

Léon Perlemuter

Gabriel Perlemuter

**2015**

# Guide de Thérapeutique

*8<sup>e</sup> édition*



**120 000 exemplaires vendus !**



**Plus de 1 000 maladies  
Plus de 3 000 médicaments**

# Guide de thérapeutique

8<sup>e</sup> édition

**Léon Perlemuter**

Professeur des universités  
Ancien chef du service endocrinologie, diabétologie, nutrition  
CHU Henri-Mondor, Créteil

**Gabriel Perlemuter**

Professeur des universités – Praticien hospitalier  
CHU Bicêtre – Université Paris-Sud  
Hôpital Antoine-Béclère, Clamart



ELSEVIER  
MASSON



Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du "photocopillage".

Cette pratique qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignements, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer de œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie :

20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Tél. : 01 44 07 47 70.

*Les indications et posologies de tous les médicaments cités dans ce livre ont été recommandées dans la littérature médicale et concordent avec la pratique de la communauté médicale. Elles peuvent, dans certains cas particuliers, différer des normes définies par les procédures d'AMM. De plus, les protocoles thérapeutiques pouvant évoluer dans le temps, il est recommandé au lecteur de se référer en cas de besoin aux notices des médicaments, aux publications les concernant et à l'Agence du médicament. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsables des prescriptions de chaque médecin.*

*La mise à jour des données thérapeutiques de cet ouvrage fait appel aux principales bases de données médicaments faisant référence. Nous les en remercions.*

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5, et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© Elsevier Masson S.A.S., Tous droits réservés, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008,  
2010, 2012, 2014

ISBN : 978-2-294-73971-2

À Maman,  
pour toute l'aide qu'elle nous a apportée  
dans la relecture de cet ouvrage.

Gabriel



# ONT COLLABORÉ AUX 8<sup>e</sup> ET 7<sup>e</sup> ÉDITIONS

## CARDIOLOGIE

**Katy Perlemuter**, cardiologue.

## DERMATOLOGIE

**Fabrice Ribeau**, dermatologue, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien assistant des hôpitaux, Le Mans.

## ENDOCRINOLOGIE

**Camille Buffet**, DES d'endocrinologie, interne des hôpitaux de Paris.

**Léon Perlemuter**, professeur des universités, ancien chef du service endocrinologie, diabétologie, nutrition, CHU Henri-Mondor, Créteil.

**Jean-Louis Thomas**, ancien chef de clinique, praticien attaché-consultant en endocrinologie à l'hôpital Henri-Mondor, Créteil.

## GASTRO-ENTÉROLOGIE – HÉPATOLOGIE

**Gabriel Perlemuter**, professeur des universités, praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère, Clamart, CHU Bicêtre – université Paris-Sud.

## GYNÉCOLOGIE – OBSTÉTRIQUE

**Élodie Adda-Herzog**, gynécologue-obstétricien, chef de clinique-assistant, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

## HÉMATOLOGIE – ONCOLOGIE

**Tereza Coman**, chef de clinique assistant, service de greffe, hôpital Saint-Louis, Paris.

**Yohan Loriot**, oncologue médical, Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

## INTOXICATIONS

**François Brivet**, ancien chef du service de réanimation médicale, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

**Frédéric Jacobs**, réanimateur médical, praticien hospitalier, service de réanimation médicale polyvalente, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

## MALADIES INFECTIEUSES

**Benjamin Wyplosz**, praticien hospitalier, service de maladies infectieuses et tropicales, centre de vaccinations internationales, hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre.

## NÉPHROLOGIE

**Alexandre Cez**, DES de néphrologie, interne des hôpitaux de Paris.

**Dominique Joly**, professeur des universités, praticien hospitalier, service de néphrologie, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

## NEUROLOGIE

**Céline Talamon**, neurologue, praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

## OPHTALMOLOGIE

**Florence Ribeau**, ophtalmologiste, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien assistant des hôpitaux, Le Mans.

## ORL – STOMATOLOGIE

**Benoît Theoleyre**, ORL ancien chef de clinique.

**Morgan Chirat**, ORL, interne des hôpitaux de Paris, service d'ORL, hôpital Necker-Enfants Malades, Paris.

## PÉDIATRIE

**Francis Perreaux**, pédiatre, praticien hospitalier, service des urgences, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

## PHARMACOLOGIE

**Élodie Barbier**, pharmacienne.

**Charlotte Ménage**, pharmacienne.

**Adam Skiredj**, pharmacien.

## PNEUMOLOGIE

**Anne Roche**, interne en pneumologie, CHU Dijon Inter-région Grand-Est.

**David Montani**, pneumologue, maître de conférence des universités, praticien hospitalier, service de pneumologie et soins intensifs, Inserm U999, hôpital de Bicêtre, université Paris-Sud.

## PSYCHIATRIE

**Andrei Radtchenko**, psychiatre, praticien hospitalier, service de psychiatrie, hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux.

## RHUMATOLOGIE – ORTHOPÉDIE

**André Cohen de Lara**, rhumatologue, ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris, expert près la Cour d'Appel de Paris.

**Gilles Hayem**, rhumatologue, praticien hospitalier, service de rhumatologie, CHU Ambroise-Paré, Boulogne.

## UROLOGIE

**Marc-Olivier Timsit**, urologue, praticien hospitalier, service d'urologie, hôpital européen Georges Pompidou et hôpital Necker, Paris.

**Dominique Joly**, professeur des universités, praticien hospitalier, service de néphrologie, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

# ONT COLLABORÉ AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

## CARDIOLOGIE

**Katy Perlemuter**, cardiologue, Hôpital Américain de Paris.

**David Messika-Zeitoun**, cardiologue, praticien hospitalier, département de cardiologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris.

## DERMATOLOGIE

**Fabrice Ribeau**, dermatologue, praticien attaché, service de dermatologie, CH, Le Mans.

## ENDOCRINOLOGIE

**Léon Perlemuter**, professeur des universités, ancien chef du service endocrinologie, diabétologie, nutrition, CHU Henri-Mondor, Créteil.

## GASTRO-ENTÉROLOGIE – HÉPATOLOGIE

**Gabriel Perlemuter**, professeur des universités, praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère, Clamart, CHU Bicêtre – université Paris-Sud.

## GYNÉCOLOGIE – OBSTÉTRIQUE

**Eli Azria**, chef de clinique, service de gynécologie-obstétrique, maternité de Port-Royal, hôpital Cochin, Paris.

**Catherine Huzan**, chef de clinique assistant, service de gynécologie-obstétrique, hôpital intercommunal de Créteil.

**Vanina Castaigne**, praticien hospitalier, service de gynécologie-obstétrique, hôpital Saint-Antoine, Paris.

## HÉMATOLOGIE – ONCOLOGIE

**Bernard Haerni**, professeur des universités, service de médecine, Institut Bergonié, Bordeaux.

**Houchingue Eghbali**, chef de service, hôpital de jour, Institut Bergonié, Bordeaux.

**Alain Ravaud**, professeur des universités, praticien hospitalier, service de radiothérapie, hôpital Saint-André, Bordeaux.

## INTOXICATIONS

**François Brivet**, praticien hospitalier et chef du service de réanimation médicale polyvalente, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

**Frédéric Jacobs**, réanimateur médical, praticien hospitalier, service de réanimation médicale polyvalente, hôpital Antoine-Béclère, Clamart.

## MALADIES INFECTIEUSES

**Benjamin Wyplosz**, praticien hospitalier, unité de maladies infectieuses et tropicales, hôpital universitaire Paul-Brousse, Villejuif.

## NÉPHROLOGIE

**Dominique Joly**, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, service de néphrologie, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

## NEUROLOGIE

**Jean-Christophe Corvol**, chef de clinique-assistant, service de neurologie, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.

## OPHTALMOLOGIE

**Florence Ribeau**, ophtalmologiste, praticien attaché, CH, Le Mans.

## ORL – STOMATOLOGIE

**Stéphane Temam**, chirurgien ORL, département d'ORL et de chirurgie maxillo-faciale, institut Gustave-Roussy, Villejuif.

## PÉDIATRIE

**Fabrice Lesage**, praticien hospitalier, service de réanimation pédiatrique polyvalente, hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

**Delphine Zenaty**, praticien hospitalier, service d'endocrinologie pédiatrique, hôpital Robert-Debré, Paris.

## PNEUMOLOGIE

**Franck Lavergne**, ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris, médecin adjoint, service de pneumologie, clinique Edouard-Rist, Paris.

## PSYCHIATRIE

**Philippe Fossati**, professeur des universités, praticien hospitalier, service de psychiatrie d'adultes, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.

**Cédric Lemogne**, interne des hôpitaux, CNRS UMR 7593.

**Gilles Amar**, psychiatre, praticien hospitalier, service de psychiatrie pour adultes, hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux.

## RHUMATOLOGIE – ORTHOPÉDIE

**André Cohen de Lara**, rhumatologue, ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris, expert près la Cour d'Appel de Paris.

## UROLOGIE

**Yvan Barthélémy**, urologue, clinique du Plateau-Clamart, Clamart.

+ **Jean Waligora**, urologue.

# À PROPOS DE LA 8<sup>e</sup> ÉDITION

Le *Guide de thérapeutique* est une référence. Son succès montre le besoin pour les médecins de disposer d'un outil fiable, facile à manier et répondant à la pratique quotidienne. De nombreux chapitres de cette 8<sup>e</sup> édition ont été complètement actualisés. Tous les médicaments ont été mis à jour et les nouvelles molécules insérées. La médecine fondée sur les preuves (*evidence based medicine* des Anglo-Saxons) a conduit à établir des recommandations et consensus par différents organismes comme la Haute Autorité de Santé (HAS) ou les sociétés savantes des différentes spécialités.

## Les consensus et recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et des sociétés savantes

L'établissement de ces consensus et recommandations officiels est issu de l'opinion d'experts à partir des données publiées. Les consensus font référence dans les prescriptions et la prise en charge des patients. La rédaction de cette nouvelle édition du *Guide de thérapeutique* a pris en compte les consensus et recommandations existants à ce jour. Les références des consensus ont été intégrées en bas de pages, dans un encadré spécifique, pour que le lecteur puisse, s'il le souhaite, trouver facilement le texte original *in extenso*.

## Les règles de prescription

Les règles reposent sur une approche exigeante mais pragmatique de la médecine de terrain. Il n'est de bonne prescription que si la stratégie choisie tient compte des éléments suivants :

- l'état général du patient ;
- la forme clinique de l'affection ;
- les effets attendus ;
- les conséquences du traitement dans le temps ;
- les modalités de surveillance et de suivi à long terme.

À propos de chacune des pathologies envisagées, les règles de prescription ont été exposées de façon aussi précise que complète.

## Médicaments référents et génériques

Bien des médicaments ont été supprimés et de nouveaux sont apparus et ont été introduits. Toute la pharmacologie a ainsi été revue et mise à jour. La prescription des médicaments est en effet en évolution constante. La commercialisation des génériques est maintenant commune et il est possible de rédiger les ordonnances en utilisant la DCI.

De nouvelles molécules ont été insérées et les prix et taux de remboursement ont été actualisés.

Pour aider à la rédaction des ordonnances, les médicaments qui existent sous forme de génériques ont été identifiés en écrivant en rouge leur DCI et leur nom commercial. En revanche, pour ne pas surcharger de façon inutile l'ouvrage, on n'a pas introduit la liste exhaustive des génériques, laissant aux pharmaciens la responsabilité du choix.

En un coup d'œil sur la « page de droite » du *Guide de thérapeutique*, le prescripteur dispose aussi de la comparaison des prix sur la totalité des produits commercialisés.

## Structure générale de l'ouvrage

Nous avons conservé la présentation qui simplifie considérablement le travail du lecteur. Sur la page de gauche (bandeaux noirs) figurent les principales pathologies de la pratique médicale. Sur la page de droite (bandeaux rouges) est donné le choix des médicaments avec la présentation, la posologie, le prix et les taux de remboursement ainsi que la pharmacologie pratique. Seuls les chapitres les plus longs et les médicaments ayant des indications multiples ne peuvent respecter strictement les pages de droite et de gauche.

## Version électronique (application pour smartphones et tablettes)

Une version électronique de l'ouvrage est disponible sous forme d'application pour smartphones et tablettes (iPhone, iPad, Android sur App Store et Google play). Cette version est une véritable application conviviale et non pas une simple reproduction de l'ouvrage sous forme e-book. Elle permet de s'affranchir de la mise en page. L'ensemble de l'ouvrage est accessible, à partir de plusieurs index (maladie, médicaments, global), par de simples clics. Chaque pathologie est

présentée avec son plan, également dépliable par des clics. Les tableaux et la pharmacologie des médicaments cités dans la prise en charge des maladies sont ainsi immédiatement disponibles par des liens hypertextes. Ils peuvent aussi être consultés directement à partir de l'index. Les conférences de consensus sont appelées par les liens hypertextes.

Cette 8<sup>e</sup> édition actualisée du *Guide de thérapeutique* conserve ce qui a fait, pensons-nous, sa réputation : facilité, précision et sécurité de la prescription. Ce guide reste aussi d'une actualité permanente qui est indispensable non seulement pour les généralistes ou les hospitaliers mais également pour les étudiants et les candidats au concours des épreuves classantes nationales (ECN).

**Léon Perlemuter**

**Gabriel Perlemuter**

Les visuels reproduits ici correspondent à la présentation de l'ouvrage papier.

## Pathologies

Les maladies sont regroupées autour de 17 spécialités médicales

Chaque pathologie fait l'objet d'une présentation détaillée

Des recommandations sont données et les objectifs thérapeutiques définis

Les stratégies thérapeutiques sont détaillées

552 Gastro-entérologie - Néphrologie

### CONSTIPATION (1)

L'apparition récente d'une constipation doit faire rechercher l'apparition d'un obstacle organique avant de débiter un traitement symptomatique.

En dehors de ce cas, la constipation peut relever de 2 mécanismes :

**Indications des examens biologiques (1)**  
Constipation persistante et ne répondant pas à un traitement adéquat : NFS, CRP, glycémie, TSH, calcémie, créatinémie.

**Indications de la coloscopie (1)**  
Âge > 50 ans ; suspicion de constipation organique, signes d'alarme (cf. Endoscopie digestive basse).

**Boissons abondantes, au moins 2 L/j.**

Toutes ces orientations vont souvent à l'encontre des habitudes des patients et il faut savoir varier les traitements pour éviter la lassitude.

**Constitution simple**

**Mesures d'hygiène**

- Repas  
Les repas doivent être pris lentement, au calme, à heures fixes, en marchant bien. Une eau riche en magnésium (Jaiprot) peut être conseillée. La dentition doit être vérifiée et apparée si besoin.
- Déviation  
Les excréments doivent avoir lieu à heures fixes, le matin, en prenant au besoin un grand verre d'eau froide quelques minutes avant stimulation du réflexe gastrocolique.
- Activité physique  
Elle doit être régulière.

**Mesures diététiques**

- Augmentation du volume du bol fécal  
Le régime doit comporter des aliments « de balais » : pain complet, légumes verts, fruits.
- Au besoin, on peut s'aider de fibres alimentaires, son de blé (ALIBAN de AZELLOGIC) : 1 c.à.s (5 g) tous les 2 j à augmenter très progressivement tous les 3-4 j pour atteindre 20 g/j ; un apport trop brutal risque de s'accompagner de ballonnements. Un mucilage type **Spagolax** **MUCILAGE PUR** peut également être proposé : 1 à 3 sach./j.

**Traitement médicamenteux**

- Laxatifs non irritants
  - En première intention (1) : laxatif type **macrogol (MOVICOL)** : 1 à 3 sach. le matin ou du lactulose (**SUPRALACE** 1+0-3 clartyl) en 1 prise le matin à dose progressive.
  - En seconde intention (1) : laxatif lubrifiant, huile de paraffine (**LANSOFIT**) : 1 à 4 c.à.s.
- Laxatifs stimulants  
Ils doivent être évités sauf pour des courtes durées car ils risquent d'entraîner une colépathie aux laxatifs (diarrhées, troubles hydroélectrolytiques, etc.). Dans certains cas particuliers (par exemple constipation post-chimiothérapiques, on peut proposer un laxatif anticholinergique (**PERSTALTINE**) : 1 cp. le soir pendant 3 j).
- Chez les femmes (pas chez les hommes) pour lesquelles le traitement précédent n'a pas le bénéfice escompté, on peut proposer un antagonisme des récepteurs 5HT<sub>4</sub>, **prucalopride (RESOLON)** : 2 cp. en une prise au cours d'un repas. Si après 4 semaines, le traitement reste inefficace, il faut l'arrêter.

**CONSENSUS**

(1) Recommandations pour la pratique clinique dans la prise en charge et le traitement de la constipation chronique de l'adulte, SNGC, 2007.

Si une conférence de consensus existe, elle est signalée et référencée au fil du texte

Chaque médicament est présenté sous sa DCI et son nom commercial

Les références précises des consensus sont indiquées

**Taux de remboursement par la sécurité sociale ou NR (non remboursé) ou HOP (délivré uniquement dans les hôpitaux)**

**Liste**

**Classe thérapeutique**

**DCI en rouge si existe en générique**

**Nom commercial en rouge si médicament générique**

**Prescription : posologie, durée du traitement, modes d'administration**

**Nom commercial**

**Nombre d'unités dans le conditionnement, forme galénique, quantité de produit actif par unité**

**Prix du conditionnement**

**Prix par unité**

**Propriétés, et Indications**

**Contre-Indications absolues et relatives (avec commentaire en cas de grossesse ou d'allaitement)**

**Précautions d'emploi (avec commentaire en cas de grossesse ou d'allaitement)**

**Effets indésirables et interactions médicamenteuses**

**LAXATIFS**

**LAXATIFS (1) - LAXATIFS OSMOTIQUES (1)**

**Lactulose**

**DUPHALAC**

Composition : 1 à 2 sachet(s)  
ou 15 mL, 4 à 10 sachet(s)  
ou 30 mL, 4 à 10 sachet(s)

**LAXARON**

Composition : idem DUPHALAC

**Lactitol**

**IMPORTAL**

Composition : idem DUPHALAC

**Sorbitol**

**SORBITOL DELAINE**

Composition : idem DUPHALAC

**Pentasterytolol**

**AGITTRANS**

Composition : idem DUPHALAC

**Magnésium**

**FORLEX**

A : 1 à 2 sachet(s) en 1 prise le matin  
E : 1 à 2 sachet(s) en 1 prise le matin

**MOVICO**

A : 1 à 2 sachet(s) en 1 prise le matin

**MOVICO ENFANTS**

E : 1 à 2 sachet(s) en 1 prise le matin

**TRANSIPIC**

A : 1 à 2 sachet(s) 5,0 g  
ou 2 à 4 sachet(s) 5,0 g  
en 1 prise le matin

**MOVICALSE**

idem MOVICO

**Magnésium hydroxyde**

**CHOLBAGINE**

A : 1 sachet le matin à jeun ou le soir au coucher

**PROPRIÉTÉS**

Laxatifs osmotiques augmentant l'hydratation du bol fécal. Le **lactulose** et le **lactitol** sont hypotonomimentaires : ils abaissent le pH colique en favorisant l'absorption de l'eau, ils facilitent le glissement de l'ensemble sanguin dans la lumière intestinale.

Les **macrogols** sont des polymères linéaires sans lesquels sont retenus les molécules d'eau. Ils entraînent une augmentation du volume des liquides intestinaux.

**INDICATIONS**

Troubles fonctionnels de la constipation (sténopéptique hémiparésie pour le **lactulose** et le **lactitol**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Colites, inflammations, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, syndrome occlusif.

**Précautions d'emploi**

Ne pas utiliser chez les patients souffrant de diabète sucré.

**Effets indésirables**

Diarrhées, flatulences, douleurs abdominales, nausées, vomissements, éruption cutanée.

**Interactions médicamenteuses**

Le **lactulose** et le **lactitol** peuvent diminuer l'absorption de certains médicaments.

**Précautions d'emploi**

Ne pas utiliser chez les patients souffrant de diabète sucré.

**Effets indésirables**

Diarrhées, flatulences, douleurs abdominales, nausées, vomissements, éruption cutanée.

**Interactions médicamenteuses**

Le **lactulose** et le **lactitol** peuvent diminuer l'absorption de certains médicaments.

## **xvi** À propos des médicaments

Chaque tableau de médicament comporte (voir exemple de tableau ci-après) :

- la classe des médicaments : ici vasodilatateurs et anti-ischémiques ;
- les dénominations communes internationales (DCI) : **naftidrofuryl, pentoxifylline, ginkgo biloba, ifendropil, piribédil**. L'écriture en rouge\* de naftidrofuryl et de pentoxifylline que ces DCI sont proposées sous forme de générique.
- Les noms commerciaux : ici *PRAXILÈNE, PENTOFLUX, TANAKAN, TRAMISAL, VADILEX, TRIVASTAL*. L'écriture en rouge\* de *PENTOFLUX* signifie que le médicament est un générique.

Pour chaque médicament, 8 indications sont systématiquement fournies :

- 1) **La prescription** : posologie, durée d'administration, modes d'administration si nécessaire.
- 2) **Le nombre d'unités dans le conditionnement** (ex. : nombre de comprimés par boîte, nombre de gouttes dans un flacon).
- 3) **Le conditionnement** (ou présentation) : comprimés, gélules, gouttes, ampoules, etc.
- 4) **La quantité de produit actif** contenue dans chaque unité. Il est essentiel dans une prescription de tenir compte de cette valeur ( $\mu\text{g}$ , mg, etc.) non seulement pour la posologie mais pour la quantité d'unités (boîtes, ampoules) nécessaires pour la durée de la prescription.
- 5) **Le prix total** du conditionnement qui permet une comparaison rapide des coûts des médicaments (à présentation égale). Quand le médicament n'est pas remboursé : « NR ». Quand il est délivré uniquement par les hôpitaux : « HOP ».

6) **La liste** sur laquelle est inscrit le médicament.

7) **Le taux de remboursement.**

8) **Le coût unitaire** est le rapport entre le prix total et le nombre d'unités dans le conditionnement (ex : nombre de comprimés).

Pour comparer le coût des médicaments entre eux, il faut évidemment tenir compte :

- *du coût du traitement par jour* qui varie en fonction du nombre d'unités prescrites. Il suffit de multiplier le coût unitaire par le nombre d'unités ;
- de la quantité de produit contenue dans l'unité.

Attention : le nombre d'unités par jour et la quantité de produit contenue sont encore plus importants à prendre en compte, lorsque des médicaments de même DCI sont comparés entre eux.



## ■ Naftidrofuryl

PRAXILÈNE					
Artériopathies :	20 cp. 200 mg	4,45	II	15 %	0,22
- 1 cp. x 3/j au cours des repas	90 cp. 200 mg	17,53	II	15 %	0,19
- 2 gél. x 3/j au cours des repas	20 gél. 100 mg	3,11	II	15 %	0,16

## ■ Pentoxifylline

PENTOFLEX					
1 à 3 cp./j au cours des repas	100 cp. LP 400 mg		II	NR	

## ■ Ginkgo biloba

TANAKAN					
3 cp./j au cours des repas	30 cp. 40 mg		II	NR	
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	90 cp. 40 mg		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3/j	30 doses buv. 1 mL (fl. 30 mL) 40 mg/mL		II	NR	
	90 doses buv. 1 mL (fl. 90 mL) 40 mg/mL		II	NR	
TRAMISAL					
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	30 doses 1 mL (fl. 30 mL)		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3/j	40 mg/mL				

## ■ Ifenprodil

VADILEX					
2 à 3 cp./j	30 cp. 20 mg		II	NR	
	50 cp. 20 mg	HOP	I		

## ■ Piritibédil

TRIVASTAL					
Artériopathie : 4 cp. à 20 mg/j en 2 à 3 prises/j en fin de repas	30 cp. 20 mg	2,41	II	65 %	0,08
Artériopathie : 1 cp. 50 mg LP/j (max 1 cp. x 2/j)	30 cp. LP 50 mg	10,11	I	65 %	0,34
Inj. IM : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j en 2 inj.	100 cp. LP 50 mg	HOP	I		
Perf. IV en 4 h dans 250 mL de soluté isotonique : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j à J3 et J4 puis 3 amp./j si besoin	12 amp. 3 mg/1 mL	HOP	I		

(\*) Dans la version numérique de l'ouvrage, l'écriture en rouge est remplacée par la mention « *dispo en générique* » (pour les DCI) ou « *générique* » (pour les noms commerciaux).

- Les maladies sont regroupées autour de 17 spécialités médicales
- Chaque pathologie fait l'objet d'une présentation détaillée.
- Des recommandations sont données et les objectifs thérapeutiques définis.
- Les stratégies thérapeutiques sont détaillées.
- Chaque médicament est présenté sous sa DCI et son nom commercial.
- Les références précises des consensus sont indiquées.
- Si une conférence de consensus existe, elle est signalée et référencée au fil du texte.

- Classe Thérapeutique
- Nom commercial en rouge si médicament générique
- Prescription : posologie, durée du traitement, modes d'administration
- Nom commercial
- Propriétés, et indications
- Contre-indications absolues et relatives (avec commentaire en cas de grossesse ou d'allaitement)
- Taux de remboursement par la sécurité sociale ou NR (non remboursé) ou HOP (délivré uniquement dans les hôpitaux)
- Liste
- Nombre d'unités dans le conditionnement, forme galénique, quantité de produit actif par unité
- Prix du Conditionnement
- Prix par unité
- Précautions d'emploi (avec commentaire en cas de grossesse ou d'allaitement)
- Effets indésirables et interactions médicamenteuses

# ABRÉVIATIONS

<b>5-FU</b>	Fluorouracile	<b>Afssaps</b>	Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (devenue ANSM) <a href="http://ansm.sante.fr">ansm.sante.fr</a>
<b>5-HIAA</b>	<i>5-Hydroxyindoleacetic Acid</i>	<b>AFU</b>	Association française d'urologie <a href="http://www.urofrance.org">www.urofrance.org</a>
<b>6TGN</b>	6-thioguanines nucléotides	<b>Ag</b>	Antigène
<b>A</b>		<b>AG</b>	Anesthésie générale
<b>AA</b>	<i>Aplastic Anemia</i> (aplasie médullaire)	<b>AGC</b>	<i>Atypical Glandular Cells</i>
<b>AAA</b>	Anévrisme de l'aorte abdominale	<b>AGT</b>	Alanine glyoxylate-aminotransférase
<b>AACH</b>	Anticorps antichimérique humain	<b>AHA</b>	<i>American Heart Association</i> <a href="http://www.heart.org">www.heart.org</a>
<b>AAD</b>	<i>American Academy of Dermatology</i> <a href="http://www.aad.org">www.aad.org</a>	<b>AHAI</b>	Anémie hémolytique auto-immune
<b>AASAL</b>	Antiarthrosique symptomatique d'action lente	<b>AI</b>	Angor instable
<b>AASLD</b>	<i>American Association for the Study of Liver Diseases</i> <a href="http://www.aasld.org">www.aasld.org</a>	<b>AIC</b>	Accident ischémique constitué
<b>ABC</b>	<i>Airway, Breathing, Circulation</i>	<b>AIHUS</b>	Association inter-hospitalo-universitaire de sexologie <a href="http://www.aius.fr">www.aius.fr</a>
<b>Ac</b>	Anticorps	<b>AINS</b>	Anti-inflammatoire non stéroïdien
<b>AC</b>	Arythmie complète	<b>AIT</b>	Accident ischémique transitoire
<b>ACE</b>	Antigène carcino-embryonnaire	<b>ALAT</b>	Alanine-aminotransférase
<b>ACFA</b>	Arythmie complète par fibrillation auriculaire	<b>alcool.</b>	Alcoolique
<b>ACT</b>	<i>Activated Clotting Time</i>	<b>ALD</b>	Affection longue durée
<b>ACTH</b>	<i>Adrenocorticotrophic Hormone</i>	<b>Alfediam</b>	Association de langue française pour l'étude du diabète et des maladies métaboliques <a href="http://www.alfediam.org">www.alfediam.org</a>
<b>ACTP</b>	Angioplastie coronaire transluminale percutanée	<b>AMH</b>	<i>Anti-Müllerian Hormone</i>
<b>Ad., A.</b>	Adulte = à partir de 15 ans	<b>AMM</b>	Autorisation de mise sur le marché
<b>AD</b>	Antidiabétique	<b>amp.</b>	Ampoule
<b>ADH</b>	Alcool-déshydrogénase hépatique	<b>AMPc</b>	Adénosine monophosphate cyclique
<b>ADH</b>	<i>Antidiuretic Hormone</i>	<b>AMP</b>	Aide médicale à la procréation
<b>ADN</b>	Acide désoxyribonucléique	<b>Anaes</b>	Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (devenue HAS) <a href="http://www.has-sante.fr">www.has-sante.fr</a>
<b>ADO</b>	Antidiabétique oral	<b>ANOCEF</b>	Association des neuro-oncologues d'expression française <a href="http://www.anocef.org">www.anocef.org</a>
<b>ADP</b>	Adénosine diphosphate	<b>ANSM</b>	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ex-Afssaps) <a href="http://ansm.sante.fr">ansm.sante.fr</a>
<b>ADR</b>	Algodystrophie réflexe		
<b>AEMO</b>	Assistance éducative en milieu ouvert		
<b>AES</b>	Accident d'exposition au sang		
<b>AFEF</b>	Association française pour l'étude du foie <a href="http://www.afef.asso.fr">www.afef.asso.fr</a>		

<b>AOC</b>	Atteinte des organes cibles	<b>AVC</b>	Accident vasculaire cérébral
<b>AOD</b>	Anticoagulant oral direct	<b>AVF</b>	Algie vasculaire de la face
<b>AOMI</b>	Artériopathie oblitérante des membres inférieurs	<b>AVK</b>	Antivitamine K
<b>AP</b>	Antipsychotique	<b>AVT</b>	Événement veineux thromboembolique
<b>APA</b>	Antipsychotique atypique	<b>B</b>	
<b>APAP</b>	Antipsychotique d'action prolongée	<b>BAAR</b>	Bacille acido-alcool-résistant
<b>APECED</b>	<i>Autoimmune Polyendocrinopathy – Candidiasis – Ectodermal Dystrophy</i>	<b>BAV</b>	Bloc auriculo-ventriculaire
<b>APS</b>	Antipaludéen de synthèse	<b>BBB</b>	Bloc de branche droit
<b>aq.</b>	Aqueux	<b>BBG</b>	Bloc de branche gauche
<b>AR</b>	Antirégurgitation	<b>BCG</b>	Bacille de Calmette et Guérin
<b>ARA II</b>	Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II	<b>BDA</b>	Bouffée délirante aiguë
<b>ARE</b>	Antagoniste des récepteurs de l'endothéline	<b>BEP</b>	Bléomycine, étoposide, cisplatine (chimiothérapie)
<b>ARF</b>	Ablation par radiofréquence	<b>BFE</b>	Bureau français de l'épilepsie
<b>ARM</b>	angiographie par résonance magnétique	<b>BIM</b>	Blocage intermaxillaire
<b>ARN</b>	Acide ribonucléique	<b>BK</b>	Bacille de Koch
<b>ARV</b>	Antirétroviral	<b>BLSE</b>	Bêta-lactamase à spectre étendu
<b>ASAT</b>	Aspartate-aminotransférase	<b>BMR</b>	Bactérie multirésistante
<b>ASC</b>	Aire sous la courbe	<b>BNL</b>	Bilirubine non liée
<b>ASC-H</b>	<i>Atypical Squamous Cells evocating High grade lesions</i>	<b>BNP</b>	Peptide natriurétique de type B
<b>ASCO</b>	<i>American Society of Clinical Oncology</i> <a href="http://www.asco.org">www.asco.org</a>	<b>BPC</b>	Bonnes pratiques cliniques
<b>ASC-US</b>	<i>Atypical Squamous Cells of Unknown Significance</i>	<b>BPCO</b>	Bronchopneumopathie chronique obstructive
<b>ASE</b>	Agent stimulant l'érythropoïèse	<b>Bq</b>	Becquerel
<b>ASE</b>	Aide sociale à l'enfance	<b>BSA</b>	Bloc sino-auriculaire
<b>ASG</b>	Autosurveillance des glycémies capillaires	<b>BU</b>	Bandelette urinaire
<b>ASI</b>	Activité sympathomimétique intrinsèque	<b>buv.</b>	Buvable
<b>ASLO</b>	Antistreptolysine O	<b>BZD</b>	Benzodiazépine
<b>ASP</b>	Abdomen sans préparation (radiographie d')	<b>C</b>	
<b>ATCD</b>	Antécédent	<b>c-mes.</b>	Cuiller-mesure
<b>ATL</b>	Angioplastie transluminale	<b>CA</b>	Cancer Antigen
<b>ATP</b>	Adénosine triphosphate	<b>ca</b>	Conduction aérienne
<b>ATS</b>	Antithyroïdien de synthèse	<b>càc</b>	Cuiller à café = 5 mL
<b>ATT</b>	Aérateurs trans-tympanique	<b>CAE</b>	Conduit auditif externe
<b>ATU</b>	Autorisation temporaire d'utilisation	<b>CAI</b>	Conduit auditif interne
<b>AUC</b>	<i>Aera Under the Curve</i> (aire sous la courbe de distribution d'un médicament)	<b>CAP</b>	Conjonctivite allergique perannuelle
<b>AUT</b>	Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques	<b>caps.</b>	Capsule
		<b>càs</b>	Cuiller à soupe = 15 mL
		<b>CAS</b>	Conjonctivite allergique saisonnière
		<b>CAST</b>	<i>Cardiac Arrhythmia Suppression Trial</i>
		<b>CAT</b>	Conduite à tenir
		<b>CBNPC</b>	Cancer bronchique non à petites cellules
		<b>CBP</b>	Cirrhose biliaire primitive
		<b>CBPC</b>	Cancer bronchique à petites cellules

<b>CCP</b>	Concentré de complexes prothrombiniques	<b>CRRMP</b>	Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
<b>CCR</b>	Cancer colorectal	<b>CSF</b>	<i>Colony-Stimulating Factor</i>
<b>CDA</b>	Courte durée d'action	<b>CSH</b>	Cellules souches hématopoïétiques
<b>CDAI</b>	<i>Crohn Disease Activity Index</i>	<b>CSHPF</b>	Conseil supérieur d'hygiène publique de France <a href="http://www.sante.gouv.fr">www.sante.gouv.fr</a>
<b>CEC</b>	Cancer épidermoïde cutané	<b>CSI</b>	Corticostéroïde inhalé
<b>CEC</b>	Circulation extracorporelle	<b>CSP</b>	Canal semi-circulaire postérieur
<b>CECOS</b>	Centre d'étude et de conservation des ovocytes et du sperme	<b>CSP</b>	Cholangite sclérosante primitive
<b>CEE</b>	Choc électrique externe	<b>CSP</b>	Code de santé publique
<b>CG</b>	Culot globulaire	<b>CT</b>	Cholestérol total
<b>CHEP</b>	Crico-hyoïdo-épiglottopexie	<b>CTF</b>	Capacité totale de fixation (de la transferrine)
<b>CHIP</b>	Chimio-hyperthermique intrapéritonéale	<b>CU</b>	Contraction utérine
<b>CHP</b>	Crico-hyoïdopexie	<b>CVF</b>	Capacité vitale forcée
<b>CI</b>	Curie	<b>D</b>	
<b>CIM</b>	Classification internationale des maladies	<b>DAV</b>	Différence artérioveineuse en oxygène
<b>CIN</b>	néoplasie intra-épithéliale cervicale	<b>DBS</b>	<i>Deep Brain Stimulation</i>
<b>CIS</b>	Carcinome <i>in situ</i>	<b>DCCT</b>	<i>Diabetes Control and Complications Trial</i>
<b>CISH</b>	<i>Chromogenic In Situ Hybridization</i>	<b>DCNC</b>	Douleurs chroniques non cancéreuses
<b>CIV</b>	Communication interventriculaire	<b>DDASS</b>	Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
<b>CIV</b>	Corset d'immobilisation vertébrale	<b>DDB</b>	Dilatation des bronches
<b>CIVD</b>	Coagulation intravasculaire disséminée	<b>DDP-4</b>	Dipeptidyl-peptidase-4
<b>CICr</b>	Clairance de la créatinine	<b>DDT</b>	Dichlorodiphényltrichloréthane
<b>CMI</b>	Concentration minimale inhibitrice	<b>DE</b>	Dysfonction érectile
<b>CMT</b>	Cancer médullaire de la thyroïde	<b>DEC</b>	Déshydratation extracellulaire
<b>CMV</b>	Cytomégalovirus	<b>DEP</b>	Débit expiratoire de pointe ( <i>peak-flow</i> )
<b>CNGOF</b>	Collège national des gynécologues et obstétriciens français <a href="http://www.cngof.asso.fr">www.cngof.asso.fr</a>	<b>DFG</b>	Débit de filtration glomérulaire
<b>CO</b>	Monoxyde de carbone	<b>DFSP</b>	Dermatofibrosarcome protuberans
<b>co</b>	Conduction osseuse	<b>DG</b>	Diabète gestationnel
<b>COMT</b>	Catéchol-O-méthyltransférase	<b>DGS</b>	Direction générale de la santé <a href="http://www.sante.gouv.fr">www.sante.gouv.fr</a>
<b>COX</b>	Cyclo-oxygénase	<b>DHA</b>	<i>Docosahexaenoic Acid</i>
<b>cp.</b>	Comprimé	<b>DHT</b>	Dihydrotestostérone
<b>CP</b>	Concentré plaquettaire	<b>DIU</b>	Dispositif intra-utérin
<b>CPA</b>	Concentré plaquettaire d'aphérèse	<b>DLCO</b>	Diffusion libre du monoxyde de carbone
<b>CPAP</b>	<i>Continuous Positive Airway Pressure</i>	<b>DMARD</b>	<i>Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug</i>
<b>CPK</b>	Créatine-phosphokinase	<b>DMH</b>	Dérivé monohydroxylé
<b>CPS</b>	Concentré plaquettaire standard	<b>DMLA</b>	Dégénérescence maculaire liée à l'âge
<b>CRI</b>	Club rhumatismes et inflammations <a href="http://www.cri-net.com">www.cri-net.com</a>	<b>DMO</b>	Densité minérale osseuse
<b>CRIP</b>	Cellule de recueil d'informations préoccupantes	<b>DMSA</b>	<i>Dimethyl Mercapto Succinic Acid</i>
<b>CRP</b>	<i>C-Reactive Protein</i>	<b>DMSO</b>	Diméthylsulfoxyde
		<b>DNP</b>	Douleur neuropathique périphérique

- DONEF** Disjonction orbito-naso-ethmoïdo-frontale
- DPP-4** Dipeptidyl-peptidase-4
- DR** Dérèglement de la rétine
- DS** Déviation standard
- DS** Durie et Salmon (classification)
- DSI** Dose supposée ingérée
- DSM** Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
- E**
- E.** Enfant = 30 mois à 15 ans
- EASL** *European Association for the Study of the Liver* [www.easl.eu](http://www.easl.eu)
- EBO** Endobrachyœsophage
- EBV** Epstein-Barr virus
- ECBC** Examen cyto bactériologique des crachats
- ECBU** Examen cyto bactériologique des urines
- ECCO** *European Crohn's & Colitis Organisation* [www.ecco-ibd.eu](http://www.ecco-ibd.eu)
- ECG** Electrocardiogramme
- ECIL** *European Conference on Infections in Leukemia* [www.ecil.org](http://www.ecil.org)
- ECMO** *ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*
- ECOG** *Eastern Cooperative Oncology Group* [ecog.dfci.harvard.edu](http://ecog.dfci.harvard.edu)
- ECT** Electroconvulsivothérapie
- EDSS** *Expanded Disability Status Scale*
- EDTA** Acide éthylène-diamine-tétracétique
- EEC** Extraction extracapsulaire
- EEG** Electroencéphalogramme
- EER** Épuration extrarénale
- efferv.** Effervescent
- EFG** Établissement français des greffes
- EFR** Épreuves fonctionnelles respiratoires
- EG** Éthylène glycol
- EGFR** *Epidermal Growth Factor Receptor*
- EHS** *European Helicobacter Study Group* [www.helicobacter.org](http://www.helicobacter.org)
- EI** Endocardite infectieuse
- EMA** *European Medicines Agency*
- EME** État de mal épileptique
- EMG** Electromyogramme
- EP** Embolie pulmonaire
- EP** Épanchement péricardique
- EP** Équivalent phénytoïne
- EPA** *Eicosapentaenoic Acid*
- EPH** Éphrine
- EPO** Érythropoïétine
- EPR** Exposition avec prévention de la réponse
- ERSPC** *European Randomized Study of screening for Prostate Cancer*
- ES** Envenimation scorpionique
- ESC** *European Society of Cardiology* [www.escardio.org](http://www.escardio.org)
- ESH** *European Society of Hypertension* [www.eshonline.org](http://www.eshonline.org)
- ESHRE** *European Society of Human Reproduction and Embryology* [www.eshre.eu](http://www.eshre.eu)
- ESST** Encéphalite spongiforme subaiguë transmissible
- ESV** Extrasystole ventriculaire
- ETF** Échographie transfontanelle
- ETO** Échographie transœsophagienne
- Eular** *European League Against Rheumatism* [www.eular.org](http://www.eular.org)
- EVT** Événement veineux thromboembolique
- F**
- FA** Fibrillation auriculaire
- FAHA** Facteur anti-hémophilique A
- FAN** Facteur atrial natriurétique
- FC** Fausse couche
- FC** Fréquence cardiaque
- FCS** Fausse couche spontanée
- FCV** Frottis cervicovaginal
- FDR** Facteur de risque
- FEVG** Fraction d'éjection du ventricule gauche
- FFA** Fédération française d'addictologie [www.addictologie.org](http://www.addictologie.org)
- FFCD** Fédération francophone de cancérologie digestive [www.ffcd.fr](http://www.ffcd.fr)
- FFI** Fédération française d'inféctiologie [www.inféctiologie.com/site/ffi.php](http://www.inféctiologie.com/site/ffi.php)
- FFP** Fédération française de psychiatrie [psydoc-fr.broca.inserm.fr](http://psydoc-fr.broca.inserm.fr)
- FIGO** Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique [www.figo.org](http://www.figo.org)
- FIO<sub>2</sub>** Fraction inspirée d'oxygène
- FISH** *Fluorescent In Situ Hybridization*
- FIV** Fécondation *in vitro*

<b>fl.</b>	Flacon	<b>GPIP</b>	Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique <a href="http://www.sfpediatrie.com/groupe-de-specialites/gpip.html">www.sfpediatrie.com/groupe-de-specialites/gpip.html</a>
<b>FLIPI</b>	<i>Follicular International Prognostic Index</i>	<b>GRAPP</b>	Groupe de recherche sur les avancées en pneumopédiatrie
<b>FLR</b>	Fiessinger-Leroy-Reiter	<b>gttes</b>	Gouttes
<b>FLT3</b>	Fms-like tyrosine-kinase-3	<b>GVH</b>	Greffon <i>versus</i> hôte
<b>FNCLCC</b>	Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer <a href="http://www.unicancer.fr">www.unicancer.fr</a>	<b>Gy</b>	Gray
<b>FOGD</b>	Fibroscopie œso-gastro-duodénale	<b>H</b>	
<b>FQAP</b>	Fluoroquinolone anti-pneumococcique	<b>HAART</b>	<i>Highly Active Antiretroviral Therapy</i>
<b>FR</b>	Fréquence respiratoire	<b>HACCEK</b>	<i>Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Capnocytophaga, Eikenella, Kingella</i>
<b>FSH</b>	<i>Folliculo-Stimulating Hormone</i>	<b>HAQ</b>	<i>Health Assessment Questionnaire</i>
<b>FV</b>	Fibrillation ventriculaire	<b>HAS</b>	Haute autorité de santé <a href="http://www.has-sante.fr">www.has-sante.fr</a>
<b>G</b>		<b>Hb</b>	Hémoglobine
<b>g</b>	Gramme	<b>HbA1c</b>	Hémoglobine glyquée
<b>G6PD</b>	Glucose-6-phosphate-déshydrogénase	<b>HBAG</b>	Hémi-bloc antérieur gauche
<b>GABA</b>	<i>Gamma-Aminobutyric Acid</i>	<b>HbCO</b>	Carboxyhémoglobine
<b>GAFA</b>	Glaucome aigu par fermeture de l'angle	<b>HBPG</b>	Hémi-bloc postérieur gauche
<b>G-CSF</b>	<i>Granulocyte-Colony Stimulating Factor</i>	<b>HBPM</b>	Héparine de bas poids moléculaire
<b>GC</b>	Centre germinatif	<b>HCAI</b>	Hépatite chronique auto-immune
<b>GC</b>	Glaucome chronique	<b>HCG</b>	Hormone chorionique gonadotrophique
<b>GCAO</b>	Glaucome chronique à angle ouvert	<b>HCSP</b>	Haut conseil de la santé publique <a href="http://www.hcsp.fr">www.hcsp.fr</a>
<b>GDS</b>	Gaz du sang	<b>HDL</b>	<i>High Density Lipoprotein</i>
<b>gél.</b>	Gélule	<b>HDT</b>	Hospitalisation à la demande d'un tiers
<b>GERCOR</b>	Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie	<b>HELLP</b>	<i>Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels and Low Platelet</i> (hémolyse, augmentation des transaminases, thrombopénie)
<b>GEU</b>	Grossesse extra-utérine	<b>HER2</b>	<i>Human Epidermal Growth Factor Receptor 2</i>
<b>GFGHNP</b>	Groupe francophone de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique <a href="http://www.gfhgnp.org">www.gfhgnp.org</a>	<b>HES</b>	Hyperéosinophilie sanguine
<b>GGT</b>	Gamma-glutamyl-transférase	<b>HFM</b>	Hémorragie fœto-maternelle
<b>GH</b>	<i>Growth Hormone</i> (hormone de croissance ou somathormone)	<b>HGPO</b>	Hyperglycémie provoquée par voie orale
<b>GINA</b>	<i>Global Initiative for Asthma</i> <a href="http://www.ginasthma.org">www.ginasthma.org</a>	<b>HGPRT</b>	Hypoxanthine guanine-phosphoribosyl transférase
<b>GIST</b>	<i>Gastrointestinal Stromal Tumor</i>	<b>HHV</b>	<i>Human Herpes Virus</i>
<b>glé.</b>	Granulés	<b>HLA</b>	<i>Human Leucocyte Antigen</i> (systèmes antigéniques portés par les leucocytes)
<b>GLP-1</b>	Glucagon-like peptide-1	<b>HNF</b>	Héparine non fractionnée
<b>GM-CSF</b>	<i>Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor</i>	<b>HMG</b>	<i>Human Menopausal Gonadotropin</i>
<b>GMHT</b>	Goière multihétéronodulaire toxique	<b>HNPCC</b>	<i>Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer</i>
<b>GMP</b>	Guanosine monophosphate		
<b>GN</b>	Granulocyte neutrophile		
<b>GnRH</b>	<i>Gonadotropin Releasing Hormone</i>		
<b>GNRP</b>	Glomérulonéphrite rapidement progressive		
<b>gom.</b>	Gomme		
<b>GPIIb/IIIa</b>	Glycoprotéine IIb IIIa		

<b>HO</b>	Hospitalisation d'office	<b>INNTI</b>	Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse
<b>HOC</b>	Hyperstimulation ovarienne contrôlée	<b>INPES</b>	Institut national de prévention et d'éducation pour la santé www.inpes.sante.fr
<b>HOP</b>	Réservé à l'usage hospitalier	<b>INR</b>	<i>International Normalized Ratio</i>
<b>HPV</b>	<i>Human Papillomavirus</i>	<b>INRT</b>	<i>Involved Node Radiotherapy</i>
<b>HSIL</b>	<i>High-grade Squamous Intraepithelial Lesions</i>	<b>INTI</b>	Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse
<b>HSV</b>	<i>Herpes Simplex Virus</i>	<b>IP</b>	Inhibiteur de protéase
<b>Ht</b>	Hématocrite	<b>IP/r</b>	Inhibiteur de protéase + ritonavir
<b>HTA</b>	Hypertension artérielle	<b>IPD</b>	Interphalangienne distale (articulation)
<b>HTAP</b>	Hypertension artérielle pulmonaire	<b>IPDES</b>	Inhibiteur des phosphodiesterases de type 5
<b>HTIC</b>	Hypertension intracrânienne	<b>IPi</b>	Index pronostique international
<b>HTLV</b>	<i>Human T-Lymphotropic Virus</i>	<b>IPP</b>	Incapacité partielle permanente
<b>HTP</b>	Hypertension pulmonaire	<b>IPS</b>	Index de pression systolique
<b>I</b>		<b>IRA</b>	Insuffisance rénale aiguë
<b>IA</b>	Insuffisance aortique	<b>IRA</b>	Isode radioactif
<b>IAG</b>	Inhibiteur des a-glucosidases	<b>IRC</b>	Insuffisance rénale chronique
<b>IAH</b>	Index d'apnées et d'hypopnées	<b>IRC</b>	Insuffisance respiratoire chronique
<b>IAH</b>	Insuffisance antéhyophysaire	<b>IRM</b>	Imagerie par résonance magnétique
<b>IAS</b>	Infection associée aux soins	<b>IRSNA</b>	Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
<b>IC</b>	Index cardiaque	<b>ISL</b>	Insuffisance surrénale lente
<b>ICPTM</b>	Infection compliquée de la peau et des tissus mous	<b>ISRS</b>	Inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine
<b>ICT</b>	Irradiation corporelle totale	<b>IST</b>	Infection sexuellement transmissible
<b>IDF</b>	<i>International Diabetes Federation</i> www.idf.org	<b>ITG</b>	Interruption thérapeutique de grossesse
<b>IDM</b>	Infarctus du myocarde	<b>ITK</b>	Inhibiteur de tyrosine-kinase
<b>IDPP-4</b>	Inhibiteur de la dipeptidyl-peptidase-4	<b>ITL</b>	Infection tuberculeuse latente
<b>IDR</b>	Intradermoréaction	<b>ITT</b>	Incapacité temporaire totale
<b>IEC</b>	Inhibiteur de l'enzyme de conversion	<b>IUE</b>	Incontinence urinaire d'effort
<b>IFN</b>	Interféron	<b>IV</b>	Intraveineux
<b>IFRT</b>	<i>Involved Field Radiotherapy</i>	<b>IVD</b>	Intraveineux direct
<b>Ig</b>	Immunoglobuline	<b>IVDL</b>	Intraveineux direct lent
<b>IGF1</b>	<i>Insulin-Like Growth Factor 1</i>	<b>IVG</b>	Interruption volontaire de grossesse
<b>IGRA</b>	<i>Interferon Gamma Release Assay</i>	<b>IVSE</b>	Intraveineux à la seringue électrique
<b>IHC</b>	Immunohistochimie	<b>IVT</b>	Intravitréen
<b>IIC</b>	Injection intracaveuse	<b>J</b>	
<b>IIU</b>	Insémination intra-utérine	<b>j</b>	Jour
<b>IL</b>	Interleukine	<b>K</b>	
<b>IM</b>	Insuffisance mitrale	<b>KGC</b>	Kératoconjonctivite gigantométopillaire
<b>IM</b>	Intramusculaire	<b>KPC</b>	Kératite ponctuée superficielle
<b>IMAO</b>	Inhibiteur de la monoamine-oxydase	<b>L</b>	
<b>IMC</b>	Indice de masse corporelle	<b>LAL</b>	Leucémie aiguë lymphoblastique
<b>IMG</b>	Interruption médicale de grossesse		
<b>IMS</b>	<i>International Menopause Society</i> www.imsociety.org		
<b>INH</b>	Isoniazide		
<b>inj.</b>	Injection		



<b>LAM</b>	Leucémie aiguë myéloblastique	<b>MAPA</b>	Mesure ambulatoire de la pression artérielle
<b>LAP</b>	Leucémie à promyélocytes	<b>MAT</b>	Microangiopathies thrombotique
<b>LCE</b>	Leucémie chronique à éosinophiles	<b>MCJ</b>	Maladie de Creutzfeldt-Jakob
<b>LCR</b>	Liquide céphalorachidien	<b>MDO</b>	Maladie à déclaration obligatoire
<b>LDA</b>	Longue durée d'action	<b>MDRD</b>	<i>Modification of the Diet in Renal Disease</i>
<b>LDH</b>	Lactate-déshydrogénase	<b>MELD</b>	<i>Model for End-stage Liver Disease</i>
<b>LDL</b>	<i>Low Density Lipoprotein</i>	<b>mes.</b>	Mesure
<b>LEC</b>	Lithotripsie extracorporelle	<b>MFIU</b>	Mort fœtale <i>in utero</i>
<b>LEMP</b>	Leuco-encéphalite multifocale progressive	<b>MGUS</b>	<i>Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance</i>
<b>LEPI</b>	Laboratoire d'étude des particules inhalées	<b>MH</b>	Môle hydatiforme
<b>LES</b>	Lupus érythémateux systémique	<b>MIBG</b>	Métabiodobenzylguanidine
<b>LFB</b>	Laboratoire français de biofractionnement	<b>MIBI</b>	Méthoxy-isobutyl isonitrite
<b>LFCE</b>	Ligue française contre l'épilepsie	<b>MICI</b>	Maladie inflammatoire chronique de l'intestin
<b>LH</b>	<i>Luteinizing Hormone</i>	<b>MIN</b>	Mort inattendue du nourrisson
<b>LH-RH</b>	<i>Luteinizing Hormone-Releasing Hormone</i>	<b>MLA</b>	Maculopathie liée à l'âge
<b>LKM</b>	<i>Liver Kidney Microsomal</i>	<b>MM</b>	Myélome multiple
<b>LLC</b>	Leucémie lymphoïde chronique	<b>MMS</b>	<i>Mini-Mental State</i>
<b>LMC</b>	Leucémie myéloïde chronique	<b>MMT</b>	Ménométrorragies
<b>LNG</b>	Lévonorgestrel	<b>MNI</b>	Mononucléose infectieuse
<b>LNH</b>	Lymphome non hodgkinien	<b>MSKCC</b>	<i>Memorial Sloan-Kettering Cancer Center</i>
<b>LP</b>	Libération prolongée	<b>MSN</b>	Mort subite du nourrisson
<b>LPG</b>	Lymphadénopathie persistante généralisée	<b>MTP</b>	Métatarsophalangienne (articulation)
<b>LPPR</b>	Liste des produits et prestations remboursables	<b>MTX</b>	Méthotrexate
<b>LRPO</b>	Lentilles rigides perméables à l'oxygène	<b>N</b>	
<b>LSH</b>	Lentilles souples hydrophiles	<b>N.</b>	Nourrisson = 1 à 30 mois
<b>LSIL</b>	<i>Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions</i>	<b>NAC</b>	N-acétylcystéine
<b>LT3</b>	Tri-iodothyronine (ou liothyronine) libre	<b>NACO</b>	Nouvel anticoagulant
<b>LT4</b>	Tétra-iodothyronine (ou lévothyroxine) libre	<b>NAMS</b>	<i>North American Menopause Society</i> <a href="http://www.menopause.org">www.menopause.org</a>
<b>lyoph.</b>	Lyophilisé	<b>NAP</b>	Neuroleptique à action prolongée
<b>M</b>	Million	<b>NAPQI</b>	N-acétyl-p-benzoquinone imine
<b>MA</b>	Monoarthrite	<b>NASCET</b>	<i>North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial</i>
<b>MAC</b>	<i>Mycobacterium avium complex</i>	<b>NASH</b>	<i>Non Alcoholic Steato-Hepatitis</i>
<b>MAG</b>	<i>Myelin-Associated Glycoprotein</i>	<b>NASSA</b>	Antidépresseur sérotoninergique spécifique et noradrénergique
<b>MALT</b>	<i>Mucosa Associated Lymphoid Tissue</i>	<b>NCB</b>	Névralgie cervico-brachiale
<b>MAMA</b>	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée	<b>NEM</b>	Néoplasie endocrinienne multiple
<b>MAP</b>	Menace d'accouchement prématuré	<b>NFS</b>	Numération formule sanguine
		<b>NIH</b>	<i>National Institutes of Health</i> <a href="http://www.nih.gov">www.nih.gov</a>
		<b>NIHSS</b>	<i>National Institute of Health Stroke Score</i>
		<b>NISH</b>	<i>Non-radioisotopic In Situ Hybridization</i>

<b>NK1</b>	Neurokine 1	<b>PCA</b>	<i>Patient Controlled Analgesia</i>
<b>NL</b>	Neuroleptique	<b>PCA</b>	Ponction de chambre antérieure
<b>NMDA</b>	N-méthyl-D-aspartate	<b>pch.</b>	Patch
<b>NN</b>	Nouveau-né = 0 à 1 mois	<b>PCH</b>	Pharmacie centrale des hôpitaux
<b>NO</b>	Monoxyde d'azote	<b>PCO<sub>2</sub></b>	Pression partielle en dioxyde de carbone
<b>NOIAN</b>	Neuropathie optique ischémique antérieure non artérielle	<b>PCP</b>	Phencyclidine
<b>NPH</b>	<i>Neutral Protamine Hagedorn</i>	<b>PCR</b>	<i>Polymerase Chain Reaction</i>
<b>NR</b>	Non remboursé	<b>PDE</b>	Phosphodiesterase
<b>NYHA</b>	<i>New York Heart Association</i>	<b>PDGFR</b>	<i>Platelet-Derived Growth Factor Receptor</i>
<b>O</b>			
<b>OACR</b>	Oblitération de l'artère centrale de la rétine	<b>pdre</b>	Poudre
<b>OAP</b>	Œdème aigu du poumon	<b>pd<sub>t</sub></b>	Pendant
<b>OBVR</b>	Occlusion de la branche veineuse rétinienne	<b>PDT</b>	<i>Photodynamic Therapy</i>
<b>OCT</b>	<i>Optical Coherence Tomography</i>	<b>PE</b>	Pression expiratoire
<b>OHD</b>	Oxygénothérapie hyperbare	<b>PEA</b>	Potentiels évoqués auditifs
<b>OLD</b>	Oxygénothérapie de longue durée	<b>PEEP</b>	<i>Positive End-Expiratory Pressure</i>
<b>OMA</b>	Otite moyenne aiguë	<b>PEG</b>	Polyéthylène-glycol
<b>OMS</b>	Organisation mondiale de la santé <a href="http://www.who.int">www.who.int</a>	<b>pell.</b>	Pelliculé
<b>OP</b>	Œstrogéstatif	<b>perf.</b>	Perfusion
<b>OPP</b>	Ordonnance de placement provisoire	<b>PET</b>	<i>Positron Emission Tomography</i>
<b>OSM</b>	Otite sérumqueuse	<b>P-gp</b>	Glycoprotéine P
<b>OVCR</b>	Oblitération de la veine centrale de la rétine	<b>PGE1</b>	Prostaglandine de type E1
<b>OVR</b>	Oblitération veineuse rétinienne	<b>Phe</b>	Phénylalanine
<b>P</b>			
<b>P. a.</b>	<i>Propionibacterium acnes</i>	<b>PHMB</b>	Polyhexaméthylènebiguanide
<b>PA</b>	Pression artérielle	<b>PI</b>	Pression inspiratoire
<b>PAC</b>	Pontage aorto-coronaire	<b>PIO</b>	Pression intraoculaire
<b>PaCO<sub>2</sub></b>	Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel	<b>PIT</b>	Primo-infection tuberculeuse
<b>PAD</b>	Pression artérielle diastolique	<b>PL</b>	Ponction lombaire
<b>PAF</b>	Polypose adénomateuse familiale	<b>PLCO</b>	<i>Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (cancer screening trial)</i>
<b>PAI</b>	Projet d'accueil individualisé	<b>PLP</b>	Protéine de liaison aux pénicillines
<b>PAL</b>	Phosphatases alcalines	<b>PLV</b>	Protéine de lait de vache
<b>PAN</b>	Périartérite noueuse	<b>PM</b>	Pacemaker
<b>pANCA</b>	Anticorps anticytoplasme des neutrophiles	<b>PM</b>	Poids moléculaire
<b>PaO<sub>2</sub></b>	Pression partielle en oxygène du sang artériel	<b>PMI</b>	Protection maternelle et infantile
<b>PAPm</b>	Pression artérielle pulmonaire moyenne	<b>PNN</b>	Polynucléaire neutrophile
<b>PAPO</b>	Pression artérielle pulmonaire d'occlusion	<b>PO</b>	<i>Per os</i>
<b>PAS</b>	Pression artérielle systolique	<b>pomm.</b>	Pommade
<b>PASH</b>	Périarthrite scapulo-humérale	<b>PPC</b>	Pression positive continue
		<b>PPD</b>	Paraphénylènediamine
		<b>ppi</b>	Pour préparation injectable
		<b>ppm</b>	Partie par million
		<b>PPR</b>	Pseudo-polyarthrite rhizomélique
		<b>PR</b>	Polyarthrite rhumatoïde
		<b>PR</b>	Prévention de la réponse
		<b>PRE</b>	Période réfractaire effective
		<b>prép.</b>	Préparation

<b>prérempl.</b>	Préremplie	<b>rTMS</b>	<i>repetitive Transcranial Magnetic Stimulation</i>
<b>PRL</b>	Prolactine	<b>RVU</b>	Reflux vésico-urétéral
<b>PS</b>	<i>Performance Status</i>	<b>S</b>	
<b>PSA</b>	<i>Prostate Specific Antigen</i>	<b>s</b>	seconde
<b>PSDP</b>	Pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline	<b>SA</b>	Semaine d'aménorrhée
<b>PSN</b>	Produit de substitution nicotinique	<b>SAAR</b>	Sténose athéromateuse d'une artère rénale
<b>PT</b>	Potentiel tardif	<b>sach.</b>	Sachet
<b>PTG</b>	Prothèse totale du genou	<b>SAMU</b>	Service d'aide médicale d'urgence
<b>PTH</b>	Parathormone	<b>SaO2</b>	Saturation artérielle en oxygène
<b>PTH</b>	Prothèse totale de hanche	<b>SAP</b>	Seringue auto-pousseuse
<b>PTI</b>	Purpura thrombopénique	<b>SAU</b>	Service d'accueil des urgences
auto-immun		<b>SAV</b>	Sérum antivenimeux
<b>PTU</b>	Propylthiouracile	<b>SC</b>	Sous-cutané
<b>pulv.</b>	Pulvérisation	<b>SCA</b>	Syndrome coronarien aigu
<b>PVR</b>	Prolifération vitréo-rétinienne	<b>SCZ</b>	Schizophrénie
<b>Q</b>		<b>SDF</b>	Sans domicile fixe
<b>QI</b>	Quotient intellectuel	<b>SDRC</b>	Syndrome douloureux régional complexe
<b>qsp</b>	Quantité suffisante pour	<b>SE</b>	Sphinctérotomie endoscopique
<b>quadriséc.</b>	Quadrisécable	<b>séc.</b>	Sécable
<b>R</b>		<b>SEES</b>	Sonde d'entraînement électrosystolique temporaire
<b>RA</b>	Rétrécissement aortique	<b>sem.</b>	Semaine
<b>RAA</b>	Rhumatisme articulaire aigu	<b>SEP</b>	Sclérose en plaques
<b>RAC</b>	Rétrécissement aortique calcifié	<b>SEP-PP</b>	Sclérose en plaques progressive primaire
<b>RAI</b>	Recherche d'agglutinines irrégulières	<b>SEP-RR</b>	Sclérose en plaques récurrente rémittente
<b>RAR</b>	Récepteur à l'acide rétinolique	<b>SEP-SP</b>	Sclérose en plaques secondairement progressive
<b>RAST</b>	<i>Radioallergosorbent Test</i> (dosage des IgE sériques spécifiques)	<b>ser.</b>	Seringue
<b>RCF</b>	Rythme cardiaque fœtal	<b>SERM</b>	<i>Selective Estrogen Receptor Modulator</i>
<b>RCH</b>	Rectocolite hémorragique	<b>SFAR</b>	Société française d'anesthésie réanimation <a href="http://www.sfar.org">www.sfar.org</a>
<b>RCIU</b>	Retard de croissance intra-utérin	<b>SFC</b>	Société française de cardiologie <a href="http://www.cardio.fr">www.cardio.fr</a>
<b>RCP</b>	Réunion de concertation pluridisciplinaire	<b>SFCD</b>	Société française de chirurgie digestive <a href="http://www.chirurgie-viscerale.org">www.chirurgie-viscerale.org</a>
<b>RCUH</b>	Rectocolite ulcéro-hémorragique	<b>SFD</b>	Société française de dermatologie <a href="http://www.sfdermato.com">www.sfdermato.com</a>
<b>RD</b>	Rétinopathie diabétique	<b>SFE</b>	Société française d'endocrinologie <a href="http://www.sfendocrino.org">www.sfendocrino.org</a>
<b>RGO</b>	Reflux gastro-œsophagien	<b>SFED</b>	Société française d'endoscopie digestive <a href="http://www.sfed.org">www.sfed.org</a>
<b>Rh</b>	Rhésus	<b>SFH</b>	Société française d'hématologie <a href="http://www.hematologie.net">www.hematologie.net</a>
<b>RHD</b>	Règles hygiéno-diététiques		
<b>RIVA</b>	Rythme idio-ventriculaire accéléré		
<b>RM</b>	Rétrécissement mitral		
<b>RO</b>	Récepteur œstrogénique		
<b>ROC</b>	Réflexe oculocardiaque		
<b>ROR</b>	Rougeole – oreillons – rubéole		
<b>ROT</b>	Réflexe ostéotendineux		
<b>RP</b>	Radiographie pulmonaire		
<b>RP</b>	Récepteur à la progestérone		
<b>RTK</b>	Récepteur à tyrosine-kinase		

- SFHTA** Société française d'hypertension artérielle [www.sfhta.eu](http://www.sfhta.eu)
- SFMU** Société française de médecine d'urgence [www.sfm.u.org](http://www.sfm.u.org)
- SFMV** Société française des maladies vasculaires [www.sfm.v.fr](http://www.sfm.v.fr)
- SFORL** Société française d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou [www.sforl.org](http://www.sforl.org)
- SFP** Société française de parasitologie [www.sparasitologie.u-psud.fr](http://www.sparasitologie.u-psud.fr)
- SFP** Société française de pédiatrie [www.sfpediatricie.com](http://www.sfpediatricie.com)
- SFR** Société française de rhumatologie [sfr.larhumatologie.fr](http://sfr.larhumatologie.fr)
- SFRO** Société française de radiothérapie oncologique [www.sfro.org](http://www.sfro.org)
- SFTG** Société de formation thérapeutique du généraliste [www.sftg.net](http://www.sftg.net)
- SGA** Streptocoque du groupe A
- SGB** Streptocoque du groupe B
- SH** Sulfamides hypoglycémiant
- shamp.** Shampooing
- SHE** Syndrome hyperéosinophilique
- SHU** Syndrome hémolytique et urémique
- SI** Système international
- SIADH** Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique
- SIO** Sphincter inférieur de l'œsophage
- SJSR** Syndrome des jambes sans repos
- SLA** Sclérose latérale amyotrophique
- SMD** Syndrome myélodysplasique
- SMP** Syndrome myéloprolifératif
- SMUR** Service mobile d'urgence et de réanimation
- SMV** Société de médecine des voyages [www.medecine-voyages.fr](http://www.medecine-voyages.fr)
- SMZ** Sulfaméthoxazole
- SNA** Syndrome néphritique aigu
- SNC** Système nerveux central
- SNFCP** Société nationale française de colo-proctologie [www.snfc.p.org](http://www.snfc.p.org)
- SNFGE** Société nationale française de gastro-entérologie [www.snfge.asso.fr](http://www.snfge.asso.fr)
- SOFCOT** Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique [www.sofcot.fr](http://www.sofcot.fr)
- sol.** Solution
- SOPK** Syndrome des ovaires polykystiques
- SOR** Standards, options et recommandations
- SP2A** Société pédiatrique de pneumologie et allergologie [www.sp2a.fr](http://www.sp2a.fr)
- SPDRE** Soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État
- SPDT** Soins psychiatriques à la demande d'un tiers
- SPID** Syndrome polyalgique idiopathique diffus
- SPILF** Société de pathologie infectieuse de langue française [www.infectiologie.com](http://www.infectiologie.com)
- SPLF** Société de pneumologie de langue française [www.splf.org](http://www.splf.org)
- SpO2** Saturation en oxygène par oxymètre de pouls
- SRAA** Systèmes rénine-angiotensine-aldostérone
- SRLF** Société de réanimation de langue française [www.srlf.org](http://www.srlf.org)
- STNI** *Subtotal Nodal Irradiation*
- subling.** Sublingual
- sup.** Suppositoire
- susp.** Suspension
- susp. buv.** Suspension buvable
- SVP** Stimulation ventriculaire programmée
- T**
- T3** Tri-iodothyronine (ou liothyronine)
- T4** Tétra-iodothyronine (ou lévothyroxine)
- TA** Trou anionique
- TAG** Trouble anxieux généralisé
- TAU** Trou anionique urinaire
- TAVI** *Transcatheter Aortic Valve Implantation*
- TCA** Taux de céphaline activé
- TCC** Thérapie cognitivo-comportementale
- TCK** Temps de céphaline kaolin
- TCM** Triglycérides à chaîne moyenne
- TDM** Tomodensitométrie
- TDR** Test de détection rapide
- TEP** Tomographie par émission de positons
- TG** Thyroglobuline
- TG** Triglycérides
- THM** Traitement hormonal substitutif de la ménopause
- TIAC** Toxi-infection alimentaire collective
- TIH** Thrombopénie induite par l'héparine
- TIMI** *Thrombolysis In Myocardial Infarction*
- TIPS** *Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt*

<b>TMP</b>	Triméthoprime
<b>TMPT</b>	Thiopurine méthyl-transférase
<b>TNF</b>	<i>Tumor Necrosis Factor</i>
<b>TNI</b>	<i>Total Nodal Irradiation</i>
<b>TNM</b>	Tumeur, nœuds lymphatiques, métastases
<b>TO</b>	Tension oculaire
<b>TOC</b>	Trouble obsessionnel compulsif
<b>TOGD</b>	Transit oeso-gastro-duodénal
<b>TOM</b>	Tenue outre-mer
<b>TOT</b>	<i>Trans-Obturator Tape</i>
<b>TP</b>	Taux de prothrombine
<b>TP</b>	Toxine <i>pertussis</i>
<b>TPHA</b>	<i>Treponema Pallidum Hemagglutinations Assay</i>
<b>TPO</b>	Test de provocation orale
<b>TPO</b>	Thrombopoïétine
<b>TPO</b>	Thyropéroxydase
<b>TR</b>	Toucher rectal
<b>TRALI</b>	<i>Transfusion Related Acute Lung Injury</i>
<b>TRALI</b>	<i>Transfusion Related Lung Injury</i>
<b>TRH</b>	<i>Tyrotrophin Releasing Hormone</i>
<b>TS</b>	Temps de saignement
<b>TS</b>	Tentative de suicide
<b>TSH</b>	<i>Thyroid Stimulating Hormone</i>
<b>TV</b>	Tachycardie ventriculaire
<b>TVNS</b>	Tachycardie ventriculaire non soutenue
<b>TVP</b>	Thrombose veineuse profonde
<b>TVS</b>	Tachycardie ventriculaire soutenue
<b>TVS</b>	Thrombose veineuse superficielle
<b>TVT</b>	<i>Tension-Free Vaginal Tape</i>

## U

<b>UAH</b>	Unité antihéparine
<b>UI</b>	Unité internationale
<b>UICC</b>	Union internationale contre le cancer
<b>UIV</b>	Urographie intraveineuse
<b>UPDRS</b>	<i>Unified Parkinson Disease Rating Scale</i>
<b>USIC</b>	Unité de soins intensifs en cardiologie
<b>USINV</b>	Unité de soins intensifs neurovasculaires
<b>UPDRS</b>	<i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale</i>

## V

<b>VADS</b>	Voies aërodigestives supérieures
<b>VAT</b>	Vaccin antitétanique
<b>VCA</b>	<i>Virus Capsid Antigen</i>

<b>VCAM</b>	<i>Vascular Cell Adhesion Molecule</i>
<b>VDRL</b>	<i>Veneral Disease Research Laboratory</i>
<b>VEGF</b>	<i>Vascular Endothelial Growth Factor</i>
<b>VEMS</b>	Volume expiré maximal en une seconde
<b>VG</b>	Ventricule gauche
<b>VGM</b>	Volume globulaire moyen
<b>VHA</b>	Virus de l'hépatite A
<b>VHB</b>	Virus de l'hépatite B
<b>VHC</b>	Virus de l'hépatite C
<b>VIH</b>	Virus de l'immunodéficience humaine
<b>VIP</b>	<i>Vasoactive Intestinal Peptide</i>
<b>VIP</b>	Étoposide, ifosfamide, cisplatine, mesna (chimiothérapie)
<b>vit.</b>	Vitamine
<b>VLDL</b>	<i>Very Low Density Lipoprotein</i>
<b>VM</b>	Ventilation mécanique
<b>VNI</b>	Ventilation non invasive
<b>VNS</b>	<i>Vague Nerve Stimulation</i>
<b>VPPB</b>	Vertige paroxystique positionnel bénin
<b>VRS</b>	Virus respiratoire syncytial
<b>VS</b>	Vitesse de sédimentation
<b>VZV</b>	Virus zona-varicelle

## MALADIE CORONAIRE STABLE (1)

### Définition de la maladie coronaire stable

- Elle est la conséquence de lésions stables athéromateuses, anatomiques ou fonctionnelles des artères coronaires et/ou de la microcirculation coronaire.
- Elle peut se manifester par des douleurs d'angor à l'effort comme au repos. Elle peut même être asymptomatique (ischémie silencieuse).
- Elle peut se destabiliser sous forme de syndrome coronaire aigu (angor instable/IDM ST- ou d'IDM ST+).

### Objectifs du traitement [1]

Il s'agit d'assurer le contrôle des symptômes et d'améliorer le pronostic. L'optimisation du traitement médical est fondamentale et doit s'accompagner de conseils et d'un suivi appropriés, afin d'assurer la meilleure qualité de vie possible et d'obtenir la meilleure observance possible sur le long terme.

### Traitement de la crise [1]

- Éducation indispensable du patient.
- Arrêt immédiat de l'effort déclenchant.
- Le patient doit s'asseoir ou s'allonger à cause de l'effet hypotenseur des **dérivés nitrés**.
- Administration sublinguale d'un **dérivé nitré d'action immédiate, NATISPRAY 0,3 mg** : 1 à 2 pulv. franches sous la langue sans inhaler.
- **La crise doit céder en 2 à 5 min.**
- La prise sublinguale peut être répétée après 5 min en cas d'inefficacité.

• En cas d'augmentation de la fréquence des crises d'angor ou de douleur angineuse prolongée > 15 min : consultation cardiologique urgente.

- Expliquer au patient la nécessité d'un traitement prophylactique avec prise de **dérivés nitrés d'action immédiate** avant d'effectuer un effort qu'il sait « angino-gène ».
- Un **dérivé nitré d'action immédiate** doit être prescrit sur l'ordonnance de tout coronarien.

### Traitement de fond [1]

Le contrôle de la fréquence cardiaque est la première et la plus importante des étapes pour contrôler les symptômes de la maladie coronaire stable.

### Bêta-bloquants

- En première intention en l'absence de contre-indication.
- Ils sont particulièrement efficaces en cas de tachycardie sinusale, d'HTA ou d'hypertensibilité ventriculaire.
- Ils diminuent la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la contractilité, les 3 paramètres essentiels régulant les besoins en O<sub>2</sub> du cœur.
- La posologie doit être suffisante pour permettre un blocage efficace des récepteurs β-adrénérgiques, c'est-à-dire :

Obtenir une bradycardie sinusale de repos à 50-60/min et une fréquence cardiaque maximale à l'effort ne dépassant pas 100-110/min.

- Ne jamais interrompre le traitement β-bloquant brutalement : risque d'angor instable, d'infarctus du myocarde, de troubles du rythme et de mort subite.
- Exemples de posologie journalière :
  - **TÉNORMINE** 100 mg : 1/2 à 2 cp./j ;
  - **SECTRAL** 200 mg : 1 cp. 1 à 2 fois/j ;
  - **SELOKEN LP** 200 mg : 1 cp. le matin.

## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION IMMÉDIATE ET COURTE : FORMES PERLINGUALES

### ■ Trinitrine sublinguale

<b>NATISPRAY</b>					
<b>NATISPRAY 0,15 mg</b> 1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	200 doses 0,15 mg (fl. 13,5 mL)	4,39	II	65 %	0,02
<b>NATISPRAY 0,30 mg</b> 1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	300 doses 0,30 mg (fl. 18 mL)	6,13	II	65 %	0,02
<b>TRINITRINE SIMPLE LALEUF</b>					
Traitement préventif ou curatif de l'angor : 1 pilule/ administration À répéter après 2 à 3 minutes si besoin	60 pilules. 0,15 mg	2,84	II	65 %	0,05

### ■ Isosorbide dinitrate

<b>ISOCARD</b>					
1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	150 doses 1,25 mg (fl. 20 mL)	4,39	II	65 %	0,03

#### PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques.

Résorption très rapide par voie perlinguale.

**Trinitrine sublinguale** : action en 1 à 2 min pendant 10 à 30 min.

**Isosorbide dinitrate** sublingual : action en 3 à 15 min pendant 1 h.

#### INDICATIONS

Traitement curatif de la crise d'angor.

Traitement préventif précritique de la crise d'angor.

**NATISPRAY 0,30** : œdème aigu pulmonaire en complément des autres traitements usuels.

#### CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indication absolue.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

Débuter à la plus faible posologie pour éviter des céphalées et recommander la position assise lors des pulvérisations pour éviter une hypotension orthostatique, notamment chez les personnes âgées.

En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthémoglobininémie.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Vasodilatateurs, **diurétiques** et **antihypertenseurs** peuvent majorer l'hypotension artérielle.

## MALADIE CORONAIRE STABLE (2)

**Inhibiteurs calciques**

Leurs effets anti-ischémiques sont corrélés aux mécanismes d'action spécifiques de chaque sous-classe thérapeutique.

► **Dihydropyridines** (*ADALATE, AMLOR, LOXEN*)

- Effets coronarodilatateur permettant d'augmenter les apports en O<sub>2</sub> au myocarde.
- Effet tachycardisant modéré.
- Effet vasodilatateur périphérique contribuant à diminuer la post-charge et donc à réduire les besoins en O<sub>2</sub> du myocarde.

► **Non dihydropyridines** : *diltiazem (TILDIEM)* et *vérapamil (ISOPTINE)*

- **Inhibiteurs calciques** bradycardisants.
- Réduisent la consommation en O<sub>2</sub> du myocarde.

Les **inhibiteurs calciques** sont indiqués quand :

- les **β-bloquants** sont contre-indiqués :
  - en cas de contre-indication extracardiaque (BPCO, asthme), prescrire de préférence un **inhibiteur calcique** bradycardisant : *BI-TILDIEM* 90 ou 120 mg : 1 cp. x 2/j,
  - en cas de contre-indication cardiaque (bradycardie), les **dihydropyridines** sont utilisables : *AMLOR* 5 mg : 1 à 2 cp./j ;
- l'angor est à forte composante spastique :
  - les **β-bloquants** sont à éviter ;
  - privilégier *vérapamil* ou *diltiazem* (240 à 360 mg/j) ou *nifédipine* (40 à 60 mg/j). Un **dérivé nitré à longue durée d'action** peut être ajouté.

En cas d'angor d'effort sévère, l'association d'une **dihydropyridine** à longue durée d'action et d'un **β-bloquant** peut être envisagée : *CHRONADALATE LP* 30 mg : 1 cp./j + n'importe quel **β-bloquant**.

L'association **β-bloquant + inhibiteur calcique bradycardisant** n'est pas recommandée (risque de dysfonction sinusale). Attention à l'hypotension artérielle en cas d'association **dihydropyridine + dérivé nitré** (privilégier une prise décalée des 2 médicaments).

**Autre antiangineux : ivabradine (PROCORALAN)**

- Traitement de l'angor stable chronique chez l'adulte en rythme sinusal.
- *PROCORALAN* 5 mg x 2/j à augmenter si besoin à 7,5 mg x 2/j.

**Dérivés nitrés d'action prolongée**

- Ils doivent être administrés à fortes doses pour surmonter l'effet de premier passage hépatique.
- Ils doivent couvrir la période douloureuse mais des fenêtres thérapeutiques sont nécessaires pour éliminer l'effet d'accoutumance.
- Les formes à libération prolongée sont particulièrement adaptées dans cette indication.
- Exemples de posologie journalière :
  - *LANGORAN LP* 40 mg : 1 cp. matin et soir en respectant un intervalle de 12 h ;
  - *MONICOR LP* 40 ou 60 mg : 1 gél./j ;
  - *NITRIDERM TTS* 5, 10 ou 15 mg : coller le patch sur peau propre à faible pilosité comme la paroi latérale du thorax ; à laisser en place pendant 12 h diurnes (8 h à 20 h) ou nocturnes (20 h à 8 h).

**Moisdamine : molécule apparentée aux dérivés nitrés**

- Mécanisme d'action voisin de celui des **dérivés nitrés**.
- Pas d'effet d'accoutumance significatif.
- Pas d'effet dépresseur sur la contractilité, la conduction et la fréquence cardiaques.
- Effet antiagrégant plaquettaire *in vitro*.
- *CORVASAL* 2 ou 4 mg : 1 cp. x 3/j.



## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION PROLONGÉE : FORMES ORALES

## ■ Isosorbide dinitrate

<b>RISORDAN</b>					
10 à 80 mg/j en 2 à 3 prises à avaler sans croquer ni sucer	60 cp. séc. 20 mg	5,03	II	65 %	0,08
<b>LANGORAN LP</b>					
20 à 40 mg x 2 à 3 /j	60 gél. 20 mg	3,26	II	65 %	0,05
	60 gél. 40 mg	5,11	II	65 %	0,09

## ■ Isosorbide mononitrate

<b>MONICOR LP</b>					
1 gél. x 2/j (toutes les 12 h)	30 gél. 20 mg	3,64	II	65 %	0,12
1 gél./j	60 gél. 20 mg	6,42	II	65 %	0,11
	30 gél. 40 mg	6,00	II	65 %	0,20
	100 gél. 40 mg	HOP	II		
1 gél./j	30 gél. 60 mg	7,90	II	65 %	0,26

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques.

Action en 15 à 60 min mais prolongée de 4 à 24 h selon les produits et les formes galéniques.

**INDICATIONS**

Traitement de fond préventif des crises d'angor.

Traitement de l'insuffisance cardiaque gauche ou globale (en association aux autres thérapeutiques usuelles)

**CONTRE-INDICATIONS**

Pas de contre-indication absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La posologie efficace devra être atteinte progressivement en raison des risques d'hypoten-

sion artérielle et de céphalées intenses chez certains sujets.

La posologie quotidienne doit être adaptée à l'efficacité et à la tolérance du patient.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement prolongé et à fortes doses.

Utiliser avec prudence en cas de cardiomyopathie obstructive (majoration du gradient intraventriculaire).

En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthémoglobinémie.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.

Possibilité d'épuisement thérapeutique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Vasodilatateurs, **diurétiques** et **antihypertenseurs** peuvent majorer l'hypotension artérielle.

**MALADIE CORONAIRE STABLE (3)****Nicorandil : molécule apparentée aux dérivés nitrés**

- Propriétés voisines de celles des **dérivés nitrés**. Activateur des canaux potassiques.
- Effet antispastique, diminution de la pré et de la post-charge, effet coronarodilatateur.
- Peut être prescrit en monothérapie ou en association avec un  **$\beta$ -bloquant** ou un **inhibiteur calcique** bradycardisant.
- Ne pas associer aux **dérivés nitrés** et **apparentés**.

**ADANCOR** 10 ou 20 mg ou **IKOREL** 10 ou 20 mg : 5 mg x 2/j pendant 7 j puis 10 à 20 mg x 2/j.

**Autres traitements dans la maladie coronaire stable [1]**

Pour améliorer le pronostic, les thérapeutiques suivantes ont montré un bénéfice dans tous les cas de maladie coronaire stable : **aspirine** ou **clopidogrel**, **inhibiteur de l'enzyme de conversion**, **statine**.

**Antiagrégants plaquettaires**

- Leur prescription est **INDISPENSABLE** à chaque coronarien.
- Ils préviennent les accidents thrombotiques (notamment coronaires mais aussi cérébraux).

**ASPÉGIC** 100 ou 250 mg : 1 sach./j.

**PLAVIX** 75 mg : 1 cp./j en cas de contre-indication vraie à l'**aspirine** ou en cas de patient polyartériel.

**Inhibiteur de l'enzyme de conversion**

- Dans la maladie coronaire stable, le **périndopril** et le **ramipril** ont montré leur

efficacité dans la réduction du risque d'événements cardiaques chez les patients ayant un antécédent d'IDM et/ou de revascularisation.

- **COVERSYL** 10 mg : 1 cp. le matin.
- **TRIA TEC** 10 mg : 1 cp. le matin.

**Correction des facteurs de risque cardiovasculaires**

- Arrêt du tabagisme, perte de poids si nécessaire.
- Traiter une hypercholestérolémie par une **statine** (ou **ézétimibe** ou **bézafibrate** en cas d'intolérance vraie aux **statines**).
- Normaliser la pression artérielle, équilibrer un diabète.
- Activité physique régulière et adaptée comme la marche, la natation et le vélo ; éviter le stress.

**Surveillance**

Réévaluation initiale indispensable du patient et de son traitement, de façon précoce entre le 4<sup>e</sup> et le 6<sup>e</sup> mois pour une éventuelle adaptation thérapeutique, puis réévaluation annuelle.


**Tolérance** : pression artérielle couché/debout, fréquence cardiaque, signes d'insuffisance cardiaque, espace PR à l'ECG.

**Efficacité** : fréquence des crises angineuses, intensité de l'effort déclenchant, consommation de **trinitrine**.

Faire pratiquer un ECG de repos annuel et un ECG supplémentaire en cas de nouveau symptôme ou en cas de médication nouvelle pouvant agir sur la conduction. Un test d'effort ou une imagerie de stress est recommandé devant la récurrence ou l'apparition de nouveaux symptômes.

## MALADIE CORONAIRE STABLE (4)

## En pratique



## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION PROLONGÉE : DISPOSITIFS TRANSDERMIQUES

### ■ Trinitrine percutanée

<b>NITRIDERM TTS</b>					
1 patch à coller sur la paroi latérale du thorax de 8 h à 20 h pour couvrir la journée ou de 20 h à 8 h pour couvrir la nuit	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>DISCOTRINE</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>DIAFUSOR</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	100 systèmes 5 mg	HOP	II		
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	100 systèmes 10 mg	HOP	II		
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>CORDIPATCH</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
<b>TRINIPATCH</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>EPINITRIL</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56

### PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques. Résorption percutanée avec passage transdermique à vitesse constante.

### INDICATIONS

Traitement de fond préventif des crises d'angor.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux **dérivés nitrés**. Cardiomyopathie obstructive. Hypertension intracrânienne.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Devant la possibilité d'atténuation de l'effet thérapeutique en cas d'administration continue de **trinitrine transdermique**, il est recommandé de retirer le système pendant 12 h si un traitement antiangineux est associé.

La posologie efficace devra être atteinte progressivement en raison des risques d'hypotension artérielle et de céphalées intenses chez certains sujets.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement prolongé et à fortes doses.

Enlever le système adhésif avant de réaliser un choc électrique externe.

En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthémoglobinémie.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions cutanées allergiques très rares.

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.


Possibilité d'épuisement thérapeutique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Vasodilatateurs, diurétiques et antihypertenseurs peuvent majorer l'hypotension artérielle.

## MALADIE CORONAIRE STABLE (5)

### Conduite à tenir devant une maladie coronaire stable en fonction du risque du patient



### Place de la revascularisation myocardique dans la maladie coronaire stable

- La revascularisation va dépendre des symptômes, des tests fonctionnels et de l'anatomie des coronaires à la coronarographie.
- Elle se justifie :
  - chez les patients qui restent symptomatiques malgré un traitement médical optimal bien suivi (bénéfice sur les symptômes) ;

– quand une ou plusieurs artères coronaires présentent des sténoses > 50 % ou une large zone d'ischémie (> 10 % du myocarde) sur un test fonctionnel (bénéfice sur le pronostic).

- Elle peut se faire par angioplastie coronaire percutanée ou par pontage aorto-coronaire (cf. Techniques de revascularisation myocardique).

### CONSENSUS

- [1] Guidelines on the management of stable coronary artery disease, ESC, 2013

## SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS ÉLEVATION DU SEGMENT ST (1)

Devant une douleur thoracique aiguë prolongée > 20 min, on distingue 3 présentations d'un syndrome coronaire aigu (SCA) :

- sur l'ECG, il existe une élévation persistente du segment ST (> 20 min) : c'est l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (IDM ST+) ;
- Sur l'ECG, il n'y a pas d'anomalie du segment ST ni de l'onde T mais la troponine augmente : c'est l'infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (IDM ST-) ;
- Sur l'ECG, il n'y a pas de modification franche et la troponine reste normale : c'est l'angor instable (AI).

Ce chapitre concerne l'angor instable (AI) et l'IDM ST-.

### Risques

- Infarctus du myocarde avec élévation du segment ST.
- Défaillance cardiaque
- Mort subite par troubles du rythme.

### Conduite thérapeutique [1]

- Hospitalisation en **urgence** en unité de soins intensifs cardiologiques après transport médicalisé type Samu.
- Repos au lit strict 48-72 h. Scope cardiaque et tensionnel.
- Voie veineuse périphérique G5 ou G2,5 : 500 mL + 2 g KCl + 3 g MgSO<sub>4</sub> /24 h.

### Traitement antithrombotique systématique

Il repose à la fois sur une anticoagulation efficace et sur une antiagrégation plaquettaire.

#### ► Anticoagulation efficace

- Fondaparinux : **ARIXTRA** 2,5 mg 1 inj. SC/j. Cet **inhibiteur sélectif du facteur X activé** a l'AMM avec un profil efficacité/tolérance actuellement le plus favorable. OU

- **LOVENOX** : 2 inj. SC de 100 UI/kg chacune, toutes les 12 h. Trois **HBPM** ont l'AMM dans l'insuffisance coronaire aiguë (**LOVENOX**, **FRAGMINE**, **FRAXIPARINE**).

OU

- Prescription d'**héparine standard non fractionnée** si les **HBPM** ou le **fondaparinux** ne sont pas disponibles. Bolus de 60-70 UI/kg puis perfusion de 12-15 UI/kg/h pour avoir un TCA entre 1,5 et 2,5 fois le témoin.

OU

- **Bivalirudine** : **ANGIOX** bolus initial IV 0,1 mg/kg puis perfusion de 0,25 mg/kg/h pendant 72 h en cas de traitement conservateur médical. La posologie est à augmenter à 1,75 mg/kg/h en cas d'intervention percutanée puis est à ramener à 0,25 mg/kg/h pendant 4 à 12 h si besoin. Cet **inhibiteur direct de la thrombine** a montré son intérêt en cas d'intervention percutanée faite en urgence ou très précocement.

#### ► Antiagrégation plaquettaire

- **Aspirine** : dose de charge initiale de 150 à 300 mg/j puis 75 à 100 mg/j au long cours.
- **Clopidogrel (PLAVIX 75 mg)** : dose de charge initiale unique de 300 mg puis 75 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois (bénéfice maximal à 3 mois).
- **Prasugrel (EFIENT)** 10 mg : dose de charge initiale unique de 60 mg puis 10 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).
- **Ticagrélor (BRILIQUE)** 90 mg : dose de charge initiale unique de 180 mg puis 90 mg x 2 /j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).

## INHIBITEUR DIRECT DU FACTEUR Xa (MALADIE CORONAIRE)

## ■ Fondaparinux sodique

ARIXTRA					
Traitement syndrome coronarien aigu avec ou sans décalage du segment ST : 2,5 mg en 1 inj. SC/j pendant 7 à 8 j maximum	2 ser. 2,5 mg/0,5 mL	13,30	I	65 %	6,65
	7 ser. 2,5 mg/0,5 mL	43,56	I	65 %	6,22
	10 ser. 2,5 mg/0,5 mL	HOP	I		

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

## PROPRIÉTÉS

Pentasaccharide inhibiteur synthétique et sélectif du facteur X activé (Xa) ; en se liant à l'antithrombine III (ATIII), il potentialise l'inhibition naturelle du facteur Xa par l'ATIII, ce qui interrompt la cascade de la coagulation.

## INDICATIONS

À la dose de 2,5 mg/j, ce médicament est indiqué dans le traitement du syndrome coronaire aigu :

- angor instable ou infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST chez les adultes pour lesquels une prise en charge par une stratégie invasive (intervention coronaire percutanée) en urgence (< 120 min) n'est pas indiquée ;
- infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST chez les adultes soit pris en charge par un traitement thrombolytique soit ne relevant initialement d'aucune technique de reperfusion.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **fondaparinux**.

Saignement actif.

Endocardite bactérienne aiguë.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Déconseillé chez les moins de 17 ans et pendant la grossesse et l'allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : contre-indiqué si clairance de la créatinine < 20 mL/min. Adaptation de la dose à 1,5 mg/j si clairance entre 20 et 30 mL/min.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie.

Épistaxis, hémoptysie, hématurie, saignement intracrânien.

Purpura, troubles de la coagulation.

Céphalée, confusion, anxiété, vertige.

Dyspnée, toux.

Nausées, vomissements, gastrite, élévation des transaminases.

Rash, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Précaution si association avec des médicaments susceptibles d'augmenter le risque hémorragique (**fibrinolytiques, anti-GPIIb/IIIa, HNF, HBPM, AINS, antiagrégants plaquettaires**).

Relais avec un autre anticoagulant :

– avec **HNF** ou **HBPM** : 1<sup>re</sup> injection 24 h après l'arrêt du **fondaparinux** ;

– avec **AVK** : poursuivre le **fondaparinux** jusqu'à obtention de l'INR cible.

## SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS ÉLEVATION DU SEGMENT ST (2)

### Traitement anti-ischémique

Un **dérivé nitré** sera très souvent instauré en perfusion continue IV à la seringue électrique.

- **RISORDAN** amp. à 10 mg/10 mL : débiter à 1 mg/h et augmenter par paliers progressifs de 1 mg toutes les heures en cas de persistance des phénomènes d'instabilité. Posologie optimale de 2 à 5 mg/h.

La prescription de **dérivés nitrés** en IV implique une surveillance rapprochée de la **fréquence cardiaque** (< 120/min) et de la **pression artérielle systolique** (> 100 mmHg).

- Le relais par un **dérivé nitré d'action prolongée** ou apparenté en cp. sera entrepris après 24-48 h de traitement IV : **CORVASAL** 4 mg : 1 cp. x 3/j.

Il est d'usage d'initier rapidement un **traitement  $\beta$ -bloquant** en particulier en cas de tachycardie ou d'HTA. Ce  **$\beta$ -bloquant** est contre-indiqué en cas de signes **aigus** d'insuffisance cardiaque. Il sera à maintenir à la sortie du patient, en particulier en cas de fonction ventriculaire gauche abaissée.

- La posologie instaurée doit permettre une fréquence cardiaque de repos à 50-60/min :
  - **TÉNORMINE** 100 mg : 1/2 cp. x 2/j ;
  - **SELOKEN** 100 mg : 1/2 cp. x 3/j ;
- Un **inhibiteur calcique dihydropyridine** peut être prescrit en cas de symptômes persistants sous **bêtabloquant + dérivé nitré** : **AMLOR** 5 : 1 cp. le matin.
- Un **inhibiteur calcique non dihydropyridine** peut être prescrit en cas de contre-indication à un **bêtabloquant** : **BI-TILDIEM** 90 : 1 cp. matin et soir.

### Traitement préventif

- Un **Inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II** :

- peut être prescrit en prévention secondaire ;
- est particulièrement indiqué en cas de dysfonction ventriculaire gauche.

**TRIATEC** 5 mg : 1 cp./j en surveillant la pression artérielle.

En cas d'intolérance aux IEC : **MICARDIS** 40 mg : 1 cp./j en surveillant la pression artérielle.

- **Lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires** :

- arrêt du tabagisme ;
- traitement d'une hypercholestérolémie par une **statine** ;
- normalisation de la pression artérielle, équilibration d'un diabète ;
- éducation du patient dans un second temps pour favoriser une réduction pondérale et une activité physique régulière et adaptée.

### Correction d'un éventuel facteur aggravant

- Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, anémie.
- Arrêt de tout médicament vasospastique.

### Prescription d'un inhibiteur de la pompe à protons

- Dans le cadre de la bithérapie antiagrégante plaquettaire.
- L'**oméprazole** et l'**ésoméprazole** pourraient diminuer l'efficacité du **clopidogrel** en inhibant le CYP2C19. Préférer un autre **inhibiteur de la pompe à proton**.
- En cas de risque d'hémorragie gastro-intestinale.



## INHIBITEUR DIRECT DE LA THROMBINE (ANTI-IIA) (MALADIE CORONAIRE)

### ■ Bivalirudine

ANGIOX					
Anticoagulant utilisé pendant une coronarographie : bolus IV de 0,75 mg/kg puis perfusion IV de 1,75 mg/kg pendant la durée de l'examen et jusqu'à 4 h après si besoin	2 fl. à usage unique 250 mg		I	NR	
	10 fl. à usage unique 250 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur direct et spécifique de la thrombine qui joue un rôle majeur dans la formation du thrombus.

#### INDICATIONS

Ce médicament est indiqué :

- en tant qu'anticoagulant chez les patients subissant une intervention coronaire percutanée notamment chez les patients atteints d'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST ;
- pour le traitement des patients atteints d'un angor instable/infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST devant bénéficier d'une intervention urgente ou précoce. Ce médicament doit être administré avec de l'**aspirine** et du **clopidogrel**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **bivalirudine**.  
Trouble de la coagulation.

Endocardite bactérienne aiguë.

HTA sévère non contrôlée.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min), dialyse.

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, hémorragie.

Hypotension artérielle, tachycardie ventriculaire.

Dyspnée.

Rash cutané, urticaire.

Choc anaphylactique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation du risque de saignement si association à d'autres anticoagulants (**HNF**, **warfarine**, **thrombolytiques**, **antiagrégants plaquettaires**).

## SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS ÉLEVATION DU SEGMENT ST (3)

### Surveillance

- **Clinique** : douleur, hémodynamique.
- **ECG** : pluriquotidien les 3 premiers jours et en cas de nouvelle douleur avant et après **dérivé nitré** sublingual.
- **Biologique** : enzymes cardiaques (troponine, CPK, CPKMB) x 2/j les 3 premiers j. NFS, plaquettes.

### Place du traitement invasif dans l'angor instable/IDM ST-

- Il dépend étroitement de l'évaluation clinique, de la réponse au traitement médical, de l'ECG, de la troponine, de l'échographie cardiaque et du risque de complications.
- Les critères estimés à haut risque sont essentiellement une élévation importante de la troponine, des modifications du segment ST et de l'onde T sur l'ECG (symptomatiques ou non), un diabète, une insuffisance rénale, une FEVG abaissée et des antécédents coronariens.
- **La coronarographie est recommandée en urgence (dans les 2 premières h)** chez les patients à très haut risque (angor réfractaire, insuffisance cardiaque, arhyth-

mie ventriculaire menaçante, instabilité hémodynamique). Les **anti-GPIIb/IIIa** peuvent être utiles.

- **La coronarographie est recommandée de façon précoce (dans les premières 24 h)** chez les patients ayant une élévation importante de la troponine et/ou des modifications du segment ST et de l'onde T sur l'ECG (symptomatiques ou non).
- **La coronarographie sera faite dans les 3 j** chez des patients avec un risque aigu plus faible et sans symptôme récurrent.
- La revascularisation coronaire se fera soit par angioplastie coronaire percutanée soit par pontage aorto-coronaire, en fonction des symptômes, du terrain, de la fonction VG et des lésions coronaires (cf. Techniques de revascularisation myocardique).
- **Un traitement conservateur médical sans traitement invasif** est indiqué chez les patients à faible risque qui relèvent de l'ensemble des critères suivants : pas de récurrence angineuse, pas de signe d'insuffisance cardiaque, pas d'anomalies ECG à l'admission et 6-9 h après, pas d'augmentation de la troponine à l'admission et 6-9 h après, et pas d'ischémie sur un test d'effort réalisé en fin d'hospitalisation.

### CONSENSUS

- [1] Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation, ESC, 2011

## ANGOR DE PRINZMETAL OU ANGOR VASOSPASTIQUE

### Définition

Il s'agit d'une variété de spasme coronaire caractérisé par un angor nocturne ou du petit matin, survenant cycliquement, quotidiennement pendant une période déterminée. Le diagnostic peut être confirmé lors d'une coronarographie par un test de provocation du spasme (**MÉTHERGIN**).

### Prise en charge initiale

- Hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques en urgence après transport médicalisé.
- Surveillance indispensable du scope cardiaque.
- Le traitement initial repose sur l'association d'un **inhibiteur calcique per os** et de **dérivés nitrés IV**.
- Éviter les **β-bloquants**.

### Risques

- Infarctus du myocarde.
- Troubles du rythme ventriculaire.
- Troubles de conduction auriculo-ventriculaire paroxystiques.
- Mort subite.

### Traitement de la crise

• Cf. Maladie coronaire stable.  
Administration sublinguale d'un **dérivé nitré d'action immédiate**. Ex. : **NATISPRAY** 0,30 mg ou **ADALATE** 10 mg : verser le contenu d'une gél. sous la langue du patient allongé.

### Traitement de fond après coronarographie systématique

**Spasme coronaire sur des artères normales ou peu pathologiques**

- Les **inhibiteurs calciques** suivants permettent de prévenir les spasmes chez 90 % des patients :
  - **inhibiteur calcique** bradycardisant : **BILTIDEM** 90 ou 120 mg : 1 cp. x 2/j ou **ISOPTINE** 120 mg : 1 gél. x 2 à 3/j ;
  - **inhibiteur calcique type dihydropyridine** : **ADALATE** 10 ou 20 mg : 1 cp. x 4/j.
 Des posologies plus élevées peuvent être nécessaires en cas d'angor réfractaire.

- Un **dérivé nitré d'action prolongée** peut être associé : **MONICOR LP** 40 mg : 1 gél./j ou **CORVASAL** 4 mg : 1 cp. x 3/j. Le traitement antiangineux doit couvrir les moments de la journée où les douleurs se produisent.

### Spasme coronaire associé à des sténoses coronaires significatives

Le traitement médical sus-cité est indispensable.

Les indications de revascularisation myocardique par angioplastie coronaire ou par pontage aorto-coronaire sont les mêmes qu'en absence de spasme.

En cas de pontage aorto-coronaire, un geste de dénervation cardiaque peut être associé.

### Lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires

- Arrêt du tabagisme, de l'alcool, de tout médicament vasoconstricteur ou drogue vasoconstrictrice (cocaïne, amphétamines).
- Normaliser la pression artérielle, équilibrer un diabète, traiter une hypercholestérolémie, perte de poids si nécessaire. Éviter le stress.
- Activité physique régulière et adaptée comme la marche, la natation et le vélo.

### Antiagrégants plaquettaires

Leur prescription est **INDISPENSABLE** à chaque coronarien.

- Prévention des accidents thrombotiques (notamment coronaires mais aussi cérébraux).

**ASPÉGIC** 100 ou 250 mg : 1 sach./j.  
**PLAVIX** 1 cp./j en cas de contre-indication vraie à l'aspirine.

### Surveillance

- Efficacité : clinique, Holter ECG avec analyse du segment ST/24 h.
- Tolérance : pression artérielle debout/couché, fréquence cardiaque, œdème des membres inférieurs.

## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (1)

### Définition

L'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (IDM ST+) est un syndrome coronaire aigu caractérisé à la fois par une douleur rétrosternale constrictive, intense, prolongée > 20 min, irradiante, le plus souvent de repos, et par un sus-décalage persistant du segment ST sur l'ECG.

Tous les patients présentant un IDM ST+ de moins de 12 h doivent bénéficier d'une reperfusion en urgence avec un triple objectif :

1. diminuer la mortalité ;
2. prévenir les complications ;
3. soulager la douleur.

### Prise en charge préhospitalière par le SAMU (15)

- **Appel du SAMU (15)** le plus tôt possible devant une douleur thoracique évocatrice.
- Monitoring ECG et surveillance clinique. L'ECG va confirmer le sus-décalage du segment ST.
- Traitement médical à débiter en urgence :
  - administrer un **antalgique majeur** : chlorhydrate de morphine 1/2 amp. (5 mg) en SC en respectant les contre-indications (BPCO, hypotension) ;
  - O<sub>2</sub> nasal si SaO<sub>2</sub> < 95 % ;
  - poser si possible une voie veineuse

périphérique (G5 %) et ne pas faire d'injection IM ;

– débiter le **traitement double antiagré-gant plaquettaire** par **aspirine** 150 à 300 mg *per os* ou en IVD + **clopidogrel** 300 ou 600 mg *per os* (ou **prasugrel** 60 mg ou **ticagrélor** 180 mg) + le **traitement anticoagulant (HBPM type énoxaparine** 3 000 UI en bolus IVD suivie immédiatement d'une injection SC de 100 UI/kg ou **HNF** 50 UI/kg en bolus IVD puis 20 mg/kg/h en IVSE ou **bivalirudine** bolus de 0,75 mg/kg en IVD suivie d'une perfusion de 1,75 mg/kg/h). Le **fondaparinux** peut être aussi utilisé sauf si une angioplastie primaire est décidée (bolus IVD de 2,5 mg).

**Remarques** : en cas de fibrinolyse, la dose de charge de **clopidogrel** préconisée est de 300 mg ; elle est de 600 mg en cas d'angioplastie primaire. Le **prasugrel**, le **ticagrélor** et la **bivalirudine** n'ont pas été testés en association avec la fibrinolyse et doivent être évités. L'association du **prasugrel** ou du **ticagrélor** à l'**aspirine** présente un bénéfice modeste mais surtout un risque hémorragique accru par rapport à l'association **clopidogrel** + **aspirine**. Il est primordial de bien respecter les contre-indications du **prasugrel** et du **ticagrélor**.

- Décider de la stratégie de reperfusion dès la phase préhospitalière.

## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (2)

### Stratégie de reperfusion coronaire

– Elle dépend du délai d'évolution de l'IDM et du délai pour effectuer la procédure d'angioplastie (accessibilité d'un centre d'angioplastie primaire).  
– L'angioplastie primaire est supérieure à la fibrinolyse chez les patients présentant un IDM ST+ en termes de moindre mortalité, de meilleure récupération myocardique, de moindre récurrence ischémique et de moindre risque hémorragique. Cependant si l'angioplastie ne peut pas être faite immédiatement, la fibrinolyse sera le traitement à privilégier.

- À partir de la prise en charge pré-hospitalière type SAMU ou d'une structure médicale sans possibilité d'angioplastie primaire :

- si l'angioplastie est réalisable dans un délai < 120 min : transfert immédiat dans un centre d'angioplastie : angioplastie primaire. Ce délai est celui entre le 1<sup>er</sup> contact médical et le geste de désobstruction intracoronaire au ballonnet ;

- si l'angioplastie n'est pas réalisable dans un délai de 120 min : fibrinolyse immédiate (idéalement dans les 30 premières minutes) puis transfert en urgence dans un centre d'angioplastie ;

- si échec de la fibrinolyse (évaluation à 90 min du début de la fibrinolyse sur la douleur et l'ECG) : angioplastie de sauvetage ;

- si succès de la fibrinolyse : coronarographie de contrôle dans les 3-24 h ;

- en cas de contre-indication à la fibrinolyse : angioplastie primaire.

- À partir d'une structure médicale avec angioplastie primaire disponible : angioplastie primaire (idéalement dans la 1<sup>re</sup> h).

• La technique d'angioplastie coronaire (primaire ou de sauvetage) est décrite dans **Techniques de revascularisation myocardique**. Les **anti-GPIIb/IIIa**

(abciximab, eptifibatide, tirofiban) peuvent être un traitement adjuvant à l'angioplastie primaire.

- La fibrinolyse dans l'IDM ST+ fait actuellement appel à des produits plus fibrinolytiques que la **streptokinase** et l'**urokinase** utilisées pendant longtemps. Il s'agit de l'**altéplase (ACTILYSE)**, la **réteplase (RAPILYSIN)** et la **ténecteplase (METALYSE)**, cette dernière étant simple à utiliser en phase pré-hospitalière avec un bolus IV unique adapté au poids. À noter que les **anti-GPIIb/IIIa** ne sont pas recommandés en association avec la fibrinolyse.

- Dans tous les cas décrits ci-dessus, la poursuite de la prise en charge devra se faire dans une unité de soins intensifs cardiologiques.

### Prise en charge en unités de soins intensifs cardiologiques [1]

- Repos au lit strict.

- Pose d'une voie veineuse périphérique de bon calibre avec 500 mL de G5 % par 24 h + 2 g KCl + 3 g MgSO<sub>4</sub>.

- Monitoring ECG, pression artérielle et oxymètre de pouls.

- **Double antiagrégation plaquettaire** : **aspirine** (ex : **KARDEGIC** 75 à 100 mg/j *per os* à vie) + autre **antiagrégant plaquettaire** pendant 1 an (**clopidogrel** 75 mg/j ou **ticagrelor** 90 mg x 2/j ou **prasugrel** 10 mg/j).

► **Anticoagulation efficace**

- La durée doit être courte < 48 h sauf si un risque thromboembolique persiste (ACFA par exemple).

- **HBPM** : **LOVENOX** 100 UI/kg/12 h en SC (utiliser le flacon multidose de 3 mL).

- Ou **HNF** : **HÉPARINE** 20 mg/kg/h en IVSE à adapter au TCA.

- Ou **bivalirudine** : **ANGIOX** perfusion de 1,75 mg/kg/h.

- Le **fondaparinux** peut être aussi utilisé.

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (1)

### Objectifs :

- supprimer les symptômes ;
- préserver la fonction myocardique ;
- prolonger la vie du patient.

La revascularisation myocardique peut se faire par angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) ou par pontage aorto-coronaire (PAC).

### Angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP)

#### Indications

La lésion doit :  
– être une sténose serrée  $\geq 50\%$  ou une occlusion ;

- intéresser une artère de bon calibre (coronaires principales et collatérales) ;
- avoir un lit d'aval étendu et de bon calibre ;
- vasculariser un myocarde viable.

Les indications sont à évaluer au cas par cas après discussion entre le cardiologue traitant, le cardiologue interventionnel et le chirurgien cardiaque dans la maladie coronaire stable (cf. chapitre correspondant).

Les indications peuvent et doivent être posées en urgence dans le cadre des syndromes coronaires aigus (IDM ST+, IDM ST- et AI) : cf. chapitres correspondants.

### MODALITÉS DE PRESCRIPTION DES ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES AVANT ET APRÈS ANGIOPLASTIE CORONAIRE (ATL) [1]

#### Avant angioplastie coronaire

- Maladie coronaire stable
  - **aspirine** 100 mg/j (*a priori* déjà prescrite à l'entrée du patient) ;
  - **et clopidogrel** 300 mg (4 cp. de 75 mg) au moins 6 h avant ATL ;
  - **ou clopidogrel** 600 mg (8 cp. de 75 mg) au moins 2 h avant ATL ;
  - l'association **aspirine + prasugrel** ou **ticagrélor** peut être considérée en cas d'antécédent de thrombose de stent sous **clopidogrel**.
- Syndrome coronaire aigu (SCA)

Qu'il s'agisse d'un angor instable ou d'un infarctus avec ou sans sus-décalage de ST, dès que possible :

- **aspirine** : dose de charge initiale de 150 à 300 mg/j puis 75 à 100 mg/j au long cours ;
- **clopidogrel (PLAVIX 75 mg)** : dose de charge initiale unique de 300 mg puis 75 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois ;
- **ticagrélor (BRILIQUE 90 mg)** : dose de charge initiale unique de 180 mg puis 90 mg x 2/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi) ;
- **prasugrel (EFIENT 10 mg)** : dose de charge initiale unique de 60 mg puis 10 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).

#### À la sortie du patient :

- Stent « nu » : **aspirine** 75 à 100 mg/j et **clopidogrel** 75 mg/j pendant 4 sem., puis **aspirine** seule 75 à 100 mg/j à vie. L'association **aspirine** 75 à 100 mg/j + **ticagrélor** 90 mg x 2/j ou **prasugrel** 10 mg/j pendant 12 mois est possible (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).
- Stent « actif » : **aspirine** 75 à 100 mg/j et **clopidogrel** 75 mg/j pendant 9 à 12 mois, puis **aspirine** seule 75 à 100 mg/j à vie. L'association **aspirine** 75 à 100 mg/j + **ticagrélor** 90 mg x 2/j ou **prasugrel** 10 mg/j pendant 12 mois est possible (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).

## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (3)

### ► Traitement $\beta$ -bloquant

- À débiter précocement dès la prise en charge hospitalière. Il n'est pas recommandé en phase pré-hospitalière.
- En l'absence de contre-indication (insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique, bradycardie, troubles de conduction sévères).
- Par voie IV à la phase aiguë puis relais *per os*. L'**acébutolol**, l'**aténolol**, le **métoprolol** et le **timolol** ont l'AMM dans l'IDM. Ex. : **TÉNORMINE** : 5 à 10 mg (1 mg/min) à injecter en IV puis relais *per os* avec 50 mg 15 min après l'injection puis toutes les 12 h.
- Diminuer la posologie ou arrêter le traitement en cas de mauvaise tolérance hémodynamique.
- Diminue la mortalité cardiovasculaire, la mort subite et les troubles du rythme.

### ► Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)

- Prévention efficace du remodelage ventriculaire gauche post-infarctus, réduction de la stimulation neuro-humorale.
- Diminution de la mortalité précoce et tardive quelle que soit la fonction ventriculaire gauche.

- À débiter précocement dès J1-J2 en particulier en cas d'insuffisance cardiaque symptomatique ou de dysfonction ventriculaire gauche systolique asymptomatique ou de diabète ou d'IDM antérieur.
- Le **captopril**, le **lisinopril**, le **périndopril**, le **ramipril**, le **trandolapril** et le **zofénopril** ont l'AMM dans le post-IDM.
- Exemples de doses optimales à atteindre progressivement :

- **TRIATEC** (cp. à 2,5 ou 5 mg) 10 mg/j en 2 prises/j ;
- **ZESTRIL** (cp. à 5 ou 20 mg) 10 mg/j en une prise/j.
- Surveillance régulière de la pression artérielle, de la kaliémie et de la fonction rénale.
- En cas d'intolérance aux IEC, les **ARA II** sont utilisables dans le post-IDM récent entre la 12<sup>e</sup> h et le 10<sup>e</sup> j. Seul le **valsartan** a l'AMM dans le post-IDM avec une efficacité identique aux IEC.
- À noter que l'**éplérénone** est indiquée aussi en post-IDM quand la FEVG est  $\leq 40\%$  en l'absence d'hyperkaliémie ou d'insuffisance rénale.

### ► Statines

- Les **statines** ont démontré leur efficacité en prévention secondaire sur la morbi-mortalité cardiovasculaire après un IDM (indépendamment du niveau de LDL initial). Objectif LDL  $< 1$  g/L.
- L'**atorvastatine**, la **fluvastatine**, la **pravastatine**, la **rosuvastatine** et la **simvastatine** ont l'AMM dans cette indication. Ex. : **TAHOR** 20 mg 1 cp./j.

Après 2 à 3 j en soins intensifs, la prise en charge peut se poursuivre en chambre conventionnelle en cardiologie, en l'absence de complication.

### Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires

- Arrêt définitif du tabac. Des **substituts nicotiniques** peuvent être prescrits dès la phase hospitalière.
- Éducation diététique, traitement d'une dyslipidémie, équilibration d'un diabète.
- Équilibration d'une HTA en privilégiant les  **$\beta$ -bloquants** et les **IEC**.

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (2)

**Cas particulier (mais fréquent 20-30 %) des patients sous AVK ou NACO pour une ACFA connue et qui doivent bénéficier d'une angioplastie coronaire**

- L'association d'un traitement antiagrégant plaquettaire et d'un traitement anticoagulant augmente le risque hémorragique de 60 %.
- Pour chaque prescription d'une association d'un traitement antiagrégant plaquettaire et d'un traitement anticoagulant, il faut s'assurer que le bénéfice soit toujours supérieur au risque aussi bien pour le risque coronaire que pour le risque embolique cérébral.

- Privilégier un stent non actif chez les patients en ACFA connue pour réduire la durée du traitement antiagrégant plaquettaire.
- Dans les 12 mois qui suivent l'accident coronarien avec angioplastie, le risque coronarien semble prédominer. L'anticoagulant devra être interrompu et la double antiagrégation plaquettaire sera donc à privilégier. Elle durera 1 mois après un stent non actif ou 3 mois après un stent actif.
- 12 mois après l'accident coronarien avec angioplastie, le risque embolique cérébral lié à l'ACFA l'emporte et il faut préférer le seul traitement anticoagulant (**AVK** ou **NACO**).

### TRAITEMENT ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE SYSTÉMATIQUE APRÈS PONTAGE AORTO-CORONAIRE

- **Aspirine** 75 à 250 mg/j à débiter 6 h après la chirurgie.
- En cas de contre-indication à l'**aspirine** : **clopidogrel (PLAVIX)** 1 cp./j.

#### Procédure

- En salle de cathétérisme sous contrôles ECG et tensionnel sous anesthésie générale ou non.
- Patient perfusé et traité par anticoagulant et **antiagrégant plaquettaire**.
- Après un abord par une artère fémorale ou une artère radiale (le plus souvent), cathétérisme sélectif des artères coronaires en multipliant les incidences pour repérer les sténoses et les quantifier.

L'angioplastie par ballonnet consiste à positionner un cathéter comportant un ballonnet à son extrémité distale, en regard de la sténose. Des inflations itératives du ballonnet sont produites pendant 10 à 30 s jusqu'à levée de l'empreinte du ballonnet.

- Des douleurs angineuses et des modifications de l'ECG sont habituelles lors des inflations (prévenir et rassurer le patient).
- Contrôle coronarographique en fin de procédure.

#### Procédures complémentaires

- Mise en place d'**endoprothèse ou stent** : prothèse métallique implantée au site de dilatation, maintenant le vaisseau ouvert après la procédure. Réduit le taux de complications de la procédure et le taux de resténose à 6 mois.
- Les stents recouverts de sirolimus ou paclitaxel (antimitotiques) dits « stents actifs » réduisent très significativement le risque de resténose dans les 6 premiers mois.**

- D'autres techniques sont beaucoup plus rarement utilisées : athérectomie rotative, rotablator.

#### Traitements adjuvants

- L'**inhibiteur de la glycoprotéine IIb/IIIa plaquettaire (RÉOPRO)** : puissant **antiagrégant plaquettaire** par voie IV est indiqué dans la prévention des complications cardiaques ischémiques lors d'une angioplastie coronaire.
- **Prasugrel** ou **ticagrelor** peuvent être considérés dans le cas de mise en place de stent à haut risque (stent sur gros réseau coronaire gauche, haut risque de thrombose intrastent, diabète).

#### Contre-indications

À évaluer en fonction du contexte clinique.

- Sténose du tronc commun gauche non protégé par des pontages.
- Artères coronaires tortueuses.
- Atteinte diffuse distale.
- Occlusion coronaire datant de plus de 6 mois.

#### Résultats

On parle de succès primaire quand :

- le gain est supérieur à 50 % par rapport au degré de sténose préexistante,
- il n'y a pas de complication majeure (chirurgie coronaire en urgence, infarctus, décès).

Le succès primaire est obtenu dans 90-95 % des cas.



## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (4)

### Prise en charge à la sortie de l'hôpital [1]

#### Réadaptation cardiovasculaire

En ambulatoire ou en milieu spécialisé.

#### Conseils hygiéno-diététiques

Renouveler les consignes de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment l'arrêt définitif du tabac.

#### Ordonnance de médicaments

- Un  $\beta$ -bloquant ou un inhibiteur calcique en cas de contre-indication aux  $\beta$ -bloquants.
- Une double antiagrégation plaquettaire (aspirine + clopidogrel principalement).
- Un traitement hypolipémiant type statine.
- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion à « pleine dose ».
- Un dérivé nitré d'action immédiate en sublingual, à la demande, doit être systématiquement prescrit et le patient éduqué.

#### Prescription d'un bilan biologique à effectuer 3 sem. après la sortie

- Glycémie à jeun.
- Dosage du cholestérol total, des cholestérols HDL et LDL et des triglycérides.
- Kaliémie, fonction rénale.

#### Rendez-vous de consultation avec le cardiologue traitant

À fixer 3 sem. après la sortie de l'hôpital.

### Première visite posthospitalière (à 3 sem.)

- Interrogatoire avec appréciation de l'activité physique, examen clinique, ECG, tolérance des traitements.
- S'assurer des bons résultats biologiques avec notamment l'objectif de LDL < 1 g/L.

### Examens à effectuer 3 mois après l'IDM

ECG d'effort éventuellement couplé à une scintigraphie myocardique au thallium

Sert à s'assurer du bon contrôle par le traitement médicamenteux et l'absence d'ischémie résiduelle.

#### Écho-Doppler cardiaque

Pour évaluer la fonction ventriculaire gauche.

#### Biologie

Un nouveau bilan lipidique doit être fait pour modifier éventuellement la posologie de l'hypolipémiant. Contrôle de la kaliémie et de la fonction rénale sous IEC.

### Consultations aux 6<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> mois

- Interrogatoire avec appréciation de l'activité physique, examen clinique, ECG, tolérance des traitements.
- Contrôle du bon respect des règles hygiéno-diététiques.

### Consultation au 12<sup>e</sup> mois

Cette consultation est l'occasion de renouveler les étapes suivantes.

ECG d'effort éventuellement couplé à une scintigraphie myocardique au thallium

À effectuer sous traitement.

#### Évaluation de la fonction ventriculaire gauche

Par échocardiographie Doppler.

### Consultations suivantes

Si le bilan à 1 an est rassurant, les consultations cardiologiques pourront être espacées tous les 6 mois.

### Bilan annuel

ECG d'effort sous traitement, bilan lipidique et glucidique. S'assurer du bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires.

## CONSENSUS

[1] Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation, ESC, 2012

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (3)

**Complications**► **Complications liées au cathétérisme interventionnel**

- Décès (1 %).
- Infarctus du myocarde par occlusion aiguë (dissection et/ou thrombose coronaire) : 2-3 %.
- Pontage aorto-coronaire en urgence : 2-4 %.
- Occlusion d'une branche, embolie coronaire distale.
- Dissection coronaire ostiale ou localisée au site de dilatation.
- Perforation d'une artère coronaire.
- Fracture du guide.
- Hématomes au point de ponction.
- Embolie artérielle distale (membre inférieur).
- Dissection ilio-fémorale ou aortique exceptionnelle.

► **Complications à distance de l'angioplastie**

- **La resténose est la complication la plus fréquente : 20-30 % dans les 6-9 premiers mois.**
- Ce taux diminue quand une endoprothèse est mise en place, en particulier une endoprothèse « active ».

**Surveillance post-procédure**

- Compression et surveillance du point de ponction radial ou fémoral. Surveillance des pouls distaux, de la chaleur cutanée et de l'hémodynamique.
- ECG répétés, enzymes cardiaques, créatinémie.

**Pontage(s) aorto-coronaire(s) [1]****Indications**

Patients symptomatiques présentant :

- un échec d'angioplastie avec resténoses itératives ;
- une sténose non protégée du tronc commun > 50 % ;
- des sténoses coronaires tritronculaires avec une fonction VG altérée ;
- des sténoses coronaires tritronculaires avec une bonne fonction VG mais persistance d'angor malgré un traitement médical maximal et impossibilité de geste d'angioplastie.

**Procédure**

- Intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle et protection myocardique.
- Réalisation de ponts entre l'amont et l'aval

des sténoses à l'aide soit de greffons artériels (surtout artères mammaires internes) soit de greffons veineux (segment de veine saphène interne).

- La revascularisation doit être la plus complète possible (2 à 5 pontages artériels et veineux). Les indications sont à évaluer au cas par cas après discussion entre le cardiologue traitant, le cardiologue interventionnel, le chirurgien cardiaque et l'anesthésiste (cf. chapitres Maladie coronaire stable, Syndrome coronaire aigu sans élévation du segment ST et Infarctus du myocarde avec élévation du segment ST).

**Résultats**

- Amélioration de la survie et de la symptomatologie, en particulier en cas de sténose du tronc commun, de lésions tritronculaires avec fonction ventriculaire gauche altérée.
- Bénéfice très net dans les angors invalidants malgré un traitement médical optimal.

**Surveillance**

Après la surveillance initiale de réanimation médico-chirurgicale, assurer une surveillance d'une dizaine de jours :

- clinique : cicatrices, auscultation cardiopulmonaire, température, hémodynamique ;
  - ECG, clichés pulmonaires, échocardiographie, recherche d'un syndrome inflammatoire.
- L'ordonnance de sortie comporte un traitement antiangineux de fond, de l'aspirine au long cours et le traitement des facteurs de risque. Convalescence en centre de rééducation cardiaque 2-3 sem.

Épreuve d'effort avant la reprise d'activité vers le 3<sup>e</sup> mois.

**Évolution**

- Mortalité périopératoire < 5 % par :
  - infarctus périopératoire ;
  - bas débit postopératoire favorisé par âge > 65 ans, dysfonction VG sévère ;
  - mauvais lit d'aval ;
  - complication extracardiaque (infectieuse, respiratoire, neurologique).

- Pontages artériels : perméabilité de 85-90 % à 10 ans.
- Pontages veineux : 10-20 % s'obstruent à 1 an et 50 % sont occlus à 10 ans.

**CONSENSUS**

[1] Guidelines on myocardial revascularization, ESC, 2010

## INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS PRÉCOCES (1)

Les traitements de chaque complication sont détaillés dans les chapitres correspondants.

### Complications rythmiques

#### Généralités

Leur diagnostic repose sur la **surveillance continue du rythme cardiaque** pendant le séjour en USIC (unité de soins intensifs cardiologiques).

En cas de détection d'un trouble du rythme, celui-ci doit être enregistré sur papier sauf en cas de troubles du rythme auriculaire mal tolérés ou ventriculaire graves où un **choc électrique externe** est immédiatement réalisé.

Le choix du traitement immédiat dépend de la tolérance hémodynamique :

- choc électrique externe en urgence en cas de troubles du rythme mal tolérés,
- traitement médicamenteux dans les autres cas.

Le traitement préventif des récidives est systématique.

#### Correction des facteurs favorisants

- Hypokaliémie : KCl en IV.
- Hypoxémie : O<sub>2</sub> au masque.
- Acidose métabolique sévère : alcalinisation.
- Hypomagnésémie : MgSO<sub>4</sub> en IV.

#### Troubles du rythme supraventriculaire

- Anticoagulation efficace.
- Ralentir la cadence ventriculaire par une dose de charge en IV ou *per os* de **CORDARONE**.
- Les **antiarythmiques de classe Ic** (ex. : **FLÉCAÏNE**) sont contre-indiqués (effet inotrope négatif, surmortalité par effet proarythmogène).
- Après retour en rythme sinusal, prévention des récidives par **CORDARONE per os**.
- En cas de mauvaise tolérance hémodynamique : régularisation par **choc électrique externe** sous courte anesthésie générale.

#### Troubles du rythme ventriculaire

Ils sont souvent induits par la reperfusion soit spontanée soit favorisée par le traitement fibrinolytique.

Après régularisation, l'indication d'un traitement antiarythmique oral au long cours va dépendre de la fonction VG à distance, de la présence de potentiels tardifs et de la sévérité des troubles du rythme ventriculaire sur le Holter-ECG/24 h.

Un **défibrillateur cardiaque implantable** peut être indiqué.

► **Extrasystoles ventriculaires fréquentes** > 5/min, polymorphes et menaçantes **XYLOCARD** à la phase aiguë.

► **Rythme idioventriculaire accéléré** (tachycardie ventriculaire lente entre 55 et 110/min)

- Le plus souvent bien toléré sur le plan hémodynamique et régresse spontanément.

- Soit abstention thérapeutique, soit accélération prudente du rythme sinusal par **ATROPINE** 0,5 à 1 mg en SC ou IV.

► **Tachycardie ventriculaire**

- En cas de **mauvaise tolérance hémodynamique** : régularisation par **choc électrique externe** en urgence sous courte anesthésie générale puis traitement d'entretien par **XYLOCARD** ou **CORDARONE**.

- En cas de **bonne tolérance hémodynamique** : **XYLOCARD** en IV en 1<sup>re</sup> intention, sinon **CORDARONE** en IV en perfusion continue.

- **RYTHMODAN** et **antiarythmiques de classe Ic** sont contre-indiqués.

► **Fibrillation ventriculaire**

Choc électrique externe en extrême urgence (360 joules) à recommencer en cas d'échec.

- La réanimation médicale associée est décrite dans Arrêt cardiorespiratoire de l'adulte.

- Après retour en rythme sinusal, prévention des récidives par **XYLOCARD** ou **CORDARONE**.

## THROMBOLYTIQUES (1)

### ■ Streptokinase

<b>STREPTASE</b>					
IDM : 1 500 000 UI en perfusion IV continue sur 45 min	1 fl. 250 000 UI	HOP	I		
Embolie pulmonaire massive : 250 000 UI en perfusion IV sur 30 min puis 100 000 UI/h pendant 24 h	1 fl. 750 000 UI 1 fl. 1 500 000 UI	HOP HOP	I I		

Remarque : le lyophilisat doit être dissous dans un soluté glucosé à 5 % ou salé isotonique.

### ■ Altéplase

<b>ACTILYSE</b>					
IDM vu avant H6 : schéma accéléré 90 min :	1 fl. pdre 10 mg + fl. solv. 10 mL	HOP	I		
- 15 mg en bolus IV en 1 à 2 min	1 fl. pdre 20 mg + fl. solv. 20 mL	HOP	I		
- puis 0,75 mg/kg en perf. IV de 30 min sans dépasser 50 mg	1 fl. pdre 50 mg + fl. solv. 50 mL	HOP	I		
- puis 0,5 mg/kg en perf. IV de 60 min sans dépasser 35 mg					
IDM vu entre H6 et H12 : schéma 3 h :					
- 10 mg en bolus IV en 1 à 2 min					
- puis 50 mg en perfusion IV sur 1 h					
- puis 10 mg en perfusion IV de 30 min jusqu'à la dose maximale de 100 mg en 3 h					
Embolie pulmonaire aiguë massive : 10 mg en bolus IV en 1 à 2 min, puis 10 mg en perfusion IV sur 2 h					

Remarque : reconstituer le produit avec le solvant, mélanger sans agiter ni faire mousser et injecter dans les 30 min.

### ■ Rétéplase

<b>RAPILYSIN</b>					
IDM avant H12 : 10 U en bolus IV en 1 à 2 min puis 10 U en bolus IV en 1 à 2 min, 30 min plus tard	2 fl. pdre 10 U + ser. solv. 10 mL	HOP	I		

### ■ Urokinase

<b>ACTOSOLV</b>					
Posologie modérée : 2 000 UI/kg/h pendant 24 h et au-delà	1 fl. pdre 100 000 UI	HOP	I		
Posologie forte : 4 000 à 5 000 UI/kg/h pendant 12 h	1 fl. pdre 600 000 UI	HOP	I		

### ■ Ténecteplase

<b>METALYSE</b>					
IDM vu avant H6 : dose adaptée au poids sans dépasser 10 000 unités (50 mg) en un bolus IV unique de 10 s	1 fl. pdre 10 000 U	HOP	I		

**INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS PRÉCOCES (2)****Troubles conductifs****Dans les IDM antérieurs**

Un BAV III, un BAV II, un bi-bloc alternant, un bloc bi- ou trifasciculaire, un BBG isolé récent imposent un **entraînement électrosystolique temporaire**.

Un PR long, un HBAG, un HBPG ou un BBD isolé imposent une surveillance rapprochée. En cas d'aggravation, un entraînement électrosystolique temporaire s'impose.

**Dans les IDM inférieurs**

- La bonne tolérance clinique habituelle impose l'**abstention thérapeutique**.
- Un entraînement électrosystolique temporaire est indiqué en cas de :
  - bradycardie symptomatique ;
  - bradycardie inadaptée au bas débit cardiaque ;
  - extension de l'IDM au ventricule droit avec mauvaise tolérance hémodynamique ;
  - BAV associé à une hyperexcitabilité ventriculaire nécessitant un traitement antiarythmique ;
  - choc cardiogénique.

**Insuffisance ventriculaire gauche aiguë****Facteurs déclenchants**

- Troubles du rythme auriculaire rapide ou ventriculaire.
- IDM d'emblée étendu ou extension de l'IDM initial à d'autres territoires myocardiques.
- Fonction VG préalablement altérée.
- Prescription de médicaments inotropes négatifs.

**Prise en charge thérapeutique**

- Doit se faire dès les premiers signes cliniques au domicile du patient, pendant le transport médicalisé puis en USIC.

• Repose essentiellement sur l'oxygénothérapie au masque, un traitement diurétique en IV et un vasodilatateur veineux en IV.

• Une intubation avec ventilation assistée peut être nécessaire ainsi qu'une surveillance hémodynamique par sonde de Swan-Ganz.

• En cas de réponse hémodynamique incomplète, on associe un traitement inotrope positif : **dopamine**.

• En cas d'échec persistant, la **milrinone** peut être prescrite.

**Choc cardiogénique sans complication mécanique**

La mortalité de l'IDM compliqué de choc cardiogénique reste élevée, de l'ordre de 50-60 %. Le moyen le plus efficace de lutter contre cette complication est de traiter les patients le plus précocement possible à la phase aiguë, pour réduire la taille de l'IDM.

C'est l'indication d'une désobstruction coronaire par voie percutanée en urgence : angioplastie primaire.

• Traitement des facteurs aggravants essentiellement rythmiques.

• Correction des troubles métaboliques, hypovolémie, hypoxémie, acidose métabolique.

• Remplissage vasculaire, drogues vasopressives et drogues inotropes positives. Cf. Choc cardiogénique.

• En l'absence d'amélioration initiale, indication à la mise en place d'une assistance circulatoire type ECMO (*ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*) plus efficace qu'une simple contre-pulsion par ballon intra-aortique. Cette assistance circulatoire est en effet plus complète pour décharger le ventricule gauche et est implantée en salle de cathétérisme.

## THROMBOLYTIQUES (2) – PHARMACOLOGIE (1)

## PROPRIÉTÉS

Activation du système fibrinolytique physiologique en transformant le plasminogène inactif en plasmine active.

L'action protéolytique de la plasmine va s'exercer sur la fibrine du caillot pour le dissoudre et sur le fibrinogène circulant. L'efficacité est d'autant plus grande que le caillot est récent.

## INDICATIONS

Infarctus du myocarde à la phase aiguë au mieux avant la 6<sup>e</sup> h du début de la douleur (**streptokinase**, **altéplase**, **ténecteplase**) ou avant H12 (**rtéplase**).

Si administration antérieure de **streptokinase** et :

- survenue d'une allergie au produit : **altéplase** ;
- récurrence d'IDM au-delà de J5 : **altéplase** ;
- récurrence d'IDM avant J5 : **streptokinase** possible.

Embolie pulmonaire aiguë massive avec instabilité hémodynamique (**streptokinase**, **altéplase**, **urokinase**).

Désobstruction des shunts artério-veineux chez les malades hémodialysés, thrombose de prothèse valvulaire cardiaque, occlusion artérielle et veineuse par thrombus récent en cas de traitement endovasculaire, restauration de perméabilité de cathéters endovasculaires (**streptokinase**, **urokinase**).

Accident vasculaire cérébral ischémique vu dans les trois premières heures après le début des symptômes neurologiques (**altéplase**).

## CONTRE-INDICATIONS

## Absolues

Pathologie intracrânienne connue (néoplasie, anévrisme), antécédent d'hémorragie cérébrale, chirurgie intracrânienne récente, chirurgie médullaire ou oculaire récente < 3 mois, traumatisme crânien ou cervical, HTA sévère non contrôlée (> 180/110 mmHg), accident vasculaire ischémique cérébral < 6 mois, hémorragie extériorisée viscérale, intervention chirurgicale < 10 j, altérations constitutionnelles ou acquises de l'hémostase, biopsie hépatique ou rénale ou aortographie par voie lombaire < 15 j, implantation de prothèse en *Dacron* < 2 mois, suspicion de dissection aortique.

En cas de traitement par **streptokinase** : allergie à la **streptokinase**, infection streptococcique < 12 mois, utilisation de ce produit dans les 6 derniers mois.

## Relatives

Âge > 70 ans, hypertension artérielle modérée, ulcère digestif ou cirrhose ne saignant pas, rétinopathie diabétique sévère, massage cardiaque, atteinte hépatocellulaire ou rénale sévère, endocardite, péricardite, traumatisme récent peu important, pancréatite aiguë.

**Grossesse** : traitement par **streptokinase** contre-indiqué avant le 5<sup>e</sup> mois et en *post-partum* immédiat. Les autres **thrombolytiques** sont contre-indiqués pendant toute la durée de la grossesse.

**Allaitement** : contre-indiqué.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À administrer en milieu médicalisé spécialisé avec des moyens de surveillance et de réanimation adéquats (Samu, en phase préhospitalière, unités de réanimation).

Évaluer pour chaque patient le rapport bénéfice/risque hémorragique surtout en cas de contre-indications relatives.

Les injections intramusculaires et ponctions artérielles non compressibles sont contre-indiquées en cours de traitement.

Si traitement par **AVK** ou **héparine** au préalable, arrêter puis compenser ou neutraliser le déficit.

Surveillance du traitement : cf. Encadré.

Traitement associé : **aspirine** et **héparine standard** sont associées avec des protocoles précis.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Risque hémorragique

– Hémorragies mineures (5 à 10 %). Gingivorragies, épistaxis, saignements aux points de ponction, hématomes cutanés.

– Hémorragies majeures (4 à 5 %). Hémorragies intracrâniennes (0,5 %), artérielles périphériques, digestives, urogénitales, rétropéritonéales.

## Réactions allergiques

– Uniquement avec la **streptokinase**.

– Survienent de façon transitoire en début de traitement : hypotension, tachycardie, fièvre, frissons, myalgies, nausées, vomissements, éruption cutanée, hyperleucocytose à polymynucléaires neutrophiles.

– Rarement, choc anaphylactique.

## INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS PRÉCOCES (3)

### Complications mécaniques

Intérêt majeur de la surveillance régulière par échocardiographie Doppler pour déceler de telles complications.

#### Insuffisance mitrale (IM) aiguë par rupture de pilier

- En cas d'IM massive avec œdème aigu pulmonaire ou choc cardiogénique résistant au traitement médicamenteux : chirurgie mitrale en urgence (réparation ou remplacement).
- En cas de stabilisation de l'état hémodynamique : bilan coronarographique puis chirurgie différée de 24-48 h (réparation ou remplacement).
- Rarement bonne tolérance clinique et hémodynamique sous traitement médicamenteux : chirurgie vers la 3<sup>e</sup> sem. (réparation ou remplacement).

#### Rupture septale

- Stabilisation hémodynamique initiale par molécules inotropes positives et vasodilatatrices.
- Fermeture chirurgicale de la brèche septale dont le délai est discuté par les équipes chirurgicales.

#### Fissuration du ventricule gauche

Chirurgie en extrême urgence.

### IDM étendu au ventricule droit

- Intérêt de l'angioplastie primaire (ou du traitement fibrinolytique précoce) pour limiter la taille de l'IDM.
- Arrêt des **dérivés nitrés** et **diurétiques**.
- Régime normosodé.
- Remplissage vasculaire sous contrôle des pressions de remplissage et du débit cardiaque (sonde de Swan-Ganz).
- Utilisation de molécules inotropes positives.
- Correction de troubles conductifs par entraînement électrosystolique temporaire idéalement auriculo-ventriculaire.

### Péricardite aiguë

- Toujours penser à une fissuration du VG.
- Un épanchement liquidien abondant à l'échocardiographie fait discuter l'**arrêt des anticoagulants** (transformation hémorragique toutefois exceptionnelle).
- Évacuation par ponction péricardique seulement en cas de signes de tamponnade.

### Thrombus intraventriculaire gauche

- Risques d'embolie périphérique.
- **HÉPARINE STANDARD** en IV à doses efficaces (ratio TCA entre 2 et 3) pendant une dizaine de j puis relais par un traitement **antivitamines K** (INR entre 2 et 3) à poursuivre jusqu'à disparition du thrombus vérifié par échocardiographie.

Surveillance échocardiographique itérative.

- Le traitement antivitamine K est définitif en cas de :
  - anévrisme du ventricule gauche ;
  - dysfonction ventriculaire gauche sévère ;
  - antécédents thromboemboliques.

**THROMBOLYTIQUES (3) – PHARMACOLOGIE (2)****INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Risque hémorragique accru en cas de traitement anticoagulant oral ou injectable ou antiagrégant plaquettaire associé.

Ne pas mélanger à d'autres substances médicamenteuses dans le flacon ni dans une perfusion.

**Traitement d'une hémorragie grave non contrôlée**

Arrêt du traitement thrombolytique, de l'**aspirine** et de l'**héparine**.

Compression prolongée des abords vasculaires.

Traitement antifibrinolytique : **acide tranexamique** en IV lente (*cf. Hémostatiques généraux en cardiologie*).

Neutralisation de l'**héparine** circulante par la **protamine**.

Correction des anomalies par transfusion selon les besoins (fibrinogène, plasma frais congelé, culots globulaires).

**Surveillance du traitement thrombolytique**

Elle comprend :

- la surveillance de l'efficacité du traitement avec l'apparition de critères de réperméabilisation coronaire : l'incidence de la reperméabilisation coronaire est de 50 à 75 % dans les 3 premières heures selon le **thrombolytique** utilisé ;
- la surveillance de la tolérance du traitement.

1. Clinique : disparition de la douleur angineuse. En cas de récurrence angineuse (= réocclusion dans 15 % des cas), une coronarographie est réalisée pour pratiquer une angioplastie de sauvetage.

2. ECG : diminution voire disparition du sus-décalage du segment ST. Arythmies ventriculaires de reperfusion (extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire, rythme idioventriculaire accéléré). Troubles conductifs. ECG pendant la perfusion, à la fin de la perfusion puis toutes les 4 h pendant 24 h.

3. Biologie : CPK avec fraction CPKMB, myoglobine, troponine. Le pic de CPK est plus précoce (< 4<sup>e</sup> h) qu'en cas d'IDM d'évolution spontanée. NFS, plaquettes, TP, TCA, fibrinogène/6 h pendant 24 h.

4. Surveillance de la tolérance : surveillance des points de ponction, signes hémorragiques latents ou patents. Échocardiographie + Doppler pour évaluer la fonction systolique VG au décours de la perfusion et éliminer un épanchement péricardique.

**Score d'occlusion de l'artère responsable de l'IDM évalué à la coronarographie****TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) 0**

- absence complète de flux au-delà de l'obstruction.

**TIMI 1**

- passage du produit de contraste au-delà de la sténose sans opacification complète du lit d'aval.

**TIMI 2**

- passage du produit de contraste au-delà de la sténose,
- opacification complète du lit d'aval,
- vitesse de lavage ralentie.

**TIMI 3**

- TIMI 2 mais vitesse de lavage non ralentie.



**INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS TARDIVES****Syndrome de Dressler**

- Péricardite récidivante + épanchement pleural + douleurs articulaires diffuses + syndrome inflammatoire biologique.
- **ASPIRINE** 2 à 3 g/j.
- Les **AINS** sont à éviter du fait du retard à la cicatrisation du VG, du risque de rupture cardiaque et d'augmentation des résistances coronaires.

**Anévrisme pariétal du ventricule gauche**

- Traitement anticoagulant à vie (**AVK**) avec un INR souhaité entre 2 et 3.
- Rôle favorable des **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** (ex. : **ZESTRIL**, **TRIA-TEC**) précocement prescrits.
- Traitement chirurgical en cas d'anévrisme compliqué (mortalité 20 %).

**Insuffisance ventriculaire gauche chronique**

- Rechercher une cause pouvant être traitée chirurgicalement (anévrisme pariétal, IM, rupture septale).

Discuter une revascularisation par angioplastie percutanée ou par pontage en cas de lésions coronaires accessibles et de viabilité myocardique qu'il faut rechercher.

- Traitement médical maximal associant **diurétique**, **inhibiteur de l'enzyme de conversion** ou **antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II**, **bêta-bloquant**, **antialdostérone** ± **AVK** ± **antiarythmique** (**CORDARONE**).
- Un **défibrillateur cardiaque implantable** peut être indiqué.
- Un **dispositif implantable avec fonction de resynchronisation** peut être indiqué.
- Discuter l'indication d'une transplantation cardiaque chez des patients de moins de 65 ans réfractaires au traitement médical maximal.

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (1)

L'insuffisance cardiaque chronique est définie par l'incapacité du cœur à assurer un débit suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes. On distingue :

- l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite à savoir une FEVG < 35 % : c'est l'insuffisance cardiaque systolique (60 % des cas) ;
- l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée à savoir une FEVG > 50 % : c'est l'insuffisance cardiaque diastolique (40 % des cas) ;
- les patients avec une FEVG entre 35 et 50 % sont plutôt à considérer dans leur prise en charge comme ayant une insuffisance cardiaque systolique.

Les principaux objectifs du traitement sont [1] :

- réduire les symptômes et maintenir ou améliorer la qualité de vie ;
- prévenir les poussées d'insuffisance cardiaque ;
- prévenir les hospitalisations itératives ;
- prévenir les complications ;
- réduire la mortalité qui répond à 2 mécanismes principaux : l'insuffisance cardiaque progressive et la mort subite, souvent d'origine rythmique.

### Classification NYHA

Elle est couramment utilisée et repose sur les symptômes et la capacité à l'exercice. Elle permet d'évaluer la sévérité de l'insuffisance cardiaque et aide à la stratégie thérapeutique.

- Stade I : absence de gêne sauf pour des efforts importants inhabituels.
- Stade II : limitation survenant à l'effort (marche rapide, montée des escaliers).
- Stade III : limitation des gestes de la vie courante
- Stade IV : gêne au moindre effort ou dyspnée permanente au repos.

### Examens recommandés à titre diagnostique et étiologique:

- Numération formule sanguine, plaquettes, ionogramme sanguin, TP, TCA, urée, créatinine, calcémie, enzymes hépatiques, ferritine, bilan thyroïdien, BNP ou NT-proBNP.
- ECG, **écho-Doppler cardiaque pour évaluer la FEVG** et la cardiopathie sous-jacente, radiographie pulmonaire.
- Pour des patients sélectionnés : IRM cardiaque, coronarographie, cathétérisme cardiaque droit/gauche, tests d'ischémie.

### Traitements de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique à fraction d'éjection réduite (NYHA II à IV) : insuffisance cardiaque systolique

- 1<sup>re</sup> étape : **diurétique** pour supprimer les signes congestifs + **IEC** (ou **ARA II** si intolérance) + **bêtabloquant** + **règles hygiéno-diététiques**. L'IEC et le **bêtabloquant** sont prescrits en vue d'atteindre la dose cible ou la dose maximale tolérée +++.
- 2<sup>e</sup> étape : si le patient présente encore des symptômes NYHA II à IV, ajouter un **antialdostérone** si clairance créatinine  $\geq 30$  mL/min et kaliémie  $\leq 5$  mmol/L.
- 3<sup>e</sup> étape : après plusieurs semaines, réévaluer les symptômes et la FEVG :
  - si symptômes persistants NYHA II à IV et FEVG  $\leq 35$  % en rythme sinusal et FC  $\geq 70$ /min : ajouter **ivabradine**,
  - si symptômes persistants NYHA II à IV et FEVG  $\leq 35$  % en ACF : ajouter **digoxine**.
- 4<sup>e</sup> étape : sous **IEC** ou **ARA II** + **bêtabloquant** + **diurétique** + **antialdostérone** + **ivabradine**, si les symptômes persistent (NYHA II à IV) avec une FEVG  $\leq 35$  % :
  - et durée du QRS  $\geq 120$  ms : **resynchronisation** à discuter,
  - et durée du QRS < 120 ms : **défibrillateur implantable** à discuter.
- 5<sup>e</sup> étape : si les symptômes persistent malgré toutes les étapes précédentes, envisager **digoxine** + **dinitrate d'isosorbide**. Discuter **assistance circulatoire** ± **transplantation cardiaque**.

## BÊTABLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (1)

## ■ Carvédilol

<b>KREDEX</b>					
Dose test de 3,125 mg puis augmentation progressive jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient Dose cible 25 mg x 2/j si poids < 85 kg et 50 mg x 2/j si poids > 85 kg À prendre au moment des repas	28 cp. séc. 6,25 mg	8,02	I	65 %	0,29
	28 cp. séc. 12,5 mg	8,02	I	65 %	0,29
	28 cp. séc. 25 mg	8,02	I	65 %	0,29

## ■ Bisoprolol

<b>CARDENSIEL</b>					
Dose initiale 1,25 mg x 1/j Dose cible 10 mg x 1/j	30 cp. 1,25 mg	6,33	I	65 %	0,21
	90 cp. 1,25 mg	17,74	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 2,5 mg	6,33	I	65 %	0,21
	90 cp. séc. 2,5 mg	17,74	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 3,75 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 5 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 7,5 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 10 mg	6,33	I	65 %	0,20
<b>CARDIOCOR</b>					
Idem <b>CARDENSIEL</b>	30 cp. 1,25 mg	6,33	I	65 %	0,21
	30 cp. séc. 2,5 mg	6,33	I	65 %	0,21
	30 cp. séc. 5 mg	3,59	I	65 %	0,12

## ■ Métoprolol

<b>SELOZOK LP</b>					
Dose initiale 23,75 mg x 1/j Dose cible 190 mg x 1/j	28 cp. 23,75 mg	19,52	I	65 %	0,70
	28 cp. 95 mg	19,52	I	65 %	0,70
	28 cp. 190 mg	19,52	I	65 %	0,70

## ■ Nébivolol

<b>NÉBILOX</b>					
Dose initiale 1,25 mg x 1/j Dose cible 10 mg x 1/j	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34
<b>TEMERIT</b>					
Idem <b>NÉBILOX</b>	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (2)

### Diurétiques

Ils sont utilisés en cas de surcharge hydrosodée quand des signes congestifs sont présents. Ils améliorent rapidement la dyspnée et la tolérance à l'effort. Ils ne réduisent pas les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ni le risque de mortalité.

- Les **diurétiques de l'anse** sont utilisables dans toutes formes d'insuffisance cardiaque et quelle que soit la fonction rénale. **Furosémide (LASILIX)** : 20 à 60 mg/j (stades II et III), jusqu'à 80 à 160 mg/j, voire plus (stade IV). Il faut penser à la supplémentation potassique. **Leur posologie doit être adaptée à l'évolution des signes cliniques** pour ne pas entraîner une déshydratation et/ou une aggravation de la fonction rénale.

- Les **diurétiques thiazidiques** peuvent être utilisés dans l'insuffisance cardiaque modérée et quand la clairance de la créatinine est  $> 30$  mL/min. Ils peuvent être utilisés en association avec les **diurétiques de l'anse** pour une action synergique.

### Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

Ils sont recommandés en 1<sup>re</sup> intention chez tous les patients avec une FEVG  $\leq 40$  %.

Ils diminuent la mortalité et améliorent la qualité de vie quels que soient l'étiologie et le degré de l'insuffisance cardiaque.

Ils doivent être augmentés progressivement jusqu'à la dose cible ou la dose maximale tolérée. On surveillera régulièrement la kaliémie, la fonction rénale et la pression artérielle. Les insuffisants cardiaques tolèrent souvent des pressions artérielles systoliques inférieures à 100 mmHg.

- **Énalapril (RENITEC)** : débiter par 2,5 mg x 2/j. Dose cible : 10-20 mg x 2/j.
- **Ramipril (TRIATEC)** : débiter par 2,5 mg en 1 prise/j. Dose cible : 5 mg x 2/j.
- **Captopril** : dose cible 50 mg x 3/j.

- **Lisinopril** : dose cible 20-35 mg en 1 prise/j.

- **Trandolapril** : dose cible 4 mg en 1 prise/j.

### Bêtabloquants

Ils sont recommandés chez tous les patients avec une FEVG  $\leq 40$  % en association aux IEC.

Ils diminuent la mortalité, le nombre d'hospitalisations, les poussées d'insuffisance cardiaque et améliorent le statut fonctionnel et la fraction d'éjection.

#### ► Précautions d'emploi

- Ils doivent être débutés chez des patients stables en consultation spécialisée, ou après décompensation cardiaque récente sous surveillance hospitalière.

- En commençant à faible dose et en augmentant progressivement (par paliers de 7 à 15 j) jusqu'à la dose cible ou la dose maximale tolérée.

- Sous surveillance régulière +++. Une fatigue peut apparaître au début du traitement mais ne doit pas conduire à arrêter les **bêtabloquants**. En cas de signes congestifs adapter les doses de **diurétiques**  $\pm$  diminuer les doses de **bêtabloquants**.

- Les contre-indications sont l'asthme, la bradycardie et l'hypotension symptomatiques.

#### ► Quatre bêtabloquants sont préférentiellement utilisés

- **Alpha-bêtabloquant, carvedilol (KREDEX)** : **bêtabloquant non cardioselectif** aux propriétés vasodilatatrices et antioxydantes. Dose initiale 1/2 cp. à 6,25 mg x 2/j. Dose cible : 25-50 mg x 2/j.

- **Bisoprolol (CARDENSIEL ou CARDIOPOL)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 1,25 mg x 1/j. Dose cible 10 mg x 1/j.

- **Succinate de métoprolol (SELOZOK LP)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 23,75 mg x 1/j. Dose cible 190 mg x 1/j.

- **Néбиволол (NÉBILOX ou TEMERIT)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 1,25 mg x 1/j. Dose cible 10 mg x 1/j.

## BÊTABLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

β-bloquants cardiosélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque mais avec effet stabilisant de membrane. Propriétés antioxydantes et vasodilatatrices. Dans l'insuffisance cardiaque, augmentation de la fraction d'éjection et diminution de la mortalité.

Le **carvédilol** a une activité alpha-bloquante supplémentaire.

### INDICATIONS

Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique de classe NYHA II, III ou IV chez les patients euvolemiques, à distance de poussées en association avec le traitement conventionnel (**diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion**).

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Insuffisance cardiaque en phase instable et choc cardiogénique.

Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire de haut degré non appareillé.

Hypotension.

Hypersensibilité au **bêtabloquant**.

Asthme, BPCO.

Artériopathie oblitérante sévère des membres inférieurs et phénomène de Raynaud.

Insuffisance hépatique sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitement instauré en milieu hospitalier : dose test (avec examen clinique toutes les heures pendant 4 h et ECG à la 4<sup>e</sup> h) en l'absence d'intolérance (fréquence cardiaque < 50/min, pression artérielle systolique < 85 mmHg, apparition de signes congestifs).

Augmentation très progressive par paliers d'au moins 15 j sous surveillance médicale stricte. Posologie augmentée jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient.

Réduire la dose ou interrompre le traitement en cas d'intolérance.

Diminution des doses chez le sujet âgé.

Surveillance de la fonction rénale, particulièrement en cas de PA limite, d'atteinte vasculaire diffuse ou d'insuffisance rénale préexistante.

**Diabétiques** : les **β-bloquants** peuvent masquer les signes d'hypoglycémie et en augmenter la sévérité.

Angor de Prinzmetal : risque de déclenchement de crises d'angor.

Psoriasis : risque d'aggravation.

ATCD de thrombopénie sévère : utilisation déconseillée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Hypotension, signes congestifs d'insuffisance cardiaque, choc, bradycardie, troubles conductifs.

Altération de la fonction rénale.

Bronchospasme.

Thrombopénie.

Autres : augmentation de la sensibilité aux allergènes et de la gravité des réactions anaphylactiques, réduction de la sécrétion lacrymale, étourdissements, troubles de conscience, crises convulsives (surdosage), diarrhée, vomissements, hyperglycémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : médicaments inotropes négatifs, **antiarythmiques de classe Ia et Ic, clonidine, sultopride** (troubles du rythme ventriculaire notamment torsades de pointes), **cimétidine** (inhibiteur enzymatique) et **floctafénine** (hypotension, choc).

Médicaments chronotropes et dromotropes négatifs.

Médicaments hypotenseurs.

**Inducteurs enzymatiques.**

**Digoxine** : majoration de la digoxinémie.

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (3)

### Antagonistes de l'aldostérone (antialdostérone)

Ils sont recommandés chez les patients au stade II à IV NYHA avec une FEVG  $\leq 35\%$ , qui restent symptomatiques sous IEC + **bêtabloquant**, avec une kaliémie  $\leq 5$  mmol/L et une clairance de la créatinine  $\geq 30$  mL/min.

L'ajout de **spironolactone** ou d'**éplérénone** au traitement standard s'avère efficace pour réduire la mortalité et le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Les principaux effets secondaires sont l'hyperkaliémie et l'insuffisance rénale (gynécomastie avec la spironolactone).

La kaliémie et la créatininémie sont à surveiller avant mise en route du traitement, quelques j après l'instauration du traitement, régulièrement sous traitement et après chaque adaptation posologique. Si kaliémie  $\geq 5,5$  mol/L, arrêter le traitement.

**Spironolactone (ALDACTONE)** : débiter à 25 mg x 1/j. Dose cible : 25-50 mg x 1/j.

**Éplérénone (INSPRA)** : débiter à 25 mg x 1/j. Dose cible : 50 mg x 1/j.

### Autres traitements médicamenteux au bénéfice moindre

#### ► Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ou ARA II

Ils peuvent être associés aux **bêtabloquants** ou ajoutés à l'association **bêtabloquant** + IEC. Leur bénéfice est moins certain que celui des IEC mais leur tolérance est meilleure.

Le **losartan (COZAAR)**, le **valsartan (TAREG)** et le **candésartan (ATACAND, KENZEN)** sont

ainsi recommandés quand la FEVG est  $\leq 40\%$  :

- en cas d'intolérance vraie aux IEC ;
- en association aux IEC en cas de persistance des symptômes (NYHA II-IV) ;
- en association aux IEC en cas d'intolérance aux **antialdostérone**.

Attention à l'hyperkaliémie en cas d'association IEC + ARA II. L'association IEC + ARA II + **antialdostérone** est contre-indiquée.

**Valsartan (TAREG)** : débiter à 40 mg x 2/j. Dose cible : 160 mg x 2/j.

**Candésartan (KENZEN)** : débiter à 4 ou 8 mg x 1/j. Dose cible : 32 mg x 1/j.

**Losartan (COZAAR)** : débiter à 50 mg x 1/j. Dose cible : 150 mg x 1/j.

#### ► Ivabradine

L'**ivabradine** entraîne une diminution dose-dépendante de la fréquence cardiaque sans action sur la contractilité myocardique. Elle est recommandée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique qui reste symptomatique (stade II à IV NYHA) avec une FEVG  $\leq 35\%$  chez des patients en rythme sinusal  $\geq 70$ /min, en association au traitement conventionnel comportant IEC + **bêtabloquant** + **antialdostérone**, ou en cas de contre-indication ou intolérance aux **bêtabloquants**.

Ses principaux effets secondaires sont rythmiques (ACFA, bradycardie, allongement QT), une élévation tensionnelle et des phosphènes.

**PROCORALAN** : commencer à 5 mg x 2/j et à augmenter si besoin après 2 sem. à 7,5 mg x 2/j si la FC reste  $\geq 60$ /min.

## INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (1)

## ■ Bénazépril

<b>CIBACÈNE</b>					
5 à 10 mg/j en 1 prise (dose maximale : 20 mg)	30 cp. séc. 5 mg	5,02	I	65 %	0,17
	90 cp. séc. 5 mg	13,85	I	65 %	0,15
	30 cp. 10 mg	7,85	I	65 %	0,26
	90 cp. 10 mg	22,07	I	65 %	0,25
<b>BRIEM</b>					
5 à 10 mg/j en 1 prise (dose maximale : 20 mg)	30 cp. séc. 5 mg	5,02	I	65 %	0,17
	90 cp. séc. 5 mg	13,85	I	65 %	0,15
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. 10 mg	7,85	I	65 %	0,26
	90 cp. 10 mg	22,07	I	65 %	0,25

## ■ Captopril

<b>LOPRIL</b>					
25 à 100 mg/j en 2 à 3 prises en dehors des repas (dose maximale : 150 mg)	30 cp. séc. 25 mg	7,86	I	65 %	0,26
	90 cp. séc. 25 mg	22,11	I	65 %	0,25
	30 cp. séc. 50 mg	13,58	I	65 %	0,45
	90 cp. séc. 50 mg	38,25	I	65 %	0,43

## ■ Cilazapril

<b>JUSTOR</b>					
2,5 mg/j en une prise	28 cp. séc. 1 mg	7,35	I	65 %	0,26
	28 cp. séc. 2,5 mg	10,86	I	65 %	0,39

## ■ Énalapril

<b>RENITEC</b>					
5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 80 mg dans l'HTA)	28 cp. séc. 5 mg	3,50	I	65 %	0,13
	50 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 20 mg	8,32	I	65 %	0,30
	50 cp. séc. 20 mg	HOP	I		

## ■ Fosinopril

<b>FOZITEC</b>					
10 à 20 mg/j en 1 prise	30 cp. séc. 10 mg	6,85	I	65 %	0,23
	90 cp. séc. 10 mg	19,24	I	65 %	0,21
	30 cp. 20 mg	8,09	I	65 %	0,27
	90 cp. 20 mg	22,75	I	65 %	0,25

## ■ Lisinopril

<b>ZESTRIL</b>					
Posologie initiale : 5-10 mg/j en 1 prise Posologie d'entretien : 20-80 mg/j en 1 prise	28 cp. séc. 5 mg	4,17	I	65 %	0,15
	28 cp. séc. 20 mg	8,53	I	65 %	0,30
	100 cp. séc. 20 mg	HOP	I		
<b>PRINIVIL</b>					
Idem <b>ZESTRIL</b>	28 cp. 5 mg	4,17	I	65 %	0,15
	28 cp. 20 mg	8,53	I	65 %	0,30

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (4)

### ► Digoxine

Elle a vu sa place se réduire très significativement dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, depuis qu'il a été montré qu'elle ne réduisait pas la mortalité.

En pratique, la **digoxine** peut être administrée à tous les patients en ACFA à tous les stades de l'insuffisance cardiaque symptomatique, afin de ralentir la cadence ventriculaire si elle est rapide. Elle peut être associée aux **bêtabloquants**.

Chez les patients en rythme sinusal avec une FEVG  $\leq 40\%$  et des symptômes persistants (NYHA II à IV) malgré un traitement par IEC + bêtabloquant + antialdostérone, la **digoxine** peut être utilisée pour réduire les symptômes et les hospitalisations, mais n'améliore pas la survie.

**Digitaliques, digoxine (DIGOXINE)** : 1/2 à 1 cp. à 0,25 mg/j, à réduire en cas d'insuffisance rénale.

### ► Dérivés nitrés

Ils ont l'AMM dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique en association aux autres traitements, avec une action uniquement symptomatique. Surveiller la pression artérielle avec un risque d'hypotension.

**LANGORAN LP** : 40 mg : 1 cp./j.

### Traitements médicamenteux non recommandés

#### ► Statines

Aucun bénéfice démontré dans l'insuffisance cardiaque chronique.

#### ► Inhibiteur direct de la rénine (*aliskirène*)

À ce jour, non recommandé en alternative à un IEC ou à un ARA II.

#### ► Anti-thrombotiques

Aucun bénéfice démontré sur la morbi-mortalité à initier un traitement anticoagulant oral dans l'insuffisance cardiaque, en dehors des patients en ACFA.

Bien entendu, si l'insuffisance cardiaque

est liée à une cardiopathie ischémique, l'**aspirine** est indiquée.

#### ► Antiarythmiques

Risque pro-arythmique de tous les **antiarythmiques**. Seule l'**amiodarone** n'a pas d'effet inotrope négatif et n'augmente pas la mortalité.

#### ► Inhibiteurs calciques

- Peuvent aggraver une insuffisance cardiaque (sauf **amlodipine**, **félodipine**) à cause de leur effet inotrope négatif.

- **Amlodipine** et **félodipine** peuvent être utilisées en cas d'hypertension artérielle ou d'angor chez les patients insuffisants cardiaques.

#### ► AINS, coxibs

À éviter à cause d'une rétention hydrosodée possible et d'un risque d'aggravation d'une insuffisance rénale et de l'insuffisance cardiaque.

### Traitements non médicamenteux

Les deux techniques suivantes peuvent être associées chez un même patient.

#### ► Défibrillateur implantable [2]

Il est proposé en prévention secondaire et primaire pour éviter la mort subite par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire chez des patients insuffisants cardiaques sélectionnés.

#### ► Resynchronisation ventriculaire

L'implantation d'un stimulateur biventriculaire permet, chez des patients sélectionnés, de resynchroniser la contraction ventriculaire et d'augmenter le débit cardiaque. Son utilisation est associée à une amélioration de la qualité de vie et du statut fonctionnel. Ses effets sur la mortalité ne sont pas encore formels.

La sélection des patients est précise et dépend de la FEVG, du statut fonctionnel NYHA, du traitement médical déjà prescrit et de la présence d'un asynchronisme apprécié à l'ECC ou en écho-Doppler cardiaque (cf. chapitre correspondant).



**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (2)****■ Périndopril**

<b>COVERSYL</b>					
2,5 à 10 mg/j en 1 prise en dehors des repas	30 cp. séc. 2,5 mg	7,74	I	65 %	0,26
	90 cp. séc. 2,5 mg	21,76	I	65 %	0,24
	30 cp. séc. 5 mg	10,27	I	65 %	0,34
	90 cp. séc. 5 mg	30,37	I	65 %	0,34
	30 cp. séc. 10 mg	16,59	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 10 mg	46,72	I	65 %	0,52

**■ Quinapril**

<b>ACUITEL</b>					
5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 40 mg)	28 cp. séc. 5 mg	5,59	I	65 %	0,20
	90 cp. séc. 5 mg	16,53	I	65 %	0,18
	28 cp. séc. 20 mg	9,34	I	65 %	0,33
	90 cp. séc. 20 mg	28,07	I	65 %	0,31

**KOREC**

5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 40 mg)	28 cp. séc. 5 mg	5,59	I	65 %	0,20
	28 cp. séc. 20 mg	14,76	I	65 %	0,53

**■ Ramipril**

<b>TRIATEC</b>					
2,5 à 5 mg/j en 1 prise (dose maximale : 10 mg)	30 cp. 1,25 mg	9,85	I	65 %	0,33
	90 cp. 1,25 mg	27,73	I	65 %	0,31
	100 cp. 1,25 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 2,5 mg	11,48	I	65 %	0,38
	90 cp. séc. 2,5 mg	32,32	I	65 %	0,36
	100 cp. séc. 2,5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 5 mg	14,30	I	65 %	0,48
	90 cp. séc. 5 mg	40,27	I	65 %	0,45
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 10 mg	20,94	I	65 %	0,70
	90 cp. séc. 10 mg	59,01	I	65 %	0,66

**■ Trandolapril**

<b>ODRIK</b>					
2 mg/j en 1 prise (dose max. : 4 mg)	28 gél. 0,5 mg	2,69	I	65 %	0,10
	84 gél. 0,5 mg	6,96	I	65 %	0,08
	28 gél. 2 mg	6,45	I	65 %	0,23
	84 gél. 2 mg	18,10	I	65 %	0,22
	28 gél. 4 mg	9,90	I	65 %	0,35
	84 gél. 4 mg	27,85	I	65 %	0,33

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (5)

### Formes cliniques

Le traitement étiologique, quand il est possible, est impératif : cure d'une valvulopathie, revascularisation coronaire, etc.

### Insuffisance cardiaque asymptomatique avec FEVG réduite $\leq 40\%$

Les IEC ou **ARA II**, **bêtabloquants** et **antialdostérone**s décrits ci-dessus restent indiqués pour éviter l'évolution de l'insuffisance cardiaque, même en l'absence de symptôme.

### Cas du sujet âgé

La prise en charge reste la même et quel que soit le sexe. Les traitements devront être adaptés à la fonction rénale souvent altérée chez la personne âgée.

### Fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque

- **Bêtabloquant** ou **digoxine** en cas d'intolérance.
- L'association **bêtabloquant** + **digoxine** est possible pour contrôler une cadence ventriculaire rapide.
- En cas d'ACFA mal tolérée, une cardioversion par choc électrique ou **amiodarone** est possible.
- Contre-indication de la **dronédarone**.

### HTA et insuffisance cardiaque

- Adapter les doses de **bêtabloquants**, **diurétiques**, **IEC** (ou **ARA II**), ajouter **antialdostérone** si besoin en l'absence d'**ARA II**.
- Possibilité d'associer **amlodipine**.

### Maladie coronaire stable et insuffisance cardiaque

- Optimiser la dose de **bêtabloquant**.
- En cas d'intolérance au **bêtabloquant** : **amlodipine** ou **ivabradine** ou **dérivé nitré d'action prolongée**.
- Si angor persistant, associer 2 antiangineux : associer **bêtabloquant** + **amlodipine** ou **ivabradine** ou **dérivé nitré d'action prolongée**.

### Traitements de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection conservée : insuffisance cardiaque diastolique

- Aucun traitement à ce jour n'a démontré une réduction de morbidité dans l'insuffisance cardiaque diastolique.
- Cette forme d'insuffisance cardiaque est souvent diagnostiquée à un âge avancé, dans le cadre d'une HTA ou d'une fibrillation auriculaire, ou plus rarement d'une cardiopathie ischémique.
- Les **inhibiteurs calciques** bradycardisants type **vérapamil** ont montré une certaine efficacité dans l'amélioration des symptômes et de la capacité à l'effort. Ils peuvent être utiles pour ralentir une ACFA ou pour traiter une HTA.
- Les **diurétiques** peuvent être prescrits comme dans l'insuffisance cardiaque systolique, avec cependant une grande prudence pour ne pas destabiliser le VG.
- Les **IEC** ou **ARA II** faciliteraient la relaxation et amélioreraient le remplissage ventriculaire gauche.
- Les **bêtabloquants** peuvent être utilisés en particulier en cas d'ACFA.

**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (3)****■ Zofénopril**

<b>ZOFÉNIL</b>					
7,5 à 60 mg/j en 1 prise	30 cp. 7,5 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 15 mg	18,03	I	65 %	0,60
	90 cp. 15 mg	50,79	I	65 %	0,56
	30 cp. 30 mg	15,41	I	65 %	0,51
	90 cp. 30 mg	48,11	I	65 %	0,53
	30 cp. 60 mg	18,03	I	65 %	0,60
<b>TEOULA</b>					
Idem <b>ZOFENIL</b> Posologie maximale : 60 mg/j en 1 ou 2 prises	30 cp. 7,5 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 15 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 30 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 60 mg	18,03	I	65 %	0,60

**■ Imidapril**

<b>TANATRIL</b>					
Posologie initiale : 5 mg/j Posologie d'entretien : 10 à 20 mg/j Diviser la posologie par 2 chez le sujet âgé, insuffisant rénal ou insuffisant hépatique	30 cp. 5 mg	8,89	I	65 %	0,30
	30 cp. 10 mg	12,25	I	65 %	0,41

**■ Moexipril**

<b>MOEX</b>					
Posologie initiale : 7,5 mg/j Posologie d'entretien : 7,5-15 mg/j Posologie max : 30 mg/j	30 cp. 7,5 mg	13,04	I	65 %	0,43
	30 cp. 15 mg	15,24	I	65 %	0,51

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (6)

### Importance de la prise en charge des comorbidités

Anémie, asthme, BPCO, cachexie, cancer, dépression, diabète, goutte, dysfonction érectile, HTA, carence martiale, syndrome cardiorénal, obésité, adénome de prostate, SAS.

### Prise en charge nutritionnelle et physique/Éducation du patient

- La consommation de sel doit être limitée pour éviter la rétention hydrosodée en particulier chez les patients symptomatiques stade III-IV NYHA.

- Il s'agit de ne pas consommer en excès les aliments riches en sel suivants :

- le pain et les biscottes ordinaires,
- toutes les charcuteries,
- les poissons séchés, salés ou fumés,
- les crustacés et les coquillages,
- les conserves, y compris les sucrées et les plats cuisinés,
- les eaux gazeuses : *Vichy, Vals, Badoit*, etc. Le *Perrier*, contenant très peu de sel, est autorisé.

- Une restriction hydrique à 1,5 L/j peut être utile en cas de symptômes sévères (stade III-IV NYHA), surtout en cas d'hyponatrémie. C'est inutile en cas de symptômes modérés.

- Arrêt du tabac, pas de consommation excessive d'alcool.

- Une activité physique modérée mais régulière est encouragée pour améliorer la capacité à l'effort et les symptômes (marche, vélo, natation). Un programme multidisciplinaire de réadaptation cardiaque dans un centre spécialisé est recommandé.

- Bien expliquer au patient la pathologie, les symptômes, le traitement, l'importance de la bonne observance et d'un suivi régulier. Bien expliquer les symptômes de rétention hydrosodée qui justifient une consultation rapide ou une augmentation du traitement diurétique par le patient lui-même (éducation thérapeutique +++).

- Vaccinations contre la grippe et le pneumocoque.

### CONSENSUS

[1] Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary, ESC, 2005

[2] Indications du défibrillateur automatique implantable ventriculaire. Mise à jour de la version française, SFC, 2006

## ŒDÈME AIGU PULMONAIRE CARDIOGÉNIQUE (1)

Il s'agit d'une urgence médicale dont le diagnostic est le plus souvent facile. L'œdème aigu pulmonaire (OAP) cardiogénique peut être la conséquence d'une décompensation d'une insuffisance cardiaque chronique ou d'une poussée hypertensive ou d'un choc cardiogénique ou d'un syndrome coronaire aigu.

### Principes du traitement

- Apprécier la gravité de l'œdème aigu pulmonaire.
- Rechercher et traiter un facteur favorisant ou déclenchant.
- Initier le traitement éventuellement au domicile du patient.
- Organiser le transfert en milieu hospitalier.

### Signes de gravité d'un OAP

- Détresse respiratoire : polypnée  $> 30$  /min, tirage, sueurs, cyanose, tachycardie sinusale  $> 150$  /min.
- Signes d'épuisement respiratoire : diminution fréquence respiratoire, aggravation cyanose, confusion, bradycardie  $< 40$  /min.
- Signes de choc : PAS  $< 85$  mmHg, troubles de conscience, marbrures cutanées.
- Hypoxie sévère ( $PO_2 < 50$  mmHg,  $SO_2 < 80$  %).

- Syndrome coronaire aigu associé.

### Facteurs déclenchants ou favorisants un OAP

Mauvaise observance ou baisse du traitement médical.  
Non-respect du régime sans sel.  
Troubles du rythme ou de conduction.  
Syndrome coronaire aigu (sans ou avec complications mécaniques).  
Introduction de médicaments délétères (**inotropes négatifs, AINS, corticoïdes**).  
Poussée hypertensive.  
Infections, notamment pulmonaires. Endocardites.  
Aggravation d'une BPCO.  
Insuffisance rénale.  
Anémie.  
Embolie pulmonaire.  
Tamponnade, dissection aortique.  
Dysthyroïdie.  
Consommation excessive d'alcool.

### Traitement médical sans signe de gravité

- Peut être initié au domicile.
- En cas d'œdèmes importants : **diurétiques de l'anse** en IV. Ex : **LASILIX** 1 à 4 amp. à 20 mg en IVD voire plus. Autre ex : **BURINEX** 0,5 à 2 mg en IVD.
- En l'absence d'œdème ou peu d'œdèmes : **dérivé nitré** en spray. Ex : **NATISPRAY** 2 bouff. à 2 min d'intervalle si PAS  $> 100$  mmHg.

## CÈDÈME AIGU PULMONAIRE CARDIOGÉNIQUE (2)

### Traitement en présence de signes de gravité ou en l'absence d'amélioration à domicile

- Transport médicalisé pour une prise en charge dans un service d'urgences ou en soins intensifs de cardiologie ou en réanimation médicale.
- Il repose sur l'oxygénothérapie, les **diurétiques** et les vasodilatateurs.
- Voie veineuse périphérique : G5 % 500 mL/24 h avec 2 g de KCl (pas de NaCl).
- Monitoring cardiaque, tensionnel et de la saturation artérielle par oxymètre de pouls. Dispositif de recueil des urines.
- Position semi-assise. Régime sans sel strict.
- **Oxygénothérapie** par voie nasale (2 à 6 L/min) ou au masque à haute concentration (6 à 12 L/min) pour avoir une  $\text{SaO}_2 > 95\%$  ( $\geq 90\%$  si BPCO). En cas de réponse insuffisante ou formes graves, la ventilation non invasive (VNI, technique sans dispositif intratrachéal) voire l'intubation avec ventilation assistée peuvent être envisagées.
- **Diurétiques par voie parentérale, diurétique de l'anse, furosémide (LASILIX)** : 2 amp. à 20 mg x 1 à 3/j en IVD, voire plus (max 240 mg/j). Adaptation régulière de la dose en fonction de l'évolution clinique, du ionogramme sanguin et de la créatinine pour éviter l'hypokaliémie, l'hyponatrémie, l'insuffisance rénale et l'hypovolémie.
- **Supplémentation potassique** adaptée à la kaliémie.
- **Dérivés nitrés** en spray, en bolus IV ou en IV à la seringue électrique. Sous surveillance étroite de la pression artérielle à cause du risque d'hypotension : **RISORDAN** un bolus IV de 2 mg à renouveler toutes les 5-10 min puis relais IV à la seringue électrique à 1 mg/h. Le débit peut être augmenté en fonction de la tolérance cli-

nique. La durée habituelle du traitement est de 24 à 48 h.

• **Traitement anticoagulant préventif** : **héparine de bas poids moléculaire, énoxaparine (LOVENOX)**, 20 à 40 mg/j en SC.

• Les **opiacés (morphine)** peuvent être utilisés en cas d'angoisse importante. Bolus IV de 2,5 à 5 mg en surveillant la fréquence respiratoire, la pression artérielle et le monitoring ECG.

• Dans les formes sévères et en l'absence d'hypotension artérielle : **vasodilatateur direct, nitroprussiate de sodium (NITRIATE)** : 0,3 µg/kg/min en augmentant progressivement jusqu'à 3 µg/kg/min.

• **Drogues inotropes positives** : uniquement en cas d'apparition de signes de choc cardiogénique ou en l'absence d'amélioration avec les traitements précédents à dose optimale (cf. Choc cardiogénique). Surveillance clinique, tensionnelle et ECG en continu.

Ex : **dobutamine** en IVSE : débiter à 2-3 µg/kg/min à adapter à la clinique (débit max à atteindre toujours progressivement : 15 µg/kg/min).

Ex : **dopamine** en IVSE : débit moyen 2 à 3 µg/kg/min à adapter à la clinique (débit max à atteindre toujours progressivement : 15 µg/kg/min).

### Surveillance

- Clinique : scope, fréquence cardiaque, pression artérielle, température, fréquence respiratoire, diurèse horaire, poids, saturation artérielle en oxygène et coloration des téguments, signes d'insuffisance cardiaque, signes de choc.
- Biologique : urée, créatinine, natrémie, kaliémie, NFS, plaquettes, glycémie, albuminémie, enzymes hépatiques, troponine, BNP.
- Radiologique : radiographie pulmonaire au minimum quotidienne.
- ECG au moins 1/j. Écho-Doppler cardiaque.

**ŒDÈME AIGU PULMONAIRE CARDIOGÉNIQUE (3)****Traitement du facteur favorisant ou déclenchant**

- En cas de syndrome coronaire aigu : **revascularisation coronaire**.
- En cas d'ACFA : anticoagulation efficace et traitement antiarythmique non inotrope négatif (cf. chapitre correspondant).
- Infection intercurrente : antibiothérapie adaptée.

**Au décours de l'épisode aigu**

- Instauration ou réadaptation du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque

(cf. chapitre correspondant). Prise en charge de la cardiopathie sous-jacente.

- Éducation du patient :
  - signes cliniques annonciateurs d'un OAP ;
  - auto-adaptation du traitement diurétique *per os* et du **dérivé nitré en spray** en cas de prise de poids, de majoration d'œdèmes ou d'aggravation de la dyspnée ;
  - bonne observance du traitement de fond indispensable ;
  - bon respect du régime peu salé.

## CHOC CARDIOGÉNIQUE (1)

### Définition

Le mécanisme initial de cette urgence vitale est une défaillance aiguë de la pompe cardiaque. Il entraîne une hypoperfusion périphérique liée à l'hypotension artérielle et à la baisse du débit cardiaque.

Le profil hémodynamique est le suivant :  
– hypotension artérielle : pression artérielle systolique < 90 mmHg ou chute d'au moins 30 mmHg de la pression artérielle systolique par rapport aux valeurs habituelles ;

– index cardiaque (IC) abaissé < 1,8 L/min/m<sup>2</sup> ;

– élévation des pressions de remplissage (PAPO > 18 mmHg, PVC > 15 mmHg).

Les signes cliniques sont en rapport avec l'hypoperfusion tissulaire (oligurie ou anurie, marbrures cutanées, cyanose, extré-

mités froides, pouls rapide et filant, troubles de la vigilance) et l'œdème aigu pulmonaire (dyspnée, orthopnée, cyanose, expectorations mousseuses).

### Étiologies des chocs cardiogéniques

- Infarctus du myocarde
- Dysfonction valvulaire aiguë (insuffisance mitrale aiguë par rupture de cordage, endocardite)
- Cardiomyopathies évoluées (primitives ou secondaires)
- Myocardites
- Troubles du rythme ou de conduction
- Choc cardiogénique sans atteinte myocardique primitive ou secondaire : dissection aortique, embolie pulmonaire, tamponnade
- Intoxication : intoxication au CO,  **$\beta$ -bloquants, antiarythmiques de classe Ia et Ic, antidépresseurs tricycliques, carbamates, antimétoprolol (adriamycine), etc.**

### Variations des principaux paramètres hémodynamiques au cours des différents types de choc

	CHOC HYPOLEMIQUE	CHOC SEPTIQUE	CHOC CARDIOGÉNIQUE
Index cardiaque	↓	↓↓ (↑ à la phase hyperkinétique)	↓↓
Pression auriculaire droite	↓	↓	↑
Pression artérielle pulmonaire	↓	↓	↑ ↑
Pression artère pulmonaire occluse	↓	↓	↓ ↑
Résistances vasculaires systémiques	↑	↓	↑
Différence artérioveineuse	↑	↓	↑



## TONICARDIAQUES INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES

### ■ Milrinone (dérivé de la bipyridine)

<b>COROTROPE</b>					
Bolus de 50 mg/kg en 10 min puis perfusion de 0,375 à 0,750 mg/kg/min en IVSE sans dépasser une dose totale de 1,13 mg/kg/24h Dilution dans du sérum glucosé isotonique Conservation de 15 à 25 °C	10 amp. 10 mg/10 mL	HOP	I		

### ■ Énoximone (dérivé de l'imidazolone)

<b>PERFANE</b>					
Bolus de 0,5 à 1 mg/kg (vitesse < 12,5 mg/min) éventuellement répété toutes les 30 min sans dépasser 3 mg/kg puis perfusion de 5 à 20 mg/kg/min en IVSE Dilution dans du sérum salé isotonique Conservation à température < 20 °C	10 amp. 100 mg/20 mL	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Substances augmentant l'AMPc intracellulaire en diminuant son hydrolyse par la phosphodiesterase III (pas d'action sur les récepteurs adrénergiques). Effets inotrope positif et vasodilatateur. Augmentation du débit cardiaque avec diminution de la pression capillaire pulmonaire, de la pression auriculaire droite et des résistances périphériques. Faible augmentation de la fréquence cardiaque. Pas d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène.

Pas de phénomène d'échappement thérapeutique.

Demi-vie : **milrinone** (2 à 3 h), et **énoximone** (4 à 6 h).

Élimination urinaire.

#### INDICATIONS

Traitement à court terme de l'insuffisance cardiaque aiguë congestive, en association ou à la place de la **dobutamine**, notamment en cas d'épuisement de son effet.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, enfants : innocuité non démontrée (pas d'effet tératogène rapporté).

Hypersensibilité à ces produits.

Troubles du rythme supraventriculaire non contrôlés et troubles du rythme ventriculaire graves.

Obstacles à l'éjection ventriculaire (rétrécissement aortique, cardiopathie obstructive).

Anévrysme ventriculaire.

Hypotension, collapsus.

Hypovolémie non corrigée.

Insuffisance rénale.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et éventuellement hémodynamique (Swan-Ganz) et biologique (ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique et numération plaquettaire).

Défibrillateur à proximité.

Adaptation de la posologie à la fonction rénale.

**Milrinone** : réduire la posologie si clairance < 30 mL/min.

Ne pas utiliser de matériel en verre (cristallisation).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Choc anaphylactique aux sulfites.

Troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire.

Hypotension.

Céphalées, diminution du goût et de l'odorat, tremblements.

Thrombopénie, fièvre, frissons.

Douleurs des extrémités.

Nausées, vomissements, diarrhée, élévation des transaminases (réversible à la diminution ou à l'arrêt du traitement).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Énoximone** : incompatibilité avec les solutés glucosés (cristallisation).

Pas d'incompatibilité médicamenteuse mise en évidence.

## CHOC CARDIOGÉNIQUE (2)

### Principaux effets hémodynamiques des agents inotropes positifs

Agents \ Effets	Isoprénaline	Dobutamine	Dopamine	Adrénaline	Noradrénaline	Inhibiteurs des PDE*
Débit cardiaque	↑↑	↑↑	↑	↑↑	↑	↑↑
Effet inotrope positif	+++	++	++	++	++	+
Fréquence cardiaque	↑↑	↑	→ ou ↑	↑↑	↑	→ ou ↑
Vasoconstriction	0	0	+ (forte dose)	++	+++	0
Vasodilatation	+	+	++ (faible dose)	0	0	++
Résistances vasculaires périphériques	↓↓↓	→ ou ↓	↑	↑↑	↑↑↑	↓↓↓
Pression artérielle	↓	→	↑/↑↑ (forte dose)	↑	↑↑↑	→ ou ↑
Pression artère pulmonaire occluse	↓	↓	↑	↑	↑	↓↓
Pression auriculaire droite	↓	→ ou ↑	↑	↑	↑	↓↓
Risque d'arythmie	+++	+ / ++	+ (forte dose)	+++	+	+++

\* PDE : phosphodiesterases.

## TONICARDIAQUES SYMPATHOMIMÉTIQUES (1)

## ■ Dobutamine

**DOBUTAMINE MYLAN**

Posologie de 5 à 20 µg/kg/min en IVSE à adapter à la réponse clinique

10 amp. 250 mg/20 mL

HOP

I

**PROPRIÉTÉS**

Amine sympathomimétique ayant des propriétés  $\alpha_1$ -,  $\beta_2$ - et surtout  $\beta_1$ -adrénergiques à l'origine de l'effet inotrope positif. Élévation du débit cardiaque avec réduction des pressions de remplissage ventriculaire (pression capillaire) et des résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. Élévation modérée de la fréquence cardiaque (discret effet chronotrope positif) et de la consommation myocardique en oxygène. Accélération de la conduction auriculo-ventriculaire. Peu d'effet sur la pression artérielle.

Délai d'action de 1 à 2 min, demi-vie de 2 min et élimination urinaire rapide.

**INDICATIONS**

Syndrome de bas débit cardiaque (en postopératoire de chirurgie cardiaque, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire grave, valvulopathies et cardiomyopathies dilatées décompensées, sepsis graves à pression de remplissage élevée, modification de la précharge associée à de hauts niveaux de PEEP, troubles de conduction hissiens).

Exploration fonctionnelle cardiologique (notamment couplée à l'échocardiographie).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie (contient des sulfites).

Obstacle à l'éjection ou au remplissage ventriculaire (rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive, tamponnade).

Troubles du rythme ventriculaire graves.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : aucun effet tératogène décrit.

Correction d'une hypovolémie, des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques.

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et hémodynamique (Swan-Ganz), défibrillateur à proximité.

Chez les patients en fibrillation auriculaire, une imprégnation digitale préalable est recommandée.

Utilisation possible au cours de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë malgré le risque d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène (posologie adaptée de façon à prévenir une accélération du rythme cardiaque et une élévation tensionnelle).

Réduire ou suspendre temporairement la perfusion en cas de tachycardie importante, d'hypertension, d'angor et de troubles du rythme ventriculaire.

Traitement à arrêter progressivement.

Surveillance étroite chez l'enfant : élévation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque plus importante que chez l'adulte et parfois augmentation de la pression capillaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Tachycardie excessive et déstabilisation angineuse chez le coronarien.

Hypertension.

Troubles du rythme ventriculaire.

Épuisement d'effet lors d'administration > 3 j, conduisant à l'augmentation des doses.

Nausées, céphalées, dyspnée.

Réactions allergiques : rash cutané, fièvre, éosinophilie, bronchospasme.

Choc anaphylactique aux sulfites.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Incompatibilité avec les solutés alcalins.

**Bêtabloquants** (antagonisme).

Vasodilatateurs : potentialisation de leurs effets.

## CHOC CARDIOGÉNIQUE (3)

### But du traitement

Il s'agit de relancer le plus rapidement possible la pompe cardiaque par une oxygénation myocardique efficace. Le traitement est d'autant plus efficace que l'étiologie est curable :

- infarctus : revascularisation en urgence ;
- troubles du rythme : cardioversion électrique ou médicamenteuse ;
- troubles de conduction : entraînement électrosystolique ;
- valvulopathie aiguë : remplacement valvulaire ;
- embolie pulmonaire : thrombolyse, embolectomie chirurgicale ;
- tamponnade : drainage péricardique.

### Traitement

- Hospitalisation en USIC ou en réanimation médicale.
- **Oxygénothérapie** adaptée avec recours précoce et large à la ventilation non invasive (VNI), voire une intubation avec ventilation assistée.
- Correction des troubles hydroélectrolytiques/troubles du rythme.
- **Contrôle de la volémie** ++++: remplissage vasculaire par un sérum salé isotonique, 200 mL en perfusion IV en 5 à 10 min, à renouveler si besoin. Maintenir une Hb > 10 g/dL.
- **Médicaments inotropes positifs**:
  - **dobutamine** +++ : 2 à 20 µg/kg/min en IVSE (augmentation du débit cardiaque et vasodilatation réflexe). Elle est générale-

ment insuffisante pour augmenter la pression artérielle et est donc souvent associée à la **dopamine** ;

- **dopamine** : 2 à 20 µg/kg/min ; ses effets dépendent de la dose administrée ;
- **adrénaline**: 0,5 à 5 mg/h en IVSE ; effet chronotrope positif et vasoconstricteur dès les faibles doses ;
- **noradrénaline** : 10 à 40 µg/h en IVSE (pas en 1<sup>re</sup> intention).

- L'utilisation des **inhibiteurs des phosphodiésterases** peut être une alternative (en l'absence d'hypotension).

- En l'absence d'évolution favorable sous inotropes positifs, un **ballon de contre-pulsion intra-aortique** peut être nécessaire. Il permet d'améliorer l'oxygénation myocardique et facilite l'éjection ventriculaire.

- En cas de défaillance irréversible, une **assistance ventriculaire gauche** (CEC, cœur artificiel) peut être envisagée chez les patients qui pourraient bénéficier d'une transplantation cardiaque.

### Surveillance d'un choc cardiogénique

- Clinique : monitoring ECG et tensionnel, pression artérielle invasive, température, fréquence respiratoire, diurèse horaire, saturation artérielle en oxygène, régression des signes de choc et d'OAP, poids.
- Biologique : ionogrammes sanguin et urinaire, urée, créatinine, bilan hépatique, hémostase, enzymes cardiaques, gaz du sang, lactates.
- Radiologique : radiographie pulmonaire.
- ECG.
- Écho-Doppler cardiaque.

**ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE DE L'ADULTE (1)**

L'arrêt cardiorespiratoire est une urgence absolue. Le patient est inconscient, ne respire pas (ou respire anormalement : gasps) et il n'y a plus de pouls carotidien.

La priorité est au cœur avec pour objectif une reprise de l'activité électrique cardiaque spontanée.

Le développement de programmes de formations de secouristes auprès du grand public ainsi que la mise en place de défibrillateurs semi-automatiques dans les lieux publics (aéroports, gares, bâtiments publics, grandes entreprises) doivent être encouragés.

Les secours sont appelés immédiatement. Noter l'heure de l'arrêt et celui du début de la réanimation.

**En présence d'un seul secouriste**

La séquence classique ABC (*Airway, Breath, Circulation*) n'est plus d'actualité et a été remplacée par CAB :

- compressions thoraciques (C) ;
- libération des voies aériennes (A) ;
- ventilation bouche à bouche (B).

**En présence de 2 secouristes**

- 1<sup>er</sup> secouriste : compressions thoraciques.
- 2<sup>e</sup> secouriste : défibrillation, libération des voies aériennes, insufflation d'oxygène.

**Gestes élémentaires de survie à assurer par les secouristes****Compressions thoraciques**

Elles doivent s'effectuer juste au-dessous du milieu du sternum, sans pause, amples,

régulières, avec une durée de compression égale à la durée de relâchement.

Les compressions doivent être réalisées à la fréquence de 100/min, avec une dépression sternale de 5 cm et en alternance avec les insufflations.

L'alternance compression/insufflation est de 30 compressions pour 2 insufflations.

**Libération des voies aériennes**

- Recherche et extraction de tout corps étranger intrabuccal (y compris les dents).
- Ouverture de la filière laryngée (lutte contre la chute de la langue et l'hypotonie massétérine).
- Tête en hyperextension en l'absence de traumatisme cervical.
- En cas de matériel disponible, mise en place d'une canule oro-pharyngée (canule de Guédel), ou sonde naso-pharyngée.

**Ventilation/insufflation**

- En l'absence de matériel : bouche-à-bouche (cf. Encadré). À alterner avec les compressions thoraciques (30 compressions/2 insufflations).
- En cas de matériel disponible : masque facial étanche avec insufflateur manuel, au mieux relié à une source d'oxygène. La durée de l'insufflation est d'au moins 1 s ; le volume insufflé doit être suffisant pour soulever le thorax. Pratiquer 2 insufflations en 5 s. À alterner avec les compressions thoraciques (30 compressions/2 insufflations).

## CHOC ÉLECTRIQUE EXTERNE (CEE)

### Préparation

En dehors de l'urgence, le choc électrique externe s'effectue en présence d'un cardiologue et d'un anesthésiste :

- en USIC ;
- patient à jeun ;
- monitoring cardiaque et tensionnel et de la saturation artérielle en oxygène par oxymètre de pouls,
- voie veineuse périphérique de bon calibre ;
- bilan sanguin du jour (ionogramme sanguin, urée, créatinine, TP, TCA) ;
- arrêt des **digitaliques (DIGOXINE)** depuis au moins 3 j.
- sous traitement anticoagulant efficace ;
- vérification de l'absence d'autres contre-indications à la cardioversion.

### Déroulement

- Anesthésie générale brève (**DIPRIVAN**) avec ventilation au masque en oxygène pur.
- Électrodes de taille suffisante appliquées fermement et complètement sur la peau par l'intermédiaire d'un gel conducteur.
- Une électrode est placée en position médiosternale, l'autre en position latérale gauche ou postérieure (pas de différence significative d'efficacité) ; chez la femme on évitera la région mammaire.
- Défibrillateur réglé en position synchrone.
- Opérateurs et assistants éloignés du lit.
- Le premier choc sera effectué à 150 joules dans la fibrillation auriculaire et 100 joules pour un flutter. En cas d'échec du premier choc, on effectuera jusqu'à 2 autres chocs de 300-360 joules, éventuellement en modifiant la position des électrodes.

On vérifiera attentivement en post-choc immédiatement la présence d'un pouls et le rythme obtenu.

### Résultats

Le taux de succès dans la fibrillation auriculaire est de 80 à 90 %. Il est d'autant plus important qu'elle est récente et est amélioré par une imprégnation par la **CORDARONE**.

#### Contre-indications à la cardioversion

- Digitalisation (risque d'arythmie ventriculaire).
- Traitement anticoagulant insuffisant.
- Hypokaliémie.
- Thrombus intra-auriculaire gauche.
- Accident embolique systémique récent.
- État infectieux ou inflammatoire récent ou en poussée.
- Chirurgie cardiotoracique récente.
- Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré et dysfonction sinusale sévère non appareillés.

#### Complications de la cardioversion

- Arythmies de régularisation (extrasystoles et fibrillation ventriculaires).
- Troubles de la repolarisation transitoires (sans signification).
- Altération myocardique (élévation de la troponine).
- Embolies systémiques dites de régularisation.
- Bloc auriculo-ventriculaire.
- Sédation myocardique transitoire avec risque d'œdème aigu pulmonaire.

**ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE DE L'ADULTE (2)****Défibrillation**

- Si un défibrillateur semi-automatique est à portée de main avant l'arrivée d'une équipe médicale, il sera utilisé par les secouristes pour la lecture ECG et la défibrillation.
- Il faudra suivre les instructions données par l'appareil d'après la lecture ECG, notamment savoir s'il y a une indication de choc électrique ou pas.
- Si lecture d'une fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire rapide : choc électrique à l'aide du réglage automatique (mode biphasique ; 1<sup>er</sup> choc à 150 joules puis 200 joules), puis reprendre aussitôt la réanimation cardiorespiratoire.
- Si lecture d'une asystolie : pas d'indication de choc. Injection d'**adrénaline** 1 mg IV (15 µg/kg), puis reprendre aussitôt la réanimation cardiorespiratoire. Action identique en l'absence de défibrillateur.
- Réévaluation toutes les 2 min (nouveau choc ou nouvelle injection d'**adrénaline**).
- À poursuivre jusqu'à perception d'un pouls carotidien avec reprise de l'activité cardiaque spontanée. Dans ce cas, arrêter les compressions thoraciques et pour-

suivre les insufflations d'oxygène jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale.

**Manœuvre de Heimlich**

Elle consiste à exercer une pression brusque et puissante de bas en haut au niveau du creux épigastrique de manière à réaliser une hyperpression intrathoracique et l'expulsion du corps étranger (contre-indiquée chez la femme enceinte).

- Patient conscient : sauveteur placé derrière la victime, pression vigoureuse du poing qui est empoigné par l'autre main.
- Patient inconscient : sauveteur à califourchon sur la victime en décubitus dorsal, pression avec la paume des mains placées l'une sur l'autre.

**Bouche-à-bouche**

- Une main est posée sur le front pour maintenir la tête en hyperextension et pincer les narines.
- L'autre main maintient la bouche ouverte en appuyant sur le menton.
- La bouche du sauveteur grande ouverte est appliquée de façon étanche autour de celle de la victime en utilisant un moyen de protection.
- Insufflations lentes (d'au moins 1 s pour éviter de remplir l'estomac d'air et de provoquer une régurgitation). Faire 2 insufflations en 5 s.

**Compressions thoraciques (massage cardiaque externe)**

- Victime en décubitus dorsal sur un plan dur.
- Sauveteur sur un même plan au niveau des aisselles.
- Bras tendus verticalement au-dessus de la cage thoracique.
- Talon des mains, posées l'une sur l'autre, juste au-dessous du milieu du sternum.
- Dépression du sternum de 5 cm au minimum.
- Fréquence au moins 100/min à alterner avec les insufflations (30 compressions pour 2 insufflations)
- Temps de compression égal au temps de relachement.
- Complications : fracture de côte(s) ou du sternum, hémoragie ou pneumothorax, contusion pulmonaire ou myocarde, tamponnade.

## ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE DE L'ADULTE (3)

### À l'arrivée de l'équipe médicale [1]

- Poursuite de la réanimation cardiopulmonaire médicalisée.
- Pose d'une voie veineuse périphérique.
- Intubation endotrachéale. Elle ne doit pas faire interrompre plus de 30 s la réanimation cardiopulmonaire. La bonne position de la sonde doit être vérifiée systématiquement.
- Le soluté salé isotonique est utilisé comme vecteur des médicaments IV au cours de la réanimation cardiopulmonaire. Une expansion volémique n'est indiquée que lorsque l'arrêt cardiaque est associé à une hypovolémie.
- Il n'y a pas d'indication à l'alcalinisation de principe. Le **bicarbonate de sodium** molaire doit être réservé aux hyperkaliémies et/ou acidoses métaboliques préexistantes, ou en cas d'arrêt secondaire à des drogues à effet stabilisant de membrane.

### Fibrillation et tachycardie ventriculaire

Leur traitement repose sur le **choc électrique externe**. Sa précocité est capitale. Le premier choc est effectué à 150-200 joules biphasique ou énergie équivalente. La première injection d'**adrénaline** (1 mg) doit être réalisée après 2 min de réanimation cardiopulmonaire, immédiatement avant le 2<sup>e</sup> ou le 3<sup>e</sup> choc électrique en l'absence de reprise d'activité circulatoire spontanée.

L'**amiodarone** est recommandée en cas de FV ou de TV rapide, résistantes aux chocs immédiatement avant le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> choc à la dose de 300 mg (voie IV directe diluée dans 20 mL de soluté salé isotonique). Une 2<sup>e</sup> injection de 150 mg doit être réalisée en cas de FV persistante ou récidivante, éventuellement suivie d'une perfusion continue de 900 mg sur 24 h.

Le **sulfate de magnésium** (2 g par voie IV directe) est réservé aux fibrillations ventriculaires résistantes aux chocs dans un contexte d'hypomagnésémie suspectée ou en cas de torsades de pointe.

### Asystolie

- Elle correspond à un tracé ECG plat. Elle peut survenir d'emblée ou faire suite à une bradycardie, une fibrillation ventriculaire ou une dissociation électromécanique. Le **choc électrique externe est inutile**. Son traitement repose sur l'**adrénaline** administrée à la dose de 1 mg tous les 2 cycles de réanimation cardiopulmonaire, soit environ toutes les 4 min. Quand une voie d'abord vasculaire n'est pas immédiatement disponible, l'**adrénaline** peut être injectée au travers de la sonde d'intubation trachéale à la dose de 2 à 3 mg dilués dans 10 mL d'eau pour préparation injectable.
- Si les doses répétées de 1 mg d'**adrénaline** s'avèrent inefficaces en cas d'asystolie réfractaire, une augmentation des doses jusqu'à 5 mg par injection est une alternative possible.

### Dissociation électromécanique

Elle correspond à la persistance de l'activité électrique cardiaque sans efficacité hémodynamique. Son traitement repose également sur l'**adrénaline**. L'**atropine** peut se discuter en cas d'activité électrique sans pouls apparaissant à la suite d'une bradycardie initialement efficace (bolus unique de 3 mg).

### Torsades de pointes

Si la torsade ne s'est pas réduite spontanément ou après 1 à 2 g de **sulfate de magnésium** en IVD : choc électrique externe ou entraînement électrosystolique (correspond le plus souvent à une dégénérescence en fibrillation ventriculaire).



## ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE DE L'ADULTE (4)

### Réanimation spécialisée [1]

- Le syndrome post-arrêt cardiaque est caractérisé par un ensemble de manifestations viscérales (neurologiques, cardiocirculatoires, respiratoires et rénales) qui peuvent conduire à une défaillance multiviscérale et au décès.
- Le maintien de l'homéostasie est essentiel.
- Une hypothermie induite (entre 32 et 34 °C pendant 12 à 24 h) doit être réalisée chez les patients toujours comateux au décours des arrêts cardiaques extra-hospitaliers en rapport avec une fibrillation ventriculaire. Elle peut être discutée dans les autres situations.
- La sédation ne doit pas avoir un caractère systématique (elle est nécessaire en cas d'hypothermie induite).
- Le syndrome coronaire aigu étant la cause la plus fréquente d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, l'indication de coronarographie doit être évoquée précocement en fonction du contexte clinique.

### Critères pronostiques

La constatation au 3<sup>e</sup> j post-arrêt cardiaque de l'absence de réponse motrice à la douleur et/ou une perte du réflexe pupillaire permettent de prédire l'absence de récupération neurologique avec une très bonne valeur prédictive. L'électroencéphalogramme est mal corrélé à l'évolution neurologique.

### Étiologies des arrêts cardiaques

- **Causes cardiaques**
  - Troubles du rythme (insuffisance coronaire +++ ) et de conduction.
  - Incompétence myocardique : infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque.
  - Perturbation de la fonction pompe : tamponnade, pneumothorax compressif.
- **Causes respiratoires**
  - Perturbation des échanges gazeux : pneumopathies graves, noyades, etc.
  - Perturbation de la commande respiratoire : intoxication médicamenteuse, atteinte neurologique.
  - Obstruction des voies aériennes : corps étranger, œdème laryngé.
- **Causes circulatoires**
  - Tous les états de choc.
  - Perturbation de la circulation pulmonaire : embolie pulmonaire massive.

### Facteurs pronostiques

- Âge.
- Pathologie causale (gravité des arrêts survenant sur cardiopathies évoluées et du choc cardiogénique survenant à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde).
- Qualité et précocité de la réanimation.
- Rapidité du rétablissement de la circulation après le début de l'arrêt cardiorespiratoire.
- Réponse à l'**adrénaline**.
- ECG initial : fibrillation ventriculaire (surtout à grandes mailles) de meilleur pronostic que l'asystolie et la dissociation électromécanique.

### Critères d'arrêt de la réanimation

- Absence de reprise d'une activité hémodynamique après 30 min de réanimation.
- L'arrêt de la réanimation est une décision médicale.
- Si une volonté de ne pas être réanimé a été exprimée (et formulée conformément à la réglementation) par le patient de son vivant, celle-ci doit être respectée.

## INSUFFISANCE MITRALE (1)

### Indications thérapeutiques [1]

Elles sont posées au cas par cas lors de réunions collégiales médico-chirurgicales en tenant compte :

- des mécanismes de la valvulopathie ;
- de la fonction ventriculaire gauche ;
- du terrain : lésions d'athérosclérose, état pulmonaire ;
- des souhaits du patient ;
- de la faisabilité du geste chirurgical avec évaluation risque/bénéfice.

### Techniques chirurgicales

#### Chirurgie conservatrice : valvuloplastie mitrale

- Plastie ou reconstruction des valves mitrales ± anneau de Carpentier en cas de dilatation de l'anneau mitral.
- 70 % des IM peuvent en bénéficier.
- Indication principale : IM dégénérative avec tissu valvulaire suffisant et sans calcification importante.
- IM ischémique : un remplacement valvulaire reste le geste le plus fréquent, mais la plastie peut être proposée.
- IM rhumatismale : contre-indication relative.

- **Antivitamines K (AVK)** maintenues 2 à 3 mois après une chirurgie conservatrice.
- **Évolution** : les résultats sont meilleurs avec la valvuloplastie qu'avec le remplacement prothétique.

#### Remplacement valvulaire prothétique


- En cas d'impossibilité ou d'échec d'une chirurgie conservatrice :

- soit prothèse mécanique à ailettes type Saint-Jude avec traitement anticoagulant à vie ;
- soit bioprothèse de Carpentier-Edwards.

Le choix entre bioprothèse et prothèse mécanique dépend :

- de l'âge (bioprothèse si > 80 ans),
- de l'existence d'une fibrillation auriculaire,
- de la possibilité de suivi au long cours,
- des risques du traitement anticoagulant (bioprothèse en cas de contre-indication absolue au traitement anticoagulant au long cours et chez les femmes désireuses de grossesse).

- **Complications postopératoires** (ex. : accidents thromboemboliques) plus fréquentes qu'en chirurgie conservatrice.

**INSUFFISANCE MITRALE (2)****Insuffisance mitrale volumineuse organique****Insuffisance mitrale organique - Arbre décisionnel proposé par l'European Society of Cardiology**

## INSUFFISANCE MITRALE (3)

### Insuffisance mitrale modérée

- Le plus souvent asymptomatique.
- Pas de traitement médical particulier en dehors de la prévention de l'endocardite infectieuse.
- Surveillance annuelle par échocardiographie.

### Traitement médical des complications

Se reporter aux chapitres correspondants.

- Poussées d'insuffisance ventriculaire gauche.
- Troubles du rythme supraventriculaire. Contre-indication des nouveaux anticoagulants oraux dans l'ACFA valvulaire. Indication des **AVK**.
- Complications emboliques.
- Traitement antibiotique prophylactique

de l'endocardite avant tout geste pouvant provoquer une bactériémie.

### Surveillance à long terme des patients porteurs de prothèse valvulaire (biologique ou mécanique)

- Examen clinique, température, ECG.

- TP, INR en cas de prothèse mécanique pour surveiller le traitement anticoagulant par **antivitamine K**. Fréquence : tous les 15 j ou tous les mois selon les patients. INR souhaité pour une prothèse mécanique mitrale : entre 3 et 4,5.

- Échocardiographie Doppler annuelle :
  - mesurer le gradient transprothétique ;
  - évaluer la surface fonctionnelle ;
  - rechercher une fuite péri- ou intra-prothétique dont le mécanisme peut être précisé par une échocardiographie transœsophagienne.

### CONSENSUS

[1] Guidelines on the management of valvular heart disease, ESC, 2011

## RÉTRÉCISSEMENT MITRAL (1)

### Définitions

Il est défini par une surface  $< 2 \text{ cm}^2$ , surface à partir de laquelle des modifications hémodynamiques apparaissent sur les pressions et le débit cardiaque. On parle de rétrécissement mitral serré pour une surface  $< 1,5 \text{ cm}^2$ .

Le RM est presque toujours d'origine rhumatismale. Il est rarement congénital.

### Principales complications

La dyspnée d'effort est le symptôme principal.

Les complications principales sont :

- pulmonaires: œdème, hémoptysie, embolie ;
- rythmiques: ACFA, flutter avec possible thrombose intra-auriculaire gauche.

### Traitement médical

Il permet surtout de prévenir ou de traiter les complications.

- Régime désodé et traitement diurétique en cas de poussée d'insuffisance cardiaque.

- En cas d'ACFA, traitement anticoagulant et ralentissement de la cadence ventriculaire par **digitalique** ou **amiodarone**. À noter que seules les **AVK** ont l'indication de l'ACFA valvulaire à ce jour. Le **dabigatran**, le **rivaroxaban** et l'**apixaban** n'ont pas obtenu l'AMM dans l'ACFA valvulaire jusqu'à présent.

- La cardioversion par **choc électrique externe** peut être envisagée si l'ACFA est récente, en l'absence de dilatation importante de l'oreillette gauche et en l'absence de thrombus dans l'oreillette gauche.

### Indications chirurgicales

Elles sont posées au cas par cas lors de réunions collégiales médico-chirurgicales en tenant compte :

- des mécanismes de la valvulopathie ;
- de la fonction ventriculaire gauche ;
- du terrain : lésions d'athérosclérose, état pulmonaire ;
- des souhaits du patient ;
- de la faisabilité du geste chirurgical avec évaluation bénéfice/risque.

## RÉTRÉCISSEMENT MITRAL (2)

### Traitements chirurgicaux et interventionnels

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de rétrécissement mitral serré symptomatique. Il peut également être proposé chez des patients peu symptomatiques en prévention des complications futures.

#### Commissurotomie mitrale à cœur fermé

- Indiquée dans les sténoses mitrales serrées non calcifiées sans altération importante du tissu valvulaire et sous-valvulaire, sans oreillette gauche dilatée et sans thrombus.
- Résultat anatomique incomplet.
- Entraîne un faible risque vital. Suites opératoires simples.
- Cette technique est principalement utilisée dans les pays en voie de développement ou en cas de RM mal toléré chez la femme enceinte.

#### Commissurotomie mitrale à cœur ouvert

Le geste est plus complet et plus efficace avec une ouverture plus large des 2 commissures. Le geste peut être complété par une annuloplastie mitrale en cas d'incontinence valvulaire et/ou une annuloplastie tricuspidiennne en cas d'insuffisance tricuspidiennne fonctionnelle importante associée. L'intervention est faite sous CEC (circulation extracorporelle).

#### Remplacement valvulaire mitral

- Indiqué en cas de valve mitrale très calcifiée avec remaniement important de l'appareil sous-valvulaire.

– Indiqué également si une insuffisance mitrale s'associe au rétrécissement mitral serré (maladie mitrale).

– Le remplacement chirurgical sous CEC consiste en une résection totale de l'appareil valvulaire puis mise en place d'une **bioprothèse** ou d'une **prothèse mécanique**.

#### Valvuloplastie mitrale percutanée

- Traitement interventionnel dont le principe est une ouverture des symphyses commissurales sous anesthésie locale par cathétérisme veineux fémoral. Le cathétérisme est le plus souvent transseptal pour positionner le ballon de dilatation dans l'orifice mitral. La procédure se fait sous anticoagulation efficace par **héparine**.
- Indiquée de préférence quand la valve mitrale est souple et peu calcifiée, avec un appareil sous-valvulaire peu remanié et sans fuite mitrale importante associée.
- Les suites sont simples.
- Il peut apparaître une resténose progressive dans les 10 à 15 ans.

### Surveillance à long terme des patients porteurs de prothèse valvulaire (biologique ou mécanique)

Idem Insuffisance mitrale.

#### Traitement des complications

- Œdème aigu pulmonaire, embolie pulmonaire, troubles du rythme supraventriculaire, embolie artérielle.
  - Traitement antibiotique prophylactique de l'endocardite avant tout geste pouvant provoquer une bactériémie.
- Se reporter aux chapitres correspondants.

## INSUFFISANCE AORTIQUE

### Indications thérapeutiques

Elles sont posées au cas par cas lors des réunions collégiales médico-chirurgicales en tenant compte :

- des mécanismes de la valvulopathie ;
- de la fonction ventriculaire gauche ;
- du terrain : lésions d'athérosclérose, état pulmonaire ;
- des souhaits du patient ;
- de la faisabilité du geste chirurgical avec évaluation risque/bénéfice.

### Insuffisance aortique (IA) chronique symptomatique

L'intervention chirurgicale s'impose.

### Procédures

Le plus souvent : remplacement valvulaire aortique et protection myocardique par :

- valve mécanique à disque (Bjork) ou à ailettes (Saint-Jude),
- bioprothèse d'origine animale, de Carpentier-Edwards ou péricardique (rarement),
- homogreffe d'origine humaine (réservée aux endocardites).

Le choix du type de prothèse dépend principalement de l'âge.

La procédure peut être complétée par un pontage coronaire (sténoses proximales significatives) ou un remplacement prothétique de l'aorte thoracique ascendante dans le cas d'une maladie annulo-ectasique (intervention de Bentall).

### Résultats

- Mortalité hospitalière de 2 à 5 %.
- Survie de 70 % à 10 ans.

### Surveillance

Les patients porteurs de prothèse valvulaire (biologique ou mécanique) font l'objet d'une surveillance à long terme. Idem Insuffisance mitrale.

À noter qu'en cas de valve mécanique aortique, la fourchette d'INR reflétant un traitement efficace par **AVK** se situe entre 2 et 3.

En cas de remplacement prothétique de l'aorte ascendante, il faut surveiller celle-ci par IRM et échocardiographie Doppler.

### Insuffisance aortique asymptomatique

- Si absence de dilatation du VG et bonne fonction systolique : **surveillance** clinique, recherche de foyers infectieux, ECG, échocardiographie Doppler, éventuellement épreuve d'effort avec mesure de la consommation en O<sub>2</sub> (VO<sub>2</sub>).
- Si dilatation du VG et altération progressive de la fonction systolique : **indication chirurgicale**.

### Insuffisance aortique aiguë

- **Endocardite infectieuse aiguë** : intervention chirurgicale précoce. Cf. chapitre correspondant.
- **Dissection de l'aorte ascendante** : intervention chirurgicale urgente. Cf. chapitre correspondant.

### Traitement médical

#### En cas d'insuffisance ventriculaire gauche

- Cf. chapitre correspondant.
- Intérêt des vasodilatateurs dans l'IA chronique avec dilatation VG.
- Intérêt des  **$\beta$ -bloquants** dans le syndrome de Marfan avec dilatation de l'aorte ascendante.
- Discussion de l'indication à un remplacement valvulaire chirurgical.

#### En cas de troubles du rythme supraventriculaire

Intérêt hémodynamique à un retour en rythme sinusal. Les nouveaux anticoagulants sont contre-indiqués dans l'ACFA valvulaire. Indication des **AVK**.

#### En cas d'hyperexcitabilité ventriculaire

Éviter les **antiarythmiques de classe I** altérant la fonction VG.

#### Traitement antibiotique prophylactique de l'endocardite

- Avant tout geste pouvant provoquer une bactériémie.
- En période périopératoire d'un remplacement valvulaire aortique. Cf. chapitre correspondant.

## RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ (RAC) (1)

### Définitions - Épidémiologie

#### Surfaces aortiques

- RA non serré > 1,5 cm<sup>2</sup>.
- RA moyennement serré entre 1,5 et 1 cm<sup>2</sup>.
- RA serré < 1 cm<sup>2</sup> et/ou 0,5 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (surface valvulaire indexée à la surface corporelle).

#### Fréquence

- Le rétrécissement aortique calcifié est la valvulopathie la plus fréquente (25 % des valvulopathies de l'adulte).
- Il concerne surtout les patients âgés de plus de 70 ans. Le risque de mort subite est faible dans le RAC tant que les patients restent asymptomatiques.

#### Indications thérapeutiques

Le traitement chirurgical constitue le seul traitement curatif du RA serré.

Elles sont posées au cas par cas lors de réunions collégiales médico-chirurgicales en tenant compte :

- de la symptomatologie du patient ;
- de la fonction ventriculaire gauche ;
- du terrain : lésions d'athérosclérose, état pulmonaire ;
- des souhaits du patient ;
- de la faisabilité du geste chirurgical avec évaluation risque/bénéfice.

#### Rétrécissement aortique serré symptomatique

Il doit être opéré même en cas de dysfonction ventriculaire gauche.

### Procédures

Le plus souvent remplacement valvulaire aortique et protection myocardique avec mise en place soit d'une valve mécanique (réservée aux sujets les moins âgés) à disque ou à ailettes, soit d'une bioprothèse (sujets > 80 ans) de Carpentier-Edwards.

Valvuloplastie aortique chirurgicale réservée aux patients jeunes présentant une fusion commissurale congénitale.

#### Résultats

- Mortalité hospitalière en l'absence de dysfonction VG : 3-5 % avant 70 ans mais > 10 % après 75 ans.
- Mortalité plus élevée quand la FEVG est < 40 %.
- 80 % de survie à 5 ans en l'absence de dysfonction VG.

#### Surveillance à long terme des patients porteurs de prothèse valvulaire (biologique ou mécanique)

Idem Insuffisance mitrale.


#### Rétrécissement aortique serré asymptomatique

La principale justification d'une chirurgie en cas de RAC serré asymptomatique est une probabilité élevée d'apparition de symptômes à court terme, exposant alors à un risque accru de mort subite. L'ECG d'effort a une importante valeur de stratification pronostique et peut être effectué en toute sécurité chez un patient asymptomatique. L'indication opératoire doit particulièrement tenir compte de l'estimation du risque opératoire.



## RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ (RAC) (2)

### Prise en charge du RAC serré asymptomatique - Recommandations de l'European Society of Cardiology



## RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ (RAC) (3)

### Rétrécissement aortique serré symptomatique avec contre-indication formelle à la chirurgie

Une implantation de valve aortique par voie percutanée (TAVI) peut être envisagée.

#### Procédure

- Le principe consiste à traiter le rétrécissement aortique et à mettre en place au sein de la valve aortique rétrécie et calcifiée une bioprothèse sertie à l'intérieur d'un stent et venant repousser contre la paroi aortique la valve native pathologique.
- La voie d'abord la plus fréquente (80 % des cas) est la voie artérielle fémorale. Cette voie n'est possible que si l'axe artériel ilio-fémoral est suffisamment large (diamètre > 6 mm), peu tortueux et non ou peu calcifié.
- En cas d'impossibilité, d'autres voies sont possibles : sous-clavière, transapicale, transaortique, ou carotidienne de façon exceptionnelle.
- Une pré-dilatation de l'orifice aortique est systématiquement réalisée avant l'implantation de la valve.

#### Indications

Les indications sont à la fois cliniques et anatomiques et la décision doit se faire au cas par cas par une équipe médico-chirurgicale expérimentée.

##### ► Indication clinique

Rétrécissement aortique serré (surface aortique < 1 cm<sup>2</sup> et/ou < 0,5 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de

surface corporelle) **symptomatique** et présentant une **contre-indication formelle** ou avec un risque opératoire jugé trop élevé par l'équipe médico-chirurgicale.

##### ► Indication anatomique

Un bilan de faisabilité est indispensable et comporte une échographie transthoracique et/ou transœphagienne, un cathétérisme cardiaque (coronarographie + angiographie sus-sigmoïdienne) et un scanner cardiaque et aorto-ilio-fémoral.

#### Contre-indications

- Cliniques : espérance de vie < 1 an liée aux comorbidités ; contre-indication à l'anesthésie.
- Anatomiques : anneau aortique < 18 mm et > 29 mm de diamètre ; bourrelet septal proéminent ; distance trop courte entre les coronaires et l'anneau aortique.

### Traitement médical des symptômes

#### Insuffisance ventriculaire gauche

Utiliser très prudemment les **diurétiques** (hypovolémie), les **dérivés nitrés** (hypotension) et les **digitaliques**.

#### Fibrillation auriculaire

Souvent mal tolérée. Recours habituel à la cardioversion. Contre-indication des nouveaux anticoagulants oraux dans l'ACFA valvulaire. Indication des **AVK**.

#### Traitement antibiotique prophylactique de l'endocardite avant tout geste pouvant provoquer une bactériémie

Se reporter au chapitre correspondant.

**ENDOCARDITES INFECTIEUSES (1)****Traitement préventif [1]**

Le consensus européen a été modifié en 2009. L'endocardite survient dans près de trois quarts des cas sur une cardiopathie préexistante connue ou une prothèse valvulaire. Chez les sujets à risque, le traitement préventif est fondamental.

Il comprend :

- une surveillance régulière (ORL, stomatologique, gynécologique) ;
- une hygiène, notamment bucco-dentaire, rigoureuse ;
- le traitement précoce et adapté de tout foyer infectieux ;
- le port d'une carte de prévention tenant compte d'une éventuelle allergie aux  $\beta$ -lactamines.

Les bactériémies d'origine dentaire, secon-

daire aux activités quotidiennes, sont beaucoup plus fréquentes que celles résultant d'un geste dentaire. Par conséquent, on réserve l'antibioprophylaxie aux patients ayant les cardiopathies dont l'évolution est plus défavorable en cas d'endocardite infectieuse : prothèse valvulaire, cardiopathie congénitale avec traitement palliatif ou une correction imparfaite, antécédent d'endocardite, ou antécédent de valvulopathie après transplantation cardiaque. Les indications sont les manipulations du tissu gingival.

Pour les interventions digestives et urogénitales, l'antibiothérapie est indiquée lorsque le site opératoire est infecté mais pas dans le cadre d'une antibiothérapie préventive.

**Cardiopathies à risque (nécessitant une antibioprophylaxie) : consensus**

- Cardiopathies à haut risque :
  - prothèses valvulaires,
  - cardiopathies congénitales cyanogènes,
  - ATCD d'endocardite infectieuse.
- Autres cardiopathies à risque :
  - valvulopathies : insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement aortique,
  - prolapsus valvulaire mitral avec insuffisance mitrale et/ou épaissement valvulaire,
  - bicuspidie aortique,
  - cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf communication interauriculaire,
  - cardiomyopathie obstructive.

La communication interauriculaire isolée, le prolapsus valvulaire mitral non compliqué, les pontages coronariens et les

pacemakers ne justifient d'aucune mesure préventive.

**Gestes nécessitant une antibioprophylaxie : conférence de consensus**

- Bucco-dentaires : toute intervention, à l'exception des soins de carie superficielle et des préparations prothétiques supragingivales sans saignement.
- ORL : amygdalectomie, adénoïdectomie, intubation naso-trachéale.
- Gastro-intestinaux : dilatations œsophagiennes, traitements endo-œsophagiens par laser, sclérose de varices œsophagiennes, colonoscopie et rectosigmoïdoscopie en cas de lésion cancéreuse, interventions digestives portant sur un appareil potentiellement infecté (cholécystectomie, colectomie), cholangiographie rétrograde\*, colonoscopie\* et rectosigmoïdoscopie\*.
- Urogénitaux : manœuvres instrumentales urétroréprolocalisielles, interventions et biopsies portant sur la prostate et les voies urinaires et lithotripsies\*.
- Cutanés : gestes cutanés portant sur un tissu infecté.

\*Uniquement chez les sujets à haut risque.

**ENDOCARDITES INFECTIEUSES (2)**

La mise en place d'un cathéter veineux périphérique, et *a fortiori* central, doit être faite sous stricte asepsie mais ne nécessite pas d'antibioprophylaxie. De même l'échographie transœsophagienne ne justifie pas de prophylaxie.

Les dispositifs de contraception intra-utérins sont déconseillés chez les sujets à risque.

**Situations à haut risque justifiant un traitement prophylactique maximal (double antibiothérapie synergique et bactéricide) :**

- cardiopathie à haut risque,
- intervention gastro-intestinale ou urologique,
- gestes multiples,
- patient hospitalisé,
- anesthésie générale.

**Critères diagnostiques d'une endocardite (Dukes University)**

2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs.

**Critères majeurs**

- Hémocultures positives :
  - 2 hémocultures positives à streptocoque non groupable, *Streptococcus bovis*, bactérie du groupe HACCEK, ou en l'absence de foyer identifié, à staphylocoque ou entérocoque,
  - hémocultures positives persistantes au même germe.
- Atteinte de l'endocarde : végétation, abcès, nouvelle fuite périprothétique.

**Critères mineurs**

- Cardiopathie prédisposante
- Toxicomanie
- Fièvre > 38 °C
- Phénomènes vasculaires (embolie artérielle, anévrysme mycotique, infarctus pulmonaire, hémorragie conjonctivale, hémorragie cérébrale)
- Phénomène immunologique (glomérulonéphrite, faux panaris d'Osler, tâches de Roth)
- Critères microbiologiques mineurs : hémoculture positive sans entrer dans la définition du critère majeur, sérologie positive pour un organisme responsable d'endocardites
- Critères échographiques mineurs : échographie compatible sans entrer dans la définition du critère majeur

## ENDOCARDITES INFECTIEUSES (3)

### Antibioprophylaxie

GESTES	PRODUITS	POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures sous anesthésie locale		
– Absence d'allergie aux bêta-lactamines	<b>Amoxicilline</b>	3 g <i>per os</i> en prise unique dans l'heure précédant le geste (enfant : 75 mg/kg) (2 g dans les recommandations européennes)
– Allergie aux bêtalactamines	<b>Clindamycine</b>	600 mg <i>per os</i> en prise unique dans l'heure précédant le geste (enfant : 15 mg/kg)
	ou <b>pristinamycine</b>	1 g <i>per os</i> en prise unique dans l'heure précédant le geste (enfant : 25 mg/kg)
Soins dentaires et actes portant sur les voies aériennes supérieures sous anesthésie générale		
– Absence d'allergie aux bêta-lactamines	<b>Amoxicilline</b>	2 g (enfant : 50 mg/kg) en IV sur 30 min dans l'heure précédant le geste puis 1 g (enfant : 25 mg/kg) <i>per os</i> 6 h plus tard
– Allergie aux bêtalactamines	<b>Vancomycine</b>	1 g en IV sur 60 min dans l'heure précédant le geste (enfant : 20 mg/kg, maximum 1 g) (pas de 2 <sup>e</sup> dose)
	ou <b>teicoplanine</b>	400 mg en IV directe dans l'heure précédant le geste (enfant de plus de 1 mois : 10 mg/kg) (pas de 2 <sup>e</sup> dose)
Interventions urologiques ou digestives (la prophylaxie n'est plus recommandées dans les nouvelles recommandations européennes)		
– Absence d'allergie aux bêta-lactamines	<b>Amoxicilline</b>	2 g (enfant : 50 mg/kg) en IV sur 30 min dans l'heure précédant le geste puis 1 g (enfant : 25 mg/kg) <i>per os</i> 6 h plus tard
	puis <b>gentamycine</b>	1,5 mg/kg (enfant : 2 mg/kg, maximum 80 mg) sur 30 min dans l'heure précédant le geste (pas de 2 <sup>e</sup> dose)
– Allergie aux bêtalactamines	<b>Vancomycine</b>	1 g en IV sur 60 min dans l'heure précédant le geste (enfant : 20 mg/kg, maximum 1 g) (pas de 2 <sup>e</sup> dose)
	ou <b>teicoplanine</b>	400 mg en IV directe dans l'heure précédant le geste (enfant de plus de 1 mois : 10 mg/kg) (pas de 2 <sup>e</sup> dose)
	puis <b>gentamycine</b>	1,5 mg/kg (enfant : 2 mg/kg, maximum 80 mg) sur 30 min dans l'heure précédant le geste (pas de 2 <sup>e</sup> dose)

## ENDOCARDITES INFECTIEUSES (4)

### Traitement médical curatif

#### Mesures générales

- Hospitalisation en cardiologie.
- Pose d'une voie veineuse périphérique.
- Recherche et traitement d'une porte d'entrée.
- Traitement d'une insuffisance cardiaque : pour réduire la charge sodée liée à la **pénicilline**, on utilisera un mélange à 50 % de sel de sodium et de sel de potassium. Notons qu'un gramme de **fosfomycine** apporte 14,4 mmol de sodium.

Le **traitement anticoagulant** est contre-indiqué, sauf en cas de pathologie thromboembolique veineuse, d'embolies artérielles non septiques, de prothèses valvulaires mécaniques et de troubles du rythme emboligènes.

L'**héparine IV** doit alors être utilisée. Elle sera arrêtée devant tout accident neurologique.

#### Antibiothérapie

Il s'agit d'une bithérapie bactéricide synergique administrée par voie IV à forte posologie, initialement probabiliste, secondairement adaptée à l'antibiogramme, précoce et prolongée. Elle doit être fractionnée de manière à maintenir en permanence des concentrations sériques plusieurs fois supérieures à la CMI.

#### Germes les plus fréquents en fonction de la porte d'entrée

- Bucco-dentaire et voies aériennes supérieures : streptocoques *viridans*.
- Urinaire : entérocoques et bacilles Gram négatif.
- Gynécologique et digestive : entérocoques, streptocoque *bovis* et bacilles Gram négatif.
- Cutanée : staphylocoque *aureus* et *epidermidis*, streptocoque.

Dans les endocardites à streptocoques, un relais par voie orale est possible (même posologie que par voie IV en fractionnant les doses). Les **céphalosporines** ne doivent pas être utilisées en cas d'entérocoques. Dans les infections nosocomiales à sta-

phylocoques, la **vancomycine** sera instituée en 1<sup>re</sup> intention du fait du risque élevé de résistance à la méticilline.

#### Les différents antistaphylococciques

- **Vancomycine** : 30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h.
- **Rifampicine** : 20 à 30 mg/kg en 2 perf. de 2 h.
- **Acide fusidique** : 500 mg x 3 perf. de 30 min.
- **Péfloxacin** : 400 mg x 2 perf. de 30 min.
- **Fosfomycine** : 150 à 200 mg/kg en 2 à 3 perf. de 30 min.

#### Critères d'efficacité du traitement médical

- Apyrexie stable et prolongée.
- Absence de complications cardiovasculaires.
- Négatification des hémocultures.
- Régression du syndrome inflammatoire.
- Stérilisation de la porte d'entrée.
- Absence de rechute à l'arrêt du traitement.
- L'échographie transœsophagienne permet de vérifier l'absence d'évolutivité des lésions.

#### Surveillance biologique du traitement médical

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine.
- Hémocultures répétées.
- Paramètres inflammatoires (numération formule sanguine, VS, CRP).
- Dosages plasmatiques des antibiotiques (**aminosides, vancomycine, téicoplanine**).
- Pouvoir bactéricide du sérum au pic et à la vallée des antibiotiques dans les situations difficiles.

#### Causes de persistance de fièvre sous traitement antibiotique

- Persistance d'un foyer microbien.
- Germe résistant à l'antibiothérapie utilisée.
- Antibiothérapie inadaptée.
- Posologie insuffisante.
- Dilution insuffisante de l'antibiotique (**pénicilline G**).
- Allergie aux antibiotiques.
- Complication thromboembolique veineuse.
- Veinite et infection du cathéter de perfusion.

## ENDOCARDITES INFECTIEUSES (5)

### Traitement chirurgical

#### Indications du traitement chirurgical

- Hémodynamiques
  - Insuffisance cardiaque grave non contrôlée par le traitement médical.
  - Fuite valvulaire importante ou se majorant.
  - Végétation obstructive.
- Infectieuses
  - Récidive précoce.
  - Entérocoque multirésistant et endocardite fongique.
  - Endocardite sur prothèse (le plus souvent).
  - Végétation augmentant de taille sous traitement efficace.
  - Échec de l'antibiothérapie.
- Lésionnelles
  - Abscès septal ou de l'anneau.
  - Accidents emboliques itératifs

Une infection non encore contrôlée par les antibiotiques n'est pas une contre-indication à une intervention quand celle-ci est nécessaire par ailleurs.

Après mise en place d'une prothèse, en cas de culture de valve native positive ou de dégâts importants, l'antibiothérapie sera poursuivie 6 sem. après l'intervention (quelle que soit la durée du traitement préopératoire), d'autant plus qu'il s'agit d'une infection à staphylocoque.

### Formes particulières

#### Endocardite tricuspidienne des toxicomanes

Le staphylocoque doré est le plus souvent en cause. En l'absence de complications, le traitement médical est le plus souvent suffisant. Un traitement par **pénicilline M (oxacilline BRISTOPEN)** et **aminosides** pendant 15 j a fait la preuve de son efficacité. L'**oxacilline IV** garde son indication ; l'alternative est la **céphalosporine de 2<sup>e</sup> génération** : **céfamandole** 75-100 mg/kg/j ; néanmoins, du fait de la fréquence des résistances à la méticilline sur ce terrain,

on peut utiliser la **vancomycine** en 1<sup>re</sup> intention.

#### Endocardites sur prothèse

##### ► Endocardite sur prothèse valvulaire précoce

Elle survient dans les 2 mois suivant l'intervention. Les germes en cause sont essentiellement les staphylocoques dorés et coagulase négatifs. Son pronostic est redoutable (mortalité de 60 %) et nécessite le plus souvent une réintervention en urgence.

##### ► Endocardite sur prothèse valvulaire tardive

Survenant plus de 2 mois après l'intervention, elle se caractérise par un taux élevé de complications (notamment d'abcès de l'anneau). La mortalité est de 40 %. Les germes retrouvés sont les streptocoques et les staphylocoques. La chirurgie est le plus souvent nécessaire.

#### Endocardites aiguës

Le tableau infectieux est au premier plan. Les complications sont fréquentes, notamment l'insuffisance cardiaque du fait de l'importance des dégâts valvulaires. La mortalité est élevée et une intervention chirurgicale est le plus souvent nécessaire.

#### Bilan d'une endocardite

- Bilan infectieux et inflammatoire : hémocultures, examen cytotabériologique des urines, bilan ORL et stomatologique et éventuellement digestif ou gynécologique, numération formule sanguine, VS, CRP, fibrinogène.
- Bilan rénal : urée, créatinine, ionogramme sanguin et urinaire, protéinurie des 24 h.
- Bilan immunologique : ASLO, complément, complexe immuns circulants.
- Échographie cardiaque transthoracique et transœsophagienne.
- ECG, radiographie pulmonaire.
- Gaz du sang, bilan hépatique, enzymes cardiaques.
- Fond d'œil.

## ENDOCARDITES INFECTIEUSES (6)

STREPTOCOQUES (non groupables et bovis)			
Sensibles à la pénicilline (CMI $\leq 0,1$ mg/l)	Amoxicilline + Gentamycine	100 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 3 mg/kg/j en 2 à 3 perf. de 30 min	Valves natives : – Forme non compliquée : bithérapie pendant 15 j – Forme compliquée : bithérapie pendant 15 j puis 2 à 4 sem. d'amoxicilline – Contre-indication aux aminosides : amoxicilline pendant 4 sem. Valves prothétiques : bithérapie pendant 15 j puis amoxicilline pendant 4 sem.
Sensibilité intermédiaire (CMI entre 0,1 et 0,5 mg/ml)	Amoxicilline + Gentamycine	150 à 200 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 3 mg/kg/j en 2 à 3 perf. de 30 min	Bithérapie pendant 15 j puis 2 à 4 sem. d'amoxicilline (valves natives) ou 4 sem. d'amoxicilline (valves prothétiques)
Streptocoques avec CMI $> 0,5$ mg/ml ou déficients	Amoxicilline + Gentamycine	200 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 3 mg/kg/j en 2 à 3 perf. de 30 min	Valves natives et prothétiques : bithérapie pendant 4 sem. puis amoxicilline pendant 2 sem.
Streptocoques tolérants (CMI/CMB $\geq 32$ )	Amoxicilline + Gentamycine	cf. supra	Bithérapie pendant 15 j puis amoxicilline pendant 2 sem. (valves natives) ou 4 sem. (valves prothétiques)
Allergie aux bêta-lactamines	Vancomycine $\pm$ Gentamycine*	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h 3 mg/kg/j en 2 à 3 perf. de 30 min	Valves natives : 4 sem. en cas de streptocoque avec CMI $\leq 0,5$ mg/mL 6 sem. dans les autres cas Valves prothétiques : 6 sem. *Gentamycine pendant 10 à 15 j en cas de streptocoque non groupable avec CMI $> 0,5$ mg/mL ou de streptocoque bovis
ENTÉROCOQUES			
Sensible à la pénicilline et aux aminosides	Amoxicilline + Gentamycine	150 à 200 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 3 mg/kg/j en 2 à 3 perf. de 30 min	Valves natives : bithérapie pendant 4 à 6 sem. Valves prothétiques : bithérapie pendant au moins 6 sem.
Résistance intrinsèque à la pénicilline	Vancomycine + Gentamycine	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h cf. supra	
Entérocoque sécréteur de bêta-lactamase	Amoxicilline + Sulbactam + Gentamycine	150 à 200 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 50 mg/kg/j (sans dépasser 4 g/j) en 3 perf. de 15 min cf. supra	
Entérocoque à haut niveau de résistance aux aminosides	Vancomycine	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h	Traitement pendant au moins 8 sem.
Allergie aux bêta-lactamines	Vancomycine + Gentamycine	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h cf. supra	Bithérapie pendant 4 à 6 sem. (valves natives) ou 6 sem. (valves prothétiques)



## ENDOCARDITES INFECTIEUSES (7)

STAPHYLOCOQUES <i>AUREUS</i> (valves natives)			
Staphylocoque sensible à la méticilline : absence d'allergie aux bêta-lactamines	Oxacilline + Gentamycine	100 à 150 mg/kg/j en 6 perf. de 30 min sans dépasser 12 g/j 3 mg/kg/j en 3 perf. de 30 min	Traitement de 4 à 6 sem. (gentamycine limitée à 5 j)
Staphylocoque sensible à la méticilline : allergie aux bêta-lactamines	Céfamandole ou Vancomycine + Gentamycine	50 à 100 mg/kg/j 30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h <i>cf. supra</i>	La gentamycine sera remplacée par un autre antistaphylococcique en cas de résistance
Staphylocoque résistant à la méticilline	Vancomycine + Gentamycine	<i>cf. supra</i>	
STAPHYLOCOQUES (valves prothétiques)			
Staphylocoque <i>aureus</i> sensible à la méticilline absence d'allergie aux bêta-lactamines	Oxacilline + Gentamycine	100 à 150 mg/kg/j en 6 perf. de 30 min sans dépasser 12 g/j 3 mg/kg/j en 3 perf. de 30 min	Traitement de 6 sem. (gentamycine limitée à 15 j)
Staphylocoque <i>aureus</i> sensible à la méticilline : allergie aux bêta-lactamines	Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h 3 mg/kg/j en 3 perf. de 30 min 20 à 30 mg/kg en 2 perf. de 2 h	* ou autre antistaphylococcique selon l'antibiogramme
Staphylocoque <i>aureus</i> résistant à la méticilline	Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine*	<i>cf. supra</i>	
Staphylocoque coagulase négatif	Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine	<i>cf. supra</i>	
ENDOCARDITES À HÉMOULTURES NÉGATIVES			
Valves natives	Amoxicilline + Gentamycine	100 mg/kg/j en 4 à 6 perf. de 30 min 3 mg/kg/j en 1 perf. de 30 min	Association pendant 4 à 6 sem.
Sur prothèse de moins d'un an*	Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine	30 mg/kg/j en 2 à 4 perf. de 2 h 3 mg/kg/j en 3 perf. de 30 min 20 à 30 mg/kg en 2 perf. de 2 h	* traitement chirurgical en cas d'échec
Sur prothèse de plus d'un an	Vancomycine + Gentamycine ± Cefotaxime**	<i>cf. supra</i>  100 à 200 mg/kg/j en 6 perf. de 30 min	** en cas d'échec au traitement de première intention

### CONSENSUS

[1] Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis, ESC, 2009

## PÉRICARDITES

### Péricardites aiguës bénignes [1]

#### Étiologies des péricardites aiguës

- Péricardite aiguë bénigne (virale ou idiopathique).
  - Tuberculose.
  - Bactérienne purulente, fongique ou parasitaire.
  - Néoplasique et postradique.
  - Rhumatismale (rhumatisme articulaire aigu).
  - Inflammatoire (lupus, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse, etc.).
  - Endocrinienne (hypothyroïdie)
  - Infarctus du myocarde (à la phase aiguë témoignant de l'étendue de la nécrose et syndrome de Dressler).
  - Post-péricardotomie.
  - Traumatique.
- L'hospitalisation est nécessaire uniquement en cas de mauvaise tolérance clinique et hémodynamique.
  - Repos au lit.
  - Traitement anti-inflammatoire : **anti-inflammatoire non stéroïdien, acide acétylsalicylique (ASPÉGIC 1000)** : 1 g x 3/j pendant 5 à 8 j puis décroissance progressive sur 15 j ; dans les formes hyperalgiques : **ASPÉGIC 1 g en IVD**.
  - Protection gastrique : **oméprazole (MOPRAL)** : 1 gél./j.
  - Traitement antalgique associé pendant les 48 premières heures : **analgésique périphérique, paracétamol (DOLIPRANE)**, 2 gél. à 500 mg x 3/j.
  - La **colchicine** a démontré son efficacité pour diminuer le risque de récurrence et le risque de passage à la chronicité.
  - La corticothérapie est contre-indiquée (favorise les rechutes).
  - Complications : rechute (20 %), récurrence, tamponnade, constriction (très rarement).

### Péricardites chroniques constrictives [1]

Le péricarde devient une coque rigide inextensible, ce qui provoque une gêne au remplissage ventriculaire : c'est le tableau d'adiastolie.

C'est une maladie rare mais grave ; cependant, du fait d'un diagnostic actuellement plus précoce, le tableau clinique peut être celui d'une forme subaiguë avec épanchement sans caractère restrictif.

L'écho-Doppler cardiaque et le cathétérisme cardiaque sont les examens de référence. Ils peuvent être complétés par un scanner et/ou une IRM cardiaque.

Le seul traitement est chirurgical et consiste en une **péricardectomie chirurgicale** :

- exérèse des feuillets pariétal et viscéral ;
- voie d'abord : thoracotomie antérieure gauche ;
- circulation extracorporelle en attente (ou d'emblée pour certains) ;
- surveillance tensionnelle par cathétérisme radial et hémodynamique par sonde de Swan-Ganz.

Différentes **complications** peuvent survenir : défaillance cardiaque congestive, arythmies, infections et hémopéricarde.

La mortalité opératoire est inférieure à 5 % ; 80 à 90 % des patients deviennent asymptomatiques mais la guérison peut prendre plusieurs mois.

#### Étiologies principales des péricardites chroniques constrictives

- Idiopathiques : 40 à 50 %.
- Post-chirurgie cardiaque : 20 %.
- Post-radiothérapies.
- Néoplasiques.
- Virales.
- Tuberculose (la péricardite chronique constrictive tuberculeuse n'existe quasiment plus dans les pays occidentaux)

## CONSENSUS

[1] Maladies péricardiques, ESC, 2004

## TAMPONNADE (1)

Elle est due à un épanchement péricardique compressif du fait de son abondance et/ou de sa rapidité de constitution (sac péricardique non distensible).

C'est une **urgence médico-chirurgicale**.

Le diagnostic repose sur l'écho-Doppler cardiaque.

### Mesures générales

- Hospitalisation en USIC à proximité d'un service de chirurgie thoracique.
- Pose de 2 voies veineuses de bon calibre.
- Monitoring cardiaque et tensionnel et de la saturation artérielle en oxygène par oxymètre de pouls.
- Dispositif de recueil des urines.
- Repos au lit strict (mobilisation interdite).
- Oxygénothérapie par voie nasale 3 L/min.
- Arrêt d'un éventuel traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire et correction des troubles de l'hémostase.
- **Diurétiques** et **vasodilatateurs** sont contre-indiqués.
- Remplissage par solutés macromoléculaires

en cas de situation hémodynamique instable.

### Drainage chirurgical


- En urgence, par voie sous-xiphoidienne.
- Évacuation de l'épanchement, biopsies péricardiques et lavage avec si nécessaire instillation locale d'antibiotiques.
- Liquide péricardique adressé aux différents laboratoires (biochimie, cytotactériologie, anatomopathologie et laboratoires spécialisés en fonction du contexte).
- Drain laissé en place 24/48 h.

### Ponction péricardique

- En cas d'extrême urgence.
- Par voie sous-xiphoidienne guidée par l'échographie (risque de plaie cardiaque).
- Sous asepsie locale, aiguille de gros calibre dirigée vers la tête de la clavicule droite selon un angle de 30° avec le plan abdominal.
- L'aspiration de 100 à 200 mL suffit généralement à lever la compression et à améliorer l'hémodynamique permettant le transfert en milieu chirurgical.

**TAMPONNADE (2)**


Échocardiographie bidimensionnelle d'un épanchement péricardique abondant (EP), circonférentiel, responsable d'une tamponnade.



## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (1)

### Traitement initial de la thrombose veineuse profonde (TVP) [1]

#### Arbre décisionnel pour la prise en charge et le traitement d'une TVP



## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (1)

## ■ Daltéparine sodique

<b>FRAGMINE</b>					
Prévention risque modéré : 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention puis 1 inj./j Prévention risque élevé : 2 500 UI en 1 SC 2 h avant l'intervention à renouveler 12 h plus tard puis 5 000 UI/j en 1 inj. SC les jours suivants Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 5 000 UI en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse > 4h : 30-35 UI/kg en 1 IVasculaire au début puis 10-15 UI/kg/h ensuite Traitement curatif des TVP : 200 UI/kg en 1 SC pendant 1 mois puis 150 UI/kg en 1 SC de M2 à M6. Posologie maximale : 18 000 UI/j	2 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	6,42	I	65 %	3,21
	6 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	18,15	I	65 %	3,02
	10 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	12,28	I	65 %	6,14
	6 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	35,21	I	65 %	5,87
	10 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 7 500 UI anti-Xa/0,75 mL	13,98	I	65 %	6,99
	10 ser. 7 500 UI anti-Xa/0,75 mL	63,31	I	65 %	6,33
	2 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	17,60	I	65 %	8,80
	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	79,23	I	65 %	7,92
	5 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,4 mL	41,77	I	65 %	8,35
	5 ser. 12 500 UI anti-Xa/0,5 mL	53,48	I	65 %	10,70
	5 ser. 15 000 UI anti-Xa/0,6 mL	63,31	I	65 %	12,66
	5 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,72 mL	75,12	I	65 %	15,02

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (2)

### Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

Elles ont toutes l'AMM dans le traitement initial d'une TVP. Elles sont au moins aussi efficaces que l'HNF, sont plus simples à utiliser et nécessitent moins de surveillance.

Étant donné la faible incidence de thrombopénie induite par l'héparine sous HBPM, la surveillance plaquettaire n'est plus indispensable, en l'absence de risque particulier. Certains continuent néanmoins la surveillance plaquettaire avant traitement, puis 2 fois/sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois puis 1 fois/sem. jusqu'à l'arrêt du traitement.

- Ex. : **FRAGMINE** ou **LOVENOX** : 100 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 2 inj./j (8 h-20 h).
- Ex. : **FRAXODI** : 171 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.
- Ex. : **INNOHEP** : 175 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.

Une surveillance particulière s'impose pour les poids < 40 kg et > 100 kg et en cas d'insuffisance rénale sévère. Il n'est pas recommandé de surveiller l'activité anti-Xa en dehors de ces situations.

La durée du traitement ne doit pas excéder 10 j, période de chevauchement HBPM/AVK incluse.

Le traitement par AVK est débuté simultanément avec l'HBPM, dès le 1<sup>er</sup> j. Le traitement par HBPM sera arrêté quand l'INR sera stable et > 2 (généralement en 2 à 4 j). Cf. Modalités de prescription des AVK. Ex. : **PRÉVISCAN** : 1 cp./j à adapter aux contrôles des TP et INR.

L'objectif thérapeutique est un INR entre 2 et 3.

### Fondaparinux

Il est aussi efficace que les HBPM. Il ne nécessite pas la surveillance des plaquettes. Le risque hémorragique est accru chez les patients > 75 ans, de faible poids corporel ou insuffisants rénaux. Il est contre-indiqué en cas de clairance de la créatinine < 30 mL/min.

**ARIXTRA** : 1 inj. 7,5 mg en SC/j pour les poids entre 50 et 100 kg. 1 inj. 5 mg en SC/j pour un poids < 50 kg. 1 inj. 10 mg en SC/j pour un poids > 100 kg.

### Rivaroxaban

C'est un inhibiteur direct du facteur Xa actif par voie orale. Il représente une alternative au traitement par AVK et ne dispose pas de surveillance biologique ni pour évaluer son activité anticoagulante ni pour évaluer le risque hémorragique. Il n'existe pas non plus d'antidote spécifique en cas d'hémorragie. Il doit donc être prescrit dans le respect très strict de ses indications et contre-indications avec une vigilance particulière dans le suivi des patients.

**XARELTO** : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 20 mg/j en 1 prise. En cas de clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 15 mg/j en 1 prise. Contre-indication si clairance de la créatinine < 30 mL/min.

### Autres traitements de la TVP à la phase initiale

L'HNF sera utilisée uniquement en cas de contre-indication aux HBPM et au fondaparinux (insuffisance rénale sévère).

Le danaparoiide et l'argatroban peuvent être utilisés en cas d'antécédent documenté de TIH (cf. chapitre correspondant).

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (2)

## ■ Nadroparine calcique

<b>FRAXIPARINE</b>					
Prévention risque modéré : 0,3 mL/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention puis 1 inj./j Prévention risque élevé : 38 UI/kg en 1 SC 12 h avant l'intervention et 12 h après, puis 1 fois/j jusqu'à J3 inclus, puis 57 UI/kg/j à partir de J4 postopératoire Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 65 UI/kg en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse Traitement curatif des TVP : 85 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 0,1 mL/10 kg de poids/12 h (= 2 inj./j) Traitement curatif de l'angor instable et IDM sans onde Q : 86 UI anti-Xa/kg/12 h en SC (= 2 inj./j) associée à l' <b>aspirine</b>	10 ser. 1 900 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	7,74	I	65 %	3,87
	6 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	22,12	I	65 %	3,69
	10 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	HOP	I		
	10 ser. 3 800 UI anti-Xa/0,4 mL	HOP	I		
	2 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	14,91	I	65 %	7,45
	6 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	42,22	I	65 %	7,04
	10 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	HOP	I		
	2 ser. 7 600 UI anti-Xa/0,8 mL	18,78	I	65 %	9,39
	10 ser. 7 600 UI anti-Xa/0,8 mL	84,42	I	65 %	8,44
	2 ser. 9 500 UI anti-Xa/1 mL	18,78	I	65 %	9,39
	10 ser. 9 500 UI anti-Xa/1 mL	HOP	I		
<b>FRAXODI</b>					
Traitement curatif des TVP : 171 UI anti-Xa/kg en une seule inj./j, soit 0,1 mL/10 kg de poids x 1/j	2 ser. 11 400 UI anti-Xa/0,6 mL	27,89	I	65 %	13,94
	10 ser. 11 400 UI anti-Xa/0,6 mL	124,39	I	65 %	12,44
	2 ser. 15 200 UI anti-Xa/0,8 mL	34,76	I	65 %	17,38
	10 ser. 15 200 UI anti-Xa/0,8 mL	156,54	I	65 %	15,65
	2 ser. 19 000 UI anti-Xa/1 mL	34,76	I	65 %	17,38
	10 ser. 19 000 UI anti-Xa/1 mL	156,54	I	65 %	15,65

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.



## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (3)

### Surveillance

- Clinique : recherche de signes d'extension de la TVP (signes inflammatoires locaux, mensurations comparatives), recherche de signes d'embolie pulmonaire, surveillance pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire.
- Biologique : créatininémie en début de traitement, TP et INR quand le relais **héparine - AVK** débute, taux de plaquettes en cas de risque de TIH ou dans un contexte postopératoire.

### Mesures associées

- La mobilisation précoce est vivement recommandée.
- **Contention veineuse élastique adaptée** (chaussettes, mi-bas, bas ou collants de contention forte classe III) à porter avant la mobilisation. Elle doit être **mise quotidiennement avant le lever du patient (éducation +++)**. L'efficacité passe par un haut niveau de pression à la cheville. La contention fait partie intégrante du traitement de la TVP et réduit de façon importante le risque de syndrome post-thrombotique.
- Recherche étiologique : une thrombophilie doit être recherchée chez tout sujet < 45 ans présentant une TVP documentée, en particulier en cas de récurrence, de survenue spontanée, de siège inhabituel ou associé à des fausses couches à répétition. Penser également à une néoplasie ou une maladie de système.

### Autres traitements de la TVP aiguë

L'insertion d'un filtre cave et la thrombectomie veineuse restent exceptionnelles et sont réservées à des cas très particuliers.

### Traitement au long cours après une TVP [1]

- La contention veineuse est à maintenir pour une durée minimale de 2 ans (ou plus si symptômes persistants).

- Il repose sur le traitement anticoagulant oral (**antivitamine K** ou **rivaroxaban**). Le rapport bénéfice/risque de ces traitements doit être réévalué à intervalles réguliers.
- La durée du traitement est de mieux en mieux précisée dans les recommandations :
  - TVP avec facteur déclenchant majeur transitoire (ex : chirurgie orthopédique, immobilisation prolongée  $\geq 3$  j) : 3 mois ;
  - TVP idiopathique (absence de facteur déclenchant, absence de facteur de risque) :  $\geq 6$  mois ;
  - TVP avec facteur de risque majeur persistant (cancer, syndrome des antiphospholipides) :  $\geq 6$  mois à prolonger tant que le facteur persiste. Seules les **HBPM** sont préconisées et en particulier la **daltéparine** au long cours. Ex : **daltéparine (FRAGMINE)** : 200 UI/kg/j pendant 1 mois puis 150 UI/kg/j jusqu'au 6<sup>e</sup> mois.
- Il existe des facteurs de modulation pouvant allonger ou réduire la durée du traitement :
  - facteurs principaux pour allonger la durée du traitement : thrombophilie majeure, récurrence de TVP proximale ou embolie pulmonaire, filtre cave permanent ;
  - facteurs principaux pour réduire la durée du traitement : risque hémorragique élevé, sujet âgé, alcoolisme, prise concomitante d'**antiagrégants plaquettaires**, observance médiocre.
- Il n'y a pas d'intérêt à la répétition des examens de type écho-Doppler veineux et/ou dosage des D-dimères en cours de traitement et en fin de traitement. Il n'y a pas lieu de tenir compte des résultats de ces examens pour décider de la durée optimale de traitement.

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (3)

## ■ Énoxaparine sodique

LOVENOX					
1 mg = 0,01 mL = 100 UI anti-Xa	2 ser. 2 000 UI anti-Xa/0,2 mL	7,37	I	65 %	3,69
Prévention risque modéré : 20 mg/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention	6 ser. 2 000 UI anti-Xa/0,2 mL	21,05	I	65 %	3,51
Prévention risque élevé : 40 mg/j en 1 SC 1 <sup>re</sup> inj. 12 h avant l'intervention	2 ser. 4 000 UI anti-Xa/0,4 mL	14,22	I	65 %	7,11
Puis 1 inj. SC/j.	6 ser. 4 000 UI anti-Xa/0,4 mL	40,33	I	65 %	6,72
Hémodialyse rénale : 0,5 à 1 mg/kg en 1 inj. dans la ligne artérielle en début de dialyse	2 ser. 6 000 UI anti-Xa/0,6 mL	16,31	I	65 %	8,16
Traitement curatif des TVP, EP, angor instable (en association avec <b>aspirine</b> ) : 1 mg/kg/12 h soit 100 UI anti-Xa/kg/j en SC (= 2 inj./j)	10 ser. 6 000 UI anti-Xa/0,6 mL	73,50	I	65 %	7,35
IDM en phase aiguë : 3 000 UI en IV bolus puis 100 UI/kg x 2/j en SC à commencer 15 min après le bolus ou 30 UI/kg en IV bolus 1 seule fois (voir en fonction des thérapeutiques associées)	2 ser. 8 000 UI anti-Xa/0,8 mL	18,18	I	65 %	9,09
	10 ser. 8 000 UI anti-Xa/0,8 mL	81,78	I	65 %	8,18
	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	100,73	I	65 %	10,07
	1 ser. 30 000 UI anti-Xa/3 mL	HOP	I		

## ■ Tinzaparine sodique

INNOHEP					
Traitement préventif	2 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,25 mL	6,23	I	65 %	3,12
1 mL = 10 000 UI anti-Xa	6 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,25 mL	17,53	I	65 %	2,92
Prévention risque modéré : 2 500 UI anti-Xa/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention	2 ser. 3 500 UI anti-Xa/0,35 mL	9,04	I	65 %	4,52
Prévention risque élevé : 4 500 UI anti-Xa/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 12 h avant l'intervention puis 3 500-4 500 UI/j pendant 10 jours	6 ser. 3 500 UI anti-Xa/0,35 mL	26,04	I	65 %	4,34
Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 2 500- 4 500 UI en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse	2 ser. 4 500 UI anti-Xa/0,45 mL	11,87	I	65 %	5,94
Traitement curatif	6 ser. 4 500 UI anti-Xa/0,45 mL	34,17	I	65 %	5,70
1 mL = 20 000 UI anti-Xa	2 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,5 mL	23,13	I	65 %	11,57
Traitement curatif des TVP, EP : 175 UI anti-Xa/kg/24 h en 1 inj. SC/j	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,5 mL	103,54	I	65 %	10,35
	2 ser. 14 000 UI anti-Xa/0,7 mL	28,60	I	65 %	14,30
	10 ser. 14 000 UI anti-Xa/0,7 mL	127,63	I	65 %	12,76
	2 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,9 mL	35,62	I	65 %	17,81
	10 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,9 mL	160,87	I	65 %	16,09

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (4)

### Cas particulier de la femme enceinte

- Pour les femmes qui nécessitent un traitement AVK au long cours, il est suggéré de réaliser fréquemment des tests de grossesse, et de remplacer l'**AVK** par une **HNF** ou une **HBPM** en cas de grossesse.
- Pour les femmes enceintes qui présentent une maladie thromboembolique veineuse aiguë, il est recommandé un traitement par **HBPM** ou par **HNF** IV pendant au moins 5 j suivi d'une dose ajustée d'**HBPM** ou d'**HNF** pendant le reste de la grossesse. Les **anticoagulants** doivent être administrés pendant au moins 6 sem. après l'accouchement. Il est cependant recommandé d'arrêter l'**HNF** ou l'**HBPM** 24 h avant le déclenchement programmé du travail.
- À noter que la demi-vie des **HBPM** est plus courte pendant la grossesse ; c'est pourquoi il est préférable de faire 2 inj. par jour au lieu d'une, au moins à la phase initiale du traitement.

### Cas particulier de la thrombose veineuse superficielle (TVS)

Cf. Insuffisance veineuse - Varices.

### TVP et voyage

Une station assise prolongée > 6 h est un facteur de risque de TVP et d'embolie pulmonaire. Dans ce cas, les patients ayant un antécédent de TVP ou d'embolie pulmonaire doivent être traités par **HBPM** et porter une contention veineuse.

### Traitement préventif de la TVP

#### Méthodes physiques

- Lever précoce en postopératoire et *post-partum*.
- Mobilisation des membres inférieurs en cas d'alitement ou en cas de voyage prolongé.
- Contention veineuse élastique adaptée à mettre en place avant le lever.

#### Méthodes pharmacologiques

Le traitement préventif dépend du risque individuel de maladie thromboembolique et du risque lié à la chirurgie.

Le traitement préventif doit être poursuivi jusqu'à reprise d'une déambulation active.

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (4) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Les **HBPM** sont le résultat du fractionnement des chaînes polysaccharidiques de l'héparine naturelle. Elles sont caractérisées par une activité anti-Xa élevée et une faible activité anti-IIa ou antithrombinique. Elles n'allongent pas le temps de saignement ni le TCA.

#### Avantages par rapport à l'héparine standard :

- moindre risque hémorragique,
- moindre fréquence des thrombopénies,
- demi-vie environ 2 fois plus longue,
- surveillance biologique limitée.

### INDICATIONS

Traitement prophylactique de la maladie veineuse thromboembolique en médecine et en chirurgie, à risque modéré et à risque élevé (toutes sauf **nadroparine** et **tinzaparine traitement curatif**).

Traitement curatif des thromboses veineuses profondes constituées (toutes sauf **tinzaparine traitement préventif**).

Prévention de la coagulation dans le circuit extracorporel au cours de l'hémodialyse (**énoxaparine**, **tinzaparine traitement préventif**, **nadroparine**, **daltéparine**).

Traitement curatif de l'embolie pulmonaire non compliquée (**énoxaparine**, **tinzaparine traitement curatif**).

Traitement de l'angor instable et de l'infarctus du myocarde sans onde Q à la phase aiguë en association avec l'aspirine (**daltéparine**, **nadroparine**, **énoxaparine**).

### CONTRE-INDICATIONS

Idem **héparines standards non fractionnées**.  
Administration par voie intramusculaire.  
Insuffisance rénale sévère (clairance inférieure à 30 mL/min) en cas d'utilisation à doses curatives.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas administrer par voie IM.  
Prudence en cas de rachianesthésie ou d'anesthésie péridurale, d'insuffisance hépatique ou rénale, d'antécédents ulcéreux, de maladies vasculaires de la chorioretine.

#### Surveillance de l'activité anti-Xa

- *Traitement préventif* : surveillance inutile.
- *Traitement curatif* : surveillance utile uniquement en cas de risque de surdosage : insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 60 mL/min), poids

extrême (maigreur, obésité), hémorragie inexpliquée. Évaluation de l'activité anti-Xa par une prise de sang réalisée 4 h après la 3<sup>e</sup> inj. en cas de traitement avec 2 inj. par jour ou 4 h après la 2<sup>e</sup> inj. en cas de traitement avec une seule injection par jour et à répéter seulement si besoin (activité anti-Xa souhaitée = 0,5 à 1 UI/mL). Pour **INNOHEP** et **FRAXODI**, l'activité anti-Xa doit être entre 0,8 et 1,5 UI/mL.

Remarque : En cas d'hémodialyse, ajuster les doses si l'activité anti-Xa est < 0,4 ou > 1,2.

#### Durée du traitement :

- Angor instable et IDM sans onde Q : 6 j jusqu'à stabilisation clinique.

- Traitement curatif des TVP, EP : ne doit pas excéder 10 j, délai d'équilibration du traitement AVK inclus.

- Traitement préventif : à maintenir jusqu'à déambulation active et complète du patient, associé à la contention élastique des membres inférieurs. Le plus souvent, ne doit pas excéder 10 j.

#### Traitement thrombolytique associé

Si un traitement thrombolytique s'avère nécessaire, il est recommandé d'interrompre le traitement par **HBPM**, étant donné l'absence de données cliniques sur l'administration conjointe.

#### Surveillance de la numération plaquettaire

Dans tous les cas (traitement préventif ou curatif ou hémodialyse) : à pratiquer avant traitement puis 2 fois/sem.

**Grossesse** : absence d'AMM mais aucun effet tératogène démontré chez les patientes enceintes ayant reçu des **HBPM**.

**Allaitement** : pas de contre-indication.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Manifestations hémorragiques rares (2 à 4 %).  
Risque de thrombopénie mais moindre qu'avec l'**héparine standard** ; la prévention repose sur l'interrogatoire avant la prescription, sur la surveillance régulière de la numération plaquettaire et sur l'arrêt du traitement idéalement avant le 10<sup>e</sup> jour.

Petits hématomes au point d'injection.

Rarement : nécrose cutanée au point d'injection, manifestations allergiques cutanées ou générales.

Risque d'ostéoporose non exclu en cas de traitement prolongé.

Élévation transitoire des transaminases, rares cas d'hyperkaliémie réversible, rares cas d'hyperéosinophilie réversible.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Idem **héparines standards non fractionnées**.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (5)

### ► *Risque thromboembolique en chirurgie*

#### • **Risque thrombotique faible**

– Chirurgie non compliquée type lithiase biliaire. Toute chirurgie comportant une immobilisation < 7 j, durée < 30 min, âge du patient < 40 ans et absence de facteur de risque associé.

#### – **Méthodes pharmacologiques inutiles.**

#### – **Méthodes physiques à préconiser.**

#### • **Risque thrombotique modéré**

– Chirurgie viscérale sauf la chirurgie colorectale et la lithiase biliaire.

– Toute chirurgie comportant une immobilisation < 7 j, durée > 30 min, âge du patient > 40 ans et facteur de risque autre que obésité, cancer, hypercoagulabilité.

#### – **HBPM à faible posologie et méthodes physiques.**

Ex. : **LOVENOX** 20 mg/j en 1 inj. SC.

#### • **Risque thrombotique élevé**

– Chirurgie lourde des membres inférieurs, orthopédique et traumatologique, chirurgie colorectale, chirurgie viscérale (lithiase biliaire exceptée).

– Toute chirurgie comportant une immobilisation > 7 j, durée > 30 min, âge du patient > 60 ans et facteurs de risque associant obésité et/ou cancer et/ou hypercoagulabilité et/ou autres facteurs de risque cumulés.

#### – **HBPM à forte posologie et méthodes physiques. Ex. : **LOVENOX** 40 mg/j en 1 inj. SC.**

– Les **nouveaux anticoagulants oraux** peuvent également être proposés en respectant leur indication : prévention de la

maladie veineuse thromboembolique après chirurgie programmée de prothèse totale de hanche ou de genou. Ex. : **PRA-DAXA** 220 mg/j à savoir 2 cp. 110 mg en une seule prise (150 mg/j à savoir 2 cp. 75 mg en une seule prise en cas de situation à risque). Ex. : **XARELTO** 1 cp. à 10 mg/j (non recommandé si clairance de la créatinine < 30 mL/min). Ex. : **ELIQUIS** 1 cp à 2,5 mg x 2/j) (à utiliser avec prudence si clairance de la créatinine entre 15 et 30 mL/min).

### ► *Risque thromboembolique en médecine*

#### • **Risque thrombotique faible**

– Immobilisation sans autre facteur de risque, âge > 65 ans et obésité.

#### – **Méthodes pharmacologiques inutiles.**

#### – **Méthodes physiques à préconiser.**

#### • **Risque thrombotique modéré**

– Antécédents de maladie thromboembolique veineuse.

– Cancer, syndrome néphrotique, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, obésité et immobilisation.

#### – **HBPM à faible posologie et méthodes physiques.**

Ex. : **LOVENOX** 20 mg/j en 1 inj. SC.

#### • **Risque thrombotique élevé**

– Antécédents de maladie thromboembolique veineuse associés à d'autres facteurs de risque.

– Plus de 3 facteurs de risque.

– Traumatisme médullaire avec paralysie.

#### – **HBPM à forte posologie et méthodes physiques.**

Ex. : **LOVENOX** 40 mg/j en 1 inj. SC.


### CONSENSUS

[1] Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine - Recommandations de bonne pratique, *Afssaps*, 2009

## EMBOLIE PULMONAIRE (1)

### Traitement initial d'une embolie pulmonaire

#### Arbre décisionnel pour la prise en charge et le traitement d'une embolie pulmonaire [1]



## HÉPARINES STANDARDS NON FRACTIONNÉES (1)

## ■ Héparine standard par voie intraveineuse

<b>HÉPARINE CHOAY</b>					
Traitement curatif des thromboses veineuses ou artérielles : à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA : 20 UI/kg/j en perfusion IV continue à la seringue électrique Parfois bolus initial de 50 UI/kg en IVD Traitement préventif des accidents thromboemboliques artériels en cas de circulation extracorporelle ou extrarénale : à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA	1 fl. 25 000 UI/5 mL	4,31	I	65 %	4,31
	10 fl. 25 000 UI/5 mL	HOP	I		
	20 amp. 5 000 UI/mL	HOP	I		

## ■ Héparine standard par voie sous-cutanée

<b>CALCIPARINE</b>					
Traitement curatif (TVP, EP, IDM, angor instable) à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA : 500 UI/kg/24 h en 2 ou 3 inj. SC/j Traitement préventif en cas d'intervention chirurgicale : 5 000 UI en une inj. SC 2 h avant l'intervention puis 5 000 UI toutes les 12 h pdt au moins 10 j après l'intervention Traitement préventif de la thromboembolie : 5 000 UI x 2/j (risque modéré) ou x 3/j (risque élevé) Surveillance plaquettes utile et surveillance TCA inutile	2 ser. prér. 5 000 UI pour 0,2 mL	3,42	I	65 %	1,71
	10 ser. prér. 5 000 UI pour 0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. prér. 7 500 UI pour 0,3 mL	3,71	I	65 %	1,86
	10 ser. prér. 7 500 UI pour 0,3 mL	HOP	I		
	2 amp. 12 500 UI pour 0,5 mL + ser.	4,71	I	65 %	2,36
	10 amp. 12 500 UI pour 0,5 mL + ser.	HOP	I		
	2 amp. 20 000 UI pour 0,8 mL + ser.	6,20	I	65 %	3,10
	10 amp. 20 000 UI pour 0,8 mL + ser.	HOP	I		
	2 amp. 25 000 UI pour 1 mL + ser.	6,58	I	65 %	3,29
	10 amp. 25 000 UI pour 1 mL + ser.	HOP	I		

**EMBOLIE PULMONAIRE (2)****Probabilité diagnostique forte d'une embolie pulmonaire (EP)**

- Hospitalisation urgente qui peut être courte. Une prise en charge ambulatoire peut être proposée pour un patient à faible risque dans un environnement familial propice.
- Repos au lit.
- Voie veineuse périphérique de bon calibre.
- Oxygène par sonde nasale : 5 à 10 L/min à adapter en fonction de l'état clinique et des gaz du sang artériel.
- **Antalgiques** si besoin.
- Traitement anticoagulant : **HBPM** ou **fondaparinux** ou **HNF**. Si le diagnostic se confirme en imagerie, instaurer un traitement par **AVK** en relais.

**Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)**

Seules l'énoxaparine et la tinzaparine ont l'AMM dans le traitement d'une EP sans signe de gravité.

**LOVENOX** 100 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 2 inj./j.

**INNOHEP** 175 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.

Cf. TVP.

**Fondaparinux**

**ARIXTRA** : 1 inj. 7,5 mg en SC/j pour les poids entre 50 et 100 kg. 1 inj. 5 mg en SC/j pour un poids < 50 kg. Une inj. 10 mg en SC/j pour un poids > 100 kg.

Cf. TVP.

**Héparine standard non fractionnée (HNF)**

– Elle peut être utilisée par voie sous-cutanée ou en perfusion IV continue avec une dose initiale de 50 UI/kg en IVD puis 20 UI/kg/h. Une mesure du TCA doit être faite 4 à 6 h après le début du traitement et après chaque changement de dose pour avoir un TCA entre 1,5 et 3 fois le témoin.

– En cas d'insuffisance rénale sévère, l'**HNF** IV sera préférée à l'**HBPM**.

– En raison du risque de TIH, le taux de plaquettes doit être vérifié avant traitement puis 2 fois/sem pendant le 1<sup>er</sup> mois de traitement puis 1 fois/sem tant que dure le traitement.

**Antivitamines K (AVK)**

Il est recommandé d'initier le traitement **AVK** dès confirmation du diagnostic d'EP, en relais du traitement anticoagulant initial. Cela peut se faire dès le 1<sup>er</sup> jour. Le traitement héparinique sera arrêté quand l'INR sera stable et > 2. Cf. Modalités de prescription des AVK. L'objectif thérapeutique est d'avoir un INR entre 2 et 3.

Ex. : **PRÉVISCAN** : 1 cp./j à adapter aux contrôles des TP et INR.

**Rivaroxaban**

C'est un **inhibiteur direct du facteur Xa** actif par voie orale. Il représente une alternative au traitement par **AVK** et ne nécessite pas de surveillance biologique ni pour évaluer son activité anticoagulante ni pour évaluer le risque hémorragique. Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'hémorragie. Il doit donc être prescrit dans le respect très strict de ses indications et contre-indications avec une vigilance particulière dans le suivi des patients.

**XARELTO** : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 20 mg/j en 1 prise. Si clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 15 mg/j en 1 prise. Contre-indication si clairance de la créatinine < 30 mL/min.

• Mobilisation autorisée dès qu'une hypo-coagulation stable est obtenue, et en l'absence d'embolie sévère.

• Port d'une contention élastique forte classe 3, à mettre en place avant chaque lever du patient en cas de thrombose veineuse profonde associée à l'EP. Contention à maintenir pendant 2 ans minimum.



## HÉPARINES STANDARDS NON FRACTIONNÉES (2) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Polysaccharide sulfaté naturel extrait de l'intestin de porc. La fixation de l'héparine sur l'antithrombine augmente fortement l'activation naturelle de l'inhibiteur vis-à-vis de la thrombine, du facteur Xa et de tous les facteurs activés de la coagulation. Il en résulte un effet anticoagulant puissant qui dépend de la concentration de **héparine**, de la concentration de l'antithrombine et de celles des facteurs de coagulation.

### INDICATIONS

Traitement curatif de la maladie veineuse thromboembolique déclarée (thrombose veineuse, embolie pulmonaire).

Phase aiguë de l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q, de l'angor instable.

Traitement curatif des embolies artérielles extracérébrales.

Traitement curatif de certains cas de coagulopathie.

Prévention des accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène, de thérapeutique endovasculaire et de chirurgie vasculaire artérielle (voie intraveineuse).

Héparinisation des circuits de perfusion dans la circulation extracorporelle et dans l'épuration extrarénale.

Indication particulière à l'héparine standard sous-cutanée : prévention des accidents thromboemboliques veineux en milieu chirurgical ou chez des patients alités présentant une affection médicale aiguë (indication réservée à l'insuffisance rénale sévère : clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min, comme alternative aux **HBPM**).

### CONTRE-INDICATIONS

Antécédent de thrombopénie grave de type II (Cf. Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)) et/ou hypersensibilité vraie à l'**héparine** (très rare).

Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase, à l'exception des CIVD non liées à l'**héparine**.

Lésion organique susceptible de saigner (ex. : ulcère digestif récent).

Endocardite infectieuse aiguë en dehors de celles survenant sur valve mécanique.

Période postopératoire après chirurgie du cerveau et de la moelle épinière.

Accident vasculaire cérébral hémorragique.

Dissection aortique, péricardite liquidienne.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pratiquer TCA, NFS, plaquettes avant traitement.

Dès que le traitement est mis en route, la surveillance biologique est quotidienne.

On peut utiliser en fonction des cas :

- le temps de céphaline activé (TCA) qui doit se situer entre 1,5 et 3 fois le témoin ;
- l'héparinémie qui doit se situer entre 0,2 et 0,6 UI/mL. À préférer en réanimation et en cas de syndrome inflammatoire important.

En cas de perfusion IV continue : 1<sup>er</sup> contrôle biologique à effectuer 6 h après le début de la perfusion et 4 à 6 h après chaque modification posologique, et à n'importe quel moment 1 fois/j.

Le prélèvement est réalisé dans une veine périphérique à distance des cathéters de perfusion, et rapidement acheminé au laboratoire.

En cas d'injections SC, 1<sup>er</sup> contrôle biologique à effectuer exactement entre les 2 premières injections et autre prélèvement après tout changement de dose.

Les injections SC se font dans l'abdomen ou à la face antérieure des cuisses, au mieux en décubitus ; l'aiguille doit être perpendiculaire au pli cutané formé par l'opérateur et maintenu pendant toute l'injection.

La numération plaquettaire doit être contrôlée 2 fois par semaine pendant 21 j.

Le relais de l'héparine par les **anticoagulants oraux (AVK)** doit se faire dès que possible, de façon à ce que la durée totale de l'héparinothérapie n'excède pas 7 à 10 j. Cf. Modalités de prescription des AVK.

Éviter toute effraction vasculaire hormis les injections IV et SC strictes.

Utiliser avec prudence en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, d'HTA sévère et chez les sujets âgés.

**Grossesse** : l'héparine ne traverse pas la barrière placentaire et peut donc être utilisée prudemment pendant toute la grossesse. Surveiller les risques hémorragiques utéro-placentaires. Traitement à arrêter si possible avant une anesthésie péridurale.

**Allaitement** : il n'est pas contre-indiqué (pas de passage dans le lait maternel).

## EMBOLIE PULMONAIRE (3)

### Surveillance efficacité - tolérance

- Clinique : pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, oxymètre de pouls, cyanose, auscultation cardiopulmonaire, examen des membres inférieurs.
- Biologique : ECG, radio thoracique, échocardiographie Doppler éventuelle (évaluation des pressions pulmonaires, recherche de thrombus de l'oreillette droite).

### Autres traitements de l'embolie pulmonaire

- La thrombolyse IV est réservée aux patients hémodynamiquement instables. C'est le traitement de première intention dans l'EP massive avec risque vital imminent.

**Altéplase** 50 mg 1 bolus en IVD. L'**urokinase** et la **streptokinase** peuvent aussi être utilisées en l'absence d'**altéplase**.

- L'embolectomie chirurgicale ou l'interruption de la veine cave inférieure par un filtre cave restent exceptionnelles et sont réservées à des cas très particuliers.

### Traitement au long cours après embolie pulmonaire

Il repose sur le traitement anticoagulant oral (**AVK** ou **rivaroxaban**). Le rapport bénéfice/risque de ces traitements doit être réévalué à intervalles réguliers.

La durée du traitement est de mieux en mieux précisée dans les recommandations :

- EP avec facteur déclenchant majeur transitoire (ex : chirurgie orthopédique, immobilisation prolongée  $\geq 3$  j) : 3 mois ;
- EP idiopathique (absence de facteur déclenchant, absence de facteur de risque) :  $\geq 6$  mois ;

- EP avec facteur de risque majeur persistant (cancer, syndrome des antiphospholipides) :  $\geq 6$  mois à prolonger tant que le facteur persiste. Seules les **HBPM** sont préconisées et en particulier la **daltéparine** au long cours. Ex : **daltéparine (FRAGMINE)** : 200 UI/kg/j pendant 1 mois puis 150 UI/kg/j jusqu'au 6<sup>e</sup> mois.

Il existe des facteurs de modulation pouvant allonger ou réduire la durée du traitement (cf. TVP).

### Conduite à tenir à distance

- Recherche étiologique : une thrombophilie doit être recherchée chez tout sujet  $< 45$  ans présentant une EP documentée, en particulier en cas de récurrence, de survenue spontanée, de siège inhabituel ou associé à des fausses couches à répétition. Penser également à une néoplasie ou une maladie de système.
- Sous **AVK**, contrôle régulier de l'INR/15 j voire tous les mois.
- Surveillance clinique en consultation à 1, 3 mois puis tous les 3 mois.
- Angioscanner si nécessaire.
- Radio thoracique, échocardiographie Doppler si nécessaire.

### Traitement préventif de l'embolie pulmonaire

#### ► Méthodes physiques

- Lever précoce en postopératoire et *post-partum*.

- Mobilisation des membres inférieurs en cas d'alitement ou en cas de voyage prolongé.

- Contention veineuse élastique adaptée à mettre en place avant le lever.

#### ► Méthodes pharmacologiques

- Risque thrombotique modéré : **HBPM** à faible posologie (cf. TVP).

- Risque thrombotique élevé : **HBPM** à forte posologie, NACO (cf. TVP).

## CONSENSUS

- [1] Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine - Recommandations de bonne pratique, *Afssaps*, 2009


## ANTICOAGULANTS : ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES (1)

### Cibles des anticoagulants sur la cascade de la coagulation

• Les **antivitamines K**, anticoagulants actifs par voie orale qui inhibent la synthèse hépatique des formes actives des facteurs de la coagulation II, VII, IX, X ainsi

que la synthèse des protéines C et S en entrant en compétition avec la vitamine K.

• Les autres anticoagulants ont leur cible d'action précisée directement dans le schéma ci-dessous.



### Quel que soit le traitement anticoagulant

- Détermination en urgence du groupe sanguin, Rhésus, agglutinines irrégulières.
- Dosage de l'hémoglobine et de l'hématocrite pour évaluer l'importance de la déglobulisation.
- Rechercher des facteurs favorisants : surdosage thérapeutique, interaction médicamenteuse, affection intercurrente.

## ANTIVITAMINES K (4) – PHARMACOLOGIE (2)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison du délai d'action, les **antivitamines K** ne constituent pas un traitement d'attaque. Modalités de prescription des **AVK** (bilan préalable, introduction du traitement, adaptation de la posologie et surveillance) : cf. Tableau.

La posologie sera adaptée et la surveillance accrue :

- en cas d'insuffisance hépatique,
- en cas d'insuffisance rénale,
- en cas d'hypoprotidémie,
- chez le sujet âgé,
- au cours de tout événement pathologique intercurrent.

En cas d'intervention chirurgicale ou d'extraction dentaire, la modification du traitement anticoagulant sera examinée au cas par cas auprès d'un avis spécialisé :

- chirurgie programmée : arrêter l'**AVK** 4 j avant l'intervention et relais par **héparine de bas poids moléculaire** à doses curatives ;
  - chirurgie en urgence : utiliser **PPSB** (effet immédiat) et **vitamine K** (action retardée mais prolongée) pour ramener INR < 2.
- L'arrêt d'un traitement par **AVK** doit être progressif.

Contre-indication de toute injection et/ou ponction par voie intramusculaire ou intra-articulaire.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Manifestations hémorragiques de gravité variable qui peuvent être un signe de surdosage ou révéler une lésion organique. Fréquence : 2 à 4 % quand INR entre 2 et 3, et 10 à 15 % quand INR entre 3 et 4,5.

Propres aux **dérivés coumariniques** : troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) ; éruptions cutanées allergiques (urticair, prurit) réversibles à l'arrêt du traitement. Propres aux **dérivés de l'indanedione** : éruptions cutanées, fièvre, arthralgies, leucopénie réversibles à l'arrêt du traitement ; manifestations immunoallergiques avec insuffisance rénale aiguë et/ou hépatique ou médullaire imposant l'arrêt du traitement ; exceptionnellement hépatite cytolytique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **aspirine** à forte dose, **miconazole**, **phénylbutazone**, millepertuis.

Associations déconseillées : **aspirine** aux doses antalgiques ou antipyrétiques (entre 500 mg et 3 g/j) et aux doses antiagrégantes (de 50 à 375 mg/j), **AINS**, **fluorouracile**.

Ces associations entraînent une augmentation du risque hémorragique.

Associations faisant l'objet de précautions d'emploi :

*Potentialisation des effets des AVK (augmentation du risque hémorragique) :*

- augmentation de la résorption digestive : ralentisseur du transit ;
- déplacement des **AVK** des sites de fixation protéique : **antibiotiques sulfamides, sulfamides hypoglycémisants, acide tiénique, clofibrate, fénofibrate, phénytoïne, miconazole** ;
- diminution du catabolisme des **AVK** : **disulfirame, chloramphénicol, tolbutamide, allopurinol, miconazole, métronidazole, cimétidine** ;
- diminution de l'élimination rénale : **probenécide** ;
- diminution de synthèse des facteurs vitamine K-dépendants : **quinidine, quinine, paracétamol, amiodarone** ;
- diminution de synthèse de vitamine K : **cyclines, antibiotiques sulfamides** ;
- augmentation du catabolisme de la vitamine K : **hormones thyroïdiennes**.

*Diminution des effets des AVK :*

- diminution de la résorption digestive : **anti-acides, pansements digestifs, colestyramine, charbon activé, laxatifs** ;
- augmentation du catabolisme par inducteurs enzymatiques : **rifampicine, barbituriques, méprobamate, phénytoïne, carbamazépine, griséofulvine, alcoolisme chronique** ;
- augmentation de synthèse des facteurs vitamines K dépendants : **vitamine K, œstrogènes**.

### INTERACTIONS

Aliments riches en **vitamine K** : choux, brocolis, céréales, choucroute, carottes, crudités, abats : ces aliments ne sont pas interdits mais il faut éviter les changements d'alimentation brusques.

**ANTICOAGULANTS : ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES (2)****Hémorragie sous HNF**

Confirmer l'hypocoagulabilité en dosant le TCA.

**Hémorragie mineure**

- Si surdosage biologique important (ratio TCA > 4) : arrêter temporairement la perfusion d'**héparine** pendant 1 h puis reprendre le traitement à dose moindre.
- Si surdosage biologique modéré : réduire la dose.

**Hémorragie majeure**

- Arrêt de l'**héparine**.
- Hospitalisation en urgence et surveillance en réanimation.

• Correction de l'hypocoagulabilité en utilisant l'antidote spécifique de l'**héparine** : **sulfate de protamine** : 100 UAH (unités antihéparine) en injection IV lente neutralisent environ 100 UI d'**héparine standard**. Le risque rare mais grave et imprévisible de cette neutralisation est une HTAP sévère avec bronchoconstriction.

- Traiter une anémie : transfusion de culots globulaires si besoin.

**Hémorragie sous héparine de bas poids moléculaire**

- Confirmer l'hypocoagulabilité en dosant l'activité anti-Xa.
- Le **sulfate de protamine** neutralise complètement l'activité anti-IIa mais incomplètement l'activité anti-Xa.
- 100 UAH en injection IV lente neutralisent 100 UI anti-Xa de **FRAXIPARINE** ou de **FRAGMINE** ou de **LOVENOX** avec toutefois une efficacité moins bonne que pour l'**héparine standard**.

- Traiter une anémie : transfusion de culots globulaires si besoin.

**Hémorragie sous traitement antivitamine K (AVK) oral**

Confirmer l'hypocoagulabilité en dosant le TP et l'INR.

**Hémorragie mineure**

- Si surdosage biologique important (TP < 10 % - INR > 5) : arrêt des **AVK**, puis reprendre le traitement à dose moindre.
- Si surdosage biologique modéré : réduire la dose.

**Hémorragie majeure**

- Arrêt des **AVK**.
- Hospitalisation en urgence et surveillance en milieu de réanimation.

• Correction de l'hypocoagulabilité avec **vitamine K1** : 5 à 10 mg en perfusion IV continue de 1 h, en association avec un CCP, quel que soit l'INR de départ.

- CCP (concentré de complexes prothrombiniques) : 0,5 à 1 mL/kg de poids en injection IV lente pour obtenir un TP > 50 %.
- Traiter une anémie : transfusion de culots globulaires si besoin.

**Hémorragie sous bivalirudine**

En cas de surdosage, le traitement par la **bivalirudine** doit être immédiatement arrêté et le patient doit être étroitement surveillé afin de détecter tout signe de saignement.

En cas de saignement majeur, le traitement par **bivalirudine** doit être arrêté immédiatement. Il n'existe pas d'antidote connu ; cependant, la **bivalirudine** est hémodialysable.

## HÉMOSTATIQUES GÉNÉRAUX EN CARDIOLOGIE (1) – ANTIDOTES DES TRAITEMENTS THROMBOLYTIQUES

### ■ Acide tranexamique

<b>EXACYL</b>					
Surdosage en thrombolytique : 2 à 4 g/24 h à répartir en 2 à 3 administrations/j Forme injectable à administrer en IV lente	20 cp. 500 mg	3,71	I	65 %	0,19
	5 amp. inj. 500 mg/5 mL	9,08	I	65 %	1,82
	5 amp. inj. 1 g/10 mL	2,93	I	65 %	0,59
<b>SPOTOF</b>					
Idem <b>EXACYL</b>	5 amp. buv. 1 g/10 mL	2,93	I	30 %	0,59
	20 cp. 500 mg	3,71	I	30 %	0,19

#### PROPRIÉTÉS

Action antifibrinolytique par inhibition de la plasmine.

#### INDICATIONS

En cardiologie : traitement d'urgence des hémorragies majeures liées à un surdosage en **thrombolytique** (cf. chapitre correspondant).

#### CONTRE-INDICATIONS

Manifestations thromboemboliques, états fibrinolytiques réactionnels à une CIVD, insuffisance rénale grave, hématurie macroscopique.

**Grossesse et allaitement** : utilisation déconseillée.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale.

Injectons IV à pratiquer très lentement. Ne pas utiliser la voie IM.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement vertiges, nausées, vomissements, lipothymies, éruption cutanée allergique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Urokinase, noradrénaline, benzylpénicillines, tétracyclines, dipyridamole, diazépam.**

**ANTICOAGULANTS : ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES (3)****Hémorragie sous fondaparinux**

Des doses supérieures à celles recommandées peuvent conduire à une augmentation du risque de saignement.

Il n'existe pas d'antidote connu au **fondaparinux**.

En cas de surdosage et d'hémorragie : arrêt du traitement, rechercher l'origine du saignement, traitement adapté (hémostasie chirurgicale, transfusion, plasmaphérèse).

**Hémorragie sous les nouveaux anticoagulants oraux (NACO) ou anticoagulants oraux directs (AOD) : dabigatran, rivaroxaban, apixaban**

Il n'existe aucun antidote spécifique ni aucune recommandation consensuelle pour l'instant.

Les TCA, TP, INR et facteurs de coagulation ne sont pas interprétables.

Le temps de thrombine est interprétable avec le **dabigatran** mais il n'y a pas de corrélation avec le taux plasmatique.

L'activité anti-Xa est interprétable avec le **rivaroxaban** et l'**apixaban** mais il n'y a pas de corrélation avec le taux plasmatique.

En cas d'hémorragie majeure ou menaçant le risque vital :

- arrêt du traitement ;
- discussion multidisciplinaire avec un spécialiste en hémostasie (dosage spécifique, interprétation) ;
- utilisation possible de **concentrés de complexes prothrombiniques (KANOKAD, OCTAPLEX, FEIBA)** et de **facteur VIIa humain recombinant (NOVOSEVEN)** ;
- épuration extrarénale du **dabigatran** à discuter.

## DIGITALIQUES - INTOXICATION

### Traitement préventif

- Respect des contre-indications des **digitaliques**.
- Tenir compte des interactions médicamenteuses et des facteurs majorant la toxicité des **digitaliques**.
- Éducation : connaissance des signes de surdosage et surveillance biologique régulière (ionogramme sanguin et taux sériques si besoin).

### Traitement curatif

#### Mesures générales

- Hospitalisation en urgence en USIC.
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Voie veineuse périphérique de bon calibre : G5 % 500 mL/24 h.
- Dispositif de recueil des urines.
- Défibrillateur à proximité.
- Arrêt des **digitaliques**.
- Bilan biologique en urgence avec dosage des taux sériques des **digitaliques**.
- Correction des désordres hydroélectrolytiques (hypokaliémie +++), acido-basiques et des autres facteurs favorisants.
- Apport de **magnésium** : 3 g/24 h.
- En cas d'intoxication massive et moins de 3 h après l'ingestion, on peut proposer un lavage gastrique précoce.

L'**ISUPREL** et les apports de **calcium** sont formellement contre-indiqués.

#### Traitement spécifique

- En présence de critères de mauvais pronostic, on aura recours en 1<sup>re</sup> intention à l'immunothérapie spécifique par immunoglobulines antidigitaliques ovines frag-

ments Fab (prendre contact avec le centre antipoison).

- Immunoglobulines à administrer précocement dès les prélèvements biologiques effectués (après éventuellement une dose test à la recherche d'une allergie).

#### En l'absence d'immunothérapie

- Bradycardie et troubles conductifs : **atropine** 0,5 à 1 mg en IVD ou sonde d'entraînement électrosystolique.
- Traitement antiarythmique :
  - **antiarythmique de classe Ib, phénytoïne (DILANTIN)** : 1 amp. à 250 mg en 5 min en IVDL puis jusqu'à 1 g/24 h en IVSE (idéalement sur une voie centrale du fait de sa veinotoxicité) ;
  - **antiarythmique de classe Ib, lidocaïne (XYLOCARD)** : bolus de 1 mg/kg suivi d'une perf. de 1 mg/kg/h en IVSE.

#### Critères de mauvais pronostic

##### ► Clinique

- Âge > 60 ans.
- Sexe masculin.
- Cardiopathie préexistante.
- Insuffisance rénale préexistante.
- État de choc.
- Dose ingérée > 10 mg (intoxication volontaire).
- Prise en charge tardive.

##### ► ECG

- Troubles conductifs de haut degré.
- Troubles du rythme ventriculaire graves.

##### ► Biologiques

- Hyperkaliémie +++.
- Taux sériques élevés.
- Hypercalcémie.



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (1)

Les principaux éléments nouveaux des dernières recommandations dans la prise en charge de la fibrillation auriculaire portent sur :

- les algorithmes de choix du traitement anticoagulant avec notamment l'apparition des nouveaux anticoagulants oraux (NACO), appelés aussi anticoagulants oraux directs (AOD);
- le maintien pharmacologique en rythme sinusal, après cardioversion médicamenteuse ou par choc électrique externe ou par technique interventionnelle (ARF);
- la place encore plus large de l'ablation par radiofréquence (ARF).

### Traitement anticoagulant [1]

Les accidents thromboemboliques représentent la première complication de l'ACFA. Ce risque peut aller de 0,8 à plus de 20 % par an en cas d'association à d'autres facteurs de risque. L'anticoagulation les réduit de plus de 50%, moyennant une faible augmentation du risque hémorragique.

Il est à présent parfaitement établi que tous les patients en arythmie complète par fibrillation auriculaire doivent être anticoagulés, à l'exclusion des patients < 65 ans (quel que soit le sexe) ayant une ACFA isolée.

- Les **nouveaux anticoagulants oraux** ont une efficacité au moins identique aux **AVK**, voire supérieure dans certains cas, et en tout cas un moindre risque hémorragique intracrânien. Cependant, ils doivent être prescrits dans le respect très strict de leurs indications et contre-indications avec

une vigilance particulière dans le suivi des patients. Les nouveaux anticoagulants oraux efficaces dans l'ACFA **non valvulaire** sont :

- le **dabigatran** : **inhibiteur direct de la thrombine (IIa)**. Posologie habituelle 150 mg x 2/j. À réduire à 110 mg x 2/j après 75 ans, si clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min, si risque hémorragique élevé et si prise de **vérapamil** ou d'**amiodarone** ;
- le **rivaroxaban** : **inhibiteur direct du facteur Xa**. Posologie habituelle 20 mg/j en 1 prise. À réduire à 15 mg/j si clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min. Contre-indication si clairance de la créatinine < 29 mL/min ;
- l'**apixaban** : **inhibiteur direct du facteur Xa**. Posologie habituelle 5 mg x 2/j. À réduire à 2,5 mg x 2/j après 80 ans, si < 60 kg et si clairance de la créatinine > 133  $\mu$ mol/L.

• Les **antivitamines K** restent un des traitements anticoagulants de choix dans l'ACFA non valvulaire et valvulaire, alors même qu'ils représentent la 1<sup>re</sup> cause de iatrogénie grave en France (accidents hémorragiques). Ils peuvent être utilisés chez les personnes âgées et en cas d'insuffisance rénale avec une posologie réduite, une évaluation du rapport bénéfice/risque, une surveillance régulière et une éducation appropriée du patient. Cf. Modalités de prescription des AVK.

- Dans l'algorithme de choix du traitement anticoagulant, on s'aide :
  - du score CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC qui évalue le risque thromboembolique en cas d'ACFA non valvulaire ;
  - du score HAS-BLED qui évalue le risque hémorragique.

## INHIBITEURS DIRECTS DU FACTEUR Xa (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE ARTÉRIELLE)

### ■ Rivaroxaban

<b>XARELTO</b>					
Traitement préventif de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire 20 mg/j, 15 mg chez le sujet âgé ou en cas d'insuffisance rénale modérée	14 cp. 15 mg	37,66	I	65 %	2,69
	28 cp. 15 mg	71,02	I	65 %	2,54
	42 cp. 15 mg	104,37	I	65 %	2,49
	100 cp. 15 mg	HOP	I		
	14 cp. 20 mg	37,66	I	65 %	2,69
	28 cp. 20 mg	71,02	I	65 %	2,54
	100 cp. 20 mg	HOP	I		

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

### ■ Apixaban

<b>ELIQUIS</b>					
Traitement préventif de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire : 5 mg x 2/j (2,5 mg x 2/j chez sujet à risque)	10 cp. 2,5 mg	13,42	I	65 %	1,34
	20 cp. 2,5 mg	26,30	I	65 %	1,32
	60 cp. 2,5 mg	72,21	I	65 %	1,20
	60 cp. 5 mg	72,21	I	65 %	1,20

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs sélectifs du facteur Xa.

La biodisponibilité de l'**apixaban** est de l'ordre de 50 % alors que celle du **rivaroxaban** est comprise entre 80 et 100 % ; les concentrations maximales sont atteintes en 2 à 4 h.

La prise alimentaire n'a pas d'influence sur les paramètres pharmacocinétiques ; l'**apixaban** et le **rivaroxaban** peuvent donc être pris pendant comme en dehors des repas.

### INDICATIONS

Prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité respectivement au **rivaroxaban** ou à l'**apixaban**.

Saignement évolutif cliniquement significatif.

Pathologie hépatique associée à un trouble de l'hémostase.

Grossesse et allaitement.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance étroite pour la recherche de signes hémorragiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables observés sont à remettre dans le contexte post-chirurgical du traitement puisqu'il est parfois difficile d'en déterminer la cause exacte.

Les effets indésirables observés sont les suivants : anémies, hémorragies, confusions et nausées. Parfois, augmentation des transaminases.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association de **XARELTO** ou d'**ELIQUIS** avec les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP 3A4 et/ou de la P-gp n'est pas recommandée. Les médicaments concernés sont les **antifongiques azolés** et les **inhibiteurs de la protéase** du VIH. Tout traitement concomitant avec un autre **anticoagulant** et/ou un **AINS** justifie une vigilance particulière en raison du risque de saignement accru.

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (2)

### Score CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc

C	Cardiaque (insuffisance, dysfonction VG)	1 point
H	HTA	1 point
A <sub>2</sub>	Âge ≥ 75 ans	2 points
D	Diabète	1 point
S <sub>2</sub>	Stroke : AVC, AIT, embolie périphérique	2 points
C	Vasculaire (maladie) : antécédent d'IDM, artériopathie périphérique, athérome aortique	1 point
A	Âge 65-74 ans	1 point
Sc	Sexe féminin	1 point

### Score HAS-BLED

H	HTA	1 point
A	Anomalie de la fonction rénale/hépatique	1 point/1 point
S	Stroke (AVC)	1 point
B	Bleeding (hémorragie)	1 point
L	Labile INR (INR instable)	1 point
E	Elderly (âge > 75 ans)	1 point
D	Drogues/alcool	1 point/1 point

## INHIBITEUR DIRECT DE LA THROMBINE (ANTI-IIa) (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE ARTÉRIELLE)

### ■ Dabigatran éxétilate

PRADAXA					
Prévention de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire A > 18 ans : 150 mg x 2/j En cas d'insuffisance rénale modérée : 110 mg x 2/j	10 gél. 110 mg	30,37	I	65 %	3,04
	30 gél. 110 mg	82,93	I	65 %	2,76
	60 gél. 110 mg	161,56	I	65 %	2,69
	60 gél. 150 mg	75,78	I	65 %	1,26

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteur direct de la thrombine (anti-IIa) (maladie veineuse).

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur direct, puissant et réversible de la thrombine qui joue un rôle majeur dans la formation du thrombus.

#### INDICATIONS

Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une fibrillation atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs des facteurs de risque suivants :

- antécédent d'AVC, d'accident ischémique transitoire ou d'embolie systémique ;
  - FEVG < 40 % ;
  - insuffisance cardiaque symptomatique, classe NYHA ≥ II ;
  - âge ≥ 75 ans.
- âge ≥ 65 ans associé à l'une des affections suivantes : diabète, coronaropathie ou HTA.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **dabigatran éxétilate**.  
Trouble de la coagulation.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Saignement évolutif, lésion organique susceptible de saigner.

Insuffisance hépatique sévère.

Traitement par **quinidine**.

Grossesse et allaitement : déconseillé.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, thrombopénie, hémorragie.

Augmentation des ASAT, des ALAT, de la bilirubine.


Réaction allergique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation du risque de saignement si association à d'autres **anticoagulants (HNF, warfarine, thrombolytiques, antiagrégants plaquettaires)**.

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (3)

### Algorithme de choix du traitement anticoagulant



### Traitement antiarythmique [1] [2]

Deux stratégies sont possibles :

- respecter l'arythmie en contrôlant la cadence ventriculaire ;
- restaurer le rythme sinusal et instaurer au décours un traitement d'entretien.

### Contrôle de la cadence ventriculaire [1] [2]

#### De façon temporaire

Très fréquemment, le traitement initial consiste à ralentir la cadence ventriculaire afin d'améliorer la tolérance avant de tenter ultérieurement une réduction.

En l'absence de signe de mauvaise tolérance lié à une fréquence ventriculaire trop rapide, les drogues par voie IV seront évitées du fait de leurs effets secondaires (hypotension, insuffisance cardiaque, etc.).

Si la fonction ventriculaire est bonne, on proposera les **inhibiteurs calciques** ou les **β-bloquants** qui sont particulièrement efficaces. Les **digitaliques** trouvent leur meilleure indication en cas d'insuffisance cardiaque par dysfonction systolique.

Les différentes thérapeutiques sont :

- **inhibiteurs calciques**, diltiazem (**TIL-DIEM**) : bolus de 20 à 25 mg (fl. à 25 mg) IV en 2 min puis 10 à 15 mg/h IVSE ou 1 cp. à 60 mg x 3/j ;
- **inhibiteurs calciques**, vérapamil (**ISOP-TINE**) : bolus de 1 à 2 amp. à 5 mg IV en 2 min puis 3 à 12 mg/h IVSE ou 1 cp. à 120 mg x 2/j ;
- **β-bloquant**, aténolol (**TÉNORMINE**) : 1/2 à 1 cp. à 100 mg/j ;
- **digitaliques**, digoxine (**DIGOXINE**) : 1/2 amp. à 0,5 mg x 3/j en IV lente ou 1 cp. à 0,25 mg/j.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (1)

### Rappels électrophysiologiques

#### Les différents types cellulaires

On distingue 2 types de cellules cardiaques :  
 – fibres à réponse rapide (cellules auriculaires, ventriculaires et du système His-Purkinje) : potentiel de repos fortement négatif et potentiel d'action classique en 5 phases ;  
 – fibres à réponse lente (cellules du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire) : potentiel de repos faiblement négatif et potentiel d'action particulier.

#### Les 5 phases du potentiel d'action

*Phase 0* : dépolarisation (courant sodique entrant).

*Phase 1* : repolarisation rapide initiale (courant chlore entrant).

*Phase 2* : plateau du potentiel d'action (courant calcique entrant).

*Phase 3* : repolarisation terminale (courant potassique sortant).

*Phase 4* : phase de repos.


Les cellules à réponse lente ont un potentiel d'action différent avec une phase 0 correspondant à un courant calcico-sodique entrant et une phase 4, sous influence sympathique, présentant une dépolarisation spontanée à l'origine de l'activité *pacemaker*.

### Classification des antiarythmiques

#### Classification de Vaughan-Williams

- Classe I : inhibiteurs des canaux sodiques.
- Classe II :  **$\beta$ -bloquants**.
- Classe III : bloqueurs de l'influx potassique.
- Classe IV : **inhibiteurs calciques**.

En fait, les **antiarythmiques** ne sont pas des substances pures : l'**amiodarone** est un **antiarythmique** de classe I, II, III et IV.



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (4)

### De façon définitive

En cas d'ACFA persistante bien tolérée chez un sujet âgé et/ou en cas de cardiopathie, le simple contrôle de la cadence ventriculaire est tout à fait acceptable. L'objectif est d'avoir une fréquence ventriculaire entre 70 et 80/min. Le traitement, par voie orale, repose sur 3 classes thérapeutiques : les **digitaliques**, les  **$\beta$ -bloquants** et les **inhibiteurs calciques**. La **COR-DARONE** est dans cette indication une drogue de seconde intention.

### Réduction de la fibrillation auriculaire [1][2]

La réduction de la fibrillation auriculaire reste le traitement de référence chez les patients symptomatiques, surtout s'ils sont jeunes.

La cardioversion peut être soit médicamenteuse, soit interventionnelle avec une ablation par radiofréquence (cf. **Ablation par radiofréquence [ARF]**), soit électrique (cf. **Choc électrique externe**).

La tentative de réduction d'une fibrillation auriculaire est une indication formelle au traitement anticoagulant efficace, quelle que soit la méthode de cardioversion. Il ne faut jamais tenter de réduction en cas d'accident embolique récent. On s'assurera que l'anticoagulation est efficace depuis une durée suffisante (au moins 3 sem.) ainsi que de l'absence de désordres hydroélectrolytiques (hypokaliémie). Il faut signaler que 50 % des fibrillations auriculaires récentes (moins de 48 h) se réduisent spontanément.

Indications de l'échographie transœsophagienne (vérification de l'absence de thrombus dans l'oreillette gauche avant réduction) :

- systématiquement après une embolie systémique,
- chez un patient à haut risque (rétrécissement mitral, dysfonction ventriculaire gauche, grosse oreillette gauche, etc.),
- en cas d'incertitude sur l'efficacité du traitement anticoagulant,
- diminution de la durée de l'anticoagulation avant réduction.

### Indications

- FA récente avec instabilité hémodynamique : **choc électrique externe**.
- FA récente sans instabilité hémodynamique : cardioversion médicamenteuse (un choc électrique externe peut néanmoins être préféré par le patient et le médecin).
  - Avec cardiopathie sévère sous-jacente : **amiodarone** (cf. Schémas possibles d'administration ci-dessous).
  - Avec cardiopathie modérée sous-jacente : **amiodarone** (cf. Schémas possibles d'administration ci-après). Le **vernalant IV**, commercialisé en Europe mais pas encore en France, apparaît dans la liste des médicaments efficaces dans les dernières recommandations européennes.
  - Sans cardiopathie sous-jacente : **flécaïnone (FLÉCAÏNE)**, **propafénone (RHYTHMOL)** ou **sotalol (SOTALLEX)**.
- FA paroxystique symptomatique et récurrente malgré le traitement médical : **ARF**.
- L'**ARF** peut être également proposée en 1<sup>re</sup> intention dans la FA paroxystique en fonction du choix du patient, du bénéfice et du risque et comme une alternative au traitement médical.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (2)

### Mécanismes d'action

#### Antiarythmiques de classe I

Ils agissent au niveau de la phase 0 en diminuant l'influx entrant de sodium (effet stabilisant de membrane), ce qui a pour effet d'augmenter la durée du QRS. Leur action s'exerce surtout sur les fibres à réponse rapide. On différencie trois sous-classes selon leur action sur la repolarisation (voir Tableau) :

- classe Ia : **hydroquinidine (SÉRÉCOR)**, **disopyramide (RYTHMODAN, ISORYTHM)** ;
- classe Ib : **lidocaïne (XYLOCARD)**, **mexilétine, phénytoïne (DILANTIN)** ;
- classe Ic : **cibenzoline (CIPRALAN, EXAC OR)**, **propafénone (RYTHMOL)**, **flécaïnide (FLÉCAÏNE)**.

#### Antiarythmiques de classe II

Les  **$\beta$ -bloquants** agissent sur la phase IV en diminuant la dépolarisation spontanée. Ils sont donc essentiellement actifs sur les fibres à réponse lente.

#### Antiarythmiques de classe III

Il s'agit de l'**amiodarone** et du **sotalol**. Leur action porte sur la phase 3 : augmentation du temps de repolarisation et de la durée du potentiel d'action, mais aucun n'est pur.

#### Antiarythmiques de classe IV (vérapamil, diltiazem)

Les **inhibiteurs calciques** agissent sur la phase 2 des fibres rapides (diminution de l'entrée de calcium) et la phase 0 des fibres lentes.

#### Antiarythmiques responsables d'effet proarythmique

- Classe Ia et Ic : extrasystoles, tachycardie et fibrillation ventriculaire, torsades de pointes, flutter 1/1.
- Classe III (la **CORDARONE** présente peu ou pas d'effet arythmogène) : extrasystoles, tachycardie et fibrillation ventriculaire, torsades de pointes.

#### Antiarythmiques responsables de torsades de pointes

- Classe Ia : **quinidiniques +++ et disopyramide**.
- Classe III.
- Classe II et IV par leur effet bradycardisant.

#### Antiarythmiques responsables de troubles conductifs

- Classe Ia et Ic : troubles de conduction infranodaux et intraventriculaires.
- Classe II et IV : dysfonction sinusale et blocs auriculo-ventriculaires nodaux.
- Classe III : provoquent des troubles de conduction.

#### Principaux antiarythmiques inotropes négatifs

- Classe Ia et Ic.
- Classe II.
- Classe IV.


#### Associations d'antiarythmiques

Elles seront à éviter surtout entre **antiarythmiques** de même classe ou inotropes négatifs. Certaines associations peuvent être utiles (**DIGOXINE/CORDARONE**, **CORDARONE/ $\beta$ -bloquants**).



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (5)

### Algorithme de choix entre les médicaments et l'ARF pour réduire une FA



### Méthodes

#### ► Ablation par radiofréquence (ARF)

Sa place a été renforcée dans les nouvelles recommandations.

#### ► Cardioversion médicamenteuse

Globalement, le taux de réduction est de 70 %. Plusieurs **antiarythmiques** sont utilisables et efficaces.

• **Antiarythmique de classe III, amiodarone (CORDARONE)**, traitement de choix avec plusieurs schémas possibles.

– En **USIC** : bolus de 1 à 2 amp. à 150 mg (5 mg/kg) en IV sur 15 à 30 min sur une voie veineuse de bon calibre puis 5 cp. à 200 mg x 1/j.

– En **hospitalisation** : dose de charge de 30 mg/kg *per os* le premier jour suivie d'une demi-dose de charge le lendemain, puis 3 cp. à 200 mg x 1/j les jours suivants (chez le sujet âgé ou avec dysfonction ventriculaire gauche, uniquement demi-dose de charge de 15 mg/kg).

– **Protocole ambulatoire en cas de premier accès de fibrillation auriculaire sur cœur sain** : J1 : 3 cp. à 200 mg x 1/j ; J10 : 2<sup>e</sup> consultation ; en cas de non-réduction, poursuivre à 2 cp./j avec rendez-vous d'hospitalisation 10 j plus tard pour une réduction par choc électrique externe.

• **Antiarythmique de classe Ic, flécaïnide (FLÉCAÏNE)** : en **USIC**, bolus de 2 mg/kg en 30 min en IV (amp. à 150 mg) suivi d'une perfusion continue de 3 µg/kg/min.

Les **digitaliques** ne permettent pas de réduire une fibrillation auriculaire.

#### ► Cardioversion électrique

Son taux de succès est de 80 à 90 %. Elle peut être utilisée d'emblée ou en cas d'échec de la cardioversion médicamenteuse. L'imprégnation cordaronique augmente son efficacité. Cf. **Choc électrique externe**.

Facteurs associés à une résistance ou à une récurrence de la fibrillation auriculaire après tentative de cardioversion :

- âge > 75 ans ;
- ACFA ancienne (> 1 an) ;
- ACFA multirécidivante (> 3 récurrences) malgré un traitement antiarythmique optimal ;
- existence d'une valvulopathie mitrale +++ ;
- oreillette gauche dilatée ;
- dysfonction ventriculaire gauche ;
- persistance d'un facteur favorisant ;
- difficultés de prescription des **antiarythmiques**.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (3)

### Antiarythmiques de classe I

	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ia	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ib	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ic
Électrophysiologie	↑ du temps de repolarisation (ralentissement de la phase 3) et ↑ de la durée du potentiel d'action	↑ du temps de repolarisation (raccourcissement de la phase 3) et ↓ de la durée du potentiel d'action	Pas d'action sur la repolarisation et la durée du potentiel d'action
Effet inotrope négatif	Marqué	Très faible	Marqué
ECG	↑ PR ↑ QRS ↑ QT	↑ QRS → ou ↓ QT	↑ PR ↑ QRS → QT
Effets secondaires	BSA Bloc intraventriculaire BAV infranodal Torsades de pointe	Peu de troubles conductifs	BSA Bloc intraventriculaire BAV infranodal

### Antiarythmiques de classes II, III et IV

	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE II	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE III	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE IV
ECG	↓ Fréquence cardiaque ↑ PR → QRS → QT	↓ Fréquence cardiaque → PR → QRS ↑ QTc Aplatissement de l'onde T et onde u	↓ Fréquence cardiaque ↑ PR → QRS
Effet inotrope négatif	Marqué	Non	Marqué
Effets secondaires	BSA BAV nodal	BSA Torsades de pointes	BSA BAV

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (6)

### Traitement médicamenteux pour maintenir le rythme sinusal [1] [2]

#### Choix du médicament antiarythmique selon la cardiopathie sous-jacente

On évitera la **FLÉCAÏNE** en cas de coronaropathie. La **dronédarone** est totalement contre-indiquée en cas d'insuffisance cardiaque.

#### Durée du traitement antiarythmique d'entretien


Un traitement antiarythmique d'entretien n'est pas toujours nécessaire au long

cours. Il pourra être interrompu dans un délai de 1 à 3 mois en cas de :

- réussite maintenue d'une **ablation par radiofréquence (ARF)** ;
- premier accès sur cœur sain ;
- FA contemporaine d'une cause précise corrigée.

Dans les autres cas, le traitement antiarythmique d'entretien devra être maintenu au long cours en surveillant son efficacité et sa tolérance.

#### Algorithme de choix du médicament antiarythmique selon la cardiopathie sous-jacente



### Formes cliniques particulières

#### Maladie de l'oreillette






C'est l'association de troubles du rythme auriculaire et de troubles de conduction. L'implantation d'un **pacemaker** est souvent indispensable en association avec le traitement antiarythmique.

#### Syndrome de Wolff-Parkinson-White

Les **digitaliques** sont **formellement contre-indiqués** (raccourcissent la période

réfractaire antérograde du faisceau de Kent et accélération de la réponse ventriculaire). Si elle est bien tolérée, la fibrillation auriculaire sera réduite par les **antiarythmiques de classe Ic (FLÉCAÏNE)** ou par la **CORDARONE** qui diminuent la perméabilité antérograde et rétrograde des voies accessoires. Au décours on effectuera une exploration électrophysiologique, avec éventuellement ablation de la voie accessoire par **radiofréquence**.

**ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (4)****Choix du traitement médical antiarythmique en fonction du trouble du rythme**

FIBRILLATION AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE, MULTAQ</b>	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL, SOTALEX</b>
Entretien (fonction du terrain et du mécanisme de la fibrillation)	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL, SOTALEX, MULTAQ</b>	<b>CORDARONE</b>
FLUTTER AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	
Entretien	<b>SÉRÉCOR, RYTHMODAN, FLÉCAÏNE</b>	<b>CORDARONE, bêtabloquants</b>
TACHYSYSTOLIE AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	
Entretien	<b>SÉRÉCOR, RYTHMODAN, FLÉCAÏNE</b>	<b>CORDARONE, bêtabloquants</b>
TACHYCARDIE JONCTIONNELLE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>STRIADYNE</b>	<b>ISOPTINE</b>
Entretien	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL</b>	<b>ISOPTINE</b> en l'absence de voie accessoire
TACHYCARDIE VENTRICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	<b>XYLOCARD</b>
Entretien (dépend de la cardiopathie causale et de la fonction ventriculaire gauche)	Cardiopathie ischémique : <b>TÉNORMINE</b> et/ou <b>CORDARONE</b> Cardiopathie dilatée : <b>CORDARONE</b> Cardiopathie hypertrophique : <b>TÉNORMINE</b> ou <b>ISOPTINE</b> ± <b>CORDARONE</b> ou <b>RYTHMODAN</b> Prolapsus valvulaire mitral : <b>TÉNORMINE</b> Dysplasie du ventricule droit : <b>SOTALEX</b>	

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (7)

### Mesures associées [1] [2]

- Hospitalisation en cardiologie en particulier si fibrillation mal tolérée, comorbidités, mauvaise compréhension du traitement.
- Recherche et correction de facteurs favorisants ou déclenchants, notamment :
  - correction des troubles hydroélectrolytiques (hypokaliémie et hypomagnésémie) ;
  - dysthyroïdie.
- Bilan clinique et échocardiographique (fonction ventriculaire gauche, taille des oreillettes et recherche d'une cardiopathie).
- Cure d'une valvulopathie si possible.
- Éviter les excitants (thé, café, alcool et tabac).

#### Facteurs favorisants ou déclenchants

- Hyperthyroïdie.
- Hypokaliémie.
- Dyscalcémie.
- **Théophylline**, agents sympathomimétiques.
- Hypoxie (pathologie respiratoire aiguë).
- Syndrome fébrile.
- Intoxication alcoolique aiguë.
- Drogues : cocaïne, crack, etc.
- Poussée d'insuffisance cardiaque.

### Surveillance [1] [2]

Elle comprend la tolérance et l'efficacité des différentes thérapeutiques.

- Clinique : notion de palpitations, effets secondaires extracardiaques des **antiarythmiques**, signes d'insuffisance cardiaque, embolies systémiques.
- ECG : rythme, espace PR, largeur du QRS, espace QT.
- Biologie : ionogramme sanguin, fonction rénale et hémostase.

- Si besoin, Holter cardiaque sur 24 h.

En dehors de leurs effets secondaires cardiaques et extracardiaques, il faut insister sur le risque d'effet proarythmique des traitements **antiarythmiques de classe Ia, Ic et III**. Il s'agit de troubles du rythme ventriculaire (extrasystoles ventriculaires, tachycardie et fibrillation ventriculaires, torsades de pointes) et auriculaire (flutter 1/1), d'accélération de la fréquence cardiaque en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White en ACFA, et d'élévation du seuil de défibrillation. Ils surviennent essentiellement dans les 48 premières heures suivant l'instauration ou la majoration posologique et sont favorisés par :

- l'âge ;
- le sexe féminin ;
- des antécédents d'insuffisance cardiaque, d'infarctus ou d'autres cardiopathies ;
- une posologie élevée ;
- l'existence de troubles hydroélectrolytiques ;
- des troubles de conduction associés (QT long).

Ils sont très rares en l'absence de cardiopathie sous-jacente.

En cas de risque d'effet proarythmique, l'instauration ou l'augmentation du traitement antiarythmique doit se faire en milieu hospitalier sous surveillance so-

#### Conduite à tenir en cas de récurrence de fibrillation auriculaire sous traitement

- Rechercher une cause favorisante.
- Vérifier l'observance thérapeutique.
- Vérifier que la posologie est suffisante.
- Bilan de la cardiopathie sous-jacente.
- Discuter une nouvelle réduction soit médicamenteuse, soit par **ARF**, soit par **choc électrique**.

### CONSENSUS

[1] Guidelines for the management of atrial fibrillation, ESC, 2010

[2] 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, ESC, 2012

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IA (1)

## ■ Hydroquinidine chlorhydrate

<b>SÉRÉCOR LP</b>					
1 gél. x 2/j (max 4/j)	20 gél. LP 300 mg	7,58	I	30 %	0,38
gél. à libération prolongée	60 gél. LP 300 mg	18,54	I	30 %	0,31

## ■ Disopyramide


<b>RYTHMODAN</b>					
Forme simple : 1 gél. x 3 ou 4/j (traitement d'attaque : jusqu'à 600 mg/j)	40 gél. 100 mg	4,79	I	30 %	0,12
Forme LP : 1 cp. x 2/j (500 mg/j)	20 cp. séc. LP 250 mg	4,79	I	30 %	0,24
<b>ISORYTHM LP</b>					
1 gél. x 2/j (dose recommandée : 500 mg/j)	20 gél. LP 125 mg	4,31	I	30 %	0,22
	20 gél. LP 250 mg	7,16	I	30 %	0,36

## ■ PROPRIÉTÉS

- **Quinidiniques : antiarythmiques de classe Ia** actifs surtout à l'étage supraventriculaire. Faible effet atropinique. Résorption digestive à 70 %, efficacité obtenue en 2 h pour une durée de 6 à 8 h (12 h pour les formes LP). Métabolisation hépatique et élimination urinaire. Taux plasmatiques efficaces : 2 à 5 mg/mL.
- **Disopyramide : antiarythmique de classe Ia** ayant des propriétés anticholinergiques. Ralen-


tissement de la conduction antérograde et rétrograde des voies accessoires rendant son utilisation possible en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White. Absorption orale rapide pour une durée de 6 à 8 h (12 h pour les formes LP). Action IV en 5 à 10 min pendant 2 h. Faible métabolisation hépatique et éliminations urinaire et fécale. Passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## Arythmie complète par fibrillation auriculaire



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (8)

### Arbre de décision thérapeutique [1] [2]



## FLUTTER ET TACHYSYSTOLIE AURICULAIRE (1)

Le flutter et la tachysystolie auriculaire surviennent le plus souvent sur cœur sain. Si le flutter est le plus souvent idiopathique, on éliminera systématiquement une intoxication aux **digitaliques** en cas de tachysystolie auriculaire.

### Traitement de la crise

#### Mesures générales

- Hospitalisation en cardiologie si besoin (cf. Fibrillation auriculaire).
- Bilan étiologique minimum : échocardiographie, ionogramme sanguin et bilan thyroïdien.
- Correction des troubles hydroélectrolytiques (hypokaliémie ++).
- Correction d'une dysthyroïdie.
- Traitement d'une cardiopathie sous-jacente.
- **Traitement anticoagulant** : il est impératif avant toute réduction. Bien que moins emboligènes que la fibrillation auriculaire, ces troubles du rythme nécessitent un traitement anticoagulant efficace (cf. Fibrillation auriculaire) instauré 3 sem. avant. Il sera maintenu 1 à 3 mois après le retour en rythme sinusal en l'absence de cardiopathie.

#### Réduction du flutter ou de la tachysystolie auriculaire

Plusieurs modalités sont disponibles.

##### ► Réduction médicamenteuse

La **CORDARONE** est le traitement de choix, selon les mêmes modalités que celles décrites pour la fibrillation auriculaire. Elle permet de ralentir la cadence ventriculaire, parfois de dégrader le flutter en fibrillation auriculaire et de restaurer le rythme sinusal. En cas d'échec, l'imprégnation cordaronique facilite la réduction par la sti-

mulation atriale ou le choc électrique externe.

Les **antiarythmiques de classe Ia et Ic** ne doivent pas être utilisés car, déprimant l'activité auriculaire, ils facilitent la conduction nodale et exposent au risque de flutter 1/1. De plus, leur efficacité est faible (20 % pour la **FLÉCAÏNE**).

##### ► Stimulation atriale

Cf. chapitre correspondant.

Le principe est de stimuler l'oreillette à une fréquence supérieure à celle du trouble à réduire, de façon à capturer et interrompre le circuit de la tachycardie. Elle est souvent utilisée en seconde intention après échec de la **CORDARONE**. Deux techniques sont utilisables :

- **voie œsophagienne** ;
- **voie endocavitaire**.

Le taux de succès de la stimulation œsophagienne pour réduire un flutter est de 60 à 80 % à la 24<sup>e</sup> h (taux plus faible pour la tachysystolie auriculaire : 35 à 50 %), éventuellement après une transformation transitoire en fibrillation auriculaire. La probabilité de réduction est d'autant plus grande que la tachycardie est d'installation récente, d'apparence idiopathique ou postopératoire et qu'il existe une imprégnation cordaronique.

La voie endocavitaire serait légèrement plus efficace que la stimulation œsophagienne.

##### ► Cardioversion électrique

Elle permet de réduire la grande majorité des flutters. Il est préférable de l'utiliser en cas d'échec de la stimulation atriale. Ses modalités et précautions sont décrites dans le chapitre correspondant, avec comme particularité un premier choc effectué à faible énergie (50 à 100 joules).



**FLUTTER ET TACHYSYSTOLIE AURICULAIRE (2)****► Ablation par radiofréquence**

Certaines indications sont habituellement retenues :

- flutter récidivant malgré un traitement médical bien conduit ou mal toléré ;
- sujet jeune refusant un traitement médicamenteux au long cours ;
- profession à risque.

Le patient sera prévenu des risques (fibrillation auriculaire, récurrence, nécessité d'un traitement antiarythmique complémentaire, bloc auriculo-ventriculaire et pace-maker).

À 1 an, 90 % des patients sont en rythme sinusal. Les récurrences sont fréquentes (15 à 30 % surtout les 3 premiers mois) et peuvent être traitées par une nouvelle séance de radiofréquence. Toutefois 20 à 30 % des patients nécessitent à 1 an un traitement antiarythmique complémentaire (pour récurrence de flutter ou fibrillation auriculaire).

**Traitement préventif pour maintenir un rythme sinusal**

Il repose en première intention sur les **antiarythmiques de classe Ia et Ic**, puis sur la **CORDARONE** et les  **$\beta$ -bloquants**.

Par exemple :

- **antiarythmique de classe Ia, disopyramide (RHYTHMODAN)** : 1 cp. à 250 mg x 2/j ;
- **antiarythmique de classe Ic, flécaïnide (FLÉCAÏNE LP)** : 1 cp. à 150 mg/j.

**Cas particuliers****Mauvaise tolérance**

En cas de mauvaise tolérance, un **choc électrique externe en urgence** est nécessaire. Il s'agit des situations de choc, collapsus, arrêt cardiorespiratoire, insuffisance cardiaque sévère, angor résistant aux thérapeutiques usuelles, cadence ventriculaire > 200/min en particulier sur Wolff-Parkinson-White et flutter 1/1 (effet proarythmique).

- Hospitalisation en USIC.
- Voie veineuse périphérique : G5 % 500 mL/24 h.
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Oxygénothérapie par voie nasale 6 L/min.
- Dispositif de recueil des urines.
- Traitement anticoagulant efficace.
- Réduction par choc électrique externe après une brève anesthésie générale (**cf. Choc électrique externe**). L'énergie initiale délivrée sera moindre que pour la fibrillation auriculaire : 100 à 200 joules, éventuellement à renouveler à 300 joules en cas d'échec.
- Ultérieurement : correction des désordres hydroélectrolytiques et traitement d'entretien antiarythmique.

**Syndrome de Wolff-Parkinson-White**

Les **digitaliques** sont formellement contre-indiqués.

## TACHYCARDIES JONCTIONNELLES (1)

On distingue deux grands types de tachycardies jonctionnelles : les tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale (maladie de Bouveret) et les tachycardies jonctionnelles en rapport avec une voie accessoire (avec ou sans préexcitation de surface). Elles constituent le domaine de prédilection de l'ablation par radiofréquence (ARF).

### Traitement de la crise

La tolérance est variable.

#### Manœuvres vagales

- Déclenchement d'un réflexe vagal bloquant la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire : **réponse du tout ou rien**.
- Elles sont d'autant plus efficaces qu'elles sont effectuées précocement.
- Débutées par le patient lui-même : manœuvre de Valsalva, déclenchement d'un réflexe nauséeux, prise d'un verre d'eau glacée.
- Poursuivies plus vigoureusement aux urgences sous surveillance scopique : massage sino-carotidien doux, droit puis gauche (en l'absence de sténose carotidienne ou d'antécédents d'accident vasculaire cérébral) ou compression oculaire (en l'absence de glaucome ou de fragilité rétinienne).

- La crise peut aussi céder spontanément au repos en s'aidant éventuellement d'un **anxiolytique**.

#### Réduction médicamenteuse

##### ► Précautions indispensables

- En présence du médecin.
- Voie veineuse périphérique.
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Défibrillateur à proximité.
- **Atropine** à disposition.

##### ► Stratégie thérapeutique

- En 1<sup>re</sup> intention :

- **triphosadénine (STRIADYNE)** : 1/2 à 1 amp. à 20 mg en IVD (1 mg/kg sans dépasser 10 mg chez l'enfant) ;

- **ou inhibiteur calcique** de type **vérapamil (ISOPTINE)** : 1 amp. à 5 mg en injection IV lente sur 2 à 3 min (en l'absence de dysfonction ventriculaire). Ceci peut être répété une fois au bout de 10 min en cas d'échec.


- D'autres **antiarythmiques** peuvent être proposés en 2<sup>e</sup> intention :

- **antiarythmique de classe Ic, flécaïnide (FLÉCAÏNE)** : 1 amp. à 50 mg en 5 min ;

- **antiarythmique de classe III, amiodarone (CORDARONE)** : 5 mg/kg en IVSE sur 30 min (amp. à 150 mg).

Le recours à la stimulation atriale cœsophagienne est efficace mais reste exceptionnel.

#### Tachycardie jonctionnelle réduite par la STRIADYNE



## STRIADYNE

## ■ Triphosadénine

STRIADYNE					
1/2 amp. soit 10 mg en IVD à renouveler éventuellement 3 min après	10 amp. 2 mL à 20 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Puissant effet cholinergique direct (ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire) de demi-vie brève (< 20 s).

**INDICATIONS**

Conversion rapide en rythme sinusal des tachycardies jonctionnelles y compris celles associées à une voie accessoire.  
Ralentissement à visée diagnostique des tachycardies à complexes larges ou fins bien tolérées.

**CONTRE-INDICATIONS**

Asthme.  
Bloc auriculo-ventriculaire du 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degré et dysfonction sinusale non appareillés.  
Hypersensibilité connue à l'adénosine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Patient perfusé.  
Surveillance scopique.  
En présence d'un médecin.

**Atropine** et matériel de réanimation à disposition.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Pause sinusale postcritique.  
Bloc auriculo-ventriculaire, rarement bradycardie sévère et asystolie.  
Quelques cas de tachycardie et de fibrillation ventriculaire.  
Bronchospasme chez l'asthmatique et en cas de BPCO.  
Effets peu intenses et transitoires : vasodilatation périphérique, nausées, crampes épigastriques, céphalées, flushs, vertiges, sueurs, dyspnée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation par le **dipyridamole** (diminuer les doses).  
Antagonisme avec la **caféine**, la **théophylline** et les médicaments anticholinergiques (**atropine**, **antispasmodiques**, **antiparkinsoniens**, **antisécrétoires**, certains **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **antidépresseurs** imipraminiques, **phénotiazines**, **disopyramide**, etc.).

## TACHYCARDIES JONCTIONNELLES (2)

### Prévention des récidives

Au décours de la crise, une exploration électrophysiologique est souhaitable (surtout s'il existe des troubles du rythme auriculaire associés). Elle permet de préciser le mécanisme de la tachycardie, d'étudier la période réfractaire d'une éventuelle voie accessoire et d'évaluer l'efficacité du traitement antiarythmique.

### Conseils hygiéno-diététiques

- Éviter les excitants : thé, café, alcool, tabac.
- Discuter un traitement anxiolytique.
- Enseigner au patient les moyens simples de réduction.
- L'activité physique n'est pas limitée.

### Traitement de fond médicamenteux

Il est indiqué en cas d'accès répétés, prolongés ou mal tolérés, difficilement réduits par les manœuvres vagales effectuées par le patient. Son efficacité tient à son action sur le circuit de réentrée et à la suppression des extrasystoles inductrices. La **COR-DARONE** ne doit pas être utilisée (affection bénigne et effets secondaires extracardiaques fréquents).

► *Tachycardie jonctionnelle associée à une voie accessoire*

On utilisera en première intention un **antiarythmique de classe Ic** :

- flécaïnide (**FLÉCAÏNE LP**) : 1 cp. à 150 mg/j ;
- propafénone (**RYTHMOL**) : 1 cp. à 300 mg x 2/j.

► *Maladie de Bouveret*

Les **inhibiteurs calciques** et les  **$\beta$ -bloquants** sont utilisables, de même que les **antiarythmiques de classe Ic** :

- inhibiteur calcique, vérapamil (**ISOPTINE**) : 1 cp. à 120 mg x 2/j ;
- bêtabloquant, métoprolol (**LOPRESSOR**) : 100 à 200 mg/j x 2 prises/j.

### Traitement non pharmacologique : ablation par radiofréquence

C'est le traitement curatif des tachycardies jonctionnelles : ablation de la voie lente arrivant au nœud auriculo-ventriculaire (maladie de Bouveret) ou de la voie accessoire. Le taux de succès est de 90 à 99 % (fonction du siège, de la voie, de l'obtention de critères électrophysiologiques locaux corrects et surtout de l'expérience de l'équipe). Une récidive survient dans 7 à 9 % des cas et sera traitée par une nouvelle séance.

Les **indications** sont larges :

- accès répétés malgré un traitement médical (inefficace ou mal toléré) ;
- syndrome de Wolff-Parkinson-White avec accès de fibrillation auriculaire rapides, surtout si épisode syncopal ;
- syndrome de Wolff-Parkinson-White pauci- ou asymptomatique mais potentiellement dangereux : période réfractaire de la voie accessoire très courte (< 200 ms) et vulnérabilité auriculaire importante, d'autant plus qu'il existe une cardiopathie ;
- sujets peu observants, sportifs, professions à risque ou sujets jugeant le traitement médical trop contraignant.

Le patient sera correctement informé des avantages et des complications de la méthode (notamment du risque d'un pacemaker définitif).

## TORSADES DE POINTES

Elles évoluent par accès syncopaux récidivants déclenchés par une extrasystole ventriculaire sur un QT long. Elles peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire.

### Mesures générales

- Hospitalisation en USIC.
- Voie veineuse périphérique de bon calibre.
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Défibrillateur à proximité.
- Dispositif de recueil des urines.

**Abstention de tout traitement antiarythmique.**

### Traitement spécifique

#### Magnésithérapie

Elle est souvent spectaculairement efficace même en l'absence de déficit : bolus de 1 à 2 g de **sulfate de magnésium** en IVDL : intraveineux direct lent suivi d'une perfusion de 8 à 12 g/j en IVSE (amp. de 10 mL à 1,5 g et de 20 mL à 3 g).

#### Accélération de la fréquence cardiaque

- Montée d'une sonde d'entraînement électrosystolique temporaire en cas d'échec du traitement par **magnésium** : stimulation à 90/min en l'absence de coronaropathie.
- L'**ISUPREL** n'a d'intérêt que dans les grandes bradycardies : 5 amp. à 0,2 mg dans 250 mL de G5 % (débit à adapter de façon à obtenir une fréquence cardiaque entre 90 et 100/min) en attendant la montée d'une sonde d'entraînement électrosystolique.

### Traitement étiologique

- Correction des troubles hydroélectrolytiques (hypokaliémie).

- Suppression des traitements bradycardisants ou induisant des torsades de pointes.

- Appareillage définitif des blocs auriculo-ventriculaires (pacemaker).

### Syndrome du QT long congénital

Le traitement repose sur les  **$\beta$ -bloquants** (déclenchement adrénergique) à l'exclusion du **SOTALEX**. Sont aussi utilisables : la sympathectomie gauche, l'implantation d'un **pacemaker** ou d'un **défibrillateur implantable**.

Facteurs favorisant les torsades de pointes

► **Bradycardie**

► **Troubles métaboliques**

- Hypokaliémie : **diurétiques, laxatifs**, prudence avec les **carboxypénicillines**.

- Hypomagnésémie.

- Hypocalcémie.

► **Médicamenteux**

- **Antiarythmiques de classe Ia** : **disopyramide, quinidiniqes** (effet idiosyncrasique ou toxique).

- **Antiarythmiques de classe III** : **sotalol, amiodarone**.

- Psychotropes : **antidépresseurs tricycliques, sultopride**.

- **Vasodilatateurs cérébraux** : **vincamine**.

- **Antihistaminiques H<sub>1</sub>** : **astémizole, terféndine**.

- **ÉRYTHROCINE IV**, **sparfloxacin**, **halofantrine, chloroquine**.

► **Divers**

- Intoxications (arsenic, organophosphorés).

- Régime amaigrissant.

- Pathologie neurologique aiguë (accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée, traumatisme crânien, etc.).

► **Facteurs aggravants**

- Dysfonction ventriculaire gauche.

- **Digitaux** en association avec les **antiarythmiques de classe Ia**.

## EXTRASYSTOLIE VENTRICULAIRE (1)

La gravité des extrasystoles ventriculaires (ESV) dépend de leur étiologie, de la cardiopathie sous-jacente ainsi que de leur type. Un bilan étiologique minimum est indispensable :

- interrogatoire : antécédents, traitement ;
- examen clinique ;
- biologie : ionogramme sanguin, créatinine et bilan thyroïdien ;
- ECG, Holter cardiaque, écho-Doppler cardiaque
- éventuellement: recherche de potentiels tardifs par ECG haute amplification (PT), stimulation ventriculaire programmée (SVP), épreuve d'effort et/ou thallium et coronarographie.

Ce bilan permettra de distinguer les ESV sur cœur sain des ESV sur cœur pathologique.

### Classification de Lown

- Degré 0 : absence d'ESV
- Degré 1 : ESV occasionnelles isolées (< 30/h)
- Degré 2 : ESV fréquentes (> 30/h)
- Degré 3 : ESV polymorphes ou multifocales
- Degré 4 : ESV répétitives par paires ou salves ( $\geq 3$  ESV)
- Degré 5 : ESV précoces (phénomène R/T)

### Principales étiologies responsables d'extrasystolie ventriculaire

- Cardiopathie ischémique (ischémie et angor de Prinzmetal, infarctus à la phase aiguë, séquelle d'infarctus et poche anévrysmale).
- Myocardiopathie dilatée.
- Myocardiopathie hypertrophique.
- Valvulopathies (aortiques et prolapsus valvulaire mitral).
- Troubles métaboliques.
- Intoxication aux **digitaliques** et effet pro-arythmique des **antiarythmiques**.
- Dysplasie arythmogène du ventricule droit.

### ESV sur cœur sain

Leur prévalence est de 3 à 7 %. Le but du traitement est la suppression des symptômes et non la normalisation de l'ECG ou du Holter.

Les grandes lignes du traitement sont :

- rassurer le patient ;
- éviter les excitants (thé, café, alcool, drogues) ;
- encourager une activité physique raisonnable ;
- si besoin traitement anxiolytique : **benzodiazépine**, **bromazépan** (**LEXOMIL**) : 1/4 à 1/2 cp. x 3/j ;
- chez les patients symptomatiques malgré ces différentes mesures, un traitement antiarythmique sera proposé. On utilisera soit un  **$\beta$ -bloquant** sans activité sympathomimétique intrinsèque, **aténolol** (**TÉNORMINE**) : 1/2 à 1 cp. à 100 mg/j, soit un **inhibiteur calcique**, **vérapamil** (**ISOPTINE**) : 1 gél. à 120 mg x 2/j.

En aucun cas la **CORDARONE** ne sera utilisée.

Le nombre des ESV ainsi que leur caractère répétitif ne constituent pas un critère de gravité.

### Caractéristiques des ESV bénignes

- Sujet le plus souvent jeune se plaignant de palpitations (jamais de syncope).
- Isolées, plus ou moins fréquentes (mais des doublets et des salves non soutenues ne sont pas exceptionnels).
- QRS modérément élargis.
- De type retard gauche/axe droit.
- Monomorphes.
- Largement voltées dans les dérivations périphériques.
- À couplage long (> 400 ms) (pas de phénomène R/T).
- S'inscrivant dans une gamme de fréquence sinusale et disparaissant à l'effort.

## EXTRASYSTOLIE VENTRICULAIRE (2)

### ESV sur cœur pathologique

Elles surviennent sur différentes cardiopathies et sont un indice de mortalité d'autant plus que la fonction ventriculaire gauche est altérée. *Le but du traitement n'est pas de supprimer à tout prix les ESV mais de réduire la mortalité.*

Les ESV graves correspondent essentiellement aux degrés 3, 4 et 5 de la classification de Lown ou à celles responsables de lipothymies ou de syncopes. Elles nécessitent un traitement antiarythmique.

#### Principes du traitement

- En ambulatoire ou en hospitalisation selon la tolérance clinique.
- Correction d'un facteur favorisant :
  - arrêt éventuel d'un traitement antiarythmique (qui est inefficace ou responsable d'un effet proarythmique) ;
  - correction des désordres hydroélectrolytiques et acido-basiques (hypokaliémie, hypomagnésémie, acidose, hypoxie) ;
  - majoration du traitement antiangineux en cas d'ischémie (symptomatique ou silencieuse).
- Traitement de la cardiopathie sous-jacente (revascularisation coronaire, etc.).
- Traitement antiarythmique : il est fonction de la cardiopathie causale, de la fraction d'éjection et des antécédents pathologiques (fonction rénale et hépatique notamment) du patient.

#### Cardiopathie ischémique

Les troubles du rythme ventriculaire sont un facteur de risque de surmortalité. Pour tant leur traitement systématique par différents antiarythmiques s'est montré inutile voire délétère.

Un traitement antiarythmique est justifié dans les cas suivants :

- patient symptomatique ;
- ESV grade 3 de Lown, ESV de grade  $\geq 3$  ;
- altération de la fonction ventriculaire gauche ;
- stimulation ventriculaire déclenchant une tachycardie ventriculaire soutenue monomorphe.

Le traitement de choix repose sur les  **$\beta$ -bloquants**, **aténolol (TÉNORMINE)** : 1 cp. à 100 mg x 1/j ou sur l'**amiodarone** en cas de dysfonction ventriculaire gauche sévère : **CORDARONE** 5 cp. à 200 mg x 1/j pendant quelques jours puis 1 à 2 cp/j. L'association **CORDARONE -  $\beta$ -bloquants** est souvent utilisée (effet bénéfique potentialisateur dans plusieurs études). Les **antiarythmiques de classe Ic** et le **sotalol** sont à éviter, notamment en cas de dysfonction ventriculaire gauche. En cas de trouble du rythme ventriculaire grave ou symptomatique sous traitement antiarythmique (à distance de tout accident ischémique aigu), on proposera un **défibrillateur implantable**.

En l'absence d'éléments de gravité, il faut respecter l'extrasystolie en tentant de maintenir les  **$\beta$ -bloquants** (diminution de la mort subite et effet anti-ischémique). Le **défibrillateur implantable** a montré une réduction de mortalité chez les patients présentant une cardiopathie ischémique avec altération de la fonction systolique (FE < 30 %) quel que soit leur niveau d'arythmie.

#### Dysplasie arhythmogène du ventricule droit

En 1<sup>re</sup> intention on utilisera un **antiarythmique de classe III**, **sotalol (SOTALEX)** : 1 cp. à 80 mg x 2/j (jusqu'à 360 mg/j). Chez les patients restant symptomatiques ou ayant présenté une mort subite, on proposera un **défibrillateur implantable**.

## EXTRASYSTOLIE VENTRICULAIRE (3)

### Myocardiopathie dilatée

L'indication d'un traitement antiarythmique est formelle en cas de troubles du rythme ventriculaire symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, la grande fréquence des troubles du rythme ventriculaire, souvent de grade de Lown élevé, rend le traitement préventif plus discutable.

On utilisera en 1<sup>re</sup> intention les  **$\beta$ -bloquants** (du fait de leur effet bénéfique sur la mortalité, cf. Insuffisance ventriculaire gauche) éventuellement en association avec la **CORDARONE**. L'initialisation du traitement  **$\beta$ -bloquant** se fera idéalement en milieu hospitalier, à distance de tout épisode de décompensation cardiaque, sous traitement diurétique et inhibiteur de l'enzyme de conversion, en débutant à faible posologie et en augmentant très progressivement, sous surveillance clinique et ECG rigoureuse.

### Myocardiopathie hypertrophique

Du fait du trouble de la fonction diastolique on utilisera en première intention les  **$\beta$ -bloquants**, **aténolol (TÉNORMINE)** : 1 à 2 cp. à 100 mg/j, ou les **inhibiteurs calciques**, **vérapamil (ISOPTINE)** : 1 gél. à 120 mg x 3/j.

Ces traitements sont parfois insuffisants :

- épisode syncopal ;
- antécédents familiaux de mort subite ;
- persistance de troubles du rythme ventriculaire graves au Holter ;
- déclenchement d'une tachycardie ventriculaire soutenue à la stimulation ventriculaire ;
- hypertrophie majeure ou persistance

d'un important gradient intraventriculaire au repos.

On leur associera alors un **antiarythmique de classe III**, **amiodarone (CORDARONE)** : 5 cp. à 200 mg x 1/j pendant quelques jours puis 1 à 2 cp./j.

**Une meilleure alternative est la mise en place d'un défibrillateur implantable.**

### Prolapsus valvulaire mitral

Un traitement antiarythmique est indiqué en présence de facteurs de risque de mort subite :

- arythmie symptomatique, *a fortiori* syncopale ;
- insuffisance mitrale importante ;
- ESV avec critères de gravité (classification de Lown) ou se majorant à l'effort ;
- antécédents familiaux de mort subite.

En l'absence d'une insuffisance mitrale significative qui nécessite une correction chirurgicale, le traitement repose sur les  **$\beta$ -bloquants**, **aténolol (TÉNORMINE)** : 1/2 à 1 cp. à 100 mg x 1/j. En cas de troubles du rythme ventriculaire graves (tachycardie ventriculaire syncopale, mort subite récupérée), la tendance est la mise en place d'un **défibrillateur implantable**.

### Surveillance

Elle repose sur la tolérance et l'efficacité du traitement. Des ECG et Holters répétés pourront être effectués. L'épreuve d'effort et/ou thallium recherchera une ischémie résiduelle. Les indications des explorations électrophysiologiques avec stimulation ventriculaire programmée seront posées en milieu spécialisé.

Il faut souligner que les **antiarythmiques** négativent inconstamment les potentiels tardifs.



## TACHYCARDIE VENTRICULAIRE (TV) (1)

### Définitions

- Tachycardie ventriculaire non soutenue (TVNS) : succession de plus de 3 complexes à une fréquence  $> 120/\text{min}$  de durée  $< 30$  s.
- Tachycardie ventriculaire soutenue (TVS) : tachycardie ventriculaire de durée  $> 30$  s.
- Rythme idio-ventriculaire accéléré (RIVA) : TV lente (fréquence entre 55 et 120/min) observée le plus souvent à la phase aiguë d'un infarctus reperfusé.

C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Son traitement comporte sa réduction et un traitement d'entretien préventif. Quelle que soit sa tolérance immédiate, il y a un risque d'aggravation brutale (défaillance hémodynamique, dégradation en fibrillation ventriculaire). Il ne faut jamais compter sur une réduction spontanée. La confirmation du diagnostic est fondamentale tant pour la conduite thérapeutique immédiate qu'à long terme. **Dans le doute, une tachycardie à complexes larges est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire.** La cardiopathie ischémique en est la première cause. La **CORDARONE** et le **choc électrique** sont efficaces tant à l'étage ventriculaire que supraventriculaire.

### Réduction

#### Mesures générales

- Hospitalisation en USIC.
- Voie veineuse de bon calibre (sérum glucosé).
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Oxygénothérapie par voie nasale : 6 L/min.

- **Défibrillateur à proximité**
- Correction des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques (dyskaliémie, hypomagnésémie, hypoxie, acidose, dyscalcémie).
- Arrêt des traitements antiarythmiques (qui sont inefficaces ou responsables d'un effet proarythmique).
- Traitement étiologique (infarctus en voie de constitution, etc.).
- Un bilan minimum est effectué en urgence (ionogramme sanguin, urée, créatinine, numération formule sanguine, plaquettes, TP, TCA, troponine, gaz du sang, radiographie pulmonaire, ECG, échocardiographie).

#### Traitement antiarythmique parentéral IV sous contrôle scope ECG

Les plus fréquemment utilisés sont :

- **antiarythmique de classe Ib, lidocaïne (XYLOCARD)** : dose de charge de 100 mg ( $\approx 5$  mL) en injection IV directe sur 2 min (1 à 1,5 mg/kg), puis relais par perfusion en IVSE de 1,5 à 4 mg/min ;
- **antiarythmique de classe III, amiodarone (CORDARONE)** : bolus de 1 à 2 amp. 150 mg en IVSE dans du G5 % (en moyenne 5 mg/kg) sur 15 à 30 min, renouvelable 2 à 3 fois/24 h puis relais par une perf. d'entretien de 10 à 20 mg/kg/j dans 250 mL de G5 % en IV (idéalement sur une voie veineuse centrale du fait de sa veino-toxicité). Faire le relais par voie orale dès le 1<sup>er</sup> j de la perf. (3 à 5 cp./j). On évitera l'utilisation successive de plusieurs **antiarythmiques** (potentialisation du risque proarythmique).

## DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES IMPLANTABLES

### Dispositifs implantables actuellement utilisés

Ils ont des fonctions :

- de stimulation cardiaque ;
- de défibrillation cardiaque ;
- de resynchronisation cardiaque.

Ces fonctions peuvent être seules ou associées entre elles si besoin, au sein du même dispositif implantable.

### Principales indications

Elles sont formelles :

– arrêt cardiaque (récupéré) par fibrillation ventriculaire ou par tachycardie ventriculaire sans cause aiguë ou réversible ;

– insuffisance cardiaque après une tachyarythmie ventriculaire soutenue ou un arrêt cardiaque récupéré quelle que soit la FEVG ;

– cardiopathie ischémique avec FEVG < 30 % en classe II ou III NYHA, au moins 1 mois après un IDM ou 3 mois après une revascularisation ;

– TV soutenue spontanée symptomatique avec cardiopathie ;

– TV soutenue spontanée mal tolérée sans cardiopathie et avec échec du traitement médical ou échec d'une ablation ;

– syncope sans cause connue avec TV soutenue ou FV déclenchable, avec cardiopathie.

D'autres indications sont moins formelles à ce jour et ne seront pas détaillées.

### Modalités

Anesthésie locale. Abord de la veine sous-clavière (droite).

Mise en place d'une sonde de défibrillation dans le ventricule droit pour un système mono-chambre. Si le système est double-chambre, une sonde de stimulation est ajoutée dans l'oreillette droite. Si le système est triple-chambre, une **sonde de « resynchronisation »** est rajoutée dans le ventricule droit au contact du ventricule gauche.

Implantation du boîtier de défibrillation sous la peau en région pectorale. Il contient les programmes et les paramètres nécessaires à la surveillance et à la détection d'anomalies du rythme cardiaque. Le boîtier de défibrillation est capable de délivrer un choc électrique de haute énergie.

Le plus souvent, couverture antibiotique anti-staphylococcique pendant 12 à 24 h.

### Complications

#### ► Précoces

- Hémithorax, pneumothorax.
- Tamponnade.
- Hématome de loge.
- Infection.
- Déplacement des sondes.
- Thrombose veineuse du membre supérieur.

#### ► Tardives

- Dysfonction.
- Usure des piles du boîtier.
- Endocardite sur sonde.
- Syndrome du « pacemaker » (asynchronisme auriculo-ventriculaire).

## TACHYCARDIE VENTRICULAIRE (TV) (2)

### Réduction par choc électrique

En cas d'échec du traitement médicamenteux ou de tachycardie ventriculaire survenant sous traitement antiarythmique, on effectuera un choc électrique externe à 200 joules après une brève anesthésie générale ou plus rarement une réduction par voie endocavitaire (montée d'une sonde dans le ventricule droit par voie veineuse fémorale sous amplificateur de brillance en salle de cathétérisme).

#### Étiologies des tachycardies à complexes larges

- Tachycardie ventriculaire.
- Tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche (fonctionnel ou non) ou préexcitation ventriculaire (Wolff-Parkinson-White).

Les manœuvres vagales, la **STRIADYNE** ou l'enregistrement endo-œsophagien permettent de préciser le diagnostic (en cas de bonne tolérance).

### Cas particuliers

#### Tachycardie ventriculaire mal tolérée

Il s'agit des situations de choc, collapsus, d'angor résistant aux thérapeutiques usuelles et d'insuffisance cardiaque sévère. On effectuera **une réduction immédiate par choc électrique externe à 200 joules** après une brève anesthésie générale. En cas d'échec, augmenter progressivement jusqu'à 400 joules. Au décours comme pour les formes bien tolérées : correction des facteurs favorisants, bilan étiologique, traitement antiarythmique par voie parentérale IV.

#### Fibrillation ventriculaire

En dehors des mesures communes à tout arrêt cardiocirculatoire, le traitement repose sur le choc électrique externe à 200 joules en extrême urgence.

#### Infarctus du myocarde à la phase aiguë

Les troubles du rythme ventriculaire sont fréquents à la phase aiguë d'un infarctus.

Ils seront traités par  **$\beta$ -bloquants IV, aténolol (TÉNORMINE)** : 1 amp. à 5 mg en IV sur 5 min éventuellement renouvelé 5 min plus tard si la fréquence cardiaque est  $> 50/\text{min}$  (en l'absence d'insuffisance cardiaque). La **lidocaïne** sera utilisée en seconde intention. Le RIVA ne justifie le plus souvent d'aucun traitement spécifique.

### Traitement d'entretien préventif

#### Traitement pharmacologique

En dehors des troubles du rythme de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë qui justifient d'un traitement par  **$\beta$ -bloquants**, un traitement antiarythmique d'entretien est indispensable en association avec celui de l'affection causale. Il est fonction de la cardiopathie sous-jacente, de la fonction ventriculaire gauche et des antécédents du patient. Cf. Extrasystolie ventriculaire.

#### Traitement non pharmacologique

Différentes méthodes sont utilisables : **défibrillateur implantable** et **ablation par radiofréquence (ARF)**.

*Les troubles du rythme à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde ne relèvent pas d'un défibrillateur implantable.*

#### Surveillance

- Clinique.
- Biologique : ionogramme sanguin, créatinémie.
- ECG, Holter cardiaque.
- Stimulation ventriculaire programmée : elle permet de guider et de surveiller l'efficacité du traitement médicamenteux. Il sera jugé efficace si elle ne permet pas le déclenchement de la tachycardie ventriculaire ou du moins le déclenchement d'une tachycardie ventriculaire lente et bien tolérée. Si le traitement médicamenteux n'évite pas le déclenchement d'une tachycardie ventriculaire, on discutera la mise en place d'un **défibrillateur implantable**.

## BRADYCARDIES - TROUBLES DE CONDUCTION (1)

Les bradycardies peuvent être liées à une dysfonction sinusale ou à un bloc auriculo-ventriculaire (BAV). De tolérance très variable, leur prise en charge comporte l'appréciation de leur tolérance avec, si besoin, pose d'une sonde d'entraînement électrosystolique temporaire (SEES), la recherche d'une étiologie éventuellement réversible et un appareillage définitif si nécessaire.

### Étiologies des bradycardies

- BAV dégénératif (maladie de Lenègre).
- Médicamenteuses : **antiarythmiques de classe Ia et Ic, digitaliques,  $\beta$ -bloquants, inhibiteurs calciques non dihydropyridines (diltiazem, vérapamil), CORDARONE**, intoxication aux imipraminiques.
- Métaboliques : hyperkaliémie, hypercalcémie.
- Infarctus du myocarde.
- Myocardites : rhumatisme articulaire aigu, diphtérie, viroses, maladie de Lyme, maladie de Chagas.
- Endocardites avec abcès du septum.
- Rétrécissement aortique calcifié serré
- Iatrogènes : **ablation par radiofréquence (ARF)**, postchirurgie cardiaque.
- Syncopes vasovagales et hypersensibilité du sinus carotidien.
- Causes rares : spondylarthrite ankylosante, collagénoses, maladie de surcharge, sarcoidose, myotonie de Steinert, postradique, tumeurs cardiaques du septum.
- Blocs auriculo-ventriculaires congénitaux.

### Prise en charge initiale

- Urgence médicale, hospitalisation en USIC.
- En cas de bloc auriculo-ventriculaire syncope, tenter un coup de poing sternal.
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Voie veineuse périphérique de bon calibre.
- O<sub>2</sub> par voie nasale 6 L/min.
- Dispositif de recueil des urines.
- Traitement étiologique :
  - arrêt des médicaments chronotropes et dromotropes négatifs ;
  - correction des troubles hydroélectrolytiques.
- Si les troubles de conduction sont mal tolérés, électroentraînement externe si l'on en dispose ou traitement tachycardi-

sant en attendant la montée d'une sonde d'entraînement :

- **anticholinergique, sulfate d'atropine (ATROPINE)** : 1 à 2 amp. à 0,5 mg en IV lente ;
- **$\beta_1$ -stimulant, isopréraline (ISUPREL)** : 5 amp. à 0,2 mg dans 250 mL de G5 % en adaptant la vitesse de perfusion de façon à obtenir une fréquence cardiaque de l'ordre de 60/min.

• Même si la bradycardie est modérée (> 40/min) et bien tolérée : test à l'**atropine** pour évaluer les possibilités d'accélération.

• **Sonde d'entraînement électrosystolique** : elle est mise en place par voie veineuse fémorale (sous anesthésie locale) en salle de cathétérisme. Son extrémité est placée à la pointe du ventricule droit en vérifiant l'obtention d'un faible seuil. La sonde est réglée en mode sentinelle à une fréquence de 60/min environ. Un traitement anticoagulant à dose efficace est impératif (risque thromboembolique). La position de la sonde sera contrôlée (radiographie pulmonaire au lit).

• Indications de l'entraînement électrosystolique temporaire :

- BAV du 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés,
- bloc bifasciculaire (BBD + HBAG ou HBPG),
- bloc de branche alternant (alternance BBD/BBG),
- bloc de branche d'apparition récente (BBD ou BBG).

Les BAV du 1<sup>er</sup> degré et les hémiblocs isolés nécessitent une surveillance rigoureuse.

### Cas particulier de l'infarctus du myocarde

Les troubles de conduction dans les infarctus inférieurs sont fréquents, haut situés (nodaux) avec un rythme d'échappement rapide. Ils sont le plus souvent rapidement réversibles et répondent en règle à l'**atropine**. Une sonde d'entraînement est rarement nécessaire.

À l'inverse, les troubles conductifs associés aux infarctus antérieurs sont graves (témoinant d'infarctus étendus), bas situés avec un rythme d'échappement le plus souvent lent et peu vigilant et donc mal tolérés.

## BÊTASTIMULANT

## ■ Isoprénaline

ISUPREL					
5 amp. dans 250 mL de G5 %, débit à adapter à la fréquence cardiaque Conservation et perfusion à l'abri de la lumière	50 amp. 0,2 mg/1 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Amine sympathomimétique  $\beta_1$ - et  $\beta_2$ -stimulante dépourvue d'effet  $\beta$ -adrénergique.

*Effet  $\beta_1$ -cardiaque* : effet chronotrope, dromotrope, bathmotrope et inotrope positif, augmentation du débit cardiaque et de la consommation myocardique en oxygène.

*Effet  $\beta_2$*  : vasodilatation artérielle systémique et pulmonaire, bronchodilatation.

Délai d'action très rapide et demi-vie brève. Élimination urinaire.

## INDICATIONS

Médicament d'urgence :

- du syndrome d'Adams-Stokes par BAV dans l'attente d'une sonde d'entraînement temporaire ou de l'implantation d'un pacemaker ;
- des bradycardies extrêmes par BSA syncopal dans l'attente d'une sonde d'entraînement temporaire ou de l'implantation d'un pacemaker ;
- de l'arrêt cardiaque lorsque l'activité cardiaque réapparaît ;
- du bas débit cardiaque après chirurgie cardiaque ;
- des torsades de pointe en cas de grande bradycardie.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **sulfites** (forme injectable).

Tachycardie sinusale > 130/min.

Hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire.

Intoxication digitale.

Hyperthyroïdie.

Insuffisance coronaire aiguë.

Cardiomyopathie obstructive et rétrécissement aortique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : déconseillé pendant les 3 premiers mois.

**Allaitement** : surveillance attentive du nouveau-né.

Monitoring cardiaque et tensionnel, surveillance de la diurèse et hémodynamique invasive en cas de bas débit.

Ne doit être utilisé en cas de collapsus qu'après restauration de la volémie.

Patient coronarien stable, diabétique ou sous **digitaliques**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions anaphylactiques (**sulfites**).

Bouffées de chaleur, céphalées, tremblements.

Hypotension artérielle.

Tachycardie.

Angor.

Troubles du rythme ventriculaire (diminuer la posologie).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Anesthésiques volatils halogénés (risque accru de troubles du rythme ventriculaire).

Antidiabétiques (élévation de la glycémie).

Incompatibilité avec les **solutés alcalins**.

## BRADYCARDIES - TROUBLES DE CONDUCTION (2)

### Prise en charge définitive : implantation d'un pacemaker

On divise les indications en trois classes :

- classe I : indication formelle ;
- classe II : indication relative ou le plus souvent admise ;
- classe III : non-indication.

#### Indications

- *Dysfonction sinusale*
  - Symptomatique (classe I).
  - Asymptomatique avec  $FC \leq 40/\text{min}$  (classe II).
- *Bloc auriculo-ventriculaire*
  - Symptomatique (classe I).
  - Complet ou du second degré asymptomatique mais avec une  $FC \leq 40/\text{min}$  (classe I).
  - Complet ou du second degré asymptomatique avec  $FC > 40/\text{min}$  (classe II).
  - Post-ablation par radiofréquence (classe I).
- *Bloc bi- ou trifasciculaire*
  - Comprenant un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré Mobitz II ou avancé symptomatique ou non (classe I).
  - Symptomatique associé à un bloc auriculo-ventriculaire complet paroxystique (classe I).
  - Asymptomatique mais associé à un bloc auriculo-ventriculaire complet paroxystique (classe II).
  - Avec un temps HV (temps de conduction hisso-ventriculaire)  $> 100 \text{ ms}$  (classe II).
- *Syncope neurocardiogénique*
  - Syncopes récidivantes ou avec pauses  $> 3 \text{ s}$  lors de la stimulation du sinus carotidien (classe I).
  - Syncopes vasovagales avec tilt-test (épreuve de bascule) positif (classe II).

#### Contre-indications

Les BAV du 1<sup>er</sup> degré et du 2<sup>e</sup> degré Mobitz I (Luciani-Wenckebach) et les dysfonctions

sinusales asymptomatiques avec une  $FC > 40/\text{min}$  ne doivent pas être appareillées.

#### Surveillance

##### Surveillance d'un patient porteur d'un pacemaker

- Clinique : signes fonctionnels, activité physique, signes d'insuffisance cardiaque, état local.
- ECG avec test à l'aimant.
- Radiographie pulmonaire.
- Surveillance électronique par le programmeur 1 mois après l'implantation puis tous les 6 mois.
- Éventuellement : Holter cardiaque, échocardiographie, épreuve d'effort.

Un **carnet de surveillance** est remis au patient comportant les principales caractéristiques du **pacemaker** et les résultats des contrôles.

Signalons l'absence de nécessité d'antibio-prophylaxie oslérienne.

##### Conseils pratiques

La vie d'un patient porteur d'un pacemaker n'est en rien limitée. Seules certaines précautions doivent être prises.

##### ► *Interférences électromagnétiques*

- Se tenir à distance des radars, des transformateurs et des émetteurs radiopuissants.

- Contre-indication à l'IRM.

- Ne pas rester de façon prolongée dans le champ des systèmes de détection anti-vol des grands magasins (passer rapidement).

- Ne pas rester de façon prolongée dans le champ des portiques de sécurité des aéroports ou des infrastructures équipées

##### ► *Contraintes mécaniques*

- Éviter l'exposition solaire prolongée de la zone implantée.

- Éviter le port de bretelles (risque d'irritation de la peau en regard du **pacemaker**).

- Éviter le port du fusil du côté implanté.

- Pas de contre-indication à la ceinture de sécurité.

**SYNCOPE ET PERTES DE CONNAISSANCE BRÈVES (1)**

Syncope : perte de connaissance complète, brutale, brève avec dissolution du tonus postural et chute, secondaire à une hypoxie cérébrale en rapport avec un effondrement transitoire du débit cardiaque, une hypotension transitoire ou une chute élective du débit cérébral.

Syncope d'Adams-Stokes : conséquence d'une brusque ischémie cérébrale secondaire à un arrêt circulatoire par pause ventriculaire prolongée ou bradycardie extrême.

**On assiste à l'épisode syncopal**

- Allonger le patient.
- S'assurer de l'existence d'une ventilation spontanée et d'une activité hémodynamique.
- Mesurer la fréquence cardiaque.
- Surélever les membres inférieurs et ôter les vêtements serrés.
- En cas de survenue en milieu hospitalier, prendre la pression artérielle et effectuer un ECG.
- En cas de suspicion d'origine cardiaque ou en l'absence d'élément d'orientation, contacter une équipe médicale mobile (réalisation d'un ECG et transfert en milieu hospitalier).
- On n'oubliera pas d'effectuer un examen clinique complet, notamment traumatologique.

**Le patient est vu à distance de l'épisode**

- Rechercher des arguments étiologiques.

**Éléments d'orientation**

- Interrogatoire du patient et de l'entourage.
- Examen clinique.
- ECG.
- Écho-Doppler cardiaque.
- Examens complémentaires selon le contexte (Holter cardiaque, exploration électrophysiologique, Doppler des vaisseaux du cou, électroencéphalogramme, scanner cérébral, voire tilt-test).

**Malaise vagal**

Secondaire à la stimulation du nerf parasymphatique (nerf vague), il associe bradycardie, vasoplégie et hypoperfusion cérébrale. Il peut aller jusqu'à la syncope. Bénin dans la très grande majorité des cas, il peut être révélateur d'une cause grave comme un infarctus du myocarde de topographie inférieure.

Certaines caractéristiques sont évocatrices : terrain anxieux, sujets émotifs, circonstances de survenue : atmosphère confinée, fièvre, douleur brutale.

**Conduite à tenir**

- Installer le patient en décubitus dorsal.
- Surélever les membres inférieurs.
- Ôter les vêtements serrés (chemise, cravate).
- En cas de malaise vagal se prolongeant :
  - **anticholinergique, sulfate d'atropine (ATROPINE)** : 0,5 mg en IV ou SC ;
  - remplissage vasculaire par **soluté macromoléculaire** : **VOLUVEN** 250 à 500 mL sur 30 min en perfusion IV ;
  - discuter l'hospitalisation.

## ANTICHOLINERGIQUE

## ■ Sulfate d'atropine

ATROPINE SULFATE AGUETTANT					
0,5 à 1 mg en SC, IM ou IV lente chez l'adulte	10 amp. 0,25 mg/1 mL		I	NR	
	10 amp. 0,5 mg/1 mL		I	NR	
	10 amp. 1 mg/1 mL		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

Anticholinergique compétitif s'opposant aux effets muscariniques de l'acétylcholine : effet tachycardisant, antispasmodique au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies biliaires et urinaires, ralentissement de la vidange gastrique, diminution des sécrétions gastriques, salivaires, lacrymales et sudorales. Élimination urinaire rapide.

## INDICATIONS

Pré-anesthésie : protection des manifestations vagales à l'induction de l'anesthésie.  
Bloc auriculoventriculaire ou atrioventriculaire.  
Prévention et traitement des blocs auriculoventriculaires et des bradycardies sinusales dans l'IDM.

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës d'origine spasmodique au niveau des voies urinaires, biliaires et du tube digestif.

Antidote spécifique des intoxications aiguës par les anticholinestérasiques (insecticides organophosphorés et carbamates) ou par les médicaments parasymphaticomimétiques.

## CONTRE-INDICATIONS

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.  
Troubles uréthro-prostatiques avec risque de rétention urinaire.

## Allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Grossesse : pas d'embryo-fœtototoxicité mais risque d'iléus méconial en fin de grossesse.

Enfant : ne doit être utilisé qu'exceptionnellement (posologie adaptée à l'âge).

Iléus paralytique, atonie intestinale du sujet âgé, mégacolon toxique.

Hypertrophie prostatique.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Insuffisance coronaire, troubles du rythme.

Hyperthyroïdie.

Bronchite chronique (accroissement de la viscosité des sécrétions bronchiques).

Conducteurs et utilisateurs de machines.

Ne doit pas être mélangé à d'autres médicaments au moment de l'emploi.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Sécheresse buccale, diminution des sécrétions lacrymales, épaississement des sécrétions bronchiques.

Mydriase et troubles de l'accommodation, augmentation de la pression intra-oculaire.

Constipation.

Rétention d'urine.

Tachycardie, palpitations, irritabilité.

Surdosage : syndrome confusionnel, délire et dépression respiratoire (traitement par **néostigmine**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Majoration des effets atropiniques avec les autres **anticholinergiques** : **antiparkinsoniens**, **antispasmodiques**, **antidépresseurs** imipraminiques, **antipsychotiques** phénothiaziniques, **antihistaminiques** H<sub>1</sub> et **disopyramide**.



**SYNCOPE ET PERTES DE CONNAISSANCE BRÈVES (2)****Principales causes de syncope**

CAUSES CARDIAQUES	CHUTE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE	CAUSES MÉTABOLIQUES	CAUSES NEUROLOGIQUES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiopathies obstructives : rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive, myxome de l'oreillette</li> <li>- Troubles du rythme (supraventriculaire et ventriculaire) et de conduction paroxystiques (blocs auriculo-ventriculaires et dysfonctions sinusales)</li> <li>- Hypertension artérielle pulmonaire primitive, embolie pulmonaire, tamponnade</li> <li>- Cardiopathies congénitales (tétralogie de Fallot, rétrécissement pulmonaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syncope vaso-vagale</li> <li>- Hypersensibilité du sinus carotidien</li> <li>- Syncopes réflexes (mictionnelle, post-prandiale, ictus laryngé)</li> <li>- Hypotension orthostatique</li> <li>- Hypovolémie</li> <li>- Altération des débits locaux (sténoses vasculaires cérébrales, vol sous-clavier, insuffisance vertébro-basilaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypoglycémie</li> <li>- Hyperventilation</li> <li>- Hypoxémie</li> <li>- Toxiques (alcool, stupéfiants, monoxyde d'azote)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumeurs cérébrales</li> <li>- Accidents vasculaires cérébraux</li> <li>- Crises comitiales</li> <li>- Migraines</li> <li>- Narcolepsie</li> </ul>

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (1)

### Définition (OMS)

L'HTA se définit par des chiffres de pression artérielle systolique  $\geq 140$  mmHg et/ou diastolique  $\geq 90$  mmHg constatés par le même opérateur à l'aide d'un brassard adapté au morphotype du patient, lors d'au moins 2 consultations, sur 2 mesures au cours de chaque visite.

NB : Un brassard trop serré surestime la pression artérielle alors qu'un brassard trop lâche la sous-estime.

La prévalence de l'HTA est évaluée à 30 % de la population adulte et augmente avec l'âge (50 % après 65 ans).

### Classification de la pression artérielle et de l'HTA chez l'adulte au cabinet médical

Mesures en position assise après 5 min de repos	PAS (mmHg) et/ou	PAD (mmHg)
PA optimale	< 120	< 80
PA normale	120-129	80-84
PA normale haute	130-139	85-89
HTA légère (grade 1)	140-159	90-99
HTA modérée (grade 2)	160-179	100-109
HTA sévère (grade 3)	$\geq 180$	$\geq 110$
HTA systolique isolée	$\geq 140$ et	< 90

### Définitions de l'HTA en dehors du cabinet médical

Les mesures tensionnelles en dehors du cabinet médical sont clairement préconisées dans les dernières recommandations. Elles peuvent apporter des informations complémentaires importantes pour d'une part confirmer ou infirmer un diagnostic d'HTA, et d'autre part suivre un patient hypertendu traité.

### Définitions de l'HTA en dehors du cabinet médical

	PAS (mmHg) et/ou	PAD (mmHg)
Mesure ambulatoire (période d'éveil)	$\geq 135$	$\geq 85$
Mesure ambulatoire (période de sommeil)	$\geq 120$	$\geq 70$
Mesure ambulatoire sur 24 h	$\geq 130$	$\geq 80$
Automesure tensionnelle sur 3 j	$\geq 135$	$\geq 85$

## INHIBITEURS CALCIQUES NON DIHYDROPYRIDINES (1)

## ■ Diltiazem

<b>TILDIEM</b>					
Angors* : 1 cp. x 3/j (max : 360 mg/j) Prévention de l'ischémie myocardique en péri-opératoire chez des coronariens lors d'une chirurgie non cardiaque sous anesthésie générale : inj. en IVD sur 2 min de 0,15 mg/kg 30 min avant l'induction, puis perfusion IV continue de 0,2 à 0,3 mg/kg/h Crise de tachycardie jonctionnelle : 0,25 mg à 0,3 mg/kg en IVD sur 2 min	30 cp. 60 mg 20 fl. 25 mg (pdre pour sol. inj. IV) 20 fl. 100 mg (pdre pour sol. inj. IV)	4,10 HOP  HOP	I I  I	65 %	0,14
<b>BI-TILDIEM</b>					
Angor stable ou d'effort : 1 cp. 90 mg x 2/j Angor d'effort ou spontané : 1 cp. 120 mg x 2/j	28 cp. LP 90 mg  28 cp. LP 120 mg	10,74  11,83	I  I	65 %  65 %	0,38  0,42
<b>MONO-TILDIEM LP</b>					
HTA, angor stable : 1 gél. 200 ou 300 mg/j à heure fixe Ne pas ouvrir ni croquer	28 gél. LP 200 mg	17,18	I	65 %	0,61
	50 gél. LP 200 mg	HOP	I		
	84 gél. LP 200 mg	48,38	I	65 %	0,58
	28 gél. LP 300 mg	17,31	I	65 %	0,62
	50 gél. LP 300 mg	HOP	I		
	84 gél. LP 300 mg	48,76	I	65 %	0,58

## ■ Vérapamil

<b>ISOPTINE</b>					
Angor et tachycardie supraventriculaire : 1 à 2 cp. x 3/j 1 gél. x 2/j  HTA : 1 cp. LP le matin	75 cp. 40 mg  30 gél. 120 mg 90 gél. 120 mg 30 cp. séc. LP 240 mg 90 cp. séc. LP 240 mg	4,12  4,05 10,99 6,47 18,17	I  I I I I	65 %  65 % 65 % 65 %	0,05  0,14 0,12 0,22 0,20

Angors : angor stable, angor d'effort, angor spontané, angor de Prinzmetal.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (2)****Intérêts du traitement antihypertenseur [1]**

L'objectif principal de la prise en charge d'un patient hypertendu est de réduire sa morbi-mortalité cardiovasculaire à long terme. L'évaluation et la correction des autres facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'HTA sont également indispensables (âge, tabac, surpoids, hyperlipidémie, diabète, sédentarité, hérédité cardiovasculaire).

La normalisation prolongée de la pression artérielle réduit de façon très significative l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale et à moindre degré des accidents ischémiques coronaires.

La normalisation de la pression artérielle sous traitement :

- nécessite un bon respect des règles d'hygiène de vie alimentaire et physique ;
- nécessite la correction des facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'HTA ;
- nécessite le plus souvent un traitement au long cours ;
- nécessite une bonne tolérance du traitement ;
- nécessite une bonne observance du traitement ;
- nécessite une surveillance médicale régulière.

Les dernières recommandations françaises recommandent une consultation dédiée à l'annonce du diagnostic d'HTA.

**Règles hygiéno-diététiques (RHD) [1]****Restriction sodée**

- La restriction sodée est modérée et un régime comportant 6 g de sel par jour est suffisant.
- Éviter les excès de fruits de mer, poissons fumés, plats préparés, conserves, charcuteries et ne pas saler à nouveau les plats à table.

**Éviter un excès de poids**

- La perte de poids fait baisser la pression artérielle.
- Consultation diététique pour mettre au point un régime adapté au patient.

**Réduire la consommation d'alcool et de glycyrrhizine**

- Le sevrage alcoolique fait baisser la pression artérielle. Ne pas dépasser 2 verres de vin ou de bière par jour avec 1 j d'abstinence par semaine.
- Éviter la consommation de réglisse et de pastis sans alcool.

**Activité physique régulière**

- La pratique régulière d'exercice physique fait baisser la pression artérielle (marche, jogging, natation).
- Il est recommandé au moins 30 min de marche soutenue 3 fois/sem.
- Supprimer les stress excessifs.

**Arrêt du tabac****Évaluation initiale standard de tout patient hypertendu**

- Anamnèse, examen clinique.
- Recherche dans les urines par bandelettes réactives ou au laboratoire et d'une microalbuminurie ou d'une protéinurie (recherche d'un retentissement rénal).
- Dans le sang : kaliémie (recherche d'une hypokaliémie suggérant un hyperaldostéronisme primaire), créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, glycémie, uricémie, hémoglobine et/ou hématoците.
- Profil lipidique : cholestérol total avec les fractions LDL et HDL, triglycérides.
- Électrocardiogramme (recherche de troubles du rythme, de signes d'ischémie myocardique, d'hypertrophie ventriculaire gauche).

## INHIBITEURS CALCIFIQUES NON DIHYDROPYRIDINES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

**Diltiazem** : inhibiteur calcique sélectif du canal calcique lent au niveau de la fibre musculaire myocardique et de la fibre musculaire lisse des vaisseaux.

- Effets inotrope négatif et bradycardisant modérés.
- Effet antiarythmique au niveau jonctionnel.
- Effet antiangineux en augmentant le débit coronaire par diminution des résistances.
- Effet antispastique coronaire.

**Vérapamil** : cf. *Antiarythmiques de classe IV*.

### INDICATIONS

HTA : **diltiazem** formes LP 200 ou 300 mg, **vérapamil** formes 120 mg et LP 240 mg.

Traitement préventif des crises d'angine de poitrine :

- angor stable, d'effort, spontané, Prinzmetal : **diltiazem** formes 60 mg ;
- angor stable, angor d'effort : **diltiazem** formes LP 90 ou 120 mg.

Prévention de l'ischémie myocardique au cours de l'anesthésie générale de patients coronariens pour interventions non cardiaques, pendant les périodes péri- et postopératoire chez des malades recevant antérieurement un traitement oral antiangineux : **diltiazem** injectable 25 et 100 mg.

Traitement de la crise de tachycardie jonctionnelle paroxystique : **diltiazem** injectable 25 mg.

### CONTRE-INDICATIONS

**Diltiazem** (toutes formes) : dysfonctionnement sinusal ; blocs auriculo-ventriculaires de degrés II et III non appareillés ; insuffisance ventriculaire gauche avec signes congestifs.

En plus pour **MONO-TILDIEM LP 300** : bradycardie sévère  $\leq 40/\text{min}$ .

En plus pour **diltiazem** forme injectable : fibril-

lations ou flutters auriculaires avec syndromes de préexcitation ventriculaire surtout si la période réfractaire de la voie accessoire est courte ; hypotension artérielle avec hypovolémie et/ou insuffisance cardiaque, choc cardiogénique, association à la **CORDARONE**.

**Grossesse, allaitement.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### **Diltiazem**

- Utiliser prudemment et surveiller en cas de bradycardie ou de BAV du 1<sup>er</sup> degré.
- Pas de précaution en cas de bloc de branche isolé.
- Respecter les contre-indications et les précautions d'emploi et surveiller attentivement (fréquence cardiaque, ECG) chez les sujets âgés, insuffisants rénaux ou hépatiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### **Diltiazem**

- Les plus fréquents : bradycardie sinusale, bloc sino-auriculaire, bloc auriculo-ventriculaire, œdèmes des membres inférieurs, érythèmes simples, urticaires localisées, rarement érythèmes desquamatifs  $\pm$  fébriles réversibles.
- Rares et transitoires : asthénie, somnolence, céphalées, insomnie, vertiges, troubles digestifs (dyspepsie, constipation, diarrhée), élévation des transaminases.

Exceptionnelles hépatites cliniques.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

#### **Diltiazem**

- Associations contre-indiquées : **dan-trolène IV**.
- Associations déconseillées : **esmolol**, **anti-arythmiques**.
- Associations avec précautions d'emploi :  $\alpha_1$ -bloquants, amiodarone,  $\beta$ -bloquants, ciclosporine, carbamazépine, midazolam IV, rifampicine, baclofène, imipraminiques, corticoïdes, antipsychotiques.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (3)

### Classification des antihypertenseurs [1]

#### Diurétiques

- Leur action antihypertensive est liée à une déplétion sodée.
- Les **diurétiques thiazidiques** et apparentés (**ESIDREX**, **FLUDEX**) sont puissants, hypokaliémiants et restent actifs jusqu'à une clairance de la créatinine de 30 mL/min. Ils sont très souvent prescrits dès qu'une bithérapie est indiquée et souvent en association fixe sous forme d'un seul comprimé qui contient également une 2<sup>e</sup> molécule.
- Les **diurétiques** épargneurs de potassium (**ALDACTONE**, **MODAMIDE**) sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale.
- Les **diurétiques de l'anse** (**LASILIX**, **BURINEX**) sont très puissants, hypokaliémiants et doivent être prescrits dans l'hypertension artérielle seulement si celle-ci est associée à une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min).

#### Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

- Ils réduisent les concentrations plasmatiques d'angiotensine II et d'aldostérone et augmentent la concentration de bradykinine.
- La principale cause d'arrêt du traitement est l'apparition d'une toux.
- En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être adaptée à la clairance de la créatinine, mais elle ne constitue pas une contre-indication.

#### Antagonistes du récepteur de l'angiotensine II (ARA II)

Leur efficacité est comparable à celle des **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** mais du fait de l'absence d'élévation de bradykinine, cette classe n'entraîne pas de toux ni d'œdème angioneurotique.

#### Inhibiteurs calciques

- Ils réduisent le tonus vasoconstricteur calcium-dépendant des fibres musculaires lisses artériolaires.
- Les **dihydropyridines** n'ont pas de contre-indication vraie en dehors de la grossesse. Leur utilisation peut être limitée par des céphalées, flushs, palpitations et œdèmes des membres inférieurs.
- Les **non-dihydropyridines** (**diltiazem** et **vérapamil**) sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque décompensée et de bloc auriculo-ventriculaire. Leur association aux **β-bloquants** est classiquement déconseillée (risque de bradycardie).

#### Bêta-bloquants

- Leur action antihypertensive est liée à la réduction du tonus β-adrénargique et à la diminution de la sécrétion de rénine.

Ils sont particulièrement indiqués en cas de tachycardie de repos, d'angor et/ou de cardiopathie ischémique associée.

- Leur utilisation peut être limitée par leurs effets secondaires.

#### Inhibiteur direct de la rénine

L'efficacité de l'**aliskirène** (**RASILEZ**) 1 cp. (150 mg)/j est comparable à celle des **antagonistes de l'angiotensine II** avec cependant une action inhibitrice plus complète du système rénine-angiotensine-aldostérone.

#### Alphabloquants

Le risque d'hypotension orthostatique au début du traitement impose une adaptation très progressive des doses.

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- Ils sont bien tolérés sur le plan biologique.
- Une déplétion sodée associée est nécessaire.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (1)

## ■ Nifédipine

<b>ADALATE</b>					
Angor Prinzmetal : 1 caps. x 4/j dont 1 le soir au coucher Angor stable : 1 caps. x 3/j associée à un <b><math>\beta</math>-bloquant</b> (max : 60 mg/j) HTA : 1 cp. LP 20 mg x 2/j sans croquer	30 caps. 10 mg	2,93	I	65 %	0,10
	90 caps. 10 mg	6,41	I	65 %	0,07
	30 cp. LP 20 mg	3,96	I	65 %	0,13
	180 cp. LP 20 mg	20,04	I	65 %	0,11
<b>CHRONADALATE LP</b>					
HTA : 1 cp./j le matin à heure fixe Angor stable : 1 à 2 cp./j en 1 prise associés à un <b><math>\beta</math>-bloquant</b>	30 cp. LP 30 mg	8,99	I	65 %	0,30
	90 cp. LP 30 mg	25,29	I	65 %	0,28
	100 cp. LP 30 mg	HOP	I		

## ■ Amlodipine

<b>AMLOR</b>					
HTA et angors (stable, d'effort, spontané, de Prinzmetal) : 5 mg/j puis jusqu'à 10 mg/j en 1 seule prise le matin	30 gél. 5 mg	8,21	I	65 %	0,27
	90 gél. 5 mg	23,10	I	65 %	0,26
	30 gél. 10 mg	8,21	I	65 %	0,27
	90 gél. 10 mg	23,10	I	65 %	0,26

## ■ Amlodipine + atorvastatine

<b>CADUET</b>					
HTA + hypercholestérolémie 1 cp./j	30 cp. 5 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 5 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	62,80	I	65 %	0,70
	30 cp. 10 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 10 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	62,80	I	65 %	0,70

## ■ Nicardipine

<b>LOXEN</b>					
<b>LOXEN 20 mg</b> HTA : 1 cp. x 3/j avant chaque repas. Max : 90 mg/j	30 cp. séc. 20 mg	5,31	I	65 %	0,18
	90 cp. séc. 20 mg	13,96	I	65 %	0,16
<b>LOXEN 50 mg LP</b> HTA : 1 gél. matin et soir avant les repas <b>LOXEN injectable</b> Réservé à l'urgence hypertensive : - effet rapide : 2,5 mg en IVD à renouveler après 10 min si besoin jusqu'à une dose cumulée de 10 mg - effet progressif : 8 à 15 mg/h en perfusion IV sur 30 min - dans les 2 cas, relais si besoin par perfusion IV continue : 2 à 4 mg/h avec adaptation des doses par paliers de 0,5 mg/h. Relais possible par voie orale	60 gél. LP 50 mg	15,36	I	65 %	0,26
	180 gél. LP 50 mg 5 amp. 10 mg/10 mL	43,24	I	65 %	0,24
			I	NR	

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (4)

### Vasodilatateurs directs

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- La **dihydralazine (NEPRESSOL)** n'est utilisée que dans certaines pré-éclampsies mettant en jeu le pronostic vital. Elle devra être associée à un  **$\beta$ -bloquant** du fait de son effet tachycardisant.
- Le **minoxidil** est réservé aux rares cas d'HTA résistante à une polythérapie. Il peut provoquer un hirsutisme et une rétention sodée et doit donc être associé à un **diurétique**.

### Antihypertenseurs centraux

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- Ils diminuent le tonus sympathique vasoconstricteur.
- Hypotension orthostatique, nausées, sécheresse de la bouche, asthénie, somnolence et tendance dépressive sont les principaux effets secondaires.

### Quand prescrire un antihypertenseur ? [1]

Pour débuter un traitement antihypertenseur, il faut s'assurer que l'HTA soit :

- **permanente**, c'est-à-dire vérifiée lors de plusieurs examens (au moins 2). Les recommandations proposent à cette étape diagnostique de réaliser une mesure ambulatoire de la pression artérielle pendant 24 h (MAPA) ou une automesure ten-

sionnelle bien menée sur 3 jours, pour confirmer l'HTA ;

- **persistante** malgré des règles hygiéno-diététiques bien suivies.

La décision du traitement antihypertenseur se fonde sur :

- les chiffres tensionnels ;
- l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire associés (cf. Encadré) ;
- l'atteinte infraclinique des organes cibles (AOC) (hypertrophie ventriculaire gauche, microalbuminurie de 30 à 300 mg/24 h) ;
- l'existence de pathologies associées/complications (coronaropathie, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, rétinopathie, insuffisance rénale chronique, artérite des membres inférieurs) ;
- l'évaluation du risque cardiovasculaire global du patient (faible, modéré, élevé, très élevé ; cf. Tableau) :
  - quand le risque est faible : RHD pendant 6 mois. Traitement pharmacologique si l'objectif n'est pas atteint,
  - quand le risque est modéré : RHD pendant 1 à 3 mois. Traitement pharmacologique si l'objectif n'est pas atteint,
  - quand le risque est élevé à très élevé : RHD et traitement pharmacologique d'emblée,
  - pour des PAS à 130-139 mmHg et des PAD à 85-89 mmHg, des RHD sont recommandées sans traitement pharmacologique, quel que soit le niveau de risque.

### Facteurs de risque (ou FDR) cardiovasculaire

- Sexe masculin
- Âge ( $\geq 55$  ans chez l'homme et  $\geq 65$  ans chez la femme)
- Tabagisme
- Antécédents familiaux d'accident cardiovasculaire précoce : avant l'âge de 55 ans chez l'homme et avant l'âge de 65 ans chez la femme
- Diabète
- Dyslipidémie : LDL-cholestérol  $\geq 1,60$  g/L (4,1 mmol/L), HDL-cholestérol  $\leq 0,40$  g/L (1 mmol/L) quel que soit le sexe.

### Autres paramètres à prendre en compte lors de la prise en charge du patient hypertendu :

- Obésité abdominale (périmètre abdominal  $> 102$  cm chez l'homme et 88 cm chez la femme) ou obésité (IMC  $> 30$  kg/m<sup>2</sup>)
- Sédentarité (absence d'activité physique régulière, soit environ 30 min, 3 fois/sem.)
- Consommation excessive d'alcool ( $> 3$  verres de vin/j chez l'homme et 2 verres/j chez la femme)



## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (2)

## ■ Félodipine

<b>FLODIL LP</b>					
HTA, angor stable : 5 mg/j puis jusqu'à 10 mg/j en 1 seule prise le matin Posologie réduite à 5 mg/j chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique sévère	30 cp. LP 5 mg	10,36	I	65 %	0,35
	90 cp. LP 5 mg	21,77	I	65 %	0,24

## ■ Isradipine

<b>ICAZ LP</b>					
HTA : 5 mg/j en 1 prise le matin Débuter à 2,5 mg/j chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique	30 gél. LP 2,5 mg	13,35	I	65 %	0,45
	90 gél. LP 2,5 mg	37,59	I	65 %	0,42
	30 gél. LP 5 mg	17,45	I	65 %	0,58
	90 gél. LP 5 mg	49,14	I	65 %	0,55

## ■ Lacidipine

<b>CALDINE</b>					
HTA : 4 mg/j puis jusqu'à 6 mg/j en 1 prise le matin. Posologie réduite à 2 mg/j chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique	30 cp. 2 mg	13,73	I	65 %	0,46
	90 cp. 2 mg	38,67	I	65 %	0,43
	30 cp. 4 mg	23,57	I	65 %	0,79
	90 cp. 4 mg	66,44	I	65 %	0,74

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (5)

### Stratification du niveau de risque cardiovasculaire de décès à 10 ans\*

Autres FDR, AOC ou maladie	Normale haute PAS 130-139 mmHg ou PAD 85-89 mmHg	HTA grade 1 PAS 140-159 mmHg ou PAD 90-99 mmHg	HAT grade 2 PAS 160-179 mmHg ou PAD 100-109 mmHg	HTA grade 3 HT PAS ≥ 180 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg
0 FDR		Risque faible	Risque modéré	Risque élevé
1-2 FDR	Risque faible	Risque modéré	Risque modéré à élevé	Risque élevé
≥ 3 FDR	Risque faible à modéré	Risque modéré à élevé	Risque élevé	Risque élevé à très élevé
AOC, IRC stade 3 ou diabète	Risque modéré à élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé à très élevé
Maladie cardiovasculaire avérée, IRC stade ≥ 4, diabète avec AOC ou FDR	Risque très élevé	Risque très élevé	Risque très élevé	Risque très élevé

### Comment prescrire un antihypertenseur ? [1]

La prescription doit se faire par étapes.

- **Étape 1 :** le choix thérapeutique de première intention est soit une monothérapie soit une association fixe à faible dose. La monothérapie se choisit parmi les **diurétiques**, les **inhibiteurs calciques**, les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)**, les **antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)** et les **bêta-bloquants**. La meilleure observance est observée avec les **ARA II** probablement grâce à leur très bonne tolérance. La bithérapie peut être préconisée dès l'étape 1 chez les patients à haut risque cardiovasculaire ou avec une HTA particulièrement élevée (grade 3 par exemple). La bithérapie peut s'avérer plus rapidement efficace et entraîner parfois moins d'effets indésirables.

- **Étape 2 :**
  - si l'objectif est atteint et la tolérance bonne après 4 sem. : on poursuit le traitement ;
  - si après 4 sem., il n'y a pas de réponse (baisse de la PAS < 10 % de la PAS initiale) ou s'il existe des effets secondaires gênants : changer de classe thérapeutique ;

- si après 4 sem., la réponse est insuffisante (baisse de la PAS > 10 % de la PAS initiale mais persistance de la PA au-dessus des objectifs) et la tolérance est bonne : bithérapie plus volontiers qu'une augmentation des doses.

- **Étape 3 :**

- si après cette 2<sup>e</sup> étape, l'objectif est atteint après 4 sem. : on poursuit le traitement ;
- si après cette 2<sup>e</sup> étape, la réponse est insuffisante après 4 sem. : trithérapie (dont un **diurétique thiazidique** en l'absence d'insuffisance rénale).

- **Étape 4 :** si après cette 3<sup>e</sup> étape, l'objectif n'est pas atteint après 4 sem., l'HTA est possiblement résistante : rechercher une HTA secondaire et traitement par multi-thérapie en milieu spécialisé.

L'augmentation des doses n'aboutit pas systématiquement à une augmentation de l'efficacité.

Le rapport efficacité/tolérance clinique et biologique du traitement peut être meilleur avec une bithérapie qu'avec une monothérapie maximale.

\* FDR : facteur de risque ; AOC : atteinte des organes cibles ; IRC : insuffisance rénale chronique.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (3)

## ■ Nitrendipine

<b>NIDREL</b>					
HTA : 20 mg/j en 1 prise Débuter à 10 mg/j chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique	28 cp. 10 mg	8,40	I	65 %	0,30
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	25,21	I	65 %	0,28
	28 cp. 20 mg	14,29	I	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	43,04	I	65 %	0,48
<b>BAYPRESS</b>					
Idem <b>NIDREL</b>	30 cp. 10 mg	8,96	I	65 %	0,30
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	30 cp. 20 mg	15,28	I	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	43,04	I	65 %	0,48

## ■ Lercanidipine

<b>LERCAN</b>					
HTA : 1 cp. le matin	30 cp. 10 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 10 mg	36,96	I	65 %	0,41
	30 cp. 20 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 20 mg	36,96	I	65 %	0,41
<b>ZANIDIP</b>					
HTA : 1 cp. le matin	30 cp. 10 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 10 mg	36,96	I	65 %	0,41
	30 cp. 20 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 20 mg	36,96	I	65 %	0,41

## ■ Manidipine

<b>IPERTEN</b>					
Posologie initiale : 10 mg/j pendant 2 à 4 sem. puis 20 mg/j si besoin	30 cp. 10 mg	12,50	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,19	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	12,50	I	65 %	0,42
	90 cp. 20 mg	35,19	I	65 %	0,39

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (6)

### Quel antihypertenseur choisir ? [1]

L'efficacité des différentes classes d'anti-hypertenseurs ( **$\beta$ -bloquant**, **IEC**, **ARA II**, **diurétique**, **IC**) étant sensiblement égale dans l'HTA essentielle modérée (forme la plus fréquente), le choix est guidé par l'acceptabilité et la tolérance du médicament en fonction de l'âge, de l'état général et de l'existence de pathologies associées.


• On peut s'aider des « paniers » thérapeutiques :

- panier 1 :  **$\beta$ -bloquant**, **IEC**, **ARA II** ;
- panier 2 : **diurétique**, **IC**.

• Quand on instaure une monothérapie (du panier 1 ou 2) s'avérant inefficace et/ou mal tolérée, il est logique de passer à une molécule de l'autre panier.

• Quand on instaure une bithérapie, il est logique de choisir une molécule dans chaque panier (cf. Figure).

### Association de classes thérapeutiques favorisant la baisse tensionnelle



• Dans l'HTA systolique du sujet âgé et dans l'HTA du sujet noir, les molécules du panier 2 se révèlent les plus efficaces et peuvent être associées entre elles si besoin. Les molécules du panier 1 ne constituent pas pour autant une contre-indication.

• Les associations préférentielles recommandées sont :

- **inhibiteur calcique** et **IEC** (ou **ARA II**) ;
- **diurétique thiazidique** et **IEC** (ou **ARA II**) ;
- **inhibiteur calcique** et **diurétique thiazidique** ;
- **bêtabloquant** et **diurétique thiazidique** (à noter que cette association augmente le risque de diabète) ;

– **bêtabloquant** et **inhibiteur calcique dihydropyridine**.

• La trithérapie préférentielle est un **diurétique thiazidique** + bloqueur du système rénine/angiotensive (**IEC** ou **ARA II**) + **inhibiteur calcique**.

• Les autres classes d'antihypertenseurs (**alphabloquants**, **vasodilatateurs** et **anti-hypertenseurs centraux**) n'ayant pas démontré leur efficacité sur la morbi-mortalité cardiovasculaire ne sont pas recommandées, mais peuvent aider à atteindre l'objectif tensionnel en cas d'effets secondaires des autres thérapeutiques ou à compter du stade de quadrithérapie.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (4) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs calciques sélectifs du canal calcique lent de la famille des dihydropyridines. Action prédominante au niveau vasculaire avec un effet vasodilatateur artériel (périphérique et coronaire) très puissant supérieur à celui des non dihydropyridines.

Diminution de la pression artérielle par diminution des résistances périphériques totales.

Augmentation des apports en O<sub>2</sub> au myocarde normal et ischémique.

Effet antispastique coronaire.

Pas d'effet inotrope négatif notable *in vivo* mais existe *in vitro*.

Pas d'effet bradycardisant.

## Durée d'action des différents produits

Nifédipine (caps. 10 mg)	6 h
Nifédipine (LP 20 mg)	12 h
Nifédipine (LP 30 mg)	24 h
Nicardipine (cp. 20 mg)	8 h
Nicardipine (LP 50 mg)	12 h
Amlodipine, félodipine, isradipine, lacidipine	24 h
Nitrendipine	12 à 24 h

## INDICATIONS

Hypertension artérielle (tous).

Prévention des crises d'angine de poitrine :

– angor stable, angor d'effort : **ADALATE** 10 mg, **CHRONADALATE LP** 30 mg, **AMLOR**, **FLODIL LP** ;

– angor spontané, angor de Prinzmetal : **ADALATE** 10 mg, **AMLOR**.

Traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud : **ADALATE** 10 mg.

Poussée hypertensive en milieu médical et en période postopératoire : **LOXEN injectable**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux dihydropyridines.

IDM de moins de 1 mois, angor instable : **ADALATE** 10 mg, **CHRONADALATE LP** 30 mg, **LOXEN** 20 mg.

Chez l'enfant en l'absence de données cliniques : **ICAZ LP**, **AMLOR**, **FLODIL LP**.

Altération marquée de la fonction ventriculaire gauche : **CALDINE**.

Grossesse et allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Des données récentes indiquent que les formes à libération immédiate peuvent s'accompagner

à fortes posologies d'un risque accru d'événements coronariens graves chez des patients coronariens.

**Nifédipine** : utiliser avec prudence en cas d'hypovolémie, de collapsus, de choc cardiogénique, de dysfonctionnement sinusal, d'anomalie de la conduction. À administrer avec précaution en cas d'insuffisance hépatique.

**Nicardipine injectable** : associer un  $\beta$ -bloquant chez les coronariens.

**Amlodipine** : à utiliser prudemment chez l'insuffisant hépatique. En cas d'asthénie, d'anorexie, de nausées tenaces, doser les enzymes hépatiques ; en cas d'augmentation ou d'ictère, arrêter le traitement.

**Isradipine** : à utiliser prudemment en cas de dysfonctionnement sinusal non appareillé.

Réduire la posologie chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets communs :

– bouffées vasomotrices, céphalées (apparition en début de traitement puis atténuation) ;  
– œdèmes des chevilles et/ou de la face (dose-dépendants) ;

– plus rarement : tachycardie, palpitations, éruptions prurigineuses eczématiformes ou urticariennes, asthénie, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, dyspepsie, nausées, gastralgies. Chez les coronariens, douleurs angineuses très rares mais imposant l'arrêt du traitement (vol coronaire). Risque d'élargissement gingival sur une gingivite/parodontite (hygiène buccale soignée).

Effets spécifiques :

– **amlodipine** : crampes musculaires, paresthésies, tremblements, dyspnée, dysgueusie, atteinte hépatique exceptionnelle réversible ;  
– **nifédipine** : atteinte hépatique exceptionnelle réversible ;  
– **lacidipine, nitrendipine** : polyurie transitoire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **dantrolène IV**, **ciclosporine**.

Associations avec précautions :  $\alpha_1$ -bloquants, **baclofène**, **cimétidine**, **itraconazole**, **phénytoïne**, **rifampicine**, **vasodilatateurs**.

Associations à prendre en compte : **imipraminiques**, **corticoïdes**, **antipsychotiques**.

Association synergique et bénéfique avec les  **$\beta$ -bloquants**.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (7)

### Choix du traitement en fonction de la forme clinique

FORME CLINIQUE	CLASSES THÉRAPEUTIQUES PRÉFÉRENTIELLES
HTA non compliquée	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Diurétique thiazidique</b></li> <li>– <b>IEC</b></li> <li>– <b>ARA II</b></li> <li>– <b>Inhibiteur calcique (dihydropyridine)</b></li> <li>– <b>Bêtabloquant</b></li> </ul>
HTA du sujet âgé, HTA systolique	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Diurétique thiazidique</b></li> <li>– <b>Inhibiteur calcique dihydropyridine</b> de longue durée d'action</li> </ul>
Néphropathie diabétique (type 1 ou 2) à partir du stade de microalbuminurie Néphropathie non diabétique	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>IEC</b> ou <b>ARA II</b></li> <li>– <b>Diurétique thiazidique</b></li> <li>– <b>Diurétique de l'anse</b> (si IR sévère)</li> </ul>
Insuffisance coronaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Bêtabloquant</b></li> <li>– <b>Inhibiteur calcique</b> de longue durée d'action</li> </ul>
Antécédent d'IDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Bêtabloquant</b></li> <li>– <b>IEC</b></li> <li>– <b>ARA II</b></li> </ul>
Insuffisance cardiaque systolique	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Diurétiques</b></li> <li>– <b>IEC</b> (1<sup>re</sup> intention) ou <b>ARA II</b> (si intolérance aux IEC)</li> <li>– <b>Bêtabloquant</b></li> <li>– <b>Antialdostérone</b> (stades II à IV NYHA)</li> </ul>
Hypertrophie ventriculaire gauche	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>IEC</b></li> <li>– <b>Inhibiteur calcique</b></li> <li>– <b>ARA II</b></li> </ul>
Antécédent d'accident vasculaire cérébral	– Tous les agents antihypertenseurs

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (1)

## ■ Losartan

<b>COZAAR</b>					
<b>HTA</b> essentielle : 50 mg x 1/j jusqu'à 100 mg x 1/j max. <b>Insuffisance cardiaque chronique</b> (intolérance aux IEC) : 12,5 mg x 1/j puis posologie doublée chaque semaine si besoin jusqu'à 150 mg x 1/j max. <b>Atteinte rénale</b> chez patient diabétique hypertendu avec protéinurie : 50 mg x 1/j puis 100 mg x 1/j si besoin 1 mois après le début du traitement. <b>Réduction du risque d'AVC</b> chez patient hypertendu avec IVG : 50 mg x 1/j puis ajout faible dose d' <b>hydrochlorothiazide</b> et/ou augmentation à 100 mg x 1/j si besoin. En cas d' <b>hypovolémie</b> (traitement par diurétique forte dose) : 25 mg x 1/j.	28 cp. séc. 50 mg	15,25	I	65 %	0,54
	90 cp. séc. 50 mg	46,25	I	65 %	0,51
	28 cp. 100 mg	26,12	I	65 %	0,93
	90 cp. 100 mg	78,74	I	65 %	0,87
	1 fl. pdre sol. susp. buv. 2,5 mg/mL		I	NR	

## ■ Valsartan

<b>TAREG</b>					
HTA : 20-80 mg/j en 1 prise	30 cp. séc. 40 mg	13,31	I	65 %	0,44
	56 cp. séc. 40 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 40 mg	37,49	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 80 mg	15,97	I	65 %	0,53
	56 cp. séc. 80 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 80 mg	44,94	I	65 %	0,50
	30 cp. séc. 160 mg	19,95	I	65 %	0,67
	56 cp. séc. 160 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 160 mg	56,21	I	65 %	0,62
	1 sol. buv. 3 mg/mL. 160 mL	7,58	I	65 %	7,58
<b>NISIS</b>					
HTA : 1 cp./j	30 cp. séc. 40 mg	13,31	I	65 %	0,44
	90 cp. séc. 40 mg	37,49	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 80 mg	15,97	I	65 %	0,53
	90 cp. séc. 80 mg	44,94	I	65 %	0,50
	30 cp. séc. 160 mg	19,95	I	65 %	0,66
	90 cp. séc. 160 mg	56,21	I	65 %	0,62

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (8)****Surveillance**

- Le patient est revu en consultation 4 à 6 sem. après le début du traitement.
- Le médecin vérifiera le contrôle tensionnel (efficacité), recherchera une hypotension orthostatique surtout chez le sujet âgé. La tolérance du médicament sera bien sûr vérifiée par l'interrogatoire orienté.
- Le patient peut disposer d'appareils de mesures automatiques de la pression artérielle, ce qui peut aider le médecin dans la surveillance et l'adaptation de la posologie (automesure tensionnelle, cf. Encadré). Une éducation du patient est alors nécessaire pour rendre cet outil fiable.

- Rappeler au patient à chaque consultation :
  - l'importance de la bonne observance thérapeutique,
  - la nécessité d'un traitement au long cours,
  - l'importance du respect des règles hygiéno-diététiques et du contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaires.

**Automesure tensionnelle : règle des 3**

- Sur 3 j consécutifs avant chaque consultation :
- 3 mesures consécutives le matin au réveil avant les prises médicamenteuses,
  - et 3 mesures consécutives le soir au coucher.
- La moyenne tensionnelle de ces 18 mesures doit être  $\leq 135/85$  mmHg.

La liste des autotensiomètres validés est disponible sur Internet : [www.comitehta.org](http://www.comitehta.org).



## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (2)

## ■ Irbésartan

<b>APROVEL</b>					
HTA : 1 cp./j en 1 prise	30 cp. pell. 75 mg	11,03	I	65 %	0,37
	56 cp. pell. 75 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 75 mg	31,08	I	65 %	0,35
	30 cp. pell. 150 mg	16,66	I	65 %	0,56
	56 cp. pell. 150 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 150 mg	46,93	I	65 %	0,52
	30 cp. pell. 300 mg	22,31	I	65 %	0,74
	56 cp. pell. 300 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 300 mg	62,86	I	65 %	0,70

## ■ Candésartan

<b>ATACAND</b>					
HTA : de 4 à 16 mg/j en 1 prise/j Insuffisance cardiaque : 4 à 32 mg/j en 1 prise/j	30 cp. séc. 4 mg	12,70	I	65 %	0,42
	90 cp. séc. 4 mg	35,73	I	65 %	0,40
	30 cp. séc. 8 mg	16,62	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 8 mg	46,83	I	65 %	0,52
	30 cp. séc. 16 mg	17,87	I	65 %	0,60
	90 cp. séc. 16 mg	50,36	I	65 %	0,56
	30 cp. séc. 32 mg	32,90	I	65 %	1,10
<b>KENZEN</b>					
HTA : de 4 à 16 mg/j en 1 prise/j Insuffisance cardiaque : 4 à 32 mg/j en 1 prise/j	30 cp. séc. 4 mg	12,70	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 8 mg	16,62	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 8 mg	46,83	I	65 %	0,52
	30 cp. séc. 16 mg	17,87	I	65 %	0,60
	90 cp. séc. 16 mg	50,36	I	65 %	0,56
	30 cp. séc. 32 mg	32,90	I	65 %	1,10

## ■ Telmisartan

<b>MICARDIS</b>					
HTA : de 20 à 80 mg/j en 1 prise/j Prévention cardiovasculaire : réduction de la morbidité cardiovasculaire chez les patients présentant : – une maladie cardiovasculaire athérothrombotique connue (antécédents de coronaropathie, d'accident vasculaire cérébral, ou d'artériopathie périphérique) ou – un diabète de type 2 avec une atteinte d'organe cible documentée Posologie usuelle : 80 mg/j en 1 prise	28 cp. 20 mg		I	NR	
	30 cp. 40 mg	14,18	I	65 %	0,47
	90 cp. 40 mg	39,94	I	65 %	0,44
	30 cp. 80 mg	17,15	I	65 %	0,57
	90 cp. 80 mg	48,29	I	65 %	0,54
<b>PRITOR</b>					
HTA : de 20 à 80 mg/j en 1 prise/j Prévention cardiovasculaire : réduction de la morbidité cardiovasculaire chez les patients présentant : – une maladie cardiovasculaire athérothrombotique connue (antécédents de coronaropathie, d'accident vasculaire cérébral, ou d'artériopathie périphérique) ou – un diabète de type 2 avec une atteinte d'organe cible documentée Posologie usuelle : 80 mg/j en 1 prise	30 cp. 20 mg		I	NR	
	30 cp. 40 mg	14,14	I	65 %	0,47
	90 cp. 40 mg	39,94	I	65 %	0,44
	30 cp. 80 mg	17,15	I	65 %	0,57
	90 cp. 80 mg	48,29	I	65 %	0,54

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (9)

### Paramètres et périodicité de la surveillance du patient hypertendu

Paramètres	Périodicité de la surveillance dans le cas d'une HTA contrôlée non compliquée	Périodicité de la surveillance dans les situations particulières
Pression artérielle	3 à 6 mois	Plus souvent, si l'objectif tensionnel n'est pas atteint (favoriser la pratique de l'automesure tensionnelle).
Interrogatoire et examen cardiovasculaire	3 à 6 mois	Plus souvent, en cas de symptôme cardiovasculaire.
Bandelettes urinaires (protéinurie)	12 mois	
Kaliémie, créatininémie et calcul du DFG	1 à 2 ans	Si fonction rénale normale : avant et 7 à 15 j après l'instauration d'un traitement diurétique ou inhibiteur du système rénine-angiotensine (avec une mesure de kaliémie) ou en cas d'événements intercurrents. Si fonction rénale altérée : la périodicité de la surveillance est adaptée en fonction de la progression de l'IRC.
Glycémie	3 ans, si initialement normale	Plus souvent, en cas d'hyperglycémie modérée à jeun, de modification du poids ou du mode de vie.
Exploration d'anomalie lipidique	3 ans, si lipides initialement normaux	Plus souvent, si les lipides sont initialement anormaux, en cas de traitement hypolipémiant, de modification du poids ou du mode de vie.
ECG	3 ans	Plus souvent, en cas de signe d'appel à l'interrogatoire ou à l'examen clinique.

### Objectifs tensionnels (simplifiés dans les dernières recommandations ESH 2013 [2])

	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
HTA essentielle sans et avec complications	< 140	< 90
HTA chez le patient diabétique	< 140	< 85
HTA avec néphropathie protéinurique avérée (pas de seuil défini de protéinurie)	< 130	< 80
HTA chez le sujet âgé < 80 ans en bon état général	< 140	< 90
HTA chez le sujet âgé < 80 ans en mauvais état général et sujet âgé > 80 ans	< 150 sans hypotension orthostatique et avec 3 antihypertenseurs maximum dont un <b>diurétique</b>	< 90

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (3)

## ■ Éprosartan

TEVETEN					
HTA : 1 cp. x 2/j	56 cp. 300 mg	15,93	I	65 %	0,28
	168 cp. 300 mg	44,84	I	65 %	0,27

## ■ Olmésartan

ALTEIS					
HTA : 10 à 40 mg/j en 1 prise/j	30 cp. 10 mg	12,58	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,43	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	19,72	I	65 %	0,66
	90 cp. 20 mg	55,57	I	65 %	0,62
	30 cp. 40 mg	20,04	I	65 %	0,67
	90 cp. 40 mg	56,45	I	65 %	0,63
OLMETEC					
HTA : 10 à 40 mg/j en 1 prise/j	30 cp. 10 mg	12,58	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,43	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	19,72	I	65 %	0,66
	90 cp. 20 mg	55,57	I	65 %	0,62
	30 cp. 40 mg	20,04	I	65 %	0,67
	90 cp. 40 mg	56,45	I	65 %	0,63

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste sélectif du récepteur AT1 de l'angiotensine II.

Effet hypotenseur.

Régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche.

Vasodilatation coronaire.

Protection rénale chez le diabétique.

Réduction de la prolifération intimale.

Absence d'élévation de la bradykinine, contrairement aux IEC, ce qui entraîne une absence théorique de toux et d'œdème angioneurotique.

## INDICATIONS

Hypertension artérielle essentielle.

Post-IDM récent (12 h à 10 j) en cas d'intolérance aux IEC chez des patients cliniquement stables présentant une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique et/ou des signes cliniques ou radiologiques d'insuffisance ventriculaire gauche.

Réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire chez des patients hypertendus avec hypertrophie ventriculaire gauche.

Traitement de l'insuffisance rénale chez les patients hypertendus et diabétiques de type 2 avec protéinurie.

Traitement de l'insuffisance cardiaque de classe II à IV NYHA avec dysfonction systolique ventriculaire gauche (FEVG  $\leq$  40 %) en cas d'intolérance aux IEC ou en association avec un IEC chez des patients restant symptomatiques sous IEC.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Sténose bilatérale des artères rénales ou sténose sur rein unique.

Insuffisance hépatique sévère, cirrhose biliaire et cholestase (en particulier TAREG).

Grossesse et allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez les sujets âgés et les insuffisants rénaux : pas de réduction de la posologie mais surveillance renforcée de la kaliémie et de la créatininémie.

Réduire la posologie en cas d'insuffisance hépatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hypotension orthostatique dose-dépendante.

Détérioration de la fonction rénale (réversible à l'arrêt du traitement) surtout en cas de déplétion hydrosodée préalable (diurétique, régime désodé, diarrhées, vomissements).

Hyperkaliémie, baisse de l'uricémie et augmentation modérée de l'acide urique urinaire. Céphalées, vertiges.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations possibles avec précaution :

- diurétiques épargneurs de potassium : surveillance de la kaliémie et la fonction rénale ; cf. Insuffisance cardiaque gauche chronique ;
- lithium : augmentation de la lithémie ;
- insuline, sulfamides hypoglycémisants : hypoglycémie ;
- AINS, corticoïdes : diminution de l'effet ;
- antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques : hypotension artérielle ;
- autres antihypertenseurs.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (10)****HTA résistante [2]**

- L'HTA est considérée comme résistante si elle reste  $> 140/90$  mm Hg malgré des règles d'hygiène de vie respectées et une trithérapie antihypertensive à doses adéquates comportant une diurétique et menée pendant au moins 4 sem.
- La résistance doit être confirmée par MAPA ou automesure.
- De plus, on doit s'assurer de la parfaite observance du patient et que l'enquête à la recherche d'une HTA secondaire a bien été faite et s'est révélée négative.
- Enfin, sur le plan thérapeutique, on doit :
  - s'assurer que les médicaments sont utilisés à pleine dose ;
  - renforcer la composante diurétique sur-

tout en cas d'insuffisance rénale (privilégier les **diurétiques de l'anse** si clairance de la créatinine  $< 30$  mL/min) ;

– passer à une quadrithérapie en privilégiant la **spironolactone** (25 à 50 mg/j) ou l'**éplérénone** (pas d'AMM dans cette indication), en l'absence de contre-indication.

- En cas d'inefficacité de ce traitement bien conduit avec une PAS  $\geq 160$  mmHg et/ou une PAD  $\geq 100$  mmHg confirmée en MAPA ou automesure, il est actuellement possible d'envisager des techniques invasives de dénervation rénale ou de stimulation des barorécepteurs, dans des centres très spécialisés et référencés. Il est cependant nécessaire d'avoir plus de preuves sur l'efficacité et la bonne tolérance de ces techniques à moyen et long terme.

## INHIBITEUR DE LA RÉNINE

■ **Aliskirène**

<b>RASILEZ</b>					
HTA 150 à 300 mg/j en une prise avec un repas léger	30 cp. 150 mg	19,30	I	15 %	0,64
	56 cp. 150 mg	HOP	I		
	30 cp. 300 mg	23,15	I	15 %	0,77
	56 cp. 300 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

L'**aliskirène** est un inhibiteur direct de la rénine humaine, non peptidique, sélectif et puissant, actif par voie orale. L'**aliskirène** inhibe le système rénine-angiotensine-aldostérone en bloquant la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine I et en réduisant les taux d'angiotensine I et d'angiotensine II ; par rapport aux autres inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'**aliskirène** n'entraîne pas d'élévation de l'activité rénine.

**INDICATIONS**

Hypertension artérielle essentielle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.

Antécédent personnel ou familial d'angioedème.

Grossesse : 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres.

Allaitement en association avec **ciclosporine**, **quinidine**, **vérapamil** (inhibiteur puissant de la gp-P) ou le jus de pamplemousse.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse. Risque d'insuffisance rénale chez les patients à risque : diabète, sténose artère rénale, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque congestive.

Risque d'hyperkaliémie chez les patients diabétiques ou ayant une fonction rénale altérée.

Arrêter la prise de **RASILEZ** si diarrhée sévère ou persistante.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhée.

Angioedèmes.

Éruption cutanée.

Légère diminution de l'hémoglobine et de l'hématocrite.

Augmentation de la kaliémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudence avec :

– **kétoconazole**, **itraconazole**, **clarithromycine**, **télithromycine**, **érythromycine**, **amiodarone** (inhibiteurs modérés de la gp-P) : risque de surdosage en **RASILEZ** ;

– **AINS** chez le patient âgé (risque d'insuffisance rénale) ;

– **furosémide** ;

– **diurétiques épargneurs de potassium**, suppléments potassiques, médicaments inhibant le système rénine-angiotensine : risque d'hyperkaliémie ;

– millepertuis et **rifampicine** (inducteur de gp-P) : biodisponibilité du **RASILEZ** diminuée ;

– autres inhibiteurs du système rénine-angiotensine : risque d'insuffisance rénale.

## CRISE AIGÜE HYPERTENSIVE

### Définition

Élévation rapide de la pression artérielle par rapport à sa valeur habituelle.

Le plus souvent il s'agit d'une « poussée hypertensive » sans souffrance viscérale.

En présence d'un signe de souffrance viscérale on parle d'« urgence hypertensive », plus fréquente en cas de crise prolongée et de variation tensionnelle importante.

### Diagnostic différentiel

- **HTA maligne** : PA diastolique > 130 mmHg et au moins un signe de souffrance viscérale aiguë parmi les suivants : encéphalopathie, rétinopathie hypertensive stade III ou IV, oedème pulmonaire, insuffisance rénale aiguë, anémie hémolytique mécanique.
- **HTA sévère** : PA diastolique > 110 mmHg.

### Examen clinique

- **Rechercher un facteur déclenchant** :
  - rupture de traitement (hypertendu connu) ;
  - douleur aiguë, infection, stress, AVC, épistaxis ;
  - prise d'AINS.
- **Confirmer la mesure tensionnelle après 15 min de repos en décubitus, au calme.**
- **Rechercher une atteinte viscérale devant des signes** :
  - neurologiques : céphalées intenses récentes, troubles de vigilance, baisse d'acuité visuelle, AVC ;
  - cardiaques : insuffisance ventriculaire gauche, angor ;
  - rénaux : polyuro-polydipsie, déshydratation.
- **Faire un fond d'œil.**  
Recherche d'hémorragies rétinienues, d'exsudats, d'un oedème papillaire.

### Traitement

**Poussée hypertensive asymptomatique ou symptômes mineurs (acouphènes, sensations vertigineuses, céphalées banales)**

- Repos. Pas de traitement d'urgence le plus souvent +++.

- Revoir le traitement de fond chez l'hypertendu connu.

- Consultation rapide mais différée chez le médecin pour les patients non connus comme hypertendus, afin de s'assurer du caractère permanent de l'HTA (consultation de dépistage).

### Urgence hypertensive (appelée aussi crise aiguë hypertensive avec atteinte viscérale)

- Hospitalisation et repos en unité de soins intensifs.
- Contrôle tensionnel automatique rapproché et continu.
- Traitement antihypertenseur oral ou parentéral.
- Voie orale : c'est la voie de prédilection dans cette indication.
- Voie parentérale : indications réelles rares.

#### • Inhibiteur calcique **LOXEN INJECTABLE** :

- effet rapide : 2,5 mg en IVD renouvelable après 10 min jusqu'à une dose cumulée de 10 mg ;
- effet progressif : 8 à 15 mg/h en perfusion IV sur 30 min ;
- dans les 2 cas, relais possible par une perfusion IV continue de 2 à 4 mg/h avec adaptation des doses par paliers de 0,5 mg/h. Relais possible par voie orale.

- **α-β-bloquant** : **TRANDATE INJECTABLE**  
1 mg/kg en IVD à renouveler après 10 min si besoin puis relais *per os* 200 à 400 mg/6 h ou poursuite IV 0,1 mg/kg/h à adapter.

- **α-bloquant** : **EUPRESSYL INJECTABLE**.  
Injection IV de 25 mg en 20 s à renouveler 5 min après si besoin. En cas de résultat encore insuffisant après 5 min, nouvelle injection IV de 50 mg en 20 s puis traitement d'entretien en perfusion IV ou à la seringue électrique de 9 à 30 mg/h pendant 7 j maximum.

## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (1) – ALPHA-1-BLOQUANTS

### ■ Prazosine

<b>MINIPRESS</b>					
0,5 mg/j au coucher puis augmentation progressive de 0,5 à 1 mg/sem. pdt 3 sem. Jusqu'à la posologie efficace HTA : 2 à 20 mg/j en 2 prises/j (posologie moyenne entre 3 et 7,5 mg/j en 2 prises/j)	30 cp. séc. 1 mg	4,80	I	65 %	0,16
	30 cp. séc. 5 mg	18,18	I	65 %	0,61
<b>ALPRESS LP</b>					
Posologie initiale : 2,5 mg/j en 1 prise	30 cp. LP 2,5 mg	10,74	I	65 %	0,36
Posologie d'entretien : 2,5-10 mg/j en 1 prise	90 cp. LP 2,5 mg	30,21	I	65 %	0,34
	30 cp. LP 5 mg	17,84	I	65 %	0,59
Posologie max : 20 mg/j en 1 prise	90 cp. LP 5 mg	50,26	I	65 %	0,56

### ■ Urapidil

<b>EUPRESSYL</b>					
HTA : 120 mg/j en 2 prises/j (max 180 mg/j) Sujet âgé : débiter à 60 mg/j en 2 prises/j <b>EUPRESSYL injectable</b> Urgence hypertensive : inj. IV de 25 mg en 20 s à renouveler 5 min après si besoin. Si résultat insuffisant après 5 min : nouvelle inj. IV de 50 mg en 20 s puis traitement d'entretien en perf. IV ou à la seringue électrique de 9 à 30 mg/h pendant 7 j max Pour la perf. IV, ajouter 5 amp. de 50 mg dans 500 mL de solution ; pour la seringue électrique, ajouter 2 amp. de 50 mg dans 50 mL de solution	30 gél. 30 mg	7,12	I	65 %	0,24
	30 gél. 60 mg	13,69	I	65 %	0,46
	5 amp. 25 mg/5 mL	HOP	I		
	5 amp. 50 mg/10 mL	HOP	I		
	5 amp. 100 mg/20 mL	HOP	I		
<b>MÉDIATENSYL</b>					
HTA : idem <b>EUPRESSYL</b> oral	30 gél. 30 mg	7,12	I	65 %	0,24
	30 gél. 60 mg	13,69	I	65 %	0,46

**HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES SECONDAIRES (1)****Définition**

L'HTA est dite essentielle dans 95 % des cas, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de la conséquence d'une rigidité prématurée ou physiologique de la paroi artérielle. Les 5 % restants correspondent aux HTA secondaires à une étiologie.

Il est donc nécessaire de sélectionner les patients chez lesquels des examens complexes, à la recherche d'une étiologie particulière, doivent être effectués.

Cette sélection repose sur :

- l'âge du patient et la sévérité de l'HTA ;
- l'anamnèse ;
- l'examen clinique et les examens biologiques habituels (kaliémie, fonction rénale).

**Principales étiologies d'HTA secondaires**

- Rénales :
  - parenchymateuses ;
  - obstructives ;
  - par sténose unilatérale ou bilatérale des

artères rénales d'origine athéromateuse ou fibrodysplasique.

- Endocriniennes :
  - hyperaldostéronisme primaire par adénome de Conn ou par hyperplasie des surrénales ;
  - phéochromocytome ;
  - syndrome et maladie de Cushing ;
  - hyperthyroïdie ;
  - hyperparathyroïdie ;
  - acromégalie.

- Médicamenteuses :

**AINS, glucocorticoïdes**, contraception orale œstroprogestative, **vasoconstric-teurs nasaux, ciclosporine, tacrolimus** ;

- Toxiques :

Régisse, antésite, alcool, ecstasy, amphétamines, cocaïne.

- Neurologiques :

- syndrome d'apnée du sommeil +++ ;
  - hypertension intracrânienne ;
  - tumeur du 4<sup>e</sup> ventricule.
- Coarctation de l'aorte.



## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (2) – VASODILATATEURS DIRECTS

### ■ Minoxidil

<b>LONOTEN</b>					
HTA : débiter à 5 mg/j en 1 ou 2 prises puis augmentation progressive de 5 à 10 mg/j tous les 3 j (max : 40 mg/j)	40 cp. séc. 5 mg	8,05	I	65 %	0,20
	40 cp. séc. 10 mg	14,18	I	65 %	0,35

### ■ Nitroprussiate de sodium

<b>NITRIATE</b>					
Urgence hypertensive et insuffisance cardiaque aiguë avec bas débit : reconstituer avec le solvant puis diluer dans du G5 % jusqu'à la concentration voulue ; débiter à 0,3 µg/kg/min et augmenter si besoin jusqu'à 5 µg/kg/min)	5 fl. pdre et solv. sol. inj.	HOP	I		

### ■ Dihydralazine

<b>NEPRESSOL</b>					
Urgence hypertensive et pré-éclampsie grave menaçant le pronostic vital : 50 à 100 mg à atteindre progressivement et à adapter à la pression artérielle	5 amp. 25 mg/2 mL	HOP	I		

## HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES SECONDAIRES (2)

### HTA secondaire à une sténose d'une artère rénale

Les sténoses artérielles rénales sont le plus souvent d'origine athéromateuse, mais peuvent être également d'origine fibrodysplasique. Une sténose athéromateuse d'une artère rénale est le reflet d'une maladie athéromateuse sévère dont le pronostic est extra-rénal.


#### Traitement médical

- Les **IEC** ou les **ARA II** sont très efficaces en cas de sténose unilatérale de l'artère rénale. Ils sont, en revanche, contre-indiqués en cas de sténose bilatérale ou de sténose sur rein unique.
- Les **bêtabloquants** ainsi que les **inhibiteurs calciques** sont également efficaces.

### Angioplastie endoluminale de l'artère rénale par voie percutanée ± endoprothèse (stent)

- Indications préférentielles : sténose unilatérale tronculaire courte d'origine fibrodysplasique, sténose athéromateuse d'une artère rénale responsable d'OAP flash ou d'une diminution du débit de filtration glomérulaire sous IEC ou d'une HTA résistante.
- Contre-indication : sténose sur rein unique.
- Résultats : ils sont meilleurs dans les angioplasties des lésions dysplasiques. La guérison de l'HTA s'obtient dans 40 % des lésions dysplasiques. En revanche, il n'y a pas de bénéfice sur la pression artérielle ni sur les événements cardiovasculaires et rénaux, de l'angioplastie des lésions athéromateuses.
- Complications : embol artériel, occlusion aiguë, dissection. Elles restent rares.

#### Algorithme de choix du traitement devant une HTA avec sténose athéromateuse d'une artère rénale (SAAR)



## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (3) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

#### $\alpha_1$ -bloquants

Antihypertenseur vasodilatateur (artériolaire et veineux) agissant en bloquant les récepteurs  $\alpha_1$ -postsynaptiques et avec également un effet sur la régulation centrale de la pression artérielle. Pas de modification de la fréquence ou du débit cardiaque.

#### Vasodilatateurs directs

Antihypertenseur vasodilatateur artériolaire avec un effet direct sur les fibres musculaires lisses artérielles.

### INDICATIONS

#### Formes orales

Hypertension artérielle (HTA).

- **LONOTEN** : indiqué dans l'HTA sévère après échec d'un traitement associant au moins 2 antihypertenseurs dont un diurétique.

- **MINIPRESS** : indiqué également dans l'insuffisance ventriculaire gauche congestive, dans le traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud et dans le traitement des manifestations fonctionnelles de l'adénome de prostate.

#### Formes injectables

Traitement de l'urgence hypertensive.

**NITRIATE** : indiqué également dans l'insuffisance cardiaque aiguë en particulier ventriculaire gauche avec bas débit cardiaque.

**NEPRESSOL** : réservé aux pré-éclampsies graves menaçant le pronostic vital.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

**MINIPRESS, ALPRESS** : insuffisance cardiaque à débit élevé, insuffisance cardiaque droite par embolie pulmonaire ou épanchement péricardique, œdème pulmonaire secondaire à une sténose aortique ou mitrale, angor non contrôlé, enfant < 12 ans.

**LONOTEN** : IDM récent, hypertension artérielle pulmonaire secondaire à une sténose mitrale.

**NITRIATE** : hypovolémie, insuffisance hépatique sévère, hypothyroïdie.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non démontrée avec **prazosine, urapidil, minoxidil, nitroprussiate**.

**NEPRESSOL** : hypersensibilité.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Urapidil** : réduire la posologie en cas d'insuffisance hépatique sévère.

**Prazosine** : augmenter les doses très progressivement jusqu'à la posologie efficace. Utiliser prudemment chez les sujets âgés, coronariens ou conducteurs de véhicules.

**Minoxidil** : ne pas utiliser en première intention. Associer obligatoirement un **diurétique** et un  **$\beta$ -bloquant** pour compenser certains effets. Surveiller les signes de rétention hydrosodée.

**Nitroprussiate** : doser quotidiennement les thiocyanates sanguins qui ne doivent pas dépasser 5 mg/100 mL. Surveiller l'apparition d'une acidose métabolique.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Cardiaques

– Hypotension orthostatique (**urapidil, prazosine**) avec parfois perte de connaissance au début du traitement (**prazosine**).

– Rétention hydrosodée avec œdèmes et prise de poids (**prazosine, minoxidil**).

– Risque d'aggravation d'un angor chez des patients sans traitement antiangineux (**prazosine, dihydralazine**).

– Tachycardie, palpitations (**prazosine, minoxidil, nitroprussiate, dihydralazine**).

– Épanchement péricardique (**minoxidil**).

#### Neurosensoriels

– Tendance lipothymique avec étourdissement, asthénie, vertiges, sueurs (**urapidil, prazosine**).

– Céphalées (**urapidil, prazosine**), acouphènes, somnolence, troubles visuels, paresthésies (**prazosine**).

**Digestifs** : nausées, gastralgies (**urapidil**), constipation, diarrhée, bouche sèche (**prazosine**).

**Uro-génitaux** : impuissance, priapisme, pollakiurie, incontinence urinaire (**prazosine**).

**ORL** : épistaxis, hyperhémie conjonctivale, larmoiement, congestion nasale (**prazosine**).

**Dermatologiques** : réactions cutanées allergiques (**prazosine, urapidil**). Hypertrichose gênante mais réversible à l'arrêt (**minoxidil**).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées :  $\alpha_1$ -bloquants associés.

Associations déconseillées : autres antihypertenseurs vasodilatateurs.

Associations avec précaution : inhibiteurs calciques, antidépresseurs, antipsychotiques, AINS, baclofène, corticoïdes, anesthésiques généraux.

**HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES SECONDAIRES (3)****HTA associée aux pathologies rénales parenchymateuses**

Le traitement est médical et des précautions sont à prendre en cas de fonction rénale franchement altérée :

- augmenter la posologie des **diurétiques de l'anse** ;
- éviter les **diurétiques thiazidiques** et les **antialdostérone**s ;
- utiliser les **IEC** ou **ARA II** avec précaution. Ils ne sont pas une contre-indication et représentent même une indication préférentielle.

**Hyperaldostéronisme primaire par adénome de Conn**

- Obtenir un équilibre tensionnel avant la chirurgie par un **antialdostérone** : **spironolactone (ALDACTONE)** à la dose de 3 mg/kg/j.
- Ablation chirurgicale de l'adénome par

voie classique ou par coelioscopie. Examen histologique de la pièce d'exérèse. Le traitement de l'hyperplasie des surrénales est médical. En cas d'intolérance à l'**ALDACTONE**, le **MODAMIDE** peut être prescrit.

**Phéochromocytome**

- Préparation à la chirurgie :  **$\alpha$ -bloquants, IEC, dihydropyridines.**

• Les  **$\beta$ -bloquants** sont contre-indiqués.

- Ablation chirurgicale de la tumeur par une équipe spécialisée (anesthésie lourde, manipulation prudente de la tumeur). La coeliochirurgie a considérablement simplifié la chirurgie des petits phéochromocytomes). Examen histologique de la pièce d'exérèse.

**Hyperthyroïdie**

Utilisation de  **$\beta$ -bloquants**, **propranolol (AVLOCARDYL)** cp. à 40 mg : 1/2 à 1 cp. x 4/j.

**CONSENSUS**

[1] Recommandation sur la prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte, *SFHTA*, 2013

[2] Guidelines for the management of arterial hypertension, *ESH et ESC*, 2013

## ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE CHRONIQUE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) (1)

### Définition

L'interrogatoire, l'examen clinique avec palpation des pouls et mesure de l'IPS permettent d'évaluer le stade de l'AOMI. L'IPS est le rapport de la pression systolique à la cheville sur la pression systolique humérale, mesurées à l'aide d'une sonde Doppler.

- Ischémie d'effort asymptomatique : IPS < 0,9 ou abolition de pouls sans manifestation clinique d'ischémie.
- Ischémie d'effort symptomatique : IPS < 0,9 ou abolition de pouls avec manifestation clinique d'ischémie.
- Ischémie permanente chronique : douleurs de décubitus ou troubles trophiques depuis au moins 15 j associés à une PAS < 50 mmHg à la cheville ou < 30 mmHg à l'orteil.

Dans l'ischémie d'effort, le risque cardiovasculaire domine le risque local. Dans l'ischémie permanente, le risque local peut être transitoirement prépondérant

mais la prise en charge cardiovasculaire reste primordiale.

### Dépistage

Il est recommandé de dépister une AOMI chez tous les sujets à risque cardiovasculaire élevé, par un examen clinique et une mesure systématique de l'IPS. Le diagnostic d'AOMI est posé quand l'IPS est inférieur à 0,90.

### Bilan initial

Le bilan initial a pour objectifs :

- d'identifier le stade de l'AOMI ;
- d'identifier et traiter/équilibrer les facteurs de risque cardiovasculaires associés (bilan lipidique complet, glycémie, microalbuminurie, HTA) ;
- d'évaluer l'atteinte locale de la maladie athéromateuse principalement par échodoppler ;
- d'évaluer l'extension à distance de la maladie athéromateuse (coronaires, carotides, aorte, artères rénales et mésentériques) ;
- de rechercher une éventuelle anémie.

## VASODILATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES (1)

## ■ Naftidrofuryl

<b>PRAXILÈNE</b>					
Artériopathies :	20 cp. 200 mg	4,45	II	15 %	0,22
- 1 cp. x 3/j au cours des repas	90 cp. 200 mg	17,53	II	15 %	0,19
- 2 gél. x 3/j au cours des repas	20 gél. 100 mg	3,11	II	15 %	0,16

## ■ Pentoxifylline

<b>PENTOFLEX</b>					
1 à 3 cp./j au cours des repas	100 cp. LP 400 mg		II	NR	

## ■ Ginkgo biloba

<b>TANAKAN</b>					
3 cp./j au cours des repas	30 cp. 40 mg		II	NR	
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	90 cp. 40 mg		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3 /j	30 doses buv. 1 mL (fl. 30 mL) 40 mg/mL		II	NR	
	90 doses buv. 1 mL (fl. 90 mL) 40 mg/mL		II	NR	
<b>TRAMISAL</b>					
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	30 doses 1 mL (fl. 30 mL)		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3/j	40 mg/mL				

## ■ Ifenprodil

<b>VADILEX</b>					
2 à 3 cp./j	30 cp. 20 mg		II	NR	
	50 cp. 20 mg	HOP	I		

## ■ Piribédil

<b>TRIVASTAL</b>					
Artériopathie : 4 cp. à 20 mg/j en 2 à 3 prises/j en fin de repas	30 cp. 20 mg	2,41	II	65 %	0,08
Artériopathie : 1 cp. 50 mg LP/j (max 1 cp. x 2/j)	30 cp. LP 50 mg	10,11	I	65 %	0,34
Inj. IM : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j en 2 inj.	100 cp. LP 50 mg	HOP	I		
Perf. IV en 4 h dans 250 mL de soluté isotonique : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j à J3 et J4 puis 3 amp./j si besoin	12 amp. 3 mg/1 mL	HOP	I		

## ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE CHRONIQUE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) (2)

### Traitement au stade d'ischémie d'effort [1]

- Éducation thérapeutique du patient (information sur les signes cliniques, sur les traitements prescrits et sur le suivi).
- Prise en charge de l'hygiène de vie : suppression totale et définitive du tabac, réduction d'une surcharge pondérale, exercice physique quotidien modéré (30 min). Entraînement régulier et progressif à la marche, bicyclette. Permet une adaptation métabolique du muscle strié et de développer le réseau collatéral.
- Équilibre d'une HTA avec un objectif de PAS < 140 mmHg.
- Correction d'un diabète (objectif HbA1c < 6,5 %).
- Correction d'une dyslipidémie (objectif LDL < 1 g/L).
- Traitement général de la maladie athéromateuse.

En cas de coronaropathie, l'AOMI au stade d'ischémie d'effort ne contre-indique pas les **bêta-bloquants**.

- Pour prévenir la survenue d'accidents cardiovasculaires, trois types de médicaments au long cours sont efficaces :
  - **antiagrégant plaquettaire** : **acide acétylsalicylique (KARDEGIC)** 75 à 160 mg/j ou **clopidogrel (PLAVIX)** 1 cp. (75 mg)/j. L'efficacité de l'aspirine est moins bien documentée que celle du clopidogrel dans l'AOMI ;
  - **statine** : **atorvastatine (TAHOR)** 10 à 40 mg/j ;
  - **inhibiteur de l'enzyme de conversion** : **périndopril (COVERSYL)** à introduire progressivement par paliers de 2 à 4 sem. sous surveillance de la pression artérielle et de la créatininémie.

Il est raisonnable de les associer chez la majorité des patients symptomatiques. À noter que les traitements vasodilatateurs n'apparaissent plus dans les dernières recommandations.

- Traitement spécifique de la claudication : marche, si besoin réadaptation vasculaire supervisée en ambulatoire ou en centre (au moins 1 h x 3 sem.).
- Si échec après 3 mois de traitement bien conduit ou plus tôt en cas de lésion proximale menaçante : envisager une revascularisation (traitement endovasculaire ou chirurgie ouverte). Après une mise en place d'une endoprothèse, une association **aspirine + clopidogrel** est instaurée dans les premières sem.

### Traitement au stade d'ischémie permanente chronique [1]

- Objectifs : sauver le membre et soulager la douleur.
- Bilan initial : hospitalisation en milieu spécialisé, écho-Doppler artériel, angio-scanner ou angio-IRM ou angiographie conventionnelle
- Prise en charge thérapeutique immédiate :
  - revascularisation chaque fois que possible (chirurgie ou traitement endovasculaire) ;
  - traitement de revascularisation par injection de prostaglandines si revascularisation impossible ou résultats insuffisants ;
  - contrôle de la douleur, de l'équilibre hémodynamique, de l'état ventilatoire, de l'état nutritionnel et des surinfections ;
  - réadaptation et nursing, prévenir la maladie thromboembolique veineuse (HBPM), prévenir la rétraction et les escarres.
- Prise en charge thérapeutique au décours :
  - éducation thérapeutique (cf. Ischémie d'effort) ;
  - traitement médicamenteux (cf. Ischémie d'effort) ;
  - réadaptation vasculaire et générale ;
  - prise en charge psychologique.

## VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES (2)

## ■ Iloprost

ILOMÉDINE					
Amp. à diluer dans 250 mL de soluté isotonique : 0,5 à 2 ng/kg/min en une perf. IV continue pendant 6 h/j Durée moyenne 4 sem.	1 amp. 0,5 mL (0,1 mg/1 mL)	HOP	I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

Ce sont tous des vasodilatateurs artériolaires.

**Naftidrofuryl** : action antisérotinergique.

**Pentoxifylline** : action d'augmentation de la déformabilité des globules rouges et de relaxation sur les fibres musculaires lisses vasculaires.

**Piribédil** : agoniste dopaminergique central et périphérique (effet vasodilatateur).

## INDICATIONS

Ces molécules ne font pas partie des recommandations.

Formes orales : traitement d'appoint de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (stade II). Certaines études seraient en faveur d'une amélioration du périmètre de marche.

Formes parentérales : traitement des manifestations douloureuses des artériopathies en poussée ischémique en association avec le traitement chirurgical et dans l'attente de celui-ci, ou en cas d'impossibilité d'un geste chirurgical.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

**Naftidrofuryl**, **pentoxifylline**, **piribédil** : ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

**Pentoxifylline**, **piribédil** : IDM à la phase aiguë.

**Piribédil** : collapsus cardiovasculaire, oedème pulmonaire pour la forme IV.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Naftidrofuryl** : ECG indispensable avant la perfusion IV qui doit être lente (risque BAV).

**Pentoxifylline** : prudence en cas d'hypotension et réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale sévère.

**Piribédil** : à prescrire à doses progressives.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Naftidrofuryl** : rarement troubles digestifs, éruption cutanée, hépatite exceptionnellement.

**Pentoxifylline** : rarement nausées, vomissements, brûlures gastriques, bouffées de chaleur, réactions cutanées, hypotension.

**Piribédil** : troubles digestifs mineurs, rarement confusion ou agitation, hypotension orthostatique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Naftidrofuryl** injectable : association déconseillée avec **antiarythmiques** et **β-bloquants**.

**Pentoxifylline** : **antivitamines K**, **AINS**, **sali-cylés**, **ticlopidine** (risque hémorragique accru).

**Piribédil** : antagoniste dopaminergique.



## ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE CHRONIQUE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) (3)

### Traitement au stade d'ischémie aiguë

Cf. chapitre correspondant.

### AOMI et amputation

• Indications : lésions tissulaires irréversibles, ischémie permanente chronique sans revascularisation possible qui ne répond pas au traitement médical ou avec des répercussions générales menaçant le pronostic vital.

• Le bilan initial va permettre de déterminer le niveau d'amputation.

• La prise en charge postopératoire est multidisciplinaire, dans une structure de réadaptation spécialisée. Verticalisation et autonomisation des déplacements aussi précocement que possible ; prothèse personnalisée, réadaptation. Prise en charge psychologique +++.

### Types de revascularisation à proposer en fonction du siège de la lésion artérielle

SIÈGE DE LA LÉSION ARTÉRIELLE	TYPES DE REVASCULARISATION À PROPOSER
Aorto-iliaque	- Angioplastie - Endartériectomie - Pontage aorto-fémoral prothétique - Pontage extra-anatomique en cas de mauvais terrain
Fémorale profonde	- Angioplastie en cas de lésion simple et courte - Endartériectomie - Pontage par greffon veineux
Fémorale superficielle	- Angioplastie - Pontage par greffon veineux
Poplitée ou jambière	- Pontage par greffon veineux

### CONSENSUS

[1] Guide médecin sur l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, HAS, 2007

## ISCHÉMIE AIGUË DES MEMBRES INFÉRIEURS (1)

L'ischémie aiguë d'un membre inférieur correspond à une altération brutale de sa perfusion microcirculatoire nutritionnelle, mettant en jeu sa vitalité immédiate. C'est la conséquence d'un processus embolique ou thrombotique au niveau des troncs artériels sus-jacents, et peut être un accident évolutif d'une AOMI.

Le diagnostic est clinique et aucune exploration ne doit retarder l'intervention de désobstruction artérielle en urgence.

### Objectifs

- Sauver le membre inférieur.
- Contrôler la douleur physique et morale.

### Dès la prise en charge du patient [1]

- Hospitalisation en urgence en unité spécialisée médico-chirurgicale (cardiologie ou chirurgie vasculaire).
- Surveillance continue de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.
- Mise en place d'une perfusion de glucosé 5 % par une voie veineuse de bon calibre.
- Patient à jeun, repos strict au lit avec surélévation de la tête du lit.
- Protection des points d'appui, arceau de protection sur les membres inférieurs.
- **Traitement anticoagulant** +++ par **HÉPARINE STANDARD** à doses efficaces : dose de charge pour certains de 100 UI/kg en IV puis 400 UI/kg/j en perf. IV continue à la seringue électrique pour avoir un ratio TCA entre 2 et 3.
- **Éventuellement, traitement vasodilatateur** par voie IV.  
Ex. : **ILOMÉDINE** amp. 0,5 mg à diluer dans 250 mL de sérum physiologique ou G5 % : 0,5 à 2 ng/kg/min en une perf. IV continue.

- **Traitement antalgique** +++ par voie IV.  
Ex. : **PERFALGAN** en perf. IV x 3/j voire **morphiniques** si besoin en IV ou en SC.
- Correction d'une hypovolémie par remplissage prudent, correction d'une acidose par alcalinisation et d'une hyperkaliémie.
- Surveillance : paramètres hémodynamiques, recherche de signes de choc (marbrures cutanées, extrémités froides, conscience).

### Bilan préopératoire en urgence [1]

Le diagnostic est clinique et aucune exploration ne doit retarder l'intervention.

- Biologie : groupe, Rhésus, RAI, TP, TCA, ionogramme sanguin, fonction rénale, glycémie, NFS, plaquettes, hémostase, gaz du sang artériel, enzymes cardiaques.
- ECG, radio thoracique, échocardiographie Doppler.
- **Artériographie en urgence** +++  
– Au mieux sur table d'intervention + contrôle en fin de procédure.  
– Permet de préciser le mécanisme de l'ischémie (embolie ou thrombose *in situ*), la topographie des lésions, l'état du lit artériel surtout en aval et en controlatéral.  
– Peut permettre une revascularisation endovasculaire si l'indication est posée.
- Le traitement est une désobstruction en urgence.

### Technique chirurgicale : thrombectomie rétrograde à la sonde de Fogarty

- Peut être faite sous anesthésie locale.
- Abord de l'axe vasculaire par courte incision artérielle à distance de l'oblitération.
- Efficacité du geste évaluée en peropératoire par la réapparition des poulx distaux et par l'artériographie.

## ISCHÉMIE AIGÜE DES MEMBRES INFÉRIEURS (2)

### Techniques endovasculaires

Les indications tendent à s'élargir.

#### Thrombo-aspiration

Sur occlusion courte, surtout pour les embolies distales.

#### Thrombolyse *in situ*

Par **urokinase**. Respecter les contre-indications. Voir chapitre correspondant.

#### Indications [1]

L'attitude thérapeutique est conditionnée par :

- l'état du lit vasculaire,
- le niveau d'occlusion,
- le retentissement locorégional,
- le terrain du patient,
- la faisabilité du geste.

#### En cas d'embolie sur artères saines

- Ischémie **proximale** prise en charge **précocement** : thrombectomie à la sonde de Fogarty.
- Ischémie **proximale** prise en charge **tardivement** : thrombolyse *in situ*.
- Ischémie **distale** prise en charge **précocement** : thrombectomie à la sonde de Fogarty ou thrombo-aspiration.

- Ischémie **distale** prise en charge **tardivement** : thrombo-aspiration ou thrombolyse *in situ*.

#### En cas de thrombose aiguë sur artères pathologiques athéromateuses

- Ischémie viable ou menaçante : thrombolyse *in situ* puis le plus souvent revascularisation par chirurgie ou par angioplastie de la lésion artérielle.
- Ischémie irréversible avec lit d'aval présent : revascularisation en urgence par pontage veineux.
- Ischémie irréversible sans lit d'aval ou si l'état général est très altéré : l'amputation peut être indiquée en l'absence d'alternative.

#### Surveillance post-revascularisation

- Paramètres hémodynamiques, diurèse, température.
- Prévention du syndrome de revascularisation : alcalinisation, correction de l'hyperkaliémie.
- Surveillance du membre revascularisé : chaleur, sensibilité, pouls, motricité.
- Écho-Doppler artériel du membre.
- Surveillance de l'héparinothérapie poursuivie en postopératoire.

### CONSENSUS

[1] Guide médecin sur l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, HAS, 2007

## DISSECTION AORTIQUE (1)

### Traitement médical

#### Mesures générales

C'est une **urgence médico-chirurgicale** (mortalité élevée : 70 % à 8 j).

- Hospitalisation en USIC ou en réanimation chirurgicale à proximité d'un service de chirurgie thoracique.

- Laisser à jeun.
- Repos au lit strict.
- Pose d'une voie veineuse périphérique de bon calibre ou voie centrale (G5 % 500 mL).
- Monitoring cardiaque et tensionnel.
- Surveillance de la saturation artérielle en oxygène par oxymètre de pouls.
- Dispositif de recueil des urines.
- Oxygénothérapie par voie nasale : 3 à 6 L/min.
- Contre-indication aux **anticoagulants** et **antiagrégants plaquettaires**.

#### Complications

- Cardiaques :
  - hémopéricarde,
  - infarctus du myocarde,
  - troubles du rythme et de conduction,
  - insuffisance cardiaque,
  - choc : infarctus étendu, insuffisance aortique massive, hémorragie et tamponnade.
- Neurologiques :
  - accident vasculaire cérébral et dissection des artères cérébrales,
  - convulsions.
- Diverses :
  - atteinte rénale,
  - ischémie aiguë d'un membre,
  - infarctus mésentérique,
  - compression médiastinale.

Un **bilan** sera effectué en urgence : groupe, Rhésus, RAI, numération formule sanguine, plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatinine, TP, TCA, enzymes cardiaques, ECG, radiographie pulmo-

naire, gaz du sang, et **échocardiographie transthoracique et transœsophagienne** réalisée au lit du patient.

L'échocardiographie est l'examen de première intention. Il établit le diagnostic, effectue le bilan d'extension (classification, étendue, orifices d'entrée et de réentrée et complications) et évalue la fonction ventriculaire gauche.

L'angioscanner thoracique ou l'angio IRM peuvent aider au diagnostic et au bilan d'extension. L'indication d'une artériographie est devenue exceptionnelle.

#### Traitement médicamenteux

► **Antalgiques par voie parentérale**

- **Analgésique périphérique, paracétamol (PERFALGAN)** : 2 g en IVDL sur 15 min. OU

- **Analgésique morphinique, chlorhydrate de morphine (MORPHINE)** : 5 mg en IVD (amp. 20 mg).

► **Limitation de l'extension de la dissection**

Elle repose sur la diminution de la pression artérielle, de la contractilité ventriculaire gauche et de la décharge adrénérergique (objectif : pression artérielle systolique entre 100 et 120 mmHg).

- Soit monothérapie, utilisée en première intention :  **$\alpha$ - $\beta$ -bloquant, labétalol (TRAN-DATE)** : 1 mg/kg en IV sur 1 min puis 0,1 à 0,3 mg/kg/h en IVSE (amp. 100 mg).

- Soit association d'un traitement antihypertenseur vasodilatateur artériel : **inhibiteur calcique, nifédipine (LOXEN)** : 1 mg/h en IVSE en augmentant progressivement, et d'un traitement  **$\beta$ -bloquant, aténolol (TÉNORMINE)** : 5 à 10 mg en IV sur 5 à 10 min (amp. 5 mg).

► **Traitement symptomatique d'une insuffisance cardiaque ou d'un état de choc (pouvant être multifactoriel)**

## DISSECTION AORTIQUE (2)

### Traitement chirurgical

Il concerne **toutes les formes sauf les types III ou B et les dissections chroniques**. Celles-ci seront traitées médicalement avec une surveillance clinique avec angioscanner thoracique et écho-Doppler cardiaque annuels. Un traitement endovasculaire peut également être proposé dans ces formes. Il faut insister sur l'importance du contrôle tensionnel.

- En urgence.
- Sous circulation extracorporelle.
- Thoracotomie ( $\pm$  laparotomie).
- Résection de l'aorte disséquée (en partie ou totalement).
- Remplacement prothétique par un tube en *Dacron* avec renforcement des anastomoses.
- Colle biologique pour obturer un faux chenal d'aval sur une zone non réséquée.
- Si nécessaire : remplacement valvulaire aortique, réimplantation de collatérales, notamment des coronaires.

Au décours on n'oubliera pas le contrôle tensionnel ainsi que l'antibioprophylaxie (cf. Endocardites).

### Étiologies - Facteurs favorisants


- HTA
- Athérosclérose
- Maladies de la média aortique : maladie de Marfan, d'Ehlers-Danlos, médianécrose kystique, etc.
- Cardiopathies congénitales : coarctation aortique, bicuspidie, communication interauriculaire, communication interventriculaire
- Iatrogènes : artériographie, toute chirurgie cardiaque avec clampage aortique, contre-pulsion intra-aortique
- Traumatisme
- Certaines aortites : syphilis, Horton, Takayashu
- Syndrome de Turner
- Grossesse.

### Classifications

- De Bakay :
  - type I (60 %) : débute sur l'aorte ascendante et s'étend sur la descendante ;
  - type II (10 %) : débute sur l'aorte ascendante mais ne dépasse pas le tronc artériel brachiocéphalique ;
  - type III : débute en aval de l'artère sous-clavière gauche et s'étend en aval sur une longueur variable (IIIa reste confinée à l'aorte thoracique et IIIb atteint l'aorte abdominale).
- Daily et Shumway :
  - type A : dissection intéressant l'aorte ascendante et/ou la crosse ;
  - type B : autres variétés.
- Selon l'ancienneté :
  - aiguë : les 2 premières sem. ;
  - subaiguë : de la 3<sup>e</sup> à la 6<sup>e</sup> sem. ;
  - chronique : au-delà de 7 sem. avec organisation de l'hématome

**DISSECTION AORTIQUE (3)**

Classification de De Baakey des dissections aortiques



## ANÉVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE (1)

Les anévrismes de l'aorte abdominale (AAA) sont essentiellement dus à l'athérosclérose (98 %). La forme sous-rénale est la plus fréquente. Il faut souligner leur extrême latence et l'importance du dépistage.


### Mode de dépistage et surveillance [1]

- Mode d'imagerie recommandé : écho-Doppler. Mesure du plus grand diamètre antéro-postérieur externe (adventice-adventice). Expression en ratio (diamètre antéro-postérieur AAA/diamètre régulier de l'aorte sous-rénale normale). Le seul diamètre antéro-postérieur ne suffit pas.
- Il n'est pas conseillé un scanner ou une IRM de première intention pour le dépistage des AAA.
- Dépistage des AAA avant 50 ans :

recommandé pour les hommes et les femmes ayant un antécédent familial d'AAA (un ou plusieurs parents ou collatéraux au premier degré).

- Dépistage des AAA entre 60 et 75 ans : recommandé pour tous les hommes fumeurs ou anciens fumeurs (conseillé pour les non-fumeurs). Recommandé pour les femmes tabagiques ou hypertendues.
- Dépistage des AAA après 75 ans : conseillé chez les hommes sans comorbidité lourde et ayant une espérance de vie sensiblement normale pour l'âge. Idem pour les femmes.
- Mode de surveillance des AAA dépistés : écho-Doppler recommandé pour la surveillance des AAA < 50 mm (pas de surveillance par scanner ou IRM de première intention sauf cas complexe).

### Organigramme de surveillance d'un AAA



### CONSENSUS

[1] Dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale et surveillance des petits anévrismes, SFMV, 2006

## ANÉVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE (2)

### Traitement médical

**Antiagrégant plaquettaire : ASPÉRIC**  
100 mg/j.

Dans la prise en charge on n'oubliera pas :

- le contrôle des facteurs de risques cardiovasculaires ;
- le bilan de la maladie athéromateuse ;
- la recherche d'autres anévrismes.

#### Complications spontanées

- Fissuration.
- Rupture avec hémorragie interne massive : rétropéritonéale, intrapéritonéale, dans la veine cave inférieure ou dans le 3<sup>e</sup> duodénum.
- Accidents emboliques périphériques.
- Thrombose anévrismale complète (exceptionnelle).
- Compression des organes du voisinage : 3<sup>e</sup> duodénum, appareil urinaire, racines nerveuses, veines cave inférieure et iliaques.

### Traitement chirurgical [1]

#### Indications

- Anévrisme de diamètre antéro-postérieur > 55 mm. Entre 50 et 55 mm, il doit y avoir une discussion collégiale médico-radio-chirurgicale.
- Accroissement de diamètre > 0,5 cm/an.
- Anévrisme symptomatique.

#### Chirurgie « ouverte »

Elle consiste en :

- laparotomie médiane (forme sous-rénale) ;
- contrôle de l'aorte et des artères iliaques ;
- mise à plat de la poche anévrismale ;
- rétablissement de la continuité par prothèse en Dacron aorto-aortique, aorto-bi-iliaque ou bifémorale ;
- réimplantation des éventuelles collatérales (mésentériques supérieure ou inférieure, artères rénales) ;
- le tube de Dacron est recouvert de la paroi anévrismale de façon à éviter tout contact avec le tube digestif et ainsi diminuer le risque de fistules aorto-digestives.

**La mortalité à froid est inférieure à 5 %.**

Sur terrain précaire, il est possible d'effectuer un pontage extra-anatomique axillo-bifémoral.

#### Chirurgie endovasculaire

C'est un traitement moins invasif. À l'aide d'un cathéter de pose, une endoprothèse vasculaire est placée à l'intérieur de l'anévrisme aortique abdominal, afin de renforcer la paroi de l'aorte et empêcher la zone lésée de se rompre.

Le cathéter de pose est introduit au niveau de l'artère fémorale (aine) et est ensuite guidé par le chirurgien jusqu'à l'anévrisme, sous contrôle radiologique.

#### Anévrisme symptomatique

**Tout anévrisme symptomatique doit être opéré en urgence.** Le pronostic est beaucoup moins bon : *la mortalité globale des anévrismes rompus est environ 80 % avec une mortalité opératoire de 40 %.*

À ce stade, le traitement est symptomatique :

- **antalgiques** ;
- correction du choc hypovolémique : remplissage par solutés macromoléculaires puis par culots globulaires ;
- traitement chirurgical en urgence avec contrôle premier de l'aorte.

#### Complications postopératoires

- Cardiaques : angor instable, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque.
- Neurologiques : accident vasculaire cérébral, paraplégie (forme sus-rénale).
- Ischémie viscérale : infarctus mésentérique, insuffisance rénale aiguë, cholécystite aiguë ischémique alithiasique.
- Ischémie aiguë de membre (par thrombose ou embolie).
- Sexuelles : impuissance, éjaculation rétrograde.
- Infectieuses : systémiques et pariétales.
- Hémorragiques : hématome rétro- ou intrapéritonéal.
- Postopératoires classiques : accidents thromboemboliques veineux, atélectasies et pneumopathies infectieuses, escarres, etc.
- Complications tardives : infection de la greffe et faux anévrisme, rupture d'anastomose, fistulisation dans le duodénum.



## INSUFFISANCE VEINEUSE - VARICES (1)

### Mesures générales

#### Règles hygiéno-diététiques

- Éviter la station debout prolongée.
- Favoriser la marche.
- Éviter les sources de chaleur (chauffage par le sol, exposition solaire, bain trop chaud).
- Port de chaussures à talon de 3 à 4 cm.
- Surélever les pieds du lit.
- Massage des membres inférieurs de la cheville vers la racine de la cuisse.
- Arrêter la pilule (contre-indication relative).
- Correction d'un éventuel surpoids.

#### Contention élastique (bandes, collants, bas, chaussettes)

- Permet de lutter contre la stase veineuse.
- Mise le matin avant le lever et à enlever le soir au coucher.
- Force de contention adaptée. La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

#### Force de contention (classement selon la contre-pression exercée à la cheville)

- Classe confort, pression < 10 mmHg : insuffisance veineuse fonctionnelle.
- Force 1, pression 10 à 15 mmHg : insuffisance veineuse fonctionnelle et superficielle.
- Force 2, pression 15,1 à 20 mmHg : insuffisance veineuse superficielle et profonde.
- Force 3, pression 20,1 à 36 mmHg : insuffisance veineuse profonde, troubles trophiques.

Exemple de marques : *Sigvaris, Varisma, Olympique*, etc.

#### Veinotoniques

Ils ne sont pas indispensables. Il en existe un grand nombre, par exemple : **veinotonique, rutoside (ESBERIVEN FORT)** : 1 cp. x 2 /j.

#### Facteurs favorisants ou prédisposants aux varices (prédominance féminine)

- Antécédents familiaux, hérédité.
- Orthostatisme professionnel.
- Grossesse.
- Troubles endocriniens.
- Obésité.
- Traumatisme.
- Contraception orale.
- Antécédents de phlébite.

#### Complications des varices

- Trophiques :
  - œdème, dermatite ocre, hypodermites scléromiformes, nodule pseudo-kaposien, capillarite ectasique, télangiectasies chevelues, varicosités, atrophie blanche de milium ;
  - ulcère variqueux et ses complications (infection, récurrence, chronicité, dégénérescence épithélio-mateuse, eczéma variqueux, hémorragie par rupture de varice) ;
  - ankylose, arthrite.
- Veineuses :
  - thromboses veineuses superficielles ;
  - ruptures variqueuses (interne ou externe).

#### Traitement d'une thrombose veineuse superficielle (TVS) diagnostiquée par échodoppler

- Environ 25 % des TVS sont associées à une TVP/EP.
- Quelle que soit la topographie de la TVS : contention élastique classe 2 ou 3.
- L'alitement et l'immobilisation ne sont pas indiqués.
- Les **HBPM** à dose curative et les **AVK** n'ont pas d'AMM pour le traitement des TVS. Les **HBPM** à dose prophylactique sont suggérées (hors AMM) dans le traitement des TVS.
- En cas d'atteinte de la jonction grande saphène/veine fémorale : **fondaparinux** ou (de façon empirique) **HBPM** en curatif pendant 4 à 6 sem. Pas de relais **AVK**. Respecter les précautions d'emploi. Traitement secondaire des varices indispensable.
- En cas de TVS spontanée aiguë symptomatique longue d'au moins 5 cm : **fondaparinux (ARIXTRA)** 2,5 mg : 1 inj./j pendant 4 à 6 sem. Pas de relais **AVK**. Respecter les précautions d'emploi. Traitement secondaire des varices indispensable.

## VEINOTONIQUES (1)

## ■ Rutoside

<b>ESBERIVEN FORT</b>					
2 cp. ou 2 amp. buv./j	30 cp. 250 mg 20 amp. buv. 4 mL			NR NR	
<b>VELITEN</b>					
1 à 2 cp. x 3/j	30 cp. 200 mg			NR	
<b>DIO-Gé</b>					
1 cp. x 2/j 1 cp. le matin	30 cp. 300 mg 30 cp. 600 mg			NR NR	
<b>DIOVÉNOR</b>					
1 cp. ou 1 sach. le matin	30 cp. 600 mg 30 sach. 600 mg pour susp. buv.			NR NR	
<b>MÉDIVEINE-Gé</b>					
1 cp. x 2/j  1 cp. ou 1 sach.-dose le matin	30 cp. 300 mg 60 cp. 300 mg 30 cp. 600 mg 30 sach.-dose 600 mg			NR NR NR NR	

## ■ Troxérutine

<b>RHÉOFLUX</b>					
1 sach. ou 1 amp./j	10 sach. 3,5 g 10 amp. 3,5 g			NR NR	
<b>VEINAMITOL</b>					
1 sach. ou 1 amp./j	10 sach. 3,5 g 10 amp. 3,5 g			NR NR	

## ■ Troxérutine + heptaminol + ginko biloba

<b>GINKOR FORT</b>					
2 gél./j (max 4/j)	30 gél. 300 mg			NR	

## ■ Citroflavonoïdes

<b>CÉMAFLAVONE</b>					
2 amp. buv./j	20 amp. 400 mg			NR	

## ■ Anthocyanosides

<b>DIFRAREL</b>					
1 à 2 cp. x 3/j	20 cp. 100 mg			NR	

## ■ Leucocianidol

<b>FLAVAN</b>					
1 cp. x 2/j	30 cp. 60 mg			NR	

## INSUFFISANCE VEINEUSE - VARICES (2)

### Traitement antivariqueux

#### Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de varices importantes ou symptomatiques, d'ulcère variqueux ou de thromboses superficielles récidivantes. La perméabilité des troncs veineux profonds sera préalablement vérifiée.

On distingue plusieurs traitements.

- *Stripping* : éveinage à l'aide d'un guide ou *stripper* de la totalité de la veine, de la malléole à la crosse. Il peut être réalisé sous anesthésie générale ou locorégionale. Il sera éventuellement complété par la résection des perforantes et l'injection de substances sclérosantes.
- Cryo-éveinage.
- Phlébectomie ambulatoire.
- Cure CHIVA : cure conservatrice et hémodynamique de l'insuffisance veineuse ambulatoire. Elle a pour objectif, par des sections-sutures étagées réalisées en ambulatoire, de modifier le trajet et le sens de la circulation veineuse du réseau superficiel vers le réseau profond. Elle permet de conserver le capital tronculaire saphénien mais expose au risque de récédive et d'échec.

#### Contre-indications au traitement chirurgical

- Âge avancé
- Obésité
- Grossesse
- Lymphœdème fixé
- Sclérodermie
- Artérite
- Thrombose veineuse profonde récente

#### Injections sclérosantes

L'injection dans la veine d'un produit irritant pour l'endothélium va transformer la varice en un cordon fibreux non perméable.

On utilisera le **TROMBOVAR** pour les grosses varices ou de taille moyenne, l'**AE-TOXISCLÉROL** pour les varices de toutes tailles et le **SCLÉRÉMO** pour les varices de toutes tailles et les varicosités.

Le traitement peut comprendre plusieurs séances d'injections.

#### Complications de la sclérothérapie

- Collection hématique
- Veinite
- Pigmentation et télangiectasies
- Ischémie aiguë (injection intra-artérielle.
- Nécrose locale (injection dans le tissu sous-cutané)
- Thrombose veineuse profonde sur terrain favorisant

**CARDIOPATHIES CONGÉNITALES****Traitement médical avant une intervention curative ou palliative chez les enfants porteurs d'une cardiopathie congénitale ducto-dépendante**

Le traitement par **prostaglandines IV** (**prostine**) permet un maintien temporaire de la perméabilité du canal artériel jusqu'à l'intervention chirurgicale. Les différentes techniques chirurgicales ne seront pas abordées.

Les indications du traitement par **prostaglandines IV** sont :

- obstacles droits :
  - sténose ou atrésie pulmonaire ;
  - atrésie tricuspide ;
  - tétralogie de Fallot ;
  - transposition des gros vaisseaux.
- obstacles gauches :
  - coarctation de l'aorte ;
  - interruption de la crosse de l'aorte ;
  - transposition des gros vaisseaux avec septum interventriculaire intact.

**ANTIVITAMINES K – RÈGLES DE PRESCRIPTION (1)****Avant de prescrire un traitement AVK [1]**

Vérifier l'absence de contre-indication.

Effectuer un bilan biologique : groupe, Rhésus, RAI, NFS, plaquettes, TP, TCA, fonction rénale, fonction hépatique.

**Prescription d'un traitement AVK en relais d'un traitement héparinique par HBPM ou HNF [1]**

Le relais précoce par **AVK**, c'est-à-dire dès le 1<sup>er</sup> j de l'héparinothérapie, est particulièrement recommandé.

Dose initiale : tenir compte de l'âge, des fonctions hépatique et rénale et des médicaments associés. Ne pas donner de dose de charge.

Ex. : **PRÉVISCAN 20 mg** : 1 cp. en 1 seule prise/j à prendre le soir.

Ex. : **SINTROM** : 1/2 cp. x 2/j.

**Prescription d'un traitement AVK sans héparinothérapie préalable [1]**

Règles de prescription identiques.

Contrôle TP et INR au 2<sup>e</sup> jour (**AVK** semi-lente) ou au 3<sup>e</sup> jour (**AVK** lente) après la dose initiale, puis tous les 2 à 3 j pour adapter la posologie jusqu'à être dans la zone thérapeutique souhaitée.

Adaptation de la posologie : effectuer TP, INR au 2<sup>e</sup> jour (**AVK** semi-lente) ou au 3<sup>e</sup> j (**AVK** lente).

La surveillance biologique d'un traitement par **AVK** doit se faire sur l'INR.

Pour une zone thérapeutique souhaitée en INR entre 2 et 3, l'adaptation du traitement est la suivante :

- si INR < 2 : poursuivre **héparine** à dose efficace, augmenter la dose d'**AVK** et prévoir TP, INR 48 h plus tard ;

- si INR > 3 : arrêter l'**héparine**, diminuer la dose d'**AVK** et prévoir TP, INR 48 h plus tard ;

- si INR entre 2 et 3 : faire un nouveau contrôle le lendemain pour s'assurer d'un INR stable dans la zone thérapeutique ; arrêter alors l'**héparine**.

Pour une zone thérapeutique en INR entre 3 et 4,5, procéder de la même façon.

L'augmentation ou la diminution de la dose d'**AVK** se fait toujours par paliers de 1/4 de cp. pour **SINTROM** et **PRÉVISCAN** et par paliers de 1/2 cp. à 2 mg pour **COUMADINE**.

Arrêter temporairement l'**AVK** si INR > 5 (TP < 10 %) et reprendre quand l'INR, contrôlé toutes les 24-48 h, est à nouveau dans la zone thérapeutique souhaitée.

## ANTIVITAMINES K (1) – DÉRIVÉS COUMARINIQUES

### ■ Warfarine

<b>COUMADINE</b>					
Dose initiale : 5 mg/j en 1 seule prise/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	20 cp. séc. 2 mg	2,43	I	65 %	0,12
	30 cp. séc. 5 mg	6,75	I	65 %	0,23

### ■ Acénocoumarol

<b>SINTROM</b>					
Dose initiale : 4 mg/j en 2 prises/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	30 cp. quadriséc. 4 mg	2,98	I	65 %	0,10
<b>MINISINTROM</b>					
À adapter à l'objectif d'INR	20 cp. 1 mg	1,94	I	65 %	0,10

## ANTIVITAMINES K (2) – DÉRIVÉ DE L'INDANEDIONE

### ■ Fluindione

<b>PRÉVISCAN</b>					
Dose initiale : 20 mg/j en 1 seule prise/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	30 cp. séc. 20 mg	3,85	I	65 %	0,13

**ANTIVITAMINES K – RÈGLES DE PRESCRIPTION (2)****Surveillance au long cours [1]****Éducation du patient**

Elle est indispensable ainsi que celle de son entourage.

Expliquer le but du traitement, ses risques, l'intérêt d'une prise régulière et sa surveillance régulière par prises de sang.

Port d'un carnet dans lequel figurent l'indication du traitement (fourchette thérapeutique souhaitée), le groupe sanguin, les résultats des contrôles biologiques datés et les modifications posologiques.

Donner la liste des médicaments interdits et autorisés (ex. : prendre du **paracétamol** et non de l'**aspirine** en cas de maux de tête).

Apprendre au patient à indiquer qu'il est sous **anticoagulant** en cas de chirurgie,

d'extraction dentaire, de toute injection ou ponction ou infiltration.

Lui indiquer les signes d'une hypocoagulation trop importante : épistaxis, gingivorragies, saignements prolongés aux coupures, ecchymoses faciles.

Augmenter la fréquence des contrôles biologiques en cas de maladie intercurrente, troubles digestifs (diarrhées), fièvre et au début de la prescription d'un nouveau médicament.

**Surveillance biologique**

TP, INR 1 fois par sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois puis 1 fois tous les 15 j ou tous les mois, tant que dure le traitement par **AVK**.

Faire des contrôles supplémentaires en cas d'introduction d'un nouveau médicament et en cas de modification de la dose d'**AVK**.

**CONSENSUS**

[1] Mise au point sur le bon usage des médicaments antivitaminé K (AVK), *Afssaps*, 2009

## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION IMMÉDIATE ET COURTE : FORMES PERLINGUALES

### ■ Trinitrine sublinguale

<b>NATISPRAY</b>					
<b>NATISPRAY 0,15 mg</b> 1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	200 doses 0,15 mg (fl. 13,5 mL)	4,39	II	65 %	0,02
<b>NATISPRAY 0,30 mg</b> 1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	300 doses 0,30 mg (fl. 18 mL)	6,13	II	65 %	0,02
<b>TRINITRINE SIMPLE LALEUF</b>					
Traitement préventif ou curatif de l'angor : 1 pilule/ administration À répéter après 2 à 3 minutes si besoin	60 pilules. 0,15 mg	2,84	II	65 %	0,05

### ■ Isosorbide dinitrate

<b>ISOCARD</b>					
1 à 2 pulv. sous la langue en cas de crise À répéter 1 à 2 fois si besoin	150 doses 1,25 mg (fl. 20 mL)	4,39	II	65 %	0,03

#### PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endo-cardiques.

Résorption très rapide par voie perlinguale.

**Trinitrine sublinguale** : action en 1 à 2 min pendant 10 à 30 min.

**Isosorbide dinitrate** sublingual : action en 3 à 15 min pendant 1 h.

#### INDICATIONS

Traitement curatif de la crise d'angor.

Traitement préventif précritique de la crise d'angor.

**NATISPRAY 0,30** : œdème aigu pulmonaire en complément des autres traitements usuels.

#### CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indication absolue.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

Débuter à la plus faible posologie pour éviter des céphalées et recommander la position assise lors des pulvérisations pour éviter une hypotension orthostatique, notamment chez les personnes âgées.

En cas de cyanose inexpiquée, faire doser la méthémoglobinémie.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Vasodilatateurs, **diurétiques** et **antihypertenseurs** peuvent majorer l'hypotension artérielle.



## MALADIE CORONAIRE STABLE (2)

### Inhibiteurs calciques

Leurs effets anti-ischémiques sont corrélés aux mécanismes d'action spécifiques de chaque sous-classe thérapeutique.

#### ► Dihydropyridines (*ADALATE*, *AMLOR*, *LOXEN*)

- Effets coronarodilatateur permettant d'augmenter les apports en O<sub>2</sub> au myocarde.
- Effet tachycardisant modéré.
- Effet vasodilatateur périphérique contribuant à diminuer la post-charge et donc à réduire les besoins en O<sub>2</sub> du myocarde.

#### ► Non dihydropyridines : *diltiazem (TILDIEM)* et *vérapamil (ISOPTINE)*

- **Inhibiteurs calciques** bradycardisants.
- Réduisent la consommation en O<sub>2</sub> du myocarde.

Les **inhibiteurs calciques** sont indiqués quand :

- les **β-bloquants** sont contre-indiqués :
  - en cas de contre-indication extracardiaque (BPCO, asthme), prescrire de préférence un **inhibiteur calcique** bradycardisant : *BI-TILDIEM* 90 ou 120 mg : 1 cp. x 2/j,
  - en cas de contre-indication cardiaque (bradycardie), les **dihydropyridines** sont utilisables : *AMLOR* 5 mg : 1 à 2 cp./j ;
- l'angor est à forte composante spastique :
  - les **β-bloquants** sont à éviter ;
  - privilégier *vérapamil* ou *diltiazem* (240 à 360 mg/j) ou *nifédipine* (40 à 60 mg/j). Un **dérivé nitré à longue durée d'action** peut être ajouté.

En cas d'angor d'effort sévère, l'association d'une **dihydropyridine** à longue durée d'action et d'un **β-bloquant** peut être envisagée : *CHRONADALATE LP* 30 mg : 1 cp./j + n'importe quel **β-bloquant**.

L'association **β-bloquant + inhibiteur calcique bradycardisant** n'est pas recommandée (risque de dysfonction sinusale). Attention à l'hypotension artérielle en cas d'association **dihydropyridine + dérivé nitré** (privilégier une prise décalée des 2 médicaments).

### Autre antiangineux : ivabradine (*PROCORALAN*)

- Traitement de l'angor stable chronique chez l'adulte en rythme sinusal.
- *PROCORALAN* 5 mg x 2/j à augmenter si besoin à 7,5 mg x 2/j.

### Dérivés nitrés d'action prolongée

- Ils doivent être administrés à fortes doses pour surmonter l'effet de premier passage hépatique.
- Ils doivent couvrir la période douloureuse mais des fenêtres thérapeutiques sont nécessaires pour éliminer l'effet d'accoutumance.
- Les formes à libération prolongée sont particulièrement adaptées dans cette indication.
- Exemples de posologie journalière :
  - *LANGORAN LP* 40 mg : 1 cp. matin et soir en respectant un intervalle de 12 h ;
  - *MONICOR LP* 40 ou 60 mg : 1 gél./j ;
  - *NITRIDERM TTS* 5, 10 ou 15 mg : coller le patch sur peau propre à faible pilosité comme la paroi latérale du thorax ; à laisser en place pendant 12 h diurnes (8 h à 20 h) ou nocturnes (20 h à 8 h).

### Molsidomine : molécule apparentée aux dérivés nitrés

- Mécanisme d'action voisin de celui des **dérivés nitrés**.
- Pas d'effet d'accoutumance significatif.
- Pas d'effet dépresseur sur la contractilité, la conduction et la fréquence cardiaques.
- Effet antiagrégant plaquettaire *in vitro*.
- *CORVASAL* 2 ou 4 mg : 1 cp. x 3/j.

## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION PROLONGÉE : FORMES ORALES

## ■ Isosorbide dinitrate

<b>RISORDAN</b>					
10 à 80 mg/j en 2 à 3 prises à avaler sans croquer ni sucer	60 cp. séc. 20 mg	5,03	II	65 %	0,08
<b>LANGORAN LP</b>					
20 à 40 mg x 2 à 3 /j	60 gél. 20 mg	3,26	II	65 %	0,05
	60 gél. 40 mg	5,11	II	65 %	0,09

## ■ Isosorbide mononitrate

<b>MONICOR LP</b>					
1 gél. x 2/j (toutes les 12 h)	30 gél. 20 mg	3,64	II	65 %	0,12
1 gél./j	60 gél. 20 mg	6,42	II	65 %	0,11
	30 gél. 40 mg	6,00	II	65 %	0,20
	100 gél. 40 mg	HOP	II		
1 gél./j	30 gél. 60 mg	7,90	II	65 %	0,26

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques.

Action en 15 à 60 min mais prolongée de 4 à 24 h selon les produits et les formes galéniques.

**INDICATIONS**

Traitement de fond préventif des crises d'angor.

Traitement de l'insuffisance cardiaque gauche ou globale (en association aux autres thérapeutiques usuelles)

**CONTRE-INDICATIONS**

Pas de contre-indication absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La posologie efficace devra être atteinte progressivement en raison des risques d'hypoten-

sion artérielle et de céphalées intenses chez certains sujets.

La posologie quotidienne doit être adaptée à l'efficacité et à la tolérance du patient.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement prolongé et à fortes doses.

Utiliser avec prudence en cas de cardiomyopathie obstructive (majoration du gradient intraventriculaire).

En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthémoglobémie.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.

Possibilité d'épuisement thérapeutique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Vasodilatateurs, **diurétiques** et **antihypertenseurs** peuvent majorer l'hypotension artérielle.

**MALADIE CORONAIRE STABLE (3)****Nicorandil : molécule apparentée aux dérivés nitrés**

- Propriétés voisines de celles des **dérivés nitrés**. Activateur des canaux potassiques.
- Effet antispastique, diminution de la pré et de la post-charge, effet coronarodilatateur.
- Peut être prescrit en monothérapie ou en association avec un  **$\beta$ -bloquant** ou un **inhibiteur calcique** bradycardisant.
- Ne pas associer aux **dérivés nitrés** et **apparentés**.

**ADANCOR** 10 ou 20 mg ou **IKOREL** 10 ou 20 mg : 5 mg x 2/j pendant 7 j puis 10 à 20 mg x 2/j.

**Autres traitements dans la maladie coronaire stable [1]**

Pour améliorer le pronostic, les thérapeutiques suivantes ont montré un bénéfice dans tous les cas de maladie coronaire stable : **aspirine** ou **clopidogrel**, **inhibiteur de l'enzyme de conversion**, **statine**.

**Antiagrégants plaquettaires**

- Leur prescription est **INDISPENSABLE** à chaque coronarien.
- Ils préviennent les accidents thrombotiques (notamment coronaires mais aussi cérébraux).

**ASPÉGIC** 100 ou 250 mg : 1 sach./j.

**PLAVIX** 75 mg : 1 cp./j en cas de contre-indication vraie à l'**aspirine** ou en cas de patient polyartériel.

**Inhibiteur de l'enzyme de conversion**

- Dans la maladie coronaire stable, le **périndopril** et le **ramipril** ont montré leur

efficacité dans la réduction du risque d'événements cardiaques chez les patients ayant un antécédent d'IDM et/ou de revascularisation.

• **COVERSYL** 10 mg : 1 cp.le matin.

• **TRIATEC** 10 mg : 1 cp. le matin.

**Correction des facteurs de risque cardiovasculaires**

- Arrêt du tabagisme, perte de poids si nécessaire.
- Traiter une hypercholestérolémie par une **statine** (ou **ézétimibe** ou **béazafibrate** en cas d'intolérance vraie aux **statines**).
- Normaliser la pression artérielle, équilibrer un diabète.
- Activité physique régulière et adaptée comme la marche, la natation et le vélo ; éviter le stress.

**Surveillance**

Réévaluation initiale indispensable du patient et de son traitement, de façon précoce entre le 4<sup>e</sup> et le 6<sup>e</sup> mois pour une éventuelle adaptation thérapeutique, puis réévaluation annuelle.


**Tolérance** : pression artérielle couché/debout, fréquence cardiaque, signes d'insuffisance cardiaque, espace PR à l'ECG.

**Efficacité** : fréquence des crises angineuses, intensité de l'effort déclenchant, consommation de **trinitrine**.

Faire pratiquer un ECG de repos annuel et un ECG supplémentaire en cas de nouveau symptôme ou en cas de médication nouvelle pouvant agir sur la conduction. Un test d'effort ou une imagerie de stress est recommandé devant la récurrence ou l'apparition de nouveaux symptômes.

## MALADIE CORONAIRE STABLE (4)

## En pratique



## DÉRIVÉS NITRÉS D'ACTION PROLONGÉE : DISPOSITIFS TRANSDERMQUES

### ■ Trinitrine percutanée

<b>NITRIDERM TTS</b>					
1 patch à coller sur la paroi latérale du thorax de 8 h à 20 h pour couvrir la journée ou de 20 h à 8 h pour couvrir la nuit	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>DISCOTRINE</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>DIAFUSOR</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	100 systèmes 5 mg	HOP	II		
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	100 systèmes 10 mg	HOP	II		
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>CORDIPATCH</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
<b>TRINIPATCH</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56
<b>EPINITRIL</b>					
Idem <b>NITRIDERM TTS</b>	30 systèmes 5 mg	14,34	II	65 %	0,48
	30 systèmes 10 mg	15,56	II	65 %	0,52
	30 systèmes 15 mg	16,80	II	65 %	0,56

### PROPRIÉTÉS

Vasodilatateurs veineux (et artériels à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques. Résorption percutanée avec passage transdermique à vitesse constante.

### INDICATIONS

Traitement de fond préventif des crises d'angor.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux **dérivés nitrés**. Cardiomyopathie obstructive. Hypertension intracrânienne.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Devant la possibilité d'atténuation de l'effet thérapeutique en cas d'administration continue de **trinitrine transdermique**, il est recommandé de retirer le système pendant 12 h si un traitement antiangineux est associé.

La posologie efficace devra être atteinte progressivement en raison des risques d'hypotension artérielle et de céphalées intenses chez certains sujets.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement prolongé et à fortes doses.

Enlever le système adhésif avant de réaliser un choc électrique externe.

En cas de cyanose inexpliquée, faire doser la méthémoglobinémie.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions cutanées allergiques très rares.

Céphalées en début de traitement mais disparaissant progressivement.

Hypotension notamment chez le sujet âgé.

Nausées, troubles digestifs.

Vasodilatation cutanée avec érythème.

Possibilité d'épuisement thérapeutique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Vasodilatateurs, diurétiques et antihypertenseurs peuvent majorer l'hypotension artérielle.

## MOLECULES APPARENTÉES AUX DÉRIVÉS NITRÉS (1)

### ■ Molsidomine

<b>CORVASAL</b>					
Angor d'effort stable : 1/2 à 1 cp. à 2 mg x 3/j pendant les repas	30 cp. séc. 2 mg	4,80	I	65 %	0,16
Angor d'effort sévère ou angor spontané ou angor sévère rebelle : 1 cp. à 4 mg x 3/j	90 cp. séc. 2 mg	12,06	I	65 %	0,13
	100 cp. séc. 2 mg	HOP	I		
	30 cp. 4 mg	7,47	I	65 %	0,25
	100 cp. 4 mg	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Propriétés voisines de celles des **dérivés nitrés** d'action prolongée. Dénués d'effet déprimeur sur la contractilité, la conduction et la fréquence cardiaques. Dénués d'effet d'accoutumance significatif. Effet antiagrégant plaquettaire *in vitro*.

#### INDICATIONS

Traitement de fond préventif des crises d'angor de tout type.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypotension artérielle sévère avec état de choc.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

Débuter le traitement à faibles doses puis augmenter progressivement surtout chez les sujets âgés, insuffisants hépatiques, hypotendus, hypovolémiques ou traités par autres vasodilatateurs.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées et baisse tensionnelle modérées en début de traitement mais rapidement régressives. Exceptionnellement : hypotension orthostatique, troubles digestifs, vertiges, prurit.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Majoration de l'hypotension avec les autres traitements vasodilatateurs.

La substitution aux **dérivés nitrés** est plus logique que leur association en raison des propriétés voisines de ces 2 classes.

## MOLECULES APPARENTÉES AUX DÉRIVÉS NITRÉS (2)

### ■ Nicorandil

<b>ADANCOR</b>					
À augmenter progressivement : 5 mg x 2/j pendant 1 sem. puis 10 à 20 mg x 2 /j	30 cp. séc. 10 mg	6,04	I	65 %	0,20
	30 cp. 20 mg	10,95	I	65 %	0,37
<b>IKOREL</b>					
Idem <b>ADANCOR</b>	30 cp. séc. 10 mg	6,04	I	65 %	0,20
	30 cp. 20 mg	10,95	I	65 %	0,37

### PROPRIÉTÉS

Propriétés voisines de celles des **dérivés nitrés** d'action prolongée. Activateur des canaux potassiques. Effet coronarodilatateur et antispastique sans phénomène de vol coronaire ni de dépression de la contractilité ni d'échappement thérapeutique.

### INDICATIONS

Traitement préventif des crises d'angor d'effort.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit, hypotension artérielle, état de choc cardiogénique.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

Éviter ou utiliser avec prudence chez les sujets hypovolémiques ou avec une pression artérielle systolique < 100 mmHg. Débuter toujours à doses progressives à cause des céphalées fréquentes.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées fréquentes mais transitoires. Rarement vertiges, troubles digestifs, palpitations, flush facial, hypotension et/ou tachycardie, aphtoses ou ulcérations buccales.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation de l'effet hypotenseur des **bêta-bloquants**, des **inhibiteurs calciques** et des **antidépresseurs tricycliques**.

Ne pas associer aux **dérivés nitrés** et apparentés.

## AUTRES ANTIANGINEUX

## ■ Ivabradine

PROCORALAN					
Traitement de la maladie coronaire : 5 mg x 2/j à augmenter si besoin après 1 mois à 7,5 mg x 2/j	56 cp. 5 mg 100 cp. 5 mg	52,36 HOP	I	65 %	0,94
Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique : 5 mg x 2/j à augmenter si besoin après 15 j à 7,5 mg x 2/j	56 cp. 7,5 mg 100 cp. 7,5 mg	52,36 HOP	I	65 %	0,94

## PROPRIÉTÉS

Diminue la fréquence cardiaque par inhibition sélective du courant pacemaker au niveau du nœud sinusal.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de l'angor stable chronique chez les patients en rythme sinusal :

– avec une contre-indication ou intolérance aux **bêtabloquants** ;

– ou en association aux **bêtabloquants** chez des patients insuffisamment contrôlés par un bêtabloquant à dose optimale et dont la FC reste > 60/min

Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique de classe II à IV NYHA avec dysfonction systolique chez des patients en rythme sinusal dont la FC est ≥ 75/min en association au traitement standard avec **bêtabloquant** ou en cas de contre-indication à un **bêtabloquant**.

## ■ Trimétazidine

VASTAREL					
1 cp. x 3/j 60 gttes buv./j en 3 prises aux repas	60 cp. 20 mg 1200 gttes fl. 60 mL 20 mg/mL		II	NR	
1 cp. matin et soir	60 cp. 35 mg à libération modifiée		II	NR	

## PROPRIÉTÉS

Effet anti-ischémique cellulaire.

## INDICATIONS

Traitement prophylactique d'appoint des crises d'angine de poitrine.

Traitement d'appoint des atteintes vasculaires chorio-rétiniennes.

Traitement d'appoint des vertiges d'origine vasculaire, vertiges de Ménière, acouphènes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**ivabradine**.

Bradycardie < 50/min, choc cardiogénique, hypotension artérielle < 90/50 mmHg.

IDM aigu, angor instable, BAV 3, IC instable.

Grossesse, allaitement.

Déficit en lactase, malabsorption glucose ou galactose.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation déconseillée en cas d'arythmie, de BAV 2 de bradycardie < 60/min, d'AVC récent.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Bradycardie, élévation uricémie et éosinophilie. BAV 1, extrasystoles ventriculaires et supraventriculaires, palpitations.

Diarrhée, céphalées, vertiges, dyspnée.

Phosphènes.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association fortement déconseillée avec **inhibiteurs calciques** bradycardisants tels que **vérapamil** et **diltiazem**.

Éviter l'association avec des molécules allongeant l'intervalle QT.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Pas d'effets indésirables connus.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.



## BÊTABLOQUANTS CARDIOSÉLECTIFS AVEC ACTIVITÉ SYMPATHIQUE INTRINSÈQUE (ASI)

### ■ Acébutolol

<b>SECTRAL</b>					
Angor et troubles du rythme : 400 à 800 mg/j en 3 prises/j de préférence Infarctus : 200 mg matin et soir HTA : 400 mg/j en 1 prise le matin ou 200 mg matin et soir	30 cp. séc. 200 mg	6,02	I	65 %	0,20
	90 cp. séc. 200 mg	16,84	I	65 %	0,19
	30 cp. séc. 400 mg	11,21	I	65 %	0,37
	90 cp. séc. 400 mg	31,55	I	65 %	0,35
	1 mL sol. buv. 40 mg/mL	18,90	I	65 %	18,90
<b>SECTRAL LP</b> Angor : 1 cp./j le matin Ne pas croquer ni broyer	28 cp. LP 500 mg	18,95	I	65 %	0,68

### ■ Céliprolol

<b>CÉLECTOL</b>					
HTA et angor : 1 cp. le matin à jeun/j. Max 3 cp./j	28 cp. séc. 200 mg	10,07	I	65 %	0,36
	84 cp. séc. 200 mg	28,35	I	65 %	0,34

Les bêtabloquants utilisés dans l'insuffisance cardiaque sont traités dans le chapitre Insuffisance cardiaque.

## BÊTABLOQUANTS CARDIOSÉLECTIFS SANS ASI (1)

## ■ Métoprolol

<b>LOPRESSOR</b>					
HTA : 1 cp. 200 mg le matin ou 1 cp. 100 mg matin et soir/j. Ne pas croquer Infarctus : dès J1, 50 mg/6 h pendant 48 h puis 200 mg/j en 2 ou 3 prises en dose d'entretien Angor : 50 à 100 mg/j en 1 ou 2 prises/j Troubles du rythme : 100 à 200 mg/j en 2 à 3 prises/j Migraine : 100 à 200 mg/j Érithisme cardiaque : 100 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	3,07	I	65 %	0,10
	90 cp. séc. 100 mg	8,08	I	65 %	0,09
	30 cp. séc. LP 200 mg	7,74	I	65 %	0,26
	90 cp. séc. LP 200 mg	21,76	I	65 %	0,24
<b>SELOKEN</b>					
Idem <b>LOPRESSOR</b>	30 cp. séc. 100 mg	4,39	I	65 %	0,15
	30 cp. LP 200 mg	7,74	I	65 %	0,26
	90 cp. LP 200 mg	21,76	I	65 %	0,24

## ■ Bisoprolol

<b>DETENSIEL</b>					
HTA : 10 mg/j le matin voire 20 mg si HTA sévère Angor : 10 mg/j en 1 prise voire 20 mg si angor sévère	30 cp. 10 mg	6,33	I	65 %	0,21
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	17,74	I	65 %	0,20

## ■ Bétaxolol

<b>KERLONE</b>					
HTA et angor : 20 mg/j en 1 prise	28 cp. séc. 20 mg	12,57	I	65 %	0,45
	84 cp. séc. 20 mg	35,38	I	65 %	0,42

## BÊTABLOQUANTS CARDIOSÉLECTIFS SANS ASI (2)

## ■ Aténolol

<b>TÉNORMINE</b>					
HTA : 100 mg/j le matin Angor et troubles du rythme : 100 à 200 mg/j Infarctus phase aiguë : en relais de la forme IV, 50 mg <i>per os</i> 15 min après l'inj. renouvelés 12 h après À partir de H24 : 100 mg/j <i>per os</i> en 1 prise/j Réduire la posologie de 50 % environ si insuffisance rénale sévère <b>TÉNORMINE injectable</b> inj. IV lente sous contrôle tensionnel et ECG Infarctus phase aiguë : 5 à 10 mg (1 mg/min) à injecter très précocement avant H12 puis relai <i>per os</i>	30 cp. séc. 50 mg	4,45	I	65 %	0,15
	90 cp. séc. 50 mg	12,17	I	65 %	0,14
	30 cp. séc. 100 mg	8,58	I	65 %	0,29
	90 cp. séc. 100 mg	24,14	I	65 %	0,27
	5 amp. 5 mg/10 mL	HOP	I		
<b>BETATOP</b>					
Idem <b>TÉNORMINE</b>	28 cp. 50 mg	3,65	I	65 %	0,13
	28 cp. 100 mg	5,99	I	65 %	0,21

## ■ Nébivolol

<b>NÉBILOX</b>					
HTA : 5 mg/j Insuffisance cardiaque chronique : posologie initiale progressive 1,25 mg/j 1 <sup>re</sup> sem., puis 2,5 et 5 mg/j les 2 et 3 <sup>e</sup> sem. (max. 10 mg/j en une prise)	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34
<b>TEMERIT</b>					
Idem <b>NÉBILOX</b>	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34

## BÊTABLOQUANTS NON CARDIOSÉLECTIFS SANS ASI (1)

## ■ Propranolol

<b>ALVOCARDYL</b>					
HTA, angor, cardiomyopathie obstructive : 2 cp. x 2/j en moyenne Infarctus : 1 cp. x 4/j pendant 2 à 3 j à instituer entre J5 et J21 après l'épisode aigu, puis 2 cp. x 2/j Troubles du rythme, hyperthyroïdie : 1 à 2 cp./j Migraines, algie face, tremblements : 1 à 3 cp./j Tachycardie, palpitations émotionnelles : 1 cp. 60 min avant la situation stressante	50 cp. séc. 40 mg	3,56	I	65 %	0,07
HTA, angor, cardiomyopathie obstructive, traitement d'entretien après infarctus : 1 gél./j le matin Prévention de la rupture de varices œsophagiennes : 1 gél./j le matin. Se fonder sur la fréquence cardiaque qui doit diminuer de 25 % sous traitement	30 gél. LP 160 mg 90 gél. LP 160 mg	8,32 23,41	I I	65 % 65 %	0,28 0,26

## ■ Nadolol

<b>CORGARD</b>					
HTA, angor : 1 cp./j le matin Troubles du rythme, hyperthyroïdie : 1/2 à 1 cp./j le matin Cardiomyopathie obstructive : 1 à 4 cp./j en 1 ou plusieurs prises Réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale en espaçant les prises	28 cp. séc. 80 mg	5,68	I	65 %	0,20

## ■ Timolol

<b>TIMACOR</b>					
HTA : 10 à 30 mg/j en 1 à 3 prises Angor : 15 à 45 mg/j Traitement au long cours après infarctus : 10 mg x 2/j	30 cp. séc. 10 mg	4,98	I	65 %	0,17

## BÊTABLOQUANTS NON CARDIOSÉLECTIFS SANS ASI (2)

## ■ Tertatolol

<b>ARTEX</b>					
HTA : 1 cp./j le matin Si insuffisance hépatique : 1/2 cp./j	30 cp. séc. 5 mg	12,09	I	65 %	0,40

## ■ Sotalol

<b>SOTALLEX</b>					
Prévention des récidives des tachycardies supraventriculaires et ventriculaires : initialement 80 mg/j, puis 160 à 320 mg/j en moyenne en 2 prises Posologie à diminuer en cas d'insuffisance rénale	30 cp. séc. 80 mg	3,28	I	65 %	0,11
	30 cp. séc. 160 mg	5,41	I	65 %	0,18

## ■ Labétalol

<b>TRANDATE</b>					
HTA : 400 à 800 mg/j en 2 prises	30 cp. séc. 200 mg	6,29	I	65 %	0,21
<b>TRANDATE injectable</b> Urgence hypertensive : 1 mg/kg en IV en 1 min à répéter si besoin après 10 min puis relais <i>per os</i> : 200 à 400 mg/6 h, ou par perfusion IV : 0,1 à 0,3 mg/kg/h selon sévérité de l'HTA	180 cp. séc. 200 mg	33,03	I	65 %	0,18
	5 amp. 100 mg/20 mL	HOP	I		

## BÊTABLOQUANTS NON CARDIOSÉLECTIFS AVEC ASI

## ■ Pindolol

<b>VISKEN</b>					
HTA : 15 mg/j en moyenne en 1 à 3 prises/j Dose maximale par prise : 30 mg Dose maximale par jour : 60 mg Angor : 15 mg/j en moyenne en 1 à 3 prises/j Troubles du rythme : 5 à 15 mg/j Hyperthyroïdie, cardiomyopathie obstructive : 5 à 15 mg/j en 1 à 3 prises/j	90 cp. séc. 5 mg	8,24	I	65 %	0,09
<b>VISKEN-QUINZE</b>					
HTA et angor : 1 cp./j le matin	30 cp. séc. 15 mg	10,86	I	65 %	0,36
	90 cp. séc. 15 mg	30,56	I	65 %	0,34

## BÊTABLOQUANTS – PHARMACOLOGIE (1)

## PROPRIÉTÉS

Antagonistes compétitifs et spécifiques des catécholamines au niveau des récepteurs  $\beta$ -adrénergiques.

## Différents bêtabloquants

- On distingue les  **$\beta$ -bloquants** :
  - cardiosélectifs : blocage préférentiel des récepteurs  $\beta_1$ -cardiaques et respect relatif des récepteurs  $\beta_2$ -extracardiaques (muscles lisses bronchiques et vasculaires). Toutefois, la cardiosélectivité n'est pas absolue et ces  **$\beta$ -bloquants** peuvent provoquer des crises d'asthme à fortes doses ;
  - non cardiosélectifs : blocage des récepteurs  $\beta_1$ -cardiaques et des récepteurs  $\beta_2$ -extracardiaques responsables d'une bronchoconstriction, d'une vasoconstriction, d'une augmentation des sécrétions et du péristaltisme digestifs et de perturbations métaboliques.
- On distingue aussi les  **$\beta$ -bloquants** par :
  - leur activité sympathomimétique intrinsèque (ASI) ou non. La présence d'une ASI entraîne une bradycardie moindre au repos, moins d'effets broncho- ou vasoconstricteurs, moins de perturbations métaboliques. Les  **$\beta$ -**

**bloquants** avec ASI sont inefficaces dans la migraine ;

- leur effet stabilisant de membrane ou non : pas de traduction clinique.

On distingue aussi les  **$\beta$ -bloquants** :

- liposolubles : métabolisme hépatique, contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère. Effets secondaires centraux : cauchemars, insomnies, syndrome dépressif ;
- hydrosolubles : élimination rénale, posologie à adapter, voire contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère. Pas d'effet central ;
- mixtes : métabolisme hépatique et élimination rénale.

Propriétés supplémentaires propres à certains

**$\beta$ -bloquants** :

- CÉLECTOL** : activité  $\beta_2$ -agoniste, effet  $\alpha_2$ -bloquant faible ;
- TRANDATE** : effet  $\alpha_1$ -bloquant postsynaptique modéré au niveau des vaisseaux ;
- SOTALEX** : effet antiarythmique supplémentaire de classe III ;
- NÉBILOX, TEMERIT** : antagonistes sélectifs et compétitifs des récepteurs  $\beta_1$  cardiaques et propriétés vasodilatatrices modérées.

Propriétés des  $\beta$ -bloquants

DCI	CARDIO-SÉLECTIVITÉ	ASI	TYPE D'ÉLIMINATION	PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
<b>Acébutolol</b>	Oui	Oui, modérée	Hép/Rén	
<b>Céilprolol</b>	Oui	Oui, modérée	Hép/Rén	Activité $\beta_2$ -agoniste. Effet $\alpha_2$ -bloquant faible
<b>Métoprolol</b>	Oui	Non	Hép	
<b>Aténolol</b>	Oui, bonne	Non	Rén	
<b>Néбиволol</b>	Oui, très bonne	Non	Rén	Propriété vasodilatatrice
<b>Bisoprolol</b>	Oui, très bonne	Non	Rén	
<b>Bétaxolol</b>	Oui, bonne	Non	Rén	
<b>Pindolol</b>	Non	Oui, importante	Hép/Rén	
<b>Propranolol</b>	Non	Oui, assez importante	Hép	
<b>Nadolol</b>	Non	Non	Rén	
<b>Timolol</b>	Non	Non	Rén	
<b>Tertatolol</b>	Non	Non	Rén	
<b>Sotalol</b>	Non	Non	Rén	Effet antiarythmique de classe III
<b>Labétalol</b>	Non	Non	Hép/Rén	$\alpha_1$ -bloquant post-synaptique
<b>Carvédilol</b>	Oui	Non	Rén	Activité $\alpha$ -bloquante supplémentaire

**BÊTABLOQUANTS – PHARMACOLOGIE (2)****Effets cliniques**

**Effets cardiovasculaires** : réduction de la fréquence cardiaque, ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire, réduction de la contractilité myocardique, réduction du débit cardiaque, réduction de la consommation d'oxygène du myocarde au repos et à l'effort, effet antihypertenseur.

**Effets extracardiaques** provoqués surtout par les  **$\beta$ -bloquants non cardiosélectifs** : bronchoconstriction, vasoconstriction, hypoglycémie, freinage de la sécrétion de rénine, diminution de la production d'humeur aqueuse, augmentation des sécrétions et du péristaltisme digestifs, perturbations métaboliques avec augmentation des triglycérides et diminution du rapport HDL cholestérol/cholestérol total.

**INDICATIONS**

- Hypertension artérielle (HTA).
- Prophylaxie des crises d'angor d'effort.
- Angor instable/IDM ST-.
- Infarctus du myocarde ST+ à la phase aiguë.
- Traitement au long cours après infarctus (réduction des récurrences ischémiques et de la mortalité essentiellement par mort subite).
- Insuffisance cardiaque chronique (**carvédilol, métoprolol, bisoprolol, nébivolol**). Cf. **Insuffisance cardiaque**.
- Traitement et prévention des tachycardies sinusales ou jonctionnelles, d'une cadence ventriculaire élevée dans les fibrillations et les flutters auriculaires. Traitement et prévention de certains troubles du rythme ventriculaires (extrasystolie ventriculaire, tachycardies ventriculaires).
- Signes fonctionnels des cardiomyopathies hypertrophiques et obstructives.
- Manifestations cardiovasculaires des hyperthyroïdies.
- Traitement de fond des migraines, algies faciales et tremblements essentiels.
- Prévention primaire (grades II et III) et secondaire (tous grades) de l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes (**non cardiosélectifs** : **propranolol** et **nadolol**).
- Algodystrophies, trac (**propranolol**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) sévères.  
Insuffisance cardiaque décompensée, choc cardiogénique.

Angor de Prinzmetal pur.

Blocs auriculoventriculaires (BAV) des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés non appareillés.

Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).

Bradycardies importantes (FC < 45-50/min).

Syndrome de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères.

Phéochromocytome non traité.

Hypotension artérielle ou orthostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : risques de troubles du rythme graves, d'infarctus du myocarde et de mort subite. Idem dans l'HTA.

Utiliser avec prudence en cas d'asthme ou de BPCO modérés : préférer un cardiosélectif.

Utiliser avec prudence en cas de BAV de 1<sup>er</sup> degré. Surveillance de l'ECCG.

En cas de troubles artériels périphériques, privilégier un cardiosélectif avec ASI pour ne pas aggraver les troubles.

En cas de phéochromocytome, associer toujours un  **$\alpha$ -bloquant** pour éviter une crise hypertensive.

Chez le sujet âgé : respect absolu des contre-indications et surveillance étroite.

Chez le sujet diabétique : les signes annonçant une hypoglycémie, comme les palpitations et les sueurs, peuvent être masqués ; préférer un cardiosélectif et renforcer les contrôles glycémiques au début.

Utiliser avec prudence en cas d'antécédent de choc anaphylactique.

En cas d'insuffisance rénale ou hépatique : privilégier un  **$\beta$ -bloquant** non éliminé par l'organe insuffisant ou réduire la posologie.

En cas d'anesthésie générale : une prémédication d'**atropine** peut être utile. On ne doit plus systématiquement arrêter un  **$\beta$ -bloquant** avant une anesthésie. Il a été montré une réduction de la mortalité périopératoire quand on maintient un traitement bêta-bloquant.

**Grossesse** : les  **$\beta$ -bloquants** peuvent être prescrits si besoin. Pas d'effet tératogène connu. Surveiller le nouveau-né les 5 premiers jours (glycémie, fréquence cardiaque, état respiratoire).

**Allaitement** : passage dans le lait maternel. À éviter sauf le **propranolol** (passage très faible).

**BÊTABLOQUANTS – PHARMACOLOGIE (3)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents : asthénie, refroidissement des extrémités, bradycardie modérée asymptomatique, troubles digestifs, impuissance dose-dépendante.

Rares mais imposant l'arrêt du traitement : bradycardie sévère symptomatique, chute tensionnelle, ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire ou aggravation d'un bloc auriculo-ventriculaire existant, insuffisance cardiaque, crise d'asthme, hypoglycémie, syndrome de Raynaud, aggravation d'une claudication intermittente existante, éruptions cutanées parfois psoriasiformes.

Divers : cauchemars (1 %), sécheresse lacrymale, aggravation du pronostic des chocs anaphylactiques, apparition d'anticorps antinucléaires mais exceptionnellement accompagnés d'un syndrome lupique cédant à l'arrêt du traitement, pneumopathies immunoallergiques exceptionnelles.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée : **floctafénine (IDARAC)**.

Associations déconseillées :

- **amiodarone (CORDARONE)** ;
  - **naftidrofuryl** injectable (**PRAXILÈNE**).
- Associations nécessitant des précautions d'emploi :
- **Anesthésiques volatils halogénés**.
  - **Inhibiteurs calciques** : **diltiazem, vérapamil** ; risque de bradycardie excessive. Avec les **dihydropyridines**, le risque est l'addition des effets inotropes négatifs des produits.
  - **Antiarythmique de classe Ia** : surveillance clinique et ECG nécessaire.
  - **Baclofène (LIORESAL)** : surveillance de la pression artérielle.
  - **Insuline et sulfamides hypoglycémisants** : masquage des symptômes de l'hypoglycémie surtout au début de l'association ; prévenir le malade et renforcer la surveillance glycémique.
  - **Lidocaïne (XYLOCARD, XYLOCAÏNE)** : décrit pour le **propranolol**, **métoprolol** et **nadolol**.
  - **Produits de contraste iodés** : réduction sous **bêtabloquants** des réactions cardiovasculaires de compensation en cas de choc allergique aux produits iodés.
  - **AINS, antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques, corticoïdes, méfloquine (LARIAM)**.
  - **Cimétidine et inducteurs enzymatiques** : à utiliser prudemment avec les **β-bloquants** liposolubles.



## DÉRIVÉS NITRÉS : FORME INJECTABLE

## ■ Isosorbide dinitrate

RISORDAN					
Angor instable : 2 à 5 mg/h par paliers progressifs en perf. IV continue à la seringue électrique Œdème aigu du poumon sévère : inj. IV directe de 2 mg max en 2 min. Relais par une perf. IV continue ou par voie orale		50 amp. 10 mL = 10 mg	HOP	I	

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateur veineux (et artériel à fortes doses) entraînant une réduction des besoins en O<sub>2</sub> du cœur. Vasodilatateur coronaire avec effet antispastique et redistribution du flux coronaire vers les zones ischémiques sous-endocardiques.

**INDICATIONS**

Angor instable.  
Insuffisance ventriculaire gauche en particulier à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde.  
Œdème aigu du poumon cardiogénique.  
Prévention de l'ischémie myocardique lors des interventions coronaires.  
Levée d'un spasme artériel coronaire par voie intrac coronaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypotension artérielle sévère non corrigée (valeur systolique < 100 mmHg).  
Collapsus circulatoire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Perfuser à débit continu en augmentant par paliers progressifs jusqu'à la posologie efficace. Posologie quotidienne ajustée selon l'efficacité et la tolérance du patient (hypotension artérielle, céphalées).  
Contrôler la pression artérielle systémique et la pression capillaire pulmonaire si voie centrale. En cas de cyanose inexpiquée, faire doser la méthémoglobémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, hypotension artérielle, vasodilatation cutanée transitoire avec érythème, troubles digestifs.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Majoration de l'hypotension avec les **antihypertenseurs**, les autres **vasodilatateurs**, les **diurétiques**.

## THROMBOLYTIQUES (1)

### ■ Streptokinase

<b>STREPTASE</b>					
IDM : 1 500 000 UI en perfusion IV continue sur 45 min	1 fl. 250 000 UI	HOP	I		
Embolie pulmonaire massive : 250 000 UI en perfusion IV sur 30 min puis 100 000 UI/h pendant 24 h	1 fl. 750 000 UI 1 fl. 1 500 000 UI	HOP HOP	I I		

Remarque : le lyophilisat doit être dissous dans un soluté glucosé à 5 % ou salé isotonique.

### ■ Altéplase

<b>ACTILYSE</b>					
IDM vu avant H6 : schéma accéléré 90 min :	1 fl. pdre 10 mg + fl. solv. 10 mL	HOP	I		
- 15 mg en bolus IV en 1 à 2 min	1 fl. pdre 20 mg + fl. solv. 20 mL	HOP	I		
- puis 0,75 mg/kg en perf. IV de 30 min sans dépasser 50 mg	1 fl. pdre 50 mg + fl. solv. 50 mL	HOP	I		
- puis 0,5 mg/kg en perf. IV de 60 min sans dépasser 35 mg					
IDM vu entre H6 et H12 : schéma 3 h :					
- 10 mg en bolus IV en 1 à 2 min					
- puis 50 mg en perfusion IV sur 1 h					
- puis 10 mg en perfusion IV de 30 min jusqu'à la dose maximale de 100 mg en 3 h					
Embolie pulmonaire aiguë massive : 10 mg en bolus IV en 1 à 2 min, puis 10 mg en perfusion IV sur 2 h					

Remarque : reconstituer le produit avec le solvant, mélanger sans agiter ni faire mousser et injecter dans les 30 min.

### ■ Rétéplase

<b>RAPILYSIN</b>					
IDM avant H12 : 10 U en bolus IV en 1 à 2 min puis 10 U en bolus IV en 1 à 2 min, 30 min plus tard	2 fl. pdre 10 U + ser. solv. 10 mL	HOP	I		

### ■ Urokinase

<b>ACTOSOLV</b>					
Posologie modérée : 2 000 UI/kg/h pendant 24 h et au-delà	1 fl. pdre 100 000 UI	HOP	I		
Posologie forte : 4 000 à 5 000 UI/kg/h pendant 12 h	1 fl. pdre 600 000 UI	HOP	I		

### ■ Ténecteplase

<b>METALYSE</b>					
IDM vu avant H6 : dose adaptée au poids sans dépasser 10 000 unités (50 mg) en un bolus IV unique de 10 s	1 fl. pdre 10 000 U	HOP	I		

**INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS PRÉCOCES (2)****Troubles conductifs****Dans les IDM antérieurs**

Un BAV III, un BAV II, un bi-bloc alternant, un bloc bi- ou trifasciculaire, un BBG isolé récent imposent un **entraînement électrosystolique temporaire**.

Un PR long, un HBAG, un HBPG ou un BBD isolé imposent une surveillance rapprochée. En cas d'aggravation, un entraînement électrosystolique temporaire s'impose.

**Dans les IDM inférieurs**

- La bonne tolérance clinique habituelle impose l'**abstention thérapeutique**.
- Un entraînement électrosystolique temporaire est indiqué en cas de :
  - bradycardie symptomatique ;
  - bradycardie inadaptée au bas débit cardiaque ;
  - extension de l'IDM au ventricule droit avec mauvaise tolérance hémodynamique ;
  - BAV associé à une hyperexcitabilité ventriculaire nécessitant un traitement antiarythmique ;
  - choc cardiogénique.

**Insuffisance ventriculaire gauche aiguë****Facteurs déclenchants**

- Troubles du rythme auriculaire rapide ou ventriculaire.
- IDM d'emblée étendu ou extension de l'IDM initial à d'autres territoires myocardiques.
- Fonction VG préalablement altérée.
- Prescription de médicaments inotropes négatifs.

**Prise en charge thérapeutique**

- Doit se faire dès les premiers signes cliniques au domicile du patient, pendant le transport médicalisé puis en USIC.

• Repose essentiellement sur l'oxygénothérapie au masque, un traitement diurétique en IV et un vasodilatateur veineux en IV.

• Une intubation avec ventilation assistée peut être nécessaire ainsi qu'une surveillance hémodynamique par sonde de Swan-Ganz.

• En cas de réponse hémodynamique incomplète, on associe un traitement inotrope positif : **dopamine**.

• En cas d'échec persistant, la **milrinone** peut être prescrite.

**Choc cardiogénique sans complication mécanique**

La mortalité de l'IDM compliqué de choc cardiogénique reste élevée, de l'ordre de 50-60 %. Le moyen le plus efficace de lutter contre cette complication est de traiter les patients le plus précocement possible à la phase aiguë, pour réduire la taille de l'IDM.

C'est l'indication d'une désobstruction coronaire par voie percutanée en urgence : angioplastie primaire.

• Traitement des facteurs aggravants essentiellement rythmiques.

• Correction des troubles métaboliques, hypovolémie, hypoxémie, acidose métabolique.

• Remplissage vasculaire, drogues vasopressives et drogues inotropes positives. Cf. Choc cardiogénique.

• En l'absence d'amélioration initiale, indication à la mise en place d'une assistance circulatoire type ECMO (*ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*) plus efficace qu'une simple contre-pulsion par ballon intra-aortique. Cette assistance circulatoire est en effet plus complète pour décharger le ventricule gauche et est implantée en salle de cathétérisme.

## THROMBOLYTIQUES (2) – PHARMACOLOGIE (1)

## PROPRIÉTÉS

Activation du système fibrinolytique physiologique en transformant le plasminogène inactif en plasmine active.

L'action protéolytique de la plasmine va s'exercer sur la fibrine du caillot pour le dissoudre et sur le fibrinogène circulant. L'efficacité est d'autant plus grande que le caillot est récent.

## INDICATIONS

Infarctus du myocarde à la phase aiguë au mieux avant la 6<sup>e</sup> h du début de la douleur (**streptokinase**, **altéplase**, **ténecteplase**) ou avant H12 (**rtéplase**).

Si administration antérieure de **streptokinase** et :

- survenue d'une allergie au produit : **altéplase** ;
- récurrence d'IDM au-delà de J5 : **altéplase** ;
- récurrence d'IDM avant J5 : **streptokinase** possible.

Embolie pulmonaire aiguë massive avec instabilité hémodynamique (**streptokinase**, **altéplase**, **urokinase**).

Désobstruction des shunts artério-veineux chez les malades hémodialysés, thrombose de prothèse valvulaire cardiaque, occlusion artérielle et veineuse par thrombus récent en cas de traitement endovasculaire, restauration de perméabilité de cathéters endovasculaires (**streptokinase**, **urokinase**).

Accident vasculaire cérébral ischémique vu dans les trois premières heures après le début des symptômes neurologiques (**altéplase**).

## CONTRE-INDICATIONS

## Absolues

Pathologie intracrânienne connue (néoplasie, anévrisme), antécédent d'hémorragie cérébrale, chirurgie intracrânienne récente, chirurgie médullaire ou oculaire récente < 3 mois, traumatisme crânien ou cervical, HTA sévère non contrôlée (> 180/110 mmHg), accident vasculaire ischémique cérébral < 6 mois, hémorragie extériorisée viscérale, intervention chirurgicale < 10 j, altérations constitutionnelles ou acquises de l'hémostase, biopsie hépatique ou rénale ou aortographie par voie lombaire < 15 j, implantation de prothèse en *Dacron* < 2 mois, suspicion de dissection aortique.

En cas de traitement par **streptokinase** : allergie à la **streptokinase**, infection streptococcique < 12 mois, utilisation de ce produit dans les 6 derniers mois.

## Relatives

Âge > 70 ans, hypertension artérielle modérée, ulcère digestif ou cirrhose ne saignant pas, rétinopathie diabétique sévère, massage cardiaque, atteinte hépatocellulaire ou rénale sévère, endocardite, péricardite, traumatisme récent peu important, pancréatite aiguë.

**Grossesse** : traitement par **streptokinase** contre-indiqué avant le 5<sup>e</sup> mois et en *post-partum* immédiat. Les autres **thrombolytiques** sont contre-indiqués pendant toute la durée de la grossesse.

**Allaitement** : contre-indiqué.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À administrer en milieu médicalisé spécialisé avec des moyens de surveillance et de réanimation adéquats (Samu, en phase préhospitalière, unités de réanimation).

Évaluer pour chaque patient le rapport bénéfice/risque hémorragique surtout en cas de contre-indications relatives.

Les injections intramusculaires et ponctions artérielles non compressibles sont contre-indiquées en cours de traitement.

Si traitement par **AVK** ou **héparine** au préalable, arrêter puis compenser ou neutraliser le déficit.

Surveillance du traitement : cf. Encadré.

Traitement associé : **aspirine** et **héparine standard** sont associées avec des protocoles précis.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Risque hémorragique

– Hémorragies mineures (5 à 10 %). Gingivorragies, épistaxis, saignements aux points de ponction, hématomes cutanés.

– Hémorragies majeures (4 à 5 %). Hémorragies intracrâniennes (0,5 %), artérielles périphériques, digestives, urogénitales, rétropéritonéales.

## Réactions allergiques

– Uniquement avec la **streptokinase**.

– Survienent de façon transitoire en début de traitement : hypotension, tachycardie, fièvre, frissons, myalgies, nausées, vomissements, éruption cutanée, hyperleucocytose à polymynucléaires neutrophiles.

– Rarement, choc anaphylactique.

## INFARCTUS DU MYOCARDE : COMPLICATIONS PRÉCOCES (3)

### Complications mécaniques

Intérêt majeur de la surveillance régulière par échocardiographie Doppler pour déceler de telles complications.

#### Insuffisance mitrale (IM) aiguë par rupture de pilier

- En cas d'IM massive avec œdème aigu pulmonaire ou choc cardiogénique résistant au traitement médicamenteux : chirurgie mitrale en urgence (réparation ou remplacement).
- En cas de stabilisation de l'état hémodynamique : bilan coronarographique puis chirurgie différée de 24-48 h (réparation ou remplacement).
- Rarement bonne tolérance clinique et hémodynamique sous traitement médicamenteux : chirurgie vers la 3<sup>e</sup> sem. (réparation ou remplacement).

#### Rupture septale

- Stabilisation hémodynamique initiale par molécules inotropes positives et vasodilatatrices.
- Fermeture chirurgicale de la brèche septale dont le délai est discuté par les équipes chirurgicales.

#### Fissuration du ventricule gauche

Chirurgie en extrême urgence.

### IDM étendu au ventricule droit

- Intérêt de l'angioplastie primaire (ou du traitement fibrinolytique précoce) pour limiter la taille de l'IDM.
- Arrêt des **dérivés nitrés** et **diurétiques**.
- Régime normosodé.
- Remplissage vasculaire sous contrôle des pressions de remplissage et du débit cardiaque (sonde de Swan-Ganz).
- Utilisation de molécules inotropes positives.
- Correction de troubles conductifs par entraînement électrosystolique temporaire idéalement auriculo-ventriculaire.

### Péricardite aiguë

- Toujours penser à une fissuration du VG.
- Un épanchement liquidien abondant à l'échocardiographie fait discuter l'**arrêt des anticoagulants** (transformation hémorragique toutefois exceptionnelle).
- Évacuation par ponction péricardique seulement en cas de signes de tamponnade.

### Thrombus intraventriculaire gauche

- Risques d'embolie périphérique.
- **HÉPARINE STANDARD** en IV à doses efficaces (ratio TCA entre 2 et 3) pendant une dizaine de j puis relais par un traitement **antivitamines K** (INR entre 2 et 3) à poursuivre jusqu'à disparition du thrombus vérifié par échocardiographie.

Surveillance échocardiographique itérative.

- Le traitement antivitamine K est définitif en cas de :
  - anévrisme du ventricule gauche ;
  - dysfonction ventriculaire gauche sévère ;
  - antécédents thromboemboliques.

**THROMBOLYTIQUES (3) – PHARMACOLOGIE (2)****INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Risque hémorragique accru en cas de traitement anticoagulant oral ou injectable ou antiagrégant plaquettaire associé.

Ne pas mélanger à d'autres substances médicamenteuses dans le flacon ni dans une perfusion.

**Traitement d'une hémorragie grave non contrôlée**

Arrêt du traitement thrombolytique, de l'**aspirine** et de l'**héparine**.

Compression prolongée des abords vasculaires.

Traitement antifibrinolytique : **acide tranexamique** en IV lente (*cf. Hémostatiques généraux en cardiologie*).

Neutralisation de l'**héparine** circulante par la **protamine**.

Correction des anomalies par transfusion selon les besoins (fibrinogène, plasma frais congelé, culots globulaires).

**Surveillance du traitement thrombolytique**

Elle comprend :

- la surveillance de l'efficacité du traitement avec l'apparition de critères de réperméabilisation coronaire : l'incidence de la reperméabilisation coronaire est de 50 à 75 % dans les 3 premières heures selon le **thrombolytique** utilisé ;
- la surveillance de la tolérance du traitement.

1. Clinique : disparition de la douleur angineuse. En cas de récurrence angineuse (= réocclusion dans 15 % des cas), une coronarographie est réalisée pour pratiquer une angioplastie de sauvetage.

2. ECG : diminution voire disparition du sus-décalage du segment ST. Arythmies ventriculaires de reperfusion (extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire, rythme idioventriculaire accéléré). Troubles conductifs. ECG pendant la perfusion, à la fin de la perfusion puis toutes les 4 h pendant 24 h.

3. Biologie : CPK avec fraction CPKMB, myoglobine, troponine. Le pic de CPK est plus précoce (< 4<sup>e</sup> h) qu'en cas d'IDM d'évolution spontanée. NFS, plaquettes, TP, TCA, fibrinogène/6 h pendant 24 h.

4. Surveillance de la tolérance : surveillance des points de ponction, signes hémorragiques latents ou patents. Échocardiographie + Doppler pour évaluer la fonction systolique VG au décours de la perfusion et éliminer un épanchement péricardique.

**Score d'occlusion de l'artère responsable de l'IDM évalué à la coronarographie****TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) 0**

- absence complète de flux au-delà de l'obstruction.

**TIMI 1**

- passage du produit de contraste au-delà de la sténose sans opacification complète du lit d'aval.

**TIMI 2**

- passage du produit de contraste au-delà de la sténose,
- opacification complète du lit d'aval,
- vitesse de lavage ralentie.

**TIMI 3**

- TIMI 2 mais vitesse de lavage non ralentie.

## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES (1)

## ■ Acide acétylsalicylique

<b>ASPÉRIC</b>					
Voir posologie quotidienne recommandée dans « INDICATIONS »	20 sach. N. 100 mg	2,20		65 %	0,11
	20 sach. E. 250 mg	2,28		65 %	0,11
<b>KARDÉGIC</b>					
Voir posologie quotidienne recommandée dans « INDICATIONS » Phase aiguë des syndromes coronaires aigus : 1 inj. unique de 250 ou 500 mg en IVD le plus rapidement possible, en dose de charge	30 sach. 75 mg	2,95		65 %	0,10
	30 sach. 160 mg	2,95		65 %	0,10
	30 sach. 300 mg	2,95		65 %	0,10
	20 fl. 500 mg/5 mL	HOP			

## ■ Clopidogrel

<b>PLAVIX</b>					
Initiation : dose de charge de 1 cp. à 300 mg dans le cadre d'un événement aigu comme un infarctus du myocarde Entretien : 1 cp./j à 75 mg	30 cp. 75 mg	33,84	I	65 %	1,13
	50 cp. 75 mg	HOP	I		
	30 cp. 300 mg	HOP	I		

## ■ Ticlopidine

<b>TICLID</b>					
1 cp. x 2/j pendant les repas	30 cp. 250 mg	26,11	I	65 %	0,87

## ■ Acide acétylsalicylique + clopidogrel

<b>DUOPLAVIN</b>					
1 cp./j	30 cp. 75 mg acide acétylsalicylique + 75 mg clopidogrel	24,92	I	65 %	0,83

## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES (2)

## ■ Flurbiprofène

<b>CEBUTID</b>					
1 cp. x 2/j pendant les repas	30 cp. 50 mg	3,60	II	65 %	0,12

## ■ Dipyridamole

<b>PERSANTINE</b>					
300 mg/j en moyenne à répartir dans la journée Explorations fonctionnelles cardiovasculaires : 0,5 mg/kg en perfusion IV	30 cp. 75 mg 10 amp. 2 mL = 10 mg	HOP	II I	NR	
<b>CLERIDIUM</b>					
300 mg/j en moyenne à répartir dans la journée	60 cp. séc. 150 mg		II	NR	

## ■ Acide acétylsalicylique + dipyridamole

<b>ASASANTINE LP</b>					
1 gél. x 2/j	60 gél. 200 mg/ 25 mg 300 gél. 200 mg/ 25 mg	14,56 HOP	II	65 %	0,24



## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES (3) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

– **Aspirine** : inhibition irréversible de la cyclo-oxygénase plaquettaire entraînant une absence de synthèse de thromboxane A<sub>2</sub>, activateur plaquettaire et vasoconstricteur.

– **Ticlopidine** et **clopidogrel** : inhibition irréversible de l'agrégation plaquettaire induite par l'ADP qui est un activateur plaquettaire.

– **Flurbiprofène** : inhibition réversible (24 h) de la cyclo-oxygénase plaquettaire entraînant un défaut de synthèse de thromboxane A<sub>2</sub>.

– **Dipyridamole** : inhibition de la phosphodiésterase plaquettaire entraînant une augmentation du taux d'AMPc intraplaquettaire.

### INDICATIONS

#### Aspirine

Les posologies sont en mg/j :

– Traitement de l'IDM à la phase aiguë, thrombolysé ou non (160 à 325 mg).

– Prévention secondaire post-IDM (160 à 325 mg).

– Angor stable et angor instable (160 à 325).

– Prévention des occlusions coronaires après pontage (325 ou plus), angioplasties ou stents (160 à 325 mg).

– Prévention des récurrences d'accident ischémique cérébral (75 à 1 300 mg).

– Prothèse valvulaire mécanique en association avec un traitement par **AVK** (100 mg).

– Fibrillation auriculaire (325 mg).

– Chirurgie carotidienne (80 à 650 mg).

#### Clopidogrel

Le clopidogrel est indiqué dans la prévention des événements athérothrombotiques (liés à l'athéromatose) :

– Chez les patients adultes souffrant d'un infarctus du myocarde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), d'un accident vasculaire cérébral ischémique (datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie.

Le clopidogrel est également indiqué, en association à l'**aspirine** :

– Dans la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients adultes souffrant d'un syndrome coronaire aigu (angor ins-

table, infarctus du myocarde) avec ou sans sus-décalage du segment ST y compris les patients bénéficiant d'une angioplastie coronaire avec pose de stent, éligibles à un traitement thrombolytique.

– Dans la prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques chez les patients adultes souffrant de fibrillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque d'événements vasculaires, qui ne peuvent être traités par un **antivitamine K** et qui présentent un faible risque de saignements.

#### Ticlopidine

– Prévention des complications thrombotiques artérielles après un premier accident vasculaire cérébral lié à l'athérosclérose.

– Prévention des accidents ischémiques majeurs (ex. : coronariens) chez les patients souffrant d'une artérite des membres inférieurs.

– Contre-indication vraie à l'**aspirine**.

– Thromboembolies récurrentes sous **aspirine**.

#### Flurbiprofène

Prévention secondaire après IDM et après désobstruction coronaire au cas où l'**aspirine** est temporairement contre-indiquée (ex. : chirurgie programmée).

#### Dipyridamole

Prévention des accidents thromboemboliques systémiques sur valves cardiaques ou après pontage en association avec les **antivitamines K** ou l'**aspirine**.

### CONTRE-INDICATIONS

#### Générales

Ulcère gastroduodénal évolutif.

Maladies hémorragiques, risque hémorragique.

Allergie connue à la molécule.

#### Particulières

**Ticlopidine** : antécédents hématologiques.

**Flurbiprofène** : insuffisance hépatocellulaire sévère, insuffisance rénale sévère.

**Dipyridamole** : à la phase aiguë d'un IDM.

**Grossesse** : **aspirine** contre-indiquée au 3<sup>e</sup> trimestre, **ticlopidine** et **dipyridamole** contre-indiqués pendant toute la grossesse, **flurbiprofène** contre-indiqué aux 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres.

**Allaitement** : contre-indiqué.

## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES (4) – PHARMACOLOGIE (2)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Aspirine** : à utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'hémorragie digestive. À arrêter 8 j avant une chirurgie lourde programmée et à remplacer par le **flurbiprofène** jusqu'à la veille de la chirurgie.

**Ticlopidine** : surveillance hématologique (NFS + plaquettes avant traitement puis tous les 15 j pendant les 3 premiers mois puis 15 j après l'arrêt). Arrêter 8 j avant une chirurgie lourde programmée.

**Clopidogrel** : pas de surveillance hématologique.

**Flurbiprofène** : utiliser avec précaution si antécédents d'hémorragie digestive ou d'ulcère.

**Dipyridamole** : augmentation progressive de la posologie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

**Aspirine** : cf. **Aspirine** (rhumatologie).

**Ticlopidine** : troubles hématologiques graves mais exceptionnels (neutropénie, pancytopenie, aplasie médullaire, thrombopénie). Accidents hémorragiques, diarrhées, nausées, éruptions cutanées, hépatite, ictère cholestatique.

**Clopidogrel** : a l'avantage de ne pas donner les effets indésirables hématologiques de la **ticlopidine**.

**Flurbiprofène** : cf. **AINS** (rhumatologie).

**Dipyridamole** : céphalées, bouffées de chaleur, hypotension, nausées, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées. Possibilité de crises d'angor avec la forme IV.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

• Interactions communes à tous les **antiagrégants plaquettaires** : substances ayant des propriétés antiagrégantes plaquettaires : l'**aspirine** et les **AINS**, la **ticlopidine** et le **clopidogrel**, le **tirofiban**, l'**éptifibatide** et l'**abciximab**, l'**iloprost**.

L'utilisation de plusieurs **antiagrégants plaquettaires** majore le risque de saignement, de même que leur association à l'**héparine** ou **analogues de l'héparine** (hirudines), aux **anticoagulants oraux** et aux **thrombolytiques**, et doit être prise en compte en maintenant une surveillance régulière, clinique et biologique.

#### • **Aspirine** :

– Associations contre-indiquées

**Méthotrexate** utilisé à des doses supérieures à 15 mg/sem.

– Associations déconseillées

Anticoagulants oraux.

**Uricosuriques** (**benzbromarone**, **probenécide**).

– Associations faisant l'objet de précautions d'emploi

**Glucocorticoïdes** (voie générale), sauf **hydrocortisone** employée comme traitement substitutif dans la maladie d'Addison.

**Méthotrexate** utilisé à des doses inférieures à 15 mg/sem.

– Associations à prendre en compte

**Héparines** aux doses curatives et préventives.

**Topiques gastro-intestinaux** (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium et de calcium).

#### • **Flurbiprofène** : cf. **AINS** (rhumatologie).

#### • **Clopidogrel** :

– Anticoagulants oraux : l'administration simultanée n'est pas recommandée.

– Interactions avec d'autres médicaments.

Le **clopidogrel** étant transformé par le CYP2C19, l'association de médicaments inhibant le CYP2C19 doit être déconseillée : **oméprazole** et **ésoméprazole**, **fluvoxamine**, **fluoxétine**, **moclobémide**, **voriconazole**, **flucanazole**, **ticlopidine**, **ciprofloxacine**, **cimétidine**, **carbamazépine**, **oxcarbazépine**.

## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES (5)

## ■ Prasugrel

EFIENT					
Posologie initiale : 60 mg en 1 prise unique	30 cp. 10 mg 90 cp. 10 mg	52,86 HOP	I I	65 %	1,76
Posologie d'entretien : 5 à 10 mg/j					

## ■ Ticagrélor

BRILIQUE					
Posologie initiale : 180 mg en 1 prise unique	60 cp. 90 mg 100 cp. 90 mg 180 cp. 90 mg	75,78 HOP HOP	I	65 %	1,26
Posologie d'entretien : 90 mg x 2/j					

## PROPRIÉTÉS

**Prasugrel** : inhibiteur de l'activation et de l'agrégation plaquettaires par l'intermédiaire de la liaison irréversible de son métabolite actif aux récepteurs à l'ADP de type P2Y<sub>12</sub> sur les plaquettes.

**Ticagrélor** : antagoniste sélectif du P2Y<sub>12</sub>, récepteur plaquettaire de l'adénosine diphosphate (ADP) qui empêche l'activation et l'agrégation plaquettaires déclenchées par l'ADP.

## INDICATIONS

En association avec l'**acide acétylsalicylique** : prévention des événements athéro-thrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde avec ou sans sus-décalage du segment ST), incluant les patients traités médicalement et ceux traités par une intervention coronaire percutanée primaire ou retardée ou un pontage aorto-coronaire.

## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Saignement pathologique avéré.
- Antécédent d'hémorragie intracrânienne, d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire.
- Insuffisance hépatique (modérée à sévère pour **ticagrélor** et sévère - classe C de Child-Pugh pour **prasugrel**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une surveillance cardiologique, rénale et respiratoire est recommandée pour le **ticagrélor** en particulier chez les patients à risque.

En raison du risque de saignement, à utiliser avec prudence chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale, un traumatisme, un ulcère ou une hémorragie digestives récents. En cas d'intervention chirurgicale programmée, le traitement doit être interrompu au moins 7 j avant l'intervention.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Épistaxis, hématome, hémorragie gastro-intestinale.

**Prasugrel** : éruption cutanée, anémie et troubles gastro-intestinaux.

**Ticagrélor** : dyspnée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Prasugrel** : pas d'interaction médicamenteuse significative recensée. Par le manque d'étude avec la **warfarine** et les **AINS**, il doit être utilisé avec prudence en cas d'association.

Le **ticagrélor** est essentiellement un substrat du cytochrome CYP3A4 et un inhibiteur faible du CYP3A4. C'est aussi un substrat et un inhibiteur faible de la P-gp. Il peut ainsi augmenter l'exposition aux substrats de la P-gp. Il est contre-indiqué en association avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 tels que les **antifongiques azolés**, la **clarithromycine**, le **ritonavir** et l'**atazanavir**. Son utilisation avec les inducteurs puissants du CYP3A4 est déconseillée en raison du risque de diminution de son efficacité. Il peut être utilisé avec prudence en association avec les autres **antiagrégants plaquettaires** ou les anticoagulants. En raison de ses propriétés inhibitrices du CYP3A4 et de la P-gp, le **ticagrélor** peut modifier les concentrations plasmatiques de leurs substrats tels que les **statines** par exemple.

## INHIBITEURS DES RÉCEPTEURS GPIIb/IIIa PLAQUETTAIRES (1)

## ■ Abciximab

RÉOPRO					
Voie IV en cure unique : 0,25 mg/kg en bolus IV 10 min avant l'angioplastie, suivi d'une perfusion IV continue de 10 mg/min pendant 12 h - Bolus d' <b>héparine</b> avant angioplastie : 50 à 70 U/kg sans dépasser 7 000 U - Administration d' <b>héparine</b> en cours d'angioplastie : bolus répétés de 20 U/kg puis perfusion de 7 U/kg/h pour atteindre puis maintenir un ratio TCA entre 1,5 et 2 - Perfusion d' <b>héparine</b> après angioplastie : au mieux arrêt de l' <b>héparine</b> après l'angioplastie et retrait du désilet dans les 6 h, sinon perfusion de 7 U/kg/h	1 fl. 5 mL 2 mg/mL	HOP	I		

## ■ Eptifibatide

INTÉGRILIN					
180 mg/kg en bolus IV suivi d'une perf. continue de 2 mg/kg/min pendant 72 h max. sans intervention coronarienne percutanée et 96 h max. si intervention coronarienne percutanée	1 fl. 10 mL pour inj. 2 mg/mL	HOP	I		
	1 fl. 100 mL pour perf. 0,75 mg/mL	HOP	I		

## ■ Tirofiban

AGRASTAT					
Débuter une perf. IV de 0,4 µg/kg/min pendant 30 min, puis vitesse d'entretien à 0,1 µg/kg/min Administration simultanée d' <b>héparine non fractionnée</b> : bolus IV de 5 000 UI au début du traitement puis 1 000 UI/h pour avoir un ratio TCA à 2 Durée min. du traitement : 48 h, durée max : 108 h	1 fl. 50 mL (250 µg/mL)	HOP	I		

## INHIBITEURS DES RÉCEPTEURS GPIIb/IIIa PLAQUETTAIRES (2) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

**RÉOPRO** est un fragment d'anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs GPIIb/IIIa plaquettaires responsables de l'agrégation plaquettaire. **INTEGRILIN** est un peptide cyclique synthétique mimant le fibrinogène (ligand de GPIIb/IIIa). **AGRASAT** est un antagoniste non peptidique du récepteur GPIIb/IIIa et empêche la liaison du fibrinogène au récepteur. Ces médicaments vont donc inhiber l'agrégation plaquettaire en empêchant la liaison des récepteurs GPIIb/IIIa à leurs ligands (fibrinogène, facteur Willebrand).

La posologie retenue permet :

- un blocage prolongé et important de plus de 80 % des récepteurs GPIIb/IIIa ;
- une inhibition de l'agrégation plaquettaire *in vitro* en réponse à l'ADP ;
- un temps de saignement > 30 min.

### INDICATIONS

Pour **RÉOPRO** :

- prévention des complications cardiaques ischémiques chez les patients qui font l'objet d'une angioplastie coronaire ;
- angor instable réfractaire au traitement médical classique avec geste d'angioplastie coronaire programmé.

Pour **INTEGRILIN** : prévention d'un IDM précoce après angor instable ou IDM sans onde Q de moins de 24 h.

Pour **AGRASAT** : prévention d'un IDM précoce après angor instable ou IDM sans onde Q dont le dernier épisode de douleurs thoraciques est survenu au cours des 12 h précédentes et s'accompagne de modifications ECG et/ou d'une élévation des enzymes cardiaques.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue au produit ou à l'un de ses composants ou à la papaine.

Hémorragie interne.

Antécédent d'accident vasculaire cérébral dans les 2 ans précédents.

Chirurgie ou traumatisme intracrâniens ou intrarachidiens dans les 2 derniers mois.

Chirurgie majeure < 2 mois.

Tumeur, malformation ou anévrisme artérioveineux intracrâniens.

Anomalie de la coagulation, thrombopénie

préexistante, hypertension non contrôlée, vascularite, rétinopathie florissante, insuffisance hépatique ou rénale sévère.

**Grossesse, allaitement** : aucune étude.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Accroissement du risque hémorragique nécessitant une administration en milieu spécialisé (soins intensifs).

- Administration simultanée d'**héparine** et d'**aspirine** :

– **aspirine** : 300 mg/j *per os* ;

– **héparine** : la posologie doit être adaptée au poids du patient et au TCA.

- Prévention du risque hémorragique :

– surveillance stricte du point de ponction de l'artère fémorale où est positionné le désilet ; surveillance régulière des pouls distaux ;

– arrêt de l'**héparine** au moins 4 h avant le retrait de désilet puis compression soignée du point de ponction jusqu'à obtention d'une hémostase stable puis mise en place d'un pansement compressif ;

– surveillance des sites potentiellement hémorragiques : points de ponction, espace rétropéritonéal, tube digestif ;

– NFS, TCA, TP avant traitement ;

– hémoglobine, hématocrite à 12 h puis 24 h après injection du bolus.

- Surveillance régulière ECG et paramètres vitaux.

- Rétablissement de la fonction plaquettaire :
  - en cas d'hémorragie non contrôlée ou de chirurgie en urgence, il faut pratiquer un temps de saignement (méthode d'Ivy). Si TS > 12 min, nécessité de transfusion de 10 U plaquettaires permettant de rétablir une fonction plaquettaire pratiquement normale ;
  - en cas de thrombopénie : numération plaquettaire avant traitement puis 2 à 4 h après bolus puis 24 h après.

- Si thrombopénie vraie et vérifiée < 100 000/mm<sup>3</sup> : arrêt des traitements et dosage quotidien jusqu'au retour à la normale.

- Si plaquettes < 60 000/mm<sup>3</sup> : arrêt **héparine** et **aspirine** en plus de l'arrêt du traitement.

- Si plaquettes < 50 000/mm<sup>3</sup> : transfusion de plaquettes.

- Réadministration apparemment possible avec une même efficacité et une bonne tolérance.

- Néphropathies et maladies vasculaires périphériques : bénéfice diminué.

## INHIBITEURS DES RÉCEPTEURS GPIIb/IIIa PLAQUETTAIRES (3) – PHARMACOLOGIE (2)

### EFFETS INDÉSIRABLES


Saignements, thrombopénie : cf. ci-dessus.  
 Réactions allergiques encore jamais observées en traitement unique mais possibles, pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique. Prurit, rash, œdème de Quincke.  
 Hypotension, troubles digestifs, bradycardie, fièvre.  
 Anticorps humains antichimériques à un titre

très faible (6,5 % après 2-4 sem.) sous **RÉOPRO**.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Héparine, anticoagulants oraux, thrombolytiques**, autres agents antiplaquettaires, **dex-trans** de faible poids moléculaire majorent le risque de saignement.

**AGRASAT** : incompatible avec le **diazépam**.



## INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (1)

## ■ Bénazépril

<b>CIBACÈNE</b>					
5 à 10 mg/j en 1 prise (dose maximale : 20 mg)	30 cp. séc. 5 mg	5,02	I	65 %	0,17
	90 cp. séc. 5 mg	13,85	I	65 %	0,15
	30 cp. 10 mg	7,85	I	65 %	0,26
	90 cp. 10 mg	22,07	I	65 %	0,25
<b>BRIEM</b>					
5 à 10 mg/j en 1 prise (dose maximale : 20 mg)	30 cp. séc. 5 mg	5,02	I	65 %	0,17
	90 cp. séc. 5 mg	13,85	I	65 %	0,15
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. 10 mg	7,85	I	65 %	0,26
	90 cp. 10 mg	22,07	I	65 %	0,25

## ■ Captopril

<b>LOPRIL</b>					
25 à 100 mg/j en 2 à 3 prises en dehors des repas (dose maximale : 150 mg)	30 cp. séc. 25 mg	7,86	I	65 %	0,26
	90 cp. séc. 25 mg	22,11	I	65 %	0,25
	30 cp. séc. 50 mg	13,58	I	65 %	0,45
	90 cp. séc. 50 mg	38,25	I	65 %	0,43

## ■ Cilazapril

<b>JUSTOR</b>					
2,5 mg/j en une prise	28 cp. séc. 1 mg	7,35	I	65 %	0,26
	28 cp. séc. 2,5 mg	10,86	I	65 %	0,39

## ■ Énalapril

<b>RENITEC</b>					
5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 80 mg dans l'HTA)	28 cp. séc. 5 mg	3,50	I	65 %	0,13
	50 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 20 mg	8,32	I	65 %	0,30
	50 cp. séc. 20 mg	HOP	I		

## ■ Fosinopril

<b>FOZITEC</b>					
10 à 20 mg/j en 1 prise	30 cp. séc. 10 mg	6,85	I	65 %	0,23
	90 cp. séc. 10 mg	19,24	I	65 %	0,21
	30 cp. 20 mg	8,09	I	65 %	0,27
	90 cp. 20 mg	22,75	I	65 %	0,25

## ■ Lisinopril

<b>ZESTRIL</b>					
Posologie initiale : 5-10 mg/j en 1 prise Posologie d'entretien : 20-80 mg/j en 1 prise	28 cp. séc. 5 mg	4,17	I	65 %	0,15
	28 cp. séc. 20 mg	8,53	I	65 %	0,30
	100 cp. séc. 20 mg	HOP	I		
<b>PRINIVIL</b>					
Idem <b>ZESTRIL</b>	28 cp. 5 mg	4,17	I	65 %	0,15
	28 cp. 20 mg	8,53	I	65 %	0,30

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (4)

### ► Digoxine

Elle a vu sa place se réduire très significativement dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, depuis qu'il a été montré qu'elle ne réduisait pas la mortalité.

En pratique, la **digoxine** peut être administrée à tous les patients en ACFA à tous les stades de l'insuffisance cardiaque symptomatique, afin de ralentir la cadence ventriculaire si elle est rapide. Elle peut être associée aux **bêtabloquants**.

Chez les patients en rythme sinusal avec une FEVG  $\leq 40\%$  et des symptômes persistants (NYHA II à IV) malgré un traitement par IEC + bêtabloquant + antialdostérone, la **digoxine** peut être utilisée pour réduire les symptômes et les hospitalisations, mais n'améliore pas la survie.

**Digitaliques, digoxine (DIGOXINE)** : 1/2 à 1 cp. à 0,25 mg/j, à réduire en cas d'insuffisance rénale.

### ► Dérivés nitrés

Ils ont l'AMM dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique en association aux autres traitements, avec une action uniquement symptomatique. Surveiller la pression artérielle avec un risque d'hypotension.

**LANGORAN LP** : 40 mg : 1 cp./j.

### Traitements médicamenteux non recommandés

#### ► Statines

Aucun bénéfice démontré dans l'insuffisance cardiaque chronique.

#### ► Inhibiteur direct de la rénine (*aliskirène*)

À ce jour, non recommandé en alternative à un IEC ou à un ARA II.

#### ► Anti-thrombotiques

Aucun bénéfice démontré sur la morbi-mortalité à initier un traitement anticoagulant oral dans l'insuffisance cardiaque, en dehors des patients en ACFA.

Bien entendu, si l'insuffisance cardiaque

est liée à une cardiopathie ischémique, l'**aspirine** est indiquée.

#### ► Antiarythmiques

Risque pro-arythmique de tous les **anti-arythmiques**. Seule l'**amiodarone** n'a pas d'effet inotrope négatif et n'augmente pas la mortalité.

#### ► Inhibiteurs calciques

- Peuvent aggraver une insuffisance cardiaque (sauf **amlodipine**, **félodipine**) à cause de leur effet inotrope négatif.

- **Amlodipine** et **félodipine** peuvent être utilisées en cas d'hypertension artérielle ou d'angor chez les patients insuffisants cardiaques.

#### ► AINS, coxibs

À éviter à cause d'une rétention hydrosodée possible et d'un risque d'aggravation d'une insuffisance rénale et de l'insuffisance cardiaque.

### Traitements non médicamenteux

Les deux techniques suivantes peuvent être associées chez un même patient.

#### ► Défibrillateur implantable [2]

Il est proposé en prévention secondaire et primaire pour éviter la mort subite par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire chez des patients insuffisants cardiaques sélectionnés.

#### ► Resynchronisation ventriculaire

L'implantation d'un stimulateur biventriculaire permet, chez des patients sélectionnés, de resynchroniser la contraction ventriculaire et d'augmenter le débit cardiaque. Son utilisation est associée à une amélioration de la qualité de vie et du statut fonctionnel. Ses effets sur la mortalité ne sont pas encore formels.

La sélection des patients est précise et dépend de la FEVG, du statut fonctionnel NYHA, du traitement médical déjà prescrit et de la présence d'un asynchronisme apprécié à l'ECC ou en écho-Doppler cardiaque (cf. chapitre correspondant).



**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (2)****■ Périndopril**

<b>COVERSYL</b>					
2,5 à 10 mg/j en 1 prise en dehors des repas	30 cp. séc. 2,5 mg	7,74	I	65 %	0,26
	90 cp. séc. 2,5 mg	21,76	I	65 %	0,24
	30 cp. séc. 5 mg	10,27	I	65 %	0,34
	90 cp. séc. 5 mg	30,37	I	65 %	0,34
	30 cp. séc. 10 mg	16,59	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 10 mg	46,72	I	65 %	0,52

**■ Quinapril**

<b>ACUITEL</b>					
5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 40 mg)	28 cp. séc. 5 mg	5,59	I	65 %	0,20
	90 cp. séc. 5 mg	16,53	I	65 %	0,18
	28 cp. séc. 20 mg	9,34	I	65 %	0,33
	90 cp. séc. 20 mg	28,07	I	65 %	0,31

**KOREC**

5 à 20 mg/j en 1 à 2 prises (dose maximale : 40 mg)	28 cp. séc. 5 mg	5,59	I	65 %	0,20
	28 cp. séc. 20 mg	14,76	I	65 %	0,53

**■ Ramipril**

<b>TRIATEC</b>					
2,5 à 5 mg/j en 1 prise (dose maximale : 10 mg)	30 cp. 1,25 mg	9,85	I	65 %	0,33
	90 cp. 1,25 mg	27,73	I	65 %	0,31
	100 cp. 1,25 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 2,5 mg	11,48	I	65 %	0,38
	90 cp. séc. 2,5 mg	32,32	I	65 %	0,36
	100 cp. séc. 2,5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 5 mg	14,30	I	65 %	0,48
	90 cp. séc. 5 mg	40,27	I	65 %	0,45
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 10 mg	20,94	I	65 %	0,70
	90 cp. séc. 10 mg	59,01	I	65 %	0,66

**■ Trandolapril**

<b>ODRIK</b>					
2 mg/j en 1 prise (dose max. : 4 mg)	28 gél. 0,5 mg	2,69	I	65 %	0,10
	84 gél. 0,5 mg	6,96	I	65 %	0,08
	28 gél. 2 mg	6,45	I	65 %	0,23
	84 gél. 2 mg	18,10	I	65 %	0,22
	28 gél. 4 mg	9,90	I	65 %	0,35
	84 gél. 4 mg	27,85	I	65 %	0,33

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (5)

### Formes cliniques

Le traitement étiologique, quand il est possible, est impératif : cure d'une valvulopathie, revascularisation coronaire, etc.

### Insuffisance cardiaque asymptomatique avec FEVG réduite $\leq 40\%$

Les IEC ou **ARA II**, **bêtabloquants** et **antialdostérone**s décrits ci-dessus restent indiqués pour éviter l'évolution de l'insuffisance cardiaque, même en l'absence de symptôme.

### Cas du sujet âgé

La prise en charge reste la même et quel que soit le sexe. Les traitements devront être adaptés à la fonction rénale souvent altérée chez la personne âgée.

### Fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque

- **Bêtabloquant** ou **digoxine** en cas d'intolérance.
- L'association **bêtabloquant** + **digoxine** est possible pour contrôler une cadence ventriculaire rapide.
- En cas d'ACFA mal tolérée, une cardioversion par choc électrique ou **amiodarone** est possible.
- Contre-indication de la **dronédarone**.

### HTA et insuffisance cardiaque

- Adapter les doses de **bêtabloquants**, **diurétiques**, **IEC** (ou **ARA II**), ajouter **antialdostérone** si besoin en l'absence d'**ARA II**.
- Possibilité d'associer **amlodipine**.

### Maladie coronaire stable et insuffisance cardiaque

- Optimiser la dose de **bêtabloquant**.
- En cas d'intolérance au **bêtabloquant** : **amlodipine** ou **ivabradine** ou **dérivé nitré d'action prolongée**.
- Si angor persistant, associer 2 antiangineux : associer **bêtabloquant** + **amlodipine** ou **ivabradine** ou **dérivé nitré d'action prolongée**.

### Traitements de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection conservée : insuffisance cardiaque diastolique

- Aucun traitement à ce jour n'a démontré une réduction de morbidité dans l'insuffisance cardiaque diastolique.
- Cette forme d'insuffisance cardiaque est souvent diagnostiquée à un âge avancé, dans le cadre d'une HTA ou d'une fibrillation auriculaire, ou plus rarement d'une cardiopathie ischémique.
- Les **inhibiteurs calciques** bradycardisants type **vérapamil** ont montré une certaine efficacité dans l'amélioration des symptômes et de la capacité à l'effort. Ils peuvent être utiles pour ralentir une ACFA ou pour traiter une HTA.
- Les **diurétiques** peuvent être prescrits comme dans l'insuffisance cardiaque systolique, avec cependant une grande prudence pour ne pas destabiliser le VG.
- Les **IEC** ou **ARA II** faciliteraient la relaxation et amélioreraient le remplissage ventriculaire gauche.
- Les **bêtabloquants** peuvent être utilisés en particulier en cas d'ACFA.

**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (3)****■ Zofénopril**

<b>ZOFÉNIL</b>					
7,5 à 60 mg/j en 1 prise	30 cp. 7,5 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 15 mg	18,03	I	65 %	0,60
	90 cp. 15 mg	50,79	I	65 %	0,56
	30 cp. 30 mg	15,41	I	65 %	0,51
	90 cp. 30 mg	48,11	I	65 %	0,53
	30 cp. 60 mg	18,03	I	65 %	0,60
<b>TEOULA</b>					
Idem <b>ZOFENIL</b> Posologie maximale : 60 mg/j en 1 ou 2 prises	30 cp. 7,5 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 15 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 30 mg	18,03	I	65 %	0,60
	30 cp. 60 mg	18,03	I	65 %	0,60

**■ Imidapril**

<b>TANATRIL</b>					
Posologie initiale : 5 mg/j Posologie d'entretien : 10 à 20 mg/j Diviser la posologie par 2 chez le sujet âgé, insuffisant rénal ou insuffisant hépatique	30 cp. 5 mg	8,89	I	65 %	0,30
	30 cp. 10 mg	12,25	I	65 %	0,41

**■ Moexipril**

<b>MOEX</b>					
Posologie initiale : 7,5 mg/j Posologie d'entretien : 7,5-15 mg/j Posologie max : 30 mg/j	30 cp. 7,5 mg	13,04	I	65 %	0,43
	30 cp. 15 mg	15,24	I	65 %	0,51

**INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (6)****Importance de la prise en charge des comorbidités**

Anémie, asthme, BPCO, cachexie, cancer, dépression, diabète, goutte, dysfonction érectile, HTA, carence martiale, syndrome cardiorénal, obésité, adénome de prostate, SAS.

**Prise en charge nutritionnelle et physique/Éducation du patient**

- La consommation de sel doit être limitée pour éviter la rétention hydrosodée en particulier chez les patients symptomatiques stade III-IV NYHA.

- Il s'agit de ne pas consommer en excès les aliments riches en sel suivants :

- le pain et les biscottes ordinaires,
- toutes les charcuteries,
- les poissons séchés, salés ou fumés,
- les crustacés et les coquillages,
- les conserves, y compris les sucrées et les plats cuisinés,
- les eaux gazeuses : *Vichy, Vals, Badoit*, etc. Le *Perrier*, contenant très peu de sel, est autorisé.

- Une restriction hydrique à 1,5 L/j peut être utile en cas de symptômes sévères (stade III-IV NYHA), surtout en cas d'hyponatrémie. C'est inutile en cas de symptômes modérés.

- Arrêt du tabac, pas de consommation excessive d'alcool.

- Une activité physique modérée mais régulière est encouragée pour améliorer la capacité à l'effort et les symptômes (marche, vélo, natation). Un programme multidisciplinaire de réadaptation cardiaque dans un centre spécialisé est recommandé.

- Bien expliquer au patient la pathologie, les symptômes, le traitement, l'importance de la bonne observance et d'un suivi régulier. Bien expliquer les symptômes de rétention hydrosodée qui justifient une consultation rapide ou une augmentation du traitement diurétique par le patient lui-même (éducation thérapeutique +++).

- Vaccinations contre la grippe et le pneumocoque.

**— CONSENSUS —**

[1] Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary, ESC, 2005

[2] Indications du défibrillateur automatique implantable ventriculaire. Mise à jour de la version française, SFC, 2006

**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (4) –  
PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

Inhibition de la kininase II (enzyme responsable de la conversion d'angiotensine I en angiotensine II et de la dégradation de la bradykinine). Action inhibitrice sur les systèmes rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) circulants et tissulaires. Augmentation de la bradykinine et des prostaglandines vasodilatatrices. Diminution de la stimulation sympathique.

Action hémodynamique (vasodilatation artérielle et veineuse) et neurohormonale avec effet structural (action antiproliférative sur les cellules musculaires cardiaques et vasculaires). Dans l'HTA : néphroprotection chez le diabétique, régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche et association synergique avec les diurétiques.

Élimination par voie rénale sauf **trandolapril** (33 % rénale et 66 % hépatique) et **fosinopril** (50 % rénale et 50 % hépatique).

Absorption du **captopril** et du **perindopril** diminuée de 30 % par l'alimentation.

**INDICATIONS**

Hypertension artérielle : tous les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** et les associations avec l'**hydrochlorothiazide** (après l'échec d'une monothérapie).

Insuffisance cardiaque : **captopril**, **clizapril**, **énalapril**, **fosinopril**, **lisinopril**, **perindopril**, **quinapril**, **ramipril**.

Post-infarctus : **captopril**, **lisinopril**, **ramipril**, **trandolapril**.

Il semble toutefois que l'effet dans l'insuffisance cardiaque et le post-infarctus soit un effet de classe (non lié au type d'inhibiteur de l'enzyme de conversion).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : accidents néonataux (surtout 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trim.).

**Allaitement** : passage dans le lait maternel (très faible).

Allergie.

Sténose bilatérale des artères rénales.

Hémodialyse avec membranes à haute perméabilité (polyacrylonitrile) : risque de réaction anaphylactoïde.

Associations avec l'**hydrochlorothiazide** :

– Clairance de la créatinine < 30 mL/min.

– Allergie aux **sulfamides**.

– Insuffisance hépatique sévère.

– Hypokaliémie et hyponatrémie réfractaires.

– Hyperuricémie symptomatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la posologie à la clairance de la créatinine (surveillance stricte de la fonction rénale). Schématiquement :

– clairance ≥ 70 mL/min : posologie moyenne ;

– clairance ≥ 30 mL/min : 1/2 de la posologie moyenne ;

– clairance ≥ 10 mL/min : 1/8 à 1/4 de la posologie moyenne ;

– clairance ≤ 10 mL/min : 2,5 mg de **RENITEC** ou 2 mg de **COVERSYL** le jour de la dialyse ou 0,5 mg/j d'**ODRIK**.

Pas d'adaptation à la clairance de la créatinine avec le **FOZITEC**.

Insuffisance cardiaque, sujet âgé, pression artérielle initialement basse : débuter à faible posologie (1/8 à 1/4 de la posologie moyenne) et augmenter progressivement sous surveillance stricte.

Déplétion hydrosodée : diminuer, voire interrompre transitoirement les diurétiques

HTA réno-vasculaire : utilisation prudente, en général avant une revascularisation.

**INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) (4) –  
PHARMACOLOGIE (2)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypotension artérielle brutale (surtout effet de 1<sup>re</sup> dose et en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypovolémie).

Hypotension orthostatique.

Toux sèche (10 à 20 %).

Hyperkaliémie (effet antialdostérone).

Insuffisance rénale (favorisée par l'hypovolémie et les **AINS**) (rechercher une sténose bilatérale des artères rénales ++).

Troubles digestifs banals : diarrhée, nausées, gastralgies, douleurs abdominales.

Céphalées, crampes musculaires, asthénie.

Réactions d'hypersensibilité (nécessitent l'arrêt du traitement) : rash cutané, flush, urticaire, œdème de Quincke (< 1/1 000).

Spécifiques au **captopril** (du fait d'un groupement thiol) : agueusie, leucopénie et thrombopénie (surtout en cas de connectivites ou de

traitement par immunosuppresseurs), protéinurie et syndrome néphrotique (glomérulonéphrite extramembraneuse).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diurétiques : risque d'insuffisance rénale avec les **thiazidiques** et les **diurétiques de l'anse**, et d'hyperkaliémie avec les **épargneurs de potassium** et les **ARA II**.

Apports potassiques : sous stricte surveillance.

**AINS** : association contre-indiquée.

Autres **antihypertenseurs** : majoration du risque d'hypotension.

**Héparine** : majoration du risque d'hyperkaliémie.

**Lithium** : majoration de la lithémie.

**Immunosuppresseurs** : association contre-indiquée avec le **LOPRIL**.

Association déconseillée avec les **antidépresseurs** imipraminiques et les **antipsychotiques**.

## BÊTABLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (1)

## ■ Carvédilol

<b>KREDEX</b>					
Dose test de 3,125 mg puis augmentation progressive jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient Dose cible 25 mg x 2/j si poids < 85 kg et 50 mg x 2/j si poids > 85 kg À prendre au moment des repas	28 cp. séc. 6,25 mg	8,02	I	65 %	0,29
	28 cp. séc. 12,5 mg	8,02	I	65 %	0,29
	28 cp. séc. 25 mg	8,02	I	65 %	0,29

## ■ Bisoprolol

<b>CARDENSIEL</b>					
Dose initiale 1,25 mg x 1/j Dose cible 10 mg x 1/j	30 cp. 1,25 mg	6,33	I	65 %	0,21
	90 cp. 1,25 mg	17,74	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 2,5 mg	6,33	I	65 %	0,21
	90 cp. séc. 2,5 mg	17,74	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 3,75 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 5 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 7,5 mg	6,33	I	65 %	0,20
	30 cp. séc. 10 mg	6,33	I	65 %	0,20
<b>CARDIOCOR</b>					
Idem <b>CARDENSIEL</b>	30 cp. 1,25 mg	6,33	I	65 %	0,21
	30 cp. séc. 2,5 mg	6,33	I	65 %	0,21
	30 cp. séc. 5 mg	3,59	I	65 %	0,12

## ■ Métoprolol

<b>SELOZOK LP</b>					
Dose initiale 23,75 mg x 1/j Dose cible 190 mg x 1/j	28 cp. 23,75 mg	19,52	I	65 %	0,70
	28 cp. 95 mg	19,52	I	65 %	0,70
	28 cp. 190 mg	19,52	I	65 %	0,70

## ■ Nébivolol

<b>NÉBILOX</b>					
Dose initiale 1,25 mg x 1/j Dose cible 10 mg x 1/j	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34
<b>TEMERIT</b>					
Idem <b>NÉBILOX</b>	30 cp. quadriséc. 5 mg	10,76	I	65 %	0,36
	90 cp. quadriséc. 5 mg	30,30	I	65 %	0,34

## INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (2)

### Diurétiques

Ils sont utilisés en cas de surcharge hydrosodée quand des signes congestifs sont présents. Ils améliorent rapidement la dyspnée et la tolérance à l'effort. Ils ne réduisent pas les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ni le risque de mortalité.

- Les **diurétiques de l'anse** sont utilisables dans toutes formes d'insuffisance cardiaque et quelle que soit la fonction rénale. **Furosémide (LASILIX)** : 20 à 60 mg/j (stades II et III), jusqu'à 80 à 160 mg/j, voire plus (stade IV). Il faut penser à la supplémentation potassique. **Leur posologie doit être adaptée à l'évolution des signes cliniques** pour ne pas entraîner une déshydratation et/ou une aggravation de la fonction rénale.

- Les **diurétiques thiazidiques** peuvent être utilisés dans l'insuffisance cardiaque modérée et quand la clairance de la créatinine est  $> 30$  mL/min. Ils peuvent être utilisés en association avec les **diurétiques de l'anse** pour une action synergique.

### Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

Ils sont recommandés en 1<sup>re</sup> intention chez tous les patients avec une FEVG  $\leq 40$  %.

Ils diminuent la mortalité et améliorent la qualité de vie quels que soient l'étiologie et le degré de l'insuffisance cardiaque.

Ils doivent être augmentés progressivement jusqu'à la dose cible ou la dose maximale tolérée. On surveillera régulièrement la kaliémie, la fonction rénale et la pression artérielle. Les insuffisants cardiaques tolèrent souvent des pressions artérielles systoliques inférieures à 100 mmHg.

- **Énalapril (RENITEC)** : débiter par 2,5 mg x 2/j. Dose cible : 10-20 mg x 2/j.
- **Ramipril (TRIATEC)** : débiter par 2,5 mg en 1 prise/j. Dose cible : 5 mg x 2/j.
- **Captopril** : dose cible 50 mg x 3/j.

- **Lisinopril** : dose cible 20-35 mg en 1 prise/j.

- **Trandolapril** : dose cible 4 mg en 1 prise/j.

### Bêtabloquants

Ils sont recommandés chez tous les patients avec une FEVG  $\leq 40$  % en association aux IEC.

Ils diminuent la mortalité, le nombre d'hospitalisations, les poussées d'insuffisance cardiaque et améliorent le statut fonctionnel et la fraction d'éjection.

#### ► Précautions d'emploi

- Ils doivent être débutés chez des patients stables en consultation spécialisée, ou après décompensation cardiaque récente sous surveillance hospitalière.

- En commençant à faible dose et en augmentant progressivement (par paliers de 7 à 15 j) jusqu'à la dose cible ou la dose maximale tolérée.

- Sous surveillance régulière +++. Une fatigue peut apparaître au début du traitement mais ne doit pas conduire à arrêter les **bêtabloquants**. En cas de signes congestifs adapter les doses de **diurétiques**  $\pm$  diminuer les doses de **bêtabloquants**.

- Les contre-indications sont l'asthme, la bradycardie et l'hypotension symptomatiques.

#### ► Quatre bêtabloquants sont préférentiellement utilisés

- **Alpha-bêtabloquant, carvedilol (KREDEX)** : **bêtabloquant non cardioselectif** aux propriétés vasodilatatrices et antioxydantes. Dose initiale 1/2 cp. à 6,25 mg x 2/j. Dose cible : 25-50 mg x 2/j.

- **Bisoprolol (CARDENSIEL ou CARDIOPOL)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 1,25 mg x 1/j. Dose cible 10 mg x 1/j.

- **Succinate de métoprolol (SELOZOK LP)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 23,75 mg x 1/j. Dose cible 190 mg x 1/j.

- **Néбиволол (NÉBILOX ou TEMERIT)** : **bêtabloquant cardioselectif**. Dose initiale 1,25 mg x 1/j. Dose cible 10 mg x 1/j.



## BÊTABLOQUANTS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

β-bloquants cardiosélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque mais avec effet stabilisant de membrane. Propriétés antioxydantes et vasodilatatrices. Dans l'insuffisance cardiaque, augmentation de la fraction d'éjection et diminution de la mortalité.

Le **carvédilol** a une activité alpha-bloquante supplémentaire.

### INDICATIONS

Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique de classe NYHA II, III ou IV chez les patients euvolemiques, à distance de poussées en association avec le traitement conventionnel (**diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion**).

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Insuffisance cardiaque en phase instable et choc cardiogénique.

Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire de haut degré non appareillé.

Hypotension.

Hypersensibilité au **bêtabloquant**.

Asthme, BPCO.

Artériopathie oblitérante sévère des membres inférieurs et phénomène de Raynaud.

Insuffisance hépatique sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitement instauré en milieu hospitalier : dose test (avec examen clinique toutes les heures pendant 4 h et ECG à la 4<sup>e</sup> h) en l'absence d'intolérance (fréquence cardiaque < 50/min, pression artérielle systolique < 85 mmHg, apparition de signes congestifs).

Augmentation très progressive par paliers d'au moins 15 j sous surveillance médicale stricte. Posologie augmentée jusqu'à la dose maximale tolérée par le patient.

Réduire la dose ou interrompre le traitement en cas d'intolérance.

Diminution des doses chez le sujet âgé.

Surveillance de la fonction rénale, particulièrement en cas de PA limite, d'atteinte vasculaire diffuse ou d'insuffisance rénale préexistante.

**Diabétiques** : les **β-bloquants** peuvent masquer les signes d'hypoglycémie et en augmenter la sévérité.

Angor de Prinzmetal : risque de déclenchement de crises d'angor.

Psoriasis : risque d'aggravation.

ATCD de thrombopénie sévère : utilisation déconseillée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Hypotension, signes congestifs d'insuffisance cardiaque, choc, bradycardie, troubles conductifs.

Altération de la fonction rénale.

Bronchospasme.

Thrombopénie.

Autres : augmentation de la sensibilité aux allergènes et de la gravité des réactions anaphylactiques, réduction de la sécrétion lacrymale, étourdissements, troubles de conscience, crises convulsives (surdosage), diarrhée, vomissements, hyperglycémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : médicaments inotropes négatifs, **antiarythmiques de classe Ia et Ic, clonidine, sultopride** (troubles du rythme ventriculaire notamment torsades de pointes), **cimétidine** (inhibiteur enzymatique) et **floctafénine** (hypotension, choc).

Médicaments chronotropes et dromotropes négatifs.

Médicaments hypotenseurs.

**Inducteurs enzymatiques.**

**Digoxine** : majoration de la digoxinémie.

## TONICARDIAQUES INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES

### ■ Milrinone (dérivé de la bipyridine)

<b>COROTROPE</b>					
Bolus de 50 mg/kg en 10 min puis perfusion de 0,375 à 0,750 mg/kg/min en IVSE sans dépasser une dose totale de 1,13 mg/kg/24h Dilution dans du sérum glucosé isotonique Conservation de 15 à 25 °C	10 amp. 10 mg/10 mL	HOP	I		

### ■ Énoximone (dérivé de l'imidazolone)

<b>PERFANE</b>					
Bolus de 0,5 à 1 mg/kg (vitesse < 12,5 mg/min) éventuellement répété toutes les 30 min sans dépasser 3 mg/kg puis perfusion de 5 à 20 mg/kg/min en IVSE Dilution dans du sérum salé isotonique Conservation à température < 20 °C	10 amp. 100 mg/20 mL	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Substances augmentant l'AMPc intracellulaire en diminuant son hydrolyse par la phosphodiesterase III (pas d'action sur les récepteurs adrénergiques). Effets inotrope positif et vasodilatateur. Augmentation du débit cardiaque avec diminution de la pression capillaire pulmonaire, de la pression auriculaire droite et des résistances périphériques. Faible augmentation de la fréquence cardiaque. Pas d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène.

Pas de phénomène d'échappement thérapeutique.

Demi-vie : **milrinone** (2 à 3 h), et **énoximone** (4 à 6 h).

Élimination urinaire.

#### INDICATIONS

Traitement à court terme de l'insuffisance cardiaque aiguë congestive, en association ou à la place de la **dobutamine**, notamment en cas d'épuisement de son effet.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, enfants : innocuité non démontrée (pas d'effet tératogène rapporté).

Hypersensibilité à ces produits.

Troubles du rythme supraventriculaire non contrôlés et troubles du rythme ventriculaire graves.

Obstacles à l'éjection ventriculaire (rétrécissement aortique, cardiopathie obstructive).

Anévrysme ventriculaire.

Hypotension, collapsus.

Hypovolémie non corrigée.

Insuffisance rénale.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et éventuellement hémodynamique (Swan-Ganz) et biologique (ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique et numération plaquettaire).

Défibrillateur à proximité.

Adaptation de la posologie à la fonction rénale.

**Milrinone** : réduire la posologie si clairance < 30 mL/min.

Ne pas utiliser de matériel en verre (cristallisation).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Choc anaphylactique aux sulfites.

Troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire.

Hypotension.

Céphalées, diminution du goût et de l'odorat, tremblements.

Thrombopénie, fièvre, frissons.

Douleurs des extrémités.

Nausées, vomissements, diarrhée, élévation des transaminases (réversible à la diminution ou à l'arrêt du traitement).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Énoximone** : incompatibilité avec les solutés glucosés (cristallisation).

Pas d'incompatibilité médicamenteuse mise en évidence.

**CHOC CARDIOGÉNIQUE (2)****Principaux effets hémodynamiques des agents inotropes positifs**

Agents \ Effets	Isoprénaline	Dobutamine	Dopamine	Adrénaline	Noradrénaline	Inhibiteurs des PDE*
Débit cardiaque	↑↑	↑↑	↑	↑↑	↑	↑↑
Effet inotrope positif	+++	++	++	++	++	+
Fréquence cardiaque	↑↑	↑	→ ou ↑	↑↑	↑	→ ou ↑
Vasoconstriction	0	0	+ (forte dose)	++	+++	0
Vasodilatation	+	+	++ (faible dose)	0	0	++
Résistances vasculaires périphériques	↓↓↓	→ ou ↓	↑	↑↑	↑↑↑	↓↓↓
Pression artérielle	↓	→	↑/↑↑ (forte dose)	↑	↑↑↑	→ ou ↑
Pression artère pulmonaire occluse	↓	↓	↑	↑	↑	↓↓
Pression auriculaire droite	↓	→ ou ↑	↑	↑	↑	↓↓
Risque d'arythmie	+++	+ / ++	+ (forte dose)	+++	+	+++

\* PDE : phosphodiesterases.

## TONICARDIAQUES SYMPATHOMIMÉTIQUES (1)

## ■ Dobutamine

**DOBUTAMINE MYLAN**

Posologie de 5 à 20 µg/kg/min en IVSE à adapter à la réponse clinique

10 amp. 250 mg/20 mL

HOP

I

**PROPRIÉTÉS**

Amine sympathomimétique ayant des propriétés  $\alpha_1$ -,  $\beta_2$ - et surtout  $\beta_1$ -adrénergiques à l'origine de l'effet inotrope positif. Élévation du débit cardiaque avec réduction des pressions de remplissage ventriculaire (pression capillaire) et des résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. Élévation modérée de la fréquence cardiaque (discret effet chronotrope positif) et de la consommation myocardique en oxygène. Accélération de la conduction auriculo-ventriculaire. Peu d'effet sur la pression artérielle.

Délai d'action de 1 à 2 min, demi-vie de 2 min et élimination urinaire rapide.

**INDICATIONS**

Syndrome de bas débit cardiaque (en postopératoire de chirurgie cardiaque, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire grave, valvulopathies et cardiomyopathies dilatées décompensées, sepsis graves à pression de remplissage élevée, modification de la précharge associée à de hauts niveaux de PEEP, troubles de conduction hissiens).

Exploration fonctionnelle cardiologique (notamment couplée à l'échocardiographie).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie (contient des sulfites).

Obstacle à l'éjection ou au remplissage ventriculaire (rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive, tamponnade).

Troubles du rythme ventriculaire graves.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : aucun effet tératogène décrit.

Correction d'une hypovolémie, des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques.

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et hémodynamique (Swan-Ganz), défibrillateur à proximité.

Chez les patients en fibrillation auriculaire, une imprégnation digitale préalable est recommandée.

Utilisation possible au cours de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë malgré le risque d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène (posologie adaptée de façon à prévenir une accélération du rythme cardiaque et une élévation tensionnelle).

Réduire ou suspendre temporairement la perfusion en cas de tachycardie importante, d'hypertension, d'angor et de troubles du rythme ventriculaire.

Traitement à arrêter progressivement.

Surveillance étroite chez l'enfant : élévation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque plus importante que chez l'adulte et parfois augmentation de la pression capillaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Tachycardie excessive et déstabilisation angineuse chez le coronarien.

Hypertension.

Troubles du rythme ventriculaire.

Épuisement d'effet lors d'administration > 3 j, conduisant à l'augmentation des doses.

Nausées, céphalées, dyspnée.

Réactions allergiques : rash cutané, fièvre, éosinophilie, bronchospasme.

Choc anaphylactique aux sulfites.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Incompatibilité avec les solutés alcalins.

**Bêtabloquants** (antagonisme).

Vasodilatateurs : potentialisation de leurs effets.

## CHOC CARDIOGÉNIQUE (3)

### But du traitement

Il s'agit de relancer le plus rapidement possible la pompe cardiaque par une oxygénation myocardique efficace. Le traitement est d'autant plus efficace que l'étiologie est curable :

- infarctus : revascularisation en urgence ;
- troubles du rythme : cardioversion électrique ou médicamenteuse ;
- troubles de conduction : entraînement électrosystolique ;
- valvulopathie aiguë : remplacement valvulaire ;
- embolie pulmonaire : thrombolyse, embolectomie chirurgicale ;
- tamponnade : drainage péricardique.

### Traitement

- Hospitalisation en USIC ou en réanimation médicale.
- **Oxygénothérapie** adaptée avec recours précoce et large à la ventilation non invasive (VNI), voire une intubation avec ventilation assistée.
- Correction des troubles hydroélectrolytiques/troubles du rythme.
- **Contrôle de la volémie** ++++: remplissage vasculaire par un sérum salé isotonique, 200 mL en perfusion IV en 5 à 10 min, à renouveler si besoin. Maintenir une Hb > 10 g/dL.
- **Médicaments inotropes positifs**:
  - **dobutamine** +++ : 2 à 20 µg/kg/min en IVSE (augmentation du débit cardiaque et vasodilatation réflexe). Elle est générale-

ment insuffisante pour augmenter la pression artérielle et est donc souvent associée à la **dopamine** ;

- **dopamine** : 2 à 20 µg/kg/min ; ses effets dépendent de la dose administrée ;
- **adrénaline**: 0,5 à 5 mg/h en IVSE ; effet chronotrope positif et vasoconstricteur dès les faibles doses ;
- **noradrénaline** : 10 à 40 µg/h en IVSE (pas en 1<sup>re</sup> intention).

- L'utilisation des **inhibiteurs des phosphodiésterases** peut être une alternative (en l'absence d'hypotension).

- En l'absence d'évolution favorable sous inotropes positifs, un **ballon de contre-pulsion intra-aortique** peut être nécessaire. Il permet d'améliorer l'oxygénation myocardique et facilite l'éjection ventriculaire.

- En cas de défaillance irréversible, une **assistance ventriculaire gauche** (CEC, cœur artificiel) peut être envisagée chez les patients qui pourraient bénéficier d'une transplantation cardiaque.

### Surveillance d'un choc cardiogénique

- Clinique : monitoring ECG et tensionnel, pression artérielle invasive, température, fréquence respiratoire, diurèse horaire, saturation artérielle en oxygène, régression des signes de choc et d'OAP, poids.
- Biologique : ionogrammes sanguin et urinaire, urée, créatinine, bilan hépatique, hémostasie, enzymes cardiaques, gaz du sang, lactates.
- Radiologique : radiographie pulmonaire.
- ECG.
- Écho-Doppler cardiaque.

## TONICARDIAQUES SYMPATHOMIMÉTIQUES (2)

### ■ Dopamine

<b>DOPAMINE AGUETTANT</b>					
Posologie de 3 à 20 µg/kg/min en IVSE à adapter à la réponse clinique Incompatibilité avec les solutés alcalins	50 amp. 50 mg/5 mL	HOP	I		
	50 amp. 200 mg/5 mL	HOP	I		
<b>DOPAMINE MYLAN</b>					
Idem <b>DOPAMINE AGUETTANT</b>	50 amp. 50 mg/10 mL	HOP	I		
	50 amp. 200 mg/5 mL	HOP	I		
<b>DOPAMINE RENAUDIN</b>					
Idem <b>DOPAMINE AGUETTANT</b>	10 amp. 50 mg/10 mL	HOP	I		
	100 amp. 50 mg/5 mL	HOP	I		
	100 amp. 200 mg/5 mL	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Amine sympathomimétique dont les propriétés dépendent de la dose :

- dopaminergiques ( $< 5 \mu\text{g/kg/min}$ ) : vasodilatation coronaire, mésentérique et surtout rénale entraînant une augmentation du débit sanguin, de la filtration glomérulaire, de la diurèse et de la natriurèse ;

- $\beta_1$ -adrénergiques ( $5 \text{ à } 15 \mu\text{g/kg/min}$ ) : puissant effet inotrope positif responsable de l'élévation du débit cardiaque. Chute des résistances périphériques. Élévation modérée de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ;

- $\beta$ -adrénergiques ( $> 15 \mu\text{g/kg/min}$ ) : tachycardie, élévation des résistances périphériques (vasoconstriction), augmentation de la pression artérielle, de la consommation myocardique en oxygène et diminution de la diurèse.

Délai d'action de 2 à 4 min, demi-vie de 2 min et élimination urinaire rapide.

### INDICATIONS

Correction des troubles hémodynamiques de l'état de choc (cardiogénique, septique, traumatique, hypovolémique après restauration de la volémie).

Syndrome de bas débit cardiaque.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allergie aux sulfites.

Phéochromocytome.

Troubles du rythme ventriculaire graves.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Correction d'une hypovolémie, des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques.

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et hémodynamique (Swan-Ganz), défibrillateur à proximité.

Arrêter progressivement le traitement.

Réduire ou suspendre temporairement le traitement en cas de tachycardie importante, d'hypertension, d'angor et de troubles du rythme ventriculaire.

Artérite des membres inférieurs : posologie initiale faible et augmentation très progressive.

Utilisation déconseillée à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde (risque de vasoconstriction, de troubles du rythme ventriculaire et de majoration de l'ischémie).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Tachycardie et crise d'angor, hypertension.

Troubles du rythme ventriculaire.

Épuisement d'effet lors d'administration  $> 3 \text{ j}$  conduisant à l'augmentation des doses.

Choc anaphylactique aux sulfites.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Antidépresseurs** imipraminiques : hypertension et troubles du rythme ventriculaire.

**Anesthésiques volatils halogénés** : utilisation déconseillée (risque accru d'arythmies ventriculaires).

**IMAO** non sélectifs : grande prudence, doses 10 fois moindres (risque d'hypertension).

### TONICARDIAQUES SYMPATHOMIMÉTIQUES (3)

#### ■ Épinéphrine (ou adrénaline)

<b>ADRÉNALINE</b>					
Arrêt cardiaque : 1 à 3 mg en IVD à renouveler toutes les 3-5 min en cas d'inefficacité (utilisation possible en intratrachéal : 3 à 5 mg à diluer dans 5 à 10 mL de sérum physiologique suivi de 3 insufflations au masque) Choc rebelle : 1 à 10 mg/h en IVSE idéalement sur voie centrale Choc anaphylactique : 0,25 à 0,5 mg en IV, IM ou SC éventuellement renouvelée, associée aux corticoïdes et au remplissage Adaptation posologique chez l'enfant (cf. Précautions d'emploi) Ne pas mélanger avec d'autres solutés injectables et incompatibilité avec les solutés alcalins	10 amp. 0,25 mg/1 mL	HOP	I		
	100 amp. 0,25 mg/1 mL	HOP	I		
	10 amp. 1 mg/1 mL	HOP	I		
	100 amp. 1 mg/1 mL	HOP	I		

#### ■ Norépinéphrine (ou noradrénaline)

<b>NORADRÉNALINE AGUETTANT</b>					
À diluer obligatoirement avant inj. IV de préférence dans du glucose isotonique	10 amp. 8 mg/4 mL	HOP	I		
	50 amp. 8 mg/4 mL	HOP	I		
	10 amp. 16 mg/8 mL	HOP	I		

**TONICARDIAQUES SYMPATHOMIMÉTIQUES (4) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Amine sympathomimétique aux propriétés :

- $\beta$ -adrénergiques : vasoconstriction avec élévation de la pression artérielle et des résistances artérielles périphériques ;
- $\beta_2$ -adrénergiques : bronchodilatation ;
- $\beta_1$ -adrénergiques : effets inotrope positif puissant, chronotrope et bathmotrope positifs. Augmentation du débit cardiaque. Rôle favorisant la reprise d'une activité cardiaque en cas d'asystolie. Inhibition de la libération des médiateurs de l'allergie et de l'inflammation. Résorption rapide par voie sublinguale (destruction par voie orale). Délai d'action IV de 3/5 min, durée d'action de quelques dizaines de min.

**INDICATIONS**

Arrêt cardiaque.

Choc anaphylactique.

Autres détresses cardiocirculatoires : infectieuses, hémorragiques (après rétablissement de la volémie), etc.

Réactions allergiques sévères (œdèmes de Quincke, etc.) et état de mal asthmatique.

Les kits auto-injectables doivent être impérativement prescrits aux sujets susceptibles de faire un choc anaphylactique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune contre-indication absolue dans le choc anaphylactique et l'arrêt cardiaque.

Allergie aux sulfites (kits auto-injectables).

Association contre-indiquée avec la spartéine (syncope).

Insuffisance coronarienne non contrôlée.

Troubles du rythme ventriculaire graves.

Hypertension artérielle sévère.

Obstacle à l'éjection ventriculaire.

Hyperthyroïdie.

Diabète.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conservation à l'abri de la lumière à température ambiante pour l'**adrénaline** injectable et entre + 2 et + 8 °C pour les kits auto-injectables (mais stabilité conservée plusieurs semaines à température ambiante). L'**adrénaline** est normalement incolore et devient rose lorsqu'elle est oxydée.

Utilisation sous surveillance scopique, tensionnelle, ECG, de la diurèse et hémodynamique (Swan-Ganz).

Choc anaphylactique : adaptation de la posologie à l'âge :

- enfant > 12 ans : 0,25 à 0,50 mg ;
- enfant > 6 ans : 0,25 mg ;
- enfant > 2 ans : 0,01 à 0,20 mg ;
- enfant < 2 ans : 0,01 mg/kg.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions anaphylactiques : choc, bronchospasme (kits auto-injectables).

Tachycardie excessive et déstabilisation angineuse chez le coronarien.

Hypertension.

Troubles du rythme ventriculaire.

Hypertension pulmonaire majeure et œdème aigu du poumon consécutif à la vasoconstriction.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Antidépresseurs** imipraminiques : hypertension et troubles du rythme ventriculaire.

**Anesthésiques volatils halogénés** : utilisation déconseillée du fait du risque accru d'arythmies ventriculaires.

**IMAO** non sélectifs : grande prudence, doses 10 fois moindres (risque d'hypertension).

**Dérivés de l'ergot de seigle** : potentialisation de l'effet vasoconstricteur.



## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (1)

## ■ Daltéparine sodique

<b>FRAGMINE</b>					
Prévention risque modéré : 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention puis 1 inj./j Prévention risque élevé : 2 500 UI en 1 SC 2 h avant l'intervention à renouveler 12 h plus tard puis 5 000 UI/j en 1 inj. SC les jours suivants Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 5 000 UI en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse > 4h : 30-35 UI/kg en 1 IVasculaire au début puis 10-15 UI/kg/h ensuite Traitement curatif des TVP : 200 UI/kg en 1 SC pendant 1 mois puis 150 UI/kg en 1 SC de M2 à M6. Posologie maximale : 18 000 UI/j	2 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	6,42	I	65 %	3,21
	6 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	18,15	I	65 %	3,02
	10 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	12,28	I	65 %	6,14
	6 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	35,21	I	65 %	5,87
	10 ser. 5 000 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 7 500 UI anti-Xa/0,75 mL	13,98	I	65 %	6,99
	10 ser. 7 500 UI anti-Xa/0,75 mL	63,31	I	65 %	6,33
	2 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	17,60	I	65 %	8,80
	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	79,23	I	65 %	7,92
	5 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,4 mL	41,77	I	65 %	8,35
	5 ser. 12 500 UI anti-Xa/0,5 mL	53,48	I	65 %	10,70
	5 ser. 15 000 UI anti-Xa/0,6 mL	63,31	I	65 %	12,66
	5 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,72 mL	75,12	I	65 %	15,02

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (2)

### Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

Elles ont toutes l'AMM dans le traitement initial d'une TVP. Elles sont au moins aussi efficaces que l'**HNF**, sont plus simples à utiliser et nécessitent moins de surveillance.

Étant donné la faible incidence de thrombopénie induite par l'héparine sous **HBPM**, la surveillance plaquettaire n'est plus indispensable, en l'absence de risque particulier. Certains continuent néanmoins la surveillance plaquettaire avant traitement, puis 2 fois/sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois puis 1 fois/sem. jusqu'à l'arrêt du traitement.

- Ex. : **FRAGMINE** ou **LOVENOX** : 100 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 2 inj./j (8 h-20 h).
- Ex. : **FRAXODI** : 171 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.
- Ex. : **INNOHEP** : 175 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.

Une surveillance particulière s'impose pour les poids < 40 kg et > 100 kg et en cas d'insuffisance rénale sévère. Il n'est pas recommandé de surveiller l'activité anti-Xa en dehors de ces situations.

La durée du traitement ne doit pas excéder 10 j, période de chevauchement **HBPM/AVK** incluse.

Le traitement par **AVK** est débuté simultanément avec l'**HBPM**, dès le 1<sup>er</sup> j. Le traitement par **HBPM** sera arrêté quand l'INR sera stable et > 2 (généralement en 2 à 4 j). Cf. Modalités de prescription des AVK. Ex. : **PRÉVISCAN** : 1 cp./j à adapter aux contrôles des TP et INR.

L'objectif thérapeutique est un INR entre 2 et 3.

### Fondaparinux

Il est aussi efficace que les **HBPM**. Il ne nécessite pas la surveillance des plaquettes. Le risque hémorragique est accru chez les patients > 75 ans, de faible poids corporel ou insuffisants rénaux. Il est contre-indiqué en cas de clairance de la créatinine < 30 mL/min.

**ARIXTRA** : 1 inj. 7,5 mg en SC/j pour les poids entre 50 et 100 kg. 1 inj. 5 mg en SC/j pour un poids < 50 kg. 1 inj. 10 mg en SC/j pour un poids > 100 kg.

### Rivaroxaban

C'est un **inhibiteur direct du facteur Xa** actif par voie orale. Il représente une alternative au traitement par **AVK** et ne dispose pas de surveillance biologique ni pour évaluer son activité anticoagulante ni pour évaluer le risque hémorragique. Il n'existe pas non plus d'antidote spécifique en cas d'hémorragie. Il doit donc être prescrit dans le respect très strict de ses indications et contre-indications avec une vigilance particulière dans le suivi des patients.

**XARELTO** : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 20 mg/j en 1 prise. En cas de clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 15 mg/j en 1 prise. Contre-indication si clairance de la créatinine < 30 mL/min.

### Autres traitements de la TVP à la phase initiale

L'**HNF** sera utilisée uniquement en cas de contre-indication aux **HBPM** et au **fondaparinux** (insuffisance rénale sévère).

Le **danaparoi**de et l'**argatroban** peuvent être utilisés en cas d'antécédent documenté de TIH (cf. chapitre correspondant).

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (2)

## ■ Nadroparine calcique

<b>FRAXIPARINE</b>					
Prévention risque modéré : 0,3 mL/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention puis 1 inj./j Prévention risque élevé : 38 UI/kg en 1 SC 12 h avant l'intervention et 12 h après, puis 1 fois/j jusqu'à J3 inclus, puis 57 UI/kg/j à partir de J4 postopératoire Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 65 UI/kg en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse Traitement curatif des TVP : 85 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 0,1 mL/10 kg de poids/12 h (= 2 inj./j) Traitement curatif de l'angor instable et IDM sans onde Q : 86 UI anti-Xa/kg/12 h en SC (= 2 inj./j) associée à l' <b>aspirine</b>	10 ser. 1 900 UI anti-Xa/0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	7,74	I	65 %	3,87
	6 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	22,12	I	65 %	3,69
	10 ser. 2 850 UI anti-Xa/0,3 mL	HOP	I		
	10 ser. 3 800 UI anti-Xa/0,4 mL	HOP	I		
	2 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	14,91	I	65 %	7,45
	6 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	42,22	I	65 %	7,04
	10 ser. 5 700 UI anti-Xa/0,6 mL	HOP	I		
	2 ser. 7 600 UI anti-Xa/0,8 mL	18,78	I	65 %	9,39
	10 ser. 7 600 UI anti-Xa/0,8 mL	84,42	I	65 %	8,44
	2 ser. 9 500 UI anti-Xa/1 mL	18,78	I	65 %	9,39
	10 ser. 9 500 UI anti-Xa/1 mL	HOP	I		
<b>FRAXODI</b>					
Traitement curatif des TVP : 171 UI anti-Xa/kg en une seule inj./j, soit 0,1 mL/10 kg de poids x 1/j	2 ser. 11 400 UI anti-Xa/0,6 mL	27,89	I	65 %	13,94
	10 ser. 11 400 UI anti-Xa/0,6 mL	124,39	I	65 %	12,44
	2 ser. 15 200 UI anti-Xa/0,8 mL	34,76	I	65 %	17,38
	10 ser. 15 200 UI anti-Xa/0,8 mL	156,54	I	65 %	15,65
	2 ser. 19 000 UI anti-Xa/1 mL	34,76	I	65 %	17,38
	10 ser. 19 000 UI anti-Xa/1 mL	156,54	I	65 %	15,65

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (3)

### Surveillance

- Clinique : recherche de signes d'extension de la TVP (signes inflammatoires locaux, mensurations comparatives), recherche de signes d'embolie pulmonaire, surveillance pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire.
- Biologique : créatininémie en début de traitement, TP et INR quand le relais **héparine - AVK** débute, taux de plaquettes en cas de risque de TIH ou dans un contexte postopératoire.

### Mesures associées

- La mobilisation précoce est vivement recommandée.
- **Contention veineuse élastique adaptée** (chaussettes, mi-bas, bas ou collants de contention forte classe III) à porter avant la mobilisation. Elle doit être **mise quotidiennement avant le lever du patient (éducation +++)**. L'efficacité passe par un haut niveau de pression à la cheville. La contention fait partie intégrante du traitement de la TVP et réduit de façon importante le risque de syndrome post-thrombotique.
- Recherche étiologique : une thrombophilie doit être recherchée chez tout sujet < 45 ans présentant une TVP documentée, en particulier en cas de récurrence, de survenue spontanée, de siège inhabituel ou associé à des fausses couches à répétition. Penser également à une néoplasie ou une maladie de système.

### Autres traitements de la TVP aiguë

L'insertion d'un filtre cave et la thrombectomie veineuse restent exceptionnelles et sont réservées à des cas très particuliers.

### Traitement au long cours après une TVP [1]

- La contention veineuse est à maintenir pour une durée minimale de 2 ans (ou plus si symptômes persistants).

- Il repose sur le traitement anticoagulant oral (**antivitamine K** ou **rivaroxaban**). Le rapport bénéfice/risque de ces traitements doit être réévalué à intervalles réguliers.
- La durée du traitement est de mieux en mieux précisée dans les recommandations :
  - TVP avec facteur déclenchant majeur transitoire (ex : chirurgie orthopédique, immobilisation prolongée  $\geq 3$  j) : 3 mois ;
  - TVP idiopathique (absence de facteur déclenchant, absence de facteur de risque) :  $\geq 6$  mois ;
  - TVP avec facteur de risque majeur persistant (cancer, syndrome des antiphospholipides) :  $\geq 6$  mois à prolonger tant que le facteur persiste. Seules les **HBPM** sont préconisées et en particulier la **daltéparine** au long cours. Ex : **daltéparine (FRAGMINE)** : 200 UI/kg/j pendant 1 mois puis 150 UI/kg/j jusqu'au 6<sup>e</sup> mois.
- Il existe des facteurs de modulation pouvant allonger ou réduire la durée du traitement :
  - facteurs principaux pour allonger la durée du traitement : thrombophilie majeure, récurrence de TVP proximale ou embolie pulmonaire, filtre cave permanent ;
  - facteurs principaux pour réduire la durée du traitement : risque hémorragique élevé, sujet âgé, alcoolisme, prise concomitante d'**antiagrégants plaquettaires**, observance médiocre.
- Il n'y a pas d'intérêt à la répétition des examens de type écho-Doppler veineux et/ou dosage des D-dimères en cours de traitement et en fin de traitement. Il n'y a pas lieu de tenir compte des résultats de ces examens pour décider de la durée optimale de traitement.

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (3)

## ■ Énoxaparine sodique

LOVENOX					
1 mg = 0,01 mL = 100 UI anti-Xa	2 ser. 2 000 UI anti-Xa/0,2 mL	7,37	I	65 %	3,69
Prévention risque modéré : 20 mg/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention	6 ser. 2 000 UI anti-Xa/0,2 mL	21,05	I	65 %	3,51
Prévention risque élevé : 40 mg/j en 1 SC 1 <sup>re</sup> inj. 12 h avant l'intervention	2 ser. 4 000 UI anti-Xa/0,4 mL	14,22	I	65 %	7,11
Puis 1 inj. SC/j.	6 ser. 4 000 UI anti-Xa/0,4 mL	40,33	I	65 %	6,72
Hémodialyse rénale : 0,5 à 1 mg/kg en 1 inj. dans la ligne artérielle en début de dialyse	2 ser. 6 000 UI anti-Xa/0,6 mL	16,31	I	65 %	8,16
Traitement curatif des TVP, EP, angor instable (en association avec <b>aspirine</b> ) : 1 mg/kg/12 h soit 100 UI anti-Xa/kg/j en SC (= 2 inj./j)	10 ser. 6 000 UI anti-Xa/0,6 mL	73,50	I	65 %	7,35
IDM en phase aiguë : 3 000 UI en IV bolus puis 100 UI/kg x 2/j en SC à commencer 15 min après le bolus ou 30 UI/kg en IV bolus 1 seule fois (voir en fonction des thérapeutiques associées)	2 ser. 8 000 UI anti-Xa/0,8 mL	18,18	I	65 %	9,09
	10 ser. 8 000 UI anti-Xa/0,8 mL	81,78	I	65 %	8,18
	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/1 mL	100,73	I	65 %	10,07
	1 ser. 30 000 UI anti-Xa/3 mL	HOP	I		

## ■ Tinzaparine sodique

INNOHEP					
Traitement préventif	2 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,25 mL	6,23	I	65 %	3,12
1 mL = 10 000 UI anti-Xa	6 ser. 2 500 UI anti-Xa/0,25 mL	17,53	I	65 %	2,92
Prévention risque modéré : 2 500 UI anti-Xa/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 2 h avant l'intervention	2 ser. 3 500 UI anti-Xa/0,35 mL	9,04	I	65 %	4,52
Prévention risque élevé : 4 500 UI anti-Xa/j en 1 SC. 1 <sup>re</sup> inj. 12 h avant l'intervention puis 3 500-4 500 UI/j pendant 10 jours	6 ser. 3 500 UI anti-Xa/0,35 mL	26,04	I	65 %	4,34
Prévention au cours de l'hémodialyse : < 4h : 2 500- 4 500 UI en 1 inj. intravasculaire au début de la dialyse	2 ser. 4 500 UI anti-Xa/0,45 mL	11,87	I	65 %	5,94
Traitement curatif	6 ser. 4 500 UI anti-Xa/0,45 mL	34,17	I	65 %	5,70
1 mL = 20 000 UI anti-Xa	2 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,5 mL	23,13	I	65 %	11,57
Traitement curatif des TVP, EP : 175 UI anti-Xa/kg/24 h en 1 inj. SC/j	10 ser. 10 000 UI anti-Xa/0,5 mL	103,54	I	65 %	10,35
	2 ser. 14 000 UI anti-Xa/0,7 mL	28,60	I	65 %	14,30
	10 ser. 14 000 UI anti-Xa/0,7 mL	127,63	I	65 %	12,76
	2 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,9 mL	35,62	I	65 %	17,81
	10 ser. 18 000 UI anti-Xa/0,9 mL	160,87	I	65 %	16,09

NB : Les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités anti-Xa.

## THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) DES MEMBRES INFÉRIEURS (4)

### Cas particulier de la femme enceinte

- Pour les femmes qui nécessitent un traitement AVK au long cours, il est suggéré de réaliser fréquemment des tests de grossesse, et de remplacer l'**AVK** par une **HNF** ou une **HBPM** en cas de grossesse.
- Pour les femmes enceintes qui présentent une maladie thromboembolique veineuse aiguë, il est recommandé un traitement par **HBPM** ou par **HNF** IV pendant au moins 5 j suivi d'une dose ajustée d'**HBPM** ou d'**HNF** pendant le reste de la grossesse. Les **anticoagulants** doivent être administrés pendant au moins 6 sem. après l'accouchement. Il est cependant recommandé d'arrêter l'**HNF** ou l'**HBPM** 24 h avant le déclenchement programmé du travail.
- À noter que la demi-vie des **HBPM** est plus courte pendant la grossesse ; c'est pourquoi il est préférable de faire 2 inj. par jour au lieu d'une, au moins à la phase initiale du traitement.

### Cas particulier de la thrombose veineuse superficielle (TVS)

Cf. Insuffisance veineuse - Varices.

### TVP et voyage

Une station assise prolongée > 6 h est un facteur de risque de TVP et d'embolie pulmonaire. Dans ce cas, les patients ayant un antécédent de TVP ou d'embolie pulmonaire doivent être traités par **HBPM** et porter une contention veineuse.

### Traitement préventif de la TVP

#### Méthodes physiques

- Lever précoce en postopératoire et *post-partum*.
- Mobilisation des membres inférieurs en cas d'alitement ou en cas de voyage prolongé.
- Contention veineuse élastique adaptée à mettre en place avant le lever.

#### Méthodes pharmacologiques

Le traitement préventif dépend du risque individuel de maladie thromboembolique et du risque lié à la chirurgie.

Le traitement préventif doit être poursuivi jusqu'à reprise d'une déambulation active.

## HÉPARINES DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM) (4) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Les **HBPM** sont le résultat du fractionnement des chaînes polysaccharidiques de l'héparine naturelle. Elles sont caractérisées par une activité anti-Xa élevée et une faible activité anti-IIa ou antithrombinique. Elles n'allongent pas le temps de saignement ni le TCA.

#### Avantages par rapport à l'héparine standard :

- moindre risque hémorragique,
- moindre fréquence des thrombopénies,
- demi-vie environ 2 fois plus longue,
- surveillance biologique limitée.

### INDICATIONS

Traitement prophylactique de la maladie veineuse thromboembolique en médecine et en chirurgie, à risque modéré et à risque élevé (toutes sauf **nadroparine** et **tinzaparine traitement curatif**).

Traitement curatif des thromboses veineuses profondes constituées (toutes sauf **tinzaparine traitement préventif**).

Prévention de la coagulation dans le circuit extracorporel au cours de l'hémodialyse (**énoxaparine**, **tinzaparine traitement préventif**, **nadroparine**, **daltéparine**).

Traitement curatif de l'embolie pulmonaire non compliquée (**énoxaparine**, **tinzaparine traitement curatif**).

Traitement de l'angor instable et de l'infarctus du myocarde sans onde Q à la phase aiguë en association avec l'aspirine (**daltéparine**, **nadroparine**, **énoxaparine**).

### CONTRE-INDICATIONS

Idem **héparines standards non fractionnées**.  
Administration par voie intramusculaire.  
Insuffisance rénale sévère (clairance inférieure à 30 mL/min) en cas d'utilisation à doses curatives.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas administrer par voie IM.  
Prudence en cas de rachianesthésie ou d'anesthésie péridurale, d'insuffisance hépatique ou rénale, d'antécédents ulcéreux, de maladies vasculaires de la chorioretine.

#### Surveillance de l'activité anti-Xa

- *Traitement préventif* : surveillance inutile.
- *Traitement curatif* : surveillance utile uniquement en cas de risque de surdosage : insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 60 mL/min), poids

extrême (maigreur, obésité), hémorragie inexpliquée. Évaluation de l'activité anti-Xa par une prise de sang réalisée 4 h après la 3<sup>e</sup> inj. en cas de traitement avec 2 inj. par jour ou 4 h après la 2<sup>e</sup> inj. en cas de traitement avec une seule injection par jour et à répéter seulement si besoin (activité anti-Xa souhaitée = 0,5 à 1 UI/mL). Pour **INNOHEP** et **FRAXODI**, l'activité anti-Xa doit être entre 0,8 et 1,5 UI/mL.

Remarque : En cas d'hémodialyse, ajuster les doses si l'activité anti-Xa est < 0,4 ou > 1,2.

#### Durée du traitement :

- Angor instable et IDM sans onde Q : 6 j jusqu'à stabilisation clinique.

- Traitement curatif des TVP, EP : ne doit pas excéder 10 j, délai d'équilibration du traitement AVK inclus.

- Traitement préventif : à maintenir jusqu'à déambulation active et complète du patient, associé à la contention élastique des membres inférieurs. Le plus souvent, ne doit pas excéder 10 j.

#### Traitement thrombolytique associé

Si un traitement thrombolytique s'avère nécessaire, il est recommandé d'interrompre le traitement par **HBPM**, étant donné l'absence de données cliniques sur l'administration conjointe.

#### Surveillance de la numération plaquettaire

Dans tous les cas (traitement préventif ou curatif ou hémodialyse) : à pratiquer avant traitement puis 2 fois/sem.

**Grossesse** : absence d'AMM mais aucun effet tératogène démontré chez les patientes enceintes ayant reçu des **HBPM**.

**Allaitement** : pas de contre-indication.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Manifestations hémorragiques rares (2 à 4 %).  
Risque de thrombopénie mais moindre qu'avec l'**héparine standard** ; la prévention repose sur l'interrogatoire avant la prescription, sur la surveillance régulière de la numération plaquettaire et sur l'arrêt du traitement idéalement avant le 10<sup>e</sup> jour.

Petits hématomes au point d'injection.

Rarement : nécrose cutanée au point d'injection, manifestations allergiques cutanées ou générales.

Risque d'ostéoporose non exclu en cas de traitement prolongé.

Élévation transitoire des transaminases, rares cas d'hyperkaliémie réversible, rares cas d'hyperéosinophilie réversible.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Idem **héparines standards non fractionnées**.

## INHIBITEUR DIRECT DU FACTEUR Xa (MALADIE CORONAIRE)

## ■ Fondaparinux sodique

ARIXTRA					
Traitement syndrome coronarien aigu avec ou sans décalage du segment ST : 2,5 mg en 1 inj. SC/j pendant 7 à 8 j maximum	2 ser. 2,5 mg/0,5 mL	13,30	I	65 %	6,65
	7 ser. 2,5 mg/0,5 mL	43,56	I	65 %	6,22
	10 ser. 2,5 mg/0,5 mL	HOP	I		

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

## PROPRIÉTÉS

Pentasaccharide inhibiteur synthétique et sélectif du facteur X activé (Xa) ; en se liant à l'antithrombine III (ATIII), il potentialise l'inhibition naturelle du facteur Xa par l'ATIII, ce qui interrompt la cascade de la coagulation.

## INDICATIONS

À la dose de 2,5 mg/j, ce médicament est indiqué dans le traitement du syndrome coronaire aigu :

- angor instable ou infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST chez les adultes pour lesquels une prise en charge par une stratégie invasive (intervention coronaire percutanée) en urgence (< 120 min) n'est pas indiquée ;
- infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST chez les adultes soit pris en charge par un traitement thrombolytique soit ne relevant initialement d'aucune technique de reperfusion.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **fondaparinux**.

Saignement actif.

Endocardite bactérienne aiguë.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Déconseillé chez les moins de 17 ans et pendant la grossesse et l'allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : contre-indiqué si clairance de la créatinine < 20 mL/min. Adaptation de la dose à 1,5 mg/j si clairance entre 20 et 30 mL/min.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie.

Épistaxis, hémoptysie, hématurie, saignement intracrânien.

Purpura, troubles de la coagulation.

Céphalée, confusion, anxiété, vertige.

Dyspnée, toux.

Nausées, vomissements, gastrite, élévation des transaminases.

Rash, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Précaution si association avec des médicaments susceptibles d'augmenter le risque hémorragique (**fibrinolytiques, anti-GPIIb/IIIa, HNF, HBPM, AINS, antiagrégants plaquettaires**).

Relais avec un autre anticoagulant :

– avec **HNF** ou **HBPM** : 1<sup>re</sup> injection 24 h après l'arrêt du **fondaparinux** ;

– avec **AVK** : poursuivre le **fondaparinux** jusqu'à obtention de l'INR cible.



## INHIBITEUR DIRECT DE LA THROMBINE (ANTI-IIA) (MALADIE CORONAIRE)

### ■ Bivalirudine

ANGIOX					
Anticoagulant utilisé pendant une coronarographie : bolus IV de 0,75 mg/kg puis perfusion IV de 1,75 mg/kg pendant la durée de l'examen et jusqu'à 4 h après si besoin	2 fl. à usage unique 250 mg		I	NR	
	10 fl. à usage unique 250 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur direct et spécifique de la thrombine qui joue un rôle majeur dans la formation du thrombus.

#### INDICATIONS

Ce médicament est indiqué :

- en tant qu'anticoagulant chez les patients subissant une intervention coronaire percutanée notamment chez les patients atteints d'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST ;
- pour le traitement des patients atteints d'un angor instable/infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST devant bénéficier d'une intervention urgente ou précoce. Ce médicament doit être administré avec de l'**aspirine** et du **clopidogrel**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **bivalirudine**.  
Trouble de la coagulation.

Endocardite bactérienne aiguë.

HTA sévère non contrôlée.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min), dialyse.

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, hémorragie.

Hypotension artérielle, tachycardie ventriculaire.

Dyspnée.

Rash cutané, urticaire.

Choc anaphylactique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation du risque de saignement si association à d'autres anticoagulants (**HNF**, **warfarine**, **thrombolytiques**, **antiagrégants plaquettaires**).

## HÉPARINES STANDARDS NON FRACTIONNÉES (1)

## ■ Héparine standard par voie intraveineuse

<b>HÉPARINE CHOAY</b>					
Traitement curatif des thromboses veineuses ou artérielles : à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA : 20 UI/kg/j en perfusion IV continue à la seringue électrique Parfois bolus initial de 50 UI/kg en IVD Traitement préventif des accidents thromboemboliques artériels en cas de circulation extracorporelle ou extrarénale : à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA	1 fl. 25 000 UI/5 mL	4,31	I	65 %	4,31
	10 fl. 25 000 UI/5 mL	HOP	I		
	20 amp. 5 000 UI/mL	HOP	I		

## ■ Héparine standard par voie sous-cutanée

<b>CALCIPARINE</b>					
Traitement curatif (TVP, EP, IDM, angor instable) à adapter au poids, à la pathologie sous-jacente et aux TCA : 500 UI/kg/24 h en 2 ou 3 inj. SC/j Traitement préventif en cas d'intervention chirurgicale : 5 000 UI en une inj. SC 2 h avant l'intervention puis 5 000 UI toutes les 12 h pdt au moins 10 j après l'intervention Traitement préventif de la thromboembolie : 5 000 UI x 2/j (risque modéré) ou x 3/j (risque élevé) Surveillance plaquettes utile et surveillance TCA inutile	2 ser. prér. 5 000 UI pour 0,2 mL	3,42	I	65 %	1,71
	10 ser. prér. 5 000 UI pour 0,2 mL	HOP	I		
	2 ser. prér. 7 500 UI pour 0,3 mL	3,71	I	65 %	1,86
	10 ser. prér. 7 500 UI pour 0,3 mL	HOP	I		
	2 amp. 12 500 UI pour 0,5 mL + ser.	4,71	I	65 %	2,36
	10 amp. 12 500 UI pour 0,5 mL + ser.	HOP	I		
	2 amp. 20 000 UI pour 0,8 mL + ser.	6,20	I	65 %	3,10
	10 amp. 20 000 UI pour 0,8 mL + ser.	HOP	I		
	2 amp. 25 000 UI pour 1 mL + ser.	6,58	I	65 %	3,29
	10 amp. 25 000 UI pour 1 mL + ser.	HOP	I		

**EMBOLIE PULMONAIRE (2)****Probabilité diagnostique forte d'une embolie pulmonaire (EP)**

- Hospitalisation urgente qui peut être courte. Une prise en charge ambulatoire peut être proposée pour un patient à faible risque dans un environnement familial propice.
- Repos au lit.
- Voie veineuse périphérique de bon calibre.
- Oxygène par sonde nasale : 5 à 10 L/min à adapter en fonction de l'état clinique et des gaz du sang artériel.
- **Antalgiques** si besoin.
- Traitement anticoagulant : **HBPM ou fondaparinux ou HNF**. Si le diagnostic se confirme en imagerie, instaurer un traitement par **AVK** en relais.

**Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)**

Seules l'énoxaparine et la tinzaparine ont l'AMM dans le traitement d'une EP sans signe de gravité.

**LOVENOX** 100 UI anti-Xa/kg/12 h en SC soit 2 inj./j.

**INNOHEP** 175 UI anti-Xa/kg/24 h en SC soit 1 inj./j.

Cf. TVP.

**Fondaparinux**

**ARIXTRA** : 1 inj. 7,5 mg en SC/j pour les poids entre 50 et 100 kg. 1 inj. 5 mg en SC/j pour un poids < 50 kg. Une inj. 10 mg en SC/j pour un poids > 100 kg.

Cf. TVP.

**Héparine standard non fractionnée (HNF)**

– Elle peut être utilisée par voie sous-cutanée ou en perfusion IV continue avec une dose initiale de 50 UI/kg en IVD puis 20 UI/kg/h. Une mesure du TCA doit être faite 4 à 6 h après le début du traitement et après chaque changement de dose pour avoir un TCA entre 1,5 et 3 fois le témoin.

– En cas d'insuffisance rénale sévère, l'**HNF IV** sera préférée à l'**HBPM**.

– En raison du risque de TIH, le taux de plaquettes doit être vérifié avant traitement puis 2 fois/sem pendant le 1<sup>er</sup> mois de traitement puis 1 fois/sem tant que dure le traitement.

**Antivitamines K (AVK)**

Il est recommandé d'initier le traitement **AVK** dès confirmation du diagnostic d'EP, en relais du traitement anticoagulant initial. Cela peut se faire dès le 1<sup>er</sup> jour. Le traitement héparinique sera arrêté quand l'INR sera stable et > 2. Cf. Modalités de prescription des AVK. L'objectif thérapeutique est d'avoir un INR entre 2 et 3.

Ex. : **PRÉVISCAN** : 1 cp./j à adapter aux contrôles des TP et INR.

**Rivaroxaban**

C'est un **inhibiteur direct du facteur Xa** actif par voie orale. Il représente une alternative au traitement par **AVK** et ne nécessite pas de surveillance biologique ni pour évaluer son activité anticoagulante ni pour évaluer le risque hémorragique. Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'hémorragie. Il doit donc être prescrit dans le respect très strict de ses indications et contre-indications avec une vigilance particulière dans le suivi des patients.

**XARELTO** : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 20 mg/j en 1 prise. Si clairance de la créatinine entre 30 et 50 mL/min : 1 cp. 15 mg x 2/j pendant les 3 premières sem. puis 15 mg/j en 1 prise. Contre-indication si clairance de la créatinine < 30 mL/min.

• Mobilisation autorisée dès qu'une hypo-coagulation stable est obtenue, et en l'absence d'embolie sévère.

• Port d'une contention élastique forte classe 3, à mettre en place avant chaque lever du patient en cas de thrombose veineuse profonde associée à l'EP. Contention à maintenir pendant 2 ans minimum.

## HÉPARINES STANDARDS NON FRACTIONNÉES (2) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Polysaccharide sulfaté naturel extrait de l'intestin de porc. La fixation de l'héparine sur l'antithrombine augmente fortement l'activation naturelle de l'inhibiteur vis-à-vis de la thrombine, du facteur Xa et de tous les facteurs activés de la coagulation. Il en résulte un effet anticoagulant puissant qui dépend de la concentration de **héparine**, de la concentration de l'antithrombine et de celles des facteurs de coagulation.

### INDICATIONS

Traitement curatif de la maladie veineuse thromboembolique déclarée (thrombose veineuse, embolie pulmonaire).

Phase aiguë de l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q, de l'angor instable.

Traitement curatif des embolies artérielles extracérébrales.

Traitement curatif de certains cas de coagulopathie.

Prévention des accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène, de thérapeutique endovasculaire et de chirurgie vasculaire artérielle (voie intraveineuse).

Héparinisation des circuits de perfusion dans la circulation extracorporelle et dans l'épuration extrarénale.

Indication particulière à l'héparine standard sous-cutanée : prévention des accidents thromboemboliques veineux en milieu chirurgical ou chez des patients alités présentant une affection médicale aiguë (indication réservée à l'insuffisance rénale sévère : clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min, comme alternative aux **HBPM**).

### CONTRE-INDICATIONS

Antécédent de thrombopénie grave de type II (Cf. Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)) et/ou hypersensibilité vraie à l'**héparine** (très rare).

Manifestations ou tendances hémorragiques liées à des troubles de l'hémostase, à l'exception des CIVD non liées à l'**héparine**.

Lésion organique susceptible de saigner (ex. : ulcère digestif récent).

Endocardite infectieuse aiguë en dehors de celles survenant sur valve mécanique.

Période postopératoire après chirurgie du cerveau et de la moelle épinière.

Accident vasculaire cérébral hémorragique.

Dissection aortique, péricardite liquidienne.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pratiquer TCA, NFS, plaquettes avant traitement.

Dès que le traitement est mis en route, la surveillance biologique est quotidienne.

On peut utiliser en fonction des cas :

- le temps de céphaline activé (TCA) qui doit se situer entre 1,5 et 3 fois le témoin ;
- l'héparinémie qui doit se situer entre 0,2 et 0,6 UI/mL. À préférer en réanimation et en cas de syndrome inflammatoire important.

En cas de perfusion IV continue : 1<sup>er</sup> contrôle biologique à effectuer 6 h après le début de la perfusion et 4 à 6 h après chaque modification posologique, et à n'importe quel moment 1 fois/j.

Le prélèvement est réalisé dans une veine périphérique à distance des cathéters de perfusion, et rapidement acheminé au laboratoire.

En cas d'injections SC, 1<sup>er</sup> contrôle biologique à effectuer exactement entre les 2 premières injections et autre prélèvement après tout changement de dose.

Les injections SC se font dans l'abdomen ou à la face antérieure des cuisses, au mieux en décubitus ; l'aiguille doit être perpendiculaire au pli cutané formé par l'opérateur et maintenu pendant toute l'injection.

La numération plaquettaire doit être contrôlée 2 fois par semaine pendant 21 j.

Le relais de l'héparine par les **anticoagulants oraux (AVK)** doit se faire dès que possible, de façon à ce que la durée totale de l'héparinothérapie n'excède pas 7 à 10 j. Cf. Modalités de prescription des AVK.

Éviter toute effraction vasculaire hormis les injections IV et SC strictes.

Utiliser avec prudence en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, d'HTA sévère et chez les sujets âgés.

**Grossesse** : l'héparine ne traverse pas la barrière placentaire et peut donc être utilisée prudemment pendant toute la grossesse. Surveiller les risques hémorragiques utéro-placentaires. Traitement à arrêter si possible avant une anesthésie péridurale.

**Allaitement** : il n'est pas contre-indiqué (pas de passage dans le lait maternel).

**EMBOLIE PULMONAIRE (3)****Surveillance efficacité - tolérance**

- Clinique : pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, oxymètre de pouls, cyanose, auscultation cardiopulmonaire, examen des membres inférieurs.
- Biologique : ECG, radio thoracique, échocardiographie Doppler éventuelle (évaluation des pressions pulmonaires, recherche de thrombus de l'oreillette droite).

**Autres traitements de l'embolie pulmonaire**

- La thrombolyse IV est réservée aux patients hémodynamiquement instables. C'est le traitement de première intention dans l'EP massive avec risque vital imminent.

**Altéplase** 50 mg 1 bolus en IVD. L'**urokinase** et la **streptokinase** peuvent aussi être utilisées en l'absence d'**altéplase**.

- L'embolectomie chirurgicale ou l'interruption de la veine cave inférieure par un filtre cave restent exceptionnelles et sont réservées à des cas très particuliers.

**Traitement au long cours après embolie pulmonaire**

Il repose sur le traitement anticoagulant oral (**AVK** ou **rivaroxaban**). Le rapport bénéfice/risque de ces traitements doit être réévalué à intervalles réguliers.

La durée du traitement est de mieux en mieux précisée dans les recommandations :

- EP avec facteur déclenchant majeur transitoire (ex : chirurgie orthopédique, immobilisation prolongée  $\geq 3$  j) : 3 mois ;
- EP idiopathique (absence de facteur déclenchant, absence de facteur de risque) :  $\geq 6$  mois ;

- EP avec facteur de risque majeur persistant (cancer, syndrome des antiphospholipides) :  $\geq 6$  mois à prolonger tant que le facteur persiste. Seules les **HBPM** sont préconisées et en particulier la **daltéparine** au long cours. Ex : **daltéparine (FRAGMINE)** : 200 UI/kg/j pendant 1 mois puis 150 UI/kg/j jusqu'au 6<sup>e</sup> mois.

Il existe des facteurs de modulation pouvant allonger ou réduire la durée du traitement (cf. TVP).

**Conduite à tenir à distance**

- Recherche étiologique : une thrombophilie doit être recherchée chez tout sujet  $< 45$  ans présentant une EP documentée, en particulier en cas de récurrence, de survenue spontanée, de siège inhabituel ou associé à des fausses couches à répétition. Penser également à une néoplasie ou une maladie de système.
- Sous **AVK**, contrôle régulier de l'INR/15 j voire tous les mois.
- Surveillance clinique en consultation à 1, 3 mois puis tous les 3 mois.
- Angioscanner si nécessaire.
- Radio thoracique, échocardiographie Doppler si nécessaire.

**Traitement préventif de l'embolie pulmonaire****► Méthodes physiques**

- Lever précoce en postopératoire et *post-partum*.

- Mobilisation des membres inférieurs en cas d'alitement ou en cas de voyage prolongé.

- Contention veineuse élastique adaptée à mettre en place avant le lever.

**► Méthodes pharmacologiques**

- Risque thrombotique modéré : **HBPM** à faible posologie (cf. TVP).

- Risque thrombotique élevé : **HBPM** à forte posologie, NACO (cf. TVP).

**CONSENSUS**

- [1] Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse en médecine - Recommandations de bonne pratique, *Afssaps*, 2009

## HÉPARINES STANDARDS NON FRACTIONNÉES (3) – PHARMACOLOGIE (2)

### EFFETS INDÉSIRABLES

Manifestations hémorragiques (5 à 7 %).

Thrombopénies de type I précoces (avant J5) : les plus fréquentes, souvent modérées ( $> 100\,000/\text{mm}^3$ ), spontanément résolutives et ne nécessitant pas l'arrêt du traitement.

Thrombopénies de type II (TII ; cf. Thrombopénie induite par l'héparine) sévères mais très rares, tardives (entre J6 et J25) avec thromboses artérielles et/ou veineuses fréquentes : arrêt impératif de l'héparine, surveillance rapprochée et relais par **AVK**.

Rarement : nécrose cutanée au point d'injection, hyperéosinophilie, ostéoporose (traitement  $> 6$  mois), alopecie, réactions allergiques

cutanées, élévation des transaminases, priapisme, hypoaldostérisme avec hyperkaliémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **AINS**, **dex-tran 40 IV**, **aspirine** et salicylés à dose antalgique : augmentation du risque hémorragique. Associations avec précautions d'emploi (surveillance biologique renforcée) : **aspirine** à dose antiagrégante, **ticlopidine**, **clopidogrel**, **anti-GPIIb/IIIa**, thrombolytiques, **AVK**, **corticoïdes généraux**.

Association incompatible dans les flacons de perfusion avec de nombreux antibiotiques.

## ANTIVITAMINES K (1) – DÉRIVÉS COUMARINIQUES

### ■ Warfarine

<b>COUMADINE</b>					
Dose initiale : 5 mg/j en 1 seule prise/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	20 cp. séc. 2 mg	2,43	I	65 %	0,12
	30 cp. séc. 5 mg	6,75	I	65 %	0,23

### ■ Acénocoumarol

<b>SINTROM</b>					
Dose initiale : 4 mg/j en 2 prises/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	30 cp. quadriséc. 4 mg	2,98	I	65 %	0,10
<b>MINISINTROM</b>					
À adapter à l'objectif d'INR	20 cp. 1 mg	1,94	I	65 %	0,10

## ANTIVITAMINES K (2) – DÉRIVÉ DE L'INDANEDIONE

### ■ Fluindione

<b>PRÉVISCAN</b>					
Dose initiale : 20 mg/j en 1 seule prise/j à adapter ensuite selon la zone thérapeutique choisie	30 cp. séc. 20 mg	3,85	I	65 %	0,13

**ANTIVITAMINES K – RÈGLES DE PRESCRIPTION (2)****Surveillance au long cours [1]****Éducation du patient**

Elle est indispensable ainsi que celle de son entourage.

Expliquer le but du traitement, ses risques, l'intérêt d'une prise régulière et sa surveillance régulière par prises de sang.

Port d'un carnet dans lequel figurent l'indication du traitement (fourchette thérapeutique souhaitée), le groupe sanguin, les résultats des contrôles biologiques datés et les modifications posologiques.

Donner la liste des médicaments interdits et autorisés (ex. : prendre du **paracétamol** et non de l'**aspirine** en cas de maux de tête).

Apprendre au patient à indiquer qu'il est sous **anticoagulant** en cas de chirurgie,

d'extraction dentaire, de toute injection ou ponction ou infiltration.

Lui indiquer les signes d'une hypocoagulation trop importante : épistaxis, gingivorragies, saignements prolongés aux coupures, ecchymoses faciles.

Augmenter la fréquence des contrôles biologiques en cas de maladie intercurrente, troubles digestifs (diarrhées), fièvre et au début de la prescription d'un nouveau médicament.

**Surveillance biologique**

TP, INR 1 fois par sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois puis 1 fois tous les 15 j ou tous les mois, tant que dure le traitement par **AVK**.

Faire des contrôles supplémentaires en cas d'introduction d'un nouveau médicament et en cas de modification de la dose d'**AVK**.

**CONSENSUS**

[1] Mise au point sur le bon usage des médicaments antivitaminé K (AVK), *Afssaps*, 2009



## ANTIVITAMINES K (3) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Anticoagulants actifs par voie orale qui inhibent la synthèse hépatique des formes actives des facteurs de la coagulation II, VII, X, IX ainsi que la synthèse des protéines C et S en entrant en compétition avec la vitamine K. Résorption digestive complète, fixation importante à l'albumine plasmatique, catabolisme hépatique, élimination urinaire.

	Délai d'action	Durée d'action
<b>COUMADINE</b>	Lent 2 à 3 j	4 à 5 j
<b>SINTROM MINISINTROM</b>	Semi-lent 1 à 2 j	2 à 4 j
<b>PRÉVISCAN</b>	Semi-lent 1 à 2 j	2 j

### INDICATIONS

Indications où la zone thérapeutique préconisée en INR est entre 2 et 3 :

- Traitement des thromboses veineuses profondes et embolies pulmonaires.
- Prévention des embolies systémiques en cas de fibrillation auriculaire, infarctus du myocarde compliqué d'anévrisme, cardiomyopathie dilatée avec altération de la fonction VG, cardiopathie valvulaire (rétrécissement mitral serré avec oreillette gauche dilatée), prothèse valvulaire biologique (3 premiers mois postopératoires).

- Prothèse valvulaire mécanique aortique de 2<sup>e</sup> génération sans facteur de risque embolique type fibrillation auriculaire, dysfonction ventriculaire gauche, antécédent thromboembolique. Indications où la zone thérapeutique préconisée en INR est entre 3 et 4,5 :

- prothèse valvulaire mécanique mitrale
- prothèse valvulaire mécanique aortique de première génération ou avec facteur de risque embolique type fibrillation auriculaire, dysfonction ventriculaire gauche, antécédent thromboembolique.
- Embolies systémiques récidivantes.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie connue aux produits.

Syndromes hémorragiques et lésions susceptibles de saigner.

Ulcère gastroduodénal récent ou évolutif, varices œsophagiennes.

HTA maligne (valeur diastolique > 120 mmHg). Intervention neurochirurgicale ou oculaire récente.

Insuffisance rénale ou insuffisance hépatique sévères.

Accident vasculaire cérébral récent (sauf en cas d'embolie).

Péricardite liquidienne.

Certaines associations médicamenteuses : **aspirine** à forte dose, **miconazole**, **phénylbutazone**.

**Grossesse** : contre-indication pendant toute la durée de la grossesse.

**Allaitement** : contre-indiqué.


## ANTICOAGULANTS : ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES (1)

### Cibles des anticoagulants sur la cascade de la coagulation

• Les **antivitamines K**, anticoagulants actifs par voie orale qui inhibent la synthèse hépatique des formes actives des facteurs de la coagulation II, VII, IX, X ainsi

que la synthèse des protéines C et S en entrant en compétition avec la vitamine K.

• Les autres anticoagulants ont leur cible d'action précisée directement dans le schéma ci-dessous.



### Quel que soit le traitement anticoagulant

- Détermination en urgence du groupe sanguin, Rhésus, agglutinines irrégulières.
- Dosage de l'hémoglobine et de l'hématocrite pour évaluer l'importance de la déglobulisation.
- Rechercher des facteurs favorisants : surdosage thérapeutique, interaction médicamenteuse, affection intercurrente.

## ANTIVITAMINES K (4) – PHARMACOLOGIE (2)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison du délai d'action, les **antivitamines K** ne constituent pas un traitement d'attaque. Modalités de prescription des **AVK** (bilan préalable, introduction du traitement, adaptation de la posologie et surveillance) : cf. Tableau.

La posologie sera adaptée et la surveillance accrue :

- en cas d'insuffisance hépatique,
- en cas d'insuffisance rénale,
- en cas d'hypoprotidémie,
- chez le sujet âgé,
- au cours de tout événement pathologique intercurrent.

En cas d'intervention chirurgicale ou d'extraction dentaire, la modification du traitement anticoagulant sera examinée au cas par cas auprès d'un avis spécialisé :

- chirurgie programmée : arrêter l'**AVK** 4 j avant l'intervention et relais par **héparine de bas poids moléculaire** à doses curatives ;
  - chirurgie en urgence : utiliser **PPSB** (effet immédiat) et **vitamine K** (action retardée mais prolongée) pour ramener INR < 2.
- L'arrêt d'un traitement par **AVK** doit être progressif.

Contre-indication de toute injection et/ou ponction par voie intramusculaire ou intra-articulaire.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Manifestations hémorragiques de gravité variable qui peuvent être un signe de surdosage ou révéler une lésion organique. Fréquence : 2 à 4 % quand INR entre 2 et 3, et 10 à 15 % quand INR entre 3 et 4,5.

Propres aux **dérivés coumariniques** : troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) ; éruptions cutanées allergiques (urticaire, prurit) réversibles à l'arrêt du traitement. Propres aux **dérivés de l'indanedione** : éruptions cutanées, fièvre, arthralgies, leucopénie réversibles à l'arrêt du traitement ; manifestations immunoallergiques avec insuffisance rénale aiguë et/ou hépatique ou médullaire imposant l'arrêt du traitement ; exceptionnellement hépatite cytolytique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **aspirine** à forte dose, **miconazole**, **phénylbutazone**, millepertuis.

Associations déconseillées : **aspirine** aux doses antalgiques ou antipyrétiques (entre 500 mg et 3 g/j) et aux doses antiagrégantes (de 50 à 375 mg/j), **AINS**, **fluorouracile**.

Ces associations entraînent une augmentation du risque hémorragique.

Associations faisant l'objet de précautions d'emploi :

*Potentialisation des effets des AVK (augmentation du risque hémorragique) :*

- augmentation de la résorption digestive : ralentisseur du transit ;
- déplacement des **AVK** des sites de fixation protéique : **antibiotiques sulfamides, sulfamides hypoglycémiant, acide tiénique, clofibrate, fénofibrate, phénytoïne, miconazole** ;
- diminution du catabolisme des **AVK** : **disulfirame, chloramphénicol, tolbutamide, allopurinol, miconazole, métronidazole, cimétidine** ;
- diminution de l'élimination rénale : **probenécide** ;
- diminution de synthèse des facteurs vitamine K-dépendants : **quinidine, quinine, paracétamol, amiodarone** ;
- diminution de synthèse de vitamine K : **cyclines, antibiotiques sulfamides** ;
- augmentation du catabolisme de la vitamine K : **hormones thyroïdiennes**.

*Diminution des effets des AVK :*

- diminution de la résorption digestive : **anti-acides, pansements digestifs, colestyramine, charbon activé, laxatifs** ;
- augmentation du catabolisme par inducteurs enzymatiques : **rifampicine, barbituriques, méprobamate, phénytoïne, carbamazépine, griséofulvine, alcoolisme chronique** ;
- augmentation de synthèse des facteurs vitamines K dépendants : **vitamine K, œstrogènes**.

### INTERACTIONS

Aliments riches en **vitamine K** : choux, brocolis, céréales, choucroute, carottes, crudités, abats : ces aliments ne sont pas interdits mais il faut éviter les changements d'alimentation brusques.

## HÉMOSTATIQUES GÉNÉRAUX EN CARDIOLOGIE (1) – ANTIDOTES DES TRAITEMENTS THROMBOLYTIQUES

### ■ Acide tranexamique

<b>EXACYL</b>					
Surdosage en thrombolytique : 2 à 4 g/24 h à répartir en 2 à 3 administrations/j Forme injectable à administrer en IV lente	20 cp. 500 mg	3,71	I	65 %	0,19
	5 amp. inj. 500 mg/5 mL	9,08	I	65 %	1,82
	5 amp. inj. 1 g/10 mL	2,93	I	65 %	0,59
<b>SPOTOF</b>					
Idem <b>EXACYL</b>	5 amp. buv. 1 g/10 mL	2,93	I	30 %	0,59
	20 cp. 500 mg	3,71	I	30 %	0,19

#### PROPRIÉTÉS

Action antifibrinolytique par inhibition de la plasmine.

#### INDICATIONS

En cardiologie : traitement d'urgence des hémorragies majeures liées à un surdosage en **thrombolytique** (cf. chapitre correspondant).

#### CONTRE-INDICATIONS

Manifestations thromboemboliques, états fibrinolytiques réactionnels à une CIVD, insuffisance rénale grave, hématurie macroscopique.

**Grossesse et allaitement** : utilisation déconseillée.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale.

Injectons IV à pratiquer très lentement. Ne pas utiliser la voie IM.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement vertiges, nausées, vomissements, lipothymies, éruption cutanée allergique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Urokinase, noradrénaline, benzylpénicillines, tétracyclines, dipyridamole, diazépam.**

**ANTICOAGULANTS : ACCIDENTS HÉMORRAGIQUES (3)****Hémorragie sous fondaparinux**

Des doses supérieures à celles recommandées peuvent conduire à une augmentation du risque de saignement.

Il n'existe pas d'antidote connu au **fondaparinux**.

En cas de surdosage et d'hémorragie : arrêt du traitement, rechercher l'origine du saignement, traitement adapté (hémostase chirurgicale, transfusion, plasmaphérèse).

**Hémorragie sous les nouveaux anticoagulants oraux (NACO) ou anticoagulants oraux directs (AOD) : dabigatran, rivaroxaban, apixaban**

Il n'existe aucun antidote spécifique ni aucune recommandation consensuelle pour l'instant.

Les TCA, TP, INR et facteurs de coagulation ne sont pas interprétables.

Le temps de thrombine est interprétable avec le **dabigatran** mais il n'y a pas de corrélation avec le taux plasmatique.

L'activité anti-Xa est interprétable avec le **rivaroxaban** et l'**apixaban** mais il n'y a pas de corrélation avec le taux plasmatique.

En cas d'hémorragie majeure ou menaçant le risque vital :

- arrêt du traitement ;
- discussion multidisciplinaire avec un spécialiste en hémostase (dosage spécifique, interprétation) ;
- utilisation possible de **concentrés de complexes prothrombiniques (KANOKAD, OCTAPLEX, FEIBA)** et de **facteur VIIa humain recombinant (NOVOSEVEN)** ;
- épuration extrarénale du **dabigatran** à discuter.

## HÉMOSTATIQUES GÉNÉRAUX EN CARDIOLOGIE (2) – ANTIDOTE DES TRAITEMENTS HÉPARINIQUES

### ■ Sulfate de protamine

PROTAMINE CHOAY					
100 UAH (unités antihéparine) en inj. IV lente neutralisent 100 UI d'héparine standard, 50 à 60 UI anti-Xa de <b>FRAXIPARINE</b> ou de <b>FRAGMINE</b>	1 fl. 10 000 UAH/10 mL 1 mL = 1 000 UAH	35,04	I	65 %	35,04

#### PROPRIÉTÉS

Antidote de l'héparine d'action immédiate en IV.

#### INDICATIONS

Neutralisation instantanée de l'action anticoagulante de l'héparine en cas de surdosage par exemple.

#### CONTRE-INDICATIONS

Aucune. Une allergie alimentaire au poisson peut faire prévoir une intolérance à la protamine.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pratiquer un temps de thrombine pour s'assurer d'une bonne neutralisation de l'héparine par la protamine : il doit être normalisé. La persistance du syndrome hémorragique peut être un signe de surdosage en protamine qui possède une activité anticoagulante propre.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement hypotension, bradycardie, hypertension pulmonaire aiguë.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

## HÉMOSTATIQUES GÉNÉRAUX EN CARDIOLOGIE (3) – ANTIDOTE DES TRAITEMENTS PAR ANTIVITAMINES K

### ■ Vitamine K

VITAMINE K1 ROCHE					
Surdosage en AVK avec INR > 6 et sans hémorragie sévère : 0,5 mg en perfusion IV continue sur 20 à 30 min Si INR ≥ 10 et sans hémorragie sévère : 1 mg en perfusion IV continue sur 20 à 30 min Surdosage en AVK avec hémorragie sévère : 10 à 20 mg en perfusion IV continue d'1 h en association au PPSB	5 amp. 2 mg/0,2 mL 3 amp. 10 mg/1 mL	5,68 4,12		65 % 65 %	1,14 1,37

#### PROPRIÉTÉS

Cofacteur indispensable à la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation II, VII, IX, X, protéines C et S.

#### INDICATIONS

En cardiologie : hypoprothrombinémie induite par les anticoagulants oraux antivitaminés K. Cholestase : hypoprothrombinémie induite par la carence en vitamine K liée à la cholestase. Correction d'une hypoprothrombinémie liée à une cholestase : 20 mg IV.

#### CONTRE-INDICATIONS

Antécédent d'allergie à la vitamine K.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser la voie IM pour corriger un traitement antivitamine K : utiliser la voie IV.

Ne pas utiliser une ampoule avec un contenu devenu trouble.

**Grossesse et allaitement** : risques non connus.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Voie IV : risque faible de réactions anaphylactiques.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'administration de vitamine K à un patient sous AVK le rend réfractaire aux AVK pendant 8 j environ.

## DIGITALIQUES (1)

## ■ Digoxine

<b>DIGOXINE</b>					
1 cp./j	30 cp. séc. 0,25 mg	2,75	I	65 %	0,09
Soluté buvable utilisé chez l'enfant : dose initiale de 7 à 15 mg/kg puis 7 à 15 mg/kg/j en 2 ou 3 prises	60 mL sol. buv. en gttes 5 µg/0,1 mL + pipette	2,52	I	65 %	0,04
Forme injectable pour adulte : 1 à 2 amp./j en attaque puis 1/2 à 1 amp./j en IV lente	6 amp. sol. inj. IV 0,5 mg/2 mL	7,05	I	65 %	1,18
<b>HEMIGOXINE</b>					
Sujet âgé : 1 cp./j Insuffisance rénale sévère : 1 cp. tous les 2 j	30 cp. 0,125 mg	2,75	I	65 %	0,09

## PROPRIÉTÉS

Hétéroside d'origine végétale.

Les digitaliques inhibent la pompe  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ , l'extrusion du  $\text{Na}^+$  étant compensée par l'échangeur  $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ . Il en résulte une augmentation du calcium intracellulaire à l'origine de l'effet inotrope positif. La toxicité survient lorsque l'inhibition de la pompe  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  est telle que l'homéostasie cellulaire ne peut plus être maintenue (acidose et surcharge calcique intracellulaire). L'hypoxie, l'hypokaliémie et l'hypercalcémie favorisent leur toxicité.

Les différents effets thérapeutiques des **digitaliques** sont :

- effet inotrope positif ;
- effet chronotrope négatif ;
- effet dromotrope négatif ;
- effet bathmotrope positif ;
- effet vasculaire : vasoconstrictions artérielle et veineuse chez le sujet sain et vasodilatation chez le sujet en insuffisance cardiaque ;
- effet natriurétique direct par son action sur les cellules tubulaires et indirect via l'amélioration hémodynamique ;
- modification de l'arc baroréflexe avec augmentation du tonus parasympathique et diminution du tonus sympathique ;
- effet variable sur la consommation myocardique en oxygène.

La liposolubilité, liée au nombre de radicaux OH, conditionne les propriétés pharmacocinétiques des **digitaliques**.

L'absorption digestive est d'environ 70 %. L'élimination est rénale (90 %) sous forme non transformée et hépatique (10 %). La liaison aux protéines plasmatiques est faible, d'où un début d'action rapide (1 à 2 h *per os* ; 10 à 30 min IV). La demi-vie est de 36 h et l'équilibre obtenu à partir du 6<sup>e</sup> jour. La digoxinémie ne devra donc être vérifiée qu'après ce délai.

## INDICATIONS

Troubles du rythme supraventriculaire : ralentissement ou réduction de la fibrillation auriculaire ou du flutter auriculaire.  
Insuffisance cardiaque.

## CONTRE-INDICATIONS

Dysfonction sinusale et troubles de conduction de haut degré non appareillés.  
Hyperexcitabilité ventriculaire (tachycardie et fibrillation ventriculaires).  
Syndrome de Wolff-Parkinson-White.  
Cardiopathies obstructives (rétrécissement aortique, cardiopathie hypertrophique).  
Cardioversion électrique.  
Temporaires : hypokaliémie non corrigée.  
**Sultopride**, sels de calcium IV.

Arrêt de la **DIGOXINE** depuis au moins 3 j avant un choc électrique externe.

## DIGITALIQUES (2)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : on peut prescrire la **DIGOXINE** en surveillant les taux sériques, notamment au 3<sup>e</sup> trimestre.

**Allaitement** : risque non connu mais très faible passage dans le lait maternel.

Surveillance clinique et ECG stricte en début de traitement, d'autant plus que la fonction ventriculaire gauche est altérée.

Réduire la posologie de la **DIGOXINE** de moitié en cas d'insuffisance rénale ou chez le sujet âgé (baisse physiologique de la fonction rénale, masse musculaire plus faible, troubles fréquents de la kaliémie et de la magnésémie). Diminuer la posologie chez l'insuffisant respiratoire avec hypoxie.

Réduire la posologie en cas d'hypothyroïdie.

Correction et prévention d'une hypokaliémie.

Pas de dose de charge en cas d'insuffisance rénale, chez le sujet âgé, en cas de dysthyroïdie et en cas d'insuffisance cardiaque évoluée.

Les **digitaliques** doivent être évités à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles du rythme ventriculaire liés à une hypersensibilité ou un surdosage (nécessitent l'arrêt du traitement).

Troubles de conduction et dysfonction sinusale.

Manifestations allergiques (exceptionnelles) cutanées et purpura thrombocytopénique.

Gynécomastie (très rare).

Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, diarrhées (premiers signes de surdosage).

Troubles neuro-sensoriels : céphalées, vertiges, coloration en jaune de la vision et confusion (surdosage).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association contre-indiquée avec le **calcium** intraveineux et surveillance en cas d'utilisation de **calcium** per os associé ou non de la **vitamine D**.

Contre-indication du **millepertuis** (inducteur enzymatique) et du **sultopride**.

**Midodrine** déconseillée (sympathomimétique alpha).

Précaution d'emploi avec les médicaments bradycardisants (notamment **bêtabloquants**, **amiodarone**, **vérapamil**), la **carbamazépine**, la **colestyramine**, l'**érythromycine**, les médicaments hypokaliémisants, l'**itraconazole**, le **ritonavir**, les topiques gastro-intestinaux.

## Surveillance d'un patient sous DIGOXINE

## ► Clinique

Rythme et fréquence cardiaque.

- Signes d'efficacité ;

- Signes de surdosage : troubles digestifs et neuro-sensoriels, bradycardie, accélération paradoxale de la fréquence cardiaque et arythmies.

## ► ECG

Signes d'imprégnation digitalique :

- diminution de la fréquence cardiaque,

- augmentation de l'espace PR qui reste < 0,24 s,

- raccourcissement de l'espace QT,

- sous-décalage cupuliforme du segment ST,

- onde U.

Signes de surdosage :

- troubles du rythme à tous les étages (tachysystolie auriculaire + + +),  
- troubles de conduction.

## ► Biologique

• Ionogramme sanguin, urée, créatinine.

• Taux sériques.

## Taux sanguins (digoxinémie)

Par microméthode.

– Prélèvement fait à l'équilibre, c'est-à-dire à la fin de la 1<sup>re</sup> sem., au moins 8 h après la dernière prise.

– Digoxinémie : taux thérapeutiques entre 0,8 et 1,5 ng/mL chez l'adulte. Digoxinémie entre 2 et 3 ng/mL chez le nourrisson < 2 ans et entre 1 et 2 ng/mL au-dessus de 2 ans.

Il faut signaler l'importante susceptibilité individuelle et la faible marge thérapeutique.



## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (1)

### Rappels électrophysiologiques

#### Les différents types cellulaires

On distingue 2 types de cellules cardiaques :  
 – fibres à réponse rapide (cellules auriculaires, ventriculaires et du système His-Purkinje) : potentiel de repos fortement négatif et potentiel d'action classique en 5 phases ;  
 – fibres à réponse lente (cellules du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire) : potentiel de repos faiblement négatif et potentiel d'action particulier.

#### Les 5 phases du potentiel d'action

*Phase 0* : dépolarisation (courant sodique entrant).

*Phase 1* : repolarisation rapide initiale (courant chlore entrant).

*Phase 2* : plateau du potentiel d'action (courant calcique entrant).

*Phase 3* : repolarisation terminale (courant potassique sortant).

*Phase 4* : phase de repos.


Les cellules à réponse lente ont un potentiel d'action différent avec une phase 0 correspondant à un courant calcico-sodique entrant et une phase 4, sous influence sympathique, présentant une dépolarisation spontanée à l'origine de l'activité *pacemaker*.

### Classification des antiarythmiques

#### Classification de Vaughan-Williams

- Classe I : inhibiteurs des canaux sodiques.
- Classe II :  **$\beta$ -bloquants**.
- Classe III : bloqueurs de l'influx potassique.
- Classe IV : **inhibiteurs calciques**.

En fait, les **antiarythmiques** ne sont pas des substances pures : l'**amiodarone** est un **antiarythmique** de classe I, II, III et IV.



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (4)

### De façon définitive

En cas d'ACFA persistante bien tolérée chez un sujet âgé et/ou en cas de cardiopathie, le simple contrôle de la cadence ventriculaire est tout à fait acceptable. L'objectif est d'avoir une fréquence ventriculaire entre 70 et 80/min. Le traitement, par voie orale, repose sur 3 classes thérapeutiques : les **digitaliques**, les  **$\beta$ -bloquants** et les **inhibiteurs calciques**. La **COR-DARONE** est dans cette indication une drogue de seconde intention.

### Réduction de la fibrillation auriculaire [1][2]

La réduction de la fibrillation auriculaire reste le traitement de référence chez les patients symptomatiques, surtout s'ils sont jeunes.

La cardioversion peut être soit médicamenteuse, soit interventionnelle avec une ablation par radiofréquence (**cf. Ablation par radiofréquence [ARF]**), soit électrique (**cf. Choc électrique externe**).

La tentative de réduction d'une fibrillation auriculaire est une indication formelle au traitement anticoagulant efficace, quelle que soit la méthode de cardioversion. Il ne faut jamais tenter de réduction en cas d'accident embolique récent. On s'assurera que l'anticoagulation est efficace depuis une durée suffisante (au moins 3 sem.) ainsi que de l'absence de désordres hydroélectrolytiques (hypokaliémie). Il faut signaler que 50 % des fibrillations auriculaires récentes (moins de 48 h) se réduisent spontanément.

Indications de l'échographie transœsophagienne (vérification de l'absence de thrombus dans l'oreillette gauche avant réduction) :

- systématiquement après une embolie systémique,
- chez un patient à haut risque (rétrécissement mitral, dysfonction ventriculaire gauche, grosse oreillette gauche, etc.),
- en cas d'incertitude sur l'efficacité du traitement anticoagulant,
- diminution de la durée de l'anticoagulation avant réduction.

### Indications

- FA récente avec instabilité hémodynamique : **choc électrique externe**.
- FA récente sans instabilité hémodynamique : cardioversion médicamenteuse (un choc électrique externe peut néanmoins être préféré par le patient et le médecin).
  - Avec cardiopathie sévère sous-jacente : **amiodarone** (*cf. Schémas possibles d'administration ci-dessous*).
  - Avec cardiopathie modérée sous-jacente : **amiodarone** (*cf. Schémas possibles d'administration ci-après*). Le **vernalant IV**, commercialisé en Europe mais pas encore en France, apparaît dans la liste des médicaments efficaces dans les dernières recommandations européennes.
  - Sans cardiopathie sous-jacente : **flécaïnone (FLÉCAÏNE)**, **propafénone (RHYTHMOL)** ou **sotalol (SOTALEX)**.
- FA paroxystique symptomatique et récurrente malgré le traitement médical : **ARF**.
- L'**ARF** peut être également proposée en 1<sup>re</sup> intention dans la FA paroxystique en fonction du choix du patient, du bénéfice et du risque et comme une alternative au traitement médical.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (2)

### Mécanismes d'action

#### Antiarythmiques de classe I

Ils agissent au niveau de la phase 0 en diminuant l'influx entrant de sodium (effet stabilisant de membrane), ce qui a pour effet d'augmenter la durée du QRS. Leur action s'exerce surtout sur les fibres à réponse rapide. On différencie trois sous-classes selon leur action sur la repolarisation (voir Tableau) :

- classe Ia : **hydroquinidine (SÉRÉCOR)**, **disopyramide (RYTHMODAN, ISORYTHM)** ;
- classe Ib : **lidocaïne (XYLOCARD)**, **mexilétine, phénytoïne (DILANTIN)** ;
- classe Ic : **cibenzoline (CIPRALAN, EXAC OR)**, **propafénone (RYTHMOL)**, **flécaïnide (FLÉCAÏNE)**.

#### Antiarythmiques de classe II

Les  **$\beta$ -bloquants** agissent sur la phase IV en diminuant la dépolarisation spontanée. Ils sont donc essentiellement actifs sur les fibres à réponse lente.

#### Antiarythmiques de classe III

Il s'agit de l'**amiodarone** et du **sotalol**. Leur action porte sur la phase 3 : augmentation du temps de repolarisation et de la durée du potentiel d'action, mais aucun n'est pur.

#### Antiarythmiques de classe IV (vérapamil, diltiazem)

Les **inhibiteurs calciques** agissent sur la phase 2 des fibres rapides (diminution de l'entrée de calcium) et la phase 0 des fibres lentes.

#### Antiarythmiques responsables d'effet proarythmique

- Classe Ia et Ic : extrasystoles, tachycardie et fibrillation ventriculaire, torsades de pointes, flutter 1/1.
- Classe III (la **CORDARONE** présente peu ou pas d'effet arythmogène) : extrasystoles, tachycardie et fibrillation ventriculaire, torsades de pointes.

#### Antiarythmiques responsables de torsades de pointes

- Classe Ia : **quinidiniques +++ et disopyramide**.
- Classe III.
- Classe II et IV par leur effet bradycardisant.

#### Antiarythmiques responsables de troubles conductifs

- Classe Ia et Ic : troubles de conduction infranodaux et intraventriculaires.
- Classe II et IV : dysfonction sinusale et blocs auriculo-ventriculaires nodaux.
- Classe III : provoquent des troubles de conduction.

#### Principaux antiarythmiques inotropes négatifs


- Classe Ia et Ic.
- Classe II.
- Classe IV.

#### Associations d'antiarythmiques

Elles seront à éviter surtout entre **antiarythmiques** de même classe ou inotropes négatifs. Certaines associations peuvent être utiles (**DIGOXINE/CORDARONE**, **CORDARONE/ $\beta$ -bloquants**).

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (5)

### Algorithme de choix entre les médicaments et l'ARF pour réduire une FA



### Méthodes

#### ► Ablation par radiofréquence (ARF)

Sa place a été renforcée dans les nouvelles recommandations.

#### ► Cardioversion médicamenteuse

Globalement, le taux de réduction est de 70 %. Plusieurs **antiarythmiques** sont utilisables et efficaces.

• **Antiarythmique de classe III, amiodarone (CORDARONE)**, traitement de choix avec plusieurs schémas possibles.

– En **USIC** : bolus de 1 à 2 amp. à 150 mg (5 mg/kg) en IV sur 15 à 30 min sur une voie veineuse de bon calibre puis 5 cp. à 200 mg x 1/j.

– En **hospitalisation** : dose de charge de 30 mg/kg *per os* le premier jour suivie d'une demi-dose de charge le lendemain, puis 3 cp. à 200 mg x 1/j les jours suivants (chez le sujet âgé ou avec dysfonction ventriculaire gauche, uniquement demi-dose de charge de 15 mg/kg).

– **Protocole ambulatoire en cas de premier accès de fibrillation auriculaire sur cœur sain** : J1 : 3 cp. à 200 mg x 1/j ; J10 : 2<sup>e</sup> consultation ; en cas de non-réduction, poursuivre à 2 cp./j avec rendez-vous d'hospitalisation 10 j plus tard pour une réduction par choc électrique externe.

• **Antiarythmique de classe Ic, flécaïnone (FLÉCAÏNE)** : en **USIC**, bolus de 2 mg/kg en 30 min en IV (amp. à 150 mg) suivi d'une perfusion continue de 3 µg/kg/min.

Les **digitaliques** ne permettent pas de réduire une fibrillation auriculaire.

#### ► Cardioversion électrique

Son taux de succès est de 80 à 90 %. Elle peut être utilisée d'emblée ou en cas d'échec de la cardioversion médicamenteuse. L'imprégnation cordaronique augmente son efficacité. Cf. **Choc électrique externe**.

Facteurs associés à une résistance ou à une récurrence de la fibrillation auriculaire après tentative de cardioversion :

- âge > 75 ans ;
- ACFA ancienne (> 1 an) ;
- ACFA multirécidivante (> 3 récurrences) malgré un traitement antiarythmique optimal ;
- existence d'une valvulopathie mitrale +++ ;
- oreillette gauche dilatée ;
- dysfonction ventriculaire gauche ;
- persistance d'un facteur favorisant ;
- difficultés de prescription des **antiarythmiques**.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (3)

### Antiarythmiques de classe I

	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ia	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ib	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE Ic
Électrophysiologie	↑ du temps de repolarisation (ralentissement de la phase 3) et ↑ de la durée du potentiel d'action	↑ du temps de repolarisation (raccourcissement de la phase 3) et ↓ de la durée du potentiel d'action	Pas d'action sur la repolarisation et la durée du potentiel d'action
Effet inotrope négatif	Marqué	Très faible	Marqué
ECG	↑ PR ↑ QRS ↑ QT	↑ QRS → ou ↓ QT	↑ PR ↑ QRS → QT
Effets secondaires	BSA Bloc intraventriculaire BAV infranodal Torsades de pointe	Peu de troubles conductifs	BSA Bloc intraventriculaire BAV infranodal

### Antiarythmiques de classes II, III et IV

	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE II	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE III	ANTIARYTHMIQUE DE CLASSE IV
ECG	↓ Fréquence cardiaque ↑ PR → QRS → QT	↓ Fréquence cardiaque → PR → QRS ↑ QTc Aplatissement de l'onde T et onde u	↓ Fréquence cardiaque ↑ PR → QRS
Effet inotrope négatif	Marqué	Non	Marqué
Effets secondaires	BSA BAV nodal	BSA Torsades de pointes	BSA BAV

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (6)

### Traitement médicamenteux pour maintenir le rythme sinusal [1] [2]

#### Choix du médicament antiarythmique selon la cardiopathie sous-jacente

On évitera la **FLÉCAÏNE** en cas de coronaropathie. La **dronédarone** est totalement contre-indiquée en cas d'insuffisance cardiaque.

#### Durée du traitement antiarythmique d'entretien


Un traitement antiarythmique d'entretien n'est pas toujours nécessaire au long

cours. Il pourra être interrompu dans un délai de 1 à 3 mois en cas de :

- réussite maintenue d'une **ablation par radiofréquence (ARF)** ;
- premier accès sur cœur sain ;
- FA contemporaine d'une cause précise corrigée.

Dans les autres cas, le traitement antiarythmique d'entretien devra être maintenu au long cours en surveillant son efficacité et sa tolérance.

#### Algorithme de choix du médicament antiarythmique selon la cardiopathie sous-jacente



### Formes cliniques particulières

#### Maladie de l'oreillette

C'est l'association de troubles du rythme auriculaire et de troubles de conduction. L'implantation d'un **pacemaker** est souvent indispensable en association avec le traitement antiarythmique.






#### Syndrome de Wolff-Parkinson-White

Les **digitaliques** sont **formellement contre-indiqués** (raccourcissent la période

réfractaire antérograde du faisceau de Kent et accélération de la réponse ventriculaire). Si elle est bien tolérée, la fibrillation auriculaire sera réduite par les **antiarythmiques de classe Ic (FLÉCAÏNE)** ou par la **CORDARONE** qui diminuent la perméabilité antérograde et rétrograde des voies accessoires. Au décours on effectuera une exploration électrophysiologique, avec éventuellement ablation de la voie accessoire par **radiofréquence**.

## ANTIARYTHMIQUES - MÉCANISMES ET CLASSIFICATION (4)

### Choix du traitement médical antiarythmique en fonction du trouble du rythme

FIBRILLATION AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE, MULTAQ</b>	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL, SOTALEX</b>
Entretien (fonction du terrain et du mécanisme de la fibrillation)	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL, SOTALEX, MULTAQ</b>	<b>CORDARONE</b>
FLUTTER AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	
Entretien	<b>SÉRÉCOR, RYTHMODAN, FLÉCAÏNE</b>	<b>CORDARONE, bêtabloquants</b>
TACHYSYSTOLIE AURICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	
Entretien	<b>SÉRÉCOR, RYTHMODAN, FLÉCAÏNE</b>	<b>CORDARONE, bêtabloquants</b>
TACHYCARDIE JONCTIONNELLE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>STRIADYNE</b>	<b>ISOPTINE</b>
Entretien	<b>FLÉCAÏNE, RYTHMOL</b>	<b>ISOPTINE</b> en l'absence de voie accessoire
TACHYCARDIE VENTRICULAIRE :		
		
	Première intention	Seconde intention
Réduction	<b>CORDARONE</b>	<b>XYLOCARD</b>
Entretien (dépend de la cardiopathie causale et de la fonction ventriculaire gauche)	Cardiopathie ischémique : <b>TÉNORMINE</b> et/ou <b>CORDARONE</b> Cardiopathie dilatée : <b>CORDARONE</b> Cardiopathie hypertrophique : <b>TÉNORMINE</b> ou <b>ISOPTINE</b> ± <b>CORDARONE</b> ou <b>RYTHMODAN</b> Prolapsus valvulaire mitral : <b>TÉNORMINE</b> Dysplasie du ventricule droit : <b>SOTALEX</b>	

## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (7)

### Mesures associées [1] [2]

- Hospitalisation en cardiologie en particulier si fibrillation mal tolérée, comorbidités, mauvaise compréhension du traitement.
- Recherche et correction de facteurs favorisants ou déclenchants, notamment :
  - correction des troubles hydroélectrolytiques (hypokaliémie et hypomagnésémie) ;
  - dysthyroïdie.
- Bilan clinique et échocardiographique (fonction ventriculaire gauche, taille des oreillettes et recherche d'une cardiopathie).
- Cure d'une valvulopathie si possible.
- Éviter les excitants (thé, café, alcool et tabac).

#### Facteurs favorisants ou déclenchants

- Hyperthyroïdie.
- Hypokaliémie.
- Dyscalcémie.
- **Théophylline**, agents sympathomimétiques.
- Hypoxie (pathologie respiratoire aiguë).
- Syndrome fébrile.
- Intoxication alcoolique aiguë.
- Drogues : cocaïne, crack, etc.
- Poussée d'insuffisance cardiaque.

### Surveillance [1] [2]

Elle comprend la tolérance et l'efficacité des différentes thérapeutiques.

- Clinique : notion de palpitations, effets secondaires extracardiaques des **antiarythmiques**, signes d'insuffisance cardiaque, embolies systémiques.
- ECG : rythme, espace PR, largeur du QRS, espace QT.
- Biologie : ionogramme sanguin, fonction rénale et hémostase.

- Si besoin, Holter cardiaque sur 24 h.

En dehors de leurs effets secondaires cardiaques et extracardiaques, il faut insister sur le risque d'effet proarythmique des traitements **antiarythmiques de classe Ia, Ic et III**. Il s'agit de troubles du rythme ventriculaire (extrasystoles ventriculaires, tachycardie et fibrillation ventriculaires, torsades de pointes) et auriculaire (flutter 1/1), d'accélération de la fréquence cardiaque en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White en ACFA, et d'élévation du seuil de défibrillation. Ils surviennent essentiellement dans les 48 premières heures suivant l'instauration ou la majoration posologique et sont favorisés par :

- l'âge ;
- le sexe féminin ;
- des antécédents d'insuffisance cardiaque, d'infarctus ou d'autres cardiopathies ;
- une posologie élevée ;
- l'existence de troubles hydroélectrolytiques ;
- des troubles de conduction associés (QT long).

Ils sont très rares en l'absence de cardiopathie sous-jacente.

En cas de risque d'effet proarythmique, l'instauration ou l'augmentation du traitement antiarythmique doit se faire en milieu hospitalier sous surveillance so-

#### Conduite à tenir en cas de récurrence de fibrillation auriculaire sous traitement

- Rechercher une cause favorisante.
- Vérifier l'observance thérapeutique.
- Vérifier que la posologie est suffisante.
- Bilan de la cardiopathie sous-jacente.
- Discuter une nouvelle réduction soit médicamenteuse, soit par **ARF**, soit par **choc électrique**.

### CONSENSUS

[1] Guidelines for the management of atrial fibrillation, ESC, 2010

[2] 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation, ESC, 2012



## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IA (1)

## ■ Hydroquinidine chlorhydrate

<b>SÉRÉCOR LP</b>					
1 gél. x 2/j (max 4/j)	20 gél. LP 300 mg	7,58	I	30 %	0,38
gél. à libération prolongée	60 gél. LP 300 mg	18,54	I	30 %	0,31

## ■ Disopyramide


<b>RYTHMODAN</b>					
Forme simple : 1 gél. x 3 ou 4/j (traitement d'attaque : jusqu'à 600 mg/j)	40 gél. 100 mg	4,79	I	30 %	0,12
Forme LP : 1 cp. x 2/j (500 mg/j)	20 cp. séc. LP 250 mg	4,79	I	30 %	0,24
<b>ISORYTHM LP</b>					
1 gél. x 2/j (dose recommandée : 500 mg/j)	20 gél. LP 125 mg	4,31	I	30 %	0,22
	20 gél. LP 250 mg	7,16	I	30 %	0,36

## ■ PROPRIÉTÉS

- **Quinidiniques : antiarythmiques de classe Ia** actifs surtout à l'étage supraventriculaire. Faible effet atropinique. Résorption digestive à 70 %, efficacité obtenue en 2 h pour une durée de 6 à 8 h (12 h pour les formes LP). Métabolisation hépatique et élimination urinaire. Taux plasmatiques efficaces : 2 à 5 mg/mL.
- **Disopyramide : antiarythmique de classe Ia** ayant des propriétés anticholinergiques. Ralen-


tissement de la conduction antérograde et rétrograde des voies accessoires rendant son utilisation possible en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White. Absorption orale rapide pour une durée de 6 à 8 h (12 h pour les formes LP). Action IV en 5 à 10 min pendant 2 h. Faible métabolisation hépatique et éliminations urinaire et fécale. Passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## Arythmie complète par fibrillation auriculaire



## ARYTHMIE COMPLÈTE PAR FIBRILLATION AURICULAIRE (ACFA) (8)

### Arbre de décision thérapeutique [1] [2]



## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IA (2)

## INDICATIONS

Traitement curatif et prévention des récides des troubles du rythme ventriculaire en l'absence de dysfonction cardiaque et/ou de coronaropathie.

Prévention des récides des tachycardies supraventriculaires en l'absence de dysfonction cardiaque.

Prévention des chocs cardiaques électriques chez les patients porteurs de défibrillateur implantable.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

Hypersensibilité.

Dysfonction sinusale et troubles de conduction de haut degré non appareillés.

QT long et antécédents de torsades de pointes. Insuffisance cardiaque non contrôlée.

Troubles du rythme de l'intoxication digitale (**quinidiniques**).

Risque de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire par obstacle uréthroprostatique (**disopyramide**).

Relative : myasthénie (**quinidiniques**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance de la kaliémie et de la glycémie.

Insuffisance cardiaque.

Surveillance ECG : arrêt du traitement en cas d'allongement du PR > 0,24 s, QT > 0,40 s et QRS > 25 % ou de troubles du rythme ventriculaire.

Le sous-décalage en cupule du segment ST et l'aplatissement de l'onde T sont des signes normaux d'imprégnation quinidinique.

• **Quinidiniques** :

– dose test à la recherche d'un effet idiosyncrasique (examen clinique et ECG 4 à 6 h après puis 1/j) ;

– utiliser avec prudence en cas d'insuffisance rénale, de risque de glaucome par fermeture de l'angle ou de rétention urinaire.

• **Disopyramide** : réduire la posologie de 50 % chez le sujet âgé, de 50 à 75 % en cas d'insuffisance rénale (forme injectable : 1 mg/kg en 1 h) et de 25 % en cas d'insuffisance hépatique. Chez l'enfant, adaptation au poids et à l'âge (formes LP contre-indiquées).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Insuffisance cardiaque, choc cardiogénique.

Troubles de conduction, allongement du QT et torsades de pointes, effets proarythmiques (troubles du rythme ventriculaire et flutter 1/1) (rares avec le **disopyramide**).

Troubles digestifs (fréquents avec les **quinidiniques**) : diarrhée, nausées, vomissements.

**Quinidiniques**

– Effets idiosyncrasiques (imposent l'arrêt définitif du traitement) : rash cutané, crise d'asthme, fièvre, hypotension, purpura thrombopénique, anémie hémolytique, bloc auriculo-ventriculaire, allongement du QT, torsades de pointes, troubles du rythme ventriculaire, syncope et arrêt cardiocirculatoire.

– Cinchonisme (surdosage) : vertiges, diplopie, photophobie, bourdonnement d'oreille, hypacousie.

– Atteinte hépatique immunoallergique fébrile (rare).

– Aggravation d'une myasthénie.

**Disopyramide**

– Effets atropiniques : bouche sèche, constipation, hypertension intra-oculaire, troubles de l'accommodation, diplopie, dysurie, rétention d'urine et parfois accélération de la fréquence cardiaque.

– Risque d'hypoglycémie chez les sujets âgés, dénutris, diabétiques et insuffisants rénaux.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association contre-indiquée avec les médicaments donnant des torsades de pointes.

Association aux autres **antiarythmiques**.

Médicaments chronotropes, dromotropes et inotropes négatifs.

Médicaments hypokaliémants.

Inducteurs enzymatiques.

**Quinidiniques** :

– alcalinisants urinaires : diminution de l'élimination et risque de surdosage.

– **magnésium** : majoration des taux sériques.

– **DIGOXINE** : augmentation de la digoxinémie.

– **CORDARONE** : majoration de la quinidinémie.

– **antivitamines K** : risque de surdosage.

**Disopyramide** : médicaments anticholinergiques (cf. **Atropine**).

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IB

## ■ Lidocaïne

XYLOCARD					
<b>XYLOCARD 2 %</b> Bolus en IVD de 1 à 1,5 mg/kg en 2 min	10 amp. 5 mL 20 mg/mL	HOP	II		
<b>XYLOCARD perfusion 5 %</b> Perfusion de 1,5 à 4 mg/min en IVSE en relais du bolus	10 fl. 20 mL 50 mg/mL	HOP	II		

**PROPRIÉTÉS**

Antiarythmique de la classe Ib agissant préférentiellement à l'étage ventriculaire. Faible effet inotrope négatif et hypotenseur. Inactivation hépatique. Action immédiate et durant 20 à 30 min.

**INDICATIONS**

Prévention et traitement des récurrences des troubles du rythme ventriculaire menaçant le pronostic vital, notamment à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : pas d'effet tératogène mis en évidence dans les études épidémiologiques humaines mais faiblesse des études expérimentales animales.

Antécédents neuropsychiques graves, notamment convulsifs, allergie, troubles hépatiques graves.

Choc cardiogénique, troubles de conduction de haut degré non appareillés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance cardiaque ou hépatique ou traitement par **β-bloquants** ou **cimétidine** : réduire les doses de 50 %.

**XYLOCARD PERFUSION 5 %** : jamais en IVD.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques (exceptionnelles) : cutanées, œdème laryngé, choc anaphylactique.  
Surdosage : agitation, délire, syndrome confusionnel, paresthésies des extrémités et des lèvres, puis dépression respiratoire, troubles du rythme et de conduction, collapsus cardiovasculaire, crises convulsives et coma. Le traitement est symptomatique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Autres **antiarythmiques**, **β-bloquants** et **cimétidine**.

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IC (1)

## ■ Flécaïnide

<b>FLÉCAÏNE</b>					
1 cp. x 2/j (max 300 mg/j) Forme injectable : bolus de 1 à 2 mg/kg en au moins 10 min, éventuellement complété d'une dose de 0,02 mg/kg/min pendant 1 h puis 0,003 mg/kg/min en IVSE Dilution dans du sérum glucosé	30 cp. séc. 100 mg 5 amp. 10 mg/mL	8,04 HOP	I I	65 %	0,27
<b>FLÉCAÏNE LP</b> 1 prise/j Tachycardies supra-ventriculaires : 100 mg/j Tachycardies ventriculaires : 200 mg/j Posologie max. : 300 mg/j	30 gél. LP 50 mg 30 gél. LP 100 mg 30 gél. LP 150 mg 30 gél. LP 200 mg	16,67 16,67 16,67 16,67	I I I I	65 % 65 % 65 % 65 %	0,56 0,56 0,56 0,56

## ■ Propafénone

<b>RYTHMOL</b>					
1 cp. x 2 ou 3/j	30 cp. séc. 300 mg	11,64	I	65 %	0,39

## ■ Cibenzoline

<b>CIPRALAN</b>					
1 cp. x 2 ou 3/j (max 3/j)	30 cp. séc. 130 mg	15,90	I	65 %	0,53
<b>EXACOR</b>					
1 cp. x 2 ou 3/j (max 3/j)	30 cp. séc. 130 mg	14,37	I	65 %	0,48

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IC (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antiarythmiques actifs à tous les étages présentant un effet inotrope négatif. Ralentissement de la conduction antérograde et rétrograde des voies accessoires. La **propafénone** présente de plus un effet  $\beta$ -bloquant.

**Flécaïnide** : résorption digestive importante. Pic plasmatique obtenu en 2 à 3 h par voie orale et 10 min en IV. Demi-vie de 14 h. Métabolisation hépatique et élimination urinaire (à 40 % sous forme inchangée). Taux plasmatiques efficaces : 0,2 à 1 mg/mL.

**Propafénone** : résorption digestive complète. Concentration maximale obtenue au bout de 3 h et demi-vie de 4 h. Élimination biliaire et urinaire (métabolites actifs et inactifs). Taux plasmatiques efficaces : 0,3 à 0,7 mg/mL.

**Cibenzoline** : résorption digestive quasi complète avec un pic d'efficacité obtenu en 2 h. Demi-vie plasmatique de 7 h. Métabolisation hépatique et élimination urinaire (60 % sous forme inchangée).

### INDICATIONS

Traitement et prévention des récides de troubles du rythme ventriculaire en l'absence de dysfonction cardiaque et/ou de coronaropathie.

Prévention des récides des tachycardies supraventriculaires en l'absence de dysfonction cardiaque.

Prévention des chocs cardiaques électriques inopinés chez les patients porteurs de défibrillateur implantable (**flécaïnide**, **propafénone**).

### CONTRE-INDICATIONS

Dysfonction sinusale et troubles de conduction de haut degré non appareillés.

Insuffisance cardiaque sévère.

Cardiopathie ischémique (extension de l'étude CAST).

Hypersensibilité.

Relatives (**propafénone**) : intoxication digitale, insuffisance hépatique ou rénale grave, hypotension artérielle, BPCO sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : utilisation déconseillée surtout les 3 premiers mois.

Cardiopathie ischémique : l'étude CAST a montré une surmortalité (globale et rythmique) du traitement préventif des arythmies ventriculaires non menaçantes par la **FLÉCAÏNE** en cas d'altération modérée à moyenne de la fraction d'éjection (précaution étendue aux autres **antiarythmiques de classe Ic**).

Insuffisance cardiaque : réduire la posologie.

Surveillance ECG : arrêt du traitement en cas d'augmentation du PR > 0,24 s, QRS > 25 %, ou de troubles du rythme ventriculaire.

Surveillance de la kaliémie et correction d'une hypomagnésémie.

### Posologie adaptée à la fonction rénale et chez le sujet âgé :

– **Flécaïnide** : diminuer la posologie de moitié en cas de clairance de la créatinine < 20 mL/min.

– **Propafénone** : réduire la posologie de moitié.

– **Cibenzoline** : 3 mg/kg/j en 2 prises *per os* (clairance de la créatinine entre 20 et 40 mL/min) et 2,5 mg/kg/j en 2 prises *per os* (clairance de la créatinine entre 10 et 20 mL/min).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Insuffisance cardiaque, choc cardiogénique.

Bradycardie et troubles de conduction.

Effets proarythmiques : troubles du rythme ventriculaire et flutter 1/1.

Troubles digestifs.

Troubles neuro-sensoriels à fortes doses (vertiges, tremblements, lipothymies, troubles visuels et céphalées).

**Propafénone** : troubles du goût, réactions cutanées allergiques.

**Cibenzoline** : hypoglycémie en cas de surdosage (surtout chez le sujet âgé, dénutri et insuffisant rénal).

Surdosage : traitement symptomatique et lavage de sodium molaire (**cibenzoline**).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Autres **antiarythmiques**.

Médicaments donnant des torsades de pointes. Médicaments inotropes, dromotropes et chronotropes négatifs.

**AVK** : augmentation de l'effet anticoagulant.

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE II

Cf. **Bétabloquants**.

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE III (1)

## ■ Amiodarone

<b>CORDARONE</b>					
<i>Per os</i> : Traitement d'attaque : 3 cp./j (jusqu'à 5 dans certains cas exceptionnels) pdt 8 à 10 j Traitement d'entretien 1/2 à 2 cp./j IV : Troubles du rythme Traitement d'attaque : 5 mg/kg en IVSE sur 20 min à 2 h, renouvelables x 2 à 3/24 h Traitement d'entretien : 10 à 20 mg/kg/j (moyenne de 600 à 800 mg/24 h) idéalement sur une voie veineuse centrale Arrêt cardiorespiratoire Posologie usuelle : 5 mg/kg/administration Posologie cumulée : 2,5 mg/kg/administration	30 cp. séc. 200 mg 50 cp. séc. 200 mg	12,65 HOP	I I	65 %	0,42
	6 amp. 150 mg/3 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Puissant antiarythmique de classe III mais aussi I, II et IV.

Diminution de l'automatisme sinusal, de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire sans modification de la conduction intraventriculaire. L'effet bradycardisant est modéré.

Augmentation des périodes réfractaires et diminution de l'excitabilité myocardique aux étages auriculaire, nodal et ventriculaire.

Ralentissement de la conduction et allongement des périodes réfractaires dans les voies accessoires auriculo-ventriculaires.

Diminution de la consommation myocardique en oxygène et effet vasodilatateur coronarien.

Effet inotrope négatif négligeable.

Action rapide par voie IV (effet maximal en 15 à 20 min) mais de courte durée (1 à 4 h). Par voie orale, résorption moyenne de 50 % avec effet maximal en 3 à 7 h, l'activité thérapeutique n'étant obtenue qu'au bout d'au moins une semaine.

Forte affinité tissulaire (importante accumulation) et demi-vie longue (20 à 100 j).

Élimination biliaire et fécale se poursuivant plusieurs mois après l'arrêt du traitement.

Chaque comprimé contient 75 mg d'iode (300 fois les besoins journaliers en iode).

Signes d'« imprégnation à la **CORDARONE** » : allongement du QT, onde T bifide, onde U (et

bradycardie sinusale, discrète augmentation du PR sans allongement du QRS).

## INDICATIONS

*Per os*, ce médicament est indiqué dans la prévention des récidives :

- des tachycardies ventriculaires menaçant le pronostic vital : le traitement doit être instauré en milieu hospitalier sous monitoring ;
- des tachycardies ventriculaires documentées symptomatiques et invalidantes ;
- des tachycardies supraventriculaires documentées lorsque la nécessité d'un traitement est établie en cas de résistance ou de contre-indication aux autres thérapeutiques ;
- des fibrillations ventriculaires.

Ce médicament est indiqué dans le traitement des tachycardies supraventriculaires : ralentissement ou réduction de la fibrillation auriculaire ou du flutter auriculaire.

Par voie IV, ce médicament est indiqué dans les troubles du rythme graves lorsque la voie orale n'est pas adaptée, notamment dans :

- les tachycardies du syndrome de Wolff Parkinson White ;
- les troubles du rythme auriculaire, avec rythme ventriculaire rapide ;
- les troubles du rythme ventriculaire documentés symptomatiques et invalidants.

Ce médicament est également indiqué dans la réanimation cardiorespiratoire en cas d'arrêt cardiaque lié à une fibrillation ventriculaire résistante aux chocs électriques externes.

**ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE III (2)****CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** : manifestations cardiaques et hypothyroïdie chez le fœtus ou le nouveau-né (passage dans le lait maternel). Bradycardie, dysfonction sinusale et troubles conductifs de haut degré non appareillés. Hyperthyroïdie : contre-indication formelle. Allergie à l'iode. Hypotension et collapsus (forme injectable).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique : ECG, ionogramme sanguin, bilan thyroïdien et radiographie pulmonaire. Correction d'une hypokaliémie. Antécédents personnels ou familiaux de dysthyroïdie. Exposition solaire ou aux ultraviolets. Insuffisance respiratoire sévère (forme injectable). Voie intraveineuse : dilution uniquement dans du sérum glucosé. Relais *per os* précoce après une période de chevauchement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Voie IV** : hypotension, veinite, flush, aggravation d'une insuffisance respiratoire sévère. **Cardiaques** : bradycardie, bloc sino-auriculaire, bloc auriculo-ventriculaire ; les effets proarythmiques sont très rares. **Oculaires** : dépôts cornéens (constants) et sans conséquence thérapeutique (réversibles à l'arrêt du traitement), halos colorés. **Cutanés** : photosensibilisation, pigmentation cutanée grise.

**Thyroïdiens** :

- hormonémie thyroïdienne dissociée (sans dysthyroïdie) : élévation de la T4, T3 normale ou basse, TSH normale ;
- hypothyroïdie : possibilité de poursuivre la **CORDARONE** si elle est indispensable ;
- hyperthyroïdie : arrêt impératif de l'**amiodarone**.

**Hépatiques** : élévation isolée et modérée des transaminases, exceptionnellement hépatite aiguë.

**Troubles digestifs** : bénins.

**Très rares** : neuropathie périphérique sensitivo-motrice et/ou myopathie, pneumopathie interstitielle diffuse dose-dépendante (arrêt impératif du fait du risque de fibrose pulmonaire irréversible).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée avec les médicaments donnant des torsades de pointes (cf. Torsades de pointes).

Médicaments chronotropes et dromotropes négatifs (majoration du risque de bradycardie et de troubles conductifs).

**Digitaliques** : augmentation de la digoxinémie de 50 %.

**Quinidiniques** : augmentation de la quinidinémie de 33 % (association non recommandée). Médicaments hypokaliémants.

**Antivitamines K** (potentialisation de l'effet anticoagulant).

**Antithyroïdiens**.

**Phénytoïne** : augmentation des taux plasmatiques.

**Anesthésiques généraux**.



## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE III (3)

## ■ Dronédarone

MULTAQ					
Antécédent de fibrillation auriculaire ou fibrillation auriculaire actuelle, non permanente, pour prévenir les récurrences ou ralentir la conduction : 400 mg x2/j pendant un repas	60 cp. 400 mg 100 cp. 400 mg		I	NR	
			I	NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiarythmique de classe III (inhibiteur des courants potassiques prolongeant le potentiel d'action et les périodes réfractaires), IV (inhibiteur des courants calciques), Ib (inhibiteur des courants sodiques) et II (antagoniste adrénergique non compétitif).

Diminution de la fréquence cardiaque ; prolongement de la longueur du cycle de Wenckebach et des intervalles AH, PQ, QT sans effet marqué ou avec une augmentation faible de l'intervalle QTc, et sans changement sur les intervalles HV et QRS.

## INDICATIONS

Antécédent de fibrillation auriculaire (FA) ou FA actuelle non permanente, afin de prévenir les récurrences ou de ralentir la fréquence cardiaque.

## CONTRE-INDICATIONS

- Grossesse, allaitement.
- Hypersensibilité.
- Blocs auriculoventriculaires des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés ou maladie du sinus (à l'exception des patients appareillés avec un stimulateur cardiaque en activité).
- Bradycardie < 50.
- Conditions hémodynamiques instables incluant les patients avec des symptômes d'insuffisance cardiaque au repos ou lors d'un effort minime (correspondant aux patients de classe IV NYHA et de classe III NYHA instables).
- Intervalle QTc ≥ 500 ms.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse : augmentation de l'exposition à la dronédarone.

Risque d'aggravation d'une insuffisance cardiaque.

Des hépatites graves mettant en jeu le pronostic vital ont été rapportées : effectuer un bilan hépatique avant le début du traitement puis

tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois ; arrêter le traitement si les ALAT sont ≥ 3 fois la valeur limite supérieure de la normale.

Risque d'élévation de la créatininémie ne devant pas forcément faire arrêter le traitement.

Corriger toute carence en potassium ou en magnésium (effet arythmogène).

Effet arythmogène : un allongement modéré de l'intervalle QTc Bazett (environ 10 ms), liée à une prolongation de la repolarisation.

Allongement du risque d'hyperkaliémie chez les patients diabétiques ou ayant une fonction rénale altérée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Neurologiques : dysgueusie.
- Cardiaques : insuffisance cardiaque congestive, bradycardie.
- Hépatogastroentérologiques : hépatites fulminantes. Effectuer un bilan hépatique avant le début du traitement puis tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois ; arrêter le traitement si les ALAT sont ≥ 3 fois la valeur limite supérieure de la normale. Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, dyspepsie.
- Cutanées : rash, érythème.
- Asthénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

## Risque de torsades de pointes :

- Ne pas associer à : phénothiazines, buprénorphine, antidépresseurs tricycliques, érythromycine, térfénadine, antiarythmiques de classe I et III.
- La coadministration de β-bloquants ou de digoxine doit être réalisée avec précaution.

Risque d'augmentation de l'exposition à la dronédarone avec : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, télicyclomycine, érythromycine, inhibiteurs calciques (diltiazem, vérapamil, nifédipine).

Risque de diminution de l'exposition aux médicaments suivants : rifampicine, phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne.

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE III (4)

## ■ Sotalol

SOTALOL					
Per os : dose initiale de 80 mg en 1 ou 2 prises/j puis augmentation progressive entre 160 et 320 mg en 2 prises/j (max. : 640 mg/j)	30 cp. séc. 80 mg	3,28	I	65 %	0,11
	30 cp. séc. 160 mg	5,41	I	65 %	0,18

## PROPRIÉTÉS

Bêta-bloquant non cardiosélectif dépourvu d'activité sympathomimétique intrinsèque, possédant des propriétés de classe III. Effet globalement inotrope négatif. Prolonge la durée des périodes réfractaires des voies accessoires dans le sens antérograde et rétrograde. Diminution de la pression artérielle systolique et diastolique chez l'hypertendu. Biodisponibilité de 90 % (diminuée si prise lors des repas). Pic atteint en 2,5 à 4 h. Demi-vie de 10 à 20 h. Pas de métabolisation et élimination urinaire. Important passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

Prévention des récidives des tachycardies ventriculaires menaçant le pronostic vital, des tachycardies ventriculaires symptomatiques et invalidantes en l'absence d'insuffisance cardiaque non contrôlée, des tachycardies supra-ventriculaires documentées en l'absence d'insuffisance cardiaque non contrôlée.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.  
Bradycardie, dysfonction sinusale et troubles de conduction de haut degré non appareillés.  
QT long et antécédents de torsades de pointes.  
Insuffisance cardiaque non contrôlée.  
Hypotension artérielle, choc cardiogénique.  
Angor de Prinzmetal.  
Asthme, BPCO sévère.  
Phénomène de Raynaud et artériopathie sévère des membres inférieurs.  
Phéochromocytome non traité.  
Insuffisance rénale (clairance < 10 mL/min).  
Acidose métabolique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : utilisation déconseillée. Absence d'effet tératogène mais risque de bradycardie, de détresse respiratoire et

d'hypoglycémie chez le fœtus et le nouveau-né.

Ne jamais interrompre brutalement.

Surveillance de l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique.

Débuter à faible posologie (40 mg x 2/j) puis augmenter progressivement, particulièrement chez le sujet âgé.

Adaptation de la posologie à la clairance de la créatinine : > 60 mL/min : dose usuelle, entre 30 et 60 mL/min : demi-dose, et entre 10 et 30 mL/min : quart de dose.

Diabétiques : les **β-bloquants** peuvent masquer les signes d'hypoglycémie et en augmenter la sévérité.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles de conduction, effets proarythmiques (troubles du rythme ventriculaire et torsades de pointes).

Insuffisance cardiaque, choc cardiogénique.

Manifestation de Raynaud et aggravation d'une artérite.

Aggravation d'un psoriasis.

Troubles digestifs, fatigue, vertiges, asthénie, dépression, insomnie, impuissance.

Hypoglycémie en cas de surdosage.

Crise d'asthme.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : médicaments donnant des torsades de pointes, médicaments inotropes, chronotropes et dromotropes négatifs et la **floctafénine**.

Associations déconseillées ou à surveiller : **antiarythmiques, antihypertenseurs, médicaments hypokaliémants, anesthésiques généraux** surtout déprimeurs myocardiques (**anesthésiques volatils halogénés**), **hypoglycémiant oraux** et insuline.

**Lidocaïne** : majoration de la lidocaïnémie.

**Digitaliques**.

**Produits de contraste iodés** : moins bonne réponse à l'**adrénaline** en cas de choc anaphylactique.

## ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE IV

## ■ Vérapamil

ISOPTINE					
1 à 2 cp. x 3/j aux repas	75 cp. 40 mg	4,12	I	65 %	0,05
2 à 3 gél. x 2/j aux repas	30 gél. 120 mg	4,05	I	65 %	0,14
	90 gél. 120 mg	10,99	I	65 %	0,12
1 cp./j en 1 prise matinale pour la forme LP	30 cp. séc. LP 240 mg	6,47	I	65 %	0,22
	90 cp. séc. LP 240 mg	18,17	I	65 %	0,20
1 amp. en IV sur 3 min à renouveler éventuellement 10 min après en cas d'échec	5 amp. 5 mg/2 mL	2,97	I	65 %	0,59

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur des canaux calciques ayant un effet antiarythmique de classe IV. Effet inotrope négatif marqué et vasodilatateur artériel. Diminution de la consommation myocardique en oxygène et effet vasodilatateur coronarien. Facilitation de la conduction antérograde dans les voies accessoires. Métabolisation hépatique avec intense effet de premier passage. Demi-vie (prise unique) 3 à 7 h (formes simples) et 11 h (formes LP).

## INDICATIONS

Forme 40 mg : traitement de l'angor sous toutes ses formes, traitement et prévention des tachycardies paroxystiques supraventriculaires. Forme 120 mg : traitement de l'angor sous toutes ses formes, traitement et prévention des tachycardies paroxystiques supraventriculaires, HTA, prévention secondaire de l'IDM en cas de contre-indication à un **bêtabloquant** et en l'absence d'insuffisance cardiaque.

Forme 240 LP : HTA, traitement de l'angor stable.

Forme IV : tachycardies jonctionnelles paroxystiques, certains troubles du rythme ventriculaire.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité, hypotension. Dysfonction sinusale et troubles de conduction de haut degré non appareillés. Insuffisance cardiaque non contrôlée. Infarctus du myocarde à la phase aiguë. Troubles du rythme supraventriculaire sur Wolff-Parkinson-White (sauf crise de tachycardie jonctionnelle).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : pas de fœtotoxicité observée.

Enfant : 5 mg/kg (forme simple), innocuité non établie pour les formes LP.

Sujet âgé : réduire la posologie de 30 à 50 %. Insuffisance hépatique : réduire la posologie de 80 %.

Infarctus du myocarde : ne commencer le traitement que 7 à 15 j après.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Bradycardie et troubles de conduction.

Effet arythmogène paradoxal dans la fibrillation auriculaire sur Wolff-Parkinson-White.

Insuffisance cardiaque, hypotension.

œdème des membres inférieurs, constipation parfois opiniâtre, gastralgies, nervosité, asthénie transitoire, réactions allergiques, gynécostomie.

Surdosage : traitement symptomatique et **ISUPREL**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association contre-indiquée avec le **dantrolène IV**.

Association déconseillée avec les autres **antiarythmiques**, les médicaments inotropes, dromotropes et chronotropes négatifs.

**Antihypertenseurs** et **baclofène**.

**Antidépresseurs** imipraminiques, **antipsychotiques**.

**Digoxine** (majoration de la digoxinémie), **carbamazépine** (augmentation de la tégrétolémie), **ciclosporine** (majoration des taux circulants), **midazolam** (diminution de son métabolisme hépatique et majoration de la sédation).

## STIMULATION ATRIALE

### Voie œsophagienne

C'est une méthode d'exploration semi-invasive non sanglante utilisable au lit du patient, qui est à visée diagnostique ou thérapeutique.

- Patient *a jeun* et perfusé.
- Introduction d'une sonde souple et fine par voie nasale après une anesthésie locale soigneuse.
- L'électrode est reliée à un appareil ECG pour la détection (tracés œsophagien et de surface simultanés) ou à un générateur pour la stimulation.
- La sonde est positionnée de façon à obtenir un signal auriculaire isodiphasique (électrode monopolaire) ou d'amplitude maximale (électrode bipolaire).

### Voie endocavitaire

C'est une technique invasive.

- Patient *a jeun* et perfusé.

- Stimulation de l'oreillette droite à l'aide d'une sonde introduite par voie veineuse fémorale.
- Sous amplificateur de brillance.
- En salle de cathétérisme.


#### Principales indications de la voie œsophagienne

- **Diagnostic** (= enregistrement)
  - Certaines tachycardies à complexes fins.
  - Tachycardies à complexes larges bien tolérées (éliminer une tachycardie ventriculaire).
  - Démasquer certains syndromes de Wolff-Parkinson-White.
  - Étude de la fonction sinusale et de la conduction nodale.
- **Thérapeutiques** (= stimulation)
  - Réduction du flutter auriculaire.
  - Réduction des tachycardies jonctionnelles.
  - Plus difficilement, réduction des tachysystolies auriculaires.

### Comparaison voie œsophagienne/voie endocavitaire

	VOIE ŒSOPHAGIENNE	VOIE ENDOCAVITAIRE
Anesthésie	Locale (nasale)	Locale (fémorale)
Tolérance	Plus ou moins bonne (parfois douloureuse ++)	Bonne (peu ou pas douloureuse)
Complications	Quasi nulles	Locales (ponction veineuse fémorale), générales liées aux sondes et à l'alitement post-examen
Efficacité	60 à 80 % à la 24e h	Modérément plus efficace (80 %)

### ECG : Flutter auriculaire



## ABLATION PAR RADIOFRÉQUENCE

### Principe

C'est actuellement la méthode de choix utilisée en rythmologie interventionnelle.

Son mécanisme d'action repose sur l'ablation d'une zone arythmogène par échauffement tissulaire en utilisant des courants de haute fréquence. Les lésions tissulaires aiguës évoluent vers une fibrose cicatricielle bien limitée qui respecte l'architecture tissulaire.

La radiofréquence n'induit pas d'excitation des cellules musculaires, évitant les contractions algiques et la nécessité d'une anesthésie générale. Elle produit des lésions de petite taille peu délabrantes et ne provoque pas de barotraumatisme.

### Technique

Réalisée par des équipes entraînées, elle requiert un générateur, une salle de cathétérisme et des cathéters spéciaux. Ces derniers sont introduits par voie veineuse fémorale et éventuellement artérielle sous traitement anticoagulant efficace. L'ablation est réalisée après repérage soigneux de la zone arythmogène (cartographie).

### Indications

Les critères d'éligibilité pour chacune de ces indications ne sont pas détaillés.

Tachycardies jonctionnelles.

Tachysystolie auriculaire.

Flutter auriculaire.

Fibrillation auriculaire.

Ablation de la jonction auriculo-ventriculaire.

Tachycardies ventriculaires.

### Complications

Actuellement le taux de complication est faible. Il est de 1,5 % dans l'expérience française, avec un taux de mortalité de 0,04 %.

#### Complications locales fémorales

Hématome.

Faux anévrisme.

Fistule artérielle-veineuse.

Dissection.

Phlébite.

Ischémie aiguë de membre.

#### Complications générales liées au cathétérisme

Embolie pulmonaire.

Accident vasculaire cérébral.

Tamponnade.

Traumatisme valvulaire.

Atteinte coronaire.

#### Complications secondaires à l'ablation

Bloc auriculo-ventriculaire pouvant nécessiter la mise en place d'un stimulateur cardiaque

Troubles du rythme ventriculaire.

## STRIADYNE

## ■ Triphosadénine

STRIADYNE					
1/2 amp. soit 10 mg en IVD à renouveler éventuellement 3 min après	10 amp. 2 mL à 20 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Puissant effet cholinergique direct (ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire) de demi-vie brève (< 20 s).

**INDICATIONS**

Conversion rapide en rythme sinusal des tachycardies jonctionnelles y compris celles associées à une voie accessoire.  
Ralentissement à visée diagnostique des tachycardies à complexes larges ou fins bien tolérées.

**CONTRE-INDICATIONS**

Asthme.  
Bloc auriculo-ventriculaire du 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degré et dysfonction sinusale non appareillés.  
Hypersensibilité connue à l'adénosine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Patient perfusé.  
Surveillance scopique.  
En présence d'un médecin.

**Atropine** et matériel de réanimation à disposition.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Pause sinusale postcritique.  
Bloc auriculo-ventriculaire, rarement bradycardie sévère et asystolie.  
Quelques cas de tachycardie et de fibrillation ventriculaire.  
Bronchospasme chez l'asthmatique et en cas de BPCO.  
Effets peu intenses et transitoires : vasodilatation périphérique, nausées, crampes épigastriques, céphalées, flushs, vertiges, sueurs, dyspnée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation par le **dipyridamole** (diminuer les doses).  
Antagonisme avec la **caféine**, la **théophylline** et les médicaments anticholinergiques (**atropine**, **antispasmodiques**, **antiparkinsoniens**, **antisécrétoires**, certains **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **antidépresseurs** imipraminiques, **phénotiazines**, **disopyramide**, etc.).

## CHOC ÉLECTRIQUE EXTERNE (CEE)

### Préparation

En dehors de l'urgence, le choc électrique externe s'effectue en présence d'un cardiologue et d'un anesthésiste :

- en USIC ;
- patient à jeun ;
- monitoring cardiaque et tensionnel et de la saturation artérielle en oxygène par oxymètre de pouls,
- voie veineuse périphérique de bon calibre ;
- bilan sanguin du jour (ionogramme sanguin, urée, créatinine, TP, TCA) ;
- arrêt des **digitaliques (DIGOXINE)** depuis au moins 3 j.
- sous traitement anticoagulant efficace ;
- vérification de l'absence d'autres contre-indications à la cardioversion.

### Déroulement

- Anesthésie générale brève (**DIPRIVAN**) avec ventilation au masque en oxygène pur.
- Électrodes de taille suffisante appliquées fermement et complètement sur la peau par l'intermédiaire d'un gel conducteur.
- Une électrode est placée en position médiosternale, l'autre en position latérale gauche ou postérieure (pas de différence significative d'efficacité) ; chez la femme on évitera la région mammaire.
- Défibrillateur réglé en position synchrone.
- Opérateurs et assistants éloignés du lit.
- Le premier choc sera effectué à 150 joules dans la fibrillation auriculaire et 100 joules pour un flutter. En cas d'échec du premier choc, on effectuera jusqu'à 2 autres chocs de 300-360 joules, éventuellement en modifiant la position des électrodes.

On vérifiera attentivement en post-choc immédiatement la présence d'un pouls et le rythme obtenu.

### Résultats

Le taux de succès dans la fibrillation auriculaire est de 80 à 90 %. Il est d'autant plus important qu'elle est récente et est amélioré par une imprégnation par la **CORDARONE**.

#### Contre-indications à la cardioversion

- Digitalisation (risque d'arythmie ventriculaire).
- Traitement anticoagulant insuffisant.
- Hypokaliémie.
- Thrombus intra-auriculaire gauche.
- Accident embolique systémique récent.
- État infectieux ou inflammatoire récent ou en poussée.
- Chirurgie cardiotoracique récente.
- Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré et dysfonction sinusale sévère non appareillés.

#### Complications de la cardioversion

- Arythmies de régularisation (extrasystoles et fibrillation ventriculaires).
- Troubles de la repolarisation transitoires (sans signification).
- Altération myocardique (élévation de la troponine).
- Embolies systémiques dites de régularisation.
- Bloc auriculo-ventriculaire.
- Sédation myocardique transitoire avec risque d'œdème aigu pulmonaire.

## BÊTASTIMULANT

## ■ Isoprénaline

ISUPREL					
5 amp. dans 250 mL de G5 %, débit à adapter à la fréquence cardiaque Conservation et perfusion à l'abri de la lumière	50 amp. 0,2 mg/1 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Amine sympathomimétique  $\beta_1$ - et  $\beta_2$ -stimulante dépourvue d'effet  $\beta$ -adrénergique.

*Effet  $\beta_1$ -cardiaque* : effet chronotrope, dromotrope, bathmotrope et inotrope positif, augmentation du débit cardiaque et de la consommation myocardique en oxygène.

*Effet  $\beta_2$*  : vasodilatation artérielle systémique et pulmonaire, bronchodilatation.

Délai d'action très rapide et demi-vie brève. Élimination urinaire.

## INDICATIONS

Médicament d'urgence :

- du syndrome d'Adams-Stokes par BAV dans l'attente d'une sonde d'entraînement temporaire ou de l'implantation d'un pacemaker ;
- des bradycardies extrêmes par BSA syncopal dans l'attente d'une sonde d'entraînement temporaire ou de l'implantation d'un pacemaker ;
- de l'arrêt cardiaque lorsque l'activité cardiaque réapparaît ;
- du bas débit cardiaque après chirurgie cardiaque ;
- des torsades de pointe en cas de grande bradycardie.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **sulfites** (forme injectable).

Tachycardie sinusale > 130/min.

Hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire.

Intoxication digitale.

Hyperthyroïdie.

Insuffisance coronaire aiguë.

Cardiomyopathie obstructive et rétrécissement aortique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : déconseillé pendant les 3 premiers mois.

**Allaitement** : surveillance attentive du nouveau-né.

Monitoring cardiaque et tensionnel, surveillance de la diurèse et hémodynamique invasive en cas de bas débit.

Ne doit être utilisé en cas de collapsus qu'après restauration de la volémie.

Patient coronarien stable, diabétique ou sous **digitaliques**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions anaphylactiques (**sulfites**).

Bouffées de chaleur, céphalées, tremblements.

Hypotension artérielle.

Tachycardie.

Angor.

Troubles du rythme ventriculaire (diminuer la posologie).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Anesthésiques volatils halogénés (risque accru de troubles du rythme ventriculaire).

Antidiabétiques (élévation de la glycémie).

Incompatibilité avec les **solutés alcalins**.



## ANTICHOLINERGIQUE

## ■ Sulfate d'atropine

ATROPINE SULFATE AGUETTANT					
0,5 à 1 mg en SC, IM ou IV lente chez l'adulte	10 amp. 0,25 mg/1 mL		I	NR	
	10 amp. 0,5 mg/1 mL		I	NR	
	10 amp. 1 mg/1 mL		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

Anticholinergique compétitif s'opposant aux effets muscariniques de l'acétylcholine : effet tachycardisant, antispasmodique au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies biliaires et urinaires, ralentissement de la vidange gastrique, diminution des sécrétions gastriques, salivaires, lacrymales et sudorales. Élimination urinaire rapide.

## INDICATIONS

Pré-anesthésie : protection des manifestations vagales à l'induction de l'anesthésie.  
Bloc auriculoventriculaire ou atrioventriculaire.  
Prévention et traitement des blocs auriculoventriculaires et des bradycardies sinusales dans l'IDM.

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës d'origine spasmodique au niveau des voies urinaires, biliaires et du tube digestif.

Antidote spécifique des intoxications aiguës par les anticholinestérasiques (insecticides organophosphorés et carbamates) ou par les médicaments parasymphaticomimétiques.

## CONTRE-INDICATIONS

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.  
Troubles uréthro-prostatiques avec risque de rétention urinaire.

## Allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Grossesse : pas d'embryo-fœtototoxicité mais risque d'iléus méconial en fin de grossesse.

Enfant : ne doit être utilisé qu'exceptionnellement (posologie adaptée à l'âge).

Iléus paralytique, atonie intestinale du sujet âgé, mégacolon toxique.

Hypertrophie prostatique.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Insuffisance coronaire, troubles du rythme.

Hyperthyroïdie.

Bronchite chronique (accroissement de la viscosité des sécrétions bronchiques).

Conducteurs et utilisateurs de machines.

Ne doit pas être mélangé à d'autres médicaments au moment de l'emploi.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Sécheresse buccale, diminution des sécrétions lacrymales, épaississement des sécrétions bronchiques.

Mydriase et troubles de l'accommodation, augmentation de la pression intra-oculaire.

Constipation.

Rétention d'urine.

Tachycardie, palpitations, irritabilité.

Surdosage : syndrome confusionnel, délire et dépression respiratoire (traitement par **néostigmine**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Majoration des effets atropiniques avec les autres **anticholinergiques** : **antiparkinsoniens**, **antispasmodiques**, **antidépresseurs** imipraminiques, **antipsychotiques** phénothiaziniques, **antihistaminiques** H<sub>1</sub> et **disopyramide**.

## VASODILATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES (1)

## ■ Naftidrofuryl

<b>PRAXILÈNE</b>					
Artériopathies :	20 cp. 200 mg	4,45	II	15 %	0,22
- 1 cp. x 3/j au cours des repas	90 cp. 200 mg	17,53	II	15 %	0,19
- 2 gél. x 3/j au cours des repas	20 gél. 100 mg	3,11	II	15 %	0,16

## ■ Pentoxifylline

<b>PENTOFLEX</b>					
1 à 3 cp./j au cours des repas	100 cp. LP 400 mg		II	NR	

## ■ Ginkgo biloba

<b>TANAKAN</b>					
3 cp./j au cours des repas	30 cp. 40 mg		II	NR	
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	90 cp. 40 mg		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3 /j	30 doses buv. 1 mL (fl. 30 mL) 40 mg/mL		II	NR	
	90 doses buv. 1 mL (fl. 90 mL) 40 mg/mL		II	NR	
<b>TRAMISAL</b>					
1 dose (= 1 mL = 40 mg) à diluer dans	30 doses 1 mL (fl. 30 mL)		II	NR	
1 demi-verre d'eau x 3/j	40 mg/mL				

## ■ Ifenprodil

<b>VADILEX</b>					
2 à 3 cp./j	30 cp. 20 mg		II	NR	
	50 cp. 20 mg	HOP	I		

## ■ Piribédil

<b>TRIVASTAL</b>					
Artériopathie : 4 cp. à 20 mg/j en 2 à 3 prises/j en fin de repas	30 cp. 20 mg	2,41	II	65 %	0,08
Artériopathie : 1 cp. 50 mg LP/j (max 1 cp. x 2/j)	30 cp. LP 50 mg	10,11	I	65 %	0,34
Inj. IM : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j en 2 inj.	100 cp. LP 50 mg	HOP	I		
Perf. IV en 4 h dans 250 mL de soluté isotonique : 1 amp./j à J1 et J2 puis 2 amp./j à J3 et J4 puis 3 amp./j si besoin	12 amp. 3 mg/1 mL	HOP	I		

## ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE CHRONIQUE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) (2)

### Traitement au stade d'ischémie d'effort [1]

- Éducation thérapeutique du patient (information sur les signes cliniques, sur les traitements prescrits et sur le suivi).
- Prise en charge de l'hygiène de vie : suppression totale et définitive du tabac, réduction d'une surcharge pondérale, exercice physique quotidien modéré (30 min). Entraînement régulier et progressif à la marche, bicyclette. Permet une adaptation métabolique du muscle strié et de développer le réseau collatéral.
- Équilibre d'une HTA avec un objectif de PAS < 140 mmHg.
- Correction d'un diabète (objectif HbA1c < 6,5 %).
- Correction d'une dyslipidémie (objectif LDL < 1 g/L).
- Traitement général de la maladie athéromateuse.

En cas de coronaropathie, l'AOMI au stade d'ischémie d'effort ne contre-indique pas les **bêta-bloquants**.

- Pour prévenir la survenue d'accidents cardiovasculaires, trois types de médicaments au long cours sont efficaces :
  - **antiagrégant plaquettaire** : **acide acétylsalicylique (KARDEGIC)** 75 à 160 mg/j ou **clopidogrel (PLAVIX)** 1 cp. (75 mg)/j. L'efficacité de l'aspirine est moins bien documentée que celle du clopidogrel dans l'AOMI ;
  - **statine** : **atorvastatine (TAHOR)** 10 à 40 mg/j ;
  - **inhibiteur de l'enzyme de conversion** : **périndopril (COVERSYL)** à introduire progressivement par paliers de 2 à 4 sem. sous surveillance de la pression artérielle et de la créatininémie.

Il est raisonnable de les associer chez la majorité des patients symptomatiques. À noter que les traitements vasodilatateurs n'apparaissent plus dans les dernières recommandations.

- Traitement spécifique de la claudication : marche, si besoin réadaptation vasculaire supervisée en ambulatoire ou en centre (au moins 1 h x 3 sem.).
- Si échec après 3 mois de traitement bien conduit ou plus tôt en cas de lésion proximale menaçante : envisager une revascularisation (traitement endovasculaire ou chirurgie ouverte). Après une mise en place d'une endoprothèse, une association **aspirine + clopidogrel** est instaurée dans les premières sem.

### Traitement au stade d'ischémie permanente chronique [1]

- Objectifs : sauver le membre et soulager la douleur.
- Bilan initial : hospitalisation en milieu spécialisé, écho-Doppler artériel, angio-scanner ou angio-IRM ou angiographie conventionnelle
- Prise en charge thérapeutique immédiate :
  - revascularisation chaque fois que possible (chirurgie ou traitement endovasculaire) ;
  - traitement de revascularisation par injection de prostaglandines si revascularisation impossible ou résultats insuffisants ;
  - contrôle de la douleur, de l'équilibre hémodynamique, de l'état ventilatoire, de l'état nutritionnel et des surinfections ;
  - réadaptation et nursing, prévenir la maladie thromboembolique veineuse (HBPM), prévenir la rétraction et les escarres.
- Prise en charge thérapeutique au décours :
  - éducation thérapeutique (cf. Ischémie d'effort) ;
  - traitement médicamenteux (cf. Ischémie d'effort) ;
  - réadaptation vasculaire et générale ;
  - prise en charge psychologique.

## VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES (2)

## ■ Iloprost

ILOMÉDINE					
Amp. à diluer dans 250 mL de soluté isotonique : 0,5 à 2 ng/kg/min en une perf. IV continue pendant 6 h/j Durée moyenne 4 sem.	1 amp. 0,5 mL (0,1 mg/1 mL)	HOP	I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

Ce sont tous des vasodilatateurs artériolaires.

**Naftidrofuryl** : action antisérotoninergique.

**Pentoxifylline** : action d'augmentation de la déformabilité des globules rouges et de relaxation sur les fibres musculaires lisses vasculaires.

**Piribédil** : agoniste dopaminergique central et périphérique (effet vasodilatateur).

## INDICATIONS

Ces molécules ne font pas partie des recommandations.

Formes orales : traitement d'appoint de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (stade II). Certaines études seraient en faveur d'une amélioration du périmètre de marche.

Formes parentérales : traitement des manifestations douloureuses des artériopathies en poussée ischémique en association avec le traitement chirurgical et dans l'attente de celui-ci, ou en cas d'impossibilité d'un geste chirurgical.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

**Naftidrofuryl**, **pentoxifylline**, **piribédil** : ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

**Pentoxifylline**, **piribédil** : IDM à la phase aiguë.

**Piribédil** : collapsus cardiovasculaire, oedème pulmonaire pour la forme IV.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Naftidrofuryl** : ECG indispensable avant la perfusion IV qui doit être lente (risque BAV).

**Pentoxifylline** : prudence en cas d'hypotension et réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale sévère.

**Piribédil** : à prescrire à doses progressives.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Naftidrofuryl** : rarement troubles digestifs, éruption cutanée, hépatite exceptionnellement.

**Pentoxifylline** : rarement nausées, vomissements, brûlures gastriques, bouffées de chaleur, réactions cutanées, hypotension.

**Piribédil** : troubles digestifs mineurs, rarement confusion ou agitation, hypotension orthostatique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Naftidrofuryl** injectable : association déconseillée avec **antiarythmiques** et **β-bloquants**.

**Pentoxifylline** : **antivitamines K**, **AINS**, **sali-cylés**, **ticlopidine** (risque hémorragique accru).

**Piribédil** : antagoniste dopaminergique.

## VEINOTONIQUES (1)

## ■ Rutoside

<b>ESBERIVEN FORT</b>					
2 cp. ou 2 amp. buv./j	30 cp. 250 mg 20 amp. buv. 4 mL			NR NR	
<b>VELITEN</b>					
1 à 2 cp. x 3/j	30 cp. 200 mg			NR	
<b>DIO-Gé</b>					
1 cp. x 2/j 1 cp. le matin	30 cp. 300 mg 30 cp. 600 mg			NR NR	
<b>DIOVÉNOR</b>					
1 cp. ou 1 sach. le matin	30 cp. 600 mg 30 sach. 600 mg pour susp. buv.			NR NR	
<b>MÉDIVEINE-Gé</b>					
1 cp. x 2/j  1 cp. ou 1 sach.-dose le matin	30 cp. 300 mg 60 cp. 300 mg 30 cp. 600 mg 30 sach.-dose 600 mg			NR NR NR NR	

## ■ Troxérutine

<b>RHÉOFLUX</b>					
1 sach. ou 1 amp./j	10 sach. 3,5 g 10 amp. 3,5 g			NR NR	
<b>VEINAMITOL</b>					
1 sach. ou 1 amp./j	10 sach. 3,5 g 10 amp. 3,5 g			NR NR	

## ■ Troxérutine + heptaminol + ginko biloba

<b>GINKOR FORT</b>					
2 gél./j (max 4/j)	30 gél. 300 mg			NR	

## ■ Citroflavonoïdes

<b>CÉMAFLAVONE</b>					
2 amp. buv./j	20 amp. 400 mg			NR	

## ■ Anthocyanosides

<b>DIFRAREL</b>					
1 à 2 cp. x 3/j	20 cp. 100 mg			NR	

## ■ Leucocianidol

<b>FLAVAN</b>					
1 cp. x 2/j	30 cp. 60 mg			NR	

## INSUFFISANCE VEINEUSE - VARICES (2)

### Traitement antivariqueux

#### Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de varices importantes ou symptomatiques, d'ulcère variqueux ou de thromboses superficielles récidivantes. La perméabilité des troncs veineux profonds sera préalablement vérifiée.

On distingue plusieurs traitements.

- *Stripping* : éveinage à l'aide d'un guide ou *stripper* de la totalité de la veine, de la malléole à la crosse. Il peut être réalisé sous anesthésie générale ou locorégionale. Il sera éventuellement complété par la résection des perforantes et l'injection de substances sclérosantes.
- Cryo-éveinage.
- Phlébectomie ambulatoire.
- Cure CHIVA : cure conservatrice et hémodynamique de l'insuffisance veineuse ambulatoire. Elle a pour objectif, par des sections-sutures étagées réalisées en ambulatoire, de modifier le trajet et le sens de la circulation veineuse du réseau superficiel vers le réseau profond. Elle permet de conserver le capital tronculaire saphénien mais expose au risque de récédive et d'échec.

#### Contre-indications au traitement chirurgical

- Âge avancé
- Obésité
- Grossesse
- Lymphœdème fixé
- Sclérodermie
- Artérite
- Thrombose veineuse profonde récente

#### Injections sclérosantes

L'injection dans la veine d'un produit irritant pour l'endothélium va transformer la varice en un cordon fibreux non perméable.

On utilisera le **TROMBOVAR** pour les grosses varices ou de taille moyenne, l'**AE-TOXISCLÉROL** pour les varices de toutes tailles et le **SCLÉRÉMO** pour les varices de toutes tailles et les varicosités.

Le traitement peut comprendre plusieurs séances d'injections.

#### Complications de la sclérothérapie

- Collection hématique
- Veinite
- Pigmentation et télangiectasies
- Ischémie aiguë (injection intra-artérielle).
- Nécrose locale (injection dans le tissu sous-cutané)
- Thrombose veineuse profonde sur terrain favorisant

## VEINOTONIQUES (2)

## ■ Hespéridine méthylchalcone

<b>CYCLO 3 FORT</b>					
1 gél. ou amp. buv. x 3/j	30 gél. 30 amp. buv. (1,5 mL)			NR NR	
<b>DAFLON</b>					
2 cp. x 2/j 1 cp. x 2/j Crise hémorroïdaire : 6 cp. de J1 à J4 puis 4 cp. de J5 à J7	30 cp. 375 mg 30 cp. 500 mg			NR NR	

## ■ Oligomères procyanidoliques

<b>ENDOTÉLON</b>					
100 à 300 mg/j en 2 prises	60 cp. 150 mg			NR	

## ■ Adénosine phosphate

<b>ADÉNYL</b>					
1 cp. x 2/j	30 cp. 60 mg			NR	

## ■ Adénosine phosphate d'heptaminol

<b>AMPÉCYCLAL</b>					
3 à 6 gél./j	30 gél. 300 mg			NR	

## ■ Calcium dobésilate

<b>DOXIUM</b>					
3 à 6 cp./j aux repas	30 cp. 250 mg			NR	

## ■ Naftazone

<b>ETIOVEN</b>					
1 cp./j en milieu de journée	30 cp. à 30 mg			NR	

## PROPRIÉTÉS

Veinotoniques appartenant en grande majorité à la famille des **flavonoïdes**. Augmentent le tonus veineux et la résistance capillaire et diminuent la perméabilité capillaire.  
Bénéfice non démontré en dehors de la crise hémorroïdaire.

## INDICATIONS

Poussées hémorroïdaires aiguës congestives non compliquées (posologie maximale).  
Insuffisance veino-lymphatique.

Troubles fonctionnels de la fragilité capillaire (ecchymoses, pétéchies, gingivorragies, etc.).

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie avec la **naftazone**.  
Association aux **IMAO** et hyperthyroïdie pour l'**heptaminol**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs bénins.  
Diarrhée chronique (nécessitant l'arrêt du traitement).

## SCLÉROSANTS VEINEUX (1)

## ■ Alun de chrome + glycérol

<b>SCLÉRÉMO</b>					
Débuter par 3 mL dilués au 2/3 puis augmenter sans dépasser 10 mL	5 amp. IV 2 mL		II	NR	

## ■ Lauromacogrol

<b>AETOXISCLÉROL TAMPONNÉ</b>					
Débuter par 1 mL à 0,5 % puis augmenter sans dépasser 2 mL à 3 %	5 amp. 2 mL à 0,25 %		II	NR	
Toutes les ampoules contiennent 0,1 mL d'alcool	5 amp. 2 mL à 0,5 %		II	NR	
	5 amp. 2 mL à 2 %		I	NR	
	5 amp. 2 mL à 3 %		I	NR	

## ■ Tétradécyl sulfate de sodium

<b>TROMBOVAR</b>					
Débuter par 1 mL à 1 % puis augmenter sans dépasser 2 mL à 3 %	10 amp. 2 mL à 1 %	3,02	II	30 %	0,30
	10 amp. 2 mL à 3 %	3,11	II	30 %	0,31

**PROPRIÉTÉS**

Produits sclérosant l'endothélium, transformant la varice en un cordon fibreux non perméable. Effet sclérosant maximal (par ordre décroissant) : **TROMBOVAR**, **AETOXISCLÉROL** et **SCLÉRÉMO**.

**INDICATIONS**

Sclérose des varices et varicosités.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie.  
Très grosses veines et veines difficiles à atteindre.  
Phlébites profondes et patient sous traitement anticoagulant.  
Affections fébriles.

Patient sous médicament à effet antabuse (**AETOXISCLÉROL**).  
Atteinte rénale (**SCLÉRÉMO**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Médecin expérimenté.  
Injection intraveineuse stricte.  
Adaptation de la puissance du produit sclérosant à la taille des varices.  
Contention élastique associée (au moins pendant les 3 j suivant la sclérose).  
Utiliser avec prudence chez le sujet diabétique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques.  
Nécrose cutanée.  
Ischémie artérielle.  
Pigmentation résiduelle.



**SCLÉROSANTS VEINEUX (2)****■ Quinine urée**

<b>KINUREA H</b>					
Sclérose des hémorroïdes : inj. sous-muqueuses, de 1-5 ml x 1 à 2/séance, espacées de 8 à 15 j 4 à 6 inj. sont en général nécessaires Fissure anale : 1 à 2 inj. sous-fissuraires de 2 à 3 gttes maximum	6 amp. 250 mg/5 mL 50 amp. 250 mg/5 mL	10,71 HOP	I	30 %	1,79

**INDICATIONS**

Sclérose des hémorroïdes et fissures anales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Contre-indications de la sclérose en général :  
– très grosses veines et veines difficiles à atteindre ;  
– affections fébriles, phlébites ;  
– injection intra-artérielle.

Troubles de la conduction intraventriculaire.

Hypersensibilité à l'un des composants, en particulier à la **quinine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les injections doivent être faites exclusivement par un médecin expérimenté.

Compte tenu de la localisation de l'injection, la pratique de la sclérose n'est pas recommandée

chez les personnes traitées par des anticoagulants.

Ne pratiquer les injections qu'en dehors des épisodes douloureux.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets indésirables cliniques fréquents :

- cinchonisme se manifestant par acouphènes, hypoacousie, vertiges, troubles de la vision, céphalées ;
- prurit, éruption érythémateuse, eczéma, photosensibilisation, urticaire ;
- arythmie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Astémizole** : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.

## INHIBITEURS CALCIQUES NON DIHYDROPYRIDINES (1)

## ■ Diltiazem

<b>TILDIEM</b>					
Angors* : 1 cp. x 3/j (max : 360 mg/j) Prévention de l'ischémie myocardique en péri-opératoire chez des coronariens lors d'une chirurgie non cardiaque sous anesthésie générale : inj. en IVD sur 2 min de 0,15 mg/kg 30 min avant l'induction, puis perfusion IV continue de 0,2 à 0,3 mg/kg/h Crise de tachycardie jonctionnelle : 0,25 mg à 0,3 mg/kg en IVD sur 2 min	30 cp. 60 mg 20 fl. 25 mg (pdre pour sol. inj. IV) 20 fl. 100 mg (pdre pour sol. inj. IV)	4,10 HOP  HOP	I I  I	65 %	0,14
<b>BI-TILDIEM</b>					
Angor stable ou d'effort : 1 cp. 90 mg x 2/j Angor d'effort ou spontané : 1 cp. 120 mg x 2/j	28 cp. LP 90 mg  28 cp. LP 120 mg	10,74  11,83	I  I	65 %  65 %	0,38  0,42
<b>MONO-TILDIEM LP</b>					
HTA, angor stable : 1 gél. 200 ou 300 mg/j à heure fixe Ne pas ouvrir ni croquer	28 gél. LP 200 mg	17,18	I	65 %	0,61
	50 gél. LP 200 mg	HOP	I		
	84 gél. LP 200 mg	48,38	I	65 %	0,58
	28 gél. LP 300 mg	17,31	I	65 %	0,62
	50 gél. LP 300 mg	HOP	I		
	84 gél. LP 300 mg	48,76	I	65 %	0,58

## ■ Vérapamil

<b>ISOPTINE</b>					
Angor et tachycardie supraventriculaire : 1 à 2 cp. x 3/j 1 gél. x 2/j  HTA : 1 cp. LP le matin	75 cp. 40 mg  30 gél. 120 mg 90 gél. 120 mg 30 cp. séc. LP 240 mg 90 cp. séc. LP 240 mg	4,12  4,05 10,99 6,47 18,17	I  I I I I	65 %  65 % 65 % 65 %	0,05  0,14 0,12 0,22 0,20

Angors : angor stable, angor d'effort, angor spontané, angor de Prinzmetal.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (2)****Intérêts du traitement antihypertenseur [1]**

L'objectif principal de la prise en charge d'un patient hypertendu est de réduire sa morbi-mortalité cardiovasculaire à long terme. L'évaluation et la correction des autres facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'HTA sont également indispensables (âge, tabac, surpoids, hyperlipidémie, diabète, sédentarité, hérédité cardiovasculaire).

La normalisation prolongée de la pression artérielle réduit de façon très significative l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale et à moindre degré des accidents ischémiques coronaires.

La normalisation de la pression artérielle sous traitement :

- nécessite un bon respect des règles d'hygiène de vie alimentaire et physique ;
- nécessite la correction des facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'HTA ;
- nécessite le plus souvent un traitement au long cours ;
- nécessite une bonne tolérance du traitement ;
- nécessite une bonne observance du traitement ;
- nécessite une surveillance médicale régulière.

Les dernières recommandations françaises recommandent une consultation dédiée à l'annonce du diagnostic d'HTA.

**Règles hygiéno-diététiques (RHD) [1]****Restriction sodée**

- La restriction sodée est modérée et un régime comportant 6 g de sel par jour est suffisant.
- Éviter les excès de fruits de mer, poissons fumés, plats préparés, conserves, charcuteries et ne pas saler à nouveau les plats à table.

**Éviter un excès de poids**

- La perte de poids fait baisser la pression artérielle.
- Consultation diététique pour mettre au point un régime adapté au patient.

**Réduire la consommation d'alcool et de glycyrrhizine**

- Le sevrage alcoolique fait baisser la pression artérielle. Ne pas dépasser 2 verres de vin ou de bière par jour avec 1 j d'abstinence par semaine.
- Éviter la consommation de réglisse et de pastis sans alcool.

**Activité physique régulière**

- La pratique régulière d'exercice physique fait baisser la pression artérielle (marche, jogging, natation).
- Il est recommandé au moins 30 min de marche soutenue 3 fois/sem.
- Supprimer les stress excessifs.

**Arrêt du tabac****Évaluation initiale standard de tout patient hypertendu**

- Anamnèse, examen clinique.
- Recherche dans les urines par bandelettes réactives ou au laboratoire et d'une microalbuminurie ou d'une protéinurie (recherche d'un retentissement rénal).
- Dans le sang : kaliémie (recherche d'une hypokaliémie suggérant un hyperaldostéronisme primaire), créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire, glycémie, uricémie, hémoglobine et/ou hématocrite.
- Profil lipidique : cholestérol total avec les fractions LDL et HDL, triglycérides.
- Électrocardiogramme (recherche de troubles du rythme, de signes d'ischémie myocardique, d'hypertrophie ventriculaire gauche).

## INHIBITEURS CALCIFIQUES NON DIHYDROPYRIDINES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

**Diltiazem** : inhibiteur calcique sélectif du canal calcique lent au niveau de la fibre musculaire myocardique et de la fibre musculaire lisse des vaisseaux.

- Effets inotrope négatif et bradycardisant modérés.
- Effet antiarythmique au niveau jonctionnel.
- Effet antiangineux en augmentant le débit coronaire par diminution des résistances.
- Effet antispastique coronaire.

**Vérapamil** : cf. *Antiarythmiques de classe IV*.

### INDICATIONS

HTA : **diltiazem** formes LP 200 ou 300 mg, **vérapamil** formes 120 mg et LP 240 mg.

Traitement préventif des crises d'angine de poitrine :

- angor stable, d'effort, spontané, Prinzmetal : **diltiazem** formes 60 mg ;
- angor stable, angor d'effort : **diltiazem** formes LP 90 ou 120 mg.

Prévention de l'ischémie myocardique au cours de l'anesthésie générale de patients coronariens pour interventions non cardiaques, pendant les périodes péri- et postopératoire chez des malades recevant antérieurement un traitement oral antiangineux : **diltiazem** injectable 25 et 100 mg.

Traitement de la crise de tachycardie jonctionnelle paroxystique : **diltiazem** injectable 25 mg.

### CONTRE-INDICATIONS

**Diltiazem** (toutes formes) : dysfonctionnement sinusal ; blocs auriculo-ventriculaires de degrés II et III non appareillés ; insuffisance ventriculaire gauche avec signes congestifs.

En plus pour **MONO-TILDIEM LP 300** : bradycardie sévère  $\leq 40/\text{min}$ .

En plus pour **diltiazem** forme injectable : fibril-

lations ou flutters auriculaires avec syndromes de préexcitation ventriculaire surtout si la période réfractaire de la voie accessoire est courte ; hypotension artérielle avec hypovolémie et/ou insuffisance cardiaque, choc cardiogénique, association à la **CORDARONE**.

**Grossesse, allaitement.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### **Diltiazem**

- Utiliser prudemment et surveiller en cas de bradycardie ou de BAV du 1<sup>er</sup> degré.
- Pas de précaution en cas de bloc de branche isolé.
- Respecter les contre-indications et les précautions d'emploi et surveiller attentivement (fréquence cardiaque, ECG) chez les sujets âgés, insuffisants rénaux ou hépatiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### **Diltiazem**

- Les plus fréquents : bradycardie sinusale, bloc sino-auriculaire, bloc auriculo-ventriculaire, œdèmes des membres inférieurs, érythèmes simples, urticaires localisées, rarement érythèmes desquamatifs  $\pm$  fébriles réversibles.
- Rares et transitoires : asthénie, somnolence, céphalées, insomnie, vertiges, troubles digestifs (dyspepsie, constipation, diarrhée), élévation des transaminases.

Exceptionnelles hépatites cliniques.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

#### **Diltiazem**

- Associations contre-indiquées : **dan-trolène IV**.
- Associations déconseillées : **esmolol**, **anti-arythmiques**.
- Associations avec précautions d'emploi :  $\alpha_1$ -bloquants, amiodarone,  $\beta$ -bloquants, ciclosporine, carbamazépine, midazolam IV, rifampicine, baclofène, imipraminiques, corticoïdes, antipsychotiques.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (3)

### Classification des antihypertenseurs [1]

#### Diurétiques

- Leur action antihypertensive est liée à une déplétion sodée.
- Les **diurétiques thiazidiques** et apparentés (**ESIDREX**, **FLUDEX**) sont puissants, hypokaliémiants et restent actifs jusqu'à une clairance de la créatinine de 30 mL/min. Ils sont très souvent prescrits dès qu'une bithérapie est indiquée et souvent en association fixe sous forme d'un seul comprimé qui contient également une 2<sup>e</sup> molécule.
- Les **diurétiques** épargneurs de potassium (**ALDACTONE**, **MODAMIDE**) sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale.
- Les **diurétiques de l'anse** (**LASILIX**, **BURINEX**) sont très puissants, hypokaliémiants et doivent être prescrits dans l'hypertension artérielle seulement si celle-ci est associée à une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min).

#### Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

- Ils réduisent les concentrations plasmatiques d'angiotensine II et d'aldostérone et augmentent la concentration de bradykinine.
- La principale cause d'arrêt du traitement est l'apparition d'une toux.
- En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être adaptée à la clairance de la créatinine, mais elle ne constitue pas une contre-indication.

#### Antagonistes du récepteur de l'angiotensine II (ARA II)

Leur efficacité est comparable à celle des **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** mais du fait de l'absence d'élévation de bradykinine, cette classe n'entraîne pas de toux ni d'œdème angioneurotique.

#### Inhibiteurs calciques

- Ils réduisent le tonus vasoconstricteur calcium-dépendant des fibres musculaires lisses artériolaires.
- Les **dihydropyridines** n'ont pas de contre-indication vraie en dehors de la grossesse. Leur utilisation peut être limitée par des céphalées, flushs, palpitations et œdèmes des membres inférieurs.
- Les **non-dihydropyridines** (**diltiazem** et **vérapamil**) sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque décompensée et de bloc auriculo-ventriculaire. Leur association aux **β-bloquants** est classiquement déconseillée (risque de bradycardie).

#### Bêta-bloquants

- Leur action antihypertensive est liée à la réduction du tonus β-adrénargique et à la diminution de la sécrétion de rénine.

Ils sont particulièrement indiqués en cas de tachycardie de repos, d'angor et/ou de cardiopathie ischémique associée.

- Leur utilisation peut être limitée par leurs effets secondaires.

#### Inhibiteur direct de la rénine

L'efficacité de l'**aliskirène** (**RASILEZ**) 1 cp. (150 mg)/j est comparable à celle des **antagonistes de l'angiotensine II** avec cependant une action inhibitrice plus complète du système rénine-angiotensine-aldostérone.

#### Alphabloquants

Le risque d'hypotension orthostatique au début du traitement impose une adaptation très progressive des doses.

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- Ils sont bien tolérés sur le plan biologique.
- Une déplétion sodée associée est nécessaire.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (1)

## ■ Nifédipine

<b>ADALATE</b>					
Angor Prinzmetal : 1 caps. x 4/j dont 1 le soir au coucher Angor stable : 1 caps. x 3/j associée à un <b>β-bloquant</b> (max : 60 mg/j) HTA : 1 cp. LP 20 mg x 2/j sans croquer	30 caps. 10 mg	2,93	I	65 %	0,10
	90 caps. 10 mg	6,41	I	65 %	0,07
	30 cp. LP 20 mg	3,96	I	65 %	0,13
	180 cp. LP 20 mg	20,04	I	65 %	0,11
<b>CHRONADALATE LP</b>					
HTA : 1 cp./j le matin à heure fixe Angor stable : 1 à 2 cp./j en 1 prise associés à un <b>β-bloquant</b>	30 cp. LP 30 mg	8,99	I	65 %	0,30
	90 cp. LP 30 mg	25,29	I	65 %	0,28
	100 cp. LP 30 mg	HOP	I		

## ■ Amlodipine

<b>AMLOR</b>					
HTA et angors (stable, d'effort, spontané, de Prinzmetal) : 5 mg/j puis jusqu'à 10 mg/j en 1 seule prise le matin	30 gél. 5 mg	8,21	I	65 %	0,27
	90 gél. 5 mg	23,10	I	65 %	0,26
	30 gél. 10 mg	8,21	I	65 %	0,27
	90 gél. 10 mg	23,10	I	65 %	0,26

## ■ Amlodipine + atorvastatine

<b>CADUET</b>					
HTA + hypercholestérolémie 1 cp./j	30 cp. 5 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 5 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	62,80	I	65 %	0,70
	30 cp. 10 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 10 mg <b>amlodipine</b> + 10 mg <b>atorvastatine</b>	62,80	I	65 %	0,70

## ■ Nicardipine

<b>LOXEN</b>					
<b>LOXEN 20 mg</b> HTA : 1 cp. x 3/j avant chaque repas. Max : 90 mg/j	30 cp. séc. 20 mg	5,31	I	65 %	0,18
	90 cp. séc. 20 mg	13,96	I	65 %	0,16
<b>LOXEN 50 mg LP</b> HTA : 1 gél. matin et soir avant les repas <b>LOXEN injectable</b> Réservé à l'urgence hypertensive : - effet rapide : 2,5 mg en IVD à renouveler après 10 min si besoin jusqu'à une dose cumulée de 10 mg - effet progressif : 8 à 15 mg/h en perfusion IV sur 30 min - dans les 2 cas, relais si besoin par perfusion IV continue : 2 à 4 mg/h avec adaptation des doses par paliers de 0,5 mg/h. Relais possible par voie orale	60 gél. LP 50 mg	15,36	I	65 %	0,26
	180 gél. LP 50 mg 5 amp. 10 mg/10 mL	43,24	I	65 %	0,24
			I	NR	

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (4)****Vasodilatateurs directs**

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- La **dihydralazine (NEPRESSOL)** n'est utilisée que dans certaines pré-éclampsies mettant en jeu le pronostic vital. Elle devra être associée à un  **$\beta$ -bloquant** du fait de son effet tachycardisant.
- Le **minoxidil** est réservé aux rares cas d'HTA résistante à une polythérapie. Il peut provoquer un hirsutisme et une rétention sodée et doit donc être associé à un **diurétique**.

**Antihypertenseurs centraux**

- Ils ne sont jamais prescrits en 1<sup>re</sup> intention.
- Ils diminuent le tonus sympathique vasoconstricteur.
- Hypotension orthostatique, nausées, sécheresse de la bouche, asthénie, somnolence et tendance dépressive sont les principaux effets secondaires.

**Quand prescrire un antihypertenseur ? [1]**

Pour débuter un traitement antihypertenseur, il faut s'assurer que l'HTA soit :

- **permanente**, c'est-à-dire vérifiée lors de plusieurs examens (au moins 2). Les recommandations proposent à cette étape diagnostique de réaliser une mesure ambulatoire de la pression artérielle pendant 24 h (MAPA) ou une automesure ten-

sionnelle bien menée sur 3 jours, pour confirmer l'HTA ;

- **persistante** malgré des règles hygiéno-diététiques bien suivies.

La décision du traitement antihypertenseur se fonde sur :

- les chiffres tensionnels ;
- l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire associés (cf. Encadré) ;
- l'atteinte infraclinique des organes cibles (AOC) (hypertrophie ventriculaire gauche, microalbuminurie de 30 à 300 mg/24 h) ;
- l'existence de pathologies associées/complications (coronaropathie, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, rétinopathie, insuffisance rénale chronique, artérite des membres inférieurs) ;
- l'évaluation du risque cardiovasculaire global du patient (faible, modéré, élevé, très élevé ; cf. Tableau) :
  - quand le risque est faible : RHD pendant 6 mois. Traitement pharmacologique si l'objectif n'est pas atteint,
  - quand le risque est modéré : RHD pendant 1 à 3 mois. Traitement pharmacologique si l'objectif n'est pas atteint,
  - quand le risque est élevé à très élevé : RHD et traitement pharmacologique d'emblée,
  - pour des PAS à 130-139 mmHg et des PAD à 85-89 mmHg, des RHD sont recommandées sans traitement pharmacologique, quel que soit le niveau de risque.

**Facteurs de risque (ou FDR) cardiovasculaire**

- Sexe masculin
- Âge ( $\geq 55$  ans chez l'homme et  $\geq 65$  ans chez la femme)
- Tabagisme
- Antécédents familiaux d'accident cardiovasculaire précoce : avant l'âge de 55 ans chez l'homme et avant l'âge de 65 ans chez la femme
- Diabète
- Dyslipidémie : LDL-cholestérol  $\geq 1,60$  g/L (4,1 mmol/L), HDL-cholestérol  $\leq 0,40$  g/L (1 mmol/L) quel que soit le sexe.

**Autres paramètres à prendre en compte lors de la prise en charge du patient hypertendu :**

- Obésité abdominale (périmètre abdominal  $> 102$  cm chez l'homme et 88 cm chez la femme) ou obésité (IMC  $> 30$  kg/m<sup>2</sup>)
- Sédentarité (absence d'activité physique régulière, soit environ 30 min, 3 fois/sem.)
- Consommation excessive d'alcool ( $> 3$  verres de vin/j chez l'homme et 2 verres/j chez la femme)

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (2)

## ■ Félodipine

<b>FLODIL LP</b>					
HTA, angor stable : 5 mg/j puis jusqu'à 10 mg/j en 1 seule prise le matin Posologie réduite à 5 mg/j chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique sévère	30 cp. LP 5 mg	10,36	I	65 %	0,35
	90 cp. LP 5 mg	21,77	I	65 %	0,24

## ■ Isradipine

<b>ICAZ LP</b>					
HTA : 5 mg/j en 1 prise le matin Débuter à 2,5 mg/j chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique	30 gél. LP 2,5 mg	13,35	I	65 %	0,45
	90 gél. LP 2,5 mg	37,59	I	65 %	0,42
	30 gél. LP 5 mg	17,45	I	65 %	0,58
	90 gél. LP 5 mg	49,14	I	65 %	0,55

## ■ Lacidipine

<b>CALDINE</b>					
HTA : 4 mg/j puis jusqu'à 6 mg/j en 1 prise le matin. Posologie réduite à 2 mg/j chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique	30 cp. 2 mg	13,73	I	65 %	0,46
	90 cp. 2 mg	38,67	I	65 %	0,43
	30 cp. 4 mg	23,57	I	65 %	0,79
	90 cp. 4 mg	66,44	I	65 %	0,74



## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (5)

### Stratification du niveau de risque cardiovasculaire de décès à 10 ans\*

Autres FDR, AOC ou maladie	Normale haute PAS 130-139 mmHg ou PAD 85-89 mmHg	HTA grade 1 PAS 140-159 mmHg ou PAD 90-99 mmHg	HAT grade 2 PAS 160-179 mmHg ou PAD 100-109 mmHg	HTA grade 3 HT PAS ≥ 180 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg
0 FDR		Risque faible	Risque modéré	Risque élevé
1-2 FDR	Risque faible	Risque modéré	Risque modéré à élevé	Risque élevé
≥ 3 FDR	Risque faible à modéré	Risque modéré à élevé	Risque élevé	Risque élevé à très élevé
AOC, IRC stade 3 ou diabète	Risque modéré à élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé à très élevé
Maladie cardiovasculaire avérée, IRC stade ≥ 4, diabète avec AOC ou FDR	Risque très élevé	Risque très élevé	Risque très élevé	Risque très élevé

### Comment prescrire un antihypertenseur ? [1]

La prescription doit se faire par étapes.

- **Étape 1 :** le choix thérapeutique de première intention est soit une monothérapie soit une association fixe à faible dose. La monothérapie se choisit parmi les **diurétiques**, les **inhibiteurs calciques**, les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)**, les **antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)** et les **bêta-bloquants**. La meilleure observance est observée avec les **ARA II** probablement grâce à leur très bonne tolérance. La bithérapie peut être préconisée dès l'étape 1 chez les patients à haut risque cardiovasculaire ou avec une HTA particulièrement élevée (grade 3 par exemple). La bithérapie peut s'avérer plus rapidement efficace et entraîner parfois moins d'effets indésirables.

- **Étape 2 :**
  - si l'objectif est atteint et la tolérance bonne après 4 sem. : on poursuit le traitement ;
  - si après 4 sem., il n'y a pas de réponse (baisse de la PAS < 10 % de la PAS initiale) ou s'il existe des effets secondaires gênants : changer de classe thérapeutique ;

- si après 4 sem., la réponse est insuffisante (baisse de la PAS > 10 % de la PAS initiale mais persistance de la PA au-dessus des objectifs) et la tolérance est bonne : bithérapie plus volontiers qu'une augmentation des doses.

- **Étape 3 :**

- si après cette 2<sup>e</sup> étape, l'objectif est atteint après 4 sem. : on poursuit le traitement ;
- si après cette 2<sup>e</sup> étape, la réponse est insuffisante après 4 sem. : trithérapie (dont un **diurétique thiazidique** en l'absence d'insuffisance rénale).

- **Étape 4 :** si après cette 3<sup>e</sup> étape, l'objectif n'est pas atteint après 4 sem., l'HTA est possiblement résistante : rechercher une HTA secondaire et traitement par multi-thérapie en milieu spécialisé.

L'augmentation des doses n'aboutit pas systématiquement à une augmentation de l'efficacité.

Le rapport efficacité/tolérance clinique et biologique du traitement peut être meilleur avec une bithérapie qu'avec une monothérapie maximale.

\* FDR : facteur de risque ; AOC : atteinte des organes cibles ; IRC : insuffisance rénale chronique.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (3)

## ■ Nitrendipine

<b>NIDREL</b>					
HTA : 20 mg/j en 1 prise Débuter à 10 mg/j chez le sujet âgé et l'in-suffisant hépatique	28 cp. 10 mg	8,40	I	65 %	0,30
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	25,21	I	65 %	0,28
	28 cp. 20 mg	14,29	I	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	43,04	I	65 %	0,48
<b>BAYPRESS</b>					
Idem <b>NIDREL</b>	30 cp. 10 mg	8,96	I	65 %	0,30
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	30 cp. 20 mg	15,28	I	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	43,04	I	65 %	0,48

## ■ Lercanidipine

<b>LERCAN</b>					
HTA : 1 cp. le matin	30 cp. 10 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 10 mg	36,96	I	65 %	0,41
	30 cp. 20 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 20 mg	36,96	I	65 %	0,41
<b>ZANIDIP</b>					
HTA : 1 cp. le matin	30 cp. 10 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 10 mg	36,96	I	65 %	0,41
	30 cp. 20 mg	13,12	I	65 %	0,44
	90 cp. 20 mg	36,96	I	65 %	0,41

## ■ Manidipine

<b>IPERTEN</b>					
Posologie initiale : 10 mg/j pendant 2 à 4 sem. puis 20 mg/j si besoin	30 cp. 10 mg	12,50	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,19	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	12,50	I	65 %	0,42
	90 cp. 20 mg	35,19	I	65 %	0,39

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (6)

### Quel antihypertenseur choisir ? [1]

L'efficacité des différentes classes d'anti-hypertenseurs ( **$\beta$ -bloquant**, **IEC**, **ARA II**, **diurétique**, **IC**) étant sensiblement égale dans l'HTA essentielle modérée (forme la plus fréquente), le choix est guidé par l'acceptabilité et la tolérance du médicament en fonction de l'âge, de l'état général et de l'existence de pathologies associées.


• On peut s'aider des « paniers » thérapeutiques :

- panier 1 :  **$\beta$ -bloquant**, **IEC**, **ARA II** ;
- panier 2 : **diurétique**, **IC**.

• Quand on instaure une monothérapie (du panier 1 ou 2) s'avérant inefficace et/ou mal tolérée, il est logique de passer à une molécule de l'autre panier.

• Quand on instaure une bithérapie, il est logique de choisir une molécule dans chaque panier (cf. Figure).

### Association de classes thérapeutiques favorisant la baisse tensionnelle



• Dans l'HTA systolique du sujet âgé et dans l'HTA du sujet noir, les molécules du panier 2 se révèlent les plus efficaces et peuvent être associées entre elles si besoin. Les molécules du panier 1 ne constituent pas pour autant une contre-indication.

• Les associations préférentielles recommandées sont :

- **inhibiteur calcique** et **IEC** (ou **ARA II**) ;
- **diurétique thiazidique** et **IEC** (ou **ARA II**) ;
- **inhibiteur calcique** et **diurétique thiazidique** ;
- **bêtabloquant** et **diurétique thiazidique** (à noter que cette association augmente le risque de diabète) ;

– **bêtabloquant** et **inhibiteur calcique dihydropyridine**.

• La trithérapie préférentielle est un **diurétique thiazidique** + bloqueur du système rénine/angiotensive (**IEC** ou **ARA II**) + **inhibiteur calcique**.

• Les autres classes d'antihypertenseurs (**alphabloquants**, **vasodilatateurs** et **anti-hypertenseurs centraux**) n'ayant pas démontré leur efficacité sur la morbi-mortalité cardiovasculaire ne sont pas recommandées, mais peuvent aider à atteindre l'objectif tensionnel en cas d'effets secondaires des autres thérapeutiques ou à compter du stade de quadrithérapie.

## INHIBITEURS CALCIQUES DIHYDROPYRIDINES (4) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs calciques sélectifs du canal calcique lent de la famille des dihydropyridines. Action prédominante au niveau vasculaire avec un effet vasodilatateur artériel (périphérique et coronaire) très puissant supérieur à celui des non dihydropyridines.

Diminution de la pression artérielle par diminution des résistances périphériques totales.

Augmentation des apports en O<sub>2</sub> au myocarde normal et ischémique.

Effet antispastique coronaire.

Pas d'effet inotrope négatif notable *in vivo* mais existe *in vitro*.

Pas d'effet bradycardisant.

## Durée d'action des différents produits

Nifédipine (caps. 10 mg)	6 h
Nifédipine (LP 20 mg)	12 h
Nifédipine (LP 30 mg)	24 h
Nicardipine (cp. 20 mg)	8 h
Nicardipine (LP 50 mg)	12 h
Amlodipine, félodipine, isradipine, lacidipine	24 h
Nitrendipine	12 à 24 h

## INDICATIONS

Hypertension artérielle (tous).

Prévention des crises d'angine de poitrine :

– angor stable, angor d'effort : **ADALATE** 10 mg, **CHRONADALATE LP** 30 mg, **AMLOR**, **FLODIL LP** ;

– angor spontané, angor de Prinzmetal : **ADALATE** 10 mg, **AMLOR**.

Traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud : **ADALATE** 10 mg.

Poussée hypertensive en milieu médical et en période postopératoire : **LOXEN injectable**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux dihydropyridines.

IDM de moins de 1 mois, angor instable : **ADALATE** 10 mg, **CHRONADALATE LP** 30 mg, **LOXEN** 20 mg.

Chez l'enfant en l'absence de données cliniques : **ICAZ LP**, **AMLOR**, **FLODIL LP**.

Altération marquée de la fonction ventriculaire gauche : **CALDINE**.

Grossesse et allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Des données récentes indiquent que les formes à libération immédiate peuvent s'accompagner

à fortes posologies d'un risque accru d'événements coronariens graves chez des patients coronariens.

**Nifédipine** : utiliser avec prudence en cas d'hypovolémie, de collapsus, de choc cardiogénique, de dysfonctionnement sinusal, d'anomalie de la conduction. À administrer avec précaution en cas d'insuffisance hépatique.

**Nicardipine injectable** : associer un  $\beta$ -bloquant chez les coronariens.

**Amlodipine** : à utiliser prudemment chez l'insuffisant hépatique. En cas d'asthénie, d'anorexie, de nausées tenaces, doser les enzymes hépatiques ; en cas d'augmentation ou d'ictère, arrêter le traitement.

**Isradipine** : à utiliser prudemment en cas de dysfonctionnement sinusal non appareillé.

Réduire la posologie chez le sujet âgé et l'insuffisant hépatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets communs :

– bouffées vasomotrices, céphalées (apparition en début de traitement puis atténuation) ;  
– œdèmes des chevilles et/ou de la face (dose-dépendants) ;

– plus rarement : tachycardie, palpitations, éruptions prurigineuses eczématiformes ou urticariennes, asthénie, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, dyspepsie, nausées, gastralgies. Chez les coronariens, douleurs angineuses très rares mais imposant l'arrêt du traitement (vol coronaire). Risque d'élargissement gingival sur une gingivite/parodontite (hygiène buccale soignée).

Effets spécifiques :

– **amlodipine** : crampes musculaires, paresthésies, tremblements, dyspnée, dysgueusie, atteinte hépatique exceptionnelle réversible ;  
– **nifédipine** : atteinte hépatique exceptionnelle réversible ;  
– **lacidipine, nitrendipine** : polyurie transitoire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **dantrolène IV**, **ciclosporine**.

Associations avec précautions :  $\alpha_1$ -bloquants, **baclofène**, **cimétidine**, **itraconazole**, **phénytoïne**, **rifampicine**, **vasodilatateurs**.

Associations à prendre en compte : **imipraminiques**, **corticoïdes**, **antipsychotiques**.

Association synergique et bénéfique avec les  **$\beta$ -bloquants**.

## INHIBITEUR DE LA RÉNINE

■ **Aliskirène**

<b>RASILEZ</b>					
HTA 150 à 300 mg/j en une prise avec un repas léger	30 cp. 150 mg	19,30	I	15 %	0,64
	56 cp. 150 mg	HOP	I		
	30 cp. 300 mg	23,15	I	15 %	0,77
	56 cp. 300 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

L'**aliskirène** est un inhibiteur direct de la rénine humaine, non peptidique, sélectif et puissant, actif par voie orale. L'**aliskirène** inhibe le système rénine-angiotensine-aldostérone en bloquant la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine I et en réduisant les taux d'angiotensine I et d'angiotensine II ; par rapport aux autres inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'**aliskirène** n'entraîne pas d'élévation de l'activité rénine.

**INDICATIONS**

Hypertension artérielle essentielle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.

Antécédent personnel ou familial d'angioedème.

Grossesse : 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres.

Allaitement en association avec **ciclosporine**, **quinidine**, **vérapamil** (inhibiteur puissant de la gp-P) ou le jus de pamplemousse.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse. Risque d'insuffisance rénale chez les patients à risque : diabète, sténose artère rénale, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque congestive.

Risque d'hyperkaliémie chez les patients diabétiques ou ayant une fonction rénale altérée.

Arrêter la prise de **RASILEZ** si diarrhée sévère ou persistante.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhée.

Angioedèmes.

Éruption cutanée.

Légère diminution de l'hémoglobine et de l'hématocrite.

Augmentation de la kaliémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudence avec :

– **kétoconazole**, **itraconazole**, **clarithromycine**, **télithromycine**, **érythromycine**, **amiodarone** (inhibiteurs modérés de la gp-P) : risque de surdosage en **RASILEZ** ;

– **AINS** chez le patient âgé (risque d'insuffisance rénale) ;

– **furosémide** ;

– **diurétiques épargneurs de potassium**, suppléments potassiques, médicaments inhibant le système rénine-angiotensine : risque d'hyperkaliémie ;

– millepertuis et **rifampicine** (inducteur de gp-P) : biodisponibilité du **RASILEZ** diminuée ;

– autres inhibiteurs du système rénine-angiotensine : risque d'insuffisance rénale.

## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (1) – ALPHA-1-BLOQUANTS

### ■ Prazosine

<b>MINIPRESS</b>					
0,5 mg/j au coucher puis augmentation progressive de 0,5 à 1 mg/sem. pdt 3 sem. Jusqu'à la posologie efficace HTA : 2 à 20 mg/j en 2 prises/j (posologie moyenne entre 3 et 7,5 mg/j en 2 prises/j)	30 cp. séc. 1 mg	4,80	I	65 %	0,16
	30 cp. séc. 5 mg	18,18	I	65 %	0,61
<b>ALPRESS LP</b>					
Posologie initiale : 2,5 mg/j en 1 prise	30 cp. LP 2,5 mg	10,74	I	65 %	0,36
Posologie d'entretien : 2,5-10 mg/j en 1 prise	90 cp. LP 2,5 mg	30,21	I	65 %	0,34
	30 cp. LP 5 mg	17,84	I	65 %	0,59
Posologie max : 20 mg/j en 1 prise	90 cp. LP 5 mg	50,26	I	65 %	0,56

### ■ Urapidil

<b>EUPRESSYL</b>					
HTA : 120 mg/j en 2 prises/j (max 180 mg/j) Sujet âgé : débiter à 60 mg/j en 2 prises/j <b>EUPRESSYL injectable</b> Urgence hypertensive : inj. IV de 25 mg en 20 s à renouveler 5 min après si besoin. Si résultat insuffisant après 5 min : nouvelle inj. IV de 50 mg en 20 s puis traitement d'entretien en perf. IV ou à la seringue électrique de 9 à 30 mg/h pendant 7 j max Pour la perf. IV, ajouter 5 amp. de 50 mg dans 500 mL de solution ; pour la seringue électrique, ajouter 2 amp. de 50 mg dans 50 mL de solution	30 gél. 30 mg	7,12	I	65 %	0,24
	30 gél. 60 mg	13,69	I	65 %	0,46
	5 amp. 25 mg/5 mL	HOP	I		
	5 amp. 50 mg/10 mL	HOP	I		
	5 amp. 100 mg/20 mL	HOP	I		
<b>MÉDIATENSYL</b>					
HTA : idem <b>EUPRESSYL</b> oral	30 gél. 30 mg	7,12	I	65 %	0,24
	30 gél. 60 mg	13,69	I	65 %	0,46

**HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES SECONDAIRES (1)****Définition**

L'HTA est dite essentielle dans 95 % des cas, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de la conséquence d'une rigidité prématurée ou physiologique de la paroi artérielle. Les 5 % restants correspondent aux HTA secondaires à une étiologie.

Il est donc nécessaire de sélectionner les patients chez lesquels des examens complexes, à la recherche d'une étiologie particulière, doivent être effectués.

Cette sélection repose sur :

- l'âge du patient et la sévérité de l'HTA ;
- l'anamnèse ;
- l'examen clinique et les examens biologiques habituels (kaliémie, fonction rénale).

**Principales étiologies d'HTA secondaires**

- Rénales :
  - parenchymateuses ;
  - obstructives ;
  - par sténose unilatérale ou bilatérale des

artères rénales d'origine athéromateuse ou fibrodysplasique.

- Endocriniennes :
  - hyperaldostéronisme primaire par adénome de Conn ou par hyperplasie des surrénales ;
  - phéochromocytome ;
  - syndrome et maladie de Cushing ;
  - hyperthyroïdie ;
  - hyperparathyroïdie ;
  - acromégalie.

- Médicamenteuses :

**AINS, glucocorticoïdes**, contraception orale œstroprogestative, **vasoconstric-teurs nasaux, ciclosporine, tacrolimus** ;

- Toxiques :

Régisse, antésite, alcool, ecstasy, amphétamines, cocaïne.

- Neurologiques :

- syndrome d'apnée du sommeil +++ ;
  - hypertension intracrânienne ;
  - tumeur du 4<sup>e</sup> ventricule.
- Coarctation de l'aorte.

## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (2) – VASODILATATEURS DIRECTS

### ■ Minoxidil

<b>LONOTEN</b>					
HTA : débiter à 5 mg/j en 1 ou 2 prises puis augmentation progressive de 5 à 10 mg/j tous les 3 j (max : 40 mg/j)	40 cp. séc. 5 mg	8,05	I	65 %	0,20
	40 cp. séc. 10 mg	14,18	I	65 %	0,35

### ■ Nitroprussiate de sodium

<b>NITRIATE</b>					
Urgence hypertensive et insuffisance cardiaque aiguë avec bas débit : reconstituer avec le solvant puis diluer dans du G5 % jusqu'à la concentration voulue ; débiter à 0,3 µg/kg/min et augmenter si besoin jusqu'à 5 µg/kg/min)	5 fl. pdre et solv. sol. inj.	HOP	I		

### ■ Dihydralazine

<b>NEPRESSOL</b>					
Urgence hypertensive et pré-éclampsie grave menaçant le pronostic vital : 50 à 100 mg à atteindre progressivement et à adapter à la pression artérielle	5 amp. 25 mg/2 mL	HOP	I		



## HYPERTENSIONS ARTÉRIELLES SECONDAIRES (2)

### HTA secondaire à une sténose d'une artère rénale

Les sténoses artérielles rénales sont le plus souvent d'origine athéromateuse, mais peuvent être également d'origine fibrodysplasique. Une sténose athéromateuse d'une artère rénale est le reflet d'une maladie athéromateuse sévère dont le pronostic est extra-rénal.


#### Traitement médical

- Les **IEC** ou les **ARA II** sont très efficaces en cas de sténose unilatérale de l'artère rénale. Ils sont, en revanche, contre-indiqués en cas de sténose bilatérale ou de sténose sur rein unique.
- Les **bêtabloquants** ainsi que les **inhibiteurs calciques** sont également efficaces.

### Angioplastie endoluminale de l'artère rénale par voie percutanée ± endoprothèse (stent)

- Indications préférentielles : sténose unilatérale tronculaire courte d'origine fibrodysplasique, sténose athéromateuse d'une artère rénale responsable d'OAP flash ou d'une diminution du débit de filtration glomérulaire sous IEC ou d'une HTA résistante.
- Contre-indication : sténose sur rein unique.
- Résultats : ils sont meilleurs dans les angioplasties des lésions dysplasiques. La guérison de l'HTA s'obtient dans 40 % des lésions dysplasiques. En revanche, il n'y a pas de bénéfice sur la pression artérielle ni sur les événements cardiovasculaires et rénaux, de l'angioplastie des lésions athéromateuses.
- Complications : embol artériel, occlusion aiguë, dissection. Elles restent rares.

#### Algorithme de choix du traitement devant une HTA avec sténose athéromateuse d'une artère rénale (SAAR)



## ANTIHYPERTENSEURS VASODILATATEURS (3) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

#### $\alpha_1$ -bloquants

Antihypertenseur vasodilatateur (artériolaire et veineux) agissant en bloquant les récepteurs  $\alpha_1$ -postsynaptiques et avec également un effet sur la régulation centrale de la pression artérielle. Pas de modification de la fréquence ou du débit cardiaque.

#### Vasodilatateurs directs

Antihypertenseur vasodilatateur artériolaire avec un effet direct sur les fibres musculaires lisses artérielles.

### INDICATIONS

#### Formes orales

Hypertension artérielle (HTA).

- **LONOTEN** : indiqué dans l'HTA sévère après échec d'un traitement associant au moins 2 antihypertenseurs dont un diurétique.

- **MINIPRESS** : indiqué également dans l'insuffisance ventriculaire gauche congestive, dans le traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud et dans le traitement des manifestations fonctionnelles de l'adénome de prostate.

#### Formes injectables

Traitement de l'urgence hypertensive.

**NITRIATE** : indiqué également dans l'insuffisance cardiaque aiguë en particulier ventriculaire gauche avec bas débit cardiaque.

**NEPRESSOL** : réservé aux pré-éclampsies graves menaçant le pronostic vital.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

**MINIPRESS, ALPRESS** : insuffisance cardiaque à débit élevé, insuffisance cardiaque droite par embolie pulmonaire ou épanchement péricardique, œdème pulmonaire secondaire à une sténose aortique ou mitrale, angor non contrôlé, enfant < 12 ans.

**LONOTEN** : IDM récent, hypertension artérielle pulmonaire secondaire à une sténose mitrale.

**NITRIATE** : hypovolémie, insuffisance hépatique sévère, hypothyroïdie.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non démontrée avec **prazosine, urapidil, minoxidil, nitroprussiate**.

**NEPRESSOL** : hypersensibilité.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Urapidil** : réduire la posologie en cas d'insuffisance hépatique sévère.

**Prazosine** : augmenter les doses très progressivement jusqu'à la posologie efficace. Utiliser prudemment chez les sujets âgés, coronariens ou conducteurs de véhicules.

**Minoxidil** : ne pas utiliser en première intention. Associer obligatoirement un **diurétique** et un  **$\beta$ -bloquant** pour compenser certains effets. Surveiller les signes de rétention hydrosodée.

**Nitroprussiate** : doser quotidiennement les thiocyanates sanguins qui ne doivent pas dépasser 5 mg/100 mL. Surveiller l'apparition d'une acidose métabolique.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Cardiaques

– Hypotension orthostatique (**urapidil, prazosine**) avec parfois perte de connaissance au début du traitement (**prazosine**).

– Rétention hydrosodée avec œdèmes et prise de poids (**prazosine, minoxidil**).

– Risque d'aggravation d'un angor chez des patients sans traitement antiangineux (**prazosine, dihydralazine**).

– Tachycardie, palpitations (**prazosine, minoxidil, nitroprussiate, dihydralazine**).

– Épanchement péricardique (**minoxidil**).

#### Neurosensoriels

– Tendance lipothymique avec étourdissement, asthénie, vertiges, sueurs (**urapidil, prazosine**).

– Céphalées (**urapidil, prazosine**), acouphènes, somnolence, troubles visuels, paresthésies (**prazosine**).

**Digestifs** : nausées, gastralgies (**urapidil**), constipation, diarrhée, bouche sèche (**prazosine**).

**Uro-génitaux** : impuissance, priapisme, pollakiurie, incontinence urinaire (**prazosine**).

**ORL** : épistaxis, hyperhémie conjonctivale, larmoiement, congestion nasale (**prazosine**).

**Dermatologiques** : réactions cutanées allergiques (**prazosine, urapidil**). Hypertrichose gênante mais réversible à l'arrêt (**minoxidil**).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées :  $\alpha_1$ -bloquants associés.

Associations déconseillées : autres antihypertenseurs vasodilatateurs.

Associations avec précaution : inhibiteurs calciques, antidépresseurs, antipsychotiques, AINS, baclofène, corticoïdes, anesthésiques généraux.

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (1)

## ■ Losartan

<b>COZAAR</b>					
<b>HTA</b> essentielle : 50 mg x 1/j jusqu'à 100 mg x 1/j max. <b>Insuffisance cardiaque chronique</b> (intolérance aux IEC) : 12,5 mg x 1/j puis posologie doublée chaque semaine si besoin jusqu'à 150 mg x 1/j max. <b>Atteinte rénale</b> chez patient diabétique hypertendu avec protéinurie : 50 mg x 1/j puis 100 mg x 1/j si besoin 1 mois après le début du traitement. <b>Réduction du risque d'AVC</b> chez patient hypertendu avec IVG : 50 mg x 1/j puis ajout faible dose d' <b>hydrochlorothiazide</b> et/ou augmentation à 100 mg x 1/j si besoin. En cas d' <b>hypovolémie</b> (traitement par diurétique forte dose) : 25 mg x 1/j.	28 cp. séc. 50 mg	15,25	I	65 %	0,54
	90 cp. séc. 50 mg	46,25	I	65 %	0,51
	28 cp. 100 mg	26,12	I	65 %	0,93
	90 cp. 100 mg	78,74	I	65 %	0,87
	1 fl. pdre sol. susp. buv. 2,5 mg/mL		I	NR	

## ■ Valsartan

<b>TAREG</b>					
HTA : 20-80 mg/j en 1 prise	30 cp. séc. 40 mg	13,31	I	65 %	0,44
	56 cp. séc. 40 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 40 mg	37,49	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 80 mg	15,97	I	65 %	0,53
	56 cp. séc. 80 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 80 mg	44,94	I	65 %	0,50
	30 cp. séc. 160 mg	19,95	I	65 %	0,67
	56 cp. séc. 160 mg	HOP	I		
	90 cp. séc. 160 mg	56,21	I	65 %	0,62
	1 sol. buv. 3 mg/mL. 160 mL	7,58	I	65 %	7,58
<b>NISIS</b>					
HTA : 1 cp./j	30 cp. séc. 40 mg	13,31	I	65 %	0,44
	90 cp. séc. 40 mg	37,49	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 80 mg	15,97	I	65 %	0,53
	90 cp. séc. 80 mg	44,94	I	65 %	0,50
	30 cp. séc. 160 mg	19,95	I	65 %	0,66
	90 cp. séc. 160 mg	56,21	I	65 %	0,62

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (8)****Surveillance**

- Le patient est revu en consultation 4 à 6 sem. après le début du traitement.
- Le médecin vérifiera le contrôle tensionnel (efficacité), recherchera une hypotension orthostatique surtout chez le sujet âgé. La tolérance du médicament sera bien sûr vérifiée par l'interrogatoire orienté.
- Le patient peut disposer d'appareils de mesures automatiques de la pression artérielle, ce qui peut aider le médecin dans la surveillance et l'adaptation de la posologie (automesure tensionnelle, cf. Encadré). Une éducation du patient est alors nécessaire pour rendre cet outil fiable.

- Rappeler au patient à chaque consultation :
  - l'importance de la bonne observance thérapeutique,
  - la nécessité d'un traitement au long cours,
  - l'importance du respect des règles hygiéno-diététiques et du contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaires.

**Automesure tensionnelle : règle des 3**

- Sur 3 j consécutifs avant chaque consultation :
- 3 mesures consécutives le matin au réveil avant les prises médicamenteuses,
  - et 3 mesures consécutives le soir au coucher.
- La moyenne tensionnelle de ces 18 mesures doit être  $\leq 135/85$  mmHg.

La liste des autotensiomètres validés est disponible sur Internet : [www.comitehta.org](http://www.comitehta.org).

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (2)

## ■ Irbésartan

<b>APROVEL</b>					
HTA : 1 cp./j en 1 prise	30 cp. pell. 75 mg	11,03	I	65 %	0,37
	56 cp. pell. 75 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 75 mg	31,08	I	65 %	0,35
	30 cp. pell. 150 mg	16,66	I	65 %	0,56
	56 cp. pell. 150 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 150 mg	46,93	I	65 %	0,52
	30 cp. pell. 300 mg	22,31	I	65 %	0,74
	56 cp. pell. 300 mg	HOP	I		
	90 cp. pell. 300 mg	62,86	I	65 %	0,70

## ■ Candésartan

<b>ATACAND</b>					
HTA : de 4 à 16 mg/j en 1 prise/j Insuffisance cardiaque : 4 à 32 mg/j en 1 prise/j	30 cp. séc. 4 mg	12,70	I	65 %	0,42
	90 cp. séc. 4 mg	35,73	I	65 %	0,40
	30 cp. séc. 8 mg	16,62	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 8 mg	46,83	I	65 %	0,52
	30 cp. séc. 16 mg	17,87	I	65 %	0,60
	90 cp. séc. 16 mg	50,36	I	65 %	0,56
	30 cp. séc. 32 mg	32,90	I	65 %	1,10
<b>KENZEN</b>					
HTA : de 4 à 16 mg/j en 1 prise/j Insuffisance cardiaque : 4 à 32 mg/j en 1 prise/j	30 cp. séc. 4 mg	12,70	I	65 %	0,42
	30 cp. séc. 8 mg	16,62	I	65 %	0,55
	90 cp. séc. 8 mg	46,83	I	65 %	0,52
	30 cp. séc. 16 mg	17,87	I	65 %	0,60
	90 cp. séc. 16 mg	50,36	I	65 %	0,56
	30 cp. séc. 32 mg	32,90	I	65 %	1,10

## ■ Telmisartan

<b>MICARDIS</b>					
HTA : de 20 à 80 mg/j en 1 prise/j Prévention cardiovasculaire : réduction de la morbidité cardiovasculaire chez les patients présentant : – une maladie cardiovasculaire athéromatose connue (antécédents de coronaropathie, d'accident vasculaire cérébral, ou d'artériopathie périphérique) ou – un diabète de type 2 avec une atteinte d'organe cible documentée Posologie usuelle : 80 mg/j en 1 prise	28 cp. 20 mg		I	NR	
	30 cp. 40 mg	14,18	I	65 %	0,47
	90 cp. 40 mg	39,94	I	65 %	0,44
	30 cp. 80 mg	17,15	I	65 %	0,57
	90 cp. 80 mg	48,29	I	65 %	0,54
<b>PRITOR</b>					
HTA : de 20 à 80 mg/j en 1 prise/j Prévention cardiovasculaire : réduction de la morbidité cardiovasculaire chez les patients présentant : – une maladie cardiovasculaire athéromatose connue (antécédents de coronaropathie, d'accident vasculaire cérébral, ou d'artériopathie périphérique) ou – un diabète de type 2 avec une atteinte d'organe cible documentée Posologie usuelle : 80 mg/j en 1 prise	30 cp. 20 mg		I	NR	
	30 cp. 40 mg	14,14	I	65 %	0,47
	90 cp. 40 mg	39,94	I	65 %	0,44
	30 cp. 80 mg	17,15	I	65 %	0,57
	90 cp. 80 mg	48,29	I	65 %	0,54

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) ESSENTIELLE DE L'ADULTE EN DEHORS DE LA GROSSESSE (9)

### Paramètres et périodicité de la surveillance du patient hypertendu

Paramètres	Périodicité de la surveillance dans le cas d'une HTA contrôlée non compliquée	Périodicité de la surveillance dans les situations particulières
Pression artérielle	3 à 6 mois	Plus souvent, si l'objectif tensionnel n'est pas atteint (favoriser la pratique de l'automesure tensionnelle).
Interrogatoire et examen cardiovasculaire	3 à 6 mois	Plus souvent, en cas de symptôme cardiovasculaire.
Bandelettes urinaires (protéinurie)	12 mois	
Kaliémie, créatininémie et calcul du DFG	1 à 2 ans	Si fonction rénale normale : avant et 7 à 15 j après l'instauration d'un traitement diurétique ou inhibiteur du système rénine-angiotensine (avec une mesure de kaliémie) ou en cas d'événements intercurrents. Si fonction rénale altérée : la périodicité de la surveillance est adaptée en fonction de la progression de l'IRC.
Glycémie	3 ans, si initialement normale	Plus souvent, en cas d'hyperglycémie modérée à jeun, de modification du poids ou du mode de vie.
Exploration d'anomalie lipidique	3 ans, si lipides initialement normaux	Plus souvent, si les lipides sont initialement anormaux, en cas de traitement hypolipémiant, de modification du poids ou du mode de vie.
ECG	3 ans	Plus souvent, en cas de signe d'appel à l'interrogatoire ou à l'examen clinique.

### Objectifs tensionnels (simplifiés dans les dernières recommandations ESH 2013 [2])

	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
HTA essentielle sans et avec complications	< 140	< 90
HTA chez le patient diabétique	< 140	< 85
HTA avec néphropathie protéinurique avérée (pas de seuil défini de protéinurie)	< 130	< 80
HTA chez le sujet âgé < 80 ans en bon état général	< 140	< 90
HTA chez le sujet âgé < 80 ans en mauvais état général et sujet âgé > 80 ans	< 150 sans hypotension orthostatique et avec 3 antihypertenseurs maximum dont un <b>diurétique</b>	< 90

**ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II (3)****■ Éprosartan**

<b>TEVETEN</b>					
HTA : 1 cp. x 2/j	56 cp. 300 mg	15,93	I	65 %	0,28
	168 cp. 300 mg	44,84	I	65 %	0,27

**■ Olmésartan**

<b>ALTEIS</b>					
HTA : 10 à 40 mg/j en 1 prise/j	30 cp. 10 mg	12,58	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,43	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	19,72	I	65 %	0,66
	90 cp. 20 mg	55,57	I	65 %	0,62
	30 cp. 40 mg	20,04	I	65 %	0,67
	90 cp. 40 mg	56,45	I	65 %	0,63
<b>OLMETEC</b>					
HTA : 10 à 40 mg/j en 1 prise/j	30 cp. 10 mg	12,58	I	65 %	0,42
	90 cp. 10 mg	35,43	I	65 %	0,39
	30 cp. 20 mg	19,72	I	65 %	0,66
	90 cp. 20 mg	55,57	I	65 %	0,62
	30 cp. 40 mg	20,04	I	65 %	0,67
	90 cp. 40 mg	56,45	I	65 %	0,63

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste sélectif du récepteur AT1 de l'angiotensine II.

Effet hypotenseur.

Régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche.

Vasodilatation coronaire.

Protection rénale chez le diabétique.

Réduction de la prolifération intinale.

Absence d'élévation de la bradykinine, contrairement aux **IEC**, ce qui entraîne une absence théorique de toux et d'œdème angioneurotique.

**INDICATIONS**

Hypertension artérielle essentielle.

Post-IDM récent (12 h à 10 j) en cas d'intolérance aux **IEC** chez des patients cliniquement stables présentant une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique et/ou des signes cliniques ou radiologiques d'insuffisance ventriculaire gauche.

Réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire chez des patients hypertendus avec hypertrophie ventriculaire gauche.

Traitement de l'insuffisance rénale chez les patients hypertendus et diabétiques de type 2 avec protéinurie.

Traitement de l'insuffisance cardiaque de classe II à IV NYHA avec dysfonction systolique ventriculaire gauche (FEVG  $\leq$  40 %) en cas d'intolérance aux **IEC** ou en association avec un **IEC** chez des patients restant symptomatiques sous **IEC**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie au produit.

Sténose bilatérale des artères rénales ou sténose sur rein unique.

Insuffisance hépatique sévère, cirrhose biliaire et cholestase (en particulier **TAREG**).

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez les sujets âgés et les insuffisants rénaux : pas de réduction de la posologie mais surveillance renforcée de la kaliémie et de la créatininémie.

Réduire la posologie en cas d'insuffisance hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypotension orthostatique dose-dépendante.

Détérioration de la fonction rénale (réversible à l'arrêt du traitement) surtout en cas de déplétion hydrosodée préalable (**diurétique**, régime désodé, diarrhées, vomissements).

Hyperkaliémie, baisse de l'uricémie et augmentation modérée de l'acide urique urinaire. Céphalées, vertiges.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations possibles avec précaution :

- **diurétiques épargneurs de potassium** : surveillance de la kaliémie et la fonction rénale ; cf. Insuffisance cardiaque gauche chronique ;
- **lithium** : augmentation de la lithémie ;
- **insuline, sulfamides hypoglycémisants** : hypoglycémie ;
- **AINS, corticoïdes** : diminution de l'effet ;
- **antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques** : hypotension artérielle ;
- autres **antihypertenseurs**.

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (1)

## Associations de diurétiques

## ■ Amiloride + furosémide

<b>LOGIRÈNE</b>					
<b>Amiloride 5 mg + furosémide 40 mg</b> Insuffisance cardiaque congestive : 1 cp./j le matin (max 2 cp./j)	30 cp. séc.	6,49	I	65 %	0,22

## ■ Altizide + spironolactone

<b>ALDACTAZINE</b>					
<b>Altizide 15 mg + spironolactone 25 mg</b> HTA : 1/2 à 1 cp./j œdèmes de cause rénale ou cardiaque : 3 à 4 cp./j en attaque puis 1 à 2 cp./j en entretien œdèmes de cause hépatique : 4 à 6 cp./j en attaque puis 1 à 2 cp./j en entretien	30 cp. séc.	5,89	II	65 %	0,20
	90 cp. séc.	16,45	II	65 %	0,18

## ■ Triamterène + méthyclothiazide

<b>ISOBAR</b>					
<b>Triamterène 150 mg + méthyclothiazide 5 mg</b> HTA : 1 cp./j	30 cp. séc.	6,29	II	65 %	0,21

## ■ Triamterène + hydrochlorothiazide

<b>PRESTOLE</b>					
<b>Triamterène 50 mg + hydrochlorothiazide 25 mg</b> HTA : 1 gél./j	30 gél.	6,06	II	65 %	0,20

## ■ Amiloride + hydrochlorothiazide

<b>MODURETIC</b>					
<b>Amiloride 5 mg + hydrochlorothiazide 50 mg</b> HTA : 1/2 cp./j le matin œdèmes d'origine cardiaque : débiter à 1 ou 2 cp./j puis réduire la dose pour le traitement d'entretien Ascite cirrhotique : débiter entre 1/2 et 1 cp./j puis traitement d'entretien (max : 2 cp./j)	30 cp. séc.	3,98	I	65 %	0,13



## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (2)

### IEC + diurétique thiazidique ou diurétique apparenté

#### ■ Quinapril + hydrochlorothiazide

<b>ACUILLX</b>					
<b>Quinapril</b> 20 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise	28 cp. séc.	<b>9,34</b>	I	65 %	<b>0,33</b>
	90 cp. séc.	<b>28,07</b>	I	65 %	<b>0,31</b>

#### ■ Bénazépril + hydrochlorothiazide

<b>BRIAZIDE</b>					
<b>Bénazépril</b> 10 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise Si sujet âgé : débiter à 1/2 cp./j	30 cp. séc.	<b>7,85</b>	I	NR	<b>0,26</b>
	90 cp. séc.	<b>22,07</b>	I	65 %	<b>0,25</b>
<b>CIBADREX</b>					
<b>Bénazépril</b> 10 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg Idem <b>BRIAZIDE</b>	30 cp. séc.	<b>7,85</b>	I	65 %	<b>0,26</b>
	90 cp. séc.	<b>22,07</b>	I	65 %	<b>0,25</b>

#### ■ Captopril + hydrochlorothiazide

<b>CAPTEA</b>					
<b>Captopril</b> 50 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise. Si insuffisance rénale modérée ou sujet âgé : débiter à 1/2 cp./j	30 cp. séc.	<b>9,96</b>	I	65 %	<b>0,33</b>
	90 cp. séc.	<b>28,04</b>	I	65 %	<b>0,31</b>
<b>ECAZIDE</b>					
<b>Captopril</b> 50 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg Idem <b>CAPTEA</b>	30 cp. séc.	<b>9,96</b>	I	65 %	<b>0,33</b>
	90 cp. séc.	<b>28,04</b>	I	65 %	<b>0,31</b>

#### ■ Énalapril + hydrochlorothiazide

<b>CO-RENITEC</b>					
<b>Énalapril</b> 20 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise. Si insuffisance rénale modérée ou sujet âgé : débiter à 1/2 cp./j	28 cp. séc.	<b>8,32</b>	I	65 %	<b>0,30</b>
	50 cp. séc.	<b>HOP</b>	I		
	90 cp. séc.	<b>24,98</b>	I	65 %	<b>0,28</b>

#### ■ Fozinopril + hydrochlorothiazide

<b>FOZIRETIC</b>					
<b>Fosinopril</b> 20 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. séc.	<b>8,09</b>	I	65 %	<b>0,27</b>
	90 cp. séc.	<b>22,75</b>	I	65 %	<b>0,25</b>

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (3)

## ■ Lisinopril + hydrochlorothiazide

<b>PRINZIDE</b>					
<b>Lisinopril</b> 20 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise. Si insuffisance rénale modérée : débiter à 1/2 cp./j	28 cp. séc.	8,57	I	65 %	0,31
<b>ZESTORETIC</b>					
<b>Lisinopril</b> 20 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg Idem <b>PRINZIDE</b>	30 cp. séc.	15,90	I	65 %	0,53
	90 cp. séc.	44,78	I	65 %	0,50

## ■ Périndopril + indapamide

<b>PRETERAX</b>					
<b>Périndopril</b> 2,5 mg + <b>indapamide</b> 0,625 mg HTA : 1 cp./j (AMM en 1 <sup>re</sup> intention)	30 cp.	9,42	I	65 %	0,31
	90 cp.	26,51	I	65 %	0,29
<b>BIPRETERAX</b>					
<b>Périndopril</b> 5 mg + <b>indapamide</b> 1,25 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	9,42	I	65 %	0,31
	90 cp.	26,51	I	65 %	0,29
<b>Périndopril</b> 10 mg + <b>indapamide</b> 2,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,15	I	65 %	0,74
	90 cp.	62,41	I	65 %	0,69

## ■ Ramipril + hydrochlorothiazide

<b>COTRIATEC</b>					
<b>Ramipril</b> 5 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	17,96	I	65 %	0,60

## ■ Zofénopril + hydrochlorothiazide

<b>ZOFENILDUO</b>					
<b>Zofénopril</b> 30 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	18,03	I	65 %	0,60
	90 cp.	50,79	I	65 %	0,56

**ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (4)****ARA II + diurétique thiazidique****■ Losartan + hydrochlorothiazide**

<b>HYZAAR</b>					
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + losartan 50 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise	28 cp.	15,37	I	65 %	0,55
	90 cp.	46,25	I	65 %	0,51
<b>FORTZAAR</b>					
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + losartan 100 mg HTA: 1 cp./j	28 cp.	26,12	I	65 %	0,93
	90 cp.	78,74	I	65 %	0,87
Hydrochlorothiazide 25 mg + losartan 100 mg HTA : 1 cp./j	28 cp.	26,12	I	65 %	0,93
	90 cp.	78,74	I	65 %	0,87

**■ Valsartan + hydrochlorothiazide**

<b>COTAREG</b>					
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + valsartan 80 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	15,97	I	65 %	0,53
	90 cp.	44,94	I	65 %	0,50
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + valsartan 160 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	19,95	I	65 %	0,67
	90 cp.	56,21	I	65 %	0,62
Hydrochlorothiazide 25 mg + valsartan 160 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	19,95	I	65 %	0,67
	90 cp.	56,21	I	65 %	0,62
<b>NISISCO</b>					
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + valsartan 80 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	15,97	I	65 %	0,53
	90 cp.	44,94	I	65 %	0,50
Hydrochlorothiazide 12,5 mg + valsartan 160 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	19,95	I	65 %	0,66
	90 cp.	56,21	I	65 %	0,62
Hydrochlorothiazide 25 mg + valsartan 160 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	19,95	I	65 %	0,66
	90 cp.	56,21	I	65 %	0,62

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (5)

## ■ Telmisartan + hydrochlorothiazide

<b>MICARDISPLUS</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>telmisartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	17,60	I	65 %	0,59
	90 cp.	49,56	I	65 %	0,55
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>telmisartan</b> 80 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	21,30	I	65 %	0,71
	90 cp.	60,00	I	65 %	0,67
<b>Hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>telmisartan</b> 80 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	21,30	I	65 %	0,71
	90 cp.	60,00	I	65 %	0,67
<b>PRITORPLUS</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>telmisartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	17,60	I	65 %	0,59
	90 cp.	49,56	I	65 %	0,55
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>telmisartan</b> 80 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	21,30	I	65 %	0,71
	90 cp.	60,00	I	65 %	0,67
<b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>telmisartan</b> 80 mg HTA: 1 cp./j	30 cp.	21,30	I	65 %	0,71
	90 cp.	60,00	I	65 %	0,67

**ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (6)****■ Candésartan + hydrochlorothiazide**

<b>COKENZEN</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>candésartan</b> 8 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>16,62</b> <b>46,83</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,55</b> <b>0,52</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>candésartan</b> 16 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>17,87</b> <b>50,36</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,60</b> <b>0,56</b>
<b>HYTACAND</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>candésartan</b> 8 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>16,62</b> <b>46,83</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,55</b> <b>0,52</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>candésartan</b> 16 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>17,87</b> <b>50,36</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,60</b> <b>0,56</b>

**■ Olmésartan + hydrochlorothiazide**

<b>ALTEISDUO</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>olmésartan</b> 20 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>19,72</b> <b>55,57</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,66</b> <b>0,62</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>olmésartan</b> 20 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>19,72</b> <b>55,57</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,66</b> <b>0,62</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>olmésartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>20,04</b> <b>56,45</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,67</b> <b>0,63</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>olmésartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>20,04</b> <b>56,45</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,67</b> <b>0,63</b>
<b>COOLMETEC</b>					
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>olmésartan</b> 20 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>19,72</b> <b>55,57</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,66</b> <b>0,62</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>olmésartan</b> 20 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>19,72</b> <b>55,57</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,66</b> <b>0,62</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg + <b>olmésartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>20,04</b> <b>53,14</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,67</b> <b>0,59</b>
<b>Hydrochlorothiazide</b> 25 mg + <b>olmésartan</b> 40 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 90 cp.	<b>20,04</b> <b>53,14</b>	I I	65 % 65 %	<b>0,67</b> <b>0,59</b>

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (7)

## ■ Irbésartan + hydrochlorothiazide

<b>COAPROVEL</b>					
<b>Irbesartan</b> 150 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. pell.	16,66	I	65 %	0,56
	56 cp. pell.	HOP	I		
<b>Irbesartan</b> 300 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j	90 cp. pell.	46,93	I	65 %	0,52
	30 cp. pell.	22,31	I	65 %	0,74
<b>Irbesartan</b> 300 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg HTA : 1 cp./j	56 cp. pell.	HOP	I		
	90 cp. pell.	62,86	I	65 %	0,70
	30 cp. pell.	22,31	I	65 %	0,74
	56 cp. pell.	HOP	I		
	90 cp. pell.	62,86	I	65 %	0,70

## ARA II + inhibiteur calcique

## ■ Valsartan + amlodipine

<b>EXFORGE</b>					
<b>Valsartan</b> 80 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	21,80	I	65 %	0,73
	56 cp.	HOP	I		
	90 cp.	61,42	I	65 %	0,68
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	24,81	I	65 %	0,83
	56 cp.	HOP	I		
	90 cp.	69,91	I	65 %	0,78
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	24,81	I	65 %	0,83
	56 cp.	HOP	I		
	90 cp.	69,91	I	65 %	0,78

## ■ Telmisartan + amlodipine

<b>TWYNSTA</b>					
<b>Telmisartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,91	I	65 %	0,76
	90 cp.	64,56	I	65 %	0,72
<b>Telmisartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,91	I	65 %	0,76
	90 cp.	64,56	I	65 %	0,72
<b>Telmisartan</b> 80 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	26,57	I	65 %	0,89
	90 cp.	74,88	I	65 %	0,83
<b>Telmisartan</b> 80 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	26,57	I	65 %	0,89
	90 cp.	74,88	I	65 %	0,83

## ■ Olmésartan + amlodipine

<b>SEVIKAR</b>					
<b>Olmésartan</b> 20 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74
<b>Olmésartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74
<b>Olmésartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74

## ■ Olmésartan + Amlodipine

<b>AXELER</b>					
<b>Olmésartan</b> 20 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74
<b>Olmésartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74
<b>Olmésartan</b> 40 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	23,74	I	65 %	0,79
	90 cp.	66,87	I	65 %	0,74

**ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (8)****ARA II + inhibiteur calcique + diurétique thiazidique****■ Valsartan + amlodipine + hydrochlorothiazide**

<b>EXFORGE HCT</b>					
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j le matin	30 cp.		I	NR	
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 5 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg HTA : 1 cp./j le matin	30 cp.		I	NR	
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 12,5 mg HTA : 1 cp./j le matin	30 cp.		I	NR	
<b>Valsartan</b> 160 mg + <b>amlodipine</b> 10 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg HTA : 1 cp./j le matin	30 cp.		I	NR	

**Bêtabloquants + diurétiques****■ Métoprolol + chlortalidone**

<b>LOGROTON</b>					
<b>Métoprolol</b> 200 mg + <b>chlortalidone</b> 25 mg HTA : 1 cp./j le matin au petit-déjeuner (max 2 cp./j en 2 prises)	30 cp. séc. 90 cp. séc.	8,21 23,10	I I	65 % 65 %	0,27 0,26

**■ Timolol + amiloride + hydrochlorothiazide**

<b>MODUCREN</b>					
<b>Timolol</b> 10 mg + <b>amiloride</b> 2,5 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 25 mg HTA : 1 cp./j en 1 prise	30 cp.	5,73	I	65 %	0,19

**■ Pindolol + clopamide**

<b>VISKALDIX</b>					
<b>Pindolol</b> 10 mg + <b>clopamide</b> 5 mg HTA : 1 cp./j le matin au petit-déjeuner (max 2 cp./j en 2 prises)	30 cp. 90 cp.	5,60 15,56	I I	65 % 65 %	0,19 0,17

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (9)

## ■ Bisoprolol + hydrochlorothiazide

<b>LODOZ</b>					
Hydrochlorothiazide 6,25 mg + bisoprolol 2,5 ou 5 ou 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	6,33	I	65 %	0,21
	90 cp.	17,74	I	65 %	0,20
<b>WYTENS</b>					
Hydrochlorothiazide 6,25 mg + bisoprolol 2,5 ou 5 ou 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	6,33	I	65 %	0,21

## ■ Aténolol + chlortalidone

<b>TENORETIC</b>					
Aténolol 50 mg + chlortalidone 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	6,68	I	65 %	0,22
	90 cp.	18,79	I	65 %	0,21

## ■ Nébivolol + hydrochlorothiazide

<b>CONEBILOX</b>					
Nébivolol 5 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	12,23	I	65 %	0,41
	90 cp.	34,43	I	65 %	0,38
Nébivolol 5 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	12,23	I	65 %	0,41
	90 cp.	34,43	I	65 %	0,38
<b>TEMERITDUO</b>					
Nébivolol 5 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	12,23	I	65 %	0,41
	90 cp.	34,43	I	65 %	0,38
Nébivolol 5 mg + hydrochlorothiazide 25 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	12,23	I	65 %	0,41
	90 cp.	34,43	I	65 %	0,38

## Bêta-bloquants + inhibiteurs calciques

## ■ Aténolol + nifédipine

<b>TENORDATE</b>					
Aténolol 50 mg + nifédipine 20 mg HTA : 1 gél./j	30 gél.	15,72	I	65 %	0,52
	90 gél.	44,28	I	65 %	0,49
<b>BETA ADALATE</b>					
Aténolol 50 mg + nifédipine 20 mg HTA : 1 gél./j	28 gél.	14,71	I	65 %	0,53



## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (10)

### ■ Métoprolol (succinate de) + féléodipine

<b>LOGIMAX</b>					
Succinate de métoprolol 47,5 mg + féléodipine 5 mg HTA : 1 cp./j le matin sans croquer (max : 2 cp./j) Sujets âgés et insuffisants hépatiques : 1 cp./j	30 cp. LP	18,69	I	65 %	0,62
	90 cp. LP	52,66	I	65 %	0,59

47,5 mg de succinate de métoprolol sont équivalents en efficacité antihypertensive à 100 mg de tartrate de métoprolol (*LOPRESSOR, SELOKEN*)

### Diurétique + réserpine

### ■ Bendrofluméthiazide + réserpine

<b>TENSIONORME</b>					
Bendrofluméthiazide 2,5 mg + réserpine 0,1 mg HTA : 1 à 3 cp./j	24 cp. séc.	2,50	II	65 %	0,10

### IEC + inhibiteurs calciques

### ■ Périndopril + amolodipine

<b>COVERAM</b>					
Périndopril 5 mg + amolodipine 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,22	I	65 %	0,74
	90 cp.	62,60	I	65 %	0,70
Périndopril 5 mg + amolodipine 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,22	I	65 %	0,74
	90 cp.	62,60	I	65 %	0,70
Périndopril 10 mg + amolodipine 5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	30,05	I	65 %	1,00
	90 cp.	84,70	I	65 %	0,94
Périndopril 10 mg + amolodipine 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	30,05	I	65 %	1,00
	90 cp.	84,70	I	65 %	0,94

### ■ Trandolapril + vérapamil

<b>TARKA LP</b>					
Trandolapril 2 mg + vérapamil 180 mg HTA : 1 cp./j	28 cp.	17,57	I	65 %	0,63
	84 cp.	49,49	I	65 %	0,59

### ■ Énalapril + lercanidipine

<b>LERCAPRESS</b>					
Énalapril 20 mg + lercanidipine 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,06	I	65 %	0,74
	90 cp.	62,14	I	65 %	0,69
<b>ZANEXTRA</b>					
Énalapril 20 mg + lercanidipine 10 mg HTA : 1 cp./j	30 cp.	22,06	I	65 %	0,74
	90 cp.	62,14	I	65 %	0,69

## ANTIHYPERTENSEURS : ASSOCIATIONS (11)

## Inhibiteur de la rénine + diurétique thiazidique

## ■ Aliskirène + hydrochlorothiazide

<b>RASILEZ HCT</b>					
Aliskirène 150 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 56 cp.	19,30 HOP	I I	65 %	0,64
Aliskirène 300 mg + hydrochlorothiazide 12,5 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 56 cp.	23,15 HOP	I I	65 %	0,77
Aliskirène 300 mg + hydrochlorothiazide 25 mg HTA : 1 cp./j	30 cp. 56 cp.	23,15 HOP	I I	65 % 65 %	0,77

## Inhibiteur calcique + statine

## ■ Amlodipine + atorvastatine

<b>CADUET</b>					
Prévention des accidents cardiovasculaires en cas d'HTA associée à plusieurs facteurs de risque : 1 cp./j	30 cp. 5 mg/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 5 mg/10 mg	62,80	I	65 %	0,70
	30 cp. 10 mg/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 10 mg/10 mg	62,80	I	65 %	0,70

## PROPRIÉTÉS

Se reporter aux différentes classes thérapeutiques.

## INDICATIONS

Traitement de l'hypertension artérielle lorsque la monothérapie n'est pas efficace ou en première intention.

## CONTRE-INDICATIONS

Se reporter aux différentes classes thérapeutiques.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux différentes classes thérapeutiques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Se reporter aux différentes classes thérapeutiques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Se reporter aux différentes classes thérapeutiques.

## INHIBITEURS DIRECTS DU FACTEUR Xa (MALADIE VEINEUSE) (1)

## ■ Fondaparinux sodique

ARIXTRA					
Traitement préventif après chirurgie orthopédique lourde des membres inférieurs, après chirurgie abdominale pour cancer ou chez patient alité à haut risque : 2,5 mg en 1 inj. SC/j à débiter 6 h après la fin de la chirurgie (en l'absence de saignement actif) Durée moyenne du traitement : 5 à 9 j (max 33 j) Traitement curatif TVP, EP stable : 7,5 mg en 1 inj. SC/j pdt 5 à 10 j	2 ser. 2,5 mg/0,5 mL	13,30	I	65 %	6,65
	7 ser. 2,5 mg/0,5 mL	43,56	I	65 %	6,22
	10 ser. 2,5 mg/0,5 mL	HOP	I		
	2 ser. 5 mg/0,4 mL	32,56	I	65 %	16,28
	7 ser. 5 mg/0,4 mL	103,22	I	65 %	14,75
	10 ser. 5 mg/0,4 mL	145,62	I	65 %	14,56
	2 ser. 7,5 mg/0,6 mL	32,56	I	65 %	16,28
	7 ser. 7,5 mg/0,6 mL	103,22	I	65 %	14,75
	10 ser. 7,5 mg/0,6 mL	145,62	I	65 %	14,56
	2 ser. 10 mg/0,8 mL	32,56	I	65 %	16,28
	7 ser. 10 mg/0,8 mL	103,22	I	65 %	14,75
	10 ser. 10 mg/0,8 mL	145,62	I	65 %	14,56

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie coronaire).

## PROPRIÉTÉS

Pentasaccharide inhibiteur synthétique et sélectif du facteur X activé (Xa) ; en se liant à l'antithrombine III (ATIII), il potentialise l'inhibition naturelle du facteur Xa par l'ATIII, ce qui interrompt la cascade de la coagulation.

## INDICATIONS

À la dose de 2,5 mg/j, ce médicament est indiqué :

- dans la prévention des événements thromboemboliques veineux :
  - en chirurgie orthopédique majeure du membre inférieur de l'adulte, telle que fracture de hanche, prothèse de hanche ou chirurgie majeure du genou.
  - en chirurgie abdominale chez les patients jugés à haut risque de complications thromboemboliques, tels que les patients soumis à une chirurgie abdominale pour cancer ;
  - chez l'adulte à haut risque d'événements thromboemboliques veineux, alité pour une affection médicale aiguë telle que insuffisance cardiaque et/ou trouble respiratoire aigu, et/ou maladie infectieuse ou inflammatoire aiguë.
- dans le traitement de la thrombose veineuse superficielle spontanée aiguë symptomatique des membres inférieurs de l'adulte sans thrombose veineuse profonde associée.

À des doses comprises entre 5 et 10 mg/j, ce médicament est indiqué dans le traitement des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires aiguës de l'adulte, à l'exclusion des patients hémodynamiquement instables ou des patients nécessitant une thrombolyse.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au fondaparinux.

Saignement actif.

Endocardite bactérienne aiguë.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Déconseillé chez les moins de 17 ans et pendant la grossesse et l'allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : contre-indiqué si clairance de la créatinine < 20 mL/min. Adaptation de la dose à 1,5 mg/j si clairance entre 20 et 30 mL/min.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie.

Épistaxis, hémoptysie, hématurie, saignement intracrânien.

Purpura, troubles de la coagulation.

Céphalée, confusion, anxiété, vertige.

Dyspnée, toux.

Nausées, vomissements, gastrite, élévation des transaminases.

Rash, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Précaution si association avec des médicaments susceptibles d'augmenter le risque hémorragique (fibrinolytiques, anti-GPIIb/IIIa, HNF, HBPM, AINS, antiagrégants plaquettaires).

Relais avec un autre anticoagulant :

– avec HNF ou HBPM : 1<sup>re</sup> injection 24 h après l'arrêt du fondaparinux ;

– avec AVK : poursuivre le fondaparinux jusqu'à obtention de l'INR cible.

## INHIBITEURS DIRECTS DU FACTEUR XA (MALADIE VEINEUSE) (2)

■ **Rivaroxaban**

<b>XARELTO</b>					
Traitement préventif en cas de chirurgie de la hanche ou du genou : 10 mg/j en 1 prise	5 cp. 10 mg	14,10	I	65 %	2,82
	10 cp. 10 mg	27,65	I	65 %	2,76
	30 cp. 10 mg	75,78	I	65 %	2,53
	100 cp. 10 mg	HOP	I	65 %	
	14 cp. 15 mg	37,66	I	65 %	2,69
Initier le traitement 6 à 10 h après l'intervention chirurgicale	28 cp. 15 mg	71,02	I	65 %	2,54
	42 cp. 15 mg	104,37	I	65 %	2,49
	100 cp. 15 mg	HOP	I		
	14 cp. 20 mg	37,66	I	65 %	2,69
	28 cp. 20 mg	71,02	I	65 %	2,54
Durée du traitement : 2 à 5 sem. en fonction de la chirurgie	100 cp. 20 mg	HOP	I		
Traitement préventif et curatif des embolies pulmonaires ou des thromboses veineuses profondes					
	15 mg x 2/j en 2 prises pdt 21 j				
	20 mg x 1/j (ou 15 mg si IR modérée) à partir du 22 <sup>e</sup> j				

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie thromboembolique artérielle).

■ **Apixaban**

<b>ELIQUIS</b>					
Traitement préventif en cas de chirurgie de la hanche et du genou : 2,5 mg x 2/j	10 cp. 2,5 mg	13,42	I	65 %	1,34
	20 cp. 2,5 mg	26,30	I	65 %	1,32
	60 cp. 2,5 mg	72,21	I	65 %	1,20
Initier le traitement 12 à 24 h après l'intervention chirurgicale					
Durée du traitement : 10 à 14 j pour une prothèse totale de genou et 32 à 38 j pour une prothèse totale de hanche					

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie thromboembolique artérielle).

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs sélectifs du facteur Xa.

La biodisponibilité de l'**apixaban** est de l'ordre de 50 % alors que celle du **rivaroxaban** est comprise entre 80 et 100 % ; les concentrations maximales sont atteintes en 2 à 4 h.

La prise alimentaire n'a pas d'influence sur les paramètres pharmacocinétiques ; l'**apixaban** et le **rivaroxaban** peuvent donc être pris pendant comme en dehors des repas.

**INDICATIONS**

Prévention des événements thromboemboliques veineux chez l'adulte dans un contexte post-chirurgical pour prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou (PTG).

Prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque. Traitement préventif ou curatif des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires chez l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité respectivement au **rivaroxaban** ou à l'**apixaban**.

Saignement évolutif cliniquement significatif.

Pathologie hépatique associée à un trouble de l'hémostase.

Grossesse et allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance étroite pour la recherche de signes hémorragiques.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les effets indésirables observés sont à remettre dans le contexte post-chirurgical du traitement puisqu'il est parfois difficile d'en déterminer la cause exacte.

Les effets indésirables observés sont les suivants : anémies, hémorragies, confusions et nausées. Parfois, augmentation des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association de **XARELTO** ou d'**ELIQUIS** avec les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP 3A4 et/ou de la P-gp n'est pas recommandée. Les médicaments concernés sont les **antifongiques azolés** et les **inhibiteurs de la protéase du VIH**. Tout traitement concomitant avec un autre **anticoagulant** et/ou un **AINS** justifie une vigilance particulière en raison du risque de saignement accru.

## AUTRE ANTIARYTHMIQUE

## ■ Adénosine

KRENOSIN				
En IV bolus Posologie initiale : 3 mg 1 seule fois Posologie d'entretien : 6 mg puis 12 mg si non-réponse	6 fl. 6 mg/2 mL	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Nucléoside endogène avec effet vasodilatateur périphérique/antiarythmique.

## INDICATIONS

- Conversion rapide en rythme sinusal des tachycardies jonctionnelles, y compris celles associées à une voie accessoire (syndrome de Wolf-Parkinson-White).
- Aide au diagnostic des tachycardies à complexes larges ou fins.

## CONTRE-INDICATIONS

- Bloc auriculo-ventriculaire du 2<sup>e</sup> ou du 3<sup>e</sup> degré, à l'exception des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque.
- Dysfonctionnement sino-auriculaire (maladie de l'oreillette) à l'exception des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque.
- Bronchopneumopathies chroniques obstructives avec bronchospasme (ex : asthme bronchique).
- Syndrome du QT long.
- Hypotension artérielle sévère.
- Hypersensibilité connue à l'**adénosine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la possibilité de survenue de troubles conductifs ou rythmiques transitoires lors de la réduction de la tachycardie paroxystique supraventriculaire, ce produit ne doit être administré qu'en milieu hospitalier, sous surveillance électrocardiographique et par des médecins disposant de moyens de réanimation cardiorespiratoire.

En raison du risque éventuel d'hypotension artérielle significative, l'**adénosine** doit être utilisée avec prudence chez les patients présentant :

- une sténose du tronc commun (gauche),
- une hypovolémie non corrigée,
- un rétrécissement valvulaire cardiaque,
- un shunt gauche-droit,

- un dysfonctionnement du système nerveux autonome,
- une sténose carotidienne avec insuffisance vasculaire cérébrale,
- des antécédents récents d'infarctus du myocarde ou une insuffisance cardiaque sévère,
- des troubles mineurs de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire du 1<sup>er</sup> degré, bloc de branche) qui pourraient être transitoirement aggravés durant la perfusion,
- une fibrillation auriculaire, ou un flutter, spécialement chez ceux ayant une voie de la conduction accessoire, la conduction par cette voie anormale pouvant être favorisée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables cliniques fréquents :

- troubles mentaux : anxiété ;
- troubles neurologiques : céphalées, vertiges ;
- troubles généraux : sensation d'oppression/douleur dans la poitrine, sensation de brûlure, nausées, dyspnée ;
- troubles cardiovasculaires : bradycardie, pause sinusale, pause post-extrasystolique, extrasystoles auriculaires, bloc auriculo-ventriculaire, troubles de l'excitabilité ventriculaire telles que des extrasystoles ventriculaires, tachycardies ventriculaires non soutenues.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **dipyridamole** étant susceptible de multiplier par quatre les effets de l'**adénosine**, il est conseillé de ne pas administrer ce médicament à des patients traités par du **dipyridamole**. En cas d'utilisation indispensable de ce médicament, en réduire significativement la dose. L'**aminophylline**, la **théophylline** et les autres bases xanthiques (thé, café, chocolat et des boissons au cola) sont des antagonistes compétitifs de l'**adénosine**. Chez les patients traités par ce type de produit, des doses d'**adénosine** plus élevées peuvent se révéler nécessaires. L'**adénosine** peut interagir avec les produits pouvant diminuer la conduction cardiaque.

**PROSTAGLANDINES EN CARDIOLOGIE****■ Prostine**

<b>PROSTINE VR</b>					
Posologie initiale : 0,1 µg/kg/min Posologie d'entretien : 0,01 à 0,4 µg/kg/min Posologie maximale : 0,4 µg/kg/min Le traitement est poursuivi jusqu'à ce que l'acte chirurgical puisse être réalisé	1 amp. 0,5 mg/1 mL	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Prostaglandines avec un effet vasodilatateur musculotrope.

**INDICATIONS**

Maintien temporaire de la perméabilité du canal artériel jusqu'à l'intervention curative ou palliative chez les enfants porteurs d'une cardiopathie congénitale ducto-dépendante, notamment :

- obstacles droits :
  - sténose ou atrésie pulmonaire,
  - atrésie tricuspide,
  - tétralogie de Fallot,
  - transposition des gros vaisseaux ;
- obstacles gauches :
  - coarctation de l'aorte,
  - interruption de la crosse de l'aorte,
  - transposition des gros vaisseaux avec septum interventriculaire intact.

**CONTRE-INDICATIONS**

Voie intraveineuse directe.  
Insuffisance respiratoire.

Hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À utiliser avec prudence en cas de terrain hémorragique type troubles de l'hémostase, de la coagulation, hémophilie, thrombophilie, maladie hémorragique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets indésirables cliniques fréquents :

- diarrhées ;
- hématome, ecchymose ;
- fièvre transitoire ;
- apoplexie ;
- CIVD ;
- flush ;
- bradycardie, hypotension, tachycardie, arrêt cardiaque, œdème.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives.

## INHIBITEUR DIRECT DE LA THROMBINE (ANTI-IIa) (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE ARTÉRIELLE)

### ■ Dabigatran éxétilate

<b>PRADAXA</b>					
Prévention de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire A > 18 ans : 150 mg x 2/j En cas d'insuffisance rénale modérée : 110 mg x 2/j	10 gél. 110 mg	30,37	I	65 %	3,04
	30 gél. 110 mg	82,93	I	65 %	2,76
	60 gél. 110 mg	161,56	I	65 %	2,69
	60 gél. 150 mg	75,78	I	65 %	1,26

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteur direct de la thrombine (anti-IIa) (maladie veineuse).

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur direct, puissant et réversible de la thrombine qui joue un rôle majeur dans la formation du thrombus.

#### INDICATIONS

Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une fibrillation atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs des facteurs de risque suivants :

- antécédent d'AVC, d'accident ischémique transitoire ou d'embolie systémique ;
  - FEVG < 40 % ;
  - insuffisance cardiaque symptomatique, classe NYHA ≥ II ;
  - âge ≥ 75 ans.
- âge ≥ 65 ans associé à l'une des affections suivantes : diabète, coronaropathie ou HTA.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **dabigatran éxétilate**.  
Trouble de la coagulation.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Saignement évolutif, lésion organique susceptible de saigner.

Insuffisance hépatique sévère.

Traitement par **quinidine**.

Grossesse et allaitement : déconseillé.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, thrombopénie, hémorragie.

Augmentation des ASAT, des ALAT, de la bilirubine.

Réaction allergique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation du risque de saignement si association à d'autres **anticoagulants (HNF, warfarine, thrombolytiques, antiagrégants plaquettaires)**.

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (1)

**Objectifs :**

- supprimer les symptômes ;
- préserver la fonction myocardique ;
- prolonger la vie du patient.

La revascularisation myocardique peut se faire par angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) ou par pontage aorto-coronaire (PAC).

**Angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP)****Indications**

La lésion doit :  
– être une sténose serrée  $\geq 50\%$  ou une occlusion ;

- intéresser une artère de bon calibre (coronaires principales et collatérales) ;
- avoir un lit d'aval étendu et de bon calibre ;
- vasculariser un myocarde viable.

Les indications sont à évaluer au cas par cas après discussion entre le cardiologue traitant, le cardiologue interventionnel et le chirurgien cardiaque dans la maladie coronaire stable (cf. chapitre correspondant).

Les indications peuvent et doivent être posées en urgence dans le cadre des syndromes coronaires aigus (IDM ST+, IDM ST- et AI) : cf. chapitres correspondants.

**MODALITÉS DE PRESCRIPTION DES ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES AVANT ET APRÈS ANGIOPLASTIE CORONAIRE (ATL) [1]****Avant angioplastie coronaire**

- Maladie coronaire stable
  - **aspirine** 100 mg/j (*a priori* déjà prescrite à l'entrée du patient) ;
  - **et clopidogrel** 300 mg (4 cp. de 75 mg) au moins 6 h avant ATL ;
  - **ou clopidogrel** 600 mg (8 cp. de 75 mg) au moins 2 h avant ATL ;
  - l'association **aspirine + prasugrel** ou **ticagrélor** peut être considérée en cas d'antécédent de thrombose de stent sous **clopidogrel**.
- Syndrome coronaire aigu (SCA)

Qu'il s'agisse d'un angor instable ou d'un infarctus avec ou sans sus-décalage de ST, dès que possible :

- **aspirine** : dose de charge initiale de 150 à 300 mg/j puis 75 à 100 mg/j au long cours ;
- **clopidogrel (PLAVIX 75 mg)** : dose de charge initiale unique de 300 mg puis 75 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois ;
- **ticagrélor (BRILIQUE 90 mg)** : dose de charge initiale unique de 180 mg puis 90 mg x 2/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi) ;
- **prasugrel (EFIENT 10 mg)** : dose de charge initiale unique de 60 mg puis 10 mg/j en association avec l'**aspirine** pendant 12 mois maximum (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).

**À la sortie du patient :**

- Stent « nu » : **aspirine** 75 à 100 mg/j et **clopidogrel** 75 mg/j pendant 4 sem., puis **aspirine** seule 75 à 100 mg/j à vie. L'association **aspirine** 75 à 100 mg/j + **ticagrélor** 90 mg x 2/j ou **prasugrel** 10 mg/j pendant 12 mois est possible (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).
- Stent « actif » : **aspirine** 75 à 100 mg/j et **clopidogrel** 75 mg/j pendant 9 à 12 mois, puis **aspirine** seule 75 à 100 mg/j à vie. L'association **aspirine** 75 à 100 mg/j + **ticagrélor** 90 mg x 2/j ou **prasugrel** 10 mg/j pendant 12 mois est possible (à arrêter en cas d'indication clinique : cf. Précautions d'emploi).



## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (3)

### ► Traitement $\beta$ -bloquant

- À débiter précocement dès la prise en charge hospitalière. Il n'est pas recommandé en phase pré-hospitalière.
- En l'absence de contre-indication (insuffisance cardiaque aiguë, choc cardiogénique, bradycardie, troubles de conduction sévères).
- Par voie IV à la phase aiguë puis relais *per os*. L'**acébutolol**, l'**aténolol**, le **métoprolol** et le **timolol** ont l'AMM dans l'IDM. Ex. : **TÉNORMINE** : 5 à 10 mg (1 mg/min) à injecter en IV puis relais *per os* avec 50 mg 15 min après l'injection puis toutes les 12 h.
- Diminuer la posologie ou arrêter le traitement en cas de mauvaise tolérance hémodynamique.
- Diminue la mortalité cardiovasculaire, la mort subite et les troubles du rythme.

### ► Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)

- Prévention efficace du remodelage ventriculaire gauche post-infarctus, réduction de la stimulation neuro-humorale.
- Diminution de la mortalité précoce et tardive quelle que soit la fonction ventriculaire gauche.

- À débiter précocement dès J1-J2 en particulier en cas d'insuffisance cardiaque symptomatique ou de dysfonction ventriculaire gauche systolique asymptomatique ou de diabète ou d'IDM antérieur.
- Le **captopril**, le **lisinopril**, le **périndopril**, le **ramipril**, le **trandolapril** et le **zofénopril** ont l'AMM dans le post-IDM.
- Exemples de doses optimales à atteindre progressivement :

- **TRIATEC** (cp. à 2,5 ou 5 mg) 10 mg/j en 2 prises/j ;
- **ZESTRIL** (cp. à 5 ou 20 mg) 10 mg/j en une prise/j.
- Surveillance régulière de la pression artérielle, de la kaliémie et de la fonction rénale.
- En cas d'intolérance aux IEC, les **ARA II** sont utilisables dans le post-IDM récent entre la 12<sup>e</sup> h et le 10<sup>e</sup> j. Seul le **valsartan** a l'AMM dans le post-IDM avec une efficacité identique aux IEC.
- À noter que l'**éplérénone** est indiquée aussi en post-IDM quand la FEVG est  $\leq 40\%$  en l'absence d'hyperkaliémie ou d'insuffisance rénale.

### ► Statines

- Les **statines** ont démontré leur efficacité en prévention secondaire sur la morbi-mortalité cardiovasculaire après un IDM (indépendamment du niveau de LDL initial). Objectif LDL  $< 1$  g/L.
- L'**atorvastatine**, la **fluvastatine**, la **pravastatine**, la **rosuvastatine** et la **simvastatine** ont l'AMM dans cette indication. Ex. : **TAHOR** 20 mg 1 cp./j.

Après 2 à 3 j en soins intensifs, la prise en charge peut se poursuivre en chambre conventionnelle en cardiologie, en l'absence de complication.

### Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires

- Arrêt définitif du tabac. Des **substituts nicotiniques** peuvent être prescrits dès la phase hospitalière.
- Éducation diététique, traitement d'une dyslipidémie, équilibration d'un diabète.
- Équilibration d'une HTA en privilégiant les  **$\beta$ -bloquants** et les **IEC**.

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (2)

**Cas particulier (mais fréquent 20-30 %) des patients sous AVK ou NACO pour une ACFA connue et qui doivent bénéficier d'une angioplastie coronaire**

- L'association d'un traitement antiagrégant plaquettaire et d'un traitement anticoagulant augmente le risque hémorragique de 60 %.
- Pour chaque prescription d'une association d'un traitement antiagrégant plaquettaire et d'un traitement anticoagulant, il faut s'assurer que le bénéfice soit toujours supérieur au risque aussi bien pour le risque coronaire que pour le risque embolique cérébral.

- Privilégier un stent non actif chez les patients en ACFA connue pour réduire la durée du traitement antiagrégant plaquettaire.
- Dans les 12 mois qui suivent l'accident coronarien avec angioplastie, le risque coronarien semble prédominer. L'anticoagulant devra être interrompu et la double antiagrégation plaquettaire sera donc à privilégier. Elle durera 1 mois après un stent non actif ou 3 mois après un stent actif.
- 12 mois après l'accident coronarien avec angioplastie, le risque embolique cérébral lié à l'ACFA l'emporte et il faut préférer le seul traitement anticoagulant (**AVK** ou **NACO**).

### TRAITEMENT ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE SYSTÉMATIQUE APRÈS PONTAGE AORTO-CORONAIRE

- **Aspirine** 75 à 250 mg/j à débiter 6 h après la chirurgie.
- En cas de contre-indication à l'**aspirine** : **clopidogrel (PLAVIX)** 1 cp./j.

#### Procédure

- En salle de cathétérisme sous contrôles ECG et tensionnel sous anesthésie générale ou non.
- Patient perfusé et traité par anticoagulant et antiagrégant plaquettaire.
- Après un abord par une artère fémorale ou une artère radiale (le plus souvent), cathétérisme sélectif des artères coronaires en multipliant les incidences pour repérer les sténoses et les quantifier.

L'angioplastie par ballonnet consiste à positionner un cathéter comportant un ballonnet à son extrémité distale, en regard de la sténose. Des inflations itératives du ballonnet sont produites pendant 10 à 30 s jusqu'à levée de l'empreinte du ballonnet.

- Des douleurs angineuses et des modifications de l'ECG sont habituelles lors des inflations (prévenir et rassurer le patient).
- Contrôle coronarographique en fin de procédure.

#### Procédures complémentaires

- Mise en place d'**endoprothèse ou stent** : prothèse métallique implantée au site de dilatation, maintenant le vaisseau ouvert après la procédure. Réduit le taux de complications de la procédure et le taux de resténose à 6 mois.
- Les stents recouverts de sirolimus ou paclitaxel (antimitotiques) dits « stents actifs » réduisent très significativement le risque de resténose dans les 6 premiers mois.**

- D'autres techniques sont beaucoup plus rarement utilisées : athérectomie rotative, rotablator.

#### Traitements adjuvants

- L'**inhibiteur de la glycoprotéine IIb/IIIa plaquettaire (RÉOPRO)** : puissant antiagrégant plaquettaire par voie IV est indiqué dans la prévention des complications cardiaques ischémiques lors d'une angioplastie coronaire.
- **Prasugrel** ou **ticagrelor** peuvent être considérés dans le cas de mise en place de stent à haut risque (stent sur gros réseau coronaire gauche, haut risque de thrombose intrastent, diabète).

#### Contre-indications

À évaluer en fonction du contexte clinique.

- Sténose du tronc commun gauche non protégé par des pontages.
- Artères coronaires tortueuses.
- Atteinte diffuse distale.
- Occlusion coronaire datant de plus de 6 mois.

#### Résultats

On parle de succès primaire quand :

- le gain est supérieur à 50 % par rapport au degré de sténose préexistante,
- il n'y a pas de complication majeure (chirurgie coronaire en urgence, infarctus, décès).

Le succès primaire est obtenu dans 90-95 % des cas.

## INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) AVEC ÉLEVATION DU SEGMENT ST (4)

### Prise en charge à la sortie de l'hôpital [1]

#### Réadaptation cardiovasculaire

En ambulatoire ou en milieu spécialisé.

#### Conseils hygiéno-diététiques

Renouveler les consignes de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment l'arrêt définitif du tabac.

#### Ordonnance de médicaments

- Un  $\beta$ -bloquant ou un inhibiteur calcique en cas de contre-indication aux  $\beta$ -bloquants.
- Une double antiagrégation plaquettaire (aspirine + clopidogrel principalement).
- Un traitement hypolipémiant type statine.
- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion à « pleine dose ».
- Un dérivé nitré d'action immédiate en sublingual, à la demande, doit être systématiquement prescrit et le patient éduqué.

#### Prescription d'un bilan biologique à effectuer 3 sem. après la sortie

- Glycémie à jeun.
- Dosage du cholestérol total, des cholestérols HDL et LDL et des triglycérides.
- Kaliémie, fonction rénale.

#### Rendez-vous de consultation avec le cardiologue traitant

À fixer 3 sem. après la sortie de l'hôpital.

### Première visite posthospitalière (à 3 sem.)

- Interrogatoire avec appréciation de l'activité physique, examen clinique, ECG, tolérance des traitements.
- S'assurer des bons résultats biologiques avec notamment l'objectif de LDL < 1 g/L.

### Examens à effectuer 3 mois après l'IDM

ECG d'effort éventuellement couplé à une scintigraphie myocardique au thallium

Sert à s'assurer du bon contrôle par le traitement médicamenteux et l'absence d'ischémie résiduelle.

#### Écho-Doppler cardiaque

Pour évaluer la fonction ventriculaire gauche.

#### Biologie

Un nouveau bilan lipidique doit être fait pour modifier éventuellement la posologie de l'hypolipémiant. Contrôle de la kaliémie et de la fonction rénale sous IEC.

### Consultations aux 6<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> mois

- Interrogatoire avec appréciation de l'activité physique, examen clinique, ECG, tolérance des traitements.
- Contrôle du bon respect des règles hygiéno-diététiques.

### Consultation au 12<sup>e</sup> mois

Cette consultation est l'occasion de renouveler les étapes suivantes.

ECG d'effort éventuellement couplé à une scintigraphie myocardique au thallium

À effectuer sous traitement.

#### Évaluation de la fonction ventriculaire gauche

Par échocardiographie Doppler.

### Consultations suivantes

Si le bilan à 1 an est rassurant, les consultations cardiologiques pourront être espacées tous les 6 mois.

### Bilan annuel

ECG d'effort sous traitement, bilan lipidique et glucidique. S'assurer du bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires.

## CONSENSUS

[1] Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation, ESC, 2012

## TECHNIQUES DE REVASCULARISATION MYOCARDIQUE (3)

**Complications****► Complications liées au cathétérisme interventionnel**

- Décès (1 %).
- Infarctus du myocarde par occlusion aiguë (dissection et/ou thrombose coronaire) : 2-3 %.
- Pontage aorto-coronaire en urgence : 2-4 %.
- Occlusion d'une branche, embolie coronaire distale.
- Dissection coronaire ostiale ou localisée au site de dilatation.
- Perforation d'une artère coronaire.
- Fracture du guide.
- Hématomes au point de ponction.
- Embolie artérielle distale (membre inférieur).
- Dissection ilio-fémorale ou aortique exceptionnelle.

**► Complications à distance de l'angioplastie**

- **La resténose est la complication la plus fréquente : 20-30 % dans les 6-9 premiers mois.**
- Ce taux diminue quand une endoprothèse est mise en place, en particulier une endoprothèse « active ».

**Surveillance post-procédure**

- Compression et surveillance du point de ponction radial ou fémoral. Surveillance des pouls distaux, de la chaleur cutanée et de l'hémodynamique.
- ECG répétés, enzymes cardiaques, créatinémie.

**Pontage(s) aorto-coronaire(s) [1]****Indications**

Patients symptomatiques présentant :

- un échec d'angioplastie avec resténoses itératives ;
- une sténose non protégée du tronc commun > 50 % ;
- des sténoses coronaires tritronculaires avec une fonction VG altérée ;
- des sténoses coronaires tritronculaires avec une bonne fonction VG mais persistance d'angor malgré un traitement médical maximal et impossibilité de geste d'angioplastie.

**Procédure**

- Intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle et protection myocardique.
- Réalisation de ponts entre l'amont et l'aval

des sténoses à l'aide soit de greffons artériels (surtout artères mammaires internes) soit de greffons veineux (segment de veine saphène interne).

- La revascularisation doit être la plus complète possible (2 à 5 pontages artériels et veineux). Les indications sont à évaluer au cas par cas après discussion entre le cardiologue traitant, le cardiologue interventionnel, le chirurgien cardiaque et l'anesthésiste (cf. chapitres Maladie coronaire stable, Syndrome coronaire aigu sans élévation du segment ST et Infarctus du myocarde avec élévation du segment ST).

**Résultats**

- Amélioration de la survie et de la symptomatologie, en particulier en cas de sténose du tronc commun, de lésions tritronculaires avec fonction ventriculaire gauche altérée.
- Bénéfice très net dans les angors invalidants malgré un traitement médical optimal.

**Surveillance**

Après la surveillance initiale de réanimation médico-chirurgicale, assurer une surveillance d'une dizaine de jours :

- clinique : cicatrices, auscultation cardiopulmonaire, température, hémodynamique ;
  - ECG, clichés pulmonaires, échocardiographie, recherche d'un syndrome inflammatoire.
- L'ordonnance de sortie comporte un traitement antiangineux de fond, de l'aspirine au long cours et le traitement des facteurs de risque. Convalescence en centre de rééducation cardiaque 2-3 sem.

Épreuve d'effort avant la reprise d'activité vers le 3<sup>e</sup> mois.

**Évolution**

- Mortalité périopératoire < 5 % par :
  - infarctus périopératoire ;
  - bas débit postopératoire favorisé par âge > 65 ans, dysfonction VG sévère ;
  - mauvais lit d'aval ;
  - complication extracardiaque (infectieuse, respiratoire, neurologique).

- Pontages artériels : perméabilité de 85-90 % à 10 ans.
- Pontages veineux : 10-20 % s'obstruent à 1 an et 50 % sont occlus à 10 ans.

**CONSENSUS**

[1] Guidelines on myocardial revascularization, ESC, 2010

## ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE (1)

## ■ Clonidine

<b>CATAPRESSAN</b>					
HTA : 1 à 4 cp./j en moyenne en 2 prises/j La posologie d'entretien doit être atteinte progressivement (max : 7 cp./j) <b>CATAPRESSAN injectable</b> Urgence hypertensive : 3 à 4 amp./j en moyenne en IM ou perfusion IV En inj. IM : 1 amp. 1 mL à répéter toutes les 4 h en fonction de la clinique puis relais <i>per os</i> En perfusion IV : 4 amp. dans 500 mL de G5 % (= 1,2 mg/mL), débiter à 1,2 mg/min et la dose maximale sera de 7,2 mg/min puis diminution des doses ou relais <i>per os</i> En inj. IV : 1 amp. 1 mL dans 10 mL de sérum physiologique à injecter en 10 min, à répéter toutes les 4 h si besoin	30 cp. séc. 0,15 mg	4,47	II	65 %	0,15
	50 cp. séc. 0,15 mg	HOP	II		
	10 amp. 0,15 mg/mL	HOP	II		

## ■ Méthylodopa

<b>ALDOMET</b>					
HTA : débiter à 250 mg x 2 ou 3/j pendant 48 h puis augmentation progressive (de préférence le soir) toutes les 48 h pour atteindre 750 mg à 1,5 g/j (max : 3 g/j)	30 cp. 250 mg	3,96	I	65 %	0,13
	30 cp. 500 mg	6,41	I	65 %	0,21

## ■ Moxonidine

<b>PHYSIOTENS</b>					
HTA : 0,2 mg/j en 1 prise le matin (max : 0,4 mg en 1 ou 2 prises/j)	30 cp. 0,2 mg	9,64	I	65 %	0,32
	90 cp. 0,2 mg	27,12	I	65 %	0,30
	30 cp. 0,4 mg	10,21	I	65 %	0,34
	90 cp. 0,4 mg	28,72	I	65 %	0,32

## ■ Rilménidine

<b>HYPERIUM</b>					
HTA : 1 cp./j en 1 prise le matin (max : 1 cp. x 2/j)	30 cp. 1 mg	11,44	I	65 %	0,38
	90 cp. 1 mg	32,20	I	65 %	0,36
	100 cp. 1 mg	HOP	I		

## ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antihypertenseurs d'action centrale : effet  $\alpha_2$ -sympathomimétique sur les centres bulbaires entraînant une diminution du tonus sympathique périphérique et de la pression artérielle systolique et diastolique. Le tonus vagal est augmenté, entraînant une bradycardie modérée.

Remarque : **HYPERIUM** et **PHYSIOTENS** sont des agonistes sélectifs des récepteurs imidazoliniques I1 centraux entraînant une baisse du tonus sympathique périphérique et donc de la pression artérielle ; ils ont une affinité moindre pour les récepteurs  $\alpha_2$ -adrénergiques centraux, ce qui permet une meilleure tolérance (moins de somnolence et de sécheresse buccale).

### INDICATIONS

Formes orales : hypertension artérielle.

**CATAPRESSAN INJECTABLE** : traitement d'attaque des urgences hypertensives.

### CONTRE-INDICATIONS

État dépressif grave.

Allergie au produit.

**ALDOMET** : antécédents d'hépatite médicamenteuse ou de maladie hépatique évolutive ; anémie hémolytique.

**HYPERIUM** et **PHYSIOTENS** : insuffisance rénale sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Administrer à doses progressives.
- Diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale.
- Ne pas interrompre brutalement surtout à forte posologie.
- Utiliser avec prudence chez les sujets âgés et chez les conducteurs de véhicules.
- **ALDOMET** : contrôle régulier du bilan hématologique, du bilan hépatique et de la tolérance clinique.

### Grossesse :

- autorisés : **CATAPRESSAN**, **ALDOMET** ;
- déconseillés : **PHYSIOTENS**, **HYPERIUM**.

### Allaitement :

- autorisés : **CATAPRESSAN**, **ALDOMET** ;
- déconseillés : **PHYSIOTENS**, **HYPERIUM**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Effets secondaires communs

- Digestifs : sécheresse de la bouche, consti-

pation plus fréquente que diarrhée, gastralgies, nausées.

- Cardiaques : palpitations, hypotension orthostatique, bradycardie.

- Neuropsychiques : baisse de la libido, somnolence, asthénie, anxiété, syndromes dépressifs, insomnie (**HYPERIUM**), extrémités froides, paresthésies des extrémités.

- Psychiatriques : possibilité de majoration de troubles dépressifs.

- Cutanés : prurit, éruptions cutanées, rashes.

- Rétention hydrosodée transitoire (oedèmes).

Syndrome de sevrage à l'arrêt brutal du traitement surtout à forte dose (essentiellement avec **CATAPRESSAN**) : rebond hypertensif, tachycardie, tremblements.

#### Effets spécifiques à **ALDOMET**

- Neurologiques : syndrome parkinsonien, paralysie faciale, mouvements choréoathétosiques.

- Psychiques : cauchemars, perturbation de l'acuité mentale, états psychotiques ou dépressifs transitoires et réversibles.

- Cardiovasculaires : aggravation d'un angor.

- Digestifs : colite, langue saburrale ou noire, pancréatite, inflammation des glandes salivaires.

- Hépatiques : hépatites aiguës cytolytiques, hépatite chronique active, ictère fébrile ou non (rarement cholestatique), nécrose hépatocellulaire parfois mortelle.

- Hématologiques : test de Coombs positif, anémie hémolytique, aplasie médullaire, leucopénie, granulopénie, thrombopénie ; présence d'anticorps antinucléaires, de cellules LE et du facteur rhumatoïde.

- Allergiques : fièvre, syndrome lupique, myocardite, péricardite.

- Dermatologiques : réaction eczémateuse, lichénoïde, nécrose épidermique toxique.

- Divers : gynécomastie, galactorrhée, impuissance, congestion nasale, arthralgies, myalgies.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Associations déconseillées : **IMAO** non sélectifs, **antidépresseurs** imipraminiques, **miansérine**, alcool, sympatholytiques alpha. Médicaments hépatotoxiques avec **ALDOMET**.

- Associations avec précaution : **AINS**, **badolène**,  **$\beta$ -bloquants**, **corticoïdes**, **antipsychotiques**, **lithium**, **lévodopa**.

## STIMULATEURS CARDIAQUES

### Dispositifs implantables actuellement utilisés

- Ils ont des fonctions :
- de stimulation cardiaque ;
  - de défibrillation cardiaque ;
  - de resynchronisation cardiaque.

Ces fonctions peuvent être seules ou associées entre elles si besoin, au sein du même dispositif implantable.

### Principales pathologies relevant d'un stimulateur cardiaque implantable

Cf. Bradycardies - troubles de conduction.

- Dysfonction sinusale.
- Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré.

### Modalités

Anesthésie locale. Abord de la veine sous-clavière (droite).

Mise en place des sondes de stimulation dans les cavités droites (dans le ventricule droit pour un système mono-chambre, dans le ventricule droit et l'oreillette droite pour un système double chambre). Un dispositif triple-chambre est un système de stimulation double chambre associée à une troisième sonde dite de **re-synchronisation**, mise en place au contact du ventricule gauche.

Implantation du boîtier de stimulation sous la peau en région pectorale. Il contient les programmes et les paramètres de surveillance du rythme cardiaque adaptés au patient. Le boîtier de stimulation délivre de faibles impulsions électriques.

Le plus souvent, couverture antibiotique antistaphylococcique pendant 12 à 24 h.

### Caractérisation des stimulateurs cardiaques

Elle comporte actuellement 4 à 5 lettres :

- 1<sup>re</sup> lettre : cavité entraînée (A : oreillette, V : ventricule, D : oreillette et ventricule) ;
- 2<sup>e</sup> lettre : cavité détectée (A : oreillette, V : ventricule, D : oreillette et ventricule) ;
- 3<sup>e</sup> lettre : effet de la détection (I : inhibition,

T : déclenchement de stimulation, D : inhibition et déclenchement) ;

- 4<sup>e</sup> lettre : asservissement (R) ;
- 5<sup>e</sup> lettre : capacités antitachycardiques.

### Choix du type de stimulateur cardiaque

Il est fonction :

- de l'indication initiale ;
- de la persistance d'une réponse chronotrope ;
- de l'association à des troubles du rythme supraventriculaire ;
- des pathologies associées ;
- de l'état général et l'activité.

En cas d'incompétence chronotrope, il est préférable d'implanter un pacemaker pouvant s'accélérer à l'effort : VVIR, DDD, etc.

### Dysfonction sinusale

- Isolée : AAI.
- Associée à des troubles conductifs ou nécessité de traitement chronotrope ou dromotrope négatif :
  - DDD en l'absence de troubles du rythme supraventriculaire ;
  - DDI ou DDD avec possibilité de repli en cas de troubles du rythme supraventriculaire.

### Troubles de conduction

- Rythme sinusal : DDD ou VDD.
- En ACFA : VVI.

(Les indications sont posées en milieu spécialisé.)

### Complications

#### ► Précoces

- Hémothorax, pneumothorax.
- Tamponnade.
- Hématome de loge.
- Infection.
- Déplacement des sondes.
- Thrombose veineuse du membre supérieur.

#### ► Tardives

- Dysfonction.
- Usure des piles du boîtier.
- Endocardite sur sonde.
- Syndrome du « pacemaker » (asynchronisme auriculo-ventriculaire).

## DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES IMPLANTABLES

### Dispositifs implantables actuellement utilisés

Ils ont des fonctions :

- de stimulation cardiaque ;
- de défibrillation cardiaque ;
- de resynchronisation cardiaque.

Ces fonctions peuvent être seules ou associées entre elles si besoin, au sein du même dispositif implantable.

### Principales indications

Elles sont formelles :

- arrêt cardiaque (récupéré) par fibrillation ventriculaire ou par tachycardie ventriculaire sans cause aiguë ou réversible ;
  - insuffisance cardiaque après une tachyarythmie ventriculaire soutenue ou un arrêt cardiaque récupéré quelle que soit la FEVG ;
  - cardiopathie ischémique avec FEVG < 30 % en classe II ou III NYHA, au moins 1 mois après un IDM ou 3 mois après une revascularisation ;
  - TV soutenue spontanée symptomatique avec cardiopathie ;
  - TV soutenue spontanée mal tolérée sans cardiopathie et avec échec du traitement médical ou échec d'une ablation ;
  - syncope sans cause connue avec TV soutenue ou FV déclenchable, avec cardiopathie.
- D'autres indications sont moins formelles à ce jour et ne seront pas détaillées.

### Modalités

Anesthésie locale. Abord de la veine sous-clavière (droite).

Mise en place d'une sonde de défibrillation dans le ventricule droit pour un système mono-chambre. Si le système est double-chambre, une sonde de stimulation est ajoutée dans l'oreillette droite. Si le système est triple-chambre, une **sonde de « resynchronisation »** est rajoutée dans le ventricule droit au contact du ventricule gauche.

Implantation du boîtier de défibrillation sous la peau en région pectorale. Il contient les programmes et les paramètres nécessaires à la surveillance et à la détection d'anomalies du rythme cardiaque. Le boîtier de défibrillation est capable de délivrer un choc électrique de haute énergie.

Le plus souvent, couverture antibiotique anti-staphylococcique pendant 12 à 24 h.

### Complications

#### ► Précoces

- Hémithorax, pneumothorax.
- Tamponnade.
- Hématome de loge.
- Infection.
- Déplacement des sondes.
- Thrombose veineuse du membre supérieur.

#### ► Tardives

- Dysfonction.
- Usure des piles du boîtier.
- Endocardite sur sonde.
- Syndrome du « pacemaker » (asynchronisme auriculo-ventriculaire).



## RESYNCHRONISATION CARDIAQUE

### Dispositifs implantables actuellement utilisés

Ils ont des fonctions :

- de stimulation cardiaque ;
- de défibrillation cardiaque ;
- de resynchronisation cardiaque.

Ces fonctions peuvent être seules ou associées entre elles si besoin, au sein du même dispositif implantable.

### Principales indications

L'insuffisance cardiaque chronique est la principale indication, quand l'espérance de vie est supérieure à 1 an. Le bénéfice de la resynchronisation y a été démontré dans les critères suivants :

- cardiopathie dilatée (ischémique ou non) avec diamètre télédiastolique du VG > 55 mm, FEVG < 30-35 %, classe III/IV NYHA, réfractaire au traitement médical optimal, et présence d'un asynchronisme ventriculaire avec un QRS > 120 ms de morphologie BBG ;
- cardiopathie dilatée (ischémique ou non) avec diamètre télédiastolique du VG > 55 mm, FEVG < 30 %, classe II NYHA, et présence d'un asynchronisme ventriculaire avec un QRS > 130 ms de morphologie BBG.

Les patients en rythme sinusal en tirent un plus grand bénéfice.

D'autres indications sont moins formelles à ce jour et ne seront pas détaillées.

### Mécanismes d'action

- Sur la fonction systolique : augmentation du débit, meilleure coordination de la contraction du VG, raccourcissement du temps de contraction du VG.

- Sur la fonction diastolique : temps de remplissage du VG allongé.
- Diminution de la fuite mitrale.
- Diminution du remodelage.

### Modalités

Anesthésie locale. Abord de la veine sous-clavière (droite).

Mise en place d'une sonde de resynchronisation dans le ventricule droit au contact du ventricule gauche afin de resynchroniser les contractions du ventricule gauche avec celles du ventricule droit.

Cette sonde est le plus souvent associée à des sondes de stimulation intra-auriculaire droite et intraventriculaire droite. Elle peut être aussi associée à une **sonde de défibrillation**.

Implantation du boîtier de stimulation avec fonction de resynchronisation, sous la peau en région pectorale.

Le plus souvent, couverture antibiotique antistaphylococcique pendant 12 à 24 h.

### Complications

#### ► Précoces

- Hémothorax, pneumothorax.
- Tamponnade.
- Hématome de loge.
- Infection.
- Déplacement des sondes.
- Thrombose veineuse du membre supérieur.

#### ► Tardives

- Dysfonction
- Usure des piles du boîtier.
- Endocardite sur sonde.
- Syndrome du « pacemaker » (asynchronisme auriculo-ventriculaire).

## INHIBITEURS DIRECTS DU FACTEUR Xa (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE ARTÉRIELLE)

### ■ Rivaroxaban

<b>XARELTO</b>					
Traitement préventif de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire 20 mg/j, 15 mg chez le sujet âgé ou en cas d'insuffisance rénale modérée	14 cp. 15 mg	37,66	I	65 %	2,69
	28 cp. 15 mg	71,02	I	65 %	2,54
	42 cp. 15 mg	104,37	I	65 %	2,49
	100 cp. 15 mg	HOP	I		
	14 cp. 20 mg	37,66	I	65 %	2,69
	28 cp. 20 mg	71,02	I	65 %	2,54
	100 cp. 20 mg	HOP	I		

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

### ■ Apixaban

<b>ELIQUIS</b>					
Traitement préventif de l'accident thromboembolique ou AVC ischémique dans la fibrillation auriculaire : 5 mg x 2/j (2,5 mg x 2/j chez sujet à risque)	10 cp. 2,5 mg	13,42	I	65 %	1,34
	20 cp. 2,5 mg	26,30	I	65 %	1,32
	60 cp. 2,5 mg	72,21	I	65 %	1,20
	60 cp. 5 mg	72,21	I	65 %	1,20

Les autres indications de ce médicament sont proposées dans le chapitre Inhibiteurs directs du facteur Xa (maladie veineuse).

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs sélectifs du facteur Xa.

La biodisponibilité de l'**apixaban** est de l'ordre de 50 % alors que celle du **rivaroxaban** est comprise entre 80 et 100 % ; les concentrations maximales sont atteintes en 2 à 4 h.

La prise alimentaire n'a pas d'influence sur les paramètres pharmacocinétiques ; l'**apixaban** et le **rivaroxaban** peuvent donc être pris pendant comme en dehors des repas.

### INDICATIONS

Prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité respectivement au **rivaroxaban** ou à l'**apixaban**.

Saignement évolutif cliniquement significatif.

Pathologie hépatique associée à un trouble de l'hémostase.

Grossesse et allaitement.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance étroite pour la recherche de signes hémorragiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables observés sont à remettre dans le contexte post-chirurgical du traitement puisqu'il est parfois difficile d'en déterminer la cause exacte.

Les effets indésirables observés sont les suivants : anémies, hémorragies, confusions et nausées. Parfois, augmentation des transaminases.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association de **XARELTO** ou d'**ELIQUIS** avec les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP 3A4 et/ou de la P-gp n'est pas recommandée. Les médicaments concernés sont les **antifongiques azolés** et les **inhibiteurs de la protéase** du VIH. Tout traitement concomitant avec un autre **anticoagulant** et/ou un **AINS** justifie une vigilance particulière en raison du risque de saignement accru.

## INHIBITEUR DIRECT DE LA THROMBINE (ANTI-IIA) (MALADIE VEINEUSE)

### ■ Dabigatran éxétilate

PRADAXA					
1 gél. 1 à 4 h après intervention puis	10 gél. 75 mg	30,37	I	65 %	3,04
2 gél./j pdt 10 j (genou) ou 28 à 35 j (PTH)	30 gél. 75 mg	82,93	I	65 %	2,76
A > 18 ans : 110 mg x 2/j en 1 prise	60 gél. 75 mg	161,56	I	65 %	2,69
75 mg x 2/j en 1 prise en cas d'ins. rénale	10 gél. 110 mg	30,37	I	65 %	3,04
modérée (Clce créat. 30-50 mL/min), sujet	30 gél. 110 mg	82,93	I	65 %	2,76
âgé, association à <b>amiodarone</b>	60 gél. 110 mg	161,56	I	65 %	2,69

Les autres indications de ce médicament sont proposés dans le chapitre Inhibiteur direct de la thrombine (anti-IIa) (maladie thromboembolique artérielle).

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur direct, puissant et réversible de la thrombine qui joue un rôle majeur dans la formation du thrombus.

#### INDICATIONS

Prévention primaire des événements thromboemboliques veineux chez les patients adultes ayant bénéficié d'une chirurgie programmée du genou ou d'une prothèse totale de hanche.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **dabigatran éxétilate**.  
Trouble de la coagulation.  
Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Saignement évolutif, lésion organique susceptible de saigner.

Insuffisance hépatique sévère.

Traitement par **quinidine**.

Grossesse et allaitement : déconseillé.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, thrombopénie, hémorragie.

Augmentation des ASAT, des ALAT, de la bilirubine.

Réaction allergique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation du risque de saignement si association à d'autres **anticoagulants** (HNF, **warfarine**, **thrombolytiques**, **antiagrégants plaquettaires**).

## ACNÉ (1)

L'acné est une affection d'une extrême fréquence (80 à 100 % de la population est atteinte à l'adolescence), localisée aux régions séborrhéiques du visage et du tronc. La présence de **comédons** (kystes ouverts ou « points noirs ») est la caractéristique quasi pathognomonique de l'acné ; les comédons sont associés à des kystes fermés (« points blancs ») et à des lésions inflammatoires (papules, nodules, pustules) ; la forme typique est appelée acné polymorphe juvénile et associée à des degrés divers ces différentes lésions.

*Diagnostics différentiels* : autres dermatoses papuleuses ou folliculaires faciales : dermatite péri-orale, rosacée, *Pyoderma* faciale, *Pili incarnati* des sujets à peau noire, angiofibromes de l'ÉPILOIA, syphilis secondaire.

### Physiopathologie

L'acné procède de 3 mécanismes intriqués.

#### Hyperséborrhée

La sécrétion de sébum par les glandes sébacées est sous la dépendance des androgènes ; la dihydrotestostérone issue de la transformation de la testostérone par la 5 $\alpha$ -réductase entraîne une augmentation de volume de la glande sébacée et

une augmentation de la sécrétion de sébum.

#### Dosages des androgènes plasmatiques dans l'acné féminine

Testostérone libre,  $\Delta$ -4-androstènedione, sulfate de DHA.

Indications :

- signes d'hyperandrogénie associés à l'acné ;
- acné sévère et/ou résistante à des traitements bien conduits.

#### Rétention sébacée

Il existe une kératinisation anormale du canal excréteur des glandes sébacées provoquant une obstruction et la formation de kystes. Cette hyperkératose est attribuée à l'action irritante des acides gras du sébum.

#### Inflammation

Elle provient de la rupture dans le derme des kystes dont la paroi est fragilisée par les acides gras du sébum.

Une bactérie anaérobie saprophyte des glandes sébacées, *Propionibacterium acnes* (P. a.), favorise la production d'acides gras, synthétise des enzymes qui agressent la paroi du follicule sébacé et favorise le chimiotactisme des neutrophiles catalysant ainsi l'inflammation.

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (1) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (1)

### ■ Trétinoïne (ou vitamine A acide)

<b>EFFEDERM</b>					
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche pendant plusieurs sem. en attaque puis × 2 à 3/sem. en entretien	30 g (crème 0,05 %) 50 mL (lotion 0,05 %)	3,22 4,80	I I	30 % 30 %	0,11 0,10
<b>LOCACID</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b> Réservé aux acnés du tronc	30 g (crème 0,05 %) 15 mL (fl. de sol. 0,1 %)	3,00 3,00	I I	30 % 30 %	0,10 0,20
<b>RETACNYL</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b>	30 g (crème 0,025 %) 30 g (crème 0,05 %)		I I	NR NR	
<b>KETREL</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b>	30 g (crème 0,05 %)	2,87	I	30 %	0,10

### ■ Adapalène

<b>DIFFERINE</b>					
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche pendant plusieurs sem. en attaque puis × 2 à 3/sem. en entretien	30 g (gel ou crème 0,1 %)	5,37	I	30 %	0,18
<b>EPIDUO</b>					
Idem <b>DIFFERINE</b>	30 g (gel)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

La **trétinoïne** favorise l'élimination des kystes ouverts et fermés et prévient leur formation.

L'**adapalène** possède de plus une activité anti-inflammatoire.

#### INDICATIONS

- Acné à prédominance rétentionnelle.
- Troubles de la kératinisation.
- Prévention et traitement de l'héliodermie (**trétinoïne** seulement).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester la sensibilité individuelle en début de traitement par une touche d'essai sur une petite partie du visage, espacer les applications en cas d'irritation.

Commencer par des faibles concentrations chez les sujets à peau fragile (roux, blonds, peau fine) et en cas d'association avec d'autres topiques irritants (**peroxyde de benzoyle**, **érythromycine**).

Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche.

Ne pas s'exposer au soleil (photosensibilisation).

**Grossesse** : ne pas utiliser pendant la grossesse. Donner une contraception aux femmes en âge de procréer.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Des signes d'irritation à type d'érythème, de cuisson et de desquamation peuvent survenir en début de traitement, ils doivent faire espacer les applications (1 soir sur 2 ou 3) ; ces signes sont transitoires.

Une poussée d'acné est possible en début de traitement.

Les effets secondaires de l'**adapalène** sont moins intenses pour une efficacité qui semble identique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inactivation par le **peroxyde de benzoyle**. Ne pas associer avec **isotrétinoïne** (risque d'irritation +++).

## ACNÉ (2)

### Buts du traitement

Diminuer la séborrhée, supprimer la rétention sébacée et limiter la composante inflammatoire.

### Mesures générales

- Rechercher des signes d'hyperandrogénie chez la femme : hirsutisme, acné importante de topographie thoracique, anomalies des règles.
- Rechercher un médicament inducteur : **antiépileptiques** (phénobarbital, phénytoïne), **antidépresseurs** (lithium, amineptine), **corticoïdes locaux** et généraux (*notamment le triamcinolone injectable qui peut*

*déclencher une acné 3 mois après l'injection*), **vitamine B12**, **iode**, **brome** (*antitussifs, expectorants, sédatifs*), **androgènes** (*anabolisants, contraceptifs oraux*), **isoniazide**, **ciclosporine**, **azathioprine**.

- Rechercher des facteurs aggravants locaux : cosmétiques comédogènes, profession (*travailleurs de la restauration, garagistes*), excoriations (« acné excoriée des jeunes filles »).

On ne négligera pas le retentissement psychologique de l'acné chez un adolescent, ni le risque cicatriciel ultérieur.

Une relation de confiance est nécessaire avec le patient pour l'observance du traitement souvent long et difficile.

### Ce qu'il faut dire au patient

- L'acné est le résultat d'une plus grande sensibilité des glandes sébacées aux androgènes.
- L'acné ne disparaît pas avec le mariage ni avec les premiers rapports sexuels, mais avec les traitements et avec le temps.
- Les traitements dont nous disposons ne sont pas efficaces dans les 15 jours mais après plusieurs semaines.
- Le début du traitement est parfois difficile en raison d'une possible exacerbation des lésions et des effets irritatifs imposant d'espacer les applications.
- Un traitement d'entretien local est souvent nécessaire au long cours pour éviter les récives.
- Les kystes ne doivent pas être manipulés mais extraits par le dermatologue (nettoyage de peau).
- Le soleil est un faux ami de l'acné et provoque une poussée après une amélioration initiale.
- Les aliments, notamment le chocolat et la charcuterie, ne donnent pas d'acné.
- L'acné n'est pas due à un défaut d'hygiène ; elle n'est pas le résultat d'un comportement particulier (notamment la masturbation ne donne pas d'acné).

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (2) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (2)

### ■ Isotrétinoïne locale

ROACCUTANE				
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche en traitement d'attaque pendant plusieurs sem., puis 2 à 3 appl./sem. en entretien	30 g (gel 0,05 %)		I	NR

#### PROPRIÉTÉS

L'**isotrétinoïne locale** a la même action que la **trétinoïne** dont elle est dérivée. Son efficacité semble identique à celle de la **trétinoïne** pour un prix nettement supérieur.

#### INDICATIONS

Acné rétentionnelle.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester la sensibilité individuelle en début de traitement par une touche d'essai sur une petite partie du visage, espacer les applications

en cas d'irritation. Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche. Ne pas s'exposer au soleil (photosensibilisation).

**Grossesse** : ne pas utiliser pendant la grossesse. Donner une contraception aux femmes en âge de procréer.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Une irritation et une poussée de l'acné peuvent se voir en début de traitement ; ces effets sont transitoires et doivent faire espacer les applications.

**ACNÉ (3)****Mesures spécifiques [1]****Acné rétentionnelle modérée**

Vitamine A acide locale, **trétinoïne** 0,05 % crème (**EFFEDERM**) : 1 application le soir sur tout le visage y compris sur les zones non visiblement atteintes à l'exception des paupières, du pourtour narinaire et des lèvres rouges, 1/4 h après la toilette sur une peau sèche.

Un **nettoyage de peau** sera effectué par le dermatologue après 1 à 2 mois de traitement local ; il consiste à extraire les kystes ouverts et fermés manuellement à l'aide d'une lame de bistouri n° 11 et d'un tire-comédons.

On peut utiliser l'**isotrétinoïne** locale, pour une efficacité identique mais un coût plus élevé. L'**adapalène** est moins irritant que la **trétinoïne** 0,05 % pour une efficacité qui semble inférieure.

Le **peroxyde de benzoyle** a une action mixte, anti-inflammatoire et antirétentionnelle.

**Acné inflammatoire [1]**

- **Peroxyde de benzoyle** (**CUTACNYL 2,5 gel aqueux**) : une application le soir sur tout le visage y compris les zones apparemment saines à l'exception des paupières, du pourtour narinaire et des lèvres rouges, 1/4 h après la toilette sur une peau sèche.
- Antibiothérapie locale, **érythromycine** (**ERYFLUID 4 %**) en solution à tamponner sur toutes les lésions rouges, le matin après la toilette (intérêt probablement très limité des antibiotiques locaux).
- Antibiothérapie orale, **doxycycline** 100 mg : un cp. le soir au dîner avec un

grand verre d'eau pendant 15 jours puis une gélule à 50 mg pendant 1 mois 1/2.

- **Zinc** (**RUBOZINC**) : 2 gél. x 1/j pendant 3 mois à distance des repas ; l'efficacité serait identique à celle des cyclines sur l'inflammation chez les bons répondeurs avec moins d'effets secondaires.

**Acné polymorphe (mixte inflammatoire et rétentionnelle)**

C'est la forme la plus fréquente.

Association des traitements précédents, par exemple :

- toilette du visage matin et soir avec un gel ou une eau adaptés type **SEBIUM MOUSSANT** ou  $H_2O$ , à rincer ;
- puis crème hydratante type **CLEAN-AC** sur le visage ;
- dans la journée, photoprotection externe en cas d'ensoleillement important ;
- **doxycycline** 100 mg : un cp. au dîner avec un grand verre d'eau ;
- le soir après la toilette du visage, sur une peau sèche, application d'**EFFEDERM**, avec prudence au début.

Il est important de revoir le patient à 2 mois pour la surveillance de la tolérance, de l'observance et de l'efficacité du traitement, et la réalisation éventuelle d'un nettoyage de peau.

Le traitement doit être maintenu plusieurs semaines à plusieurs mois et poursuivi par un traitement local d'entretien à raison de 2 à 3 applications par semaine.

La résistance bactériologique est reconnue comme un problème croissant amenant à **ne pas utiliser les antibiotiques systémiques seuls** dans les acnés mineures.



## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (3) – PEROXYDE DE BENZOYLE

### ■ Peroxyde de benzoyle

<b>CUTACNYL</b>						
Acné mixte : 1 appl. le soir après la toilette sur peau sèche, plusieurs sem. en attaque, puis × 2 à 3/sem. en entretien	40 g (gel aqueux 2,5 %)	2,87	II	30 %	0,07	
	40 g (gel aqueux 5 %)	2,95	II	30 %	0,07	
	40 g (gel aqueux 10 %)	2,95	II	30 %	0,07	
<b>EFFACNÉ</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	40 g (gel aqueux 5 %)		II	NR		
<b>PANNOGEL</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	40 g (gel aqueux 5 %)		II	NR		
	40 g (gel aqueux 10 %)	2,75	II	30 %	0,07	
<b>ECLARAN</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	45 g (gel 5 %)	3,07	II	30 %	0,07	
	45 g (gel 10 %)	3,07	II	30 %	0,07	
<b>CURASPOT</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	100 g (gel 5 %)			NR		

#### PROPRIÉTÉS

Anti-inflammatoire, antibactérien et un peu kératolytique.

#### INDICATIONS

Acné polymorphe avec prédominance inflammatoire.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux peroxydes (eau oxygénée).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Commencer par des faibles concentrations pour les peaux fragiles avec une touche d'essai

(cf. **trétinoïne**). Espacer les applications en cas d'irritation. Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche.

Pas d'exposition solaire (photosensibilisation).

Décoloration des textiles (litterie, vêtements).

Pas de contre-indication pendant la grossesse.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation imposant un espacement des applications. Photosensibilisation.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **peroxyde de benzoyle** inactive la **trétinoïne** et l'**érythromycine**.

## ACNÉ (4)

**Acné rétionnelle sévère, acné résistante à des traitements bien conduits ou récidivante à l'arrêt de ces derniers [2]**

Rétinoïde, **isotrétinoïne** : 0,5 à 1 mg/kg/j, en 1 à 2 prises, jusqu'à une dose cumulée de 100 à 150 mg/kg.

On associe une hydratation du visage (**CLEAN-AC**, **PHYSIANÉ**), des lèvres (**CÉRCERACUTA**, **VASELINE OFFICINALE**, **STICK SVR**, **STICK AU COLD CREAM AVÈNE**) et éventuellement des yeux (**ILAST** et **NUTRIVISC**), une photoprotection externe (**PHOTODERM AKN 30**), ainsi qu'une surveillance biologique des transaminases, des triglycérides et du cholestérol total.

- Un accord de soins et de contraception doit être remis à la patiente et signé avant d'entreprendre le traitement par **isotrétinoïne**.

- À chaque consultation mensuelle le médecin doit s'assurer que le test qualitatif plasmatique de grossesse a bien été réalisé, que la contraception efficace est bien suivie et que la patiente a bien compris les risques d'une grossesse sous **isotrétinoïne**.

- Le médecin doit encore noter tous ces éléments sur l'ordonnance ; dans le cas contraire le médicament ne sera pas délivré par le pharmacien.

**Autres traitements****Traitements hormonaux [1]**

Le traitement antiandrogène local idéal reste à inventer.

L'acétate de cyprotérone (**ANDROCUR**) est indiqué chez la femme ayant une acné sévère et/ou une hyperandrogénie marquée d'origine ovarienne ou périphérique : **ANDROCUR**, 1 cp. du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle + **CESTROGEL** du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle. L'effet contraceptif n'est garanti qu'à partir du 3<sup>e</sup> cycle (schéma de F. Kутten).

Ces traitements imposent une surveillance gynécologique stricte.

**Traitements adjuvants [1]**

- Ne pas solliciter la séborrhée avec des nettoyages agressifs et répétés de la peau ; utiliser des pains surgas sans savon ou des produits moussants pour peau acnéique (**CLEANANCE GEL NETTOYANT**).

- Hydrater la peau avec des émulsions eau dans l'huile respectant le film hydrolipidique naturel de la peau (**CLEAN-AC**).

- Utiliser une photoprotection externe.

- Le traitement des cicatrices résiduelles ne s'envisage qu'après guérison complète de l'acné, on aura recours à différentes techniques : peeling chimique, dermabrasion, laser resurfacing, relèvement chirurgical.

Les peelings n'ont pas démontré cliniquement la preuve de leur efficacité dans le traitement de l'acné.

L'intérêt de l'extraction manuelle des kystes fermés et comédons est fondé sur l'expérience.

L'efficacité des lampes et lasers n'est pas démontrée.

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (4) – ANTIBIOTIQUES

### ■ Érythromycine percutanée

<b>ERYFLUID</b>					
Acné inflammatoire : à tamponner sur toutes les lésions inflammatoires × 1 à 2/j pendant plusieurs sem.	30 mL (sol. alcool. 4 %)	2,52	I	15 %	0,08
	100 mL (sol. alcool. 4 %)	5,30	I	15 %	0,05
<b>ÉRYTHROGEL</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel alcool. 4 %)	3,05	I	15 %	0,10
<b>ÉRYTHROMYCINE BAILLEUL</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	100 mL (sol. alcool. 4 %)	5,06	I	15 %	0,05

### ■ Érythromycine en association

<b>ERYLIK</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel alcool. 4 %)	4,71	I	30 %	0,16

### ■ Clindamycine percutanée

<b>DALACINE T TOPIC</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 mL (sol. alcool. 1 %)		I	NR	
<b>ZINDACLINÉ</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel 1 %)		I	NR	
<b>CLINDAFLUID</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 mL (sol. 1 %)		I	NR	
	100 mL (sol. 1 %)		I	NR	

### ■ Acide azélaïque

<b>FINACEA</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (tube 15 %)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques locaux de la famille des macrolides et des lincosanides agissant sur *Propionibacterium acnes* et ayant une action anti-inflammatoire dans l'acné.

#### INDICATIONS

Acné inflammatoire.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter l'application à proximité des yeux et de la bouche.

Utiliser la **clindamycine** avec prudence en cas d'antécédent de colite pseudo-membraneuse.

**Grossesse** : innocuité de la **clindamycine** non démontrée.

**Allaitement** : innocuité de la **clindamycine** non démontrée.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Signes d'irritation transitoires.

Risque non exclu de colite pseudo-membraneuse avec la **clindamycine**.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inactivation par le **peroxyde de benzoyle**.

## ACNÉ (5)

### Formes particulières cliniques

#### Folliculite à bacilles Gram négatif

Complication du traitement antibiotique oral de l'acné, cette éruption subite de pustules impose un arrêt des **cyclines orales** et un traitement antibiotique adapté aux prélèvements bactériologiques locaux.

#### Acné fulminans

L'**isotrétinoïne** est peu efficace ; on associe un **corticoïde général**, **prednisone (CORTAN-CYL)**, 1 mg/kg/j à une cycline à 1 g/j.

#### Acné avec œdème facial

**Isotrétinoïne**, 1 mg/kg/j, ou **prednisone** 1 mg/kg/j.

#### Acné néonatale

Absence de traitement avec résolution spontanée le plus souvent, mais dépend de l'intensité des symptômes et peut aller jusqu'à la prescription d'**isotrétinoïne** orale.

### Traitement de l'acné par voie générale

- 1. Il n'y a pas lieu de prescrire de l'**isotrétinoïne** en dehors des acnés sévères nodulokystiques et conglobata et des acnés résistantes à un traitement classique\*.
- 2. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, de débiter un traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse et sans qu'un moyen efficace de contraception ait été instauré un mois avant le début du traitement.
- 3. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, de poursuivre un traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse répété tous les 2 mois, et sans qu'un moyen efficace de contraception soit poursuivi.
- 4. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, d'arrêter le moyen efficace de contraception avant la fin du premier mois suivant l'arrêt du traitement par **isotrétinoïne**\*\*.
- 5. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, de pratiquer d'autres examens\*\*\* que le dosage des transaminases, du cholestérol total et des triglycérides.
- 6. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, d'associer les **cyclines** à l'**isotrétinoïne** du fait du risque d'hypertension intracrânienne.
- 7. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, de prescrire l'**isotrétinoïne** à une dose inférieure à 0,5 mg/kg/j - dose initiale optimale - ou supérieure à 1 mg/kg/j.
- Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, d'administrer une dose cumulée de plus de 150 mg/kg d'**isotrétinoïne** par cure.

### CONSENSUS

- [1] Guidelines of care for acne vulgaris management, AAD, 2007
- [2] Traitement de l'acné par voie générale, *Afssaps*, 2007

\* L'AMM précise que l'acné est résistante après un traitement classique (traitement antibiotique en association avec des traitements locaux) d'au moins 3 mois.

\*\* Au terme de cette période, il conviendra de vérifier qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse pratiqué une semaine après la fin de la contraception, c'est-à-dire 5 sem. après l'arrêt du traitement par **isotrétinoïne**.

\*\*\* Sauf les examens nécessaires pour répondre aux conditions des références 3, 4, 5 et sauf comorbidité.

## DERMATITE SÉBORRHÉIQUE (1)

Dermatose très fréquente, d'étiologie inconnue, touchant l'adulte surtout de sexe masculin. Elle réalise des plaques érythémato-squameuses, plus ou moins prurigineuses, caractérisées par leur distribution symétrique sur les régions séborrhéiques de la face et parfois du tronc, et sur le cuir chevelu.

### Facteurs déclenchants

Divers facteurs sont connus pour déclencher des poussées de dermatite séborrhéique :

- facteurs environnementaux (climat froid et sec, stress, surmenage professionnel) ;

- pathologie sous-jacente (VIH, maladie de Parkinson) ;
- champignon saprophyte (*Malassezia furfur*) ;
- tics de grattage ;
- toilettes agressives (produits trop détersifs).

Cette affection peut être difficile à distinguer d'un psoriasis localisé au visage et au cuir chevelu en l'absence d'autres localisations classiques qui seront toujours cherchées ; il existe des similitudes cliniques importantes entre ces 2 affections cutanées chroniques et certains préfèrent parler de « sébopsoriasis » plutôt que de trancher en faveur de l'un ou l'autre diagnostic.

## DERMATITE SÉBORRHÉIQUE (2)

### Traitement

Il faut expliquer au patient le caractère chronique et récidivant de cette affection, dont l'évolution est émaillée de rémissions, spontanées ou sous traitement, et de poussées.

### Traitement d'attaque

Deux traitements ont une AMM et un remboursement dans cette indication : **kétocazole local** (**KÉTODERM** gel sachet moussant), ou shampoing (**SEBIPROX**) x 2/sem. pendant 4 sem., en réalisant un shampoing et en appliquant le reste du gel et la mousse sur le visage et la partie haute du tronc ; il faut **laisser agir le produit 5 min et bien rincer**. Les applications peuvent ensuite être espacées. D'autres shampoings sont efficaces mais non remboursés rendant la concurrence difficile. On peut utiliser **MYCOSTER crème** en traitement d'appoint sur des lésions affchantes du visage : 2 appl./j pendant 2 sem. ou **LITHIODERM** gel, 2 appl./j pendant 2 mois.

Dans les dermatites séborrhéiques profuses (VIH), on peut recommander l'application rapidement dégressive d'un **dermocorticoïde de classe III**, **TRIDÉSONIT** crème ou **LOCAPRED** crème sur les lésions du visage pendant 10 j puis 1 j/2 pendant 2 sem. puis x 2/sem. pendant 2 sem. en prenant le relais par un traitement classique.

En cas de dermites séborrhéique très étendue du cuir chevelu, on peut avoir recours à l'**itraconazole** (**SPORANOX**) : 1 cp./j.

### Traitement d'entretien

Il a pour but d'éviter les poussées évolutives de cette affection chronique.

Ex. : **KÉTODERM** gel sachet moussant, une fois/sem. à une fois toutes les 3 sem. au long cours, en interrompant le traitement lors des vacances et des beaux jours et en l'accentuant en période d'hiver et de stress.

Utilisation de **shampooings au goudron** (**IONAX cade**, **PROVÉGOL CADIQUE**) et à la pyrithione-zinc (**ITEM**, **PROVÉGOL**, **DUCRAY**) en alternance avec des shampooings doux (ex. : **NORMAKER**, **EXTRA-DOUX DUCRAY**, **NODÉ**, **PROVÉGOL**).

### Mesures d'accompagnement

Éviter les tics de grattage et les toilettes agressives du visage. Utiliser un pain sans savon ou un nettoyant doux pour la toilette du visage. Hydrater le visage le matin (**CRÉALINE DS** ou **LÉGÈRE**).

Une exposition solaire modérée et adaptée à chaque patient peut être conseillée (héliothérapie).

On associera une prise en charge du « stress ».

### Dermatite séborrhéique du nouveau-né

Il s'agit soit d'une forme localisée (cf. Adulte), soit d'une forme généralisée : c'est l'érythrodermie de Leiner-Moussous. L'évolution se fait vers la guérison spontanée avant l'âge de 4 mois : émollients seuls non gras.

## ALOPÉCIES (1)

### Alopécie androgéno-génétique

C'est une alopécie déterminée génétiquement, et due à une « hypersensibilité » des follicules pileux du cuir chevelu aux androgènes. La calvitie précoce en est la conséquence.

#### Traitement médical

##### ► Éducation

Il faut expliquer au patient que le cheveu subit un cycle, dont la durée est génétiquement déterminée, comprenant 3 phases :

- une phase anagène de pousse de 0,35 à 0,45 mm/j ;
- une phase catagène qui est un arrêt de la pousse ;
- une phase télogène qui correspond à une involution et à une chute physiologique du cheveu en 2 à 4 mois.

Les cheveux subissent plusieurs cycles au cours d'une vie et sont de plus en plus fins après chaque nouveau cycle.

L'efficacité d'un traitement antichute, quel qu'il soit, ne peut s'apprécier avant 3 mois.

Il existe une chute physiologique de 25 à 50 cheveux/j, avec des pics saisonniers en août-septembre et au printemps.

##### ► Shampoings

Nécessité de shampoings réguliers doux (**PROVÉGOL**, **DUCRAY EXTRA-DOUX**) en alternance avec des shampoings antiséborrhéiques (**ARGÉAL**) en massages réguliers.

##### ► Traitement médical

##### • Vitamines B5 et vitamines H.

**Vitamines B5 et vitamines H per os** ou IM (**BÉPANTHÈNE** et **BIOTINE**) ; **acides aminés soufrés + vitamine B6 per os (CYSTINE B6)** quasiment sans intérêt dans cette alopécie, contrairement à l'**effluvium** télogène survenant après un choc psychologique, une intervention chirurgicale, une forte fièvre ou un accouchement.

##### • Minoxidil.

Le traitement local actuellement le plus efficace est le **minoxidil (ALOPEXY)** lotion à 5 % ou à 2 %, à raison de 2 appl./j au long cours, avec une action dès le 2<sup>e</sup> mois chez les sujets répondeurs et maximum en 3 à 4 mois ; ce traitement est efficace chez les sujets répondeurs tant qu'il est utilisé.

##### • Autres traitements

Les autres lotions ayant un intérêt mais restant moins efficaces que **minoxidil** sont :

##### **AMINEXIL** et **MAXILÈNE**.

Le **finastéride PROPÉCIA**, inhibiteur de la 5 $\alpha$ -réductase de type 2 utilisé dans le traitement de l'adénome de prostate, est disponible dans cette indication à raison de 1 cp./j.

Traitement antiandrogène chez la femme (**acétate de cyprotérone + œstrogène**).

##### Traitement chirurgical

Il fait essentiellement appel aux micro-greffes de cheveux, réalisées sous anesthésie locale à partir de follicules pileux occipitaux réimplantés un par un sur la zone alopécique.

## ANTIALOPÉCIQUES

## ■ Minoxidil

<b>ALOPEXY</b>					
Alopécie androgéno-génétique : 2 appl./j sur les zones alopéciques du cuir chevelu sec en massant légèrement	180 mL (3 fl. de sol. 2 %)			NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)			NR	
<b>ALOSTIL</b>					
Idem <b>ALOPEXY</b>	180 mL (3 fl. de sol. 2 %)			NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)			NR	
<b>MINOXIDIL BAILLEUL</b>					
Idem <b>ALOPEXY</b>	1 mL (3 fl. de sol. 2 %)		II	NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateur périphérique.

**INDICATIONS**

Alopécie androgéno-génétique.  
Autres alopecies, non cicatricielles (pelade).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Appliquer sur le cuir chevelu sec, ne pas utiliser de sèche-cheveux après application (diminution de l'efficacité) et se laver les mains.  
Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

## ■ Finastéride

<b>PROPÉCIA</b>					
Alopécie androgéno-génétique 1 cp./j, minimum 3 à 6 mois	28 cp. 1 mg		I	NR	
	84 cp. 1 mg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la 5 $\alpha$ -réductase de type 2.

**INDICATIONS**

Stades peu évolués de l'alopécie androgéno-génétique chez l'homme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Femme et sujet < 18 ans.  
Hypersensibilité connue au produit.

Surveiller l'apparition d'effets systémiques.  
Ne pas utiliser chez la femme les formes à 5 %.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation locale (7,5 %).  
Sensibilité au propylène glycol (excipient).  
Rares : vertiges, céphalées, hypertrichose temporaire, alopécie paradoxale.  
Exceptionnels : effets systémiques hypotenseurs avec tachycardie et rétention hydrosodée, polymyalgies, élévation des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Guanéthidine** : risque d'hypotension orthostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne doit pas être prescrit chez la femme.  
Ne pas utiliser avant l'âge de 18 ans.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares (1/100 à 1/1 000) et transitoires, réversibles en cours ou à l'arrêt du traitement :  
– Troubles de l'érection.  
– Diminution de la libido et du volume de l'éjaculat.



## ALOPÉCIES (2)

**Pelade**

Maladie auto-immune caractérisée par sa survenue brutale, parfois après un choc psychologique (en fait rarement noté en pratique).

**Formes mineures et moyennes**

- Lotion rubéfiante sur les plaques alopéciques.
- Corticothérapie locale : **DERMOVAL gel** sur les plaques x 1/j, associé au **minoxidil** ou au **dioxyanthranol** ; le **dioxyanthranol** est utilisé en préparation magistrale :
  - **dioxyanthranol** 0,2 % ;
  - **acide acétylsalicylique** 0,2 % ;
  - **anthrabase** qsp 40 mL.

On le prescrit en *short contact therapy* de 15 min/j en augmentant à 30 min puis à 45 min et en augmentant la concentration si pas de réponse à 1 mois.

**Zinc, RUBOZINC** : 4 gél./j en 2 prises.

Parfois abstention thérapeutique en cas

de tendance à la repousse spontanée (ce qui est la règle dans les formes en petites plaques).

**Formes majeures (en plaques > 50 % du cuir chevelu, ophiasique étendue, décalvante totale, universalis)**

- PUVAthérapie corporelle totale.
- En cas d'échec attesté par l'absence de repousse après 30 séances ou par une repousse < 30 % à la 40<sup>e</sup> séance, allergénothérapie de contact uniquement en milieu hospitalier.
- Discussion d'une corticothérapie générale en cas de chute importante diffuse à 1 mg/kg/j de **prednisone**, rapidement dégressive, voire **méthotrexate**.
- Dans tous les cas l'abstention thérapeutique se discute (50 % de repousse spontanée dans les 6 mois) et une psychothérapie de soutien est de mise dans ces formes diffuses.

**Étiologies et traitements des alopécies****Circonsrite non cicatricielle**

- Pelade.
- Teigne : **griséofulvine**.
- Trichotillomanie : suppression du tic.
- Syphilis secondaire : **extencilline**.

**Diffuse non cicatricielle**

- Androgéno-génétique.
- *Effluvium télogène* : **vitamines B5** et **vitamines H** en IM, 1 à 2 amp. de chaque x 3/sem. pendant 3 sem. et relais *per os* 2 cp. de chaque x 2/j pendant 6 sem.
- Pathologie générale (dysthyroïdie, insuffisance antéhypophysaire, médicaments, carence en fer, etc.) : traitement de la cause.

**Circonsrite cicatricielle**

- Pseudo-pelade (idiopathique, lupus érythémateux, lichen plan, sclérodermie) : **dermocorticoïde de classe I**.
- Cancer cutané primitif (basocellulaire) ou secondaire (métastase d'un adénocarcinome mammaire) : traitement de la cause.
- Traumatisme : traitement esthétique.
- Infection chronique (folliculites, kérion, favus) : antibiothérapie, **antifongiques**.
- Maladies bulleuses : traitement de la cause.
- Surcharge métabolique (mucinoïse, amylose) : traitement de la cause.

## ECZÉMAS (1) – ECZÉMA DE CONTACT

L'eczéma est une dermatose prurigineuse, érythémateuse et microvésiculeuse en placards, volontiers diffuse. On distingue l'eczéma de contact et l'eczéma atopique principalement.

L'eczéma de contact est dû à une sensibilisation à un allergène par contact avec l'épiderme.

### Principaux allergènes de contact environnementaux

- Nickel (bijoux +++, médaillon de ceinturon, boutons de jeans, etc.).
- Chrome (ciment ++, cuirs ++, métaux, etc.).
- Cobalt (bijoux +++, etc.).
- Colophane (sparadraps, etc.).
- Baume du Pérou (stick labial +++, tulle gras +++, propolis, etc.).
- Formaldéhyde (= conservateur).
- Caoutchouc.

Autres : lanoline, PPD, sulfate de néomycine, résine formaldéhyde paratertiaire butylphénol, plantes (frullania).

### Traitement local de la poussée

#### • Antiseptiques.

*Si l'atteinte est diffuse, en bain quotidien :*  
ex. : **PERMANGANATE DE POTASSIUM  $KMnO_4$**  au 1/10 000<sup>e</sup> (1 sachet de 500 mg pour 5 L d'eau de façon à obtenir une coloration rosée couleur étiquette d'Évian).

*Si l'atteinte est localisée :* ex. : **chlorhexidine, (BISEPTINE)** : 1 à 2 appl./j.

• **NITRATE D'ARGENT AQUEUX 1 %** sur les lésions suintantes.

• **Dermocorticoïdes** avec décroissance rapide, ex. : **DIPROSONE** pommade : 1 appl. le soir pendant 5 j, 1 soir/2 pendant 5 j x 2/sem. pendant 1 sem.

### Traitement général

• **Antihistaminiques  $H_1$** , efficaces par sédation, sinon intérêt discutable dans l'eczéma.

• **Anxiolytique antihistaminique  $H_1$ , hydroxyzine (ATARAX)** : 25 mg au coucher.

• Antibiothérapie si impétiginisation :

– *locale*, ex. : **FUCIDINE** crème 1 appl./j, pendant 1 sem. ;

– *orale*, ex. : **macrolide, JOSACINE** : 1 mesure/kg/prise x 2/j, 1 sem.

### Traitement de fond

Il n'y a pas de désensibilisation possible à un allergène de contact. **L'exclusion définitive est nécessaire.**

Après enquête allergologique, on doit remettre au patient une liste des produits à éviter contenant l'allergène responsable et lui proposer d'éventuels substituts ne contenant pas cet allergène.

Exemple : pour l'eczéma de contact au caoutchouc naturel (latex), *éviter les contacts avec les objets suivants :*

- gants ménagers ;
- ballons ;
- raquettes de tennis et de squash ;
- biberon et sucette ;
- chambre à air ;
- bonnet de bain, lunettes de piscine, tubas ;
- ruban adhésif ;
- préservatifs ;
- semelles de crêpe de chaussure.

Port de gants sans latex (**DERMAPRÈNE Ultra Ansell**, en caoutchouc synthétique) ou port de sous-gants en coton ou en vinyle ou en latex doublés de polyuréthane.

## DERMOCORTICOÏDES (1) – DERMOCORTICOÏDES DE CLASSE IV

## ■ Clobétasol propionate

DERMOVAL					
Indications préférentielles : eczémas, lichen, psoriasis et lupus érythémateux chronique ; 1 à 2 appl./j À renouveler en cas de dermatose suintante Décroissance toujours progressive	10 g (crème 0,05 %) 20 mL (gel 0,05 %)	2,25	I	65 %	0,22
		3,29	I	65 %	0,16
CLARELUX Gé					
A. et E. > 12 ans : 1 à 2 appl./j	10 g (crème 500 µg/g)	2,07	I	65 %	0,41
CLARELUX					
A. : 1 à 2 appl./j Dose max. : 1/2 fl./sem. (50 g)	100 g (mousse 500 µg/g)	14,67	I	65 %	0,15

## ■ Bétaméthasone dipropionate + propylène glycol

<b>DIPROLÈNE</b>					
Idem <b>DERMOVAL</b>	15 g (pomm. 0,05 %)	2,52	I	65 %	0,17

## ECZÉMAS (2) – DERMATITE ATOPIQUE

Encore appelée *eczéma constitutionnel* cette dermatose s'intègre dans un tableau déterminé génétiquement : le **terrain atopique**, qui prédispose à l'apparition de manifestations allergiques (**eczéma**, **asthme**, **rhinite** et **conjonctivite**).

### Traitement de la poussée [1]

#### Traitement local

- **Antiseptiques** : rarement utilisés ; cf. Eczéma de contact.
- **NITRATE D'ARGENT AQUEUX 1 %** sur les lésions suintantes.
- **Dermocorticoïdes**, ex. : **bétaméthasone (BETNEVAL** crème) : 1 appl. le soir pendant 1 sem., 1 soir/2 pendant 2 sem. puis x 3/sem. pendant 3 sem.
- **Tacrolimus (PROTOPIC)**.
- **Émollients**, ex. : **LIPIKAR** : application après la toilette le matin sur tout le corps et le visage, et le soir en relais des **dermocorticoïdes**.

#### Traitement général

- **Antihistaminiques H<sub>1</sub>** : peu efficaces en réalité sauf si sédatifs.
- **Anxiolytique antihistaminique H<sub>1</sub>**, si besoin et fonction de l'âge, **hydroxyzine (ATARAX)** : 25 mg au coucher (séable).
- Antibiothérapie si surinfection patente :
  - *locale*, ex. : **FUCIDINE** crème 2 appl./j, pendant 1 sem. ;
  - *orale*, ex. : **macrolide, JOSACINE** : 50 mg/kg/j, pendant 1 sem.
- Photothérapies (UVB seuls en première intention, PUVA, **UVB + UVA**) en cas de dermatite atopique résistante à un traitement bien conduit ou pour passer un cap ou pour épargner les **dermocorticoïdes**.
- **Ciclosporine** dans les formes sévères résistantes aux autres traitements (hors AMM, rechutes++).

### Prévention des rechutes

Il n'y a pas de traitement spécifique de la dermatite atopique ; des mesures doivent être prises pour éviter les rechutes.

#### Lutte contre la sécheresse cutanée (xérose)

Elle est impérative. La **peau de l'atopique doit être « graissée »** : huile pour le bain (**TOPIALYSE**), **émollients** quotidiens après la toilette (**LIPIKAR**, **ATODERM**, **COLD CREAM**, préparations magistrales de glycérolé d'amidon) à renforcer en période de stress et de climat sec et froid. Éviter les facteurs qui peuvent aggraver la peau (savons, gels douche, lessives, adoucissant, laine) et utiliser un pain sans savon (**A-DERMA PAIN SURGRAS**), une lotion douce (**CETAPHIL**) pour la toilette ou un surgras liquide (**TOPIALYSE** gel).

#### Autres mesures

**La dermatite atopique est une affection chronique où interviennent plusieurs facteurs à prendre en compte.**

- Éviter les animaux domestiques, les tapis et les moquettes, la fumée du tabac ; aérer le domicile. Bain court et pas trop chaud.
- Éviter le contact avec le virus herpès et traiter rapidement tout herpès déclaré. Il n'y a pas de régime d'exclusion à suivre et les désensibilisations sont inutiles. Il ne faut pas méconnaître une sensibilisation de contact fréquente chez l'atopique et savoir demander des tests épicutanés.
- Les vaccinations peuvent être faites selon le calendrier recommandé : elles seront évitées en poussée d'eczéma.
- Allaitement maternel exclusif recommandé 6 mois (OMS 2003).
- Enquête allergologique souhaitée si évolution défavorable sous traitement bien conduit, si suspicion d'eczéma de contact, si autres signes associés (respiratoires, digestifs, urticaire), si cassure de la courbe de poids ou retard staturo-pondéral.

## DERMOCORTICOÏDES (2) – DERMOCORTICOÏDES DE CLASSE III (1)

## ■ Bétaméthasone valérate

<b>BETNEVAL</b>					
Indications préférentielles : eczémas, lichen, psoriasis et lupus érythémateux chronique ; 1 à 2 appl./j À renouveler en cas de dermatose suintante Décroissance toujours progressive	10 g (crème 0,1 %)	2,02	I	65 %	0,20
	30 g (crème 0,1 %)	2,95	I	65 %	0,10
	100 g (crème 0,1 %)	HOP	I		
	10 g (pomm. 0,1 %)	2,02	I	65 %	0,20
	30 g (pomm. 0,1 %)	2,92	I	65 %	0,10
	100 g (pomm. 0,1 %)	HOP	I		
	15 g (lotion 0,1 %)	2,38		65 %	0,16

## ■ Bétaméthasone dipropionate

<b>DIPROSONE</b>					
Idem <b>BETNEVAL</b>	30 g (crème 0,05 %)	3,80	I	65 %	0,13
	30 g (pomm. 0,05 %)	3,80	I	65 %	0,13
	30 mL (lotion 0,05 %)	3,80	I	65 %	0,13

## ■ Diflucortolone valérate

<b>NÉRISONE</b>					
Idem <b>BETNEVAL</b>	30 g (crème 0,1 %)	3,44	I	65 %	0,11
	30 g (pomm. 0,1 %)	3,44	I	65 %	0,11
<b>NÉRISONE GRAS</b>					
Idem <b>BETNEVAL</b>	30 g (pomm. 0,1 %)	3,44	I	65 %	0,11

## ■ Fluticasone

<b>FLIXOVATE</b>					
AMM chez l'enfant dès 1 an : 1 à 2 appl./j	30 g (pomm. 0,05 %)	4,09	I	65 %	0,14
	30 g (crème 0,05 %)	4,09	I	65 %	0,14

## ECZÉMAS (3)

### Conseils à donner aux parents d'enfants atopiques [1]

- La dermatite atopique, ou eczéma atopique, est une dermatose chronique qui évolue par poussées entrecoupées de rémissions.
- La maladie s'améliore classiquement avec l'âge, mais il existe des formes allant jusqu'à l'âge adulte.

#### Recommandations générales

- Éviter tout contact avec les sujets ayant un herpès en raison du risque de survenue d'une pustulose de Kaposi Juliusberg (herpès généralisé à traiter par **aciclovir (ZOVIRAX)** IV).
- En cas de climat sec et froid, bien se protéger en renforçant l'hydratation cutanée ; en effet les sujets atopiques vont beaucoup mieux sous un climat chaud et humide.
- Éviter le contact avec la laine ; mettre des sous-vêtements en coton à manches longues.
- Éviter les poussières (aérer régulièrement le logement).
- Éviter les animaux domestiques (poils de chats ++).
- Il n'y a pas de régime alimentaire particulier en dehors des très rares cas où un aliment (lait, œufs, poissons, arachide, blé, légumineuses, fruits exotiques) est manifestement responsable de la survenue des poussées d'eczéma.

#### Lutte contre la sécheresse cutanée

- La lutte contre la xérose cutanée est fondamentale, elle est un moyen de prévenir les poussées d'eczéma, elle doit être permanente, quotidienne ; en effet une des caractéristiques de la peau de l'atopique est d'être sèche.
- Les **émollients** sont à appliquer tous les jours sur la peau encore un peu humide, x 1 à 2/j, après la toilette.

#### Traitement des poussées

- Il fait appel aux **dermocorticoïdes**.
- Les **corticoïdes locaux**, prescrits par le dermatologue, suivant des règles précises, ne sont pas dommageables pour l'enfant.
- Il faut respecter la prescription qui doit être expliquée.
- Un traitement dermocorticoïde (classe II sur le visage, III sur le corps) est appliqué en couche mince, sans faire pénétrer, sur les zones atteintes uniquement, x 1/j (voire x 2/j en cas de suintement uniquement) ; arrêt quand disparition des lésions et/ou relais par un émollient.
- Le dermatologue doit être à nouveau consulté en cours de traitement pour réadapter la prescription si besoin.
- Le traitement des poussées doit lutter contre le prurit en utilisant les **dermocorticoïdes**.
- Enfin le traitement des poussées doit lutter contre la surinfection de la peau lorsqu'elle est évidente, à l'aide d'**antibiotiques per os (macrolide)**.

## DERMOCORTICOÏDES (3) – DERMOCORTICOÏDES DE CLASSE III (2)

## ■ Hydrocortisone acéponate

<b>EFFICORT LIPOPHILE</b>					
Traitement des lésions sèches Indications préférentielles : eczémas, lichen, psoriasis et lupus érythémateux chronique 1 à 2 appl./j Arrêt progressif du traitement	30 g (crème 0,127 %)	3,32	I	65 %	0,11
<b>EFFICORT HYDROPHILE</b>					
Traitement des lésions suintantes Indications préférentielles : eczémas de contact, lichénification, dermatite atopique, dysidrose et dermite séborrhéique 1 à 2 appl./j Arrêt progressif du traitement	30 g (crème 0,127 %)	3,32	I	65 %	0,11

## ■ Hydrocortisone butyrate

<b>LOCOÏD</b>					
Indications préférentielles : eczémas, lichen, psoriasis et lupus érythémateux chronique 1 à 2 appl./j À renouveler en cas de dermatose suintante Décroissance toujours progressive	30 g (crème 0,1 %)	3,49	I	65 %	0,12
	30 g (pomm. 0,1 %)	3,49	I	65 %	0,12
	30 mL (lotion 0,1 %)	3,49	I	65 %	0,12
	30 g (émuls. fluide sans alcool 0,1 %)	3,49	I	65 %	0,12
	30 g (crème épaisse 0,1 %)	3,49		65 %	0,12

## ECZÉMAS (4) – DYSIDROSE

### Définition

La dysidrose est une dermatose vésiculeuse, proche de l'eczéma affectant les pieds et les mains et ayant tendance à récidiver.

On distingue plusieurs facteurs favorisants possibles :

- une mycose locale à toujours rechercher ;
- une infection microbienne locale ou régionale ;
- un eczéma de contact au nickel notamment (rare en pratique) ;
- un terrain favorisant : atopie, anxiété, tabagisme.

Le plus souvent aucune cause n'est mise en évidence, il existe une nette recrudescence saisonnière (printemps, été).

### Traitement

#### De la cause

Éviction du nickel, **antifongiques** si mycose, **antibiotiques** si surinfection bactérienne, arrêt du tabac, prise en charge du terrain anxieux.

#### De la poussée

Si le prurit est féroce voire s'il existe des douleurs, les vésicules seront percées avec une aiguille sous-cutanée stérile et asséchées avec du **NITRATE D'ARGENT AQUEUX 1 %**.

- Antisepsie locale si surinfection, ex. : **chlorhexidine (BISEPTINE)** 1 à 2 x/j.
- **Dermocorticoïdes**, ex. : **bétaméthasone dipropionate (DIPROLÈNE pommade)** le soir sous occlusion au début puis décroissance rapide.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la dermatite atopique de l'enfant, SFD, 2005



## GALE

La gale ou scabiose est une parasitose cutanée due à un acarien : *Sarcoptes scabiei hominis*.

Le traitement doit être appliqué de manière simultanée à tous les sujets contacts et à toute la famille, même chez les sujets apparemment indemnes ; ces mesures indispensables doivent être expliquées au patient et à son entourage.

Une hospitalisation courte s'impose chez les sujets vivant dans des conditions sociales défavorables, dans les formes très profuses, surinfectées, ou eczématisées.

### Traitement antiscabieux

#### Mesures non spécifiques

- Dans les formes surinfectées, bains antiseptiques associés à une antibiothérapie générale si nécessaire.

Ex. : **HIBITANE 5 %** : 1/2 fl. dans une baignoire d'eau tiède, pendant 15-20 min et **PYOSTACINE 2** à 3 g/j pendant 1 sem.

- Dans les formes eczématisées, utiliser des **émollients** et des **dermocorticoïdes** pendant environ 48 h avant de débuter le traitement antiscabieux.

Ex. : **CÉRAT DE GALIEN** le matin après un bain antiseptique et **BETNEVAL** crème le soir.

#### Mesures spécifiques

- Traitement oral : **ivermectine (STROMECTOL)** : 200 µg/kg en 1 prise.

Traitement local associé si lésions nombreuses ++++ car effet immédiat.

- J0 au soir : à la sortie du bain sur la peau bien rincée et encore humide : 1<sup>er</sup> badigeon d'**ASCABIOL** lotion 10 % appliquée sur tout le corps sans oublier les organes génitaux externes et les plantes des pieds, mais en respectant le visage et le cuir chevelu.

Vêtements propres pour la nuit, après séchage des badigeons.

- J1 le matin : pas de toilette ; en cas de lavage des mains, le patient doit de nouveau appliquer **ASCABIOL**.

- J1 le soir : nouveau bain suivi d'un 2<sup>e</sup> badigeon si lésions importantes, à garder 24 h.

- J2 le soir : bain et rinçage définitif.

Une nouvelle application peut être indiquée une semaine plus tard.

- Si persistance d'un prurit ou présence de nodules scabieux, après avoir éliminé une réinfestation ou un traitement mal conduit : **BETNEVAL** crème le soir de façon dégressive sur 3 sem. et **émollients (LIPI-KAR, CÉRAT DE GALIEN, COLD CREAM)** le matin et en relais du **dermocorticoïde**.

- **Antihistaminique sédatif**

Ex. : **dexchlorphéniramine (POLARAMINE)** : 1 cp. à 2 mg x 3 à 4/j.

- Chez le nourrisson, on effectue un seul badigeon d'**ASCABIOL** posé moins de 12 h.

- Chez l'enfant, on limite les temps d'application de l'**ASCABIOL** à 12 h.

### Mesures d'accompagnement

**Prévenir que le prurit peut persister 15 j après traitement.**

- Les **ongles** du patient sont coupés courts et brossés avec un **antiseptique (PLUREXID savon moussant)**.

- **Désinfection du linge** : linge de corps, linge de toilette et literie sont désinfectés soit par lavage en machine à 60 °C pour ce qui peut l'être, soit par pulvérisation du linge avec **A-PAR aérosol** dans un sac-poubelle fermé pendant 72 h.

- **Éviction scolaire** inutile si traitement bien fait ; pas d'éviction pour les sujets contacts mais examen et traitement en cas de symptômes.

- On conseillera l'**isolement du patient hospitalisé** en chambre seule, et des mesures de prévention élémentaires telles que le port de gants afin d'éviter la contamination du personnel soignant, surtout dans le cas de gales profuses.

### Gale norvégienne

Décapage des lésions par **VASELINE SALICYLÉE** de 10 à 20 % pendant quelques jours puis badigeons d'**ASCABIOL** selon le même schéma mais répétés plusieurs fois à quelques jours d'intervalle, ou **ivermectine (STROMECTOL)** : 200 µg/kg en une prise orale à renouveler 1 fois si besoin.

## PÉDICULOSES

Les pédiculoses sont des parasitoses exclusivement humaines dues à des insectes. Il en existe trois types :

- la pédiculose du cuir chevelu due à *Pediculus humanus capitis* ;
- la pédiculose du corps due à *Pediculus humanus corporis* ;
- la phthiriasie pubienne due à *Phthirus inguinalis*.

### Pédiculose du cuir chevelu

- **Malathion** (lotion) appliqué raie par raie et gardé 12 h pendant la nuit sous un bonnet ; puis shampoing normal. Idem J10.
- Literie, bonnets, écharpes, brosses et peignes seront soigneusement lavés à 60 °C ou isolés dans un sac-poubelle soit 15 j soit 48 h avec un spray **A-PAR**. Pulvériser spray **A-PAR** sur les dossiers des fauteuils, canapés, sièges de voiture.
- Examen de tous les sujets contacts et traitement +++ (école, famille).
- Des nouvelles molécules :
  - à base d'huile de coco (**APASYL POUX, PARANIX**),
  - à base de diméticone (**ITAX, ALTOPOUX**),
 empêchent la respiration des poux et des lentes. Deux à 3 applications de 10 à 20 min sont nécessaires à une semaine d'intervalle.

Les shampooings antipoux, les répulsifs sont inutiles et sources de résistances ; il est fondamental de retirer à la main les lentes +++ dans les jours qui suivent le traitement.

### Pédiculose corporelle

- Bain antiseptique : **HIBITANE 5 %** 1/2 fl. dans une baignoire d'eau tiède, pendant 15 à 20 min.
- **Pyréthrine** ou **malathion** en lotion 12 h sur le corps puis bain à nouveau.
- Désinfection du linge +++ soit en machine à 60 °C, soit dans un grand sac pendant 48 h avec **A-PAR aérosol**.

### Phthiriasie pubienne

- **Malathion** (lotion) à appliquer sur les poils bien secs, à rincer au bout de 12 heures.
  - Port d'un slip poudré avec **A-PAR aérosol** pendant 12 heures.
  - Renouveler le lendemain et à une semaine.
  - Enlever les lentes à la pince ou raser les poils.
  - Désinfection du linge comme précédemment décrit.
  - Recherche et traitement des partenaires sexuels.
  - Recherche d'une autre infection sexuellement transmissible associée.
  - Dans les formes impétiginisées : soins antiseptiques locaux : **chlorhexidine (BISEPTINE solution)** et antibiothérapie générale : **JOSACINE 2 g/j** pendant 1 sem.
- Pas d'éviction scolaire si traitement ; en revanche les élèves au contact d'un sujet contaminé seront tous prévenus, examinés et si nécessaire traités immédiatement afin de rompre la chaîne de contamination.

**INFECTIONS CUTANÉES BACTÉRIENNES (1) – IMPÉTIGO**

Dermatose bactérienne initialement bulleuse due à un streptocoque A bêta-hémolytique et/ou à un staphylocoque doré, très contagieuse survenant par petites **épidémies**, en particulier dans les **collectivités** d'enfants.

**Traitement local**

Il repose sur les **antiseptiques**.

**Chlorhexidine (BISEPTINE spray ou SEP-TÉAL)** : 2 appl./j sur les lésions.

- Toilette avec savon antiseptique **SEPTIVON** à bien rincer.
- **Pommades antibiotiques antistaphylococciques**.

Ex. : **FUCIDINE** : 2 appl./j jusqu'à disparition des lésions, environ 10 j.

- Ablation des croûtes, sans les arracher.

**Traitement général**

Il est essentiellement dirigé contre le streptocoque.

Il est discuté dans les formes mineures, mais il permet de diminuer le nombre des récurrences et d'agir rapidement : antibiotique de la famille des **macrolides**.

Ex. : **josamycine (JOSACINE)** : 50 mg/kg/j en 2 prises pendant 10 j.

**Mesures associées**

- Éviction scolaire, réduite à 48 h en cas d'antibiothérapie générale.
- Hygiène rigoureuse, ongles coupés courts et brossés avec un savon antiseptique **CYTÉAL**.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX

## ■ Mupirocine

<b>MUPIDERM</b>					
Impétigo et dermatoses impétiginisées 2 à 3 appl./j pendant 5 à 10 j	15 g (pom. 2 %)	6,33	I	30 %	0,42

## ■ Acide fusidique

<b>FUCIDINE</b>					
Infections cutanées bactériennes Éradication du portage dans les staphylococcies cutanées récidivantes 2 à 3 appl./j	15 g (cr. ou pom. 2 %)	3,06	I	30 %	0,20

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques à usage local, ayant une action antistaphylococcique et sur de nombreux autres germes en raison des concentrations élevées (bactéricides) obtenues *in situ*.

## INDICATIONS

Éradication du portage nasal de staphylocoque doré dans les staphylococcies récidivantes (pour **FUCIDINE** uniquement, pas pour **MUPI-  
DERM** selon les mentions du *Vidal* et l'AMM).  
Traitement des dermatoses cutanées infectieuses (impétigo, folliculite bactérienne, etc.).

## ■ Sulfadiazine argentine

<b>FLAMMAZINE</b>					
1 appl./j	50 g (cr. 1 %) 500 g (cr. 1 %)	3,91	I	15 % NR	0,08

## ■ Sulfadiazine argentine + nitrate de cérium

<b>FLAMMACÉRIUM</b>					
1 appl./j pendant 1 sem. puis tous les 2-3 j	500 g (cr. 1 % stérile)	HOP	I	NR	

## PROPRIÉTÉS

**Sulfadiazine** : sulfamide bactériostatique.  
**Argent** : pouvoir bactéricide.

## MICROBIOLOGIE

Gram (-) tels que *Pseudomonas aeruginosa*,  
*Aerobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*.  
*Staphylococcus aureus*.

## INDICATIONS

**FLAMMAZINE** : infections cutanées bactériennes, plaies infectées et brûlures.

**FLAMMACÉRIUM** : brûlures étendues avec lésions profondes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Application sur les yeux, et sur les seins chez la femme qui allaite.

Ne pas utiliser **MUPIDERM** sur la muqueuse nasale (**BACTROBAN** est réservé pour cette indication en milieu hospitalier).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risques d'émergence de souches résistantes.  
Ne pas utiliser la **mupirocine** sur de grandes surfaces (< 20%).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Cf. Précautions d'emploi.

## CONTRE-INDICATIONS

Sensibilisation connue aux sulfamides.  
Nouveau-né, prématuré, fin de gestation (3<sup>e</sup> trim.), allaitement (risque d'ictère nucléaire du nouveau-né).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déficit en G6PD : risque d'hémolyse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Anticoagulants oraux** : nombreux cas rapportés d'augmentation de leur activité, déséquilibre de l'INR.

**INFECTIONS CUTANÉES BACTÉRIENNES (2) – ÉRYSIPÈLE**

Infection cutanée dermo-hypodermique due, dans sa forme typique, à un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A ; d'autres germes (streptocoques d'autres groupes, staphylocoque doré, bactéries Gram négatif) peuvent être responsables de dermo-hypodermites bactériennes prenant l'aspect d'un érysipèle.

L'hospitalisation est de rigueur dans les formes sévères ou sur un terrain fragile (diabète, sujet âgé, etc.). Dans les autres cas, un traitement ambulatoire est possible (amoxicilline 3 à 4 g/j pendant 15 j).

**Mise en condition du patient**

- Hospitalisation en milieu médical.
- Repos au lit.
- Mise en place d'un arceau pour éviter le contact douloureux de la peau avec les draps.
- Voie veineuse périphérique.

**Antibiothérapie [1]****Forme typique**

En première intention, on propose de la **PÉNICILLINE G** par voie IV : posologie adaptée au poids : 200 000 UI/kg/j en 6 inj. (ex. : 90 kg = 3 MUI x 6/j) ou **amoxicilline** 1 g x 3/j. Relais *per os* après 48 h d'apyrexie par **amoxicilline** 1 g x 3/j pour une durée totale de 15 j à 3 sem.

**Doute sur l'origine streptococcique**

Dans les cas où l'érysipèle ne réalise pas la forme typique (grosse jambe rouge aiguë fébrile), l'origine streptococcique peut être remise en cause et une autre antibiothérapie doit être prescrite. Les situations principales sont : sujet jeune, maladie générale notamment diabète

avec mal perforant plantaire, ulcère de jambe, morsure animale.

En cas de doute sur l'origine streptococcique : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 1 g IV lente x 3/j et relais *per os* à la même dose pour une durée totale de 3 sem.

**Mesures associées [1]**

- Traitement de la porte d'entrée cutanée : soins d'ulcères, de plaies, d'intertrigo interorteil, etc.

Ex. : antiseptie de plaies cutanées par éraflures par **BÉTADINE solution** dermique 10 % x 2/j pendant 1 sem.

- Anticoagulation préventive s'il existe des facteurs de risque de thrombose veineuse associés.

Ex. : **LOVENOX** 0,2 mL SC x 1/j jusqu'à amélioration des signes inflammatoires et reprise normale de la marche.

- Vaccination antitétanique à jour.

**Prévention des récurrences [1]**

Quel qu'en soit le siège, l'**érysipèle récidive souvent** (persistance de facteurs favorisants locaux, comme une insuffisance veineuse, un lymphœdème ou des plaies). On effectue alors des soins locaux quotidiens, un traitement énergétique de l'insuffisance veineuse par contention des membres inférieurs et on conseille une hygiène rigoureuse. Une antibiothérapie au long cours est nécessaire.

Ex. : **pénicilline G (EXTENCILLINE)**, 2,4 MU en IM toutes les 3 sem. au long cours ou **ORACILLINE** 2 à 3 MU/j.

Le traitement de l'érysipèle de la face est identique à l'exception de l'anticoagulation préventive qui est inutile.

## INFECTIONS CUTANÉES BACTÉRIENNES (3) – FURONCLES – ANTHRAX

### Définitions

#### Furoncles

Ce sont des folliculites profondes à staphylocoque doré atteignant préférentiellement l'adolescent et l'adulte jeune.

#### Anthrax

C'est un agglomérat de furoncles, réalisant un placard inflammatoire avec des signes généraux fréquents.

#### Traitement

L'hospitalisation est indiquée en cas de fièvre.

#### Traitement local

- Ne pas manipuler.
- Antiseptie locale.

Ex. : **chlorhexidine (BISEPTINE)** sur les lésions x 1 à 2/j, associée à une toilette avec **SEPTIVON**.

- Hygiène correcte fondamentale, avec lavages des mains pluriquotidiens lors des situations de la vie courante et brossage des ongles avec un savon antiseptique type **CYTÉAL**.

- Antibiothérapie locale dans les gîtes réservoirs de staphylocoque (nez, anus, conduits auditifs externes, creux axillaires)  
Ex. : **FUCIDINE pommade** 2 applications/j pendant 5 jours.

#### Traitement général

Il est indiqué en cas de furoncles multiples et/ou récidivants : **antibiotique** antistaphylococcique.

Ex. : **amoxicilline-acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 1 g x 3/j pendant 15 j.

En cas de furunculose, on recherchera un **diabète** associé, une prise de **corticoïdes** au long cours, un contage familial.

## INFECTIONS CUTANÉES BACTÉRIENNES (4) – ÉRYTHRASMA

Infection bactérienne due à *Corynebacterium minutissimum*, localisée préférentiellement à la face interne des cuisses et dans les grands plis, réalisant un intertrigo.

#### Traitement local

**Imidazolé** ou **macrolide** local :

**Éconazole (PEVARYL)** : 2 appl./j pendant 15

à 21 j, ou **érythromycine (ERYFLUID)** lotion 4 % idem.

#### Traitement général

Associé au traitement local pour éviter les fréquentes récurrences, **macrolide** : **josamycine (JOSACINE)** : 1 g x 2/j, pendant 10 j.

### CONSENSUS

[1] Érysipèle et fasciite nécrosante : prise en charge, *SPILF* et *SFD*, 2000

## INTERTRIGO (1)

Les plis sont le siège d'une augmentation de température, d'humidité, d'une élévation du pH et d'obscurité. Il existe une augmentation du niveau moyen de colonisation bactérienne avec présence habituelle de grandes quantités de staphylocoques dorés et *epidermidis*, de BG- (*Acinetobacter*), et de levures (*Candida albicans*).

La plupart des intertrigos des grands plis sont multifactoriels (macération, irritation, prolifération bactérienne, mycose, terrain psoriasique, voire sensibilisation secondaire à l'application de topiques).

En dehors des principales causes (irritation, bactéries, mycoses, psoriasis, eczéma), il existe des causes rares (pemphigus, carence en zinc, histiocytose, Darier, syphilis).

À bannir : prescription de topiques gras, de solutions « tout en 1 » type **MYCOLOG**.

À faire : supprimer les facteurs favorisants, sécher, limiter les topiques, désinfecter avec nitrate d'argent aqueux 1 % et lait imidazolé.

### Intertrigo à dermatophytes des grands plis (plis inguinaux +++)

Homme davantage atteint que femme et enfant ; atteinte unilatérale possible ;

début face interne des cuisses puis extension centrifuge avec éclaircissement central, bistre, squameux et bordure active vésiculeuse, inflammatoire.

- Antisepsie, séchage +++ et **imidazolé** local.

Ex. : **BÉTADINE dermique 10 %** x 2/j pendant 8 j et **éconazole (PEVARYL** poudre) x 2/j pendant 15 j.

- S'aider du sèche-cheveux pour bien sécher les plis après la toilette.

- Linge de toilette lavé à 60 °C en machine.

- Vêtements et sous-vêtements amples.

### Intertrigo à dermatophytes des petits plis (pied d'athlète)

- Antisepsie, séchage +++ et **imidazolé** local comme ci-dessus.

- Traiter tous les espaces interdigitaux des 2 côtés, port de chaussettes en coton changées tous les jours et lavées en machine à 60 °C, éviter les chaussures très fermées, notamment les baskets, séchage fondamental après la toilette +++.

- Pulvériser **PEVARYL** poudre dans toutes les chaussures et chaussons habituellement portés, x 1/j jusqu'à la fin du flacon.

## INTERTRIGO (2)

### Intertrigo à *Candida*

- Facteurs favorisants, pustulettes en périphérie.

- Application locale d'un **antiseptique**, séchage puis **imidazolé** local.

Ex. : **BÉTADINE dermique 10 %** solution puis **éconazole (PEVARYL)** poudre) x 2/j, pendant 15 j.

### Érythrasma

Plaques face interne cuisse, couleur charmois, bien limitée, rouge pourpre en lumière de Wood.

#### Traitement local

**Imidazolé** ou **macrolide** local : **éconazole (PEVARYL)** : 2 appl./j pendant 15 à 21 j, ou **érythromycine, ERYFLUID** lotion 4 % idem.

#### Traitement général

Associé au traitement local pour éviter les fréquentes récurrences, **macrolide (JOSACINE)** : 1 g x 2/j, pendant 10 j.

### Autres intertrigos bactériens (staphylocoques, streptocoques, plus rarement bacilles Gram-)

- Recherche et traitement de facteurs favorisants (mauvaise hygiène, diabète, microtraumatismes locaux, mycose sous-jacente).

- **Antiseptique**, séchage +++, **antibiotique local**.

Ex. : **PRIMYXINE** : pommade 1 appl. matin et soir pendant 10 j.

### Dermite irritative et psoriasis

Ce sont les principales causes d'intertrigos.

- Arrêt des facteurs locaux favorisants (frottements, topiques, cosmétiques, lessives et adoucissants mal rincés).

- **Nitrate d'argent** si suintant, séchage et **dermocorticoïde**.

Ex. : **Nitrate d'argent** aqueux 1 % puis séchage et **LOCOÏD** émulsion : x 1 à 2/j pendant 4 j puis 1 j sur 2 pendant 1 sem. et relais par **CYTELIUM A-DERMA spray**.

### Eczémas

- Arrêt d'un facteur contact.

- **Antiseptique**, séchage et **dermocorticoïde**.

Ex. : **chlorhexidine** aqueuse (**SEPTÉAL**) puis séchage et **LOCOÏD** émulsion fluide : x 2/j pendant 5 j puis 1 j sur 2 pendant 1 sem. puis x 2/sem. pendant 2 sem.

- Hydratation quotidienne en relais du **dermocorticoïde (LIPIKAR)** après la toilette et toilette avec un pain surgras (**A-DERMA**) ou un surgras liquide (**AVÈNE GEL COLD CREAM**).



## LUCITE ESTIVALE BÉNIGNE

Éruption idiopathique déclenchée par le soleil pour une exposition inhabituelle sur les régions habituellement non exposées. On différenciera la lucite estivale de la lucite polymorphe, du lupus érythémateux, d'un eczéma ou d'une urticaire.

### Traitement en première intention

Il n'y a pas de lucite estivale sans UV donc une bonne protection contre les UV est évidemment indispensable et elle est d'abord vestimentaire puis à défaut par crème écran solaire indice 50+ correctement et régulièrement appliquée.

**PHOTODERM ORAL** : 2 cp./j en 1 prise, à débuter 15 j avant l'exposition solaire et à poursuivre pendant les 2 à 3 sem. du séjour au soleil.

### Traitements alternatifs

- Antipaludéens de synthèse (**PLAQUENIL** ou **NIVAQUINE**) : 2 cp./j, à débuter 7 j avant le départ et à poursuivre les 15 premiers j

du séjour. La posologie est fonction du poids idéal (taille en cm - 100 - 10 % pour les hommes - 15 % pour les femmes) avec un maximum de 3,5 à 4 mg/kg/j pour **NIVAQUINE** et 6 à 6,5 mg/kg/j pour **PLAQUENIL**.

- Vitamine PP (**NICOBION**) : 3 g/j en 3 prises, 2 j avant l'exposition solaire.

### En cas d'échec du traitement médical

Photothérapies PUVA ou UVB TLO1 dans les cas extrêmement invalidants, après explication du caractère carcinogène des UV. Le rapport bénéfice/risque doit être discuté avec le patient. Prise en charge par la Sécurité sociale.

### Mesures systématiquement associées à tous les traitements

- Vêtements +++.
- Photoprotection externe avec filtres anti-UVA, anti-UVB et anti-IR (**AVÈNE 50+**, **ANTHÉLIOS 50+**, **PHOTODERM MAX 50+**) renouvelée toutes les 2 h.

**INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (1)****Définition**

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des maladies infectieuses transmises par voie sexuelle, localisées ou généralisées. La pathologie VIH et l'hépatite B sont envisagées dans d'autres chapitres (cf. Sida, Hépatites).

**Mesures générales à toutes les IST**

- Rechercher les autres IST possiblement associées (prélèvements bactériologiques locaux et sérologies syphilis, VIH et hépatite B).
- Rechercher et traiter le ou les partenaires sexuels.
- Contrôle clinique en fin de traitement et

microbiologique si les symptômes persistent.

- Informer sur les risques liés aux IST (cancers du col de l'utérus dus aux HPV (*Papillomavirus*), transmission de maladies graves : VIH et hépatite B, 1<sup>re</sup> cause de stérilité tubaire : *Chlamydia trachomatis*).
- Abstinence ou rapports sexuels protégés pendant la durée du traitement.

**4 IST à déclaration obligatoire (lois 1942 et 1948)**

- Syphilis
- Gonococcie
- Chancre mou
- Maladie de Nicolas-Favre

**Conduite à tenir devant une urétrite avec écoulement**

- Écouvillonnage avec un écouvillon en coton pour examen direct à l'état frais et frottis coloré sur lame.
- Second écouvillonnage pour cultures (gonocoques et germes banaux).
- Prélèvement endo-urétral à l'écouvillon en plastique, placé ensuite dans un milieu de transport pour culture de *Chlamydia trachomatis* (+ éventuelle PCR *Chlamydia* et *Mycoplasma genitalium*).
- Mise en culture du premier jet d'urine (+ éventuelle PCR *Chlamydia*).
- Sérologies VIH, hépatite B, syphilis.

**IMMUNOMODULATEUR**■ **Imiquimod**

<b>ALDARA</b>					
3 appl./sem. au coucher : contact de 6 à 10 h Applications poursuivies jusqu'à disparition ; pour 16 sem. max.	12 sach. de crème 5 % usage unique	62,37	I	65 %	5,20

**PROPRIÉTÉS**

Cytokine immunomodulatrice.

Induction de synthèse d'interféron alpha par les cellules immunitaires répondeuses.

**INDICATIONS**

Traitement local des verrues génitales et péri-anales externes de l'adulte (condylomes).

Traitement des petits carcinomes basocellulaires superficiels.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Applications déconseillées sur les lésions du prépuce chez les patients non circoncis.

- Verrues génitales ou anales internes : pas d'étude d'évaluation.

- Pas d'occlusion par pansement.

- Pas d'application sur peau lésée (ex. : après cryothérapie).

- Enlever la crème avant un rapport sexuel (elle fragilise les moyens contraceptifs ou de protection locaux).

- Grossesse et allaitement : aucune information disponible.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions cutanées locales.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Non étudiées avec les **immunosuppresseurs** : prudence chez les greffés.

## INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (2)

### Syphilis

Le traitement est obligatoire (recours aux forces de l'ordre si besoin).

#### Syphilis I, II et latente < 1 an

- **Pénicilline G retard.**

Ex. : **EXTENCILLINE** : 2,4 M d'UI IM en 1 fois (1,2 M d'UI dans chaque fesse).

- Éventuellement prévention de la réaction d'Herxheimer dans les syphilis II et latente < 1 an par **prednisone (CORTANCYL)** 30 mg/j, les premiers jours du traitement antibiotique.

- Si contre-indication aux **pénicillines** :
  - **érythromycine (ÉRYTHROCINE)** 500 mg x 4/j *per os* pendant 14 j ou ;
  - **doxycycline (GRANUDOXY)** 100 mg x 2/j *per os* pendant 14 j.

#### Syphilis latente > 1 an et syphilis III

Prévention de la réaction d'Herxheimer par **prednisone (CORTANCYL)** 1/2 mg/kg/j la veille et les 3 premiers jours du traitement antibiotique.

► *En cas de neurosyphilis, de syphilis oculaire*

- **Pénicilline G** en hospitalisation : 0,5 M d'UI/kg/j en 6 perfusions/4 h pendant 14 j.
- Si contre-indication aux **pénicillines** : **érythromycine** 500 mg x 4/j pendant 28 jours ou **doxycycline** 200 mg/j pendant 21 à 28 jours.

► *En l'absence d'atteinte neurologique centrale*

- **Pénicilline G retard** en hospitalisation au début : **EXTENCILLINE** 2,4 M d'UI IM/sem., à J1, J8 et J15 (1,2 M d'UI dans chaque fesse).
- Si contre-indication aux **pénicillines** : **doxycycline** 200 mg/j pendant 28 à 30 jours.

#### Formes particulières

► *Syphilis chez la femme enceinte*

- **Extencilline** 2,4 M d'UI en IM à J1 et J8 (1,2 M d'UI dans chaque fesse).
- En cas d'allergie à la pénicilline : désensibilisation en milieu hospitalier ou **azithromycine** 500 mg/j pendant 10 jours ou **ceftriaxone** 250 à 500 mg IM/j pendant 10 jours.

► *Syphilis congénitale*

- **Pénicilline G** aqueuse : 100 000 à 150 000 U/kg/j IV à administrer à 50 000 U/kg/12 h dans la 1<sup>re</sup> semaine de vie puis toutes les 8 h pendant 10 à 14 j.
- Prévention de la réaction d'Herxheimer.
- Dans tous les cas, une surveillance sérologique à 3, 6, 12 et 24 mois est nécessaire jusqu'à la négativation du VDRL ++. En cas de neurosyphilis, une surveillance du liquide céphalorachidien, tous les 6 mois jusqu'à normalisation, doit être faite.

**INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (3)****Chancre mou**

- **Macrolide** : érythromycine (**ÉRYTHROCINE**) 500 mg x 4/j pendant 7 j ou ciprofloxacine 500 mg x 2/j pendant 3 jours.
- Possible traitement minute : ceftriaxone (**ROCÉPHINE**) : 250 mg IM en dose unique ou azithromycine 1 g *per os*.

**Gonococcie**

Forme non compliquée (urétrite, endocervicite, rectite, atteinte oropharyngée)

On pratique un traitement minute.

► Absence d'allergie à la pénicilline

Ex. : ceftriaxone (**ROCÉPHINE**) : 250 mg IM en dose unique ; ce traitement diffuse dans les éventuelles localisations oropharyngées associées et permet de traiter les gonocoques résistant à la pénicilline (21 % des souches en France).

► En cas d'allergie à la pénicilline

- Aminoside, spectinomycine (**TROBICINE**) : 2 g IM en dose unique (mais ne diffuse pas dans l'oropharynx) ou,
- Fluoroquinolone, ciprofloxacine (**CIFLOX**) : 500 mg *per os* en 1 prise (mais il existe des résistances).

► Grossesse - Allaitement

Ceftriaxone 250 mg IM 1 dose.

Formes compliquées (formes disséminées, salpingite)

Hospitalisation, céfotaxime (**CLAFORAN**) : 1 g/8 h IV lente pendant 10 j.

Dans tous les cas, il faut associer un traitement anti-*Chlamydia* par cycline pendant 7 j (*cf. infra*).

**Infections à *Chlamydia trachomatis***

Insistons sur l'importance du dépistage et du traitement de *Chlamydia trachomatis* en raison des redoutables complications d'une infection chronique cliniquement muette, en effet *C. trachomatis* est responsable de 80 % des stérilités tubaires et de 50 % des grossesses extra-utérines en France. Ex. :

– tétracyclines, doxycycline (**GRANUDOX**) 100 mg x 2/j pendant 7 j ;

– ou macrolides, azithromycine (**ZITHROMAX**) : 1 g *per os* en dose unique (coût élevé +++).

Grossesse - Allaitement : érythromycine 500 mg x 4/j pendant 7 jours ou amoxicilline 500 mg x 3/j pendant 7 jours.

Enfant < 45 kg, nouveau-né : érythromycine 50 mg/kg/j en 4 prises/j pendant 10 à 14 j.

**INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (4)****Infections à mycoplasmes*****Ureaplasma urealyticum***

Il s'agit d'un hôte normal des muqueuses génitales. Il ne doit plus être recherché ni traité sauf cas exceptionnel. Traitement identique à celui de *Chlamydia*.

**Trichomonase**

- **Métronidazole (FLAGYL)** : 2 g en dose unique ou 500 mg x 2/j pendant 7 j.
- En cas de grossesse, traitement local par **FLAGYL** : 1 ovule x 2/j pendant 10 j.

**Urétrite non gonococcique**

Idem *Chlamydia*.

**Urétrite persistante ou récurrente**

**Érythromycine** 500 mg x 4/j pendant 14 jours + **métronidazole** 2 g en 1 prise ou 400 mg x 2/j pendant 5 jours.

**Herpès génital [1]****Primo-infection**

- **Valaciclovir (ZELITREX)** : 1 cp. à 500 mg x 2/j, pendant 5 à 10 j.

**Récurrences**

- *Épisodes prolongés, douloureux*
- Faire l'ordonnance par anticipation.
- Commencer le traitement dès les premiers signes : **ZELITREX** 500 mg x 2/j, pendant 5 j.

**➤ Récurrences > 6/an**

Il y a indication à un traitement au long cours.

Ex. : **ZELITREX** 500 mg/j en 1 à 2 prises pendant 6 à 12 mois et réévaluation.

**Lymphogranulomatose vénérienne (maladie de Nicolas-Favre)****Tétracyclines.**

Ex. : **doxycycline** : 1 cp. à 100 mg x 2/j pendant 3 sem.

**Donovanose****Tétracyclines.****Infections à Papillomavirus (HPV)**

Insistons sur le rôle carcinogène de certains HPV chez la femme (cancer du col utérin).

Différents traitements sont envisageables, dépendant des habitudes de chacun, du nombre et de la localisation des lésions.

**Bilan préthérapeutique**

On effectue toujours un test à l'acide acétique 5 % avant le traitement (entraîne un blanchiment des lésions qui sont ainsi plus visibles).

Le frottis cervical et la colposcopie (avec tests à l'acide acétique et au lugol ± biopsies) sont systématiques chez la femme. L'examen des premiers centimètres de l'urètre chez l'homme est nécessaire en cas de lésions méatiques.

Anuscopie systématique en cas de lésions anales.

## INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (5)

## Traitements [1]

## ► Imiquimod

**Imiquimod 5 % crème (ALDARA)** : x 3/sem. au coucher sur les lésions, max. 16 semaines.

## ► Cryothérapie

Elle peut être pratiquée quand le nombre de lésions ne dépasse pas 10 à 15.

Application d'azote liquide x 1/sem. jusqu'à la guérison.

La meilleure indication est le traitement des localisations cutanées vulvaires, périanéales et périanales.

## ► Podophylline et podophyllotoxine

Le patient doit être facile à suivre et discipliné pour profiter de ce traitement. Il est surtout indiqué lorsque les lésions sont nombreuses.

- Soit **PODOPHYLLINE** à préparer à 25 % dans la vaseline et à appliquer 2 h/j, revoir le patient x 1/sem.

- Soit **podophyllotoxine** en solution (**CONDYLINE**) : réservé à l'homme car coule, x 2/j, 3 j/sem. à répéter si besoin (maximum 5 sem.).

## ► 5 fluoro-uracile

**EFUDIX crème**, à réserver aux formes diffuses vulvaires et anales chez la femme, à

appliquer le soir x 2 à 3/sem. ; laisser agir toute la nuit et rincer abondamment le matin ; possibilité d'irritation locale +++.

► Électrocoagulation et laser CO<sub>2</sub>

C'est le traitement de choix des formes diffuses, multifocales et récidivantes.

À réaliser sous anesthésie locale, voire générale pour les formes diffuses notamment anale et génitale chez la femme.

À noter l'intérêt d'une circoncision en cas de condylomes profus et récidivants chez l'homme notamment VIH+.

## Prévention

- Utilisation du préservatif.

- Vaccination préventive (**GARDASIL**) [2] : il existe un vaccin contre 4 *Papillomavirus* oncogènes (HPV 6, 11, 16, 18) indiqué pour la prévention des dysplasies de haut grade et les cancers du col de l'utérus ainsi que les verrues génitales externes dues à ces virus. Le schéma recommandé est de 3 injections (0, 2 et 6 mois). L'indication est fondée sur la démonstration de l'efficacité du vaccin chez les femmes de 16 à 26 ans et sur l'immunogénicité (la fabrication d'anticorps spécifiques après vaccination) chez les enfants et adolescents de 9 à 15 ans.

## CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'herpès cutanéomuqueux chez le sujet immunocompétent (manifestations oculaires exclues), *SFD et Anaes*, 2001

[2] Avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18, *DGS*, 2007

## MYCOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES (1) – CANDIDOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES

Infections provoquées par des levures du genre *Candida*, en pratique par *Candida albicans*.

### Facteurs favorisants

*Locaux :*

- macération ;
- sécheresse buccale (syndrome sec, médicaments anticholinergiques, séquelles de radiothérapie) ;
- prothèse dentaire.

*Généraux :*

- grossesse, hormones (**progestérone** +++);
- diabète mal contrôlé ;
- immunosuppression (VIH+).

*Médicamenteux :*

- **antibiotiques** ;
- **œstroprogestatifs** ;
- **corticoïdes** ;
- **immunosuppresseurs**.

### Mesures non spécifiques

- Recherche et traitement d'un ou plusieurs facteurs favorisants.
- Prélèvement mycologique préalable à l'application des **topiques**.

### Traitement spécifique

#### Candidose des plis (intertrigo à *Candida albicans*)

Application locale d'un **antiseptique**, séchage puis **imidazolé** local.

Ex. : **NITRATE D'ARGENT AQUEUX 1 %** ou **BÉTADINE** solution dermique quelques jours si suintant puis **éconazole (PEVARYL 1 % lait)** x 2/j, pendant 15 j.

#### Candidose buccale

- Brossage de la muqueuse et d'une éventuelle prothèse dentaire avec la suspension buvable d'**amphotéricine (FUNGIZONE)** puis rinçage dans de l'eau bicarbonatée (bicarbonate de sodium 14/1000).
- Bains de bouche avec **ÉLUDRIL** x 3 à 4/j.

- **FUNGIZONE** suspension buvable, 1 càc x 3/j, à distance des repas à laisser au contact de la muqueuse buccale quelques minutes avant d'avaler, pendant 15 j.

- Traitement d'un éventuel foyer digestif par **FUNGIZONE** : 2 gél. x 3/j pendant 10 j. Chez l'immunodéprimé : **fluconazole (TRIFLUCAN)** : 100 mg/j pour une durée fonction de la réponse clinique.

#### Candidose vaginale

- Port de vêtements amples et de sous-vêtements en coton bien rincés (pas de lessive caustique).
- Ne pas utiliser de tampons périodiques.
- Changement éventuel de stérilet.
- Toilette avec un pain sans savon ou avec une solution alcaline, **GYN HYDRALIN**, x 1/j.

- Associer un **imidazolé** local :

Ex. : **éconazole (PEVARYL 1 % crème)** sur la vulve matin et soir pendant 2 sem., et **GYN-PEVARYL 1** ovule 3 j de suite ou **GYN-PEVARYL LP 1** ovule le soir au coucher (les 2 formules sont renouvelables 10 j après en cas de mycose récidivante).

- Si symptomatologie très bruyante : **fluconazole (TRIFLUCAN)** : 150 mg en 1 fois.
  - Prévention des rechutes si candidoses fréquentes et invalidantes.
- Ex. : **fluconazole (TRIFLUCAN)** : 100 mg x 1/sem.

#### Candidose génitale masculine

**Éconazole** crème x 2/j jusqu'à résolution.

À distinguer d'une simple balanite ou balano-posthite irritative, cas de loin le plus fréquent, à traiter par :

- éviction des savons ;
- utilisation d'un surgras pour la toilette ;
- **dermocorticoïde (LOCOÏD** émulsion fluide) pour quelques jours.



## ANTIFONGIQUES LOCAUX (1) – ANTIFONGIQUES AZOLÉS (1)

## ■ Bifonazole

<b>AMYCOR</b>					
Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, pityriasis versicolor : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	15 g (crème 1 %)	4,68	I	30 %	0,31
	15 mL (spray 1 %)	4,53	I	30 %	0,30
	15 g (fl. pdre 1 %)	4,68	I	30 %	0,31

## ■ Oxiconazole

<b>FONX</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 1 %)	3,89	I	30 %	0,26
	15 mL (spray 1 %)	3,89	I	30 %	0,26
	15 g (fl. pdre 1 %)	3,89	I	30 %	0,26

## ■ Fenticonazole

<b>LOMEXIN</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 2 %)	3,76	I	30 %	0,25
	30 g (crème 2 %)			NR	

## ■ Omoconazole

<b>FONGAMIL</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 1 %)	3,76	I	30 %	0,25
	30 g (spray 1 %)	4,35	I	15 %	0,14
	20 g (fl. pdre 1 %)		I	NR	

## ■ Miconazole

<b>DAKTARIN</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	12 c-mes. (gel buccal) 2 %	5,28	I	65 %	0,44
	30 g (fl. pdre 2 %)	3,05	I	30 %	0,10
<b>LORAMYC</b>					
Pycoses oropharyngées : 1 cp. muco-adhésif x 1/j pdt 7 à 14 j	14 cp. 50 mg	71,02	I	65 %	5,07

## ■ Isoconazole

<b>FAZOL</b>					
idem <b>AMYCOR</b>	30 g (crème 2 %)	4,58	I	30 %	0,15
	30 g (1 fl. émuls. 2 %)	4,39	I	30 %	0,15

## ■ Sertaconazole

<b>MONAZOL</b>					
Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, pityriasis versicolor : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	15 g (crème 2 %)	3,89		30 %	0,26

## MYCOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES (2) – DERMATOPHYTIES

Ce sont des mycoses strictement cutanées et phanériennes dues à des champignons du genre dermatophytes se développant exclusivement dans la couche cornée.

### Mesures non spécifiques

- Recherche et traitement d'un facteur de contact (entourage pour les espèces anthrophiles, animaux essentiellement domestiques pour les espèces zoophiles).
- Prélèvement mycologique préalable à tout traitement, **indispensable en cas de teigne et d'onychomycose** (différencier de simples modifications de l'ongle par microtraumatismes répétés très fréquents en pratique +++).

### Traitement spécifique

#### Dermatophyties de la peau glabre

##### ► *Forme localisée*

Antiseptie et **imidazolé** local.

Ex. : **BÉTADINE** *dermique* x 2/j pendant 8 j et **éconazole** (**PEVARYL** *crème*) : x 2/j pendant 21 j.

##### ► *Forme diffuse*

Antifongique par voie orale.

Ex. : **terbinafine** (**LAMISIL**) : 1 cp. à 250 mg/j pendant 28 j.

#### Dermatophyties des plis (intertrigo)

- Antiseptie, séchage +++ et **imidazolé** local. Par ex. : **BÉTADINE** *dermique* x 2/j pendant 8 j et **éconazole** (**PEVARYL** *1 % lait*) x 2/j pendant 21 j.
- S'aider du sèche-cheveux pour bien sécher les plis après la toilette.
- Linge de toilette lavé à 60 °C en machine.
- Vêtements et sous-vêtements amples.

#### Pied d'athlète

- Traiter tous les espaces interorteils des 2 pieds, porter des chaussettes en coton changées tous les jours et lavées en machine à 60 °C, éviter les chaussures très fermées, notamment les baskets, séchage fondamental après la toilette +++.
- Pulvériser **PEVARYL** poudre dans toutes les chaussures et chaussons habituellement portés, x 1/j jusqu'à la fin du flacon.

### Teignes

- Traitement obligatoirement général, reposant sur la **griséofulvine** (**GRISÉFULINE**) : 1 cp. à 500 mg x 2/j chez l'adulte, 20 mg/kg/j chez l'enfant en 2 prises, au milieu des repas, pendant 2 mois.
- Prélèvement mycologique indispensable avant tout traitement.
- Examen des sujets contacts (problème des porteurs asymptomatiques).
- Pas d'éviction scolaire si certificat attestant d'un traitement en cours.

### Onychomycoses à dermatophytes

Prélèvement mycologique dans un laboratoire entraîné indispensable avant tout traitement par voie générale (un ongle dyschromique n'est pas forcément une onychomycose).

#### ► *Atteinte distale, mono- ou oligodactyle, sans atteinte matricielle*

Là encore, plutôt que d'entreprendre des traitements locaux par **vernifs antifongiques** COÛTEUX, en cas de doute faire un prélèvement mycologique +++ dans un laboratoire de référence.

Le traitement est local.

Ex. : **bifonazole** + **urée** (**AMYCOR ONYCHOSÉ**) : sous occlusion de 24 h pour détruire la tablette unguéale mycosique.

Ex. : **amorolfine** (**LOCÉRYL** *5 %*) x 1 à 2/sem. jusqu'à la guérison clinique (± mycologique).

Ex. : **ciclopiroxolamine** (**MYCOSTER** *8 %*) x 1/j jusqu'à la guérison clinique (± mycologique).

#### ► *Atteinte polydactyle, atteinte matricielle*

- Le traitement est général et repose actuellement sur la **terbinafine** (**LAMISIL**) en cure continue ou sur l'**itraconazole** (**SPORANOX**) en cures intermittentes (1 sem. par mois).
- Ex. : **terbinafine** (**LAMISIL**), 1 cp. à 250 mg/j pendant 3 mois.

- Association à un traitement local.

Ex. : **bifonazole** + **urée** (**AMYCOR ONYCHOSÉ**) : sous occlusion de 24 h pour détruire la tablette unguéale mycosique.

- Prélèvement mycologique en fin de traitement, prévention des rechutes (fréquentes) par un traitement antifongique local des intertrigos interorteils et du pourtour unguéal.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (2) – ANTIFONGIQUES AZOLÉS (2)

### ■ Éconazole

<b>PEVARYL</b>					
Idem <b>MONAZOL</b>	30 g (crème 1 %)	4,79		30 %	0,16
	30 mL (fl. d'émuls. 1 %)	4,95		30 %	0,17
	30 g (fl. pdre 1 %)	6,53		30 %	0,22
	30 g (fl. de sol. 1 %)	5,51		30 %	0,18

### ■ Tioconazole

<b>TROSYD</b>					
Idem <b>MONAZOL</b>	30 g (crème 1 %)	3,64	I	30 %	0,12

### ■ Kétoconazole

<b>KÉTODERM</b>					
Dermite séborrhéique : 2 sach./sem. pdt 1 mois en attaque puis 1 sach. tous les 8 à 15 j en entretien Pityriasis versicolor : traitement minute : 1 tube à appliquer sur tout le corps ; laisser 5 min et rincer ; renouveler à 15 j si atteinte profuse Mycoses cutanées à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, dermite séborrhéique profuse : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	8 sach.-dose 6 g (gel moussant 2 %)	9,33	I	30 %	1,17
	20 g (tube monodose de gel 2 %)	4,65	I	30 %	0,23
	15 g (crème 2 %)	4,68	I	30 %	0,31

#### PROPRIÉTÉS

Les imidazolés sont des antifongiques à large spectre, ayant une puissante action contre les *Candida*, les dermatophytes, *Malassezia furfur* (agent du *pityriasis versicolor*, également impliqué dans la dermite séborrhéique et le *pityriasis capitis*), *Corynebacterium minutissimum*, ils sont également bactéricides sur les germes Gram+.

#### INDICATIONS

Mycoses cutanées et muqueuses à *Candida* et à dermatophytes.  
 Pityriasis versicolor.  
 Dermite séborrhéique.  
 Érythrasma.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : ne pas utiliser au cours du 1<sup>er</sup> trimestre **kétoconazole**, **bifonazole**, **tioconazole** et **omoconazole**.

Éviter tout contact avec les yeux et proscrire les solutions alcoolisées chez le nourrisson et sur les muqueuses.

**TROSYD** : l'excipient huileux peut détériorer le latex.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale lors d'une utilisation prolongée ; rares eczéma de contact.

## MYCOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES (3) – PITYRIASIS VERSICOLOR

### Définition

Mycose cutanée due à *Malassezia furfur*, saprophyte des régions séborrhéiques du corps.

### Traitement

Il repose sur un imidazolé local.

Ex. : kétoconazole (**KÉTODERM** gel mono-

dose) : 1 tube à utiliser en 1 seule fois, en commençant par un shampoing puis en traitant tout le reste du tégument ; laisser agir 5 min et rincer. Prévenir le patient que les macules achromiques ne se repigmenteront qu'après un certain temps.

Dans les cas très profus et rebelles au traitement local : kétoconazole (**NIZORAL**) : 200 mg/j pendant 10 j.

## PSORIASIS (1)

### Définition

Le psoriasis est une dermatose érythémato-squameuse en plaques bien limitées, d'évolution chronique, très fréquente.

Les trois cibles thérapeutiques sont :

- l'hyperprolifération kératinocytaire ;
- les anomalies de différenciation terminale de l'épiderme ;
- l'inflammation du derme.

Il existe de nombreux traitements permettant de blanchir le psoriasis. Le traitement est adapté à chaque patient et est fonction non pas de l'étendue du psoriasis mais du retentissement de ce dernier sur la vie du patient.

### Traitements locaux

#### Kératolytiques

La **VASELINE SALICYLÉE** dont le pourcentage peut varier classiquement de 2 à 20 %, en fonction de la quantité d'acide salicylique mélangé à la vaseline, est utilisée quelques jours dans le but de décaper les plaques de psoriasis. Elle laisse ensuite place à une autre thérapeutique. Elle ne s'utilise pas chez le nourrisson.

Son indication préférentielle est le psoriasis épais et localisé. On utilise de forts pourcentages (20 %, parfois plus) sur les plaques très épaisses ou dans certaines localisations (paumes et plantes, cuir chevelu) pendant une période brève.

#### Réducteurs

Les **goudrons** sont utilisés dans le but de réduire les états très squameux ; on distingue :

- les **goudrons de bois** ou **huile de cade** (**LAC-CODERME** pommade) : 1 à 2 appl./j ; **CADITAR** solution : 2 à 4 cuillères à soupe par bain ou 1 cuillère à café par litre d'eau ; nombreux shampooings ;
- d'autres **goudrons** plus forts sont utilisés en milieu hospitalier : la **pommade de Brocq**, modulable en concentration (faible,

moyen, fort), nécessite une hospitalisation de 3 semaines et est réservée aux psoriasis très épais, diffus, chez des sujets chez qui un traitement général est contre-indiqué.

#### Dermocorticoïdes

Ils sont particulièrement intéressants dans deux localisations :

- le cuir chevelu ;
- les plis.

Ils sont utilisés en lotion, de manière lentement dégressive sur plusieurs mois.

Ils sont indiqués également pour des psoriasis en plaques très limitées, après décapage avec un **kératolytique** ou un réducteur ; on utilise :

- pour le corps : une crème ou une pommade de classe III ;

- pour les paumes et les plantes : une pommade ou une crème de classe IV, souvent sous occlusion de 12 heures la nuit.

Le traitement devra être poursuivi de nombreuses semaines après la disparition des lésions pour éviter les récives précoces.

#### Vitamine D

Le **calcipotriol** (**DAIVONEX**) est indiqué pour les psoriasis en plaques du corps peu étendus (< 40 % de la surface corporelle), à raison de 2 appl./j. Une forme en lotion pour le cuir chevelu est disponible.

Le **tacalcitol** (**APSOR**), pommade, 1 appl./j, est utilisable sur le visage et dans les plis si besoin.

**Vitamine D + dermocorticoïde de niveau III : DAIVOBET pommade** pour les psoriasis en plaques du corps < 30 % de la surface corporelle, 1 mois puis possible 2 j/sem. en alternance avec une **vitamine D** en entretien.

#### Rétinoïdes locaux

Un **rétinoïde** topique, le **tazarotène** (**ZORAC gel**) est indiqué dans le psoriasis en plaques < 10 % de surface corporelle en association avec un **dermocorticoïde de classe III**.

## VITAMINE D LOCALE

## ■ Calcipotriol

<b>DAIVONEX</b>					
Psoriasis en plaques du corps < 40 % surface corporelle : 2 appl./j pendant 6 sem. Psoriasis du cuir chevelu : 2 appl./j.	30 g (crème 50 µg/g)	13,01	II	65 %	0,43
	120 g (crème 50 µg/g)	40,35	II	65 %	0,34

## ■ Calcipotriol + corticoïde

<b>DAIVOBET</b>					
1 appl./j pendant 1 mois Ne pas dépasser 100 g/sem.	60 g (pomm. 50 µg/0,5 mg/g)	46,62	I	65 %	0,78
	60 g (gel 50 µg/0,5 mg/g)	46,62	I	65 %	0,78

## ■ Calcitriol

<b>SILKIS</b>					
Réservé aux zones fragiles (visage-pli) : 2 appl./j max 6 sem. Ne pas dépasser 30 g/j	30 g (pomm. 3 µg/g)	10,40	I	30 %	0,35
	100 g (pomm. 3 µg/g)	28,47	I	30 %	0,28

## PROPRIÉTÉS

Dérivé de la vitamine D, il inhibe la prolifération des kératinocytes et stimule leur différenciation ; il est peu résorbé par voie percutanée et ne présente pas de risque d'hypercalcémie dans les conditions normales d'utilisation. Son efficacité semble comparable à celle des **dermocorticoïdes de classe III**.

## INDICATIONS

Psoriasis en plaques, atteignant moins de 40 % de la surface corporelle.  
Psoriasis du cuir chevelu.

## ■ Tacalcitol

<b>APSOR</b>					
Psoriasis en plaques : 1 appl./j de préférence le soir	15 g (pomm.)	9,88	II	65 %	0,66
	60 g (pomm.)	32,09	II	65 %	0,53
	50 mL (fl. ém. cut.)	27,57	II	65 %	0,55

## PROPRIÉTÉS

Idem **DAIVONEX**.

## INDICATIONS

Psoriasis en plaques.  
Utilisation possible sur le visage et dans les plis.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**  
Hypercalcémies.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse.**

**Allaitement.**

Hypercalcémies, application sur le visage et dans les plis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser 30 g/j ni 35 % de la surface cutanée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale et lésions eczématiformes, risque d'hypercalcémie, réversibles à l'arrêt du traitement, en cas de surdosage.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser 50 g par semaine.  
Ne pas utiliser dans les psoriasis pustuleux, en gouttes ou érythrodermiques.  
Se laver les mains après utilisation.  
Éviter le contact avec les yeux.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hypercalcémie modérée et réversible si surdosage.  
Dégradation par les UV.  
Irritation locale transitoire.

## PSORIASIS (2)

### Traitement général

On n'utilise pas de corticothérapie générale responsable de rebond redoutable à son arrêt (érythrodermie, psoriasis pustuleux).

### PUVAthérapie et photothérapie UVB

Elle est utilisée pour les psoriasis étendus, volontiers les psoriasis en goutte, après décapage des lésions épaisses par un traitement local kératolytique ou réducteur, de quelques jours. Elle peut être associée localement à la **vitamine D**, aux **goudrons**, aux **dermocorticoïdes** et au **tazarotène**.

### Rétinoïdes oraux

**Acitrétine (SORIATANE)** : 10 mg/j en augmentant de 10 mg/sem. jusqu'à l'apparition des premiers effets secondaires cliniques (chéilite).

On trouvera ainsi la dose maximale tolérée de façon confortable, sous surveillance biologique (bilans hépatique et lipidique); on maintiendra cette dose pendant 6 à 12 mois avant de décroître doucement la posologie.

### RePUVAthérapie

C'est l'association du **SORIATANE**, à doses plus faibles que lorsqu'il est utilisé seul, et de la PUVAthérapie, après échec de ces 2 traitements seuls, en commençant par le **rétinoïde**.

### Méthotrexate

Il est réservé aux formes graves, après échec ou contre-indication de tous les traitements précédents. 1 IM/sem. après une dose test de 5 mg, en atteignant une dose de 20 à 25 mg/sem., toujours le même jour à réaliser par une infirmière; association de **LEDERFOLINE** : 5 mg/j sauf le jour de l'injection de **méthotrexate**.

Surveillance hebdomadaire de la NFS pendant 2 mois puis mensuelle. Surveillance mensuelle du bilan hépatique. Marquer sur l'ordonnance que la **prise d'alcool** est

**strictement contre-indiquée** ainsi que la prise d'**aspirine** et d'autres **anti-inflammatoires non stéroïdiens** et de **BACTRIM**.

### Ciclosporine

C'est, avec le **méthotrexate**, le second traitement majeur des psoriasis très graves résistant à tous les traitements; la **ciclosporine (NÉORAL)** est débutée à 2,5 mg/kg/j en 2 prises, sans jamais dépasser 5 mg/kg/j, après étude de la fonction rénale par mesure de la clairance de la créatinine. L'efficacité est remarquable mais se pose le problème du maintien du traitement de la toxicité rénale et des effets immunosuppresseurs au long cours et des rebonds à l'arrêt.

### Biothérapies

**Étanercept (ENBREL)** et **infliximab (REMICADE)** : prescription hospitalière initiale, renouvellement sur ordonnance d'exception, indiqués pour les psoriasis sévères ayant résisté à au moins 2 traitements systémiques parmi **ciclosporine**, **méthotrexate** et photothérapie.

### Traitements adjuvants

Le repos, l'exposition solaire, les cures thermales sont des mesures générales pouvant aider un traitement spécifique à agir, elles peuvent être suffisantes dans certains psoriasis peu invalidants.

Une **hydratation quotidienne de la peau** est systématiquement associée aux autres traitements.

Arrêt d'un médicament inducteur de psoriasis.

Médicaments pouvant induire ou aggraver un psoriasis :

- **β-bloquants.**
- **Corticoïdes** par voie générale.
- **Lithium.**
- **Sels d'or** et **antipaludéens de synthèse.**
- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion.**
- **Iode.**
- **Anti-inflammatoires non stéroïdiens** dont l'**aspirine**.

## RÉTINOÏDE LOCAL

## ■ Tazarotène

<b>ZORAC</b>					
Psoriasis en plaques < 10 % de surface corporelle 1 appl. le soir pendant 12 sem.	60 g (gel 0,05 %)	30,57	I	30 %	0,51
	60 g (gel 0,1 %)	32,09	I	30 %	0,53

**PROPRIÉTÉS**

Rétinoïde local ayant au cours du psoriasis une action sur l'inflammation, la prolifération et les anomalies de différenciation des kératinocytes.

**INDICATIONS**

Psoriasis en plaques < 10 % de surface corporelle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Femme enceinte ou susceptible de l'être.  
Allaitement.  
Hypersensibilité connue au produit.

Application sur le visage, le cuir chevelu, et les plis.

Surface à traiter > 10 %.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

N'appliquer que sur la peau psoriasique.

Interrompre le traitement en cas d'irritation.

Associer un **dermocorticoïde de classe III** le matin.

Éviter de prescrire avant l'âge de 18 ans.

Laver les mains après application.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Prurit, sensation de brûlure, érythème, irritation, desquamation, aggravation du psoriasis.  
Photosensibilisation.



## PSORIASIS (3)

### Traitement d'entretien

Il est nécessaire dans cette affection chronique récidivante pour éviter les rechutes rapides à l'arrêt du traitement d'attaque ; les traitements topiques sont diminués extrêmement lentement.

Pour les traitements généraux : pas de PUVAthérapie en entretien (pas plus de 4 mois de suite), éviter la **ciclosporine** au long cours ; le **SORIATANE** et le **méthotrexate** sont utilisés en entretien. L'avenir est probablement aux traitements alternés, par exemple PUVAthérapie 4 mois, **méthotrexate** 4 mois puis **ciclosporine**, biothérapies dans les psoriasis sévères invalidants.

Au total, chaque traitement doit être adapté à chaque patient et est essentielle-

ment fonction du retentissement du psoriasis sur la vie du patient :

- un psoriasis peu étendu mais atteignant les zone visibles de la peau chez une jeune femme (visage, dos des mains) peut être vécu très difficilement et est à considérer comme un psoriasis « grave » ;
- un psoriasis diffus sur des zones cachées chez un homme âgé peut être vécu sans aucune demande thérapeutique et sera considéré comme un psoriasis « bénin ».

Dans tous les cas il est fondamental d'expliquer la maladie et les traitements envisageables au patient, en se rappelant que le traitement devra toujours être moins désagréable que le psoriasis.

### Indications thérapeutiques

#### Indications thérapeutiques en fonction de la forme clinique

Psoriasis en plaques peu étendu	En cas de lésions très kératosiques, <b>LACCODERME</b> pommade : x 2/j ou <b>VASELINE SALICYLÉE</b> 20 % : x 2/j, éventuellement sous occlusion la nuit au début.
Psoriasis étendu	Si très épais : <b>VASELINE SALICYLÉE</b> 2 % le matin et dermocorticoïde le soir ( <b>BETNEVAL</b> crème ou préparation dermocorticoïde) + émollient : <b>NÉRISONE</b> crème 50 % et <b>NÉRIBASE</b> crème 50 % pendant quelques jours puis suivi d'un traitement général. Traitement général par photothérapie ou <b>SORIATANE</b> si insuffisant ou rechute rapide, voire rePUVA-thérapie.
Psoriasis éruptif en gouttes	Photothérapie associée à une hydratation cutanée ( <b>LIPIKAR</b> ).
Psoriasis érythrodermique	Hospitalisation. <b>SORIATANE</b> à faible dose : 10 mg/j ou <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b> : dose test de 5 mg IM puis 10 mg/sem. Réhydratation du patient et hydratation cutanée ( <b>CERAT</b> , <b>COLD CREAM</b> ).
Psoriasis pustuleux	Palmo-plantaire : arrêt du tabac. <b>SORIATANE</b> débuté à 10 mg/j. Généralisé : hospitalisation. <b>SORIATANE</b> à forte dose : 1 mg/kg/j associé à des soins locaux ( <b>ÉOSINE</b> aqueuse sur toutes les zones pustuleuses).

## GOUDRONS

### ■ Anthraline (ou dioxyanthranol ou dithranol)

<b>ANAXÉRYL</b>				
Psoriasis en plaques du corps et du cuir chevelu : <i>short contact therapy</i> , application pendant 10 min/j, rinçage abondant avec un savon acide, puis augmentation des temps de pose en fonction de l'efficacité (ex : 10 min/j pdt 1 sem. puis 20 min/j pdt 2 sem. puis 30 min/j pdt 3 sem.)	38 g (pomm. 0,35 % d'anthraline)		NR	

### ■ Huile de cade

<b>CADITAR</b>				
Psoriasis, eczemas secs, névrodermites, lichénifications, autres dermatoses hyperkératosiques : bain quotidien avec de l'eau tiède 2 càs par bain, 1 càc par litre pour bains localisés (mains, pieds)	250 mL (fl. de prép. diluer pour bain)	4,01	15 %	0,02

### ■ Pommade de Brocq

<b>POMMADE DE BROCC</b>				
Psoriasis très épais et diffus en cas de contre-indication aux autres traitements	prép. magistrale	HOP		

### ■ Acide sacylique + huile essentielle de cade + huile essentielle de cèdre + huile de vaseline

<b>DERMAGOR BETACADE</b>				
Visage et corps. Peaux irritées, squameuses. Soin et entretien des peaux psoriasiques. Accompagnement et relais de la corticothérapie locale	100 mL		NR	

#### PROPRIÉTÉS

Réducteurs utilisés dans les états hyperkératosiques, notamment dans le psoriasis, seuls ou en association, pour réduire la vitesse de renouvellement de l'épiderme.

#### INDICATIONS

Psoriasis, eczemas secs, névrodermites, lichénifications, autres dermatoses hyperkératosiques. Sous forme de shampooings, ils sont très utilisés pour les états squameux du cuir chevelu. La **POMMADE DE BROCC** n'est utilisée qu'en milieu hospitalier.

#### CONTRE-INDICATIONS

Dermatoses suintantes.  
Hypersensibilité aux constituants.

Psoriasis inflammatoires, irrités, érythrodermiques.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser sur les muqueuses ni sur les yeux.

Tache les vêtements et la literie ; odeur désagréable.

L'**anthraline** s'oxyde à l'air, doit être appliquée avec des gants et jamais sur les zones fragiles (plis, visage, cou, organes génitaux).

Effets carcinogènes cutanés des **goudrons** (sur-tout si association aux ultraviolets).

**ANAXÉRYL** contient du baume du Pérou.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation, éruptions acnéiformes, folliculites.

## PSORIASIS (4)

### Indications thérapeutiques en fonction de la topographie

Psoriasis du cuir chevelu	Si très épais, décapage avec <b>VASELINE SALICYLÉE</b> 20 % ou <b>FLAMMAZINE</b> pommade sous bonnet occlusif la nuit avec shampoing le matin, 2 à 3 j de suite puis <b>DIPROSONE</b> lotion tous les soirs sur les lésions pendant 1 mois, puis 1 soir/2 pendant 2 mois, puis x 2 /sem. pendant 3 mois, puis x 1/sem. pendant 6 mois et arrêt. Shampoings doux et réducteurs en alternance de façon régulière ( <b>ULTRA-DOUX</b> de Charlieu) et shampoing à l'huile de Cade.
Psoriasis des plis	Antiseptie quotidienne de quelques jours par <b>SEPTÉAL</b> ou <b>NITRATE D'ARGENT</b> AQUEUX 1 %. Séchage soigneux des plis à l'aide du sèche-cheveux. <b>DIPROSONE</b> crème pendant 1 mois. Relais par <b>DIPROSONE</b> lotion en décroissant lentement sur plusieurs mois.
Psoriasis unguéal	<b>SORIATANE</b> débuté à 10 mg/j sans dépasser 0,5 mg/kg/j car risque d'aggraver l'atteinte unguéale. Injection de <b>corticoïdes</b> . Efficacité de la <b>ciclosporine</b> .
Psoriasis palmo-plantaire	<b>VASELINE SALICYLÉE</b> 10 % sous occlusion. Protéger les fissures cutanées avec le <b>BAUME DU COMMANDEUR</b> , pendant quelques jours puis <b>DIPROLÈNE</b> pommade sous occlusion la nuit pendant quelques jours puis tous les soirs sans occlusion pour une durée d'1 mois puis 1 soir sur 2 pendant 1 mois, puis x 2/sem. pendant 2 mois. En cas de résistance, <b>SORIATANE</b> débuté à 10 mg/j, puis x 1/sem. pendant 3 mois. Hydratation le matin ( <b>BARIEDERM</b> , <b>BEPANTHÈNE</b> ) pommade renouvelée dans la journée à l'aide d'un stick ( <b>STICK LABIAL SVR</b> ).

## ROSACÉE

La rosacée est une affection chronique et fréquente de la face évoluant en 4 stades qui classiquement se succèdent ; une origine vasculaire est avancée, du moins pour les premiers stades.

- Stade 1 : flushs ou bouffées vasomotrices.
- Stade 2 : érythème et télangiectasies, c'est la couperose.
- Stade 3 : papules et pustules sur fond de couperose.
- Stade 4 : éléphantiasis (rhinophyma, blépharophyma).

La rosacée évolue par poussées avec aggravation progressive ; il existe 40 % de régression spontanée. Les complications sont ophtalmologiques (blépharites chroniques, chalazions, blépharophyma, kératites, ulcères de cornée, épiscérates).

La rosacée est aggravée par la corticothérapie locale, formellement contre-indiquée, et par les expositions solaires ; elle doit être différenciée de l'acné, de la dermatite péri-orale et de la dermatite séborrhéique. Une photoprotection externe est recommandée quel que soit le stade de la rosacée (indices 30 à 50+).

### Stade 1 : flushs

#### Hygiène alimentaire

Éliminer l'alcool, éviter les repas très chauds et rapides, les épices, les boissons chaudes.

#### Ice chip therapy

Laisser fondre un glaçon dans la bouche lors de l'apparition d'un flush post-prandial.

#### Médicament

**Clonidine (CATAPRESSAN)** : 1/4 à 1/2 cp. à 0,15 mg x 2/j ; ces faibles doses ne donnent pas d'effet secondaire sur la pression artérielle ; sécheresse buccale, vertiges et constipation sont possibles. Efficacité modeste en pratique.

#### Laser à colorant pulsé

### Stade 2 : couperose

Le traitement est difficile. Les topiques sont inefficaces (en dehors des correcteurs de teint). L'électrocoagulation fine a un intérêt aux stades débutants mais les télangiectasies récidivent à moyen terme et cette technique est longue, douloureuse

et source de petites cicatrices dépigmentées. Les lasers (colorant pulsé, KTP, Nd-YAG long pulse) sont actuellement les seuls traitements intéressants.

### Stade 3 : papulo-pustules

C'est à ce stade que les traitements sont les plus efficaces ; ils reposent sur le **métronidazole** local et sur les **cyclines** orales.

#### Traitement local

**Métronidazole** local, **ROSICED** crème : 1 appl. matin et soir pendant 6 à 8 sem. ; le traitement sera poursuivi si besoin.

Le **métronidazole** peut être préparé plus concentré que dans les produits du commerce : 2 appl./j de la préparation suivante :

- **métronidazole**, 0,5 mg ;
- **NÉRIBASE** crème, 50 mg.

#### Traitement général

Il repose sur les cyclines : **doxycycline** 100 mg le soir pour 3 mois.

#### Exemple de traitement d'entretien d'une rosacée papulo-pustuleuse avec flushs

- Règles hygiéno-diététiques : pas d'alcool, pas de boissons chaudes ni de repas épicés.
- Photoprotection externe par écran 50+ à renouveler toutes les 2 à 3 h si ensoleillement important.
- **TOLEXINE** : 100 mg le soir pendant 3 mois.
- **ROSICED** crème, une application le soir après la toilette du visage à l'eau.
- Laser à distance de la poussée papulo-pustuleuse.

Le **métronidazole** peut être prescrit *per os* ; il est moins bien toléré que les **cyclines** : **métronidazole (FLAGYL)** cp. 250 mg x 2/j pendant 1 mois, puis 250 mg/j pendant 1 mois, puis 125 mg/j pendant 2 mois et relais en topique.

L'**isotrétinoïne orale (ROACCUTANE)** peut être utile à un stade très papulo-pustuleux avec œdème.

### Stade 4 : rhyma

Le rhinophyma peu évolué peut être traité par l'**isotrétinoïne orale (ROACCUTANE)**. À un stade évolué le traitement est chirurgical.

## TUMEURS CUTANÉES BÉNIGNES (1)

### Verrues vulgaires

#### En première intention

Ce sont des lésions virales dues à HPV (*Papillomavirus*, type 1 et 6 le plus souvent), auto- et hétérocontagieuses.

Le traitement de première intention reste classiquement l'azote liquide (cryothérapie) appliqué à l'aide d'un bâtonnet muni d'une extrémité en coton, ou d'un Cryac (très utile en cas de lésions multiples) après décapage manuel à l'aide d'une lame de bistouri n° 15. Ce traitement est douloureux et doit être réalisé sous anesthésie locale par crème **EMLA** chez l'enfant. Les sprays vendus en pharmacie ne sont pas à base d'azote liquide +++.

Les applications peuvent être répétées ; au-delà de 3 applications, le traitement devrait être considéré comme un échec et poursuivi avec une autre approche. L'azote liquide est peu efficace et à abandonner sur les verrues mosaïques et les myrmécies plantaires et sur les verrues périunguéales.

#### Autres traitements possibles

##### ► Abstention thérapeutique

60 % des verrues disparaissent spontanément dans un délai de 6 mois à 1 an, expliquant ainsi les guérisons obtenues avec les traitements les plus divers.

##### ► Traitements kératolytiques

Ex. : **COLLODION SALICYLÉ** : acide lactique 4 g + acide salicylique 4 g + collodion élastique 4 g, 1 application le soir sur la verrue en protégeant la peau saine autour avec un vernis (**VERLIM 3**). À renouveler tous les soirs jusqu'à disparition de la ver-

rue ou plus simplement **DUOFILM** vernis le soir sur les lésions jusqu'à disparition. Parfois pose d'un pansement occlusif de vaseline salicylée 50 % changé tous les 8 j avec contrôle à 1 mois.

##### ► Autres traitements

Électrocoagulation, laser CO<sub>2</sub>, chirurgie d'exérèse doivent être abandonnés sauf cas très particulier +++.

**Imiquimod (ALDARA)** topique hors AMM uniquement sur les verrues bien décapées et très cher.

### **Molluscum contagiosum**

Disparition spontanée +++ mais parfois sur 2 ans.

Traitement simple en cas d'extension, de prurit, de surinfection, par applications douces d'azote liquide au coton, toujours sous anesthésie locale par crème **EMLA** appliquée 30 min à 1 h avant sous film plastique alimentaire (pas de pansements collants douloureux au retrait). Curetage possible mais saignement ++ et possibles cicatrices.

Prévenir des récurrences possibles et traiter à nouveau si extension mais pas systématiquement.

Émollients et **nitrate d'argent** aqueux 1 à 2 % possibles voire **DUOFILM** vernis quelques applications pour les enfants plus grands jusqu'à irritation et arrêt.

### **Verrues séborrhéiques**

Abstention ou destruction par application d'azote liquide au coton ou au Cryac suivie de l'application d'un corps gras. Ex. : **CICALFATE** x 2/j jusqu'à la cicatrisation.

## KÉRATOLYTIQUES - ACIDE SALICYLIQUE (1)

## Formes réservées aux verrues

## ■ Acide salicylique

<b>DUOFILM</b>				
16,7 % d'ac. salicylique + 16,7 % d'ac. lactique Verrues vulgaires, cors et durillons : 1 à 2 appl./j (protéger la peau périlésionnelle avec un vernis incolore <i>VERLIM 3</i> ou vernis à ongles du commerce), après avoir ramolli la lésion au cours d'un bain, gratter la peau blanchie avec une lime à ongles jetable, sans faire saigner, x 1/sem.	1 fl. 15 mL			NR
<b>VERRUFILM</b>				
Idem <b>DUOFILM</b>	1 fl. 14 mL			NR
<b>KÉRAFILM</b>				
1,5 g d'ac. salicylique + 1,5 g d'ac. lactique Idem <b>DUOFILM</b>	1 fl. 10 mL + 6 rondelles protect. + appl.			NR
<b>TRANSVERCID</b>				
Dispositif pour appl. cutanée Traitement local de verrues vulgaires À poser le soir et enlever le lendemain matin	10 disp. 6 mm, 3,62 mg d'ac. salicylique 8 disp. 12 mm, 14,54 mg d'ac. salicylique			NR NR
<b>CORICIDE LE DIABLE</b>				
1 application cutanée le matin pendant 1 semaine	1 fl. 4 g sol. appl. cutanée 12,5 %			NR
<b>FEUILLE DE SAULE</b>				
<i>Cors-Durillons</i> 1 emplâtre/j pendant 3 à 5 j <i>Verrues</i> 3 appl./j de solution pendant 2 sem.	5 emplâtres durillons 9 emplâtres cors 1 emplâtre à découper sol. 10 % appl. loc.			NR NR NR
<b>POMMADE M.O. COCHON</b>				
1 appl. le soir	10 g (pomm. 50 %)			NR
<b>SANITOS</b>				
1 à 2 appl./j	fl. 5 mL sol. 11 %			NR
<b>VERRUPAN</b>				
1 à 2 appl./j	2 fl. 3 g			NR

**PROPRIÉTÉS**

Kératolytiques.

**INDICATIONS**

Verrues vulgaires, cors, durillons.  
Verrues vulgaires plantaires des zones d'appui exclusivement pour le verutal.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : pas d'acide salicylique au cours du 3<sup>e</sup> trimestre.

**Acide salicylique** : hypersensibilité aux salicylés, application sur les muqueuses, dans les plis et sur les dermatoses suintantes.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Arrêt pendant quelques jours si douleurs, saignement.

Ne pas utiliser des produits trop puissants chez le diabétique et l'artéritique.

## TUMEURS CUTANÉES BÉNIGNES (2)

### Nævi

#### Autosurveillance

Selon l'abécédaire ABCDE :

Abécédaire sur lequel s'appuie la surveillance des nævi ; la présence ou l'apparition de l'un des critères suivants doit faire consulter le dermatologue

A : Asymétrie du dessin.

B : Bordure irrégulière, en carte de géographie.

C : Couleur inhomogène, polychromie.

D : Dimension > 6 mm de grand axe.

E : Évolutivité.

#### Surveillance médicale

- Surveillance annuelle par le dermatologue.
- Protection contre le soleil chez tous les sujets ayant des nævi, d'autant plus qu'ils sont nombreux et cliniquement atypiques.
- Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale des nævi congénitaux et des nævi atypiques avec examen anatomopathologique systématique.

#### Sujets à risque de mélanome

- Antécédent de mélanome personnel ou familial.
- Plus de 50 nævi.
- Nævi très variés (forme, couleur, taille).
- Nombreuses éphélides.
- Phototype clair.
- Antécédents de brûlures solaires sévères dans l'enfance ou l'adolescence.
- Nombreuses séances d'UVA en cabine.

### Kératoses actiniques (carcinomes épidermoïdes *in situ*)

La cryothérapie est la méthode la plus simple et est à utiliser en 1<sup>re</sup> intention.

L'**EFUDIX** crème est indiquée à raison de 1 à 2 appl./j pendant 4 à 6 sem. en cas de lésions multiples ; il nécessite une bonne compréhension du patient en raison de l'irritation locale.

Dermabrasion et laser CO<sub>2</sub> sont réservés aux contre-indications des 2 techniques précédentes.

L'électrocoagulation sous anesthésie locale peut être effectuée.

On peut également proposer **imiquimod (ALDARA)** : 1 appl./j 5 j/sem. en protégeant la peau autour pendant 6 sem. Laisser agir la nuit.

Dans tous les cas il faut surveiller le patient annuellement au long cours, biopsier les lésions s'il existe un doute sur une transformation en carcinome épidermoïde invasif et recommander une protection solaire totale (chapeau, casquette, écran solaire indice 50+).

### Cornes cutanées

Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale et examen anatomopathologique de toute la pièce opératoire. Les cornes cutanées correspondent aux étiologies suivantes : lésion virale 52 %, kératose actinique 26 %, kérato-acanthome 4,8 %, carcinome spinocellulaire 3,2 %.

#### Technique de l'autosurveillance des nævi

Après s'être totalement déshabillé, examiner successivement et attentivement :

- le visage sans oublier les oreilles ;
- le cuir chevelu en s'aidant d'un sèche-cheveux ;
- la paume et le dos des mains sans oublier les ongles, les avant-bras ;
- les coudes, les bras, les aisselles ;
- le cou, la poitrine (en regardant sous les seins chez les femmes) et le ventre ;
- dans une glace, avec l'aide d'un miroir à main, la nuque, les épaules et le dos ;
- les fesses et la face postérieure des cuisses ;
- en s'asseyant, la face antérieure des cuisses, les jambes, le dos et la plante des pieds sans oublier les ongles, et la région génitale avec l'aide d'un miroir.

Cet auto-examen ne prend pas plus de 10 minutes et doit être réalisé régulièrement 2 à 3 fois par an.

## ULCÈRES CUTANÉS (1)

### Traitements locaux

#### Pansements

Le choix d'un pansement dépend du stade de la cicatrisation, des disponibilités au sein des différents services, des prix, du caractère remboursable ou non et des habitudes des médecins prescripteurs. L'intérêt principal du pansement est de maintenir un milieu humide favorable à la cicatrisation.

#### Réalisation d'un soin d'ulcère de jambe

- En l'absence d'infection locorégionale ou générale évidente, ayant pour porte d'entrée supposée l'ulcère, les prélèvements bactériologiques sont inutiles.
- Retirer le pansement précédent en humidifiant +++ avec du sérum physiologique (douleur et risque de désépidermisation si le pansement colle).

#### ► Antisepsie

Pas d'antiseptiques pour les soins d'ulcères ; intérêt des bains de pieds et de jambes si plaies sales, défaut d'hygiène.

**Acide borique** en irrigation si surinfection à bacille pyocyanique.

L'antibiothérapie locale est exceptionnellement justifiée, source de résistance et d'eczéma de contact. L'antibiothérapie générale n'est indiquée qu'en cas d'infection locorégionale voire systémique (lymphangite, érysipèle, cellulite) ayant l'ulcère comme porte d'entrée.

#### ► Détersion

- Anesthésie locale par **XYLOCAÏNE** gel urétral 1/2 h avant si soins très douloureux ;

antalgique suivant douleur (ex. : 5 mg de **morphine** sous-cutanée si ulcère artériel ou angiodermite nécrotique).

- La détersion doit être mécanique en utilisant une curette, un bistouri. L'utilisation d'un hydrogel (type **PURILON**) peut être utile en complément d'une détersion mécanique correctement effectuée.

- On utilise des pansements (afflux de polynucléaires et de macrophages) le plus souvent gras à ce stade (vaseline officinale + **MEPITEL**) ou **hydrocolloïdes**.

- La détersion peut être chimique (**PURILON gel**) en cas de nécrose, en protégeant la peau péri-ulcéreuse avec de la pâte à l'eau (**ALOPLASTINE**).

- On utilise des **alginates** ou **charbons** en cas de plaie surinfectée, à changer toutes les 24 h.

#### ► Bourgeonnement

- Essentiellement à l'aide de pansements gras (**MEPITEL**, **PHYSIOTULLE**) et vaseline officinale ou d'**hydrocolloïdes**.

- En cas de bourgeonnement trop important : crayon de nitrate d'argent.

#### ► Épidermisation

- Pansements aux **hydrocolloïdes** ou hydrocellulaires, pansements gras.

- Intérêt des greffes cutanées en pastille ou en filet.

### Traitements généraux [1]

- Vaccination antitétanique à jour.
- Anticoagulation préventive si alitement prolongé.

• **Antalgiques** généraux et locaux avant et pendant les soins et régulièrement répartis dans la journée.



**BAS ET BANDES DE COMPRESSION VEINEUSE****Bas et bandes de compression veineuse**

**Bandes** (systématiques si pansement)

Indiquées en cas d'ulcères de jambe.

**DUPRAFLEX**, étalonnées, largeur 10 cm, longueur 3 m.

Prescrire 2 paires.

Grade 1-2 : faible à moyen.

Grade 3-4 : moyen à fort.

**Bas**

Jarret (+++), mi-cuisse ou collant.

1 = insuffisance veineuse fonctionnelle.

2 = existence de varices.

3 = phlébite antérieure ou évolutive.

4 = lymphœdème.

## ULCÈRES CUTANÉS (2)

### Traitement étiologique

#### Ulcère artériel

Il est primordial et doit comporter :

- un geste de revascularisation chaque fois que cela est possible ;
- des mesures hygiéno-diététiques (arrêt du tabac, correction d'une dyslipidémie, équilibre d'un diabète et de la pression artérielle) ;
- des **vasodilatateurs artériels** : **naftidrofuryl (PRAXILÈNE)** : 3 cp. à 200 mg/j ; **pentoxifylline (TORENTAL)** : 3 cp. à 400 mg/j.

#### Ulcère veineux

C'est le traitement d'une insuffisance veineuse. Le bilan doit comporter un échodoppler des réseaux profonds et superficiels et des communicantes :  
– traitement chirurgical du réseau superficiel (stripping ++)

– dans tous les cas éviter la station debout prolongée, la chaleur, surélever les pieds du lit de manière à favoriser le retour veineux, favoriser la marche, corriger un surpoids et porter des bas ou des bandes de contention veineuse +++.

#### Ordonnance type pour une infirmière devant prendre en charge un ulcère cutané

- « Soins plaies multiples » à inscrire.
  - Sérum physiologique stérile : spray.
  - Compresses stériles non tissées 7,5 x 7,5 : 100.
  - Pansement choisi avec sa taille, noter 1 boîte renouvelable.
  - Bandes Nyllex 10 cm, 1 par pansement.
  - Anesthésique local.
  - Bandes de compression : 2 paires.
- Détailler l'intégralité du déroulement du soin et la fréquence des pansements : noter x 1/j à 3/sem. selon l'évolution.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse, hors pansement, *Anaes*, 2006

## URTICAIRE – ŒDÈME DE QUINCKE (1)

### Définitions

L'urticaire est une maladie fréquente faite de papules fugaces, érythémateuses, œdématisées et prurigineuses.

L'œdème de Quincke ou angio-œdème est une atteinte profonde de l'hypoderme, non prurigineuse, donnant une sensation de tension sous-cutanée.

### Causes d'urticaire

*Dans l'immense majorité des cas, l'urticaire n'a pas de cause retrouvée ou est d'origine physique et non pas allergique.*

#### Médicaments

- Pénicillines.
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Produits de contraste iodés.

#### Aliments

- Aliments contenant des moisissures (pain, bière, fromages, choucroute).
- Conserves.
- Noix.
- Blanc d'œuf.
- Crustacés, poissons, fraises, bananes, tomates, etc.

#### Infections

- Virales : hépatites, mononucléose infectieuse, etc.
- Parasitaires : helminthes, bilharziose, toxocarose.
- Bactériennes : foyers ORL et dentaires (en fait rarement en cause, *Helicobacter pylori*).

#### Facteurs contacts

Rares, souvent chez un atopique.

#### Facteurs physiques

- Dermographisme.
- Urticaire cholinergique.
- Urticaire retardée à la pression.
- Urticaire au froid.
- Urticaire à l'eau.
- Urticaire au chaud.
- Urticaire solaire.

#### Maladies générales

- Vascularites.
- Lupus érythémateux systémique.
- Maladie de Still.
- Polyarthrite rhumatoïde.
- Dermatomyosite.
- Péri-artérite noueuse.
- Hémopathies, dysglobulinémies et thyroïdite auto-immune.

#### Urticaires génétiques

œdème angioneurotique héréditaire par déficit en inhibiteur de la C1 estérase ; syndrome de Muckle Wells.

#### Facteurs psychologiques

##### Urticaire idiopathique

Aucune cause mise en évidence, cas le plus fréquent dans les urticaires chroniques.

**ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (1)****Non sédatifs et non anticholinergiques****■ Loratadine**

<b>CLARITYNE</b>					
Rhinites, urticaire chronique idiopathique :	15 cp. séc. 10 mg	4,45	II	30 %	0,30
1 cp./j en 1 prise	12 c-mes. 5 mg	2,53	II	30 %	0,21
E. 2-12 ans :	(fl. 60 mL)				
> 30 kg : 2 c-mes. x 1/j	24 c-mes. 5 mg	3,94	II	30 %	0,16
≤ 30 kg : 1 c-mes. x 1/j	(fl. 120 mL)				

**■ Desloratadine**

<b>AERIUS</b>					
1 cp./j en 1 prise	15 cp. 5 mg	4,07	II	30 %	0,27
	30 cp. 5 mg	7,35	II	30 %	0,25
E. 1-5 ans : 2,5 mL x 1/j	1 fl. 150 mL	4,76	II	30 %	4,76
E. 6-11 ans : 5 mL x 1/j	(0,5 mg/mL)				
A. ou E. > 12 ans : 10 mL x 1/j					

**■ Ébastine**

<b>KESTINLYO</b>					
Urticaires, rhinites allergiques	30 lyocs 10 mg	9,19	II	30 %	0,31
1 à 2 lyocs/j					
<b>KESTIN</b>					
Urticaires, rhinites allergiques	15 cp. 10 mg	4,95	II	30 %	0,33
1 à 2 cp./j	30 cp. 10 mg	9,19	II	30 %	0,31

**■ Cétirizine**

<b>ZYRTEC</b>					
Rhinites allergiques, conjonctivites allergiques, urticaire	300 fl. 15 mL	3,90	II	30 %	0,01
A., E. > 12 ans : 20 gttes x 1/j	(gttes 0,5 mg)				
E. 6-12 ans : 10 gttes x 2/j					
E. 2-6 ans : 5 gttes x 2/j					
<b>VIRLIX</b>					
A., E. > 12 ans : 1 cp. x 1/j	15 cp. séc. 10 mg	4,17	II	30 %	0,28
E. 6-12 ans : 1/2 cp. x 2/j					

**■ Lévocétirizine**

<b>XYZALL</b>					
A. et E. > 6 ans : 1 cp./j	14 cp. 5 mg	3,73	II	30 %	0,27
À adapter chez l'insuffisant rénal en fonction de la clairance :	28 cp. 5 mg	6,63	II	30 %	0,24
30-50 mL/min : 1 cp./2 j					
< 30 mL/min : 1 cp./3 j					

**URTICAIRE – ŒDÈME DE QUINCKE (2)****Traitement de la crise aiguë**

Le choix du traitement repose sur la présence ou non de signes de gravité.

**Signes de gravité**

- Dysphagie, stagnation de la salive dans la cavité buccale.
- Grande angoisse.
- Dyspnée, patient assis cherchant l'air, voire cyanose, sueurs.

**Absence de signes de gravité**

Le traitement repose sur les **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, par ex. **CLARITYNE** 1 cp. le matin, associé à **ATARAX** 25 mg le soir au coucher.

En cas de crise invalidante, ne cédant pas sous traitement oral, une hospitalisation courte peut être proposée pour réaliser des perfusions de **POLARAMINE** : 2 à 3 amp. de 5 mg/j en perfusion IV.

Les **corticoïdes** par voie générale, orale ou injectable, sont inutiles.

**Présence de signes de gravité**

Ils sont le témoin d'un œdème de Quincke avec atteinte muqueuse de la langue, du

pharynx ou du larynx et doivent être connus.

**► Urgence thérapeutique**

- Asseoir le patient.
- Pose d'une voie veineuse.
- Injection de 1 amp. de **SOLUMÉDROL** 20 mg en IVD, à renouveler.
- Puis en cas d'amélioration, relais par **prednisone (CORTANCYL)** : 0,5 mg/kg/j et décroissance rapide sur une semaine.
- Les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** sont un bon traitement d'appoint, initialement en IV puis relayés *per os* pour 10 j.
- En cas d'échec, **ADRÉNALINE RENAUDIN** IM 0,25 à 1 mg ; en l'absence d'amélioration rapide, transfert en réanimation.

La survenue d'un choc anaphylactique impose une réanimation médicale en extrême urgence ; le traitement repose sur l'administration d'adrénaline en IV à la seringue électrique en continu sous monitoring cardiaque.

**► Traitement étiologique**

Suppression définitive d'un aliment ou d'un médicament, traitement d'une parasitose intestinale, d'une infection dentaire, etc.

ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (2)

## ■ Méquitazine

PRIMALAN						
Rhinites, urticaire chronique idiopathique : 1 cp./j en 1 prise	14 cp. séc. 5 mg	3,69	I	30 %	0,26	
	14 cp. séc. 10 mg	5,39	I	30 %	0,38	
	24 c-mes. 1,25 mg (fl. 60 mL)	2,62	I	30 %	0,11	
> 30 kg : 2 c-mes. x 1/j						
≥ 30 kg : 1 c-mes. x 1/j	50 c. mes. 1,25 mg (fl. 125 mL)	4,09	I	30 %	0,08	

## ■ Fexofénadine

TELFAST						
Rhinite allergique saisonnière > 12 ans : 1 cp. 120 mg/j Prurit de l'urticaire chronique ≥ 12 ans : 1 cp. 180 mg/j	30 cp. 120 mg	5,00	II	30 %	0,17	
	15 cp. 180 mg	3,89	II	30 %	0,26	

## Sédatifs et anticholinergiques

## ■ Bromphéniramine

DIMÉGAN					
Dermatoses allergiques (urticaires), dermatoses prurigineuses (eczémas, prurigos), manifestations ORL et respiratoires allergiques (rhinites) : 8 à 24 mg/j	10 gél. 12 mg	3,40		15 %	0,34

## ■ Dexchlorphéniramine

POLARAMINE					
Idem <b>DIMÉGAN</b> : 6 à 8 mg/j	30 cp. séc. 2 mg 25 càc 0,5 mg (fl. 125 mL) 5 amp. 1 mL (= 5 mg)			NR NR	
<b>POLARAMINE</b> injectable 5 à 10 mg SC, IM ou IV				NR	

## ■ Hydroxyzine

ATARAX					
Rhinite, conjonctivite, urticaire, anxiété 25 à 100 mg/j le soir au coucher	30 cp. séc. 25 mg	2,93	I	65 %	0,10

## ■ Isothipendyl

HISTAPAYSYL					
Idem <b>DIMÉGAN</b> : 2 à 3 cp./j	20 cp. 12 mg			NR	

**URTICAIRE – ŒDÈME DE QUINCKE (3)****Traitement de l'urticaire chronique [1]****Règles diététiques****Aliments et médicaments riches en histamine ou histamino-libérateurs**

- Boissons et aliments fermentés.
- Charcuterie.
- Conserves (produits de la mer, petits pois, etc.).
- Poissons et fruits de mer.
- Certains légumes (épinards et tomates).
- Fruits (bananes, ananas, fruits exotiques, fraises).
- Cacahuètes, noix et noisettes.
- Chocolat.
- Épices et alcool.
- Blanc d'œuf.
- **Aspirine.**
- **Antibiotiques** (néomycine, colistine et polymyxine).
- Amines (**opiacés**, **amphétamines**, **cocaïne**, **protamine**).
- **Macromolécules**, **anesthésiques**, **anti-hypertenseurs** (dihydralazine et réserpine).
- Autres : **quinine**, produits de contraste iodés, **pilocarpine**.

On s'efforcera de prévenir les récides, surtout en cas d'urticaire chronique de cause indéterminée, en remettant au patient une liste des aliments riches en histamine et des aliments histamino-libérateurs sans mécanisme allergique. Il faut savoir qu'il existe de la **pénicilline** dans certains aliments, notamment dans le lait, qu'il existe des dérivés de l'**aspirine** dans la banane, etc.

**Traitement médicamenteux**

Il repose sur les **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, 2 mois ; par exemple **KESTINLYO** : 1 cp./j pendant 2 mois.

**► Formes particulières**

En cas d'urticaire cholinergique, les **anti-histaminiques anticholinergiques** tels que **POLARAMINE** ou **ATARAX** sont plus efficaces.

Seules l'urticaire retardée à la pression et les vascularites urticariennes peuvent relever de la corticothérapie par voie générale.

L'œdème angioneurotique héréditaire se traite par les **androgènes** (**DANATROL**).

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge de l'urticaire chronique, *SFD et Anaes*, 2003

**TUMEURS CUTANÉES MALIGNES (1)****Maladie de Bowen**

Exérèse chirurgicale avec une marge de 5 mm et examen anatomopathologique de la pièce opératoire. À défaut, cryothérapie.

Si la chirurgie et la cryothérapie sont impossibles (lésions étendues ou multiples ou zones cicatrisant mal) : chimiothérapie locale par 5-FU (**EFFUDIX**) ou imiquimod (**ALDARA**) à 2 conditions : vérification diagnostique par biopsie préalable et surveillance après traitement.

**Maladie de Paget mammaire**

Exérèse chirurgicale de la lésion et du cancer du sein sous-jacent (cf. Traitement du cancer du sein) avec examen anatomopathologique.

**Carcinomes basocellulaires [1]**

Les métastases sont exceptionnelles.

**Traitement chirurgical**

Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale ou générale courte avec une marge de 3 à 5 voire 10 mm en fonction du type histologique, de la taille, de la topographie et du caractère primitif ou récidivant de la lésion.

Surveillance clinique annuelle à vie.

**Autres traitements****► Radiothérapie**

Elle est indiquée chez les patients non opérables.

**► Cryochirurgie**

Elle est intéressante dans les localisations délicates pour la chirurgie (pointe du nez, paupières, grande taille) ou en cas de tumeur de petite taille.

Dans tous les cas :

- examen anatomopathologique de la pièce opératoire (sauf pour la cryochirurgie et la radiothérapie) ;
- surveillance annuelle au long cours ;
- protection solaire totale (vêtements, casquette, chapeau, écran total).

**► Laser CO<sub>2</sub>**

Sur des basocellulaires multiples, superficiels du dos.

**► Alternative**

**Imiquimod (ALDARA)** pour les carcinomes basocellulaires superficiels, de petite taille, en dehors des zones anatomiques à risque et après contrôle histologique. 1 appl./j 5 j/sem. en protégeant la peau autour pendant 6 sem. Laisser agir la nuit.

**► Formes localement avancées ou métastatiques**

On propose un **inhibiteur de la voie Hedgehog**, le **vismodégib (ERIVEDGE)** : 1 gél. (150 mg)/j.



## ANTIMITOTIQUES LOCAUX

## ■ Fluorouracile

<b>EFUDIX</b>					
Kératoses actiniques, maladie de Bowen, kérato-acanthome, certains basocellulaires et condylomes génitaux : 1 à 2 appl./j pendant 4 à 6 sem.	20 g crème 5 %	26,30	I	65 %	1,32

**PROPRIÉTÉS**

Antimitotique.

**INDICATIONS**

Kératoses actiniques étendues pour lesquelles une cryothérapie n'est pas envisageable +++ , maladie de Bowen, kérato-acanthome, certains carcinomes basocellulaires et certains condylomes génitaux.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses ; se laver les mains après l'application.

L'évolution normale des lésions sous traitement est une nécrose avec possible perte de substance puis réépidermisation, dont il faut bien prévenir le patient.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème, érosion, ulcération, nécrose.

Risque de majoration des effets du produit en cas d'exposition solaire.

## ■ Podophyllotoxine

<b>CONDYLINE</b>					
Condylomes ano-génitaux : 2 appl./j pendant 3 j, à répéter si besoin au maximum pendant 5 sem.	3 mL (sol. avec 6 applicateurs)	20,39	I	65 %	6,80

**PROPRIÉTÉS**

Antimitotique cytolytique d'origine végétale (extrait de la résine de podophylline).

**INDICATIONS**

Condylomes ano-génitaux pour lesquels une cryothérapie n'est pas envisageable ; à réserver à l'homme car le produit peut facilement couler et entraîner des brûlures chez la femme (préférer l'utilisation d'une préparation de podophylline 25 % dans la vaseline chez la femme) ; surface traitable < 4 cm<sup>2</sup>.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Utilisation en intravaginal et chez l'enfant.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Appliquer avec précautions en utilisant l'applicateur sélectivement sur les lésions et laisser sécher en évitant tout écoulement du produit. Se laver les mains après application. Rincer à grande eau en cas de contact oculaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème, douleur, possible ulcération. œdème, balanoposthite.

## TUMEURS CUTANÉES MALIGNES (2)

### Carcinomes spinocellulaires (= carcinomes épidermoïdes) [2]

#### Traitement chirurgical

- Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale ou générale courte avec une marge de 4 ou 10 mm en fonction du type histologique, de la taille, de la topographie et du caractère primitif ou récidivant de la lésion. L'exérèse doit intéresser l'hypoderme en respectant l'aponévrose, le périoste ou le périchondre si ces structures ne sont ni au contact de la tumeur, ni envahies.
- Curage ganglionnaire en cas d'adénopathie satellite palpable ou en cas de localisation particulière (demi-muqueuses, extrémités, oreilles) ou de tumeurs volumineuses de mauvais pronostic.

#### Autres traitements

Les autres méthodes (radiothérapie, cryochirurgie) sont réservées aux tumeurs de très petite taille chez le sujet âgé ou aux tumeurs très volumineuses pour lesquelles la chirurgie est impossible.

Chimiothérapie dans les lésions évoluées.

Les **anticorps anti-EGFR, cétuximab (ERBITUX)** pourraient représenter une option intéressante mais leur place est encore à préciser.

Dans tous les cas :

- examen anatomopathologique de la pièce opératoire ;
- surveillance semestrielle au long cours ;
- protection solaire totale (vêtements, casquette, chapeau, écran total).

#### Tumeurs cutanées

- Il n'y a pas lieu, chez les patients ayant eu un carcinome cutané, baso- ou spinocellulaire au stade I (tumeur locale), de faire un suivi autre que clinique.
- Il n'y a pas lieu de pratiquer l'exérèse systématique des naevi.

## INHIBITEURS DE PROTÉINE-KINASE ANTINÉOPLASIQUES (1)

## ■ Ipilimumab

YERVOY					
Perfusion IV de 90 min 3 mg/kg toutes les 3 sem. pendant 9 sem. (soit 4 doses)	1 fl. 50 mg (10 mL)	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

L'antigène 4 des lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) est un régulateur négatif de l'activation des cellules T.

L'ipilimumab est un potentialisateur des cellules T qui bloque spécifiquement le signal inhibiteur du CTLA-4, conduisant à une activation des cellules T, à leur prolifération, et l'infiltration des tumeurs par les lymphocytes, aboutissant à la mort des cellules tumorales.

Le mécanisme d'action de l'ipilimumab est indirect, en activant la réponse immunitaire *via* les cellules T.

**INDICATIONS**

Traitement du mélanome avancé (non résécable ou métastatique) chez les patients adultes ayant déjà reçu un traitement.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique et thyroïdien avant traitement. Surveillance biologique, hépatique, surrénalienne, gastro-intestinale, dermatologique, thyroïdienne et neurologique pendant le traitement.

Déconseillé en cas de grossesse ou allaitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Confusion, troubles psychocomportementaux, dépression, ataxie, myoclonie, neuropathie périphérique, réactions cutanées, troubles de la vision, hémorragie gastro-intestinale, colite, insuffisance hépatique, hépatite, hypothyroïdie, troubles cardio-vasculaires (fibrillation, hypotension, arythmie), dépression respiratoire.

Anémie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie, augmentation des enzymes hépatiques et pancréatiques, perturbation du bilan thyroïdien et surrénalien, hypokaliémie, hyponatrémie.

Asthénie, céphalées, tremblements, vertiges, douleurs musculaires, diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, reflux, amaigrissement, bouffées de chaleur, dyspnée, toux.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Corticostéroïdes** : interférence avec le mécanisme d'action de l'ipilimumab. À éviter pendant le traitement mais peuvent être utilisés après.

**Anticoagulants** : majoration du risque hémorragique notamment gastro-intestinal. Une surveillance étroite est recommandée.

## TUMEURS CUTANÉES MALIGNES (3)

### Mélanome cutané [3]

Insistons sur la prévention primaire de cette redoutable affection, par une éducation au soleil dès le plus jeune âge en fonction du phototype, les mesures de photoprotection, le dépistage des sujets à risque (Cf. Nævi), l'enseignement de l'auto-surveillance et la surveillance dermatologique régulière.

Le traitement est discuté en RCP.

#### Stade I

##### ► Traitement

Le traitement est chirurgical, avec un 1<sup>er</sup> temps consistant en l'exérèse de la lésion avec examen anatomopathologique confirmant le diagnostic et mesurant notamment l'indice de Breslow (épaisseur de la tumeur), principal facteur pronostique conditionnant les marges de sécurité à respecter pour la reprise chirurgicale qui s'effectue dans un 2<sup>e</sup> temps.

- *In situ* : marge de 5 mm.
- Dubreuilh : marge de 1 cm.
- Breslow  $\leq 1$  mm : marge de 1 cm.
- Breslow de 1,01 à 2 mm : marge de 1 à 2 cm.
- Breslow de 2,01 à 4 mm : marge de 2 cm.
- Breslow  $> 4$  mm : marge de 2 à 3 cm.

Exérèse du ganglion sentinelle proposé pour un Breslow  $> 1$  mm ou mélanome ulcéré.

##### ► Surveillance

- Breslow  $\leq 1,5$  mm : surveillance clinique tous les 6 mois pendant 10 ans puis 1 fois/an à vie et autosurveillance.
- Breslow  $> 1,5$  mm : surveillance clinique tous les 3 mois pendant 5 ans puis 1 fois/an à vie et autosurveillance. Écho-

graphie ganglionnaire de la zone de drainage, imagerie TDM si Breslow  $> 4$  mm, ulcération, ganglion envahi en histologie. Pour les mélanomes dont le Breslow est  $\geq 1,5$  mm sans envahissement ganglionnaire (N0), on peut proposer : **interféron  $\alpha 2a$  (ROFÉRON)**, 3 M UI x 3/sem. pendant 18 mois en sous-cutané, après un bilan d'extension.

Pour les mélanomes à haut risque de récurrence (exemple N+) : **interféron  $\alpha 2b$  (INTRONA)**, 20 M UI/m<sup>2</sup>/j IV 5 j/7 pendant 1 mois puis 10 M UI/m<sup>2</sup> SC x 3/sem. pendant 48 sem., après un bilan d'extension.

#### Stade IV (métastases viscérales) [4]

- Si possible, les métastases doivent être réséquées.
- Le statut BRAF de la tumeur primitive doit être recherché.
- En cas de mutation BRAF, le traitement repose sur l'administration de **vémurafénib (ZELBORAF)**. En seconde intention, on propose le **témolomide (TEMODAL)** ou l'**ipilimumab (YERVOY)**, possible en cas de localisations accessibles peu nombreuses et isolées.
- En l'absence de mutation, on propose une chimiothérapie : **dacarbazine (DÉTICÈNE)**, 250 mg/m<sup>2</sup>/j IV pendant 4 à 5 j, et réévaluation après 2 à 3 cures espacées de 28 j. En cas de métastases cérébrales : **fétomustine (MUPHORAN)**, 100 mg/m<sup>2</sup> 3 doses à une sem. d'intervalle puis réévaluation après 4 à 5 sem.

#### Dans tous les cas

- surveillance régulière à vie ;
- autosurveillance +++ ;
- examen des membres de la famille ;
- protection solaire maximum (pas d'exposition, vêtements, écrans solaires).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l'adulte, *Anaes*, 2004

[2] Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome épidermoïde cutané (spino-cellulaire) et de ses précurseurs, *SFD*, 2009

[3] Prise en charge des patients adultes atteints d'un mélanome cutané MO, *SFD et FNCLCC*, 2005

[4] Mélanome cutané métastatique, *SFD*, 2013

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (1) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (1)

### ■ Trétinoïne (ou vitamine A acide)

<b>EFFEDERM</b>					
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche pendant plusieurs sem. en attaque puis × 2 à 3/sem. en entretien	30 g (crème 0,05 %) 50 mL (lotion 0,05 %)	3,22 4,80	I I	30 % 30 %	0,11 0,10
<b>LOCACID</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b> Réservé aux acnés du tronc	30 g (crème 0,05 %) 15 mL (fl. de sol. 0,1 %)	3,00 3,00	I I	30 % 30 %	0,10 0,20
<b>RETACNYL</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b>	30 g (crème 0,025 %) 30 g (crème 0,05 %)		I I	NR NR	
<b>KETREL</b>					
Idem <b>EFFEDERM</b>	30 g (crème 0,05 %)	2,87	I	30 %	0,10

### ■ Adapalène

<b>DIFFERINE</b>					
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche pendant plusieurs sem. en attaque puis × 2 à 3/sem. en entretien	30 g (gel ou crème 0,1 %)	5,37	I	30 %	0,18
<b>EPIDUO</b>					
Idem <b>DIFFERINE</b>	30 g (gel)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

La **trétinoïne** favorise l'élimination des kystes ouverts et fermés et prévient leur formation.

L'**adapalène** possède de plus une activité anti-inflammatoire.

#### INDICATIONS

- Acné à prédominance rétentionnelle.
- Troubles de la kératinisation.
- Prévention et traitement de l'héliodermie (**trétinoïne** seulement).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester la sensibilité individuelle en début de traitement par une touche d'essai sur une petite partie du visage, espacer les applications en cas d'irritation.

Commencer par des faibles concentrations chez les sujets à peau fragile (roux, blonds, peau fine) et en cas d'association avec d'autres topiques irritants (**peroxyde de benzoyle**, **érythromycine**).

Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche.

Ne pas s'exposer au soleil (photosensibilisation).

**Grossesse** : ne pas utiliser pendant la grossesse. Donner une contraception aux femmes en âge de procréer.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Des signes d'irritation à type d'érythème, de cuisson et de desquamation peuvent survenir en début de traitement, ils doivent faire espacer les applications (1 soir sur 2 ou 3) ; ces signes sont transitoires.

Une poussée d'acné est possible en début de traitement.

Les effets secondaires de l'**adapalène** sont moins intenses pour une efficacité qui semble identique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inactivation par le **peroxyde de benzoyle**. Ne pas associer avec **isotrétinoïne** (risque d'irritation +++).

## ACNÉ (2)

### Buts du traitement

Diminuer la séborrhée, supprimer la rétention sébacée et limiter la composante inflammatoire.

### Mesures générales

- Rechercher des signes d'hyperandrogénie chez la femme : hirsutisme, acné importante de topographie thoracique, anomalies des règles.
- Rechercher un médicament inducteur : **antiépileptiques** (phénobarbital, phénytoïne), **antidépresseurs** (lithium, amineptine), **corticoïdes locaux** et généraux (*notamment le triamcinolone injectable qui peut*

*déclencher une acné 3 mois après l'injection*), **vitamine B12**, **iode**, **brome** (*antitussifs, expectorants, sédatifs*), **androgènes** (*anabolisants, contraceptifs oraux*), **isoniazide**, **ciclosporine**, **azathioprine**.

- Rechercher des facteurs aggravants locaux : cosmétiques comédogènes, profession (*travailleurs de la restauration, garagistes*), excoriations (« acné excoriée des jeunes filles »).

On ne négligera pas le retentissement psychologique de l'acné chez un adolescent, ni le risque cicatriciel ultérieur.

Une relation de confiance est nécessaire avec le patient pour l'observance du traitement souvent long et difficile.

### Ce qu'il faut dire au patient

- L'acné est le résultat d'une plus grande sensibilité des glandes sébacées aux androgènes.
- L'acné ne disparaît pas avec le mariage ni avec les premiers rapports sexuels, mais avec les traitements et avec le temps.
- Les traitements dont nous disposons ne sont pas efficaces dans les 15 jours mais après plusieurs semaines.
- Le début du traitement est parfois difficile en raison d'une possible exacerbation des lésions et des effets irritatifs imposant d'espacer les applications.
- Un traitement d'entretien local est souvent nécessaire au long cours pour éviter les récives.
- Les kystes ne doivent pas être manipulés mais extraits par le dermatologue (nettoyage de peau).
- Le soleil est un faux ami de l'acné et provoque une poussée après une amélioration initiale.
- Les aliments, notamment le chocolat et la charcuterie, ne donnent pas d'acné.
- L'acné n'est pas due à un défaut d'hygiène ; elle n'est pas le résultat d'un comportement particulier (notamment la masturbation ne donne pas d'acné).

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (2) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (2)

### ■ Isotrétinoïne locale

ROACCUTANE				
Acné : 1 appl. le soir après la toilette sur une peau bien sèche en traitement d'attaque pendant plusieurs sem., puis 2 à 3 appl./sem. en entretien	30 g (gel 0,05 %)		I	NR

#### PROPRIÉTÉS

L'**isotrétinoïne locale** a la même action que la **trétinoïne** dont elle est dérivée. Son efficacité semble identique à celle de la **trétinoïne** pour un prix nettement supérieur.

#### INDICATIONS

Acné rétentionnelle.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester la sensibilité individuelle en début de traitement par une touche d'essai sur une petite partie du visage, espacer les applications

en cas d'irritation. Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche. Ne pas s'exposer au soleil (photosensibilisation).

**Grossesse** : ne pas utiliser pendant la grossesse. Donner une contraception aux femmes en âge de procréer.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Une irritation et une poussée de l'acné peuvent se voir en début de traitement ; ces effets sont transitoires et doivent faire espacer les applications.

**ACNÉ (3)****Mesures spécifiques [1]****Acné rétentionnelle modérée**

Vitamine A acide locale, **trétinoïne** 0,05 % crème (**EFFEDERM**) : 1 application le soir sur tout le visage y compris sur les zones non visiblement atteintes à l'exception des paupières, du pourtour narinaire et des lèvres rouges, 1/4 h après la toilette sur une peau sèche.

Un **nettoyage de peau** sera effectué par le dermatologue après 1 à 2 mois de traitement local ; il consiste à extraire les kystes ouverts et fermés manuellement à l'aide d'une lame de bistouri n° 11 et d'un tire-comédons.

On peut utiliser l'**isotrétinoïne** locale, pour une efficacité identique mais un coût plus élevé. L'**adapalène** est moins irritant que la **trétinoïne** 0,05 % pour une efficacité qui semble inférieure.

Le **peroxyde de benzoyle** a une action mixte, anti-inflammatoire et antirétentionnelle.

**Acné inflammatoire [1]**

- **Peroxyde de benzoyle** (**CUTACNYL** 2,5 gel aqueux) : une application le soir sur tout le visage y compris les zones apparemment saines à l'exception des paupières, du pourtour narinaire et des lèvres rouges, 1/4 h après la toilette sur une peau sèche.
- Antibiothérapie locale, **érythromycine** (**ERYFLUID** 4 %) en solution à tamponner sur toutes les lésions rouges, le matin après la toilette (intérêt probablement très limité des antibiotiques locaux).
- Antibiothérapie orale, **doxycycline** 100 mg : un cp. le soir au dîner avec un

grand verre d'eau pendant 15 jours puis une gélule à 50 mg pendant 1 mois 1/2.

- **Zinc** (**RUBOZINC**) : 2 gél. x 1/j pendant 3 mois à distance des repas ; l'efficacité serait identique à celle des cyclines sur l'inflammation chez les bons répondeurs avec moins d'effets secondaires.

**Acné polymorphe (mixte inflammatoire et rétentionnelle)**

C'est la forme la plus fréquente.

Association des traitements précédents, par exemple :

- toilette du visage matin et soir avec un gel ou une eau adaptés type **SEBIUM MOUSSANT** ou  $H_2O$ , à rincer ;
- puis crème hydratante type **CLEAN-AC** sur le visage ;
- dans la journée, photoprotection externe en cas d'ensoleillement important ;
- **doxycycline** 100 mg : un cp. au dîner avec un grand verre d'eau ;
- le soir après la toilette du visage, sur une peau sèche, application d'**EFFEDERM**, avec prudence au début.

Il est important de revoir le patient à 2 mois pour la surveillance de la tolérance, de l'observance et de l'efficacité du traitement, et la réalisation éventuelle d'un nettoyage de peau.

Le traitement doit être maintenu plusieurs semaines à plusieurs mois et poursuivi par un traitement local d'entretien à raison de 2 à 3 applications par semaine.

La résistance bactériologique est reconnue comme un problème croissant amenant à **ne pas utiliser les antibiotiques systémiques seuls** dans les acnés mineures.



## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (3) – PEROXYDE DE BENZOYLE

### ■ Peroxyde de benzoyle

<b>CUTACNYL</b>						
Acné mixte : 1 appl. le soir après la toilette sur peau sèche, plusieurs sem. en attaque, puis × 2 à 3/sem. en entretien	40 g (gel aqueux 2,5 %)	2,87	II	30 %	0,07	
	40 g (gel aqueux 5 %)	2,95	II	30 %	0,07	
	40 g (gel aqueux 10 %)	2,95	II	30 %	0,07	
<b>EFFACNÉ</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	40 g (gel aqueux 5 %)		II	NR		
<b>PANNOGEL</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	40 g (gel aqueux 5 %)		II	NR		
	40 g (gel aqueux 10 %)	2,75	II	30 %	0,07	
<b>ECLARAN</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	45 g (gel 5 %)	3,07	II	30 %	0,07	
	45 g (gel 10 %)	3,07	II	30 %	0,07	
<b>CURASPOT</b>						
Idem <b>CUTACNYL</b>	100 g (gel 5 %)			NR		

#### PROPRIÉTÉS

Anti-inflammatoire, antibactérien et un peu kératolytique.

#### INDICATIONS

Acné polymorphe avec prédominance inflammatoire.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux peroxydes (eau oxygénée).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Commencer par des faibles concentrations pour les peaux fragiles avec une touche d'essai

(cf. **trétinoïne**). Espacer les applications en cas d'irritation. Appliquer avec prudence autour des yeux, des narines et de la bouche.

Pas d'exposition solaire (photosensibilisation).

Décoloration des textiles (litterie, vêtements).

Pas de contre-indication pendant la grossesse.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation imposant un espacement des applications. Photosensibilisation.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **peroxyde de benzoyle** inactive la **trétinoïne** et l'**érythromycine**.

## ACNÉ (4)

**Acné rétionnelle sévère, acné résistante à des traitements bien conduits ou récidivante à l'arrêt de ces derniers [2]**

Rétinoïde, **isotrétinoïne** : 0,5 à 1 mg/kg/j, en 1 à 2 prises, jusqu'à une dose cumulée de 100 à 150 mg/kg.

On associe une hydratation du visage (**CLEAN-AC**, **PHYSIANÉ**), des lèvres (**CÉRCERACUTA**, **VASELINE OFFICINALE**, **STICK SVR**, **STICK AU COLD CREAM AVÈNE**) et éventuellement des yeux (**ILAST** et **NUTRIVISC**), une photoprotection externe (**PHOTODERM AKN 30**), ainsi qu'une surveillance biologique des transaminases, des triglycérides et du cholestérol total.

- Un accord de soins et de contraception doit être remis à la patiente et signé avant d'entreprendre le traitement par **isotrétinoïne**.

- À chaque consultation mensuelle le médecin doit s'assurer que le test qualitatif plasmatique de grossesse a bien été réalisé, que la contraception efficace est bien suivie et que la patiente a bien compris les risques d'une grossesse sous **isotrétinoïne**.

- Le médecin doit encore noter tous ces éléments sur l'ordonnance ; dans le cas contraire le médicament ne sera pas délivré par le pharmacien.

**Autres traitements****Traitements hormonaux [1]**

Le traitement antiandrogène local idéal reste à inventer.

L'acétate de cyprotérone (**ANDROCUR**) est indiqué chez la femme ayant une acné sévère et/ou une hyperandrogénie marquée d'origine ovarienne ou périphérique : **ANDROCUR**, 1 cp. du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle + **CESTROGEL** du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle. L'effet contraceptif n'est garanti qu'à partir du 3<sup>e</sup> cycle (schéma de F. Kутten).

Ces traitements imposent une surveillance gynécologique stricte.

**Traitements adjuvants [1]**

- Ne pas solliciter la séborrhée avec des nettoyages agressifs et répétés de la peau ; utiliser des pains surgas sans savon ou des produits moussants pour peau acnéique (**CLEANANCE GEL NETTOYANT**).

- Hydrater la peau avec des émulsions eau dans l'huile respectant le film hydrolipidique naturel de la peau (**CLEAN-AC**).

- Utiliser une photoprotection externe.

- Le traitement des cicatrices résiduelles ne s'envisage qu'après guérison complète de l'acné, on aura recours à différentes techniques : peeling chimique, dermabrasion, laser resurfacing, relèvement chirurgical.

Les peelings n'ont pas démontré cliniquement la preuve de leur efficacité dans le traitement de l'acné.

L'intérêt de l'extraction manuelle des kystes fermés et comédons est fondé sur l'expérience.

L'efficacité des lampes et lasers n'est pas démontrée.

## ANTIACNÉIQUES LOCAUX (4) – ANTIBIOTIQUES

### ■ Érythromycine percutanée

<b>ERYFLUID</b>					
Acné inflammatoire : à tamponner sur toutes les lésions inflammatoires × 1 à 2/j pendant plusieurs sem.	30 mL (sol. alcool. 4 %)	2,52	I	15 %	0,08
	100 mL (sol. alcool. 4 %)	5,30	I	15 %	0,05
<b>ÉRYTHROGEL</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel alcool. 4 %)	3,05	I	15 %	0,10
<b>ÉRYTHROMYCINE BAILLEUL</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	100 mL (sol. alcool. 4 %)	5,06	I	15 %	0,05

### ■ Érythromycine en association

<b>ERYLIK</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel alcool. 4 %)	4,71	I	30 %	0,16

### ■ Clindamycine percutanée

<b>DALACINE T TOPIC</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 mL (sol. alcool. 1 %)		I	NR	
<b>ZINDACLINÉ</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (gel 1 %)		I	NR	
<b>CLINDAFLUID</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 mL (sol. 1 %)		I	NR	
	100 mL (sol. 1 %)		I	NR	

### ■ Acide azélaïque

<b>FINACEA</b>					
Idem <b>ERYFLUID</b>	30 g (tube 15 %)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques locaux de la famille des macrolides et des lincosanides agissant sur *Propionibacterium acnes* et ayant une action anti-inflammatoire dans l'acné.

#### INDICATIONS

Acné inflammatoire.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter l'application à proximité des yeux et de la bouche.

Utiliser la **clindamycine** avec prudence en cas d'antécédent de colite pseudo-membraneuse.

**Grossesse** : innocuité de la **clindamycine** non démontrée.

**Allaitement** : innocuité de la **clindamycine** non démontrée.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Signes d'irritation transitoires.

Risque non exclu de colite pseudo-membraneuse avec la **clindamycine**.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inactivation par le **peroxyde de benzoyle**.

## ACNÉ (5)

### Formes particulières cliniques

#### Folliculite à bacilles Gram négatif

Complication du traitement antibiotique oral de l'acné, cette éruption subite de pustules impose un arrêt des **cyclines orales** et un traitement antibiotique adapté aux prélèvements bactériologiques locaux.

#### Acné fulminans

L'**isotrétinoïne** est peu efficace ; on associe un **corticoïde général**, **prednisone (CORTAN-CYL)**, 1 mg/kg/j à une cycline à 1 g/j.

#### Acné avec œdème facial

**Isotrétinoïne**, 1 mg/kg/j, ou **prednisone** 1 mg/kg/j.

#### Acné néonatale

Absence de traitement avec résolution spontanée le plus souvent, mais dépend de l'intensité des symptômes et peut aller jusqu'à la prescription d'**isotrétinoïne** orale.

### Traitement de l'acné par voie générale

- 1. Il n'y a pas lieu de prescrire de l'**isotrétinoïne** en dehors des acnés sévères nodulokystiques et conglobata et des acnés résistantes à un traitement classique\*.
- 2. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, de débiter un traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse et sans qu'un moyen efficace de contraception ait été instauré un mois avant le début du traitement.
- 3. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, de poursuivre un traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse répété tous les 2 mois, et sans qu'un moyen efficace de contraception soit poursuivi.
- 4. Il n'y a pas lieu, du fait du risque tératogène, d'arrêter le moyen efficace de contraception avant la fin du premier mois suivant l'arrêt du traitement par **isotrétinoïne**\*\*.
- 5. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné par **isotrétinoïne**, de pratiquer d'autres examens\*\*\* que le dosage des transaminases, du cholestérol total et des triglycérides.
- 6. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, d'associer les **cyclines** à l'**isotrétinoïne** du fait du risque d'hypertension intracrânienne.
- 7. Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, de prescrire l'**isotrétinoïne** à une dose inférieure à 0,5 mg/kg/j - dose initiale optimale - ou supérieure à 1 mg/kg/j.
- Il n'y a pas lieu, dans le traitement de l'acné, d'administrer une dose cumulée de plus de 150 mg/kg d'**isotrétinoïne** par cure.

### CONSENSUS

- [1] Guidelines of care for acne vulgaris management, AAD, 2007
- [2] Traitement de l'acné par voie générale, *Afssaps*, 2007

\* L'AMM précise que l'acné est résistante après un traitement classique (traitement antibiotique en association avec des traitements locaux) d'au moins 3 mois.

\*\* Au terme de cette période, il conviendra de vérifier qu'il n'y a pas de grossesse en cours par un test qualitatif de grossesse pratiqué une semaine après la fin de la contraception, c'est-à-dire 5 sem. après l'arrêt du traitement par **isotrétinoïne**.

\*\*\* Sauf les examens nécessaires pour répondre aux conditions des références 3, 4, 5 et sauf comorbidité.

## ANTIACNÉIQUES GÉNÉRAUX (1) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (1)

### ■ Isotrétinoïne

<b>CONTRACNÉ GÉ</b>					
Réservé aux acnés sévères ou résistantes aux traitements bien conduits : 0,5 à 1 mg/kg/j en 1 à 2 prises/j aux repas jusqu'à une dose cumulée de 100 à 150 mg/kg	30 caps. 5 mg	8,13	I	65 %	0,27
	30 caps. 10 mg	13,38	I	65 %	0,45
	30 caps. 20 mg	22,80	I	65 %	0,76
<b>CONTRACNÉ</b>					
Idem <b>CONTRACNÉ GÉ</b>	30 caps. 40 mg	41,77	I	65 %	1,39
<b>PROCUTA GÉ</b>					
Idem <b>CONTRACNÉ GÉ</b>	30 caps. 5 mg	9,05	I	65 %	0,30
	30 caps. 10 mg	14,94	I	65 %	0,50
	30 caps. 20 mg	25,50	I	65 %	0,85
<b>CURACNÉ GÉ</b>					
Idem <b>CONTRACNÉ GÉ</b>	30 caps. 5 mg	8,13	I	65 %	0,27
	30 caps. 10 mg	13,38	I	65 %	0,45
	30 caps. 20 mg	22,80	I	65 %	0,76
<b>CURACNÉ</b>					
Idem <b>CONTRACNÉ GÉ</b>	30 caps. 40 mg	41,77	I	65 %	1,39

## ANTIACNÉIQUES GÉNÉRAUX (2) – DÉRIVÉS DE LA VITAMINE A (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Dérivé de la vitamine A, l'**isotrétinoïne** est anti-séborrhéique, kératolytique et dans une moindre mesure anti-inflammatoire.

### INDICATIONS

D'emblée dans les acnés sévères (nodulo-kystique, conglobata) ; en seconde intention dans les acnés résistantes ou récidivantes après des traitements majeurs bien conduits.

Hidrosadénite suppurée à un stade peu avancé, folliculite disséquante du cuir chevelu.

### CONTRE-INDICATIONS

#### Grossesse et allaitement.

Femmes en âge de procréer sans contraception efficace.

Dyslipidémie, hypervitaminose A, insuffisances hépatique ou rénale.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contraception efficace chez la femme en période d'activité génitale, débutée 1 mois avant le début du traitement et poursuivie 1 mois après la fin du traitement.

Accord de soins et de contraception signé par la patiente ; évaluation mensuelle de l'observance de la contraception et de la compréhension par la patiente des risques d'une grossesse sous **isotrétinoïne**. Réalisation avant le traitement puis de façon mensuelle d'un test qualitatif plasmatique de grossesse. Surveillance

avant et pendant le traitement (à 1 mois puis tous les 2 mois) des transaminases, des triglycérides et du cholestérol total.

Pas de port de lentilles de contact.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Tératogénicité +++.

La contraception et la réalisation d'un test qualitatif plasmatique de grossesse sont obligatoires pour toutes les femmes traitées par **isotrétinoïne**.

Cutanéo-muqueux : chéilite, xérose, sécheresse buccale, desquamation palmo-plantaire, érythème facial, chute de cheveux, fragilité des ongles, poussée transitoire de l'acné dans le 1<sup>er</sup> mois.

Osseux : douleurs osseuses, arthralgies, hyperostoses, soudure prématurée des cartilages de conjugaison chez l'enfant.

Ophtalmologiques : sécheresse oculaire, intolérance au port des lentilles cornéennes, conjonctivite, opacités cornéennes, myopie.

Divers : myalgies, céphalées par hypertension intracrânienne, élévation des phosphatases alcalines et des transaminases, hépatites, élévation du cholestérol total et des triglycérides.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les **tétracyclines** sont contre-indiquées en raison du risque d'hypertension intracrânienne. Association avec la **phénytoïne** à surveiller.

## ANTIACNÉIQUES GÉNÉRAUX (3) – DÉRIVÉS DU ZINC

### ■ Zinc (ou gluconate de zinc)

<b>GRANIONS DE ZINC</b>					
Acné inflammatoire : 30 mg/j à distance des repas, pendant 3 mois puis 15 mg/j en entretien	30 amp. buv. 15 mg	4,53	I	30 %	0,15
<b>RUBOZINC</b>					
Idem <b>GRANIONS DE ZINC</b>	30 gél. 15 mg	5,55	I	30 %	0,19
	60 gél. 15 mg	8,30	I	30 %	0,14
<b>EFFIZINC</b>					
Idem <b>GRANIONS DE ZINC</b>	30 gél. 15 mg	4,84	I	30 %	0,16
	60 gél. 15 mg	8,30	I	30 %	0,14

#### PROPRIÉTÉS

Agit sur la composante inflammatoire de l'acné par un mécanisme mal connu.

#### INDICATIONS

Acné inflammatoire.

Acrodermatite entéropathique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Gastralgies spontanément résolutives, surtout avec le sulfate de zinc.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre à distance des repas et d'autres médicaments éventuellement associés.

Anémie sidéroblastique par carence en cuivre si traitement prolongé à forte dose.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Possibilité de chélation intestinale du **zinc** par les aliments riches en acide phytique (pain complet, maïs, soja, etc.).

Associations déconseillées : **cyclines, anti-acides, calcium, fer** (chélation).

## ANTIACNÉIQUES GÉNÉRAUX (4) – ANTIANDROGÈNE

### ■ Cyprotérone acétate

<b>ANDROCUR</b>					
Acné sévère et/ou hyperandrogénie d'origine ovarienne ou périphérique : 1 cp. du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle associé à un œstrogène du 16 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j (schéma de Kuttan)	20 cp. séc. 50 mg	12,09	I	65 %	0,60

#### PROPRIÉTÉS

Progestatif de synthèse ayant une action antiandrogénique, une action antigonadotrope et une action anti-œstrogénique.

#### INDICATIONS

Hirsutismes féminins majeurs d'origine non tumorale.

Manifestations d'hyperandrogénie chez la femme jeune désirant une contraception orale. Certaines pubertés précoces, contraception orale chez les femmes ayant un lupus érythémateux systémique, cancer de la prostate.

#### CONTRE-INDICATIONS

Affections hépatiques graves, diabète sévère, antécédents ou maladie thromboemboliques, dépression chronique grave, tuberculose.

Celles des œstrogènes lorsqu'ils sont associés.

**Grossesse et allaitement.**

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Arrêt du traitement si : troubles oculaires, signes d'hépatite, accident thromboembolique, céphalées importantes.

Surveillance clinique : examen gynécologique avec palpation des seins, poids, pression artérielle.

Surveillance biologique : lipides sanguins, glycémie, bilan hépatique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Chez la femme : troubles des règles (possible aménorrhée), prise de poids.

Chez l'homme : inhibition de la spermatogénèse, gynécomastie, variation du poids, impuissance.

Dans les 2 sexes : dyspnée, troubles visuels, aggravation d'une insuffisance veineuse existante, migraines et céphalées, accidents hépatiques dose-dépendants.

## ANTIALOPÉCIQUES

## ■ Minoxidil

<b>ALOPEXY</b>					
Alopécie androgéno-génétique : 2 appl./j sur les zones alopéciques du cuir chevelu sec en massant légèrement	180 mL (3 fl. de sol. 2 %)			NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)			NR	
<b>ALOSTIL</b>					
Idem <b>ALOPEXY</b>	180 mL (3 fl. de sol. 2 %)			NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)			NR	
<b>MINOXIDIL BAILLEUL</b>					
Idem <b>ALOPEXY</b>	1 mL (3 fl. de sol. 2 %)		II	NR	
	180 mL (3 fl. de sol. 5 %)		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateur périphérique.

**INDICATIONS**

Alopécie androgéno-génétique.  
Autres alopecies, non cicatricielles (pelade).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Appliquer sur le cuir chevelu sec, ne pas utiliser de sèche-cheveux après application (diminution de l'efficacité) et se laver les mains.  
Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

## ■ Finastéride

<b>PROPÉCIA</b>					
Alopécie androgéno-génétique 1 cp./j, minimum 3 à 6 mois	28 cp. 1 mg		I	NR	
	84 cp. 1 mg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la 5 $\alpha$ -réductase de type 2.

**INDICATIONS**

Stades peu évolués de l'alopécie androgéno-génétique chez l'homme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Femme et sujet < 18 ans.  
Hypersensibilité connue au produit.

Surveiller l'apparition d'effets systémiques.  
Ne pas utiliser chez la femme les formes à 5 %.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation locale (7,5 %).  
Sensibilité au propylène glycol (excipient).  
Rares : vertiges, céphalées, hypertrichose temporaire, alopécie paradoxale.  
Exceptionnels : effets systémiques hypotenseurs avec tachycardie et rétention hydrosodée, polymyalgies, élévation des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Guanéthidine** : risque d'hypotension orthostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne doit pas être prescrit chez la femme.  
Ne pas utiliser avant l'âge de 18 ans.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares (1/100 à 1/1 000) et transitoires, réversibles en cours ou à l'arrêt du traitement :  
– Troubles de l'érection.  
– Diminution de la libido et du volume de l'éjaculat.



## SHAMPOOINGS À BASE DE GOUDRON

SHAMPOOINGS AU GOUDRON *	
Shampooings à base d'huile de cade <b>ITEM ALPHA CADE</b>	Les shampooings au goudron sont indiqués dans tous les états squameux du cuir chevelu, pityriasis capitis, dermatite séborrhéique, psoriasis : en attaque au début à raison de 3 shampooings par semaine puis espacés régulièrement en alternance avec un shampooing doux au long court.

## PAINS SANS SAVON

PAINS DERMATOLOGIQUES	
<b>A-DERMA</b> pain surgras (sans conservateur) et gel surgras <b>PROVÉGOL</b> pain (sans conservateur) et gel surgras <b>TOPIALYSE SENSITIVE</b> gel surgras (sans conservateur) <b>LIPIKAR</b> syndet, surgras et pain surgras <b>AVÈNE COLD CREAM</b> gel surgras ou pain surgras	Pains de toilette garantis sans savon, utilisables en remplacement des savons pour la toilette des peaux sensibles : traitement asséchant antiacnéique, dermatite séborrhéique, dermatite atopique, xérose cutanée, etc.

\* Liste non exhaustive ; ne sont citées que les spécialités les plus fréquemment utilisées par le dermatologue.

## SHAMPOOINGS À BASE DE GOUDRON

SHAMPOOINGS AU GOUDRON *	
Shampooings à base d'huile de cade <b>ITEM ALPHA CADE</b>	Les shampooings au goudron sont indiqués dans tous les états squameux du cuir chevelu, pityriasis capitis, dermatite séborrhéique, psoriasis : en attaque au début à raison de 3 shampooings par semaine puis espacés régulièrement en alternance avec un shampooing doux au long court.

## PAINS SANS SAVON

PAINS DERMATOLOGIQUES	
<b>A-DERMA</b> pain surgras (sans conservateur) et gel surgras <b>PROVÉGOL</b> pain (sans conservateur) et gel surgras <b>TOPIALYSE SENSITIVE</b> gel surgras (sans conservateur) <b>LIPIKAR</b> syndet, surgras et pain surgras <b>AVÈNE COLD CREAM</b> gel surgras ou pain surgras	Pains de toilette garantis sans savon, utilisables en remplacement des savons pour la toilette des peaux sensibles : traitement asséchant antiacnéique, dermatite séborrhéique, dermatite atopique, xérose cutanée, etc.

\* Liste non exhaustive ; ne sont citées que les spécialités les plus fréquemment utilisées par le dermatologue.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX

## ■ Mupirocine

<b>MUPIDERM</b>					
Impétigo et dermatoses impétiginisées 2 à 3 appl./j pendant 5 à 10 j	15 g (pom. 2 %)	6,33	I	30 %	0,42

## ■ Acide fusidique

<b>FUCIDINE</b>					
Infections cutanées bactériennes Éradication du portage dans les staphylococcies cutanées récidivantes 2 à 3 appl./j	15 g (cr. ou pom. 2 %)	3,06	I	30 %	0,20

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques à usage local, ayant une action antistaphylococcique et sur de nombreux autres germes en raison des concentrations élevées (bactéricides) obtenues *in situ*.

## INDICATIONS

Éradication du portage nasal de staphylocoque doré dans les staphylococcies récidivantes (pour **FUCIDINE** uniquement, pas pour **MUPI-  
DERM** selon les mentions du *Vidal* et l'AMM).  
Traitement des dermatoses cutanées infectieuses (impétigo, folliculite bactérienne, etc.).

## ■ Sulfadiazine argentine

<b>FLAMMAZINE</b>					
1 appl./j	50 g (cr. 1 %) 500 g (cr. 1 %)	3,91	I	15 % NR	0,08

## ■ Sulfadiazine argentine + nitrate de cérium

<b>FLAMMACÉRIUM</b>					
1 appl./j pendant 1 sem. puis tous les 2-3 j	500 g (cr. 1 % stérile)	HOP	I	NR	

## PROPRIÉTÉS

**Sulfadiazine** : sulfamide bactériostatique.  
**Argent** : pouvoir bactéricide.

## MICROBIOLOGIE

Gram (-) tels que *Pseudomonas aeruginosa*,  
*Aerobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*,  
*Staphylococcus aureus*.

## INDICATIONS

**FLAMMAZINE** : infections cutanées bactériennes, plaies infectées et brûlures.

**FLAMMACÉRIUM** : brûlures étendues avec lésions profondes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Application sur les yeux, et sur les seins chez la femme qui allaite.

Ne pas utiliser **MUPIDERM** sur la muqueuse nasale (**BACTROBAN** est réservé pour cette indication en milieu hospitalier).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risques d'émergence de souches résistantes.  
Ne pas utiliser la **mupirocine** sur de grandes surfaces (< 20%).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Cf. Précautions d'emploi.

## CONTRE-INDICATIONS

Sensibilisation connue aux sulfamides.  
Nouveau-né, prématuré, fin de gestation (3<sup>e</sup> trim.), allaitement (risque d'ictère nucléaire du nouveau-né).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déficit en G6PD : risque d'hémolyse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Anticoagulants oraux** : nombreux cas rapportés d'augmentation de leur activité, déséquilibre de l'INR.

## ANTIPHOTOSENSIBILISANTS

## ■ Acide para-aminobenzoïque

<b>PARAMINAN</b>					
Prévention des photodermatoses, notamment de la lucite estivale bénigne : 6 gél./j 15 j avant le départ puis 4 gél./j pendant la durée du séjour jusqu'au bronzage	120 cp. 500 mg			NR	
<b>PABASUN</b>					
Idem <b>PARAMINAN</b>	60 cp. 500 mg			NR	

## ■ Hydroxychloroquine

<b>NIVAQUINE</b>					
Prévention de la lucite estivale : 2 à 3 cp./j 7 j avant exposition puis 2 à 3 cp./j pendant 15 j	20 cp. 100 mg	2,95	II	65 %	0,15
<b>PLAQUENIL</b>					
idem <b>NIVAQUINE</b>	30 cp. 200 mg	5,33	II	65 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Protecteurs des réactions de photosensibilité.

**INDICATIONS**

Prévention des photodermatoses, notamment de la lucite estivale bénigne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Pour les caroténoïdes :

- **grossesse** ;
- **allaitement**.

Rétinopathie, glaucome, hypervitaminose A.  
Hypersensibilité aux substances du groupe para (anesthésiques locaux, conservateurs et colorants).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Contrôle ophtalmologique nécessaire dans les utilisations prolongées (> 2 mois/an) pour les **antipaludéens** de synthèse.

Ces médicaments ne protègent en rien des effets carcinogènes du soleil et seront toujours associés à une photoprotection externe maximum (indice 50+ pour les UVB et bonne protection UVA type **PHOTODERM MAX 50+**, **ANTHÉLIOS 50+**, **AVÈNE 50+**).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Pour les caroténoïdes :

- Coloration orangée de la peau, des selles et des larmes.
- Troubles digestifs transitoires.
- Rétinopathies.

Pour l'acide para-aminobenzoïque : possibles réactions allergiques chez les sujets sensibilisés aux substances du groupe para.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pour les caroténoïdes : ne pas associer à la vitamine A (risque d'hypertension intracrânienne).

## MÉTRONIDAZOLE LOCAL

### ■ Métronidazole

<b>ROSICED</b>					
Rosacée : 1 appl. matin et soir pendant 6 à 8 sem. puis 1 appl. le soir en entretien	30 g (gel 0,75 %)	5,55	I	30 %	0,19
<b>ROZAGEL</b>					
Idem <b>ROSICED</b>	30 g (gel 0,75 %)	6,15	I	30 %	0,21
<b>ROZEX</b>					
Idem <b>ROSICED</b>	30 g (gel 0,75 %)	6,50	I	30 %	0,22
	30 g (crème 0,75 %)	6,50	I	30 %	0,22
	30 g (tube d'émuls. 0,75 %)	6,50	I	30 %	0,22

#### PROPRIÉTÉS

Antibiotique et antiparasitaire, le **métronidazole** a une action sur la composante inflammatoire de la rosacée.

#### INDICATIONS

Rosacée au stade papulo-pustuleux.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **métronidazole**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le contact avec les yeux.

**Grossesse** : pas au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** : passage dans le lait.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Signes mineurs d'irritation cutanée.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les possibilités d'interactions médicamenteuses sont peu probables compte tenu du faible passage systémique du **métronidazole** topique ; rappelons la possibilité d'interaction avec :

- le **disulfirame (ESPÉRAL)** ;
- l'alcool ;
- la **coumarine** et la **warfarine**.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (1) – ANTIFONGIQUES AZOLÉS (1)

### ■ Bifonazole

<b>AMYCOR</b>					
Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, pityriasis versicolor : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	15 g (crème 1 %)	4,68	I	30 %	0,31
	15 mL (spray 1 %)	4,53	I	30 %	0,30
	15 g (fl. pdre 1 %)	4,68	I	30 %	0,31

### ■ Oxiconazole

<b>FONX</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 1 %)	3,89	I	30 %	0,26
	15 mL (spray 1 %)	3,89	I	30 %	0,26
	15 g (fl. pdre 1 %)	3,89	I	30 %	0,26

### ■ Fenticonazole

<b>LOMEXIN</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 2 %)	3,76	I	30 %	0,25
	30 g (crème 2 %)			NR	

### ■ Omoconazole

<b>FONGAMIL</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	15 g (crème 1 %)	3,76	I	30 %	0,25
	30 g (spray 1 %)	4,35	I	15 %	0,14
	20 g (fl. pdre 1 %)		I	NR	

### ■ Miconazole

<b>DAKTARIN</b>					
Idem <b>AMYCOR</b>	12 c-mes. (gel buccal) 2 %	5,28	I	65 %	0,44
	30 g (fl. pdre 2 %)	3,05	I	30 %	0,10
<b>LORAMYC</b>					
Pycoses oropharyngées : 1 cp. muco-adhésif x 1/j pdt 7 à 14 j	14 cp. 50 mg	71,02	I	65 %	5,07

### ■ Isoconazole

<b>FAZOL</b>					
idem <b>AMYCOR</b>	30 g (crème 2 %)	4,58	I	30 %	0,15
	30 g (1 fl. émuls. 2 %)	4,39	I	30 %	0,15

### ■ Sertaconazole

<b>MONAZOL</b>					
Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, pityriasis versicolor : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	15 g (crème 2 %)	3,89		30 %	0,26

## MYCOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES (2) – DERMATOPHYTIES

Ce sont des mycoses strictement cutanées et phanériennes dues à des champignons du genre dermatophytes se développant exclusivement dans la couche cornée.

### Mesures non spécifiques

- Recherche et traitement d'un facteur de contact (entourage pour les espèces anthrophiles, animaux essentiellement domestiques pour les espèces zoophiles).
- Prélèvement mycologique préalable à tout traitement, **indispensable en cas de teigne et d'onychomycose** (différencier de simples modifications de l'ongle par microtraumatismes répétés très fréquents en pratique +++).

### Traitement spécifique

#### Dermatophyties de la peau glabre

##### ► *Forme localisée*

Antiseptie et **imidazolé** local.

Ex. : **BÉTADINE** *dermique* x 2/j pendant 8 j et **éconazole** (**PEVARYL** *crème*) : x 2/j pendant 21 j.

##### ► *Forme diffuse*

Antifongique par voie orale.

Ex. : **terbinafine** (**LAMISIL**) : 1 cp. à 250 mg/j pendant 28 j.

#### Dermatophyties des plis (intertrigo)

- Antiseptie, séchage +++ et **imidazolé** local. Par ex. : **BÉTADINE** *dermique* x 2/j pendant 8 j et **éconazole** (**PEVARYL** *1 % lait*) x 2/j pendant 21 j.
- S'aider du sèche-cheveux pour bien sécher les plis après la toilette.
- Linge de toilette lavé à 60 °C en machine.
- Vêtements et sous-vêtements amples.

#### Pied d'athlète

- Traiter tous les espaces interorteils des 2 pieds, porter des chaussettes en coton changées tous les jours et lavées en machine à 60 °C, éviter les chaussures très fermées, notamment les baskets, séchage fondamental après la toilette +++.
- Pulvériser **PEVARYL** poudre dans toutes les chaussures et chaussons habituellement portés, x 1/j jusqu'à la fin du flacon.

### Teignes

- Traitement obligatoirement général, reposant sur la **griséofulvine** (**GRISÉFULINE**) : 1 cp. à 500 mg x 2/j chez l'adulte, 20 mg/kg/j chez l'enfant en 2 prises, au milieu des repas, pendant 2 mois.
- Prélèvement mycologique indispensable avant tout traitement.
- Examen des sujets contacts (problème des porteurs asymptomatiques).
- Pas d'éviction scolaire si certificat attestant d'un traitement en cours.

### Onychomycoses à dermatophytes

Prélèvement mycologique dans un laboratoire entraîné indispensable avant tout traitement par voie générale (un ongle dyschromique n'est pas forcément une onychomycose).

#### ► *Atteinte distale, mono- ou oligodactyle, sans atteinte matricielle*

Là encore, plutôt que d'entreprendre des traitements locaux par **vernifs antifongiques** COÛTEUX, en cas de doute faire un prélèvement mycologique +++ dans un laboratoire de référence.

Le traitement est local.

Ex. : **bifonazole** + **urée** (**AMYCOR ONYCHOSÉ**) : sous occlusion de 24 h pour détruire la tablette unguéale mycosique.

Ex. : **amorolfine** (**LOCÉRYL** *5 %*) x 1 à 2/sem. jusqu'à la guérison clinique (± mycologique).

Ex. : **ciclopiroxolamine** (**MYCOSTER** *8 %*) x 1/j jusqu'à la guérison clinique (± mycologique).

#### ► *Atteinte polydactyle, atteinte matricielle*

- Le traitement est général et repose actuellement sur la **terbinafine** (**LAMISIL**) en cure continue ou sur l'**itraconazole** (**SPORANOX**) en cures intermittentes (1 sem. par mois).
- Ex. : **terbinafine** (**LAMISIL**), 1 cp. à 250 mg/j pendant 3 mois.

- Association à un traitement local.

Ex. : **bifonazole** + **urée** (**AMYCOR ONYCHOSÉ**) : sous occlusion de 24 h pour détruire la tablette unguéale mycosique.

- Prélèvement mycologique en fin de traitement, prévention des rechutes (fréquentes) par un traitement antifongique local des intertrigos interorteils et du pourtour unguéal.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (2) – ANTIFONGIQUES AZOLÉS (2)

### ■ Éconazole

<b>PEVARYL</b>					
Idem <b>MONAZOL</b>	30 g (crème 1 %)	4,79		30 %	0,16
	30 mL (fl. d'émuls. 1 %)	4,95		30 %	0,17
	30 g (fl. pdre 1 %)	6,53		30 %	0,22
	30 g (fl. de sol. 1 %)	5,51		30 %	0,18

### ■ Tioconazole

<b>TROSYD</b>					
Idem <b>MONAZOL</b>	30 g (crème 1 %)	3,64	I	30 %	0,12

### ■ Kétoconazole

<b>KÉTODERM</b>					
Dermite séborrhéique : 2 sach./sem. pdt 1 mois en attaque puis 1 sach. tous les 8 à 15 j en entretien Pityriasis versicolor : traitement minute : 1 tube à appliquer sur tout le corps ; laisser 5 min et rincer ; renouveler à 15 j si atteinte profuse Mycoses cutanées à dermatophytes et à <i>Candida</i> , érythrasma, dermite séborrhéique profuse : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem.	8 sach.-dose 6 g (gel moussant 2 %)	9,33	I	30 %	1,17
	20 g (tube monodose de gel 2 %)	4,65	I	30 %	0,23
	15 g (crème 2 %)	4,68	I	30 %	0,31

#### PROPRIÉTÉS

Les imidazolés sont des antifongiques à large spectre, ayant une puissante action contre les *Candida*, les dermatophytes, *Malassezia furfur* (agent du *pityriasis versicolor*, également impliqué dans la dermite séborrhéique et le *pityriasis capitis*), *Corynebacterium minutissimum*, ils sont également bactéricides sur les germes Gram+.

#### INDICATIONS

Mycoses cutanées et muqueuses à *Candida* et à dermatophytes.  
 Pityriasis versicolor.  
 Dermite séborrhéique.  
 Érythrasma.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : ne pas utiliser au cours du 1<sup>er</sup> trimestre **kétoconazole**, **bifonazole**, **tioconazole** et **omoconazole**.

Éviter tout contact avec les yeux et proscrire les solutions alcoolisées chez le nourrisson et sur les muqueuses.

**TROSYD** : l'excipient huileux peut détériorer le latex.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale lors d'une utilisation prolongée ; rares eczéma de contact.



## MYCOSES CUTANÉES ET MUQUEUSES (3) – PITYRIASIS VERSICOLOR

### Définition

Mycose cutanée due à *Malassezia furfur*, saprophyte des régions séborrhéiques du corps.

### Traitement

Il repose sur un imidazolé local.

Ex. : kétoconazole (**KÉTODERM** gel mono-

dose) : 1 tube à utiliser en 1 seule fois, en commençant par un shampoing puis en traitant tout le reste du tégument ; laisser agir 5 min et rincer. Prévenir le patient que les macules achromiques ne se repigmenteront qu'après un certain temps.

Dans les cas très profus et rebelles au traitement local : kétoconazole (**NIZORAL**) : 200 mg/j pendant 10 j.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (3) – KÉRATOLYTIQUE

## ■ Bifonazole + urée

AMYCOR ONYCHOSET					
Onychomycoses à dermatophytes et à <i>Candida</i> : occlusion de 12 ou de 24 h jusqu'à élimination de l'ongle pathologique	10 g (pomm. + pansements)	24,41	I	30 %	2,44

**PROPRIÉTÉS**

Association d'un imidazolé et d'un kératolytique, l'**urée**, ayant une affinité particulière pour l'ongle pathologique qu'elle détruit.

**INDICATIONS**

Onychomycoses.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : ne pas utiliser au cours du 1<sup>er</sup> trimestre.

Association à un traitement oral en cas d'atteinte matricielle.

Protection éventuelle de la peau périunguéale par un vernis incolore.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibles irritations locales périunguéales dues au kératolytique ; rares eczématisations de contact.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (4) – VERNIS ANTIFONGIQUES

## ■ Amorolfine

LOCÉRYL					
Onychomycoses : 1 à 2 appl./sem. jusqu'à la guérison clinique et mycologique	2 mL (sol. filmogène 5 % + 10 spatules)	21,84	I	30 %	10,92

## PROPRIÉTÉS

Antifongique actif sur les *Candida*, les dermatophytes et les moisissures.  
La solution filmogène diffuse dans la tablette unguéale.

## INDICATIONS

Onychomycoses.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

## ■ Ciclopiroxolamine

MYCOSTER					
Onychomycoses : 1 appl./j jusqu'à la guérison clinique et mycologique	3 mL (sol. filmogène 8 % + pinceau)	10,14	I	30 %	3,38

## PROPRIÉTÉS

Antifongique actif sur les *Candida*, les dermatophytes, *Malassezia furfur*, et les bactéries Gram+ et Gram-.

## INDICATIONS

Onychomycoses.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

Ne pas utiliser chez l'enfant.

Associer un traitement par voie générale en cas d'atteinte matricielle.

Utiliser un dissolvant avant chaque nouvelle application de la solution filmogène.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Possible sensation de brûlure en début de traitement, transitoire cédant habituellement avec la poursuite du traitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : utilisation déconseillée.

Enlever le film avec un dissolvant × 1/sem.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Possibles irritations locales ; rares eczématisations de contact.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (5) – FAMILLE DES PYRIDONES

■ **Ciclopiroxolamine**

<b>MYCOSTER</b>				
Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à <i>Candida</i> : 1 à 2 appl./j pendant 2 à 3 sem., pityriasis versicolor pour la sol. : 1 appl./j pendant 3 sem.	30 g (crème 1 %)	4,68	30 %	0,16
	30 mL (sol. alcool. 1 %)	4,63	30 %	0,15
	30 g (fl. de pdre. 1 %)	4,63	30 %	0,15

**PROPRIÉTÉS**

Antifongique actif sur les *Candida*, les dermatophytes, *Malassezia furfur*, et les bactéries Gram+ et Gram-.

**INDICATIONS**

Mycoses à *Candida* et à dermatophytes, pityriasis versicolor.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : utilisation déconseillée.

Éviter tout contact avec les yeux et proscrire les solutions alcoolisées chez le nourrisson et sur les muqueuses.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibles irritations locales ; rares eczématisations de contact.

## ANTIFONGIQUES LOCAUX (6) – DIVERS

■ **Terbinafine**

<b>LAMISIL</b>					
Candidoses cutanées	15 g (crème 1 %)	4,34	II	30 %	0,29
1 appl./j pendant 1 sem.	15 mL (fl. sol. pulv. 1 %)	5,33	II	30 %	0,36
1 cp./j au cours d'un repas	14 cp. 250 mg	18,78	II	65 %	1,34
	28 cp. 250 mg	36,33	II	65 %	1,30
<b>LAMISILDERMGEL</b>					
Idem <b>LAMISIL</b>	15 g (gel 1 %)	5,33	II	30 %	0,36
<b>LAMISILATE</b>					
Idem <b>LAMISIL</b>	10 g (crème 1 %)		II	NR	
<b>LAMISILATE MONODOSE</b>					
Idem <b>LAMISIL</b>	4 g (sol. appl. cut.) 1%		II	NR	

■ **Ciclopiroxolamine**

<b>SEBIPROX</b>					
Shampooing réservé au traitement de la dermatite séborrhéique	100 mL 1,5 %	9,88	II	30 %	0,10

**PROPRIÉTÉS**

Antifongique actif sur les *Candida* et les dermatophytes.

**INDICATIONS**

Mycoses cutanées et muqueuses à dermatophytes et à *Candida*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : utilisation déconseillée.

Ne pas appliquer sur les yeux.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares érythèmes et prurit.

## ANTIFONGIQUE ORAL

## ■ Griséofulvine

GRISÉFULVINE					
A. : 500 à 1 000 mg/j	30 cp. 250 mg	4,14	I	65 %	0,14
E. : 10 à 20 mg/kg/j	30 cp. 500 mg	6,56	I	65 %	0,22

## PROPRIÉTÉS

Antifongique actif sur les dermatophytes (*Microsporon*, *Trichophyton* et *Epidermophyton*) mais inactif sur les *Candida*.

## INDICATIONS

Dermatophyties de la peau glabre, de la barbe et du cuir chevelu et palmo-plantaires. Onychomycose.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** (innocuité non démontrée).

## Allaitement.

Allergie à la griséofulvine.

Porphyrie, lupus.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prise au milieu des repas.

Surveillance mensuelle de la numération sanguine.

Photosensibilisation.

Effet antabuse.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Digestifs : nausées, vomissements, anorexie, altération du goût, sensation de soif.

Cutanés : photosensibilisation, allergie.

Neurologiques : insomnie, somnolence, céphalées, asthénie, vertiges, effet antabuse.

Hématologiques : anémie, leucopénie.

Divers : risque de crise de porphyrie aiguë, hépatotoxicité au cours de la porphyrie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Par induction enzymatique : **contraceptifs oraux, kétoconazole, antivitamines K, bromocriptine, ciclosporine, hormones thyroïdiennes, isoniazide.**

**Phénobarbital** : augmenter les doses de griséofulvine.

NB : Pour les autres **antifongiques** utilisés par voie orale ou IV : cf. Candidoses invasives (chap. Maladies infectieuses).

## ANTISCABIEUX NON PYRÉTHRYNOÏDE

## ■ Benzoate de benzyle

<b>ASCABIOL</b>					
Gale : appliquer sur tout le corps sauf le visage et le cuir chevelu puis laver après 24 h Changer les draps avant et après le traitement	125 mL (fl. de sol. 10 %)			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiparasitaire actif sur les acariens dont les sarcoptes de la gale ; également actif sur les poux et les aoûtats.

**INDICATIONS**

Gale et aoûtats.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et nourrisson : ne pas appliquer pendant plus de 12 h.

Déparasiter les vêtements et la literie avec **A-PAR aérosol**.

Ne pas avaler ni appliquer sur le visage, les yeux et les muqueuses.

Traitement simultané de tous les sujets contacts.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation locale, surtout si eczématisation.

Possible eczématisation.

Convulsion en cas de non-respect des précautions d'emploi.

## ANTIPARASITAIRE

## ■ Ivermectine

<b>STROMEKTOL</b>					
Traitement oral de la gale humaine : 200 µg/kg en 1 prise/j	1 cp. 3 mg 4 cp. 3 mg 20 cp. 3 mg	5,37 19,56 HOP	II II II	65 % 65 %	5,37 4,89

**PROPRIÉTÉS**

Antiparasitaire dérivé des avermectines présentant une affinité importante pour les canaux chlorure glutamate-dépendants présents dans les cellules musculaires et nerveuses des invertébrés.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, excellente absorption digestive, métabolisation mal connue, excrétion biliaire, faible passage transplacentaire.

**INDICATIONS**

- Gale humaine.
- Anguilliose gastro-intestinale.
- Microfilarémie à *Wuchereria bancrofti*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement.**

Sécurité non établie si poids < 15 kg.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

## ANTISCABIEUX NON PYRÉTHRYNOÏDE

## ■ Benzoate de benzyle

<b>ASCABIOL</b>					
Gale : appliquer sur tout le corps sauf le visage et le cuir chevelu puis laver après 24 h Changer les draps avant et après le traitement	125 mL (fl. de sol. 10 %)			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiparasitaire actif sur les acariens dont les sarcoptes de la gale ; également actif sur les poux et les aoûtats.

**INDICATIONS**

Gale et aoûtats.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et nourrisson : ne pas appliquer pendant plus de 12 h.

Déparasiter les vêtements et la literie avec **A-PAR aérosol**.

Ne pas avaler ni appliquer sur le visage, les yeux et les muqueuses.

Traitement simultané de tous les sujets contacts.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation locale, surtout si eczématisation.

Possible eczématisation.

Convulsion en cas de non-respect des précautions d'emploi.

## ANTIPARASITAIRE

## ■ Ivermectine

<b>STROMEKTOL</b>					
Traitement oral de la gale humaine : 200 µg/kg en 1 prise/j	1 cp. 3 mg 4 cp. 3 mg 20 cp. 3 mg	5,37 19,56 HOP	II II II	65 % 65 %	5,37 4,89

**PROPRIÉTÉS**

Antiparasitaire dérivé des avermectines présentant une affinité importante pour les canaux chlorure glutamate-dépendants présents dans les cellules musculaires et nerveuses des invertébrés.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, excellente absorption digestive, métabolisation mal connue, excrétion biliaire, faible passage transplacentaire.

**INDICATIONS**

- Gale humaine.
- Anguilliose gastro-intestinale.
- Microfilarémie à *Wuchereria bancrofti*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement.**

Sécurité non établie si poids < 15 kg.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.



**ANTISCABIEUX ET ANTIPÉDICULEUX PYRÉTHRYNOÏDES (1)**

## ■ Néopynamine = tétraméthrine + sumithrine

<b>A-PAR aérosol</b>				
Complément de traitement de la gale, des poux, des puces et punaises, pour le linge et la literie	125 g (aérosol)		NR	

## ■ Esdétrine + pipéronyle butoxyde

<b>SPRÉGAL</b>				
Traitement de la gale : pulvériser sur tous le corps sauf le visage et le cuir chevelu le soir de préférence puis laver après 12 h Changer les draps avant et après le traitement	152 g (aérosol)		NR	

## ■ Phénothrine

<b>ITEM ANTI-POUX</b>				
Péculoses : appl. sur le cuir chevelu (et toute région atteinte), laisser 10 min puis laver et peigner rigoureusement	150 mL (lotion) 150 mL (shamp.)		NR NR	
<b>ITAX</b>				
Péculoses : 2 shamp. consécutifs en laissant le 2 <sup>e</sup> 5 min avant de laver et peigner rigoureusement	150 mL (shamp.) 300 mL (shamp.)		NR NR	
<b>PARASIDOSE</b>				
Idem <b>ITAX</b>	200 mL (shamp.)		NR	

## ■ Phénothrine + acide acétique

<b>HÉGOR</b>				
Idem <b>ITAX</b>	150 mL (shamp.)		NR	

## ANTISCABIEUX ET ANTIPÉDICULEUX PYRÉTHRYNOÏDES (2)

### ■ Dépalléthrine + pipéronyle butoxyde

<b>PARA spécial poux</b>				
Shamp. : idem <b>ITAX</b>	125 mL (shamp.) 250 mL (shamp.) 125 mL (aérosol)			NR NR NR
Solution : pulvériser sur le cuir chevelu et laisser agir 30 min puis peigner après lavage avec le shampoing habituel				

### ■ Perméthrine naturelles + pipéronyle butoxyde

<b>MARIE ROSE</b>				
Shamp. de 10 à 15 min 2 j consécutifs et rincer puis peigner	125 mL (lotion)			NR

#### PROPRIÉTÉS

Insecticides peu toxiques et pédiculicides. Tous les composés dont la DCI se termine par le suffixe « -thrine » sont des dérivés synthétiques de pyréthrine. Le pipéronyle butoxyde agit en synergie avec les pyréthrine et permet de limiter l'émergence de résistances.

#### INDICATIONS

Pédiculoses, gale (**SPRÉGAL** : port d'un masque par le patient et le soignant pendant la pulvérisation).

#### CONTRE-INDICATIONS

Pas chez l'enfant < 30 mois. Ne pas utiliser les aérosols chez les asthmatiques.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déparasiter les vêtements et la literie avec **A-PAR aérosol**. En cas de gale, traitement simultané de tous les sujets contacts. Ne pas avaler ni appliquer sur le visage, les yeux et les muqueuses. Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Sensation de cuisson.

Toxicité centrale mal connue mais inférieure à celle des organophosphorés.

Irritation cutanée.

## ANTIPÉDICULEUX

## ■ Malathion

<b>PRIODERM</b>				
Laisser agir environ 8 h puis laver les cheveux et les peigner au peigne fin	110 mL (lotion pressurisée 0,5 %)		NR	

## ■ Malathion + perméthrine + pipéronyl butoxyde

<b>PARA PLUS</b>				
Laisser agir environ 40 min puis laver les cheveux et les peigner au peigne fin	125 mL		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Insecticides organophosphorés, pediculicides et lenticides.

**INDICATIONS**

Poux de tête et de corps.

**CONTRE-INDICATIONS**

Enfant < 30 mois pour les aérosols.  
Ne pas utiliser les aérosols chez l'asthmatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas avaler ni appliquer sur le visage, les yeux et les muqueuses.

Diminuer le temps d'application avant l'âge de 2 ans, en particulier avant 6 mois (diminuer de moitié).

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas sécher avec un sèche-cheveux (inflammabilité du flacon pressurisé).

Pédiculose : déparasiter les vêtements et la literie avec **A-PAR aérosol**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Odeur désagréable, irritation possible.

Larmolement, salivation, vomissements, diarrhée, dyspnée, convulsions, coma en cas d'ingestion ou de résorption transcutanée (non-respect des précautions d'emploi, utilisation répétée, peau lésée).

## VITAMINE D LOCALE

## ■ Calcipotriol

<b>DAIVONEX</b>					
Psoriasis en plaques du corps < 40 % surface corporelle : 2 appl./j pendant 6 sem. Psoriasis du cuir chevelu : 2 appl./j.	30 g (crème 50 µg/g)	13,01	II	65 %	0,43
	120 g (crème 50 µg/g)	40,35	II	65 %	0,34

## ■ Calcipotriol + corticoïde

<b>DAIVOBET</b>					
1 appl./j pendant 1 mois Ne pas dépasser 100 g/sem.	60 g (pomm. 50 µg/0,5 mg/g)	46,62	I	65 %	0,78
	60 g (gel 50 µg/0,5 mg/g)	46,62	I	65 %	0,78

## ■ Calcitriol

<b>SILKIS</b>					
Réservé aux zones fragiles (visage-pli) : 2 appl./j max 6 sem. Ne pas dépasser 30 g/j	30 g (pomm. 3 µg/g)	10,40	I	30 %	0,35
	100 g (pomm. 3 µg/g)	28,47	I	30 %	0,28

## PROPRIÉTÉS

Dérivé de la vitamine D, il inhibe la prolifération des kératinocytes et stimule leur différenciation ; il est peu résorbé par voie percutanée et ne présente pas de risque d'hypercalcémie dans les conditions normales d'utilisation. Son efficacité semble comparable à celle des **dermocorticoïdes de classe III**.

## INDICATIONS

Psoriasis en plaques, atteignant moins de 40 % de la surface corporelle.  
Psoriasis du cuir chevelu.

## ■ Tacalcitol

<b>APSOR</b>					
Psoriasis en plaques : 1 appl./j de préférence le soir	15 g (pomm.)	9,88	II	65 %	0,66
	60 g (pomm.)	32,09	II	65 %	0,53
	50 mL (fl. ém. cut.)	27,57	II	65 %	0,55

## PROPRIÉTÉS

Idem **DAIVONEX**.

## INDICATIONS

Psoriasis en plaques.  
Utilisation possible sur le visage et dans les plis.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**  
Hypercalcémies.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse.**

**Allaitement.**

Hypercalcémies, application sur le visage et dans les plis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser 30 g/j ni 35 % de la surface cutanée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale et lésions eczématiformes, risque d'hypercalcémie, réversibles à l'arrêt du traitement, en cas de surdosage.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser 50 g par semaine.  
Ne pas utiliser dans les psoriasis pustuleux, en gouttes ou érythrodermiques.  
Se laver les mains après utilisation.  
Éviter le contact avec les yeux.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hypercalcémie modérée et réversible si surdosage.  
Dégradation par les UV.  
Irritation locale transitoire.

## RÉTINOÏDE LOCAL

## ■ Tazarotène

<b>ZORAC</b>					
Psoriasis en plaques < 10 % de surface corporelle 1 appl. le soir pendant 12 sem.	60 g (gel 0,05 %)	30,57	I	30 %	0,51
	60 g (gel 0,1 %)	32,09	I	30 %	0,53

**PROPRIÉTÉS**

Rétinoïde local ayant au cours du psoriasis une action sur l'inflammation, la prolifération et les anomalies de différenciation des kératinocytes.

**INDICATIONS**

Psoriasis en plaques < 10 % de surface corporelle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Femme enceinte ou susceptible de l'être.  
Allaitement.  
Hypersensibilité connue au produit.

Application sur le visage, le cuir chevelu, et les plis.

Surface à traiter > 10 %.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

N'appliquer que sur la peau psoriasique.

Interrompre le traitement en cas d'irritation.

Associer un **dermocorticoïde de classe III** le matin.

Éviter de prescrire avant l'âge de 18 ans.

Laver les mains après application.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Prurit, sensation de brûlure, érythème, irritation, desquamation, aggravation du psoriasis.  
Photosensibilisation.

## GOUDRONS

### ■ Anthraline (ou dioxyanthranol ou dithranol)

<b>ANAXÉRYL</b>				
Psoriasis en plaques du corps et du cuir chevelu : <i>short contact therapy</i> , application pendant 10 min/j, rinçage abondant avec un savon acide, puis augmentation des temps de pose en fonction de l'efficacité (ex : 10 min/j pdt 1 sem. puis 20 min/j pdt 2 sem. puis 30 min/j pdt 3 sem.)	38 g (pomm. 0,35 % d'anthraline)		NR	

### ■ Huile de cade

<b>CADITAR</b>				
Psoriasis, eczemas secs, névrodermites, lichénifications, autres dermatoses hyperkératosiques : bain quotidien avec de l'eau tiède 2 càs par bain, 1 càc par litre pour bains localisés (mains, pieds)	250 mL (fl. de prép. diluer pour bain)	4,01	15 %	0,02

### ■ Pommade de Brocq

<b>POMMADE DE BROCC</b>				
Psoriasis très épais et diffus en cas de contre-indication aux autres traitements	prép. magistrale	HOP		

### ■ Acide sacylique + huile essentielle de cade + huile essentielle de cèdre + huile de vaseline

<b>DERMAGOR BETACADE</b>				
Visage et corps. Peaux irritées, squameuses. Soin et entretien des peaux psoriasiques. Accompagnement et relais de la corticothérapie locale	100 mL		NR	

#### PROPRIÉTÉS

Réducteurs utilisés dans les états hyperkératosiques, notamment dans le psoriasis, seuls ou en association, pour réduire la vitesse de renouvellement de l'épiderme.

#### INDICATIONS

Psoriasis, eczemas secs, névrodermites, lichénifications, autres dermatoses hyperkératosiques. Sous forme de shampooings, ils sont très utilisés pour les états squameux du cuir chevelu. La **POMMADE DE BROCC** n'est utilisée qu'en milieu hospitalier.

#### CONTRE-INDICATIONS

Dermatoses suintantes.  
Hypersensibilité aux constituants.

Psoriasis inflammatoires, irrités, érythrodermiques.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser sur les muqueuses ni sur les yeux.

Tache les vêtements et la literie ; odeur désagréable.

L'**anthraline** s'oxyde à l'air, doit être appliquée avec des gants et jamais sur les zones fragiles (plis, visage, cou, organes génitaux).

Effets carcinogènes cutanés des **goudrons** (sur-tout si association aux ultraviolets).

**ANAXÉRYL** contient du baume du Pérou.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation, éruptions acnéiformes, folliculites.

## RÉTINOÏDE ORAL

## ■ Acitrétine

SORIATANE					
Psoriasis invalidant, 10 mg/j en augmentant progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée Troubles de la kératinisation, idem Psoriasis pustuleux, 1 mg/kg/j	30 gél. 10 mg	25,01	I	65 %	0,83
	30 gél. 25 mg	51,36	I	65 %	1,71

## PROPRIÉTÉS

Dérivés de synthèse de la vitamine A, l'**acitrétine**, inefficace dans l'acné, réduit la prolifération cellulaire et la kératinisation de l'épiderme.

## INDICATIONS

Psoriasis sévères : érythrodermique, pustuleux, rhumatisme psoriasique, kératodermie palmo-plantaire, psoriasis résistants aux autres traitements classiques.

Troubles de la kératinisation : ichtyoses héréditaires, kératodermies palmo-plantaires, maladie de Darier, pityriasis rubra pilaire.

Dermatoses inflammatoires : lichen plan.

## CONTRE-INDICATIONS

Femmes en âge de procréer sans contraception efficace.

Dyslipidémie, hypervitaminose A, insuffisance hépatique ou rénale.

**Grossesse** et **allaitement** : contre-indication absolue. Voir Précautions d'emploi.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contraception efficace obligatoire chez la femme en période d'activité génitale, débutée 1 mois avant le début du traitement et poursuivie 2 ans après la fin du traitement par **acitrétine**.

Contrôle avant le début du traitement et surveillance régulière des enzymes hépatiques et des lipides sanguins pendant toute la durée du traitement.

Recherche d'anomalies osseuses lors des traitements prolongés.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Téatogénicité** +++.

Cutanéo-muqueux : chéilite, xérose, sécheresse buccale, desquamation palmo-plantaire, érythème facial, chute de cheveux, fragilité des ongles.

Osseux : douleurs osseuses, arthralgies, hyperostoses, soudure prématurée des cartilages de conjugaison chez l'enfant.

Ophtalmologiques : sécheresse oculaire, intolérance au port des lentilles cornéennes, conjonctivite, opacité cornéenne, myopie.

Divers : myalgies, céphalées par hypertension intracrânienne, élévation des phosphatases alcalines et des transaminases, hépatites, élévation du cholestérol total et des triglycérides.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les **tétracyclines** sont contre-indiquées en association en raison du risque d'hypertension intracrânienne, association avec la **phénytoïne** à surveiller. Attention aux contraceptifs progestatifs microdosés en raison du risque de leur inefficacité contraceptive, il faut utiliser un œstroprogestatif.

## PHOTOTHÉRAPIES UVA-UVB (1)

### Les différents types de photothérapie

#### PUVAthérapie

La PUVAthérapie (psoralène + UVA) est l'inhibition de la division cellulaire par un psoralène sous l'action des ultra-violets A.

#### BalnéoPUVAthérapie

Le psoralène se trouve dans la baignoire et il n'y a donc pas de prise orale du médicament ; intérêt chez les sujets insuffisants hépatiques ou rénaux, notamment les patients éthyliques chroniques ; ce traitement nécessite une baignoire. Les doses d'UVA sont moindres qu'avec la PUVAthérapie classique.

#### PUVAthérapie locale

Essentiellement pour les atteintes palmo-plantaire du psoriasis ; intérêt pour les dermites irritatives et de contact des mains. Elle s'effectue grâce à des lampes de petite taille n'irradiant que les pieds et les mains, après ingestion d'un psoralène.

#### Association rétinoides PUVAthérapie = rePUVAthérapie

**SORIATANE** associé à la PUVAthérapie indiquée dans le psoriasis.

#### Photothérapies UVB

Il n'y a pas de prise de psoralènes dans ce type de photothérapie ; les UVB sont à spectres larges ou à spectre étroit (lampe TL 01). Indications dans le psoriasis, les eczéma, le vitiligo notamment. Ces photothérapies n'ont pas les contre-indications liées au psoralène (insuffisances hépato-cellulaire et rénale, grossesse), et seraient, pour les UVB à spectre étroit, moins carcinogènes que celles utilisant les UVA.

#### Photothérapies UVA + UVB

En première intention chez un patient atopique si une photothérapie est indiquée.

#### Phototypes selon Fitzpatrick

Phototype I : roux, coup de soleil (= brûlure), ne bronze pas.

Phototype II : peau blanche, coup de soleil (= brûlure), bronze un peu.

Phototype III : peau blanche, ne brûle pas ou peu au soleil, bronze.

Phototype IV : peau mate, ne brûle pas, bronze.

Phototype V : peau marron (sujets asiatiques, d'Afrique du Nord, etc.).

Phototype VI : peau noire.

#### Précautions à prendre pour un traitement par photothérapie

- Remettre une fiche au patient mentionnant la quantité de psoralène et l'horaire de la prise par rapport à l'irradiation pour une PUVA.
- Remettre un carnet de photothérapie mentionnant le nombre de séances et la quantité d'UV reçue ( $J/cm^2$ ).
- Protection oculaire dès la prise du psoralène, pendant la séance et jusqu'à la tombée du jour avec des lunettes adéquates (absorption à 330 nm, ex : *Orma UVX Essilor incolores*) pour une PUVA.
- Protection des organes génitaux externes pendant la séance (port d'un slip type string si lésions fessières) et les mamelons avec 1 écran solaire.
- Signaler au dermatologue toute modification cutanée (rougeurs, démangeaisons, etc.).
- Signaler toute prise médicamenteuse tout au long de la photothérapie.
- Ne rien appliquer sur la peau avant les irradiations UV sauf protocole particulier.
- Hydrater la peau après chaque séance (ex : **LIPIKAR**) et appliquer un écran solaire si ensoleillement (ex : écran indice 50+).

#### Exemple de protocole UVB TLO1 pour un psoriasis pour un sujet de phototype II à III

- Débuter à  $0,2 J/cm^2$ , augmenter de  $0,1$  à  $0,2 J/cm^2$  à chaque séance sauf problème jusqu'à  $1,7 J/cm^2$  à raison de 2 à 3 séances/sem. jusqu'au blanchiment du psoriasis et arrêt (durée totale habituelle de 15 à 30 séances (2 à 3 mois).
- Entente préalable auprès de la Caisse d'assurance-maladie.



## PHOTOTHÉRAPIES UVA-UVB (2)

## Psoralène par voie orale

## ■ 8-Méthoxsalène

MÉLADININE					
PUVAthérapie : 0,6 mg/kg ou 25 mg/m <sup>2</sup> , 2 h avant l'irradiation UVA	30 cp. 10 mg	4,07	I	65 %	0,14

## Psoralène par voie locale

## ■ 8-Méthoxsalène

MÉLADININE					
<b>MÉLADININE</b> faible PUVAthérapies localisées par ex. dans le vitiligo : application homogène de la solution 2 h avant l'irradiation UVA	24 mL (sol. alcool. 0,1 %)	3,64	I	65 %	0,15
<b>MÉLADININE</b> forte BainéoPUVAthérapie : 2 fl. pour une baignoire de 160 L	24 mL (sol. alcool. 0,75 %)	4,07	I	65 %	0,17

## PROPRIÉTÉS

Les psoralènes sont toujours utilisés en association avec une photothérapie. Ils s'intercalent dans l'ADN et, uniquement sous l'action des UVA, provoquent des liaisons des bases pyrimidiques bloquant ainsi la division cellulaire. Les indications, contre-indications, précautions d'emploi et effets secondaires se superposent donc à ceux de la PUVAthérapie.

## INDICATIONS

Psoriasis > 40 % de la surface corporelle +++.  
Parapsoriasis et mycosis fongoïde, lichen plan, mastocytoses, eczéma notamment dermatite atopique, vitiligo, pelade, prurit chronique et prurigos, photodermatoses (lucite estivale bénigne).

## CONTRE-INDICATIONS

## • Contre-indications à la PUVAthérapie

**Absolues : Grossesse. Allaitement.** Antécédents de mélanome. Syndrome des naevi atypiques familial. Naevomatose basocellulaire, maladies de la réparation de l'ADN. Lupus systémique, dermatomyosite.

**Relatives majeures :** Âge < 10 ans. Antécédent de carcinome cutané épithélial (baso- et spino-cellulaire). Antécédent d'exposition à l'arsenic ou aux radiations ionisantes. Kératoses actiniques, traitement immunosuppresseur, porphyries, insuffisance cardiaque.

**Relatives mineures :** Âge < 16 ans ; cataracte, maladies bulleuses auto-immunes ; insuffisances hépatique ou rénale (intérêt de la bal-

néoPUVAthérapie), phototype I, photosensibilité.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une contraception efficace est nécessaire en âge de procréer.

Bilan préthérapeutique comprenant : examen cutané complet (antécédents, phototype, degré d'héliodermie, naevi, kératoses actiniques), examen cardiovasculaire, consultation ophtalmologique, bilan biologique (fonction rénale, bilan hépatique).

Protection des yeux, du scrotum et des mame-  
lons pendant la séance de PUVA.

Quantités d'UV reçus précisément notées à  
chaque séance en Joules par cm<sup>2</sup>.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Cancers cutanés épithéliaux et probable aug-  
mentation de l'incidence du mélanome, justi-  
fiant de ne pas dépasser 100 à 200 séances  
de PUVAthérapie au cours d'une vie, soit  
1 500 J/cm<sup>2</sup>. Ce risque justifie une surveillance  
dermatologique clinique annuelle à vie.

Photosensibilisation, déclenchement rarissime  
d'une dermatose photosensible (dermatite ac-  
tinique, lupus érythémateux, pemphigus, pem-  
phigoïde bulleuse). Vieillessement cutané  
précoce.

Cataracte (chez les sujets âgés et les atopiques,  
pour des doses importantes). Troubles digestifs.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne jamais associer un médicament photosensi-  
bilisant (**phénotiazines, amiodarone, cyclines,  
vitamine A acide, quinolones, sulfamides,  
nombreux antihypertenseurs**).

## DERMOCORTICOÏDES (7) – RÈGLES DE PRESCRIPTION D'UN DERMOCORTICOÏDE

### PAS DE PRESCRIPTION D'UN DERMOCORTICOÏDE SANS UN DIAGNOSTIC PRÉCIS

### CHOIX DE LA CLASSE EN FONCTION DE LA LOCALISATION DE LA DERMATOSE ET DE L'ÂGE DU PATIENT

- Classe I réservée aux lésions épaisses (plaque d'eczéma lichénifié) et aux localisations où la peau est épaisse (paumes et plantes).
- Classe II pour la plupart des lésions du tronc (chez l'adulte).
- Classe III sur le visage et chez l'enfant.

### CHOIX DE LA FORME GALÉNIQUE EN FONCTION DE LA DERMATOSE ET DE SA LOCALISATION

- Lotions dans les plis et sur le cuir chevelu.
- Pommades sur les lésions épaisses (plaques de psoriasis, eczéma lichénifié) et dans les localisations où la peau est épaisse (paumes et plantes).
- Crèmes sur des lésions du tronc, du visage et sur des lésions suintantes (eczéma aigu).

### PRÉCISER SUR L'ORDONNANCE

- 1 à 2 appl./j en attaque.
- La durée du traitement d'attaque.
- Le traitement ne sera jamais interrompu brutalement en raison du risque d'un effet rebond (reprise évolutive brutale de la dermatose).

- Le mode de décroissance sera clairement précisé :

Ex. : 1 application un soir sur 2 pendant 2 semaines puis 2 applications par semaine pendant 2 semaines.

- Mentionner le nombre de tubes à délivrer par le pharmacien et la contenance de ces tubes (ex. : **DIPROSONE** crème, 2 tubes de 30 g).

### INFORMER LE PATIENT

- Du caractère personnel de son traitement.
- Du possible effet rebond en cas de non-décroissance progressive (très fréquent en pratique +++).
- De l'inutilité d'appliquer le **dermocorticoïde** plus d'une à deux fois par jour.

### APPLIQUER UN ANTISEPTIQUE AVANT LE DERMOCORTICOÏDE EN CAS DE LÉSIONS SURINFECTÉES

### PROSCRIRE LES ASSOCIATIONS

- **Dermocorticoïde + antibiotique.**
- **Dermocorticoïde + antifongique.**

En cas de doute diagnostique, il faut effectuer un prélèvement bactériologique ou mycologique ou réaliser une biopsie cutanée puis traiter selon l'hypothèse diagnostique la plus probable (**dermocorticoïde** seul ou **antibiotique local** seul ou **antifongique local** seul en premier).

## ÉMOLLIENTS

ÉMOLLIENTS *	
<p><b>LIPIKAR</b>  <b>ATODERM PP</b>  <b>TOPIALYSE</b>  <b>EXOMEGA</b>  <b>EMULSION COLD CREAM AVÈNE</b>  <b>CRÈME TRIXERA DE AVÈNE</b>  <b>CERAT DE GALIEN</b> (préparation)  <b>DEXERYL</b> 250 g (remboursable dans les indications atopie, ichtyoses, psoriasis, brûlures superficielles)          Préparations magistrales (mention obligatoire sur l'ordonnance pour le remboursement : «Prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes»),          ex : glycérôle d'amidon 40 g          Excipial lipolotion qsp 400 g</p>	<p>Les émollients sont utilisés pour l'hydratation de la peau, dans la dermatite atopique, les xéroses et les ichtyoses, le psoriasis ; ils sont appliqués quotidiennement de préférence après la toilette sur une peau un peu humide.</p>

\* Liste non exhaustive ; nombreuses spécialités ; ne sont citées que les plus fréquemment utilisées par le dermatologue.

## DERMOCORTICOÏDES (7) – RÈGLES DE PRESCRIPTION D'UN DERMOCORTICOÏDE

### PAS DE PRESCRIPTION D'UN DERMOCORTICOÏDE SANS UN DIAGNOSTIC PRÉCIS

### CHOIX DE LA CLASSE EN FONCTION DE LA LOCALISATION DE LA DERMATOSE ET DE L'ÂGE DU PATIENT

- Classe I réservée aux lésions épaisses (plaque d'eczéma lichénifié) et aux localisations où la peau est épaisse (paumes et plantes).
- Classe II pour la plupart des lésions du tronc (chez l'adulte).
- Classe III sur le visage et chez l'enfant.

### CHOIX DE LA FORME GALÉNIQUE EN FONCTION DE LA DERMATOSE ET DE SA LOCALISATION

- Lotions dans les plis et sur le cuir chevelu.
- Pommades sur les lésions épaisses (plaques de psoriasis, eczéma lichénifié) et dans les localisations où la peau est épaisse (paumes et plantes).
- Crèmes sur des lésions du tronc, du visage et sur des lésions suintantes (eczéma aigu).

### PRÉCISER SUR L'ORDONNANCE

- 1 à 2 appl./j en attaque.
- La durée du traitement d'attaque.
- Le traitement ne sera jamais interrompu brutalement en raison du risque d'un effet rebond (reprise évolutive brutale de la dermatose).

- Le mode de décroissance sera clairement précisé :

Ex. : 1 application un soir sur 2 pendant 2 semaines puis 2 applications par semaine pendant 2 semaines.

- Mentionner le nombre de tubes à délivrer par le pharmacien et la contenance de ces tubes (ex. : **DIPROSONE** crème, 2 tubes de 30 g).

### INFORMER LE PATIENT

- Du caractère personnel de son traitement.
- Du possible effet rebond en cas de non-décroissance progressive (très fréquent en pratique +++).
- De l'inutilité d'appliquer le **dermocorticoïde** plus d'une à deux fois par jour.

### APPLIQUER UN ANTISEPTIQUE AVANT LE DERMOCORTICOÏDE EN CAS DE LÉSIONS SURINFECTÉES

### PROSCRIRE LES ASSOCIATIONS

- **Dermocorticoïde + antibiotique.**
- **Dermocorticoïde + antifongique.**

En cas de doute diagnostique, il faut effectuer un prélèvement bactériologique ou mycologique ou réaliser une biopsie cutanée puis traiter selon l'hypothèse diagnostique la plus probable (**dermocorticoïde** seul ou **antibiotique local** seul ou **antifongique local** seul en premier).

## ÉMOLLIENTS

ÉMOLLIENTS *	
<p><b>LIPIKAR</b>  <b>ATODERM PP</b>  <b>TOPIALYSE</b>  <b>EXOMEGA</b>  <b>EMULSION COLD CREAM AVÈNE</b>  <b>CRÈME TRIXERA DE AVÈNE</b>  <b>CERAT DE GALIEN</b> (préparation)  <b>DEXERYL</b> 250 g (remboursable dans les indications atopie, ichtyoses, psoriasis, brûlures superficielles)          Préparations magistrales (mention obligatoire sur l'ordonnance pour le remboursement : «Prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes»),          ex : glycérôle d'amidon 40 g          Excipial lipolotion qsp 400 g</p>	<p>Les émollients sont utilisés pour l'hydratation de la peau, dans la dermatite atopique, les xéroses et les ichtyoses, le psoriasis ; ils sont appliqués quotidiennement de préférence après la toilette sur une peau un peu humide.</p>

\* Liste non exhaustive ; nombreuses spécialités ; ne sont citées que les plus fréquemment utilisées par le dermatologue.

**ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (1)****Non sédatifs et non anticholinergiques****■ Loratadine**

<b>CLARITYNE</b>					
Rhinites, urticaire chronique idiopathique :	15 cp. séc. 10 mg	4,45	II	30 %	0,30
1 cp./j en 1 prise	12 c-mes. 5 mg	2,53	II	30 %	0,21
E. 2-12 ans :	(fl. 60 mL)				
> 30 kg : 2 c-mes. x 1/j	24 c-mes. 5 mg	3,94	II	30 %	0,16
≤ 30 kg : 1 c-mes. x 1/j	(fl. 120 mL)				

**■ Desloratadine**

<b>AERIUS</b>					
1 cp./j en 1 prise	15 cp. 5 mg	4,07	II	30 %	0,27
	30 cp. 5 mg	7,35	II	30 %	0,25
E. 1-5 ans : 2,5 mL x 1/j	1 fl. 150 mL	4,76	II	30 %	4,76
E. 6-11 ans : 5 mL x 1/j	(0,5 mg/mL)				
A. ou E. > 12 ans : 10 mL x 1/j					

**■ Ébastine**

<b>KESTINLYO</b>					
Urticaires, rhinites allergiques	30 lyocs 10 mg	9,19	II	30 %	0,31
1 à 2 lyocs/j					
<b>KESTIN</b>					
Urticaires, rhinites allergiques	15 cp. 10 mg	4,95	II	30 %	0,33
1 à 2 cp./j	30 cp. 10 mg	9,19	II	30 %	0,31

**■ Cétirizine**

<b>ZYRTEC</b>					
Rhinites allergiques, conjonctivites allergiques, urticaire	300 fl. 15 mL	3,90	II	30 %	0,01
A., E. > 12 ans : 20 gttes x 1/j	(gttes 0,5 mg)				
E. 6-12 ans : 10 gttes x 2/j					
E. 2-6 ans : 5 gttes x 2/j					
<b>VIRLIX</b>					
A., E. > 12 ans : 1 cp. x 1/j	15 cp. séc. 10 mg	4,17	II	30 %	0,28
E. 6-12 ans : 1/2 cp. x 2/j					

**■ Lévocétirizine**

<b>XYZALL</b>					
A. et E. > 6 ans : 1 cp./j	14 cp. 5 mg	3,73	II	30 %	0,27
À adapter chez l'insuffisant rénal en fonction de la clairance :	28 cp. 5 mg	6,63	II	30 %	0,24
30-50 mL/min : 1 cp./2 j					
< 30 mL/min : 1 cp./3 j					

## URTICAIRE – ŒDÈME DE QUINCKE (2)

### Traitement de la crise aiguë

Le choix du traitement repose sur la présence ou non de signes de gravité.

#### Signes de gravité

- Dysphagie, stagnation de la salive dans la cavité buccale.
- Grande angoisse.
- Dyspnée, patient assis cherchant l'air, voire cyanose, sueurs.

#### Absence de signes de gravité

Le traitement repose sur les **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, par ex. **CLARITYNE** 1 cp. le matin, associé à **ATARAX** 25 mg le soir au coucher.

En cas de crise invalidante, ne cédant pas sous traitement oral, une hospitalisation courte peut être proposée pour réaliser des perfusions de **POLARAMINE** : 2 à 3 amp. de 5 mg/j en perfusion IV.

Les **corticoïdes** par voie générale, orale ou injectable, sont inutiles.

#### Présence de signes de gravité

Ils sont le témoin d'un œdème de Quincke avec atteinte muqueuse de la langue, du

pharynx ou du larynx et doivent être connus.

#### ► Urgence thérapeutique

- Asseoir le patient.
- Pose d'une voie veineuse.
- Injection de 1 amp. de **SOLUMÉDROL** 20 mg en IVD, à renouveler.
- Puis en cas d'amélioration, relais par **prednisone (CORTANCYL)** : 0,5 mg/kg/j et décroissance rapide sur une semaine.
- Les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** sont un bon traitement d'appoint, initialement en IV puis relayés *per os* pour 10 j.
- En cas d'échec, **ADRÉNALINE RENAUDIN** IM 0,25 à 1 mg ; en l'absence d'amélioration rapide, transfert en réanimation.

La survenue d'un choc anaphylactique impose une réanimation médicale en extrême urgence ; le traitement repose sur l'administration d'adrénaline en IV à la seringue électrique en continu sous monitoring cardiaque.

#### ► Traitement étiologique

Suppression définitive d'un aliment ou d'un médicament, traitement d'une parasitose intestinale, d'une infection dentaire, etc.

ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (2)

## ■ Méquitazine

PRIMALAN						
Rhinites, urticaire chronique idiopathique : 1 cp./j en 1 prise	14 cp. séc. 5 mg	3,69	I	30 %	0,26	
	14 cp. séc. 10 mg	5,39	I	30 %	0,38	
	24 c-mes. 1,25 mg (fl. 60 mL)	2,62	I	30 %	0,11	
> 30 kg : 2 c-mes. x 1/j						
≥ 30 kg : 1 c-mes. x 1/j	50 c. mes. 1,25 mg (fl. 125 mL)	4,09	I	30 %	0,08	

## ■ Fexofénadine

<b>TELFAST</b>					
Rhinite allergique saisonnière > 12 ans : 1 cp. 120 mg/j Prurit de l'urticaire chronique ≥ 12 ans : 1 cp. 180 mg/j	30 cp. 120 mg	5,00	II	30 %	0,17
	15 cp. 180 mg	3,89	II	30 %	0,26

## Sédatifs et anticholinergiques

## ■ Bromphéniramine

<b>DIMÉGAN</b>					
Dermatoses allergiques (urticaires), dermatoses prurigineuses (eczémas, prurigos), manifestations ORL et respiratoires allergiques (rhinites) : 8 à 24 mg/j	10 gél. 12 mg	3,40		15 %	0,34

## ■ Dexchlorphéniramine

<b>POLARAMINE</b>					
Idem <b>DIMÉGAN</b> : 6 à 8 mg/j	30 cp. séc. 2 mg			NR	
	25 càc 0,5 mg (fl. 125 mL)			NR	
<b>POLARAMINE</b> injectable 5 à 10 mg SC, IM ou IV	5 amp. 1 mL (= 5 mg)			NR	

## ■ Hydroxyzine

<b>ATARAX</b>					
Rhinite, conjonctivite, urticaire, anxiété 25 à 100 mg/j le soir au coucher	30 cp. séc. 25 mg	2,93	I	65 %	0,10

## ■ Isothipendyl

<b>HISTAPAYSYL</b>					
Idem <b>DIMÉGAN</b> : 2 à 3 cp./j	20 cp. 12 mg			NR	

**URTICAIRE – ŒDÈME DE QUINCKE (3)****Traitement de l'urticaire chronique [1]****Règles diététiques****Aliments et médicaments riches en histamine ou histamino-libérateurs**

- Boissons et aliments fermentés.
- Charcuterie.
- Conserves (produits de la mer, petits pois, etc.).
- Poissons et fruits de mer.
- Certains légumes (épinards et tomates).
- Fruits (bananes, ananas, fruits exotiques, fraises).
- Cacahuètes, noix et noisettes.
- Chocolat.
- Épices et alcool.
- Blanc d'œuf.
- **Aspirine.**
- **Antibiotiques** (néomycine, colistine et polymyxine).
- Amines (**opiacés**, **amphétamines**, **cocaïne**, **protamine**).
- **Macromolécules**, **anesthésiques**, **anti-hypertenseurs** (dihydralazine et réserpine).
- Autres : **quinine**, produits de contraste iodés, **pilocarpine**.

On s'efforcera de prévenir les récides, surtout en cas d'urticaire chronique de cause indéterminée, en remettant au patient une liste des aliments riches en histamine et des aliments histamino-libérateurs sans mécanisme allergique. Il faut savoir qu'il existe de la **pénicilline** dans certains aliments, notamment dans le lait, qu'il existe des dérivés de l'**aspirine** dans la banane, etc.

**Traitement médicamenteux**

Il repose sur les **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, 2 mois ; par exemple **KESTINLYO** : 1 cp./j pendant 2 mois.

**► Formes particulières**

En cas d'urticaire cholinergique, les **anti-histaminiques anticholinergiques** tels que **POLARAMINE** ou **ATARAX** sont plus efficaces.

Seules l'urticaire retardée à la pression et les vascularites urticariennes peuvent relever de la corticothérapie par voie générale.

L'œdème angioneurotique héréditaire se traite par les **androgènes** (**DANATROL**).

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge de l'urticaire chronique, *SFD et Anaes*, 2003

ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (3)

## Sédatifs et anticholinergiques (phénothiazines)

## ■ Prométhazine

PHÉNERGAN					
Dermatoses allergiques (urticaires), dermatoses prurigineuses (eczémas, prurigos), manifestations ORL et respiratoires allergiques (rhinites) : 1 cp./j en une prise 10 à 150 mg/j 50 à 100 mg/j en IM ou IV	20 cp. 25 mg 30 càc 5 mg (fl. 150 mL)  5 amp. 2 mL = 50 mg	1,53		15 % NR	0,08
			I	NR	

## ■ Alimémazine

THÉRALÈNE					
Idem <b>PHÉNERGAN</b> : 1 à 8 cp./j A. : 10 à 20 mL x 1 à 4/j E. > 2 ans : 0,25 à 0,5 mL/kg x 1 à 4/j  A. : 5 à 10 gtttes x 1 à 4/j E. 2-15 ans : 0,1 à 0,2 gtttes/kg x 1 à 4/j	50 cp. séc. 5 mg 15 gobelets doseurs 2,5 mg (fl. sirop 150 mL) 1200 gtttes 1 mL (fl. 30 mL)	1,78   2,0	II   II	15 % NR  15 %	0,04   0,00

## PROPRIÉTÉS

Les antihistaminiques H<sub>1</sub> agissent en bloquant les effets de l'histamine sur les vaisseaux, les bronches et le tube digestif.

## INDICATIONS

Rhinite allergique, asthme allergique, conjonctivite allergique, urticaire et œdème de Quincke.

Prurit non médié par l'histamine, où l'efficacité est surtout marquée par la sédation provoquée par les antihistaminiques sédatifs.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse :

- **POLARAMINE** : à éviter au 3<sup>e</sup> trimestre, autorisée aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres ;
- **ZYRTEC** et **VIRLIX** : contre-indiqués au 1<sup>er</sup> trimestre, possible en fin de grossesse ;
- **CLARITYNE** et **KESTINLYO** : déconseillés ;
- **ATARAX** : contre-indiqué au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** : tous déconseillés.

Pour les produits anticholinergiques : obstacle prostatique, sujets à risque de glaucome aigu (chambre antérieure étroite, angle irido-cornéen étroit, femme de 50 ans hypermétrope, sujet âgé avec cataracte) : prendre un avis ophtalmologique.

< 2 ans pour la **loratadine** sirop et la **cétirizine**-solution buvable.

< 6 ans pour la **cétirizine** en cp.

< 12 ans pour la **féxofénadine**, la **desloratadine**, l'**ébastine** et la **loratadine** en cp.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez les conducteurs de véhicules, baisse de la vigilance avec les produits sédatifs.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares troubles digestifs et céphalées.  
Somnolence avec les produits sédatifs.  
Effets anticholinergiques à type de sécheresse buccale et oculaire, de constipation.  
Risque de rétention aiguë d'urines et de glaucome aigu avec les produits anticholinergiques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune avec la **cétirizine**.  
Majoration des effets sédatifs avec l'alcool et d'autres médicaments sédatifs comme par exemple les **benzodiazépines** pour les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** sédatifs.

Avec les médicaments anticholinergiques tels que les **antidépresseurs tricycliques**, certains **antiparkinsoniens**, l'**ATARAX**, certains **antispasmodiques** et les **neuroleptiques** pour les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** anticholinergiques, avec les **macrolides** et les **imidazolés** pour **ébastine**.



## ANTISEPTIQUES (1)

## Récapitulatif et activité préférentielle

Iode <b>BÉTADINE SOLUTION, SCRUB, TULLE, ALCOOL IODÉ</b>	Antiseptique à large spectre bactéricide et fongicide.
Chlore <b>AMUKINE, DAKIN COOPER</b>	Antiseptique bactéricide, fongicide après un temps de contact prolongé, virucide notamment sur le VIH.
Carbanilides <b>SOLUBACTER, SEPTIVON, CUTISAN POUDRE</b>	Antiseptiques bactériostatiques sur les Gram+ (bactéricides si utilisés non dilués).
Amidines <b>HEXOMÉDINE SOLUTION, GEL, TRANSCUTANÉE</b>	Antiseptiques actifs sur les bactéries Gram+.
Alcool éthylique <b>ALCOOL MODIFIÉ GIFRER 70°</b>	Antiseptique bactéricide à 70°, fongicide et virucide.
Chlorhexidine <b>SEPTÉAL, HIBISCRUB, CHLORHEXIDINE 0,05 %, HIBIDIL 0,05 %, HIBITANE, HIBITANE CHAMP, MERFÈNE, HIBISPRINT</b> Chlorhexidine + hexamidine + chlorocrésol <b>CYTÉAL SOLUTION</b> Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium <b>DERMOBACTER, MERCRYL, MERCRYL spray</b> Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique <b>BISEPTINE, DERMASPRAD ANTISEPTIQUE</b>	Antiseptique bactériostatique (puis bactéricide après un temps de contact de 10 min), essentiellement sur les germes Gram+, fongistatique sur <i>Candida albicans</i> . Très utilisés en pratique dermatologique.
Oxydants <b>EAU OXYGÉNÉE</b>	Antiseptiques bactériostatiques (faibles sauf pour le permanganate de potassium).
Colorants <b>ÉOSINE AQUEUSE</b>	Antiseptiques en solution alcoolique, bactériostatiques sur les bactéries Gram+ et à un moindre degré sur les Gram-. Très asséchants.
Ammoniums quaternaires <b>STERLANE SOLUTION</b>	Antiseptiques bactéricides sur les bactéries Gram+, faiblement fongistatiques.
Détergents anioniques <b>DERMACIDE LIQUIDE</b>	Antiseptiques faiblement bactériostatiques sur les germes Gram+.
Sulfate de cuivre <b>CRÈME DE DALIBOUR (SANS CAMPHRE) DERMOCUIVRE, MÉTACUPROL</b>	Antiseptique bactéricide sur les germes Gram+ et fongistatique sur <i>Candida albicans</i> . Bien toléré chez le nourrisson.
Nitrate d'argent <b>NITRATE D'ARGENT</b>	Antiseptique très astringent utilisé dans les dermatoses suintantes. Utilisé à forte concentration pour son effet caustique dans les ulcères de jambe sous forme de crayon.
Acide parahydroxybenzoïque <b>NISASOL SOLUTION</b>	Antiseptique bactéricide in vitro sur les germes Gram+ et fongistatique.

## ANTISEPTIQUES (2)

## ■ Iode

<b>BÉTADINE DERMIQUE</b>					
Antisepsie de la peau. Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses. Lavage des plaies	125 mL (sol. aqueuse 10 %) 500 mL (sol. alcool. 10 %) 50 unidoses de 10 mL (sol. alcool. 10 %) 10 unidoses 10 %	2,60 HOP HOP		30 %	0,02
<b>BÉTADINE</b>					
Antisepsie de la peau	30 g (gel 10 %)			NR	
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses	100 g (gel 10 %)	HOP			
Antisepsie des plaies et brûlures superficielles	6 compr. imprégnées 350 mg 50 compr. imprégnées 350 mg	HOP		NR	
Antisepsie de la cavité buccale	125 mL (fl.) 10 unidoses 10 mL (sol. 10 %)	HOP		NR	
Antisepsie vaginale	8 ovules 250 mg			NR	
Antisepsie vaginale et génitale externe	125 mL (fl.) 500 mL (fl.)				
Antisepsie cutanée périoculaire et conjonctivale en chirurgie ophtalmique	100 fl. de 20 mL sol. irrig. ocul. 5 %	HOP			
<b>BÉTADINE ALCOOLIQUE</b>					
Réservée à l'antisepsie du champ opératoire	125 mL (fl. 5 %) 500 mL (fl. 5 %) 40 unidoses 10 mL (5 %)	HOP HOP HOP			
<b>BÉTADINE SCRUB</b>					
Toilette des mains	125 mL (sol. moussante 4 %)	2,41		30 %	0,02
Lavage des plaies (dilué au 1/3)	500 mL (sol. moussante 4 %) 10 doses 10 mL (4 %) 50 doses 10 mL (4 %)	HOP HOP HOP			
<b>BÉTADINE TULLE</b>					
Plaies ou brûlures	5 pans. méd. 10 x 10 cm (10 %) 10 pans. méd. 10 x 10 cm (10 %)			NR NR	
<b>ALCOOL IODÉ</b>					
Antisepsie de la peau	100 g (sol. officinale 1 ou 2 %)			NR	
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses					

**ANTISEPTIQUES (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antiseptique à large spectre bactéricide et fongicide.

**CONTRE-INDICATIONS**

Antécédent d'allergie à l'iode.

Association aux dérivés mercuriels (ulcérations).

Nouveau-né < 1 mois.

Pathologie thyroïdienne.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser de façon prolongée (irritation, retard à la cicatrisation), ni sur des surfaces

étendues (surcharge iodée et hypothyroïdie), notamment chez la femme enceinte et le jeune enfant.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation, retard à la cicatrisation, coloration brune des téguments et des textiles, surcharge iodée et hypothyroïdie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Provoque des ulcérations quand association aux dérivés mercuriels.

Inactivation par le **thiosulfate de sodium**.

## ANTISEPTIQUES (4)

## ■ Chlore

<b>AMUKINE</b>					
Antiseptie de la peau et des muqueuses dans une fl. opaque aux UV de sol. aqueuse	60 mL 0,06 % 200 mL 0,06 % 500 mL 0,06 % 1 L 0,06 %			NR NR NR NR	
Antiseptie des plaies et brûlures (Stabilité 36 mois à l'abri de la lumière et à une température < 30 °C)					
<b>DAKIN COOPER STABILISÉ</b>					
Antiseptie de la peau et des muqueuses	60 mL (sol. aq. 0,5 %)			NR	
Antiseptie des plaies et brûlures	250 mL (sol. aq. 0,5 %)	2,82		30 %	0,01
Antiseptie des plaies et brûlures (Stabilité 30 mois à l'abri de la lumière et à une température < 30 °C)	500 mL (sol. aq. 0,5 %)			NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiseptique bactéricide, fongicide après un temps de contact prolongé, virucide notamment sur le VIH.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Dermite irritative caustique si utilisation sous occlusion.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter l'utilisation d'autres **antiseptiques** (inactivation par les dérivés mercuriels).

## ■ Carbanilides

<b>SOLUBACTER</b>					
Antiseptie de la peau et des muqueuses	150 mL (sol. moussante 1 %)			NR	
Bains (1 cas dans 10 L d'eau)					
Nettoyage et antiseptie des mains	400 mL (sol. moussante 1 %)			NR	
<b>SEPTIVON</b>					
Antiseptie de la peau et des muqueuses	250 mL (sol. moussante 1,5 %)	2,91		15 %	0,01
Bains (3 bouchons dans 2 L d'eau)					
Nettoyage et antiseptie des mains	500 mL (sol. moussante 1,5 %)			NR	
<b>CUTISAN</b>					
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses suintantes	80 g (pdre 1 %)			NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiseptiques bactériostatiques sur les bactéries Gram+ (bactéricides si utilisés non dilués).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **triclocarban**.

Nourrisson < 6 mois, pour la crème 2 %.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas chauffer car risque de production de métabolites toxiques pouvant entraîner une méthémoglobinémie.

Bien rincer et utiliser très dilué chez l'enfant (importante résorption percutanée). Ne pas mettre en contact avec l'œil.

Ne pas associer à d'autres **antiseptiques**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares réactions allergiques ou par photosensibilisation.

## ANTISEPTIQUES (5)

## ■ Amidines

<b>HEXOMÉDINE</b>					
Antisepsie de la peau et des muqueuses Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses	45 mL (sol. alcool. 1/1 000)	2,10		15 %	0,05
	500 mL (sol. alcool. 1/1 000)	3,15		15 %	0,01
	75 mL (fl. pour pulv. cutanée)	3,10		15 %	0,04
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses non suintantes	30 g (gel 1/1 000)	2,77		15 %	0,09
<b>HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE</b>					
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses Périonyxis bactérien (bains de doigt de quelques min)	45 mL (sol. alcool. 1,5/1 000)	3,07		15 %	0,07
<b>HEXAMIDINE GILBERT</b>					
Traitement d'appoint des surinfections de la peau	45 mL (sol. alcool. 1 %)			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptiques actifs sur les bactéries Gram+.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue aux **diamidines**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser pour l'antisepsie avant un geste chirurgical car son délai d'action est trop long.

Ne pas appliquer la solution transcutanée sur les plaies ni sur les muqueuses, ni sous pansement (risque de nécrose).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares phénomènes de sensibilisation cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas utiliser d'autres **antiseptiques**.

## ■ Alcool éthylique

<b>ALCOOL MODIFIÉ GIFRER 70 °</b>					
Antisepsie de la peau saine Désinfection du petit matériel chirurgical après son nettoyage	1 fl. (prép. officinale)			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique bactéricide à 70°, fongicide et virucide.

L'alcool à 90° est réputé moins efficace.

**CONTRE-INDICATIONS**

Application sur les yeux, les muqueuses et les plaies.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Asséchant et irritant.

## ANTISEPTIQUES (6)

## ■ Chlorhexidine

SEPTÉAL					
Antiseptie des plaies et brûlures	250 mL (sol. alcool. 0,5 %)	3,73		15 %	0,01
Antiseptie de la peau					
DIASEPTYL					
Antiseptie des plaies et brûlures	75 mL (sol. 0,5 %)	3,72		NR	0,03
Antiseptie de la peau	125 mL (sol. 0,5 %)			15 %	
	250 mL (sol. 0,5 %)			NR	
HIBISCURB					
Antiseptie de la peau	125 mL (sol. moussante 4 %)			NR	
Lavages des mains	500 mL (sol. moussante 4 %)			NR	
HIBIDIL					
Antiseptie de la peau et des muqueuses	15 mL (25 unidoses de sol. aqueuse 0,05 %)			NR	
Antiseptie des plaies					
HIBITANE					
Antiseptie des plaies et brûlures	125 mL (sol. alcool. 0,5 %)	HOP			
	500 mL (sol. alcool. 0,5 %)	HOP			
DOSISEPTINE					
Antiseptie des plaies superficielles	10 unidoses 5 mL	2,74		NR	0,14
	20 unidoses 5 mL			15 %	

## ■ Chlorhexidine + hexamidine + chlorocresol

<b>CYTÉAL</b>					
Antiseptie des plaies et brûlures	250 mL (sol. moussante 0,1 %)	3,83		15 %	0,02
Antiseptie de la peau et des muqueuses	500 mL (sol. moussante 0,1 %)	8,41		NR	0,02

## PROPRIÉTÉS

Antiseptique bactériostatique (puis bactéricide après un temps de contact de 10 min), actif essentiellement sur les germes Gram+ et fongistatique sur *Candida albicans*.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à la **chlorhexidine**. Association avec les dérivés anioniques et les savons (inactivation).

Ne pas mettre en contact avec le cerveau, les méninges et l'oreille moyenne.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver à l'abri de la lumière. Rincer après application (pour les solutions moussantes).

Ne pas utiliser pour les lavages d'oreille.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares eczéma de contact.

Risque d'effets systémiques si application sur de grandes surfaces ou sous occlusion, notamment chez l'enfant.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas utiliser d'autres **antiseptiques**.

## ANTISEPTIQUES (7)

## ■ Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium

<b>DERMOBACTER</b>					
Antiseptie de la peau (solution pure) et des muqueuses (solution diluée)	300 mL (sol.)	4,16		15 %	0,01
<b>MERCRYL</b>					
Antiseptie de la peau (solution pure) et des muqueuses (solution diluée)	125 mL (sol. moussante)			NR	
<b>MERCRYL SPRAY</b>					
Antiseptie de la peau	50 mL (sol.)			NR	

## ■ Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique

<b>BISEPTINE</b>					
Antiseptie des plaies, dermatoses infectieuses sensibles, antiseptie du champ opératoire	100 mL (fl. pulv.)	4,04		30 %	0,04
	250 mL	3,81		30 %	0,02
	500 mL	HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Bactéricide, fongicide, actif sur les germes Gram+ et Gram- et sur *Candida albicans*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue à l'un des constituants.  
Application sur les muqueuses.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Pas d'emploi successif avec des savons ou d'autres antiseptiques non cationiques.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Allergies de contact et anaphylaxie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Savons, antiseptiques anioniques.

## ■ Oxydants

<b>EAU OXYGÉNÉE GILBERT</b>					
Antiseptie des plaies	120 mL (fl. pulv. de sol. 10 vol.)			NR	
	120 mL (fl. de sol. 10 vol.)			NR	
	250 mL (fl. de sol. 10 vol.)			NR	
	10 unidoses 10 mL (10 vol.)			NR	
	60 unidoses 10 mL (10 vol.)	HOP			
	100 unidoses 10 mL (10 vol.)	HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptiques bactériostatiques (faibles sauf pour le permanganate de potassium).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue au produit.  
Association à l'eau oxygénée et au nitrate d'argent pour le permanganate de potassium.  
Contact avec les yeux.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Assèchement de la peau.  
Le permanganate de potassium est très salissant et peut entraîner des brûlures en cas d'erreur de dilution.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association à l'eau oxygénée et au nitrate d'argent pour le permanganate de potassium.

## ANTISEPTIQUES (8)

## ■ Colorants

<b>ÉOSINE AQUEUSE GIFRER</b>					
Traitement d'appoint de l'érythème fessier du nourrisson	2 mL (10 unidoses 2 %)		II	NR	
	5 mL (20 unidoses 2 %)		II	NR	
	45 mL (fl. 2 %)		II	NR	
	100 mL (fl. 2 %)		II	NR	
<b>ÉOSINE AQUEUSE GILBERT</b>					
Traitement d'appoint de l'érythème fessier du nourrisson	2 mL (10 unidoses 2 %)		II	NR	
	5 mL (10 unidoses 2 %)		II	NR	
	50 mL (fl. 2 %)		II	NR	
	100 mL (fl. 2 %)		II	NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiseptiques bactériostatiques sur les bactéries Gram+ et à un moindre degré sur les Gram-. Très asséchant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contamination très rapide de l'éosine aqueuse.

## ■ Ammoniums quaternaires

<b>STERLANE</b>					
Traitement d'appoint des dermatoses infectieuses Antiseptie des plaies	125 mL (sol. 0,5 %)		II	NR	
	350 mL (sol. 0,5 %)		II	NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiseptiques bactéricides sur les bactéries Gram+, faiblement fongistatiques.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux produits.

Contact avec les muqueuses génitales et oculaires.

Association avec les **antiseptiques** anioniques et les savons (inactivation).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Photosensibilisation avec l'éosine.

Très salissant.

Contact avec le cerveau, les méninges et l'oreille moyenne.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Dermes irritatives, eczémas de contact.

Effets systémiques possibles si utilisation sur de grandes surfaces, sous occlusion, notamment chez le nourrisson.

Effets caustiques si utilisation sous occlusion.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas utiliser d'autres **antiseptiques**.



## ANTISEPTIQUES (9)

## ■ Détergents anioniques

<b>DERMACIDE</b>					
Nettoyage de la peau et des muqueuses et rinçage	250 mL (sol. moussante)		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique faiblement bactériostatique sur les germes Gram+.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au produit.  
Association aux ammoniums quaternaires et à la chlorhexidine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Rincer soigneusement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation, eczéma de contact et développement de levures.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas utiliser d'autres antiseptiques.

## ■ Sulfate de cuivre

<b>CRÈME DE DALIBOUR (sans camphre)</b>					
Dermatoses infectieuses, érythème fessier	prép. magistrale			NR	
<b>DERMOCUIVRE</b>					
Idem <b>CRÈME DE DALIBOUR (sans camphre)</b>	25 g (pomm.) 100 g (pomm.)		II	NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique bactéricide sur les germes Gram+ et fongistatique sur *Candida albicans*. Bien toléré chez le nourrisson.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares eczémas de contact.

## KÉRATOLYTIQUES - ACIDE SALICYLIQUE (1)

## Formes réservées aux verrues

## ■ Acide salicylique

<b>DUOFILM</b>				
16,7 % d'ac. salicylique + 16,7 % d'ac. lactique Verrues vulgaires, cors et durillons : 1 à 2 appl./j (protéger la peau périlésionnelle avec un vernis incolore <i>VERLIM 3</i> ou vernis à ongles du commerce), après avoir ramolli la lésion au cours d'un bain, gratter la peau blanchie avec une lime à ongles jetable, sans faire saigner, x 1/sem.	1 fl. 15 mL			NR
<b>VERRUFILM</b>				
Idem <b>DUOFILM</b>	1 fl. 14 mL			NR
<b>KÉRAFILM</b>				
1,5 g d'ac. salicylique + 1,5 g d'ac. lactique Idem <b>DUOFILM</b>	1 fl. 10 mL + 6 rondelles protect. + appl.			NR
<b>TRANSVERCID</b>				
Dispositif pour appl. cutanée Traitement local de verrues vulgaires À poser le soir et enlever le lendemain matin	10 disp. 6 mm, 3,62 mg d'ac. salicylique 8 disp. 12 mm, 14,54 mg d'ac. salicylique			NR NR
<b>CORICIDE LE DIABLE</b>				
1 application cutanée le matin pendant 1 semaine	1 fl. 4 g sol. appl. cutanée 12,5 %			NR
<b>FEUILLE DE SAULE</b>				
<i>Cors-Durillons</i> 1 emplâtre/j pendant 3 à 5 j <i>Verrues</i> 3 appl./j de solution pendant 2 sem.	5 emplâtres durillons 9 emplâtres cors 1 emplâtre à découper sol. 10 % appl. loc.			NR NR NR
<b>POMMADE M.O. COCHON</b>				
1 appl. le soir	10 g (pomm. 50 %)			NR
<b>SANITOS</b>				
1 à 2 appl./j	fl. 5 mL sol. 11 %			NR
<b>VERRUPAN</b>				
1 à 2 appl./j	2 fl. 3 g			NR

**PROPRIÉTÉS**

Kératolytiques.

**INDICATIONS**

Verrues vulgaires, cors, durillons.  
Verrues vulgaires plantaires des zones d'appui exclusivement pour le verutal.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : pas d'acide salicylique au cours du 3<sup>e</sup> trimestre.

**Acide salicylique** : hypersensibilité aux salicylés, application sur les muqueuses, dans les plis et sur les dermatoses suintantes.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Arrêt pendant quelques jours si douleurs, saignement.

Ne pas utiliser des produits trop puissants chez le diabétique et l'artéritique.

## TUMEURS CUTANÉES BÉNIGNES (2)

### Nævi

#### Autosurveillance

Selon l'abécédaire ABCDE :

Abécédaire sur lequel s'appuie la surveillance des nævi ; la présence ou l'apparition de l'un des critères suivants doit faire consulter le dermatologue

A : Asymétrie du dessin.

B : Bordure irrégulière, en carte de géographie.

C : Couleur inhomogène, polychromie.

D : Dimension > 6 mm de grand axe.

E : Évolutivité.

#### Surveillance médicale

- Surveillance annuelle par le dermatologue.
- Protection contre le soleil chez tous les sujets ayant des nævi, d'autant plus qu'ils sont nombreux et cliniquement atypiques.
- Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale des nævi congénitaux et des nævi atypiques avec examen anatomopathologique systématique.

#### Sujets à risque de mélanome

- Antécédent de mélanome personnel ou familial.
- Plus de 50 nævi.
- Nævi très variés (forme, couleur, taille).
- Nombreuses éphélides.
- Phototype clair.
- Antécédents de brûlures solaires sévères dans l'enfance ou l'adolescence.
- Nombreuses séances d'UVA en cabine.

### Kératoses actiniques (carcinomes épidermoïdes *in situ*)

La cryothérapie est la méthode la plus simple et est à utiliser en 1<sup>re</sup> intention.

L'**EFUDIX** crème est indiquée à raison de 1 à 2 appl./j pendant 4 à 6 sem. en cas de lésions multiples ; il nécessite une bonne compréhension du patient en raison de l'irritation locale.

Dermabrasion et laser CO<sub>2</sub> sont réservés aux contre-indications des 2 techniques précédentes.

L'électrocoagulation sous anesthésie locale peut être effectuée.

On peut également proposer **imiquimod (ALDARA)** : 1 appl./j 5 j/sem. en protégeant la peau autour pendant 6 sem. Laisser agir la nuit.

Dans tous les cas il faut surveiller le patient annuellement au long cours, biopsier les lésions s'il existe un doute sur une transformation en carcinome épidermoïde invasif et recommander une protection solaire totale (chapeau, casquette, écran solaire indice 50+).

### Cornes cutanées

Exérèse chirurgicale sous anesthésie locale et examen anatomopathologique de toute la pièce opératoire. Les cornes cutanées correspondent aux étiologies suivantes : lésion virale 52 %, kératose actinique 26 %, kérato-acanthome 4,8 %, carcinome spinocellulaire 3,2 %.

#### Technique de l'autosurveillance des nævi

Après s'être totalement déshabillé, examiner successivement et attentivement :

- le visage sans oublier les oreilles ;
- le cuir chevelu en s'aidant d'un sèche-cheveux ;
- la paume et le dos des mains sans oublier les ongles, les avant-bras ;
- les coudes, les bras, les aisselles ;
- le cou, la poitrine (en regardant sous les seins chez les femmes) et le ventre ;
- dans une glace, avec l'aide d'un miroir à main, la nuque, les épaules et le dos ;
- les fesses et la face postérieure des cuisses ;
- en s'asseyant, la face antérieure des cuisses, les jambes, le dos et la plante des pieds sans oublier les ongles, et la région génitale avec l'aide d'un miroir.

Cet auto-examen ne prend pas plus de 10 minutes et doit être réalisé régulièrement 2 à 3 fois par an.

## KÉRATOLYTIQUES - ACIDE SALICYLIQUE (2)

## Pommade kératolytique

## ■ Acide salicylique + vaseline

<b>VASELINE SALICYLÉE</b>					
Dermatoses squameuses et hyperkératosiques (psoriasis, lichénifications, kératodermies palmo-plantaires, verrues vulgaires) : % fonction de l'épaisseur des lésions	1 tube (prép. magistrale)			NR	

## Pommade kératolytique + corticoïde

## ■ Acide salicylique + diflucortolone

<b>NÉRISALIC</b>					
Psoriasis et autres dermatoses hyperkératosiques avec composante inflammatoire : 1 appl./j puis diminution progressive	30 g pomm. 3 %	3,40	I	15 %	0,11

## Lotions kératolytiques + corticoïdes

## ■ Acide salicylique + bétaméthasone

<b>DIPROSALIC</b>					
Psoriasis et états psoriasiformes du cuir chevelu : 1 appl./j en friction puis dégression progressive	30 g (sol. alcool. 2 %)	3,59	I	15 %	0,12

## ■ Acide salicylique + triamcinolone

<b>LOCALONE</b>					
Idem <b>DIPROSALIC</b>	122 mL (sol. alcool. 0,1 %)		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

L'**acide salicylique** est un kératolytique utilisé pour le décapage des dermatoses hyperkératosiques telles que le psoriasis, les kératodermies palmo-plantaires, les ichtyoses, les verrues vulgaires.

L'association à un **dermocorticoïde** a un intérêt lorsqu'une composante inflammatoire est associée (psoriasis, eczéma lichénifié).

**INDICATIONS**

Cf. Propriétés.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : pas d'acide salicylique au cours du 3<sup>e</sup> trimestre.

**Acide salicylique** : hypersensibilité aux salicylés, application sur les muqueuses, dans les plis et sur les dermatoses suintantes.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas appliquer sur des surfaces étendues chez l'enfant.

Ne pas utiliser de façon prolongée car risque d'irritation locale (prendre le relais par une lotion corticoïde type **DIPROSONE**, lotion pour le traitement des psoriasis du cuir chevelu).

## ANTIMITOTIQUES LOCAUX

## ■ Fluorouracile

<b>EFUDIX</b>					
Kératoses actiniques, maladie de Bowen, kérato-acanthome, certains basocellulaires et condylomes génitaux : 1 à 2 appl./j pendant 4 à 6 sem.	20 g crème 5 %	26,30	I	65 %	1,32

**PROPRIÉTÉS**

Antimitotique.

**INDICATIONS**

Kératoses actiniques étendues pour lesquelles une cryothérapie n'est pas envisageable +++ , maladie de Bowen, kérato-acanthome, certains carcinomes basocellulaires et certains condylomes génitaux.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses ; se laver les mains après l'application.

L'évolution normale des lésions sous traitement est une nécrose avec possible perte de substance puis réépidermisation, dont il faut bien prévenir le patient.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème, érosion, ulcération, nécrose.

Risque de majoration des effets du produit en cas d'exposition solaire.

## ■ Podophyllotoxine

<b>CONDYLINE</b>					
Condylomes ano-génitaux : 2 appl./j pendant 3 j, à répéter si besoin au maximum pendant 5 sem.	3 mL (sol. avec 6 applicateurs)	20,39	I	65 %	6,80

**PROPRIÉTÉS**

Antimitotique cytolytique d'origine végétale (extrait de la résine de podophylline).

**INDICATIONS**

Condylomes ano-génitaux pour lesquels une cryothérapie n'est pas envisageable ; à réserver à l'homme car le produit peut facilement couler et entraîner des brûlures chez la femme (préférer l'utilisation d'une préparation de podophylline 25 % dans la vaseline chez la femme) ; surface traitable < 4 cm<sup>2</sup>.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Utilisation en intravaginal et chez l'enfant.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Appliquer avec précautions en utilisant l'applicateur sélectivement sur les lésions et laisser sécher en évitant tout écoulement du produit. Se laver les mains après application. Rincer à grande eau en cas de contact oculaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème, douleur, possible ulcération. œdème, balanoposthite.

**IMMUNOMODULATEUR**■ **Imiquimod**

<b>ALDARA</b>					
3 appl./sem. au coucher : contact de 6 à 10 h Applications poursuivies jusqu'à disparition ; pour 16 sem. max.	12 sach. de crème 5 % usage unique	62,37	I	65 %	5,20

**PROPRIÉTÉS**

Cytokine immunomodulatrice.

Induction de synthèse d'interféron alpha par les cellules immunitaires répondeuses.

**INDICATIONS**

Traitement local des verrues génitales et péri-anales externes de l'adulte (condylomes).

Traitement des petits carcinomes basocellulaires superficiels.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Applications déconseillées sur les lésions du prépuce chez les patients non circoncis.

- Verrues génitales ou anales internes : pas d'étude d'évaluation.

- Pas d'occlusion par pansement.

- Pas d'application sur peau lésée (ex. : après cryothérapie).

- Enlever la crème avant un rapport sexuel (elle fragilise les moyens contraceptifs ou de protection locaux).

- Grossesse et allaitement : aucune information disponible.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions cutanées locales.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Non étudiées avec les **immunosuppresseurs** : prudence chez les greffés.

**BAS ET BANDES DE COMPRESSION VEINEUSE****Bas et bandes de compression veineuse**

**Bandes** (systématiques si pansement)

Indiquées en cas d'ulcères de jambe.

**DUPRAFLEX**, étalonnées, largeur 10 cm, longueur 3 m.

Prescrire 2 paires.

Grade 1-2 : faible à moyen.

Grade 3-4 : moyen à fort.

**Bas**

Jarret (+++), mi-cuisse ou collant.

1 = insuffisance veineuse fonctionnelle.

2 = existence de varices.

3 = phlébite antérieure ou évolutive.

4 = lymphœdème.

# ULCÈRES CUTANÉS - PANSEMENTS (1)

## Pansements absorbants

Hydrocolloïdes		
<b>COMFEEL PLUS</b> et <b>PLUS TRANSPARENTCOMFEEL PÂTE</b> , <b>DUODERM E</b> et <b>DUODERM EXTRA MINCE</b> , <b>ALGOPLAQUE</b>	Indications : tous les stades de la cicatrisation. Laisser au moins 48 h en place. Existent en mince (contrôle visuel), épais (plus absorbants) et bordés (utiles dans les zones de friction).	LPPR *
Hydrocellulaires et mousses		
<b>ALLEVYN</b> non adhésif et <b>MEPILEX</b> , <b>TIELLE</b> et <b>TIELLE S</b> , <b>COMBIDERM</b> et <b>COMBIDERM</b> non adhésif <b>BIATIN</b> et <b>BIATIN</b> non adhésif, sacrum, talon	Indications : idem hydrocolloïdes, plus absorbants et mieux tolérés. En pratique : escarres +++, macération, ulcères de jambe. Interactions avec H2 O2 et <b>DAKIN</b> .	LPPR
Hydrogels		
<b>DUODERM HYDROGEL</b> , <b>PURILON</b> , <b>NU-GEL</b> , <b>INTRASITE</b> , <b>NORMLGEL</b> , <b>HYPERGEL</b>	Indications : détersion et bourgeonnement des plaies sèches +++.	LPPR
Alginate		
<b>URGOSORB</b> (association avec un hydrocolloïde), <b>ALGOSTÉRIL</b> , <b>MELGISORB</b>	Indications : détersion, plaie hémorragique, plaie infectée, suintement +++. Contiennent tous des CMC, sauf <b>ALGOSTÉRIL</b> .	LPPR pour les plaques
Hydrofibres		
<b>AQUACEL</b>	Indications : plaie suintante +++, c'est le plus absorbant des pansements.	LPPR
Charbons		
<b>CARBONET</b>	Indications : limite la prolifération bactérienne. Pansement peu absorbant, mal toléré si mal humidifié, nécessite un pansement secondaire (américain, film).	LPPR
Polysaccharides		
<b>DEBRISAN</b>	Uniquement en détersion sur une courte période.	
<b>POLYACRYLATE</b> , <b>TENDERWET</b>	Indications : détersion et hydratation des plaies sèches ou fibrineuses. Nécessitent un pansement secondaire.	Non LPPR
Pansements hydrosélectifs		
<b>CUTINOVA HYDRO</b>	Indications : ulcères, escarres, brûlures peu ou moyennement exsudatives	LPPR
Acide hyaluronique		
<b>IALUSET</b> : compresses et crème	Plutôt en phase de bourgeonnement et d'épidermisation	

\* Liste des produits et prestations remboursables = tarif de base sécurité sociale remboursé et opposable pour les pansements



## ULCÈRES CUTANÉS - PANSEMENTS (2)

### Pansements d'interface (non absorbants)

Gras		
<b>JELONET, ADAPTIC, PHYSIOTULLE (+ hydrocolloïde)</b>	Ne contient pas de baume du Pérou, très allergisant. Indications : tous les stades de la cicatrisation.	LPPR sauf <b>JELONET</b>
Siliconés		
<b>MEPITEL</b>	Indications : épidermolyses, dermabrasion.	LPPR

### Pansements argentiques

<b>ACTISORB AG+</b>	10,5 × 10,5 10,5 × 19	boîtes de 12	Absorption et drainage des germes et des exsudats de la plaie Activité in vitro anti-bactéries Gram+ et Gram- Diminuent les odeurs Indications : plaies infectées ou à risque d'infection, plaies fortement exsudatives Précautions : contre-indication en cas de sensibilité connue à l'argent, en pansement secondaire sous tulle <b>ADAPTIC</b> par exemple pour <b>ACTISORB AG+</b>
<b>AQUACEL AG</b>	2,5 × 40	boîte de 16	
	10 × 12	boîte de 16	
	13,5 × 15	boîte de 16	
	15 × 20	boîte de 10	
	16 × 30	boîte de 10	
	Modèles hospitaliers : 4 × 20 4 × 30	boîte de 10 boîte de 10	
<b>BIATAIN AG</b>	10 × 12 15 × 15	boîte de 16 boîte de 10	

### Exemples de pansements utilisés correspondant à une pratique de soin quotidienne des plaies de jambes

<b>AQUACEL</b>	10 × 12	boîte de 16
<b>MEPITEL</b>	7,5 × 10	boîte de 10
<b>ADAPTIC</b>	7,6 × 7,6 et 7,6 × 20,3	boîte de 10
<b>COMFEEL PLUS</b>	10 × 10	boîte de 16
<b>COMFEEL PLUS TRANSPARENT</b>	10 × 10	boîte de 16
<b>ALLEVYN non adhésif</b>	10 × 10	boîte de 10
<b>ALGOSTÉRIL</b>	10 × 10	boîte de 10
<b>PHYSIOTULLE</b>	10 × 10	boîte de 10
<b>ACTISORB + 25</b>	10,5 × 10,5 et 10,5 × 19	boîte de 12
<b>BIATAIN ARGENT non adhésif</b>	10 × 12	boîte de 16

## ULCÈRES CUTANÉS - PANSEMENTS (3)

### Films

Polyuréthanes		
<b>OPSITE POST OP, OPSITE FLEXIFLIX et OPSITE FLEXIGRID, TEGADERM</b>	Indications : épidermisation, post-chirurgie cutanée, brûlures superficielles	LPPR
Matrice à effet antiprotéases		
<b>PROMOGRAN</b>	Indications : toutes plaies chroniques. À renouveler /72 heures	NR

### Nouvelles classes

Pansements biologiques «inertes»		
<b>INTEGRA</b> (matrice collagène + silicone)		
Facteur de croissance		
<b>REGRANEX</b> gel 0,01 % (tube 15 g)	Stimulation de la granulation et de la cicatrisation des plaies $\geq 5 \text{ cm}^2$ chez le diabétique avec neuropathie périphérique	65 % médicament d'exception (coût élevé : 357,83 €)

## INHIBITEURS DE PROTÉINE-KINASE ANTINÉOPLASIQUES (1)

## ■ Ipilimumab

YERVOY					
Perfusion IV de 90 min 3 mg/kg toutes les 3 sem. pendant 9 sem. (soit 4 doses)	1 fl. 50 mg (10 mL)	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

L'antigène 4 des lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) est un régulateur négatif de l'activation des cellules T.

L'ipilimumab est un potentialisateur des cellules T qui bloque spécifiquement le signal inhibiteur du CTLA-4, conduisant à une activation des cellules T, à leur prolifération, et l'infiltration des tumeurs par les lymphocytes, aboutissant à la mort des cellules tumorales.

Le mécanisme d'action de l'ipilimumab est indirect, en activant la réponse immunitaire *via* les cellules T.

**INDICATIONS**

Traitement du mélanome avancé (non résécable ou métastatique) chez les patients adultes ayant déjà reçu un traitement.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique et thyroïdien avant traitement. Surveillance biologique, hépatique, surrénalienne, gastro-intestinale, dermatologique, thyroïdienne et neurologique pendant le traitement.

Déconseillé en cas de grossesse ou allaitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Confusion, troubles psychocomportementaux, dépression, ataxie, myoclonie, neuropathie périphérique, réactions cutanées, troubles de la vision, hémorragie gastro-intestinale, colite, insuffisance hépatique, hépatite, hypothyroïdie, troubles cardio-vasculaires (fibrillation, hypotension, arythmie), dépression respiratoire.

Anémie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie, augmentation des enzymes hépatiques et pancréatiques, perturbation du bilan thyroïdien et surrénalien, hypokaliémie, hyponatrémie.

Asthénie, céphalées, tremblements, vertiges, douleurs musculaires, diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, reflux, amaigrissement, bouffées de chaleur, dyspnée, toux.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Corticostéroïdes** : interférence avec le mécanisme d'action de l'ipilimumab. À éviter pendant le traitement mais peuvent être utilisés après.

**Anticoagulants** : majoration du risque hémorragique notamment gastro-intestinal. Une surveillance étroite est recommandée.

## TUMEURS CUTANÉES MALIGNES (3)

### Mélanome cutané [3]

Insistons sur la prévention primaire de cette redoutable affection, par une éducation au soleil dès le plus jeune âge en fonction du phototype, les mesures de photoprotection, le dépistage des sujets à risque (Cf. Nævi), l'enseignement de l'auto-surveillance et la surveillance dermatologique régulière.

Le traitement est discuté en RCP.

#### Stade I

##### ► Traitement

Le traitement est chirurgical, avec un 1<sup>er</sup> temps consistant en l'exérèse de la lésion avec examen anatomopathologique confirmant le diagnostic et mesurant notamment l'indice de Breslow (épaisseur de la tumeur), principal facteur pronostique conditionnant les marges de sécurité à respecter pour la reprise chirurgicale qui s'effectue dans un 2<sup>e</sup> temps.

- *In situ* : marge de 5 mm.
- Dubreuilh : marge de 1 cm.
- Breslow  $\leq 1$  mm : marge de 1 cm.
- Breslow de 1,01 à 2 mm : marge de 1 à 2 cm.
- Breslow de 2,01 à 4 mm : marge de 2 cm.
- Breslow  $> 4$  mm : marge de 2 à 3 cm.

Exérèse du ganglion sentinelle proposé pour un Breslow  $> 1$  mm ou mélanome ulcéré.

##### ► Surveillance

- Breslow  $\leq 1,5$  mm : surveillance clinique tous les 6 mois pendant 10 ans puis 1 fois/an à vie et autosurveillance.
- Breslow  $> 1,5$  mm : surveillance clinique tous les 3 mois pendant 5 ans puis 1 fois/an à vie et autosurveillance. Écho-

graphie ganglionnaire de la zone de drainage, imagerie TDM si Breslow  $> 4$  mm, ulcération, ganglion envahi en histologie. Pour les mélanomes dont le Breslow est  $\geq 1,5$  mm sans envahissement ganglionnaire (N0), on peut proposer : **interféron  $\alpha 2a$  (ROFÉRON)**, 3 M UI x 3/sem. pendant 18 mois en sous-cutané, après un bilan d'extension.

Pour les mélanomes à haut risque de récurrence (exemple N+) : **interféron  $\alpha 2b$  (INTRONA)**, 20 M UI/m<sup>2</sup>/j IV 5 j/7 pendant 1 mois puis 10 M UI/m<sup>2</sup> SC x 3/sem. pendant 48 sem., après un bilan d'extension.

#### Stade IV (métastases viscérales) [4]

- Si possible, les métastases doivent être réséquées.
- Le statut BRAF de la tumeur primitive doit être recherché.
- En cas de mutation BRAF, le traitement repose sur l'administration de **vémurafénib (ZELBORAF)**. En seconde intention, on propose le **témolomide (TEMODAL)** ou l'**ipilimumab (YERVOY)**, possible en cas de localisations accessibles peu nombreuses et isolées.
- En l'absence de mutation, on propose une chimiothérapie : **dacarbazine (DÉTICÈNE)**, 250 mg/m<sup>2</sup>/j IV pendant 4 à 5 j, et réévaluation après 2 à 3 cures espacées de 28 j. En cas de métastases cérébrales : **fétomustine (MUPHORAN)**, 100 mg/m<sup>2</sup> 3 doses à une sem. d'intervalle puis réévaluation après 4 à 5 sem.

#### Dans tous les cas

- surveillance régulière à vie ;
- autosurveillance +++ ;
- examen des membres de la famille ;
- protection solaire maximum (pas d'exposition, vêtements, écrans solaires).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l'adulte, *Anaes*, 2004

[2] Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome épidermoïde cutané (spino-cellulaire) et de ses précurseurs, *SFD*, 2009

[3] Prise en charge des patients adultes atteints d'un mélanome cutané MO, *SFD et FNCLCC*, 2005

[4] Mélanome cutané métastatique, *SFD*, 2013

## INHIBITEURS DE PROTÉINE-KINASE ANTINÉOPLASIQUES (2)

## ■ Vémurafénib

ZELBORAF					
4 cp. (960 mg) x 2/j à 12 h d'intervalle et dans les mêmes conditions (au cours ou en dehors des repas mais de façon constante) Poursuite du traitement et adaptation posologique conditionnées par la tolérance En cas d'oubli : prise si $\geq 4$ h avant la prise suivante En cas de vomissement : ne pas reprendre la dose, poursuivre le traitement normalement	56 cp. 240 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur par voie orale de la sérine-thréonine-kinase BRAF. La substitution de la valine 600 des protéines BRAF conduit à leur activation constitutive et donc à une absence de contrôle par les facteurs de croissance physiologiques. Le **vémurafénib** s'oppose à cette activation permanente en inhibant cette kinase mutée avec une certaine sélectivité vis-à-vis des BRAF non mutées.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Le **vémurafénib** présente une demi-vie longue qui mène à une certaine accumulation dans

l'organisme. Ce composé est très peu biotransformé ( $\leq 5\%$ ) et est excrété à 94 % dans les selles.

**INDICATIONS**

Traitement en monothérapie du mélanome métastatique porteur de la mutation BRAF V600 ou non résécable.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, évaluation du rapport bénéfice/risque en cas de grossesse, d'allaitement. Contraception efficace obligatoire.

## INHIBITEURS DE PROTÉINE-KINASE ANTINÉOPLASIQUES (3)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La présence de la mutation BRAF V600 doit être confirmée avant l'initiation du traitement.

Une surveillance oculaire est indispensable en raison du risque d'uvéïte.

Une surveillance cutanée est également nécessaire en raison du risque d'apparition de CEC (cancer épidermoïde cutané) ; toute lésion suspecte devra être caractérisée en anatomopathologie. La survenue de CEC ne doit pas conduire à l'arrêt du traitement.

## Ajustements posologiques et arrêt du traitement

Grade de l'événement indésirable	Conduite à tenir
Grade 1 ou 2 tolérable	Poursuite à la posologie usuelle : 960 mg x 2/j
Grade 2 intolérable ou 3	- 1 <sup>re</sup> fois : interruption puis reprise à 720 mg x 2/j lors du retour au grade 0 ou 1 - 2 <sup>e</sup> fois : interruption puis reprise à 480 mg x 2/j lors du retour au grade 0 ou 1 - 3 <sup>e</sup> fois : arrêt définitif
Grade 4	- 1 <sup>re</sup> fois : interruption puis reprise à 480 mg x 2/j ou arrêt définitif - 2 <sup>e</sup> fois : arrêt définitif

## EFFETS INDÉSIRABLES

L'allongement de l'intervalle QTc justifie une adaptation de la prise en charge :

- un QTc > 500 ms et allongé ≥ 60 ms depuis l'initiation du traitement conduit à l'arrêt définitif ;

- un QTc > 500 ms et allongé ≤ 60 ms depuis l'initiation du traitement conduit à une interruption puis une reprise lors du retour du QTc ≤ 500 ms à la posologie inférieure à chaque réapparition (720 mg x 2/j puis 480 mg x 2/j puis arrêt définitif).

Les plus fréquents : arthralgies, éruptions cutanées, photosensibilité, nausées, alopecie et prurit.

L'apparition de CEC est très fréquente.

On note également les manifestations suivantes : anorexie, céphalées, divers troubles digestifs, réactions cutanées pouvant être sévères, réactions oculaires (uvéïtes), allongement de l'intervalle QT, anomalies du bilan hépatique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les inhibiteurs et inducteurs puissants du CYP3A4.

Le **ZELBORAF** est un inducteur du CYP3A4 et peut rendre inefficaces les médicaments métabolisés par cette enzyme comme certaines pilules contraceptives. Il induit également légèrement le CYP2B6 et inhibe le CYP1A2.

## ANTINÉOPLASIQUE INHIBITEUR DE LA VOIE HEDGEHOG

■ **Vismodégib**

<b>ERIVEDGE</b>					
1 gél./j	28 gél. 150 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Le **vismodégib** est une petite molécule inhibitrice de la voie Hedgehog, administrée par voie orale. Cette voie entraîne la transcription de gènes impliqués dans la prolifération, la survie et la différenciation cellulaire.

**INDICATIONS**

Traitement des patients adultes atteints de carcinome basocellulaire :

- métastatique symptomatique ;
- localement avancé pour lequel la chirurgie ou la radiothérapie ne sont pas appropriées.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ayant montré une tératogénécité chez l'animal, **ERIVEDGE** est contre-indiqué chez la femme enceinte, allaitante ou en âge de procréer en l'absence de contraception efficace.

En raison de l'absence d'études, ce médicament est contre-indiqué chez les patients de moins de 18 ans.

Hypersensibilité au produit ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Femme en âge de procréer : test de grossesse, contraception chimique et mécanique.

La sécurité, l'efficacité et la tolérance du médicament n'ayant pas été établies chez les

patients insuffisants hépatiques ou insuffisants rénaux chroniques, une surveillance étroite est recommandée en cas d'administration chez ce type de patient.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets indésirables cliniques, fréquents ou très fréquents, de gravité mineure à modérée :

- troubles de l'état général : perte de poids, douleur, asthénie ;
- troubles du système nerveux : dysgueusie, agueusie ;
- troubles cutanés : alopecie, prurit, rash ;
- troubles musculosquelettiques : spasmes musculaires, athralgies, myalgies ;
- troubles gastro-intestinaux : diarrhées, constipation, vomissements, douleurs abdominales ;
- perte d'appétit ;
- aménorrhée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les études pharmacocinétiques montrent que le **vismodégib** est un substrat de la pompe d'efflux P-gp et que les enzymes métabolisant le médicament sont les CYP2C9 et CYP3A4 : il est donc sensible à leurs inhibiteurs (augmentation de son efficacité) et à leurs inducteurs (diminution de son efficacité).

Il peut également diminuer l'efficacité des stéroïdes contraceptifs.

## DIABÈTE SUCRÉ – ACIDOCÉTOSE (3 PREMIÈRES HEURES)

Il peut s'agir d'un diabète connu décompensé ou d'un diabète inaugural. Il existe toujours des signes cardinaux (polyuropolydipsie), une cétose et même des troubles de la conscience (« précoma » ou coma).

### Mesures immédiates

Hospitalisation en service spécialisé ou en réanimation.

- Mettre en place une voie d'abord IV.

Un cathéter dans une veine du bras suffit normalement, en sachant qu'il faudra passer environ 6 à 8 L dans les 24 h, dont la moitié dans les 6 premières heures.

- Non systématique : sonde vésicale (si absence de diurèse au bout de 3 h) et sonde gastrique (en cas de vomissements).

- Faire des soins de nursing (en cas de coma).

– Retrait des prothèses dentaires.

– Matelas anti-escarres et changements de position fréquents.

– Humidification des muqueuses et liberté des voies respiratoires.

– Prévention des thromboses veineuses.

- Établir la feuille de surveillance horaire.

- Faire les prélèvements sanguins et urinaires pour évaluation immédiate.

Glycémie capillaire, glycosurie, cétonurie, ionogramme, bicarbonates et pH. Ne pas attendre les résultats pour traiter.

### Apports hydroélectriques

#### Quantité de liquide

1 L en 1 h, puis 1 L en 2 h, puis 1 L en 3 h, puis 1 L toutes les 4 h - en surveillant la correction de la déshydratation et l'état cardiaque (ECG).

#### Nature des apports

En général, dans les 3 premières heures on perfuse du sérum salé physiologique à 9 ‰.

### Insulinothérapie

#### Types d'insuline

On n'utilise que des insulines d'action rapide (voir **insulines ultrarapides et rapides**).

Les insulines actuellement les plus volontiers utilisées sont les analogues rapides **HUMALOG** (lispro), **NOVORAPID** (aspart) ou **APIDRA** (glulisine).

#### Doses et voies d'administration

– La seringue électrique a remplacé les autres modes d'administration. À partir de 1 flacon de 10 mL d'**insuline rapide** (100 U/mL), 600 U (6 mL) sont prélevées et diluées dans 60 mL de sérum physiologique. La vitesse d'administration est de 10 U/h (environ 0,15 U/kg/h chez l'adulte) au début en cas de cétose importante, 3 à 5 U/h autrement.

– La voie IV directe est possible en injections horaires, à raison de 10 U en IV directe toutes les heures, jusqu'à disparition de la cétose urinaire. En revanche l'introduction d'insuline dans les flacons de perfusion et la voie IM sont déconseillées. La surveillance se fait sur les glycémies capillaires (+++).

Lorsque la glycémie est redevenue normale ou subnormale, on passe à la voie SC après avoir fait une dernière injection IV de 10 U en même temps que l'injection SC pour éviter tout hiatus insulinaire.

Ne jamais utiliser le protocole dit « à la demande » qui consiste à arrêter l'insulinothérapie lorsque la glycémie est redevenue normale. Un diabète de type 1 a besoin d'insuline même lorsque la glycémie est normale (+++).

Il faut se fonder sur les besoins probables (0,7 U/kg/j). On divise la dose par 4 et on injecte cette quantité toutes les 6 h.

### Apports ioniques

Dès la 3<sup>e</sup> h il faut apporter du potassium (8 à 12 g/24 h) et compenser la perte en sodium (12 g/24 h).



## ANALOGUES ULTRARAPIDES DE L'INSULINE

## ■ Insuline analogue lispro

<b>HUMALOG</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 45 à 70 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>HUMALOG KWIKPEN</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

## ■ Insuline analogue aspart

<b>NOVORAPID</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 40 à 80 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>NOVORAPID FLEXPEN</b>  <b>NOVORAPID PENFILL</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46

## ■ Insuline analogue glulisine

<b>APIDRA</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 40 à 80 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>APIDRA OPTICLIK</b>  <b>APIDRA SOLOSTAR</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

## DIABÈTE SUCRÉ – ACIDOCÉTOSE (APRÈS LA 3<sup>E</sup> HEURE) (1)

Outre les trois éléments de base, hydratation, insulinothérapie et apports ioniques, la 3<sup>e</sup> h est marquée par la possibilité d'une hypokaliémie qu'il faut prévenir. Le traitement d'un facteur déclenchant est également d'importance majeure.

### Hydratation

- Si le patient est inconscient ou obnubilé, la réhydratation est poursuivie **par voie IV** comme pendant les premières heures. En général, le volume à perfuser est de 6 à 8 L sur 24 h, dont la moitié sur les 8 premières heures, à adapter en fonction de l'âge, de l'état cardiovasculaire, de l'osmolarité plasmatique et de la tolérance clinique.
- Quand le patient a repris conscience et est capable d'avaler sans problème, la réhydratation peut être poursuivie *per os* (bouillon de viande et de légumes + jus de fruits + eau), guidée par la soif.

### Apports ioniques

Les apports les plus importants (guidés sur l'aspect clinique du patient et les ionogrammes) sont :

- le sodium : les pertes globales sont de 400 à 500 mmol/24 h (10 à 12 g). Les apports doivent tenir compte de ces pertes et être adaptés sur les ionogrammes ;
- le potassium : 400 à 500 mmol/24 h (10 à 12 g), dans la perfusion ou dans du jus de fruits. Une hypokaliémie de la 3<sup>e</sup> h est à craindre si la glycémie se normalise trop vite ;
- le glucose : dès que la glycémie est proche de la normale ;
- les protéines : l'intense catabolisme musculaire doit être réparé.

Lorsque la glycémie atteint 2,5 g/L (13 mmol/L), on remplace le sérum salé par du glucosé à 10 %, additionné de NaCl (4 à 6 g/L) et de KCl (3 à 4 g/L).

### Insulinothérapie

Dès que la voie IV n'est plus nécessaire parce que les glycémies sont redevenues subnormales, on reprend la voie SC en évitant tout hiatus insulinique.

### Quantité d'insuline à injecter

Les doses nécessaires pour les 24 h qui viennent sont évaluées approximativement.

La dose par 24 h se situe au moins à 0,8 U/kg/j le 1<sup>er</sup> j.

L'objectif n'est pas d'équilibrer parfaitement et immédiatement le patient mais d'éviter deux écueils : une **rechute de la cétose** si les quantités d'insuline sont insuffisantes et des **hypoglycémies** si les doses sont trop élevées.

### Répartition de l'insuline

Au cours de ces diabètes décompensés l'insulinothérapie doit être optimisée.

La répartition de l'insuline se fait en 4 injections/j soit 1 toutes les 6 h. à chaque injection la quantité d'insuline à injecter est obtenue en divisant la quantité théorique totale (0,8 U/kg/j) par 4.

### Quelle insuline injecter ?

L'insulinothérapie optimisée est un impératif : 4 injections d'insuline par jour (ou pompe à insuline externe).

On a recours au schéma basal/bolus :

- 3 injections d'**insuline ultrarapide** :  
le matin avant le petit-déjeuner ;  
le midi avant le déjeuner ;  
le soir avant le dîner ;
- une **insuline NPH** matin et soir, **LANTUS** le soir ou **LEVEMIR** matin et soir.

- Exemple : pour un sujet pesant 60 kg. et ayant besoin de  $0,8 \times 60 = 48$  U/j d'insuline, on peut donc faire : une injection de 24 U de **LANTUS** au coucher et 8 U d'**insuline ultrarapide** matin, midi et soir.

**DIABÈTE SUCRÉ – ACIDOCÉTOSE (APRÈS LA 3<sup>E</sup> HEURE) (2)****Traitement d'un facteur déclenchant****Traitement d'une infection**

Antibiothérapie énergique et adaptée à la probabilité du type d'infection en attendant une preuve bactériologique et un antibiogramme :

- infection pulmonaire : **AUGMENTIN** (amoxicilline + acide clavulanique) : 1 g/8 h ;
- infection urinaire : il faut être rapidement efficace. Les **quinolones** (**OFLOCET**, **PÉFLACINE**) sont les antibiotiques les plus régulièrement efficaces sur les infections urinaires chez le diabétique ;
- infections cutanées à staphylocoques : **AUGMENTIN**, pristinamycine (**PYOSTACINE**).

**Traitement d'une maladie générale**

Toute maladie générale grave peut décompenser un diabète mais il faut rechercher : un cancer viscéral, une hémopathie, une connectivite, une endocrinopathie (hyperthyroïdie, acromégalie).

**Traitement en cas de médicament diabétoène**

La corticothérapie (+++) : une simple injection intra-articulaire suffit à décompenser un diabète. On doit traiter par insuline ces patients jusqu'à élimination du corticoïde.

## COMA HYPEROSMOLAIRE – ACIDOSE LACTIQUE

### Coma hyperosmolaire

Il résulte de la conjonction d'un diabète déséquilibré et d'une déshydratation. Il est fréquent chez le sujet âgé atteint de diabète de type 2 et traité par **antidiabétiques oraux** ou régime seul.

### Nursing

- *Soins de nursing (en cas de coma)*
  - Retrait des prothèses dentaires.
  - Matelas anti-escarres et changements de position fréquents.
  - Humidification des muqueuses et liberté des voies respiratoires.
  - Prévention des thromboses veineuses.
- *Établir la feuille de surveillance horaire*
- *Faire les prélèvements sanguins et urinaires pour évaluation immédiate*

Glycémie capillaire, glycosurie, cétonurie, ionogramme, bicarbonates et pH. Ne pas attendre les résultats pour traiter.

### Réhydratation et apports ioniques

La correction hydrosodée doit être réalisée en priorité et en urgence : le volume perfusé est important, en général 6 à 8 L sur 24 h, sans dépasser 1 à 2 L durant les 2 premières heures.

On débute en général par du sérum salé à 9 ‰. Le relais par du sérum hypotonique à 4,5 ‰ se fait ensuite lorsque la volémie est rétablie.

L'apport de potassium (2 à 4 g de KCl) dans la perfusion doit se faire dès le début, ou à partir de la 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> h si la kaliémie de départ est élevée.

Le sérum glucosé à 5 % additionné de sodium et de potassium remplace le sérum salé lorsque la glycémie atteint 2,5 g/L (13,7 mmol/L).

### Insulinothérapie

Il existe une insulino-résistance importante liée à la déshydratation.

L'insulinothérapie se fait par voie intraveineuse à l'aide d'un **analogue rapide de l'insuline** (**HUMALOG**, **NOVORAPID**, **APIDRA**), administré en général à faibles doses : on injecte un bolus initial de 0,1 à 0,2 U/kg suivi d'une administration continue à la seringue électrique de 5 à 7 U par heure. Le retour à la normoglycémie ne doit pas être trop rapide : maintenir une glycémie aux alentours de 2,5 à 2 g/L (14 à 11 mmol/L) pendant quelques heures pour éviter les risques de survenue d'un œdème cérébral.

### Prévention des thromboses veineuses

Héparine de bas poids moléculaire.

Ex. : **LOVENOX** 0,4 mL en SC en l'absence d'insuffisance rénale.

### Traitement d'un facteur déclenchant

Antibiothérapie nécessaire chez les sujets fragiles.

Prévention de la déshydratation pour éviter les rechutes.

### Acidose lactique

L'acidose lactique est une complication rare mais grave du diabétique traité par la **metformine**.

- Lutte contre l'anoxie. Oxygénation optimale des tissus par ventilation correcte.
- Assurer une pression artérielle normale : remplissage vasculaire, drogues vasoactives en cas de syndrome de bas débit.
- Assurer une diurèse correcte : fortes doses de **furosémide** IV surtout si l'on utilise du **bicarbonate de sodium**.
- Lutte contre l'acidose.

L'administration de bicarbonates en perfusion doit être très surveillée. L'épuration extrarénale peut s'avérer être la meilleure solution. La dialyse au bicarbonate, préférable au tampon acétate, donne souvent des résultats cliniques spectaculaires.

• L'insulinothérapie doit être assurée par une SAP en ne dépassant pas 10 U/h.

## DIABÈTE DE TYPE 1 – DIABÈTE SUCRÉ INAUGURAL NON COMPLIQUÉ (1)

Le diabète de type 1 se révèle toujours par des signes cliniques et biologiques reconnaissables en consultation.

### Mesures immédiates

- Vérifier dans les urines (à la bandelette de *KÉTO-DIASTIX* ou *KÉTO-DIABUR TEST 5000*) la présence ou l'absence de cétose. Une cétose faible ou absente oriente vers un coma hyperosmolaire.
- Hospitalisation en service spécialisé (éducation du patient +++).

### Doses d'insuline

Pour un diabétique totalement insulino-prive, la dose totale d'insuline est d'environ 0,7 à 0,8 U/kg/24 h.

Cette dose peut être inférieure (0,5 U/j par exemple) lorsque le diabète est récent (réserves en insuline encore notables).

Cependant les besoins varient en fonction de l'activité physique et de l'alimentation ; c'est la raison pour laquelle ils sont différents pendant la journée (environ 2/3 des besoins) et pendant la nuit (1/3 des besoins).

Par exemple un individu de 70 kg a besoin de 50 à 60 U/j dont 36 à 40 U pendant la journée et 16 à 20 pendant la nuit.

### Répartition de l'insuline

Le schéma d'insulinothérapie idéal est celui qui reproduit l'insulinosécrétion physiologique, à savoir un apport basal qui permet de maintenir une glycémie aussi proche que possible de la normale entre les repas et un apport supplémentaire d'insuline au moment de chaque repas, afin d'assimiler les glucides apportés par l'alimentation, en évitant les pics d'hyperglycémie postprandiaux.

Il existe toujours une opposition entre la nécessité d'éviter l'hyperglycémie en multipliant le nombre des injections d'insuline et l'obligation d'éviter les épisodes d'hy-

poglycémie pour le confort et la sécurité du patient.

### Insulinothérapie optimisée

L'étude prospective DCCT a montré que l'obtention d'un équilibre glycémique aussi proche que possible de celui du sujet normal permettait de réduire à terme l'incidence des complications microvasculaires chez le diabétique.

Elle fait appel à un schéma d'insulinothérapie qui sépare l'apport basal en insuline (pour normaliser la glycémie interprandiale) et les apports supplémentaires (bolus) au moment des repas.

Ce schéma basal-bolus est à la base de l'insulinothérapie fonctionnelle qui responsabilise le patient en le rendant autonome, mais nécessite son éducation (y compris diététique) et la réalisation d'auto-contrôles pluriquotidiens de la glycémie capillaire. Le but est de faire varier les doses d'insuline en fonction des besoins en tenant compte des apports alimentaires, de l'activité physique et des événements intercurrents (maladie), de façon à atteindre l'objectif glycémique. Il s'impose chez le diabétique jeune.

#### Bases de l'insulinothérapie fonctionnelle

Elle consiste à déterminer :

- les besoins insuliniques de base par une épreuve de jeûne glucidique : 0,3 à 0,4 U/kg/24 h ;
- les besoins insuliniques prandiaux. Les besoins habituels, pour 10 g de glucides, sont :
  - petit-déjeuner : 2 U,
  - déjeuner : 1 U,
  - dîner : 1,5 U.

Le diabétique doit également savoir ajouter un correctif d'insuline (en plus de la dose nécessaire pour couvrir le repas) si sa glycémie préprandiale est élevée, sachant qu'une unité d'insuline rapide diminue la glycémie de 0,30 à 0,50 g/L (1,6 à 2,7 mmol/L) en moyenne.

Il y a plusieurs moyens de réaliser l'insulinothérapie optimisée.

## INSULINES INTERMÉDIAIRES NPH PURES

## ■ Insuline NPH biogénétique

<b>INSULATARD</b>					
Insuline d'action intermédiaire injectable par voie SC × 1 ou 2/j Début d'action : 1 h 30 Fin d'action : 24 h	1 fl. 10 mL 100 UI/mL (1 000 U)	17,27	II	65 %	17,27
<b>INSULATARD INNOLET</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	39,25	II	65 %	7,85
<b>INSULATARD FLEXPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	39,25	II	65 %	7,85
<b>INSULATARD PENFILL</b>	5 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 U)	33,87	II	65 %	6,77
<b>UMULINE NPH</b>					
Insuline d'action intermédiaire injectable par voie SC × 1 ou 2/j Début d'action : 1 h 30 Fin d'action : 16 à 18 h	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
<b>UMULINE NPH KWIPEN</b>	5 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 U)	33,87	II	65 %	6,77
	5 stylos 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,19	II	65 %	7,64

## DIABÈTE DE TYPE 1 – DIABÈTE SUCRÉ INAUGURAL NON COMPLIQUÉ (2)

### Pompe à insuline

Elle permet de délivrer en continu 24 h sur 24 de l'**insuline rapide** ou un **analogue ultrarapide**, à des débits éventuellement variables pendant le jour et la nuit et des bolus préprandiaux juste avant les repas.

### Technique à 4 ou 5 injections par jour

Un **analogue ultrarapide de l'insuline (API-DRA, HUMALOG ou NOVORAPID)** est injecté 10 min avant les repas (matin, midi et soir), qui n'ont pas besoin d'être pris à heure régulière. Un **analogue lent de l'insuline (LANTUS)** est injecté à un moment quelconque de la journée, mais toujours le même.

On peut utiliser un autre analogue lent (**LEVEMIR**), mais ce dernier ayant une durée d'action inférieure à 24 h, on est souvent amené à faire 2 injections à 12 h d'intervalle (une le matin et une le soir) ; ce schéma à 5 injections est parfois nécessaire lorsque les besoins de base en insuline sont très différents le jour et la nuit.

### Technique à 3 injections par jour

Cette technique rend un peu plus difficile l'adaptation des doses, mais elle est possible chez les diabétiques dont la vie est régulière.

On s'adresse aux mélanges d'**analogues rapides + NPH (NOVOMIX ou HUMALOG MIX)** injectés avant chacun des 3 repas (dans ce cas on choisit les mélanges à fort pourcentage d'**analogue rapide**) ou 2 fois par jour (matin et soir) en y associant un analogue rapide (**NOVORAPID ou HUMALOG**) avant le repas de midi.

La **NPH** administrée ainsi en 2 ou 3 fois assure les besoins de base et l'**analogue** apporte avant chaque repas les besoins prandiaux.

Exemples de schémas à 3 injections :

- **NOVOMIX 30** le matin et le soir, **NOVORAPID** à midi ;
- **HUMALOG MIX 50** matin, midi et soir ;
- **NOVOMIX 70** le matin, **NOVOMIX 50** à midi et le soir.

### Technique à 2 injections par jour

Cette technique est réservée à des situations particulières : malade n'acceptant que des contraintes minimales, lorsque les injections ne peuvent être faites que par une tierce personne matin et soir. Ce schéma permet rarement d'obtenir une HbA1c < 7 %. On choisit alors un mélange d'**analogue ultrarapide + NPH (NOVOMIX 30, HUMALOG MIX 25)**, en sachant qu'avec ces derniers, il est parfois difficile d'obtenir une glycémie acceptable à midi, en raison de la courte durée d'action des **analogues rapides**.

D'une manière générale, on injecte 2/3 de la dose quotidienne le matin et 1/3 le soir.

### Objectif glycémique

L'objectif glycémique doit être individualisé.

Les objectifs idéaux chez un diabétique de type 1 adulte sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

L'objectif d'HbA1c pour le diabétique de type 1 adulte est inférieur à 7 %, on tolère jusqu'à 8 % chez l'enfant de 6 à 12 ans et 8,5 % chez le jeune enfant (< 6 ans). Chez le sujet âgé, l'objectif est de prévenir l'acidocétose, le coma hyperosmolaire et les infections favorisées par une hyperglycémie chronique. Pour atteindre ce dernier objectif (et les deux précédents par voie de conséquence), il faut éviter la prolongation d'une hyperglycémie chronique au-dessus de 2 g/L soit 11 mmol/L (c'est-à-dire maintenir une HbA1c < 9 %).

## MÉLANGES ANALOGUE ULTRARAPIDE EN SOLUTION ET ANALOGUE PROTAMINE EN SUSPENSION

### ■ Insuline lispro

<b>HUMALOG MIX</b>					
<b>HUMALOG MIX25</b> Mélange d'insuline d'action <b>lispro</b> ultrarapide en solution (25 %) et de lispro protamine en suspension (75 %)	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,87	II	65 %	7,77
<b>HUMALOG MIX25 KWIKPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>HUMALOG MIX50</b> Mélange d'insuline d'action <b>lispro</b> ultrarapide en solution (50 %) et de lispro protamine en suspension (50 %)	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,87	II	65 %	7,77
<b>HUMALOG MIX50 KWIKPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

### ■ Insuline analogue asparte

<b>NOVOMIX</b>					
Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (30 %) et d'aspartate protamine en suspension (70 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>NOVOMIX 30 PenFill</b>	5 cart. 3 mL 100 U/mL	38,87	II	65 %	7,77
<b>NOVOMIX 50 FLEXPEN</b> Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (50 %) et d'aspartate protamine en suspension (50 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>NOVOMIX 70 FLEXPEN</b> Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (70 %) et d'aspartate protamine en suspension (30 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12



## DIABÈTE DE TYPE 1 – DIABÈTE SUCRÉ INAUGURAL NON COMPLIQUÉ (3)

### Les objectifs idéaux chez un diabétique de type 1 adulte

Le matin à jeun	1-1,2 g/L (5,5-6,6 mmol/L)
Avant les repas	0,8-1,2 g/L (4,4-6,6 mmol/L)
2 h après les repas	1,2-1,8 g/L (6,6-9,9 mmol/L)
À 3 h du matin	> 0,8 g/L (4,4 mmol/L)
HbA1c	≤ 7 %
Hypoglycémies modérées	0-5/sem.
Hypoglycémies sévères (nécessitant le recours à un tiers pour le resucrage)	0
Nombre d'autocontrôles	3-6/j
Nombre d'injections	35-/j ou pompe

### Diabète : en pratique

En pratique, lors du diagnostic d'un diabète de type 1, chez un sujet jeune, il faut instaurer une insulinothérapie optimisée avec une insuline basale (une **glargine** ou deux **NPH**) et des **insulines rapides** à chaque repas. Il faut rapidement éduquer le patient au minimum :

- à l'adaptation des doses (en fonction des repas, en cas d'activité physique, en cas de maladie intercurrente),
- à la diététique avec des conseils individualisés par une diététicienne,
- aux techniques d'injection d'insuline et de contrôle glycémique,
- à la surveillance de la cétonurie en cas de glycémie supérieure à 3 g/L (16,5 mmol/L) et à la conduite à tenir en cas de cétonurie (faire 5 UI d'**insuline rapide** par croix d'acétone),
- au kit de glucagon (avec éducation surtout de l'entourage proche sur les modalités d'utilisation),
- et à la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie (symptômes, resucrage).

Il faut également le prévenir que des troubles visuels (en général vision floue) peuvent apparaître et persister durant environ un mois du fait de la variation rapide de la glycémie au niveau du cristallin, et que ces troubles régresseront spontanément.

Parallèlement à l'instauration de l'insulinothérapie, il faudra ajouter du potassium et surveiller la kaliémie dans les premiers jours.

Les besoins en insuline sont très élevés à la phase aiguë, en raison de l'insulinorésistance liée à l'hyperglycémie majeure et à la cétose ; ils diminuent par la suite (période de lune de miel durant, en général, moins d'un an pendant laquelle le diabète est facile à équilibrer et nécessite de faibles doses d'insuline) puis augmentent à nouveau. Une fois que le choc de l'annonce du diagnostic est passé et que l'éducation de base du jeune diabétique est faite, on propose, en général, une insulinothérapie fonctionnelle (avec notamment réalisation d'une épreuve de jeûne glucidique) pour optimiser et faciliter l'équilibration du diabète.

## INSULINOTHÉRAPIE (1) : TYPES D'INSULINE (1)

### Fabrication des insulines

Il y a quelques années, l'insuline était fabriquée à partir de pancréas d'animaux : bœuf et surtout porc. L'avènement des techniques de génie génétique a permis d'inclure dans des cellules vivantes les séquences d'ADN humain qui codent pour la synthèse de l'insuline, qualifiée d'insuline biogénétique humaine. On a également appris à modifier la molécule d'insuline humaine pour qu'elle acquière des caractéristiques particulières. Il s'agit des analogues de l'insuline humaine, produits également par génie génétique.

### Analogues ultrarapides de l'insuline

Les insulines analogues sont des molécules dont la structure chimique est proche de celle de l'insuline humaine, mais elles s'en différencient par la suppression, le remplacement ou l'addition de certains acides aminés. Ces changements ont pour effet principal de modifier leur cinétique de résorption et d'action.

Il existe trois analogues ultrarapides :

- l'insuline **lispro** ou **HUMALOG** (Lilly) ;
- l'insuline **aspart** ou **NOVORAPID** (Novo-Nordisk) ;
- l'insuline **glulisine** ou **APIDRA** (Sanofi-Aventis).

### Insulines ultrarapides lispro (HUMALOG), aspart (NOVORAPID) et glulisine (APIDRA)

	DÉBUT	PIC	FIN
Voie SC	10 à 20 min	60 min	3 à 4 h

Les analogues ultrarapides ont supplanté l'insuline ordinaire rapide qui est de moins en moins utilisée. Ils sont administrés juste avant les repas alors que l'insuline humaine rapide devait l'être 30 min avant. Ils permettent de mieux réduire les élévations glycémiques postprandiales et d'éviter les épisodes d'hypoglycémie à distance des repas.

Les **analogues ultrarapides** sont parfaitement stables dans les pompes externes, mais pas dans les pompes implantables.

### Insuline humaine ordinaire rapide

Il s'agit de l'insuline naturelle utilisable par toutes les voies d'administration (IV, IM, SC et intrapéritonéale). Elle est commercialisée sous les noms d'**ACTRAPID** ou d'**UMU-LINE RAPIDE**. Son profil d'action dépend de la voie d'administration (cf. Tableau).

Injectée par voie sous-cutanée, son effet débute 30 min après l'injection, culmine entre 2 et 4 h et se termine à 6 h.

**INSULINOTHÉRAPIE (2) : TYPES D'INSULINE (2)****Insuline rapide : profils d'action**

	DÉBUT	PIC	FIN
Voie IV	Immédiat	10 min	20 min
Voie IM	10 min	30 min	2 h
Voie SC	30 min	2 à 4 h	6 h

Elle se présente sous forme d'une solution limpide qui peut être utilisée en toutes circonstances dans tous les systèmes d'injection : seringues, stylos, pompes. Elle est cependant moins stable que les **analogues ultrarapides** dans les pompes externes.

- En urgence, elle est administrée par voie intraveineuse ; elle doit alors être utilisée seule, à l'aide d'une seringue à perfusion ou d'une pompe.
- Elle n'est quasiment plus utilisée dans les autres indications.

*L'insuline ordinaire doit toujours être injectée 30 min avant les repas, jamais immédiatement avant.*

**Insuline humaine ordinaire NPH**

L'insuline NPH (*Neutral Protamine Hagedorn*, ce dernier nom étant celui de son inventeur) est l'insuline humaine biogénétique additionnée de sulfate de protamine, destiné à retarder et augmenter la durée d'action de l'insuline. La durée d'action de l'insuline NPH se prolonge pendant 8 à 16 h, avec un pic d'action entre 4 et 6 h. Il faut remuer le stylo ou le flacon avant injection pour homogénéiser la suspension.

**INSULINOTHÉRAPIE (3) : TYPES D'INSULINE (3)****Analogues lents de l'insuline**

Il existe deux analogues lents :

- l'insuline **glargine** ou **LANTUS** (Sanofi-Aventis) ;
- l'insuline **détémir** ou **LEVEMIR** (Novo-Nordisk).

Profil d'action :

- la **LANTUS**. Son action débute en 2 à 4 h et se prolonge de façon régulière et constante, sans pic, entre 22 et 24 h ;
- la **LEVEMIR**. Elle commence à agir 2 à 4 h après l'injection ; son action se poursuit avec un faible pic vers 6-7 h, jusqu'à 14 h après l'administration, parfois au-delà jusqu'à 20 h pour des doses supérieures à 0,4 U/kg.

Les **analogues de l'insuline d'action lente** doivent être exclusivement administrés par voie sous-cutanée et ne doivent pas être mélangés à d'autres insulines.

La cinétique de la **LANTUS** autorise le plus souvent une seule injection quotidienne, qui doit être faite à la même heure chaque jour.

La **LEVEMIR** peut également être administrée en une injection quotidienne, mais la plupart des essais cliniques ont été réalisés avec 2 injections par jour à intervalle de 12h. La variabilité de l'absorption chez un même individu est plus faible avec la **détémir (LEVEMIR)** qu'avec l'**insuline NPH** ou la **glargine**.

La durée d'action de l'ensemble des insulines retard (NPH, **glargine**, **détémir**) augmente avec la dose d'insuline injectée. Il faut 3 j pour atteindre un état d'équilibre et donc décider de la nécessité de modifier la dose d'insuline.

**Mélanges d'insulines**

Le mélange de l'**insuline NPH** à l'**insuline humaine rapide** ou à un **analogue de l'insuline d'action ultrarapide** a pour but de disposer à l'aide d'une seule injection d'un profil d'action à début rapide ou ultrarapide et de durée prolongée.

Ces mélanges sont constitués d'une part de l'insuline rapide ou de l'insuline rapide de l'analogue ultrarapide en solution et d'autre part de la même insuline ou du même analogue en suspension avec le sulfate de protamine (cf. Insuline NPH).

**Profil d'action**

Les mélanges d'insulines sont définis par la proportion d'**insuline rapide** ou d'**analogue ultrarapide** ajoutée à la **NPH**, qui peut être de 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 70 %.

– La plupart des diabétiques bénéficient d'un mélange contenant 25 ou 30 % d'**insuline rapide** ou d'**analogue ultrarapide**.

– Les diabétiques qui ont des repas riches en glucides ou des glycémies élevées à distance des repas peuvent bénéficier des mélanges à 40 ou 50 % d'**insuline rapide**.

– Les diabétiques ayant tendance à faire des malaises hypoglycémiques entre les repas auront intérêt à utiliser les mélanges à 10 ou 20 % d'**insuline rapide**, ou mieux, les mélanges **insuline NPH + analogue d'action ultrarapide**.

Seules les **insulines NPH** peuvent être mélangées à l'**insuline rapide** dans les cartouches. La **LEVEMIR** peut remplacer la **NPH** (voir page précédente).

**INSULINOTHÉRAPIE (4) : INJECTIONS D'INSULINE (1)****Matériels d'injection****Stylos injecteurs**

L'utilisation de la seringue à insuline a fait place à celle des stylos à insuline. En augmentant le confort de l'injection, les stylos, peu encombrants, ont permis de multiplier le nombre des injections quotidiennes et d'obtenir ainsi un meilleur contrôle glycémique.

Le coton et l'alcool ne sont pas indispensables à la technique d'injection car le matériel n'entraîne jamais d'infection locale : une peau propre suffit.

Les stylos sont en fait des seringues sophistiquées qui possèdent :

- un réservoir d'insuline, sous forme de cartouche jetable (contenant en général 300 U d'insuline) ;
- un système permettant de programmer la dose à injecter ;
- une aiguille jetable.

Il existe deux types de stylos injecteurs :

- les stylos réutilisables qui sont rechargés à l'aide de cartouches ;
- les stylos préremplis jetables.

Les modèles diffèrent par le volume maximal programmable et le pas de réglage qui permet de délivrer une ou deux unité(s).

**Aiguilles**

L'injection d'insuline doit être faite en sous-cutané avec une aiguille adaptée :

- une aiguille courte (8 ou 5 mm chez les

patients à peau fine) est de plus en plus utilisée car elle permet une injection facile et indolore ; elle est utilisée en piquant la peau perpendiculairement au sommet d'un large pli cutané ;

- une aiguille longue (12 mm) est conseillée chez les sujets obèses ou lorsque l'injection est effectuée dans la fesse.

**Technique d'injection**

- Il est indispensable de varier les lieux d'injection (cuisses, ventre, fesses, bras).

- Les **analogues rapides de l'insuline** doivent être injectés **immédiatement avant les repas** (et non pas 15 à 20 min comme l'insuline ordinaire).

- L'**insuline NPH** et les **analogues lents** doivent être préférentiellement injectés dans les cuisses ou les fesses pour éviter le développement de lipodystrophies.

**Transport et conservation de l'insuline**

L'insuline est un produit stable entre 7 et 27 °C. Elle peut donc parfaitement être utilisée à la température ambiante. L'insuline à injecter ne doit pas être sortie du réfrigérateur immédiatement avant l'injection (douleur garantie). Le stock d'insuline ne doit pas être mis au congélateur mais au réfrigérateur à + 4 °C. Le flacon ou le stylo à insuline en cours d'utilisation peut être conservé environ 4 sem. à température ambiante sans être placé au réfrigérateur, à condition de le maintenir à l'abri du soleil et d'une source de chaleur.

## INSULINOTHÉRAPIE (5) : INJECTIONS D'INSULINE (2)

### Pompes externes

Les pompes sont des appareils permettant d'infuser de façon continue de l'insuline par voie sous-cutanée.

Toutes les pompes actuellement ont un moteur qui pousse en permanence un piston vidant progressivement le réservoir d'insuline (seringue ou cartouche).

Certaines pompes ont un seul débit de base et on actionne un bouton ou une molette pour accélérer le moteur au moment des bolus. D'autres sont complexes permettant de programmer à l'avance plusieurs doses de base.

Les **pompes externes** ont des caractéristiques de présentation et de maniement

différentes mais leurs fonctions sont identiques.

Les pompes sont maintenant prises en charge par la Sécurité Sociale et leur maintenance assurée par des prestataires de service libéraux compétents.

Les pompes à insuline sont indiquées en cas de diabète instable, chez la femme enceinte, pour assurer un équilibre glycémique rigoureux, ou encore lorsqu'il s'agit d'équilibrer rapidement le diabète.

Tout patient ayant une pompe externe doit avoir à disposition des analogues rapides et lents de l'insuline en stylo pour prendre le relais en cas de dysfonctionnement de la pompe.

**Tableau d'utilisation des principaux stylos rechargeables injecteurs d'insuline**

Marque (fabricant)	Dose maximale injectable (U)	Programmation (U)	Cartouches d'insuline compatibles
Novopen 3 Demi	35	0,5 en 0,5	PENFILL ACTRAPID INSULATARD NPH NOVORAPID NOVOMIX 30, 50 et 70 LEVEMIR
Novopen 4	60	1 en 1	
Novopen Junior (NovoNordisk)	35	0,5 en 0,5	
Humapen Luxura	60	1 en 1	UMULINE NPH UMULINE PROFIL 30 HUMALOG HUMALOG MIX25 HUMALOG MIX50
Luxura HD (Lilly)	30	0,5 en 0,5	
Opticlik (Sanofi Aventis)	80	1 en 1	LANTUS APIDRA
Optipen Pro 1 (Sanofi Aventis)	60	1 en 1	
Optipen Pro 2 (Sanofi Aventis)	60	2 en 2	

## DIABÈTE DE TYPE 2 (1)

Le diagnostic du diabète de type 2 (DT2) repose sur 2 glycémies à jeun  $> 1,26$  g/L.

Devant tout diagnostic de diabète, rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires associés :

- Âge  $> 50$  ans pour un homme et 60 ans chez une femme.
- Antécédents familiaux cardiovasculaires précoces.
- Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans.
- HTA traitée ou non.
- Obésité.

Devant tout diagnostic de diabète, rechercher une atteinte des organes cibles : complications oculaires, rénales, neurologiques, cardiovasculaires et podologiques.

### Objectifs glycémiques

- Pour la majorité des patients (y compris les patients avec une complication macrovasculaire non évoluée), une HbA1c  $< 7$  % est recommandée. L'HbA1c doit être contrôlée tous les 3 mois. La stratégie médicamenteuse repose sur l'écart observé par rapport à l'objectif d'HbA1c.
- L'autosurveillance glycémique n'est recommandée que si les résultats sont susceptibles de modifier les mesures hygiéno-diététiques et/ou le traitement médicamenteux.
- Pour les personnes âgées fragiles (limitations motrices et/ou cognitives) et pour les patients ayant une complication macrovasculaire évoluée, l'objectif est une HbA1c  $\leq 8$  %.
- Pour les personnes malades, la priorité est d'éviter les complications aiguës du diabète et les hypoglycémies : l'objectif est l'obtention de glycémies préprandiales entre 1 et 2 g/L et/ou d'une HbA1c  $< 9$  %.

### Mesures hygiéno-diététiques

#### Diététique

Le régime doit être hypocalorique en cas de surpoids seulement.

L'apport énergétique doit être adapté aux besoins individuels. L'apport glucidique représente 50-55 % des calories.

- Il faut privilégier les glucides à index glycémique bas (pain au son, féculents, riz et pomme de terre naturels, fruits et légumes frais) et limiter les sucres rapides.
- Les graisses constituent 30 % des calories. Les graisses animales doivent être réduites (graisses de table et produits laitiers, viandes riches en lipides) au profit de graisses végétales et polyinsaturées.
- L'alimentation doit être divisée en 3 repas au moins.
- Le vin est autorisé en quantité modérée (moins de 30 g par jour chez l'homme et moins de 20 g par j chez la femme), à condition de tenir compte de son apport énergétique.
- Les édulcorants : parmi les édulcorants non nutritifs, on a le choix entre :

- les cyclamates : *SUCRUM, SUCARYL*,
- l'aspartam : *NUTRASWEET, POUSS-SUC*,
- les saccharinates : *SUCREDULCOR, ODA*,
- les dérivés du stevia (rébaudioside A) : *PURVIA*
- les dérivés du sucre (sucralose) : *CANDE-REL, SPLENDA*
- les polyols (xylitol, maltitol) : ce ne sont pas des édulcorants mais des sucres au pouvoir sucrant plus faible que le saccharose du fait d'une absorption moindre.

#### Exercice physique

Il doit être quotidien, progressif, évalué en intensité et en durée. La marche rapide (+++) est l'exercice le plus facile, suivie par le vélo et la natation.

Le régime et l'exercice physique suffisent souvent pour normaliser les glycémies. Lorsque le patient ne maigrit pas ou de façon insuffisante ou que les glycémies et l'HbA1c restent trop élevées, il faut ajouter un médicament.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (1) – BIGUANIDES

## ■ Metformine

GLUCOPHAGE					
<b>GLUCOPHAGE 500</b> (390 mg <b>metformine</b> ) 2 à 3 cp./j matin et soir aux repas	30 cp. 500 mg	2,93	I	65 %	0,10
	50 cp. 500 mg	HOP	I		
	90 cp. 500 mg	6,80	I	65 %	0,08
<b>GLUCOPHAGE 850</b> (663 mg <b>metformine</b> ) 1 à 2 cp./j à administrer aux repas pour diminuer les effets secondaires	30 sach. 500 mg	2,57	I	65 %	0,09
	30 cp. 850 mg	4,61	I	65 %	0,15
	90 cp. 850 mg	11,82	I	65 %	0,13
<b>GLUCOPHAGE 1 000</b> (780 mg <b>metformine</b> ) 2 à 3 cp. ou sach./j. La dose de 3 cp. ou sach./j est maximale	30 sach. 850 mg	3,89	I	65 %	0,13
	30 cp. 1 000 mg	5,10	I	65 %	0,17
	90 cp. 1 000 mg	13,28	I	65 %	0,15
	30 sach. 1 000 g	4,09	I	65 %	0,14
STAGID					
280 mg <b>metformine</b> 1 à 3 cp./j aux repas	30 cp. 700 mg	3,60	I	65 %	0,12
	100 cp. 700 mg	9,05	I	65 %	0,09

## PROPRIÉTÉS

La **metformine** abaisse la glycémie du diabétique, sans provoquer d'hypoglycémie, car elle n'agit pas sur la sécrétion d'insuline, mais elle en potentialise l'action.

Elle diminue la néoglucogenèse et la glycolyse et par voie de conséquence la production de glucose par le foie.

## INDICATIONS

Diabète de type 2 non compliqué (surtout en cas de surpoids).

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse, allaitement.

Diabète de type 1, si donnée seule.  
Insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contrôler la créatininémie régulièrement, surtout chez le sujet âgé.

Prendre les comprimés au cours ou à la fin des repas pour minimiser les effets secondaires digestifs.

Arrêter le traitement la veille de l'administration de produits de contraste iodés et reprendre le traitement 48 h après l'examen, après avoir vérifié la créatinine sanguine.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Acidose lactique à laquelle il faut penser si le malade se plaint d'une fatigue avec crampes musculaires. Il faut alors interrompre immédiatement le traitement et demander d'urgence un ionogramme sanguin avec dosage des lactates. L'acidose lactique survient chez des sujets âgés avec fonctionnement rénal déficient.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. La prise de **metformine** est la 1<sup>re</sup> cause de diarrhée chez le diabétique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool : risque majoré d'acidose lactique.



## DIABÈTE DE TYPE 2 (2)

### Médicaments [1]

#### Metformine

C'est le traitement de première intention. La **metformine** est un **biguanide** à action antihyperglycémiant, due à l'augmentation de la sensibilité à l'insuline du tissu hépatique. Quatre dosages sont actuellement disponibles en France (**GLUCOPHAGE** 500, 850, 1 000 mg, **STAGID** 700 mg). Elle s'administre en 2 ou 3 prises quotidiennes pendant ou après les repas. La dose maximale quotidienne est comprise entre 2 550 et 3 000 mg en 3 prises.

La **metformine** ne crée jamais d'hypoglycémie, ni de prise de poids. Ses effets secondaires sont la possibilité de troubles digestifs (nausées, crampes abdominales, diarrhée) surtout si elle est administrée avant les repas, et le risque d'acidose lactique en cas d'insuffisance rénale ou hépatique et dans les situations d'hypoxie tissulaire (insuffisance cardiaque, respiratoire, infarctus du myocarde récent, etc.).

#### Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase

Ils diminuent la digestion des sucres et sont intéressants pour réduire les glycémies postprandiales (cf. fiche pharmacologique). Ils doivent être administrés au début de chaque repas. On a le choix entre deux spécialités : l'**acarbose** (**GLUCOR** 50 ou 100 mg) ou le **miglitol** (**DIASTABOL**). Leur effet est modeste mais ils ont peu d'effets secondaires, à l'exception des flatulences, souvent gênantes, qui s'expliquent par la fermentation des sucres non digérés par les bactéries du côlon.

#### Sulfamides hypoglycémiants (SH)

Ils stimulent la sécrétion de l'insuline en se fixant sur un récepteur spécifique de la cellule bêta du pancréas. Seuls sont désormais utilisés les sulfamides de seconde génération dont la durée d'action ne dépasse pas 24 h.

Les molécules se distinguent par leur durée d'action : courte (**GLIBÉNÈSE**), moyenne (**DAONIL**) ou longue (**AMAREL**, **DIAMICRON**). Les **sulfamides** ont une élimination rénale et sont contre-indiqués dans l'insuffisance rénale. Ils peuvent entraîner une prise de poids de quelques kilos et parfois des hypoglycémies, notamment chez le sujet âgé.

Comprimé pour comprimé, les **sulfamides** suivants : **DIAMICRON**, **DAONIL**, **GLIBÉNÈSE** ont une puissance d'action équivalente. La dose maximale est de 3 cp./j qu'il ne faut pas dépasser.

Les sulfamides de longue durée d'action (**AMAREL**, **OZIDIA**) comportent un risque accru d'hypoglycémie, surtout chez le sujet de plus de 65 ans.

Les **sulfamides** à action courte ou moyenne sont prescrits en 3 prises quotidiennes, avant chaque repas. Les **sulfamides** à action longue se prennent une fois par jour, le matin avant le petit-déjeuner.

La prescription doit se faire de façon progressive : par exemple **HÉMI-DAONIL** 2,5 mg : 1 cp. matin, midi et soir puis **DAONIL**.

On peut également, si l'on préfère un **sulfamide** de longue durée, utiliser l'**AMAREL**, dont les présentations à 1, 2, 3 et 4 mg permettent aussi cette escalade progressive des posologies.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (2) – SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS (1)

### ■ Glibenclamide

<b>DAONIL</b>					
2 à 3 cp./j à prescrire aux repas	20 cp. 5 mg	2,64	I	65 %	0,13
La posologie maximale de 3 cp./j doit être atteinte progressivement et non dépassée	100 cp. 5 mg	8,80	I	65 %	0,09
	180 cp. 5 mg	14,65	I	65 %	0,08
<b>HÉMI-DAONIL</b>					
Posologie moyenne : 2 à 3 cp./j	60 cp. 2,5 mg	3,37	I	65 %	0,06
	100 cp. 2,5 mg	HOP	I		
	180 cp. 2,5 mg	8,96	I	65 %	0,05

### ■ Glipizide

<b>GLIBÉNÈSE</b>					
Sulfamide de durée d'action assez courte	20 cp. 5 mg	3,04	I	65 %	0,15
La posologie max. est de 4 cp./j à répartir à chaque repas	100 cp. 5 mg	9,76	I	65 %	0,10
<b>MINIDIAB</b>					
Idem <b>GLIBÉNÈSE</b>	20 cp. 5 mg	3,04	I	65 %	0,15
	100 cp. 5 mg	9,76	I	65 %	0,10
<b>OZIDIA</b>					
Forme à libération prolongée	30 cp. 5 mg	6,70	I	65 %	0,22
Prise unique le matin	30 cp. 10 mg	12,25	I	65 %	0,41
Poso. max. 20 mg					

### ■ Glizalazide

<b>DIAMICRON</b>					
Cp. à libération modifiée	30 cp. séc. 60 mg	10,61	I	65 %	0,35
1/2 à 2 cp./j en une prise au petit-déjeuner	90 cp. séc. 60 mg	30,47	I	65 %	0,34
	100 cp. séc. 60 mg	HOP	I		

### ■ Glimépiride

<b>AMAREL</b>					
Sulfamide ayant une action puissante tout en maintenant des taux d'insulinémie modérée mais prolongée	30 cp. 1 mg	4,79	I	65 %	0,16
Dose à adapter en fonction du patient : en moyenne 2 à 4 mg/j en une seule prise le matin	90 cp. 1 mg	13,16	I	65 %	0,15
	120 cp. 1 mg	HOP	I		
	30 cp. 2 mg	7,36	I	65 %	0,25
	90 cp. 2 mg	20,70	I	65 %	0,23
	120 cp. 2 mg	HOP	I		
	30 cp. 3 mg	9,46	I	65 %	0,32
	90 cp. 3 mg	26,62	I	65 %	0,30
	120 cp. 3 mg	HOP	I		
	30 cp. 4 mg	10,86	I	65 %	0,36
	90 cp. 4 mg	30,56	I	65 %	0,34
	120 cp. 4 mg	HOP	I		

## DIABÈTE DE TYPE 2 (3)

### Glinides

Bien que se fixant sur un récepteur différent de la cellule bêta du pancréas, ils ont le même mode d'action que les **sulfamides**, mais agissent plus vite et plus brièvement et n'ont pas d'élimination rénale. Ils s'administrent avant chaque repas et ne sont pas contre-indiqués chez l'insuffisant rénal.

Un seul **glinide** est disponible en France (**NOVONORM**, cp. à 0,5, 1 ou 2 mg).

### Incrétines ou mieux incrétinomimétiques

Il s'agit de la classe médicamenteuse la plus récente. L'effet incrétine désigne l'amplification de la sécrétion d'insuline liée à l'action d'hormones, notamment le GLP-1, sécrété par le tube digestif lors du repas. Il stimule la sécrétion d'insuline, inhibe celle de glucagon, ralentit la vidange gastrique et réduit la prise alimentaire. La sécrétion de GLP-1 est abaissée chez le diabétique de type 2. Le GLP-1 est inhibé par l'enzyme DPP-4.

Les **inhibiteurs de la DPP-4** sont disponibles par voie orale (**sitagliptine** : **JANUVIA**, **vidagliptine** : **GALVUS**, **saxagliptine** : **ONGLYSA**) et utilisés en seconde intention. Ils trouvent leur place tout particuliè-

rement chez le diabétique de type 2 en surpoids ou obèse. Les **analogues du GLP-1** sont utilisés par voie sous-cutanée, le plus souvent pour éviter d'introduire l'insuline : **exénatide (BYETTA)**, **liraglutide (VICTOZA)**. Ces molécules ont pour principal effet secondaire la survenue d'une sensation de satiété et de nausées qui justifient l'augmentation progressive de la dose. Les nausées peuvent disparaître après plusieurs semaines de traitement.

On prescrit par exemple : **JANUVIA** 1 cp./j ou **BYETTA** 5 mg en SC x 2/j.

### Paramètres de surveillance du traitement du diabète de type 2

- 1 - Le taux d'HbA1c, 4 fois/an et le niveau moyen des glycémies obtenues par autocontrôle du patient (s'il est pratiqué).
- 2 - Le fond d'œil ou la rétinographie une fois par an.
- 3 - L'ECG annuel.
- 4 - L'examen au monofilament, la recherche des ROT achilléens et l'examen des pieds annuel.
- 5 - La microalbuminurie et la créatinine annuelles.
- 6 - Le bilan lipidique annuel.
- 7 - L'examen dentaire annuel.

L'efficacité du traitement doit être évaluée sur l'autocontrôle glycémique par le patient et le taux d'HbA1c.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (3) – SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Tous les **sulfamides hypoglycémiant** (**SH**) stimulent la sécrétion d'insuline en se fixant sur des récepteurs spécifiques au niveau de la cellule  $\beta$ -langerhansienne. Une dose maximale de **SH** peut, sur un pancréas encore répondeur, faire sécréter jusqu'à 30 U d'insuline par 24 h. Peuvent être associés à la **metformine** et aux **glitazones**.

On distingue les sulfamides :

- à durée d'action courte (**glipizide**) à prescrire à chaque repas ;
- à durée d'action moyenne (**glibenclamide**, **gliclazide**) à prescrire à chaque repas ;
- à durée d'action longue (**glimépiride**, **OZIDIA**), à pendre en 1 prise le matin.

### INDICATIONS

Diabète de type 2 non compliqué après échec des mesures hygiénodétététiques.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Diabète de type 1 ; insuffisance rénale, hépatique sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement doit être instauré de façon progressive.

Autocontrôle par les diabétiques souhaitable (surtout entre les repas et à jeun) car les hypo-

glycémies peuvent être sévères (surtout avec les produits d'action prolongée).

Il est inutile d'associer 2 **sulfamides** ou 1 **sulfamide** et un **glinide**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Le principal danger des **sulfamides** est l'hypoglycémie par surdosage, entraînant une hyperinsulinémie absolue ou relative :

- surdosage ou absence de catabolisme lors d'une insuffisance rénale ;
- apport insuffisant en hydrates de carbone ;
- potentialisation médicamenteuse.

Chez les malades âgés, ces hypoglycémies peuvent être durables. Il faut alors installer une perfusion de sérum glucosé à 10 % et ne pas se contenter de «resucrer» le malade avec un ou deux verres de jus de fruits.

Les autres inconvénients des **sulfamides hypoglycémiant** sont très rares avec les produits actuels : accidents allergiques cutanés, leucogranulopénies, thrombopénies.

L'atteinte hépatique est en revanche possible et constitue une contre-indication à la prescription.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisent l'action : **coumariniques**, **anti-inflammatoires non stéroïdiens**,  **$\beta$ -bloquants**, **miconazole**, **éconazole**. Alcool.

Diminuent l'action : **corticoïdes**, **progestatifs** **macrodosés**, **salbutamol**.

## DIABÈTE DE TYPE 2 (4)

### Indications

#### En première intention

On débute par une monothérapie par **metformine**.

En cas d'intolérance ou de contre-indication, on utilise un **sulfamide**. Les alternatives sont les **glinides** ou les **inhibiteurs des alphagluco-sidases**. Les **inhibiteurs de la DPP-4** ne devraient pas être utilisés en première intention et en monothérapie (recul insuffisant, absence de prise en charge dans ce cas).

#### Si l'objectif glycémique n'est pas atteint sous metformine (en seconde intention)

On associe **metformine + sulfamide**.

► En cas d'intolérance ou de contre-indication aux **sulfamides**, si l'écart à l'objectif d'HbA1c est  $< 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **metformine + répaglinide** (si irrégularité de la prise alimentaire) ;
- **metformine + inhibiteurs des alphagluco-sidases** (si hypoglycémies) ;
- **metformine + inhibiteurs de la DPP-4** (si hypoglycémies ou prise de poids).

► En cas d'intolérance ou de contre-indication aux **sulfamides**, si l'écart à l'objectif d'HbA1c est  $> 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **metformine + insuline** ;

- **metformine + analogue du GLP-1** (si IMC  $> 30\text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

#### Si l'objectif glycémique n'est pas atteint sous sulfamide (en seconde intention)

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $< 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **sulfamide + inhibiteur des alphagluco-sidases** ;
- **sulfamide + inhibiteur de la DPP-4**.

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $> 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **sulfamide + insuline** ;
- **sulfamide + analogues du GLP-1** (si IMC  $> 30\text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

#### En cas d'objectif glycémique non atteint sous bithérapie biguanide + sulfamide (en 3<sup>e</sup> intention)

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $< 1\%$

On propose les associations :

- **metformine + sulfamide + inhibiteur des alphagluco-sidases** ;
- **metformine + sulfamide + inhibiteur de la DPP-4**.

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $> 1\%$

On propose les associations :

- **metformine + sulfamide + insuline** ;
- **metformine + sulfamide + analogue du GLP-1** (si IMC  $> 30\text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

**HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (4) – INHIBITEURS DES  $\alpha$ -GLUCOSIDASES**■ **Acarbose**

<b>GLUCOR</b>					
2 à 3 cp./j aux repas	90 cp. 50 mg	12,36	I	65 %	0,14
Commencer par 3 cp. à 50 mg	270 cp. 50 mg	34,79	I	65 %	0,13
Si nécessaire passer progressivement	90 cp. séc. 100 mg	16,63	I	65 %	0,18
à 3 x 100 mg	270 cp. séc. 100 mg	46,84	I	65 %	0,17

■ **Miglitol**

<b>DIASTABOL</b>					
1 cp. à 50 mg x 3/j	90 cp. 50 mg	15,52	I	65 %	0,17
Jusqu'à 3 x 100 mg si nécessaire	90 cp. 100 mg	20,92	I	65 %	0,23

**PROPRIÉTÉS**

Les **inhibiteurs des  $\alpha$ -glucosidases** agissent dans la lumière intestinale en inhibant de façon compétitive et sélective les enzymes qui dégradent les disaccharides en sucres simples. Administrés avant les repas, ils réduisent l'hyperglycémie postprandiale.

**INDICATIONS**

Diabète de type 2.

**CONTRE-INDICATIONS**

Pathologie digestive.  
Insuffisance rénale sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Flatulences, douleurs digestives, selles molles, voire diarrhées, surtout en début de traitement. De rares cas d'élévation de transaminases ont été relevés pour des doses dépassant 600 mg/j.

**DIABÈTE DE TYPE 2 (5)****Diabètes insulinonécessitants  
(ou insulinorequérants)**

L'insulinothérapie est entreprise dans trois circonstances principales :

- lorsque l'objectif glycémique n'est pas atteint depuis plusieurs mois. C'est le cas lorsque l'HbA1c est  $> 7\%$  à 2 contrôles successifs espacés de 3 mois ;
- lorsqu'apparaissent des signes de décompensation. Ces signes traduisent une insulinopénie, par épuisement sécrétoire des cellules  $\beta$  du pancréas (cf. Encadré ci-dessous) ;
- en cas d'insuffisance rénale contre-indiquant les antidiabétiques oraux.

Le passage à l'insuline est suggéré sur :

- amaigrissement avec fonte musculaire ;
- asthénie ;
- cétonurie (+++) ;
- polyuropolydipsie ;
- glycémie  $> 3$  g ;
- survenue d'une insuffisance rénale modérée à sévère ;
- ischémie tissulaire sévère (infarctus du myocarde, insuffisance hépatique, etc.).

Classiquement, il s'agit d'un diabète de type 2 traité depuis plusieurs mois ou années par des **sulfamides hypoglycémisants** (*DIAMICRON*, *DAONIL*, etc.) et/ou la **metformine** (*GLUCOPHAGE*, *STAGID*, etc.) et/ou des **incrétino-mimétiques**.

- L'insuline est souvent associée à une bithérapie (le plus souvent association **sulfamides** et **metformine**). Elle est administrée en une injection unique le soir au coucher d'une **insuline NPH** ou d'un **analogue lent de l'insuline** (*LANTUS*, *LEVEMIR*).
- En cas d'échec, il faut envisager une insulinothérapie en plusieurs injections quotidiennes, en ayant recours à l'expertise d'un diabétologue.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (5) – RÉPAGLINIDE

## ■ Répaglinide

NOVONORM					
1 cp. à administrer avant chacun des 3 repas	90 cp. 0,5 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 0,5 mg	37,47	I	65 %	0,14
	90 cp. 1 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 1 mg	37,47	I	65 %	0,14
	90 cp. 2 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 2 mg	37,47	I	65 %	0,14

## PROPRIÉTÉS

Hypoglycémiant oral. Le **répaglinide** ferme les canaux potassiques ATP-dépendants de la membrane des cellules bêta en se fixant sur une protéine cible différente de celle des **sulfamides**.

Chez des patients diabétiques de type II, la réponse insulinosécrétrice au repas survient 30 min après la prise d'une dose orale de **répaglinide**. La concentration plasmatique diminue ensuite rapidement et le **répaglinide** est éliminé en 4 à 6 h. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 1 h environ.

L'action insulinosécrétrice est donc plus rapide et moins durable que celle des **sulfamides**.

## INDICATIONS

Idem **sulfamides hypoglycémiants**.

Il faut ajouter que le **répaglinide** est surtout indiqué en cas de pics hyperglycémiques post-prandiaux avec des glycémies assez basses avant les repas. Il est aussi indiqué en cas de repas très irréguliers puisqu'il peut être pris au moment des repas et que son action est rapide.

Peut être associé à la **metformine** mais pas aux **sulfamides**.

Le **répaglinide** est éliminé par la bile et non par les reins (il n'est donc pas contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Diabète de type 2.

Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre le produit au moment du repas. Ne pas le prendre en cas de saut d'un repas.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Idem : **sulfamides hypoglycémiants**.

Les hypoglycémies sont en rapport avec une dose trop forte, un repas non pris, un exercice physique violent.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à la **rifampicine**, au **kétoconazole**, à l'**itraconazole** et au **fluconazole** est contre-indiquée.



## DIABÈTE DE TYPE 2 (6)

### Synthèse des traitements du diabète de type 2

TRAITEMENT	MÉCANISME D'ACTION	RÉDUCTION DE L'HbA1c (%)	COÛT MENSUEL (€)	EFFETS SECONDAIRES PRINCIPAUX	EFFET SUR LE POIDS
Insuline	Insuline exogène	1,5-2,5	60-70	Hypoglycémie	↑
<b>Biguanides</b>	Diminution de la production hématique de glucose	1,5	11-13	Troubles digestifs	≈
<b>Sufamides</b>	Augmentation de la sécrétion d'insuline	1,5	4-30	Hypoglycémie	↑
<b>Glinides</b>	Augmentation de la sécrétion d'insuline	1-1,5	18	Hypoglycémie	↑
<b>GLP-1</b>	Potentialisation de la sécrétion d'insuline, diminution de la sécrétion de glucagon, ralentissement de la vidange gastrique	0,5-1,5	110	Nausées, vomissements	↓
<b>IDPP-4</b>	Inhibition du métabolisme du GLP-1	0,5-0,8	16-22	Troubles digestifs	≈
<b>Inhibiteurs des α-glucosidases</b>	Réduction de la digestion des sucres complexes	0,5-0,8	16-22	Troubles digestifs	≈

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (6) – INCRÉTINO-MIMÉTIQUES – ANALOGUE DU GLP-1 ET INHIBITEUR DE LA DPP-4 (1)

### ■ Exénatide

<b>BYETTA</b>					
2 inj. SC/j 5 µg x 2/j en SC pendant 1 mois, avant éventuellement d'augmenter la dose à 10 µg x 2 /j	60 doses 1,2 mL (5 µg) pour cart. en stylo inj. prérempli	109,74	I	65 %	1,83
	60 doses 2,4 mL (10 µg) pour cart. en stylo inj. prérempli	315,88	I	65 %	5,26

### ■ Liraglutide

<b>VICTOZA</b>					
1 inj. SC/j L'initiation du traitement se fait à la dose de 0,6 mg/j pour obtenir une meilleure tolérance gastro-intestinale. On augmente ensuite à 1,2 mg/j puis si besoin à 1,8 mg/j max avec 1 sem. d'intervalle minimum	2 stylos inj. préremplis 3 mL	109,74	I	65 %	54,87

### ■ Sitagliptine

<b>JANUVIA</b>					
1 cp./j	28 cp. 100 mg	44,00	I	65 %	1,57
	50 cp. 100 mg	HOP	I		
<b>XELEVIA</b>					
1 cp./j	28 cp. 100 mg	44,00	I	65 %	1,57

### ■ Vildagliptine


<b>GALVUS</b>					
1 à 2 cp./j en 1 ou 2 prises	30 cp. 50 mg	24,74	I	65 %	0,82
	60 cp. 50 mg	46,83	I	65 %	0,78
	90 cp. 50 mg	HOP	I		

### ■ Saxagliptine

<b>ONGLYZA</b>					
1 cp./j	30 cp. 5 mg 90 cp. 5 mg	44,69 HOP	I I	65 %	1,49

## DIABÈTE DE TYPE 2 (7)

## Stratégie médicamenteuse pour les diabétiques de type 2 : cas général [1]



## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (7) – INCRÉTINO-MIMÉTIQUES - ANALOGUE DU GLP-1 ET INHIBITEUR DE LA DPP-4 (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

L'**exénatide** et le **liraglutide** sont deux incrétino-mimétiques analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Ils exercent donc plusieurs actions hypoglycémiantes comme le GLP-1 dont la concentration est diminuée en cas de diabète de type 2 : augmentation de la sécrétion d'insuline ; inhibition de la sécrétion de glucagon ; ralentissement de la vidange gastrique, diminuant ainsi le taux d'absorption intestinale du glucose.

L'action de l'**exénatide** est très courte, avec une demi-vie de 3 h ; il devra être administré 2 fois/j. Le **liraglutide** est acylé, ce qui lui confère une cinétique plus favorable (demi-vie : 13 h) et 1 inj. SC/j suffit.

Le GLP-1 est inhibé par une enzyme : la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4). La **sitagliptine**, la **vildagliptine** et la **saxagliptine**, inhibiteurs de la DPP-4, favorisent donc l'effet GLP-1 endogène.

L'**exénatide** et le **liraglutide** permettent un bon contrôle des glycémies postprandiales. Ils entraînent généralement une perte de poids (environ 2 kg).

### INDICATIONS

Traitement du diabète de type 2 en association à la **metformine** et/ou un **sulfamide hypoglycémiant** chez les sujets n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérées de ces traitements.

**GALVUS** bénéficie d'une extension d'indication pour le traitement en monothérapie du diabète de type 2 lorsque les règles hydiéno-diététiques ne suffisent pas et que l'association avec la **metformine** n'est pas possible.

### CONTRE-INDICATIONS

Diabète de type 1.

Allergie à la substance active ou un excipient. Grossesse.

Relative : insuffisance rénale terminale et modérée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour l'**exénatide**, commencer le traitement à la dose de 5 µg x 2/j en sous-cutané pendant 1 mois, avant éventuellement d'augmenter la dose à 10 µg x 2/j pour obtenir un meilleur contrôle glycémique.

Pour le **liraglutide**, commencer le traitement à la dose de 0,6 mg/j pendant 1 sem., avant éventuellement d'augmenter la dose à 1,2 mg/j voire 1,8 mg/j pour obtenir un meilleur contrôle glycémique.

Envisager l'adaptation de la dose d'un **sulfamide hypoglycémiant** prescrit en association, pour diminuer le risque d'hypoglycémie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées. Vomissements. Diarrhée.

Diminution de l'appétit.

Hypoglycémie en cas d'association à un **sulfamide hypoglycémiant**.

De rares cas de pancréatites aiguës ont été décrits et imposent l'arrêt du médicament.


La **sitagliptine** augmenterait les infections des voies aériennes supérieures.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Surveillance rapprochée de l'INR en début de traitement et lors de l'augmentation de dose. Prise d'antibiotiques au moins une heure avant l'injection.

## DIABÈTE DE TYPE 2 (8)

### Stratégie médicamenteuse pour les diabétiques de type 2 en cas d'intolérance ou contre-indication à la metformine [1]



#### CONSENSUS

[1] Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2, HAS et ANSM, 2013

## DIABÈTE – COMPLICATIONS (1)

### Rétinopathie

Elle survient dans 100 % des cas après plusieurs années de diabète déséquilibré.

#### Traitement médical

L'équilibration du diabète et de la pression artérielle est impérative pour prévenir la rétinopathie diabétique et s'impose à tous les stades de rétinopathie avérée. En revanche, au stade évolué une équilibration trop rapide est susceptible d'aggraver transitoirement l'œdème et l'ischémie.

Les études sur l'utilisation d'**inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire** (aspirine 125 à 250 mg/j, ticlopidine (**TICLID**) 1 à 2 cp./j), clopidogrel (**PLAVIX**) (rétinopathie proliférante) montrant une diminution de l'incidence des microanévrismes n'ont pas été confirmées de manière indiscutable.

#### Photocoagulation

Le seul traitement efficace prouvé de la rétinopathie diabétique est la photocoagulation par laser.

##### ► Photocoagulation panrétinienne

Elle consiste à détruire par des impacts de laser (à argon ou à xénon) la rétine périphérique.

Elle est indiquée :

- dans le traitement de la rétinopathie proliférante : elle permet la régression de la néovascularisation et réduit le risque de cécité ;
- en cas de rétinopathie préproliférante avant une équilibration rapide de la glycémie ou une grossesse.

Elle a des inconvénients tels qu'une diminution de la vision crépusculaire, une amputation du champ visuel périphérique

ou encore l'aggravation d'un œdème maculaire.

La photocoagulation au laser a bouleversé le pronostic de la rétinopathie diabétique en permettant de préserver souvent l'évolution péjorative. Le laser à argon ou à xénon permet la photocoagulation focale ou panrétinienne des lésions, en particulier des néovaisseaux susceptibles de saigner et de l'œdème cystoïde. Indications et réalisation sont souvent difficiles (fatigue du patient, désagrément des éclats lumineux, baisse possible de l'acuité visuelle après photocoagulation).

##### ► Photocoagulation focale

Indiquée en cas d'œdème focal. En cas d'œdème diffus, on a recours à la photocoagulation en grille, qui présente néanmoins le risque de baisse de l'acuité visuelle.

#### Traitement anti-VEGF

Les **anti-VEGF** type bévécizumab (**AVASTIN**) ou ranibizumab (**LUCENTIS**) inhibent la néovascularisation. Ils sont utilisés dans l'œdème maculaire où ils améliorent dans certains cas l'acuité visuelle. On peut les associer à la photocoagulation.

#### Vitrectomie

Elle peut être efficace dans les cas d'opacification du vitré due à une hémorragie, même avec dépôts de fibrine et décollement rétinien.

#### Cryoapplication panrétinienne et chirurgie du décollement de rétine

##### Traitements en cours d'évaluation

Ce sont l'hexacétone de triamcinolone (**HEXATRIONE**), les inhibiteurs de la protéine C-kinase, les inhibiteurs du système angiotensine (candésartan, **KENZEN**)

## DIABÈTE – COMPLICATIONS (2)

### Néphropathie

Elle survient dans 30 à 40 % des cas après plusieurs années de diabète déséquilibré. Elle comporte des facteurs génétiques.

#### Prescriptions diététiques

Restriction raisonnable de l'apport protéique de l'ordre de 1 g/kg de poids corporel. Restriction des apports sodés : pas plus de 6 g de sel en cas d'HTA, régime plus restrictif en cas d'œdèmes.

#### Contrôle optimal du diabète (+++)

Insulinothérapie optimisée avec plusieurs injections par jour (schéma basal/bolus) ou pompe à insuline.

L'objectif à atteindre est une hémoglobine glyquée A1c  $\leq$  6,5 %.

#### Traitement de toute HTA (cf. HTA)

##### ► En l'absence de microalbuminurie

Le traitement antihypertenseur devra avoir pour objectif des chiffres  $\leq$  130/80 mmHg.

Les 5 classes thérapeutiques (**IEC**, **ARA2** ou **sartans**, **diurétiques thiazidiques**, **bêta-bloquants cardiosélectifs** et **inhibiteurs calciques**) peuvent être utilisées en première intention. Néanmoins, on privilégiera les **IEC** et les **ARA2** dont l'activité inhibitrice du système rénine/angiotensine a un effet néphroprotecteur.

Leur introduction justifie la surveillance de la fonction rénale et de la kaliémie au bout d'une semaine. Toute élévation de la créatinémie supérieure à 30 % ou hyperkaliémie supérieure à 6 mmol/L impose l'arrêt transitoire du traitement. Il pourra être repris progressivement après avoir

écarté une sténose de l'artère rénale, éventuellement en association à un **diurétique hypokaliémiant** en cas de survenue d'une hyperkaliémie.

Si la monothérapie ne permet pas d'atteindre les objectifs tensionnels, on passe à une bithérapie en associant un **diurétique thiazidique** (sauf en cas d'insuffisance rénale sévère où ils sont inefficaces), un  **$\beta$ -bloquant** ou un **inhibiteur calcique**, voire à une trithérapie. Les **diurétiques de l'anse** (**furosémide**, **LASILIX**) sont souvent nécessaires lorsque la clairance de la créatinine atteint 30 mL/min.

Les associations fixes d'antihypertenseurs facilitent l'observance.

##### ► En présence d'une néphropathie incipiens (microalbuminurie $<$ 300 mg/24 h sans atteinte de la fonction rénale)

Il est recommandé de prescrire en première intention un **IEC** ou un **ARA2**, même en l'absence d'HTA, car leur effet néphroprotecteur permet parfois de réduire la microalbuminurie ou au moins d'éviter le passage au stade de la macroalbuminurie.

#### Traitement de la néphropathie terminale

La dialyse est en général nécessaire lorsque la clairance de créatinine atteint 10 mL/min.

L'anémie sera traitée par l'**érythropoïétine humaine recombinante** (**EPREX**, **NÉORE-CORMON**, **ARANESP**).

Les troubles phosphocalciques (hyperparathyroïdie secondaire) devront faire appel aux **sels de calcium**, aux **chélateurs du phosphore** (**RENAGEL**) et au dérivé 1- $\alpha$ -hydroxylé de la vitamine D3 (**UN-ALFA**).

STADE	ANCIENNETÉ DU DIABÈTE	FILTRATION GLOMÉRULAIRE	ALBUMINURIE	PRESSIION ARTÉRIELLE
Silencieux	Début	Augmentée	Normale	Normale
Néphropathie débutante	5 à 10 ans	Augmentée puis normale	Microalbuminurie : 30 à 300 mg/24 h	Normale ou augmentée
Néphropathie patente	5 à 10 ans plus tard	Diminution progressive	Macroalbuminurie $>$ 300 mg/24 h $\pm$ syndrome néphrotique	HTA
Insuffisance rénale	3 à 20 ans plus tard	Très diminuée	Diminution en fin d'évolution	HTA

**DIABÈTE – COMPLICATIONS (3)****Neuropathie périphérique****Douleur**

L'équilibre glycémique le meilleur possible permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de la neuropathie périphérique.

Les **antalgiques** usuels et les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** sont parfois utiles mais partiellement efficaces.

Certains **antiépileptiques** ont une action bénéfique sur la douleur d'origine neurologique ; on utilise :

- le **clonazépam (RIVOTRIL)** : 0,05 à 0,1 mg/kg/j (1 gtte = 0,1 mg) ;
- la **carbamazépine (TÉGÉROL)** à la dose de 1 à 4 cp./j à 200 mg ;
- la **gabapentine (NEURONTIN)** et la **prégabaline (LYRICA)**, dérivés proche de l'acide gamma-aminobutyrique, sont de loin les plus actifs. Seul le **LYRICA** a l'AMM : 150 mg en 2 ou 3 prises quotidiennes, à augmenter jusqu'à 600 mg/j si besoin.

Les **antidépresseurs tricycliques** : **amitriptyline (ÉLAVIL, LAROXYL)** ou **imipramine (TOFRANIL)** ont été proposés mais ils sont de moins en moins utilisés en raison de leurs effets secondaires.

Les atteintes paralytiques et amyotrophiques doivent bénéficier de mesures kinésithérapiques progressives, actives et prolongées.

**Neuropathie digestive****► Gastroparésie**

L'alimentation doit être de préférence semi-liquide et fragmentée avec modifications si nécessaire de l'horaire des injections préprandiales d'insuline, de façon à obtenir le meilleur équilibre glycémique possible.

L'**érythromycine (ÉRYTHROCINE)** est un agoniste puissant de la motiline et est parfois efficace à faible dose : 250 mg/j IV.

L'**ambénonium (MYTELASE)**, à la dose de 3 à 10 cp./j en 3 à 4 prises avant les repas, favorise également la vidange gastrique. Les patients peuvent aussi bénéficier de la prescription d'**antiémétiques** type **MOTILIUM** ou **PRIMPÉRAN**.

**► Diarrhée**

Le **lopéramide (IMODIUM)** à la dose de 6 à 8 mg/j peut être efficace.

La **colestyramine (QUESTRAN)** est peu efficace.

Les antibiotiques (**AUGMENTIN**) sont souvent très efficaces car une pullulation microbienne au niveau du grêle est fréquente.



**DIABÈTE – COMPLICATIONS (4)****Pied diabétique**

L'Alfediam recommande la prise en charge suivante [1].

**Prise en charge générale et prévention**

- Prévention des plaies par évaluation du chaussage.
- Soins de pédicurie réguliers en cas de neuropathie sensitive.
- Prévention du tétanos.
- Prévention des thromboses veineuses (**héparine de bas poids moléculaire**).
- Correction d'une éventuelle dénutrition.

**Prise en charge du pied**

- Systématiquement :
  - Éradication de la cause de la plaie.
  - Mise en décharge (prescription de chaussures à appui partiel).
  - Recherche de signes généraux (fièvre, frissons), locaux inflammatoires ou septiques plus ou moins extensifs (écoulement purulent, chaleur, œdème, lymphangite, etc.).
  - Recherche d'un contact osseux qui signe l'ostéite.
  - Recherche de la présence des poulx aux membres inférieurs afin de classer la plaie en plaie neuropathique pure, artéritique pure ou mixte (le plus fréquent).

- Plaie non infectée et non ischémique
  - Nettoyage au sérum physiologique et débridement de la plaie au bistouri par une infirmière (décornage, pelage).
  - Pansement avec un antiseptique peu agressif.
  - Traitement des mycoses par des **anti-fongiques locaux**.

- Plaie infectée (signes septiques locaux ou généraux)

Antibiothérapie par voie générale associant au moins 2 antibiotiques à spectre suffisamment large pour couvrir les germes aérobies et anaérobies et ayant une bonne diffusion tissulaire (à adapter secondairement à l'antibiogramme).

- Pied ischémique

- Discuter avant tout un geste de revascularisation en fonction des résultats de l'exploration vasculaire.

- Quand aucun geste de revascularisation n'est possible, on peut parfois recourir à l'oxygénothérapie hyperbare.

- L'amputation n'est envisagée qu'en dernier lieu devant une gangrène extensive, une infection sévère, des lésions nécrotiques dues à une artériopathie non corrigable ou une altération de l'état général. Elle doit être aussi conservatrice que possible.

**CONSENSUS**

[1] Le pied diabétique, *Alfediam*, 1996

## DIABÈTE ET CHIRURGIE

### Règles de comportement

Un diabétique mal équilibré ( $HbA1c > 8\%$ ) est un patient à haut risque.

Un diabétique correctement équilibré est un patient comme un autre.

1. Chirurgie contre-indiquée chez le diabétique équilibré ? Aucune.
  2. Risques particuliers à l'anesthésie ? Aucun.
  3. Problèmes particuliers au réveil ? Aucun.
  4. Problèmes postopératoires spécifiques ? Aucun.
- DANS TOUS LES CAS UNE PRÉCAUTION S'IMPOSE : ÉVITER L'HYPOGLYCÉMIE.

Le véritable problème est celui de la compétence médico-infirmière qui doit être capable de :

- adapter les injections d'insuline ;
- faire des contrôles de la glycémie capillaire ;
- faire confiance au diabétique bien éduqué pour prendre en charge son propre traitement ;
- téléphoner au diabétologue en cas de problème.

### Précautions à prendre chez le diabétique traité par antidiabétiques oraux

Le traitement par **metformine** doit être arrêté 72 h avant toute intervention chirurgicale programmée et ne doit être repris que 72 h après l'intervention.

Le diabétique qui doit avoir une intervention chirurgicale (même un acte dentaire) doit être bien équilibré avant l'intervention : **vérifier l'HbA1c**.

### Mesures pratiques chez le diabétique insulinotraité

#### Chirurgie mineure

##### ► Le jour de l'intervention

Perfusion de sérum glucosé à 10 % (la quantité de glucose étant identique à celle qu'auraient dû apporter les repas). Par exemple, perfusion de 1 250 mL de G10 % de 7 h jusqu'au repas du soir. Dans ce cas, on fait la ou les injections d'insuline aux mêmes doses que les jours précédents.

#### Chirurgie majeure

##### ► Avant l'intervention

Équilibrer au mieux le diabète.

##### ► Le jour de l'intervention

Administrer 250 à 300 g de glucose par 24 h, par perfusion si besoin, avant, pendant et après l'intervention. Injecter l'insuline en sous-cutané toutes les 4 à 6 h ou à la seringue électrique ou à la pompe.

Contrôle 6 fois/j des glycémies capillaires afin d'ajuster les doses d'insuline.

##### ► Les jours suivant l'intervention

Continuer la seringue électrique ou la pompe puis répartir l'insuline en plusieurs injections.

## DIABÈTE ET GROSSESSE – DIABÈTE GESTATIONNEL

### Diabète patent et grossesse

#### Règles de la prise en charge

La grossesse doit être programmée.

L'équilibre glycémique doit être obtenu dès la conception, avant arrêt de la contraception.

Les **hypoglycémiant oraux** sont contre-indiqués. En cas de diabète non insulino-dépendant, il faut les arrêter en même temps que la contraception et passer à l'insulinothérapie.

L'objectif est d'obtenir des glycémies aussi proches que possible de la normale : glycémie moyenne de 0,80 g/L avec HbA1c à 6 %, et ce, de la conception jusqu'à l'accouchement. L'accouchement doit être programmé.

#### Modalités de la prise en charge

La future mère doit être prise en charge par une équipe multidisciplinaire (diabétologue, obstétricien et néonatalogiste).

##### ► Prise en charge du diabète

- Insulinothérapie soit par pompe portable, soit insulinothérapie conventionnelle optimisée en privilégiant le schéma basal/bolus et en utilisant l'**insuline NPH** (ex. : **INSULATARD**, **UMULINE NPH**) pour les besoins de base et un bolus d'**analogue ultrarapide de l'insuline** (**HUMALOG** ou **NOVORAPID**) avant chacun des 3 repas.

- Autocontrôles glycémiques au moins 6 fois par jour et adaptation des doses d'insuline de façon à obtenir des glycémies capillaires inférieures ou égales à 1 g/L (5,5 mmol/L) à jeun et à 1,40 g/L (7,7 mmol/L) en postprandial.

- Consultation du diabétologue au moins une fois par mois (deux fois si nécessaire) pour examen clinique (poids, pression artérielle, recherche d'œdèmes) et contrôle biologique (HbA1c ou mieux, fructosamine et recherche de protéinurie).

- Examen du fond d'œil avant la grossesse (en cas de rétinopathie proliférante préexistante : panphotocoagulation au laser avant la conception) et tous les 3 mois en l'absence de rétinopathie, sinon au moins tous les mois.

- Prise en charge par la diététicienne : prescription d'un régime assurant les besoins quotidiens en évitant une prise de poids trop importante.

- Seule une coronaropathie sévère contre-indique la grossesse (situation rare).

##### ► Prise en charge de la grossesse et de l'accouchement

Plusieurs échographies doivent être demandées : vers la 11<sup>e</sup> ou 12<sup>e</sup> sem. pour vérifier le terme, puis à la 20<sup>e</sup> et 32<sup>e</sup> sem. Pour dépister les malformations, mesurer la croissance fœtale et rechercher une macrosomie (mesure de la circonférence abdominale).

À partir de la 32<sup>e</sup> sem., il faut dépister une souffrance fœtale par enregistrement répété du rythme cardiaque du fœtus.

Au cours des consultations obstétricales, dépister une prééclampsie, une menace d'accouchement prématuré, etc.

L'accouchement doit être programmé avec hospitalisation entre les 36<sup>e</sup> et 37<sup>e</sup> sem. si la patiente réside loin de la maternité ou en cas de problème. Si la grossesse se déroule de façon satisfaisante, l'accouchement peut avoir lieu au terme. Il se déroule après mise en place d'une insulinothérapie intraveineuse à l'aide d'une seringue électrique.

##### ► Prise en charge du nouveau-né

Il s'agit de prévenir l'hypoglycémie et l'hypocalcémie.

### Diabète gestationnel

- Il s'agit de tout diabète ou intolérance au glucose apparu ou reconnu au cours de la grossesse, qu'elle soit ou non préexistante, qu'elle persiste ou non après l'accouchement.

- Il doit être dépisté dès la première visite et à la 26<sup>e</sup> sem. de grossesse chez les femmes obèses, ayant des antécédents familiaux de diabète de type 2, ayant développé un diabète gestationnel au cours d'une précédente grossesse, ayant mis au monde un nouveau-né macrosomique, atteinte d'HTA ou prenant trop de poids en cours de grossesse.

- En cas de glycémie supérieure ou égale à 0,90 g/L (4,95 mmol/L) à jeun et à 1,20 g/L (6,6 mmol/L) 2 h après les repas : un régime personnalisé est prescrit et la femme est soumise à un autocontrôle glycémique.

- Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints avec le régime seul, on a recours à l'insuline.

## DIABÈTE – ÉDUCATION (1)

Le programme suivant est une liste minimale d'objectifs qui doit permettre au diabétique de prendre en charge son diabète.

### 1. Diabète de type 1 : insulinothérapie

- Connaître le maniement du matériel d'injection de l'insuline (stylo jetable ou stylo rechargeable) : sélection de la dose, modalités d'injection.
- Utiliser des aiguilles dont la longueur est adaptée à l'épaisseur du sujet.
- En cas d'utilisation d'une pompe à insuline : expliquer le fonctionnement, l'insertion du cathéter et organiser la prise en charge à domicile.
- Expliquer les caractéristiques des insulines ou analogues utilisés ; durée d'action : ultrarapide, intermédiaire ou lente en indiquant sur un schéma combien de temps les insulines agissent sur 24 h.
- Pour l'insulinothérapie optimisée, indiquer au patient la différence entre besoins de base et besoins prandiaux
- Injection de l'insuline : vérifier qu'il n'y a ni boules, ni douleur, ni saignement.
- Changer les lieux d'injection : faire l'injection à la cuisse, au bras, dans la paroi abdominale, sur les côtés.
- Stocker le matériel et le flacon en usage dans un lieu à température ambiante, flacons en réserve au réfrigérateur.
- Parler de l'obligation d'utiliser un collecteur d'aiguilles.

### 2. Contrôler les glycémies

- Utiliser un appareil autotiqueur pour glycémies capillaires.
- Prélever la goutte de sang capillaire.
- À propos du lecteur de glycémie :
  - retenir son nom (ACCU-CHECK ACTIVE, ACCU-CHECK GO, FREESTYLE PAPILLON, ONE TOUCH GLUCO TOUCH PLUS, ONE TOUCH ULTRA 2, OPTIUM XCEED) ;

– enseigner son utilisation (code, introduction des bandelettes, lecture, etc.).

- Savoir quelle glycémie permet de juger l'action de l'insuline injectée auparavant.
- Contrôler les glycosuries et la cétonurie. Utiliser les bandelettes adéquates (*KÉTO-DIASTIX, KÉTO-DIABUR TEST 5000*).
- Interpréter la présence simultanée de glucose et de corps cétoniques, de corps cétoniques seuls.
- Conduite à tenir en présence des résultats précédents.

### 3. Adapter les doses d'insuline en fonction des glycémies

- Hyperglycémies permanentes : augmenter la quantité de l'insuline basale. Définir la dose (+ 2, + 3, + 4 U).
- Déterminer la dose du bolus à injecter avant chaque repas en fonction de la glycémie préprandiale du moment, de la glycémie postprandiale des jours précédents, de l'apport glucidique et de l'activité physique prévue. Définir la dose (+ 1, + 2, + 3, + 4 U).
- Hyperglycémies d'apparition brutale mais durables : ajouter de l'**insuline rapide** ou un **analogue ultrarapide** au traitement habituel (en fonction des glycémies capillaires). Définir la dose (+ 2, + 3, + 4 U). Vérifier l'absence de cétonurie ; rechercher une cause ; prévenir le médecin.
- Hypoglycémie : connaître la définition et la conduite à tenir.

Conscience conservée : resucrage par la bouche si possible ou **glucagon** (avoir une ampoule en réserve dans le réfrigérateur). Conscience diminuée ou absente : sérum glucosé IV (type, quantité).

- Hypoglycémie : prévention des récidives. Être capable d'adapter l'alimentation, les efforts physiques et la diminution des doses d'insuline.

## DIABÈTE – ÉDUCATION (2)

### 4. Alimentation

- Connaître les équivalents glucidiques (teneur en glucides des principaux aliments).
- Choisir les aliments des différents repas (petit-déjeuner, collation matinale, déjeuner, goûter, dîner, collation), en fonction des rations calorique et glucidique conseillées, avec un écart inférieur à 20 %.
- Modifier la composition des repas en conservant un équilibre calorique et glucidique correct (remplacement d'un ou de plusieurs aliments par d'autres).
- Choisir ou modifier une collation en fonction d'un effort physique, d'une sortie. Avoir toujours du sucre dans sa poche.

### 5. Activités physiques

- Choisir si possible un sport régulier.
- Modifier l'alimentation en fonction de l'horaire et de l'intensité du sport.
- Diminuer la dose d'insuline en fonction de l'horaire, de l'intensité et de la durée de l'effort physique.

### 6. Hygiène de vie, des pieds

### 7. Voyages

- Modifier l'insulinothérapie en fonction de la durée et des horaires du voyage.
- Adapter l'insulinothérapie en fonction de l'alimentation proposée pendant le voyage.

INDEX GLYCÉMIQUE	INTERVALLE DE VALEURS	ALIMENTS
Faible	≤ 55	La plupart des fruits frais et légumes verts, légumes secs, céréales en grains, pâtes, chocolat noir riche en cacao, lait et produits laitiers, viandes, oléagineux, pommes, poires, oranges, pêches
Moyen	56-69	Produits à base de céréales complètes, bananes, abricots secs, pommes de terre à l'eau ou la vapeur, abricots, bananes, melon, ananas
Élevé	≥ 70	Pain blanc, baguette, riz blanc, pommes de terre frites ou au four ou chips, corn flakes, pain complet, pain suédois, confiseries, barres chocolatées, carottes, pastèque, sodas

## DIABÈTE – AUTOCONTRÔLE (1)

### Autocontrôle glycémique

Le diabétique dispose de deux éléments afin de mesurer lui-même sa glycémie capillaire.

#### Appareil autopiqueur et lancettes

Les autopiqueurs munis d'une aiguille (ou lancette) permettent d'obtenir une goutte de sang capillaire prélevée au bout du doigt, sur laquelle la glycémie sera mesurée.

Les autopiqueurs disposent désormais d'un dispositif qui permet de régler la profondeur de la piqûre en fonction de l'épaisseur et la qualité de la peau. La piqûre devient donc pratiquement indolore, et ce d'autant plus qu'on choisit une lancette fine. Les lancettes BD Micro-Fine + sont les plus fines (diamètre de 0,2 mm) et s'adaptent sur tous les autopiqueurs.

Certains autopiqueurs (*ACCU-CHEK SOFT-CLIX*, *ONETOUCH ULTRASOFT*, etc.) ne s'utilisent qu'avec une lancette spécifique du même nom.

Certains autopiqueurs utilisés avec la bandelette éponyme (*ACCU-CHEK ACTIVE*, *FREESTYLE PAPILLON*) rendent possible le prélèvement sur des sites moins vascularisés que les doigts (bras, avant-bras, base du pouce, etc.). Néanmoins, les résultats obtenus sur sites alternatifs ne sont pas toujours concordants avec ceux pris au bout du doigt.

#### Bandelettes et lecteurs de glycémie capillaire

La lecture de la glycémie capillaire se fait après avoir déposé ou fait absorber la goutte de sang sur une bandelette (ou une électrode) adaptée à chaque lecteur, dans laquelle elle est introduite.

Les lecteurs à usage partagé sont ceux pour lesquels le dépôt de la goutte de sang sur la bandelette ou l'électrode ne risque pas de mettre en contact le doigt du diabétique avec le boîtier du lecteur sur lequel pourraient persister des traces de sang d'une précédente utilisation. Il s'agit donc de lecteurs où le dépôt se fait sur la bandelette avant qu'elle soit introduite dans l'appareil ou sur l'extrémité de l'électrode dépassant à l'extérieur du lecteur.

La bandelette *MEDISENSE OPTIUM β-CETONES* utilisable avec les lecteurs *MEDISENSE OPTIUM* et *MEDISENSE OPTIUM XCEED* permet de déterminer la cétonémie sur le sang capillaire.

Les lecteurs de glycémie mémorisent tous automatiquement les 100 à 500 derniers tests avec la date et l'heure de la mesure et donnent la moyenne des glycémies sur les 7, 14 ou 30 j précédents. Certains peuvent être connectés avec un ordinateur grâce à un logiciel qui permet l'analyse des résultats.

Certains lecteurs (5 s) sont plus rapides que d'autres (20 s).

**GLYCÉMIES CAPILLAIRES (1) – LECTEURS (1)**

LECTEURS	CARACTÉRISTIQUES	LOGICIELS	BANDELETTES	NOMBRE ET PRIX DES BANDELETTES	VITESSE DE LECTURE (s)
Accu-Chek Performa (Roche Diagnostics)	Permet l'analyse avec une petite goutte de sang (0,6 µL), système très précis, capable de reconnaître automatiquement les bandelettes périmées.		Accu-Chek Performa	100 = 38,61 €	5
Ascensia Breeze 2 (Bayer Diagnostics)	Lecteur sans codage. Électrode intégrée dans l'appareil qui aspire la goutte (1 µL). 420 glycémies en mémoire. Moyenne des 1, 7, 14 et 30 dernier(s) jour(s).	Win Glucofacts	Ascensia Glucodisc (disque de 10 capteurs)	50 = 19,31 €	5
Ascensia Brio (Bayer Diagnostics)	Mise en route et arrêt automatique du lecteur par insertion et retrait de la bandelette. 10 mémoires.	-	Ascensia Easyfill	50 = 19,31 €	20
Freestyle Papillon mini (Abbott Diabetes Care)	Aspiration du sang sur la bandelette goutte de 3 µL. 250 glycémies en mémoire. Moyenne des 14 derniers jours.	Diabass	FreeStyle Papillon	100 = 38,61 €	15
One Touch Ultra (Lifescan)	Conseil de vérifier l'acétonurie en cas de glycémie élevée. 150 glycémies en mémoire. Moyenne des 14 derniers jours.	In Touch	One Touch Ultra	100 = 38,61 €	5

## DIABÈTE – AUTOCONTRÔLE (2)

### Quand faire le contrôle des glycémies ?

Au cours d'un diabète de type 1, l'autosurveillance des glycémies capillaires (ASG) est indispensable quotidiennement.

En cas de diabète de type 2, l'ASG est indiquée :

- chez les patients insulino-traités ou chez qui l'insuline est envisagée à court terme;
- chez les patients traités par insulinosécréteurs comme les **sulfamides hypoglycémisants** (confirmer une hypoglycémie);
- dans un but pédagogique (appréciation de l'effet d'une activité physique, de l'alimentation, etc.).

Il faut **répartir les contrôles** pour pouvoir adapter le traitement, en faisant des glycémies à jeun et en période postprandiale (2 à 4 h après les repas).

Il faut définir avec le patient le nombre et l'horaire des contrôles glycémiques par jour.

Quand les circonstances imposent un contrôle glycémique strict (grossesse, port d'une pompe à insuline, microangiopathie évolutive), le nombre des mesures doit être au moins de 6 par j.

Il ne faut pas accepter les glycémies faites toujours à la même heure qui testent toujours la même insuline ou le même traitement.

Les mesures de la glycémie faites à jeun ou avant les repas reflètent l'action de l'insuline basale.

Les contrôles faits après les repas objectivent la montée glycémique après la charge glucidique des repas et testent l'efficacité des bolus préprandiaux.

### Exemples

Un patient a reçu :

- une injection d'un **analoge lent** (ou d'une **insuline NPH**) la veille au soir au coucher (22 h) ;

- une injection d'un **analogue ultrarapide** juste avant le petit-déjeuner (7 h).

On teste :

- le matin à jeun (6 h 45) : l'efficacité de l'injection du soir ;

- 1 h 30 après le petit-déjeuner (8 h 30) : l'efficacité de l'**analogue ultrarapide** injecté le matin.

Deux types d'événements doivent être dépistés :

#### • Les hyperglycémies postprandiales

Lorsque le même repas est régulièrement suivi d'une hyperglycémie, cela signifie que la dose d'**analogue ultrarapide** qui précède est insuffisante et doit être augmentée de 2 U le lendemain.

#### • Les hypoglycémies

La survenue d'une hypoglycémie systématiquement en fin d'après-midi par exemple nécessite le jour suivant la diminution de la dose de 2 à 4 U de la dose d'insuline basale (**analoge lent** ou **NPH** du matin) injectée précédemment.

Point fondamental qu'il faut expliquer au diabétique : l'adaptation des doses est toujours décalée et s'applique à l'injection correspondante du jour suivant.



**GLYCÉMIES CAPILLAIRES (2) – LECTEURS (2)**

- Les bandelettes d'autosurveillance glycémique sont prises en charge sans restriction à 100 % pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2 traité par insulinosécréteurs, elles sont depuis l'arrêté du 25 février 2011 remboursées à hauteur de 200 bandelettes/an, à l'exception des patients chez lesquels une insulinothérapie est prévue à court ou moyen terme.
- Dans tous les cas, 1 lecteur de glycémie est pris en charge tous les 4 ans chez l'adulte, 2 lecteurs tous les 4 ans chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans. Les lecteurs sont en fait garantis au minimum 4 ans.
- Un kit d'autosurveillance glycémique (1 lecteur de glycémie + au minimum 10 bandelettes d'autocontrôle de la glycémie + 1 autopiqueur + au minimum 10 lancettes pour autopiqueur, non réutilisables, stériles) est remboursé une seule fois pour un patient, lors de l'initiation de l'autosurveillance glycémique. Un lecteur seul est ensuite prescrit lors du renouvellement.

## DIABÈTE – AUTOCONTRÔLE (3)

### Contrôle de la glycosurie

La surveillance de la glycosurie ne reflète qu'imparfaitement les glycémies :

- elle est constamment « en retard » sur le chiffre de la glycémie lors du contrôle puisque l'urine a stagné dans la vessie ;
- elle est soumise à une double imprécision en fonction du seuil rénal du glucose. Normalement la glycosurie apparaît lorsque la glycémie dépasse 1,80 g/L (9,9 mmol/L) :

- le seuil est dit « bas » lorsque la glycosurie est présente alors que la glycémie est inférieure à 1,80 g/L (cas de la grossesse) ;
- le seuil est dit « élevé » lorsqu'il n'y a pas de glycosurie alors que la glycémie est supérieure à 1,80 g/L. Ceci s'observe en cas d'insuffisance rénale et souvent chez le sujet âgé.

Cette caractéristique oblige à faire l'auto-surveillance sur la glycémie seule.

L'appréciation de la glycosurie peut toutefois être utile lorsque le diabétique a des glycémies stables, pour contrôler l'absence de glycosurie nocturne et... reposer les doigts des diabétiques. On dispose des bandelettes de :

- **KETO-DIASTIX** (Bayer diagnostics) ;
- **KETO-DIABUR TEST 5000** (Boehringer-Mannheim).

Ces bandelettes sont les seules qui soient utilisables pour un dosage semi-quantitatif (glycosurie de 0 à ++++).

Les autres bandelettes peuvent être utilisées pour le dépistage de la glycosurie mais non pour son dosage semi-quantitatif.

### Recherche de la cétonurie

Cette recherche est d'un intérêt majeur lorsque les glycémies sont mal contrôlées. Elle est indiquée lorsque la glycémie atteint ou dépasse 2,50 g/L.

### En cas d'hyperglycémie + cétose

La présence de cétonurie peut signifier une évolution à court terme vers l'acidocétose. Elle invite à augmenter rapidement la dose d'insuline en ajoutant un **analogue ultrarapide** aux doses habituellement faites en tenant compte aussi de l'apport glucidique du repas.

Tout diabétique (et surtout un type 1) doit savoir :

- faire 5 UI d'analogue rapide en plus par croix de cétonurie si la glycémie est  $> 2,5$  g/L (13,75 mmol/L) ;
- consulter en urgence en cas de persistance de la cétonurie malgré les rajouts d'insuline.

### En cas de cétonurie sans glycosurie

Une hypoglycémie est à craindre et un contrôle immédiat de la glycémie capillaire s'impose.

## ACROMÉGALIE (1)

### Mesures générales

Hospitaliser le malade pour un bilan complet **tumoral** (IRM, champ visuel) et **hormonal** à la recherche d'une insuffisance ou d'une hypersécrétion des autres axes hypophysaires : dosages de GH (*Growth Hormone*), IGF1, PRL, FSH/LH, testostérone ou œstradiol, TSH, T4, T3, cortisol et test au *Synacthène*.

Bilan cardiaque (pression artérielle, ECG, échographie cardiaque), dépistage systématique d'un syndrome d'apnée du sommeil, coloscopie et bilan métabolique (diabète, dyslipidémie). L'ensemble du bilan doit permettre de définir le degré d'urgence du traitement.

### Traitement chirurgical

Il s'impose en première intention mais dans certains cas il est précédé d'un traitement médical.

### Hypophysectomie

Elle consiste à enlever l'adénome somatotrope par voie trans-sphénoïdale.

L'hypophysectomie par voie trans-sphénoïdale est le traitement de choix des microadénomes ou des macroadénomes sans envahissement du sinus caverneux ou expansion suprasellaire.

L'abord sous-frontal est nécessaire pour aborder les très volumineux adénomes à expansion suprasellaire.

### Complications

#### ► Insuffisance antéhypophysaire

Totale dans 15 % des cas. Parfois dissociée (dans 25 % des cas environ).

#### ► Autres complications

Diabète insipide (4 %), méningites (3 %), fuite de LCR (2 %), hématomas sous-arachnoïdiens (1 %).

### Après l'intervention

Surveillance annuelle.

#### ► Guérison

La guérison est définie sur des critères biologiques : normalisation de l'IGF1, dosé au moins 3 mois après la chirurgie (interprétée en fonction de l'âge), concentration moyenne de GH < 2,5 µg/L (7,5 mUI/L) et GH plasmatique restant inférieure à 0,4 µg/L au cours d'une HGPO (avec les nouveaux dosages ultrasensibles).

Elle est obtenue dans 40 à 70 % des cas environ, les chiffres variant suivant les séries.

Les résultats après chirurgie sont d'autant plus satisfaisants que la tumeur est bien limitée, sans extension en dehors de la loge hypophysaire.

Tout patient guéri doit être surveillé à vie. Lorsque l'IGF1 est normal et que le nadir de GH sous HGPO reste inférieur à 1 µg/L (3 mUI/L), il est vraisemblable que la maladie ne sera pas évolutive.

#### ► Persistance d'une hypersécrétion de GH

Si l'IGF1 est augmenté et si la GH ne s'abaisse pas en dessous de 1 µg/L (3 mUI/L), le patient est considéré comme non contrôlé et un traitement complémentaire (médical ou radiothérapie) s'impose.

## INHIBITEURS DE LA SOMATHORMONE (GH) (1) – ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE (1)

### ■ Octréotide

<b>SANDOSTATINE</b>					
Ruptures de varices œsophagiennes : 25 µg/h à la seringue électrique pendant 5 j	6 amp. 50 µg/mL	44,68	I	100 %	7,45
	6 amp. 100 µg/mL	79,81	I	100 %	13,30
	6 amp. 500 µg/mL	359,30	I	100 %	59,88
<b>SANDOSTATINE LP</b>					
1 inj. IM profonde toutes les 4 sem. en commençant par 20 mg, puis 20 mg pour la 2 <sup>e</sup> et la 3 <sup>e</sup> inj. Ajustement ultérieur selon les taux de GH et d'IGF1	1 fl. 10 mg + ser. 2,5 mL	1128,32	I	100 %	1128,32
	1 fl. 20 mg + ser. 2,5 mL	1320,29	I	100 %	1320,29
	1 fl. 30 mg + ser. 2,5 mL	1512,16	I	100 %	1512,16

### ■ Lanréotide

<b>SOMATULINE LP</b>					
1 inj. IM toutes les 2 sem.	1 fl. 30 mg + solv. 2 mL + ser.	660,33	I	100 %	660,33
1 inj. SC profonde toutes les 4 sem.	1 ser. 60 mg	1128,32	I	100 %	1128,32
	1 ser. 90 mg	1320,30	I	100 %	1320,30
	1 ser. 120 mg	1512,16	I	100 %	1512,16

### ■ Pasiréotide

<b>SIGNIFOR</b>					
Maladie de Cushing : chez les patients inopérables ou en cas d'échec de la chirurgie 0,6 mg x 2/j en SC Posologie pouvant varier de 0,3 à 0,9 mg par prise en fonction de la clinique	60 amp 1 mL (0,3 mg/mL)	3382,06	I	100 %	56,37
	6 amp 1 mL (0,6 mg/mL)	405,04	I	100 %	67,51
	60 amp 1 mL (0,6 mg/mL)	3753,27	I	100 %	62,55
	60 amp 1 mL (0,9 mg/mL)	4124,49	I	100 %	68,74

## ACROMÉGALIE (2)

### Traitement médical [1]

Il fait appel à deux catégories de médicaments : les **analogues de la somatostatine** qui inhibent la sécrétion de la GH ou un **antagoniste du récepteur de la GH**.

#### Analogues de la somatostatine

**Lanréotide (SOMATULINE LP)** en commençant par 1 inj. IM de 30 mg toutes les 2 sem. ou 1 inj. SC profonde de 60 mg toutes les 4 sem.

**Octréotide (SANDOSTATINE LP)** en commençant par une injection à 20 mg tous les mois.

**Le but est d'obtenir une normalisation des taux d'IGF1 et un taux de GH < 2,5 µg/mL (7,5 mUI/L).**

Si ces objectifs ne sont pas atteints, on augmente les doses mensuelles à 30 mg pour la **SANDOSTATINE LP** (injections IM) ou à 60, voire 120 mg pour la **SOMATULINE LP** (seringues prêtes à l'emploi pour injection SC profonde).

En cas de GH < 1 µg/mL (3 mUI/L), on peut utiliser la forme à 10 mg de la **SANDOSTATINE LP** ou 1 inj. de **SOMATULINE LP** 120 mg tous les 42 ou 56 j.

Les **analogues de la somatostatine** sont aussi utilisés pour préparer à la chirurgie : le traitement dure de quelques semaines à quelques mois dans les tumeurs volumineuses difficiles à opérer d'emblée (AMM acceptée).

#### Antagoniste du récepteur de la GH

**Pegvisomant (SOMAVERT)** : il est utilisé à raison d'une injection sous-cutanée en commençant par 10 mg par j, en augmen-

tant progressivement les doses jusqu'à 30 mg par paliers de 4 à 6 sem. de façon à obtenir un taux d'IGF1 compris dans les normes pour l'âge. La GH s'élève sous **pegvisomant** et n'est donc plus le reflet du contrôle de l'acromégalie.

#### Antagonistes dopaminergiques

Ils ne normalisent les taux de GH et d'IGF1 que dans 10 % des cas. La **bromocriptine (PARLODEL)** ou la **quinagolide (NORPROLAC)** sont presque exclusivement utilisés dans les adénomes mixtes sécrétant à la fois de la GH et de la prolactine.

### Traitement radiothérapique

La radiothérapie est indiquée en cas d'ablation incomplète de l'adénome, de récurrence, chez les patients inopérables, ou chez les patients opérés non guéris avant traitement médical et ne supportant pas ce dernier.

#### Radiothérapie conventionnelle

Elle est utilisée à la dose de 45 à 50 Gy fractionnée en plusieurs séances. Son délai d'action est long et elle ne permet d'obtenir une guérison que dans 50 % des cas. Elle est rarement compliquée de radionécroses (cerveau, chiasma optique), mais elle expose à long terme au risque d'insuffisance hypothalamo-hypophysaire.

#### « Gamma knife »

Cette technique consiste à administrer en une seule séance un rayonnement gamma concentré sur l'adénome après repérage stéréotaxique. Elle n'est utilisée que dans quelques centres disposant de l'équipement permettant de l'appliquer.

### CONSENSUS

[1] Consensus français sur la prise en charge de l'acromégalie, SFE, 2008

## DIABÈTE INSIPIDE

### Traitement du diabète insipide

Diabète insipide par carence absolue en ADH (hormone antidiurétique). Le traitement se fait au mieux actuellement par l'administration de **desmopressine (MINIRIN)**.

#### En urgence

On utilise la forme injectable à la dose de 4 µg en IV ou IM ou même SC, à répéter au besoin en cas de déshydratation ou impossibilité d'administrer par voie nasale (intervention sur l'hypophyse).

#### En traitement d'entretien

On utilise :

- soit les lyophilisats de **MINIRINMELT** à 0,1 et/ou 0,2 mg ; la dose quotidienne est de 0,3 mg en 3 prises, à adapter en fonction de la diurèse ;
- soit la solution endonasale administrée avec un cathéter gradué ou en spray à l'aide d'un flacon pulvérisateur. La dose est de 0,1 à 0,2 mL soit 10 à 20 µg de **MINIRIN** à pulvériser dans la narine 1 à 2 fois/j.

#### Causes acquises du diabète insipide

- Séquelles de traumatisme ou d'intervention chirurgicale (+++).
- Tumeur de la région infundibulo-tubérienne (le plus souvent développée aux dépens du tissu nerveux - méningiome, gliome - ou de la poche de Rathke - craniopharyngiome). Il s'agit beaucoup plus rarement d'une tumeur hypophysaire.
- Maladie de système avec localisation hypophyso-hypothalamique, plus rarement en cause ; ce peut être : une sarcoïdose, une hémopathie (leucémie surtout), enfin une réticulo-histiocytose ou maladie de Hand-Schüller-Christian.
- Hypophysite lymphocytaire.
- Plus exceptionnellement encore : séquelles de méningite en particulier tuberculeuse avec arachnoïdite de la base.

### Diabètes insipides partiels

La carence en ADH existe mais n'est pas totale : on peut essayer la **carbamazépine (TÉGRÉTOL)** à la dose de 1 à 3 cp. soit 200 à 600 mg/j.

### Diabète insipide et potomanie

Le diagnostic différentiel de diabète insipide peut être difficile avec une potomanie. Il repose sur l'épreuve de restriction hydrique en milieu hospitalier. Seul le potomane supporte la restriction hydrique pendant quelques heures.

#### Cure de déconditionnement

Elle est commencée en milieu hospitalier. Elle comporte :

- une diminution volontaire et progressive des apports hydriques par le patient ;
- une surveillance médicale et psychologique ;
- l'utilisation de la **carbamazépine (TÉGRÉTOL)** à la dose de 100 à 300 mg/j ;
- des **anxiolytiques (SÉRESTA, LEXOMIL)**.

### Diabètes insipides primitifs

Ce sont des affections génétiques apparaissant en général chez le sujet jeune ou l'enfant.

Le traitement fait appel au **MINIRIN**.

Les doses doivent être adaptées en fonction de l'intensité de symptômes et des circonstances de la vie (efforts, sports, traumatismes, stress).

### Diabète insipide néphrogénique

Il est en général insensible à la **desmopressine** aux doses habituelles. On a parfois recours aux **diurétiques**, à un régime peu salé ou aux **inhibiteurs des prostaglandines**.

## HYPERPROLACTINÉMIES (1)

La plupart des hyperprolactinémies sont d'origine médicamenteuse. Ainsi les **anti-psychotiques**, en bloquant la dopamine, freinateur naturel de PRL, sont de puissants stimulants de la sécrétion de prolactine.

Les adénomes à PRL ou prolactinomes sont les tumeurs hypophysaires les plus fréquentes mais leur diagnostic suppose d'avoir éliminé les autres étiologies.

La prise en charge des hyperprolactinémies a fait l'objet d'un consensus d'experts de la Société française d'endocrinologie [1].

### Adénomes à prolactine

La taille des prolactinomes, mesurée à l'IRM, permet de faire la distinction entre microadénomes, de diamètre inférieur à 10 mm, et macroadénomes, de diamètre supérieur.

#### Traitement médical

##### ► Indications

En dehors des indications chirurgicales impératives (menace visuelle), le traitement médical est indiqué pratiquement dans tous les cas en première intention en cas de symptômes liés à l'hyperprolactinémie.

##### ► Molécules utilisées et modalités de prescription

Le traitement médical repose sur l'utilisation des **agonistes dopaminergiques** qui inhibent la sécrétion de prolactine. On a le choix entre plusieurs molécules : la **bromocriptine** (**PARLODEL**, **BROMO-KIN**), la **quinagolide** (**NORPROLAC**), la **cabergoline** (**DOSTINEX**) ou le **lisuride** (**AROLAC**, **DOPERGINE**), moins utilisé.

Ils permettent de normaliser le taux plasmatique de la PRL et à terme de réduire le volume de l'adénome.

Le **quinagolide** (**NORPROLAC**) et la **cabergoline** (**DOSTINEX**) sont désormais utilisés en première intention en dehors de la grossesse en raison de leurs avantages en termes de tolérance et d'efficacité.

##### • **NORPROLAC**

Les comprimés sont dosés à 25, 75, 150 µg de **quinagolide**.

**Traitement initial** : 25 µg pendant 3 j, puis 50 µg pendant 3 j, puis 75 µg/j.

**Traitement ultérieur** : la dose de 75 µg/j est suffisante pour contrôler la plupart des hyperprolactinémies mais une dose de 300 µg/j peut être atteinte si nécessaire.

##### • **DOSTINEX**

En raison de sa longue demi-vie d'élimination, la molécule est administrée en une prise hebdomadaire.

On commence par 0,5 mg et on augmente si nécessaire par paliers de 0,5 mg toutes les 4 sem.

##### • **PARLODEL** ou **BROMO-KIN**

Les comprimés sont dosés à 2,5 mg de **bromocriptine** base.

Le traitement est débuté de façon progressive : 1/2 cp. le 1<sup>er</sup> j, 1 cp. le 2<sup>e</sup> j puis 2 cp./j. Ce n'est qu'en cas de freinage incomplet de l'hyperprolactinémie que l'on augmente à 3, voire 4 cp./j.

##### • **AROLAC** ou **DOPERGINE**

On débute aussi le traitement de façon progressive : 1/2 cp. le 1<sup>er</sup> j, 1 cp. le 2<sup>e</sup> j et 1,5 cp. le 3<sup>e</sup> en 3 prises.

Le traitement médical des prolactinomes doit être poursuivi pendant longtemps (au moins 3 ans) à la dose minimale permettant de maintenir une concentration minimale de prolactine.

## ANTIPROLACTINIQUES

## ■ Bromocriptine

<b>PARLODEL</b>					
Posologie progressive : 1/2 cp. le 1 <sup>er</sup> j puis 1 cp. le 2 <sup>e</sup> j puis augmentation progressive par paliers de 1 cp. tous les 2 j	20 cp. séc. 2,5 mg	4,21	I	65 %	0,21
Traitement prolongé	30 cp. séc. 2,5 mg	5,89	I	65 %	0,20
La posologie maximale est de 40 mg/j	30 gél. 5 mg	9,03	I	65 %	0,30
	30 gél. 10 mg	15,96	I	65 %	0,53

## ■ Quinagolide

<b>NORPROLAC</b>					
Posologie progressive : 25 µg pendant 3 j, puis 50 µg pendant 3 j, puis 75 µg jusqu'à la fin du 1 <sup>er</sup> mois de traitement	3 cp. 25 µg + 3 cp. 50 µg	6,75	I	65 %	2,25
Traitement maximum : 300 mg/j	30 cp. 75 µg	30,03	I	65 %	1,00
	30 cp. 150 µg	51,42	I	65 %	1,71

## ■ Cabergoline

<b>DOSTINEX</b>					
Commencer par 0,5 mg/sem. Augmenter la dose par paliers de 0,5 mg en fonction de la prolactinémie mesurée 4 sem. après l'initiation du traitement	8 cp. 0,50 mg	32,28	I	65 %	4,04

## ■ Lisuride

<b>AROLAC</b>					
Posologie progressive : 1/2 cp. le 1 <sup>er</sup> j puis 2 x 1/2 cp. le 2 <sup>e</sup> j et 3 x 1/2 cp./j puis augmenter éventuellement la dose tous les 3 à 4 j	20 cp. séc. 0,2 mg	6,51	I	65 %	0,33
<b>DOPERGINE</b>					
Idem <b>AROLAC</b>	30 cp. séc. 0,2 mg	9,01	I	65 %	0,30

## PROPRIÉTÉS

Agonistes dopaminergiques réduisant la sécrétion hypophysaire de prolactine.

## INDICATIONS

Hyperprolactinémie idiopathique.  
Prolactinomes.

Inhibition de la montée laiteuse pour **bromocriptine (PARLODEL)** et **lisuride (AROLAC, DOPERGINE)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Toxémie gravidique et hypertension du post-partum (contre-indication formelle).  
Insuffisance coronaire.

L'allaitement n'est pas possible sous traitement.

Traitements par les **antipsychotiques** (sauf **clozapine**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Administer avec prudence en cas de troubles psychiatriques, troubles confusionnels, délires, syndromes d'excitation psychomotrice.  
Surveillance de la pression artérielle.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, vomissements, constipation.  
Troubles neurologiques : céphalées, vertiges, dyskinésies, malaise général.  
Hypertension.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Antagonisme avec les **antipsychotiques** et les **antiémétiques**.

**Dérivés de l'ergot de seigle** et **sympathomimétiques** : risque de vasoconstriction et de poussées hypertensives.

**Macrolides** (sauf **spiramycine**) : risque d'augmentation des taux plasmatiques du dopaminergique.



## HYPERPROLACTINÉMIES (2)

### ► Effets secondaires

Les effets secondaires les plus fréquents sont de nature digestive (nausées, vomissements). Les patients peuvent aussi se plaindre de céphalées, vertiges, somnolence et sensation de malaise général avec hypotension. Ces manifestations sont passagères mais obligent parfois à modifier le traitement. Il faut aussi connaître le risque de rhinorrhée de LCR en cas de réduction tumorale majeure désobstruant les brèches dure-mériennes auparavant collmatées par un macroprolactinome.

### ► Critères d'efficacité

La normalisation de la PRL survient dans un délai variable, de quelques jours à quelques mois.

La disparition des signes cliniques précède parfois la normalisation biologique : chez l'homme, disparition de l'impuissance et chez la femme, réapparition des cycles menstruels. Durée du traitement : il faut 3 ans minimum pour que, lors de l'arrêt du traitement, il n'y ait pas de réascension du taux de prolactine.

### ► Prolactinome et grossesse

Chez la femme en aménorrhée, due à un prolactinome, le traitement par **agoniste dopaminergique** rétablit rapidement les ovulations et permet la survenue d'une grossesse.

La **bromocriptine** est la molécule pour laquelle on dispose du plus grand recul quant à l'absence de risque maternel et fœtal pendant la grossesse.

Le **quinagolide** et la **cabergoline** ne sont pas tératogènes et malgré un recul moindre. Ils tendent à être de plus en plus utilisés chez la femme qui désire une grossesse car ils sont mieux tolérés.

Au cours de la grossesse normale, la sécrétion accrue des œstrogènes stimule la production de PRL et peut augmenter le

volume du prolactinome (dans 30 % des cas environ).

Dans les microprolactinomes, le risque de complications liées à l'augmentation du volume tumoral est exceptionnel. Le traitement par **agoniste dopaminergique** peut donc être interrompu dès que le diagnostic de grossesse est porté.

Dans les macroprolactinomes, le traitement est plutôt poursuivi (surtout en cas d'adénomes à développement suprasellaire) ou repris si la masse tumorale augmente au cours des contrôles réalisés tous les 2 à 3 mois.

### Prolactinome et contraception

- Il faut éviter les **œstroprogestatifs** fortement dosés en **éthinyloestradiol**.
- On propose plutôt la contraception par progestatif seul ou la pose d'un stérilet.
- La minipilule œstroprogestative contenant moins de 35 µg d'**éthinyloestradiol** peut être proposée en cas de microadénome en contrôlant le taux de la PRL après 3 mois et le volume de l'adénome après 1 an.

### Traitement neurochirurgical

L'intervention permettant l'ablation du prolactinome par voie rhinoseptale n'est pas indiquée dans la majorité des cas. Le geste chirurgical est réalisé dans les circonstances suivantes :

- résistance aux **agonistes dopaminergiques** (pas plus de 10 % des cas) ;
- intolérance sévère et persistante aux **agonistes dopaminergiques** ;
- prolactinome plurisécrétant (notamment PRL + GH) ;
- patientes porteuses d'un microadénome refusant le traitement médical au long cours, anxieuses quant à l'évolution durant une grossesse future...
- volumineux adénome invasif ou apoplexie hypophysaire sous traitement, mettant en jeu le pronostic visuel.

## HYPERPROLACTINÉMIES (3)

### Hyperprolactinémies secondaires

- **Hypothyroïdie périphérique** : secondaire à l'hypersécrétion de TRH, elle disparaît avec le traitement étiologique.
- **Cirrhose, insuffisance rénale** : secondaire à une insuffisance d'épuration de l'hormone.
- **Syndrome des ovaires polykystiques** (conséquence de l'hyperœstrogénie).

### Hyperprolactinémies médicamenteuses

- Les médicaments stimulant la sécrétion de PRL sont nombreux :
  - **œstrogènes de synthèse** (éthinyloestradiol) à fortes doses ;
  - **antipsychotiques** : sulpiride (*DOGMATIL*), halopéridol (*HALDOL*), phénothiazines (*LARGACTIL*, *TERCIAN*, etc.) ;

- **antidépresseurs** : tricycliques (*ANAFRANIL*, *LAROXYL*, *ÉLAVIL*, etc.) ou **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine** (*PROZAC*, *DEROXAT*, etc.) ;
- **antiémétiques** (*PRIMPÉRAN*, *MOTILIUM*, *VOGALÈNE*), **anti-H<sub>2</sub>** (*TAGAMET*, *AZANTAC*) ;
- **opiacés** (méthadone).

La prescription des **agonistes dopaminergiques** est inutile et potentiellement dangereuse chez les patients sous **antipsychotiques** (aggravation des troubles psychiatriques). Si le traitement en cause ne peut pas être interrompu, on proposera, après vérification de l'IRM, un traitement symptomatique par œstrogènes ou **œstroprogestatifs** pour corriger l'hypoœstrogénie chez la femme.

### CONSENSUS

- [1] Diagnostic et prise en charge des hyperprolactinémies, *SFE*, 2006

## INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE (IAH) (1)

On réunit sous le terme d'insuffisance antéhypophysaire (IAH) ou encore d'hypopituitarisme les tableaux cliniques qui sont dus à l'insuffisance de la sécrétion d'une ou plusieurs hormones produites par l'antéhypophyse. Il en résulte un déficit des hormones périphériques : corticosurrénales, thyroïdiennes, gonadiques. À cela s'ajoute un déficit en hormone de croissance. Le déficit en hydrocortisone peut immédiatement mettre en jeu le pronostic vital. Les autres déficits doivent être compensés et le patient devra être éduqué pour mener son traitement sa vie durant, et l'adapter aux circonstances.

### Remplacement du triple déficit surrénalien, thyroïdien et gonadique

#### Traitement du déficit corticotrope

Il fait appel aux hormones corticosurrénales.

##### ► Glucocorticoïdes

L'**hydrocortisone**, dénomination pharmacologique du cortisol, est prescrite *per os* aux doses de 20 à 30 mg/j (environ 1/2 mg/kg/j).

Les corticoïdes de synthèse ne doivent pas être utilisés pour compenser le déficit en cortisol.

##### ► Minéralocorticoïdes

La prise de **fludrocortisone** n'est pas utile. En effet la sécrétion de l'aldostérone est en grande partie sous la dépendance du système rénine-angiotensine, et le déficit en ACTH ne se traduit pas par un déficit minéralocorticoïde.

#### Traitement du déficit thyroérotrope (en TSH)

Il est traité par la **L-thyroxine**.

On prescrit **LÉVOTHYROX** en adaptant la dose (en général 100 à 125 µg/j) de façon à obtenir un taux plasmatique de la T4 dans les valeurs supérieures de la normale. La surveillance de la TSH est inutile.

#### Traitement du déficit somatotrope (en GH)

Chez l'enfant avant la puberté, le déficit doit être compensé pour assurer la crois-

sance ; le traitement pourra être poursuivi à l'âge adulte, mais le déficit devra être réévalué.

Les intitulés de l'AMM du traitement par l'hormone de croissance à l'âge adulte sont :

- le déficit somatotrope sévère acquis à l'âge adulte (c'est-à-dire avec une GH < 0,3 µg/L lors d'une hypoglycémie insulémique ayant permis d'obtenir une glycémie < 0,4 g/L) lié à une pathologie hypothalamo-hypophysaire connue avec au moins un autre déficit antéhypophysaire, excepté la prolactine. Dans ce cas, un seul test dynamique suffit pour diagnostiquer le déficit ;

- le déficit somatotrope acquis dans l'enfance prouvé par deux tests dynamiques (un taux d'IGF1 < -2 DS peut être considéré comme un test).

- chez un adulte de moins de 60 ans, sans processus tumoral évolutif, en dehors de toute pathologie aiguë ;

Le traitement doit être initié :

- chez un adulte de moins de 60 ans, sans processus tumoral évolutif, en dehors de toute pathologie aiguë ;

- par un endocrinologue et prescrit selon la réglementation en vigueur pour les médicaments d'exception.

On dispose de plusieurs spécialités : **GENOTONORM**, **NORDITROPINE**, **NUTROPINAQ**, **SAIZEN**, **UMATROPE**, **ZOMACTON**. Le traitement nécessite une injection sous-cutanée quotidienne à la dose initiale de 0,15 à 0,30 mg/j, que l'on adapte en fonction de la tolérance clinique et du plasmatique de l'IGF1. Des stylos injecteurs facilitent l'auto-administration du traitement (**NUTROPINAQ PEN**, **SAIZEN CLICKEASY**).

Surveillance :

- de l'efficacité : clinique et IGF1 tous les 6 mois, DMO à un an si pathologique initialement ;

- de la tolérance : clinique, glycémie à jeun et bilan lipidique annuel.

## HORMONE DE CROISSANCE (1)

## ■ Somatotropine

<b>NORDITROPINE SIMPLEXX</b>					
Retard de croissance lié à un déficit somatotrope chez l'enfant : 25 à 35 µg/kg/j	1 inj. 5 mg/1,5 mL	160,54	I	100 %	160,54
Retard de croissance lié à un syndrome de Turner : 50 µg/kg/j	1 inj. 10 mg/1,5 mL	312,20	I	100 %	312,20
Retard de croissance chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel : 35 µg/kg/j	1 inj. 15 mg/1,5 mL	463,08	I	100 %	463,08
Retard de croissance chez les enfants prépubères lié à une insuffisance rénale chronique : 50 µg/kg/j					
Déficit en hormone de croissance en rapport avec un syndrome hypothalamo-hypophysaire connu chez l'adulte : 0,1 à 0,3 mg/j					
<b>NUTROPINAQ</b>					
Idem <b>NORDITROPINE SIMPLEXX</b>	1 inj. 10 mg/2 mL	312,20	I	100 %	312,20
<b>SAIZEN</b>					
Retard de croissance lié à un déficit somatotrope chez l'enfant : 0,7 à 1 mg/m <sup>2</sup> /j	1 sol. inj. 5,83 mg/mL	191,49	I	100 %	191,49
Retard de croissance lié à un syndrome de Turner et retard de croissance chez les enfants prépubères lié à une insuffisance rénale chronique : 1,4 mg/m <sup>2</sup> /j	1 sol. inj. 8 mg/mL	608,88	I	100 %	608,88
Retard de croissance chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel : 35 µg/kg/j					
Déficit en hormone de croissance en rapport avec un syndrome hypothalamo-hypophysaire connu chez l'adulte : 0,15 à 0,3 mg/j					
<b>SAIZEN CLICKEASY</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 fl. pdre + amp. solv. 8 mg/1,37 mL	251,84	I	100 %	251,84
<b>UMATROPE</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. 6 mg/3 mL	191,49	I	100 %	191,49
	1 cart. 12 mg/3 mL	372,55	I	100 %	372,55
	1 cart. 24 mg/3 mL	722,43	I	100 %	722,43
<b>ZOMACTON</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 fl. pdre + amp. solv. 4 mg/3,5 mL	119,39	I	100 %	119,39
	1 fl. pdre + amp. solv. 10 mg/mL	288,97	I	100 %	288,97

## INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE (IAH) (2)

### Traitement du déficit gonadotrope (en LH et FSH)

Le traitement est différent selon que le patient désire ou non une descendance. Si le patient ne désire pas procréer, on prescrit un traitement substitutif par les hormones gonadiques.

Dès qu'il y a désir de descendance, on s'adresse aux gonadotrophines qui permettent d'induire l'ovulation chez la femme et de stimuler la spermatogenèse chez l'homme.

► *Traitement substitutif par les hormones gonadiques*

#### Chez l'homme

Il s'agit d'une hormonothérapie substitutive importante, surtout chez le sujet jeune afin de maintenir une libido et une activité sexuelle normale et d'éviter à long terme une déminéralisation osseuse sévère.

On utilise la **testostérone**, qui est disponible sous plusieurs formes :

- forme injectable en intramusculaire : **énanthate de testostérone (ANDROTARDYL)** à raison d'une injection de 250 mg toutes les 2 ou 4 sem., ou **undécanoate de testostérone 1 000 mg (NEBIDO)** à raison d'une injection toutes les 10 à 14 sem. L'intervalle des injections doit être adapté en fonction des dosages de testostérone plasmatique effectués avant l'injection suivante ;

- forme transdermique : gel de testostérone à 1 % en sachet de 25 ou 50 mg de testostérone (**ANDROGEL**). La dose recommandée est de 50 mg par j, mais ce médicament n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale ;

- forme orale : capsule à 40 mg (**PANTESTONE**). En raison de la mauvaise biodisponibilité de la testostérone par voie orale. Il faut au moins 3 capsules par j et parfois plus pour normaliser le taux plasmatique de la testostérone.

On peut aussi utiliser le gel de la **dihydrotestostérone** ou **androstanolone (ANDRAC-**

**TIM**). Cette spécialité n'est pas remboursée dans le traitement de l'hypogonadisme.

#### Chez la femme

Il est d'autant plus indispensable de réaliser une hormonothérapie substitutive que la femme est jeune, afin de maintenir la trophicité des tissus sensibles aux œstrogènes (vagin, squelette, peau).

- œstrogènes

On utilise du **17- $\beta$ -estradiol** soit par voie transdermique, sous forme de gel (**OESTROGEL**, **OESTRODOSE**, **ESTREVA**, **DÉLIDOSE**) : 0,5 à 1,5 mg par j ou de patch que l'on applique 2 fois par sem. (**ESTRADERM TTS**, **CLIMARA**, **DERMESTRIL**, **CESCLIM**) ou 1 fois par sem. (**DERMESTRIL SEPTEM**, **FEMSEPT**, **ESTRAPATCH**, **THAIS SEPT**), soit *per os* à raison de 1 à 2 mg par j (**ESTROFEM**, **ESTREVA comprimés**, **OROMONE**, **PROVAMES**, **PROGYNOVA**).

- Progestatifs

Il est indispensable, en l'absence d'hystérectomie, d'associer au traitement œstrogénique un **progestatif** pour équilibrer les effets du **17- $\beta$ -estradiol** sur l'endomètre et éviter la survenue à terme d'une hyperplasie pouvant entraîner un cancer utérin :

- on doit préférer la **progestérone naturelle (UTROGESTAN**, **MENAELE**, **ESTIMA**) : 1 à 2 caps./j à 100 mg le soir au coucher ;

- en cas d'intolérance, on s'adresse aux **progestatifs de synthèse** : **chlormadinone (LUTERAN)** ou **dydrogestérone (DUPHASTON)**.

- Associations œstro-progestatives

Des combinaisons fixes associant dans la même formulation le **17- $\beta$ -estradiol** et un progestatif peuvent aussi être prescrites, sous forme de patch transdermique (**FEMSEPTCOMBI**, **FEMSEPTIVO**) ou sous forme de comprimé (**CLIMASTON**, **CLIMÈNE**, etc.).

L'administration du **17- $\beta$ -estradiol** et de la **progestérone naturelle** (ou du progestatif de synthèse) peut se faire en continu si l'on souhaite éviter les règles ou, si la femme désire des règles, de façon séquentielle (21 à 28 j de **17- $\beta$ -estradiol** avec association de la progestérone ou du progestatif les 12 derniers jours de chaque cycle).

## HORMONE DE CROISSANCE (2)

<b>GENOTONORM MINIQUECK</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	7 inj. pdre et solv. 0,6 mg	136,24	I	100 %	19,46
	7 inj. pdre et solv. 0,8 mg	180,22	I	100 %	25,75
	7 inj. pdre et solv. 1 mg	222,79	I	100 %	31,83
	7 inj. pdre et solv. 1,2 mg	265,27	I	100 %	37,90
	7 inj. pdre et solv. 1,4 mg	307,74	I	100 %	43,96
	7 inj. pdre et solv. 1,6 mg	350,21	I	100 %	50,03
	7 inj. pdre et solv. 1,8 mg	392,68	I	100 %	56,10
	7 inj. pdre et solv. 2 mg	435,16	I	100 %	62,17
<b>OMNITROPE</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. inj. 5,5 mg/1,5 mL	136,60	I	100 %	136,60
	5 cart. inj. 5,5 mg/1,5 mL	642,05	I	100 %	128,41
	10 cart. inj. 10 mg/1,5 mL	1242,97	I	100 %	124,30
	1 cart. inj. 10 mg/1,5 mL	265,95	I	100 %	265,95
	5 cart. inj. 6,7 mg/mL	1 242,97	I	100 %	248,59
	10 cart. inj. 6,7 mg/mL	2 444,82	I	100 %	244,48
<b>GENOTONORM</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. inj. 5,3 mg/mL	170,8	I	100 %	170,80
	1 stylo inj. 5,3 mg/mL	170,8	I	100 %	170,80
	5 stylos inj. 5,3 mg/mL	797,42	I	100 %	159,48
	1 cart. inj. 12 mg/mL	374,48	I	100 %	374,48
	1 stylo inj. 12 mg/mL	374,48	I	100 %	374,48
	5 stylos inj. 12 mg/mL	1753,47	I	100 %	350,69

**INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE (IAH) (3)**► *Traitement par les gonadotrophines***Chez la femme**

Il s'agit d'induire l'ovulation en réalisant successivement :

– la maturation d'un follicule par injections IM successives de **gonadotrophines ménopausiques humaines** ou HMG (**FOSTIMON, MENOPUR**) ou de **FSH recombinante humaine** (**GONAL-F, PUREGON**) ;

– et lorsque le follicule est arrivé à maturation, le déclenchement de l'ovulation par une injection IM de **gonadotrophine chorionique humaine** ou HCG (**GONADOTROPINE CHORIONIQUE ENDO**) ou LH recombinante humaine (**LUVERIS**) ou encore de **choriogonadotropine alpha humaine** (**OVITRELLE**). L'induction de l'ovulation doit se faire sous surveillance clinique, échographique et biologique, afin d'éviter une grossesse multiple ou un syndrome d'hyperstimulation ovarienne.

Lorsque l'insuffisance gonadotrope est d'origine hypothalamique, l'induction de l'ovulation peut se faire par l'administration pulsatile de **LH-RH** (**LUTRELEF**) à l'aide d'une pompe (**ZYKLOMAT PULSE**). La posologie est de 5 à 20 µg par pulses de quelques secondes toutes les 90 min.

**Chez l'homme**

On induit et/ou on maintient la spermatogenèse par des injections IM de **HMG + HCG** ou **FSH recombinante + HCG**.

**Adaptation du traitement**

L'hormonothérapie substitutive est un traitement à vie pour ce qui est des substitutions en **hydrocortisone** et **L-thyroxine**. Le malade doit être éduqué pour éviter les décompensations aiguës (coma hypopituitaire très grave).

La substitution somatotrope doit être discutée au-delà de 60 ans.

La substitution gonadique doit être reconsidérée après 60 ans. En l'absence de contre-indication, les doses minimales efficaces doivent être prescrites sous surveillance régulière (seins chez la femme, prostate chez l'homme).

- Carte d'insuffisance antéhypophysaire indiquant le traitement suivi et les coordonnées du médecin à prévenir.
- Prescriptions claires indiquant la nécessité de doubler ou tripler les doses d'**hydrocortisone** en cas d'agression, de stress, de maladie intercurrente (grippe +++), d'efforts physiques importants, de facteurs de déshydratation.
- Régime normalement salé.
- Surveillance périodique du poids et de la pression artérielle.

## COMA HYPOPITUITAIRE

L'hospitalisation en réanimation est indispensable. Le traitement associe les mesures de l'insuffisance surrénale aiguë et du coma myxœdémateux. Il doit être débuté dès les prélèvements biologiques réalisés, sans en attendre les résultats.

### Traitement symptomatique

#### Mise en condition du malade

- Repos au lit. Patient à jeun.
- Mise en place d'une voie veineuse périphérique et si besoin, centrale.
- Pose d'une sonde nasale d'oxygène, d'une sonde urinaire et d'une sonde gastrique.
- Mise en place d'un monitoring (ECG, pression artérielle, etc.).

#### Correction des troubles ventilatoires

- Assurer la liberté des voies aériennes.
- Éviter l'encombrement bronchique.
- Oxygénothérapie par voie nasale : débit à adapter à la gazométrie artérielle.
- Si nécessaire : intubation et ventilation assistée.

#### Réchauffement progressif (+++)

Par réchauffement externe passif : chambre à 25 °C, couvertures. Il faut éviter un réchauffement trop rapide à cause du risque de collapsus vasculaire.

#### Correction des troubles hydroélectrolytiques

Solutés glucosés iso- voire hypertoniques à cause de l'hyponatémie + hypoglycémie.

Les apports sodés doivent être adaptés à la natriurèse pour éviter une intoxication par l'eau :

- si natriurèse basse : restriction hydrique ;
- si natriurèse élevée : apports sodés sous stricte surveillance de la pression veineuse centrale.

#### Correction cardiovasculaire (+++)

Le remplissage vasculaire est essentiel.

Des solutés de remplissage sont utilisés en cas de collapsus.

Il faut rester prudent avec les drogues inotropes en cas d'insuffisance cardiaque.

### Traitement du facteur déclenchant

Une antibiothérapie sera débutée par voie intraveineuse en cas de suspicion d'infection.

#### Nursing

Il est commun à tous les malades hospitalisés en réanimation (soins des yeux, de la bouche, aspiration bronchique, prévention d'escarres, etc.). Il est d'autant plus important que les patients atteints sont souvent âgés.

#### Traitement hormonal substitutif

##### ► Hormonothérapie surrénalienne

**Hémisuccinate d'hydrocortisone** par voie parentérale intraveineuse : on injecte 100 mg en dose de charge puis 200 mg/24 h en continu à la seringue électrique.

Les **minéralocorticoïdes** sont également nécessaires : **SYNCORTYL** : 5 mg en IM x 2.

##### ► Hormonothérapie thyroïdienne

On peut proposer de la **lévothyroxine sodique** sous forme injectable (**L THYROXINE SERB**) : le premier jour on prescrit une dose d'attaque de 500 µg à perfuser sur 2 h à la seringue électrique ou en perfusion.

Les jours suivants, la dose d'entretien est variable : 100 à 200 µg/24 h selon l'évolution clinique, la tolérance et l'état coronarien.

Dès que l'alimentation redevient possible, un traitement par voie orale doit prendre le relais de la voie veineuse.

D'autres auteurs préfèrent utiliser de la **liothyronine sodique** ou T3 (**CYNOMEL** cp. à 25 µg) à la dose de 10 à 25 µg x 3/j par la bouche ou la sonde gastrique.

### Évolution - éducation

Le pronostic reste très grave. Après traitement de l'urgence, pratiquer un bilan étiologique et hormonal puis éduquer le patient (cf. Insuffisance antéhypophysaire).



## INSUFFISANCE SURRÉNALE LENTE

L'insuffisance surrénale ou hypocorticisme correspond à la diminution du fonctionnement des glandes corticosurrénales. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital et nécessite une éducation du patient afin de prévenir la survenue d'une décompensation aiguë.

### Alimentation

Le traitement glucocorticoïde est donné à titre supplétif : l'apport en sel doit donc être normal (8 à 12 g/j de NaCl).

### Hormonothérapie

#### Glucocorticoïde naturel

On prescrit le glucocorticoïde naturel (**HYDROCORTISONE**) administré par voie orale (cp. à 10 mg).

Il est illogique et dangereux d'utiliser des corticoïdes de synthèse (**prednisone, prednisolone**, etc.) dans le traitement de l'insuffisance surrénale.

#### ► Besoins de base

Ils sont de 1/2 à 1 mg/kg suivant l'intensité du déficit, le rapport poids/taille, le sexe.

La dose quotidienne est de 20 à 30 mg en moyenne.

#### ► Répartition

De préférence, compte tenu de la faible durée de vie de l'hormone, il faut répartir les doses en 2 à 3 prises/j. Par exemple : 20 mg le matin, 5 mg à midi, 5 mg à 16 h, ou 20 mg le matin et 10 mg à midi.

#### ► Éducation du patient

Cf. Insuffisance surrénale aiguë.

En cas d'intervention chirurgicale, les doses d'**hydrocortisone** sont augmentées :

- la veille : 60 mg/j ;
- le jour de l'intervention : 50 à 100 mg IV préopératoire et perfusion peropératoire ;
- le lendemain : 100 mg.

Si la voie orale est impossible, le traitement doit être administré par IV.

#### Minéralocorticoïde

**Fludrocortisone (FLUCORTAC)** : cp. à 50 µg.

La prescription de **fludrocortisone** est indiquée dans l'insuffisance surrénale primi-

tive, qui est la seule à s'accompagner d'un déficit en aldostérone (contrairement à l'insuffisance d'origine antéhypophysaire).

La dose journalière est de 50 à 200 µg (1 à 4 cp.).

### Surveillance

- Clinique.
- Poids.
- Pression artérielle (+++).
- Asthénie.
- **Biologique** : uniquement au début du traitement pour vérifier la normalisation des paramètres :
  - ionogramme sanguin : glycémie, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> (hyperkaliémie au début), Cl<sup>-</sup>, CO<sub>3</sub>H<sup>-</sup>, urée, créatinine ;
  - ionogramme urinaire : Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> ;
  - cortisol libre urinaire : ce dosage peut avoir une certaine utilité pour vérifier l'équilibre hormonal.

### Traitement d'une cause

#### Tuberculose

Le traitement spécifique est systématique pour la plupart des auteurs devant une ISL d'origine tuberculeuse, même si la maladie est éteinte depuis longtemps. La **rifampicine** est un inducteur enzymatique qui impose une augmentation des doses d'**hydrocortisone** à 40 mg/j.

#### Hémochromatose

Les saignées ne permettent pas de récupérer le fonctionnement surrénal.

### En cas de corticothérapie prolongée

- Éviter un arrêt brutal (cf. Corticothérapie).
- Surtout (+++) ajouter de l'**hydrocortisone** 100 mg par 24 h soit par voie buccale soit par voie parentérale si c'est nécessaire (vomissements) lorsqu'une agression est constatée ou une intervention chirurgicale prévue.

### Traitement préventif des crises aiguës (+++)

Cf. Insuffisance surrénale aiguë.

## HORMONES SURRÉNALIENNES (1) – GLUCOCORTICOÏDES

## ■ Hydrocortisone

<b>HYDROCORTISONE ROUSSEL</b>					
Hormone administrable par voie orale à raison de 20 à 30 mg/j en moyenne Répartir en 2 ou 3 fois du fait de la durée de vie réduite (6 h)	25 cp. 10 mg 50 cp. 10 mg	3,24 HOP	I I	65 %	0,13

**PROPRIÉTÉS**

L'**hydrocortisone** est l'hormone glucocorticoïde physiologique ayant un rôle de maintien de la glycémie (par action sur la néoglucogenèse) et de l'équilibre hydrosodé (en complément de l'aldostérone).

L'**hydrocortisone** a également une action anti-inflammatoire et antiallergique.

Elle agit également sur la volémie et la masse sanguine et a une action antichoc.

**INDICATIONS**

L'indication majeure de l'**hydrocortisone** est le traitement substitutif de l'insuffisance surrénale d'origine surrénalienne et hypophysaire. On l'utilise également en réanimation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune : l'**hydrocortisone** est une hormone substitutive d'importance vitale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils n'apparaissent qu'en cas de surdosage : signes d'hypercorticisme, HTA, hypokaliémie, diabète.

**INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGÜE (1)**

Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le traitement doit être débuté dès la suspension du diagnostic.

**Mesures générales**

- Voie d'abord veineuse de bon calibre (centrale en cas de choc +++).
- En cas de choc ou de troubles de la conscience :
  - scope, sonde vésicale, aspiration gastrique ;
  - oxygène par voie nasale ;
  - nursing (+++) : malade immobilisé, matelas anti-escarres, réchauffement, humidification des muqueuses, oxygénothérapie, prévention des thromboses veineuses ;
  - ne pas manipuler le patient de façon intempestive : risque de mort subite.

**Réhydratation, apports glucosé et ionique****En cas de choc**

Commencer par un remplissage vasculaire : **VOLUVEN** 500 mL en 30 min.

**Dans tous les cas**

Soluté glucosé à 50 p. 1 000 + 3 à 4 g de NaCl dans chaque flacon :

- d'abord 1 000 mL la 1<sup>re</sup> h,
- puis 500 mL/h les 3 h suivantes,
- puis 1 500 mL à 2 500 mL pour les 20 h suivantes.

Au total : 3 à 5 000 mL pour les 24 h, contenant 200 g de glucose et 12 à 20 g de NaCl.

Aucun apport potassique.

**Apports hormonaux**

Le **glucocorticoïde** utilisé par voie parentérale est l'**hémisuccinate d'hydrocortisone** (amp. injectables, 100 mg). Le **minéralocorticoïde** utilisé est l'**acétate de désoxycorticostérone** (**SYNCORTYL** : amp. injectables de 10 mg). On remplace ensuite par **FLUCORTAC** *per os* (cf. Insuffisance surrénale lente).

Deux techniques de traitement sont possibles :

- 100 mg en IVD + 400 mg en perfusion continue IVSE (à ces fortes doses, l'**hydrocortisone** a un pouvoir minéralocorticoïde) ;
- 100 mg en IVD puis 100 mg en IM toutes les 6 h, associé à du **SYNCORTYL**, 5 mg en IM toutes les 12 h.

**Surveillance****Clinique**

Pression artérielle (différentielle +++), diurèse, température, état de conscience.

**Biologique**

- Ionogramme sanguin : glycémie, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> (hyperkaliémie au début), Cl<sup>-</sup>, CO<sub>3</sub>H<sup>-</sup>, urée, créatinine (insuffisance rénale fonctionnelle) à répéter toutes les 4 h pendant les 12 premières heures.
- Ionogramme urinaire : Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>.

**Électrocardiogramme**

Recherche de signes d'hyperkaliémie.

**Traitement d'une cause**

- Infection (antibiothérapie).
- Chez la femme jeune, recherche d'une grossesse.

## HORMONES SURRÉNALIENNES (2) – MINÉRALOCORTICOÏDES

### ■ Désoxycortone

<b>SYNCORTYL</b>					
1/2 à 1 amp. en IM 1 à 2/j en fonction des signes cliniques et du ionogramme	4 amp. 10 mg	8,46	I	65 %	2,12

### ■ Fludrocortisone (acétate)

<b>FLUCORTAC</b>					
En période aiguë d'insuffisance surrénale : 100 à 200 µg/j (souvent remplacée par le <b>SYNCORTYL</b> IM du fait des troubles digestifs) En période d'insuffisance surrénale chronique : 50 à 200 µg/j Exceptionnellement : 300 µg/j	30 cp. séc. 50 µg 60 cp. séc. 50 µg	107,95	I I	65 % 65 %	1,80

#### PROPRIÉTÉS

Hormone d'épargne du sodium, l'aldostérone, minéralocorticoïde naturel, est indispensable à la vie.

Elle permet la réabsorption du sodium et l'élimination du potassium en échange.

Elle contribue à maintenir l'osmolarité plasmatique et la pression artérielle.

Le stimulant principal de sa sécrétion est le système rénine-angiotensine.

Non disponible sous sa forme naturelle, elle est remplacée par la **désoxycortone** injectable ou la **fludrocortisone** administrable par voie orale.

#### INDICATIONS

Insuffisance surrénale par atteinte des glandes surrénales.

#### CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Association déconseillée avec des médicaments susceptibles d'entraîner des torsades de pointes, digitaliques, inducteurs enzymatiques.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Surdosage : rétention sodée, hypokaliémie.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Rifampicine, barbituriques, phénytoïne, carbamazépine, diurétiques hypokaliémisants.

## INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGUË (2)

### Traitement préventif

Afin d'éviter une décompensation, le patient atteint d'une insuffisance surrénale chronique doit respecter un certain nombre de règles :

- le régime doit être normalement salé et sucré ; en aucun cas on ne doit appliquer au patient traité pour insuffisance surrénale les règles diététiques qui s'appliquent lors des traitements par les corticoïdes de synthèse à visée anti-inflammatoire ;

- les **laxatifs** et les **diurétiques** sont proscrits ;

- le traitement ne doit **jamais** être interrompu ;

- le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter lui-même les doses en les multipliant par 2 ou 3 dès qu'il est atteint d'une maladie intercurrente (infection fébrile), soumis à une agression physique (fracture, effort physique prolongé, intervention chirurgicale, extraction dentaire) ou psychique (examen complémentaire type IRM...), à une déshydratation (sueurs abondantes) ou un accouchement. En cas de vomissements, il est indispensable de passer à la voie parentérale (**hémisuccinate d'hydrocortisone**) ; le patient doit toujours avoir avec lui (au domicile,

au travail, en cas de déplacement) une ampoule d'**hémisuccinate d'hydrocortisone** ;

- le patient doit connaître les signes d'insuffisance surrénale aiguë ;

- le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter lui-même les doses en les multipliant par 2 ou 3 dès qu'il est atteint d'une maladie intercurrente (infection fébrile), soumis à une agression physique (fracture, effort physique prolongé, intervention chirurgicale, extraction dentaire) ou psychique, à une déshydratation (sueurs abondantes) ou avant une intervention chirurgicale ou un accouchement. En cas de vomissements, il est indispensable de passer à la voie parentérale (**hémisuccinate d'hydrocortisone**) ;

- le patient doit constamment porter sur lui une carte avec mention du traitement prescrit, des coordonnées de son médecin et de la conduite à tenir pour éviter une décompensation aiguë en situation d'urgence (accident sur la voie publique, par exemple).

L'éducation des patients atteints d'insuffisance surrénale chronique est essentielle pour éviter la survenue d'une insuffisance surrénale aiguë, qui peut mettre en jeu le pronostic vital.

## HYPERCORTICISMES (1)

Il existe trois sortes d'hypercorticismes selon la sécrétion excédentaire :

- les hypercorticismes métaboliques ou hypercortisolismes qui se traduisent par l'hypersécrétion de cortisol par la zone fasciculée de la surrénale ;
- les hyperaldostéronismes, qui se manifestent par l'hypersécrétion d'aldostérone par la zone glomérulée de la surrénale ;
- les hyperandrogénies d'origine surrénalienne.

Ces hypercorticismes peuvent être fonctionnels (sans lésion organique) ou dus à une tumeur sécrétante (bénigne ou maligne).

### Maladie de Cushing

La maladie de Cushing, cause la plus fréquente des hypercortisolismes, correspond à une hyperplasie bilatérale des surrénales, secondaire à la production excessive d'ACTH par un adénome hypophysaire corticotrope.

### Traitement chirurgical hypophysaire

L'exérèse de l'adénome corticotrope hypophysaire se réalise par voie transphénoïdale même si elle n'a pu être visualisée par l'imagerie.

- Préparation non systématique à l'intervention par un traitement anticortisolique : **OP'DDD** ou **mitotane (LYSODREN)** à raison de 2 à 6 g/j pendant 10 à 15 j.
  - Supplémentation en **hydrocortisone** avant, pendant et après l'intervention (100 mg/j) afin d'éviter une insuffisance corticotrope postopératoire.
- La guérison a lieu dans 80 % des cas.

### En cas d'échec

Traitement anticortisolique de 6 mois par **OP'DDD** ou **analogue de la somatostatine : pesiréotide (SIGNIFOR)** ou **analogue dopaminergique (cabergoline)**.

En cas de récurrence à l'arrêt du traitement, plusieurs possibilités :

- réintervention chirurgicale sur l'hypophyse ;
- radiothérapie hypophysaire ;

– surrénalectomie bilatérale chimique ou chirurgicale, en cas de persistance de la maladie sans possibilité de traiter l'hypophyse. Dans ce dernier cas (rarement réalisé), il faut craindre (25 % des cas) le syndrome de Nelson par croissance de l'adénome hypophysaire avec hypersécrétion d'ACTH. Une radiothérapie externe hypophysaire préventive est discutée. Un traitement hormonal substitutif est parfois nécessaire de façon temporaire après la chirurgie.

### Syndromes de Cushing par tumeur sécrétante de la corticosurrénale

Ils s'accompagnent d'une baisse de l'ACTH ; il peut s'agir d'un adénome bénin, d'un corticosurrénalome malin ou d'une hyperplasie nodulaire bilatérale des surrénales.

### Adénome bénin

Il siège sur une surrénale, et la glande controlatérale a tendance à s'atrophier, en raison de la baisse de l'ACTH.

La surrénalectomie est impérative. Elle est grandement facilitée par la coelioscopie. Le traitement substitutif par l'**hydrocortisone** est indispensable, au moins de façon temporaire du fait de l'atrophie surrénalienne controlatérale.

### Corticosurrénalome malin

Il faut pratiquer une exérèse tumorale la plus large possible, par une équipe chirurgicale entraînée.

Chimiothérapie par un anticortisolique : **OP'DDD** ou **mitotane (LYSODREN)**, **métirapone (MÉTOPIRONE)** ou encore, bien qu'il n'ait pas l'AMM pour cette indication, **kétoconazole (NIZORAL)** en postopératoire ou exclusive en cas de tumeur non extirpable. Le pronostic est très sombre : la survie moyenne est de 8 mois.

### Hyperplasie nodulaire bilatérale

Après une éventuelle préparation par **OP'DDD**, on réalise une surrénalectomie bilatérale, suivie de la mise en route d'un traitement par **hydrocortisone**.

## ANTICORTISOLIQUES (1)

### ■ Mitotane (ou OP'DDD)

<b>LYSODREN</b>				
Dose initiale : 2 à 3 g/j à augmenter progressivement si besoin Débuter à 4 à 6 g/j en cas de syndrome de Cushing sévère et adapter secondairement la dose	100 cp. 500 mg	HOP	I	

#### PROPRIÉTÉS

Dérivé du DDT, c'est un bloqueur enzymatique de la synthèse du cortisol ; il possède également une activité antitumorale (action cytotoxique pour le cortex surrénalien).

#### INDICATIONS

Syndrome de Cushing.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doses progressives avec surveillance du taux plasmatique, quand c'est possible (ne pas dépasser 20 mg/L).

Associer systématiquement, immédiatement ou au bout de quelques jours, à un traitement par **hydrocortisone**.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Ses effets secondaires sont nombreux, parmi les plus fréquents :

– troubles digestifs : nausées, diarrhée, vomissements, élévation des enzymes hépatiques (GGT, ASAT, ALAT) ;

– troubles métaboliques : hypercholestérolémie, hypertriglycémie ;  
– troubles neurologiques : paresthésies, vertiges, somnolence, confusion, polynévrite, etc. ;  
– rashs cutanés.

Il existe un risque d'insuffisance surrénale aiguë à partir du 15<sup>e</sup> j de traitement qui nécessite de débuter une hormonothérapie substitutive par **hydrocortisone** voire **fludrocortisone** en cas de traitement prolongé ou à fortes doses.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à la **spironolactone** est contre-indiquée (elle bloque l'action du **mitotane**).

En raison de l'effet inducteur enzymatique : nécessité d'augmenter les doses d'**antivitamines K**, les doses substitutives d'hydrocortisone (une asthénie soulagée par une majoration des doses d'hydrocortisone signe le sous-dosage de ce traitement), risque d'efficacité moindre de la contraception œstroprogestative.

## HYPERCORTICISMES (2)

### Syndromes de Cushing paranéoplasiques

Les syndromes de Cushing paranéoplasiques résultent de la sécrétion ectopique d'ACTH par une tumeur maligne (le plus souvent pulmonaire ou pancréatique). Ils se traduisent par une hyperplasie bilatérale des surrénales.

On réalise l'exérèse du cancer primitif quand c'est possible. Sinon, on prescrit un **anticortisolique** ou une surrénalectomie bilatérale. Le pronostic dépend de celui de la tumeur initiale ; il est souvent mauvais.

### Syndrome de Conn (hyperaldostéronisme primaire)

La production excessive d'aldostérone est due à une tumeur surrénalienne (qui est presque toujours un adénome bénin) ou, plus rarement à une hyperplasie bilatérale des surrénales.

#### Traitement médical

La **spironolactone (ALDACTONE)** à la dose de 3 à 5 mg/kg est capable de corriger complètement les anomalies hydroélectrolytiques dues à l'hyperaldostéronisme. Elle normalise la PA, abaisse le débit cardiaque.

Un traitement prolongé à forte dose peut entraîner des troubles sexuels : impuissance et gynécomastie chez l'homme, troubles menstruels chez la femme. Ces troubles sont réversibles à l'arrêt du traitement.

#### Traitement chirurgical

Le recours à la chirurgie consiste en une surrénalectomie unilatérale en cas d'adénome. Les résultats sont bons : dans 2/3 des cas la situation est normalisée, dans 1/3 des cas un traitement médical antihypertenseur est nécessaire.

Il existe un bon parallélisme entre la réponse au traitement chirurgical et l'abaissement tensionnel obtenu sous **spironolactone (ALDACTONE)**.



## HYPOGONADISMES (1)

### Hypogonadismes masculins périphériques

Ils résultent d'une atteinte testiculaire congénitale ou acquise. Ces syndromes s'accompagnent d'une insuffisance testiculaire portant sur la fonction endocrine (sécrétion de testostérone) et/ou sur la fonction exocrine (formation de spermatozoïdes).

#### Causes

- Syndrome de Klinefelter (XXY) et anomalies chromosomiques apparentées.
- Cryptorchidie, anorchidie, déficits enzymatiques congénitaux de la synthèse de la testostérone.
- Insuffisances testiculaires acquises :
  - infectieuses (oreillons),
  - métaboliques (hémochromatose),
  - après radiothérapie,
  - post-chirurgicales et post-traumatiques.

#### Traitement

Il est étiologique, dès que possible. Le traitement des hypogonadismes testiculaires consiste en une hormonothérapie substitutive à vie, basée sur l'administration de **testostérone**, après s'être assuré de l'absence de néoplasie prostatique.

##### ► Par voie IM

**Testostérone** sous forme d'ester en solution huileuse, ayant un effet retard : **caproate de testostérone** 250 mg (**ANDROTARDYL**) à raison d'une injection de 250 mg toutes les 2 ou 4 sem.), ou **undécanoate de testostérone** 1 000 mg (**NEBIDO**) à raison d'une injection toutes les 10 à 14 sem.

##### ► Par voie orale

**Undécanoate de testostérone** (**PANTESTONE**).

Le traitement nécessite plusieurs prises quotidiennes. Les oublis sont fréquents, ce qui est parfois un handicap lors d'un traitement au long cours dont on connaît l'observance médiocre.

##### ► Par voie percutanée

L'**androstanolone** ou **dihydrotestostérone** (**ANDRACTIM**) est la forme active de la tes-

**tostérone** sur les organes génitaux et sur le système pilo-sébacé. Administrable à la dose de 125 à 250 mg/j selon l'intensité du déficit, elle est parfois moins facile à manier par les patients que la **testostérone** en gel cutané (**ANDROGEL**) utilisé à la dose de 5 g/j (soit 50 mg de **testostérone**).

#### Résultats

Ils sont en général bons sur le plan physique (virilisation) et psychologique. Le traitement n'a pas d'effet sur la spermatogénèse et ne rétablit pas le volume testiculaire.

Certains accidents (irritabilité, agressivité, voire délinquance) peuvent se produire chez des sujets qui acquièrent des désirs sexuels sans inhibition psychosociale (déficit de l'éducation ou niveau intellectuel bas).

### Hypogonadismes féminins périphériques

Encore appelés insuffisances ovariennes primitives, ils correspondent à l'atteinte de la gonade elle-même.

#### Causes

- Congénitales : syndrome de Turner (XO) et anomalies chromosomiques apparentées.
- Génétiques : ovaires résistants aux gonadotrophines.
- Insuffisances ovariennes acquises :
  - auto-immunes (dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune) ;
  - iatrogènes : après radiothérapie, chirurgie ou chimiothérapie.

#### Traitement

Le traitement substitutif par le **17--estradiol** est indispensable, sauf contre-indication, pour assurer la trophicité des organes génitaux et éviter l'ostéoporose. Si l'utérus est présent, il faut y associer la **progestérone naturelle** ou un **progestatif de synthèse** (mêmes modalités du traitement que pour celui de l'insuffisance gonadotrope en l'absence de désir de grossesse).

## ANDROGÈNES

## ■ Testostérone

<b>ANDROGEL</b>					
5 g de gel/j en application sur la peau Dose max. : 10 g/j	30 sach. dose 2,5 g (25 mg de <b>testostérone</b> ) 30 sach. dose 5 g (50 mg de <b>testostérone</b> )		I	NR	
			I	NR	
<b>FORTIGEL</b>					
3 à 4 g de gel/j le matin	1 fl. 60 g (gel 2 %)		I	NR	
<b>TESTOPATCH</b>					
2 patches de 2,4 mg/24 h renouvelés tous les 48 h	30 disp. transderm. 1,2 mg/24 h 30 disp. transderm. 1,8 mg/24 h 30 disp. transderm. 2,4 mg/24 h		I	NR	
			I	NR	
			I	NR	

## ■ Androstanolone

<b>ANDRACTIM</b>					
Une dose de 5 g de gel/j assure une testostéronémie de 2 à 4 ng/mL Dose habituelle : 5 à 10 g/j	16 doses de gel pour appl. locale	24,94	I	30 %	1,56

**PROPRIÉTÉS**

La testostérone et son métabolite actif, l'androstanolone, provoquent le développement chez l'homme des organes génitaux et le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires masculins (morphologie : voix, muscles, pilosité, comportement). Ils stimulent la libido. La testostérone n'entraîne pas le développement testiculaire.

**INDICATIONS**

Hypogonadismes primitifs d'origine testiculaire (congénitaux ou acquis).

Hypogonadismes d'origine hypothalamo-hypophysaire.

Gynécomastie (applications locales).

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance cardiaque, rénale et hépatique.

Chez l'homme : cancer de la prostate, adénome de la prostate.

Chez la femme : seule l'**androstanolone** locale est autorisée dans le lichen vulvaire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez le sportif : produit inscrit sur la liste des produits dopants, dépisté lors des tests effectués dans le cadre de la lutte contre le dopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritabilité, prise de poids, séborrhée, acné, rétention hydrosodée, hypercalcémie.

Avec les formes orales : augmentation des lipides sanguins (cholestérol, triglycérides).

Gynécomastie (par aromatisation en œstrogènes) en cas de surdosage.

Polyglobulie.

Rares hépatites cholestatiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Anticoagulants** : surtout avec les formes injectables, surveiller les fluctuations de l'INR.

## HYPOGONADISMES (2)

### Hypogonadismes hypothalamo-hypophysaires

#### Causes

La cause de ces hypogonadismes est un déficit en gonadotrophines, d'où leur dénomination d'hypogonadismes hypogonadotrophiques.

Ils peuvent être isolés ou associés à d'autres déficits hypothalamo-hypophysaires (cf. Insuffisance hypophysaire).

Il y a deux variétés d'hypogonadismes hypothalamo-hypophysaires :

- les hypogonadismes congénitaux apparaissant avant la puberté (prépubertaires) se traduisent par l'absence de développement pubertaire (impubérisme). Le plus fréquent est le syndrome de Kallmann-de Morsier qui s'accompagne d'une anosmie ;
- les hypogonadismes acquis : tumoraux, infectieux, traumatiques, etc.

#### Traitement médical

Les modalités du traitement sont celles indiquées pour le traitement de l'insuffisance gonadotrope (cf. Insuffisance hypophysaire).

##### ► *Traitement substitutif par les hormones gonadiques*

Lorsque la puberté est induite et quand il n'y a pas de désir de descendance, on s'adresse aux hormones gonadiques qui seront administrées au long cours :

- **testostérone** chez l'homme ;
- **17- $\beta$ -estradiol** (1 à 2 mg/j par voie orale ou sous forme de gel ; 25 à 100  $\mu$ g/j sous forme de patch) associé la **progestérone naturelle** (100 à 200 mg/j) ou à un **progestatif de synthèse** chez la femme.

##### ► *Recours aux gonadotrophines*

Le traitement substitutif sera suspendu à chaque fois que le ou la patient(e) souhaitera procréer. On utilisera alors les **gonadotrophines** ou la pompe à **LH-RH** pour induire l'ovulation ou stimuler la spermatogenèse.

## GYNÉCOMASTIES (1)

La gynécomastie est l'augmentation non tumorale du volume d'un ou des deux seins chez l'homme. Elle est la conséquence d'une hyperplasie mammaire en réponse à un déséquilibre local ou systémique entre œstrogènes et androgènes. Elle est souvent physiologique, mais le diagnostic de gynécomastie idiopathique ne doit être porté qu'après avoir éliminé une cause endocrinienne, tumorale ou iatrogène.

### Étiologies

#### Gynécomasties physiologiques

- Gynécomastie néonatale.
- Gynécomastie pubertaire.
- Gynécomastie du sujet âgé.

#### Gynécomasties d'origine tumorale

- Tumeurs endocrines du testicule (leydïgome, tumeurs à cellules de Sertoli).

- Adénomes hypophysaires.
- Tumeurs surrénaliennes œstrogénosécrétantes (exceptionnelles).
- Gynécomasties paranéoplasiques.

#### Causes endocriniennes

- Hypogonadismes hypergonadotrophiques (syndrome de Klinefelter).
- Hypogonadisme hypogonadotrophique (adénomes hypophysaires).
- Pseudo-hermaphrodismes masculins.
- Hyperthyroïdie.

#### Causes générales

- Insuffisance hépato-cellulaire, quelle qu'en soit la cause.
- Insuffisance rénale chronique (en début d'hémodialyse).
- Traumatismes thoraciques, atteintes de la moelle dorsale.

## GYNÉCOMASTIES (2)

## Causes médicamenteuses

Hormones et antihormones	<b>œstrogènes</b> <b>Androgènes</b> aromatisables en œstrogènes : <b>testostérone</b> et ses esters <b>Antiandrogènes stéroïdiens</b> (acétate de <b>cyprotérone</b> ) et <b>non stéroïdiens</b> (flutamide, nilutamide, <b>CASODEX</b> ) <b>Inhibiteurs de la 5-<math>\alpha</math>-réductase</b> : <b>finastéride</b> <b>Hormone gonadotrope</b> : <b>HCG</b> <b>Agonistes de la LH-RH</b> <b>Antiminéralocorticoïdes</b> : <b>spironolactone</b> , <b>canrénoate de potassium</b> <b>Anticortisolique</b> : <b>OP'DDD</b>
Médicaments de la sphère digestive	<b>Cimétidine</b> <b>Métoclopramide</b>
Anti-infectieux	<b>Imidazolés</b> : <b>kétoconazole</b> , <b>métronidazole</b> <b>Isoniazide</b>
Médicaments cardiovasculaires	<b>Digitaliques</b> : <b>digoxine</b>
<b>Antihypertenseurs</b> : <b>méthyldopa</b> , <b>réserpine</b>	<b>Amiodarone</b> <b>Vérapamil</b> <b>Nifédipine</b>
Psychotropes	
<b>Antipsychotiques</b>	<b>Phénothiazines</b> : <b>chlorpromazine</b> , <b>perphénazine</b> , etc. <b>Butyrophénones</b> : <b>halopéridol</b> , <b>dropéridol</b> , etc. <b>Benzamides</b> : <b>tiapride</b> , <b>sulpiride</b> , etc.
<b>Antidépresseurs tricycliques</b> : <b>clomipramine</b> , <b>imipramine</b> , etc.	
<b>Phénytoïne</b>	
Chimiothérapie anticancéreuse	<b>Agents alkylants</b> <b>Vindésine</b>

## Traitement

C'est avant tout celui de la cause. Dans 20 à 30 % des cas, on ne retrouve aucune étiologie et on porte le diagnostic de gynécomastie idiopathique.

- **Le traitement médical** des gynécomasties pubertaires ou idiopathiques est décevant, mal évalué et ne se conçoit que dans

les formes récentes. On peut faire appel à un androgène non aromatisable et notamment à l'**androstanolone** sous forme de gel percutané (**ANDRACTIM**).

- **Le traitement chirurgical** s'impose en cas de gynécomastie volumineuse, mal supportée, ainsi que dans les formes non régressives à distance de la puberté.

## HIRSUTISME (1)

Il se définit par l'existence chez la femme d'une pilosité androgénodépendante à des endroits où elle n'existe pas normalement : visage, thorax, abdomen, périnée, face interne des cuisses, région lombaire.

Le traitement est fonction de l'origine de l'hyperproduction d'androgènes : surrénales, ovaires, ou d'une hypersensibilité de la peau.

Des mesures cosmétiques sont toujours indispensables : utilisées en attendant l'efficacité des traitements hormonaux (plusieurs mois), elles consistent en une épilation électrique pour le visage, à la cire, à la pince et une décoloration dans les autres régions du corps. Le rasage est interdit (stimulation du follicule pileux). Il existe un traitement local, non remboursé, ralentissant et prévenant la repousse des poils dont l'effet est visible après 2 mois d'utilisation et réversible à l'arrêt : l'**éflornithine hydrochloride (VANIQUA)**. Les effets secondaires sont modérés (érythème, irritation, etc.) et rares.

### Hyperandrogénies surrénaliennes

#### Tumeur surrénalienne androgénosécrétante

La chirurgie s'impose. Elle a été très simplifiée par la coelioscopie.

#### Blocs enzymatiques à révélation tardive

##### ► Freinage surrénalien

L'**hydrocortisone** à la dose de 20 mg/j permet d'éviter l'hypersecrétion d'ACTH réactionnelle au déficit relatif en cortisol et cor-

rige donc l'hyperandrogénie. Certains auteurs ont proposé l'utilisation de la **dexaméthasone (DECTANCYL)** dont l'action freinatrice est plus importante.

Les **corticoïdes** entraînent parfois plus d'effets secondaires que de bénéfices, surtout si le bloc est partiel.

##### ► Traitement antiandrogénique

Il peut être associé au traitement corticoïde ou prescrit seul, surtout lorsque le bloc est de faible intensité.

On utilise de l'**acétate de cyprotérone (ANDROCUR)** à la dose de 50 mg/j pendant 21 j sur 28.

Ce traitement étant atrophiant pour la muqueuse utérine qui peut saigner de façon anarchique, il est associé à un **traitement œstrogénique (17- $\beta$ -estradiol)**. Ce dernier est prescrit de façon variable soit 21 j par cycle, soit durant les 2 dernières semaines de chaque cycle. Les doses sont adaptées pour chaque femme afin d'éviter un surdosage : douleurs mammaires, prise de poids.

- On privilégie la voie transdermique sous forme de gel percutané (**OESTROGEL, ESTREVA** gel, etc.) ou de patch (**ESTRADERM TTS, DERMESTRIL SEPTEM**, etc.).

- L'estradiol peut également être prescrit *per os* (**ESTROFEM, ESTREVA** cp., **OROMONE, PROVAMES**, etc.).

Le traitement est contraceptif à partir du 2<sup>e</sup> cycle. Il faut prévenir la patiente. La fertilité est recouvrée 2 cycles après l'arrêt du traitement.

## HIRSUTISME (2)

### Hyperandrogénies ovariennes

#### Tumeurs ovariennes androgénosécrétantes

Le traitement est chirurgical.

#### Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Il est responsable d'une aménorrhée ou spanioménorrhée associée à une hyperproduction d'œstrogènes et d'androgènes par les ovaires.

En dehors du désir de grossesse, il convient de freiner les ovaires pour traiter les conséquences de l'hyperfonctionnement ovarien et notamment l'hirsutisme.

##### ► Associations œstroprogestatives

Il est possible de freiner les ovaires par une pilule œstroprogestative contenant au moins 30 µg d'éthinylestradiol et un progestatif peu androgénique : **norgestimate**, **désogestrel** et **gestodène** (**MÉLODIA**, **MERCILON**).

##### ► Traitement antiandrogénique

C'est un traitement à la fois étiologique (antigonadotrope) et symptomatique (antiandrogène) dont les effets s'additionnent.

On peut utiliser l'acétate de cyprotérone (**ANDROCUR**) à la dose de 50 à 100 mg pendant 3 sem. par mois en association au 17-β-estradiol *per os* ou transdermique (3 sem. par mois). On peut aussi utiliser la **drospirénone** contenue dans **JASMINE** et **JASMINELLE**.

### Hirsutisme idiopathique

Il n'est pas dû à un excès de la production d'androgènes, mais à une sensibilité accrue du follicule pileux à l'action des androgènes.

Le traitement antiandrogénique doit être discuté en fonction de l'intensité de l'hirsutisme, de la gêne esthétique et du psychisme de la femme.

Il doit tenir compte des contre-indications : hyperlipidémies, diabète non insulino-dépendant, obésité importante, risques veineux.

Il associe **ANDROCUR**, 1 cp. pendant 21 j et du 17-β-estradiol par voie transdermique.

Le traitement doit être prolongé pendant 3 ans au moins pour juger des résultats, en raison de la longueur du cycle pileux.

## HYPERTHYROÏDIE (1)

L'hyperthyroïdie se traduit par la production excessive des hormones thyroïdiennes, dont la conséquence est la thyrotoxicose.

L'hyperthyroïdie la plus fréquente est d'origine immunitaire : c'est la maladie de Basedow, conséquence de la stimulation non régulée de la thyroïde par des anticorps se fixant sur les récepteurs de la TSH. Le traitement consiste à bloquer la sécrétion thyroïdienne jusqu'à ce que la maladie s'éteigne d'elle-même. En revanche les hyperthyroïdies tumorales (nodules toxiques, goîtres nodulaires toxiques) doivent, dans la plupart des cas, être opérées.

### Maladie de Basedow non compliquée

#### Traitement d'attaque

##### ► Mesures générales

- Repos physique (arrêt du sport) et psychique (arrêt de travail si besoin).

- **Anxiolytiques** type **benzodiazépines** (**LEXOMIL**) si besoin : 1/4 cp. matin et midi ; 1/2 cp. le soir.

- **β-bloquant non cardiosélectif**, ex : **propranolol** (**AVLOCARDYL**) 1/2 à 1 cp. × 3 à 4/j ou **AVLOCARDYL LP** 1 à 2 gél./j en cas de palpitation.

- Réalisation systématique d'un ECG (ou au minimum auscultation cardiaque) à la recherche d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire (AC/FA).

- Vérification de l'absence de grossesse et prescription d'une contraception efficace.

##### ► Antithyroïdiens de synthèse (ATS)

- Le **carbimazole** (**NÉO-MERCAZOLE**) est prescrit en première intention, à raison de 40 à 60 mg/j soit 2 à 3 cp. à 20 mg/j en 1 ou 2 prises.

Surveillance hématologique : RISQUE D'AGRANULOCYTOSE IMMUNO-ALLERGIQUE.

- NFS tous les 10 j pendant les 2 premiers mois puis mensuelle ; arrêt des **ATS** si neutropénie  $< 1\ 200/\text{mm}^3$ . Le malade doit être prévenu de la nécessité de faire pratiquer en urgence une NFS en cas de fièvre, angine ou toute autre pathologie infectieuse.

En cas d'intolérance au **carbimazole**, on a recours aux autres **ATS** : **benzylthiouracile** (**BASDÈNE**) ou **propylthiouracile** (**PROPACYL**).

##### ► Durée du traitement d'attaque : 2 mois

À cette phase, le dosage de la T4 libre (T4L) ou de la T3 libre (T3L) en cas d'hyperthyroïdie à T3 est à réaliser à partir de la 4<sup>e</sup> sem., et pas avant. Surveillance régulière de T4 et TSH. La surveillance de T3 n'est pas systématique.

#### Traitement d'entretien

Il y a deux possibilités :

##### ► Diminution progressive de la dose d'ATS

Diminution de la dose d'**ATS** (par exemple : 40 - 30 puis 20 mg de **NÉO-MERCAZOLE**/j) jusqu'à normalisation des signes cliniques et des taux de T4L (ou T3L) et TSH. On atteint en général une dose d'entretien de 15 à 10 mg/j. Il convient alors de répéter les dosages des index hormonaux.

##### ► Association d'ATS

##### et de **lévothyroxine sodique**

Elle consiste à maintenir les **ATS** à des doses supérieures aux doses précédentes (20 à 40 mg/j de **NÉO-MERCAZOLE** par exemple) et, pour éviter un passage en hypothyroïdie iatrogène, d'ajouter du **LÉVOTHYROX** (75 à 100 µg/j) dès l'obtention de l'euthyroïdie. Dans ce cas le dosage des index hormonaux est suffisant tous les 3 ou 4 mois.

Durée du traitement d'entretien : 18 à 24 mois, puis arrêt progressif sur 2 mois.



## ANTITHYROÏDIENS DE SYNTHÈSE

## ■ Benzylthiouracile

<b>BASDÈNE</b>					
Traitement d'attaque : 9 à 12 cp./j	50 cp. 25 mg	3,86	I	65 %	0,08
Traitement d'entretien : 2 à 4 cp./j					

## ■ Carbimazole

<b>NÉO-MERCAZOLE</b>					
Traitement d'attaque : 40 à 60 mg/j	50 cp. 5 mg	3,81	I	65 %	0,08
Traitement d'entretien : 10 à 15 mg/j à atteindre progressivement	30 cp. 20 mg	4,52	I	65 %	0,15

## ■ Propylthiouracile

<b>PROPYLEX</b>					
Traitement d'attaque : 6 à 9 cp./j	30 cp. 50 mg	8,88	I	65 %	0,30
Traitement d'entretien : 1 à 4 cp./j	90 cp. 50 mg	25,55	I	65 %	0,28

## PROPRIÉTÉS

Les thiourés (**benzylthiouracile**) et les imidazoles (**carbimazole**) bloquent l'activité de la thyroïde en inhibant l'organification de l'iode et la transformation des iodotyrosines en iodothyronines. Le **propylthiouracile** (PTU) inhibe en outre la conversion périphérique de la T4 en T3.

## INDICATIONS

Hyperthyroïdies diffuses.  
Préparation à la thyroïdectomie de toutes les hyperthyroïdies.

## CONTRE-INDICATIONS

Cancers thyroïdiens différenciés.  
Hémopathies préexistantes.  
Insuffisance hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## • Grossesse

Les **ATS** traversent la barrière placentaire. Il n'y a pas de contre-indication absolue mais le traitement par **ATS** doit être prescrit à la dose la plus faible possible et sous surveillance (cf. Hyperthyroïdies - Formes particulières).

Avant la 7<sup>e</sup> sem., il faut prescrire le **propylthiouracile** car il y a un risque d'aplasie du cuir chevelu chez l'enfant avec le **carbimazole**.

• **Allaitement** : contre-indiqué car les **ATS** sont excrétés dans le lait.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Leuconéutropénie modérée

Une leucopénie entre 3 500 et 4 000/mm<sup>3</sup> et une neutropénie = 1 500/mm<sup>3</sup> sont fréquentes au cours de l'hyperthyroïdie : elles ne contre-indiquent pas les **ATS**. La surveillance rapprochée de la NFS permet de s'assurer de sa normalisation spontanée. L'arrêt s'impose si les PNN sont < 1 200/mm<sup>3</sup>.

L'agranulocytose, rare mais grave, est de mécanisme immunoallergique (0,5 % des cas).

L'allergie au **carbimazole** n'est pas forcément croisée avec une allergie au PTU.

Surveillance de la NFS tous les 10 j pendant 2 mois puis tous les mois et si fièvre, angine ou toute autre infection.

L'aplasie médullaire est exceptionnelle.

## Accidents digestifs

Nausées, vomissements et épigastralgies.  
Toxicité hépatique : le **carbimazole** peut entraîner un ictère cholestatique pur ; le PTU peut provoquer une cytolysse.

## Réactions cutanées

Rash érythémateux, urticaire, arthralgies et myalgies.

## Augmentation du volume du goitre

Cette manifestation se rencontre lors de traitements prolongés sans surveillance ou en cas de surdosage par les **ATS**. Il existe toujours une hypothyroïdie associée. Cet inconvénient est évité par l'adjonction de **L-thyroxine**.

## HYPERTHYROÏDIE (2)

### Rechutes

La rechute est souvent annoncée par la persistance des anticorps antirécepteurs de la TSH à la fin du traitement.

Le traitement médical peut être repris pour une nouvelle cure de 16 à 18 mois si le goitre est petit, les signes peu intenses et le patient hostile à un traitement radical.

Dans tous les autres cas, on préfère un traitement radical : chirurgie ou **iode radioactif** après préparation par **antithyroïdiens de synthèse**, afin de traiter en euthyroïdie. S'il existe une contre-indication aux **ATS** : solution de **LUGOL** et/ou  **$\beta$ -bloquants**.

#### ► Chirurgie

Indications préférentielles de la chirurgie :

- gros goitre,
- thyroïdes nodulaires,
- difficultés de suivi,
- femmes jeunes désirant procréer.

• Technique : thyroïdectomie subtotale laissant un « mur » postérieur de volume thyroïdien d'environ 6 à 8 g. (Une thyroïde normale pèse 10 à 15 g.)

• Inconvénients :

- rares : lésions des nerfs récurrents, hypoparathyroïdie ;
- rechutes : 7 % ;
- hypothyroïdies : en cas de geste large.

• Surveillance postopératoire : dosage de la T4L et de la TSH après un mois, puis tous les 3 mois pendant un an, annuellement ensuite.

#### ► Iode radioactif (IRA)

• Indications de l'IRA :

- goitre diffus, petit ou modéré ;
- absence de surcharge iodée ;
- personnes âgées ou difficiles à opérer.

• Contre-indication : grossesse, incontinence urinaire.

• Prévenir les femmes jeunes ou en âge de procréer de la nécessité d'une contraception efficace 6 mois après la dose d'iode.

• Nécessité d'interrompre la préparation par **ATS** 5 j avant la dose d'iode.

• Inconvénients : rechutes en cas de doses insuffisantes et surtout hypothyroïdies à long terme (30 %).

• Inconvénients : rechutes en cas de doses insuffisantes et surtout hypothyroïdies pouvant survenir à long terme (30 %).

• Surveillance : dosage de la T4L et de la TSH toutes les 4 à 6 sem. pendant les 3 premiers mois, puis à 6 mois (ou en fonction de la clinique), puis annuellement.

### Maladies de Basedow compliquées

#### Cardiomyopathies

##### ► Troubles du rythme

•  **$\beta$ -bloquants non cardiosélectifs** : on utilise **AVLOCARDYL** : 80 à 160 mg/j.

• **Anticoagulants** systématiques en cas d'AC/FA.

##### ► Insuffisance cardiaque

Elle guérit avec l'hyperthyroïdie mais peut persister chez les sujets âgés ou au cœur antérieurement lésé.

#### Exophtalmies sévères

##### ► Mesures locales

• Protection cornéenne par larmes artificielles et collyre de **méthylcellulose (CELLUVISC)** : 1 g x 2 à 7/j ; lunettes sombres et enveloppantes, **collyre antibiotique** dans les formes sévères.

• Occlusion des yeux la nuit par adhésif sur les paupières, position tête surélevée pour diminuer l'œdème.

##### ► Mesures générales dans les formes malignes

• **Corticothérapie** : **prednisone** ou **prednisolone (CORTANCYL, SOLUPRED)** : 1 à 2 mg/kg/j. Traitement d'une durée de 1 mois en diminuant progressivement la corticothérapie de 20 mg chaque sem.

• **Radiothérapie externe rétro-orbitaire** : à la dose de 25 Gy seule ou associée aux **corticostéroïdes**.

• **Chirurgie** : en urgence pour décompresser le nerf optique ou à distance en cas d'atteinte séquellaire.

## IODE

## ■ Iode

**LUGOL FORT (SOLUTION DE)**

60 à 90 gttes/j en 3 prises (20 gttes avant chaque repas dans un peu de lait pour le goût)  
Le traitement ne doit pas dépasser quelques semaines

1 fl. (iodure métalloïdique 5 g + iodure de potassium 10 g + eau distillée qsp 10 mL)

NR

**PROPRIÉTÉS**

L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. L'apport souhaitable est de 250 à 300 mg/j.

En excès, l'iode bloque les mécanismes d'élaboration des hormones thyroïdiennes. Il est accumulé massivement dans la glande thyroïde puis est lentement éliminé dans les urines en plusieurs semaines ou mois.

**INDICATIONS**

Goitre endémique : prévention et traitement.  
L'administration d'**iode** à titre préventif se fait par iodation du sel de cuisine, ou de l'eau de boisson, ou plus rarement du pain. Ce traitement est réalisé à l'échelon national.

Hyperthyroïdie : l'**iode** est un traitement efficace des hyperthyroïdies diffuses (maladie de Basedow).

Il n'est utilisé qu'en cas de contre-indication des **antithyroïdiens de synthèse** et dans le but de préparer le patient à la chirurgie.

Il y a un phénomène d'échappement qui se traduit par la réapparition d'une hyperthyroïdie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'iode : des accidents graves peuvent survenir : œdème de Quincke, rashes généralisés.

**Grossesse.**

Contre-indication formelle : blocage de la thyroïde fœtale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Iodisme : goût métallique de la salive, troubles digestifs, éruptions cutanées acnéiformes.

Allergie à l'iode.

Hypothyroïdies par blocage thyroïdien.

Hyperthyroïdies (effet Wolff-Chaikoff).

**Facteurs déclenchants d'une crise aiguë thyrotoxique**

- Traitement chirurgical ou par iode radioactif d'une hyperthyroïdie chez un patient mal préparé.
- Infection.
- Traumatisme.
- Intervention chirurgicale.
- Accouchement, toxémie gravidique.
- Acidocétose diabétique.

**Traitement d'une crise aiguë thyrotoxique**

- Hospitalisation en réanimation.
- Nursing.
- Refroidissement progressif en cas d'hyperthermie.
- Traitement du collapsus : **amines vasopressives**.
- **ATS** par voie digestive intensive (sonde gastrique) : **propylthiouracile** (80 à 100 mg).
- **Iodure de sodium IV** : 250 mg toutes les 6 h.
- **β-bloquant** s à forte dose : **AVLOCARDYL** 140 mg/j.
- **Corticoïdes** : 1 mg/kg/j.

## HYPERTHYROÏDIE (3)

### Hyperthyroïdies tumorales

#### Adénome toxique

- Préparation par **ATS** systématique : **NÉO-MERCAZOLE** 40 mg/j jusqu'à euthyroïdie puis lobectomie ou **iode radioactif**.

#### Goitre multinodulaire toxique

Préparation par les **ATS** systématique comme pour l'adénome toxique puis **traitement chirurgical** (thyroïdectomie subtotale ou totale) ou **iode radioactif**.

### Hyperthyroïdies induites par l'iode

La plus fréquente est de loin l'hyperthyroïdie induite par la **CORDARONE**.

Arrêt total et définitif des produits iodés responsables. La plupart de ces hyperthyroïdies guérissent seules.

- Les **ATS** sont beaucoup moins efficaces qu'au cours des autres hyperthyroïdies et il convient de prescrire des doses supérieures ; certains préfèrent le **propylthiouracile** au **carbimazole**.

- Les **β-bloquants** sont indispensables.
- La corticothérapie est parfois utile (elle diminue la libération des hormones thyroïdiennes).

Le **perchlorate de potassium** est parfois utilisé dans les formes sévères.

L'essentiel est de pouvoir attendre l'élimination **spontanée** de l'iode, ce qui nécessite quelques semaines à plusieurs mois.

### Hyperthyroïdies de la femme enceinte

Il faut distinguer l'hyperthyroïdie de l'évolution physiologique de la TSH au cours de la grossesse. Un goitre, une auto-immunité et notamment des Ac antirécepteurs

de la TSH sont en faveur d'une maladie de Basedow.

#### Traitement médical par ATS

Les **ATS** sont autorisés chez la femme enceinte avec une préférence pour le **propylthiouracile** avant la 7<sup>e</sup> sem.

Le but est l'obtention d'une T4L dans les valeurs hautes de la normale, avec la dose la plus faible possible d'**ATS**. Ce traitement n'est pas tératogène et permet d'atteindre en général la fin de la grossesse sans problème. En raison de l'amélioration naturelle de la maladie de Basedow durant la grossesse il est souvent possible d'arrêter les **ATS** dans les derniers mois.

En revanche, la surveillance clinique et biologique s'impose dans le post-partum, l'hyperthyroïdie peut s'exacerber ou récider. Lorsque les anticorps antirécepteurs de la TSH sont présents à des taux élevés, une surveillance fœtale rapprochée par l'obstétricien est nécessaire.

L'allaitement est contre-indiqué chez une femme sous **ATS** (risque d'hypothyroïdie du nourrisson).

#### Traitement chirurgical

S'il est indispensable, il faut intervenir entre le 3<sup>e</sup> et le 6<sup>e</sup> mois.

### Hyperthyroïdies de l'enfant

- **Traitement médical** : toujours utilisé en premier. Il peut être nécessaire de recommencer 2 ou 3 fois la cure d'**ATS**.

- **Chirurgie** : meilleure solution en cas de récurrences rapides et/ou de gros goitre.

Il n'y a pas d'indication à un avortement thérapeutique, mais il est nécessaire d'éviter toute grossesse chez une femme non enceinte hyperthyroïdienne devant être traitée par **ATS**.

## HYPOTHYROIDIE (1)

### Forme habituelle non compliquée

Le traitement s'effectue en ambulatoire.

#### Traitement substitutif par lévothyroxine sodique

##### ► Posologie de départ

**LEVOTHYROX** : 1 cp. à 50 µg ou à 75 µg le matin, voire d'emblée 100 µg/j si l'hypothyroïdie est récente chez un sujet jeune.

##### ► Progression des doses

Paliers de 25 µg par sem. jusqu'à la dose finale d'équilibre (100 à 150 µg/j) jugée sur des taux de TSH normaux.

Le dosage de la TSH pour la surveillance doit être pratiqué 4 à 6 sem. après la dernière modification de posologie.

### Chez le sujet âgé ou avec antécédents de cardiopathie

#### Mesures générales

- Risques de crises d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde.
- Recherche et correction d'une anémie.
- Majoration du traitement de l'insuffisance coronarienne, s'il est déjà prescrit.
- Sinon, mise en route d'un traitement à titre préventif, en choisissant de préférence :

- soit un **β-bloquant** (en l'absence de contre-indication) de préférence cardiosélectif. Ex. : **SECTRAL** : 1 à 2 cp. à 200 mg/j ;
- soit un **inhibiteur calcique** en remplacement ou en complément du traitement

par **β-bloquants**. **ADALATE** (caps. à 10 mg) : 1 caps. x 3/j ou **LOXEN** 20 mg : 1 cp. x 3/j.

#### Traitement substitutif prudent et progressif

##### ► Dose initiale

**LEVOTHYROX** : 1/2 cp. à 25 µg. Surveillance clinique et ECG quotidienne au début.

##### ► Progression des doses

Paliers de 12,5 µg (**LEVOTHYROX** : 1/2 cp. à 25 µg) toutes les 2 sem.. La dose d'entretien doit rester en deçà des posologies « habituelles », au maximum 75 µg/j. On augmente ensuite la dose en fonction du contrôle hormonal réalisé 4 à 6 sem. plus tard.

##### ► En cas de douleur angineuse

Si des douleurs précordiales surviennent, la conduite à tenir est la suivante :

- ECG pendant la douleur ;
- prescrire une pulvérisation de **NATIS-PRAY** ;
- arrêter l'augmentation de **L-thyroxine** ;
- revenir au palier précédant la douleur pendant une semaine ;
- majorer le traitement de l'insuffisance coronarienne.

#### But du traitement

Chez le sujet cardiaque ou coronarien, on ne recherche pas à normaliser à tout prix la TSH. L'obtention d'une TSH à la limite supérieure de la normale est parfois suffisante.

#### Surveillance biologique de l'hypothyroïdie traitée

- La surveillance d'un patient atteint d'une hypothyroïdie primaire repose sur le dosage de la TSH.
  - Le dosage de la T4L peut être utile ; il est seul réalisé dans les hypothyroïdies d'origine haute.
  - Dans les hypothyroïdies d'origine haute, il faut d'abord substituer un déficit corticotrope.
  - Le dosage de la T3L est inutile.
- Une fois l'équilibre du traitement atteint, et en l'absence de pathologie intercurrente ou de signes cliniques, un contrôle annuel est suffisant.

## HYPOTHYROÏDIE (2)

### Hypothyroïdie fruste

Elle est définie par une TSH augmentée ( $> 4$  mU/L) avec une T4L normale, sur plusieurs dosages. Les stratégies de prise en charge ont fait l'objet d'un consensus [1].

La conduite à tenir est résumée dans le tableau suivant :

TSH $> 4$ mU/L + T4L normale à plusieurs reprises : recherche des Ac anti-TPO		
TSH $> 4$ mU/L + Ac anti-TPO négatif	TSH $> 10$ mU/L + Ac anti-TPO positifs ou facteurs de risque cardiovasculaires associés et notamment hypercholestérolémie	TSH $> 10$ mU/L
Contrôle de la TSH à 6 mois puis annuel en l'absence de normalisation (arrêt des dosages si TSH $< 4$ mU/L)	Envisager le traitement par <b>LÉVOTHYROX</b>	Traitement par <b>LÉVOTHYROX</b> indiqué

### Hypothyroïdie de l'enfant

Elle bénéficie du dépistage systématique fait sur le sang du cordon chez tout nouveau-né au 5<sup>e</sup> jour de vie.

#### Traitement substitutif

##### ► Enfant de moins de 1 an

On prescrit **LÉVOTHYROX** à la dose de 5 à 10  $\mu\text{g/kg/j}$ .

##### ► Dès l'âge de 9 mois

Les comprimés de **LÉVOTHYROX** dissous dans l'eau peuvent être utilisés pour traiter les athyréoses ou les ectopies thyroïdiennes.

##### ► Après 10 ans

On obtient un équilibre biologique satisfaisant avec des doses de 3 à 4  $\mu\text{g/kg/j}$ .

#### Surveillance

##### ► Clinique

Persistance de signes d'hypothyroïdie ou présence de signes d'hyperthyroïdie en faveur d'un surdosage.

On surveille le comportement. Un syndrome d'excitation passager est possible dans les premières semaines du traitement. La somnolence et la lenteur psychomotrice doivent faire craindre un sous-dosage.

On surveille les courbes de poids, de taille, et la maturation osseuse est suivie par des radiographies du squelette.

##### ► Biologique

T3, T4 libres et TSH ultrasensible en cas d'hypothyroïdie périphérique.

La TSH seule sera suffisante dès que l'équilibre hormonal sera atteint.

T3 et T4 libres sont indispensables si l'hypothyroïdie est secondaire (insuffisance antéhypophysaire).

### Grossesse

Les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent de 30 à 50 % pendant la grossesse. Il faut donc informer toute femme en âge de procréer, ayant une hypothyroïdie substituée par **LÉVOTHYROX**, d'augmenter la posologie de 30 à 50 % dès le début de la grossesse et de consulter rapidement son endocrinologue. Si le diagnostic est fait pendant la grossesse, il faut instituer rapidement un traitement substitutif. La surveillance biologique comportera un dosage de T4L et TSH tous les 1 à 2 mois. L'objectif est d'obtenir une TSH  $< 2,5$  mU/L et une T4L dans le tiers supérieur de la normale.

Il est impératif que la femme enceinte soit parfaitement équilibrée afin d'éviter le développement d'un goitre chez le fœtus. La posologie prescrite avant la grossesse est reprise après l'accouchement ; l'allaitement n'est pas contre-indiqué.

**HORMONES THYROÏDIENNES (1)****■ Lévothyroxine sodique**

<b>LÉVOTHYROX</b>					
La posologie de remplacement est de 1,5 µg/kg/j soit 100 à 150 µg/j en une seule prise le matin à jeun	30 cp. séc. 25 µg	1,34	II	65 %	0,04
	30 cp. séc. 50 µg	1,79	II	65 %	0,06
	30 cp. séc. 75 µg	2,28	II	65 %	0,08
	30 cp. séc. 100 µg	2,74	II	65 %	0,09
	30 cp. séc. 125 µg	3,20	II	65 %	0,11
	30 cp. séc. 150 µg	3,68	II	65 %	0,12
	30 cp. séc. 175 µg	4,14	II	65 %	0,14
	30 cp. séc. 200 µg	4,62	II	65 %	0,15
<b>L THYROXINE SERB</b>					
Seule forme injectable disponible (voie IM ou IV)	450 gttes (1 gtte = 5 µg) soluté buvable 15 mL conserver à + 4° C	4,77	II	65 %	0,01
	6 amp. 1 mL 200 µg/mL	HOP	II		

**■ Liothyronine sodique**

<b>CYNOMEL</b>					
Hypothyroïdie non traitée : posologie initiale est de 1/4 ou 1/2 cp. à adapter de façon hebdomadaire	30 cp. 25 µg	3,01	II	65 %	0,10

**■ Liothyronine sodique + lévothyroxine sodique**

<b>EUTHYRAL</b>					
Produit à n'utiliser que dans des cas très particuliers (comas thyroïdiens)	50 cp. 100 µg LT4 + 20 µg LT3	3,32	II	15 %	0,07

## HYPOTHYROÏDIE (3)

### Hypothyroïdies iatrogènes

Les produits les plus fréquemment en cause sont :

- surcharge iodée ;
- antithyroïdiens de synthèse ;
- lithium.

### Arrêt du traitement

Il n'est pas obligatoire si le médicament prescrit est indispensable.

Dans ce cas, on instaure le traitement substitutif. Les doses de **LÉVOTHYROX** sont variables entre 75 et 150 µg/j.

### Durée du traitement

Elle est variable : elle peut être passagère, tant que dure la prise du médicament en cause, ou définitive lorsque l'hypothyroïdie ne disparaît pas à l'arrêt du traitement (pathologie sous-jacente révélée par le traitement).

### Coma hypothyroïdien

C'est une urgence médicale qui devient assez rare depuis la généralisation des bilans thyroïdiens. C'est néanmoins une situation qui met en jeu le pronostic vital ; le patient est hospitalisé en unité de soins intensifs. Le traitement est débuté dès les prélèvements faits mais sans en attendre les résultats : tout retard thérapeutique assombrit le pronostic. Les dosages de T4L et TSH confirmeront le diagnostic *a posteriori*.

### Traitement symptomatique

► *Mise en condition du malade*

- Repos au lit. Patient à jeun.
- Mise en place d'une voie veineuse périphérique puis, si besoin, centrale.

- Pose d'une sonde nasale d'oxygène, d'une sonde urinaire et d'une sonde gastrique.

- Mise en place d'un monitoring cardiotensionnel.

► *Correction des troubles ventilatoires*

- Assurer la liberté des voies aériennes. Éviter l'encombrement bronchique (aspirations).

- Oxygénothérapie ; si nécessaire : intubation et ventilation assistée.

► *Réchauffement progressif*

Réchauffement externe passif : chambre à 25 °C, couvertures.

► *Correction des troubles hydroélectrolytiques*

Par des solutés iso- voire hypertoniques à cause de l'hyponatrémie. Si natriurèse basse : restriction hydrique ; si natriurèse élevée : apports sodés sous stricte surveillance de la pression veineuse centrale.

► *Correction des troubles cardiovasculaires*

Concentrés globulaires et solutés de remplissage type **VOLUVEN** en cas de collapsus. Il faut rester prudent avec les drogues inotropes en cas d'insuffisance cardiaque.

► *Traitement du facteur déclenchant*

Une antibiothérapie sera débutée par voie intraveineuse en cas de suspicion d'infection.

► *Nursing*

Commun à tous les malades hospitalisés en réanimation (soins des yeux, de la bouche, aspiration bronchique, prévention d'escarres, etc.), il est d'autant plus important que les patients atteints de coma myxoédémateux sont souvent âgés.



**HORMONES THYROÏDIENNES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'hormone active est la T3 mais l'hormone de remplacement utilisée est la T4. Elle est de durée plus longue (8 j), convertie en T3 dans l'organisme.

Absorption digestive rapide. Biodisponibilité : 50 %. Passage intact dans la circulation. Durée d'action : 1 sem.

Action sur la croissance et le développement, la calorigénèse, le système cardiovasculaire, le métabolisme de la cellule, et l'inhibition de la sécrétion de TSH.

La fraction libre représente la forme active. La LT4 ne passe pas la barrière placentaire, mais est retrouvée dans le lait maternel.

La tri-iodothyronine ou liothyronine (LT3) a une diffusion tissulaire rapide et une durée d'action de 48 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperthyroïdie, cardiopathie décompensée non hypothyroïdienne, troubles du rythme.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez le sujet âgé, la mise en route du traitement doit être très progressive.

Chez le sujet coronarien, le traitement doit être instauré sous surveillance clinique et ECG +  $\beta$ -bloquants.

Il doit être commencé à doses faibles par paliers de 8 à 15 j.

En cas de panhypopituitarisme, le traitement de l'insuffisance corticotrope doit primer.

**Grossesse** : le traitement peut être prescrit pendant toute la durée de la grossesse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aggravation d'une cardiopathie (angor, infarctus du myocarde, troubles du rythme).

Apparition de signes d'hyperthyroïdie (surdosage) : insomnie, excitabilité, tachycardie, céphalées, sueurs, amaigrissement, diarrhée, tremblements.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aux doses substitutives habituelles, les **hormones thyroïdiennes** n'ont pas d'interactions médicamenteuses. Ce n'est qu'en cas de surdosage qu'apparaissent les effets.

Seuls les patients sous **anticoagulants** doivent être surveillés plus étroitement au début du traitement par **hormones thyroïdiennes**.

Les **sels de fer**, les **pansements gastriques**, les **inhibiteurs de la pompe à protons** et la **colestyramine** diminuent l'absorption digestive de la **lévothyroxine** et doivent donc être administrés à distance.

Hypothyroïdies de l'enfant : cf. Hypothyroïdies de l'enfant (pédiatrie).

## HYPOTHYROÏDIE (4)

### Traitement étiologique

#### ► Corticothérapie

Systématique en raison de l'éventualité d'une insuffisance surrénale fonctionnelle résultant de l'hypométabolisme.

**Hémisuccinate d'hydrocortisone** en continu à la seringue électrique 100 à 200 mg/24 h. La posologie est progressivement diminuée en fonction de l'évolution.

#### ► Traitement de l'insuffisance thyroïdienne

**L-thyroxine injectable (L THYROXINE SERB) :**

- 1<sup>er</sup> jour : dose d'attaque de 500 µg à perfuser sur 2 h à la seringue électrique ou en perfusion ;
- les jours suivants, la dose d'entretien est variable : 100 à 200 µg/24 h selon l'évo-

lution clinique, la tolérance et l'état coronarien.

Dès que l'alimentation devient possible, un traitement par voie orale prendra le relais de la voie veineuse.

#### ► Surveillance

Elle est commune à toute réanimation. On insiste surtout sur la surveillance cardiaque à la recherche de signes cliniques, électriques et biologiques traduisant une ischémie.

#### ► Évolution

Pronostic sombre : 50 % de décès.

À la sortie de réanimation, il est impératif de pratiquer un bilan complet d'hypothyroïdie et surtout de motiver le patient à prendre régulièrement le traitement substitutif.

### CONSENSUS

[1] Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge, HAS, 2007

## IODE ET ALIMENTATION

### Besoins en iode

Les besoins en iode sont couverts essentiellement par l'eau et par les apports alimentaires.

Ils sont de 150 µg/j chez l'adulte et 200 µg/j pendant la grossesse. Ils correspondent à la quantité d'iode contenue dans les hormones thyroïdiennes (la quantité d'iode contenue dans les hormones thyroïdiennes chez un sujet adulte étant de 200 µg/j environ).

### Carences iodées

En France, la carence iodée existe dans certaines régions : Bretagne, pourtour du Massif Central, Vosges, Savoie. Elle est palliée par l'apport iodé du sel de table.

### Excès d'iode

Il ne peut pas être alimentaire car les apports ne sont pas suffisamment importants ou prolongés. La saturation iodée est toujours médicamenteuse : le plus souvent par la **CORDARONE** et les produits de contraste iodés.

### Aliments riches en iode

ALIMENT	RICHESSSE EN IODE (mg p.100 g)
Algue marine	700
Morue fraîche	0,50
Farine de poisson	0,10
Hareng fumé	0,10
Soja	0,10
Hareng frais	0,10
Crabe	0,04
Langouste	0,03
Homard	0,03
Haricot vert	0,03
Oignon	0,02
Sardine	0,016
Saumon	0,013
Anguille	0,010
Maquereau	0,010
Merlan	0,010
Viande Pain Pommes de terre	Traces

## THYROÏDITES

### Thyroïdite de De Quervain

Il s'agit d'une inflammation subaiguë de la glande thyroïde, souvent secondaire à une infection virale ; elle débute de façon brutale et bruyante mais évolue en général vers la guérison.

Le traitement est purement symptomatique et n'influe pas sur l'évolution spontanée de la maladie. Il permet simplement de faire disparaître en quelques jours les douleurs et les signes inflammatoires.

#### Forme peu douloureuse

- Aspirine à la dose de 3 g/j (**ASPÉGIC** 1000).
- Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** : par exemple **diclofénac** (**VOLTARÈNE**) comprimés à 50 mg 3 fois/j, ou suppositoire à 100 mg 1/j, calmement bien les signes locaux (douleurs cervicales, pharyngées). On peut y associer un **antalgique** type **paracétamol**.

#### Forme sévère (douleur importante

+ altération de l'état général

+ signes d'hyperthyroïdie)

- **Corticoïdes** type **prednisone** (**CORTANCYL**) à la dose de 20 à 40 mg/j (selon le poids et la taille) pendant 2 sem.

Ce traitement, remarquablement efficace, est un vrai test diagnostique et thérapeutique : l'état général s'améliore ainsi que l'asthénie et les douleurs disparaissent en 24 à 48 h.

La corticothérapie est progressivement arrêtée sur 4 à 6 sem.

Un rebond est possible en cas d'arrêt trop précoce qui n'influe pas sur l'évolution de la maladie ; la corticothérapie peut être reprise.

- Si syndrome thyrotoxique : **β-bloquants** type **propranolol** (**AVLOCARDYL**) : 80 à 120 mg/j en plusieurs prises. Les **ATS** ne sont pas recommandés.

#### Forme évolutive

Le plus souvent (80 % des cas) elle guérit vite et bien en quelques semaines.

La phase initiale est suivie d'une phase d'hypothyroïdie transitoire (biologique et/ou clinique) au cours de laquelle il peut être utile de prescrire de la thyroxine (**LÉVOTHYROX**).

Il existe un risque d'hypothyroïdie définitive à long terme.

### Thyroïdite auto-immune de Hashimoto

Il s'agit d'une atteinte auto-immune de la glande thyroïde, caractérisée par une infiltration lymphoplasmocytaire du parenchyme, évoluant à plus ou moins long terme vers la destruction de la glande, donc vers l'hypothyroïdie. Elle est associée à la présence d'auto-Ac anti-TPO ± antithyroglobuline.

#### Traitement de l'hypothyroïdie

Il dépend de l'intensité de l'hypothyroïdie. La prescription de LT4 (**LÉVOTHYROX**) a un double intérêt :

- elle permet de limiter l'augmentation de volume de la glande thyroïde (freinage) ;
- elle remplace le déficit de sécrétion hormonale, constant au cours de la thyroïdite de Hashimoto (substitution).

#### Traitement du goitre

Si le goitre devient compressif ou comporte des nodules volumineux ou évolutifs, un traitement chirurgical est indiqué. Il sera suivi par une hormonothérapie thyroïdienne substitutive définitive.

## CANCER DE LA THYROÏDE (1)

### Cancers thyroïdiens différenciés

Les cancers différenciés de la thyroïde, dérivés des cellules vésiculaires, sont les plus fréquents. Parmi eux, on distingue les cancers *papillaires* (environ 90 % des cas) et les cancers *vésiculaires* (environ 5 % des cas).

Ces cancers différenciés gardent la possibilité de fixer l'iode, possèdent des récepteurs de la TSH et sécrètent de la thyroglobuline, propriétés qui sont mises à profit pour leur traitement et leur surveillance.

Les cancers thyroïdiens différenciés sont de bon pronostic : leur extension est essentiellement locorégionale, touchant les ganglions jugulo-carotidiens. Elle peut aussi être générale, entraînant des métastases pulmonaires, osseuses et cérébrales qui gardent en général l'aptitude à fixer l'iode.

Le traitement repose sur un trépied : la chirurgie, l'administration d'**iode radioactif (IRA)** et l'hormonothérapie thyroïdienne freinatrice.

La surveillance doit être régulière, permettant un dépistage précoce des récidives.

La prise en charge des cancers thyroïdiens différenciés a fait l'objet d'un consensus d'experts de la Société française d'endocrinologie [1].

### Chirurgie

#### ► Technique

##### • Elle comporte :

- une *thyroïdectomie totale* réalisée d'emblée si le diagnostic de cancer a été fait en préopératoire ou en deux temps si le diagnostic est fait lors de l'examen anatomopathologique extemporané, qui est indispensable lors de l'exérèse de tout nodule thyroïdien. Si une lobo-isthmectomie a été réalisée en raison d'un examen extemporané faussement négatif, il faut envisager de réintervenir pour totaliser la thyroïdectomie (sauf en cas de lésion infracentimétrique, unifocale, non extensive) ;

- lors de l'intervention, une *exploration minutieuse des ganglions jugulo-carotidiens homolatéraux* (jugulo-carotidiens) et centraux (région récurrentielle sus- et sous-isthmique) est indispensable. Toute suspi-

cion d'invasissement ganglionnaire impose un curage, dont l'étendue sera variable. Certaines équipes réalisent des curages ganglionnaires prophylactiques, plus ou moins étendus.

#### ► Incidents, accidents

- Lésions des nerfs récurrents (paralysie des cordes vocales) ou des nerfs laryngés externes (faiblesse de la voix).

- Hypoparathyroïdie transitoire ou définitive (nécessité d'une supplémentation vitaminocalcique pendant les 3 mois qui suivent la chirurgie).

- Hématome de la loge thyroïdienne.

Ces problèmes sont d'autant plus rares que le chirurgien est entraîné.

### Traitement par iode radioactif ( $I^{131}$ )

Il est destiné à totaliser la thyroïdectomie en détruisant le tissu thyroïdien normal et les éventuels foyers tumoraux qui auraient persisté.

#### ► Modalités

La totalisation par l'iode est pratiquée environ 4 à 6 sem. après la chirurgie, après sevrage en **hormones thyroïdiennes** ou après une injection préalable de **TSH recombinante humaine (THYROGEN)**. On administre habituellement une dose de 100 mCi (3 700 MBq).

On effectue dans la semaine qui suit une scintigraphie qui renseigne sur les reliquats thyroïdiens laissés en place et les éventuelles métastases ganglionnaires ou extracervicales.

#### ► Indications

- Pas de totalisation par l'iode radioactif en cas de lésion unifocale infracentimétrique sans extension tumorale locale et à distance, sans histologie défavorable.

- Totalisation par 100 mCi en cas d'extension tumorale périthyroïdienne (tumeur pT3 de la classification TNM OMS de 2002), de métastases ganglionnaires cervicales ou à distance ou d'exérèse tumorale incomplète non réopérable.

- Pas de consensus actuel dans toutes les autres situations. L'indication de totalisation doit être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) en milieu spécialisé.

## CANCER DE LA THYROÏDE (2)

### ► Précautions

Avant l'administration d'iode radioactif, il faut :

- éviter toute surcharge iodée alimentaire ou médicamenteuse ;
- s'assurer que le taux plasmatique de la TSH est suffisamment élevé ( $> 30$  mU/L) ;
- s'assurer de l'absence de grossesse en cours chez les femmes en âge de procréer et de la prescription d'une contraception efficace dans l'année suivant l'administration de la dose d'iode ;
- prescrire une corticothérapie de courte durée pour prévenir les phénomènes inflammatoires cervicaux en cas de reliquats thyroïdiens post-chirurgicaux très volumineux.

### Traitement hormonal freinateur

L'hormonothérapie thyroïdienne s'impose pour tous les patients opérés d'un cancer thyroïdien quelle qu'ait été l'ampleur de l'exérèse, qu'il y ait eu ou non traitement radio-isotopique complémentaire. On administre donc, dans ce cas, la **L-thyroxine (LÉVOTHYROX)** à la dose maximale tolérée pour freiner suffisamment la sécrétion hypophysaire de TSH.

La dose habituelle est de l'ordre 2 à 2,5  $\mu\text{g/kg/j}$ , soit 150 à 200  $\mu\text{g/j}$  chez l'adulte. Il faut commencer d'emblée à une dose de 125 à 150  $\mu\text{g}$  au minimum, selon le poids du patient. En cas de suspicion de surdosage en **L-thyroxine (LÉVOTHYROX)**, il faut réaliser un dosage de T3L. Si celle-ci est au-dessus de la norme du laboratoire, il faut diminuer le dosage (de 25  $\mu\text{g}$  par exemple) de telle sorte que la TSH soit toujours freinée. Il n'est pas justifié de modifier le dosage si la T3L est normale (la T4L peut classiquement être un peu au-dessus de la normale).

Les objectifs pour la TSH sont ainsi fixés par le consensus français de 2007 [1], sauf contre-indication :

- $< 0,1$  mU/L lors du traitement initial et chez les patients non guéris ;
- dans les valeurs basses de la normale du laboratoire (entre 0,1 et 0,5 mU/L pour une normale de TSH  $> 0,1$  mU/L) chez les

patients en rémission ayant un cancer à haut risque ;

- entre 0,3 et 2 mU/L chez les patients en rémission et ayant un cancer à faible risque de récurrence.

### Surveillance

Son objectif est de dépister précocement les récurrences.

#### ► Moyens de la surveillance

- Elle repose essentiellement sur le dosage de la thyroglobuline (TG) tous les 6 à 12 mois. Un dosage de TSH et une recherche des anticorps anti-TG doivent être effectués simultanément.

- L'imagerie fait appel à l'échographie cervicale réalisée par un opérateur entraîné. Les indications de la scintigraphie à l'iode 131 avec balayage corps entier se sont restreintes ces dernières années. La tomographie d'émissions de positons (TEP) est parfois réalisée en 2<sup>e</sup> intention.

#### ► Modalités de la surveillance

##### À court terme

- Tumeur infracentimétrique sans extension (pas de totalisation par l'iode) : échographie cervicale et TG sous traitement freinateur sans stimulation.

- Cancer traité par thyroïdectomie totale suivie d'une totalisation par l'iode :

- à 3 mois : palpation cervicale, dosage de la TG et de la TSH ;

- à 6-12 mois : échographie cervicale, dosage de la TG après stimulation par la **TSH humaine recombinante (THYROGEN)** et dans certains cas particuliers (patient à risque élevé, présence d'anticorps anti-TG ou scintigraphie postopératoire suspecte ou peu informative) : nouvelle scintigraphie diagnostique après injection de 4-5 mCi d'**iode radioactif** ; la TSH humaine est utilisée à raison de 2 inj. IM de 0,9 mg, à 24 h d'intervalle, 4 j avant le dosage et la scintigraphie, sans interruption préalable du traitement freinateur ;

- ultérieurement, en dehors de toute anomalie à l'échographie, si la TG sous stimulation est inférieure au seuil institutionnel mais détectable (en général 5 à 7 ng/mL), il faut répéter l'échographie et le dosage de TG sous stimulation 6 à 12 mois plus tard.

## CANCER DE LA THYROÏDE (3)

### À long terme

- Patients guéris (absence d'anomalie échographique, TG stimulée indétectable, absence d'anticorps anti-TG) : contrôle annuel de la TSH et de la TG sans stimulation préalable et sans arrêt du traitement freinateur.
- Patients avec TG indétectable mais présence d'anticorps anti-TG : surveillance périodique par échographie, scintigraphie diagnostique et autres techniques d'imageries en fonction des signes cliniques. La disparition des anticorps est considérée comme une preuve de rémission.

### Traitement des récurrences

- Récurrences locorégionales et métastases à distance : administration d'une dose thérapeutique d'iode  $^{131}$ .
- Chirurgie des récurrences ganglionnaires et des métastases osseuses.
- Radiothérapie externe et chimiothérapie : en dernière intention seulement.
- **Inhibiteur de protéine tyrosine-kinase (sorafénib, NEXAVAR).**

Après traitement initial d'un cancer différencié de la thyroïde par thyroïdectomie totale et totalisation isotopique, un taux de TG indétectable après stimulation, en l'absence d'anticorps anti-TG, permet d'affirmer la guérison (1 % de rechute à 10 ans).

### Cancers indifférenciés

Le pronostic est effroyable.

La thyroïdectomie doit être précoce, avant l'apparition des métastases.

Ces cancers relèvent de chimiothérapie lourde et de radiothérapie externe cervicale, éventuellement associée à une chirurgie thyroïdienne.

### Carcinome médullaire de la thyroïde

Le cancer médullaire de la thyroïde (CMT) est développé aux dépens des cellules C parafofolliculaires dont la caractéristique est de sécréter la calcitonine.

Environ un tiers des CMT sont des formes familiales, le plus souvent associées à d'autres tumeurs endocriniennes (phéochromocytome, adénome parathyroïdien), qui entrent dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne de type 2 (NEM2 ou syndrome de Sipple). Il s'agit d'une atteinte multiglandulaire héréditaire autosomique dominante due à des mutations germinales du proto-oncogène RET situé sur le chromosome 10. Dans les formes familiales, les lésions carcinomateuses sont en général diffuses, bilatérales et multifocales et leur apparition est précédée par un stade d'hyperplasie des cellules C.

Le traitement du CMT est chirurgical : il consiste en une thyroïdectomie totale associée à un curage systématique du compartiment central du cou et des deux chaînes jugulo-carotidiennes. La calcitonine plasmatique est un marqueur fiable qui permet de juger de la présence de tissu néoplasique résiduel ou de l'apparition de métastases loco-régionales ou à distance (hépatiques, pulmonaires ou osseuses).

Chez les apparentés porteurs de la mutation du gène RET, la thyroïdectomie s'impose dès que le taux de la calcitonine s'élève au-dessus de 10 pg/mL lors du test à la pentagastrine.

Dans certaines formes familiales, il est souhaitable de réaliser une thyroïdectomie prophylactique.

Dans le NEM2, l'ablation du phéochromocytome doit précéder la thyroïdectomie.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge des cancers thyroïdiens différenciés de souche vésiculaire, SFE, 2007

**GOITRE SIMPLE - NODULES - GOITRES MULTINODULAIRES (1)****Goîtres simples**

Le goitre simple est une hypertrophie diffuse et homogène de la thyroïde sans dysfonction thyroïdienne. Il survient classiquement chez des patients ayant des antécédents familiaux de goitre, lors de la puberté, ou pendant la grossesse, avec d'importantes disparités régionales. La carence en iode est la principale étiologie du goitre. Le tabac est aussi un facteur favorisante. Un goitre doit être exploré en première intention par un dosage de TSH et une échographie.

Il n'y a pas de consensus pour la prise en charge thérapeutique du goitre simple. Les attitudes envisageables sont la surveillance clinique et échographique régulière ou la prescription d'hormones thyroïdiennes. L'objectif est d'empêcher l'augmentation de volume du goitre en freinant la sécrétion de TSH par l'hypophyse. Le traitement est d'autant plus efficace que le goitre est jeune, diffus, chez un sujet de moins de 40 ans, sans immunité thyroïdienne.

**Prescription**

Des doses de **L-thyroxine (LÉVOTHYROX)** de 75 à 125 µg/j sont en général suffisantes. La durée du traitement reste à codifier. Son efficacité disparaît lors de l'arrêt de la prescription.

**Surveillance**

Elle repose sur le dosage de la TSH 8 sem. après l'instauration du traitement (ou toute modification posologique) puis tous les 6 à 12 mois, une fois l'objectif de TSH atteint (c'est-à-dire après avoir obtenu une TSH dans les valeurs basses de la normale du laboratoire). L'échographie effectuée après 6 et 18 mois de traitement évalue son efficacité. On peut espérer une réduction de 25 à 30 % du volume du goitre en 6 à 12 mois.

**Nodule thyroïdien isolé**

C'est une pathologie très fréquente et le plus souvent bénigne, mais le risque est de ne pas laisser évoluer un cancer thyroïdien.

Le diagnostic repose sur l'échographie et la cytoponction thyroïdienne à l'aiguille fine. La scintigraphie ne doit pas être demandée d'emblée.

**Échographie**

Elle permet :

- de noter si le nodule est solide (structure échogène), kystique (structure anéchogène) ou mixte à la fois solide et kystique ;
- de le situer dans la thyroïde (lobe gauche ou droit, isthme), d'en mesurer le diamètre et d'en apprécier les contours ;
- de rechercher des signes en faveur de la malignité : nodule hypoéchogène, hypervascularisé au Doppler, avec des microcalcifications, de contours flous, avec un halo périphérique incomplet ;
- de déceler la présence d'adénopathie satellites suspectes ;
- de guider la cytoponction à l'aiguille fine.

Un nodule entièrement kystique est toujours bénin et ne doit pas faire l'objet de cytoponction exploratrice.

**Cytoponction**

C'est un examen qui consiste à ponctionner le nodule à l'aiguille fine. La cytoponction s'impose si le diamètre du nodule atteint 1-1,5 cm. Elle est réalisée sous échographie (cytoponction échoguidée) si le nodule n'est pas palpable ou mixte.

Elle permet de retirer quelques cellules que l'on analyse au microscope de façon à connaître la nature du nodule.

Une cytoponction négative n'élimine pas forcément le diagnostic de cancer lorsque le nodule est gros (diamètre > 3 cm).

L'examen doit être fait par une équipe (ponctionneur et cytologiste) entraînée.



## GOITRE SIMPLE - NODULES - GOITRES MULTINODULAIRES (2)

### Scintigraphie

Elle permet de différencier les nodules chauds (fixant l'iode radioactif), qui sont bénins dans presque 100 % des cas, des nodules froids (ne fixant pas l'iode radioactif), qui peuvent être bénins ou malins. Elle ne s'impose que si le nodule s'accompagne d'une TSH basse.

### Conduite thérapeutique

85 % des nodules isolés sont bénins.

La décision thérapeutique dépend de leur aspect échographique, de leur volume, du résultat de la cytoponction et de leur évolutivité :

- Nodule entièrement kystique : abstention thérapeutique ou ponction évacuatrice à l'aiguille s'il est volumineux et douloureux, chirurgie s'il récidive après ponction évacuatrice.

- Nodule solide < 1-1,5 cm : abstention thérapeutique et surveillance par échographie à 1 an puis plus espacée en cas de stabilité.

- Nodule solide > 3 ou 4 cm : discuter la chirurgie avec examen anatopathologique extemporané, parfois en dépit d'une cytoponction bénigne. Plus ou moins hormones thyroïdiennes.

- Nodule cytoponctionné avec cytologie bénigne : surveillance échographique (répéter la cytoponction en cas d'évolutivité du nodule).

- Nodule cytoponctionné avec cytologie en faveur de la malignité : indication chirurgicale.

- Nodule cytoponctionné avec cytologie douteuse : avis spécialisé.

- Nodule cytoponctionné avec cytologie non contributive : répéter la cytoponction.

### Goîtres multinodulaires

Il s'agit de goîtres anciens qui ont subi au cours du temps des remaniements ayant fait apparaître au sein du parenchyme glandulaire plusieurs nodules. La conduite

à tenir varie en fonction l'étiologie, du volume des nodules et de l'état fonctionnel (eu-, hyper- ou hypothyroïdie).

### Goitre multinodulaire euthyroïdien (TSH normale)

À ce stade, le traitement par la **L-thyroxine (LÉVOTHYROX)** est inefficace. La chirurgie est envisagée en cas de goitre compressif (dyspnée, dysphonie, dysphagie, circulation veineuse collatérale) ou de suspicion de malignité d'un ou plusieurs nodules.

En cas de nodules multiples, les plus volumineux et les plus suspects échographiquement doivent être ponctionnés en priorité. En cas de goitre multinodulaire avec de multiples nodules supracentimétriques, une scintigraphie peut être réalisée si la TSH est dans les valeurs basses de la normale (< 1 mUI/L) à la recherche de nodules chauds qui ne seraient pas à cytoponctionner.

La plupart des goîtres multinodulaires finiront par être opérés au bout de plusieurs années.

### Goitre multihétéronodulaire toxique (GMHT)

Au sein du goitre, certains nodules restent non fonctionnels, d'autres deviennent hyperfonctionnels ou toxiques.

La TSH est basse. La T4L est normale ou élevée.

Ces goîtres sont justiciables d'une thyroïdectomie, en général presque totale. En cas de contre-indication (sujets âgés), ils sont traités par **iode radioactif**.

### Goitre multinodulaire avec thyroïdite

Les nodules sont en général nombreux et de diamètre < 1 cm.

La recherche des anticorps antithyroïde est souvent positive, la TSH a tendance à augmenter.

Le traitement par la **L-thyroxine (LÉVOTHYROX)** doit être instauré en cas d'hypothyroïdie.

## HYPERPARATHYROIDIE PRIMAIRE (1)

### Définition

C'est une affection due à l'hyperfonctionnement d'une ou de plusieurs glande(s) parathyroïde(s), qui se traduit par une sécrétion exagérée de l'hormone parathyroïdienne ou parathormone (PTH), hormone clé du métabolisme phosphocalcique.

### Causes et mécanismes

- La cause principale de l'hyperparathyroïdie est l'adénome parathyroïdien, tumeur bénigne qui apparaît dans l'une des quatre parathyroïdes, les autres glandes étant par voie de conséquence mises au repos.
- L'hyperplasie des parathyroïdes (hyperfonctionnement des quatre parathyroïdes) et les adénomes multiples sont moins fréquents. Ils surviennent dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple (NEM de type 1 ou 2), dans laquelle l'hyperparathyroïdie est associée à d'autres tumeurs endocriniennes.
- Le cancer parathyroïdien est exceptionnel.

### Traitement chirurgical

La prise en charge de l'hyperparathyroïdie primaire fait l'objet d'un consensus d'experts de la Société française d'endocrinologie [1].

### Adénome parathyroïdien

Le seul traitement est chirurgical. C'est le traitement de première intention, même si l'hyperparathyroïdie est asymptomatique. L'intervention doit être conduite par un chirurgien expérimenté. Il existe deux types d'intervention :

- la chirurgie conventionnelle (par cervicotomie transverse) avec exploration des quatre glandes pour identifier l'adénome et ne pas méconnaître une atteinte multiglandulaire :

- la chirurgie mini-invasive (sous anesthésie locale) en cas d'adénome unique localisé en préopératoire (par échographie et scintigraphie au MIBI).

*Résultats :*

- Plus de 80 % de guérisons.
- Environ 15 % d'explorations négatives, 5 % de réinterventions, soit parce qu'un 2<sup>e</sup> adénome ou une parathyroïde hyperplasique ont été méconnus, soit parce que l'adénome était de siège ectopique (intra-thymique, intrathyroïdien, rétro-œsophagien ou médiastinal).

### Hyperplasie parathyroïdienne

Ablation de 3 parathyroïdes et d'une partie de la 4<sup>e</sup>. Si une tétanie postopératoire s'installe, elle est en règle jugulée par un traitement associant **alfacalcidol** et **calcium** (cf. Hypoparathyroïdie).

### Cancer parathyroïdien

Exérèse large avec ablation du lobe thyroïdien.

## AGENT ANTIPARATHYROÏDIEN

## ■ Cinacalcet

MIMPARA					
Hyperparathyroïdie secondaire : Poso. initiale : 30 mg x 1/j au cours du repas Adaptation des doses toutes les 2 à 4 sem. Poso. max. 180mg/j. Objectif : PTH intacte plasmatique : 150-300 pg/mL Cancer parathyroïdien : Poso. initiale 30 mg x 2/j puis augmentation toutes les 2 à 4 sem. jusqu'à 90 mg x 2/j pour atteindre une calcémie ≤ à la limite supérieure de la normale	28 cp. 30 mg	198,01	I	65 %	7,07
	28 cp. 60 mg	356,72	I	65 %	12,74
	28 cp. 90 mg	529,78	I	65 %	18,92

## PROPRIÉTÉS

Agent calcimimétique qui diminue directement le taux de parathormone (PTH) en augmentant la sensibilité du récepteur au calcium extracellulaire. La diminution du taux de PTH est associée à une réduction concomitante de la calcémie.

## INDICATIONS

Hyperparathyroïdie secondaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale.

Hypercalcémie chez les patients atteints de cancer de la parathyroïde.

Peut être utilisé dans le cadre d'un traitement comportant des **chélateurs du phosphate** et/ou des **analogues de la vitamine D** selon les besoins.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **cinacalcet**, patients de moins de 18 ans, allaitement.  
Déconseillé pendant la grossesse.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction d'hypersensibilité.

Anorexie, nausées, vomissements, dyspepsie.

Rash, myalgie, asthénie, hypocalcémie, diminution du taux de testostérone.

Vertige, paresthésies, crise convulsive.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **cinacalcet** est en partie métabolisé par le CYP3A4, donc un ajustement de sa posologie est nécessaire si un inhibiteur (**kétoconazole**, **voriconazole**, **ritonavir**, etc.) ou un inducteur (**rifampicine**) du CYP3A4 est administré de façon concomitante.

Le **cinacalcet** est un inhibiteur puissant du CYP2A6, d'où la nécessité d'adapter la posologie des médicaments métabolisés par le CYP2D6 (**flécaïnide**, **propafénone**, **métoprolol**, **désipramine**, **nortriptyline**, **clomipramine**, etc.).

## HYPERPARATHYROIDIE PRIMAIRE (2)

### Traitement médical

Lorsque l'intervention n'est pas possible (refus du patient, contre-indication), on devra respecter les règles suivantes :

- Apport normal en calcium (1 000 mg/j) et boissons abondantes.

- Abstention de médicaments hypercalcémiants (**diurétiques thiazidiques**, doses supra-physiologiques de **vitamine D**, **lithium**). En cas de carence en vitamine D, on apportera une supplémentation à faible dose (400 UI/j).

- Surveillance régulière de la calcémie, de l'albumine et de la fonction rénale, notamment en cas d'immobilisation.

- Réalisation d'une mesure de la densité osseuse tous les 2 à 3 ans puis adaptée à la pente évolutive. Discuter un traitement anti-ostéoporotique si la perte osseuse s'aggrave.

Dans l'hypercalcémie due à un cancer parathyroïdien récidivant ou inopérable, on dispose d'un agent calcimimétique qui

abaisse le taux de la PTH : le **cinacalcet (MIMPARA)**, qui se prescrit à raison de 2 cp. à 30 mg/j.

### Recherche d'une néoplasie endocrinienne multiple (NEM)

Les éléments de suspicion sont :

- le diagnostic à un âge jeune < 30 ans,
  - les antécédents familiaux d'hyperparathyroïdie primaire ou de NEM,
  - le caractère multiglandulaire de l'atteinte,
  - l'association à d'autres lésions de NEM.
- La découverte d'une NEM rend obligatoire la recherche d'une mutation et une enquête familiale.

#### NEM de type 1

Hyperparathyroïdie + adénome hypophysaire + tumeur endocrine duodénale ou pancréatique.

#### NEM de type 2 (syndrome de Sipple)

Cancer médullaire de la thyroïde + phéochromocytome + hyperparathyroïdie.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'hyperparathyroïdie primaire asymptomatique, SFE, 2004

## HYPOPARATHYROIDIE

Il s'agit des manifestations liées à l'insuffisance de sécrétion de l'hormone parathyroïdienne ou parathormone (PTH). Elle doit être différenciée de la pseudo-hypoparathyroïdie qui résulte de l'absence de réceptivité à la PTH et s'accompagne d'anomalies morphologiques.

### Principales causes

#### Chirurgicale

La chirurgie est la principale cause : post-thyroidectomie totale ou après chirurgie des parathyroïdes.

#### Auto-immune

Par exemple, dans le cadre d'un syndrome APECED (candidose cutanéomuqueuse, hypoparathyroïdie, insuffisance surrénale ± autres atteintes auto-immunes).

#### Congénitale

Syndrome de Di George : non-développement de la 3<sup>e</sup> poche pharyngée avec aplasie thymique et agénésie parathyroïdienne.

Hypocalcémie hypercalciurique familiale.

#### Secondaire à une hypomagnésémie sévère

Chez l'alcoolique chronique

En cas de malabsorption

### Traitement de fond

#### Il repose essentiellement sur les dérivés de la vitamine D3.

La vitamine D3 ou cholécalférol est synthétisée dans le tissu sous-cutané à partir du déhydrocholestérol. Pour être active, elle doit subir deux hydroxylations, d'abord en 25 au niveau du foie, puis en 1-alpha(OH)<sub>2</sub> au niveau du rein. Son rôle principal est de stimuler l'absorption intestinale du calcium.

C'est la PTH qui stimule la 1-hydroxylation. C'est pourquoi le traitement de l'hypoparathyroïdie doit faire appel à un dérivé 1-alpha hydroxylé :

– soit l'**alfacalcidol** ou **un-alpha (OH)<sub>2</sub> D3 (UN-ALFA)** : 1 gtte = 0,1 µg et 1 caps. = 0,25 µg ; la dose initiale est de 0,50 à 1 µg/j (2 à 4 cp.) ;

– soit le **1,25 (OH)<sub>2</sub> D3** ou **calcitriol (ROCAL-TROL)** qui est l'hormone active.

La posologie est de 0,25 à 2 µg/j, soit 1 à 4 caps. L'élimination du **calcitriol** est plus rapide que celle des autres dérivés.

La surveillance repose sur des dosages hebdomadaires puis bisannuels de calcémie, de phosphorémie et surtout calciurie des 24 h, urée et créatininémie, afin de prévenir tout surdosage avec ses risques rénaux : lithiase et néphrocalcinose. Il faut déceler les premiers signes d'intoxication par la **vitamine D** : anorexie, nausées, asthénie, polyuropolydipsie, hypercalcémie.

L'objectif est d'obtenir une calcémie normale basse ou juste en dessous de la normale du laboratoire.

On doit veiller à ce que l'apport calcique soit suffisant (au moins 1 500 mg/j), et si nécessaire prescrire une supplémentation calcique. Il faut penser à corriger une hypomagnésémie associée.

La **vitamine D** doit être poursuivie pendant la grossesse.

### Traitement de l'hypocalcémie aiguë

– C'est une urgence thérapeutique : perfusion IV lente d'une ampoule de **gluconate de calcium** à 10 % dans 100 mL de G5 %, éventuellement renouvelable et relais par 1 à 2 mg/kg et par heure de **calcium** élément IV.

– Surveillance électrocardiographique (risque de troubles du rythme en cas de correction trop rapide de la calcémie) : prescrire *per os* un dérivé hydroxylé de la vitamine D3 en débutant par de fortes doses (**ROCAL-TROL**, **UN-ALFA**) et, si besoin, un sédatif : **benzodiazépines (LEXOMIL**, 1/2 à 1 cp./j).

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (1)

L'hypercholestérolémie pure se définit comme l'augmentation isolée du LDL cholestérol ( $> 1,6$  g/L), les triglycérides étant à un taux normal ( $< 1,5$  g/L).

### Régime

Son efficacité est assez modérée : 5 à 10 % de baisse du LDL-C. Sa prescription reste indispensable afin de ne pas observer une résistance à l'action des traitements médicamenteux. Le résultat du régime est parfois suffisant dans les formes mineures.

### Apport calorique global

Il doit être réduit chaque fois qu'il existe un surpoids. Lorsqu'il n'y a pas obésité, la diététique conseillée est un régime isocalorique, équilibré en fonction de l'activité physique, comportant 50 à 55 % de calories sous forme de glucides, 30 % sous forme de lipides, 15 à 20 % sous forme de protéines.

### Quantité de cholestérol alimentaire

Elle doit être réduite à moins de 300 mg/j (apport alimentaire usuel : 600 à 1 200 mg) (cf. tableau *Teneur des aliments courants en cholestérol*). Or le cholestérol est totalement d'origine animale. On conseille d'éviter les aliments les plus riches en cholestérol :

- viandes : charcuteries, abats, viandes grasses (porc, oie, canard, mouton sauf gigot, d'agneau) ;
- œufs (2 par sem.) ;
- laitages : beurre, margarines ordinaires, saindoux, fromages à 45 % de matières grasses ;
- huile d'arachide ;
- légumes : arachides, cacahuètes, avocats ;
- plats préparés et pâtisseries du commerce contenant des graisses riches en cholestérol.

On conseille également de faire la cuisine non grasse :

- dégraisser les bouillons et jus de viande ;
- piquer les volailles à rôtir afin que la graisse s'écoule et jeter la peau ;
- remplacer le beurre par des margarines végétales ou des produits enrichis en phytostérols ou phytostanols (**DANACOL**, **PRO-ACTIV**) ;
- utiliser exclusivement des huiles de tournesol, de colza, de maïs, de pépins de raisin, d'œillette ; l'huile d'olive riche en acide linoléique est utilisable pour les salades ;
- éviter les pâtisseries du commerce faites au beurre ou à l'huile ;
- dans les desserts, préférer salades de fruits, sorbets, compotes ;
- éviter les fritures ;
- utiliser largement les épices (poivre, cumin, safran, herbes, etc.) en assaisonnement.

### Répartition des acides gras

#### ► Quantité d'acides gras saturés

Elle doit être réduite à 8-10 % de la ration calorique quotidienne. Les aliments riches en graisses animales doivent être limités : lait et ses dérivés, beurre, fromages, graisses de la viande, abats, jaune d'œufs, charcuterie, crustacés.

#### ► Acides gras insaturés

Il faut augmenter la quantité de graisses mono-insaturées et polyinsaturées que l'on trouve dans les huiles végétales de tournesol, de maïs, de soja et un peu dans l'huile de colza. L'apport souhaitable est de 6 à 8 % pour l'acide linoléique, et de 0,5 à 1 % pour l'acide linoléique.

L'utilité des acides eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque comme **antiagrégants plaquettaires** et comme **hypolipidémiants** justifie la consommation de poisson ou l'adjonction d'huiles de poisson.

## HYPOLIPÉMIANTS (1) – STATINES (1)

### ■ Simvastatine

<b>ZOCOR</b>					
Posologie initiale usuelle : 10 à 20 mg/j en 1 prise le soir	28 cp. 5 mg		I	NR	
	28 cp. séc. 20 mg	20,61	I	65 %	0,74
	50 cp. séc. 20 mg	HOP	I		
	84 cp. séc. 20 mg	58,04	I	65 %	0,69
	28 cp. 40 mg	23,02	I	65 %	0,82
	50 cp. 40 mg	HOP	I		
	84 cp. 40 mg	64,83	I	65 %	0,77
<b>LODALÈS</b>					
Idem <b>ZOCOR</b>	28 cp. séc. 20 mg	20,61	I	65 %	0,74
	90 cp. séc. 20 mg	62,08	I	65 %	0,69
	28 cp. 40 mg	23,02	I	65 %	0,82
	90 cp. 40 mg	69,35	I	65 %	0,77

### ■ Pravastatine

<b>ELISOR</b>					
Dose recommandée : 10 à 40 mg x 1/j	28 cp. séc. 10 mg	9,76	I	65 %	0,35
	28 cp. séc. 20 mg	18,96	I	65 %	0,68
	84 cp. séc. 20 mg	53,42	I	65 %	0,64
	28 cp. séc. 40 mg	21,17	I	65 %	0,76
	84 cp. séc. 40 mg	59,66	I	65 %	0,71
<b>VASTEN</b>					
Idem <b>ELISOR</b>	28 cp. séc. 10 mg	9,76	I	65 %	0,35
	28 cp. séc. 20 mg	18,96	I	65 %	0,68
	84 cp. séc. 20 mg	53,42	I	65 %	0,64
	28 cp. 40 mg	21,17	I	65 %	0,76
	84 cp. 40 mg	59,66	I	65 %	0,71

### ■ Pravastatine + acide acétylsalicylique

<b>PRAVADUAL</b>					
Prévention secondaire après un angor instable ou un infarctus du myocarde avec cholestérol normal ou élevé : 1 cp. /j	30 cp. 40 mg/80 mg	19,39	I	65 %	0,65
	90 cp. 40 mg/80 mg	54,72	I	65 %	0,64

### ■ Fluvastatine

<b>FRACTAL</b>					
Posologie habituelle : 20 à 40 mg/j Dose max. : 80 mg/j	30 gél. 20 mg	7,18	I	65 %	0,24
	90 gél. 20 mg	20,20	I	65 %	0,22
	30 gél. 40 mg	7,98	I	65 %	0,27
	90 gél. 40 mg	22,46	I	65 %	0,25
	30 cp. LP 80 mg	13,10	I	65 %	0,44
	90 cp. LP 80 mg	37,19	I	65 %	0,41
<b>LESCOL</b>					
Idem <b>FRACTAL</b>	30 gél. 20 mg	7,18	I	65 %	0,24
	90 gél. 20 mg	20,20	I	65 %	0,22
	30 gél. 40 mg	7,98	I	65 %	0,27
	90 gél. 40 mg	22,46	I	65 %	0,25
	28 cp. LP 80 mg	HOP	I		
	30 cp. LP 80 mg	13,20	I	65 %	0,44
	90 cp. LP 80 mg	37,19	I	65 %	0,41

**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (2)****Médicaments****Hypercholestérolémies d'intensité moyenne**

► *Inhibiteurs de l'HMG CoA réductase ou statines*

Ils constituent l'indication préférentielle dans les hypercholestérolémies moyennes. Les **statines**, associées au régime, peuvent réduire le cholestérol total de 30 à 40 %, l'apolipoprotéine B de 30 % et les triglycérides de 10 %.

On utilise la **simvastatine** (**ZOCOR**, **LODALÈS** 20 à 80 mg/j), la **pravastatine** (**ELISOR**, **VASTEN** 20 à 80 mg/j) et la **fluvastatine** (**FRACTAL**, **LESCOL** 20 à 80 mg/j), l'**atorvastatine** (**TAHOR** 10 à 80 mg/j) ou la **rosuvastatine** (**CRESTOR** 5 à 80 mg/j). On débute en général par le plus faible dosage et on augmente la posologie en fonction du taux de LDL cholestérol, de façon à atteindre l'objectif fixé [1].

Les **statines** sont d'autant plus actives que les patients conservent des récepteurs hépatiques de LDL, raison pour laquelle leur efficacité est réduite dans les formes familiales les plus graves de l'hypercholestérolémie homozygote.

Les **statines** sont administrées de préférence le soir (car l'HMGCoA réductase est une enzyme à action essentiellement nocturne).

Les **statines** ont fait la preuve de leur efficacité à réduire à long terme l'incidence des accidents cardiovasculaires.

► *Ézétimibe*

L'**ézétimibe** (**EZETROL**) agit en bloquant l'absorption digestive du cholestérol alimentaire et biliaire. Il est utilisé à raison de 10 mg/j seul en cas d'intolérance aux **statines** ou en association avec elles lorsque le taux du LDL cholestérol reste supérieur à l'objectif fixé : **ézétimibe + simvastatine** (**INEGY**) : 10/20 à 20/80 mg/j.

**Cas des hypercholestérolémies majeures**

► *Traitement médicamenteux*

Chez l'enfant, essentiellement dans les cholestases responsables d'hypercholestérolémie majeure, on prescrit une résine chélatrice des acides biliaires : **colestyramine** (**QUESTRAN**) 8 à 16 mg/j. Des effets secondaires, surtout digestifs, peuvent rendre le traitement inconfortable (constipation opiniâtre). Une posologie très progressive est nécessaire pour faire accepter ce traitement.

Une **statine** est systématiquement associée au **QUESTRAN** pour compenser l'augmentation de l'activité de l'HMG CoA réductase.

► *Aphérèse des LDL*

Cette technique consiste à extraire de façon sélective les LDL du plasma. Elle est associée au traitement médicamenteux.



## HYPOLIPÉMIANTS (2) – STATINES (2)

## ■ Atorvastatine

<b>TAHOR</b>					
Posologie initiale : 10 mg/j à tout moment de la journée, à augmenter au bout de 4 sem. Posologie max. : 80 mg/j La dose de 10 mg peut être augmentée à 20 mg au bout de 4 sem.	28 cp. 10 mg	14,82	I	65 %	0,53
	50 cp. 10 mg	HOP	I	65 %	
	90 cp. 10 mg	44,60	I	65 %	0,50
	28 cp. 20 mg	27,33	I	65 %	0,98
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	82,40	I	65 %	0,92
	28 cp. 40 mg	30,54	I	65 %	1,09
	50 cp. 40 mg	HOP	I		
	90 cp. 40 mg	91,76	I	65 %	1,02
	28 cp. 80 mg	30,54	I	65 %	1,09
	50 cp. 80 mg	HOP	I		
	90 cp. 80 mg	91,76	I	65 %	1,02

## ■ Atorvastatine + amlodipine

<b>CADUET</b>					
Prévention cardiovasculaire chez l'hypertendu sans maladie coronaire avec 3 facteurs de risque et cholestérol normal ou modérément élevé : 1 cp. /j	30 cp. 5/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	30 cp. 10/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 5/10 mg	62,87	I	65 %	0,70
	90 cp. 10/10 mg	62,87	I	65 %	0,70

## ■ Rosuvastatine

<b>CRESTOR</b>					
Commencer le traitement à la dose de 5 ou 10 mg/j Posologie maximale : 40 mg/j en 2 prises	30 cp. 5 mg	18,71	I	65 %	0,62
	50 cp. 5 mg	HOP	I		
	90 cp. 5 mg	52,69	I	65 %	0,59
	30 cp. 10 mg	27,21	I	65 %	0,91
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	76,67	I	65 %	0,85
	30 cp. 20 mg	35,71	I	65 %	1,19
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	100,71	I	65 %	1,12

**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (3)****Teneur des aliments courants en cholestérol**

CATÉGORIE D'ALIMENTS	ALIMENTS		TENEUR CHOLESTÉROL (en mg/100 g)
Viandes	Abats	Cervelle	> 2 500
		Rognons	500-550
		Foie	350-400
		Cœur (bœuf cuit)	300
		Ris de veau	250
	Viandes	Viandes grasses	70-100
Poissons	Poissons	Caviar	300
		Huîtres	250
		Poissons habituels	< 70
Œufs/laitages	Œuf	1 œuf entier (60 g)	500
	Beurre	Beurre habituel	250
		Beurre demi-sel	250
	Fromages		100
Pâtisseries	(au beurre)	Croissants, madeleines	200

**Critères de prescription de médicaments**

La prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique doit tenir compte des facteurs de risque.

**Facteurs de risque**

Les hyperlipidémies sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Leur

traitement nécessite de fixer un objectif en termes de taux de LDL cholestérol à atteindre, qui prenne en compte tous les autres facteurs du risque cardiovasculaire. On définit par ailleurs des patients à haut risque cardiovasculaire pour lesquels les objectifs sont plus stricts.

**HYPOLIPÉMIANTS (3) – STATINES (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Les **statines** bloquent l'étape initiale de la biosynthèse du cholestérol en inhibant l'HMG-CoA réductase qui permet normalement cette réaction.

Les **statines** réduisent en moyenne le cholestérol total de 30 à 40 %, le LDL-C de 40 % et, les triglycérides de 20 %. Elles augmentent le HDL-C de 10 %.

Les **statines** de deuxième génération (**atorvastatine**, **rosuvastatine**) sont les plus puissantes ; elles réduisent modérément les triglycérides et élèvent de façon variable le HDL cholestérol. Ce sont donc des produits qui agissent essentiellement dans les hypercholestérolémies pures ou mixtes.

**INDICATIONS**

Hypercholestérolémies pures (IIa) et mixtes (IIb et III).

Prévention des événements cardiovasculaires chez des sujets à risque.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux **statines**.

Insuffisances hépatocellulaires.

**Grossesse** et **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Avant prescription : bilan hépatique (ASAT, ALAT et dosage des CPK seulement dans les situations à risque de rhabdomyolyse). Surveillance des transaminases dans les 3 mois suivant le début du traitement.

Les **statines** doivent être arrêtées si les transaminases sont  $> 3N$  sauf si l'élévation peut être rapportée à une stéatose ou une NASH (stéatopathie dysmétabolique : atteinte hépatique liée au syndrome métabolique) du sujet obèse ou en surpoids.

Dosage des CPK en cas de symptômes musculaires uniquement. Les **statines** doivent être arrêtées si les CPK sont  $> 5N$ .

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Atteinte hépatique : surveillance des transaminases avant traitement et de façon régulière, notamment avec les fortes doses. Une élévation à 3 fois la normale doit faire arrêter le traitement.

Troubles musculaires : ils se manifestent par des crampes, des douleurs, des contractures musculaires. L'accident le plus sévère est une rhabdomyolyse. Le dosage de la CPK musculaire permet de dépister ces troubles. Le risque d'atteinte musculaire augmente en cas de traitement immunosuppresseur simultané (**ciclosporine**).

Troubles digestifs : nausées, douleurs abdominales, diarrhée.

Autres effets : céphalées, asthénie, syndrome dépressif ; réactions allergiques cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Fibrates** : ils sont déconseillés car ils augmentent le risque de rhabdomyolyse lorsqu'ils sont associés aux **statines**. L'association est possible dans certains cas particuliers sous surveillance étroite.

**Antivitamines K** : augmentation de l'activité anticoagulante.

**Ciclosporine** : diminution du métabolisme des **statines**.

**Digoxine** : augmentation de 20 % de la digoxinémie.

**Érythromycine** : augmentation du risque musculaire.

Jus de pamplemousse : augmente les concentrations de **statines**.

**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (4)****Facteurs de risque associés à prendre en compte**

ÂGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homme de plus de 50 ans</li> <li>• Femme de 60 ans ou plus</li> </ul>
ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE MALADIE CORONAIRE PRÉCOCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infarctus du myocarde ou mort subite : avant l'âge de 55 ans chez le père ou chez un parent du premier degré de sexe masculin</li> <li>• Infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 65 ans chez la mère ou chez un parent du premier degré de sexe féminin</li> </ul>
TABAGISME	Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
HYPERTENSION ARTÉRIELLE PERMANENTE	Traitée ou non (se reporter aux recommandations spécifiques)
DIABÈTE DE type 2	Se reporter aux recommandations spécifiques
HDL CHOLESTÉROL *	≤ 0,40 g/L (1,0 mmol/L)

**Patient à haut risque cardiovasculaire**

- ANTÉCÉDENT DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE AVÉRÉE
- DIABÈTE DE type 2 à HAUT RISQUE :
  - atteinte rénale (protéinurie > 300 mg/24 h ou clairance de la créatinine estimée par la formule de Cockcroft < 60 mL/min),
  - ou au moins 2 des facteurs suivants : âge, antécédents de maladie coronaire précoce, tabagisme, hypertension artérielle, HDL cholestérol < 0,40 g/L, microalbuminurie (30 mg/24 h).
- RISQUE DE SURVENUE D'UN ÉVÉNEMENT CORONARIEN DANS LES 10 ANS > 20 % (selon les tables de risque).

**Critères lipidiques**

La conférence de consensus a défini des seuils de LDL cholestérol à partir desquels le traitement hypolipémiant doit être introduit. Ces seuils tiennent compte des autres facteurs de risque cardiovasculaires.

Les objectifs sont d'autant plus exigeants qu'ils sont nombreux. L'objectif est d'atteindre un LDL cholestérol inférieur à ces seuils.

Tout sujet ayant un LDL cholestérol > 1,60 g/L (4,1 mmol/L), ainsi que tout sujet ayant au moins un facteur de risque cardiovasculaire, doit bénéficier d'une prise en charge diététique, afin de modifier son mode de vie et son alimentation. Le taux de LDL cholestérol est calculé avec la formule de Friedwald à partir des résultats

du bilan dit « évaluation d'une anomalie lipidique » qui consiste à déterminer 3 paramètres :

- le cholestérol total (CT) ;
- le HDL cholestérol (HDL-C) ;
- les triglycérides (TG) inférieurs à 4 g.

**En g/L : LDL-C = CT - (HDL-C + TG/5)**

**En mmol/L : LDL-C = CT - (HDL-C + TG/2,26)**

Cette formule n'est valable que si les TG sont < 4 g/L (4,5 mmol/L).

Le taux de LDL-C permet ainsi d'instituer le traitement chez des patients ayant des facteurs de risque :

- soit en prévention primaire, avant tout accident cardiovasculaire ;
- soit en prévention secondaire, afin d'empêcher une récurrence.

\* Facteur protecteur : HDL cholestérol ≥ 0,60 g/L (1,5 mmol/L) ; soustraire alors « un risque » au score de niveau de risque

## HYPOLIPÉMIANTS (4) – INHIBITEURS DE L'ABSORPTION INTESTINALE DU CHOLESTÉROL

### ■ Ézétimibe

<b>EZETROL</b>					
1 cp./j	28 cp. 10 mg	39,64	I	65 %	1,42
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	124,68	I	65 %	1,39

### ■ Ézétimibe + simvastatine

<b>INEGY</b>					
1 cp./j	30 cp. 10 mg/20 mg	54,52	I	65 %	1,82
10/20 mg à 20/80 mg/j le soir	30 cp. 10 mg/40 mg	60,24	I	65 %	2,01
	90 cp. 10 mg/20 mg	154,09	I	65 %	1,71
	90 cp. 10 mg/40 mg	170,31	I	65 %	1,89

### PROPRIÉTÉS

L'**ézétimibe** est un hypolipémiant entraînant une inhibition sélective de l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols apparentés. Il diminue d'environ 20 % le LDL cholestérol.

La **simvastatine** diminue la synthèse hépatique du cholestérol (cf. **Statines**).

En association avec la **simvastatine**, l'**ézétimibe** diminue le cholestérol par l'association de deux mécanismes distincts.

### INDICATIONS

Hypercholestérolémie primaire :

- en association avec une statine comme traitement adjuvant chez les patients répondant partiellement au traitement par **statine** seule ;
- en monothérapie en cas d'intolérance aux **statines**.

Hypercholestérolémie familiale homozygote : en association avec une **statine**.

Sitostérolémie homozygote : en traitement adjuvant au régime.

### CONTRE-INDICATIONS

Grossesse, allaitement.

Hypersensibilité à l'**ézétimibe**, allaitement, galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption en glucose ou galactose, déficit en lactate.

Déconseillé en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère, chez l'enfant de moins de 10 ans et pendant la grossesse.

Contre-indications de la **simvastatine** pour **INEGY**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Celles de la **simvastatine** pour **INEGY**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, douleurs abdominales, diarrhée, constipation.

Pancréatite, hépatite, cholécystite.

Rash cutané, thrombopénie.

Myopathie, rhabdomyolyse, élévation des CPK.

Effets secondaires de la **simvastatine** pour **INEGY**.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (5)

### Stratégie thérapeutique des dyslipidémies en fonction des facteurs de risque : objectif à atteindre pour le LDL cholestérol

AUCUN FACTEUR DE RISQUE	1 SEUL FACTEUR DE RISQUE	2 FACTEURS DE RISQUE	≥ 3 FACTEURS DE RISQUE	HAUT RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
< 2,20 g/L (5,7 mmol/L)	< 1,90 g/L (4,9 mmol/L)	< 1,60 g/L (4,1 mmol/L)	< 1,30 g/L (3,4 mmol/L)	< 1,00 g/L (2,6 mmol/L)

Le traitement comporte toujours :

- le régime diététique hypocholestérolémiant ;
- une activité physique régulière ;
- la prise en charge des facteurs de risque associés : tabagisme, HTA, diabète de type 2, obésité.

Le traitement médicamenteux est prescrit d'emblée chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Chez les patients à risque plus faible, le traitement médicamenteux est introduit en cas d'échec des règles hygiénodietétiques suivies pendant 3 mois.

Les **statines** sont prescrites en première

intention. Les autres médicaments hypolipidémisants sont utilisés en deuxième intention.

#### Cas particulier du sujet âgé :

– Le bénéfice de l'introduction d'un traitement par statine, en prévention primaire, chez le sujet de plus de 80 ans n'est pas démontré.

– Chez les sujets âgés de plus de 80 ans, les critères permettant la prolongation du traitement en prévention primaire sont : le cumul de facteurs de risque, l'absence de pathologie non cardiovasculaire réduisant l'espérance de vie à court terme et une bonne tolérance du traitement.

### Caractéristiques des différents types d'hyperlipidémies

TYPE D'HYPERLIPIDÉMIE	CHYLOMICRONS	β (LDL)	Pré β (VLDL)	AUTRE	RISQUES MAJEURS
I	+++	NI	NI à +	0	Pancréatite
Ila	NI	+++	NI	0	Athérosclérose
Ilb	NI	++	++		Athérosclérose pancréatite
III	NI	++	++	IDL	Athérosclérose pancréatite
IV	NI à +	NI à +	+++	0	Xanthomatose éruptive pancréatite
V	++		++	0	Pancréatite

#### CONSENSUS

[1] Prise en charge thérapeutique des patients dyslipidémiques, *Afssaps*, 2005

## HYPOLIPÉMIANTS (5) – RÉSINE

## ■ Colestyramine

QUESTAN					
3 sach./j en moyenne : 1 à chaque repas, la posologie pouvant aller jusqu'à 24 g dans les hypercholestérolémies majeures	50 sach. 4 g à dissoudre	18,23	I	65 %	0,36

**PROPRIÉTÉS**

Résine échangeuse d'ions, fixant les acides biliaires et augmentant leur élimination fécale (en particulier le cholestérol transformé en acides cholique et chénodésoxycholique)

**INDICATIONS**

Hypercholestérolémie  
Prurit lié à une cholestase.  
Diarrhée liée à une résection iléale (pour chélateur les acides biliaires).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation fréquente, opiniâtre, pouvant dans les cas extrêmes réaliser une pseudo-occlusion.

Risque de malabsorption des vitamines A, D, E, K et de nombreux médicaments.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement à posologie progressive, à administrer à distance des autres médicaments.

Associer un traitement par lubrifiant digestif.

**Grossesse** : évaluer les risques : hypercholestérolémie majeure contre malabsorption des vitamines liposolubles.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de l'effet des **AVK** et des **hormones thyroïdiennes**.

**Dépistage et surveillance biologiques d'une hyperlipidémie**

1. Il n'y a pas lieu, chez un patient jeune (homme < 50 ans, femme avant la ménopause), sans dyslipidémie et sans facteur de risque\*, dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 5 ans.
2. Il n'y a pas lieu, chez un homme après 50 ans, sans facteur de risque et dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 3 ans.
3. Il n'y a pas lieu, chez une femme après la ménopause, sans facteur de risque et dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 3 ans.
4. Il n'y a pas lieu, chez les patients porteurs de facteurs de risque, suivant une thérapeutique hypolipémiante hygiénodététique et/ou médicamenteuse, de répéter les dosages plus d'une fois tous les 6 mois, une fois les valeurs cibles atteintes et stabilisées.
5. Il n'y a pas lieu, si une dyslipidémie est dépistée, de prescrire, dans le cadre de l'exploration d'une anomalie lipidique, d'autres examens que le dosage\*\* du cholestérol total, du cholestérol HDL (permettant le calcul du LDL cholestérol) et des triglycérides.

\* Facteurs de risque autres qu'une dyslipidémie : signes évocateurs de maladie artérielle (HTA notamment), diabète sucré, tabagisme, surpoids (surtout avec morphotype androïde, même si le surpoids est modeste), histoire familiale d'athérosclérose prématurée (infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans, chez un parent direct ou dans la fratrie).

\*\* Prélèvement effectué après 12 h de jeûne.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIES (1)

### Hypertriglycéridémies pures (type IV)

#### Hypertriglycéridémies (type IV)

SIGNES ET RISQUES CLINIQUES	CRITÈRES BIOLOGIQUES
Troubles digestifs Hépatomégalie Xanthomatose éruptive Pancréatites aiguës	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Surcharge considérable en VLDL. Le sérum est lactescent et au test de décantation, les VLDL ne flottent pas.</li> <li>– Les TG peuvent atteindre 40 à 100 g/L. Ces VLDL contiennent 1/5 de cholestérol : cette surcharge entraîne une hypercholestérolémie qui peut dépasser 20 g/L.</li> <li>– L'électrophorèse des lipoprotéines montre la surcharge en VLDL, d'ailleurs souvent associée à des chylomicrons.</li> </ul>

#### Régime

Il a une importance essentielle : la moitié des hypertriglycéridémie peut être corrigée par une diététique bien suivie.

##### ► Contrôle du poids

Il est capital ici de revenir au poids idéal et le régime hypocalorique global est mis en œuvre dès qu'existe un surpoids. Deux mesures efficaces :

- limitation de l'apport calorique ;
- substitution des graisses animales par les graisses végétales mono- ou polyinsaturées.

##### ► Contrôle des facteurs nutritionnels responsables de l'hypertriglycéridémie

- Limitation des sucres à absorption rapide et des féculents.

Un certain nombre d'hypertriglycéridémies sont provoquées et entretenues par les glucides d'assimilation rapide. Ces hypertriglycéridémies se rapprochent de celles observées dans le diabète et sont en rapport avec des anomalies génétiques.

- Suppression de l'alcool

L'hypertriglycéridémie peut être déclenchée par de faibles quantités d'alcool. Ici le déficit porte également sur des enzymes de la lipolyse et une augmentation de la synthèse des TG.

L'évaluation de l'efficacité du régime seul doit être relativement longue, 2 à 3 mois, de façon à tester la sensibilité aux glucides ou à l'alcool avant la décision d'un traitement médicamenteux complémentaire en cas d'échec.

#### Acides gras oméga-3

Ils peuvent être prescrits en monothérapie ou en association avec les **fibrates**. Ex. : **OMACOR** 1 à 4 caps./j.

#### Dérivés des fibrates

Ce sont les médicaments essentielles des hypertriglycéridémies majeures et des hyperlipidémies mixtes. Ils entraînent une réduction du cholestérol total (- 25 % : action sur l'HMGCoA réductase), des triglycérides (- 35 à 45 %) et une élévation du HDL cholestérol (+ 10 à 25 %).

Ils sont bien tolérés, mais on manque de preuves quant à leur efficacité sur la morbidité cardiovasculaire à long terme en prévention primaire et secondaire.

Les **fibrates** les plus fréquemment utilisés sont :

- le **fénofibrate (LIPANTHYL)** ;
- le **gemfibrozil (LIPUR)**.

Les doses habituelles sont de 100 à 300 mg/j.

Les **fibrates** sont indiqués dans deux situations :

- en cas d'hypertriglycéridémie avec hypo-HDLémie et un LDL-C < 1 g/L ;
- en cas d'hypertriglycéridémie importante > 4 g/L.

#### Hyperlipidémie mixte de type IIb

L'hypertriglycéridémie mixte est caractérisée par l'élévation conjointe du cholestérol et des triglycérides ; l'augmentation du cholestérol est due à celle du cholestérol LDL, le cholestérol HDL étant diminué.

Le régime associe les mesures propres aux hypercholestérolémies et aux hypertriglycéridémies.

On privilégie la prescription d'une **statine**.



**HYPOLIPÉMIANTS (6) – FIBRATES**■ **Bézafibrate**

<b>BÉFIZAL</b>					
La dose moyenne est de 400 mg/j	84 cp. 200 mg	6,70	II	65 %	0,08
	30 cp. LP 400 mg	7,93	II	65 %	0,26
	90 cp. LP 400 mg	22,30	II	65 %	0,25

■ **Ciprofibrate**

<b>LIPANOR</b>					
1 gél./j	30 gél. 100 mg	5,62	II	65 %	0,19

■ **Fénofibrate**

<b>LIPANTHYL</b>					
<b>LIPANTHYL MICRONISÉ</b> : 2 à 4 gél./j en 2 à 3 prises	60 gél. 67 mg	6,06	II	65 %	0,10
	90 gél. 67 mg	8,38	II	65 %	0,09
	30 gél. 200 mg	9,69	II	65 %	0,32
	90 gél. 200 mg	27,27	II	65 %	0,30
<b>LIPANTHYL à libération modifiée</b> : 1 cp./j	30 cp. 145 mg	7,70	II	65 %	0,26
	90 cp. 145 mg	21,65	II	65 %	0,24
	30 cp. 160 mg	9,61	II	65 %	0,32
	90 cp. 160 mg	27,06	II	65 %	0,30

■ **Gemfibrozil**

<b>LIPUR</b>					
1 cp./j à chaque repas	60 cp. 450 mg	11,97	II	65 %	0,20

**PROPRIÉTÉS**

Les **fibrates** agissent à la fois sur la synthèse du cholestérol (inhibition de l'HMG-CoA réductase) et des triglycérides. Ils réduisent ainsi le LDL de 25 % et les TG de 40-60 %. Le HDL augmente de 10-20 %.

**INDICATIONS**

Hyperlipidémies mixtes (IIa, III) et de type IV. Hyperlipidémies de type IIa (moins efficaces que les **statines**).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance du TP ou de L'INR avec les **antivitamines K**. Surveillance régulière de la créatinine et des transaminases.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Myalgies, et dans les cas extrêmes, rhabdomyolyse (effet dose-dépendant).

Effets hépatotoxiques : élévation des transaminases (10 à 20 %). Lithiase biliaire.

Nausées, asthénie, céphalées, vertiges.

Impuissance.

Allergies cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas associer aux **statines** car risque de potentialisation des effets secondaires hépatiques et musculaires.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIES (2)

### Hyperlipidémie mixte de type III (dys- $\beta$ -lipoprotéinémie)

Cette hyperlipidémie, rare, comprend une lipoprotéine dont l'excès comporte des risques communs aux hyperlipidémies de type IIb et IV. Elle réagit en général très bien au traitement par régime et **fibrates**.

### Hypertriglycéridémies secondaires

#### Traitement étiologique

##### ► Traitement diététique

La diététique comporte obligatoirement la suppression de l'alcool et la restriction en sucres d'absorption rapide.

En cas d'obésité, un régime de restriction calorique est obligatoire.

##### ► Diabète

Le diabète déséquilibré retentit presque inéluctablement sur le métabolisme lipidique et est responsable très fréquemment d'hypertriglycéridémie modérée. Le bon contrôle du diabète s'accompagne d'une normalisation des triglycérides.

Les hypertriglycéridémies au cours du diabète peuvent être brutales et massives (pancréatites aiguës, xanthomatoses éruptives). Elles obligent à traiter le patient par insuline. Le schéma thérapeutique de début doit être optimisé : au moins 4 injections/j.

##### ► Hépatopathies

Toute atteinte hépatique peut se compliquer d'hyperlipidémie mixte ou d'hypertriglycéridémie pure. Le traitement est uniquement diététique.

##### ► Médicaments hypertriglycéridémisants

- **Éthinylestradiol** contenu dans les pilules contraceptives.
- Certains **progestatifs** : **noréthistérone**.
- **Corticoïdes**.

#### Traitement médicamenteux

Lorsque le traitement étiologique est insuffisant, un traitement médicamenteux est indiqué selon les mêmes règles de prescription que dans les hypertriglycéridémies pures et les hyperlipidémies mixtes.

### Hyperchylomicronémies (hyperlipidémies de type I)

L'hyperchylomicronémie, dyslipidémie exceptionnelle, ne provoque jamais de complication athéromateuse. Le risque majeur de cette hyperlipidémie est la pancréatite aiguë œdémateuse et surtout nécrosante.

#### Traitement diététique

Le traitement est difficile : il s'agit de la seule hyperlipidémie où le régime doit être très restrictif en graisses, inférieur à 20 % de l'apport énergétique total (10 à 15 g/j).

La restriction lipidique doit porter sur les lipides cachés, notamment dans la viande, les pâtisseries, le chocolat, etc.

Il faut choisir préférentiellement les aliments suivants :

- viandes maigres (< 5 % de graisses),
- poissons maigres (< 1 % de graisses),
- fromages maigres,
- laitages écrémés,
- œufs sans le jaune.

Afin de maintenir une ration calorique suffisante, on peut utiliser les triglycérides à chaîne moyenne car ils ne participent pas à la formation des chylomicrons (huile *Liprocil*, margarine *Ceres*).

#### Traitement médicamenteux

Il n'y a aucun traitement médicamenteux efficace dans l'hyperlipidémie de type I.

### Hyperlipidémie de type V

Il s'agit d'une maladie génétique rare, associant une hypertriglycéridémie et une hyperchylomicronémie.

Le traitement comporte :

- une diététique restrictive en graisse comme dans l'hyperchylomicronémie ;
- la suppression de l'alcool et la restriction en sucres d'absorption rapide ;
- la prescription de **fibrates** et éventuellement d'huiles de poisson riches en acides gras polyinsaturés de la série oméga-3 (**OMACOR**, etc.).

## HYPOLIPÉMIANTS (7) – ACIDES GRAS OMÉGA-3

### ■ Triglycérides d'acides gras oméga-3

<b>TRIGLISTAB</b>					
3 caps./j	30 caps. 1 010 mg		II	NR	
<b>YSOMEGA</b>					
Idem <b>TRIGLISTAB</b>	30 caps. 1 g		II	NR	
	60 caps. 1 g		II	NR	

### ■ Acides oméga-3 + alpha-tocophérol

<b>OMACOR</b>					
1 à 4 caps./j	28 caps. 1 g/4 mg	26,35	II	65 %	0,94

#### PROPRIÉTÉS

Préparations à base d'huile de chair de poisson, riche en acides gras oméga-3 polyinsaturés (acides ecosapentaénoïque et docosahexaénoïque).

#### INDICATIONS

Hyperlipidémies avec hypertriglycéridémie isolée ou prédominante (type IIb, III et IV).

Prévention des accidents cardiovasculaires chez des sujets prédisposés ou ayant déjà eu un infarctus du myocarde.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitements anticoagulants : surveillance.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, éructations.

## HYPERLIPIDÉMIES SECONDAIRES

CAUSES	TYPE	CARACTÈRES PARTICULIERS	TRAITEMENT
Syndrome néphrotique	Ila ou Iib (hypercholestérolémie +++)	Athérogène si syndrome néphrotique permanent parallèle à la protéinurie	Traitement de l'insuffisance rénale ± <b>statines</b>
Insuffisance rénale chronique + hémodialyse	Type IV (hypertriglycémie mineure, acquise)	Rôle athérogène non négligeable	Disparaît avec la transplantation rénale
Alcoolisme chronique modéré	Taux élevé d'HDL et Apo AII	Probablement non athérogène	Arrêt de l'alcoolisme
Cholestase	Hypercholestérolémie avec importante élévation des phospholipides	La lipoprotéine en surcharge dans la cholestase est une lipoprotéine anormale, la LpX	Traitement étiologique
Diabète sucré	Hypertriglycémies endogènes glucido-dépendantes	Risque non négligeable de pancréatites et d'athérome	Traitement du diabète, en cas d'échec : <b>statines</b> ou <b>fibrates</b> ou huiles de poissons (surveillance de l'HbA1c)
	Hyperchylomicro-némies majeures	Xanthomatoses éruptives	Traitement du diabète par l'insuline
Hypothyroïdie	Hypercholestérolémie de type Iib ou Iii	Athérome	Réversible sous traitement de l'hypothyroïdie
Lupus érythémateux, périartérite noueuse, sida	Hyperlipidémie mixte		Traitement étiologique
<b>Œstrogénostatifs (OP)</b>	Hypercholestérolémie pure ou de type Iib	Athérome, thromboses	Suppression des <b>OP</b> chez toute femme sensible

## HYPOGLYCÉMIES

### Hypoglycémies du diabétique

#### Causes de l'hypoglycémie

► *Hypoglycémies par excès d'insuline circulante*

- Surdosage en insuline.
- Injection d'insuline dans une zone soumise à une activité physique importante.
- Bains chauds après l'injection d'insuline.
- Résorption trop rapide de l'insuline.

► *Prise d'un médicament hypoglycémiant insulinosécréteur (sulfamide hypoglycémiant)*

► *Facteurs hypoglycémiants*

- Erreur diététique : apport glucidique insuffisant, saut d'un repas.
- Repas trop tardif.
- Exercice physique intense ou inhabituel.
- Absorption d'alcool à jeun.

#### Traitement d'urgence de l'hypoglycémie

► *Si le sujet peut avaler*

Administration par voie orale de 15 à 20 g de sucre rapidement absorbable ; par exemple :

- 3 morceaux de sucre (mastication possible) ;
- un verre de *Coca-Cola* ;
- 25 mL de jus de fruit (1 verre).

► *Si le patient ne peut pas avaler*

• Injection IM de **glucagon (GLUCAGEN)** suivie d'un resucrage *per os*. Le glucagon est contre-indiqué en cas de prise de **sulfamide hypoglycémiant**.

• Injection IV de 2 ampoules de 20 mL de sérum glucosé à 30 %. Cette dose est en général suffisante pour réveiller le malade.

• La pose d'une perfusion de sérum glucosé à 10 % est néanmoins indispensable après la sortie du coma.

► *Dans tous les cas*

Le patient sera réalimenté dès son réveil. Il sera éduqué afin d'éviter une récurrence. En cas d'hypoglycémie secondaire à une prise de **sulfamide hypoglycémiant**, il faut poser une perfusion de G10 % pour une durée supérieure à 2 à 3 fois la demi-vie du **sulfamide**.

### Hypoglycémies médicamenteuses

En dehors des médicaments hypoglycémisants, de nombreux médicaments peuvent déclencher une hypoglycémie. Sont le plus souvent incriminés :

- **Anti-inflammatoires**
  - **Salicylés** à forte dose (4 à 6 g/j).
  - **AINS** (indométacine, phénylbutazone).
- **Antipsychotiques**
  - **Chlorpromazine (LARGACTIL)**.
  - **Halopéridol (HALDOL)**.
  - **IMAO**.
- **Médicaments du système cardiovasculaire**
  - **β-bloquants**.
  - **Cibenzoline (CIPRALAN)**.
  - **Disopyramide (RYTHMODAN)**.
- **Divers**
  - **Pentamidine (PENTACARINAT)**.
  - **Pénicillamine (TROLOVOL)**.
  - **Quinine**.
  - **Chloramphénicol, kétoconazole**.

Tous ces médicaments voient leurs effets hypoglycémisants favorisés par l'existence d'un facteur de risque associé : insuffisance rénale ou hépatique, dénutrition, infection sévère ou prise d'alcool.

### Hypoglycémies organiques

Ce sont des hypoglycémies sévères. En plus du traitement symptomatique, un traitement étiologique s'impose :

- Traitement chirurgical en cas d'insulinome (ou de carcinome hépatocellulaire ou de mésentérion, si possible) ou prescription d'une substance hyperglycémisante **diazoxide (PROGLICEM)** par voie orale ou **streptozocine** par voie IV en cas d'insulinome malin ou inopérable.
- Traitement substitutif par **hydrocortisone** en cas d'insuffisance surrénalienne ou hypophysaire.

### Hypoglycémies fonctionnelles

Les hypoglycémies fonctionnelles ou hypoglycémies réactives surviennent 2 à 3 h après un repas, sont peu sévères et ne sont pas toujours calmées par la prise de sucre. Elles ne sont justiciables que de mesures diététiques (fractionnement des repas, suppression de sucres rapides, consommation de fibres).

## OBÉSITÉ (1)

La prise en charge du patient obèse est difficile et demande du temps.

### Évaluation clinique

Avant toute intervention thérapeutique, il convient au minimum :

- de mesurer le poids et la taille et de calculer l'indice de masse corporelle :  $IMC = \text{poids (kg)} / \text{taille (m)}^2$  ;
- de mesurer le tour de taille.

### Relation entre le poids et l'IMC

POIDS	IMC (kg/m <sup>2</sup> )
Poids insuffisant	< 18
Poids normal	18-25
Surpoids	25-30
Obésité non morbide	30-40
Obésité morbide	> 40

- De reconstituer l'histoire du poids et les antécédents familiaux d'obésité et de pathologies métaboliques ou vasculaires.
- D'évaluer les dépenses énergétiques en calculant la dépense énergétique de repos à l'aide d'une formule comme celle de Harris et Benedict [pour l'homme =  $13,7 \times \text{Poids (kg)} + 500,3 \times \text{Taille (m)} - 6,7 \times \text{Âge (ans)} + 66,4$  et pour la femme =  $9,5 \times \text{Poids (kg)} + 184,9 \times \text{Taille (m)} - 4,6 \times \text{Âge (ans)} + 655$ ] ; la dépense totale s'obtient en la multipliant par 1,3 pour les sujets très sédentaires, par 1,5 pour une activité légère et jusqu'à 2,1 pour une activité très importante.
- De procéder à une enquête alimentaire qualitative et quantitative même succincte pour dépister un trouble du comportement alimentaire et évaluer les apports. La tenue d'un carnet alimentaire est utile et l'aide d'une diététicienne, si elle est possible, est souhaitable.
- De connaître la situation sociale et familiale et l'existence de conflits influant sur les possibilités d'action du patient.

• De rechercher un syndrome métabolique et les complications éventuelles de l'obésité :

- métaboliques : diabète de type 2, dyslipidémie,
- cardiovasculaires : HTA, coronaropathie, insuffisance veineuse,
- respiratoires : syndrome d'apnées du sommeil, hypoventilation alvéolaire,
- ostéoarticulaires : arthrose,
- digestives : hépatopathie dysmétabolique, lithiase vésiculaire,
- psychologiques : syndrome dépressif.

### Enquête alimentaire

Elle a pour but d'évaluer la consommation calorique quotidienne (cf. Enquête alimentaire).

### Examens biologiques

En l'absence de signes d'appel d'orientation, seuls les glycémies à jeun, le bilan lipidique, l'ECG (surtout à partir d'un âge moyen chez l'homme) et le dosage de TSH sont indispensables.

### Syndrome métabolique - Syndrome d'insulinorésistance (IDF [1])

- Obésité tronculaire :
  - Tour de taille  $\geq 94$  cm (homme) ou  $\geq 80$  cm (femme).
- Au moins 2 des paramètres suivants :
  - Triglycérides  $\geq 1,50$  g/L (1,7 mmol/L) ou hypertriglycéridémie traitée.
  - HDL-cholesterol  $< 0,40$  g/L (1,0 mmol/L) (homme) ou  $< 0,50$  g/L (1,3 mmol/L) (femme) ou hypercholestérolémie traitée.
  - Pression artérielle systolique  $\geq 130$  mmHg ou diastolique  $\geq 85$  mmHg ou HTA traitée.
  - Glycémie  $\geq 1,0$  g/L (5,6 mmol/L) ou diabète de type 2 traité.
- Remarque : une nouvelle définition ne considère plus le tour de taille comme critère obligatoire : 3 critères parmi les 5 définissent le syndrome métabolique.

## ADJUVANT DE LA SURCHARGE PONDERALE

## ■ Orlistat

XÉNICAL				
1 gél. avant, pendant ou jusqu'à 1 h après chacun des principaux repas Si un repas est sauté ou ne contient pas de graisses, la prise d' <b>orlistat</b> doit être supprimée Des posologies supérieures à 120 mg x 3/j n'apportent pas de bénéfice supplémentaire	84 gél. 120 mg		I	NR

## PROPRIÉTÉS

L'**orlistat** est un inhibiteur puissant, spécifique et d'action prolongée des lipases gastro-intestinales. Il forme dans la lumière de l'estomac et de l'intestin grêle une liaison covalente avec le site sérine actif des lipases gastriques et pancréatiques. L'enzyme ainsi inactivée ne peut plus hydrolyser les triglycérides alimentaires en acides gras libres et monoglycérides absorbables.

## INDICATIONS

**XÉNICAL** : traitement de l'obésité (indice de masse corporelle [IMC]  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>) ou du surpoids (IMC  $\geq 28$  kg/m<sup>2</sup>) associé à des facteurs de risques.

Si un régime seul a précédemment permis une perte de poids d'au moins 2,5 kg en 4 sem. consécutives. Le traitement par **orlistat** doit être arrêté après 12 sem. si les patients n'ont pas perdu au moins 5 % du poids initial.

## CONTRE-INDICATIONS

Syndrome de malabsorption chronique.  
Cholestase.

Allaitement (le passage dans le lait maternel n'est pas connu). Grossesse.

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminution de l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Maintien d'une alimentation riche en fruits et en légumes.

Si besoin, supplémentation multivitaminique à distance (2 h) de la prise d'**orlistat**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

• Gastro-intestinaux (+++)

Ils sont liés à l'activité de l'**orlistat** et témoignent de son efficacité. Pendant la première année de traitement, les effets très fréquents sont des traces de graisses au niveau anal

(27 %), des gaz avec suintement (24 %), des selles impérieuses (22 %), des selles grasses/huileuses (20 %), des émissions de graisses (12 %), des selles abondantes (11 %), des incontinences fécales (8 %).

L'incidence des effets indésirables diminue lors de l'utilisation prolongée d'**orlistat**.

Les autres événements (plus rares) sont : douleur/gêne abdominale, flatulence, selles liquides, selles molles, douleur/gêne rectale, problèmes dentaires, problèmes gingivaux.

- Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : infection respiratoire haute, infection respiratoire basse, grippe.
- Système nerveux : céphalées.
- Troubles des organes de reproduction et des seins : règles irrégulières.
- Troubles psychiques : anxiété.
- Troubles généraux et accidents liés au site d'administration : asthénie.
- Troubles rénaux et urinaires : infection urinaire.
- Allergies : prurit, rash cutané, urticaire, angio-œdème et réaction anaphylactique, rares cas d'éruptions bulleuses.

De très rares cas d'augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines hépatiques, et d'exceptionnels cas d'hépatite potentiellement graves ont été rapportés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à l'**acarbose** est déconseillée.

## Anorexigènes.

**Anticoagulants** : en traitement à long terme, une évaluation de l'INR doit être réalisée.

**Vitamines et bêta-carotène** : la diminution de l'absorption des vitamines **D**, **E** et du **bêta-carotène** doit être prise en compte.

**Ciclosporine** : diminution des taux plasmatiques.

## OBÉSITÉ (2)

### Objectifs thérapeutiques

L'objectif du traitement doit être réaliste. Aussi souhaitable qu'elle soit, la perte de poids n'est pas l'objectif unique du traitement : chez les sujets en phase pondérale ascendante, la stabilité pondérale est le premier objectif à atteindre. Un objectif de perte de poids de l'ordre de 10 % du poids initial obtenu en 3 à 6 mois, bien qu'il paraisse modeste à de nombreux patients, est souvent réaliste et utile pour améliorer les comorbidités.

La prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires associés et le traitement des complications sont des priorités.

### Moyens thérapeutiques

#### Activité physique

Une fois la prise de poids acquise, l'activité physique ne fait pas en soi perdre du poids, mais modifie la composition corporelle au profit de la masse maigre et permet de prévenir la reprise du poids. Il faut essayer d'obtenir l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour. Prendre le temps de suggérer, en fonction des contraintes de chacun, différentes possibilités d'augmenter l'activité physique.

Tous les exercices sont valables à condition d'être réguliers, progressifs, évalués. L'objectif est d'augmenter les dépenses caloriques et de remplacer la graisse par du muscle. Sports conseillés : la marche (30 min à 1 h/j) le vélo, la natation.

#### Prescription diététique

La prescription d'un « régime » ne peut être standardisée. Le but est d'obtenir une modification durable de l'alimentation, réduisant les apports caloriques d'environ 1/4 ou 1/3 les apports antérieurs de façon à le situer environ 600 kcal en dessous des dépenses énergétiques totales, sans descendre en dessous de 1 200-1 400 kcal/j.

Il faut éviter les interdits, conseiller au moins 3 repas par jour avec des collations si besoin, en insistant sur la répartition des nutriments, c'est-à-dire privilégier les fruits et légumes, réduire les graisses (de structure et ajoutées), contrôler les féculents sans les exclure, inciter à développer certains modes de cuisson (vapeur, grill), choisir les menus adéquats en restauration collective, limiter les boissons sucrées et alcoolisées. Il est important de s'assurer que les apports protéiques, calciques, et en fer sont suffisants.

La pratique de régimes très restrictifs du type « régimes protéinés » (ou *very low calorie diet*), permettant des pertes de poids rapides et faciles, est à déconseiller : ils favorisent les rechutes et le syndrome yo-yo (reprise pondérale plus importante que la perte obtenue). Ils ne doivent être prescrits qu'en milieu spécialisé dans des indications particulières.

Enfin, il faut expliquer au patient qu'après une phase de perte de poids, une nouvelle stabilité s'instaure, à un niveau pondéral souvent supérieur aux souhaits du patient, exigeant pourtant la poursuite d'une vigilance alimentaire plus ou moins contraignante.

Les cures (hospitalisation de courte durée en milieu hospitalier spécialisé pour faire maigrir) n'ont de sens que si elles s'accompagnent de modification durable du comportement alimentaire. Elles peuvent être une aide ponctuelle (pour initier une perte de poids et redonner confiance ou isoler transitoirement d'un milieu familial conflictuel, par exemple).

#### Accompagnement psychologique

Il peut être utile lorsqu'il existe des troubles du comportement alimentaire importants ou un syndrome dépressif associé.

Le recours au psychiatre est parfois nécessaire.



## OBÉSITÉ (3)

### Médicaments

Les médicaments «anti-obésité» peuvent être un complément.

Aucun médicament n'a prouvé son efficacité de façon importante et durable.

Un produit est utilisé dans le traitement des obésités : un inhibiteur de l'absorption des graisses, l'**orlistat (XÉNICAL)** : 1 gél. à chaque repas. Le traitement par **orlistat** doit être entrepris uniquement si un régime seul a précédemment permis une perte de poids d'au moins 2,5 kg en 4 sem. consécutives. Le traitement par **orlistat (XÉNICAL)** doit être arrêté après 12 sem. si les patients n'ont pas perdu au moins 5 % du poids initial mesuré au début du traitement médicamenteux.

Plusieurs cas graves d'atteintes hépatiques ont été rapportés chez des patients traités par **orlistat** ayant conduit dans certains cas à une transplantation hépatique voire au décès du patient. Le lien de causalité avec l'**orlistat** reste difficile à établir mais ne peut pas être exclu. Devant la gravité de ces effets hépatiques, l'Agence européenne du médicament (EMA) a récemment conduit une évaluation des effets indésirables rapportés avec **orlistat**. Elle a décidé de réévaluer le rapport bénéfice/risque de ces deux spécialités.

### Chirurgie bariatrique

La chirurgie de l'obésité, lorsque les indications sont bien posées, permet de réduire les facteurs de risque liés à l'obésité et améliore de plusieurs années l'espérance de vie.

Elle est indiquée après échec d'une prise en charge médicalisée d'au moins un an :  
– chez les patients avec  $IMC > 40 \text{ kg/m}^2$  ;  
– chez les patients avec  $IMC > 35 \text{ kg/m}^2$  avec comorbidités (maladies cardiorespiratoires, ostéo-articulaires ou métaboliques).

Il en existe différents types. L'intervention la plus pratiquée est la *sleeve gastrectomy* ou « gastrectomie verticale calibrée » qui consiste à réséquer 2/3 de l'estomac. En plus de la restriction gastrique qu'elle entraîne, cette intervention résèque la partie de l'estomac qui sécrète la ghréline et qui stimule l'appétit.

L'anneau gastrique a été abandonné du fait de l'importance des complications qu'il entraînait.

### Complications esthétiques

Les amaigrissements réussis s'accompagnent souvent de disgrâces esthétiques majeures (seins, ventres, cuisses) surtout lors des pertes de poids importantes après chirurgie de l'obésité.

Le recours à la chirurgie plastique est utile dans ces situations. Il doit être prévu au **début** du traitement.

### CONSENSUS

[1] The IDF Consensus Worldwide Definition of the Metabolic Syndrome, *IDF*, 2006

## OBÉSITÉ (4)

## Enquête alimentaire\*

## Petit-déjeuner

PORTIONS	CALORIES						TOTAL
	50	100	150	200	250	> 300	
Boissons							
Thé, café noir (1 bol)							
Thé, café noir + 2 sucres	×						
Thé, café + lait entier + 2 sucres		×					
Thé, café + lait écrémé + 2 sucres		×					
Chocolat au lait sucré				×			
Aliments							
Pain (1/4 baguette, 2 tranches) ou 5 biscottes			×				
Pain + beurre					×		
Pain + confiture ou miel					×		
Pain + beurre et confiture						×	
Pain + fromage					×		
Pain + beurre et fromage						×	
Laitages							
Yaourt nature ou fromage blanc		×					
Yaourt 0 % ou fromage blanc 0 %	×						
TOTAL CALORIES							

## Collation

PORTIONS	CALORIES						TOTAL
	50	100	150	200	250	> 300	
Boissons							
Jus de fruits (250 mL)			×				
Coca-limonade			×				
Aliments							
Chocolat à croquer (1 barre)	×						
Pain (1/4 baguette)			×				
+ beurre						×	
Pain au chocolat						×	
Croissant			×				
Confiture ou miel (1 cuil. à soupe)		×					
Biscottes (2)	×						
TOTAL CALORIES							

\* L'enquête rapide consiste à pointer dans la colonne de droite (TOTAL) les aliments choisis. Le TOTAL est inscrit dans la dernière case en bas à droite.

## OBÉSITÉ (5)

## Déjeuner et dîner

PORTIONS	CALORIES						TOTAL
	50	100	150	200	250	> 300	
Entrées							
Crudités							
Crudités assaisonnées							
Huile : 1 cuil. à soupe		x					
Mayonnaise		x					
Pizza maigre					x		
Pizza grasse						x	
Quiche				x			
Charcuteries (30 g)			x				
Plats							
Viande grillée maigre (125 g)				x			
Viande grillée grasse						x	
Viande en sauce						x	
Poisson maigre (150 g)		x					
Poisson « gras »				x			
Poisson en sauce					x		
Poisson frit					x		
Crustacés			x				
Œufs (2)			x				
+ beurre				x			
Légumes							
Légumes verts (200 g cuits)		x					
Légumes secs (150 g cuits)			x				
Féculents (200 g cuits)				x			
+ beurre					x		
Laitages							
Fromage dir (30 g)		x					
Réduits en matières grasses	x						
Yaourt nature	x						
+ sucre		x					
+ sucre et fruits			x				
Desserts							
Fruits (100 g)	x						
Fruits secs			x				
Pâtisseries						x	
+ crème						x	
Glaces				x			
Sorbets		x					
Pain (1/4 baguette)			x				
Boissons							
Vin (2 verres)					x		
Bière (demi)		x					
Cidre (2 verres)			x				
Apéritif (50 mL)		x					
Alcool sec (50 mL)		x					
Liqueur (50 mL)		x					
TOTAL CALORIES							

## ANTITHYROÏDIENS DE SYNTHÈSE

## ■ Benzylthiouracile

<b>BASDÈNE</b>					
Traitement d'attaque : 9 à 12 cp./j	50 cp. 25 mg	3,86	I	65 %	0,08
Traitement d'entretien : 2 à 4 cp./j					

## ■ Carbimazole

<b>NÉO-MERCAZOLE</b>					
Traitement d'attaque : 40 à 60 mg/j	50 cp. 5 mg	3,81	I	65 %	0,08
Traitement d'entretien : 10 à 15 mg/j à atteindre progressivement	30 cp. 20 mg	4,52	I	65 %	0,15

## ■ Propylthiouracile

<b>PROPYLEX</b>					
Traitement d'attaque : 6 à 9 cp./j	30 cp. 50 mg	8,88	I	65 %	0,30
Traitement d'entretien : 1 à 4 cp./j	90 cp. 50 mg	25,55	I	65 %	0,28

## PROPRIÉTÉS

Les thiourés (**benzylthiouracile**) et les imidazoles (**carbimazole**) bloquent l'activité de la thyroïde en inhibant l'organification de l'iode et la transformation des iodosytosines en iodothyronines. Le **propylthiouracile** (PTU) inhibe en outre la conversion périphérique de la T4 en T3.

## INDICATIONS

Hyperthyroïdies diffuses.  
Préparation à la thyroïdectomie de toutes les hyperthyroïdies.

## CONTRE-INDICATIONS

Cancers thyroïdiens différenciés.  
Hémopathies préexistantes.  
Insuffisance hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## • Grossesse

Les **ATS** traversent la barrière placentaire. Il n'y a pas de contre-indication absolue mais le traitement par **ATS** doit être prescrit à la dose la plus faible possible et sous surveillance (cf. Hyperthyroïdies - Formes particulières).

Avant la 7<sup>e</sup> sem., il faut prescrire le **propylthiouracile** car il y a un risque d'aplasie du cuir chevelu chez l'enfant avec le **carbimazole**.

• **Allaitement** : contre-indiqué car les **ATS** sont excrétés dans le lait.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Leuconéutropénie modérée

Une leucopénie entre 3 500 et 4 000/mm<sup>3</sup> et une neutropénie = 1 500/mm<sup>3</sup> sont fréquentes au cours de l'hyperthyroïdie : elles ne contre-indiquent pas les **ATS**. La surveillance rapprochée de la NFS permet de s'assurer de sa normalisation spontanée. L'arrêt s'impose si les PNN sont < 1 200/mm<sup>3</sup>.

L'agranulocytose, rare mais grave, est de mécanisme immunoallergique (0,5 % des cas).

L'allergie au **carbimazole** n'est pas forcément croisée avec une allergie au PTU.

Surveillance de la NFS tous les 10 j pendant 2 mois puis tous les mois et si fièvre, angine ou toute autre infection.

L'aplasie médullaire est exceptionnelle.

## Accidents digestifs

Nausées, vomissements et épigastralgies.  
Toxicité hépatique : le **carbimazole** peut entraîner un ictère cholestatique pur ; le PTU peut provoquer une cytolysse.

## Réactions cutanées

Rash érythémateux, urticaire, arthralgies et myalgies.

## Augmentation du volume du goitre

Cette manifestation se rencontre lors de traitements prolongés sans surveillance ou en cas de surdosage par les **ATS**. Il existe toujours une hypothyroïdie associée. Cet inconvénient est évité par l'adjonction de **L-thyroxine**.

## IODE

## ■ Iode

**LUGOL FORT (SOLUTION DE)**

60 à 90 gttes/j en 3 prises (20 gttes avant chaque repas dans un peu de lait pour le goût)  
Le traitement ne doit pas dépasser quelques semaines

1 fl. (iodure métalloïdique 5 g + iodure de potassium 10 g + eau distillée qsp 10 mL)

NR

**PROPRIÉTÉS**

L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. L'apport souhaitable est de 250 à 300 mg/j.

En excès, l'iode bloque les mécanismes d'élaboration des hormones thyroïdiennes. Il est accumulé massivement dans la glande thyroïde puis est lentement éliminé dans les urines en plusieurs semaines ou mois.

**INDICATIONS**

Goitre endémique : prévention et traitement.  
L'administration d'**iode** à titre préventif se fait par iodation du sel de cuisine, ou de l'eau de boisson, ou plus rarement du pain. Ce traitement est réalisé à l'échelon national.

Hyperthyroïdie : l'**iode** est un traitement efficace des hyperthyroïdies diffuses (maladie de Basedow).

Il n'est utilisé qu'en cas de contre-indication des **antithyroïdiens de synthèse** et dans le but de préparer le patient à la chirurgie.

Il y a un phénomène d'échappement qui se traduit par la réapparition d'une hyperthyroïdie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'iode : des accidents graves peuvent survenir : œdème de Quincke, rashes généralisés.

**Grossesse.**

Contre-indication formelle : blocage de la thyroïde fœtale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Iodisme : goût métallique de la salive, troubles digestifs, éruptions cutanées acnéiformes.

Allergie à l'iode.

Hypothyroïdies par blocage thyroïdien.

Hyperthyroïdies (effet Wolff-Chaikoff).

**Facteurs déclenchants d'une crise aiguë thyrotoxique**

- Traitement chirurgical ou par iode radioactif d'une hyperthyroïdie chez un patient mal préparé.
- Infection.
- Traumatisme.
- Intervention chirurgicale.
- Accouchement, toxémie gravidique.
- Acidocétose diabétique.

**Traitement d'une crise aiguë thyrotoxique**

- Hospitalisation en réanimation.
- Nursing.
- Refroidissement progressif en cas d'hyperthermie.
- Traitement du collapsus : **amines vasopressives**.
- **ATS** par voie digestive intensive (sonde gastrique) : **propylthiouracile** (80 à 100 mg).
- **Iodure de sodium IV** : 250 mg toutes les 6 h.
- **β-bloquant** s à forte dose : **AVLOCARDYL** 140 mg/j.
- **Corticoïdes** : 1 mg/kg/j.

## IODE ET MÉDICAMENTS (1)

Les besoins en iode de l'organisme sont de 250 mg/j environ, chez l'adulte. Les apports iodés (eau et aliments) couvrent ces besoins.

Lorsque les apports iodés augmentent, la production des hormones thyroïdiennes s'accroît jusqu'à une valeur limite, puis elle diminue par blocage de l'organification des iodures. Il s'agit de l'effet Wolff-Chaïkoff ; il est en général transitoire, d'où l'action limitée dans le temps du soluté iodo-ioduré dit de **LUGOL**, autrefois utilisé dans le traitement de la maladie de Basedow. L'augmentation des apports iodés, réalisée notamment par la prescription de médicament iodés ou l'administration de produits iodés de contraste (voir tableaux) peut conduire à deux situations pathologiques opposées :

- chez certains sujets, notamment en cas d'anomalie mineure de la synthèse des hormones thyroïdiennes ou d'existence d'une thyroïdite sous-jacente, il n'y a pas d'échappement à l'effet Wolff-Chaïkoff et une hypothyroïdie s'installe ;
- à l'inverse, d'autres sujets développent une hyperthyroïdie soit parce qu'ils sont porteurs d'un goitre ancien, remanié, en général multinodulaire, comportant des nodules fonctionnels qui s'activent en raison de l'apport accru d'iode, soit parce que l'apport d'iode entraîne sur une glande antérieurement saine la libération subite de la réserve hormonale contenue dans les vésicules thyroïdiennes (thyroïdite iodée).

Ces dysthyroïdies induites par l'iode sont en général transitoires ; leur durée dépend de la quantité du produit iodé administré et de sa

vitesse d'élimination. Elle va de quelques jours (produit à base d'érythrosine) à plusieurs mois. Des recommandations relatives à l'utilisation des produits de contraste iodés ont été émises par la Société française d'endocrinologie et la Société de radiologie, à l'usage des radiologues.

Chez le nouveau-né prématuré et de petit poids : éviter autant que possible l'administration de produits de contraste iodés, ou utiliser la dose la plus faible possible (risque d'hypothyroïdie).

Chez l'adulte, il y a contre-indication absolue en cas d'hyperthyroïdie non traitée (risque d'aggravation), ou si le patient doit bénéficier d'une scintigraphie thyroïdienne ou d'une administration thérapeutique d'iode radioactif. Les contre-indications relatives sont les suivantes :

- goitre nodulaire (notamment chez les sujets âgés ou cardiaques) ;
- thyroïdite auto-immune ;
- maladie de Basedow en rémission (pas de contre-indication en cours de traitement par les **ATS**) ;
- antécédents d'hyperthyroïdie par surcharge iodée.

Les dysthyroïdies (hyperthyroïdie ou hypothyroïdie) secondaires à une surcharge iodée les plus fréquentes sont dues à l'**amiodarone** (**CORDARONE**). Alors que les besoins quotidiens en iode sont environ de 0,2 mg/j, un comprimé en apporte environ 9 mg. De plus l'**amiodarone** a une demi-vie d'élimination longue d'environ 10 j.

## Produits les plus riches en iode\*

MÉDICAMENT	UNITÉ	CONTENU (en µg)	PRODUIT IODÉ	SPÉCIALITÉ
<b>BÉTADINE</b>	solution, pansements 10 g p. 100 g	100 000	<b>Polyvidone iodée</b>	Mal. infectieuses
<b>CORDARONE</b>	cp.	80 000	<b>Amiodarone</b>	Cardiologie
<b>COLCHIMAX</b>	cp.	14 300	<b>Iodure de tiémonium</b>	Rhumatologie

\* Les besoins moyens en iode d'un adulte étant de 200 à 250 µg/j, un seul comprimé de **CORDARONE** apporte près de 400 fois la dose quotidienne !

## IODE ET MÉDICAMENTS (2)

### Produits de contraste iodés

TRIIODÉS SOLUBLES UROANGIOGRAPHIQUES	
TÉLÉBRIX	
TÉLÉBRIX 30 MEGLUMINE	
TÉLÉBRIX 12 SODIUM	
TRIIODÉS HYDROSOLUBLES NON IONIQUES neurologiques, vasculaires, urologiques	
IOMÉRON	
IOPAMIRON (200, 200, 370)	
IVÉPAQUE	
OMNIPAQUE (180, 240, 300, 350)	
OPTIJECT	
OPTIRAY (300, 350)	
ULTRAVIST (300, 370)	
VISIPAQUE (270, 320)	
XENETIX (250, 300, 350)	
HEXAIODÉS UROANGIOGRAPHIQUES	
HEXABRIX	
AUTRES PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS	
LIPIODOL	Lymphographie
TÉLÉBRIX GASTRO	Gastro-entérologie
TÉLÉBRIX HYSTERO	Gynécologie

## HORMONES THYROÏDIENNES (1)

## ■ Lévothyroxine sodique

<b>LÉVOTHYROX</b>					
La posologie de remplacement est de 1,5 µg/kg/j soit 100 à 150 µg/j en une seule prise le matin à jeun	30 cp. séc. 25 µg	1,34	II	65 %	0,04
	30 cp. séc. 50 µg	1,79	II	65 %	0,06
	30 cp. séc. 75 µg	2,28	II	65 %	0,08
	30 cp. séc. 100 µg	2,74	II	65 %	0,09
	30 cp. séc. 125 µg	3,20	II	65 %	0,11
	30 cp. séc. 150 µg	3,68	II	65 %	0,12
	30 cp. séc. 175 µg	4,14	II	65 %	0,14
	30 cp. séc. 200 µg	4,62	II	65 %	0,15
<b>L THYROXINE SERB</b>					
Seule forme injectable disponible (voie IM ou IV)	450 gttes (1 gtte = 5 µg) soluté buvable 15 mL conserver à + 4° C	4,77	II	65 %	0,01
	6 amp. 1 mL 200 µg/mL	HOP	II		

## ■ Liothyronine sodique

<b>CYNOMEL</b>					
Hypothyroïdie non traitée : posologie initiale est de 1/4 ou 1/2 cp. à adapter de façon hebdomadaire	30 cp. 25 µg	3,01	II	65 %	0,10

## ■ Liothyronine sodique + lévothyroxine sodique

<b>EUTHYRAL</b>					
Produit à n'utiliser que dans des cas très particuliers (comas thyroïdiens)	50 cp. 100 µg LT4 + 20 µg LT3	3,32	II	15 %	0,07



## HYPOTHYROÏDIE (3)

### Hypothyroïdies iatrogènes

Les produits les plus fréquemment en cause sont :

- surcharge iodée ;
- **antithyroïdiens de synthèse** ;
- **lithium**.

### Arrêt du traitement

Il n'est pas obligatoire si le médicament prescrit est indispensable.

Dans ce cas, on instaure le traitement substitutif. Les doses de **LÉVOTHYROX** sont variables entre 75 et 150 µg/j.

### Durée du traitement

Elle est variable : elle peut être passagère, tant que dure la prise du médicament en cause, ou définitive lorsque l'hypothyroïdie ne disparaît pas à l'arrêt du traitement (pathologie sous-jacente révélée par le traitement).

### Coma hypothyroïdien

C'est une urgence médicale qui devient assez rare depuis la généralisation des bilans thyroïdiens. C'est néanmoins une situation qui met en jeu le pronostic vital ; le patient est hospitalisé en unité de soins intensifs. Le traitement est débuté dès les prélèvements faits mais sans en attendre les résultats : tout retard thérapeutique assombrit le pronostic. Les dosages de T4L et TSH confirmeront le diagnostic *a posteriori*.

### Traitement symptomatique

- *Mise en condition du malade*
- Repos au lit. Patient à jeun.
- Mise en place d'une voie veineuse périphérique puis, si besoin, centrale.

- Pose d'une sonde nasale d'oxygène, d'une sonde urinaire et d'une sonde gastrique.

- Mise en place d'un monitoring cardiotensionnel.

#### ► *Correction des troubles ventilatoires*

- Assurer la liberté des voies aériennes. Éviter l'encombrement bronchique (aspirations).

- Oxygénothérapie ; si nécessaire : intubation et ventilation assistée.

#### ► *Réchauffement progressif*

Réchauffement externe passif : chambre à 25 °C, couvertures.

#### ► *Correction des troubles hydroélectrolytiques*

Par des solutés iso- voire hypertoniques à cause de l'hyponatrémie. Si natriurèse basse : restriction hydrique ; si natriurèse élevée : apports sodés sous stricte surveillance de la pression veineuse centrale.

- *Correction des troubles cardiovasculaires*  
Concentrés globulaires et solutés de remplissage type **VOLUVEN** en cas de collapsus. Il faut rester prudent avec les drogues inotropes en cas d'insuffisance cardiaque.

#### ► *Traitement du facteur déclenchant*

Une antibiothérapie sera débutée par voie intraveineuse en cas de suspicion d'infection.

#### ► *Nursing*

Commun à tous les malades hospitalisés en réanimation (soins des yeux, de la bouche, aspiration bronchique, prévention d'escarres, etc.), il est d'autant plus important que les patients atteints de coma myxoédémateux sont souvent âgés.

**HORMONES THYROÏDIENNES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'hormone active est la T3 mais l'hormone de remplacement utilisée est la T4. Elle est de durée plus longue (8 j), convertie en T3 dans l'organisme.

Absorption digestive rapide. Biodisponibilité : 50 %. Passage intact dans la circulation. Durée d'action : 1 sem.

Action sur la croissance et le développement, la calorigénèse, le système cardiovasculaire, le métabolisme de la cellule, et l'inhibition de la sécrétion de TSH.

La fraction libre représente la forme active. La LT4 ne passe pas la barrière placentaire, mais est retrouvée dans le lait maternel.

La tri-iodothyronine ou liothyronine (LT3) a une diffusion tissulaire rapide et une durée d'action de 48 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperthyroïdie, cardiopathie décompensée non hypothyroïdienne, troubles du rythme.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez le sujet âgé, la mise en route du traitement doit être très progressive.

Chez le sujet coronarien, le traitement doit être instauré sous surveillance clinique et ECG +  $\beta$ -bloquants.

Il doit être commencé à doses faibles par paliers de 8 à 15 j.

En cas de panhypopituitarisme, le traitement de l'insuffisance corticotrope doit primer.

**Grossesse** : le traitement peut être prescrit pendant toute la durée de la grossesse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aggravation d'une cardiopathie (angor, infarctus du myocarde, troubles du rythme).

Apparition de signes d'hyperthyroïdie (surdosage) : insomnie, excitabilité, tachycardie, céphalées, sueurs, amaigrissement, diarrhée, tremblements.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aux doses substitutives habituelles, les **hormones thyroïdiennes** n'ont pas d'interactions médicamenteuses. Ce n'est qu'en cas de surdosage qu'apparaissent les effets.

Seuls les patients sous **anticoagulants** doivent être surveillés plus étroitement au début du traitement par **hormones thyroïdiennes**.

Les **sels de fer**, les **pansements gastriques**, les **inhibiteurs de la pompe à protons** et la **colestyramine** diminuent l'absorption digestive de la **lévothyroxine** et doivent donc être administrés à distance.

Hypothyroïdies de l'enfant : cf. Hypothyroïdies de l'enfant (pédiatrie).

## AGENT ANTIPARATHYROÏDIEN

## ■ Cinacalcet

MIMPARA					
Hyperparathyroïdie secondaire : Poso. initiale : 30 mg x 1/j au cours du repas Adaptation des doses toutes les 2 à 4 sem. Poso. max. 180mg/j. Objectif : PTH intacte plasmatique : 150-300 pg/mL Cancer parathyroïdien : Poso. initiale 30 mg x 2/j puis augmentation toutes les 2 à 4 sem. jusqu'à 90 mg x 2/j pour atteindre une calcémie ≤ à la limite supérieure de la normale	28 cp. 30 mg	198,01	I	65 %	7,07
	28 cp. 60 mg	356,72	I	65 %	12,74
	28 cp. 90 mg	529,78	I	65 %	18,92

## PROPRIÉTÉS

Agent calcimimétique qui diminue directement le taux de parathormone (PTH) en augmentant la sensibilité du récepteur au calcium extracellulaire. La diminution du taux de PTH est associée à une réduction concomitante de la calcémie.

## INDICATIONS

Hyperparathyroïdie secondaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale.

Hypercalcémie chez les patients atteints de cancer de la parathyroïde.

Peut être utilisé dans le cadre d'un traitement comportant des **chélateurs du phosphate** et/ou des **analogues de la vitamine D** selon les besoins.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **cinacalcet**, patients de moins de 18 ans, allaitement.  
Déconseillé pendant la grossesse.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction d'hypersensibilité.

Anorexie, nausées, vomissements, dyspepsie.

Rash, myalgie, asthénie, hypocalcémie, diminution du taux de testostérone.

Vertige, paresthésies, crise convulsive.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **cinacalcet** est en partie métabolisé par le CYP3A4, donc un ajustement de sa posologie est nécessaire si un inhibiteur (**kétoconazole**, **voriconazole**, **ritonavir**, etc.) ou un inducteur (**rifampicine**) du CYP3A4 est administré de façon concomitante.

Le **cinacalcet** est un inhibiteur puissant du CYP2A6, d'où la nécessité d'adapter la posologie des médicaments métabolisés par le CYP2D6 (**flécaïnide**, **propafénone**, **métoprolol**, **désipramine**, **nortriptyline**, **clomipramine**, etc.).

# ANTICORTISOLIQUES (1)

## ■ Mitotane (ou OP'DDD)

LYSODREN					
Dose initiale : 2 à 3 g/j à augmenter progressivement si besoin Débuter à 4 à 6 g/j en cas de syndrome de Cushing sévère et adapter secondairement la dose	100 cp. 500 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Dérivé du DDT, c'est un bloqueur enzymatique de la synthèse du cortisol ; il possède également une activité antitumorale (action cytotoxique pour le cortex surrénalien).

## INDICATIONS

Syndrome de Cushing.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doses progressives avec surveillance du taux plasmatique, quand c'est possible (ne pas dépasser 20 mg/L).

Associer systématiquement, immédiatement ou au bout de quelques jours, à un traitement par **hydrocortisone**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ses effets secondaires sont nombreux, parmi les plus fréquents :

– troubles digestifs : nausées, diarrhée, vomissements, élévation des enzymes hépatiques (GGT, ASAT, ALAT) ;

– troubles métaboliques : hypercholestérolémie, hypertriglycémie ;  
– troubles neurologiques : paresthésies, vertiges, somnolence, confusion, polynévrite, etc. ;  
– rashs cutanés.

Il existe un risque d'insuffisance surrénale aiguë à partir du 15<sup>e</sup> j de traitement qui nécessite de débuter une hormonothérapie substitutive par **hydrocortisone** voire **fludrocortisone** en cas de traitement prolongé ou à fortes doses.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à la **spironolactone** est contre-indiquée (elle bloque l'action du **mitotane**).

En raison de l'effet inducteur enzymatique : nécessité d'augmenter les doses d'**antivitamines K**, les doses substitutives d'hydrocortisone (une asthénie soulagée par une majoration des doses d'hydrocortisone signe le sous-dosage de ce traitement), risque d'efficacité moindre de la contraception œstroprogestative.

## HYPERCORTICISMES (2)

### Syndromes de Cushing paranéoplasiques

Les syndromes de Cushing paranéoplasiques résultent de la sécrétion ectopique d'ACTH par une tumeur maligne (le plus souvent pulmonaire ou pancréatique). Ils se traduisent par une hyperplasie bilatérale des surrénales.

On réalise l'exérèse du cancer primitif quand c'est possible. Sinon, on prescrit un **anticortisolique** ou une surrénalectomie bilatérale. Le pronostic dépend de celui de la tumeur initiale ; il est souvent mauvais.

### Syndrome de Conn (hyperaldostéronisme primaire)

La production excessive d'aldostérone est due à une tumeur surrénalienne (qui est presque toujours un adénome bénin) ou, plus rarement à une hyperplasie bilatérale des surrénales.

#### Traitement médical

La **spironolactone (ALDACTONE)** à la dose de 3 à 5 mg/kg est capable de corriger complètement les anomalies hydroélectrolytiques dues à l'hyperaldostéronisme. Elle normalise la PA, abaisse le débit cardiaque.

Un traitement prolongé à forte dose peut entraîner des troubles sexuels : impuissance et gynécomastie chez l'homme, troubles menstruels chez la femme. Ces troubles sont réversibles à l'arrêt du traitement.

#### Traitement chirurgical

Le recours à la chirurgie consiste en une surrénalectomie unilatérale en cas d'adénome. Les résultats sont bons : dans 2/3 des cas la situation est normalisée, dans 1/3 des cas un traitement médical antihypertenseur est nécessaire.

Il existe un bon parallélisme entre la réponse au traitement chirurgical et l'abaissement tensionnel obtenu sous **spironolactone (ALDACTONE)**.

**ANTICORTISOLIQUES (2)**■ **Métyrapone**

<b>MÉTOPIRONE</b>					
Dose habituelle entre 250 mg et 6 g/j	50 caps. 250 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Bloqueur enzymatique de la synthèse du cortisol et de l'aldostérone.

**INDICATIONS**

Syndromes de Cushing tumoraux.  
Exploration de l'axe hypophyso-surrénalien (test à la métopirone).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Doses à adapter en fonction de la cortisolémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque à long terme d'HTA ou d'insuffisance surrénalienne (associer à l'**hydrocortisone**).  
Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales.  
Troubles neurologiques : céphalées, vertiges.  
Allergies cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Phénytoïne, fosphénytoïne.**

## HORMONES SURRÉNALIENNES (1) – GLUCOCORTICOÏDES

## ■ Hydrocortisone

<b>HYDROCORTISONE ROUSSEL</b>					
Hormone administrable par voie orale à raison de 20 à 30 mg/j en moyenne Répartir en 2 ou 3 fois du fait de la durée de vie réduite (6 h)	25 cp. 10 mg 50 cp. 10 mg	3,24 HOP	I I	65 %	0,13

**PROPRIÉTÉS**

L'**hydrocortisone** est l'hormone glucocorticoïde physiologique ayant un rôle de maintien de la glycémie (par action sur la néoglucogenèse) et de l'équilibre hydrosodé (en complément de l'aldostérone).

L'**hydrocortisone** a également une action anti-inflammatoire et antiallergique.

Elle agit également sur la volémie et la masse sanguine et a une action antichoc.

**INDICATIONS**

L'indication majeure de l'**hydrocortisone** est le traitement substitutif de l'insuffisance surrénale d'origine surrénalienne et hypophysaire. On l'utilise également en réanimation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune : l'**hydrocortisone** est une hormone substitutive d'importance vitale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils n'apparaissent qu'en cas de surdosage : signes d'hypercorticisme, HTA, hypokaliémie, diabète.

## INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGÜE (1)

Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le traitement doit être débuté dès la suspension du diagnostic.

### Mesures générales

- Voie d'abord veineuse de bon calibre (centrale en cas de choc +++).
- En cas de choc ou de troubles de la conscience :
  - scope, sonde vésicale, aspiration gastrique ;
  - oxygène par voie nasale ;
  - nursing (+++) : malade immobilisé, matelas anti-escarres, réchauffement, humidification des muqueuses, oxygénothérapie, prévention des thromboses veineuses ;
  - ne pas manipuler le patient de façon intempestive : risque de mort subite.

### Réhydratation, apports glucosé et ionique

#### En cas de choc

Commencer par un remplissage vasculaire : **VOLUVEN** 500 mL en 30 min.

#### Dans tous les cas

Soluté glucosé à 50 p. 1 000 + 3 à 4 g de NaCl dans chaque flacon :

- d'abord 1 000 mL la 1<sup>re</sup> h,
- puis 500 mL/h les 3 h suivantes,
- puis 1 500 mL à 2 500 mL pour les 20 h suivantes.

Au total : 3 à 5 000 mL pour les 24 h, contenant 200 g de glucose et 12 à 20 g de NaCl.

Aucun apport potassique.

### Apports hormonaux

Le **glucocorticoïde** utilisé par voie parentérale est l'**hémisuccinate d'hydrocortisone** (amp. injectables, 100 mg). Le **minéralocorticoïde** utilisé est l'**acétate de désoxycorticostérone** (**SYNCORTYL** : amp. injectables de 10 mg). On remplace ensuite par **FLUCORTAC** *per os* (cf. Insuffisance surrénale lente).

Deux techniques de traitement sont possibles :

- 100 mg en IVD + 400 mg en perfusion continue IVSE (à ces fortes doses, l'**hydrocortisone** a un pouvoir minéralocorticoïde) ;
- 100 mg en IVD puis 100 mg en IM toutes les 6 h, associé à du **SYNCORTYL**, 5 mg en IM toutes les 12 h.

### Surveillance

#### Clinique

Pression artérielle (différentielle +++), diurèse, température, état de conscience.

#### Biologique

- Ionogramme sanguin : glycémie, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> (hyperkaliémie au début), Cl<sup>-</sup>, CO<sub>3</sub>H<sup>-</sup>, urée, créatinine (insuffisance rénale fonctionnelle) à répéter toutes les 4 h pendant les 12 premières heures.
- Ionogramme urinaire : Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>.

#### Électrocardiogramme

Recherche de signes d'hyperkaliémie.

### Traitement d'une cause

- Infection (antibiothérapie).
- Chez la femme jeune, recherche d'une grossesse.



## HORMONES SURRÉNALIENNES (2) – MINÉRALOCORTICOÏDES

## ■ Désoxycortone

<b>SYNCORTYL</b>					
1/2 à 1 amp. en IM 1 à 2/j en fonction des signes cliniques et du ionogramme	4 amp. 10 mg	8,46	I	65 %	2,12

## ■ Fludrocortisone (acétate)

<b>FLUCORTAC</b>					
En période aiguë d'insuffisance surrénale : 100 à 200 µg/j (souvent remplacée par le <b>SYNCORTYL</b> IM du fait des troubles digestifs) En période d'insuffisance surrénale chronique : 50 à 200 µg/j Exceptionnellement : 300 µg/j	30 cp. séc. 50 µg 60 cp. séc. 50 µg	107,95	I I	65 % 65 %	1,80

## PROPRIÉTÉS

Hormone d'épargne du sodium, l'aldostérone, minéralocorticoïde naturel, est indispensable à la vie.

Elle permet la réabsorption du sodium et l'élimination du potassium en échange.

Elle contribue à maintenir l'osmolarité plasmatique et la pression artérielle.

Le stimulant principal de sa sécrétion est le système rénine-angiotensine.

Non disponible sous sa forme naturelle, elle est remplacée par la **désoxycortone** injectable ou la **fludrocortisone** administrable par voie orale.

## INDICATIONS

Insuffisance surrénale par atteinte des glandes surrénales.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Association déconseillée avec des médicaments susceptibles d'entraîner des torsades de pointes, digitaliques, inducteurs enzymatiques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Surdosage : rétention sodée, hypokaliémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Rifampicine, barbituriques, phénytoïne, carbamazépine, diurétiques hypokaliémisants.

## INHIBITEURS DE LA SOMATHORMONE (GH) (1) – ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE (1)

### ■ Octréotide

<b>SANDOSTATINE</b>					
Ruptures de varices œsophagiennes : 25 µg/h à la seringue électrique pendant 5 j	6 amp. 50 µg/mL	44,68	I	100 %	7,45
	6 amp. 100 µg/mL	79,81	I	100 %	13,30
	6 amp. 500 µg/mL	359,30	I	100 %	59,88
<b>SANDOSTATINE LP</b>					
1 inj. IM profonde toutes les 4 sem. en commençant par 20 mg, puis 20 mg pour la 2 <sup>e</sup> et la 3 <sup>e</sup> inj. Ajustement ultérieur selon les taux de GH et d'IGF1	1 fl. 10 mg + ser. 2,5 mL	1128,32	I	100 %	1128,32
	1 fl. 20 mg + ser. 2,5 mL	1320,29	I	100 %	1320,29
	1 fl. 30 mg + ser. 2,5 mL	1512,16	I	100 %	1512,16
	1 fl. 30 mg + ser. 2,5 mL	1512,16	I	100 %	1512,16

### ■ Lanréotide

<b>SOMATULINE LP</b>					
1 inj. IM toutes les 2 sem.	1 fl. 30 mg + solv. 2 mL + ser.	660,33	I	100 %	660,33
1 inj. SC profonde toutes les 4 sem.	1 ser. 60 mg	1128,32	I	100 %	1128,32
	1 ser. 90 mg	1320,30	I	100 %	1320,30
	1 ser. 120 mg	1512,16	I	100 %	1512,16

### ■ Pasiréotide

<b>SIGNIFOR</b>					
Maladie de Cushing : chez les patients inopérables ou en cas d'échec de la chirurgie 0,6 mg x 2/j en SC Posologie pouvant varier de 0,3 à 0,9 mg par prise en fonction de la clinique	60 amp 1 mL (0,3 mg/mL)	3382,06	I	100 %	56,37
	6 amp 1 mL (0,6 mg/mL)	405,04	I	100 %	67,51
	60 amp 1 mL (0,6 mg/mL)	3753,27	I	100 %	62,55
	60 amp 1 mL (0,9 mg/mL)	4124,49	I	100 %	68,74

## ACROMÉGALIE (2)

### Traitement médical [1]

Il fait appel à deux catégories de médicaments : les **analogues de la somatostatine** qui inhibent la sécrétion de la GH ou un **antagoniste du récepteur de la GH**.

#### Analogues de la somatostatine

**Lanréotide (SOMATULINE LP)** en commençant par 1 inj. IM de 30 mg toutes les 2 sem. ou 1 inj. SC profonde de 60 mg toutes les 4 sem.

**Octréotide (SANDOSTATINE LP)** en commençant par une injection à 20 mg tous les mois.

**Le but est d'obtenir une normalisation** des taux d'IGF1 et un taux de GH < 2,5 µg/mL (7,5 mUI/L).

Si ces objectifs ne sont pas atteints, on augmente les doses mensuelles à 30 mg pour la **SANDOSTATINE LP** (injections IM) ou à 60, voire 120 mg pour la **SOMATULINE LP** (seringues prêtes à l'emploi pour injection SC profonde).

En cas de GH < 1 µg/mL (3 mUI/L), on peut utiliser la forme à 10 mg de la **SANDOSTATINE LP** ou 1 inj. de **SOMATULINE LP** 120 mg tous les 42 ou 56 j.

Les **analogues de la somatostatine** sont aussi utilisés pour préparer à la chirurgie : le traitement dure de quelques semaines à quelques mois dans les tumeurs volumineuses difficiles à opérer d'emblée (AMM acceptée).

#### Antagoniste du récepteur de la GH

**Pegvisomant (SOMAVERT)** : il est utilisé à raison d'une injection sous-cutanée en commençant par 10 mg par j, en augmen-

tant progressivement les doses jusqu'à 30 mg par paliers de 4 à 6 sem. de façon à obtenir un taux d'IGF1 compris dans les normes pour l'âge. La GH s'élève sous **pegvisomant** et n'est donc plus le reflet du contrôle de l'acromégalie.

#### Antagonistes dopaminergiques

Ils ne normalisent les taux de GH et d'IGF1 que dans 10 % des cas. La **bromocriptine (PARLODEL)** ou la **quinagolide (NORPROLAC)** sont presque exclusivement utilisés dans les adénomes mixtes sécrétant à la fois de la GH et de la prolactine.

### Traitement radiothérapique

La radiothérapie est indiquée en cas d'ablation incomplète de l'adénome, de récurrence, chez les patients inopérables, ou chez les patients opérés non guéris avant traitement médical et ne supportant pas ce dernier.

#### Radiothérapie conventionnelle

Elle est utilisée à la dose de 45 à 50 Gy fractionnée en plusieurs séances. Son délai d'action est long et elle ne permet d'obtenir une guérison que dans 50 % des cas. Elle est rarement compliquée de radionécroses (cerveau, chiasma optique), mais elle expose à long terme au risque d'insuffisance hypothalamo-hypophysaire.

#### « Gamma knife »

Cette technique consiste à administrer en une seule séance un rayonnement gamma concentré sur l'adénome après repérage stéréotaxique. Elle n'est utilisée que dans quelques centres disposant de l'équipement permettant de l'appliquer.

### CONSENSUS

[1] Consensus français sur la prise en charge de l'acromégalie, SFE, 2008

## INHIBITEURS DE LA SOMATHORMONE (GH) (2) – ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Les analogues de la somatostatine (**octréotide**, **lanréotide**, **pasiréotide**) ont une action similaire à la somatostatine : comme elle, ils se fixent sur les récepteurs des cellules somatotropes et ils inhibent la sécrétion de l'hormone de croissance. Ils peuvent réduire la taille de la tumeur. Ils inhibent la sécrétion de somathormone, l'**octréotide** se fixe sur les récepteurs hypophysaires des cellules sécrétant l'hormone de croissance. Il inhibe également mais dans une moindre mesure les sécrétions de TSH et de prolactine.

Actifs également sur les sites somatostatino-sensibles du tube digestif, les **analogues de la somatostatine** inhibent les sécrétions endocrines pancréatiques (insuline, glucagon, amyline) et les sécrétions digestives (gastrine, cholecystokinine, VIP, sérotonine).

**Octréotide** et **lanréotide** sont présentés sous des formes à libération prolongée, qui permettent une durée d'action de plusieurs semaines. Le **pasiréotide** présente une affinité différente des deux autres pour les récepteurs à la somatostatine, il n'a donc pas les mêmes indications.

### INDICATIONS

**Acromégalie** : lorsque la sécrétion d'hormone de croissance n'est pas normalisée après chirurgie et/ou radiothérapie ou en cas de macroadénomes expansifs ou invasifs, non opérables.

**Adénomes thyroïdiques primitifs** : lorsque la sécrétion n'est pas normalisée après chirurgie ou radiothérapie ou chez les patients ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou radiothérapique.

**Autres adénomes hypophysaires (indications exceptionnelles non reconnues par l'AMM) ; adénomes gonadotropes, adénomes corticotropes (au cours du syndrome de Nelson), adénomes non fonctionnels** notamment en cas de troubles visuels liés à une compression des voies optiques avant la chirurgie, avant ou après la radiothérapie ou lorsqu'aucun geste thérapeutique n'est possible ou efficace.

### Indications digestives :

- traitement des tumeurs digestives endocrines;
- rupture des varices œsophagiennes (**octréotide**, forme d'action rapide);
- prévention et traitement des fistules pancréatiques.

**Maladie de Cushing** : chez les patients adultes inopérables ou en cas d'échec de la chirurgie.

### CONTRE-INDICATIONS

#### Grossesse et allaitement.

**Pasiréotide** : insuffisance hépatique sévère. La grossesse et l'allaitement sont déconseillés mais non contre-indiqués pour ce médicament.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le diabète de type 2 peut être aggravé par l'administration des **analogues de la somatostatine** ; au contraire, ils diminuent les besoins en insuline du diabétique de type 1.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs mineurs (nausées, vomissements) et possible altération de l'état général (anémie, asthénie, céphalées) essentiellement les 3 à 6 premiers mois.

Le principal effet secondaire est la survenue d'une lithiase vésiculaire qui se complique exceptionnellement. Une échographie de surveillance avant la mise en route du traitement est indiquée en cas de traitement prolongé. La pertinence de la surveillance échographique sous traitement se discute.

Élévation de la glycémie (compensée par l'amélioration de l'insulinorésistance sous traitement).

Le **pasiréotide** entraîne fréquemment des élévations des enzymes hépato-biliaires et pancréatiques ainsi que des troubles cardiovasculaires tels qu'hypotension artérielle ou bradycardie. Une surveillance clinique étroite est donc recommandée en début de traitement surtout en cas d'association à des médicaments présentant les mêmes propriétés.

## INHIBITEURS DE LA SOMATHORMONE (GH) (3) – ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE LA SOMATROPINE

### ■ Pegvisomant

<b>SOMAVERT</b>					
1 inj. SC de 10 mg/j avec augmentation toutes les 4 à 6 sem. par paliers de 5 mg Dose max. 30 mg/j	30 fl. 10 mg + solv.	2 128,67	I	100 %	70,96
	30 fl. 15 mg + solv.	3 172,45	I	100 %	105,75
	1 fl. 20 mg + solv.	157,49	I	100 %	157,49
	30 fl. 20 mg + solv.	4 216,22	I	100 %	140,54

### PROPRIÉTÉS

Le **pegvisomant** est le seul antagoniste des récepteurs de la GH : c'est un analogue de la GH, génétiquement modifié, qui se fixe sur les récepteurs périphériques de cette dernière et en bloque l'activité. Il entraîne une baisse sélective de la production d'IGF1.

### INDICATIONS

Traitement de l'acromégalie chez les patients ayant une réponse insuffisante à la chirurgie et/ou la radiothérapie, chez lesquels les **analogues de la somatostatine** ont été mal tolérés ou insuffisamment efficaces pour normaliser le taux circulant de l'IGF1.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une réduction des doses d'**hypoglycémifiants oraux** ou d'insuline est parfois nécessaire chez les patients sous **pegvisomant** (augmentation de la sensibilité à l'insuline).

Risque d'augmentation du volume tumoral (surveillance par l'imagerie hypophysaire et le champ visuel).

Surveillance des transaminases toutes les 4 à 6 sem. pendant les 6 premiers mois de traitement.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction au point d'injection, sudation, céphalées, asthénie.

Développement d'anticorps anti-hormone de croissance dont la signification est inconnue.

Diarrhée, constipation, nausées, vomissements, météorisme abdominal, dyspepsie, flatulence, bouche sèche, sialorrhée, troubles dentaires.

Syndrome grippal, asthénie, ecchymose ou hémorragie au point d'injection, œdèmes des membres inférieurs.

Myalgies, arthralgies, arthrite.

Vertiges, tremblements, hypoesthésie, dysgueusie.

Sudation, prurit, rash, peau sèche.

Troubles du sommeil, troubles de l'humeur, augmentation de la libido, troubles mnésiques.

Prise de poids, hyperglycémie (rarement hypoglycémie), hypercholestérolémie (rarement hypertriglycéridémie), faim.

Dyspnée, troubles visuels.

Hématurie, protéinurie, insuffisance rénale.

Hypertension artérielle.

Thrombopénie, leucopénie, leucocytose.

Hépatites médicamenteuses exceptionnelles.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Surveiller et éventuellement diminuer la posologie de l'insuline ou d'**hypoglycémifiants oraux**.

## ANTIPROLACTINIQUES

## ■ Bromocriptine

<b>PARLODEL</b>					
Posologie progressive : 1/2 cp. le 1 <sup>er</sup> j puis 1 cp. le 2 <sup>e</sup> j puis augmentation progressive par paliers de 1 cp. tous les 2 j	20 cp. séc. 2,5 mg	4,21	I	65 %	0,21
Traitement prolongé	30 cp. séc. 2,5 mg	5,89	I	65 %	0,20
La posologie maximale est de 40 mg/j	30 gél. 5 mg	9,03	I	65 %	0,30
	30 gél. 10 mg	15,96	I	65 %	0,53

## ■ Quinagolide

<b>NORPROLAC</b>					
Posologie progressive : 25 µg pendant 3 j, puis 50 µg pendant 3 j, puis 75 µg jusqu'à la fin du 1 <sup>er</sup> mois de traitement	3 cp. 25 µg + 3 cp. 50 µg	6,75	I	65 %	2,25
Traitement maximum : 300 mg/j	30 cp. 75 µg	30,03	I	65 %	1,00
	30 cp. 150 µg	51,42	I	65 %	1,71

## ■ Cabergoline

<b>DOSTINEX</b>					
Commencer par 0,5 mg/sem. Augmenter la dose par paliers de 0,5 mg en fonction de la prolactinémie mesurée 4 sem. après l'initiation du traitement	8 cp. 0,50 mg	32,28	I	65 %	4,04

## ■ Lisuride

<b>AROLAC</b>					
Posologie progressive : 1/2 cp. le 1 <sup>er</sup> j puis 2 x 1/2 cp. le 2 <sup>e</sup> j et 3 x 1/2 cp./j puis augmenter éventuellement la dose tous les 3 à 4 j	20 cp. séc. 0,2 mg	6,51	I	65 %	0,33
<b>DOPERGINE</b>					
Idem <b>AROLAC</b>	30 cp. séc. 0,2 mg	9,01	I	65 %	0,30

## PROPRIÉTÉS

Agonistes dopaminergiques réduisant la sécrétion hypophysaire de prolactine.

## INDICATIONS

Hyperprolactinémie idiopathique.  
Prolactinomes.

Inhibition de la montée laiteuse pour **bromocriptine (PARLODEL)** et **lisuride (AROLAC, DOPERGINE)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Toxémie gravidique et hypertension du post-partum (contre-indication formelle).  
Insuffisance coronaire.

L'allaitement n'est pas possible sous traitement.

Traitements par les **antipsychotiques** (sauf **clozapine**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Administer avec prudence en cas de troubles psychiatriques, troubles confusionnels, délires, syndromes d'excitation psychomotrice.  
Surveillance de la pression artérielle.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, vomissements, constipation.  
Troubles neurologiques : céphalées, vertiges, dyskinésies, malaise général.  
Hypertension.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Antagonisme avec les **antipsychotiques** et les **antiémétiques**.

**Dérivés de l'ergot de seigle** et **sympathomimétiques** : risque de vasoconstriction et de poussées hypertensives.

**Macrolides** (sauf **spiramycine**) : risque d'augmentation des taux plasmatiques du dopaminergique.

## HORMONE DE CROISSANCE (1)

## ■ Somatotropine

<b>NORDITROPINE SIMPLEXX</b>					
Retard de croissance lié à un déficit somatotrope chez l'enfant : 25 à 35 µg/kg/j	1 inj. 5 mg/1,5 mL	160,54	I	100 %	160,54
Retard de croissance lié à un syndrome de Turner : 50 µg/kg/j	1 inj. 10 mg/1,5 mL	312,20	I	100 %	312,20
Retard de croissance chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel : 35 µg/kg/j	1 inj. 15 mg/1,5 mL	463,08	I	100 %	463,08
Retard de croissance chez les enfants prépubères lié à une insuffisance rénale chronique : 50 µg/kg/j					
Déficit en hormone de croissance en rapport avec un syndrome hypothalamo-hypophysaire connu chez l'adulte : 0,1 à 0,3 mg/j					
<b>NUTROPINAQ</b>					
Idem <b>NORDITROPINE SIMPLEXX</b>	1 inj. 10 mg/2 mL	312,20	I	100 %	312,20
<b>SAIZEN</b>					
Retard de croissance lié à un déficit somatotrope chez l'enfant : 0,7 à 1 mg/m <sup>2</sup> /j	1 sol. inj. 5,83 mg/mL	191,49	I	100 %	191,49
Retard de croissance lié à un syndrome de Turner et retard de croissance chez les enfants prépubères lié à une insuffisance rénale chronique : 1,4 mg/m <sup>2</sup> /j	1 sol. inj. 8 mg/mL	608,88	I	100 %	608,88
Retard de croissance chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel : 35 µg/kg/j					
Déficit en hormone de croissance en rapport avec un syndrome hypothalamo-hypophysaire connu chez l'adulte : 0,15 à 0,3 mg/j					
<b>SAIZEN CLICKEASY</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 fl. pdre + amp. solv. 8 mg/1,37 mL	251,84	I	100 %	251,84
<b>UMATROPE</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. 6 mg/3 mL	191,49	I	100 %	191,49
	1 cart. 12 mg/3 mL	372,55	I	100 %	372,55
	1 cart. 24 mg/3 mL	722,43	I	100 %	722,43
<b>ZOMACTON</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 fl. pdre + amp. solv. 4 mg/3,5 mL	119,39	I	100 %	119,39
	1 fl. pdre + amp. solv. 10 mg/mL	288,97	I	100 %	288,97

## INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE (IAH) (2)

### Traitement du déficit gonadotrope (en LH et FSH)

Le traitement est différent selon que le patient désire ou non une descendance. Si le patient ne désire pas procréer, on prescrit un traitement substitutif par les hormones gonadiques.

Dès qu'il y a désir de descendance, on s'adresse aux gonadotrophines qui permettent d'induire l'ovulation chez la femme et de stimuler la spermatogenèse chez l'homme.

► *Traitement substitutif par les hormones gonadiques*

#### Chez l'homme

Il s'agit d'une hormonothérapie substitutive importante, surtout chez le sujet jeune afin de maintenir une libido et une activité sexuelle normale et d'éviter à long terme une déminéralisation osseuse sévère.

On utilise la **testostérone**, qui est disponible sous plusieurs formes :

- forme injectable en intramusculaire : **énanthate de testostérone (ANDROTARDYL)** à raison d'une injection de 250 mg toutes les 2 ou 4 sem., ou **undécanoate de testostérone 1 000 mg (NEBIDO)** à raison d'une injection toutes les 10 à 14 sem. L'intervalle des injections doit être adapté en fonction des dosages de testostérone plasmatique effectués avant l'injection suivante ;

- forme transdermique : gel de testostérone à 1 % en sachet de 25 ou 50 mg de testostérone (**ANDROGEL**). La dose recommandée est de 50 mg par j, mais ce médicament n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale ;

- forme orale : capsule à 40 mg (**PANTESTONE**). En raison de la mauvaise biodisponibilité de la testostérone par voie orale. Il faut au moins 3 capsules par j et parfois plus pour normaliser le taux plasmatique de la testostérone.

On peut aussi utiliser le gel de la **dihydrotestostérone** ou **androstanolone (ANDRAC-**

**TIM**). Cette spécialité n'est pas remboursée dans le traitement de l'hypogonadisme.

#### Chez la femme

Il est d'autant plus indispensable de réaliser une hormonothérapie substitutive que la femme est jeune, afin de maintenir la trophicité des tissus sensibles aux œstrogènes (vagin, squelette, peau).

- œstrogènes

On utilise du **17- $\beta$ -estradiol** soit par voie transdermique, sous forme de gel (**OESTROGEL**, **OESTRODOSE**, **ESTREVA**, **DÉLIDOSE**) : 0,5 à 1,5 mg par j ou de patch que l'on applique 2 fois par sem. (**ESTRADERM TTS**, **CLIMARA**, **DERMESTRIL**, **CESCLIM**) ou 1 fois par sem. (**DERMESTRIL SEPTEM**, **FEMSEPT**, **ESTRAPATCH**, **THAIS SEPT**), soit *per os* à raison de 1 à 2 mg par j (**ESTROFEM**, **ESTREVA comprimés**, **OROMONE**, **PROVAMES**, **PROGYNOVA**).

- Progestatifs

Il est indispensable, en l'absence d'hystérectomie, d'associer au traitement œstrogénique un **progestatif** pour équilibrer les effets du **17- $\beta$ -estradiol** sur l'endomètre et éviter la survenue à terme d'une hyperplasie pouvant entraîner un cancer utérin :

- on doit préférer la **progestérone naturelle (UTROGESTAN, MENAELLE, ESTIMA)** : 1 à 2 caps./j à 100 mg le soir au coucher ;

- en cas d'intolérance, on s'adresse aux **progestatifs de synthèse** : **chlormadinone (LUTERAN)** ou **dydrogestérone (DUPHASTON)**.

- Associations œstro-progestatives

Des combinaisons fixes associant dans la même formulation le **17- $\beta$ -estradiol** et un progestatif peuvent aussi être prescrites, sous forme de patch transdermique (**FEMSEPTCOMBI**, **FEMSEPTIVO**) ou sous forme de comprimé (**CLIMASTON**, **CLIMÈNE**, etc.).

L'administration du **17- $\beta$ -estradiol** et de la **progestérone naturelle** (ou du progestatif de synthèse) peut se faire en continu si l'on souhaite éviter les règles ou, si la femme désire des règles, de façon séquentielle (21 à 28 j de **17- $\beta$ -estradiol** avec association de la progestérone ou du progestatif les 12 derniers jours de chaque cycle).



## HORMONE DE CROISSANCE (2)

<b>GENOTONORM MINIQUECK</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	7 inj. pdre et solv. 0,6 mg	136,24	I	100 %	19,46
	7 inj. pdre et solv. 0,8 mg	180,22	I	100 %	25,75
	7 inj. pdre et solv. 1 mg	222,79	I	100 %	31,83
	7 inj. pdre et solv. 1,2 mg	265,27	I	100 %	37,90
	7 inj. pdre et solv. 1,4 mg	307,74	I	100 %	43,96
	7 inj. pdre et solv. 1,6 mg	350,21	I	100 %	50,03
	7 inj. pdre et solv. 1,8 mg	392,68	I	100 %	56,10
	7 inj. pdre et solv. 2 mg	435,16	I	100 %	62,17
<b>OMNITROPE</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. inj. 5,5 mg/1,5 mL	136,60	I	100 %	136,60
	5 cart. inj. 5,5 mg/1,5 mL	642,05	I	100 %	128,41
	10 cart. inj. 10 mg/1,5 mL	1242,97	I	100 %	124,30
	1 cart. inj. 10 mg/1,5 mL	265,95	I	100 %	265,95
	5 cart. inj. 6,7 mg/mL	1 242,97	I	100 %	248,59
	10 cart. inj. 6,7 mg/mL	2 444,82	I	100 %	244,48
<b>GENOTONORM</b>					
Idem <b>SAIZEN</b>	1 cart. inj. 5,3 mg/mL	170,8	I	100 %	170,80
	1 stylo inj. 5,3 mg/mL	170,8	I	100 %	170,80
	5 stylos inj. 5,3 mg/mL	797,42	I	100 %	159,48
	1 cart. inj. 12 mg/mL	374,48	I	100 %	374,48
	1 stylo inj. 12 mg/mL	374,48	I	100 %	374,48
	5 stylos inj. 12 mg/mL	1753,47	I	100 %	350,69

## INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE (IAH) (3)

### ► Traitement par les gonadotrophines

#### Chez la femme

Il s'agit d'induire l'ovulation en réalisant successivement :

- la maturation d'un follicule par injections IM successives de **gonadotrophines ménopausiques humaines** ou HMG (**FOSTIMON**, **MENOPUR**) ou de **FSH recombinante humaine** (**GONAL-F**, **PUREGON**) ;
- et lorsque le follicule est arrivé à maturation, le déclenchement de l'ovulation par une injection IM de **gonadotrophine chorionique humaine** ou **HCG** (**GONADOTROPINE CHORIONIQUE ENDO**) ou **LH recombinante humaine** (**LUVERIS**) ou encore de **choriogonadotropine alpha humaine** (**OVITRELLE**). L'induction de l'ovulation doit se faire sous surveillance clinique, échographique et biologique, afin d'éviter une grossesse multiple ou un syndrome d'hyperstimulation ovarienne.

Lorsque l'insuffisance gonadotrope est d'origine hypothalamique, l'induction de l'ovulation peut se faire par l'administration pulsatile de **LH-RH** (**LUTRELEF**) à l'aide d'une pompe (**ZYKLOMAT PULSE**). La posologie est de 5 à 20 µg par pulses de quelques secondes toutes les 90 min.

#### Chez l'homme

On induit et/ou on maintient la spermatogenèse par des injections IM de **HMG + HCG** ou **FSH recombinante + HCG**.

#### Adaptation du traitement

L'hormonothérapie substitutive est un traitement à vie pour ce qui est des substitutions en **hydrocortisone** et **L-thyroxine**. Le malade doit être éduqué pour éviter les décompensations aiguës (coma hypopituitaire très grave).

La substitution somatotrope doit être discutée au-delà de 60 ans.

La substitution gonadique doit être reconsidérée après 60 ans. En l'absence de contre-indication, les doses minimales efficaces doivent être prescrites sous surveillance régulière (seins chez la femme, prostate chez l'homme).

- Carte d'insuffisance antéhypophysaire indiquant le traitement suivi et les coordonnées du médecin à prévenir.
- Prescriptions claires indiquant la nécessité de doubler ou tripler les doses d'**hydrocortisone** en cas d'agression, de stress, de maladie intercurrente (grippe +++), d'efforts physiques importants, de facteurs de déshydratation.
- Régime normalement salé.
- Surveillance périodique du poids et de la pression artérielle.

**HORMONE DE CROISSANCE (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Hormone de croissance humaine recombinante.

**INDICATIONS**

Retard de croissance lié à un déficit somatotrope chez l'enfant.

Retard de croissance lié à un syndrome de Turner.

Retard de croissance intra-utérin avec une taille < - 2,5 DS.

Retard de croissance chez les enfants prépubères lié à une insuffisance rénale chronique.

Déficit en hormone de croissance en rapport avec un syndrome hypothalamo-hypophysaire connu chez l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Processus tumoral connu et évolutif.

Épiphysses soudées chez l'enfant.

État critique aigu dû aux complications d'une intervention chirurgicale à cœur ouvert.

État critique aigu dû aux complications d'une intervention chirurgicale abdominale.

Insuffisance respiratoire aiguë.

**Grossesse, allaitement.**

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effet lipodystrophique local et réactions au point d'injection.

Rétention hydrosodée responsable d'œdèmes, myalgies, arthralgies et paresthésies, surtout en cas de surdosage.

Hyperglycémie.

Augmentation de la conversion de T4 en T3.

Élévation des phosphatases alcalines.

Élévation du taux sérique des acides gras non estérifiés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Optimiser la corticothérapie de substitution avant l'introduction du traitement (risque de décompenser une insuffisance corticotrope).

La **somatropine** risque d'entraîner un état de résistance à l'insuline chez le diabétique. Surveillance de la glycémie conseillée.

Surveillance accrue de la T4 et de la T3 au début du traitement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'administration de **glucocorticoïdes** risque d'inhiber l'effet de la **somatropine** sur la croissance.

Augmentation de la clairance des médicaments métabolisés par le cytochrome P450 (**corticoïdes, stéroïdes sexuels, anticonvulsivants et ciclosporine**).

## ANTIDIURÉTIQUES

## ■ Desmopressine

<b>MINIRIN</b>					
<b>MINIRIN SPRAY</b> A. : administration de 1 dose/j en respectant un intervalle de 12 h, soit 10 à 20 µg/j (0,1 à 0,2 mL) E. : 5 à 10 µg/j (0,05 à 0,1 mL)	25 doses sol. endonasales (une dose 10 µg = 0,1 mL) fl. pulvérisateur 2,5 mL + embout nasal	23,08	II	65 %	0,92
	10 amp. 1 mL	HOP	II		
<b>MINIRIN solution injectable</b> Diabète insipide aigu : - A. : 1 à 4 µg - E. : 0,4 à 1 µg - N. : 0,2 à 0,4 µg Étude du pouvoir de concentration du rein dans le diagnostic de diabète insipide					
<b>MINIRINMELT</b>					
Traitement au long cours du diabète insipide par voie orale : 100 à 600 µg/j en moyenne	30 lyocs 60 µg	25,43	II	65 %	0,85
	100 lyocs 60 µg	77,21	II	65 %	0,77
	30 lyocs 120 µg	48,05	II	65 %	1,60
	100 lyocs 120 µg	150,12	II	65 %	1,50
	30 lyocs 240 µg	91,79	II	65 %	3,06
	100 lyocs 240 µg	292,06	II	65 %	2,92

## PROPRIÉTÉS

La **desmopressine** est un analogue de l'hormone antidiurétique naturelle ou arginine-vasopressine : elle augmente le pouvoir de concentration du rein en favorisant la réabsorption de l'eau.

La **desmopressine** entraîne également une augmentation du facteur VIII et du facteur de Willebrand, ce qui explique son action hémostatique dans certaines hémopathies.

Elle a une action spécifique de mécanisme mal expliqué dans l'énurésie.

## INDICATIONS

Diabète insipide d'origine centrale par lésion post-hypophysaire ou hypothalamique.

Étude du pouvoir de concentration du rein.

Énurésie nocturne isolée.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune en cas de déficit de l'hormone.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez les sujets atteints d'HTA ou d'une insuffisance coronarienne, l'administration de l'hormone antidiurétique doit être particulièrement surveillée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

L'excès d'hormone antidiurétique peut entraîner une intoxication par l'eau (augmentation rapide du poids, céphalées, nausées, vomissements, troubles de la conscience) et une hyponatrémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicament agissant sur la sécrétion d'ADH : **carbamazépine**.

Médicaments potentialisant l'action antidiurétique : **sulfamides hypoglycémifiants**.

## ANDROGÈNES

## ■ Testostérone

<b>ANDROGEL</b>					
5 g de gel/j en application sur la peau Dose max. : 10 g/j	30 sach. dose 2,5 g (25 mg de <b>testostérone</b> ) 30 sach. dose 5 g (50 mg de <b>testostérone</b> )		I	NR	
			I	NR	
<b>FORTIGEL</b>					
3 à 4 g de gel/j le matin	1 fl. 60 g (gel 2 %)		I	NR	
<b>TESTOPATCH</b>					
2 patches de 2,4 mg/24 h renouvelés tous les 48 h	30 disp. transderm. 1,2 mg/24 h 30 disp. transderm. 1,8 mg/24 h 30 disp. transderm. 2,4 mg/24 h		I	NR	
			I	NR	
			I	NR	

## ■ Androstanolone

<b>ANDRACTIM</b>					
Une dose de 5 g de gel/j assure une testostéronémie de 2 à 4 ng/mL Dose habituelle : 5 à 10 g/j	16 doses de gel pour appl. locale	24,94	I	30 %	1,56

**PROPRIÉTÉS**

La testostérone et son métabolite actif, l'androstanolone, provoquent le développement chez l'homme des organes génitaux et le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires masculins (morphologie : voix, muscles, pilosité, comportement). Ils stimulent la libido. La testostérone n'entraîne pas le développement testiculaire.

**INDICATIONS**

Hypogonadismes primitifs d'origine testiculaire (congénitaux ou acquis).

Hypogonadismes d'origine hypothalamo-hypophysaire.

Gynécomastie (applications locales).

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance cardiaque, rénale et hépatique.

Chez l'homme : cancer de la prostate, adénome de la prostate.

Chez la femme : seule l'**androstanolone** locale est autorisée dans le lichen vulvaire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez le sportif : produit inscrit sur la liste des produits dopants, dépisté lors des tests effectués dans le cadre de la lutte contre le dopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritabilité, prise de poids, séborrhée, acné, rétention hydrosodée, hypercalcémie.

Avec les formes orales : augmentation des lipides sanguins (cholestérol, triglycérides).

Gynécomastie (par aromatisation en œstrogènes) en cas de surdosage.

Polyglobulie.

Rares hépatites cholestatiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Anticoagulants** : surtout avec les formes injectables, surveiller les fluctuations de l'INR.

## INSULINES INTERMÉDIAIRES NPH PURES

## ■ Insuline NPH biogénétique

<b>INSULATARD</b>					
Insuline d'action intermédiaire injectable par voie SC × 1 ou 2/j Début d'action : 1 h 30 Fin d'action : 24 h	1 fl. 10 mL 100 UI/mL (1 000 U)	17,27	II	65 %	17,27
<b>INSULATARD INNOLET</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	39,25	II	65 %	7,85
<b>INSULATARD FLEXPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	39,25	II	65 %	7,85
<b>INSULATARD PENFILL</b>	5 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 U)	33,87	II	65 %	6,77
<b>UMULINE NPH</b>					
Insuline d'action intermédiaire injectable par voie SC × 1 ou 2/j Début d'action : 1 h 30 Fin d'action : 16 à 18 h	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
<b>UMULINE NPH KWIPEN</b>	5 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 U)	33,87	II	65 %	6,77
	5 stylos 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,19	II	65 %	7,64

## MÉLANGES ANALOGUE ULTRARAPIDE EN SOLUTION ET ANALOGUE PROTAMINE EN SUSPENSION

### ■ Insuline lispro

<b>HUMALOG MIX</b>					
<b>HUMALOG MIX25</b> Mélange d'insuline d'action <b>lispro</b> ultrarapide en solution (25 %) et de lispro protamine en suspension (75 %)	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,87	II	65 %	7,77
<b>HUMALOG MIX25 KWIKPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>HUMALOG MIX50</b> Mélange d'insuline d'action <b>lispro</b> ultrarapide en solution (50 %) et de lispro protamine en suspension (50 %)	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	38,87	II	65 %	7,77
<b>HUMALOG MIX50 KWIKPEN</b>	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

### ■ Insuline analogue asparte

<b>NOVOMIX</b>					
Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (30 %) et d'aspartate protamine en suspension (70 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>NOVOMIX 30 PenFill</b>	5 cart. 3 mL 100 U/mL	38,87	II	65 %	7,77
<b>NOVOMIX 50 FLEXPEN</b> Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (50 %) et d'aspartate protamine en suspension (50 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
<b>NOVOMIX 70 FLEXPEN</b> Mélange d'insuline asparte ultrarapide en solution (70 %) et d'aspartate protamine en suspension (30 %)	5 styl. 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

## MÉLANGES INSULINE RAPIDE EN SOLUTION ET NPH EN SUSPENSION

## ■ Mélanges d'insulines humaines biogénétiques

<b>INSUMAN COMB</b>					
<b>INSUMAN COMB 15</b> Mélange contenant 15 % d'insuline rapide et 85 % de NPH <b>INSUMAN COMB 15 OPTISET</b>  <b>INSUMAN COMB 25</b> Mélange contenant 25 % d'insuline rapide et 75 % de NPH <b>INSUMAN COMB 25 OPTISET</b>  <b>INSUMAN COMB 50</b> Mélange contenant 50 % d'insuline rapide et 50 % de NPH <b>INSUMAN COMB 50 OPTISET</b>	1 fl. 5 mL 100 U/mL (500 U)	8,92	II	65 %	8,92
	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 mL)	38,19	II	65 %	7,64
	1 fl. 5 mL 100 U/mL (500 U)	8,92	II	65 %	8,92
	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 mL)	38,19	II	65 %	7,64
	1 fl. 5 mL 100 U/mL (500 U)	8,92	II	65 %	8,92
	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 mL)	38,19	II	65 %	7,64
<b>UMULINE PROFIL</b>					
<b>UMULINE PROFIL 30</b> Mélange contenant 30 % d'insuline rapide et 70 % de NPH  <b>UMULINE PROFIL 30 KWIKPEN</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	33,87	II	65 %	6,77
	5 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 mL)	38,19	II	65 %	7,64



## ANALOGUES LENTS DE L'INSULINE

## ■ Insuline détémir

<b>LEVEMIR</b>					
Analogue d'insuline d'action prolongée, à utiliser comme insuline basale en 1 à 2 inj./j	1500 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 UI)	63,73	II	65 %	0,04
<b>LEVEMIR FLEXPEN</b>					
<b>LEVEMIR PENFILL</b>	1500 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 UI)	63,73	II	65 %	0,04
<b>LEVEMIR INNOLET</b>	1500 stylos 3 mL 100 UI/mL (300 UI)	63,73	II	65 %	0,04

## ■ Insuline glargine

<b>LANTUS</b>					
Analogue d'insuline d'action prolongée, à utiliser comme insuline basale en 1 inj./j	1000 fl. 10 mL 100 UI/mL (1 000 UI)	43,92	II	65 %	0,04
	1500 cart. 3 mL 100 UI/mL (1 500 UI)	63,73	II	65 %	0,04
<b>LANTUS SOLOSTAR</b>					
Idem <b>LANTUS</b>	1500 stylos 3 mL 100 UI/mL (1 500 UI)	63,73	II	65 %	0,04

Les **analogues lents de l'insuline** injectés par voie sous-cutanée sont libérés régulièrement sans pic ; ils sont utilisés comme insuline basale :

– dans l'insulinothérapie optimisée dite fonc-

tionnelle en association, avec un bolus d'**analogue ultrarapide** avant chaque repas (diabète de type 1 ou diabète insulino-requérant) ;

– en association avec des **hypoglycémiant** oraux dans le diabète de type 2.

## ANALOGUES ULTRARAPIDES DE L'INSULINE

## ■ Insuline analogue lispro

<b>HUMALOG</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 45 à 70 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>HUMALOG KWIKPEN</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

## ■ Insuline analogue aspart

<b>NOVORAPID</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 40 à 80 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>NOVORAPID FLEXPEN</b>  <b>NOVORAPID PENFILL</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12
	5 cart. 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46

## ■ Insuline analogue glulisine

<b>APIDRA</b>					
Analogue de l'insuline humaine pouvant être injectée par toutes les voies (IV, IM, SC) et administrée par pompe à insuline externe Dose dépendant des besoins - début d'action rapide (10 à 15 min) - pic d'action : 40 à 80 min - durée moins prolongée que l'insuline habituelle par voie SC : 2 à 5 h <b>APIDRA OPTICLIK</b>  <b>APIDRA SOLOSTAR</b>	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	37,28	II	65 %	7,46
	5 stylos jetables 3 mL 100 U/mL (300 U)	40,58	II	65 %	8,12

## INSULINES RAPIDES

## ■ Insuline humaine recombinante

<b>ACTRAPID</b>					
Insuline soluble à injecter en IV, IM ou SC 20 à 30 min avant le repas Dose dépendant des besoins Pic d'action de la 2 <sup>e</sup> à la 4 <sup>e</sup> h Fin d'action vers la 6 <sup>e</sup> -8 <sup>e</sup> h	1 fl. 10 mL 100 U/mL (1 000 U)	18,29	II	65 %	18,29
<b>INSUMAN INFUSAT</b>					
Insuline spécifique pour pompe à insuline Dose dépendant des besoins	5 cart. 3,15 mL 100 U/mL (315 U) pour pompe	48,68	II	65 %	9,74
<b>UMULINE RAPIDE</b>					
Insuline à injecter en IV, IM ou SC 20 à 30 min avant le repas Dose dépendant des besoins Pic d'action de la 2 <sup>e</sup> à la 4 <sup>e</sup> h Fin d'action vers la 6 <sup>e</sup> -8 <sup>e</sup> h Insuline soluble : cartouche pour stylo <i>Humapen</i> , pouvant être injectée en IV, IM ou SC Dose dépendant des besoins	1 fl. 10 mL 100 UI/mL (1 000 U)	20,12	II	65 %	20,12
	5 cart. 3 mL 100 UI/mL (300 U) pour stylos <i>Humapen</i>	33,87	II	65 %	6,77

Attention : les prix ne sont comparables qu'en fonction du nombre d'unités d'insuline contenues dans les flacons ou cartouches.

**BANDELETTES URINAIRES**

BANDELETTES	CARACTÉRISTIQUES	NB ET PRIX*
Kéto-Diastix (Bayer Diagnostics)	Bandelettes réactives pour détermination semi-quantitative de la glycosurie et de la cétonurie.	50 = 8,63 NR
Kéto-Diabur-Test 5000 (Roche Diagnostics)	Bandelettes réactives pour la détermination semi-quantitative de la glycosurie jusqu'à 50 g/L et la détection de l'acétone dans l'urine.	50 = 8,23 NR

## ANTIANDROGÈNE

## ■ Cyprotérone acétate

ANDROCUR					
1 cp./j pendant 3 sem. ; arrêt 8 j Traitement prolongé plusieurs années	20 cp. séc. 50 mg	12,09	I	65 %	0,61

Il existe un comprimé à 100 mg à utiliser uniquement pour le traitement du cancer de la prostate.

**PROPRIÉTÉS**

Stéroïde de synthèse de la classe des **progestatifs** ayant une puissante action inhibitrice sur les récepteurs périphériques de la testostérone. Donné 21 j par cycle, le produit a également une action antagonisotrope, inhibant la sécrétion de FSH/LH et un effet progestatif sur l'utérus et le sein.

La demi-vie du produit est de 48 h environ avec une métabolisation par le foie et une élimination digestive (70 %) et urinaire (30 %).

**INDICATIONS**

Chez la femme : traitement antiandrogénique dans les hirsutismes quelle qu'en soit l'origine, associé à de l'**éthinyloestradiol**.

Chez l'homme : traitement palliatif du cancer de la prostate.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : le produit a une action anticonceptionnelle dès le 1<sup>er</sup> cycle. Effets féminisants liés

à la dose sur les fœtus mâles observés chez l'animal, non rapportés chez la femme pour le moment.

Diabète sévère ou déséquilibré, angor ou infarctus, antécédents thromboemboliques, affections hépatiques graves, dépression sévère, allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Arrêt du traitement en cas d'élévation des transaminases (à doser avant traitement), de suspicion de phlébite, de céphalées tenaces. Surveiller le poids, la pression artérielle, les transaminases et la glycémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, asthénie, prise de poids, aggravation d'une insuffisance veineuse.

Perturbation du cycle menstruel : spottings, saignements intermenstruels ou aménorrhée.

Aggravation du diabète.

**GLYCÉMIES CAPILLAIRES (1) – LECTEURS (1)**

LECTEURS	CARACTÉRISTIQUES	LOGICIELS	BANDELETTES	NOMBRE ET PRIX DES BANDELETTES	VITESSE DE LECTURE (s)
Accu-Chek Performa (Roche Diagnostics)	Permet l'analyse avec une petite goutte de sang (0,6 µL), système très précis, capable de reconnaître automatiquement les bandelettes périmées.		Accu-Chek Performa	100 = 38,61 €	5
Ascensia Breeze 2 (Bayer Diagnostics)	Lecteur sans codage. Électrode intégrée dans l'appareil qui aspire la goutte (1 µL). 420 glycémies en mémoire. Moyenne des 1, 7, 14 et 30 dernier(s) jour(s).	Win Glucofacts	Ascensia Glucodisc (disque de 10 capteurs)	50 = 19,31 €	5
Ascensia Brio (Bayer Diagnostics)	Mise en route et arrêt automatique du lecteur par insertion et retrait de la bandelette. 10 mémoires.	-	Ascensia Easyfill	50 = 19,31 €	20
Freestyle Papillon mini (Abbott Diabetes Care)	Aspiration du sang sur la bandelette goutte de 3 µL. 250 glycémies en mémoire. Moyenne des 14 derniers jours.	Diabass	FreeStyle Papillon	100 = 38,61 €	15
One Touch Ultra (Lifescan)	Conseil de vérifier l'acétonurie en cas de glycémie élevée. 150 glycémies en mémoire. Moyenne des 14 derniers jours.	In Touch	One Touch Ultra	100 = 38,61 €	5

## DIABÈTE – AUTOCONTRÔLE (2)

### Quand faire le contrôle des glycémies ?

Au cours d'un diabète de type 1, l'autosurveillance des glycémies capillaires (ASG) est indispensable quotidiennement.

En cas de diabète de type 2, l'ASG est indiquée :

- chez les patients insulino-traités ou chez qui l'insuline est envisagée à court terme;
- chez les patients traités par insulinosécréteurs comme les **sulfamides hypoglycémisants** (confirmer une hypoglycémie);
- dans un but pédagogique (appréciation de l'effet d'une activité physique, de l'alimentation, etc.).

Il faut **répartir les contrôles** pour pouvoir adapter le traitement, en faisant des glycémies à jeun et en période postprandiale (2 à 4 h après les repas).

Il faut définir avec le patient le nombre et l'horaire des contrôles glycémiques par jour.

Quand les circonstances imposent un contrôle glycémique strict (grossesse, port d'une pompe à insuline, microangiopathie évolutive), le nombre des mesures doit être au moins de 6 par j.

Il ne faut pas accepter les glycémies faites toujours à la même heure qui testent toujours la même insuline ou le même traitement.

Les mesures de la glycémie faites à jeun ou avant les repas reflètent l'action de l'insuline basale.

Les contrôles faits après les repas objectivent la montée glycémique après la charge glucidique des repas et testent l'efficacité des bolus préprandiaux.

### Exemples

Un patient a reçu :

- une injection d'un **analoge lent** (ou d'une **insuline NPH**) la veille au soir au coucher (22 h) ;

– une injection d'un **analogue ultrarapide** juste avant le petit-déjeuner (7 h).

On teste :

- le matin à jeun (6 h 45) : l'efficacité de l'injection du soir ;

– 1 h 30 après le petit-déjeuner (8 h 30) : l'efficacité de l'**analogue ultrarapide** injecté le matin.

Deux types d'événements doivent être dépistés :

#### • Les hyperglycémies postprandiales

Lorsque le même repas est régulièrement suivi d'une hyperglycémie, cela signifie que la dose d'**analogue ultrarapide** qui précède est insuffisante et doit être augmentée de 2 U le lendemain.

#### • Les hypoglycémies

La survenue d'une hypoglycémie systématiquement en fin d'après-midi par exemple nécessite le jour suivant la diminution de la dose de 2 à 4 U de la dose d'insuline basale (**analoge lent** ou **NPH** du matin) injectée précédemment.

Point fondamental qu'il faut expliquer au diabétique : l'adaptation des doses est toujours décalée et s'applique à l'injection correspondante du jour suivant.

**GLYCÉMIES CAPILLAIRES (2) – LECTEURS (2)**

- Les bandelettes d'autosurveillance glycémique sont prises en charge sans restriction à 100 % pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2 traité par insulinosécréteurs, elles sont depuis l'arrêté du 25 février 2011 remboursées à hauteur de 200 bandelettes/an, à l'exception des patients chez lesquels une insulinothérapie est prévue à court ou moyen terme.
- Dans tous les cas, 1 lecteur de glycémie est pris en charge tous les 4 ans chez l'adulte, 2 lecteurs tous les 4 ans chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans. Les lecteurs sont en fait garantis au minimum 4 ans.
- Un kit d'autosurveillance glycémique (1 lecteur de glycémie + au minimum 10 bandelettes d'autocontrôle de la glycémie + 1 autopiqueur + au minimum 10 lancettes pour autopiqueur, non réutilisables, stériles) est remboursé une seule fois pour un patient, lors de l'initiation de l'autosurveillance glycémique. Un lecteur seul est ensuite prescrit lors du renouvellement.



## DIABÈTE – AUTOCONTRÔLE (3)

### Contrôle de la glycosurie

La surveillance de la glycosurie ne reflète qu'imparfaitement les glycémies :

- elle est constamment « en retard » sur le chiffre de la glycémie lors du contrôle puisque l'urine a stagné dans la vessie ;
- elle est soumise à une double imprécision en fonction du seuil rénal du glucose. Normalement la glycosurie apparaît lorsque la glycémie dépasse 1,80 g/L (9,9 mmol/L) :

- le seuil est dit « bas » lorsque la glycosurie est présente alors que la glycémie est inférieure à 1,80 g/L (cas de la grossesse) ;
- le seuil est dit « élevé » lorsqu'il n'y a pas de glycosurie alors que la glycémie est supérieure à 1,80 g/L. Ceci s'observe en cas d'insuffisance rénale et souvent chez le sujet âgé.

Cette caractéristique oblige à faire l'auto-surveillance sur la glycémie seule.

L'appréciation de la glycosurie peut toutefois être utile lorsque le diabétique a des glycémies stables, pour contrôler l'absence de glycosurie nocturne et... reposer les doigts des diabétiques. On dispose des bandelettes de :

- **KETO-DIASTIX** (Bayer diagnostics) ;
- **KETO-DIABUR TEST 5000** (Boehringer-Mannheim).

Ces bandelettes sont les seules qui soient utilisables pour un dosage semi-quantitatif (glycosurie de 0 à ++++).

Les autres bandelettes peuvent être utilisées pour le dépistage de la glycosurie mais non pour son dosage semi-quantitatif.

### Recherche de la cétonurie

Cette recherche est d'un intérêt majeur lorsque les glycémies sont mal contrôlées. Elle est indiquée lorsque la glycémie atteint ou dépasse 2,50 g/L.

### En cas d'hyperglycémie + cétose

La présence de cétonurie peut signifier une évolution à court terme vers l'acidocétose. Elle invite à augmenter rapidement la dose d'insuline en ajoutant un **analogue ultrarapide** aux doses habituellement faites en tenant compte aussi de l'apport glucidique du repas.

Tout diabétique (et surtout un type 1) doit savoir :

- faire 5 UI d'analogue rapide en plus par croix de cétonurie si la glycémie est  $> 2,5$  g/L (13,75 mmol/L) ;
- consulter en urgence en cas de persistance de la cétonurie malgré les rajouts d'insuline.

### En cas de cétonurie sans glycosurie

Une hypoglycémie est à craindre et un contrôle immédiat de la glycémie capillaire s'impose.

### GLYCÉMIES CAPILLAIRES (3) – AUTOPIQUEURS POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG CAPILLAIRE

Prix = 12,76 €

Le remboursement est assuré pour : une attri-

bution par an chez l'adulte et deux attributions par an chez l'enfant de moins de 18 ans.

DÉNOMINATION FABRICANT	CARACTÉRISTIQUES
Accu-Chek Softclix Roche Diagnostics	11 positions de réglage de profondeur de la piqûre Existe en 2 versions : mini ou classique
Glucoject Dual A Menarini Diagnostics	Système d'atténuation de la douleur 7 positions de réglage de profondeur de la piqûre 3 puissances de propulsion
One Touch Delica Lifescan	7 positions de réglage de profondeur de la piqûre Contrôle précis de la trajectoire pour une pénétration rapide et rectiligne Vibrations contrôlées pour une piqûre nette et en douceur
Accu-Chek Safe-T-Pro Roche Diagnostics	Spécialement adapté à l'usage professionnel (usage unique) Manchon amovible protégeant la lancette Rétraction de la lancette après utilisation
Vitrex Compact Chronolyss	5 positions de réglage de profondeur de la piqûre

**GLYCÉMIES CAPILLAIRES (4) – LANCETTES**

200 lancettes non réutilisables stériles pour  
autopiqueur : 15,20 €.

DÉNOMINATION	FABRICANT	DIAMÈTRE (mm)	AUTOPIQUEURS COMPATIBLES
Accu-Chek Softclicx	Roche Diagnostics	0,40	Accu-Chek Softclicx
Accu-Chek Multiclix	Roche Diagnostics	0,375	Accu-Chek Multiclix
BD Micro-Fine +	Beckman Dickinson	0,20	La plupart des autopiqueurs
FreeStyle Papillon	Abbott Diabetes Care	0,50	FreeStyle
One Touch Delica	Lifescan	0,30	One Touch Delica
Unilet Confort	Owen Mumford	0,40	Autolet impression
Vitrex Soft	Chronolyss	0,30	Vitrex Compact

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (1) – BIGUANIDES

## ■ Metformine

GLUCOPHAGE					
<b>GLUCOPHAGE 500</b> (390 mg <b>metformine</b> ) 2 à 3 cp./j matin et soir aux repas	30 cp. 500 mg	2,93	I	65 %	0,10
	50 cp. 500 mg	HOP	I		
	90 cp. 500 mg	6,80	I	65 %	0,08
<b>GLUCOPHAGE 850</b> (663 mg <b>metformine</b> ) 1 à 2 cp./j à administrer aux repas pour diminuer les effets secondaires	30 sach. 500 mg	2,57	I	65 %	0,09
	30 cp. 850 mg	4,61	I	65 %	0,15
	90 cp. 850 mg	11,82	I	65 %	0,13
<b>GLUCOPHAGE 1 000</b> (780 mg <b>metformine</b> ) 2 à 3 cp. ou sach./j. La dose de 3 cp. ou sach./j est maximale	30 sach. 850 mg	3,89	I	65 %	0,13
	30 cp. 1 000 mg	5,10	I	65 %	0,17
	90 cp. 1 000 mg	13,28	I	65 %	0,15
	30 sach. 1 000 g	4,09	I	65 %	0,14
STAGID					
280 mg <b>metformine</b> 1 à 3 cp./j aux repas	30 cp. 700 mg	3,60	I	65 %	0,12
	100 cp. 700 mg	9,05	I	65 %	0,09

## PROPRIÉTÉS

La **metformine** abaisse la glycémie du diabétique, sans provoquer d'hypoglycémie, car elle n'agit pas sur la sécrétion d'insuline, mais elle en potentialise l'action.

Elle diminue la néoglucogenèse et la glycolyse et par voie de conséquence la production de glucose par le foie.

## INDICATIONS

Diabète de type 2 non compliqué (surtout en cas de surpoids).

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse, allaitement.

Diabète de type 1, si donnée seule.  
Insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contrôler la créatininémie régulièrement, surtout chez le sujet âgé.

Prendre les comprimés au cours ou à la fin des repas pour minimiser les effets secondaires digestifs.

Arrêter le traitement la veille de l'administration de produits de contraste iodés et reprendre le traitement 48 h après l'examen, après avoir vérifié la créatinine sanguine.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Acidose lactique à laquelle il faut penser si le malade se plaint d'une fatigue avec crampes musculaires. Il faut alors interrompre immédiatement le traitement et demander d'urgence un ionogramme sanguin avec dosage des lactates. L'acidose lactique survient chez des sujets âgés avec fonctionnement rénal déficient.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. La prise de **metformine** est la 1<sup>re</sup> cause de diarrhée chez le diabétique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool : risque majoré d'acidose lactique.

**DIABÈTE DE TYPE 2 (2)****Médicaments [1]****Metformine**

C'est le traitement de première intention. La **metformine** est un **biguanide** à action antihyperglycémiant, due à l'augmentation de la sensibilité à l'insuline du tissu hépatique. Quatre dosages sont actuellement disponibles en France (**GLUCOPHAGE** 500, 850, 1 000 mg, **STAGID** 700 mg). Elle s'administre en 2 ou 3 prises quotidiennes pendant ou après les repas. La dose maximale quotidienne est comprise entre 2 550 et 3 000 mg en 3 prises.

La **metformine** ne crée jamais d'hypoglycémie, ni de prise de poids. Ses effets secondaires sont la possibilité de troubles digestifs (nausées, crampes abdominales, diarrhée) surtout si elle est administrée avant les repas, et le risque d'acidose lactique en cas d'insuffisance rénale ou hépatique et dans les situations d'hypoxie tissulaire (insuffisance cardiaque, respiratoire, infarctus du myocarde récent, etc.).

**Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase**

Ils diminuent la digestion des sucres et sont intéressants pour réduire les glycémies postprandiales (cf. fiche pharmacologique). Ils doivent être administrés au début de chaque repas. On a le choix entre deux spécialités : l'**acarbose** (**GLUCOR** 50 ou 100 mg) ou le **miglitol** (**DIASTABOL**). Leur effet est modeste mais ils ont peu d'effets secondaires, à l'exception des flatulences, souvent gênantes, qui s'expliquent par la fermentation des sucres non digérés par les bactéries du côlon.

**Sulfamides hypoglycémiants (SH)**

Ils stimulent la sécrétion de l'insuline en se fixant sur un récepteur spécifique de la cellule bêta du pancréas. Seuls sont désormais utilisés les sulfamides de seconde génération dont la durée d'action ne dépasse pas 24 h.

Les molécules se distinguent par leur durée d'action : courte (**GLIBÉNÈSE**), moyenne (**DAONIL**) ou longue (**AMAREL**, **DIAMICRON**). Les **sulfamides** ont une élimination rénale et sont contre-indiqués dans l'insuffisance rénale. Ils peuvent entraîner une prise de poids de quelques kilos et parfois des hypoglycémies, notamment chez le sujet âgé.

Comprimé pour comprimé, les **sulfamides** suivants : **DIAMICRON**, **DAONIL**, **GLIBÉNÈSE** ont une puissance d'action équivalente. La dose maximale est de 3 cp./j qu'il ne faut pas dépasser.

Les sulfamides de longue durée d'action (**AMAREL**, **OZIDIA**) comportent un risque accru d'hypoglycémie, surtout chez le sujet de plus de 65 ans.

Les **sulfamides** à action courte ou moyenne sont prescrits en 3 prises quotidiennes, avant chaque repas. Les **sulfamides** à action longue se prennent une fois par jour, le matin avant le petit-déjeuner.

La prescription doit se faire de façon progressive : par exemple **HÉMI-DAONIL** 2,5 mg : 1 cp. matin, midi et soir puis **DAONIL**.

On peut également, si l'on préfère un **sulfamide** de longue durée, utiliser l'**AMAREL**, dont les présentations à 1, 2, 3 et 4 mg permettent aussi cette escalade progressive des posologies.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (2) – SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS (1)

### ■ Glibenclamide

<b>DAONIL</b>					
2 à 3 cp./j à prescrire aux repas	20 cp. 5 mg	2,64	I	65 %	0,13
La posologie maximale de 3 cp./j doit être atteinte progressivement et non dépassée	100 cp. 5 mg	8,80	I	65 %	0,09
	180 cp. 5 mg	14,65	I	65 %	0,08
<b>HÉMI-DAONIL</b>					
Posologie moyenne : 2 à 3 cp./j	60 cp. 2,5 mg	3,37	I	65 %	0,06
	100 cp. 2,5 mg	HOP	I		
	180 cp. 2,5 mg	8,96	I	65 %	0,05

### ■ Glipizide

<b>GLIBÉNÈSE</b>					
Sulfamide de durée d'action assez courte	20 cp. 5 mg	3,04	I	65 %	0,15
La posologie max. est de 4 cp./j à répartir à chaque repas	100 cp. 5 mg	9,76	I	65 %	0,10
<b>MINIDIAB</b>					
Idem <b>GLIBÉNÈSE</b>	20 cp. 5 mg	3,04	I	65 %	0,15
	100 cp. 5 mg	9,76	I	65 %	0,10
<b>OZIDIA</b>					
Forme à libération prolongée	30 cp. 5 mg	6,70	I	65 %	0,22
Prise unique le matin	30 cp. 10 mg	12,25	I	65 %	0,41
Poso. max. 20 mg					

### ■ Glizclazide

<b>DIAMICRON</b>					
Cp. à libération modifiée	30 cp. séc. 60 mg	10,61	I	65 %	0,35
1/2 à 2 cp./j en une prise au petit-déjeuner	90 cp. séc. 60 mg	30,47	I	65 %	0,34
	100 cp. séc. 60 mg	HOP	I		

### ■ Glimépiride

<b>AMAREL</b>					
Sulfamide ayant une action puissante tout en maintenant des taux d'insulinémie modérée mais prolongée	30 cp. 1 mg	4,79	I	65 %	0,16
Dose à adapter en fonction du patient : en moyenne 2 à 4 mg/j en une seule prise le matin	90 cp. 1 mg	13,16	I	65 %	0,15
	120 cp. 1 mg	HOP	I		
	30 cp. 2 mg	7,36	I	65 %	0,25
	90 cp. 2 mg	20,70	I	65 %	0,23
	120 cp. 2 mg	HOP	I		
	30 cp. 3 mg	9,46	I	65 %	0,32
	90 cp. 3 mg	26,62	I	65 %	0,30
	120 cp. 3 mg	HOP	I		
	30 cp. 4 mg	10,86	I	65 %	0,36
	90 cp. 4 mg	30,56	I	65 %	0,34
	120 cp. 4 mg	HOP	I		

## DIABÈTE DE TYPE 2 (3)

### Glinides

Bien que se fixant sur un récepteur différent de la cellule bêta du pancréas, ils ont le même mode d'action que les **sulfamides**, mais agissent plus vite et plus brièvement et n'ont pas d'élimination rénale. Ils s'administrent avant chaque repas et ne sont pas contre-indiqués chez l'insuffisant rénal.

Un seul **glinide** est disponible en France (**NOVONORM**, cp. à 0,5, 1 ou 2 mg).

### Incrétines ou mieux incrétinomimétiques

Il s'agit de la classe médicamenteuse la plus récente. L'effet incrétine désigne l'amplification de la sécrétion d'insuline liée à l'action d'hormones, notamment le GLP-1, sécrété par le tube digestif lors du repas. Il stimule la sécrétion d'insuline, inhibe celle de glucagon, ralentit la vidange gastrique et réduit la prise alimentaire. La sécrétion de GLP-1 est abaissée chez le diabétique de type 2. Le GLP-1 est inhibé par l'enzyme DPP-4.

Les **inhibiteurs de la DPP-4** sont disponibles par voie orale (**sitagliptine** : **JANUVIA**, **vidagliptine** : **GALVUS**, **saxagliptine** : **ONGLYSA**) et utilisés en seconde intention. Ils trouvent leur place tout particuliè-

rement chez le diabétique de type 2 en surpoids ou obèse. Les **analogues du GLP-1** sont utilisés par voie sous-cutanée, le plus souvent pour éviter d'introduire l'insuline : **exénatide (BYETTA)**, **liraglutide (VICTOZA)**. Ces molécules ont pour principal effet secondaire la survenue d'une sensation de satiété et de nausées qui justifient l'augmentation progressive de la dose. Les nausées peuvent disparaître après plusieurs semaines de traitement.

On prescrit par exemple : **JANUVIA** 1 cp./j ou **BYETTA** 5 mg en SC x 2/j.

### Paramètres de surveillance du traitement du diabète de type 2

- 1 - Le taux d'HbA1c, 4 fois/an et le niveau moyen des glycémies obtenues par autocontrôle du patient (s'il est pratiqué).
- 2 - Le fond d'œil ou la rétinographie une fois par an.
- 3 - L'ECG annuel.
- 4 - L'examen au monofilament, la recherche des ROT achilléens et l'examen des pieds annuel.
- 5 - La microalbuminurie et la créatinine annuelles.
- 6 - Le bilan lipidique annuel.
- 7 - L'examen dentaire annuel.

L'efficacité du traitement doit être évaluée sur l'autocontrôle glycémique par le patient et le taux d'HbA1c.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (3) – SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Tous les **sulfamides hypoglycémiantes (SH)** stimulent la sécrétion d'insuline en se fixant sur des récepteurs spécifiques au niveau de la cellule  $\beta$ -langerhansienne. Une dose maximale de **SH** peut, sur un pancréas encore répondeur, faire sécréter jusqu'à 30 U d'insuline par 24 h. Peuvent être associés à la **metformine** et aux **glitazones**.

On distingue les sulfamides :

- à durée d'action courte (**glipizide**) à prescrire à chaque repas ;
- à durée d'action moyenne (**glibenclamide**, **glizlazide**) à prescrire à chaque repas ;
- à durée d'action longue (**glimépiride**, **OZIDIA**), à pendre en 1 prise le matin.

### INDICATIONS

Diabète de type 2 non compliqué après échec des mesures hygiénodétététiques.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Diabète de type 1 ; insuffisance rénale, hépatique sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement doit être instauré de façon progressive.

Autocontrôle par les diabétiques souhaitable (surtout entre les repas et à jeun) car les hypo-

glycémies peuvent être sévères (surtout avec les produits d'action prolongée).

Il est inutile d'associer 2 **sulfamides** ou 1 **sulfamide** et un **glinide**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Le principal danger des **sulfamides** est l'hypoglycémie par surdosage, entraînant une hyperinsulinémie absolue ou relative :

- surdosage ou absence de catabolisme lors d'une insuffisance rénale ;
- apport insuffisant en hydrates de carbone ;
- potentialisation médicamenteuse.

Chez les malades âgés, ces hypoglycémies peuvent être durables. Il faut alors installer une perfusion de sérum glucosé à 10 % et ne pas se contenter de «resucrer» le malade avec un ou deux verres de jus de fruits.

Les autres inconvénients des **sulfamides hypoglycémiantes** sont très rares avec les produits actuels : accidents allergiques cutanés, leucogranulopénies, thrombopénies.

L'atteinte hépatique est en revanche possible et constitue une contre-indication à la prescription.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisent l'action : **coumariniques**, **anti-inflammatoires non stéroïdiens**,  **$\beta$ -bloquants**, **miconazole**, **éconazole**. Alcool.

Diminuent l'action : **corticoïdes**, **progestatifs** **macrodosés**, **salbutamol**.



## DIABÈTE DE TYPE 2 (4)

### Indications

#### En première intention

On débute par une monothérapie par **metformine**.

En cas d'intolérance ou de contre-indication, on utilise un **sulfamide**. Les alternatives sont les **glinides** ou les **inhibiteurs des alphagluco-sidases**. Les **inhibiteurs de la DPP-4** ne devraient pas être utilisés en première intention et en monothérapie (recul insuffisant, absence de prise en charge dans ce cas).

#### Si l'objectif glycémique n'est pas atteint sous metformine (en seconde intention)

On associe **metformine + sulfamide**.

► En cas d'intolérance ou de contre-indication aux **sulfamides**, si l'écart à l'objectif d'HbA1c est  $< 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **metformine + répaglinide** (si irrégularité de la prise alimentaire) ;
- **metformine + inhibiteurs des alphagluco-sidases** (si hypoglycémies) ;
- **metformine + inhibiteurs de la DPP-4** (si hypoglycémies ou prise de poids).

► En cas d'intolérance ou de contre-indication aux **sulfamides**, si l'écart à l'objectif d'HbA1c est  $> 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **metformine + insuline** ;

- **metformine + analogue du GLP-1** (si IMC  $> 30 \text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

#### Si l'objectif glycémique n'est pas atteint sous sulfamide (en seconde intention)

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $< 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **sulfamide + inhibiteur des alphagluco-sidases** ;
- **sulfamide + inhibiteur de la DPP-4**.

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $> 1\%$

On propose les associations suivantes :

- **sulfamide + insuline** ;
- **sulfamide + analogues du GLP-1** (si IMC  $> 30 \text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

#### En cas d'objectif glycémique non atteint sous bithérapie biguanide + sulfamide (en 3<sup>e</sup> intention)

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $< 1\%$

On propose les associations :

- **metformine + sulfamide + inhibiteur des alphagluco-sidases** ;
- **metformine + sulfamide + inhibiteur de la DPP-4**.

► Écart à l'objectif d'HbA1c  $> 1\%$

On propose les associations :

- **metformine + sulfamide + insuline** ;
- **metformine + sulfamide + analogue du GLP-1** (si IMC  $> 30 \text{ kg/m}^2$  ou prise de poids ou hypoglycémies).

**HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (4) – INHIBITEURS DES  $\alpha$ -GLUCOSIDASES**■ **Acarbose**

<b>GLUCOR</b>					
2 à 3 cp./j aux repas	90 cp. 50 mg	12,36	I	65 %	0,14
Commencer par 3 cp. à 50 mg	270 cp. 50 mg	34,79	I	65 %	0,13
Si nécessaire passer progressivement	90 cp. séc. 100 mg	16,63	I	65 %	0,18
à 3 x 100 mg	270 cp. séc. 100 mg	46,84	I	65 %	0,17

■ **Miglitol**

<b>DIASTABOL</b>					
1 cp. à 50 mg x 3/j	90 cp. 50 mg	15,52	I	65 %	0,17
Jusqu'à 3 x 100 mg si nécessaire	90 cp. 100 mg	20,92	I	65 %	0,23

**PROPRIÉTÉS**

Les **inhibiteurs des  $\alpha$ -glucosidases** agissent dans la lumière intestinale en inhibant de façon compétitive et sélective les enzymes qui dégradent les disaccharides en sucres simples. Administrés avant les repas, ils réduisent l'hyperglycémie postprandiale.

**INDICATIONS**

Diabète de type 2.

**CONTRE-INDICATIONS**

Pathologie digestive.  
Insuffisance rénale sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Flatulences, douleurs digestives, selles molles, voire diarrhées, surtout en début de traitement. De rares cas d'élévation de transaminases ont été relevés pour des doses dépassant 600 mg/j.

**DIABÈTE DE TYPE 2 (5)****Diabètes insulinonécessitants  
(ou insulinorequérants)**

L'insulinothérapie est entreprise dans trois circonstances principales :

- lorsque l'objectif glycémique n'est pas atteint depuis plusieurs mois. C'est le cas lorsque l'HbA1c est  $> 7\%$  à 2 contrôles successifs espacés de 3 mois ;
- lorsqu'apparaissent des signes de décompensation. Ces signes traduisent une insulinopénie, par épuisement sécrétoire des cellules  $\beta$  du pancréas (cf. Encadré ci-dessous) ;
- en cas d'insuffisance rénale contre-indiquant les antidiabétiques oraux.

Le passage à l'insuline est suggéré sur :

- amaigrissement avec fonte musculaire ;
- asthénie ;
- cétonurie (+++) ;
- polyuropolydipsie ;
- glycémie  $> 3$  g ;
- survenue d'une insuffisance rénale modérée à sévère ;
- ischémie tissulaire sévère (infarctus du myocarde, insuffisance hépatique, etc.).

Classiquement, il s'agit d'un diabète de type 2 traité depuis plusieurs mois ou années par des **sulfamides hypoglycémiants** (*DIAMICRON*, *DAONIL*, etc.) et/ou la **metformine** (*GLUCOPHAGE*, *STAGID*, etc.) et/ou des **incrétino-mimétiques**.

- L'insuline est souvent associée à une bithérapie (le plus souvent association **sulfamides** et **metformine**). Elle est administrée en une injection unique le soir au coucher d'une **insuline NPH** ou d'un **analogue lent de l'insuline** (*LANTUS*, *LEVEMIR*).
- En cas d'échec, il faut envisager une insulinothérapie en plusieurs injections quotidiennes, en ayant recours à l'expertise d'un diabétologue.

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (5) – RÉPAGLINIDE

## ■ Répaglinide

NOVONORM					
1 cp. à administrer avant chacun des 3 repas	90 cp. 0,5 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 0,5 mg	37,47	I	65 %	0,14
	90 cp. 1 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 1 mg	37,47	I	65 %	0,14
	90 cp. 2 mg	13,31	I	65 %	0,15
	270 cp. 2 mg	37,47	I	65 %	0,14

## PROPRIÉTÉS

Hypoglycémiant oral. Le **répaglinide** ferme les canaux potassiques ATP-dépendants de la membrane des cellules bêta en se fixant sur une protéine cible différente de celle des **sulfamides**.

Chez des patients diabétiques de type II, la réponse insulinosécrétrice au repas survient 30 min après la prise d'une dose orale de **répaglinide**. La concentration plasmatique diminue ensuite rapidement et le **répaglinide** est éliminé en 4 à 6 h. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 1 h environ.

L'action insulinosécrétrice est donc plus rapide et moins durable que celle des **sulfamides**.

## INDICATIONS

Idem **sulfamides hypoglycémiants**.

Il faut ajouter que le **répaglinide** est surtout indiqué en cas de pics hyperglycémiques post-prandiaux avec des glycémies assez basses avant les repas. Il est aussi indiqué en cas de repas très irréguliers puisqu'il peut être pris au moment des repas et que son action est rapide.

Peut être associé à la **metformine** mais pas aux **sulfamides**.

Le **répaglinide** est éliminé par la bile et non par les reins (il n'est donc pas contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Diabète de type 2.

Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre le produit au moment du repas. Ne pas le prendre en cas de saut d'un repas.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Idem : **sulfamides hypoglycémiants**.

Les hypoglycémies sont en rapport avec une dose trop forte, un repas non pris, un exercice physique violent.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à la **rifampicine**, au **kétoconazole**, à l'**itraconazole** et au **fluconazole** est contre-indiquée.

## DIABÈTE DE TYPE 2 (6)

### Synthèse des traitements du diabète de type 2

TRAITEMENT	MÉCANISME D'ACTION	RÉDUCTION DE L'HbA1c (%)	COÛT MENSUEL (€)	EFFETS SECONDAIRES PRINCIPAUX	EFFET SUR LE POIDS
Insuline	Insuline exogène	1,5-2,5	60-70	Hypoglycémie	↑
<b>Biguanides</b>	Diminution de la production hématique de glucose	1,5	11-13	Troubles digestifs	≈
<b>Sufamides</b>	Augmentation de la sécrétion d'insuline	1,5	4-30	Hypoglycémie	↑
<b>Glinides</b>	Augmentation de la sécrétion d'insuline	1-1,5	18	Hypoglycémie	↑
<b>GLP-1</b>	Potentialisation de la sécrétion d'insuline, diminution de la sécrétion de glucagon, ralentissement de la vidange gastrique	0,5-1,5	110	Nausées, vomissements	↓
<b>IDPP-4</b>	Inhibition du métabolisme du GLP-1	0,5-0,8	16-22	Troubles digestifs	≈
<b>Inhibiteurs des α-glucosidases</b>	Réduction de la digestion des sucres complexes	0,5-0,8	16-22	Troubles digestifs	≈

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (6) – INCRÉTINO-MIMÉTIQUES – ANALOGUE DU GLP-1 ET INHIBITEUR DE LA DPP-4 (1)

### ■ Exénatide

<b>BYETTA</b>					
2 inj. SC/j 5 µg x 2/j en SC pendant 1 mois, avant éventuellement d'augmenter la dose à 10 µg x 2 /j	60 doses 1,2 mL (5 µg) pour cart. en stylo inj. prérempli	109,74	I	65 %	1,83
	60 doses 2,4 mL (10 µg) pour cart. en stylo inj. prérempli	315,88	I	65 %	5,26

### ■ Liraglutide

<b>VICTOZA</b>					
1 inj. SC/j L'initiation du traitement se fait à la dose de 0,6 mg/j pour obtenir une meilleure tolérance gastro-intestinale. On augmente ensuite à 1,2 mg/j puis si besoin à 1,8 mg/j max avec 1 sem. d'intervalle minimum	2 stylos inj. préremplis 3 mL	109,74	I	65 %	54,87

### ■ Sitagliptine

<b>JANUVIA</b>					
1 cp./j	28 cp. 100 mg	44,00	I	65 %	1,57
	50 cp. 100 mg	HOP	I		
<b>XELEVIA</b>					
1 cp./j	28 cp. 100 mg	44,00	I	65 %	1,57

### ■ Vildagliptine


<b>GALVUS</b>					
1 à 2 cp./j en 1 ou 2 prises	30 cp. 50 mg	24,74	I	65 %	0,82
	60 cp. 50 mg	46,83	I	65 %	0,78
	90 cp. 50 mg	HOP	I		

### ■ Saxagliptine

<b>ONGLYZA</b>					
1 cp./j	30 cp. 5 mg 90 cp. 5 mg	44,69 HOP	I I	65 %	1,49

## DIABÈTE DE TYPE 2 (7)

## Stratégie médicamenteuse pour les diabétiques de type 2 : cas général [1]



## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (7) – INCRÉTINO-MIMÉTIQUES - ANALOGUE DU GLP-1 ET INHIBITEUR DE LA DPP-4 (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

L'**exénatide** et le **liraglutide** sont deux incrétino-mimétiques analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Ils exercent donc plusieurs actions hypoglycémiantes comme le GLP-1 dont la concentration est diminuée en cas de diabète de type 2 : augmentation de la sécrétion d'insuline ; inhibition de la sécrétion de glucagon ; ralentissement de la vidange gastrique, diminuant ainsi le taux d'absorption intestinale du glucose.

L'action de l'**exénatide** est très courte, avec une demi-vie de 3 h ; il devra être administré 2 fois/j. Le **liraglutide** est acylé, ce qui lui confère une cinétique plus favorable (demi-vie : 13 h) et 1 inj. SC/j suffit.

Le GLP-1 est inhibé par une enzyme : la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4). La **sitagliptine**, la **vil-dagliptine** et la **saxagliptine**, inhibiteurs de la DPP-4, favorisent donc l'effet GLP-1 endogène.

L'**exénatide** et le **liraglutide** permettent un bon contrôle des glycémies postprandiales. Ils entraînent généralement une perte de poids (environ 2 kg).

### INDICATIONS

Traitement du diabète de type 2 en association à la **metformine** et/ou un **sulfamide hypoglycémiant** chez les sujets n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérées de ces traitements.

**GALVUS** bénéficie d'une extension d'indication pour le traitement en monothérapie du diabète de type 2 lorsque les règles hydiéno-diététiques ne suffisent pas et que l'association avec la **metformine** n'est pas possible.

### CONTRE-INDICATIONS

Diabète de type 1.

Allergie à la substance active ou un excipient. Grossesse.

Relative : insuffisance rénale terminale et modérée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour l'**exénatide**, commencer le traitement à la dose de 5 µg x 2/j en sous-cutané pendant 1 mois, avant éventuellement d'augmenter la dose à 10 µg x 2/j pour obtenir un meilleur contrôle glycémique.

Pour le **liraglutide**, commencer le traitement à la dose de 0,6 mg/j pendant 1 sem., avant éventuellement d'augmenter la dose à 1,2 mg/j voire 1,8 mg/j pour obtenir un meilleur contrôle glycémique.

Envisager l'adaptation de la dose d'un **sulfamide hypoglycémiant** prescrit en association, pour diminuer le risque d'hypoglycémie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées. Vomissements. Diarrhée.

Diminution de l'appétit.

Hypoglycémie en cas d'association à un **sulfamide hypoglycémiant**.

De rares cas de pancréatites aiguës ont été décrits et imposent l'arrêt du médicament.

La **sitagliptine** augmenterait les infections des voies aériennes supérieures.


### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Surveillance rapprochée de l'INR en début de traitement et lors de l'augmentation de dose. Prise d'antibiotiques au moins une heure avant l'injection.



## DIABÈTE DE TYPE 2 (8)

### Stratégie médicamenteuse pour les diabétiques de type 2 en cas d'intolérance ou contre-indication à la metformine [1]



#### CONSENSUS

[1] Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2, HAS et ANSM, 2013

## HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX (8) – ASSOCIATIONS D'ANTIDIABÉTIQUES

## ■ Metformine + glibenclamide

<b>GLUCOVANCE</b>					
1 à 6 cp./j en 1 à 3 prises Augmentation progressive des doses	30 cp. pell. 500 mg/2,5 mg		I	NR	
	30 cp. pell. 500 mg/5 mg		I	NR	

## ■ Metformine + sitagliptine

<b>JANUMET</b>					
1 cp. x 2/j À corrélér aux posologies du traitement antérieur	56 cp. 1 000 mg/50 mg	44,00	I	65 %	0,79
<b>VELMETIA</b>					
Idem <b>JANUMET</b>	56 cp. 1 000 mg/50 mg	44,00	I	65 %	0,79

## ■ Metformine + vildagliptine

<b>EUCREAS</b>					
1 cp. x 2/j À corrélér aux posologies du traitement antérieur	60 cp. 1 000 mg/50 mg 180 cp. 1 000 mg/50 mg	46,83 HOP	I I	65 %	0,84

## ■ Metformine + saxagliptine

<b>KOMBOGLYZE</b>					
1 cp. x 2/j À corrélér aux posologies du traitement antérieur	60 cp. 1 000 mg/2,5 mg	44,69	I	65 %	0,74

## ■ PROPRIÉTÉS

**GLUCOVANCE** : association d'un **biguanide** et d'un **sulfamide hypoglycémiant**.

**JANUMET**, **VELMETIA**, **EUCREAS** et **KOMBOGLYZE** : association d'un **biguanide** et d'une **incrétine**.

## ■ INDICATIONS

**GLUCOVANCE** : traitement du diabète non insulinodépendant de l'adulte en substitution d'une

bithérapie par **metformine** et **glibenclamide** chez des patients dont l'équilibre glycémique est stable et bien contrôlé.

**JANUMET**, **VELMETIA**, **EUCREAS** et **KOMBOGLYZE** : diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la **metformine** en monothérapie. Se référer à chaque DCI pour la pharmacologie

## HYPERGLYCÉMIANTS

## ■ Diazoxide

**PROGLICEM**

Dose moyenne de 5 à 10 mg/kg/j soit 350 à 500 mg pour l'adulte de poids moyen

100 gél. 25 mg  
100 gél. 100 mg

HOP  
HOP

I  
I

**PROPRIÉTÉS**

Médicament ayant une action hyperglycémiant essentielle par inhibition de la libération pancréatique d'insuline et par action stimulante sur les catécholamines médullo-surrénales. Le **diazoxide** a aussi une action antihypertensive et inhibitrice sur les fibres musculaires lisses.

**INDICATIONS**

Hypoglycémies tumorales pancréatiques.  
Hypoglycémies leucine-sensibles de l'enfant.

## ■ Glucagon

**GLUCAGEN**

1 amp. injectable à diluer dans le solvant : injecter immédiatement en IM  
Chez l'enfant : 0,5 mg

1 amp. injectable 1 mg  
(1 mL de solv.)

18,63

I

65 %

18,63

**GLUCAGEN KIT**

Idem **GLUCAGEN**

1 ser. préremplie  
1 mg/mL

22,91

I

65 %

22,91

**PROPRIÉTÉS**

Hormone hyperglycémiant par mobilisation immédiate des réserves de glucose hépatique. La néoglucogenèse et la glycogénolyse sont également accélérées. Le **glucagon** a également une action lipolytique et éventuellement, à doses élevées, des actions chronotrope et inotrope positives.

**INDICATIONS**

Hypoglycémies : action rapide (3 à 10 min) et brève (20 à 30 min).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Mise en œuvre du traitement en milieu hospitalier.

Surveillance de la glycémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rétention hydrosodée.

Hirsutisme souvent marqué aux fortes posologies, chez l'enfant.

Troubles digestifs.

Accidents allergiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation de l'action hyperglycémiant par les **diurétiques**.

Augmentation des taux plasmatiques d'**AVK**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisances hépatiques : le **glucagon** y est inactif.

Hypoglycémies alcooliques, insulinomes, glucagonomes.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

À doses importantes (> 2 mg) : flush, nausées, vomissements. En cas de surdosage : risque d'hypokaliémie.

## HYPOLIPÉMIANTS (1) – STATINES (1)

## ■ Simvastatine

<b>ZOCOR</b>					
Posologie initiale usuelle : 10 à 20 mg/j en 1 prise le soir	28 cp. 5 mg		I	NR	
	28 cp. séc. 20 mg	20,61	I	65 %	0,74
	50 cp. séc. 20 mg	HOP	I		
	84 cp. séc. 20 mg	58,04	I	65 %	0,69
	28 cp. 40 mg	23,02	I	65 %	0,82
	50 cp. 40 mg	HOP	I		
	84 cp. 40 mg	64,83	I	65 %	0,77
<b>LODALÈS</b>					
Idem <b>ZOCOR</b>	28 cp. séc. 20 mg	20,61	I	65 %	0,74
	90 cp. séc. 20 mg	62,08	I	65 %	0,69
	28 cp. 40 mg	23,02	I	65 %	0,82
	90 cp. 40 mg	69,35	I	65 %	0,77

## ■ Pravastatine

<b>ELISOR</b>					
Dose recommandée : 10 à 40 mg x 1/j	28 cp. séc. 10 mg	9,76	I	65 %	0,35
	28 cp. séc. 20 mg	18,96	I	65 %	0,68
	84 cp. séc. 20 mg	53,42	I	65 %	0,64
	28 cp. séc. 40 mg	21,17	I	65 %	0,76
	84 cp. séc. 40 mg	59,66	I	65 %	0,71
<b>VASTEN</b>					
Idem <b>ELISOR</b>	28 cp. séc. 10 mg	9,76	I	65 %	0,35
	28 cp. séc. 20 mg	18,96	I	65 %	0,68
	84 cp. séc. 20 mg	53,42	I	65 %	0,64
	28 cp. 40 mg	21,17	I	65 %	0,76
	84 cp. 40 mg	59,66	I	65 %	0,71

## ■ Pravastatine + acide acétylsalicylique

<b>PRAVADUAL</b>					
Prévention secondaire après un angor instable ou un infarctus du myocarde avec cholestérol normal ou élevé : 1 cp. /j	30 cp. 40 mg/80 mg	19,39	I	65 %	0,65
	90 cp. 40 mg/80 mg	54,72	I	65 %	0,64

## ■ Fluvastatine

<b>FRACTAL</b>					
Posologie habituelle : 20 à 40 mg/j Dose max. : 80 mg/j	30 gél. 20 mg	7,18	I	65 %	0,24
	90 gél. 20 mg	20,20	I	65 %	0,22
	30 gél. 40 mg	7,98	I	65 %	0,27
	90 gél. 40 mg	22,46	I	65 %	0,25
	30 cp. LP 80 mg	13,10	I	65 %	0,44
	90 cp. LP 80 mg	37,19	I	65 %	0,41
<b>LESCOL</b>					
Idem <b>FRACTAL</b>	30 gél. 20 mg	7,18	I	65 %	0,24
	90 gél. 20 mg	20,20	I	65 %	0,22
	30 gél. 40 mg	7,98	I	65 %	0,27
	90 gél. 40 mg	22,46	I	65 %	0,25
	28 cp. LP 80 mg	HOP	I		
	30 cp. LP 80 mg	13,20	I	65 %	0,44
	90 cp. LP 80 mg	37,19	I	65 %	0,41

**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (2)****Médicaments****Hypercholestérolémies d'intensité moyenne**

► *Inhibiteurs de l'HMG CoA réductase ou statines*

Ils constituent l'indication préférentielle dans les hypercholestérolémies moyennes. Les **statines**, associées au régime, peuvent réduire le cholestérol total de 30 à 40 %, l'apolipoprotéine B de 30 % et les triglycérides de 10 %.

On utilise la **simvastatine** (**ZOCOR**, **LODALÈS** 20 à 80 mg/j), la **pravastatine** (**ELISOR**, **VASTEN** 20 à 80 mg/j) et la **fluvastatine** (**FRACTAL**, **LESCOL** 20 à 80 mg/j), l'**atorvastatine** (**TAHOR** 10 à 80 mg/j) ou la **rosuvastatine** (**CRESTOR** 5 à 80 mg/j). On débute en général par le plus faible dosage et on augmente la posologie en fonction du taux de LDL cholestérol, de façon à atteindre l'objectif fixé [1].

Les **statines** sont d'autant plus actives que les patients conservent des récepteurs hépatiques de LDL, raison pour laquelle leur efficacité est réduite dans les formes familiales les plus graves de l'hypercholestérolémie homozygote.

Les **statines** sont administrées de préférence le soir (car l'HMGCoA réductase est une enzyme à action essentiellement nocturne).

Les **statines** ont fait la preuve de leur efficacité à réduire à long terme l'incidence des accidents cardiovasculaires.

► *Ézétimibe*

L'**ézétimibe** (**EZETROL**) agit en bloquant l'absorption digestive du cholestérol alimentaire et biliaire. Il est utilisé à raison de 10 mg/j seul en cas d'intolérance aux **statines** ou en association avec elles lorsque le taux du LDL cholestérol reste supérieur à l'objectif fixé : **ézétimibe + simvastatine** (**INEGY**) : 10/20 à 20/80 mg/j.

**Cas des hypercholestérolémies majeures**

► *Traitement médicamenteux*

Chez l'enfant, essentiellement dans les cholestases responsables d'hypercholestérolémie majeure, on prescrit une résine chélatrice des acides biliaires : **colestyramine** (**QUESTRAN**) 8 à 16 mg/j. Des effets secondaires, surtout digestifs, peuvent rendre le traitement inconfortable (constipation opiniâtre). Une posologie très progressive est nécessaire pour faire accepter ce traitement.

Une **statine** est systématiquement associée au **QUESTRAN** pour compenser l'augmentation de l'activité de l'HMG CoA réductase.

► *Aphérèse des LDL*

Cette technique consiste à extraire de façon sélective les LDL du plasma. Elle est associée au traitement médicamenteux.

## HYPOLIPÉMIANTS (2) – STATINES (2)

## ■ Atorvastatine

<b>TAHOR</b>					
Posologie initiale : 10 mg/j à tout moment de la journée, à augmenter au bout de 4 sem. Posologie max. : 80 mg/j La dose de 10 mg peut être augmentée à 20 mg au bout de 4 sem.	28 cp. 10 mg	14,82	I	65 %	0,53
	50 cp. 10 mg	HOP	I	65 %	
	90 cp. 10 mg	44,60	I	65 %	0,50
	28 cp. 20 mg	27,33	I	65 %	0,98
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	82,40	I	65 %	0,92
	28 cp. 40 mg	30,54	I	65 %	1,09
	50 cp. 40 mg	HOP	I		
	90 cp. 40 mg	91,76	I	65 %	1,02
	28 cp. 80 mg	30,54	I	65 %	1,09
	50 cp. 80 mg	HOP	I		
	90 cp. 80 mg	91,76	I	65 %	1,02

## ■ Atorvastatine + amlodipine

<b>CADUET</b>					
Prévention cardiovasculaire chez l'hypertendu sans maladie coronaire avec 3 facteurs de risque et cholestérol normal ou modérément élevé : 1 cp. /j	30 cp. 5/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	30 cp. 10/10 mg	22,29	I	65 %	0,74
	90 cp. 5/10 mg	62,87	I	65 %	0,70
	90 cp. 10/10 mg	62,87	I	65 %	0,70

## ■ Rosuvastatine

<b>CRESTOR</b>					
Commencer le traitement à la dose de 5 ou 10 mg/j Posologie maximale : 40 mg/j en 2 prises	30 cp. 5 mg	18,71	I	65 %	0,62
	50 cp. 5 mg	HOP	I		
	90 cp. 5 mg	52,69	I	65 %	0,59
	30 cp. 10 mg	27,21	I	65 %	0,91
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	76,67	I	65 %	0,85
	30 cp. 20 mg	35,71	I	65 %	1,19
	50 cp. 20 mg	HOP	I		
	90 cp. 20 mg	100,71	I	65 %	1,12

**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (3)****Teneur des aliments courants en cholestérol**

CATÉGORIE D'ALIMENTS	ALIMENTS		TENEUR CHOLESTÉROL (en mg/100 g)
Viandes	Abats	Cervelle	> 2 500
		Rognons	500-550
		Foie	350-400
		Cœur (bœuf cuit)	300
		Ris de veau	250
	Viandes	Viandes grasses	70-100
Poissons	Poissons	Caviar	300
		Huîtres	250
		Poissons habituels	< 70
Œufs/laitages	Œuf	1 œuf entier (60 g)	500
	Beurre	Beurre habituel	250
		Beurre demi-sel	250
	Fromages		100
Pâtisseries	(au beurre)	Croissants, madeleines	200

**Critères de prescription de médicaments**

La prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique doit tenir compte des facteurs de risque.

**Facteurs de risque**

Les hyperlipidémies sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Leur

traitement nécessite de fixer un objectif en termes de taux de LDL cholestérol à atteindre, qui prenne en compte tous les autres facteurs du risque cardiovasculaire. On définit par ailleurs des patients à haut risque cardiovasculaire pour lesquels les objectifs sont plus stricts.

**HYPOLIPÉMIANTS (3) – STATINES (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Les **statines** bloquent l'étape initiale de la biosynthèse du cholestérol en inhibant l'HMG-CoA réductase qui permet normalement cette réaction.

Les **statines** réduisent en moyenne le cholestérol total de 30 à 40 %, le LDL-C de 40 % et, les triglycérides de 20 %. Elles augmentent le HDL-C de 10 %.

Les **statines** de deuxième génération (**atorvastatine**, **rosuvastatine**) sont les plus puissantes ; elles réduisent modérément les triglycérides et élèvent de façon variable le HDL cholestérol. Ce sont donc des produits qui agissent essentiellement dans les hypercholestérolémies pures ou mixtes.

**INDICATIONS**

Hypercholestérolémies pures (IIa) et mixtes (IIb et III).

Prévention des événements cardiovasculaires chez des sujets à risque.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux **statines**.

Insuffisances hépatocellulaires.

**Grossesse** et **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Avant prescription : bilan hépatique (ASAT, ALAT et dosage des CPK seulement dans les situations à risque de rhabdomyolyse). Surveillance des transaminases dans les 3 mois suivant le début du traitement.

Les **statines** doivent être arrêtées si les transaminases sont  $> 3N$  sauf si l'élévation peut être rapportée à une stéatose ou une NASH (stéatopathie dysmétabolique : atteinte hépatique liée au syndrome métabolique) du sujet obèse ou en surpoids.

Dosage des CPK en cas de symptômes musculaires uniquement. Les **statines** doivent être arrêtées si les CPK sont  $> 5N$ .

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Atteinte hépatique : surveillance des transaminases avant traitement et de façon régulière, notamment avec les fortes doses. Une élévation à 3 fois la normale doit faire arrêter le traitement.

Troubles musculaires : ils se manifestent par des crampes, des douleurs, des contractures musculaires. L'accident le plus sévère est une rhabdomyolyse. Le dosage de la CPK musculaire permet de dépister ces troubles. Le risque d'atteinte musculaire augmente en cas de traitement immunosuppresseur simultané (**ciclosporine**).

Troubles digestifs : nausées, douleurs abdominales, diarrhée.

Autres effets : céphalées, asthénie, syndrome dépressif ; réactions allergiques cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Fibrates** : ils sont déconseillés car ils augmentent le risque de rhabdomyolyse lorsqu'ils sont associés aux **statines**. L'association est possible dans certains cas particuliers sous surveillance étroite.

**Antivitamines K** : augmentation de l'activité anticoagulante.

**Ciclosporine** : diminution du métabolisme des **statines**.

**Digoxine** : augmentation de 20 % de la digoxinémie.

**Érythromycine** : augmentation du risque musculaire.

Jus de pamplemousse : augmente les concentrations de **statines**.



**HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (4)****Facteurs de risque associés à prendre en compte**

ÂGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homme de plus de 50 ans</li> <li>• Femme de 60 ans ou plus</li> </ul>
ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE MALADIE CORONAIRE PRÉCOCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infarctus du myocarde ou mort subite : avant l'âge de 55 ans chez le père ou chez un parent du premier degré de sexe masculin</li> <li>• Infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 65 ans chez la mère ou chez un parent du premier degré de sexe féminin</li> </ul>
TABAGISME	Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
HYPERTENSION ARTÉRIELLE PERMANENTE	Traitée ou non (se reporter aux recommandations spécifiques)
DIABÈTE DE type 2	Se reporter aux recommandations spécifiques
HDL CHOLESTÉROL *	≤ 0,40 g/L (1,0 mmol/L)

**Patient à haut risque cardiovasculaire**

- ANTÉCÉDENT DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE AVÉRÉE
- DIABÈTE DE type 2 à HAUT RISQUE :
  - atteinte rénale (protéinurie > 300 mg/24 h ou clairance de la créatinine estimée par la formule de Cockcroft < 60 mL/min),
  - ou au moins 2 des facteurs suivants : âge, antécédents de maladie coronaire précoce, tabagisme, hypertension artérielle, HDL cholestérol < 0,40 g/L, microalbuminurie (30 mg/24 h).
- RISQUE DE SURVENUE D'UN ÉVÉNEMENT CORONARIEN DANS LES 10 ANS > 20 % (selon les tables de risque).

**Critères lipidiques**

La conférence de consensus a défini des seuils de LDL cholestérol à partir desquels le traitement hypolipémiant doit être introduit. Ces seuils tiennent compte des autres facteurs de risque cardiovasculaires.

Les objectifs sont d'autant plus exigeants qu'ils sont nombreux. L'objectif est d'atteindre un LDL cholestérol inférieur à ces seuils.

Tout sujet ayant un LDL cholestérol > 1,60 g/L (4,1 mmol/L), ainsi que tout sujet ayant au moins un facteur de risque cardiovasculaire, doit bénéficier d'une prise en charge diététique, afin de modifier son mode de vie et son alimentation. Le taux de LDL cholestérol est calculé avec la formule de Friedwald à partir des résultats

du bilan dit « évaluation d'une anomalie lipidique » qui consiste à déterminer 3 paramètres :

- le cholestérol total (CT) ;
- le HDL cholestérol (HDL-C) ;
- les triglycérides (TG) inférieurs à 4 g.

**En g/L : LDL-C = CT - (HDL-C + TG/5)**

**En mmol/L : LDL-C = CT - (HDL-C + TG/2,26)**

Cette formule n'est valable que si les TG sont < 4 g/L (4,5 mmol/L).

Le taux de LDL-C permet ainsi d'instituer le traitement chez des patients ayant des facteurs de risque :

- soit en prévention primaire, avant tout accident cardiovasculaire ;
- soit en prévention secondaire, afin d'empêcher une récurrence.

\* Facteur protecteur : HDL cholestérol ≥ 0,60 g/L (1,5 mmol/L) ; soustraire alors « un risque » au score de niveau de risque

## HYPOLIPÉMIANTS (4) – INHIBITEURS DE L'ABSORPTION INTESTINALE DU CHOLESTÉROL

### ■ Ézétimibe

<b>EZETROL</b>					
1 cp./j	28 cp. 10 mg	39,64	I	65 %	1,42
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	90 cp. 10 mg	124,68	I	65 %	1,39

### ■ Ézétimibe + simvastatine

<b>INEGY</b>					
1 cp./j	30 cp. 10 mg/20 mg	54,52	I	65 %	1,82
10/20 mg à 20/80 mg/j le soir	30 cp. 10 mg/40 mg	60,24	I	65 %	2,01
	90 cp. 10 mg/20 mg	154,09	I	65 %	1,71
	90 cp. 10 mg/40 mg	170,31	I	65 %	1,89

### PROPRIÉTÉS

L'**ézétimibe** est un hypolipémiant entraînant une inhibition sélective de l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols apparentés. Il diminue d'environ 20 % le LDL cholestérol.

La **simvastatine** diminue la synthèse hépatique du cholestérol (cf. **Statines**).

En association avec la **simvastatine**, l'**ézétimibe** diminue le cholestérol par l'association de deux mécanismes distincts.

### INDICATIONS

Hypercholestérolémie primaire :

- en association avec une statine comme traitement adjuvant chez les patients répondant partiellement au traitement par **statine** seule ;
- en monothérapie en cas d'intolérance aux **statines**.

Hypercholestérolémie familiale homozygote : en association avec une **statine**.

Sitostérolémie homozygote : en traitement adjuvant au régime.

### CONTRE-INDICATIONS

Grossesse, allaitement.

Hypersensibilité à l'**ézétimibe**, allaitement, galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption en glucose ou galactose, déficit en lactate.

Déconseillé en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère, chez l'enfant de moins de 10 ans et pendant la grossesse.

Contre-indications de la **simvastatine** pour **INEGY**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Celles de la **simvastatine** pour **INEGY**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, douleurs abdominales, diarrhée, constipation.

Pancréatite, hépatite, cholécystite.

Rash cutané, thrombopénie.

Myopathie, rhabdomyolyse, élévation des CPK.

Effets secondaires de la **simvastatine** pour **INEGY**.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERCHOLESTÉROLÉMIES PURES IIA (5)

### Stratégie thérapeutique des dyslipidémies en fonction des facteurs de risque : objectif à atteindre pour le LDL cholestérol

AUCUN FACTEUR DE RISQUE	1 SEUL FACTEUR DE RISQUE	2 FACTEURS DE RISQUE	≥ 3 FACTEURS DE RISQUE	HAUT RISQUE CARDIO-VASCULAIRE
< 2,20 g/L (5,7 mmol/L)	< 1,90 g/L (4,9 mmol/L)	< 1,60 g/L (4,1 mmol/L)	< 1,30 g/L (3,4 mmol/L)	< 1,00 g/L (2,6 mmol/L)

Le traitement comporte toujours :

- le régime diététique hypocholestérolémiant ;
- une activité physique régulière ;
- la prise en charge des facteurs de risque associés : tabagisme, HTA, diabète de type 2, obésité.

Le traitement médicamenteux est prescrit d'emblée chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Chez les patients à risque plus faible, le traitement médicamenteux est introduit en cas d'échec des règles hygiénodietétiques suivies pendant 3 mois.

Les **statines** sont prescrites en première

intention. Les autres médicaments hypolipidémisants sont utilisés en deuxième intention.

#### Cas particulier du sujet âgé :

– Le bénéfice de l'introduction d'un traitement par statine, en prévention primaire, chez le sujet de plus de 80 ans n'est pas démontré.

– Chez les sujets âgés de plus de 80 ans, les critères permettant la prolongation du traitement en prévention primaire sont : le cumul de facteurs de risque, l'absence de pathologie non cardiovasculaire réduisant l'espérance de vie à court terme et une bonne tolérance du traitement.

### Caractéristiques des différents types d'hyperlipidémies

TYPE D'HYPERLIPIDÉMIE	CHYLOMICRONS	β (LDL)	Pré β (VLDL)	AUTRE	RISQUES MAJEURS
I	+++	NI	NI à +	0	Pancréatite
Ila	NI	+++	NI	0	Athérosclérose
Ilb	NI	++	++		Athérosclérose pancréatite
III	NI	++	++	IDL	Athérosclérose pancréatite
IV	NI à +	NI à +	+++	0	Xanthomatose éruptive pancréatite
V	++		++	0	Pancréatite

#### CONSENSUS

[1] Prise en charge thérapeutique des patients dyslipidémiques, *Afssaps*, 2005

## HYPOLIPÉMIANTS (5) – RÉSINE

## ■ Colestyramine

QUESTRAN					
3 sach./j en moyenne : 1 à chaque repas, la posologie pouvant aller jusqu'à 24 g dans les hypercholestérolémies majeures	50 sach. 4 g à dissoudre	18,23	I	65 %	0,36

**PROPRIÉTÉS**

Résine échangeuse d'ions, fixant les acides biliaires et augmentant leur élimination fécale (en particulier le cholestérol transformé en acides cholique et chénodésoxycholique)

**INDICATIONS**

Hypercholestérolémie  
Prurit lié à une cholestase.  
Diarrhée liée à une résection iléale (pour chélateur les acides biliaires).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation fréquente, opiniâtre, pouvant dans les cas extrêmes réaliser une pseudo-occlusion.

Risque de malabsorption des vitamines A, D, E, K et de nombreux médicaments.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement à posologie progressive, à administrer à distance des autres médicaments.

Associer un traitement par lubrifiant digestif.

**Grossesse** : évaluer les risques : hypercholestérolémie majeure contre malabsorption des vitamines liposolubles.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de l'effet des **AVK** et des **hormones thyroïdiennes**.

**Dépistage et surveillance biologiques d'une hyperlipidémie**

1. Il n'y a pas lieu, chez un patient jeune (homme < 50 ans, femme avant la ménopause), sans dyslipidémie et sans facteur de risque\*, dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 5 ans.
2. Il n'y a pas lieu, chez un homme après 50 ans, sans facteur de risque et dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 3 ans.
3. Il n'y a pas lieu, chez une femme après la ménopause, sans facteur de risque et dont les résultats d'une première mesure, après 12 h de jeûne, du cholestérol total et des triglycérides sont normaux, de répéter ce dosage avant 3 ans.
4. Il n'y a pas lieu, chez les patients porteurs de facteurs de risque, suivant une thérapeutique hypolipémiante hygiénodététique et/ou médicamenteuse, de répéter les dosages plus d'une fois tous les 6 mois, une fois les valeurs cibles atteintes et stabilisées.
5. Il n'y a pas lieu, si une dyslipidémie est dépistée, de prescrire, dans le cadre de l'exploration d'une anomalie lipidique, d'autres examens que le dosage\*\* du cholestérol total, du cholestérol HDL (permettant le calcul du LDL cholestérol) et des triglycérides.

\* Facteurs de risque autres qu'une dyslipidémie : signes évocateurs de maladie artérielle (HTA notamment), diabète sucré, tabagisme, surpoids (surtout avec morphotype androïde, même si le surpoids est modeste), histoire familiale d'athérosclérose prématurée (infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans, chez un parent direct ou dans la fratrie).

\*\* Prélèvement effectué après 12 h de jeûne.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIES (1)

### Hypertriglycérémies pures (type IV)

#### Hypertriglycérémies (type IV)

SIGNES ET RISQUES CLINIQUES	CRITÈRES BIOLOGIQUES
Troubles digestifs Hépatomégalie Xanthomatose éruptive Pancréatites aiguës	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Surcharge considérable en VLDL. Le sérum est lactescent et au test de décantation, les VLDL ne flottent pas.</li> <li>– Les TG peuvent atteindre 40 à 100 g/L. Ces VLDL contiennent 1/5 de cholestérol : cette surcharge entraîne une hypercholestérolémie qui peut dépasser 20 g/L.</li> <li>– L'électrophorèse des lipoprotéines montre la surcharge en VLDL, d'ailleurs souvent associée à des chylomicrons.</li> </ul>

#### Régime

Il a une importance essentielle : la moitié des hypertriglycérémies peut être corrigée par une diététique bien suivie.

##### ► Contrôle du poids

Il est capital ici de revenir au poids idéal et le régime hypocalorique global est mis en œuvre dès qu'existe un surpoids. Deux mesures efficaces :

- limitation de l'apport calorique ;
- substitution des graisses animales par les graisses végétales mono- ou polyinsaturées.

##### ► Contrôle des facteurs nutritionnels responsables de l'hypertriglycérémie

- Limitation des sucres à absorption rapide et des féculents.

Un certain nombre d'hypertriglycérémies sont provoquées et entretenues par les glucides d'assimilation rapide. Ces hypertriglycérémies se rapprochent de celles observées dans le diabète et sont en rapport avec des anomalies génétiques.

- Suppression de l'alcool

L'hypertriglycérémie peut être déclenchée par de faibles quantités d'alcool. Ici le déficit porte également sur des enzymes de la lipolyse et une augmentation de la synthèse des TG.

L'évaluation de l'efficacité du régime seul doit être relativement longue, 2 à 3 mois, de façon à tester la sensibilité aux glucides ou à l'alcool avant la décision d'un traitement médicamenteux complémentaire en cas d'échec.

#### Acides gras oméga-3

Ils peuvent être prescrits en monothérapie ou en association avec les **fibrates**. Ex. : **OMACOR** 1 à 4 caps./j.

#### Dérivés des fibrates

Ce sont les médicaments essentielles des hypertriglycérémies majeures et des hyperlipidémies mixtes. Ils entraînent une réduction du cholestérol total (- 25 % : action sur l'HMGCoA réductase), des triglycérides (- 35 à 45 %) et une élévation du HDL cholestérol (+ 10 à 25 %).

Ils sont bien tolérés, mais on manque de preuves quant à leur efficacité sur la morbidité cardiovasculaire à long terme en prévention primaire et secondaire.

Les **fibrates** les plus fréquemment utilisés sont :

- le **fénofibrate (LIPANTHYL)** ;
- le **gemfibrozil (LIPUR)**.

Les doses habituelles sont de 100 à 300 mg/j.

Les **fibrates** sont indiqués dans deux situations :

- en cas d'hypertriglycérémie avec hypo-HDLémie et un LDL-C < 1 g/L ;
- en cas d'hypertriglycérémie importante > 4 g/L.

#### Hyperlipidémie mixte de type IIb

L'hypertriglycérémie mixte est caractérisée par l'élévation conjointe du cholestérol et des triglycérides ; l'augmentation du cholestérol est due à celle du cholestérol LDL, le cholestérol HDL étant diminué.

Le régime associe les mesures propres aux hypercholestérolémies et aux hypertriglycérémies.

On privilégie la prescription d'une **statine**.

**HYPOLIPÉMIANTS (6) – FIBRATES**■ **Bézafibrate**

<b>BÉFIZAL</b>					
La dose moyenne est de 400 mg/j	84 cp. 200 mg	6,70	II	65 %	0,08
	30 cp. LP 400 mg	7,93	II	65 %	0,26
	90 cp. LP 400 mg	22,30	II	65 %	0,25

■ **Ciprofibrate**

<b>LIPANOR</b>					
1 gél./j	30 gél. 100 mg	5,62	II	65 %	0,19

■ **Fénofibrate**

<b>LIPANTHYL</b>					
<b>LIPANTHYL MICRONISÉ</b> : 2 à 4 gél./j en 2 à 3 prises	60 gél. 67 mg	6,06	II	65 %	0,10
	90 gél. 67 mg	8,38	II	65 %	0,09
	30 gél. 200 mg	9,69	II	65 %	0,32
	90 gél. 200 mg	27,27	II	65 %	0,30
<b>LIPANTHYL à libération modifiée</b> : 1 cp./j	30 cp. 145 mg	7,70	II	65 %	0,26
	90 cp. 145 mg	21,65	II	65 %	0,24
	30 cp. 160 mg	9,61	II	65 %	0,32
	90 cp. 160 mg	27,06	II	65 %	0,30

■ **Gemfibrozil**

<b>LIPUR</b>					
1 cp./j à chaque repas	60 cp. 450 mg	11,97	II	65 %	0,20

**PROPRIÉTÉS**

Les **fibrates** agissent à la fois sur la synthèse du cholestérol (inhibition de l'HMG-CoA réductase) et des triglycérides. Ils réduisent ainsi le LDL de 25 % et les TG de 40-60 %. Le HDL augmente de 10-20 %.

**INDICATIONS**

Hyperlipidémies mixtes (IIa, III) et de type IV. Hyperlipidémies de type IIa (moins efficaces que les **statines**).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance du TP ou de L'INR avec les **antivitamines K**. Surveillance régulière de la créatinine et des transaminases.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Myalgies, et dans les cas extrêmes, rhabdomyolyse (effet dose-dépendant).

Effets hépatotoxiques : élévation des transaminases (10 à 20 %). Lithiase biliaire.

Nausées, asthénie, céphalées, vertiges.

Impuissance.

Allergies cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas associer aux **statines** car risque de potentialisation des effets secondaires hépatiques et musculaires.

## HYPERLIPIDÉMIES - HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIES (2)

### Hyperlipidémie mixte de type III (dys- $\beta$ -lipoprotéinémie)

Cette hyperlipidémie, rare, comprend une lipoprotéine dont l'excès comporte des risques communs aux hyperlipidémies de type IIb et IV. Elle réagit en général très bien au traitement par régime et **fibrates**.

### Hypertriglycéridémies secondaires

#### Traitement étiologique

##### ► Traitement diététique

La diététique comporte obligatoirement la suppression de l'alcool et la restriction en sucres d'absorption rapide.

En cas d'obésité, un régime de restriction calorique est obligatoire.

##### ► Diabète

Le diabète déséquilibré retentit presque inéluctablement sur le métabolisme lipidique et est responsable très fréquemment d'hypertriglycéridémie modérée. Le bon contrôle du diabète s'accompagne d'une normalisation des triglycérides.

Les hypertriglycéridémies au cours du diabète peuvent être brutales et massives (pancréatites aiguës, xanthomatoses éruptives). Elles obligent à traiter le patient par insuline. Le schéma thérapeutique de début doit être optimisé : au moins 4 injections/j.

##### ► Hépatopathies

Toute atteinte hépatique peut se compliquer d'hyperlipidémie mixte ou d'hypertriglycéridémie pure. Le traitement est uniquement diététique.

##### ► Médicaments hypertriglycéridémisants

- **Éthinylestradiol** contenu dans les pilules contraceptives.
- Certains **progestatifs** : **noréthistérone**.
- **Corticoïdes**.

#### Traitement médicamenteux

Lorsque le traitement étiologique est insuffisant, un traitement médicamenteux est indiqué selon les mêmes règles de prescription que dans les hypertriglycéridémies pures et les hyperlipidémies mixtes.

### Hyperchylomicronémies (hyperlipidémies de type I)

L'hyperchylomicronémie, dyslipidémie exceptionnelle, ne provoque jamais de complication athéromateuse. Le risque majeur de cette hyperlipidémie est la pancréatite aiguë œdémateuse et surtout nécrosante.

#### Traitement diététique

Le traitement est difficile : il s'agit de la seule hyperlipidémie où le régime doit être très restrictif en graisses, inférieur à 20 % de l'apport énergétique total (10 à 15 g/j).

La restriction lipidique doit porter sur les lipides cachés, notamment dans la viande, les pâtisseries, le chocolat, etc.

Il faut choisir préférentiellement les aliments suivants :

- viandes maigres (< 5 % de graisses),
- poissons maigres (< 1 % de graisses),
- fromages maigres,
- laitages écrémés,
- œufs sans le jaune.

Afin de maintenir une ration calorique suffisante, on peut utiliser les triglycérides à chaîne moyenne car ils ne participent pas à la formation des chylomicrons (huile *Liprocil*, margarine *Ceres*).

#### Traitement médicamenteux

Il n'y a aucun traitement médicamenteux efficace dans l'hyperlipidémie de type I.

### Hyperlipidémie de type V

Il s'agit d'une maladie génétique rare, associant une hypertriglycéridémie et une hyperchylomicronémie.

Le traitement comporte :

- une diététique restrictive en graisse comme dans l'hyperchylomicronémie ;
- la suppression de l'alcool et la restriction en sucres d'absorption rapide ;
- la prescription de **fibrates** et éventuellement d'huiles de poisson riches en acides gras polyinsaturés de la série oméga-3 (**OMACOR**, etc.).

## HYPOLIPÉMIANTS (7) – ACIDES GRAS OMÉGA-3

### ■ Triglycérides d'acides gras oméga-3

<b>TRIGLISTAB</b>					
3 caps./j	30 caps. 1 010 mg		II	NR	
<b>YSOMEGA</b>					
Idem <b>TRIGLISTAB</b>	30 caps. 1 g		II	NR	
	60 caps. 1 g		II	NR	

### ■ Acides oméga-3 + alpha-tocophérol

<b>OMACOR</b>					
1 à 4 caps./j	28 caps. 1 g/4 mg	26,35	II	65 %	0,94

#### PROPRIÉTÉS

Préparations à base d'huile de chair de poisson, riche en acides gras oméga-3 polyinsaturés (acides ecosapentaénoïque et docosahexaénoïque).

#### INDICATIONS

Hyperlipidémies avec hypertriglycéridémie isolée ou prédominante (type IIb, III et IV).

Prévention des accidents cardiovasculaires chez des sujets prédisposés ou ayant déjà eu un infarctus du myocarde.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitements anticoagulants : surveillance.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, éructations.



## ADJUVANT DE LA SURCHARGE PONDERALE

## ■ Orlistat

XÉNICAL				
1 gél. avant, pendant ou jusqu'à 1 h après chacun des principaux repas Si un repas est sauté ou ne contient pas de graisses, la prise d' <b>orlistat</b> doit être supprimée Des posologies supérieures à 120 mg x 3/j n'apportent pas de bénéfice supplémentaire	84 gél. 120 mg		I	NR

## PROPRIÉTÉS

L'**orlistat** est un inhibiteur puissant, spécifique et d'action prolongée des lipases gastro-intestinales. Il forme dans la lumière de l'estomac et de l'intestin grêle une liaison covalente avec le site sérine actif des lipases gastriques et pancréatiques. L'enzyme ainsi inactivée ne peut plus hydrolyser les triglycérides alimentaires en acides gras libres et monoglycérides absorbables.

## INDICATIONS

**XÉNICAL** : traitement de l'obésité (indice de masse corporelle [IMC]  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>) ou du surpoids (IMC  $\geq 28$  kg/m<sup>2</sup>) associé à des facteurs de risques.

Si un régime seul a précédemment permis une perte de poids d'au moins 2,5 kg en 4 sem. consécutives. Le traitement par **orlistat** doit être arrêté après 12 sem. si les patients n'ont pas perdu au moins 5 % du poids initial.

## CONTRE-INDICATIONS

Syndrome de malabsorption chronique.  
Cholestase.

Allaitement (le passage dans le lait maternel n'est pas connu). Grossesse.

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminution de l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Maintien d'une alimentation riche en fruits et en légumes.

Si besoin, supplémentation multivitaminique à distance (2 h) de la prise d'**orlistat**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

• Gastro-intestinaux (+++)

Ils sont liés à l'activité de l'**orlistat** et témoignent de son efficacité. Pendant la première année de traitement, les effets très fréquents sont des traces de graisses au niveau anal

(27 %), des gaz avec suintement (24 %), des selles impérieuses (22 %), des selles grasses/huileuses (20 %), des émissions de graisses (12 %), des selles abondantes (11 %), des incontinences fécales (8 %).

L'incidence des effets indésirables diminue lors de l'utilisation prolongée d'**orlistat**.

Les autres événements (plus rares) sont : douleur/gêne abdominale, flatulence, selles liquides, selles molles, douleur/gêne rectale, problèmes dentaires, problèmes gingivaux.

- Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : infection respiratoire haute, infection respiratoire basse, grippe.
- Système nerveux : céphalées.
- Troubles des organes de reproduction et des seins : règles irrégulières.
- Troubles psychiques : anxiété.
- Troubles généraux et accidents liés au site d'administration : asthénie.
- Troubles rénaux et urinaires : infection urinaire.
- Allergies : prurit, rash cutané, urticaire, angio-œdème et réaction anaphylactique, rares cas d'éruptions bulleuses.

De très rares cas d'augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines hépatiques, et d'exceptionnels cas d'hépatite potentiellement graves ont été rapportés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association à l'**acarbose** est déconseillée.

## Anorexigènes.

**Anticoagulants** : en traitement à long terme, une évaluation de l'INR doit être réalisée.

**Vitamines et bêta-carotène** : la diminution de l'absorption des vitamines **D**, **E** et du **bêta-carotène** doit être prise en compte.

**Ciclosporine** : diminution des taux plasmatiques.

## VITAMINE E

## ■ Alpha-tocophérol

<b>TOCO 500</b>					
1 caps/j au petit-déjeuner	30 caps. 500 mg	3,59		65 %	0,12
<b>TOCOLION</b>					
1 caps/j au petit-déjeuner	30 caps. 500 mg	4,18		65 %	0,14
<b>TOCOPA</b>					
1 gél/j au petit-déjeuner	30 gél. 500 mg	3,59	I	65 %	0,12

**PROPRIÉTÉS**

L'**alpha-tocophérol** est une vitamine liposoluble comme les vitamines A, D et K. Son absorption *per os* est de 50 %.

Un syndrome de malabsorption peut causer une carence vitaminique.

**INDICATIONS**

Traitement des carences en vitamine E.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Il a été suggéré que la **vitamine E** pourrait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique et le risque de cancer de la prostate.

## ACHALASIE DU SPHINCTER INFÉRIEUR DE L'ŒSOPHAGE (MÉGACŒSOPHAGE IDIOPATHIQUE)

L'**achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage (SIO)**, anciennement appelée mégacœsophage idiopathique, peut être considérée schématiquement comme l'opposé du reflux gastro-œsophagien. Il s'agit d'une absence de péristaltisme du corps de l'œsophage. Cet apéristaltisme est associé à une hypertonie de base du SIO et à une absence de relaxation ou une relaxation incomplète du SIO à la déglutition.

### Traitement médical

Il n'est efficace qu'au début de la maladie et devient rapidement insuffisant. On utilise des médicaments qui réduisent le tonus du SIO :

- **dérivés nitrés**, isosorbide dinitrate (**RISORDAN 5 mg** ou spray) : 1 à 2 cp. ou bouffées sublinguales avant chaque repas ;
- **inhibiteurs calciques**, nifédipine (**ADALATE**, 10 mg) : 1 à 2 caps. avant chaque repas.

### Traitement endoscopique

#### Dilatation pneumatique au ballonnet

Cette méthode donne 75 % de bons résultats à long terme. Le risque est la perforation (3 à 5 %).

#### Infiltration du SIO par de la toxine botulique

Certaines équipes évaluent l'efficacité de l'infiltration du SIO avec de la toxine botu-

lique au cours d'une endoscopie. Les résultats à court terme sont favorables mais sont encore inconnus à long terme.

#### Myotomie endoscopique (POEM : *PerOral Endoscopic Myotomy*)

Cette nouvelle méthode consiste à sectionner la circulaire interne au-dessus (7 cm) et en-dessous (2 cm) de la jonction œso-gastrique, après dissection endoscopique de la muqueuse. Les études sont encore peu nombreuses mais la morbidité serait faible et l'efficacité importante.

### Traitement chirurgical

C'est l'intervention de **Heller**. On pratique une **œso-cardio-myotomie extra-muqueuse** sur les 8 derniers centimètres de l'œsophage. Cette intervention peut être réalisée par voie coelioscopique ; elle doit être associée à la confection d'un dispositif antireflux (fundoplicature). Elle donne 85 % de résultats favorables à long terme. Le risque est le reflux et l'œsophagite peptique (3 à 5 %).

Dans tous les cas, la surveillance doit être régulière, rythmée par la clinique. Le risque est la survenue dans 4 % des cas d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage, même après traitement.

## ANOMALIES ANATOMIQUES DE L'ŒSOPHAGE

### Diverticule de Zenker

C'est un diverticule par pulsion développé aux dépens de la paroi pharyngée postérieure ; les symptômes sont dus à la stase alimentaire dans le diverticule : dysphagie intermittente, fétidité de l'haleine, pneumopathies d'inhalation, etc.

Il faut être très prudent lors de la gastroscopie car il existe un risque de perforation du diverticule à l'introduction de l'endoscope.

Le traitement est chirurgical ou endoscopique.

– Le traitement endoscopique peut être proposé en cas de diverticule de petite taille : le geste consiste à sectionner le muscle cricopharyngien qui apparaît comme un septum entre la lumière œsophagienne et le diverticule.

– Le traitement chirurgical consiste en une diverticulotomie associée à une myotomie en dessous du diverticule (cricopharyngien) pour éviter les récidives.

### Anneau de Schatzki

C'est un diaphragme muqueux œsogastrique, circulaire, toujours associé à une hernie hiatale. Il est responsable d'une dysphagie intermittente.

Si la dysphagie est sévère, on peut proposer une rupture endoscopique de l'anneau, des dilatations endoscopiques, un traitement laser, voire, si besoin, une intervention chirurgicale (intervention antireflux associée à un effondrement au doigt de l'anneau).

### Syndrome de Mallory-Weiss

C'est une déchirure longitudinale de la jonction œsogastrique. Elle apparaît lors d'effort de vomissements et est responsable de 5 à 10 % des hématoméses. Le diagnostic est endoscopique.

Le traitement est le plus souvent symptomatique (cf. Hématémèse) : repos du tube digestif, **antiémétiques**, **antisécrétoires**.

Dans les formes avec hémorragie active, le traitement est endoscopique : sclérose, mise en place d'un clip ou ligature.

**CANCER DE L'ŒSOPHAGE (1)**

La stratégie thérapeutique doit être décidée en RCP. Les facteurs influençant le choix du traitement sont [1] :

- le niveau de la lésion (1/3 inférieur dont l'abord chirurgical est abdominal et 2/3 supérieurs dont l'abord nécessite une thoracotomie) ;

- le type histologique : 90 % de carcinomes épidermoïdes ; les adénocarcinomes sont situés sur l'extrémité inférieure et compliquent surtout un endobrachyœsophage ;

- l'extension de la tumeur ;

- le terrain.

**Traitement curatif (cancer opérable)****Cancers superficiels (*in situ*)**

Traitement endoscopique par mucosectomie, si la lésion a un diamètre < 2 cm (après coloration vitale), n'est pas ulcérée, et si son caractère superficiel peut être affirmé par une échoendoscopie utilisant une sonde de haute fréquence. Lorsque la pièce de mucosectomie montre que la lésion est invasive, le risque d'extension ganglionnaire nécessite une oesophagectomie chez les patients opérables et une radio-chimiothérapie chez les patients inopérables.

Si la mucosectomie est impossible : radio-chimiothérapie ou destruction tumorale par photothérapie ou laser).

## CANCER DE L'ŒSOPHAGE (2)

### Cancers invasifs opérables (non *in situ*)

Il est chirurgical. C'est le traitement à proposer en première intention en l'absence de métastase à distance si le terrain le permet.

Les critères d'inopérabilité sont les suivants :

- contre-indications relatives :
  - âge  $\geq 75$  ans,
  - OMS = 2,
  - perte de poids  $> 15\%$  du poids de base,
  - artériopathie sévère,
  - cirrhose non décompensée.
- contre-indications absolues :
  - insuffisance respiratoire ( $\text{PaO}_2 = 60 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ ,  $\text{VEMS} = 1\,000 \text{ mL/s}$ ),
  - cirrhose décompensée (ascite, ictère, présence de varices œsophagiennes),
  - insuffisance rénale (créatininémie  $> 1,25 \times \text{N}$ ),
  - infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois ou cardiopathie évolutive.

Il faut toutefois noter que statistiquement, en traitement curatif, la chirurgie n'est pas supérieure à l'association radio-chimiothérapie pour l'amélioration de la survie.

#### ► Préparation du malade

##### Bilan préanesthésique :

- état nutritionnel (pourcentage d'amaigrissement, protidémie, albuminémie) : renutrition si possible orale, sinon entérale ou parentérale en milieu spécialisé ;
- examen respiratoire (EFR, gazométrie) ;
- examen cardiovasculaire (palpation des pouls et recherche de souffles, ECG) ;
- créatininémie et calcul de la clairance ;
- recherche de signes de cirrhose et bilan biologique hépatique ;
- recherche de signes de neuropathie ;
- état général (classification OMS).
- Consultation d'aide au sevrage tabagique et alcoolique en préopératoire pour arrêt de l'alcool et du tabac.
- Éradication des foyers infectieux ORL et stomatologiques.
- Antibiothérapie périopératoire.

### Chimiothérapie néoadjuvante et radiothérapie

L'utilité de la radio-chimiothérapie néoadjuvante est de plus en plus établie : elle associe le 5-FU et le cisplatine.

Une radiothérapie externe sur la lésion est parfois associée à la chimiothérapie, en particulier en cas de localisation haute.

#### Intervention chirurgicale

Elle a pour but d'enlever la lésion néoplasique en passant à distance (5 cm).

- Voie d'abord abdominale (et thoracique si lésion des 2/3 supérieurs).
- **Œsophagectomie totale** ou subtotale, débordant sur l'estomac si lésion inférieure.
- Cellulectomie péritumorale et curage lymphatique médiastinal et abdominal. Au moins 23 ganglions (abdomen et thorax) doivent être examinés.
- Anastomose œsogastrique la plus haute possible en tubulisant la grande courbure gastrique (continuité rétablie avec le côlon si antécédent de gastrectomie).
- Fermeture plan par plan et examen de la pièce opératoire.

**Complications** : fistule anastomotique avec médiastinite, insuffisance respiratoire après thoracotomie, complications liées au terrain.

**Mortalité** : 15 à 30 %. **Séquelles** : reflux gastro-œsophagien, sténose de l'anastomose.

#### Radiothérapie

Associée à la chimiothérapie préopératoire (cf. *supra*).

- Secondaire à la chirurgie si des adénopathies sont envahies.
- Exclusive mais ses résultats sont modestes

### Cancers non opérables, non résécables mais non métastatiques

Ils sont traités par radio-chimiothérapie concomitante.

La chimiothérapie repose sur le protocole FOLFOX4 (oxaliplatine, 5-fluorouracile et acide folinique).

**CANCER DE L'ŒSOPHAGE (3)****Traitement palliatif (cancer inopérable)****Traitement de la dysphagie**

Il existe plusieurs possibilités :

- association radio-chimiothérapie palliative ;
- dilatation endoscopique de l'œsophage souvent suivie de la mise en place d'une endoprothèse ;
- photocoagulation de la tumeur par laser ;
- gastrostomie d'alimentation mise en place par voie endoscopique ou chirurgicale ;
- en dernier recours, une sonde nasogastrique à demeure.

**Mesures aspécifiques**

- Arrêt de l'alcool et du tabac.
- Éradication des foyers infectieux.
- Alimentation hypercalorique avec supplémentation vitaminique.
- Traitement des douleurs : recours aux **morphiniques** si besoin, radiothérapie antalgique.
- Soutien psychologique.

**Chimiothérapie palliative**

Elle est recommandée chez les patients en bon état général.

On utilise le schéma **FOLFOX4** (oxaliplatine, 5-fluorouracile, et acide folinique).

**Surveillance****Après traitement curatif**

- Examen clinique tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans.
- Examens paracliniques : en fonction des symptômes (transit œsophagien, gastroscopie, radiographie thoracique, échographie et/ou scanner abdominal). Pour le diagnostic précoce de nouvelles localisations ORL ou bronchiques : examen ORL annuel, à la recherche d'un cancer métachrone, en cas de cancer épidermoïde. Fibroscopie bronchique non systématique.
- Surveillance du maintien du sevrage d'alcool et de tabac.

**Après traitement palliatif**

Examen clinique et examens complémentaires orientés par les symptômes.

**Cancer superficiel**

Il s'agit des cancers n'envahissant pas la muscularis mucosae. Une mucosectomie endoscopique peut être proposée. La photothérapie dynamique est en cours d'évaluation.

**CONSENSUS**

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive – Cancer de l'œsophage, FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFCD, SFRO et SNFGE, 2013

## ŒSOPHAGITE CAUSTIQUE

### Circonstances de survenue

Elles sont de deux types :

- accidentelles : lésions peu sévères, essentiellement buccales car le produit est recraché ;
- volontaires (tentative de suicide) : lésions graves.

### Produits en cause

Les acides provoquent des lésions étendues en surface mais peu profondes ; ils lèsent surtout l'estomac (*Harpic*).

Les bases provoquent des lésions profondes mais peu étendues en surface ; elles lèsent surtout l'œsophage car elles sont tamponnées par l'estomac (*Destop*, ammoniac).

Les oxydants dont seule la forme concentrée est toxique (eau de Javel).

### Traitement

Le patient doit être rapidement transporté en milieu hospitalier spécialisé pour pratiquer le bilan lésionnel et la prise en charge.

#### En cas de lésions superficielles

Une surveillance de quelques jours en milieu hospitalier est souvent suffisante. La réalimentation orale peut être rapidement reprise. Le risque de sténose secondaire après quelques semaines impose la pratique régulière d'une endoscopie.

#### En cas de lésions profondes

En cas de perforation, l'intervention chirurgicale est indispensable : la suture est impossible et on est donc conduit à pratiquer une œsogastrectomie en urgence.

Une alimentation parentérale exclusive est débutée.

Une antibiothérapie à large spectre est débutée : ex. **amoxicilline** + **acide clavulanique (AUGMENTIN)** IV : 1 g x 3/j ou en cas d'allergie : **ofloxacine (OFLOXET)** IV : 200 mg x 2/j.

Des complications peuvent survenir pendant cette phase : hémorragies, perforation tardive, surinfection.

Après 3 sem., un bilan endoscopique doit être pratiqué :

- si les lésions sont cicatrisées, on reprend l'alimentation orale ;
- si les lésions sont toujours évolutives, on poursuit la mise au repos du tube digestif et on refait un bilan après 3 mois de traitement.

Les séquelles et leur traitement :

- **sténose œsophagienne** : abstention, dilatation endoscopique, œsophagoplastie ;
- **sténose antrale** : gastrectomie ;
- **troubles digestifs** ;
- dégénérescence néoplasique.

### Classification endoscopique des lésions caustiques de l'œsophage

Stade	Lésions muqueuses
I	Érythème ou pétéchies
IIa	Ulcérations linéaires ou rondes
IIb	Ulcérations circulaires ou circonférentielles
IIIa	Nécrose localisée
IIIb	Nécrose étendue
IV	Perforation

### Gestes à faire et à ne pas faire devant une œsophagite caustique

Certains gestes doivent impérativement être évités :

- faire boire,
- faire vomir,
- faire absorber un antidote,
- tenter de neutraliser un acide par une base ou inversement,
- mettre une sonde nasogastrique avant le bilan endoscopique.

Les gestes à faire sont :

- mettre en place une voie veineuse périphérique,
- prélever un bilan préopératoire,
- faire des soins buccaux avec des compresses sèches.

Dans tous les cas, un bilan endoscopique s'impose, après avoir éliminé une perforation (radiographie).



## REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (1)

## Indications des explorations du RGO de l'adulte

CLASSIFICATION	SYMPTÔMES	EXPLORATIONS
Symptômes typiques	Pyrosis Régurgitations acides	Non indiquées
Symptômes typiques + symptômes d'alarme ou autres éléments décisionnels	Amaigrissement Dysphagie Hémorragie Anémie Âge > 50 ans Résistance au traitement Récidive précoce à l'arrêt du traitement	Endoscopie œsogastro- duodénale
Symptômes atypiques	Douleurs épigastriques Toux nocturne Asthme Douleurs pseudo - angineuses Enrouement Brûlures pharyngées Otalgies	Endoscopie œsogastro- duodénale pH-métrie œsophagienne si absence d'œsophagite

Ainsi, il n'y a pas lieu de pratiquer une endoscopie chez le sujet jeune pour un reflux gastro-œsophagien à symptomatologie typique, modérée, non compliquée sauf en cas d'échec du traitement symptomatique et de récurrences fréquentes.

**Règles hygiéno-diététiques****Repas**

Ils doivent être pris : au calme, à heures fixes, en mâchant bien.

Il faut éviter les aliments qui diminuent la pression du sphincter inférieur de l'œsophage : repas gras, épices, café, thé, chocolat, boissons gazeuses, menthe, **alcool et tabac**.

**Mesures posturales**

Elles ont pour but de diminuer la pression intra-abdominale :

- pas de décubitus post-prandial ;
- surélévation nocturne de la tête du lit de 15° environ (cette mesure est la seule qui ait véritablement démontré son efficacité) ;
- pas d'antéflexion brutale et prolongée ;
- éviter gaines, corsets, lombostats, ceintures, vêtements serrés, chaussures à lacets.

**Médicaments à éviter**

- Les médicaments diminuant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage : **inhibiteurs calciques, dérivés nitrés** (souvent au cours de l'angine de poitrine), **théophylline,  $\beta$ -stimulants** (souvent au cours de l'asthme), **anticholinergiques, benzodiazépines, barbituriques, morphiniques, estroprogestatifs, progestérone**.
- Les médicaments pouvant léser la muqueuse digestive : **AINS, aspirine**.

## ANTIREFLUX (1) – ANTIÉMÉTIQUES

### ■ Dompéridone

MOTILIUM						
Reflux gastro-œsophagien et œsophagite, nausées, vomissements : 1 à 2 cp. (ou c-mes.) x 3/j	40 cp. 10 mg 80 c-mes. (2,5 mL = 2,5 mg) susp. buv. 200 mL	3,65 2,97	II II	30 % 30 %	0,09 0,04	
PÉRIDYS						
Idem MOTILIUM	40 cp. 10 mg 40 c-mes. à 5 mg (ou 160 c-mes. à 1,25 mg) (fl. 200 mL)	3,65 2,97	II II	30 % 30 %	0,09 0,07	
OROPÉRIDYS						
Idem MOTILIUM	30 cp. orodisp. 10 mg	3,19	II	30 %	0,11	
BIPÉRIDYS						
Mêmes indications que MOTILIUM 1 cp. x 3/j Dose maximale : 80 mg/j	20 cp. 20 mg 40 cp. 20 mg	3,67 5,84	II II	30 % 30 %	0,18 0,15	
BIPÉRIDYSFLASH						
Idem MOTILIUM	30 cp. orodisp. 20 mg	3,92	II	30 %	0,13	

### PROPRIÉTÉS

Antiémétique neuroleptique sans effet anticholinergique passant très faiblement la barrière hémato-encéphalique. Il augmente la vitesse de vidange de l'estomac et s'oppose au reflux duodéno-œsophagien. Il renforce le péristaltisme du tube digestif supérieur :

- augmentation du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage ;
- inhibition de la relaxation du fundus gastrique et stimulation de l'activité motrice ;
- élargissement du pylore au moment de son ouverture ;
- augmentation de la fréquence, de l'amplitude et de la durée des contractions duodénales.

La **dompéridone** normalise les contractions anarchiques de la maladie des spasmes étagés de l'œsophage. Elle ne modifie pas les fonctions sécrétoires.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser si la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : hémor-

ragie gastro-intestinale, obstruction mécanique, perforation digestive. Dyskinésies tardives iatrogènes (neuroleptiques).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : diminuer les doses de 30 à 50 % en cas d'utilisation prolongée.

**Grossesse** : aucune malformation rapportée.

**Allaitement** : passage dans le lait.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Syndrome extrapyramidal exceptionnel (1,4 cas par million) presque toujours en rapport avec un surdosage ou une perméabilité anormale de la barrière hémato-encéphalique (immaturité, lésion).

Rarement, à posologie élevée et prolongée : gynécomastie, troubles des règles.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association d'**anticholinergiques** est illogique car ils ont des effets opposés à la **dompéridone**.

Cf. aussi **métoclopramide**.

## REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (2)

### Traitement médicamenteux [1]

#### Reflux gastro-œsophagien typique, sans œsophagite

S'il n'existe pas de signes d'alarme (amaigrissement, dysphagie, hémorragie, anémie) et si l'âge du sujet est < 50 ans, on peut pratiquer un traitement d'épreuve sans fibroscopie.

► Si les symptômes sont espacés (moins d'une fois par sem.), on propose la démarche suivante.

- Traitement à la demande par alginates  
Ex. : **alginate de sodium + bicarbonate de sodium (GAVISCON)** : 1 càc 30 min après chaque repas et au coucher.

- Renforcement de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage

Il est souvent utilisé mais n'a jamais prouvé son efficacité.

Ex. : **dompéridone (MOTILIUM)** : 1 cp. 15 min avant chaque repas et au coucher.

Durée du traitement : 6 sem.

► Si les symptômes sont rapprochés (une fois par sem. ou plus), on peut proposer un traitement antisécrétoire à faible dose.

- **Inhibiteur de la pompe à protons** : **MOPRAL (oméprazole)**, 1 gél. à 10 mg/j ou **LANZOR (lanzoprazole)**, 1 gél. à 15 mg/j.

La durée du traitement est de 4 sem. Au terme de ces 4 sem., si les symptômes disparaissent, il faut arrêter le traitement ; s'ils persistent ou récidivent de façon précoce, on doit pratiquer une endoscopie.

#### Reflux gastro-œsophagien avec signes d'alarme et/ou âge du sujet > 50 ans et/ou résistance au traitement symptomatique

L'endoscopie est indispensable pour fixer l'attitude thérapeutique ultérieure, qui est fonction de l'existence d'une œsophagite peptique et/ou d'une complication.

S'il n'y a pas d'œsophagite ou si l'œsophagite n'est pas sévère (perte de substance non circonscrite), on propose un traitement antisécrétoire, de préférence par **IPP** à pleine dose (par exemple **MOPRAL (oméprazole)** 20 mg : 1 cp./j) pendant 4 sem. En fin de traitement, un contrôle endoscopique de cicatrisation n'est pas utile sauf en cas de persistance des symptômes.

S'il existe une œsophagite, cf. *Œsophagite par reflux*.

### Récidive

La récurrence est fréquente (> 75 %) à l'arrêt du traitement. On peut proposer un traitement d'entretien par un gel antireflux et/ou un stimulant de la motricité digestive. En cas d'échec, les **inhibiteurs de la pompe à protons** à faible dose peuvent être efficaces : **MOPRAL (oméprazole)**, 1 gél. à 10 mg/j, ou **LANZOR (lanzoprazole)**, 1 gél. à 15 mg/j.

### Complications

#### œsophagite peptique et ses complications

- Dysphagie.
- Hémorragies : anémie ferriprive, hémartémèse, méléna.
- Amaigrissement.
- Métaplasie (endobrachyœsophage), dysplasie, cancérisation.
- Ulcère, perforation, sténose.

#### Complications respiratoires

- Asthme.
- Toux quinteuse nocturne.
- Infections broncho-pulmonaires à répétition.

#### Complications ORL

- Pharyngite, paresthésies laryngées, dysphonie.
- Otalgies.

**ANTIREFLUX (2) – GELS ANTIREFLUX****■ Alginate de sodium + bicarbonate de sodium**

<b>GAVISCON</b>					
1 à 2 sach. x 3/j après les repas et éventuellement au coucher	24 sach. à 500 mg	3,16		15 %	0,13
2 à 3 càc. x 3/j après les repas et éventuellement au coucher	50 càc (250 mg/càc ; fl. 250 mL)	2,47		15 %	0,05
<b>TOPAAL</b>					
(acide alginique)	42 cp. à 200 mg	3,49		15 %	0,08
Idem <b>GAVISCON</b>	14 càs (susp. buv. ; fl. 210 mL)	3,37		15 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Formation d'un gel visqueux surnageant au-dessus du contenu gastrique. En cas de reflux, le gel régurgite en premier et forme une barrière évitant le contact entre la muqueuse œsophagienne et le liquide gastrique acide.

**INDICATIONS**

Pyrosis, reflux gastro-œsophagien, œsophagite par reflux.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnels et liés à la présence d'aluminium : constipation, déplétion phosphorée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Rares et liées à la présence d'aluminium : retard et/ou diminution de l'absorption des médicaments suivants : **furosémide, indométacine, tétracyclines, digoxine, isoniazide, anticholinergiques.**

**REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (3) –  
ŒSOPHAGITE PAR REFLUX (1)****Classification de Savary-Miller**

Stade 1. Lésions érythémateuses ou érosives superficielles non confluentes.

Stade 2. Lésions érosives et exsudatives sans atteinte circonférentielle.

Stade 3. Lésions érosives et exsudatives d'extension circulaire sans sténose.

Stade 4. Lésions chroniques : ulcère, sténose fibreuse, endobrachyœsophage.

**Traitement d'attaque [1]****RGO typique avec pyrosis et/ou régurgitations acides**

- Si symptômes espacés ( $< 1/\text{sem.}$ ) : traitement à la demande par alginates (**GAVISCON**) : 1 càs après chaque repas ou **anti- $\text{H}_2$**  faiblement dosé.
- Si symptômes rapprochés ( $> 1/\text{sem.}$ ) : **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole (MOPRAL)** à demi-dose : 10 mg/j pendant 4 sem.

**Présence de signe d'alarme et/ou âge  $> 50$  ans et/ou résistance au traitement**

- Réalisation d'une gastroscopie.
- Si absence d'œsophagite ou œsophagite peu sévère :
  - **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole (MOPRAL)** à pleine dose : 20 mg/j pendant 4 sem. ;
  - pas de contrôle endoscopique de la cicatrisation [1].
- Si œsophagite sévère :
  - **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole (MOPRAL)** à pleine dose : 20 mg/j pendant 8 sem. ;
  - contrôle endoscopique de la cicatrisation [1].
  - en fonction des lésions, augmentation éventuelle de la dose.

**RGO atypique**

Traitement à discuter en fonction des lésions endoscopiques.

## REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (4) – ŒSOPHAGITE PAR REFLUX (2)

### Traitement chirurgical

Il doit être proposé aux sujets avec un risque opératoire faible, ayant un RGO typique, invalidant et qui ne peuvent être sevrés d'un traitement d'entretien. Dans les formes rebelles au traitement médical, l'indication du traitement chirurgical ne doit être posée que dans les cas de RGO dûment prouvés. Le choix éclairé du patient et le terrain sont les éléments qui doivent intervenir dans la décision.

• **Les principes de l'intervention sont :**

- le remplacement du cardia dans l'abdomen ;
- la confection d'une valve antireflux ;
- la fixation du montage dans l'abdomen ;
- le rapprochement des piliers du diaphragme ;
- la réfection de l'angle de His.

Cette intervention peut se pratiquer par voie coelioscopique.

• **Les deux techniques opératoires les plus fréquemment utilisées sont :**

- la fundoplicature complète ou intervention de Nissen. Elle consiste à pratiquer un

manchonage sur 360° de l'œsophage abdominal avec la grosse tubérosité gastrique. C'est l'intervention la plus efficace. Elle expose à certaines complications : dysphagie, difficulté ou impossibilité d'éruption (gas bloat syndrome) ;

– l'hémifundoplicature ou intervention de Toupet : c'est un manchonnage postérieur incomplet de l'œsophage réalisé sur 180 ou 270°.

Le traitement est efficace dans 90 % des cas pour l'intervention de Nissen, un peu moins pour l'intervention de Toupet et se dégrade un peu avec le temps.

### Traitement endoscopique

Ces traitements sont en cours d'évaluation. Sans être exhaustif, plusieurs approches sont testées :

- une injection de produit sclérosant au niveau de la musculuse au niveau du SIO ;
- une cardioplicature endoscopique à l'aide d'un système de suture placé à l'extrémité de l'endoscope ;
- une hyperthermie par radiofréquence au niveau du SIO.

### CONSENSUS

[1] Reflux gastro-œsophagien de l'adulte : « diagnostic et traitement », SNFGE, 1999

**ENDOBRACHYŒSOPHAGE - ŒSOPHAGE DE BARRETT (1)****Définition, physiopathologie et diagnostic**

L'endobrachyœsophage (EBO) ou œsophage de Barrett est une **métaplasie glandulaire** : la muqueuse malpighienne de l'œsophage est remplacée par une muqueuse de type glandulaire. Par définition, il s'agit d'une muqueuse spécialisée en métaplasie intestinale. Cette métaplasie est favorisée par le reflux gastro-œsophagie, le tabac et le surpoids. Le risque est l'apparition d'une dysplasie, d'abord de bas grade, puis de haut grade, qui elle-même peut se transformer en adénocarcinome.

**Fréquence de l'endobrachyœsophage** : 10 % des patients ayant un reflux gastro-œsophagien.

**Risque de cancer** sur endobrachyœsophage : 1 % par an (risque x 30 à 125 par rapport à la population générale). Il s'agit d'un **adénocarcinome**.

**Traitement préventif**

C'est le traitement au long cours du reflux gastro-œsophagien.

**Surveillance [1]**

Elle a pour but de diagnostiquer précocement une dysplasie de haut grade, voire un cancer de l'œsophage. Le rythme dépend du degré de dysplasie.

**Traitement curatif**

Aucun traitement médical ne permet de faire régresser les lésions d'endobrachyœsophage une fois qu'elles sont installées.

Le but du traitement est donc de prévenir l'apparition d'un adénocarcinome.

Le traitement est double :

- celui du reflux gastro-œsophagien : **inhibiteurs de la pompe à protons** au long cours, par ex. **oméprazole** 20 à 40 mg/j ;
- celui de la dysplasie (la métaplasie doit être surveillée mais pas traitée).

Le traitement de référence est l'**œsophagectomie**. Néanmoins, du fait de sa morbidité, des alternatives endoscopiques se sont développées : mucosectomie, radiofréquence, photothérapie dynamique. Chez les sujets âgés avec un risque opératoire, on peut proposer une surveillance endoscopique trimestrielle ou bien une mucosectomie endoscopique.

Le traitement doit donc être discuté au cas par cas.

**CONSENSUS**

[1] Diagnostic et surveillance de l'endobrachyoesophage, *SFED*, 2007

## ENDOBRACHYŒSOPHAGE - ŒSOPHAGE DE BARRETT (2)

EBO non dysplasique

- EBO court < 3 cm : endoscopie + biopsies tous les 5 ans
- EBO long 3-6 cm : endoscopie + biopsies tous les 3 ans
- EBO long > 6 cm : endoscopie + biopsies tous les 2 ans

Dysplasie de bas grade douteuse ou probable

IPP double dose pendant 2 à 3 mois avant nouvelle endoscopie + biopsies

Dysplasie de bas grade certaine

Endoscopie + biopsies tous les 6 mois (double lecture anatomopathologique) la 1<sup>re</sup> année puis tous les ans

Dysplasie de haut grade

IPP double dose pendant 1 à 2 mois avant nouvelle endoscopie + protocole planimétrique

Dysplasie de haut grade confirmée (double lecture anatomopathologique)

- Bilan préthérapeutique sous anesthésie (endoscopie grossissante + ac. acétique ou bleu de méthylène et/ou NBI ou FICE)
- Protocole planimétrique + biopsies ciblées
- Échoendoscopie si adénocarcinome associé

NBI : *Narrow Band Imaging* ; FICE : *Flexible spectral Imaging Color Enhancement*



## ULCÈRE GASTRIQUE

Le traitement est le même que celui de l'ulcère duodénal. Les seules différences sont les suivantes :

- *Helicobacter pylori* est moins souvent en cause dans l'ulcère gastrique (70 % des cas) que dans l'ulcère duodénal (95 %). *Helicobacter pylori* doit néanmoins être recherché et éradiqué si la recherche est positive ;

- le traitement antisécrétoire doit durer 6 sem. et non pas quatre ;

- un contrôle endoscopique avec biopsies doit systématiquement être pratiqué au décours du traitement d'un ulcère gastrique afin d'éliminer un cancer de l'estomac.

## CANCER DE L'ESTOMAC (1)

La stratégie thérapeutique doit être décidée en RCP [1].

Si le terrain le permet et en l'absence de métastases viscérales, le traitement chirurgical, c'est-à-dire curatif, doit être proposé en première intention.

### Bilan préthérapeutique

#### Extension tumorale

- Endoscopie œso-gastrooduodénale.
- TDM thoraco-abdomino-pelvienne.
- Échoendoscopie (infiltration pariétale de la tumeur).
- PET-scan à discuter au cas par cas.

#### Opérabilité

État général (échelle OMS ou Karnofsky), bilan nutritionnel (amaigrissement, protéinémie, albuminémie), pulmonaire (EFR), fonction rénale.

#### Traitement curatif

Il est chirurgical. L'intervention doit être très soignée pour ne laisser en place aucun résidu microscopique. La résection doit donc emporter à la fois l'estomac et les chaînes ganglionnaires de drainage.

#### Préparation du malade

- Arrêt de l'alcool et du tabac.
- Éradication des foyers infectieux ORL et stomatologiques.
- Bilan d'opérabilité cardiorespiratoire ; kinésithérapie respiratoire.
- Antibiothérapie périopératoire.
- Renutrition hyperprotidique systématique : **Oral Impact** 3 briquettes/j à débiter 1 semaine avant la chirurgie.

#### Intervention chirurgicale

##### ► Gastrectomie

L'étendue de la résection dépend du siège de la tumeur :

– les **cancers du corps de l'estomac (tiers proximal et moyen)** sont traités par gastrectomie totale ou des 4/5 emportant 2 cm de duodénum en aval du pylore. Le rétablissement de la continuité se fait par anastomose sur anse en Y : la 2<sup>e</sup> anse jéjunale est ascensionnée et remontée jusqu'à l'extrémité inférieure de l'œsophage à laquelle elle est anastomosée. En fonction

de l'extension, on peut étendre l'intervention à des organes de voisinage : splénectomie, pancréatectomie caudale, colectomie segmentaire ;

– les **cancers de l'antré (tiers distal)** ne nécessitent pas une gastrectomie totale mais une gastrectomie distale passant à distance du pôle supérieur de la tumeur (4 à 8 cm). L'anastomose est gastrojéjunale, utilisant la première anse jéjunale placée en pré- ou en transmésocolique (anastomose type Finsterer ou Billroth II) ;

– les structures de voisinage envahies doivent être réséquées en monobloc, c'est-à-dire sans dissection ni rupture de la pièce (les biopsies sont prohibées).

##### ► Curage ganglionnaire

Chez les sujets jeunes et/ou sans défaillance viscérale, le premier relais juxta-gastrique et coronaire, coélique, hépatique commun, pédicule hépatique, tronc de l'artère splénique doit être réséqué. Au moins 15 ganglions doivent être analysés. La splénectomie est indiquée en cas d'adénopathies de l'artère splénique ou de cancer de la grosse tubérosité atteignant la séreuse.

En cas de carcinose péritonéale résécable chez un patient en bon état général, on propose une péritonectomie avec chimio-hyperthermique intrapéritonéale (CHIP).

#### Chimiothérapie

La chimiothérapie périopératoire des formes résécables est systématique ; elle associe **épirubicine, cisplatine et 5-FU** :

– elle est probablement utile en **néoadjuvant** pour augmenter les possibilités de résection ;

– la chimiothérapie **adjuvante** en cas de risque métastatique important peut être proposée.

#### Radiothérapie

Son efficacité n'a pas été observée dans le traitement curatif.

#### Traitement endoscopique

La mucosectomie endoscopique est possible pour les cancers superficiels respectant la sous muqueuse. Après mucosectomie, l'éradication d'*Helicobacter pylori* diminue significativement le risque de récurrence.

## CANCER DE L'ESTOMAC (2)

### Traitement palliatif

#### Traitement de l'obstruction gastrique (syndrome orificiel)

On réalise un court-circuit alimentaire en pratiquant une gastrectomie partielle ou une gastrojéjunostomie.

La jéjunostomie d'alimentation ne doit être utilisée qu'en dernier recours.

#### Mesures aspécifiques.

- Arrêt de l'alcool et du tabac.
- Éradication des foyers infectieux.
- Alimentation hypercalorique avec supplémentation vitaminique.
- Traitement des douleurs : recours aux **morphiniques** si besoin, radiothérapie antalgique.
- Soutien psychologique.

### Chimiothérapie palliative

Plusieurs protocoles peuvent être proposés associant : **5FU-cisplatine-trastuzumab** ou **capécitabine-cisplatine-trastuzumab**. Le **trastuzumab** ne peut être utilisé que chez les patients ayant une surexpression tumorale de HER2. Le protocole FOLFOX associant **5FU**, **oxaliplatine** et **acide folinique** est également parfois utilisé.

### Facteurs de mauvais pronostic

Extension tumorale importante (en surface, en profondeur et à distance). Faible degré de différenciation. Aneuploïdie (cytométrie en flux). Survie globale à 5 ans : 10 %. Mortalité opératoire : 10 %.

### Schéma thérapeutique du cancer de l'estomac

Tumeur non métastasée	Tumeur métastasée (ganglions à distance inclus)	Contre-indication opératoire (terrain)
Gastrectomie + curage ± splénectomie	Gastrectomie si syndrome orificiel, sans curage ± chimiothérapie	Chimiothérapie

### Complications de la gastrectomie

#### Complications fonctionnelles

#### Complications fonctionnelles d'une résection gastrique

	SYNDROME DU PETIT ESTOMAC	DUMPING SYNDROME	HYPOGLYCÉMIE POST-PRANDIALE	SYNDROME DE L'ANSE AFFÉRENTE
Mécanisme	Exérèse gastrique large	Passage brutal dans le grêle d'aliments hyperosmolaires provoquant une hypersecrétion de sérotonine et des kinines circulantes	Hyperinsulinisme par arrivée massive d'aliments hyperosmolaires dans le grêle	Stase alimentaire et biliaire dans l'anse afférente entraînant une pullulation microbienne
Clinique	Satiété précoce, ballonnement amaigrissement	Signes précoces : asthénie, troubles vasomoteurs, sueurs, pâleur, tachycardie, flush	Signes tardifs cliniques semblables au dumping syndrome	Douleur de l'hypochondre droit calmée par des vomissements
Traitement	Fractionnement des repas	Fractionnement des repas Décubitus post-prandial Régime riche en protides et en fibres, pauvre en sucres rapides	Cf. Dumping syndrome	Régulateurs de la motricité ( <b>MOTILIUM</b> , <b>PRIMPÉРАН</b> ) Antibiothérapie ( <b>FLAGYL</b> )

## CANCER DE L'ESTOMAC (3)


### Complications mécaniques

- Ulcère anastomotique, duodénite, stomite.
- Invagination jéjunogastrique.
- Gastrite biliaire elle-même pouvant se compliquer d'un cancer gastrique.
- Bézard.
- Occlusion sur bride.
- Récidive néoplasique.

- Cancer sur moignon.

### Complications carentielles

- Carence martiale par saignement occulte.
- Carence en **vitamine B12** par malabsorption (carence en facteur intrinsèque), à prévenir par **VITAMINE B12**: 1000 µg en IM tous les 3 à 12 mois. [1]



### Indications de l'éradication d'*Helicobacter pylori*

*Helicobacter pylori* favorise la survenue de certains cancers gastriques (adénocarcinome). Par conséquent, il est recom-

mandé de rechercher et d'éradiquer cette bactérie en cas :

- d'antécédent de résection gastrique pour cancer ;
- d'antécédent familial au 1<sup>er</sup> degré de cancer gastrique.

### CONSENSUS

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFC, SFRO, SNFGE) – Cancer de l'estomac, SNFGE, 2011

## ULCÈRE DUODÉNAL (1)

La prise en charge de l'ulcère hémorragique est traitée dans le chapitre Hémorragie digestive.

### Diagnostic de l'infection à *Helicobacter pylori*

#### Caractéristiques

Bacille Gram négatif, spiralé, uréase positif (transforme l'urée en ammoniac).

*Helicobacter pylori* est retrouvé électivement dans l'estomac, principalement dans l'antré.

Il est à l'origine de plusieurs pathologies gastroduodénales, la principale étant l'ulcère duodéal.

#### Pathologies favorisées par *Helicobacter pylori*

- Ulcère duodéal (95 % des cas).
- Ulcère gastrique (70 % des cas).
- Gastrite chronique.
- Adénocarcinome gastrique.
- Lymphome gastrique de faible malignité (type MALT).
- Dyspepsie non ulcéreuse.

#### Méthodes diagnostiques

##### ► Diagnostic direct

- Analyse histologique d'une biopsie gastrique.
- Mise en culture d'une biopsie antrale.
- Recherche d'antigènes dans les selles.
- Recherche par biologie moléculaire : PCR (Polymerase Chain Reaction) dans une biopsie ; cette technique reste du domaine de la recherche.

##### ► Diagnostic indirect

- *Breath-test* ou test respiratoire à l'urée : le patient absorbe de l'urée marquée au carbone 13 (qui n'est pas radioactif) ; si *Helicobacter pylori* est présent dans l'estomac, le patient va expirer de l'air enrichi en  $^{13}\text{CO}_2$  dont la quantité est mesurée. Il existe des kits qui permettent de pratiquer en ville cette technique (HELI-KIT). Ce test est le plus simple et le plus performant.

- Test à l'urée ou Clo-test : un prélèvement antral est pratiqué au cours d'une fibroscopie ; la biopsie est mise dans un réactif qui change de couleur en moins de 3 h si *Helicobacter pylori* est présent.

- Sérologie : elle ne permet pas de faire la différence entre une infection évolutive ou ancienne.

- *Breath-test* ou test respiratoire à l'urée : le patient absorbe de l'urée marquée au carbone 13 (qui n'est pas radioactif) ; si *Helicobacter pylori* est présent dans l'estomac, le patient va expirer de l'air enrichi en  $^{13}\text{CO}_2$  dont la quantité est mesurée. Il existe des kits qui permettent de pratiquer en ville cette technique (HELI-KIT).

#### ► Quand rechercher (et éradiquer) *Helicobacter pylori* [1] ?

À chaque fois que son éradication peut être bénéfique, c'est-à-dire en cas :

- d'ulcère gastrique et duodéal ;
- de lymphome MALT ;
- d'antécédent de résection gastrique pour cancer ;
- d'antécédent familial au 1<sup>er</sup> degré de cancer gastrique ;
- de gastrite à gros plis, gastrite érosive, gastrite atrophique ;
- de traitement au long cours par **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ;
- de troubles dyspeptiques (gastroscopie non obligatoire ; une recherche par test respiratoire est suffisante).

Rq : Donc en pratique, à chaque fois qu'une gastroscopie est pratiquée !

#### ► Niveau de résistance

Le niveau de résistance d'*Helicobacter pylori* a atteint 20 % pour la **clarithromycine** et 15 % pour les **quinolones**. Ainsi, les **conférences de consensus sont devenues obsolètes**. L'association de la **clarithromycine** à de l'**amoxicilline** permet de rétablir une certaine sensibilité car l'**amoxicilline** fragilise la paroi bactérienne.

**INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (1)****■ Oméprazole**

<b>MOPRAL</b>					
œsophagite évolutive, ulcère gastroduodénal évolutif : 1 gél. (20 mg)/j	14 gél. 10 mg	7,41	II	65 %	0,53
Éradication d' <i>Helicobacter pylori</i> : 1 gél. (20 mg) x 2/j pendant 7 j, en association avec des antibiotiques	28 gél. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
Traitement symptomatique du RGO (si échec des autres traitements) : 10 mg/j	7 gél. 20 mg	4,50	II	65 %	0,64
Traitement d'entretien des œsophagites grade III et IV : 1 gél. (10 ou 20 mg)/j	14 gél. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
Traitement préventif et curatif des lésions induites par les <b>AINS</b> : 1 gél. (20 mg)/j	28 gél. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57
Syndrome de Zollinger-Ellison : jusqu'à 80 mg/j					
Voie IV si voie orale impossible : 40 à 80 mg/j en IV lente (5 min)	5 lyoph. pour usage parentéral 40 mg	HOP	II		
Hémorragie digestive : 8 mg/h pendant 72 h en IVSE					
<b>MOPRALPRO</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>ZOLTUM</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	28 gél. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
	14 gél. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57

**■ Lansoprazole**

<b>LANZOR</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	15 gél. 15 mg	7,90	II	65 %	0,53
Pleine dose : 30 mg	30 gél. 15 mg	16,67	II	65 %	0,56
Demi-dose : 15 mg	14 gél. 30 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57
<b>OGAST</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	15 gél. 15 mg	7,90	II	65 %	0,53
	30 gél. 15 mg	16,67	II	65 %	0,56
	14 gél. 30 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57
<b>OGASTORO</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. orodisp. 15 mg	5,82	II	65 %	0,42
	28 cp. orodisp. 15 mg	11,03	II	65 %	0,39
	14 cp. orodisp. 30 mg		II	NR	
	28 cp. orodisp. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57

## ULCÈRE DUODÉNAL (2)

### Traitement d'attaque

#### Règles hygiéno-diététiques

Seul l'**arrêt du tabac** a montré son utilité. On peut toutefois conseiller d'autres règles hygiéno-diététiques de base bien qu'elles n'aient jamais montré leur efficacité au cours de l'ulcère duodénal :

- repas au calme, à heures fixes, en mâchant bien ;
- arrêt de l'alcool, du café, des boissons gazeuses ;
- arrêt des **anticoagulants** (sauf indication vitale).

Éviter les médicaments gastro-toxiques (cf. Œsophagite par reflux) : **anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine**. Les **corticoïdes** ont longtemps été réputés gastro-toxiques ; en pratique, cette toxicité n'a jamais pu être démontrée ; ainsi, on ne doit plus considérer que les **corticoïdes** sont à l'origine d'ulcères gastroduodénaux ; il n'y a donc plus de contre-indication absolue à introduire des **corticoïdes** chez un patient ayant un antécédent d'ulcère.

#### Traitement médicamenteux

##### ► Éradication d'*Helicobacter pylori*

Du fait du développement de résistance, le traitement actuel repose sur une antibiothérapie séquentielle [1] :

#### Éradication d'*Helicobacter pylori* par traitement séquentiel

Traitement	J1 à J5	J6 à J10
<b>Inhibiteur de la pompe à protons</b>	Double dose	
<b>Amoxicilline</b>	1 g x 2/j	X
<b>Clarithromycine</b>	X	500 mg x 2/j
<b>Métronidazole</b>	X	500 mg x 2/j

Du fait du développement de résistances, la vérification de l'éradication par un **test respiratoire** devrait être **systématique [1]** ; les tests en vente sont : *Helikit* et *Helicobacter Test INFAI*. 15 j. d'arrêt d'un traitement antisécrétoire sont recommandés avant de pratiquer un test respiratoire.

#### Résistance d'*Helicobacter* à l'antibiothérapie (30 %)

- Le traitement de seconde intention peut reposer sur l'association **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole** (20 mg matin et soir) + **amoxicilline** (1 g matin et soir) + **métronidazole** (500 mg matin et soir).
- L'utilisation de **sels de bismuth** couplés à des antibiotiques est une nouvelle alternative : **PYLERA** (bismuth 140 mg/gél. + **métronidazole** 125 mg/gél. + **tétracycline** 125 mg/gél.), 3 gél. après chaque repas et au coucher soit 12 gél./j. On associe systématiquement de l'**oméprazole**, 20 mg matin et soir. La durée du traitement est de 10 j. En cas, d'oubli, il faut prendre la totalité du traitement.
- En cas d'échec, une mise en culture avec réalisation d'un antibiogramme ou une recherche par PCR de mutations entraînant des résistances est justifiée.
- Le traitement peut alors associer : un **inhibiteur de la pompe à protons**, de l'**amoxicilline** et une **fluoroquinolone, lévofloxacine (TAVANIC)** 500 mg x 2/j pendant 10 jours.
- La **lévofloxacine** peut être remplacée par la **rifabutine (ANSATIPINE, gél 150 mg)** : 300 mg le matin pendant 10 jours ; le risque est l'émergence de mycobactéries résistantes.

**INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (2)****■ Pantoprazole**

<b>INIPOMP</b>					
Idem <b>MOPRAL</b> Pleine dose : 40 mg Demi-dose : 20 mg	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	7 cp. 40 mg	4,50	II	65 %	0,64
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	1 fl. 40 mg (IV)	8,68	II	65 %	8,68
<b>EUPANTOL</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	7 cp. 40 mg	4,50	II	65 %	0,64
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	1 fl. 40 mg (IV)	8,68	II	NR	8,68
<b>PANTOZOL Control</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>PANTOLOC Control</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>IPRAALOX</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	

**■ Rabéprazole**

<b>PARIET</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. 10 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 10 mg	HOP	II		
	14 cp. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 20 mg	HOP	II		



## ULCÈRE DUODÉNAL (3)

### ► Traitement de l'ulcère lui-même

Après le traitement antibiotique pour éradiquer *Helicobacter pylori*, il n'est pas obligatoire de poursuivre un traitement antisécrétoire. Ce traitement reste recommandé chez les patients ayant un ulcère compliqué ou une affection sévère concomitante, chez ceux prenant un traitement par **anticoagulants**, **AINS** ou **aspirine** ou chez ceux qui conservent des douleurs à la fin de la trithérapie : **inhibiteurs de la pompe à protons**, **oméprazole (MOPRAL)** : 1 gél. (20 mg)/j (matin ou soir) pendant 3 sem.

### ► Dans les cas où *Helicobacter pylori* est absent

On traite l'ulcère par traitement antisécrétoire : **inhibiteurs de la pompe à protons**, **oméprazole (MOPRAL)** : 1 gél. (20 mg)/j (matin ou soir) pendant 4 sem.

### Indications d'un contrôle par gastroscopie en fin de traitement

- Tout ulcère gastrique.
  - Avant un traitement chirurgical.
  - En cas de nécessité de prescrire des médicaments gastrotoxiques (**aspirine**) ou des **anticoagulants**.
  - Si les symptômes persistent malgré un traitement bien conduit.
- Lorsque la gastroscopie est réalisée, on contrôle l'éradication d'*Helicobacter pylori* (biopsie).

### Indications d'un contrôle de l'éradication d'*Helicobacter pylori*

Du fait de l'augmentation de la prévalence de la résistance aux antibiotiques (30 % d'échec de l'éradication en 1<sup>re</sup> intention), le contrôle de l'éradication d'*Helicobacter pylori* doit être systématique. Elle se fait par la gastroscopie si celle-ci est réalisée. En l'absence de gastroscopie, on pratique un test respiratoire (HELI-KIT et *Helicobacter* Test INFAI).

## INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (3)

## ■ Ésoméprazole

INEXIUM					
Idem <b>MOPRAL</b>	28 sach. 10 mg	19,41	II	65 %	0,69
Pleine dose : 40 mg	7 cp. 20 mg	4,10	II	65 %	0,59
Demi-dose : 20 mg	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	25,46	II	65 %	0,91
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	25,46	II	65 %	15,93
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	10 fl. 5 mL 40 mg	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur extrêmement puissant de la sécrétion acide gastrique par inhibition de la pompe à protons H<sup>+</sup>K<sup>+</sup>ATPase de la cellule pariétale gastrique. Efficacité supérieure aux autres antiulcéreux.

## INDICATIONS

œsophagite par reflux gastro-œsophagien (prouvée par endoscopie) : traitement d'attaque ; traitement d'entretien si stade III ou IV. Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien avec ou sans œsophagite, après échec du traitement de première intention (règles hygiéno-diététiques, alginates). Ulcère gastrique et duodénal évolutif. Éradication d'*Helicobacter pylori* en association avec des antibiotiques.

Traitement préventif et curatif des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Syndrome de Zollinger-Ellison.

## CONTRE-INDICATIONS

Allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : l'utilisation de l'oméprazole au cours de la grossesse est autorisée. Toutefois la prescription de ce produit ne doit être envisagée que si nécessaire.

Ulcère gastrique : vérifier l'absence de malignité par biopsie avant de traiter.

Insuffisance hépatique : ne pas dépasser 20 mg/j d'oméprazole, 30 mg/j de lansoprazole et 40 mg/j de pantoprazole.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares (plus fréquents avec l'oméprazole) et réversibles à l'arrêt du traitement.

Digestifs : diarrhée, constipation, nausées, vomissements.

Cutanés : éruption, prurit, urticaire.

Neuropsychiques : céphalées, vertiges, confusion, agitation, hallucinations (sujets âgés).

Hématologiques : leucopénie, neutropénie, thrombopénie ; exceptionnellement anémie hémolytique et pancytopénie.

Hépatiques : élévation des transaminases.

Oculaires : quelques rares cas de cécité ont été rapportés avec l'oméprazole IV mais l'imputabilité du produit reste douteuse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ces produits sont des inducteurs enzymatiques : ils peuvent en théorie diminuer l'efficacité de la théophylline et des contraceptifs oraux (mais en pratique courante, l'effet sur la contraception est négligeable).

Diminution de l'efficacité du clodogrel en cas d'association aux inhibiteurs de la pompe à protons, en particulier avec l'oméprazole. L'oméprazole est en vente libre.

## ULCÈRE DUODÉNAL (4)

### En cas d'échec du traitement

- Vérifier l'observance médicamenteuse.
- Vérifier la cicatrisation de l'ulcère et l'éradication d'*H. pylori* en cas de persistance des symptômes, d'antécédents de complications d'ulcère, de facteurs de risque du fait d'une maladie concomitante, d'un traitement anticoagulant ou par AINS.

• Si l'infection à *Helicobacter pylori* persiste, une nouvelle gastroscopie pour mise en culture avec réalisation d'un antibiogramme ou recherche par PCR de mutations entraînant des résistances est justifiée.

Il faut éliminer :

- une résistance d'*Helicobacter pylori* aux antibiotiques ;
- un ulcère secondaire à :
  - syndrome myéloprolifératif : examen clinique, NFS,
  - insuffisance rénale : urémie, créatininémie,
  - hypersécrétion acide : syndrome de Zollinger-Ellison : gastrinémie, mesure du débit acide basal, test de stimulation par pentagastrine,
  - hyperparathyroïdie : bilan phosphocalcique.

### Traitement d'entretien

#### Indications

L'indication majeure est la nécessité de poursuivre un traitement gastrototoxique (*aspirine*).

#### Indications préférentielles des différents types d'antiulcéreux

On utilise un **inhibiteur de la pompe à protons** à demi-dose : **oméprazole**

(**MOPRAL**) : 1 gél. (10 mg)/j ou **lansoprazole** (**LANZOR**) : 1 gél. (15 mg)/j.

### Ulcère de stress (réanimation)

Les **topiques antiulcéreux** sont utilisés pour prévenir en réanimation les ulcères de stress : **sucralfate** (**ULCAR**) 1 sach. à 1 g x 2/j.

On peut également utiliser les **inhibiteurs de la pompe à protons** par voie IV.

### Prévention et traitement des lésions engendrées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens

Les **inhibiteurs de la pompe à protons** peuvent être utilisés. Par ex. : **oméprazole** (**MOPRAL**) : 1 gél. (20 mg)/j. Le traitement préventif est surtout indiqué chez les patients à risque (âge > 65 ans, antécédent d'ulcère).

### *Helicobacter pylori* et AINS

L'éradication d'*Helicobacter pylori* est indiquée et prévient, de façon incomplète, le risque hémorragique. Le traitement par **inhibiteur de la pompe à protons** au long cours est toutefois également indiqué, car plus efficace que l'éradication, chez les patients traités au long cours par un gastrototoxique.

### Traitement symptomatique : antiacides

Les **antiacides** tamponnent l'acidité gastrique et réduisent ainsi les douleurs mais ne permettent pas à un ulcère de cicatriser. De plus, leur effet est suivi d'un rebond de la sécrétion acide.

Ils peuvent être utilisés les tout premiers jours d'un traitement antiulcéreux antisécrétoire pour réduire l'intensité des douleurs ; toutefois, celles-ci cessent déjà très rapidement avec les **antisécrétoires**.

On peut également utiliser les **antiacides** pour les troubles dyspeptiques.

## SELS DE BISMUTH

## ■ Bismuth (subcitrate)

PYLERA					
(+ <b>métronidazole</b> + tétracycline) 3 gél./prise x 4/j, après le repas pendant 10 j	120 gél. 140 mg/ 125 mg/125 mg	60	I	65 %	0,50

**PROPRIÉTÉS**

Bismuth : toxicité directe et indirecte sur *Helicobacter pylori*. Effet exact inconnu.

**Métronidazole** : antibiotique bactéricide et anti-parasitaire de la classe des **nitro-imidazolés**.

Tétracycline : antibiotique bactériostatique de la classe des **tétracyclines**.

**INDICATIONS**

En association avec l'**oméprazole** (20 mg x 2/j) :

- éradication d'*Helicobacter pylori* ;
- prévention des récives d'ulcères gastro-duodénaux chez les patients ayant un ulcère actif ou un antécédent d'ulcère associés à *Helicobacter pylori*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Grossesse et allaitement.

Enfant < 12 ans.

Insuffisance rénale chronique.

Insuffisance hépatique.

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Effet antabuse (**métronidazole**) pendant et au moins 24 h après arrêt du traitement.

Photosensibilité (tétracycline).

Prudence chez le sujet âgé et le patient atteint de troubles du système nerveux central, de myathénie ou d'anomalie sanguine.

Lactose + 96 mg de potassium par prise.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Troubles digestifs** : dysgueusie, diarrhées, nausées, selles noires, anorexie, perte d'appétit, vomissements, douleurs abdominales, constipation, sécheresse buccale, flatulences.

**Troubles neurologiques** : céphalées, sensations vertigineuses, somnolence.

**Autres** : asthénie, infection vaginale, éruption cutanée, élévation des ASAT et ALAT, chromaturie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec le bismuth : **ranitidine** (absorption du bismuth augmentée)

Avec le métronidazole : alcool, **disulfirame**, **antivitamine K** (surdosage), **phénobarbital**, **phénytoïne**, **5-fluorouracile**, **ciclosporine**, **busulfan**, **lithium**.

Avec la tétracycline : méthoxyflurane (néphrotoxicité), **antivitamine K** (allongement du TP et du TCA), **antiacides**/supplémentation en Fe, **Zn**, **Al**, **Ca**/produits laitiers (absorption de la tétracycline diminuée), **rétinoïdes**, **atovaquone**.

## ULCÈRE DUODÉNAL (5)

### Traitement chirurgical

La chirurgie n'est indiquée qu'en cas de complication (hémorragie non contrôlée

par le traitement endoscopique, perforation, sténose).

#### Indication à l'éradication d'*Helicobacter pylori* : consensus européen (Maastricht) 2006 [1]

- Ulcère gastrique
- Ulcère duodénal
- Gastrite atrophique
- Après résection d'un cancer gastrique
- Apparentés au 1<sup>er</sup> degré d'un patient ayant un cancer gastrique
- Dyspepsie non ulcéreuse, la recherche peut se faire par un test respiratoire ; la gastroscopie est indispensable
- Chez les patients au long cours sous AINS avec un antécédent d'ulcère, un traitement préventif par **inhibiteurs de la pompe à protons** au long cours est supérieur à l'éradication mais l'éradication peut prévenir la survenue d'un ulcère et/ou d'une hémorragie
- Rq : Donc en pratique à chaque fois que la bactérie est trouvée !

#### Prescription des antituberculeux : recommandations 2001 de la SNFGE [2]

Deux **antiulcéreux** ne doivent pas être prescrits simultanément.

Une endoscopie est indispensable pour affirmer le diagnostic d'ulcère duodénal ou gastrique évolutif et d'œsophagite.

Les **inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)**, les **inhibiteurs des récepteurs H<sub>2</sub> de l'histamine (anti-H<sub>2</sub>)**, le **sucralfate**, le **misoprostol** sont des traitements efficaces de l'ulcère duodénal et de l'ulcère gastrique évolutif.

Les **anti-H<sub>2</sub>** et les **IPP** sont efficaces dans le traitement initial de l'œsophagite modérée (grades I-II).

Une œsophagite sévère (grades III-IV) doit être traitée en première intention par les **IPP**.

Le **sucralfate** est une bonne alternative aux **anti-H<sub>2</sub>**, dans la prévention des ulcères et des hémorragies de stress, chez des patients ayant un ou plusieurs facteurs de risque.

Les formes injectables des **antiulcéreux** ne sont utiles que lorsque la voie orale est impossible.

Il n'y a pas actuellement de données suffisantes permettant de valider l'intérêt des **antiulcéreux** dans les différentes situations recouvrant l'appellation dyspepsie.

Il n'y a aucune étude permettant de préciser la conduite thérapeutique dans la gastrite chronique. Le traitement de première intention de l'ulcère duodénal et de l'ulcère gastrique associés à la présence d'*Helicobacter pylori* est le traitement d'éradication d'*Helicobacter pylori* d'une durée d'une semaine poursuivi par un traitement par un **antiulcéreux** pendant 3 à 5 sem.

En cas d'éradication d'*Helicobacter pylori*, il n'y a pas lieu de prescrire un traitement d'entretien par **antiulcéreux** à demi-dose dans l'ulcère duodénal. En cas d'absence d'éradication d'*Helicobacter pylori* ou dans les ulcères duodénaux sans présence d'*Helicobacter pylori*, on doit discuter la prescription d'un traitement d'entretien au long cours par **antiulcéreux** à demi-dose.

### CONSENSUS

[1] The Maastricht 3 Consensus Report : Guidelines for the Management of Infection, *EHS*, 2005

[2] Les antiulcéreux : indications chez l'adulte, *SNFGE*, 2001

## DIARRHÉE AIGÜE (1)

### Intervention médicale

La première intervention médicale a habituellement lieu pendant les 3 premiers jours d'évolution. À ce stade, il est souvent difficile de rattacher la diarrhée à une étiologie.

Il faut noter qu'une diarrhée aiguë peut être révélatrice d'une diarrhée chronique (maladie coeliaque, colite inflammatoire, etc.).

Avant de débiter un traitement étiologique, il est indispensable :

- de rechercher une cause médicamenteuse ;
- de rechercher une toxi-infection alimentaire collective pour éviter de nouveaux cas de contamination ;
- de savoir quels examens complémentaires demander.

Le plus souvent, un traitement symptomatique suffit et le transit se normalise en 1 à 3 j.

### Types de diarrhée

On reconnaît deux types de diarrhée qui dépendent des germes responsables :

– la diarrhée hydroélectrolytique faite de selles abondantes, sans glaire ni sang et sans fièvre ;

– la diarrhée invasive faite d'évacuations glairo-sanglantes, parfois en dehors des selles et associée à une fièvre souvent élevée. Toutefois, dans 25 % des cas, les germes invasifs ne donnent que des diarrhées hydroélectrolytiques.

#### Examens à demander devant une diarrhée aiguë

- Diarrhée hydroélectrolytique < 3 j : aucun.
- Diarrhée ≥ 3 j et/ou syndrome dysentérique :
  - coproculture ; la recherche des toxines de *Clostridium* difficile dépend du contexte (pos-antibiotiques ou post-chimiothérapie)
  - examen parasitologique des selles ;
  - NFS, ionogramme sanguin, hémocultures ;
  - les sérologies des salmonelloses et shigelloses sont inutiles pour le diagnostic initial.

### Indications des examens des selles chez l'adulte [1]

#### Quand demander une coproculture ?

- Diarrhée hémorragique ou syndrome dysentérique
- Signes cliniques de gravité
- Terrain fragile (grand âge, insuffisance rénale, valve cardiaque, immunodépression)
- Diarrhée ≥ 3 j
- Forte probabilité d'avoir une diarrhée aiguë bactérienne
- Toxi-infection alimentaire collective

#### Quand demander un examen parasitologique des selles ?

- Diarrhée ≥ 3 j
- Douleurs abdominales
- Troubles digestifs divers : anorexie, boulimie, nausées, dyspepsie, ténisme, prurit anal
- Hyperéosinophilie

**ANTIARRHÉIQUES (1) – ANTISÉCRÉTOIRES INTESTINAUX****■ Racécadotril**

<b>TIORFAN</b>					
1 gél. x 3/j avant chaque repas Nourrisson de 1 à 9 mois (< 9 kg) :	20 gél. 100 mg	9,43	II	30 %	0,47
1 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 1 sach. x 3/j Nourrisson de 9 à 30 mois (9-13 kg) :	16 sach. 10 mg	9,43	I	30 %	0,59
2 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 2 sach. x 3/j E. de 30 mois à 9 ans (13-27 kg) : 1 sach.	30 sach. 30 mg	9,43	I	30 %	0,31
x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 1 sach. x 3/j E. ≥ 9 ans (≥ 27 kg) : 2 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 2 sach. x 3/j					
<b>TIORFANOR</b>					
1 cp. x 3/j avant chaque repas	12 cp. 175 mg	6,76	II	30 %	0,56
<b>TIORFAST</b>					
Idem <b>TIORFAN</b>	10 gél. 100 mg			NR	
<b>DIARFIX</b>					
Idem <b>TIORFAN</b>	10 gél. 100 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de l'enképhalinase, enzyme responsable de la dégradation des enképhalines endogènes qui régulent les échanges hydro-électrolytiques transmembranaires et la motricité intestinale (mais dont les rôles précis sont mal connus).

**Antisécrétoire intestinal** pur : diminue l'hyper-sécrétion intestinale induite par l'inflammation et la toxine cholérique sans avoir d'effet sur la sécrétion basale.

Absence d'action sur le système nerveux central.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des diarrhées aiguës de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse, allaitement** : absence d'étude chez l'homme.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas poursuivre le traitement plus de 7 j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rarement : somnolence.

**DIARRHÉE AIGUË (2)****Correction de la déshydratation****Voie orale**

La réhydratation se fait par voie orale tant qu'elle est possible. Elle consiste en des apports hydriques associés à du glucose et des électrolytes. On peut utiliser par exemple la **PRÉPARATION DE L'OMS** ou plus simplement du **COCA-COLA non light** : la posologie est à adapter à l'état d'hydratation de chaque patient.

**Voie intraveineuse**

Indications à une hospitalisation pour réhydratation par voie intraveineuse :

- déshydratation 10 % poids du corps ;
- vomissements importants ;
- collapsus ;
- troubles de conscience.

On utilise du **GLUCOSÉ** à 5 % + NaCl 3 g/L + KCl 1,5 g/L + **gluconate de calcium** 1 g/L + **gluconate de magnésium** 0,5 g/L : 120 à 150 mL/kg/24 h dont la moitié dans les 6 premières heures puis le rythme de perfusion doit être adapté à l'état de chaque patient.

**Limitation du retentissement fonctionnel****Réduction de la diarrhée**

On peut utiliser :

- un **antisécrétoire** intestinal, **racécadotril** (**TIORFAN**) : 1 gél. avant chaque repas, sans dépasser 7 j de traitement ;
- un **ralentisseur du transit intestinal**, **lopéramide** (**IMODIUM**) : 2 gél. en 1 prise puis 1 gél. après chaque selle liquide sans dépasser 8/j. Ce traitement ne doit pas dépasser 48 h (risque d'iléus ou de coléctasie) et est déconseillé dans les diarrhées invasives pour ne pas retarder l'élimination des agents infectieux ;
- un **pansement digestif** et un **antispasmodique** peuvent éventuellement être ajoutés : **SMECTA** : 1 sach. x 3/j ; **SPASFON** : 1 à 2 cp. x 3/j.

**Traitement de l'infection**

Les antiseptiques intestinaux peuvent être proposés dans les formes modérées. L'antibiothérapie n'est indiquée que dans les formes invasives.

**CONSENSUS**

[1] Indications des examens de selles chez l'adulte, *SNFGE*, 2003



**ANTIARRHÉIQUES (2) – RALENTISSEURS DU TRANSIT**■ **Lopéramide**

<b>IMODIUM</b>					
Diarrhée aiguë : 2 gél. en 1 prise puis 1 gél. après chaque selle liquide sans dépasser 8/j	20 gél. 2 mg	3,37	II	30 %	0,16
Diarrhée aiguë : 1 dose-kg après chaque selle liquide sans dépasser 5/j	90 mL (fl. sol. buv.)	2,89	II	30 %	0,14
<b>IMODIUMCAPS</b>					
Idem <b>IMODIUM</b>	12 gél. 2 mg			NR	
<b>DIASTROLIB</b>					
Idem <b>IMODIUM</b>	20 lyoph. 2 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antidiarrhéique opiacé.

Le **sulfate d'atropine** présent dans la préparation a pour but d'éviter un abus.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des diarrhées en association avec une réhydratation.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

Liées au **sulfate d'atropine** : glaucome par fermeture de l'angle et obstacle uréthro-prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À éviter dans les syndromes dysentériques et en cas de diarrhée post-antibiothérapie : risque de stase bactérienne intestinale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements, ballonnement, céphalées, sécheresse buccale, somnolence.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialise les effets des dépresseurs du système nerveux central (alcool, **benzodiazépines**, etc.).

## DIARRHÉE AIGÜE (3) – BACTÉRIENNE

### Traitement symptomatique

Il est fondé sur les éléments suivants :

- correction de la déshydratation ;
- limitation du retentissement fonctionnel (réduction de la diarrhée ; **antispasmodique** ; **pansements digestifs**).

### Traitement étiologique

#### Antibiothérapie

L'antibiothérapie n'est indiquée que dans les diarrhées bactériennes invasives, c'est-à-dire avec syndrome dysentérique. Elle ne doit pas être systématique mais réservée aux cas suivants :

- terrain fragile ;
- tableau sévère ;
- bactériémie (présumée ou confirmée) ;
- entérocolite endoscopique sévère ;
- complications extra-intestinales.

**Le traitement antibiotique n'est indiqué que dans les diarrhées invasives :**

- il diminue l'intensité de la diarrhée ;
- il évite la diffusion extra-intestinale du germe ;
- il réduit la contagiosité.

L'antibiotique à utiliser dépend du germe retrouvé. En attendant les résultats bactériologiques, on peut utiliser une **fluoroquinolone** par voie orale (ou à défaut IV), par exemple **ciprofloxacine (CIFLOX)** : 1 cp. à 500 mg matin et soir (ou à défaut 200 mg x 2/j en perfusion IV) qui est efficace sur la plupart des germes. La durée du traitement varie de 3 à 7 j.

#### Antiseptiques intestinaux

Les **antiseptiques intestinaux** peuvent être proposés dans les formes modérées. Leur efficacité, inconstante et discutée, est surtout nette lorsque le traitement est débuté précocement. On peut proposer des **nitrofuranes**, **nifuroxazide (ERCÉFURYL 100 mg)** : 1 gél. x 4/j.

#### Micro-organismes et produits d'origine bactérienne

Leur efficacité dans cette indication n'a jamais été démontrée.

GERME	ANTIBIOTIQUE EN 1 <sup>RE</sup> INTENTION	ANTIBIOTIQUES ALTERNATIFS
<i>Salmonella non typhi</i> , <i>Shigella</i>	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 4-7 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 7-10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j
<i>Salmonella typhi</i>	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 10 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 10 j <b>Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération IV (ROCÉPHINE)</b> : 5-10 j
<i>Campylobacter jejuni</i>	<b>Macrolide (JOSACINE)</b> : 5-7 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 5-7 j
<i>Yersinia enterocolitica</i>	<b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j <b>Tétracycline (VIBRAMYCINE N)</b> : 7-10 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 7-10 j
<i>Clostridium difficile</i>	<b>Vancomycine (VANCOCINE)</b> : 10 j	<b>Métronidazole (FLAGYL)</b> : 10 j
<i>Escherichia coli</i> entéro-invasif	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 4-7 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 7-10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j
<i>Vibrio cholerae</i>	<b>Tétracycline (VIBRAMYCINE N)</b> : 2-3 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 2-3 j <b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 2-3 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 2-3 j

## ANTIARRHÉIQUES (3) – RÉHYDRATATION ORALE

## ■ Solutions de réhydratation orale

<b>COCA-COLA (non light)</b>					
Glucides : 110 g/L Sodium : 147 mg/L (6,4 mmol/L) Potassium : 508,3 mg/L (13 mmol/L) Calories : 440 kcal/L	Bout. 19 et 25 cL Bout. 1,5 L et 1 L Canettes 33 cL			NR NR NR	
<b>PRÉPARATION DE L'OMS</b>					
Glucides : 20 g/L Sodium : 2,07 mg/L (90 mmol/L) Potassium : 977,5 mg/L (25 mmol/L) Bicarbonates : 30 mmol/L Calories : 80 kcal/L	qsp eau 1 L			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Solutés de réhydratation.

L'avantage du *Coca-Cola* est sa disponibilité partout dans le monde et son conditionnement qui assure sa stérilité.

Le soluté de l'OMS, très riche en sel, peut parfois provoquer une hypernatrémie.

**INDICATIONS**

Réhydratation des diarrhées.

Le *Coca-Cola* permet d'éviter de boire l'eau du

robinet dans les pays à risque de diarrhée du voyageur.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le *Coca-Cola* non light, très riche en sucre, expose à des risques de déséquilibre d'un diabète sucré, mais le *Coca-Cola* light ne permet pas d'assurer une réhydratation correcte en cas de diarrhée.

**DIARRHÉE AIGÜE (4) – INTOXICATIONS ALIMENTAIRES (1)**

En fait, il ne s'agit pas d'intoxications mais de toxi-infections alimentaires, essentiellement dues à des salmonelloses.

Le traitement est essentiellement symptomatique (cf. Diarrhée aiguë (1)). Il vise à lutter contre la déshydratation et les troubles fonctionnels (nausées, douleurs abdominales).

Les antibiotiques, souvent inutiles car l'évolution est spontanément favorable, doivent être réservés aux cas suivants :

- terrain fragile ;
- tableau sévère ;
- bactériémie (présumée ou confirmée) ;
- entérocolite endoscopique sévère ;
- complications extra-intestinales.

L'évolution est souvent favorable en moins de 24 h.

**Nausées et vomissements au premier plan**

Les germes responsables sont *Staphylococcus aureus* (le staphylocoque doré) et *Bacillus cereus*.

**Diarrhée simple hydrorélectolytique**

Il peut s'agir de *Clostridium perfringens* dont la toxicité est due à sa toxine ou d'un virus (virus Norwalk ou Norwalk-like).

L'évolution est spontanément favorable en 24-48 h.

**Diarrhée invasive**

Les germes responsables et le traitement antibiotique sont détaillés dans le tableau de la page « Diarrhée aiguë bactérienne ».

**Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)**

Les TIAC sont définies selon la Direction générale de la santé par « l'apparition d'au moins deux cas d'une symptomatologie en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire ».

Une TIAC doit être suspectée si :

- un tableau clinique similaire apparaît chez au moins deux individus ;

– un même facteur alimentaire est retrouvé chez les patients atteints : unité de temps et unité de lieu.

Les TIAC sont de déclaration obligatoire à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) qui déclenchera éventuellement une enquête spécifique.

## ANTIARRHÉIQUES (4) – PRODUITS D'ORIGINE MICROBIENNE

■ *Saccharomyces boulardii*

<b>ULTRA-LEVURE</b>					
1 à 4 gél./j	20 gél. 50 mg			NR	
	50 gél. 50 mg			NR	
	10 gél. 200 mg			NR	
	30 gél. 200 mg			NR	
1 sach. x 2/j	20 sach. 100 mg			NR	

■ *Lactobacillus acidophilus*

<b>LACTEOL</b>					
1 à 2 gél./j	10 gél. 340 mg			NR	
	30 gél. 340 mg			NR	
1 à 2 sach./j (max 3 à l'instauration)	10 sach. 340 mg			NR	

■ *Bacillus bifidus*

<b>LYO-BIFIDUS</b>					
2 sach./j	6 sach.			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Flore levurique (*Saccharomyces boulardii*) : flore non pathogène, inhibant la croissance de *Clostridium difficile* et de *Candida albicans* et stimulant le système immunitaire.

Flores bactériennes : proposées dans les diarrhées secondaires aux antibiotiques, liées à un déséquilibre de la flore intestinale ; favoriseraient la réimplantation de la flore saprophyte. Fractions antigéniques : stimuleraient le système immunitaire.

**INDICATIONS**

Proposés dans la prévention des diarrhées secondaires aux antibiotiques.

*Saccharomyces boulardii* aurait une certaine

efficacité à forte dose dans les colites pseudo-membraneuses en rechute.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ces produits contiennent des cellules vivantes et ne doivent pas être mélangés avec un liquide ou un aliment trop chaud ou trop froid, ou alcoolisé.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**ULTRA-LEVURE** ne peut être prescrit avec des **antifongiques** oraux ou systémiques.

L'action de ces produits n'a jamais été clairement démontrée et leur association systématique aux antibiotiques n'est pas justifiée.

**DIARRHÉE AIGÜE (5) – INTOXICATIONS ALIMENTAIRES (2)**

GERME	SYMPTÔMES	MODE DE CONTAMINATION	FRÉ- QUENCE	ÉVOLUTION	ANTIBIO- THÉRAPIE
Staphylo- coque doré	Délai < 6 h Vomissements +++ Douleurs abdominales + Diarrhée +	Charcuterie, pâtisserie, laitages contaminés lors de leur manipulation	+++	< 30 h	Non
<i>Bacillus cereus</i>	Délai < 6 h Vomissements +++ Diarrhée ±	Aliment non réfrigéré entre sa confection et sa consommation (riz du restaurant chinois +++)	+	10 h	Non
<i>Clostridium perfringens</i>	Délai : 6-24 h Diarrhée +++ Fièvre + Vomissements ±	Aliment non réfrigéré entre sa confection et sa consommation (collectivités)	++	24 h	Non
Virus (Norwalk et Norwalk- like)	Délai : 24-48 h Diarrhée +++ Vomissements ++ Malaise, céphalées	Fruits de mer +++	+	24-48 h	Non
<i>Salmonella non typhi</i>	Délai : 8-24 h Diarrhée +++ sanglante parfois Fièvre, frissons +++ Vomissements ++ Douleurs abdominales ++	Aliments d'origine animale (œufs +++ ; volailles +++)	+++	Fièvre < 48 h Diarrhée < 7 j	Si tableau sévère, terrain fragile, complica- tions : <b>fluoro- quinolone (CIFLOX)</b> : 4-7 j
<i>Vibrio parahemo- lyticus</i>	Délai : 6-20 h Diarrhée +++ sanglante parfois Fièvre, frissons +++ Vomissements ++ Douleurs abdominales ++	Poissons crus, fruits de mer	+	Fièvre < 48 h Diarrhée < 7 j	<b>Tétracycline (VIBRAMY- CINE N)</b> : 2- 3 j mais diagnostic souvent porté rétrospecti- vement

**DIARRHÉE AIGÜE (6) – DIARRHÉE DES ANTIBIOTIQUES (1)****Facteurs de risque****Antibiotiques en cause**

Tous les antibiotiques peuvent être en cause (à l'exception des **aminosides** par voie injectable) mais on retrouve le plus souvent :

- l'ampicilline ;
- l'amoxicilline ;
- les céphalosporines ;
- les lincosamides, clindamycine (**DALACINE**) et lincomycine (**LINCOCINE**).

**Terrain**

Les sujets à risques sont les suivants :

- patients hospitalisés ;
  - patients âgés ;
  - patients atteints de maladie organique sous-jacente.
- La conduite à tenir dépend de l'intensité de la diarrhée.

**Diarrhée « simple »****Antibiothérapie non indispensable**

Arrêt de l'antibiotique en cause.

**Antibiothérapie indispensable**

► *Antibiothérapie proche de son terme*

- Associer un traitement antidiarrhéique de type **antisécrétoire** intestinal, **racécadotril** (**TIORFAN**) : 1 gél. avant chaque repas, sans dépasser 7 j de traitement. Éviter les **ralentisseurs du transit intestinal** type **IMODIUM** qui favorisent la pullulation microbienne.
- Ajouter des produits d'origine bactérienne, **Saccharomyces boulardii** (**ULTRA-LEVURE**) : 2 gél. x 2/j.

► *Antibiothérapie loin de son terme*

- Changer si possible d'antibiotique.
- Rechercher *Clostridium difficile* dans les selles et traiter le cas échéant par **métronidazole** (**FLAGYL**) : 1 cp. (250 mg) x 4/j ou **vancomycine** (**VANCOCINE**) *per os* : 500 mg x 4/j pendant 10 j.


**Diarrhée profuse, fébrile, avec syndrome dysentérique**

- Arrêter l'antibiotique.
- Rechercher *Clostridium difficile* et ses toxines dans les selles.
- Pratiquer une rectosigmoïdoscopie et si elle est normale une coloscopie totale.
- Traiter le *Clostridium difficile* : **métronidazole** (**FLAGYL**) : 1 cp. (250 mg) x 4/j ou **vancomycine** (**VANCOCINE**) *per os* : 500 mg x 4/j pendant 10 j (cf. Colite pseudo-membraneuse).

**Colite pseudo-membraneuse****Forme peu sévère**

Le traitement à domicile reste possible.

- Arrêt de l'antibiotique en cause.
- Hydratation orale abondante à adapter à l'intensité de la diarrhée (**COCA-COLA non light** ou **PRÉPARATION DE L'OMS**).
- Les **ralentisseurs du transit** sont contre-indiqués (risque de colectasie) mais les **antisécrétoires** intestinaux sont autorisés, **racécadotril** (**TIORFAN**) : 1 gél. x 3/j.
- Traitement de *Clostridium difficile* : **métronidazole** (**FLAGYL**) : 1 cp. (250 mg) x 4/j ou **vancomycine** (**VANCOCINE**) *per os* : 500 mg x 4/j pendant 10-14 j ou, en particulier si forme sévère ou récidivante : **fidaxomicine** (**DIFICLIR**) 1 cp. (200 mg) x 2/j pendant 10 j.

**DIARRHÉE AIGÜE (7) – DIARRHÉE DES ANTIBIOTIQUES (2)**



**ANTISEPTIQUES INTESTINAUX (1) – MACROCYCLIQUE**■ **Fidaxomicine**

<b>DIFICLIR</b>					
A : 200 mg x 2/j pendant 10 j	20 cp. 200 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactéricide à spectre étroit actif sur *Clostridium difficile*.

**INDICATIONS**

Traitement des infections à *Clostridium difficile* particulièrement si forme sévère ou récidivante.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.  
Nouveau-né, nourrisson.  
Allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prudence en cas d'insuffisance rénale sévère, d'insuffisance hépatique modérée à sévère ou de maladie inflammatoire de l'intestin.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : vomissements, nausées, constipation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibiteurs de la glycoprotéine P, entraînant un surdosage en **fidaxomicine** : ciclosporine, **kétoconazole**, **érythromycine**, **clarithromycine**, **vérapamil**, **dronédarone**, **amiodarone**.

**DIARRHÉE AIGÜE (8) – DIARRHÉE DES ANTIBIOTIQUES (3)****Forme sévère**

Lorsque existe un retentissement sur l'état général, un terrain fragile ou un doute sur une complication (perforation colique, colectasie), le pronostic vital peut être engagé.

**► Traitement général**

- Hospitalisation du patient en urgence en milieu spécialisé.

- Arrêt du (des) antibiotique(s) utilisé(s).

- Arrêt de l'alimentation orale.

- Les **ralentisseurs du transit** sont contre-indiqués (risque de colectasie).

- Mise en place d'une voie veineuse périphérique pour rééquilibration hydroélectrolytique : **GLUCOSÉ** à 5 % + NaCl 3 g/L + KCl 1,5 g/L + **gluconate de calcium** 1 g/L + **gluconate de magnésium** 0,5 g/L : 120 à 150 mL/kg/24 h dont la moitié dans les 6 premières heures puis le rythme de perfusion doit être adapté à l'état de chaque patient.

- Antalgique périphérique (**PERFALGAN**) IV : 1 à 2 g/8 h.

- **Antispasmodique** IV (**SPASFON**) : 1 à 2 amp./8 h.

- Traitement de *Clostridium difficile* par **antibiothérapie orale** : **vancomycine (VAN-COCINE)** *per os* en première intention, 500 mg x 4/j pendant 10-14 j. Si l'antibiothérapie orale est impossible, mieux vaut utiliser des lavements de **vancomycine** plu-

tôt qu'une antibiothérapie IV (germe intraluminal).

Remarque : la **VAN-COCINE** n'est disponible qu'en milieu hospitalier.

**► Traitement des complications**

En cas de colectasie, une exsufflation colique avec mise en place d'un drainage aspiratif permet parfois d'éviter la colectomie.

En cas d'échec ou de perforation, une colectomie s'impose.

**► Prévention des rechutes**

Les produits d'origine bactérienne tels que **Saccharomyces boulardii (ULTRA-LEVURE)** à forte dose : 1 sach. (500 mg) x 2/j pendant 1 mois minimum après la **première rechute** (mais pas après la première poussée) à débiter en même temps que la **vancomycine** permettent de limiter les rechutes ultérieures.

**Prévention**

- N'utiliser les antibiotiques que s'ils sont indispensables.

- Ne pas utiliser des antibiotiques responsables de diarrhée antérieurement chez un même patient.

- En cas de terrain à risque (antécédent de diarrhée sous antibiotiques, patients âgés ou hospitalisés), on peut proposer des produits d'origine microbienne tels que **Saccharomyces boulardii (ULTRA-LEVURE)** à forte dose : 1 sach. (500 mg) x 2/j.

**ANTISEPTIQUES INTESTINAUX (2) – NITROFURANES**■ **Nifuroxazide**

<b>ERCÉFURYL</b>					
100 à 200 mg x 4/j	12 gél. 200 mg			NR	
<b>BACTERIX</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>DIAFURYL</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>IMOSEPTYL</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>PANFUREX</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b> 1 c-mes. x 3/j	28 gél. 200 mg 18 c-mes. (1 fl. 90 mL)			NR NR	
<b>EDISTON</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Anti-infectieux intestinal à action locale intraluminaire actif sur la plupart des germes habituellement rencontrés dans les infections intestinales.

Spectre d'action : *Escherichia coli*, *Staphylococcus saprophyticus*, streptocoques, entérocoques, *Bacteroides* ; à un moindre degré : *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*.

Résistance fréquente de *Proteus*, *Providencia*, *Pseudomonas*, colibacilles entéropathogènes.

**INDICATIONS**

Diarrhée aiguë infectieuse non invasive en complément de la réhydratation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **nitrofuranes**.  
Prématurité et nouveau-nés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : absence de tératogénicité chez l'animal.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

En cas de suspicion de diarrhée invasive, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

## DIARRHÉE AIGÜE (9) – DIARRHÉE DU VOYAGEUR (TURISTA)

### Généralités

#### Destinations à risque

Il s'agit de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique centrale et du Sud.

Les germes en cause sont : ETEC 20-50 %, *Rotavirus* 0-30 %, *Campylobacter*, salmonelles, shigelle, vibrio 1-16 %.

#### Conditions de séjour

Le risque est d'autant plus important que le voyageur se rapproche des conditions de vie locale et que la durée du séjour est longue.

Le risque est de 50 % pour un voyage de plus de 2 sem. en pays tropical.

#### Tableau clinique

Le plus souvent, la diarrhée survient précocement (première semaine) et guérit spontanément en 5 j. Néanmoins, le retentissement fonctionnel peut facilement gêner un séjour.

### Conseils pratiques aux voyageurs

#### Mesures d'hygiène alimentaire

##### ► Eau et boissons

- Éviter l'eau du robinet et les glaçons. Faire bouillir l'eau du robinet 3 à 5 min et la conserver dans un réservoir stérile. Une alternative est de filtrer l'eau (filtre à café) puis d'y ajouter un décontaminant type **HYDROCLONAZONE** ou **MICROPUR** : 1 cp. dans 1 L d'eau à laisser agir une heure avant consommation.

- Préférer les eaux minérales en veillant à ce qu'elles soient ouvertes en présence du voyageur.

- Prendre de préférence des boissons gazeuses (*Coca-Cola*) : le gaz carbonique inhibe la croissance d'E. coli.

##### ► Alimentation

- Éviter les légumes crus et les fruits non épluchés ; laver les fruits avec de l'eau minérale ou décontaminée.

- Éviter les fruits de mer.

- Consommer des plats cuits servis immédiatement après la cuisson.

- Les produits laitiers doivent être pasteurisés.

#### Traitement médical préventif

##### ► Antibiotiques efficaces

Les **fluoroquinolones** (**CIFLOX** : 1 cp. 500 mg/j) sont les antibiotiques les plus efficaces. Le **cotrimoxazole** (**BACTRIM FORTE** : 1 cp./j) ou la **doxycycline** (**VIBRAMYCINE N** 1 cp. 100 mg/j) sont des alternatives.

##### ► Indications

Elles sont limitées aux voyages professionnels de durée brève et aux patients fragiles.

Le risque d'effets indésirables engendrés par les antibiotiques doit être pris en compte en période de voyage : nausées, photosensibilisation, allergie et même diarrhée. De plus, le traitement préventif par antibiotiques expose au risque de développer une infection plus grave à germes résistants. Il doit donc être réservé à des circonstances exceptionnelles.

Les **antiseptiques intestinaux** pourraient représenter une alternative : **nifuroxazide** (**ERCÉFURL**), 1 x 2/j.

#### Traitement médical curatif

- Hydratation abondante : **PRÉPARATION DE L'OMS** ou **COCA-COLA non light**.

- Si intolérance digestive : **antiémétiques**, **dompéridone** (**MOTILIUM**), 1 cp. x 3/j.

- Limiter le retentissement fonctionnel : cf. Diarrhée aiguë.

- L'antibiothérapie doit être réservée aux formes sévères : > 6 selles/j ; selles glairo-sanglantes ; fièvre, déshydratation ; terrain fragile. On peut proposer une **fluoroquinolone**, **ciprofloxacine** (**CIFLOX** cp. 500 mg) : 1 cp. x 2/j pendant 5 j. L'alternative est l'association **cotrimoxazole** (**BACTRIM FORTE** : 1 cp./j) + **doxycycline** (**VIBRAMYCINE N** 1 à 2 cp. 100 mg/j).

- Chez la femme enceinte et l'enfant, on utilise l'association **érythromycine** + **cotrimoxazole**.

- L'association **lopéramide** + antibiotiques permet de limiter la durée de la diarrhée à moins de 10 h.

## MALABSORPTION (1)

La malabsorption est une maladie de la paroi de l'intestin grêle. On l'oppose à la maldigestion qui est une insuffisance en sucs digestifs.

### Principales étiologies des malabsorptions

MALADIES	DIAGNOSTIC
Atrophie villositaire : – Maladie coeliaque  – Dermate herpétiforme	– Gastroskopie + biopsies duodénales, IgA anti-endomysium et anti-transglutaminase (plus spécifiques que anti-gliadine), réponse au régime sans gluten – Idem + biopsie cutanée
Parasitoses – Lambliase – Cryptosporidiose, microsporidiose	– Parasitologie selles, gastroscopie – Sérologie VIH, parasitologie selles, biopsies (grêle ou côlon)
Envahissement de la lamina propria – Maladie de Whipple  – Maladie des chaînes lourdes alpha  – Amylose – Sclérodermie	– Gastroskopie + biopsies avec recherche de Tropheryma whipplei par PCR, vidéocapsule, biopsies ganglionnaires – Gastroskopie + biopsies + immunohistochimie, recherche de la protéine anormale (plasma) – Gastroskopie + biopsies, biopsie rectale – Entéroscanner, biopsies cutanées
Obstacle lymphatique	Clairance ( $\alpha$ 1-antitrypsine ; gastroscopie + biopsies, vidéocapsule, scanner abdominal)
Résections du grêle	Anamnèse, vidéocapsule, efficacité de la cholestyramine (résection < 1 m) ou du régime hypolipidique (résection longue)
Fistules	TOGD, entéroscanner
Grêle radique	Entéroscanner, entéro-IRM
Maladie de Crohn	Iléocoloscopie + biopsies, gastroscopie + biopsies, entéro-scanner
Pullulation microbienne Sprue tropicale	Breath-test, tubage bactériologique jéjunal, traitement antibiotique d'épreuve

## MALABSORPTION (2)

### Traitement symptomatique

Une hospitalisation peut être nécessaire pour le diagnostic et la mise en route du traitement.

#### Rééquilibration hydroélectrolytique

Par voie parentérale si besoin (potassium surtout) à adapter au bilan biologique.

#### Régime

Hypercalorique, hyperprotidique.

En cas de stéatorrhée majeure, une supplémentation en **triglycérides à chaîne moyenne (LIPROCIL)** peut être utile.

En cas de dénutrition sévère, on peut avoir recours à la nutrition entérale continue ou parentérale totale.

#### Traitement des carences

##### ► Carence en fer

**TARDYFERON** : 1 cp. matin et soir ou **VENOFER** : posologie à adapter au taux d'hémoglobine.

##### ► Carence en folates

Ex. **SPECIAFOLDINE** : 1 cp. matin et soir ou **FOLINATE DE CALCIUM** IM ou IV : 5 mg/j ou 50 mg/10 j.

##### ► Carence en calcium

Ex. **SANDOCAL** : 1 sach. matin et soir.

##### ► Carence en vitamine D

Ex. **STÉROGYL** : 10 à 30 gttes/j ou **STÉROGYL 15 «H»** et **STÉROGYL 15 «A»** : 1 amp./15 j.

##### ► Carence en vitamine K

**VITAMINE K1 Roche 10 mg/mL** : 20 mg en perf. de 20 min.

##### ► Carence en vitamine A

**Rétinol (VITAMINE A FAURE ou VITAMINE A DULCIS)** 1 à 2 gttes/j (5 000 à 10 000 UI) pendant quelques semaines (surveillance biologique car toxicité si surdosage).

### Traitement étiologique

Seules la maladie de Whipple et la pullulation microbienne sont traitées ici. Les autres maladies sont traitées dans des chapitres autonomes ou relèvent du domaine spécialisé.

#### Maladie de Whipple

La bactérie responsable de la maladie est : *Tropheryma whippelii*.

La maladie est mortelle en l'absence de traitement (atteintes neurologiques sévères).

#### • Traitement débuté en hospitalisation.

Double antibiothérapie par voie parentérale IV ou IM (**pénicilline G**) : 1,2 MUI/24 h en 2 ou 3 inj. associée à un **aminoside (streptomycine)** : 1 g/24 h en IM pendant 15 j. Une alternative est la **ceftriaxone (ROCEPHINE)** pendant une quinzaine de j.

#### • Relais pendant 1 an par **cotrimoxazole (BACTRIM FORTE)** : 1 cp. matin et soir.

Les signes cliniques digestifs régressent en quelques semaines mais l'amélioration histologique n'est que partielle. Les rechutes ont considérablement diminué depuis que le **BACTRIM** a remplacé les **tétracyclines** (meilleur passage hémoméningé).

En cas d'intolérance au **BACTRIM**, on peut recourir au **thiamphénicol (THIOPHÉNICOL)** : 2 cp. x 3/j.

Le traitement des atteintes extradigestives est symptomatique.

#### Pullulation microbienne

Le traitement idéal est étiologique lorsqu'il est possible. Il est généralement chirurgical : suppression d'une fistule, d'une sténose, d'une anse borgne, etc.

Le traitement symptomatique repose sur une antibiothérapie dont l'efficacité est rapide. On peut proposer une antibiothérapie à large spectre : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 500 mg x 3/j pendant 10 j.

Les **fluoroquinolones**, actives sur les bactéries aérobies, sont également efficaces : **norfloxacine (NOROXINE 400)**, 1 cp. (400 mg) x 2/j pendant 10 j.

Les récurrences sont fréquentes et un renouvellement de l'antibiothérapie peut s'avérer nécessaire.

## MALADIE CÉLIAQUE DE L'ADULTE (1)

### Diagnostic

Attention, dans la majorité des cas, la maladie cœliaque est peu symptomatique. La forme typique avec grande malabsorption est rare. Il peut s'agir d'une simple carence martiale ou de vagues douleurs abdominales, d'une anémie, de fausses couches ou d'une stérilité, d'une ostéoporose, d'une élévation des transaminases.

Le dépistage repose sur la recherche d'anticorps anti-transglutaminase de type IgA. En cas de déficit en IgA, on recherche les IgG.

Les anticorps anti-endomysium (IgA plutôt que IgG) sont plus spécifiques mais un peu moins sensibles.

Si les anticorps sont positifs, une biopsie du grêle (duodénum) doit être pratiquée : on recherche une atrophie villositaire, sont l'importance doit être gradée, une atrophie des cryptes et la présence d'un infiltrat inflammatoire avec des lymphocytes intraépithéliaux.

### Traitement

#### Principes

Le traitement repose sur le régime sans gluten. Il est prescrit à vie. Il repose sur l'exclusion totale de 4 céréales : blé, orge, et seigle; l'avoine peut être maintenue.

Il est important d'expliquer aux patients que le régime doit être poursuivi à vie et que, malheureusement, aucun écart ne peut être toléré car :

- la reprise d'un régime normal conduit à des rechutes quasi inéluctables ;
- après une rechute, une résistance au régime sans gluten risque d'apparaître ;
- le régime sans gluten diminue le risque de complications malignes.

Plusieurs consultations avec une diététicienne sont nécessaires.

Une liste exhaustive d'aliments interdits et autorisés doit être donnée au patient.

Le régime sans gluten est coûteux car le prix des aliments sans gluten est élevé ; ceux-ci ne sont pas pris en charge.

#### En pratique

##### ► Repas

La ration calorique doit être normale.

Viandes, poissons et œufs peuvent être consommés en grande quantité.

Le nombre de repas peut être multiplié (collation dans la matinée - fromage - ou dans la soirée - fruit).

Les produits sans gluten peuvent remplacer les aliments interdits.

##### ► Conseils pour accommoder les aliments

Tous les modes de cuisson sont autorisés. Vinaigrette, mayonnaise sans moutarde, sauce tomate fraîche ne posent pas de problème.

Les légumes peuvent être servis au beurre, au fromage, au jus de viande ou à la sauce tomate.

Les sauces à base de roux doivent être préparées avec beurre et Maïzena et non pas avec de la farine.

Les pâtes sans gluten se préparent comme les pâtes habituelles.

##### ► Produits de l'industrie agroalimentaire

D'une façon générale, il faut se méfier de tous les produits du commerce car la présence de gluten est souvent masquée :

- le terme « amidon » est ambigu ;
- les plats cuisinés du commerce doivent être évités ;
- tout repas pris à l'extérieur (restaurant, cantine, etc.) doit être entouré d'une certitude de l'absence de gluten.

L'adhésion à l'Association française des intolérants au gluten peut aider certains patients (cf. infra).

## ALIMENTS SANS GLUTEN (1) – LISTE DES ALIMENTS AUTORISÉS ET INTERDITS

TYPES D'ALIMENTS	AUTORISÉS	INTERDITS
Céréales Féculeux	Maïs, riz, soja, tapioca, millet, sarrasin et produits dérivés : farines sans gluten, pâtes sans gluten, semoule sans gluten, Corn-Flakes, Rice Krispies.	Blé, orge, avoine, seigle et dérivés : farines, semoule, pâtes, chapelure.
Viandes Charcuteries Œufs Poisson, crustacés	Viandes, volailles, abats, poissons, œufs frais, jambons (ces aliments doivent être frais ou congelés mais non cuisinés), poissons et œufs de poissons.	Viandes et poissons cuisinés (conserves, traiteur, surgelés), charcuterie, chair à saucisse, beurre de poissons et de crustacés.
Laitages	Lait entier, allégé, demi-écrémé, yaourts, fromage blanc, petits-suisses, fromages sans moisissures, crème fraîche.	Flancs, crèmes et laits gélifiés du commerce ; glaces et sorbets du commerce, fromages à moisissures (bleu, roquefort), crème de gruyère (Vache qui rit).
Graisses Sauces	Beurre, huile, margarine, saindoux, végétaline, mayonnaise Bénédicta.	Toutes les autres sauces du commerce.
Crudités Légumes	Légumes frais ou secs, surgelés ou en conserve, non cuisinés. Pomme de terre, chips, flocons de pomme de terre (Mousline, Maggi, Nestlé).	Légumes frais ou secs cuisinés du commerce, potages de légumes, sauce tomate du commerce, autres purées.
Fruits	Tous les fruits frais, au sirop et surgelés, châtaignes, marrons glacés.	Crème et purée de marrons du commerce, compotes de pommes du commerce, figues sèches.
Produits sucrés	Sucre, miel, confitures, gelées pur fruit-pur sucre, chocolat Poulain, levure alsacienne Alsa, entremets et pâtisseries maison avec farine autorisée, crème Montblanc.	Farines maltées type Ovomaltine, Banania, Ricorée, caramels, nougats, pâtes d'amande, pâtes de fruits, dragées, chewing-gum.
Condiments Apéritifs	Épices en grains, fines herbes, cornichons, câpres, sel, noix de Cajou, cacahuètes.	Épices en poudre, moutarde ordinaire du commerce.
Boissons	Thé, café, Nescafé, Nesquick, mélanges chicorée, café. Tous les sodas et eaux en bouteilles.	Bières, panachés, cidre.



## MALADIE CÉLIAQUE DE L'ADULTE (2)

### Correction des carences

Elle peut être utile au début du régime sans gluten mais elle devient rapidement inutile car l'amélioration clinique est rapide lorsque le régime est respecté. De plus, du fait de la malabsorption, le traitement des carences peut nécessiter la voie IM. Dans ce cas, les injections doivent être pratiquées **après la normalisation du taux de prothrombine, c'est-à-dire après le traitement de la carence en vitamine K**. La supplémentation doit cesser à la normalisation des paramètres biologiques.

#### Carence en fer

**TARDYFERON** : 1 cp. matin et soir ou **VENOFER** : posologie à adapter au taux d'hémoglobine.

#### Carence en folates

Ex. **SPECIAFOLDINE** : 1 cp. matin et soir ou **FOLINATE DE CALCIUM** IM ou IV : 5 mg/j ou 50 mg/10 j.

#### Carence en calcium

Ex. **SANDOCAL** : 1 sach. matin et soir.

#### Carence en vitamine D

Ex. **STÉROGYL** : 10 à 30 gtt/j ou **STÉROGYL 15 «H»** ou **STÉROGYL 15 «A»** : 1 amp. tous les 15 j.

#### Carence en vitamine K

**VITAMINE K1 Roche 10 mg/mL** : 20 mg en perf. de 20 min.

### Régime sans lactose

Il peut être associé au régime sans gluten pendant les premiers jours de traitement car l'atrophie villositaire entraîne une carence en lactase (qui disparaît lorsque les villosités repoussent).

Il faut supprimer le lait en boisson (le lait sans lactose **AL 110** et le lait de soja sont autorisés). Pour les sujets les plus intolérants, on supprime le fromage blanc (pas les autres fromages), les petits-suisses, les quiches, glaces, crèmes, etc. Les yaourts sont autorisés.

### En cas d'échec du régime sans gluten

L'échec ne peut être affirmé qu'après 6 mois de régime bien suivi. Il concerne 5 à 10 % des patients.

Les situations suivantes doivent être recherchées :

- non-observance du régime sans gluten, y compris les écarts inévitables au régime (restaurants, médicaments, etc.) ;
- intolérance à d'autres protéines (soja) ;
- carence en zinc ;
- erreur de diagnostic.

#### Le pronostic est mauvais.

On peut proposer :

- une corticothérapie par voie orale : **prednison** (**CORTANCYL**) : 1 mg/kg/j puis à adapter à chaque patient ; la durée est indéterminée ;
- une nutrition parentérale.

#### En cas de rechute

La non-observance du régime sans gluten, y compris les écarts inévitables au régime (restaurants, médicaments, etc.) est la première cause de rechute.

Le traitement consiste à reprendre un régime sans gluten. En cas d'échec, le pronostic est mauvais. Une corticothérapie ou une nutrition parentérale peuvent être tentées.

La recherche d'une complication maligne est nécessaire.

#### Complications non malignes de la maladie cœliaque

- Anémie, ostéoporose/polyarthralgies, fausses couches/stérilité.
- Association à d'autres maladies auto-immunes (diabète de type 1, hépatite auto-immune)

#### Complications malignes de la maladie cœliaque (prévenues par le régime sans gluten)

- Lymphome T du grêle.
- Carcinome épidermoïde (bouche, pharynx, œsophage).
- Adénocarcinome du grêle.

### Médicaments autorisés et interdits

De nombreuses préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés ou de gélules contiennent du gluten.

Il faut donc privilégier les formes galéniques telles que les gouttes, les sirops ou les injections SC, IM ou IV.

Association française des intolérants au gluten (AFDIAG) : 11, villa Thoréton - 75015 Paris - Tél : 01 45 54 71 23 - Fax : 01 45 54 71 43 - [www.afdiag.org](http://www.afdiag.org)

## CONSTIPATION (1)

L'apparition récente d'une constipation doit faire rechercher l'apparition d'un obstacle organique avant de débiter un traitement symptomatique.

En dehors de ce cas, la constipation peut relever de 2 mécanismes :

### Indications des examens biologiques [1]

Constipation persistante et ne répondant pas à un traitement adapté : NFS, CRP, glycémie, TSH, calcémie, créatininémie.

- modification de la motricité colique (constipation simple) ;
- atteinte des phénomènes terminaux de la défécation (dyschésie).

### Indications de la coloscopie [1]

Âge > 50 ans ; suspicion de constipation organique, signes d'alarme (cf. Endoscopie digestive basse).

## Constipation simple

### Mesures d'hygiène

#### ► Repas

Les repas doivent être pris lentement, au calme, à heures fixes, en mâchant bien. Une eau riche en magnésium (*Hépar*) peut être conseillée.

La dentition doit être vérifiée et appareillée si besoin.

#### ► Défécation

Les exonérations doivent avoir lieu à heures fixes, le matin, en prenant au besoin un grand verre d'eau froide quelques minutes avant (stimulation du réflexe gastrocolique).

#### ► Activité physique

Elle doit être régulière.

### Mesures diététiques

#### ► Augmentation du volume du bol fécal

Le régime doit comporter des aliments « de ballast » : pain complet, légumes verts, fruits.

Au besoin, on peut s'aider de **fibres alimentaires, son de blé (ALL-BRAN de KELLOGG'S)** : 1 càs (5 g) tous les 2 j à augmenter très progressivement tous les 3-4 j pour atteindre 20 g/j ; un apport trop brutal risque de s'accompagner de ballonnements. Un mucilage type **ispaghul SPAGULAX MUCILAGE PUR** peut également être proposé : 1 à 3 sach./j.

Boissons abondantes, au moins 2 L/j.

Toutes ces orientations vont souvent à l'encontre des habitudes des patients et il faut savoir varier les traitements pour éviter la lassitude.

### Traitement médicamenteux

#### ► Laxatifs non irritants

- En première intention [1] : laxatif type **macrogol (MOVICOL)** : 1 à 3 sach. le matin ou du **lactulose (DUPHALAC)** : 1 à 3 càs/j en 1 prise le matin à dose progressive.
- En seconde intention [1] : laxatif lubrifiant, **huile de paraffine (LANSOÏL)** : 1 à 4 càs/j.

#### ► Laxatifs stimulants

Ils doivent être évités sauf pour des courtes durées car ils risquent d'entraîner une colopathie aux laxatifs (diarrhée, troubles hydroélectrolytiques, etc.). Dans certains cas particuliers (par exemple constipation post-chimiothérapie), on peut proposer un **laxatif anthraquinonique (PERIS-TALTINE)** : 1 cp. le soir pendant 3 j. Chez les femmes (pas chez les hommes) pour lesquelles le traitement précédent n'a pas le bénéfice escompté, on peut proposer un antagoniste des récepteurs 5HT<sub>4</sub>, **prucalopride (RESOLOR)** : 2 cp. en une prise au cours d'un repas. Si après 4 semaines, le traitement reste inefficace, il faut l'arrêter.

## CONSENSUS

[1] Recommandations pour la pratique clinique dans la prise en charge et le traitement de la constipation chronique de l'adulte, SNFGE, 2007

**LAXATIFS (1) – LAXATIFS OSMOTIQUES (1)****■ Lactulose**

<b>DUPHALAC</b>					
Constipation : 1 à 3 sach./j ou 15 mL x 1 à 3/j	20 sach. 10 g 400 sach. 10 g	3,58 HOP	30 %	0,18	
Encéphalopathie hépatique : 6 à 10 sach./j ou 30 mL x 1 à 3/j	200 mL (fl. + godet)	2,55	30 %	0,20	
<b>LAXARON</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	12 sach. 10 g/15 mL		NR		

**■ Lactitol**

<b>IMPORTAL</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 10 g	4,05	30 %	0,20	

**■ Sorbitol**

<b>SORBITOL DELALANDE</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 5 g		NR		

**■ Pentaérythritol**

<b>AUXITRANS</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 5 g	4,00	15 %	0,20	

**■ Macrogol**

<b>FORLAX</b>					
A. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach. 10 g	3,81	30 %	0,19	
E. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach. 4 g	3,42	30 %	0,17	
<b>MOVICOL</b>					
A. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach.	4,83	30 %	0,24	
<b>MOVICOL ENFANTS</b>					
E. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach.	6,64	30 %	0,33	
<b>TRANSIPEG</b>					
A. : 1 à 2 sach. à 5,9 g/j ou 2 à 4 sach. à 2,95 g/j en 1 prise le matin	30 sach. 2,95 g 200 sach. 2,95 g 20 sach. 5,9 g 200 sach. 5,9 g	5,65 HOP 4,44 5,72	30 % 30 %	0,19 0,22	
<b>MOXALOLE</b>					
Idem <b>MOVICOL</b>	10 sach. 13,125 g		NR		

**■ Magnésium (hydroxyde)**

<b>CHLORUMAGÈNE</b>					
A. : 1 càc/j le matin à jeun ou le soir au coucher	100 g (pdre sups. buv.)		NR		

## CONSTIPATION (2)

### Constipation terminale

#### Dyschésie rectale

► *Rééduquer le réflexe exonérateur*

- Horaire précis et régulier pour aller à la selle, de préférence au réveil, même en l'absence de besoin.

- Favoriser les facteurs péristaltogènes : ingestion au réveil d'un verre d'eau glacée ou d'un jus de fruit frais pour stimuler le réflexe gastrocolique.

► *Reconstituer l'appareil musculaire d'exonération*

- Exercices pour muscler la sangle abdominale.
- Traitement d'une hernie, d'une éventration.

► *Traitement local de la dyschésie*

On utilise des laxatifs par voie rectale : **ÉDUCTYL** : 1 sup./j ou **MICROLAX** : 1 lavement/j.

#### Fécalome

C'est l'accumulation d'un important volume de matières déshydratées dans le rectum, qui apparaît souvent chez le vieillard alité ou après un lavement baryté.

Il peut se traduire sous forme d'une fausse diarrhée.

► *Ramollissement des matières*

En fonction de l'importance du fécalome, on peut proposer des laxatifs par voie rectale (**MICROLAX** : 4 à 5 lavements/j) ou bien un lavement plus important (**NORMACOL** : 4 à 5 lavements/j).

Si ces traitements sont insuffisants, on utilise la préparation suivante : 10 amp. d'**huile de paraffine** dans 500 mL d'eau tiède.

► *Extraction du fécalome*

Lorsqu'elle est nécessaire, elle est réalisée par fragmentation mécanique au doigt ou instrumentale (sous anuscopie ou rectoscope).

## COLOPATHIE FONCTIONNELLE - TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX (1)

Il s'agit d'un diagnostic d'élimination qui ne peut être porté qu'après un bilan précis comportant obligatoirement une **coloscopie avec biopsies multiples et étagées (pour éliminer une colite collagène)**.

Le traitement est difficile, aux résultats incertains. L'instauration d'une bonne relation médecin-malade est indispensable.

### Règles hygiéno-diététiques

#### Mesures d'hygiène

##### ► Repas

Les repas doivent être pris lentement au calme, à heures fixes, en mâchant bien. La dentition doit être vérifiée et appareillée si besoin.

##### ► Défécation

Les exonérations doivent avoir lieu à heures fixes, le matin, en prenant au besoin un grand verre d'une boisson fraîche (eau, jus de fruit) quelques minutes avant (stimulation du réflexe gastrocolique).

##### ► Activité physique

Elle doit être régulière.

#### Mesures diététiques

► *Suppression des aliments irritant la muqueuse digestive*

- Boissons alcoolisées et gazeuses, épices, thé et café.

- Aliments riches en cellulose, de digestion difficile : choux (verts, rouges et de Bruxelles), choux-fleurs, courges, citrouilles, épinards, oseille, rhubarbe, artichauts.

- Crudités : radis, concombres, céleris, carottes.

- Graisses cuites, fritures.

- Consommation de fruits très mûrs, en compote, gelée ou confiture.

##### ► Boissons abondantes

Au moins 2 L par j. Une eau riche en magnésium (*Hépar*) peut être conseillée.

##### ► Modification du volume du bol fécal

- Augmentation du volume du bol fécal (en cas de constipation) en consommant légumes verts, salades, carottes cuites, figues et pruneaux.

- Fibres alimentaires, **son de blé (ALL-BRAN de KELLOGG'S)** : 1 càs (5 g) tous les 2 j à augmenter très progressivement tous les 3-4 j pour atteindre 20 g/j. Un mucilage type ispaghul **SPAGULAX MUCILAGE PUR** peut également être proposé : 1 à 3 sach./j.

- Diminution du volume du bol fécal (si diarrhée ou douleurs abdominales) : régime sans résidus.

## ENTÉROCINÉTIQUE

## ■ Prucalopride

<b>RESOLOR</b>					
Médicament réservé à la femme 2 mg en une prise à n'importe quel moment de la journée, au cours ou en dehors des repas Réduire à 1 mg si > 65 ans, en cas d'insuffisance rénale sévère, et d'insuffisance hépatique sévère	7 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	14 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	28 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	84 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

Le **prucalopride** est un agoniste sélectif de haute affinité des récepteurs 5-HT<sub>4</sub> de la sérotonine. Cette activation implique une action entérocinétique.

Biodisponibilité orale absolue > 90 % avec une absorption rapide (C<sub>max</sub> atteinte en 2 à 3 h) non influencée par une prise alimentaire. La métabolisation est faible (15 %), élimination urinaire sous forme initiale à plus de 60 %.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de la constipation chronique chez les femmes pour lesquelles les laxatifs n'ont pas eu les effets escomptés. En l'attente de données, **RESOLOR** n'est pas recommandé chez l'homme et avant l'âge de 18 ans.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **prucalopride** ou à l'un des excipients. Intolérance au lactose. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Perforation ou obstruction intestinale quelle qu'en soit l'étiologie.

Les médicaments pouvant provoquer des torsades de pointe doivent être évités : **antiarythmiques de classe Ia (quinidiniques)** et **III (amiodarone)**, **antipsychotiques**, **antidépresseurs**, **macrolides**, **fluoroquinolones**, imidazolés et triazolés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'excrétion rénale étant la principale voie d'élimination du **prucalopride**, la dose recommandée est de 1 mg/j chez l'insuffisant rénal sévère. En l'absence de données, cette même dose de 1 mg/j est recommandée chez l'insuffisant hépatique sévère malgré la faible probabilité de conséquences significatives. L'excipient majoritaire est le lactose, les patients intolérants ne doivent donc pas prendre ce médicament.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, diarrhée, douleurs abdominales, maux de tête, vertiges, vomissements, rectorragie, fatigue.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **prucalopride** ne présente que peu de risques d'interactions médicamenteuses. On note tout de même l'augmentation des taux plasmatiques de **prucalopride** en présence d'inhibiteurs puissants de la P-gp comme : le **kétoconazole**, le **vérapamil**, la **ciclosporine A** et la **quinidine** mais sans conséquence clinique *a priori*. Une attention particulière doit être portée en cas de prise de médicaments allongeant l'intervalle QT. L'utilisation d'analogues atropiniques peut réduire les effets du **prucalopride** par interaction pharmacodynamique.

## COLOPATHIE FONCTIONNELLE - TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX (2)

### Traitement médicamenteux

#### Douleurs

Utilisation « à la demande » d'**antispasmodiques** musculotropes (**SPASFON**) : 1 à 2 cp. x 3/j. On peut également proposer un **antispasmodique** régulateur de la motricité digestive type **trimébutine**.

#### Troubles du transit

##### ► Constipation

On utilise un laxatif non irritant :

- **laxatif** non irritant : **macrogol (MOVICOL)** 1 à 2 sach. le matin en une prise ; **lactulose (DUPHALAC)** : 1 à 3 càs/j en 1 prise (meilleure efficacité osmotique) le matin à dose progressive ;
- **laxatif lubrifiant** : **huile de paraffine (LAN-SOÏL)** : 1 à 4 càs/j.

##### ► Diarrhée

Un **ralentisseur du transit** peut être prescrit à la dose minimale efficace. Le **lopéramide (IMODIUM)** est surdosé dans les gélules pour les troubles fonctionnels et un recours à la forme en gouttes permet d'adapter la posologie à chaque patient : **IMODIUM** en solution buvable à 20 mg/100 mL : 20 gttes/j à adapter à chaque patient.

##### ► Ballonnements

**Antispasmodique** musculotrope type **MÉTÉOSPASMYL** : 1 caps. x 2 à 3/j.

##### ► Anxiété

Un sédatif type **benzodiazépine (LEXOMIL)**, 1/4 cp. matin et midi et 1/2 cp. le soir, peut être utilisé.

#### Crénothérapie

Elle n'est pas recommandée dans le traitement de la constipation chronique.

## ENDOSCOPIE DIGESTIVE BASSE (1)

### Thème de la recommandation HAS et population concernée [1]

L'objectif de ces recommandations est de préciser la place de l'endoscopie digestive basse pour le diagnostic de lésions néo-

plasiques chez des sujets à risque élevé et très élevé de cancer colorectal (CCR) et dans des situations cliniques particulières pour les sujets à risque moyen de cancer colorectal.

### Définition des populations à risque de cancer colorectal

Risque moyen	Risque moyen de la population générale
Risque élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patients ayant des antécédents personnels d'adénome ou de cancer colorectal</li> <li>– Sujets ayant un parent au 1<sup>er</sup> degré de moins de 60 ans ou plusieurs parents au 1<sup>er</sup> degré atteints d'un cancer colorectal ou d'un adénome avancé</li> <li>– Patients atteints de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH) et maladie de Crohn, en cas de pancolite d'évolution prolongée</li> <li>– Patients atteints d'acromégalie</li> </ul>
Risque très élevé	<p>Sujets appartenant à une famille atteinte de cancers à transmission héréditaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la polypose adénomateuse familiale (PAF),</li> <li>– les cancers héréditaires sans polypose (<i>Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer</i> [HNPCC]), et</li> <li>– autres polyposes avec risque de cancer colorectal (juvénile et Peutz-Jeghers)</li> </ul>



**ENDOSCOPIE DIGESTIVE BASSE (2)****Recommandations principales****Indications de l'endoscopie digestive basse chez les patients à risque moyen de CCR**

► *En présence de symptômes digestifs isolés : douleurs abdominales et/ou diarrhée et/ou constipation*

Une coloscopie totale est recommandée en cas de survenue des symptômes :

- après 50 ans ;
- avant 50 ans, en l'absence de réponse à un traitement symptomatique.

► *En présence de rectorragies chroniques ou aiguës abondantes*

Une coloscopie totale est recommandée :

- en cas de rectorragie chronique (itérative, rouge foncé, quel que soit l'âge du patient) ;
- en cas de rectorragie chronique isolée rouge vif, après 50 ans ;
- en cas de rectorragie aiguë abondante, dès que l'état clinique du patient le permet.

Le choix entre une rectosigmoïdoscopie

souple ou une coloscopie totale de première intention est possible : en cas de rectorragie chronique isolée rouge vif, avant 50 ans.

► *En cas d'endocardite*

Une coloscopie totale est recommandée : en cas d'endocardite à *Streptococcus bovis* ou du groupe D.

► *Avant ou après transplantation d'organe chez un patient asymptomatique*

Données insuffisantes pour proposer une recommandation.

► *En cas de diverticulose colique symptomatique*

Une coloscopie totale est contre-indiquée : lorsque le diagnostic d'une inflammation aiguë d'une diverticulose colique a pu être posé par d'autres moyens diagnostiques.

Une coloscopie totale est recommandée : à distance d'une complication aiguë, en cas d'indication opératoire ou de doute diagnostique avec une pathologie néoplasique.

**ENDOSCOPIE DIGESTIVE BASSE (3)****Indications de l'endoscopie digestive basse chez les patients à risque élevé de CCR****Surveillance des MICI (maladie de Crohn et RCH)**

Une coloscopie totale avec biopsies (tous les 10 cm, au minimum 30 prélèvements) est recommandée :

- en cas de pancolite, après 10 ans d'évolution, puis tous les 2-3 ans ;
- en cas de colite gauche, après 15 ans d'évolution, puis tous les 2-3 ans.

Si dysplasie incertaine : contrôle endoscopique et biopsies à 6 mois.

Si dysplasie de bas grade ou de haut grade (catégories 3 et 4 de la classification de Vienne) : prendre un deuxième avis

anatomopathologique avant la décision thérapeutique.

Si dysplasie sur lésion en relief : biopsie de la lésion et de la muqueuse plane adjacente.

**Indication des biopsies coliques et/ou iléales (aspect macroscopique normal)****En cas de diarrhée chronique à la recherche :**

- d'une infection opportuniste chez les sujets immunodéprimés : biopsies iléo-coliques ;
- d'une colite microscopique chez les sujets non immunodéprimés : biopsies rectales et sigmoïdiennes.

**À la recherche de MICI** (biopsies nombreuses, étagées et bien répertoriées).

**CONSENSUS**

[1] Endoscopie digestive basse : indications en dehors du dépistage en population, HAS, 2004

## ENDOSCOPIE DIGESTIVE BASSE (4)

## Endoscopie digestive basse : indications en dehors du dépistage en population [1]

Surveillance des sujets asymptomatiques à risque très élevé de CCR	Début surveillance	Rythme de surveillance	Examen pratiqué
PAF : membres de la famille d'un patient atteint de PAF	A partir de 10-12 ans	Tous les ans	Rectosigmoidoscopie souple
PAF après colectomie : surveillance du rectum restant		Tous les ans	Rectosigmoidoscopie souple
PAF atténuée : membres de la famille d'un patient atteint de PAF atténuée	A partir de 30 ans	Tous les ans	Coloscopie totale
Polypose colique familiale avec mutation gène MHT	A partir de 30 ans	Pas de recommandation	Coloscopie totale
HNPPC : membres de la famille d'un patient atteint de HNPPC	A partir de 20-25 ans	Tous les 2 ans	Coloscopie totale
HNPPC après traitement chirurgical		Tous les 2 ans	Coloscopie totale
Polypose Juvenile : membres de la famille d'un patient atteint et patient atteint	A partir de 10-15 ans	Tous les 2-3 ans	Coloscopie totale
Syndrôme de Peutz-Jeghers : membres de la famille d'un patient atteint et patient atteint	A partir de 18 ans	Tous les 2-3 ans	Coloscopie totale
<b>Surveillance des sujets asymptomatiques à risque élevé de CCR</b>			
ATCD familial de CCR	A partir de 45 ans ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas index	Contrôle à 5 ans puis* 2 coloscopies distantes de 5 ans, puis* espacer la surveillance	Coloscopie totale
* un cas au 1 <sup>er</sup> degré avant 60 ans			
* plusieurs cas au 1 <sup>er</sup> degré, quel que soit l'âge			
ATCD familial de CCR au 1 <sup>er</sup> degré et découverte d'un adénome non avancé	A partir de 45 ans ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas index	Coloscopie de contrôle à 3 ans	Coloscopie totale
ATCD familial d'adénome colique		Selon résultat de la première coloscopie	Coloscopie totale
* au 1 <sup>er</sup> degré avant 60 ans			
ATCD personnel de CCR après chirurgie :		Contrôle à 6 mois, puis* à 2-3 ans puis* à 5 ans	Coloscopie totale
* si coloscopie préopératoire incomplète			
ATCD personnel de CCR après chirurgie :		Contrôle à 2-3 ans puis* à 5 ans	Coloscopie totale
* si coloscopie préopératoire complète			
Patient acromégale	Lors du diagnostic d'acromégalie		Coloscopie totale
<b>Surveillance des patients à risque élevé de CCR, après exérèse de polypes colorectaux</b>			
<b>Polypes hyperplasiques</b>			
Après exérèse de polype hyperplasique $\geq 1$ cm et/ou multiple ( $n \geq 5$ ) de siège colique et/ou séjournant sur le colon proximal dans un contexte d'ATCD familial de polyposse hyperplasique		Contrôle à 5 ans puis* à 10 ans	Coloscopie totale
<b>Adénomes en dysplasie de bas grade et avancés</b>			
Exérèse incomplète d'un adénome en dysplasie de bas grade (catégorie 3)		Contrôle à 3 mois	Coloscopie totale
ou avancée de catégorie 4.1 et 4.2			
Exérèse complète d'un adénome avancé, ou d'un nombre d'adénome $\geq 3$ , ou d'un adénome chez un patient ayant un ATCD familial de CCR		Contrôle à 3 ans, puis 2 coloscopies espacées de 5 ans puis à 10 ans	Coloscopie totale
Exérèse complète d'un adénome non avancé et d'un nombre d'adénomes $< 3$ , et absence d'ATCD familial de CCR		Contrôle à 5 ans, puis* une coloscopie à 5 ans puis* à 10 ans	Coloscopie totale
<b>Adénomes transformés</b>			
Exérèse incomplète d'un adénome transformé de catégorie 4		Contrôle à 3 mois puis* à 3 ans	Coloscopie totale
Exérèse complète d'un adénome transformé de catégorie 4		Contrôle à 3 ans	Coloscopie totale
Exérèse d'un adénome transformé de catégorie 5 sans colectomie complémentaire de la classification de Vienna		Contrôle à 3 mois puis* à 3 ans	Coloscopie totale
1 : un adénome avancé est défini par une taille $\geq 1$ cm, ou la présence d'un contingent villositaire ( $> 25\%$ de l'adénome), ou la présence de lésion de dysplasie de haut grade ou de carcinome <i>in situ</i> (catégorie 4.1 ou 4.2)			
* si classification normale			

## MALADIE DE CROHN (1)

La stratégie thérapeutique de la maladie de Crohn dépend de la gravité de la poussée de la maladie, c'est-à-dire de l'intensité des symptômes, de l'allure évolutive de la maladie, de l'aspect endoscopique et du retentissement sur la qualité de vie.

Le traitement développé ci-dessous repose sur le consensus européen de 2010 [1]. L'indice de Best (ou CDAI pour *Crohn Disease Activity Index*) permet d'évaluer la sévérité d'une poussée et de suivre l'évolution.

### Poussée minime ou modérée

#### Traitement symptomatique

##### ► Mesures générales

Le tabac aggrave et favorise les poussées de la maladie et son arrêt doit être conseillé.

Un soutien psychologique voire un traitement psychotrope peut être utile, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie psychosomatique.

Un arrêt de travail de quelques jours peut être prescrit.

##### ► Traitement antalgique

**Antispasmodique** type **SPASFON** 1 à 2 cp. x 3/j et/ou **antalgique** type **paracétamol (DOLIPRANE)** 1 à 2 cp. à 500 mg x 3/j.

##### ► Traitement d'une carence martiale

**Fumarate ferreux (FUMAFER)** : 1 cp. x 3/j voire en cas de malabsorption ; **VENOFER** :

posologie à adapter au taux d'hémoglobine.

##### ► Traitement de la diarrhée

**Ralentisseur du transit** en l'absence de forme sténosante, **lopermamide (IMODIUM)** : 1 à 3 gél./j à adapter à l'intensité de la diarrhée.

#### Mesures diététiques

Un régime sans résidus est nécessaire au début du traitement. Il sera progressivement élargi.

#### Traitement anti-inflammatoire

En l'absence de contre-indication, on utilise actuellement en première intention et en traitement d'attaque un **anti-inflammatoire colique** dans :

– localisation iléo-cæcale et colique droite, on utilise en première intention le **budésônide (ENTOCORT)** : 9 mg/j en 1 prise le matin pendant 8 sem. ; puis diminution progressive. Ce traitement est plus efficace que la **mésalazine (PENTASA)** : 1 g x 3 à 4/j qui n'a jamais clairement démontré son efficacité dans ces indications ;

– localisation colique, on peut utiliser la **sulfasalazine (SALAZOPYRINE)** ou la **mésalazine (PENTASA)** : 1 g x 3 à 4/j.

Dans les formes distales, on peut proposer des lavements anti-inflammatoires ; par exemple, **PENTASA** (suspension rectale) : 1 lavement/j.

Les antibiotiques ne sont pas recommandés.

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (1)

## ■ Mésalazine (ou acide 5-aminosalicylique ou 5-ASA)

<b>PENTASA</b>				
RCH (attaque) : 2 à 4 g/j en 3-4 prises	100 cp. séc. 500 mg	43,23	65 %	0,43
Crohn (attaque) : 4 g/j en 4 prises	60 cp. 1 g	50,77	65 %	0,85
RCH (entretien) : 0,75 à 1,5 g/j en 3 prises	120 sach. dose 1 g	97,73	65 %	0,81
	60 sach. dose 2 g	97,73	65 %	1,63
Crohn (entretien) : 2 g/j en 4 prises	15 sup. 1 g	32,25	65 %	2,15
1 sup. le soir au coucher	5 susp. rectale 1 g	22,54	65 %	4,51
1 lavement au coucher				

**ROWASA**

Idem <b>PENTASA</b>	90 cp. 250 mg	19,72	65 %	0,22
	90 cp. 500 mg	39,33	65 %	0,44
1 sup. x 2 à 3/j	15 sup. 500 mg	10,72	65 %	0,71
	30 sup. 500 mg	20,90	65 %	0,70

**FIVASA**

RCH (attaque) : 4 à 8 cp. à 400 mg/j ou 2 à 4 cp. à 800 mg/j ou 2 à 3 sup./j	100 cp. 400 mg	39,22	65 %	0,39
	30 sup. 500 mg	22,04	65 %	0,73
RCH (entretien) : 2 à 4 cp. à 400 mg/j ou 1 à 2 cp. à 800 mg/j ou 1 sup. le soir au coucher	90 cp. 800 mg	67,15	65 %	0,75
Crohn (entretien) : 6 cp. à 400 mg/j ou 3 cp. à 800 mg/j				

## ■ Olsalazine

**DIPENTUM**

Idem <b>FIVASA</b>	100 gél. 250 mg	40,33	65 %	0,40
	60 cp. 500 mg	47,54	65 %	0,79

**MALADIE DE CROHN (2)****Poussée plus intense ou résistant au traitement précédent****Traitement symptomatique et diététique**

Il est le même que pour les formes minimales et modérées.

**Traitement anti-inflammatoire**

Une corticothérapie orale est indiquée. On utilise de la **prednisone (CORTANCYL)** à la dose d'attaque de 1 mg/kg/j en une prise le matin.

Ce traitement est poursuivi jusqu'à l'obtention d'une rémission clinique (3 à 7 sem.). Il est ensuite progressivement diminué : 10 mg/sem. jusqu'à mi-dose puis 5 mg/sem. pour une durée totale de traitement d'environ 12 sem. On adjoint habituellement à la corticothérapie un traitement préventif de l'ostéoporose (qui

n'a jamais démontré son efficacité) ; par exemple **biphosphonate, ACTONEL 5** : 1 cp./j ou **ACTONEL 35** : 1 cp./sem. à associer à une supplémentation en **calcium et vitamine D** type **CACIT VITAMINE D3** 1 000 mg/880 UI 1 sach./j.

Si la corticothérapie n'est pas efficace (corticorésistance) ou bien son arrêt impossible (corticodépendance) en cas de rechute, on propose un traitement par **anticorps anti-TNF alpha (REMICADE)** 5 mg/kg en perf. de 2 h à renouveler après 2 et 6 sem., avec ou sans **immunosupresseur** type **azathioprine (IMUREL)**.

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC, doit être systématique car le risque est important.

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

La **mésalazine (5-ASA)**, fraction active de la **sulfasalazine** (responsable de l'activité thérapeutique) a des actions immunosuppressives et anti-inflammatoires.

La libération digestive de la molécule active (pour les formes orales) est fonction de la spécialité :

**PENTASA** : le **5-ASA**, encapsulé dans des microgranules enfermés dans un cp., diffuse à travers la membrane de ces granules sur toute la longueur de l'intestin, du duodénum au rectum ; 65 % de la dose est retrouvée dans le côlon.

**ROWASA** et **FIVASA** : cp. gastrorésistants libérant le **5-ASA** dans l'iléon terminal et le côlon ascendant.

**DIPENTUM** : deux molécules de **5-ASA** sont reliées entre elles par un pont azoïque (comme dans la **SALAZOPYRINE**). Sous l'action des bactéries coliques, le pont azoïque est rompu et le **5-ASA** libéré : 95 % du produit arrive au niveau colique.

## INDICATIONS

– Voie orale

Rectocolite hémorragique : traitement d'attaque des poussées légères ou modérées ; traitement d'entretien.

Maladie de Crohn : traitement des poussées légères ou modérées ; prévention des poussées aiguës, pour les formes fréquemment récidivantes.

– Voie rectale

Localisations rectales ou rectosigmoïdiennes des poussées légères ou modérées de rectocolite hémorragique.

## CONTRE-INDICATIONS

## Allaitement.

Hypersensibilité à l'**aspirine** et aux salicylés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène

de la **mésalazine** et un effet malformatif chez l'homme n'est pas attendu ; il n'existe pas actuellement de données suffisantes pour évaluer un effet malformatif ou fœtotoxique de la **mésalazine** lorsqu'elle est administrée pendant la grossesse. Le traitement par **mésalazine** sera poursuivi aux doses efficaces les plus faibles possibles, en évitant de dépasser 2 g/j.

Le métabolisme hépatique et l'élimination rénale imposent la prudence en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Une intolérance à la **sulfasalazine** ne contre-indique pas l'emploi du **5-ASA** (en l'absence d'hypersensibilité aux salicylés) car elle traduit vraisemblablement une intolérance à la **sulfapyridine**, partie inactive de la molécule.

Des néphropathies (néphrite tubulo-interstitielles ou syndromes néphrotiques) ont été rapportées (exceptionnellement avec la forme rectale). L'hypovolémie serait favorisante et la réversibilité dépend de la durée du traitement. Un calcul de la clairance de la créatinine et une recherche de protéinurie doivent être pratiqués tous les 6 mois.

## EFFETS INDÉSIRABLES

– Néphropathies (cf. Précautions d'emploi).

– Pneumopathies interstitielles (toux fébrile) régressent à l'arrêt du traitement.

Exceptionnellement : fibrose pulmonaire.

Voie orale : **olsalazine (DIPENTUM)** : diarrhée (25 %), prévenue par une augmentation progressive des doses, pouvant conduire à diminuer la posologie voire à arrêter le traitement. Rarement et en début de traitement : céphalées, nausées, vomissements, vertiges ; exceptionnellement : pancréatite aiguë, péricardite, myocardite, leucopénie, alopecie.

Voie rectale : intolérance, douleurs abdominales.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Absence de données.

## MALADIE DE CROHN (3)

### Poussée sévère

Le traitement doit être fait en milieu spécialisé.

#### Traitement symptomatique

Des **antalgiques** périphériques, des **antispasmodiques** et des **ralentisseurs du transit intestinal** peuvent être prescrits (cf. *supra*).

Le patient doit rester à jeun jusqu'à l'amélioration des symptômes. La nutrition artificielle pendant plusieurs semaines, par voie parentérale ou entérale, est aussi efficace que la corticothérapie pour obtenir une rémission. Elle nécessite toutefois des hospitalisations de longue durée et est réservée à des cas particuliers (enfants, complications, etc.).

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC, doit être systématique car le risque est important.

#### Traitement anti-inflammatoire

Le traitement repose soit :

– sur une corticothérapie parentérale intraveineuse : **méthylprednisolone (SOLU-MÉDROL)** à la dose de 1 mg/kg/j d'équivalent prednisone (soit 0,8 mg/kg/j) en une injection le matin. Le relais par voie orale se fait après 5 j de traitement IV.

– soit les **anticorps anti-TNF- $\alpha$** , **infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg en une injection IV à renouveler ; on peut associer de l'**azathioprine (IMUREL)** pour éviter la formation d'anticorps anti-TNF- $\alpha$ .

### Formes corticodépendantes

C'est une rechute de la colite à la décroissance de la corticothérapie.

Le maintien d'une corticothérapie à long terme est impossible en raison des effets secondaires.

On introduit un **immunosuppresseur** : **azathioprine (IMUREL)** à la dose de 2 à 2,5 mg/kg/j en 1 ou 2 prises. L'effet bénéfique apparaît après au minimum 3 mois de traitement et un arrêt progressif de la corticothérapie devient possible. On ne peut conclure à un échec de l'**azathioprine** qu'après 1 an de traitement bien conduit.

#### Prévention de la toxicité hématologique de l'IMUREL

Le risque de l'**azathioprine (IMUREL)** est la toxicité hématologique. Elle est liée à des polymorphismes de la TMPT (thiopurine méthyl-transférase) qui est une enzyme clé du métabolisme des purines. Dans la population, il existe 11 % d'hétérozygotes et 0,3 % d'homozygotes mutants pour la TMPT. La posologie doit être réduite de 50 % chez les hétérozygotes et le traitement ne doit pas être administré chez les homozygotes. Un phénotypage de la TMPT peut être recommandé avant l'introduction de l'**IMUREL**.

On peut également proposer de doser les métabolites de l'**azathioprine** : les 6TGN. Un niveau sérique correct témoigne de la bonne posologie de l'**azathioprine**.

La présence d'anticorps anti-TNF- $\alpha$  peut expliquer une inefficacité du traitement ; ils peuvent être prévenus par l'ajout d'**IMUREL**.

En cas d'inefficacité du **REMICADE**, on peut tester un autre **anti-TNF- $\alpha$** , l'**adalimumab (HUMIRA)** toutes les 2 sem. par voie SC : 80 mg à S0 puis 40 mg toutes les 2 sem., voire 160 mg à S0, 80 mg à S2 puis 40 mg toutes les 2 sem.

Une intervention chirurgicale peut être envisagée en cas de lésions limitées mais le risque est la récurrence à très court terme.



**ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (3)****■ Budésônide**

<b>ENTOCORT</b>					
Maladie de Crohn, hépatite auto-immune Traitement d'attaque : 9 mg en 1 prise le matin avant le petit-déjeuner pdt 8 sem., puis arrêt progressif du traitement Traitement d'entretien : en attente de l'efficacité du traitement immunosuppresseur : substitution de la <b>prednisolone</b> à une dose < 30 mg/j	45 gél. 3 mg	<b>55,70</b>	I	65 %	<b>1,24</b>
	90 gél. 3 mg	<b>107,09</b>	I	65 %	<b>1,19</b>
<b>MIKICORT</b>					
Maladie de Crohn Traitement d'attaque : 1 gél. x 3/j Colite collagène : traitement de la diarrhée	50 gél. 3 mg	<b>55,70</b>	I	65 %	<b>1,11</b>

**PROPRIÉTÉS**

Glucocorticoïde dont les particularités sont :

- une résorption digestive au niveau de l'iléon et du côlon ascendant ;
- des métabolites hépatiques avec peu d'effet glucocorticoïde. Ainsi, le **budésônide** entraîne peu d'effet sur la cortisolémie (donc faible freinage surrénalien). Globalement, par rapport à la **prednisone**, les Effets indésirables sont franchement diminués ;
- une efficacité sur l'inflammation colique à peine inférieure à celle de la prednisone.

**INDICATIONS**

Traitement d'attaque de la maladie de Crohn d'intensité légère à modérée affectant l'iléon et/ou le côlon ascendant.

Hépatite auto-immune.

**CONTRE-INDICATIONS**

Bien qu'il n'existe aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie vitale, le **budésônide** est contre-indiqué dans les situations suivantes :

- tout état infectieux, certaines viroses évolutives (herpès, varicelle, zona) ;
- vaccins vivants ;
- états psychotiques non contrôlés par un traitement ;

– hypersensibilité aux différents constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse et allaitement** : pas d'effet tératogène des **corticoïdes** connu chez l'homme. Surveillance néonatale du nouveau-né rapprochée (poids, diurèse, glycémie).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares (< 5 %) : aggravation d'une diarrhée ou de rectorragies.

Non différents du placebo : nausées, dyspepsie.

Peuvent aussi être observés : crampes, tremblements, palpitations, nervosité, vision floue, réactions cutanées (éruption, prurit), troubles menstruels.

Les effets secondaires inhérents à toute corticothérapie peuvent être observés mais sont beaucoup plus rares (5 à 15 %).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Éviter l'association avec des médicaments donnant des torsades de pointe : **suinidiniques, disopyramide, sotalol, amiodarone, bépridil, antidépresseurs tricycliques, sultopride, cispripide, érythromycine IV, sparfloxacine, halofantrine**, et en général tous les médicaments pouvant provoquer une hypokaliémie.

**MALADIE DE CROHN (4)****Formes corticorésistantes**

C'est une réponse clinique incomplète après 7 sem. de traitement par prednisone à la dose de 1 mg/kg/j.

Le traitement par **anticorps anti-TNF alpha, infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg en une injection éventuellement associée à l'**azathioprine (IMUREL)** par voie orale à la dose de 2 mg/kg/j est devenu la référence.

**Traitement d'entretien**

Il doit être envisagé dès la première poussée.

On utilise la **mésalazine (PENTASA)** : 2 à 4 g/j répartis sur le nyctémère bien que les études ne confirment pas son efficacité.

En cas de corticothérapie préalable, le **PENTASA** est introduit lorsque la dose de **prednisone** atteint 10 mg.

En cas d'échec, la mise sous immunosuppresseur, **azathioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j, est indiquée, pour une durée minimale de 4 ans.

Dans les formes distales rechutant malgré le traitement oral, on peut proposer un traitement topique anti-inflammatoire d'entretien ; par exemple : **PENTASA** (suspension rectale) : 1 lavement tous les 1 à 3 j.

Un traitement d'entretien par **anticorps anti-TNF alpha, infliximab (REMICADE)** doit être proposé : 5 à 10 mg/kg IV toutes les 8 sem. ou **adalimumab (HUMIRA)** : 20 mg toutes les 2 sem. en SC. L'adjonction d'**aza-**

**thioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j doit être discutée.

**Formes particulières****Formes ano-périnéales**

Ulcérations et fissures répondent au traitement général et ne nécessitent pas de chirurgie.

Abcès et fistules imposent un traitement chirurgical (drainage, mise à plat) en respectant à tout prix le sphincter anal.

En général, les lésions anopérinéales répondent au **métronidazole (FLAGYL)** : 1 cp. à 500 mg x 3/j ou à la **ciprofloxacine (CIFLOX)** : 1 cp. à 500 mg x 2/j.

Dans les formes difficiles à cicatriser, en l'absence d'abcès, l'**infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg répété 3 fois à 8 sem. d'intervalle est utilisé.

**Forme localisée iléo-cæcale**

Une forme localisée iléo-cæcale avec des manifestations obstructives mais sans signe d'activité peut être traitée soit de façon chirurgicale soit, si la longueur de la sténose est inférieure à 10 cm, par stricturoplastie.

**Formes avec manifestations extradigestives**

Les manifestations extradigestives répondent en général à la corticothérapie.

Si les atteintes articulaires sont prédominantes, la **sulfasalazine (SALAZOPYRINE)** doit être utilisée car la **sulfapyridine** est active sur les atteintes articulaires : 1 g x 2 à 3/j. On peut également proposer les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** malgré leur toxicité intestinale.

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (4)

## ■ Sulfasalazine

SALAZOPYRINE					
Traitement d'attaque : 4 à 6 g/j en 3 à 6 prises	100 cp. 500 mg	14,07	I	65 %	0,14
Traitement d'entretien : 1 g x 2/j					

## PROPRIÉTÉS

Molécule unissant par un pont azoïque une molécule d'acide 5-aminosalicylique (partie active) et une molécule d'un **sulfamide (sulfapyridine)** qui sert de transporteur.

Après ingestion, la **sulfasalazine** est scindée par les bactéries de la flore colique en acide 5-aminosalicylique (absorbé à 30 %) et en **sulfapyridine** (absorbée presque totalement et métabolisée au niveau du foie).

L'acide 5-aminosalicylique a des actions immunosuppressives et anti-inflammatoires.

## INDICATIONS

Rectocolite hémorragique (traitement d'attaque et d'entretien).

Maladie de Crohn colique (traitement d'attaque et d'entretien).

Polyarthrite rhumatoïde.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux **sulfamides** ou aux salicylés.

Déficit en G6PD.

Prématurés et nouveau-nés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : réduire les doses mais ne pas arrêter le traitement du fait du risque de poussée de la maladie.

Assurer une hydratation abondante.

Surveiller régulièrement la NFS et les urines (diurèse).

Réduire les doses en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, anorexie (cédant avec la diminution des doses).

Troubles hématologiques : anémies hémolytiques immunoallergiques, neutropénies, thrombopénie, aplasie médullaire ; ces manifestations imposent l'arrêt du traitement.

Réactions d'hypersensibilité : éruption cutanée (rash, urticaire), syndrome de Lyell, fièvre, anaphylaxie, éosinophilie ; ces manifestations imposent l'arrêt du traitement.

Coloration possible des urines en brun pendant le traitement.

Rares : oligospermie chez l'homme, lentement réversible.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K** et des **sulfamides hypoglycémiants**.

Absorption du produit augmentée en cas d'utilisation de **ralentisseur du transit**.

Diminution de l'absorption d'**acide folique**.

Diminution de la digoxinémie.

## MALADIE DE CROHN (5)

### Forme de la femme enceinte

Le risque d'une maladie active est bien supérieur à celui des médicaments. C'est la maladie de Crohn elle-même et non la grossesse qui doit guider le traitement.

Toute poussée survenant en cours de grossesse doit être traitée immédiatement.

#### ► Médicaments autorisés

La **SALAZOPYRINE**, le **PENTASA** et la corticothérapie peuvent être utilisés en cours de grossesse.

Une supplémentation en folates est nécessaire en cas de traitement par **SALAZOPYRINE** (diminution de l'absorption de l'acide folique indispensable au développement fœtal) : **SPECIAFOLDINE**, 1 cp. (5 mg) x 3/j à débiter avant la conception.

#### ► Médicaments probablement inoffensifs

L'**azathioprine (IMUREL)** est tératogène chez l'animal. Toutefois, un nombre important de grossesses a été rapporté chez des femmes traitées par **azathioprine** sans qu'il n'y ait de problème particulier. Les attitudes suivantes peuvent être conseillées :  
– contraception lors de la mise sous **IMUREL** ;

– tentative d'arrêt de 3 à 6 mois de l'**azathioprine** avant une grossesse si le traitement a été poursuivi pendant 2 ans ;  
– discuter l'attitude avec la patiente si une grossesse a été débutée sous **IMUREL**.

L'**IMODIUM**, la **ciclosporine** et le **FLAGYL** devraient être évités (données insuffisantes pour les prescrire sans réserve).

Plusieurs cas de grossesse ont été rapportés sous **anticorps anti-TNF alpha**, **infliximab (REMICADE)** sans malformation pour le fœtus. À la naissance, il existe un risque de BCGite en cas de vaccination

BCG ; les vaccins vivants doivent être évités dans l'année qui suit la naissance.

#### ► Médicaments contre-indiqués

Le **méthotrexate** est contre-indiqué.

### Maladie de Crohn et contraception

Le risque thromboembolique est augmenté au cours de la maladie de Crohn. Il faut donc préférer les **œstroprogestatifs** faiblement dosés ou les progestatifs purs. L'utilisation d'un stérilet est possible.

### Forme de l'enfant

L'arsenal thérapeutique est le même que chez l'adulte.

La corticothérapie devra être si possible évitée ; des administrations discontinues (1 j sur 2) sont possibles lors de la décroissance. La dose d'attaque est la même que chez l'adulte (1 mg/kg/j) sans dépasser 60 mg/j.

Les **anticorps anti-TNF alpha**, **infliximab (REMICADE)** sont efficaces.

Les techniques nutritionnelles (nutrition entérale ou parentérale exclusive) sont utiles dans les formes avec retard statural pour permettre le sevrage en **corticoïdes**.

### Maladie de Crohn et cancer

Le risque de cancer rectocolique compliquant une maladie de Crohn semble d'autant plus élevé que la maladie a débuté à un âge jeune et que la durée d'évolution est importante. Les modalités de surveillance par coloscopie font l'objet de recommandations de l'HAS [2]. Une coloscopie totale avec biopsies (tous les 10 cm, au minimum 30 prélèvements) est recommandée :

- en cas de pancolite, après 10 ans d'évolution puis tous les 2-3 ans ;
- en cas de colite gauche, après 15 ans d'évolution, puis tous les 2-3 ans.

L'association des patients atteints d'une maladie de Crohn est l'Association François Aupetit - Hôpital Saint-Antoine - Bât. Jacques Caroli - 9<sup>e</sup> étage - 184, rue du

Faubourg Saint-Antoine - 75571 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 43 07 00 49 - Courriel : info-accueil@afa.asso.fr - Site Internet : www.afa.asso.fr

## ANTICORPS ANTI-TNF ALPHA

## ■ Infiximab

REMICADE					
Maladie de Crohn sévère : 5 mg/kg en 2 h suivis de la même perf. après 2 et 6 sem. Maladie de Crohn fistulisée : 5 mg/kg en 2 h suivis de la même perf. après 2 et 6 sem. Retraitement : possible dans les 14 sem. suivant la dernière perf. Polyarthrite rhumatoïde : 3 mg/kg en 2 h suivis par des perf. supplémentaires	1 fl. 100 mg	HOP	I		

L'**adalimumab (HUMIRA)** est décrit en Rhumatologie - Orthopédie.

**PROPRIÉTÉS**

Anticorps monoclonal chimérique humain/souris inhibant l'activité fonctionnelle du TNF (Tumor Necrosis Factor) alpha humain.

**INDICATIONS**

Maladie de Crohn active, sévère ou fistulisée chez des patients n'ayant pas répondu à un traitement corticoïde ou immunosuppresseur bien conduit.

Maladie de Crohn fistulisée ne répondant pas aux autres traitements.

Polyarthrite rhumatoïde lorsque la réponse au traitement de fond est inappropriée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : nécessité d'une contraception efficace.

**Allaitement.**

Sepsis, infection évolutive.

Hypersensibilité à l'**infiximab**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réaction aiguë à la perfusion : elle survient au cours de la première ou seconde perfusion ou dans les 2 h qui les suivent. Dans ce cas, ralentir voire interrompre la perfusion jusqu'à régression des symptômes et reprendre à une vitesse plus faible. Une prémédication par **paracétamol** ou **antihistaminique H<sub>1</sub>** peut être pratiquée. Risque de réaction allergique sévère en cas d'apparition d'anticorps anti-infiximab. Hypersensibilité retardée : elle s'observe en cas de retraitement après une période sans traitement de 2 à 4 ans.

Prédisposition aux infections opportunistes par

diminution de l'immunité à médiation cellulaire (tuberculose principalement) : traiter toute infection avant l'administration d'**infiximab** et durant les 4 mois qui suivent son arrêt.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

cf. Précautions d'emploi.

Réaction aiguë à la perfusion : fièvre, frissons, urticaire, douleurs thoraciques, hypo- ou hypertension.

Hypersensibilité retardée : myalgies, arthralgies, fièvre, rash, prurit, œdème facial pouvant être associé à une dysphagie, céphalées.

Infections opportunistes : tuberculose, pneumocystose, histoplasmosse ; coccidioïdomycose, aspergillose, candidose.

Apparition d'anticorps antichimériques humains (AACH) : risque augmenté d'effets secondaires.

Troubles lymphoprolifératifs : des lymphomes et des myélomes ont été rapportés sous **infiximab** sans que la responsabilité de ce produit soit certaine.

Anticorps anti-ADN natif (double brin), rarement lupus.

De nombreux autres effets ont été rapportés avec une fréquence rare de l'ordre de 1 pour 1 000 ; sans être exhaustif :

- anémie, leucopénie, thrombopénie ;
- aggravation de maladies démyélinisantes ;
- bradycardie, palpitations ;
- myalgies, arthralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'**infiximab** ne doit pas être mélangé à d'autres médicaments.

## MALADIE DE CROHN (6)

## Indications des différents traitements de la maladie de Crohn en fonction de la gravité

Poussée minime ou modérée	<b>Budésônide</b> (9 mg/j) si forme iléo-colique droite <b>Mésalazine</b> (4 g/j) ou <b>sulfasalazine</b> (4 g/j) si forme exclusivement colique
Poussée plus intense ou résistante au traitement précédent	<b>Prednisone</b> (1 mg/kg/j) <b>Méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)</b> : 0,8 mg/kg/j puis <b>prednisone (CORTANCYL)</b> : 1 mg/kg/j
Poussée sévère	<b>Méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)</b> : 0,8 mg/kg/j puis <b>prednisone (CORTANCYL)</b> : 1 mg/kg/j <b>Infliximab (REMICADE)</b> : 5 mg/kg <b>Ciclosporine</b> Chirurgie Nutrition parentérale totale
Traitement d'entretien	<b>Mésalazine</b> (2 à 4 g/j) <b>Azathioprine (IMUREL)</b> : 2 mg/kg/j <b>Infliximab (REMICADE)</b> : 5 à 10 mg/kg/8 sem. <b>Adalimumab (HUMIRA)</b> : 20 mg/2 sem.
Corticodépendance	Chirurgie <b>Azathioprine</b> (2 mg/kg/j) <b>Méthotrexate</b> (25 mg/sem. en IM) <b>Infliximab (REMICADE)</b> <b>Adalimumab (HUMIRA)</b>
Corticorésistance	<b>Azathioprine (IMUREL)</b> <b>Infliximab (REMICADE)</b> <b>Adalimumab (HUMIRA)</b>

## MALADIE DE CROHN (7)

# **INDICE DE BEST (CDAI)**

Les données sont recueillies sur une semaine, jusqu'à la veille de l'examen clinique, directement par le malade, sur une carte préétablie.

	J	1	2	3	4	5	6	7	somme 1 à 7	
<b>1. Nombre de selles</b> liquides ou très molles										X 2 =
<b>2. Douleurs abdominales</b> (absence = 0, légères = 1, moyennes = 2, intenses = 3)										X 5 =
<b>3. Bien-être général</b> (bon = 0, moyen = 1, médiocre = 2, mauvais = 3, très mauvais = 4)										X 7 =
<b>4. Autres manifestations</b>										
• arthrites ou arthralgies										
• iritis ou uvéite										
• érythème noueux, pyoderma, aphtes buccaux										
• fissures, fistules, abcès anal ou périrectal										
• autre fistule intestinale										
• fièvre (> 38° C durant la semaine)										
<b>5. Traitement antidiarrhéique</b> par LOPÉRAMIDE ou opiacés (non = 0, oui = 1)										X 30 =
<b>6. Masse abdominale</b> (absente = 0, douteuse = 1, certaine = 5)										X 10 =
<b>7. Hématocrite</b> • Homme : 47 – hématocrite = • Femme : 42 – hématocrite =										X 6 =
<b>8. Poids</b> $100 \times \left(1 - \frac{\text{poids actuel}}{\text{poids avant la maladie (sinon poids théorique)}}\right) =$										
										TOTAL =

(\* Ajouter ou soustraire selon le signe)

## **Interprétation :**

Indice < 150 : maladie quiescente.

Indice = 150 à 450 : maladie active.

Indice > 450 : maladie sévère.

## **CONSENSUS**

[1] The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management, ECCO, 2010

[2] Endoscopie digestive basse : indications en dehors du dépistage en population, HAS, 2004

## RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (1)

La stratégie thérapeutique est fondée sur le consensus européen [1].

Contrairement à la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique a une allure ascendante, du rectum au caecum, mais

n'atteint jamais les autres segments de l'intestin.

La sévérité de la poussée peut être appréciée par le score de Truelove et Witts.

### Score de Truelove et Witts

Poussée	Légère	Sévère
Nombre d'évacuations/j	≤ 4 peu sanglantes	≥ 6 sanglantes
Température vespérale	Absence de fièvre	≥ 37,5 °C ou ≥ 37,8 °C 2 j/4
Fréquence cardiaque	Absence de tachycardie	≥ 90/min
Hémoglobine	Absence d'anémie	< 75 % de la normale
Vitesse de sédimentation	< 30 mm	≥ 30 mm
La poussée est moyenne dans les situations intermédiaires		

### Poussée minime ou modérée

#### Traitement symptomatique

##### ► Mesures générales

L'arrêt du tabac favorise et aggrave les poussées de la maladie ; le sevrage ne peut donc être conseillé en pleine poussée.

Un soutien psychologique voire un traitement psychotrope peuvent être utiles, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie psychosomatique.

Un arrêt de travail de quelques jours est utile.

##### ► Traitement antalgique

**Antispasmodique** type **SPASFON** 1 à 2 cp. x 3/j et/ou **antalgique** type **paracétamol (DOLIPRANE)** 1 à 2 cp. à 500 mg x 3/j.

##### ► Traitement d'une carence martiale

**Fumarate ferreux (FUMAFER)** : 1 cp. x 3/j voire en cas de malabsorption **VENOFER** : posologie à adapter au taux d'hémoglobine.

##### ► Traitement de la diarrhée

**Ralentisseur du transit, lopéramide (IMO-DIUM)** : 1 à 3 gél./j à adapter à l'intensité de la diarrhée. Une posologie trop importante peut favoriser l'apparition d'une colectasie.

### Mesures diététiques

Un régime sans résidus est nécessaire au début du traitement. Il sera progressivement élargi.

#### Traitement anti-inflammatoire

En l'absence de contre-indication, on utilise actuellement en première intention et en traitement d'attaque un **anti-inflammatoire colique** de type **mésalazine (PENTASA)** : 1 g x 3 à 4/j.

Ce traitement doit être préféré à la **sulfasalazine** 1 g x 3 à 4/j qui libère moins d'acide 5-aminosalicylique dans le côlon (à dose égale) et a plus d'effets secondaires.

Dans les formes distales ne dépassant pas l'angle colique gauche, un traitement local anti-inflammatoire peut être suffisant. On peut utiliser de la **mésalazine** en suppositoires pour les formes les plus basses : **ROWASA** : 1 sup. x 3/j pendant 3 à 4 sem. Si la forme est plus étendue, on préférera les lavements de **PENTASA** : 1 lavement au coucher, ou de **corticoïdes** : **SOLUPRED** 40 à 60 mg dissous dans 100 mL de sérum physiologique, 1 lavement/j pendant 3 à 4 sem. à espacer progressivement ou **COLOFOAM** 1 lavement/j pendant 1 mois puis à espacer progressivement.

L'association d'un traitement oral à un traitement local permet d'augmenter leur efficacité.



## RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (2)

### Éléments permettant de distinguer une maladie de Crohn d'une rectocolite hémorragique

MALADIE DE CROHN	RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE
Atteinte discontinue, plurisegmentaire Présence d'intervalles de muqueuse saine Tube digestif éventuellement touché dans son ensemble Ulcérations transmursales profondes et aphtoïdes superficielles Granulome tuberculoïde caractéristique	Atteinte continue, d'aval en amont Absence d'intervalle de muqueuse saine Atteinte exclusivement rectocolique Pas d'ulcération mais muqueuse congestionnée et fragile, « pleurant » le sang Absence de granulome tuberculoïde

### Poussée plus intense ou résistant au traitement précédent

#### Traitement symptomatique et diététique

Il est le même que pour les formes minimales et modérées.

Les **ralentisseurs du transit** doivent être évités du fait du risque de colectasie.

#### Traitement anti-inflammatoire

Une corticothérapie orale est indiquée. On utilise de la **prednisone (CORTANCYL)** à la dose d'attaque de 1 mg/kg/j en une prise le matin.

Ce traitement est poursuivi jusqu'à l'obtention d'une rémission clinique (3 à 7 sem.). Il est ensuite progressivement diminué : 10 mg/sem. jusqu'à mi-dose puis 5 mg/sem. pour une durée totale de traitement d'environ 12 sem.

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC doit être systématique car le risque est important.

On adjoint habituellement à la corticothérapie un traitement préventif de l'ostéoporose (qui n'a jamais démontré son efficacité) ; par exemple **SANDOCAL** : 1 sach. x 2/j et **STÉROGYL** : 1 gte x 2/j.

### Poussée sévère - mégacolon toxique

Le traitement doit être fait en milieu spécialisé car il existe un risque vital (perforation colique, hémorragie massive).

#### Traitement symptomatique

Des **antalgiques périphériques** et des **antispasmodiques** peuvent être prescrits (cf. *supra*). Les **ralentisseurs du transit** sont contre-indiqués.

Le patient doit rester à jeun jusqu'à l'amélioration des symptômes.

On effectue une rééquilibration hydro-électrolytique et on introduit une nutrition parentérale.

Si besoin : transfusion, antibiothérapie.

#### Traitement anti-inflammatoire


Une corticothérapie parentérale intraveineuse est indiquée. On utilise la **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** à la dose de 1 mg/kg/j d'équivalent prednisone (soit 0,8 mg/kg/j) en une injection le matin. La poursuite du traitement dépend de l'évolution.

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC doit être systématique car le risque est important.

En l'absence d'amélioration après 5 à 7 j de **corticoïdes voire d'emblée, à la place de la corticothérapie**, on peut introduire de la **ciclosporine** par voie IV à la posologie de 2 à 4 mg/kg/j.

L'**infliximab (REMICADE)** à la posologie de 5 mg/kg est également utilisable dans ce type de poussée. Les injections suivantes doivent être pratiquées aux sem. 2 et 6 puis toutes les 8 sem.

## RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (3)



## ► Amélioration après 5 j de corticothérapie

La corticothérapie par **prednisone (CORTANCYL)** à la dose de 1 mg/kg/j en une prise le matin assure le relais. Ce traitement est poursuivi jusqu'à l'obtention d'une rémission clinique (3 à 7 sem.). Il est ensuite progressivement diminué : 10 mg/sem. jusqu'à mi-dose puis 5 mg/sem. pour une durée totale de traitement d'environ 12 sem.

On adjoint habituellement à la corticothérapie un traitement préventif de l'ostéoporose ; par exemple **biphosphonate ACTONEL** 5 : 1 cp./j ou **ACTONEL** 35 : 1 cp./sem. à associer à une supplémentation en **calcium et vitamine D** type **CACIT VITAMINE D3** 1 000 mg/880 UI 1 sach./j.

## ► Absence d'amélioration après 5 j de corticothérapie

On peut proposer pour éviter la colectomie (cf. Arbre thérapeutique) :

– **ciclosporine IV (SANDIMMUN)** 2 mg/kg/j puis orale (**NÉORAL**) ;

– **infliximab (REMICADE).**

## Traitement d'entretien

Il doit être envisagé dès la première poussée.

On utilise la **mésalazine (PENTASA)** : 2 à 4 g/j répartis sur le nyctémère.

En cas de corticothérapie préalable, le **PENTASA** est introduit lorsque la dose de **prednisone** atteint 10 mg.

En cas d'échec, la mise sous **immunosuppresseur**, **azathioprine (IMUREL)** doit être discutée.

Dans les formes distales rechutant malgré le traitement oral, on peut utiliser un traitement topique d'entretien anti-inflammatoire ; par exemple **PENTASA** (suspension rectale) : 1 dose tous les 1 à 3 j.

Un traitement d'entretien par **anticorps anti-TNF alpha infliximab (REMICADE)** doit être introduit chez les patients qui ont répondu au traitement d'attaque par cette molécule : 5 mg/kg toutes les 8 sem.

## RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (4)

### Traitement chirurgical

#### ► Indications

- Colite sévère après 5 à 7 j ou traitement inefficace.
- Mégacolon toxique après 48-72 h de traitement inefficace.
- Perforation.
- Hémorragie massive.

#### ► Méthode

La chirurgie a pour but d'enlever le côlon et le rectum afin de supprimer la maladie. L'intervention de base consiste en une anastomose iléo-anale avec confection d'un réservoir iléal. On pratique une colectomie : l'iléon est sectionné au ras de la valvule de Bauhin ; la proctectomie est associée à une mucosectomie sur les 3 derniers cm du rectum ; le réservoir est confectionné avec les 20 à 30 cm d'iléon distal.

Certains préfèrent pratiquer une anastomose iléo-rectale. La conservation du rectum permet d'améliorer la continence mais expose au risque de récurrence et/ou de cancer sur le rectum restant.

Cette intervention nécessite d'avoir formellement éliminé une maladie de Crohn.

#### ► Résultats

Le nombre de selles est en moyenne de 5 le jour et 1 la nuit. Il peut être diminué en utilisant des **ralentisseurs du transit**.

La continence est parfaite dans 75 % des cas le jour et 50 % la nuit ; chez 2 % des malades, l'incontinence impose une iléostomie ; dans les autres cas, il s'agit de fuites intermittentes.

La pouchite est une inflammation du réservoir qui survient chez 20 % des

patients. Elle se traduit par une fièvre, une diarrhée parfois sanglante et un malaise général. Le **FLAGYL**, 500 mg x 2 à 3/j, est efficace en 10 j ; la **mésalazine** en suppositoires est une alternative.

### Rectocolite hémorragique et grossesse

Le risque d'une maladie active est bien supérieur à celui des médicaments. C'est la rectocolite elle-même et non la grossesse qui doit guider le traitement.

Les médicaments autorisés sont les mêmes que pour la maladie de Crohn : **SALAZOPYRINE**, **PENTASA**, corticothérapie, **IMUREL** à discuter. Des grossesses ont eu lieu sous **anticorps anti-TNF alpha** et n'ont pas entraîné de malformation ; dans ce dernier cas il existe un risque de BCGite après vaccination par le BCG et les vaccins vivants doivent être évités la première année après la naissance.

### Rectocolite hémorragique et contraception

Le risque thromboembolique est augmenté au cours de la rectocolite hémorragique. Il faut donc préférer les **œstrogènes** faiblement dosés ou les progestatifs purs.

L'utilisation d'un stérilet est possible.

### Rectocolite hémorragique et cancer

Le risque de cancer rectocolique compliquant une rectocolite hémorragique est d'autant plus élevé que la maladie a débuté à un âge jeune et que la durée d'évolution est importante. Les modalités de surveillance restent à préciser. On peut proposer une coloscopie régulière à partir de 15 ans d'évolution, la fréquence devant être adaptée aux lésions retrouvées.

## RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE (5)

**Anastomose iléo-anale**

L'intervention chirurgicale la plus utilisée pour traiter une rectocolite hémorragique est la proctocolectomie avec mucosectomie distale, réservoir iléal et anastomose iléo-anale.

La colectomie enlève le côlon et le rectum au-dessus du plancher pelvien (voie d'abord abdominale) ; elle laisse donc en place un moignon rectal.


La proctectomie enlève par voie périnéale toute la muqueuse digestive restante jusqu'à la musculuse ; elle n'est donc pas traditionnelle puisqu'elle se résume à l'ablation de la muqueuse et pas à la résection large du rectum et de l'anus.

L'anastomose iléo-anale consiste à suturer l'extrémité inférieure du grêle à la ligne pectinée dans le canal anal pour garder une défécation « physiologique ».

Le réservoir consiste à agrandir l'iléon terminal pour qu'il remplace le rectum dans le stockage des matières entre les selles ; il peut être en « J », en « W » ou en « S ».

Cette intervention nécessite un appareil sphinctérien en excellent état et des sanitaires toujours présents. Le nombre de selles est de 6 par j en moyenne. Le sujet idéal est le patient de moins de 50 ans.

Cette intervention nécessite une iléostomie transitoire d'environ 6 sem. pour dériver les matières afin de laisser le temps à la poche iléale de cicatriser.

**CONSENSUS**

[1] European evidence-based Consensus on the management of ulcerative colitis : Current management, ECCO, 2008

**COLITE COLLAGÈNE - COLITE LYMPHOCYTAIRE****Diagnostic****Clinique**

Souvent asymptomatiques, ces maladies sont diagnostiquées lors des biopsies systématiques réalisées au cours d'une coloscopie pour « colopathie fonctionnelle ».

Les autres modes de révélation sont une diarrhée chronique aqueuse non sanglante avec quelques douleurs abdominales. L'état général est conservé.

**Examens complémentaires**

La coloscopie est macroscopiquement normale.

L'histologie montre un infiltrat lymphocytaire de l'épithélium (colite lymphocytaire) ou bien une bande collagène sous-épithé-

liale anormalement épaisse (colite collagène).

**Traitement**

L'évolution peut être spontanément favorable.

On utilise les mêmes médicaments que pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique :

- **anti-inflammatoire colique**, sulfasalazine (**SALAZOPYRINE**) : 1 g x 4/j,
- ou bien la mésalazine (**PENTASA**) : 1 g x 2 à 4/j,
- ou encore la corticothérapie (**CORTANCYL**) : 1 mg/kg/j en dose d'attaque pendant 4 sem. environ, à diminuer ensuite progressivement.

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (1)

L'ensemble de ce chapitre reprend les recommandations de la FFCD [1] [2] [3] et intègre également les recommandations de la Société française de chirurgie dans le cadre d'un partenariat avec l'HAS\*.

### Épidémiologie

Le cancer colorectal est le premier cancer en fréquence en France les deux sexes confondus ; son augmentation est constante : 35 000 nouveaux cas/an et 16 000 décès/an.

### Facteurs histo-pronostiques déterminants

Ce sont :

- le niveau d'invasion de la tumeur dans la paroi ;

- l'extension ganglionnaire ;
- le caractère complet ou non de l'exérèse.

La connaissance de l'atteinte ganglionnaire est fondamentale car elle conditionne la mise en place d'une chimiothérapie adjuvante. Le nombre minimum de ganglions à réséquer et examiner est de 8 et le nombre recommandé est de 23 ; celui-ci doit être mentionné sur le compte-rendu anatomopathologique.

### Classifications

Les classifications TNM et UICC doivent être utilisées, celle de Dukes doit être abandonnée.

### Classifications des cancers colorectaux

STADE UICC	TNM	EXTENSION TUMORALE
0	Tis N0 M0	Carcinome in situ (atteinte muqueuse sans extension à la sous-muqueuse à travers la muscularis mucosæ)
I	T1 N0 M0	Atteinte sous-muqueuse
II	T2 N0 M0	Atteinte musculieuse
IIA	T3 N0 M0	Atteinte sous-séreuse
IIB	T4 N0 M0	Atteinte séreuse (péritoine) et/ou envahissement des organes de voisinage sans métastases ganglionnaires
IIIA (T1, T2) ou B (T3, T4)	Tout T N1 M0	Atteinte de 1 à 3 ganglions régionaux
IIIC	Tout T N2 M0	Atteinte d'au moins 4 ganglions
IV	Tout T Tout N M1	Métastases (y compris atteinte ganglionnaire iliaque)

\* Gastroenterol Clin Biol 2007; 31: 159-1522

**SANG DANS LES SELLES (RECHERCHE DE)****■ Réaction peroxydasique de l'hémoglobine**

<b>HÉMOCCULT II</b>				
Mise en évidence de sang dans les selles	30 plaquettes 100 plaquettes 3 plaquettes			NR NR NR
<b>HÉMOCCULT II unitaire</b>				
Mise en évidence de sang dans les selles	3 plaquettes			NR

**PROPRIÉTÉS**

Recherche d'hémoglobine dans les selles par une réaction peroxydasique de l'hémoglobine.

évacateurs) doivent être explorés par des techniques endoscopiques.

**INDICATIONS**

Dépistage des polypes et cancers colorectaux chez les patients asymptomatiques de plus de 40 ans.

Les patients ayant des facteurs de risque importants (antécédents familiaux, symptômes

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter de consommer de la viande, des betteraves, des navets, des médicaments contenant du fer, de l'**acide ascorbique**, de l'**aspirine** ou des **AINS** afin de réduire le risque de fausse positivité du test.

Éviter de pratiquer le test en période menstruelle.

Il s'agit d'un test qui doit être utilisé dans des campagnes de dépistage de masse. Il ne doit pas être proposé à titre individuel par un médecin à son patient en dehors de ces campagnes. En effet, le test est :

- peu sensible : 50 % des cancers ne sont pas dépistés (nombre élevé de faux négatifs) ;
- peu spécifique : environ 50 % de tests faussement positifs.

Néanmoins, il est socioéconomiquement satisfaisant dans le cadre de campagnes de dépistage de masse.

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (2)

### Cancers non métastatiques

#### Bilan d'extension

##### ► Cancer du côlon

- Examen clinique.
- Scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste.
- Coloscopie (si incomplète en préopératoire, la refaire dans les 3 à 9 mois postopératoires).
- Opacification radiologique seulement si occlusion aiguë, coloscopie incomplète ou problème de repérage.
- Coloscanner (avec éventuellement coloscopie virtuelle en cas de coloscopie incomplète ou problème de repérage).
- Si doute sur une lésion métastatique en TDM, une IRM (foie) et/ou un PET-scan peuvent être nécessaires.
- Dosage de l'ACE ou antigène carcino-embryonnaire (accord d'experts mais non recommandé dans le consensus).

##### ► Cancer du rectum

En plus du bilan précédent, il faut ajouter ;

- le toucher rectal qui est le temps primordial de l'examen clinique. Il est réalisé sur un rectum vide, en décubitus dorsal, cuisses fléchies ou en décubitus latéral gauche ou en position genu-pectorale. Il évalue :
  - la distance de la tumeur par rapport à la marge anale et à la sangle puborectale,
  - la taille en cm,
  - la mobilité de la tumeur par rapport aux plans pariétaux profonds,
  - l'extension circonférencielle;
- une écho-endoscopie rectale et si la tumeur est de grande taille, une IRM pelvienne.

**Le traitement repose sur la chirurgie. En cas d'atteinte ganglionnaire, une chimiothérapie adjuvante est nécessaire.**

### Traitement chirurgical

C'est la base du traitement. Tout cancer résectable doit être résecté.

#### ► Préparation à l'intervention chirurgicale

- Il n'y a pas de preuve de l'utilité d'une préparation colique préopératoire, qui pourrait même être délétère en irritant le côlon. On ne prépare le côlon que pour la chirurgie d'un cancer du rectum : **COLOPEG** 2 fois 2 L la veille de l'intervention.
- Patient systématiquement prévenu de la possibilité éventuelle d'une stomie.
- Antibiothérapie périopératoire.

#### ► Cancer du caecum, du côlon droit, et de la partie droite du côlon transverse

Principe : exérèse du cancer avec une marge distale et proximale d'au minimum 5 cm, une marge circonférentielle saine et une exérèse en bloc du mésocôlon atteignant avec repérage du pédicule vasculaire.

L'abord peut se faire par voie coelioscopique ou par laparotomie.

- Exploration loco-régionale à la recherche d'une extension tumorale (foie et péritoine) avec si besoin examens extemporanés.
- Technique *no-touch* : ligature des pédicules artériels à leur origine au niveau des vaisseaux mésentériques supérieurs.
- Hémicolectomie droite associée à une exérèse des ganglions satellites.
- La marge de sécurité doit être de 5 cm minimum.
- Rétablissement de la continuité en 1 temps par anastomose iléo-transverse.
- Fermeture et examen anatomopathologique de la pièce opératoire.




**CANCER DU CÔLON – CHIMIOTHÉRAPIE****Protocole FOLFOX4**

PRODUIT	POSOLOGIE	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Oxaliplatine (ELOXATINE)</b>	85 mg/m <sup>2</sup> en 2 h dans 250 mL de G5 % en Y de l' <b>acide folinique</b> avec <b>gluconate de calcium</b> (1 g) et <b>sulfate de magnésium</b> (1 g) en 30 min IV avant et après l' <b>oxaliplatine</b> au J1 du LV5FU2	Toutes les 2 sem. (12 cycles)
LV5FU2 (simplifié)	<b>Acide folinique</b> 400 mg/m <sup>2</sup> (ou <b>I-folinique</b> 200 mg/m <sup>2</sup> ) en 2 h dans 250 mL G5 %, rincer puis <b>5-FU</b> 400 mg/m <sup>2</sup> en 10 min dans 100 mL de G5 % puis <b>5-FU</b> 2 400 mg/m <sup>2</sup> en perf. continue de 44 h dans G5 % par infuseur portable (qsp 220 mL, 5 mL/h), pompe ou pousse-seringue portable	Toutes les 2 sem.

**Protocole FOLFIRI**

PRODUIT	POSOLOGIE	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Irinotécan (CAMPTO)</b>	180 mg/m <sup>2</sup> en perf. de 90 min dans 250 mL de G5 % en Y de l' <b>acide folinique</b> au J1 du LV5FU2 simplifié.	Tous les 14 j avec évaluation après 4 cures (2 mois)

**CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (3)**

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (4)

### ► Cancer du transverse gauche et du côlon gauche

• L'abord peut se faire par laparotomie ou par voie coelioscopique.

• Exploration loco-régionale à la recherche d'une extension tumorale (foie et péritoine). Si besoin examens extemporanés.

• On peut envisager plusieurs types de résection colique gauche :

– **hémicolectomie gauche** : on pratique alors une ligature de l'artère mésentérique inférieure à son origine et le rétablissement de la continuité se fait par anastomose transverso-rectale en 1 temps ;

– **colectomie segmentaire** (sigmoïdectomie, colectomie gauche haute ou basse) systématiquement précédée d'une ligature du pédicule vasculaire correspondant. Anastomose colo-colique en 1 temps.

• Dans tous les cas, la marge de sécurité doit être de 5 cm minimum.

• Les ganglions satellites sont systématiquement résectionnés.

• Fermeture et examen anatomopathologique de la pièce opératoire.

Le nombre minimum de ganglions à examiner est de 12 pour évaluer l'extension ganglionnaire.

### ► Cancer du rectum

Une radio-chimiothérapie préopératoire est indiquée pour les cancer T3-T4 du moyen et du bas rectum ; elle est discutée en RCP dans les autres cas.

Le type d'intervention dépend de la localisation tumorale : il est impératif de laisser au moins 2 cm entre le pôle inférieur de la tumeur et la limite de la résection. L'intervention se fait le plus souvent par voie coelioscopique.

Les temps opératoires sont les suivants :

– exploration locorégionale à la recherche d'une extension tumorale (foie et péritoine) avec si besoin biopsies de toute zone suspecte et examens extemporanés,  
– ligature première des pédicules artériels (artère mésentérique inférieure à 1 cm de l'aorte).

### Cancer du tiers supérieur

• **Résection du rectum**, du mésorectum jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la lésion, et des chaînes ganglionnaires satellites.

• **Anastomose colorectale** en 1 temps. Pour les anastomoses les plus basses, une colostomie de protection est parfois nécessaire, le rétablissement de la continuité se faisant dans un second temps.

### Cancer du tiers moyen

• **Résection du rectum**, du mésorectum en totalité et des chaînes ganglionnaires satellites.

• **Rétablissement de la continuité** par anastomose colorectale ou colo-anale protégée. Adjonction d'un réservoir colique en J de 5 à 6 cm de long lorsque la résection ne préserve pas au moins 3 cm de moignon rectal au-dessus du plan des releveurs.

### Cancer du tiers inférieur

La **préservation du sphincter anal** est envisageable quand on peut obtenir sur pièce fraîche une marge distale d'au moins 1 cm sous le pôle inférieur de la tumeur. Dans ce cas, l'intervention est similaire à celle des cancers du moyen rectum après dissection intersphinctérienne ; une anastomose colo-anale avec réservoir colique est pratiquée.

L'**amputation abdomino-périnéale** est inévitable si la marge distale est < 1 cm : le patient doit être prévenu de la nécessité d'une colostomie définitive.

### Temps abdominal

• Exploration loco-régionale à la recherche d'une extension tumorale (foie et péritoine) avec si besoin examens extemporanés.

• Ligature de l'artère mésentérique inférieure ; résection du bas sigmoïde, de l'ampoule rectale et de leurs dépendances cellulo-ganglionnaires.

### Temps périnéale

• Résection large de la zone sphinctérienne et du bas rectum.

• Colostomie iliaque gauche définitive.

**CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (5)****► Cancers compliqués****Cancer en occlusion**

Une colostomie temporaire est nécessaire. En fonction de l'état du patient et des équipes, l'exérèse de la tumeur peut être faite au moment de la colostomie ou lors du rétablissement de la continuité.

**Cancer avec perforation**

On pratique une résection du côlon tumoral et de la zone perforée ; une colostomie temporaire est nécessaire.

**Chimiothérapie adjuvante**

► *Stade I = T1-T2-N0 = sous-séreuse intacte*  
Pas de traitement adjuvant.

► *Stade II = T3-T4-N0 = sous-séreuse atteinte (T3) ou dépassée (T4)*

Absence de consensus.

À discuter au cas par cas en fonction des risques de récidives qui sont les embolies veineuses, périnerveuses et lymphatiques,

une perforation, une tumeur peu différenciée.

La décision est souvent prise en fonction du statut microsatellite stable (MSS) ou instable (MSI) de la tumeur ; la chimiothérapie n'a pas d'effet bénéfique (voire est délétère) chez les patients MSI qui ont d'emblée un bon pronostic. Elle pourrait être indiquée chez les patients MSS.

► *Stade III = tous pT-N1 ou N2 = envahissement ganglionnaire*

Il est clairement démontré que la chimiothérapie adjuvante améliore la survie chez les patients classés N+. Elle doit être pratiquée le plus précocement possible après la chirurgie (avant le 42<sup>e</sup> jour suivant l'intervention). On utilise le protocole **FOLFOX4** associant le 5-FU, le folinate de calcium (**LEDERFOLINE**) et l'oxaliplatine (**ELOXATINE**) pendant 6 mois. On peut également utiliser le protocole **XELOX** : oxaliplatine (**ELOXATINE**) + capécitabine (**XELODA**).

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (6)

### Cancers métastatiques

Les décisions thérapeutiques doivent toujours être discutées en réunion pluridisciplinaire comprenant un chirurgien et un radiologue expérimenté en pathologie hépatique.

#### Bilan d'extension

- Examen clinique complet comportant toucher rectal, palpation des aires ganglionnaires et évaluation de l'état général.
- TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec injection, si possible hélicoïdale ou multibarettes (mieux que échographie).
- IRM hépatique si TDM contre-indiquée ou insuffisance rénale.
- PET-scan si une exérèse des métastases est envisagée.
- Coloscopie si la précédente date de plus de 3 ans et si une exérèse des métastases est envisagée.
- Biologie : NFS, plaquettes, phosphatases alcalines, LDH, ACE et CA19-9 (optionnel) surtout si maladie non mesurable.
- Volumétrie hépatique et tumorale par TDM si doute sur le pourcentage de foie sain restant après hépatectomie.
- Ponction biopsie percutanée si abstention chirurgicale et doute diagnostique.

#### ► Métastases résécables

Chimiothérapie périopératoire.

#### Métastases hépatiques

Lorsqu'elles sont uniques ou peu nombreuses ou localisées à un héli-foie, elles doivent être réséquées. La marge de sécu-

rité idéale est d'au moins 5 mm, en respectant au maximum le parenchyme sain. Lorsque l'intervention est simple, elle se fait dans le même temps que l'intervention digestive. Dans les autres cas, un délai de 2 à 3 mois est nécessaire.

#### Métastases pulmonaires

Elles doivent être réséquées 2 à 3 mois après les métastases hépatiques.

#### Carcinose péritonéale

Lorsqu'elle est limitée, chez un patient en bon état général elle doit être réséquée dans le cadre d'un protocole associant une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP).

#### ► Métastases non résécables

- Si la tumeur primitive est symptomatique : chirurgie ou prothèse endoscopique.

Cette attitude doit être discutée au cas par cas, en cas de tumeur asymptomatique.

- Chimiothérapie adjuvante: on propose une chimiothérapie de type **FOLFOX4** (cf. *supra*) ou **IRI-FU2** (ou **FOLFIRI**) associant du **5-FU** et de l'**irinotécan** (**CAMPTO**).

#### ► Cancer inextirpable et carcinose péritonéale

Traitement palliatif :

- mise en place par voir endoscopie d'une prothèse colique
- dérivation interne pour contourner l'obstacle ;
- colostomie en cas d'occlusion imminente si la dérivation interne est impossible.

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (7)

### Chimiothérapie palliative et thérapie ciblée

#### ► Chimiothérapie

Très important : la chimiothérapie peut rendre résécable une tumeur qui ne l'était pas avant.

Les protocoles sont décidés en milieu spécialisé. On utilise le protocole **FOLFOX4** ou plus rarement **FOLFIRI**.

On ajoute un **anticorps monoclonal** en 1<sup>re</sup> ligne.

#### ► Thérapie ciblée

Il faut déterminer le statut KRAS pour choisir le traitement :

– KRAS non muté : **anticorps anti-EGFR**, **cétuximab (ERBITUX)** ou **panitumumab (VECTIBIX)**.

– KRAS muté : **anticorps anti-VEGF** : **bévacizumab (AVASTIN)** ou **aflibercept (ZALTRAP)**. On utilise ces anticorps chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique en association avec une chimiothérapie IV **5-FU-acide folinique** ± **irinotécan** ou **oxaliplatine**.

#### ► Autres molécules

On peut également utiliser le **raltitrexed (TOMUDEX)**, en cas de contre-indication au **5-FU**. On peut également proposer le **5-FU** par voie orale (**XELODA**) avec ou sans **acide folinique**.

### Place de la radiothérapie

#### ► Radiothérapie préopératoire

Elle est indiquée dans les cancers du rectum envahissant toute la paroi (T3, T4 ou B), et/ou s'accompagnant de métastases ganglionnaires (N+ ou C). Son indication est donc portée en fonction des résultats de l'écho-endoscopie. Si au cours de l'intervention chirurgicale on découvre une tumeur plus importante que prévue, la radiothérapie se fera en postopératoire. Elle facilite l'intervention chirurgicale en diminuant le volume tumoral, diminue les récidives locales mais n'améliore pas la survie. Les doses sont comprises entre 25 et 45 Gy.

#### ► Radiothérapie palliative

Ses indications ne sont pas spécifiques aux cancers colorectaux. Elle vise principalement à traiter les douleurs.

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (8)

### Surveillance des cancers colorectaux réséqués

Elle n'est indiquée que chez les patients capables de supporter une éventuelle réintervention. La surveillance est d'abord rapprochée, tous les 3 mois pendant 3 ans puis progressivement espacée, tous les 6 mois pendant 2 ans, puis tous les ans, à vie.

Les éléments de surveillance sont :

- cliniques : état général, état nutritionnel, poids, transit digestif, état de la cicatrice, **toucher rectal** (toucher de stomie si amputation), aires ganglionnaires ;
- radiologiques : échographie abdominale, radiographie thoracique ou scanner thoraco-abdominal, tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, radiographie pulmonaire ou scanner thoracique annuel pendant 5 ans ;
- endoscopiques : la **coloscopie + biopsies (zone d'anastomose)** sera effectuée 2-3 ans après l'intervention chirurgicale puis tous les 5 ans si elle est normale ; si des polypes apparaissent, la fréquence sera augmentée ;
- biologiques : le dosage des marqueurs ACE et CA19-9 est réalisé en pratique courante mais n'a jamais démontré son utilité.

L'ACE, d'intérêt non complètement démontré, peut être dosé tous les 3 mois les 3 premières années avec bilan en cas d'élévation (accord d'experts).

PET-scan : la TEP-FDG est indiquée pour la localisation des récidives en cas d'élévation confirmée de l'ACE.

### En cas de récurrence

La prise en charge est la même qu'au moment du diagnostic initial. Les patients doivent être réopérés tant que c'est possible.

### Complications de la chirurgie

#### Anastomose colorectale

- Augmentation de la fréquence des selles s'atténuant avec le temps ; la prise de **ralentisseurs du transit, lopéramide (IMO-DIUM)** peut être utile.
- Il existe un risque d'impuissance ou d'éjaculation rétrograde.

### Amputation abdomino-périnéale

- Colostomie définitive, souvent assez bien acceptée ; une consultation spécialisée avec un stomathérapeute est souhaitable.

Fédération des stomisés de France  
76, rue Balard - 75015 Paris  
Tél : 01 45 57 41 27  
Fax : 01 45 57 29 26  
[www.fsf.asso.fr](http://www.fsf.asso.fr)

- Impuissance > 30 % des cas et anéjaculation.

## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (9)

### Dépistage

#### Sujets à risque très élevé

- *Types de patients*
- Apparentés au premier degré d'un malade atteint de cancer avant 60 ans ou de 2 personnes atteintes quel que soit leur âge.

- Famille atteinte de polyposse adénomateuse familiale (PAF). Elle est liée à une mutation du gène APC.
- Famille atteinte de cancer colorectal sans polyposse (HNPCC : *Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer*).

#### Caractéristiques des cancers coliques héréditaires sans polyposse (HNPCC)

Critères diagnostiques (dits critères d'Amsterdam) :

Transmission autosomique dominante.

- au moins 3 sujets atteints de cancers dans la famille (côlon-rectum, ovaire, grêle, uretère ou cavités excrétrices rénales) ;
- au moins 2 générations successives concernées ;
- au moins 1 cancer diagnostiqué avant l'âge de 50 ans.

Les formes incomplètes sont fréquentes et doivent faire entreprendre une enquête à la recherche d'un syndrome HNPCC.

Le syndrome est lié à des anomalies des gènes de réparation de l'ADN (phénotype RER+).

Adénocarcinomes coliques, endomètre, ovaires, seins, estomac, appareil urinaire associés.

Pas de polypes intestinaux mais présence d'adénomes plans.

Prédominance dans le côlon droit.

Fréquence des cancers synchrones.

Âge précoce de survenue (45 ans en moyenne).

Début du dépistage à 25 ans, voire avant (coloscopie) si cancer rectocolique avant 30 ans dans la famille.

Meilleur pronostic que les autres cancers coliques.

#### Indication d'une consultation d'oncogénétique

- Personnes ayant deux parents au lieu de trois atteints par un cancer du spectre dont un avant l'âge de 50 ans.
- Malades ayant un antécédent personnel de cancer du spectre HNPCC.
- Malades de moins de 40 ans.
- Présence d'une instabilité microsatellitaire chez un patient de moins de 60 ans ou quel que soit l'âge en cas d'antécédent au 1<sup>er</sup> degré d'un cancer du spectre HNPCC.

#### ► Dépistage

La prise en charge des patients doit être faite en milieu spécialisé. Elle est fondée sur le consensus d'experts qui recommandent une consultation de génétique oncologique avec recherche de la mutation chez le sujet atteint et la famille. Cf. Endoscopie digestive basse.

- PAF : membres de la famille d'un patient atteint de PAF : à partir de 10-12 ans puis tous les ans : duodénoscopie avec biopsie de la papille annuelle si adénome (tous les 2 ans si normale).
- PAF après colectomie : tous les ans.
- PAF atténuée : membres de la famille d'un patient atteint de PAF atténuée : à partir de 30 ans puis tous les ans.

– Polyposse colique familiale avec mutation gène MHY : à partir de 30 ans.

– HNPCC : membres de la famille d'un patient atteint de HNPCC : à partir de 20-25 ans puis tous les 2 ans ; gastroscopie tous les 1 à 2 ans si cancer gastrique dans les antécédents. Examen gynécologique annuel après 30 ans avec échographie endovaginale et frottis.

– HNPCC après traitement chirurgical : tous les 2 ans.

– Polyposse juvénile : membres de la famille d'un patient atteint et patient atteint : à partir de 10-15 ans puis tous les 2-3 ans.

– Syndrome de Peutz-Jeghers : membres de la famille d'un patient atteint et patient atteint : à partir de 18 ans puis tous les 2-3 ans.



## CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM (10)

### Sujets à risque élevé

#### ► Types de patients

- Patients ayant un parent au premier degré atteint (père, mère, frère, sœur, enfant). Le risque est d'autant plus élevé que l'apparenté a été atteint jeune.
- Patients ayant un antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal. Il n'existe pas de consensus sur la stratégie à adopter vis-à-vis des patients ayant des apparentés atteints d'adénomes.
- Patients ayant des antécédents personnels de maladie inflammatoire intestinale (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique).

#### ► Dépistage

Chez tout patient ayant un apparenté atteint avant l'âge de 60 ans, une coloscopie de dépistage doit être conseillée à partir de 45 ans ou bien 5 ans avant l'âge

d'apparition du cancer chez le parent atteint. Si l'examen est normal, une surveillance tous les 5 ans est suffisante.

Si l'apparenté a été atteint après l'âge de 60 ans, il n'existe pas de consensus sur l'attitude à adopter.

En cas d'antécédent de cancer colorectal, d'adénome supérieur à 1 cm ou avec un contingent vilieux, une coloscopie doit être pratiquée à 3 ans puis, si elle est normale, tous les 5 ans.

En cas de pancolite, une coloscopie est conseillée tous les 2 ans après 15 à 20 ans d'évolution.

### Dépistage dans la population générale

La recherche d'un saignement occulte dans les selles peut être faite par le test **HÉMOCCULT II** à partir de 45 ans. Il permet de dépister 50 % des cancers et 30 % des adénomes supérieurs à 1 cm.

### Conduite à tenir après l'exérèse endoscopique d'un adénome transformé

- En cas d'adénocarcinome intramuqueux, la polypectomie est suffisante si l'exérèse est complète.
- En cas d'adénocarcinome invasif, la polypectomie est suffisante si tous les critères suivants sont réunis :
  - exérèse et examen histologique complets ;
  - cancer bien ou moyennement différencié (grade I ou II) ;
  - absence d'embols lymphatiques ;
  - marges de sécurité supérieures à 1 mm.

Dans ce cas, une coloscopie à 3 mois est nécessaire pour vérifier la valeur de l'exérèse. Si un seul de ces facteurs est absent ou en cas d'adénome plan, il faut pratiquer une colectomie segmentaire à visée carcinologique.

### CONSENSUS

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFCD, SFRO, SNFGE) - Cancer du côlon métastatique, *SNFGE*, 2013

[2] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFCD, SFRO, SNFGE) - Cancer du rectum, *SNFGE*, 2013

[3] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFCD, SFRO, SNFGE) - Cancer du côlon non métastatique, *SNFGE*, 2011

**DIVERTICULOSE COLIQUE NON COMPLIQUÉE**

Le but du traitement est d'éviter les complications par la **lutte contre la constipation**.

**Régularisation du transit****Mesures diététiques**

- Éviter fruits et légumes à pépins et à grosses fibres : choux, choux-fleurs, oseille, rhubarbe, tomates, citrouille, raisins, groseilles, fraises, figues.
- Le régime doit comporter des aliments « de ballast » : pain complet, légumes verts, fruits.
- Consommer des fibres diététiques alimentaires : le son de blé peut aider à régulariser le transit (*ALL-BRAN* de *KELLOGG'S*) : 1 càs (5 g) tous les 2 j à augmenter très progressivement tous les 3-4 j pour atteindre 20 g/j ; un apport trop brutal risque de s'accompagner de ballonnements.

- Boissons abondantes, au moins 2 L/j.

**Traitement médicamenteux**

Lorsque les mesures précédentes sont insuffisantes, on peut proposer :

- des **mucilages** (*SPAGULAX*) : 1 à 3 càc/re-pas ; la posologie doit être atteinte très progressivement pour éviter un météorisme ;
- des **laxatifs non irritants** type **macrogol** (*MOVICOL*) : 1 à 3 sach. le matin

**Lutte contre les douleurs**

On peut proposer :

- un **antispasmodique** musculotrope, par exemple *SPASFON* : 2 cp. x 3/j ou *DÉBRI-DAT* : 1 cp. x 3/j ;
- un **pansement intestinal** (*SMECTA*) : 1 sach. x 3/j.

Le traitement chirurgical n'est pas indiqué en l'absence de complication.

**DIVERTICULOSE COLIQUE COMPLIQUÉE (1)****Diverticulite - Sigmôidite diverticulaire [1]**

C'est la complication la plus fréquente.

**Traitement médical**► *Mise en condition du malade*

- Hospitalisation en milieu médico-chirurgical.

- Pose d'une voie veineuse périphérique et rééquilibration hydroélectrolytique.

- En cas de signes subocclusifs : mise en place d'une sonde nasogastrique en aspiration douce.

► *Mise au repos du tube digestif*

- Arrêt de l'alimentation orale.

- Diète hydrique voire alimentation parentérale.

► *Antibiothérapie*

Double, par voie parentérale intraveineuse, active sur les bacilles anaérobies à Gram- et anaérobies stricts, par exemple :

- en l'absence d'allergie, **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 2 g/j en 1 inj. ; en alternative : **fluoroquinolone, ciprofloxacine (CIFLOX)** : 200 mg IV x 2/j ;

- à laquelle on associe un **nitro-imidazole, métronidazole (FLAGYL)** : 500 mg IV x 3/j.

- alternative : association **amoxicilline-acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 1 g x 3/j.

Durée du traitement : 7 à 10 jours.

► *Traitement des douleurs*

- Vessie de glace sur le ventre.

- **Antalgique périphérique IV, paracétamol (PERFALGAN)** : 1 g x 3/j.

- **Antispasmodique musculotrope IV (SPASFON)** : 2 amp. x 3/j.

**Évolution**► *Évolution favorable*

La reprise alimentaire se fait vers le 5<sup>e</sup> ou 6<sup>e</sup> j par un **régime sans résidus**. Arrêt du traitement IV et relais *per os* après 48 h d'apyrexie, par un traitement du même type, pour 15 j.

Une coloscopie devra être pratiquée à distance pour éliminer un cancer.

Le risque de récurrence de la diverticulite après une première poussée est de 29 % à 5 ans. Le risque de chirurgie en urgence pour une deuxième poussée est faible après un traitement médical d'une première poussée. Par conséquent, la sigmoïdectomie prophylactique n'est quasiment plus pratiquée.

On recommande une sigmoïdectomie prophylactique après une poussée de diverticulite avec signes de gravité scanographique : abcès, fuite d'air et/ou de produit de contraste en extra-digestif.

Chez le sujet de moins de 50 ans, après une première poussée même sans signe de gravité, la chirurgie prophylactique doit être discutée du fait d'un risque plus élevé de récurrence, mais n'est pas systématique.

► *Évolution défavorable*

- Elle est rare : persistance de la douleur, de la fièvre et de l'inflammation, voire défense ou contracture.

- Intervention chirurgicale en urgence. La chirurgie se fait en 2 temps (intervention de Hartmann) : sigmoïdectomie avec colostomie d'amont et fermeture du moignon rectal, toilette péritonéale ; rétablissement à froid de la continuité (après 2 à 3 mois).

**DIVERTICULOSE COLIQUE COMPLIQUÉE (2)****Abcès péridiverticulaire [1]****Traitement médical**

Il est le même que celui de la sigmoïdite diverticulaire.

**Drainage de l'abcès**

Un geste de drainage doit toujours être associé au traitement médical.

**► Drainage chirurgical**

- Intervention de Hartmann : résection de l'abcès et du sigmoïde sans rétablissement immédiat de la continuité (colostomie d'amont et fermeture du moignon rectal).
- Rétablissement « à froid » (2 à 3 mois après) de la continuité.

**► Drainage transpariétal**

- Il s'effectue sous guidage échographique ou scannographique.
- Sigmoïdectomie « à froid » en 1 temps, après quelques semaines, sur un côlon parfaitement propre.

**Perforation diverticulaire - Péritonite [1]**

**C'est une urgence chirurgicale majeure : le pronostic vital est en jeu.**

Le patient doit être hospitalisé en réanimation chirurgicale.

Le traitement médical est le même que celui de la sigmoïdite diverticulaire.

L'intervention chirurgicale doit être pratiquée en urgence :

- laparotomie médiane sous-ombilicale ;
- nettoyage abondant de la cavité péritonéale avec du sérum physiologique ;
- intervention chirurgicale en urgence. La chirurgie se fait en 2 temps (intervention de Hartmann) : sigmoïdectomie avec colostomie d'amont et fermeture du moignon rectal, toilette péritonéale ; rétablissement à froid de la continuité (après 3 à 4 mois).

La suture de la perforation sans sigmoïdectomie en urgence risque de laisser évoluer à bas bruit une infection locale.

**Occlusion intestinale [1]****Circonstances de survenue**

Elle peut :

- survenir à la phase aiguë d'une diverticulite sigmoïdienne ;
- être le résultat d'une longue évolution avec plusieurs poussées de diverticulites refroidies par un traitement antibiotique ; elle réalise alors un tableau pseudo-tumoral. La coloscopie ne permet pas toujours d'éliminer une tumeur et ce n'est que l'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse qui permettra de trancher.

**DIVERTICULOSE COLIQUE COMPLIQUÉE (3)****Conduite à tenir**► *Mise en condition du patient*

- Hospitalisation en urgence en milieu chirurgical.

- Repos au lit.

- Mise en place d'une voie veineuse périphérique et d'une sonde gastrique pour aspiration digestive douce et continue.

- Arrêt de l'alimentation orale.

► *Antalgiques et antispasmodiques*

Ex. **paracétamol (PERFALGAN)** : 1 g x 3/j en IV et **SPASFON** : 2 amp. x 3/j IV.

► *Antibiothérapie*

Par voie parentérale intraveineuse, débutée après les prélèvements bactériologiques habituels et adaptée secondairement à l'antibiogramme ; en l'absence de contre-indication, on peut proposer :

- **β-lactamine** : amoxicilline + acide clavulanique (**AUGMENTIN**) : 1 g x 3/j IV ;
- et/ou **fluoroquinolone**, ofloxacin (**OFLO-CET**) : 200 mg x 2/j IV.

**Évolution**► *La levée de l'occlusion est obtenue rapidement*

Une intervention chirurgicale peut être réalisée à froid, en 1 temps, après préparation colique : sigmoïdectomie avec anastomose colorectale.

► *L'occlusion ne cède pas*

Une intervention chirurgicale sera pratiquée en urgence. L'intervention est la même que pour la péritonite ou la perforation (intervention de Hartmann) : sigmoïdectomie avec colostomie d'amont et fermeture du moignon rectal, toilette péritonéale ; rétablissement à froid de la continuité (après 3 à 4 mois).

## DIVERTICULOSE COLIQUE COMPLIQUÉE (4)

### Hémorragie diverticulaire [1]

Il peut s'agir de rectorragies, voire d'un mélèna. L'hémorragie s'arrête spontanément dans 75 à 95 % des cas. On ne peut cliniquement la différencier de l'hémorragie du cancer, d'une angiodysplasie ou d'une colite ulcéreuse. Les facteurs de risque sont la prise d'**aspirine**, d'**AINS** et d'alcool.

Le risque de récurrence est faible après un premier épisode (15 %) mais passe à 50 % après un second épisode.

### Mise en condition du malade

C'est une urgence médico-chirurgicale car l'hémorragie peut récidiver ou s'aggraver à tout moment : hospitalisation en réanimation chirurgicale.

- Éliminer une hémorragie digestive haute non extériorisée par la bouche. Pose d'une sonde nasogastrique voire fibroscopie.
- Éliminer une autre cause d'hémorragie digestive basse par une recto-sigmoïdoscopie. Idéalement, une coloscopie totale sur un côlon préparé doit être pratiquée pour préciser le siège et la cause de l'hémorragie ; un geste thérapeutique endoscopique peut être pratiqué dans le même temps.

### Hémorragie de faible abondance

Faire une coloscopie en urgence qui permettra de porter le diagnostic dans 50 % des cas.

Au cours de la coloscopie, on peut dans certains cas pratiquer une injection hémostatique d'adrénaline ou mettre en place un clip. Toutefois, les récurrences sont fréquentes. Refaire la coloscopie si le diagnostic n'a pas pu être porté.

### Hémorragie importante

► *Scanner avec injection d'iode - Artériographie mésentérique supérieure et inférieure*  
Le scanner tend à remplacer l'artériographie. Si le débit de l'hémorragie est supérieur à 0,5 mL/min (débit de transfusion nécessaire pour maintenir une hémodynamique stable), il permet de localiser le diverticule qui saigne en montrant une extravasation du produit de contraste. L'injection *in situ* d'**oxytocine** peut être tentée mais les récurrences sont fréquentes à l'arrêt de la perfusion. Elle permet toutefois de préparer le patient à l'intervention chirurgicale.

► *Scintigraphie aux hématies marquées*  
Elle permet aussi de visualiser l'hémorragie.

► *Coloscopie*

Elle est essentielle lorsqu'elle est possible car elle permet de localiser l'hémorragie. La préparation est difficile.

► *Intervention chirurgicale*

Elle est indiquée en cas d'hémorragie récidivante ou grave, ne cédant pas sous traitement.

- Le siège du saignement a été localisé avant l'intervention.

L'intervention de choix est la résection colique partielle avec anastomose immédiate ; le côlon doit être parfaitement propre et l'intervention se fait sous couvert d'une antibiothérapie.

- Le siège du saignement n'a pas été localisé avant l'intervention.

On doit tenter de pratiquer une coloscopie sur table après avoir évacué le côlon avec un tube de Faucher monté par l'anus.

Si l'origine du saignement n'est pas retrouvée, le traitement est difficile. Une colectomie totale peut être pratiquée avec anastomose iléo-rectale. Certains préfèrent pratiquer une hémicolectomie droite car la fréquence des hémorragies diverticulaires est plus importante à droite.

### CONSENSUS

[1] Complications de la diverticulose sigmoïdienne, SNFGE, 2007

## HÉMORROÏDES (1)

### Rappels

La seule pathologie du plexus hémorroïdaire externe est la thrombose.

Trois types de pathologies peuvent toucher les hémorroïdes internes : l'hémorragie, le prolapsus et la thrombose.

Le traitement développé repose sur les recommandations de la SNFCP [1].

### Traitement des complications aiguës : la thrombose hémorroïdaire externe

#### Traitement médical

Il est utile dans tous les cas.

##### ► Mesures hygiéno-diététiques

- Suppression des épices, des condiments et de la caféine.
- Éviter la sédentarité.
- Lutte contre la constipation : régime riche en fibres, laxatifs doux, mucilages.
- Bains de siège tièdes en cas de poussée.

##### ► Traitement médicamenteux local

Lubrification terminale antalgique : par exemple **TITANORÉINE** : 2 à 3 sup./j.

De nombreux topiques sont proposés sous forme de pommade ou de supposi-

toires à action antalgique et anti-inflammatoire. Leur efficacité est certaine en cas de crise mais douteuse à long terme. Ex. : topique contenant de la **prednisone (DELI-PROCT)** : 1 sup. ou 1 application (pommade) x 2 à 3/j en cas de poussée aiguë.

##### ► Traitement médicamenteux par voie générale

Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** sont utiles en cas de poussée ; ex. **VOLTA-RÈNE** : 1 cp. (50 mg) x 2 à 3/j.

Les **veinotoniques** à forte dose peuvent être utiles : **DAFLON 500** : 2 cp. x 3/j.

#### Traitement instrumental

Il peut être fait par tout praticien.

- Anesthésie locale à la **XYLOCAÏNE** 1 % dans et en périphérie de la thrombose.
- Incision verticale de la thrombose dans le sens des plis radiés de l'anus.
- Évacuation du caillot.
- Pansement compressif à base de pommade (**MITOSYL** pommade) pendant 48 h.

La survenue d'une thrombose hémorroïdaire externe interdit pendant au moins 15 j un autre traitement instrumental.

**ANTIHÉMORROÏDAIRES LOCAUX****Sans anesthésiques ni corticoïdes****■ Trimébutine + ruscogénines**

<b>PROCTOLOG</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	10 sup.		II	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**■ Oxyde de zinc**

<b>TITANORÉINE</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	12 sup.		II	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 tube crème 40 g		II	NR	

**Avec anesthésiques, sans corticoïdes****■ Oxyde de zinc + lidocaïne**

<b>TITANORÉINE</b>					
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**■ Quinisocaïne + cétrimide**

<b>RECTOQUOTANE</b>					
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**Avec anesthésiques et corticoïdes****■ Prednisolone + cinchocaïne**

<b>DELIPROCT</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	6 sup.		I	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 10 g		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Topiques antihémorroïdaires à action anti-inflammatoire (**corticoïdes**), antalgique et antiprurigineuse (anesthésiques) et veinotonique (**ruscogénines**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'un des constituants (**lidocaïne** surtout).

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses et prurigineuses anales, en parti-

culier dans la crise hémorroïdaire et les fissures.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement de courte durée ne dispensant pas d'un traitement spécifique (mesures hygiéno-diététiques, traitement instrumental ou chirurgical).

Ne pas appliquer de **corticoïdes** en cas de lésion infectieuse locale (syphilis, tuberculose, etc.).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques locales (anesthésiques surtout).



## HÉMORROÏDES (2)

### Traitement préventif

Les mesures médicales sont les mêmes que celles de la thrombose hémorroïdaire. Elles ne permettent pas de supprimer les hémorroïdes. Lorsque les manifestations deviennent gênantes et répétées, mieux vaut prendre les mesures suivantes. Il faut dans tous les cas éviter la constipation, les épices et l'alcool.

### Traitement ambulatoire instrumental

Il vise à fixer le tissu hémorroïdaire dans le canal anal et est indiqué en cas de **manifestations fonctionnelles fréquentes et gênantes**.

Il existe de nombreuses techniques dont l'efficacité est globalement comparable. Les indications dépendent de l'habitude du prescripteur.

#### ► Ligature élastique

C'est la mise en place d'un élastique au sommet des paquets hémorroïdaires pour les nécroser.

#### ► Injection sclérosante

On l'utilise surtout en période hémorragique : sclérose sous-muqueuse sous-hémorroïdaire ; une douleur retardée de 15 à 30 min est possible ; risque minime

de rectorragie à 15 j (chute d'escarre) ; 2 à 3 séances à 15 j d'intervalle sont nécessaires.

### Traitement chirurgical

#### ► Désartérialisation hémorroïdaire transanale guidée par Doppler

Il s'agit d'une méthode chirurgicale mini-invasive. La méthode consiste à repérer avec un anoscope et un Doppler l'artère hémorroïdaire supérieure qui va être suturée dans une zone peu sensible à la douleur. On y associe un repositionnement du prolapsus hémorroïdaire.

#### ► Traitement classique

Il est de moins en moins utilisé car douloureux. On peut le proposer en cas :

- d'échec des traitements précédents ;
- de thrombose d'un prolapsus hémorroïdaire ;
- de polythrombose circulaire ;
- d'hémorragie abondante et répétée.

L'intervention de base du « Saint-Mark's hospital » est une hémorroïdectomie ouverte. Elle consiste à séparer les hémorroïdes en 3 paquets dont on pratique l'exérèse. La cicatrisation dure 3 à 4 sem. L'intervention est un peu douloureuse mais se complique rarement.

### CONSENSUS

[1] Recommandations pour la pratique clinique sur le traitement des hémorroïdes, SNFCP, 2001

## FISSURE ANALE

Certaines étiologies doivent être éliminées devant une fissure anale :

- cancer du canal anal ;
- maladie de Crohn ;
- ulcération anale d'une hémopathie ou d'un cancer ;
- infection : VIH, CMV, HSV, syphilis, tuberculose ;
- affections dermatologiques prurigineuses (lésions de grattage) : eczéma, psoriasis.

### Traitement médical

Il est indiqué dans tous les cas.

#### Traitement général

Son but est de supprimer la douleur.

##### ► Régularisation du transit intestinal

Lutte contre la constipation : **laxatifs lubrifiants, mucilages**. Par exemple : **SPAGULAX** : 2 càc après les principaux repas, et **LANSOÏL GELÉE** : 2 càs le soir.

##### ► Antalgiques et anti-inflammatoires

- **Paracétamol (DOLIPRANE)** : 500 mg x 3 à 6/j ou **tramadol (IXPRIM)** : 1 cp./4-6 h.
- **VOLTARÈNE** (cp. à 50 mg) : 1 cp. x 3/j.

##### ► Myorelaxants

Ils peuvent être utiles pour diminuer la contracture : **COLTRAMYL** : 1 à 2 cp. x 2 à 3/j.

#### Traitement local

- Toilette locale au **MERCERYL** dilué de moitié dans de l'eau tiède.
- Application locale par toucher rectal par le patient de pommade **MITOSYL** x 2/j.

#### Injections sous-fissuraires

Elles sont indiquées dans les fissures typiques, jeunes, très douloureuses, avec hypertonie.

Anesthésie locale sphinctérienne par injection de 15 à 20 mL de **lidocaïne** 1 % ; puis injection sous-fissuraire d'une solution sclérosante de **quinine-urée (KINURÉA H)** : 1 à 5 mL par injection.

Ce traitement peut être répété 1 ou 2 fois à 1 sem. d'intervalle.

La complication est la formation locale d'un abcès.

#### Traitement chirurgical

Il est indiqué en cas de douleurs importantes et prolongées.

##### ► Sphinctérotomie

La sphinctérotomie est le traitement le plus répandu. Elle consiste, après une incision cutanée, à sectionner partiellement le sphincter interne pour diminuer l'hypertonie.

##### ► Fissurectomie

L'ablation de la fissure (fissurectomie) peut également être pratiquée ; elle peut être associée à un abaissement de la muqueuse rectale pour recouvrir la plaie (anuloplastie muqueuse).

##### ► Soins postopératoires

Des soins réguliers postopératoires sont nécessaires :

- **MITOSYL** : 1 appl. matin et soir et si possible, après les selles ;
- dilatations rectales au doigt un j sur deux pendant 1 sem.

La cicatrisation est obtenue en 3 sem. environ.

## PANCRÉATITE AIGÜE (1)

La prise en charge correspond aux recommandations de la conférence de consensus de la SNFGE [1].

Les deux principales causes de pancréatite aiguë sont :

- la lithiase vésiculaire (60 %) ;
- la consommation excessive d'alcool (40 %).

Le diagnostic repose sur la présence :

- d'une douleur abdominale ;
- d'une élévation de la lipasémie > 3N (il n'y a pas d'indication à doser l'amylase qui est moins spécifique).

**C'est une urgence médico-chirurgicale : le pronostic vital est en jeu.**

### Traitement symptomatique

#### Mise en condition du malade

**Toute pancréatite aiguë doit être hospitalisée du fait du risque d'évolution vers une forme grave.**

- Hospitalisation en urgence, en unité de soins intensifs s'il s'agit d'une forme grave.
- Repos absolu au lit.
- Mise en place :
  - d'une voie veineuse périphérique voire centrale (en fonction de la gravité) pour mesure de la pression veineuse centrale ;
  - d'une oxygénothérapie nasale ;

- d'un scope cardiaque, d'un dynamap ;
- d'un dispositif de recueil des urines (sonde le cas échéant) ;
- d'une sonde gastrique pour aspiration douce et continue si iléus.

#### Correction du choc

- Expansion volémique rapide par sérum physiologique, guidée éventuellement par la pression veineuse centrale : 500 mL en 20 min à renouveler si besoin.
- Si nécessaire : transfusion de concentrés globulaires.

#### Rééquilibration hydroélectrolytique

Perfusion de glucosé à 5 % : 4 L/j avec 4 g/L de NaCl, 2 g/L de KCl, 1 amp./L de gluconate de calcium et vitamine B1 - vitamine B6 : 1 g et 500 mg/j dans les perfusions (posologie indicative à adapter à chaque patient).

#### Lutte contre la douleur

- Antispasmodique : **SPASFON**, 1 amp. x 3/j.
- Antalgique : paracétamol (**PERFALGAN**) 1 g/8 h. Les antalgiques morphiniques sont utilisés en cas de douleur importante : chlorhydrate de morphine : 5 à 10 mg en SC toutes les 4 h.

## PANCRÉATITE AIGÜE (2)

### Nutrition artificielle

La mise en route d'une nutrition artificielle est inutile si la reprise de l'alimentation se fait avant le 7<sup>e</sup> j.

L'alimentation peut être reprise après 48 h sans douleur.

S'il s'agit d'une pancréatite aiguë sévère, elle se fait par voie entérale, le plus précocement possible, idéalement en site jéju-

nal (à l'aide d'une sonde naso-jéjunale) ou à défaut en site gastrique. La nutrition doit être hypercalorique, hyperprotidique.

La réalimentation orale se fait à la disparition des douleurs et à la diminution de la lipase.

### Évaluation de la gravité

Terrain : âge > 80 ans ; obésité, insuffisances organiques préexistantes.

### Score de Ranson

À l'admission en réanimation :

- glycémie > 2 g/L (ou 11 mmol/L) ;
- âge > 55 ans ;
- leucocytes > 16 000/mm<sup>3</sup> ;
- LDH > 350 UI/L (ou 1,5 fois la normale) ;
- ASAT > 250 UI/L (ou 6 fois la normale).

Après 48 h de réanimation :

- chute des bicarbonates de plus de 4 mmol/L ;

– pression partielle en oxygène (PaO<sub>2</sub>) < 60 mmHg ;

– élévation de l'urée sanguine de plus de 1,8 mmol/L ;

– calcémie < 2 mmol/L ;

– chute de l'hématocrite de plus de 10 % ;

– séquestration liquidienne > 6 L.

Chaque facteur est affecté d'un point. Le nombre de points est corrélé à la gravité de la pancréatite. Pancréatite aiguë modérée : moins de 3 points. Pancréatite aiguë sévère : au moins 3 points.

### Index de sévérité TDM 48-72 h après l'apparition des premiers signes (score de Balthazar)

Quantification de l'inflammation et de la nécrose pancréatique.

### Prévention de la surinfection

L'antibiothérapie systématique précoce n'est pas recommandée. En cas de suspicion de surinfection de la nécrose, on doit réaliser une ponction (le plus souvent sous TDM) pour étude bactériologique.

Les antibiotiques doivent être actifs sur les bactéries à Gram négatif et les germes anaérobies ; l'antibiothérapie doit être adaptée secondairement à l'antibiogramme. On utilise en première intention les **fluoroquinolones**, par exemple la **ciprofloxacin** (**CIFLOX**) : 200 mg x 2 à 3/24 h en perf. de 30 min, à adapter à la sévérité de l'infection et aux fonctions rénale et hépatique. Elle doit être associée à un second antibiotique, par exemple une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération**, **ceftriaxone** (**ROCEPHINE**) : 2 g/j à perfuser en 15 min une fois par j ou un **aminoside** : **gentamicine**

(**GENTALLINE**) : 3 mg/kg/j en 1 ou 2 inj. (à adapter à la fonction rénale). L'**imipénem** (**TIENAM**) peut également être proposé.

### Prévention des complications de la réanimation

Nursing soigneux ; changements fréquents de position ; mobilisation passive et active ; prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** (**LOVENOX**) : 0,2 mL/j en SC.

Le traitement décrit correspond aux formes sévères. Dans les formes moins graves, le traitement comporte :

- une mise au repos du tube digestif ;
- une aspiration digestive douce et continue ;
- une hydratation intraveineuse ;
- des antalgiques périphériques ;
- une réalimentation rapide dès la disparition des douleurs.

## PANCRÉATITE AIGÜE (3)

### Traitement étiologique

#### Pancréatite aiguë biliaire

##### ► Sphinctérotomie endoscopique (SE)

Deux situations font l'objet d'un consensus [1] :

- en cas d'angiocholite et/ou d'ictère obstructif, la SE est indiquée quels que soient la durée d'évolution et le degré de gravité ;

- dans les pancréatites aiguës bénignes d'évolution favorable, il n'y a pas d'indication à réaliser une SE en urgence.

Deux situations ne font pas l'objet d'un consensus :

- dans les pancréatites aiguës graves, la SE peut être réalisée en urgence par une équipe disposant d'un plateau technique adapté. Elle n'est indiquée qu'au cours des 72 premières heures d'évolution ;

- dans les pancréatites aiguës vues à un stade précoce (12 premières heures), il est difficile de prédire la gravité de l'évolution et aucune recommandation ne peut être faite.

##### ► Cholécysectomie

Dans les formes de pancréatite aiguë non compliquées, le pronostic est dominé par le risque de récurrence. Une cholécystectomie doit être réalisée, et la voie laparoscopique, au cours de la même hospitalisation, est le traitement de référence de la lithiase vésiculaire.

Dans les pancréatites aiguës graves, le pronostic est dominé par les complications générales et locorégionales. La cholécystectomie laparoscopique peut être réalisée à distance des phénomènes aigus

mais s'accompagne d'un taux de conversion élevé. Chez les malades à très haut risque opératoire, une SE sans cholécystectomie associée est préconisée.

#### Pancréatite aiguë alcoolique

Elle nécessite un arrêt total et définitif de toute boisson alcoolisée.

#### Surveillance

Elle doit être stricte, rapprochée et répétée.

#### Clinique

- État de conscience, fréquences cardiaque et respiratoire, tension artérielle, température, diurèse, pression veineuse centrale.
- Glycémie capillaire, glycosurie et cétonurie à la bandelette.
- Examen abdominal avec toucher rectal, examen cardio-pulmonaire.
- Liquide gastrique aspiré : aspect, quantité, couleur.
- Scope, électrocardiogramme, pression veineuse centrale.

#### Biologie

- NFS, plaquettes, hémostase complète à la recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée.
- Ionogrammes sanguin et urinaire, glycémie, calcémie, urémie, créatininémie.
- Amylasémie, lipasémie.
- Gazométrie artérielle.

#### Imagerie

- Radiographie thoracique au lit tous les jours.
- Échographie et tomodensitométrie abdominale à répéter régulièrement.

### CONSENSUS

[1] Pancréatite aiguë, SNFGE, 2001

## PANCRÉATITE CHRONIQUE (1)

L'alcoolisme chronique est responsable de 90 % des pancréatites chroniques. La consommation moyenne quotidienne est de 150 g d'alcool.

Le traitement est ambulatoire mais peut être débuté par une hospitalisation brève, notamment pour le sevrage.

**Le traitement doit être poursuivi toute la vie.**

### Arrêt de l'absorption de toute boisson alcoolisée

Le sevrage doit être complet et définitif. C'est à la fois le traitement étiologique et le meilleur traitement contre la douleur. Il justifie une prise en charge spécialisée (cf. Sevrage alcoolique). Il est nécessaire de prévenir le delirium tremens et l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

### Traitement des douleurs

#### Traitement médical

L'acétylsalicylate de lysine (**ASPÉGIC 500**) : 1 sach. x 3/j est classiquement bien efficace sur les douleurs pancréatiques. En cas d'intolérance, on peut utiliser le **paracétamol (DOLIPRANE)** 1 cp. à 500 mg x 3/j. Les **antispasmodiques** type **SPASFON** : 1 à 2 cp. x 3/j sont également efficaces. Le recours à des **morphiniques** au long cours (**EFFERALGAN CODÉINÉ**) est possible mais expose au risque d'accoutumance.

En cas d'échec du traitement médical :

- s'assurer que le sevrage est respecté ;
- éliminer un pseudo-kyste (échographie) ;
- éliminer un ulcère gastroduodénal (fibroscopie).

Après avoir éliminé ces causes, on peut proposer les traitements suivants.

### Sympatholyse chimique du plexus cœliaque

L'infiltration percutanée sous repérage échographique ou tomodensitométrique du plexus cœliaque par de la **lidocaïne** ou de l'alcool absolu peut donner de bons résultats.

### Traitement chirurgical

Il est exceptionnellement indiqué pour le traitement des douleurs. On pratiquerait des dérivations canalaïres, kystiques ou biliaires voire une chirurgie d'exérèse.

### Traitement de la maldigestion

#### Régime alimentaire

Le régime doit être adapté à chaque patient.

Il doit être :

- hypercalorique : 2 000 à 3 000 kcal/j ;
- hyperprotidique : 100 à 150 g/j ;
- hypolipidique : < 60 g/j en évitant les graisses cuites et en privilégiant les **triglycérides à chaîne moyenne (LIPROCIL)** ;
- normoglycémique : 300 à 400 g/j en évitant les hydrates de carbone à index glycémique élevé.

#### Enzymes pancréatiques

Les **enzymes pancréatiques** sont à prendre au début des repas (**CRÉON**) : 2 à 3 gél. x 3/j.

### Traitement du diabète

L'insuline est le meilleur traitement car les réserves insuliniques endogènes sont faibles. De petites doses sont souvent suffisantes pour équilibrer le diabète. Le risque d'hypoglycémies est important car le pancréas sécrète également moins de glucagon et le foie a moins de réserves en glycogène en cas d'insuffisance hépatique sous-jacente.

L'alternative est représentée par les **sulfamides hypoglycémisants (DAONIL** par exemple) à faible dose. Il existe alors également un risque d'hypoglycémie.

**EXTRAITS PANCRÉATIQUES****■ Poudre de pancréas**

<b>CRÉON</b>				
2 à 3 gél. au cours des repas À adapter au degré de malabsorption	60 gél. 12 000 U de lipase	12,82	65 %	0,21
	100 gél. 12 000 U de lipase	HOP		
	120 gél. 12 000 U de lipase	22,90	65 %	0,19
	60 gél. 25 000 U de lipase	20,66	65 %	0,34
	100 gél. 40 000 U de lipase		NR	
<b>EUROBIOL</b>				
6 gél. ou 8 à 12 c-mes. au cours des repas À adapter au degré de malabsorption	90 gél. 25 000 U de lipase	32,21	65 %	0,36
	100 gél. 25 000 U de lipase	34,50	65 %	0,35
	105 c-mes. 12 500 U/dose (fl. 20 g)	18,57	65 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Extraits de pancréas apportant les activités enzymatiques pancréatiques nécessaires à la digestion (activités lipolytique, amylolytique et protéolytique). Les spécialités en gélules sont gastrorésistantes, évitant une destruction des enzymes par l'acidité gastrique.

**INDICATIONS**

Insuffisance pancréatique exocrine : pancréatite chronique, mucoviscidose, séquelles de gastrectomie et de pancréatectomie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de troubles digestifs chez les sujets ayant une hypersensibilité aux extraits pancréatiques.

Ouvrir les gélules en cas de gastrectomie.

Deux à trois mois de traitement sont nécessaires pour obtenir l'efficacité optimale. La posologie peut être exceptionnellement augmentée en cas de stéatorrhée rebelle ; un traitement antisécrétoire complémentaire peut être utile.

## PANCRÉATITE CHRONIQUE (2)

### Traitement des complications

#### Pseudo-kystes

Le traitement doit être fait à distance d'une poussée de pancréatite aiguë. Seuls les pseudo-kystes symptomatiques doivent être traités s'ils ne régressent pas spontanément après environ 2 mois d'évolution.

#### ► Traitement chirurgical

On peut proposer :

- une intervention de drainage (anastomose kysto-duodénale, kysto-gastrique ou kysto-jéjunale) ;
- ou plus rarement une intervention d'exérèse (pseudo-kystes de la queue ou hémorragiques) : spléno-pancréatectomie gauche.

#### ► Traitement endoscopique

Il peut être pratiqué lorsque le pseudo-kyste bombe dans la paroi gastrique ou duodénale. Une fistule kysto-duodénale ou gastrique est alors créée par voie endoscopique.

#### ► Ponction-drainage

Une ponction échoguidée peut être faite, en particulier si les patients sont inopérables ou le traitement endoscopique impossible. Les récidives sont fréquentes.

#### Sténose de la voie biliaire principale

On fait une dérivation bilio-digestive par anastomose cholédoco-duodénale ou jéjunale s'il existe une cholestase avec

dilatation de la voie biliaire principale pendant plus de 4 sem.

#### Épanchements

Le traitement est difficile. Il faut traiter le pseudo-kyste fissuré pour que l'épanchement se tarisse.

#### Hémorragies digestives

##### ► Rupture de varices œsophagiennes

Le traitement repose sur la prévention de récidives (cf. Cirrhose).

##### ► Artère érodée au contact d'un foyer de nécrose ou d'un pseudo-kyste

Le traitement est chirurgical. On peut parfois proposer une embolisation artérielle.

#### Diabète

Il doit être traité de préférence par insuline.

#### Complications des pseudo-kystes du pancréas

Compressions :

- gastroduodénale : vomissements ;
- des voies biliaires : ictère ;
- du côlon : occlusion ;
- de la veine splénique : hypertension portale segmentaire.

Hémorragie intrakystique.

Abcédation.

Rupture intrapéritonéale ou dans un organe voisin.

Érosion artérielle : hémopéritoine, hémorragie digestive, hémorragie.

Épanchement des séreuses : péritoine, plèvre, péricarde.



## CANCER DU PANCRÉAS (1)

Le traitement reprend les recommandations de la FFCD, du GERCOR, de la FNCLCC et de la SNFGE [1].

Le cancer du pancréas est le plus grave de tous les cancers digestifs. 15 % seulement des tumeurs peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical curatif. La survie globale à 5 ans est inférieure à 5 %.

La stratégie thérapeutique doit être décidée en milieu spécialisé en RCP.

### Traitement curatif

Il est exclusivement chirurgical. C'est le traitement à proposer en première intention en l'absence de métastases à distance si le terrain le permet.

### Préparation du malade

- Arrêt de l'alcool et du tabac.
- Éradication des foyers infectieux ORL et stomatologiques.
- Renutrition si possible orale, sinon entérale ou parentérale en milieu spécialisé.
- Bilan d'opérabilité cardiorespiratoire ; kinésithérapie respiratoire.

- Antibiothérapie périopératoire.
- Le bilan d'extension est négatif.

### Intervention chirurgicale

- Laparotomie médiane sus-ombilicale.
- Exploration loco-régionale soigneuse avec examens extemporanés du péritoine et des ganglions : s'il existe un envahissement, l'intervention curatrice doit être annulée.


#### ► Localisation tumorale de la tête

- Duodéno-pancréatectomie céphalique : exérèse de la tête du pancréas, de la totalité du cadre duodénal et de la première anse jéjunale.
- Rétablissement des continuités par anastomoses gastro-jéjunale, cholédoco-jéjunale et wirsungo-jéjunale sur anse en oméga.
- Fermeture plan par plan et examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire. La mortalité opératoire est < 2 % dans les centres spécialisés.

#### ► Localisation tumorale corporeo-caudale

On pratique une spléno-pancréatectomie gauche.

## CANCER DU PANCRÉAS (2)



Duodéno-pancréatectomie céphalique. Rétablissements des continuités par anastomoses sur anse en oméga :  
 – gastro-jéjunale  
 – cholédoco-jéjunale  
 – wirsung-jéjunale

**Chimiothérapie adjuvante**

On utilise le 5-FU, l'acide folinique, la gemcitabine (**GEMZAR**), l'irinotécan (**CAMPTO**) et l'oxaliplatine.

**Traitement palliatif**

Il est pratiqué dans plus de 85 % des cas. Ses indications sont une tumeur inextirpable en totalité, une contre-indication opératoire et les récidives.

**Traitement médical**► *Traitement de la douleur*

On débute par des **antalgiques** mineurs type **paracétamol** (**DOLIPRANE 500**) ou **tramadol** (**IXPRIM**) : 1 cp./4-6 h. Le passage à des **morphiniques** est souvent nécessaire (**MOSCONTIN**).

La radiothérapie externe peut également être utilisée.

La sympathectomie chimique du plexus coeliaque sous repérage tomodensitométrique par de la **lidocaïne** ou de l'alcool absolu peut donner de bons résultats.

► *Lutte contre le prurit*

Les **chélateurs des sels biliaires**, **colestyramine** (**QUESTRAN**) : 1 sach. x 3/j, sont peu efficaces, de même que les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** (**POLARAMINE**) : 1 à 2 cp. x 2 à 3/j.

La dérivation biliaire (cf. *infra*) donne de meilleurs résultats.

► *Un soutien psychologique, des anxiolytiques et antidépresseurs peuvent être utiles.*► *Traitement de la maldigestion*

Le régime doit être hypercalorique et hyperprotidique, en utilisant des mélanges nutritifs (ex. : **NUTRIDORAL**, **FORTIMEL**).

Des **extraits pancréatiques** (**CRÉON**) : 2 à 3 gél. avant chaque repas, peuvent être prescrits.

## CANCER DU PANCRÉAS (3)

### Dérivation biliaire : traitement de la cholestase

Elle permet de faire régresser l'ictère, la maldigestion et le prurit, et de prévenir l'angiocholite.

#### ► Traitement endoscopique

Dans les localisations tumorales céphaliques, on peut mettre en place une prothèse biliaire par voie endoscopique au cours d'une cholangiographie-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE). Les complications sont la migration et


l'obstruction de la prothèse ainsi que des épisodes d'angiocholite.

#### ► Dérivation chirurgicale

Sa morbidité et sa mortalité sont plus élevées que pour le traitement endoscopique. Elle consiste à pratiquer une double dérivation cholédoco-jéjunale et gastro-jéjunale sur anse en Y ; elle peut être associée à une splanchnectomie chimique ou chirurgicale pour traiter les douleurs.

La **gemcitabine (GEMZAR)**, peu efficace sur la survie, est devenue la molécule de référence. Le **5-FU** et surtout l'**oxaliplatine** sont également utilisés.

Double dérivation sur anse en Y  
cholédoco-jéjunale et gastro-jéjunale



### CONSENSUS

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive : cancer du pancréas, FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFCD, SFRO, SFNGE, 2011

## COLIQUE HÉPATIQUE – LITHIASÉ VÉSICULAIRE

La colique hépatique ou douleur biliaire aiguë est le seul symptôme attribuable à la lithiasé biliaire. Elle correspond à la mise sous tension des voies biliaires du fait d'un obstacle, le plus souvent un calcul. Les troubles dyspeptiques, « intolérance » aux graisses, migraines, etc., ne sont pas dus à une lithiasé biliaire.

### Traitement symptomatique

#### Règles hygiéno-diététiques

- Diète hydrique.
- Puis reprise progressive d'une alimentation légère : jambon, pâtes, purée, confitures, yaourts.

#### Antispasmodiques et antalgiques

On utilise souvent le **phloroglucinol**, **triméthylphloroglucinol** (**SPASFON**) : 1 à 3 amp./j en IM ou IV lente.

Dans les formes rebelles, on peut être conduit à prescrire des **morphiniques**, malgré le spasme qu'ils entraînent sur les voies biliaires : **chlorhydrate de morphine**, 10 mg en SC à renouveler si besoin. Dans ce cas, les **antispasmodiques** perdent leur efficacité.

#### Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Ils sont particulièrement actifs. Par exemple **diclofénac** (**VOLTARÈNE**) : 1 amp. (75 mg)/j en IM. Le relais peut se faire en suppositoire : 1 sup. (100 mg), le soir, ou en cp. (**VOLTARÈNE LP**) : 1 cp. (100 mg)/j.

### Évolution

Le plus souvent, le calcul se débloque et retourne dans la vésicule ou migre spontanément dans le duodénum. La douleur cède en quelques heures mais une gêne de l'hypocondre droit peut persister plus longtemps.

Des complications peuvent survenir :

- cholangite aiguë ;
- angiocholite ;

– pancréatite aiguë.

### Traitement étiologique

C'est celui de la lithiasé vésiculaire ou de la lithiasé de la voie biliaire principale.

#### Cholécystectomie par laparoscopie

C'est actuellement l'intervention de référence (95 % des interventions). Certaines équipes la pratiquent en ambulatoire en hôpital de jour.

L'intervention devrait pour certains être systématiquement associée à une cholangiographie peropératoire. L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire est systématique.

Avant l'intervention le patient doit être prévenu de la possibilité d'une conversion (en laparotomie).

Les différents temps de l'intervention sont les suivants :

- cholécystectomie ;
- cholangiographie peropératoire :
  - si calculs de la voie biliaire principale, extraction par voie transcystique (cystique long, petits calculs) ou cholécotomie ;
  - contrôle de la vacuité de la voie biliaire principale.

#### Cholécystectomie par laparotomie

- Elle n'est quasiment plus réalisée.
- Voie sous-costale droite ou rarement sus-ombilicale.
- Abord et canulation du cystique pour cholangiographie peropératoire.
- Cholécystectomie.
- Examen anatomopathologique de la pièce opératoire.

### Traitement médical

Il n'est plus utilisé depuis le développement de la chirurgie par laparoscopie.

Une lithiasé vésiculaire ne doit être traitée que lorsqu'elle est symptomatique. Une lithiasé asymptomatique ne doit être ni traitée, ni surveillée.

**CHOLÉCYSTITE AIGÜE LITHIASIQUE**

C'est une urgence chirurgicale. L'intervention est rarement pratiquée en extrême urgence mais le patient doit être hospitalisé immédiatement pour débiter le traitement antibiotique par voie parentérale.

**Mise en condition du malade**

- Hospitalisation en milieu chirurgical.
- Voie veineuse périphérique.
- Hydratation : **GLUCOSÉ** à 5 % : 2 L/24 h + NaCl 4 g/L + KCl 2 g/L (à adapter à chaque patient).
- Si vomissements : sonde gastrique en aspiration douce et continue.
- Patient à jeun.

**Antalgiques**

- Vessie de glace sur l'hypocondre droit.
- **Antispasmodique musculotrope (SPAS-FON)** 2 amp. x 3/j.
- **Antalgique périphérique, paracétamol (PERFALGAN)** : 1 g x 3/24 h (risque de masquer une fièvre).

**Antibiothérapie**

Après 3 hémocultures, double antibiothérapie à bonne diffusion biliaire dirigée contre les germes habituellement en cause (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, anaérobies) à adapter secondairement à l'antibio-

gramme : **amoxicilline + acide clavulanique** ou **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération + aminoside** ou **fluoroquinolone ± imidazolé**.

Exemples :

- **AUGMENTIN** IV 1 g/8 h + **CIFLOX** IV 200 mg/12 h.
- **ROCEPHINE** IV 2 g/24 h + **FLAGYL** IV 500 mg/8 h.
- En cas d'allergie aux **pénicillines** : **CIFLOX** IV 200 mg/12 h + **FLAGYL** IV 500 mg/8 h.

**Surveillance****Clinique**

- Fréquence cardiaque, tension artérielle, température, diurèse.
- Ictère, douleur et palpation abdominale.

**Biologie**

- Ionogrammes sanguin et urinaire, fonction rénale, NFS, bilan hépatique (bilirubine, phosphatases alcalines).
- Bilan préopératoire.

**Intervention chirurgicale**

Elle est pratiquée après refroidissement par 48 h de traitement médical, ou plus rapidement s'il y a persistance des signes infectieux.

Cholécystectomie, idéalement par voie coelioscopique (cf. Colique hépatique).

## ANGIOCHOLITE AIGUË LITHIASIQUE

C'est une urgence chirurgicale. Le pronostic vital peut être rapidement menacé : il s'agit d'une septicémie avec rétention d'une bile infectée.

Le diagnostic est évoqué devant la triade : douleur, fièvre, ictère, se succédant dans cet ordre.

### Mise en condition du malade, antalgiques, antibiotiques

L'attitude est identique à celle adoptée au cours de la cholécystite aiguë lithiasique (cf. Cholécystite aiguë lithiasique).

Le traitement chirurgical est parfois différent.

### Traitement de la lithiase

#### Sphinctérotomie endoscopique associée à un traitement chirurgical

Cette attitude est recommandée en cas d'angiocholite et/ou d'ictère obstructif.

##### ► Sphinctérotomie endoscopique

Après correction des troubles de l'hémostase par perfusion de 20 à 40 mg de **VITAMINE K1**, et opacification rétrograde du cholédoque, on sectionne le sphincter d'Oddi.

La CPRE (cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique) permet de prati-

quer un prélèvement bactériologique de bile, l'extraction des calculs (soit spontanément, soit par l'intermédiaire d'une sonde) et le drainage biliaire (interne ou externe avec mise en place d'un drain nasobiliaire).

##### ► Cholécystectomie

Elle est effectuée à froid, 4 à 6 sem. après l'épisode aigu, idéalement par voie coelioscopique (cf. Colique hépatique).

#### Traitement chirurgical seul

Cette attitude est préconisée lorsque le calcul a franchi le sphincter d'Oddi et qu'il n'y a plus d'obstacle. L'intervention se fait par laparoscopie.

L'intervention est pratiquée dans les 48 h qui suivent l'instauration du traitement médical :

- cholécystectomie ;
- cholangiographie peropératoire ;
- si calculs de la voie biliaire principale: extraction par voie trans-cystique (cystique long, petits calculs) ou cholédocotomie ;
- prélèvement bactériologique de bile ;
- contrôle de la vacuité de la voie biliaire principale ;
- lavage abondant ;
- si besoin drainage biliaire externe.

#### Conduite à tenir devant une lithiase de la voie biliaire principale non compliquée

Deux attitudes sont possibles :

- sphinctérotomie endoscopique, puis cholécystectomie secondaire sous laparoscopie ;
- ou intervention chirurgicale d'emblée sous laparoscopie ou laparotomie.

Certaines équipes évitent la première attitude chez le sujet jeune compte tenu du devenir mal connu à long terme des sphinctérotomies.

## HÉPATITE VIRALE AIGÜE (1)

### Virus responsables

Les virus des hépatites A, B et E et plus rarement C et D sont responsables de la majorité des hépatites aiguës en France. Les autres virus sont le CMV (cytomégalo-virus), l'EBV (virus d'Epstein-Barr) et l'HSV (virus herpès).

### Diagnostic

- Infection asymptomatique : 90 % des cas.
- Clinique : ictère.
- Biologie : transaminases (surtout ALAT) entre 10 et 100 fois la normale.

#### Recherches sérologiques systématiques

- Hépatite A : IgM anti-VHA.
- Hépatite B : Ag HBs et IgM anti-HBc.
- Hépatite C : Ac anti-VHC (négatif en phase aiguë dans 50 % des cas).
- Hépatite E : IgM anti-VHE.

#### Recherches sérologiques en fonction des données épidémiologiques

- Hépatite D : Ac anti-VHD (négatif en phase aiguë dans 50 % des cas)
- Hépatites à CMV, EBV ou HSV : recherche d'IgM anti-CMV, anti-HSV et anti-VCA (pour le virus EBV).

### Conduite pratique

#### Mesure hygiéno-diététique

L'hépatite virale aiguë est le plus souvent bénigne et il n'y a pas de traitement spécifique.

L'hospitalisation n'est pas indispensable dans les formes non compliquées. Un arrêt de travail peut suffire.

Arrêt de toute boisson alcoolisée.

Le reste du régime est normal ; il est classique de limiter l'apport en graisses.

Aucun traitement médicamenteux n'est nécessaire dans les hépatites virales aiguës, sauf pour l'hépatite C.

#### Arrêt des médicaments

Tous les médicaments non indispensables doivent être arrêtés, notamment les contraceptifs oraux.

Dans les rares cas où un médicament vital doit être poursuivi, la posologie doit être adaptée à l'importance de l'insuffisance hépatique.

En cas de prurit, on utilisera un chélateur des sels biliaires, **colestyramine (QUESTAN)** : 1 sach. x 3/j.

**VACCIN ANTI-HÉPATITE A****■ Vaccin anti-hépatite A**

<b>HAVRIX</b>					
A. 1 440 U 1 inj. suivie d'un rappel à 6 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 1 440 U 1 mL	24,66	I	65 %	24,66
E. 720 U 2 inj. à 1 mois d'intervalle ; rappel à 6 ou 12 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 720 U 1 mL	16,35	I	65 %	16,35
<b>AVAXIM</b>					
A. 1 inj. suivie d'un rappel à 6 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 0,5 mL + 2 aig.	24,66	I	65 %	24,66

**■ Vaccin anti-hépatite A + vaccin anti-hépatite B**

<b>VACCIN TWINRIX</b>					
A. 1 inj. suivie d'un rappel à 1 mois et à 6 mois	1 ser. 1 mL 720 U VHA + 20 µg Ac HBs		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir du virus de l'hépatite A, purifié et inactivé. L'immunité apparaît chez plus de 99 % des sujets immunocompétents.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite A.

Cette vaccination est recommandée :

- chez les voyageurs se rendant en zone endémique (régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie (Moyen et Extrême-Orient), d'Amérique (centrale et du Sud) ;
- chez les sujets exposés professionnellement : employés de crèches et d'institutions d'enfants ou d'adolescents, assistantes maternelles, personnel médical et paramédical ; employés du secteur alimentaire, agents des cuisines, professions d'entretien d'eaux usées ;
- chez les sujets à risque particulier de contamination : homosexuels (rapports oraux-anaux), toxicomanes ;
- chez les sujets au contact de personnes infectées car l'excrétion du virus peut se prolonger après la maladie ;
- chez les personnels militaires.

Il est possible que l'infection soit méconnue au moment de la vaccination. Dans ce cas, la vaccination ne modifie pas le cours de la maladie. La vaccination est recommandée systématiquement en cas de contagie si les conditions suivantes sont réunies : naissance après 1945, absence d'antécédent connu d'ictère et absence de séjour de plus d'un an dans un pays de forte endémicité. Dans les autres cas, une sérologie préalable est préférable.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants du vaccin (albumine).

Infection fébrile.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : effet non évalué mais le risque sur le fœtus devrait être négligeable (comme avec tous les vaccins viraux inactivés).

**Allaitement** : effet non évalué.

Ne pas injecter par voie IV : vérifier avant l'injection que l'aiguille n'est pas dans une veine ; préférer l'injection dans le deltoïde plutôt que dans le muscle fessier ; exceptionnellement, le vaccin pourra être administré par voie SC en cas de risque hémorragique grave.

La réponse immunitaire est moins bonne chez les patients immuno-déprimés ; une administration répétée du vaccin peut être nécessaire. Bien agiter le vaccin avant l'injection.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réaction locale transitoire cédant en 48 h.

Rarement, réactions générales : fièvre, céphalées, nausées, vertiges, fatigue.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Injecter en un site différent avec une aiguille différente les **immunoglobulines anti-hépatite A**.

Le contrôle des taux sériques d'anticorps anti-VHA est inutile avant (il n'y a pas de risque à vacciner un sujet ayant déjà contracté la maladie) et après la vaccination chez les sujets immunocompétents.



## HÉPATITE VIRALE AIGÜE (2)

### Surveillance

La mesure régulière du taux de prothrombine doit être systématique : **un taux inférieur à 50 % nécessite une hospitalisation en urgence en milieu spécialisé du fait du risque d'hépatite fulminante ou subfulminante.**

Les transaminases doivent être dosées tous les mois.

### Hépatite C aiguë

– En cas de primo-infection asymptomatique (accident d'exposition au sang), certains proposent de débiter un traitement par interféron si ARN+ à 2 reprises, alors que d'autres préfèrent attendre une élévation des transaminases.

– En cas d'hépatite C aiguë ictérique, compte tenu de la possibilité de guérison spontanée dans 50 % des cas, la recherche de l'ARN doit être effectuée 12 sem. après le début de l'ictère ; si elle est +, un traitement doit être débuté. La conférence de consensus 2001 est obsolète et on doit maintenant proposer de l'**interféron pégylé** : **PEGASYS** 180 µg/sem. ou **VIRAFERONPEG** 1,5 µg/kg/sem. pendant 6 mois.

– L'intérêt d'ajouter de la **ribavirine** est probable mais n'a pas été établi dans cette indication.

Un traitement précoce permet d'éliminer le VHC dans plus de 90 % des cas.

### Détermination de la source de contamination

#### ► Hépatites A et E

Aliments (fruits de mer), eau, selles (personnel de crèches). L'hépatite E peut être secondaire à la consommation de saucisses contenant du foie de porc cru (figatelli corses) et plus généralement de porc pas assez cuit ou de gibier.

#### ► Hépatites B, C et D

Sujet porteur, toxicomanie, transfusion, origine d'une zone endémique.

Une enquête familiale doit être systématiquement pratiquée : interrogatoire,

dosage des transaminases et des marqueurs viraux.

### Prophylaxie

#### ► Mesures générales

- Hépatite A : pas d'isolement ; précautions vis-à-vis des selles.

**Déclaration obligatoire** à l'Agence régionale de santé (ARS) de l'hépatite A aiguë.

- Hépatite B : brosse à dents, rasoir, couverts personnels ; isolement et précautions lors des prélèvements (si hospitalisation) ; rapports protégés.

#### ► Immunoprofylaxie

Elle doit être débutée précocement sans attendre les résultats sérologiques si l'entourage n'est pas vacciné.

- Hépatite A : il est conseillé de vacciner les personnes qui sont à la fois : nées après 1945, sans antécédent connu d'ictère et n'ayant pas séjourné plus d'un an dans un pays de forte endémicité.

Si l'une au moins des conditions précédentes n'est pas remplie et si la vaccination est compatible avec un délai de 14 j après le contact, une sérologie préalable, à la recherche d'anticorps totaux anti-VHA, est fortement recommandée : seules les personnes ayant une sérologie négative seront vaccinées. Si l'hépatite est survenue dans une structure collective, il est nécessaire de faire par interrogatoire une recherche rétrospective et prospective d'autres cas.

- Hépatites B et D : **immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B** : 500 U en IM (contact sexuel) à 5 000 U en IV (contact sanguin) couplées à un début de vaccination.

- Hépatite E : un vaccin a été commercialisé dans les zones d'endémie les plus élevées (Chine, Mongolie) ; l'efficacité à long terme et sur les VHE des géotypes européens n'est pas certaine.

**IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES ANTI-HÉPATITE A****■ Immunoglobulines G contenant des anticorps anti-VHA**

<b>IMMUNOGLOBULINES anti-VHA</b>				
Inj. IM	1 ser. 2 mL		NR	
Protection de l'adulte : 1 dose unique de 5 mL	1 ser. 5 mL		NR	
Protection de l'enfant : 1 dose unique de 2 mL				

Ces immunoglobulines ne sont pas disponibles en France. On peut les obtenir en Autriche, en Belgique, en Allemagne ou en Suisse.

**PROPRIÉTÉS**

Gammaglobulines spécifiques anti-hépatite A assurant une immunoprotection contre cette maladie pendant les 2 mois qui suivent l'injection. Le mode d'obtention de ces immunoglobulines exclut le risque de transmission du VIH et des hépatites virales.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite A en cas d'épidémie ou de contagé en milieu hospitalier, en crèche et en général dans toutes les collectivités de sujets fragiles. Les indications sont limitées depuis le développement de la vaccination.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit complet en IgA.  
Immunisation anti-IgA.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'association au vaccin anti-hépatite A, pratiquer les 2 inj. à des sites différents avec des aiguilles différentes.

Ne pas utiliser de vaccins à virus vivants atténués dans les 15 j qui précèdent et les 2 mois qui suivent l'injection des **gammaglobulines** (risque d'échec de la vaccination).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnellement, sensation de malaise ou rash cutané cédant spontanément ou après injection d'**antihistaminiques H<sub>1</sub>** ou de **corticoïdes**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cf. Précautions d'emploi.

**HÉPATITE VIRALE AIGÜE (3) – HÉPATITE FULMINANTE****Définition**

Il existe deux types de définition :

1. Apparition d'une encéphalopathie hépatique au cours d'une maladie hépatique aiguë sur un foie antérieurement sain. Si le délai entre l'ictère et l'encéphalopathie hépatique est  $< 15$  j, c'est une hépatite fulminante ; s'il est  $> 15$  j, c'est une hépatite subfulminante.

2. Chute du taux de prothrombine ou du facteur V en dessous de 50 % au cours d'une maladie hépatique aiguë sur un foie antérieurement sain. (On se réfère à la biologie et non pas à l'encéphalopathie hépatique.)

Encéphalopathie hépatique : stade I : astérisis ; stade II : confusion mentale ; stade III : coma.

**Conduite à tenir**

L'hépatite fulminante est une urgence vitale : le pronostic vital est en jeu à très court terme.

- Arrêt de tous les traitements médicamenteux.
- Transfert en extrême urgence en réanimation hépatologique.

**Prévention des aggravations évitables**

Mise en place d'une voie veineuse périphérique avec du glucosé à 10 % : 1 à 2 L/24 h + NaCl + KCl (quantités à adapter à la biologie) + vitamines **B1** et **B6** (1 amp./j).

Sonde nasale pour oxygénothérapie voire intubation avec ventilation assistée.

Une administration IV de **N-acétylcystéine** est parfois effectuée car la consommation récente de **paracétamol** est fréquente.

L'administration de plasma frais congelé « pour améliorer la coagulation » est contre-indiquée car elle empêche la surveillance sans améliorer la survie.

**Contrôle des complications de la maladie**

Surélévation du tronc de 30° pour limiter l'œdème cérébral ; si besoin, on peut utiliser du **mannitol** IV.

En cas d'insuffisance rénale, une hémofiltration est pratiquée.

**Transplantation hépatique en urgence**

L'indication doit être prise en milieu spécialisé.

Schématiquement, elle est prise lorsqu'il existe une confusion ou un coma avec un facteur V  $< 20$  ou 30 % (respectivement si âge  $< > 30$  ans) car dans ce cas, la mortalité spontanée atteint 85 à 90 %.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (1)

La prise en charge de l'hépatite chronique B a beaucoup évolué avec le développement de virus mutants et l'arrivée des nouveaux antiviraux.

Ce chapitre reprend les recommandations de l'AASLD et de l'EASL [1] [2].

Les hépatites chroniques virales sont le

plus souvent asymptomatiques et découvertes de façon fortuite ou lors d'un dépistage.

En France, les porteurs chroniques de l'antigène HBs représentent 0,2 à 0,5 % de la population. La transmission se fait par voie sanguine ou sexuelle.

### Groupes à risque pour l'infection par le VHB nécessitant un dépistage

- Toxicomanes IV.
- Sujets originaires d'une zone d'endémie : Asie du Sud-Est, Afrique noire.
- Homosexuels masculins et hétérosexuels à partenaires multiples.
- Entourage familial d'un porteur chronique de l'Ag HBs.
- Enfants nés de mère Ag HBs+ n'ayant pas été vaccinés.
- Personnel de santé non vacciné.
- Transfusés (transfusion très ancienne).

### Histoire naturelle

L'infection par le VHB est asymptomatique dans 90 % des cas. Qu'elle soit symptomatique ou non, elle aboutit dans 90 % des cas à la guérison. La gravité est due au fait que les 10 % restants développent des

lésions d'hépatite chronique pouvant aboutir, après 10 ans à 30 ans d'évolution, à une cirrhose et/ou à un carcinome hépatocellulaire.

L'infection chronique par le VHB évolue en 3 phases détaillées dans le tableau suivant.

### Histoire naturelle de l'infection chronique par le VHB\*

	PREMIÈRE PHASE	DEUXIÈME PHASE	TROISIÈME PHASE
Réplication virale	Intense	Faible	Nulle
Ag HBe	+	±	-
Ac anti-HBe	-	±	+
ADN VHB	Élevé	Faible	Absent
Transaminases	Peu élevées	Très élevées	Normales
Activité	Modérée Hépatite chronique peu active (appelée aussi persistante)	Intense Hépatite chronique active	Faible ou nulle Hépatite chronique peu active ou cirrhose ou carcinome hépatocellulaire

\* L'activité est reflétée par l'inflammation et la nécrose qui précèdent la fibrose.

Le passage de la 2<sup>e</sup> à la 3<sup>e</sup> phase correspond à la séroconversion dans le système et ce taux est de 15 % par an.

Pendant la 3<sup>e</sup> phase peut survenir une séroconversion dans le système s qui correspond à un arrêt complet de l'activité histologique et de la réplication virale (moins de 5 % par an).

Le risque d'évolution vers la cirrhose est de 30 % après 20 à 30 ans d'évolution.

Le risque de carcinome hépatocellulaire est de 4 % par an (soit 20 % à 5 ans) chez un patient cirrhotique.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (2)

### Diagnostic sérologique

Les marqueurs sériques utilisés pour le diagnostic ou la surveillance des infections par le VHB sont l'Ag HBs, l'Ac anti-HBs, l'Ac anti-HBe (dont on peut caractériser les IgM), l'Ag HBe et l'Ac anti-HBe et l'ADN sérique du VHB.

#### Ag HBs et Ac anti-HBs

L'Ag HBs témoigne d'une infection virale et l'Ac anti-HBs d'une protection (guérison ou vaccination). Il existe un intervalle libre qui peut durer quelques semaines entre la disparition de l'Ag HBs et l'apparition de l'Ac anti-HBs.

#### Ac anti-HBc


L'Ac anti-HBc témoigne d'un contact avec le virus, qu'il soit récent ou ancien.

#### Ag HBe et Ac anti-HBe

L'Ag HBe témoigne d'une réplication virale (et donc d'un risque de transmission virale). La présence de l'Ac anti-HBe témoigne, si l'ADN du VHB est négatif, d'un virus sauvage, et si l'ADN du VHB est positif, d'un virus mutant (50 % des cas envrion).

#### ADN VHB

La présence dans le sérum d'ADN du VHB témoigne d'une réplication virale (et donc d'un risque de contagion). La quantification de la vérimie participe à la décision d'introduire ou non un traitement antiviral. La surveillance du taux d'ADN du VHB permet d'évaluer l'efficacité du traitement.



Extrait de C. Buffet, G. Pelletier, Hépatologie. Paris : Masson, 1994.

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (1)****■ Entécavir**

<b>BARACLUDE</b>					
Patient n'ayant jamais reçu de traitement par un analogue nucléosidique : 0,5 mg x 1/j	30 cp. 0,5 mg	477,75	I	65 %	15,93
Patient résistant à la <b>lamivudine</b> : 1 mg x 1/j, prise à jeun (plus de 2 h avant ou plus de 2 h après un repas)	30 cp. 1 mg 1 fl. 210 mL 0,05 mg/mL	477,75 554,28	I I	65 % 65 %	15,93 554,28

Le **ténofovir (VIRÉAD)** est décrit in Maladies infectieuses.

**PROPRIÉTÉS**

Analogue nucléosidique de la guanosine phosphorylé en forme triphosphate active. Par compétition avec le substrat naturel, le désoxyguanosine triphosphate, l'entécavir triphosphate inhibe les 3 fonctions de la polymérase virale : l'amorce des polymérases du VHB, la transcription inverse du brin négatif d'ADN à partir de l'ARN messager pré-génomique, et la synthèse du brin positif d'ADN du VHB.

**INDICATIONS**

Hépatite chronique virale B en phase de répliation et active histologiquement ou fibrose. Cirrhose virale B.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active. Grossesse, allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la posologie (cf. Tableau *infra*). Surveiller une fois/an la fonction rénale avec clairance, protéinurie, hématurie, glucosurie.

Cl. créatinine (mL/min)	Posologie du <b>BARACLUDE</b>	
	Patients naïfs de nucléosides	Patients résistants à la <b>lamivudine</b>
≥ 50	0,5 mg x 1/j	1 mg x 1/j
30-49	0,25 mg x 1/j* ou 0,5 mg/48 h	0,5 mg x 1/j
10-29	0,15 mg x 1/j ou 0,5 mg/72 h	0,3 mg x 1/j ou 0,5 mg/48 h
< 10 Hémodialyse ou DPAC**	0,05 mg x 1/j ou 0,5 mg/5-7 j	0,1 mg x 1/j ou 0,5 mg/72 h

*Exacerbations de l'hépatite* : augmentation transitoire des transaminases.

L'**entécavir** ne doit pas être utilisé chez les patients co-infectés VIH/VHB ne recevant pas de traitement antirétroviral hautement actif (HAART).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalée, sensation vertigineuse, somnolence. Vomissements, diarrhée, nausée, dyspepsie. Fatigue, insomnie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation de la concentration sérique de l'**entécavir** en cas de prise simultanée d'une molécule altérant la fonction rénale.

\* Pour les doses < 0,5 mg, **BARACLUDE** solution buvable est recommandée.

\*\* Les jours d'hémodialyse, administrer l'**entécavir** après l'hémodialyse.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (3)

### Diagnostic sérologique d'une infection par le VHB

MARQUEURS	SIGNIFICATION
Ag HBs+ ; Ac anti-HBs- ; IgM anti-HBc+	Hépatite virale B aiguë (ou dans certains cas particuliers réactivation virale B)
Ag HBs- ; Ac anti-HBs- ; IgM anti-HBc+	Hépatite virale B aiguë en voie de guérison (avant l'apparition des Ac anti-HBs)
Ag HBs- ; Ac anti-HBs+ ; Ac anti-HBc+	Hépatite virale B ancienne et guérie
Ag HBs- ; Ac anti-HBs+ ; Ac anti-HBc-	Sujet vacciné contre l'hépatite B (ou hépatite B guérie très ancienne)
Ag HBs+ ; Ag HBe+ ; Ac anti-HBe- ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB+ > 2 000 UI/mL	Hépatite chronique B en phase de réplication
Ag HBs+ ; Ag HBe- ; Ac anti-HBe+ ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB- (ou < 2 000 UI/mL)	Porteur inactif de l'antigène HBs
Ag HBs+ ; Ag HBe- ; Ac anti-HBe+ ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB+	Hépatite chronique B en phase de réplication à virus mutant
NB : Il est important de déterminer s'il existe une surinfection par le virus Delta ; l'Ag Delta est rarement retrouvé et l'infection est donc affirmée par la présence d'Ac anti-Delta	
Ag Delta+ ou Ac anti-Delta+ ; IgM anti-HBc+	Co-infection VHB et virus Delta
Ag Delta+ ou Ac anti-Delta+ ; IgM anti-HBc-	Surinfection à virus Delta chez un porteur chronique du VHB

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (2)****■ Lamivudine**

<b>ZEFFIX</b>					
Hépatite chronique B : 100 mg/j Choisir la suspension buvable si des doses < 100 mg/j sont utilisées (insuffisance rénale)	28 cp. 100 mg 1 fl. 240 mL (5 mg/mL) + pipette doseuse	90,02 41,05	I I	65 % 65 %	3,22 41,05
<b>EPIVIR</b>					
Idem <b>ZEFFIX</b>	60 cp. séc. 150 mg 30 cp. 300 mg 48 càc 1 fl. 240 mL 10 mg/mL	145,81 145,81 51,47	I I I	100 % 100 % 100 %	2,43 4,86 1,07

**PROPRIÉTÉS**

Antiviral très actif contre le virus VHB. La **lamivudine** est transformée en lamivudine triphosphate dans les hépatocytes, s'intègre dans le génome viral et inhibe la transcriptase inverse et l'ADN polymérase virale. Elle n'interfère pas avec le métabolisme cellulaire normal. La **lamivudine** entraîne des résistances qui sont quasi constantes après 1 an de traitement.

**INDICATIONS**

La **lamivudine** ne doit plus être utilisée en première intention du fait des résistances qu'elle entraîne.

Hépatite B chronique de l'adulte avec réplacation virale et :

- inflammation hépatique active histologiquement documentée et/ou fibrose ;
- ou atteinte hépatique décompensée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement.**

Hypersensibilité à la **lamivudine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Expérience clinique**

Le traitement doit être administré jusqu'à la séroconversion dans le système e (ou dans le système) avec VHB DNA négatif. L'arrêt du traitement peut aussi être envisagé en cas de retour à des valeurs sériques d'ALAT préthérapeutiques ou à une détérioration histologique. La **lamivudine** entraîne des mutations virales, notamment la mutation YMDD : 20 % à 1 an et 53 % à 3 ans de traitement. La poursuite du traitement malgré ces mutations permettrait toutefois de maintenir un certain bénéfice. Les implications à long terme de ces mutations sont inconnues. 53 % des patients reviennent au virus sauvage après arrêt de la **lamivudine**. Il existe ainsi un risque d'exacerbation de la maladie à l'arrêt du traitement. En pratique, la présence d'une mutation YMDD implique de ne pas arrêter le traitement.

**Insuffisance rénale**

Adapter la posologie (cf. Tableau *infra*).

Cl. créatinine (mL/min)	Posologie initiale	Dose d'entretien
30 à 50	20 mL (100 mg)	10 mL (50 mg)
15 à 30	20 mL (100 mg)	5 mL (25 mg)
5 à 15	7 mL (35 mg)	3 mL (15 mg)
< 5	7 mL (35 mg)	2 mL (10 mg)

**EFFETS INDÉSIRABLES**

La **lamivudine** est très bien tolérée chez les patients infectés par le VHB. Les effets indésirables les plus fréquents sont : malaise, asthénie, infections respiratoires, gêne au niveau de la gorge et des amygdales, céphalées, douleur ou gêne abdominale, nausée, vomissements, diarrhées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**BACTRIM** : augmentation de 40 % de l'exposition à la **lamivudine** mais en l'absence d'insuffisance rénale, ne pas modifier la posologie de la **lamivudine**.



**HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (4)****Évaluation de l'atteinte hépatique - décision de traitement**

La décision de traité dépend de la virémie du niveau des transaminases et de l'atteinte histologique.

La biopsie du foie doit être discutée au cas pas cas.

Les méthodes non invasives pour évaluer l'atteinte hépatique n'ont été validées que dans l'hépatite C et pas dans l'hépatite B, même si des extrapolations sont souvent faites (cf. Hépatite C).

En fonction de l'activité, de la fibrose et du terrain, on décide de la mise en route ou non du traitement.

**Indications thérapeutiques****Cas général**

Les patients doivent être traités si ADN VHB > 2 000 UI/mL et/ou ALAT > N et/ou lésions nécrotico-inflammatoires et/ou fibrose modérée à sévère (A2F2).

Doivent être également pris en compte l'âge et l'état général.

**Indications particulières**

- Patients immunotolérants : ALAT normales, ADN VHB > 10<sup>7</sup> UI/mL en l'absence de cirrhose ou d'antécédent familial de carcinome hépatocellulaire : surveillance.
- Femme enceinte au 3<sup>e</sup> trimestre avec une virémie > 10<sup>7</sup> UI/mL quel que soit le niveau des transaminases : traitement par **ténofovir (VIRÉAD)** pour diminuer le risque de transmission à l'enfant qui persiste, malgré la sérovaccination à la naissance, du fait de la virémie élevée.
- Patient ayant une hépatite chronique B peu sévère : ALAT < 2N et lésions histologiques < A2F2.
- Patients ayant une cirrhose compensée et un ADN viral détectable : traitement, quelle que soit la virémie (même < 2 000 UI/mL).
- Patients ayant une cirrhose décompensée : traitement urgent.

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (3)****■ Adéfovir dipivoxil**

<b>HEPSERA</b>					
1 cp. x 1/j, à prendre au moment ou en dehors des repas	30 cp. 10 mg	528,14	I	65 %	17,60

**PROPRIÉTÉS**

L'**adéfovir dipivoxil** est une prodrogue orale de l'adéfovir, analogue nucléotidique phosphate acyclique de l'adénosine monophosphate, qui est converti en adéfovir diphosphate. L'adéfovir diphosphate inhibe les polymérases virales par compétition directe de liaison avec le substrat naturel (désoxyadénosine triphosphate) et, après incorporation dans l'ADN viral, il provoque la terminaison de la chaîne d'ADN. L'adéfovir diphosphate inhibe de manière sélective les polymérases de l'ADN du VHB à des concentrations 12, 700 et 10 fois plus faibles que celles nécessaires pour inhiber respectivement les polymérases a, b et g de l'ADN humain. L'adéfovir diphosphate a une demi-vie intracellulaire comprise entre 12 et 36 h dans les lymphocytes activés et au repos.

L'**adéfovir** entraîne des résistances et n'est plus utilisé en première intention.

**INDICATIONS**

Du fait des résistances qu'il entraîne, l'**adéfovir** ne doit plus être utilisé en première intention. Hépatite B chronique avec répllication virale

active, élévation persistante des ALAT, inflammation hépatique active et fibrose histologiquement prouvées.

Hépatite B décompensée.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Adapter la posologie à la clairance de la créatinine :

- 20 à 49 mL/min : 1 cp./48 h ;
- 10 à 19 mL/min : 1 cp./72 h ;
- hémodialyse : 1 cp./7 h après la dialyse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquent : asthénie.

Fréquents : nausées, flatulences, diarrhées, dyspepsie, douleurs abdominales, céphalées.

Apparition fréquente d'une insuffisance rénale (néphropathie tubulaire).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Adapter la posologie des médicaments associés en cas d'élévation de la créatininémie.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (5)

### Traitement

#### Objectifs du traitement

Le but du traitement est d'obtenir un arrêt de la multiplication virale avec une séro-conversion dans le système e (pour les virus sauvages) voire dans le système s. L'arrêt de la réplication virale permet de limiter l'évolution des lésions hépatiques vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Prise en charge à 100 %.

#### Bilan préthérapeutique

**Cf. Médicament interféron alpha** si un traitement par cette molécule est décidé.

#### Traitement

On dispose de 2 types de traitements : l'**interféron** et les **analogues nucléosidiques ou nucléotidiques**.

– On a tendance à utiliser en première intention l'**interféron** dans les hépatites B chroniques avec Ag HBe+. En effet, sous **interféron**, les Ac anti-HBe apparaissent dans 30 à 40 % des cas et la durée du traitement est codifiée (1 an). À long terme, l'Ag HBs peut se négativer pour laisser place à des Ac anti-HBs.

– Les **analogues nucléosi(t)idiques** sont bien tolérés, efficaces aussi bien chez les patients Ag HBe+ que AgHBe-. Leur limite est le risque d'émergence de mutants résistants ; avec les nouvelles molécules, le risque à 5 ans est très faible. De plus, la durée du traitement n'est pas codifiée ; un traitement à vie est envisageable.

Arrêt de l'alcool et de tout médicament hépatotoxique (le paracétamol n'est pas contre-indiqué).

Il n'y a aucun régime particulier à suivre (le régime pauvre en graisses est inutile) mis à part l'arrêt de l'alcool.

– **Interféron alpha pégylé**

**PEGASYS** : 180 µg/sem. pendant 1 an.

Le bilan préthérapeutique est développé dans la fiche pharmacologique.

Prévention du syndrome pseudo-grippal : **paracétamol (DOLIPRANE)** : 1 g avant l'injection à renouveler éventuellement si besoin.

– **Analogues nucléosidiques et nucléotidiques**

On utilise deux types de molécules qui ont un profil de résistance très faible : analogue nucléosidique, **entécavir (BARACLUDE)** 1 cp. à 0,5 mg/j ou **analogue nucléotidique, ténofovir (VIRÉAD)** : 1 cp. à 245 mg/j.

La fonction rénale doit être surveillée une fois par an, en particulier pour le **ténofovir** :

– dosage de la créatininémie et calcul du débit de filtration glomérulaire (formule MDRD) ;

– bandelette urinaire pour dépistage de la protéinurie, de l'hématurie et de la glycosurie ;

– le taux de phosphate sérique doit être surveillé. Si le taux est < 0,48 mmol/L (1,5 mg/dL), la surveillance doit être rapprochée. Si le taux est < 0,32 mmol/L (1,0 mg/dL), l'arrêt du traitement doit être envisagé.

#### Facteurs de bonne réponse à l'interféron pour une hépatite virale chronique B

- Infection récente.
- Absence de déficit immunitaire.
- Transaminases élevées.
- Activité histologique marquée.
- Charge virale faible < 10<sup>7</sup> UI/mL.
- Génotype A.

#### Surveillance

– Virémie (ADN VHB) : tous les 3 mois.

– Si AgHBe+, contrôle tous les 3 mois.

– Surveillance des effets indésirables de l'**interféron**.

– Surveillance de la fonction rénale régulière.

– Dépistage du carcinome hépatocellulaire tous les 6 mois.

## IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES ANTI-HÉPATITE B

### ■ Immunoglobulines G contenant des anticorps anti-HBs

IMMUNOGLOBULINES ANTI-HBs					
Inj. IV ou IM Prévention après contact sexuel : 500 UI Sérovaccination des nouveau-nés de mère HBs- : 30 UI/kg à la naissance, à répéter jusqu'à ce que la protection soit assurée par des anticorps produits activement Prévention d'une contamination accidentelle par voie IV : 5 000 UI si le traitement est débuté dans les 24 h ; cette dose doit être doublée si le délai dépasse 24 h ou si l'Ag HBs est présent dans le produit contaminant Prévention de la réinfection du greffon lors de transplantations hépatiques : 10 000 UI/j le jour de la greffe et les 6 j qui suivent puis traitement d'entretien à renouveler en fonction du taux d'Ac anti-HBs qui doit rester > 100 UI/L	1 ser. 100 UI (1 mL)		I	NR	
	1 ser. 500 UI (5 mL)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Gammaglobulines spécifiques anti-HBs assurant une immunoprotection contre l'hépatite B ; demi-vie de 21 jours. Le mode d'obtention de ces immunoglobulines exclut le risque de transmission du VIH et des hépatites virales.

#### INDICATIONS

Prévention de l'hépatite B :

- chez les nouveau-nés de mère HBs+ (à associer à la vaccination) ;
- chez un sujet en cours de vaccination ou dont la sérologie vis-à-vis du VHB est inconnue ou négative, après contamination accidentelle (produit sanguin HBs+, contact sexuel, toxicomanie, etc.) ;
- chez les sujets à risque lorsque la vaccination est inefficace (insuffisants rénaux, immunodéprimés).

Prévention de la réinfection du greffon par le VHB lors des transplantations hépatiques chez les patients porteurs du VHB.

#### CONTRE-INDICATIONS

Déficit complet en IgA.  
Immunisation anti-IgA.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de contact, pratiquer la recherche des marqueurs du VHB avant l'injection des gammaglobulines.

En cas d'association au vaccin anti-hépatite B,

pratiquer les 2 inj. à des sites différents avec des aiguilles différentes.

Ne pas utiliser de vaccins à virus vivants atténués (rougeole, oreillons, rubéole, poliomyélite buvable, etc.) dans les 15 j qui précèdent et les 2 mois qui suivent l'injection des gammaglobulines (risque d'échec de la vaccination).

L'injection IV doit se faire en une seule fois, immédiatement après la reconstitution du produit, à l'aide d'un filtre, sans dépasser un débit de 0,01 mL/kg/min pendant la première demi-heure puis en augmentant progressivement en fonction de la tolérance.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Exceptionnellement, sensation de malaise ou rash cutané cédant spontanément ou après injection d'antihistaminiques H<sub>1</sub> ou de corticoïdes.

Voie IV : réactions d'intolérance en cas de débit trop rapide (fièvre, frissons, modifications hémodynamiques) ; dans ce cas, arrêter transitoirement la perfusion et injecter en IV des corticoïdes ou des antihistaminiques H<sub>1</sub> ; de telles réactions impliquent la recherche d'anticorps anti-IgA.

Rarement, réactions d'intolérance chez les transplantés hépatiques.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Cf. Précautions d'emploi.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (6)

### Prévention

#### Vaccination

Des recommandations ont été faites en 2003 [3].

C'est la meilleure prévention.

La vaccination universelle de tous les nourrissons est à recommander fortement en raison du bénéfice individuel et collectif et de l'absence de complication rapportée lors de la vaccination à cet âge.

Un programme de rattrapage de la vaccination à destination des enfants et des adolescents est fortement recommandé.

La vaccination doit également être systématique chez les groupes à risque en particulier chez les personnels de santé (médecins, infirmière, étudiants en médecine et paramédicaux, personnels de laboratoire et des centre d'hémodialyse, etc.), les insuffisants rénaux, les cirrhotiques (pour une autre étiologie que l'hépatite B, etc.).

La vaccination comporte 3 inj. IM à un mois d'intervalle, un rappel à 1 an puis tous les 5 ans. On peut aussi proposer 2 inj. à 1 mois d'intervalle puis un rappel à 6 mois et tous les 5 ans.

Le taux d'anticorps protecteur est obtenu 2 à 3 mois après la vaccination dans 95 % des cas ; il n'est pas nécessaire de vérifier le taux d'Ac anti-HBs chez les sujets immunocompétents. Dans les autres cas, si le taux est < 10 mUI/L, des injections supplé-

mentaires de vaccin sont indiquées. Si celles-ci restaient inefficaces, il a été suggéré que les patients non-répondeurs à la vaccination pourraient néanmoins ne pas développer d'hépatite B.

Il a été suggéré que le vaccin contre le VHB pourrait être à l'origine de maladies démyélinisantes (sclérose en plaques). L'association française pour l'étude du foie et l'ANAES ont souligné que les études épidémiologiques n'ont pas montré d'association convaincante mais ne permettent pas d'exclure une association de faible ampleur. De plus, le risque de sclérose en plaques n'existe pas chez l'enfant. En pratique, il est simplement déconseillé de vacciner les patients atteints de sclérose en plaques.

#### Séroprévention

Elle est indiquée en cas de risque de contamination chez un sujet non vacciné ou en particulier chez le nouveau-né d'une mère ayant une hépatite B aiguë ou porteuse chronique de l'Ag HBs. On utilise des **immunoglobulines anti-hépatite B** :

- contact sexuel : 500 UI en IM ;
- contact sanguin : 500 UI dans les 24 h ou 10 000 UI si délai de 48 h ;
- nouveau-né : 8 UI/kg sans dépasser 500 UI.

Une vaccination doit systématiquement être associée, mais dans un point d'injection différent.

**VACCIN ANTI-HÉPATITE B (1)**■ **Vaccin anti-hépatite B**

<b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>					
Primovaccination : 3 inj. IM à 1 mois d'intervalle ; rappel : 1 inj. à 1 an puis tous les 5 ans En cas d'insuffisance rénale faire une 4 <sup>e</sup> inj. 2 mois après la 3 <sup>e</sup> Autre schéma possible : 2 inj. à 1 mois d'intervalle ; rappel à 6 mois puis tous les 5 ans Chez les nouveau-nés de mère HBs+, administrer simultanément la 1 <sup>re</sup> dose de vaccin et les immunoglobulines spécifiques	1 ser. 0,5 mL	18,12		65 %	18,12
<b>ENGERIX B</b>					
<b>ENGERIX B</b> adulte 20 µg Idem <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>	1 ser. 1 mL	18,12		65 %	18,12
<b>ENGERIX B</b> enfant et nourrisson 10 µg Même schéma vaccinal que <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b> mais forme réservée à l'enfant	1 ser. 0,5 mL	10,42		65 %	10,42
<b>HBVAXPRO</b>					
Vaccin 10 µg Idem <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>	1 ser. 1 mL	17,24	I	65 %	17,24
Vaccin 5 µg Même schéma vaccinal que <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b> mais forme réservée à l'insuffisant rénal	1 ser. 1 mL	9,92	I	65 %	9,92

**HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (7)****Hépatite chronique Delta**

L'**interféron** est le seul traitement à avoir montré une certaine efficacité. On peut proposer **PEGASYS** : 180 µg/sem. pendant 1 an.

**Cirrhose post-hépatitique B**

Les complications et les traitements sont les mêmes que pour la cirrhose alcoolique (Cf. Cirrhose non compliquée) (sauf bien sûr l'hépatite alcoolique aiguë).

La transplantation est indiquée en cas de cirrhose sévère, c'est-à-dire avec un taux

de prothrombine < 50 % et/ou compliquée d'ascite.

L'infection sur le greffon peut entraîner une hépatite aiguë parfois sévère voire fulminante ; le risque est l'hépatite chronique sur le greffon qui se complique souvent de cirrhose. On utilise les **analogues nucléosi(t)idiques** et les **immunoglobulines anti-HBs** pour prévenir les récurrences.

**Cirrhose post-hépatitique Delta**

Le risque de récurrence sur le greffon est faible si une immunoprophylaxie anti-HBs est instituée.

**On parle de portage inactif de l'antigène HBs à deux conditions :**

- transaminases strictement normales à plusieurs dosages successifs ;

– ADN VHB- ou < 2 000 UI/mL.

Une surveillance tous les 6 mois est recommandée du fait du risque de réactivation virale.

**— CONSENSUS —**

[1] Chronic hepatitis B : an update, *AASLD*, 2009

[2] Clinical Practice Guidelines : Management of chronic hepatitis B virus infection, *EASL*, 2012

[3] Vaccination contre le virus de l'hépatite B, *Anaes*, 2003

**VACCIN ANTI-HÉPATITE B (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir d'une fraction antigénique virale non infectante (Ag HBs). L'immunité apparaît dans presque 100 % des cas après la troisième injection.

Le vaccin protège également de l'hépatite Delta puisque ce virus ne peut se répliquer chez les patients infectés par le virus de l'hépatite B.

Durée de la protection : 5 ans minimum.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite B.

La vaccination devrait être systématique dans l'enfance.

Chez l'adulte, elle concerne tous les sujets exposés à un risque de contamination, en particulier les professions médicales et paramédicales ; les patients insuffisants rénaux et polytransfusés ; les militaires, pompiers, grands voyageurs, toxicomanes prostitués, homosexuels, etc.

La sérovaccination est indiquée chez les nouveau-nés de mère HBs+ et chez les sujets non vaccinés pour prévenir une infection accidentelle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas congeler ; conserver au frais (4 à 8 °C) ; agiter le vaccin avant l'injection.

L'injection doit être faite de préférence chez l'adulte dans le deltoïde et chez le nouveau-né et l'enfant dans la partie antéro-latérale de la cuisse. Exceptionnellement, en cas de risque hémorragique (hémophiles), le vaccin pourra être injecté par voie sous-cutanée.

Faire une 4<sup>e</sup> injection en cas d'insuffisance rénale.

Étant donné la longue période d'incubation de

l'hépatite B, il est possible que l'infection, non reconnue, soit présente au moment de la vaccination. Dans de tels cas, il se peut que la vaccination soit sans effet sur le développement de l'hépatite B.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur locale transitoire cédant en 48 h, voire induration.

Très rarement, syndrome pseudo-grippal, vertiges, rash, prurit, urticaire.

D'autres syndromes ont été décrits mais la relation avec la vaccination est douteuse : anaphylaxie, hypotension, syndrome de Guillain-Barré, névrite optique, sclérose en plaques.

Bien que les études soient contradictoires, la vaccination contre l'hépatite B pourrait favoriser les poussées chez les patients ayant une sclérose en plaques avérée et doit donc être évitée chez ces patients. Le rapport bénéfice/risque doit être évalué au cas par cas pour les apparentés à une personne ayant une sclérose en plaques. Les autres vaccinations sont autorisées en dehors des poussées chez une patiente atteinte de sclérose en plaques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de l'efficacité du vaccin chez les patients immunodéprimés (cirrhotiques, insuffisants rénaux, transplantés, sujets infectés par le VIH, etc.).

Injecter en un site différent avec une aiguille différente les immunoglobulines anti-HBs.

Le contrôle des taux sériques d'anticorps anti-HBs est inutile :

- avant la vaccination (il n'y a pas de risque de vacciner un sujet HBs+) ;

- après la vaccination chez les sujets immuno-compétents.

Un taux 10 UI/L est considéré comme protecteur.



## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (1)

La prise en charge de l'hépatite C a été profondément modifiée en 2014 par l'arrivée des **antiprotéases**, des **inhibiteurs de l'ARN-polymérase** et des **inhibiteurs de la protéine NS5A** du virus de l'hépatite C (VHC). La prise en charge décrite dans ce chapitre tient compte de la disponibilité de ces nouvelles molécules dans le cadre de l'AMM ou en ATU (Autorisation temporaire d'utilisation) avant l'obtention définitive de l'AMM.

Les hépatites chroniques virales sont le plus souvent asymptomatiques et découvertes de façon fortuite ou lors d'un dépistage.

La prévalence de l'anticorps anti-VHC en France est de 1 à 1,5 % de la population, soit 500 000 à 600 000 personnes. Plus de 70 % des sujets infectés par le VHC vont développer une hépatite chronique. L'arbre suivant résume l'attitude à adopter devant la découverte d'une sérologie VHC positive.

### Groupes à risque pour l'infection par le VHC nécessitant un dépistage

#### *Groupe à fort risque :*

- sujet ayant reçu du sang ou des dérivés de sang avant mars 1990 ;
- hémophiles ;
- hémodialysés et transplantés ;
- toxicomanes IV.

#### *Groupe à faible risque :*

- entourage familial d'un sujet infecté par le VHC ;
- antécédent d'acte invasif diagnostique ou thérapeutique (chirurgie, endoscopie avec biopsie, exploration endocavitaire).

Et dépister toute personne ayant des ALAT augmentées.

**INTERFÉRON ALPHA (1)****■ Peginterféron alfa-2b recombinant**

<b>VIRAFERONPEG</b>					
Hépatite chronique C : 1,5 mg/kg/sem. SC	1 fl. 50 µg stylo prérempli	95,44	I	65 %	95,44
	4 fl. 50 µg stylo prérempli	362,47	I	65 %	90,62
	1 fl. 80 µg stylo prérempli	150,12	I	65 %	150,12
	4 fl. 80 µg stylo prérempli	571,00	I	65 %	142,75
	1 fl. 100 µg stylo prérempli	186,45	I	65 %	186,45
	4 fl. 100 µg stylo prérempli	703,47	I	65 %	175,87
	1 fl. 120 µg stylo prérempli	221,66	I	65 %	221,66
	4 fl. 120 µg stylo prérempli	835,93	I	65 %	208,98
	1 fl. 150 µg stylo prérempli	274,46	I	65 %	274,46
	4 fl. 150 µg stylo prérempli	1034,64	I	65 %	258,66

**■ Peginterféron alfa-2a recombinant**

<b>PEGASYS</b>					
Hépatite chronique C : 180 mg/sem. SC	1 fl. 135 µg	156,77	I	65 %	156,77
	4 fl. 135 µg	595,15	I	65 %	148,79
	1 fl. 180 µg	179,93	I	65 %	179,93
	4 fl. 180 µg	679,31	I	65 %	169,83

**■ Interféron alfa-2b recombinant**


<b>INTRONA</b>					
Hépatite chronique C : 3 MUI x 3/sem.	1 fl. 10 MUI/1 mL	78,63	I	65 %	78,63
Hépatite chronique B : 5 MUI/m <sup>2</sup> x 3/sem.	1 fl. 18 MUI/3 mL	138,10	I	65 %	138,10
Leucémie à tricholeucocytes : 3 MUI x 3/sem.	1 fl. 18 MUI/1,2 mL	138,10	I	65 %	138,10
	1 fl. 30 MUI/1,2 mL	225,80	I	65 %	225,80
Sarcome de Kaposi : jusqu'à 36 MUI/j	1 stylo 60 MUI/1,2 mL	441,15	I	65 %	441,15
Leucémie myéloïde chronique : 9 MUI/j					
Lymphome cutané à cellules T : 18 MUI/j					
Mélanome malin, cancer du rein : 10 MUI/m <sup>2</sup> /j					

**■ Interféron alfa-2a recombinant**

<b>ROFÉRON-A</b>					
Idem <b>INTRONA</b>	1 fl. 3 MUI	25,92	I	65 %	25,92
	12 fl. 3 MUI	268,86	I	65 %	22,40
	1 fl. 4,5 MUI	37,76	I	65 %	37,76
	12 fl. 4,5 MUI	398,08	I	65 %	33,17
	1 fl. 6 MUI	48,91	I	65 %	48,91
	12 fl. 6 MUI	527,32	I	65 %	43,94
	1 fl. 9 MUI	71,22	I	65 %	71,22
	12 fl. 9 MUI	770,45	I	65 %	64,20

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (2)

### Conduite à tenir devant une sérologie VHC positive (à 2 reprises)



### Évaluation de l'atteinte hépatique

La méthode de référence est la ponction biopsie hépatique.

Les tests non invasifs sont maintenant recommandés par l'HAS en première intention pour l'évaluation de l'atteinte hépatique. Ils permettent d'éviter la biopsie mais ne sont pas remboursés.

#### Fibrotest/Actitest

Les dosages des paramètres suivants permettent d'évaluer la fibrose hépatique : alpha2-macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine A1, la bilirubine totale et la gamma-GT, paramètres ajustés sur l'âge et le sexe du patient.

L'ajout de l'ALAT aux dosages précédents permet d'évaluer l'activité.

Pour prescrire le *Fibrotest/Actitest*, il faut mentionner sur l'ordonnance le dosage des paramètres précédents et demander en plus le calcul de l'*Actitest* et du *Fibrotest*.

Cet examen est actuellement pris en charge pour l'hépatite C.

Limites de ce test : il ne donne qu'un risque d'activité et de fibrose. Il n'est pas interprétable en cas d'hémolyse ou d'un syndrome de Gilbert (élévation de la bilirubine).

#### Élastographie impulsionnelle ultrasonore (*fibroscan*)

Cette méthode permet de mesurer l'élasticité du foie et de quantifier la fibrose en kPa. Cet examen n'est pas réalisable en cas d'obésité (paroi abdominale trop épaisse). Cet examen est pris en charge par la sécurité sociale pour l'hépatite C.

#### Ponction biopsie hépatique

C'est la méthode de référence. On l'utilise surtout en cas de résultats discordants entre les méthodes non invasives ou si un cofacteur (alcool, surpoids, autre virus) est associé au VHC.

**INTERFÉRON ALPHA (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Interféron alpha 2a ou 2b produit par génie génétique. Propriétés multiples dont les mécanismes restent imparfaitement compris :

- activité antivirale : inhibition de la réplication en modulant le métabolisme de la cellule hôte ;
- activité immunomodulatrice : augmentation de l'activité phagocytaire des macrophages ;
- activité antiproliférative sur certaines tumeurs.

L'**interféron pégylé** a une demi-vie prolongée et permet de ne pratiquer qu'une seule injection par sem. au lieu de 3. L'efficacité est supérieure et la tolérance identique à l'**interféron** non pégylé.

**INDICATIONS**

Hépatite chronique virale C histologiquement prouvée chez des patients n'ayant jamais été traités par **interféron alpha** et présentant des transaminases élevées, en l'absence de cirrhose décompensée.

Hépatite chronique active virale B de l'adulte histologiquement prouvée avec réplication virale persistante prouvée par le taux d'ADN sérique du VHB à 2 examens au moins, réalisés à environ 2 mois de distance dont 1 dans le mois précédant la mise sous traitement.

Leucémie à tricholeucocytes ; leucémie myéloïde chronique ; sarcome de Kaposi associé au sida ; lymphome cutané à cellules T.

Mélanome malin disséminé ; cancer du rein métastatique ou récidivant.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'interféron ou à l'excipient.

Affection cardiaque préexistante (la fièvre et les frissons peuvent décompenser une insuffisance cardiaque).

Insuffisance rénale, hépatique ou médullaire sévère ; cirrhose du foie décompensée.

Antécédent d'épilepsie et/ou atteinte du système nerveux central ; antécédents psychiatriques graves.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : nécessité d'évaluer le bénéfice d'un traitement par rapport au risque pour le fœtus ; pas d'effet tératogène rapporté.

**Allaitement** : absence de données sur le passage dans le lait ; évaluation du bénéfice par rapport au risque nécessaire.

Chez des patients transplantés, l'effet du traitement immunosuppresseur peut être diminué du fait de l'activité immunomodulatrice de l'**interféron**.

Le développement de manifestations auto-immunes est favorisé par l'**interféron** chez des patients prédisposés.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Généraux : syndrome pseudo-grippal quasi constant, fatigue, fièvre, myalgies, lassitude ; ces effets peuvent être atténués par la prise de **paracétamol** (1 g avant l'inj. d'**interféron**) et l'injection de l'**interféron** au coucher.

Digestifs : anorexie, nausées, vomissements, troubles du transit.

Hépatiques : élévation des transaminases.

Neurologiques : vertiges, troubles mnésiques et du sommeil ; somnolence ; paresthésies.

Cardio-pulmonaires : variations tensionnelles, palpitations.

Cutanés : alopecie réversible, sécheresse cutané-muqueuse, psoriasis.

Rénaux : rarement insuffisance rénale.

Hématologiques : leucopénie fréquente, anémie et thrombopénie plus rarement.

Endocriniens : dysthyroïdies, hyperglycémie, hypocalcémie.

Réaction au point d'injection ; apparition d'anticorps anti-interféron.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Salicylés et **corticoïdes** inhibent l'action de l'interféron.

Toxicité digestive du **5-FU** augmentée.

**Théophylline** : contrôler les taux sériques.

Éviter les sédatifs.

**Conditions de délivrance de l'interféron et de la ribavirine pour l'hépatite chronique C**

- Prescription initiale hospitalière (privée ou publique), réservée aux spécialistes ou services spécialisés en gastro-entérologie, hépatologie, maladies de l'appareil digestif, médecine interne. Délivrance en officine sur présentation de l'ordonnance initiale.
- Renouvellement de la prescription : non restreint. Délivrance en officine sur présentation de l'ordonnance de renouvellement et de l'ordonnance initiale.
- La délivrance est uniquement hospitalière dans les autres indications.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (3)

### Traitement

#### Prise en charge générale

- Prise en charge à 100 %.
- Arrêt de l'alcool et des médicaments hépatotoxiques (le paracétamol à dose thérapeutique n'est pas hépatotoxique).
- Aucun régime particulier n'est utile.
- Une contraception doit être prescrite pendant toute la durée du traitement. De plus, un homme traité par **ribavirine** ne doit pas avoir d'enfant pendant toute la durée du traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt (2 cycles de spermatogenèse).

Le traitement dépend du génotype du patient, de la sévérité de la maladie et des facteurs prédictifs de bonne ou de mauvaise réponse au traitement antiviral.

#### Médicaments utilisables

En 2014, les molécules utilisables dans le cadre de l'AMM sont :

- **interféron alpha pégylé (PEGASYS, VIRAFERONPEG)** ;
- **antiviral non spécifique** : **ribavirine (REBETOL, COPEGUS)** ;
- **antiprotéases** (anti-NS3/4A) actives sur les virus de génotype 1 : **télaprévir (INCIVO)**, **bocéprévir (VICTRELIS)** ; bien qu'elles aient une AMM, ces 2 molécules sont devenues obsolètes en 2014 avec l'arrivée de nouveaux **antiviraux** ;
- **inhibiteur pangénotypique de l'ARN-polymérase ARN dépendante (NS5B)** : **sofosbuvir (SOVALDI)**.

Les molécules utilisables dans le cadre d'une ATU sont ou seront :

- une nouvelle **antiprotéase** (anti-NS3/4A) active sur les virus de génotype 1 et 4 : le **siméprévir (OLYSIO)** ;
- un **inhibiteur pangénotypique de la protéine NS5A** qui participe à la réplication virale : le **daclatasvir**.

#### Facteurs prédictifs de réponse au traitement

Ces facteurs prédictifs perdent de leur intérêt du fait de l'arrivée des nouveaux **antiviraux** qui sont vraisemblablement efficaces chez (quasiment) tous les patients dans les études cliniques.

Bonne réponse : virémie faible, fibrose peu avancée, génotype IL28B C/C.

Mauvaise réponse : virémie élevée, fibrose avancée, co-infection VIH, génotype IL28B T/T.

#### Méthodes thérapeutiques

##### ► Virus de génotype 1

Le traitement peut reposer en 2014 sur :

- A) soit une trithérapie associant :
  - 1. **Interféron alpha pégylé (VIRAFERON-PEG, PEGASYS)**. Le **VIRAFERONPEG** est prescrit à la posologie de 1,5 µg/kg x 1/sem. en SC. Le **PEGASYS** est prescrit à la dose de 180 µg x 1/sem. en SC quel que soit le poids ;
  - 2. **Ribavirine (REBÉTOL ou COPEGUS)**, la posologie est adaptée au poids : 1 000 mg si poids < 75 kg ; 1 200 mg si poids ≥ 75 kg. La posologie peut également être adaptée au génotype viral. Un contrôle de la ribavirinémie peut être utile pour déterminer la posologie optimale.

## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (1)

## ■ Ribavirine

RÉBÉTOL					
Hépatite chronique C :	84 gél. 200 mg	161,91	I	65 %	1,93
< 65 kg : 2 gél. x 2/j	112 gél. 200 mg	213,37	I	65 %	1,91
65-85 kg : 2 gél. matin + 3 gél. le soir	140 gél. 200 mg	264,11	I	65 %	1,89
> 85 kg : 3 gél. x 3/j	168 gél. 200 mg	314,84	I	65 %	1,87
2 mL/10 kg de poids matin et soir	1 fl. sol. buv. 40 mg/mL	95,11	I	65 %	95,11
COPEGUS					
Hépatite chronique C :	42 cp. 200 mg	83,11	I	65 %	1,98
< 75 kg : 2 cp. matin + 3 cp. le soir	112 cp. 200 mg	213,37	I	65 %	1,91
≥ 75 kg : 3 cp. x 2/j	168 cp. 200 mg	314,84	I	65 %	1,87
	14 cp. 400 mg	56,84	I	65 %	4,06
	56 cp. 400 mg	213,37	I	65 %	3,81

Prescription initiale par un médecin habitué à prendre en charge les hépatites C

## PROPRIÉTÉS

Antiviral à large spectre actif sur les virus à ADN et ARN : virus de l'hépatite C (VHC), *influenza A et B*, *parainfluenza*, virus respiratoire syncytial (VRS), virus de la fièvre de Lassa. La **ribavirine** pénètre dans les cellules et est convertie en dérivés mono-, di- et triphosphates. Son mécanisme d'action reste mal connu. Elle pourrait entraîner la synthèse d'un ARN viral anormal ou empêcher la réplication du génome viral. Seule, elle n'a pas prouvé son effet sur le VHC. Son association à l'interféron montre une action synergique entre les 2 molécules.

## INDICATIONS

Hépatite chronique à virus C.  
Infection à VRS.  
Fièvre de Lassa.  
Hépatite virale chronique E (hors AMM).

## CONTRE-INDICATIONS

## Absolues

**Grossesse** : tératogène et clastogène chez l'animal.

## Allaitement.

Les contre-indications absolues à la **ribavirine** sont :

- insuffisance rénale terminale ;
- anémie, hémoglobinopathie ;
- cardiopathie sévère ;
- absence de contraception.

## Relatives

Hypertension artérielle.

Âge avancé.

À ces contre-indications s'ajoutent celles de l'interféron lorsque ces deux molécules sont associées.

Hypertension artérielle ;

Âge avancé.

À ces contre-indications s'ajoutent celles de l'**interféron** lorsque ces deux molécules sont associées.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## Prévention de la grossesse.

*Homme traité* : utilisation par le malade et sa partenaire, d'une contraception efficace pendant le traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt ; la femme partenaire doit effectuer un test de grossesse tous les mois pendant le traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt. L'homme dont la partenaire est enceinte doit porter des préservatifs pour éviter que la **ribavirine** n'entre en contact avec le vagin.

*Femme traitée* : un test de grossesse doit être réalisé avant de débiter le traitement puis tous les mois pendant les traitements et les 4 mois qui suivent son arrêt.

Insuffisance cardiaque, angor, antécédent d'infarctus : surveillance rapprochée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie hémolytique pouvant nécessiter une adaptation de la posologie.

Dépression.

Bronchospasme : favorisé par un asthme préexistant, une bronchopneumopathie préexistante et la prise en aérosol du produit. Conjonctivite.

Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La **ribavirine** inhibe la phosphorylation de la **zidovudine** et de la **stavudine** *in vitro*. En cas d'association à ces médicaments, surveiller la virémie du VIH. Si elle augmente, arrêter la **ribavirine**. Ce risque d'interaction peut persister 2 mois après l'arrêt de la **ribavirine**.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (4)

Avec le **VIRAIFERONPEG** :

- < 65 kg : 2 gél. 200 mg x 2/j ;
- 65-85 kg : 2 gél. 200 mg le matin + 3 gél. 200 mg le soir ;
- > 85 kg : 3 gél. 300 mg x 2/j.

Avec le **PEGASYS** :

- génotype 1 ou 4 : < 75 kg, 1 000 mg/j ; ≥ 75 kg : 1 200 mg/j ;
- génotype 2 ou 3 : 800 mg/j.

NB : Plutôt que diminuer la dose de **ribavirine** en cas d'anémie, on peut préférer ajouter une **érythropoïétine** ; ex : **NÉORE-CORMON** : 30 000 UI/sem. en SC (à discuter au cas par cas) ; de même, on peut préférer en cas de neutropénie induite par l'interféron ajouter un **facteur de croissance** plutôt que diminuer la dose (**NEULASTA** : 6 mg en SC).

- 3. **Sofosbuvir (SOVALDI)** : 1 cp./j (400 mg)

La durée totale du traitement est de 12 sem. Elle pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée). Chez les patients naïfs de tout traitement, l'efficacité globale du traitement (guérison) est d'environ 90 %.

• B) soit une bithérapie sans interféron associant :

- **sofosbuvir** + **daclatasvir** pendant 12 à 24 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **siméprévir** si génotype 1b (sauf en cas d'échec d'un traitement antérieur par **télaprévir** ou **bocéprévir**).

NB : Les AMM, conditions de remboursement et recommandations des sociétés savantes ne sont pas encore toutes disponibles lors de l'écriture de ce chapitre. Le coût très élevé d'un traitement par **sofosbuvir** ou **daclatasvir** (le prix définitif n'est pas encore fixé mais serait de quelques dizaines de milliers d'euros), pourrait faire envisager l'utilisation d'une bithérapie classique (**interféron alpha pégylé** + **ribavirine**)

chez les patients ayant des facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement.

### ► Virus de génotype 2

Une bithérapie **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine** est indiquée pendant 12 sem. La durée pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée). Chez les patients naïfs de tout traitement, l'efficacité du traitement (guérison) dépasse 90 %.

### ► Virus de génotype 3

• On recommande la trithérapie : **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine** + **interféron alpha pégylé** pendant 12 sem. La durée pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée).

• On peut en alternative proposer :

- une bi ou une trithérapie sans **interféron** associant **sofosbuvir** + **daclatasvir** ± **ribavirine** pendant 24 sem. ;
- une bithérapie sans interféron associant **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine (COPEGUS)** pendant 24 sem. sauf chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse (cirrhose chez un patient en échec thérapeutique antérieur).

### ► Virus de génotype 4

On peut proposer l'association :

- **sofosbuvir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 sem. ;
- ou **siméprévir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 à 14 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **ribavirine** pendant 24 sem.

### ► Virus de génotypes 5 et 6

On recommande l'association :

- **sofosbuvir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **daclatasvir** pendant 24 sem.

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (2) – ANTIPROTÉASES (1)****■ Télaprévir**

<b>INCIVO</b>					
2 cp. x 3/j (toutes les 8 h) à avaler entier avec de la nourriture. La trithérapie débute après 4 sem. dans le cadre d'une trithérapie, en association avec l' <b>interféron alfa</b> et la <b>ribavirine</b>	42 cp. 375 mg 168 cp. 375 mg	HOP HOP	I I		

**■ Bocéprévir**

<b>VICTRELIS</b>					
4 gél. x 3/j (toutes les 8 h) avec de la nourriture. La trithérapie débute après 4 sem. de bithérapie associant l' <b>interféron alfa</b> et la <b>ribavirine</b>	336 gél. 200mg	3313,88	I	65 %	9,86

**■ Siméprévir**

<b>OLYSIO</b>					
1 gél. x 1/j pendant 12 sem., avec de la nourriture. A associer avec l'interféron alpha et la ribavirine.	7 gél. 150 mg 28 gél. 150 mg	HOP HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Le **télaprévir**, le **bocéprévir** et le **siméprévir** sont des inhibiteurs de la sérine-protéase NS3/4A du VHC qui joue un rôle majeur dans la réplication du virus. Le **télaprévir** et le **bocéprévir** sont de très forts inhibiteurs de la réplication du VHC de génotype 1. Le **siméprévir** est également un très bon inhibiteur de la réplication du VHC de génotype 4. Ils peuvent entraîner rapidement des résistances donc **doivent tous être associés au peg-interféron alfa et à la ribavirine**.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hépatite chronique virale C due au virus VHC de génotype 1 (**télaprévir** et **bocéprévir**) ou 4 (**siméprévir**) chez les patients adultes ayant une maladie hépatique compensée (au stade de fibrose F4 pour le **siméprévir**), naïfs ou en échec après un précédent traite-

ment. Le **siméprévir** ne peut être prescrit, lors de la rédaction de ce chapitre, que sous forme d'ATU.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

**INCIVO** : toute substance dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A ou induisant le CYP3A. Grossesse/allaitement/absence de contraception.

**VICTRELIS** : toute substance dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A4/5 ou induisant le CYP3A4/5. Grossesse/allaitement/absence de contraception. Hépatite auto-immune.

**OLYSIO** : toute substance fortement inductrice ou inhibitrice du CYP3A, ou dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A4 intestinal. Allaitement (risque non exclu).

Associations aux molécules suivantes :



## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (5)

### Adaptation de la posologie de l'interféron pégylé (VIRAFERONPEG) et de la ribavirine

Test	Diminuer la <b>ribavirine</b> à 600 mg/j (1 gél. le matin et 2 le soir) si :	Diminuer <b>VIRAFERONPEG</b> de moitié si :	Interrompre le traitement si :
Hémoglobine	< 10 g/dL		< 8,5 g/dL
Hémoglobine avec antécédents cardiaques	Chute $\geq 2$ g/dL sur 1 mois de traitement		< 12 g/dL après 1 mois de traitement à dose réduite
Leucocytes		< 1 500/mm <sup>3</sup>	< 1 000/mm <sup>3</sup>
Neutrophiles		< 750/mm <sup>3</sup>	< 500/mm <sup>3</sup>
Plaquettes		< 50 000/mm <sup>3</sup>	< 25 000/mm <sup>3</sup>
Bilirubine conjuguée			2,5 x limite supérieure de la normale
Bilirubine non conjuguée	> 8,5 $\mu$ mol/L		> 68,4 $\mu$ mol/L pendant plus de 4 sem.
Créatininémie			> 177 $\mu$ mol/L
ALAT/ASAT			2 x valeurs initiales et > 10 x limite supérieure de la normale

## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (3) – ANTIPROTÉASES (2)

## Principaux médicaments contre-indiqués en association avec les antiprotéases

Nature de l'interaction	Substances impliquées
Inducteurs de CYP3A (diminuent l'efficacité des inhibiteurs de protéase)	<b>Rifampicine</b> , rifabutine, millepertuis, dexaméthasone, <b>carbamazépine</b> , <b>phénytoïne</b> , <b>phénobarbital</b>
Inhibiteurs de CYP3A (risque de toxicité par accumulation des inhibiteurs de protéase)	<b>Antifongiques azolés</b> , <b>macrolides</b> , cimetidine, pamplemousse, <b>INNTI (éfavirenz, étravirine, névirapine)</b> , <b>inhibiteurs de protéases anti-VIH</b>
L'efficacité des composés suivants est augmentée avec <b>INCIVO</b> , <b>VICTRÉLIS</b> ou <b>OLYSIO</b> Attention : risque de toxicité	<b>Antiarythmiques de classe I et III</b> (amlodaron, flécaïnide, quinidine, propafénone, etc.), <b>dérivés de l'ergot</b> , <b>benzodiazépines</b> (midazolam, triazolam, etc.), <b>statines</b> (sauf fluvastatine), <b>inhibiteurs calciques</b> , <b>inhibiteurs de PDE5</b> (HTAP), <b>bosentan</b> , <b>salmétérol</b> , <b>immunosuppresseurs</b> (ciclosporine, sirolimus, tacrolimus), <b>astémizole</b> , <b>terféndine</b>
L'efficacité des composés suivants est diminuée avec <b>INCIVO</b> ou <b>VICTRÉLIS</b> Risque d'inefficacité	<b>Éthinylestradiol</b> , <b>déscitalopram</b> , <b>désipramine</b> , <b>zolpidem</b>

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les règles d'arrêt sont les suivantes :

## Règles d'arrêt de la trithérapie comprenant un antiprotéase

Spécialité	Télaprévir ( <b>INCIVO</b> )	Bocéprévir ( <b>VICTRELIS</b> )	Siméprévir ( <b>OLYSIO</b> )
Mesure de l'ARN VHC	À S4 et S12	À S8 et S24	À S4, S12 et S24
Arrêt de la trithérapie	Si ARN VHC $\geq 1000$ UI/mL	Si ARN VHC $\geq 100$ UI/mL à S8 ou détectable à S24	Si ARN VHC $\geq 25$ UI/mL à S4
Arrêt du traitement en cours	Si ARN VHC détectable à S36 ou S48	Si détectable à S8 et négatif à S24, poursuite jusqu'à S36	Si détectable à S12 ou S24

**OLYSIO** : éviter une exposition directe importante aux UV pendant le traitement.

**VICTRÉLIS** et **OLYSIO** contiennent du lactose.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Télaprévir** : éruptions cutanées parfois sévères pouvant évoluer jusqu'au syndrome de Lyell (la présence de bulles doit faire arrêter le traite-

ment), anémie, symptômes anorectaux (hémorroïdes, proctalgie, prurit anal), nausées, diarrhées, vomissements.

**Bocéprévir** : anémie, neutropénie, nausées, céphalées, asthénie.

**Siméprévir** : éruption cutanée, prurit, bilirubinémie augmentée, réaction de photosensibilité (peu fréquente).

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (6)

### Adaptation de la posologie de l'interféron pégylé (PEGASYS) et de la ribavirine

Test	Posologie de <b>PEGASYS</b>	Posologie de la <b>ribavirine</b>
Neutropénie < 750/mm <sup>3</sup> < 500/mm <sup>3</sup>	135 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Thrombopénie < 50 000/mm <sup>3</sup> < 25 000/mm <sup>3</sup>	90 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Élévation des ALAT 1 <sup>er</sup> temps 2 <sup>e</sup> temps si persistance	90 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Variation de l'hémoglobine		
- Pas d'antécédent cardiovasculaire Hb < 12 g/dL 8,5 < Hb < 10,5 g/dL Hb < 8,5 g/dL	Pas de modification Pas de modification Pas de modification	Pas de modification Arrêt 600 mg/j
- Antécédent cardiovasculaire Hb < 12 g/dL Chute Hb > 2 g/dL dans les 4 premières sem.	Pas de modification Pas de modification	600 mg/j Arrêt
Hb < 12 g/dL après 4 sem. de <b>ribavirine</b> à 600 mg/j	Pas de modification	Arrêt

## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (4) – INHIBITEURS DES PROTÉINES NS5A ET NS5B (3)

### ■ Sofosbuvir

<b>SOVALDI</b>					
Pré-transplantation : 1 cp./j pdt 48 sem. Post-transplantation : 1 cp./j pdt 24 sem. De nouvelles indications vont se développer. A associer ou non avec l'interféron alpha et la ribavirine en fonction des génotypes viraux.	28 cp. 400 mg	HOP	I		

### ■ Daclatasvir

<b>BMS-790052</b>					
60 mg x 1/j En association avec <b>sofosbuvir</b> 400 mg pendant 24 sem. (± <b>peginterféron alfa</b> ± <b>ribavirine</b> )	33 cp. 30 mg 33 cp. 60 mg	HOP HOP			

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs pan-génotypiques de composants essentiels à la réplication du virus de l'hépatite C :

- **daclatasvir** : protéine NS5A qui participe à la réplication virale ;
- **sofosbuvir** : protéine NS5B ARN-polymérase ARN-dépendante.

#### INDICATIONS

**Sofosbuvir** : AMM.

**Daclatasvir** : ATU de cohorte.

Traitement du patient adulte atteint d'infection virale C chronique :

- qui présente une maladie à un stade avancé (avec fibrose hépatique F3/F4 ou manifestations extra-hépatiques du VHC), sans alternative thérapeutique appropriée ;
- ou qui est sur liste d'attente pour une transplantation hépatique ou rénale et nécessite un traitement pour éviter la réinfection par le VHC ;
- ou qui a subi une transplantation hépatique et présente une récurrence agressive de l'infection.

Le **sofosbuvir** est également pris en charge par l'assurance-maladie en cas de contre-indication ou d'échec de traitement par une alternative thérapeutique prise en charge.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.  
Utilisation en monothérapie.

Allaitement.

Cf. Interactions médicamenteuses.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Non recommandés pendant la grossesse : contraception efficace.

Bilans hépatique, rénal et hématologique à réaliser avant traitement. Surveillance clinique et biologique étroite à l'instauration.

La présentation du **daclatasvir** contient du lactose.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : fatigue, céphalées, nausée.

Fréquents : appétit diminué, anxiété, insomnie, dépression, vertiges, bouffées de chaleur, dyspnée, douleur abdominale, myalgie, prurit, etc.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inducteurs puissants du CYP3A4 et de la Pgp (diminution de l'exposition), contre-indiqués avec le **sofosbuvir** et le **daclatasvir** : **carbamazépine**, **rifampicine**, **phénytoïne**, **phénobarbital**, **dexaméthasone**, **millepertuis**.

Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (adaptation de posologie du **daclatasvir**) : **amiodarone**, **clarithromycine**, **érythromycine**, **itraconazole**, **kétoconazole**, **quinidine**, **ranolazine**, **ritonavir**, **atazanavir**, **efavirenz**, etc.

**Modafinil** déconseillé avec le **sofosbuvir**.

**Digoxine**, **rosuvastatine** : prudence avec le **daclatasvir**.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (7)

### Cirrhose post-hépatitique C

Les complications et les traitements sont les mêmes que pour la cirrhose alcoolique (sauf bien sûr l'hépatite alcoolique aiguë). La transplantation est indiquée en cas de cirrhose sévère, c'est-à-dire avec un taux de prothrombine < 50 % et/ou compliquée d'ascite.

L'infection récidive constamment sur le greffon ; elle peut entraîner une hépatite aiguë ou chronique. Elle évolue lentement vers la cirrhose. Le traitement par **interféron** est difficile car il peut favoriser le rejet. Patients en attente de transplantation : traitement par **sofosbuvir** + **daclatasvir** jusqu'à la transplantation.

### Précautions à prendre en cas d'hépatite C

#### Vis-à-vis de l'entourage

##### ► Vie sexuelle

Le risque de transmission du VHC par voie sexuelle est très faible et touche plutôt les homosexuels (rapports anaux).

- En cas de vie sexuelle stable : dépister le partenaire ; s'il est négatif, on conseille pendant les règles ou en cas de lésion génitale d'éviter les rapports ou d'utiliser un préservatif. En dehors de ces situations, l'utilisation d'un préservatif ne s'impose pas.

- En cas de partenaires multiples, conseiller le préservatif qui protégera également contre les autres maladies sexuellement transmissibles.

##### ► Entourage familial

- Éviter le contact potentiel avec du sang en ayant des objets de toilette personnels : rasoirs, brosse à dents et autre matériel dentaire, coupe-ongles, matériel d'épilation.

- Nettoyer et désinfecter immédiatement une plaie puis mettre un pansement. Pas de précaution particulière pour la vaisselle.

Le virus n'est pas transmissible par le simple baiser.

##### ► Vie sociale

Il n'y a aucune indication à isoler dans sa vie sociale une personne infectée par le VHC, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant à la crèche ou à l'école.

Les activités sportives sont autorisées ; en cas de plaie ou coupure, effectuer immédiatement une désinfection et un pansement.

### Pour la personne infectée elle-même

- Pas de régime alimentaire particulier mis à part l'arrêt définitif de la consommation de boissons alcoolisées. Une consommation même modérée favorise la réplication virale et aggrave les lésions hépatiques.

- Vaccination anti-hépatitique B.

### Transmission de la mère à l'enfant

##### ► Grossesse

Elle est autorisée, même en cas de réplication virale. Le risque de transmission est faible ; il augmente avec la charge virale. Le traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

L'accouchement par voie basse est autorisé.

##### ► Allaitement

Il est autorisé.

Chez le nouveau-né de mère ayant une hépatite chronique C, la recherche de l'ARN viral doit être pratiquée 6 mois à 1 an après la naissance ; la recherche d'anticorps n'est utile qu'après 1 an (temps nécessaire à l'élimination des anticorps maternels).

### CONSENSUS

[1] Prise de position de l'AFEF sur les trithérapies (Peg-IFN + ribavirine + inhibiteur de protéase) dans la prise en charge des malades atteints d'hépatite chronique C, AFEF, 2011

## HÉPATITE AUTO-IMMUNE (1)

### Définition

L'hépatite auto-immune (HCAI) est caractérisée par une agression des hépatocytes associée à la présence dans le sérum d'auto-anticorps. On distingue 2 types d'hépatite auto-immune en fonction du type d'anticorps retrouvé :

– type I : anticorps anti-muscle lisse : les plus spécifiques sont ceux avec une spécificité anti-actine ; on trouve aussi des anticorps anti-SLA ; forme typique de la femme vers 40 ans ;

– type II : anticorps anti-LKM 1 (*Liver Kidney Microsomal*) et anticorps anti-LC1 ; cette forme touche plutôt les enfants.

Le risque est l'évolution vers la cirrhose (le carcinome hépatocellulaire est rare).

### Diagnostic

- Recherche d'auto-anticorps pour le diagnostic d'auto-immunité.

- Ponction-biopsie hépatique pour évaluer le retentissement hépatique.

Un score d'hépatite auto-immune a été proposé pour pouvoir faire facilement le diagnostic (cf. tableau Score diagnostique d'HCAI).

- Préthérapeutique : diagnostic d'HCAI certain si total > 15 et probable si total entre 10 et 15.

- Post-thérapeutique : diagnostic d'HCAI certain si total > 17 et probable si total entre 12 et 17.

## HÉPATITE AUTO-IMMUNE (2)

### Traitement

#### Corticothérapie et immunosuppresseur

##### ► Traitement d'attaque

La **prednisone** (**CORTANCYL**) à la dose de 1 mg/kg/j est utilisée. Certains proposent en première intention le **budesonide** (**ENTOCORT**) 9 mg en une prise le matin.

La posologie est rapidement diminuée à par-

tir de la rémission biologique (qui doit intervenir entre 7 à 15 j) définie par des transaminases inférieures à 2 fois la normale.

En cas d'échec après 15 j de corticothérapie, on augmente la posologie à 2 mg/kg/j. On peut adjoindre d'emblée de l'**azathioprine** (**IMUREL**) 1 à 2 mg/kg/j pour diminuer la posologie de la corticothérapie et limiter les effets secondaires.

Semaine	Prednisone seule (mg)	Traitement combiné	
		Prednisone (mg)	Azathioprine (mg)
1	60	30	50
2	40	20	50
3	30	15	50
4	30	15	50
5	20	10	50

On peut proposer de ne diminuer la corticothérapie que lorsque les transaminases deviennent < 2N.

##### ► Traitement d'entretien

Il a pour but l'obtention d'une rémission histologique, qui apparaît après 6 mois à 2 ans de traitement.

On utilise l'**azathioprine** (**IMUREL**) à la posologie de 1 à 2 mg/kg/j. Le **CORTANCYL** est parfois poursuivi à faible dose : 5 à 15 mg/j.

La durée totale du traitement est de 18 mois au minimum.

L'arrêt de l'**azathioprine** (**IMUREL**) peut être envisagé après 5 ans. Une ponction-biopsie hépatique de contrôle est nécessaire avant l'arrêt du traitement.

##### ► Mesures associées

Le sevrage de la corticothérapie devant être rapide, on propose transitoirement, si besoin, une supplémentation potassique.

Si la corticothérapie se prolonge, on ajoute un traitement préventif de l'ostéoporose ; par exemple **biphosphonate**, **ACTONEL 5** : 1 cp./j ou **ACTONEL 35** : 1 cp./sem. à associer à une supplémentation en **calcium** et **vitamine D** type **CACIT VITAMINE D3** 1 000 mg/880 UI 1 sach./j.

La rémission est définie par :

- l'absence de signe clinique ;
- la normalisation des transaminases ou, à défaut, leur diminution à moins de 2 fois la normale ;
- la normalisation des gammaglobulines, des IgG et de la bilirubine ;
- la disparition des signes histologiques d'activité.

En cas d'échec, on peut proposer le **mycophénolate mofétil** (**CELLCEPT**) ou la **ciclosporine** (**SANDIMMUN**).

### Formes particulières

#### En cas de récédive

50 % des patients récidivent, souvent dans les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement. Un traitement identique au précédent doit alors être repris.

#### En cas de cirrhose

La survie n'est que de 50 % à 5 ans.

La transplantation hépatique peut être indiquée. Les récédives sur le greffon sont exceptionnels (en l'absence d'infection par le virus de l'hépatite C).

#### En cas d'hépatite chronique C associée

Le traitement par **interféron** doit être discuté au cas par cas car il risque d'entraîner une poussée d'hépatite auto-immune (cf. Hépatite chronique C).

## HÉPATITE AUTO-IMMUNE (3)

### Score diagnostique d'HCAI (hépatite chronique auto-immune)

1	Sexe féminin	+ 2
2	Rapport phosphatases alcalines/ALAT : - < 1,5N - compris entre 1,5 et 3N - > 3N	+ 2 0 - 2
3	Gammaglobulines ou IgG : - > 2N - comprises entre 1,5 et 2N - comprises entre 1 et 1,5N - < 1N	+ 3 + 2 + 1 0
4	Anticorps antinucléaires, anti-muscles lisses, anti-LKM1 : - > 1/80 - = 1/80 - = 1/40 - < 1/40	+ 3 + 2 + 1 0
5	Anticorps anti-mitochondries positifs	- 4
6	Marqueurs viraux : - positifs - négatifs	- 3 + 3
7	Prise de médicaments hépatotoxiques : - oui - non	- 4 + 1
8	Consommation alcoolique : - < 25 g/j - > 60 g/j	+ 2 - 2
9	Histologie hépatique : - hépatite d'interface - infiltrat lymphoplasmocytaire prédominant - présence de rosettes - aucune de ces lésions - lésions biliaires - autres lésions	+ 3 + 1 + 1 - 5 - 3 - 3
10	Maladies auto-immunes associées	+ 2
11	Séropositivité pour d'autres autoanticorps	+ 2
12	HLA-DR3 ou DR4	+ 1
13	Réponse au traitement : - complète - rechute	+ 2 + 3

- En préthérapeutique, le diagnostic d'hépatite auto-immune est certain si le total est > 15 et probable s'il se situe entre 10 et 15.
- En post-thérapeutique, le diagnostic d'hépatite auto-immune est certain si le total est > 17 et probable s'il se situe entre 12 et 17.



## HÉMOCHROMATOSE (1)

### Hémochromatose génétique

Un consensus a été proposé par l'HAS pour la prise en charge de l'hémochromatose [1].

L'hémochromatose génétique est une maladie autosomique récessive caractérisée par une augmentation de l'absorption intestinale du fer qui conduit donc à une surcharge de l'organisme en fer. Les anomalies biologiques du bilan martial sont précoces alors que les signes cliniques sont tardifs.

La prise en charge de l'hémochromatose génétique a été profondément modifiée par la découverte du gène de l'hémochromatose (gène HFE) et de la mutation responsable de la maladie : mutation C282Y (remplacement d'une cystéine en tyrosine en position 282).

### Diagnostic

Le diagnostic reposait classiquement sur le dosage pondéral du fer intrahépatique après réalisation d'une ponction-biopsie du foie. En 2000, le diagnostic repose sur la recherche de la mutation C282Y qui doit être retrouvée à l'état homozygote pour que le patient soit malade. Chez les patients hétérozygotes pour la mutation C282Y, une autre mutation associée, appelée H63D (remplacement d'une histidine par un acide aspartique) à l'état hétérozygote peut être associée à une surcharge en fer. Il s'agit alors d'hétérozygotes composites. Les hétérozygotes composites peuvent avoir une surcharge en fer, moins importante que lors d'une hémochromatose génétique ; il ne s'agit pas *stricto sensu* d'une hémochromatose.

La biopsie du foie, dont le but est de rechercher une fibrose, voire une cirrhose mais pas de porter le diagnostic d'hémochromatose, est réservée aux patients ayant au moins un des critères suivants :

- transaminases  $> 2 \text{ N}$  ;
- ferritine  $> 1\,000 \mu\text{g/L}$  ;
- hépatomégalie.

### Traitement

Il repose sur les saignées.

► *Enlever l'excès de fer*

Phlébotomie de 500 mL de sang 1 à 2 fois par sem. :

– = 25 à 50 L de sang/an ;

– = 12 à 35 g de fer enlevé.

Surveillance de la protidémie, du fer sérique, de la transferrine et de la ferritine tous les 2 à 3 mois.

L'objectif est l'obtention et le maintien d'une ferritine  $\leq 50 \text{ ng/mL}$ .

► *Prévenir la réaccumulation du fer*

Phlébotomie de 500 mL de sang tous les 1 à 3 mois.

Surveillance annuelle du fer sérique, de la transferrine et de la ferritine tous les 2 à 3 mois.

Lorsque les saignées sont provisoirement contre-indiquées, la **déféroxamine (DEFÉRAL)** peut être utilisée.

### Dépistage

Il concerne d'abord les apparentés au probant au 1<sup>er</sup> degré : frères, sœurs, enfants. Il sera ensuite étendu à la descendance des homozygotes et hétérozygotes dépistés. Le dépistage est fondé sur la recherche de la mutation du gène. Les parents sont souvent âgés et s'ils sont porteurs de la mutation, déjà malades. Sinon, le dépistage repose sur le bilan martial et seulement s'il est anormal, sur la recherche d'une mutation.

## CHÉLATEUR DU FER

## ■ Déféroxamine

DESFÉRAL					
20 à 60 mg/kg/j, la voie d'administration est à adapter à chaque patient Idéalement, voie SC lente continue sur 8 à 12 h par pompe miniaturisée Voie IM seulement si voie SC impossible Voie IV pendant une transfusion	1 fl. + solv.	6,63	I	100 %	6,63

## PROPRIÉTÉS

Agent chélateur des anions trivalents: ion ferrique et ion aluminium trivalents.

La **déféroxamine** est capable de fixer le fer libre du plasma ou des cellules pour former le complexe ferrioxamine qui est éliminé dans les urines et les fèces. La **déféroxamine** réduit ainsi les dépôts pathologiques de fer dans les organes.

La **déféroxamine** est rapidement absorbée après administration par bolus intramusculaire ou perfusion lente sous-cutanée, mais son absorption gastro-intestinale est médiocre.

## INDICATIONS

Hémochromatose primitive non curable par saignées.

Hémosidérose secondaire.

Intoxications martiales aiguës.

Intoxication aluminique chez l'insuffisant rénal dialysé.

Test au **DESFÉRAL** : diagnostic de l'intoxication aluminique.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité à la **déféroxamine**.

Insuffisance rénale sévère non dialysée.

Infection bactérienne évolutive.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : aucun effet malformatif ou fœto-toxique particulier mais à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue : en cas d'intoxication maternelle sévère au fer, on ne retrouve pas d'augmentation parallèle des concentrations

du fer sérique chez l'enfant ; de plus, le traitement de la mère par la **déféroxamine** semble sans retentissement sur les concentrations en fer de l'enfant.

**Allaitement** : absence d'information sur le passage de la substance active dans le lait.

En cas de perfusion trop rapide : risque de réaction vasomotrice (hypotension, collapsus, tachycardie, érythème).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs, tuméfaction, érythème, prurit au point d'injection.

Fréquemment myalgies et arthralgies.

Nausées, vomissements, fièvre, urticaire, asthme, douleurs abdominales.

Troubles visuels et auditifs, surtout en cas de ferritine basse, nécessitant l'interruption immédiate de la **déféroxamine**.

Majoration de l'encéphalopathie des dialysés. Retards de croissance, notamment chez l'enfant.

Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Infections à *Yersinia enterocolitica* et *pseudotuberculosis* en cas de surcharge en fer : interrompre le traitement, pratiquer les tests bactériologiques et une antibiothérapie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Solution injectable d'**héparine**.

**Vitamine C** : la prise concomitante de **vitamine C** augmente l'excrétion du fer ; il existe un risque d'insuffisance cardiaque en début de traitement.

Cesser l'administration de **déféroxamine** 48 h avant une scintigraphie.

## HÉMOCHROMATOSE (2)

## Éléments standard de prise en charge de l'hémochromatose HFE

ÉVALUATION INITIALE : INTERROGATOIRE, EXAMEN CLINIQUE, BILAN MARTIAL (FERRITINÉMIE ET CS-Tf)				
STADES	STADE 0	STADE 1	STADE 2	STADES 3 ET 4
BILAN INITIAL COMPLÉMENTAIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de symptôme</li> <li>• CS-Tf &lt; 45 %</li> <li>• Ferritinémie normale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de symptôme</li> <li>• CS-Tf &gt; 45 %</li> <li>• Ferritinémie normale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de symptôme</li> <li>• CS-Tf &gt; 45 %</li> <li>• Hyperferritinémie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phase d'expression clinique</li> <li>• CS-Tf &gt; 45 %</li> <li>• Hyperferritinémie</li> </ul>
	Pas d'examen complémentaires		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechercher une atteinte :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pancréatique (glycémie à jeun) ;</li> <li>- hépatique (transaminases, échographie en cas de signes cliniques ou de cytolysel) ;</li> <li>- cardiaque (échographie pour les stades 3 et 4) ;</li> <li>- gonadique (dosage testostérone s'il s'agit d'un homme) ;</li> <li>- osseuse (ostéodensitométrie) en présence de cofacteurs d'ostéoporose.</li> </ul> </li> <li>• Orienter vers un spécialiste en fonction de la clinique et en cas d'anomalie du bilan (en particulier si ferritinémie <math>\geq 1\ 000\ \mu\text{g/L}</math>).</li> </ul>	
			<b>Traitement déplétif par saignée</b> (jusqu'à 7 mL/kg sans dépasser 550 mL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phase d'induction : par saignée au maximum hebdomadaire : poursuivre jusqu'à ce que la ferritinémie devienne <math>\leq 50\ \mu\text{g/L}</math>.</li> <li>• Phase d'entretien : par saignée tous les 2, 3 ou 4 mois (en fonction des patients) : maintenir la ferritinémie <math>\leq 50\ \mu\text{g/L}</math>.</li> </ul>	<b>Traitement des complications</b> à adapter en fonction de la clinique.
	Pas de traitement			<ul style="list-style-type: none"> <li>• A chaque saignée : interrogatoire et évaluation clinique.</li> <li>• En phase d'induction : en début de traitement, contrôle mensuel de la ferritinémie lors des saignées jusqu'à atteinte du seuil de <math>300\ \mu\text{g/L}</math> chez un homme et <math>200\ \mu\text{g/L}</math> chez une femme. En dessous de ces valeurs, contrôle de la ferritinémie toutes les 2 saignées.</li> <li>• En phase d'entretien : contrôle de la ferritinémie toutes les 2 saignées.</li> <li>• Contrôle de l'hémoglobinémie dans les 8 jours qui précèdent la saignée.</li> <li>• Suspendre les saignées en cas d'hémoglobinémie <math>\leq 11\ \text{g/dL}</math>.</li> </ul>
SUIVI	Tous les 3 ans : <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrogatoire</li> <li>• examen clinique</li> <li>• ferritinémie et CS-Tf</li> </ul>	Chaque année : <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrogatoire</li> <li>• examen clinique</li> <li>• ferritinémie et CS-Tf</li> </ul>		<b>Suivi des complications à adapter en fonction de la clinique</b> (par ex. dépiéage du carcinome hépato-cellulaire en cas de cirrhose, suivi du diabète, etc.)

CS-Tf : coefficient de saturation de la transferrine.

## HÉMOCHROMATOSE (3)

### Hémochromatose secondaire

L'hémochromatose secondaire est une surcharge en fer secondaire à une autre maladie : thalassémie, drépanocytose, anémie réfractaire, myélodysplasie. L'hémodialysé chronique peut également avoir une surcharge ferrique. On la traite éventuellement par **déféroxamine (DEFÉRAL)** pendant la dialyse.

Pour certains, les saignées pourraient avoir un intérêt en cas d'hyperferritinémie

associée au syndrome métabolique pour limiter le risque de greffe d'un carcinome hépatocellulaire.

#### Causes d'élévation de la ferritine en dehors de l'hémochromatose

- Hémochromatose génétique.
- Hémochromatose secondaire.
- Alcoolisme.
- Cytolyse hépatique.
- Cancers.
- Hypothyroïdie.
- Syndrome métabolique.

#### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de l'hémochromatose liée au gène HFE (hémochromatose de type 1), HAS, 2005

## CIRRHOSE NON COMPLIQUÉE (1)

La cirrhose alcoolique représente 90 % des cirrhoses en France. L'examen histologique apporte la preuve du diagnostic en montrant l'association d'une fibrose extensive et de nodules de régénération. La ponction-biopsie hépatique n'est pas forcément indiquée chez tous les patients.

Le risque de décompensation est de 10 % par an.

La complication la plus fréquente est l'ascite.

20 % des patients développent un carcinome hépatocellulaire.

### Classification pronostique de Child-Pugh\*

	1 POINT	2 POINTS	3 POINTS
Encéphalopathie	Absente	Confusion	Coma
Ascite	Absente	Contrôlable par le traitement médical	Réfractaire
Bilirubine	< 35 µmol/L	35 à 50 µmol/L	> 50 µmol/L
Albumine	> 35 g/L	28 à 35 g/L	< 28 g/L
Taux de prothrombine	> 50 %	40 à 50 %	< 40 %

### Principales causes des cirrhoses

- Alcool.
- Virus : VHB et VHC.
- Surpoids, syndrome métabolique.
- Cirrhose biliaire primitive et secondaire à une cholestase chronique (lithiase, sténose, cholangite sclérosante primitive, pancréatite chronique, etc.).
- Hépatite auto-immune.
- Hémochromatose, maladie de Wilson, déficit en alpha-1-antitrypsine.
- Gène au retour veineux : syndrome de Budd-Chiari, maladie veino-occlusive, insuffisance cardiaque.
- Causes médicamenteuses.

\* Le score est établi en additionnant les points de chaque item :

- score de 5 ou 6 : classe A ;

- score de 7 à 9 : classe B ;

- score de 10 à 15 : classe C.

## CIRRHOSE NON COMPLIQUÉE (2)

### Traitement étiologique

- En cas de cirrhose alcoolique l'arrêt de l'alcool total et définitif (cf. Sevrage alcoolique) permet de stabiliser les lésions et d'améliorer la fonction hépatocellulaire.
- Le traitement étiologique est beaucoup moins efficace dans les autres causes.

### Les neurosédatifs doivent être évités en raison de l'insuffisance hépatocellulaire.

- En cas d'intoxication alcool-tabagique, dépister les cancers ORL, stomatologiques, broncho-pulmonaires et œsophagiens.

### Traitement des complications

Cf. Chapitres spécifiques.

Elles sont les mêmes pour toutes les cirrhoses quelle que soit leur étiologie.

Certaines particularités doivent être soulignées :

- la cirrhose biliaire primitive se complique très rarement de carcinome hépatocellulaire ;
- l'hépatite alcoolique aiguë est évidem-

ment une complication spécifique de la cirrhose alcoolique.

### Transplantation hépatique

Cf. Chapitre spécifique.

Les indications sont schématiquement :

- une cirrhose sévère (Child C) ;
- une cirrhose Child B grave, c'est-à-dire compliquée d'une ascite réfractaire ou d'hémorragies digestives à répétition ou d'une encéphalopathie hépatique invalidante ne s'améliorant pas après plusieurs semaines de traitement symptomatique ;
- un carcinome hépatocellulaire si tumeur unique < 5 cm ou 2 à 3 nodules < 3 cm.

Le score MELD (*Model for End-stage Liver Disease*) est utilisé pour discuter de l'inscription d'un patient sur liste. Ce score (de 6 à 40) permet d'évaluer le risque de décès lié au foie à 3 mois. Un score > 17 est en faveur de la transplantation et < 15 en défaveur.

MELD score :  $3,8 \times \ln(\text{bilirubine mg/dL}) + 11,2 \times \ln(\text{INR}) + 9,6 \times \ln(\text{créatinine mg/dL})$ .

**CIRRHOSE COMPLIQUÉE (1)****Hémorragie digestive  
par hypertension portale**

La prise en charge repose sur la conférence de consensus de l'EASL [1].

L'hypertension portale est responsable de 75 % des hémorragies digestives chez le cirrhotique. Le mécanisme est la rupture de varices œsophagiennes ou cardiotubérositaires. Les autres causes sont principalement les ulcères et ulcérations digestives dont la fréquence est augmentée.

**Traitement curatif**

Le traitement est décrit dans le chapitre Hémorragie digestive.

La prévention des infections (péritonite bactérienne spontanée) est systématique : **NOROXINE** 400 mg/12 h ou **OFLOCET** 200 mg/12 h.

**Traitement préventif****► Prévention secondaire**

Deux types de traitement peuvent être proposés :

- la ligature élastique des varices par voie endoscopique jusqu'à éradication : en général on pratique 4 à 6 séances espacées de 2 à 3 sem. ;

- un traitement médical par **bêtabloquants non cardiosélectifs sans ASI** type **propranolol (AVLOCARDYL)** 1 cp. (40 mg) x 3 à 4/j ou **AVLOCARDYL LP** (cp. 160 mg) 1 cp./j le matin ou **nadolol (CORCARD)** 1 cp. (80 mg) le matin.

La posologie doit être adaptée à chaque patient, le but étant de faire diminuer la fréquence cardiaque de 25 % par rapport à la fréquence avant traitement.

En pratique, on associe souvent la ligature aux **β-bloquants**.

En cas d'échec, on peut proposer une dérivation porto-cave chirurgicale ou percutanée (TIPS) (cf. Ascite), voire une transplantation hépatique.

**► Prévention primaire**

Une gastroscopie annuelle est indiquée chez tout patient cirrhotique n'ayant pas de varices œsophagiennes ou cardiotubérositaires.

La prévention primaire de la rupture de varices est indiquée chez les patients ayant des **varices de grade II ou III**. Le traitement médical par **β-bloquants non cardiosélectifs** doit être proposé en première intention du fait de son faible coût et de sa simplicité. L'interruption du traitement est délétère ; il doit donc être poursuivi à vie. En cas de contre-indication aux **β-bloquants** ou de présence de grosses varices ou de signes rouges sur des petites varices, une ligature élastique est préférable.

Les mécanismes d'action sont une diminution du débit cardiaque, une diminution du débit portal et une diminution de la pression portale.

On utilise le **propranolol (AVLOCARDYL)** : 1 cp. (40 mg) x 3 à 4/j ou **AVLOCARDYL LP** (cp. 160 mg) : 1 cp./j le matin ou le **nadolol (CORCARD)** : 1 cp. (80 mg) le matin.

La posologie doit être adaptée à chaque patient, le but étant de faire diminuer la fréquence cardiaque de 25 % par rapport à la fréquence avant traitement.

En cas de contre-indication aux **β-bloquants** et/ou en cas de signes rouges à la gastroscopie, on propose un traitement endoscopique par ligature élastique.

## CIRRHOSE COMPLIQUÉE (2)

## Ascite non infectée

## Traitement curatif [1]

## ► Règles hygiéno-diététiques

Le traitement peut être fait en ambulatoire si l'ascite n'est pas trop importante, c'est-à-dire si elle ne nécessite pas de ponction évacuatrice.

Régime désodé peu restrictif (2 à 3 g de sel/24 h), souvent hypercalorique et normoprotidique du fait de la dénutrition ; les sels de régime de type sel de potassium (XAL) sont autorisés sous couvert d'un contrôle régulier de la kaliémie ; en cas d'hyponatrémie, on associe une restriction hydrique. Ce traitement peut être suffisant.

## ► Traitement diurétique

Il permet d'accroître la natriurèse. Le but est l'obtention d'une perte de poids de 500 g/j.

- Traitement salidiurétique *per os*, le plus souvent **inhibiteurs de l'aldostérone, spironolactone (ALDACTONE)** : 100 à 300 mg/j (cp. à 50 et 75 mg) sous contrôle clinique et biologique régulier. L'efficacité de ce type de **diurétique** est retardée de 48 à 72 h.

- On peut également utiliser un **diurétique de l'anse** type **furosémide (LASILIX)** : 20 à 160 mg/j sous contrôle clinique et biologique régulier, voire une association de plusieurs **diurétiques** (hypo- et hyperkaliémiant) : **MODURÉTIC** ou **ALDACTAZINE** : 1 à 2 cp./j.

Contre-indications aux **diurétiques** :

- natrémie < 130 mmol/L ;
- créatininémie > 100-120 µmol/L ;
- kaliémie < 3,5 mmol/L si **diurétique hypokaliémiant** ou > 5,5 si **diurétique hyperkaliémiant**.

## ► Ponctions d'ascite évacuatrices

Elles sont indiquées si le traitement diurétique est inefficace ou contre-indiqué ou bien lorsqu'il existe une gêne fonctionnelle.

Plusieurs litres d'ascite peuvent être évacués à chaque séance. Une compensation

volémique par des solutés macromoléculaires, par exemple : **albumine humaine 20 % (ALBUMINE HUMAINE BAXTER)** : 1 fl. de 100 mL (20 g) pour 2 L d'ascite évacués à partir du 5<sup>e</sup> L.

Ascite réfractaire : inefficacité de toutes les mesures médicales y compris (en l'absence de contre-indication) **ALDACTONE** : 400 mg/j et **LASILIX** 160 mg/j.

## Surveillance du traitement d'une ascite

- Efficacité
    - Clinique : perte de 500 g/j sous **diurétiques** ; diurèse > 1 L/j ; périmètre ombilical.
    - Biologie : natriurèse > 25 mmol/j (1,5 g/j).
  - Tolérance
    - Clinique : T°, PA, fréquence cardiaque, examen cutané, recherche d'une encéphalopathie.
    - Biologie : natrémie, kaliémie, urémie, créatininémie x 1 à 2/sem. ; bilan hépatique x 1/sem.
- La présence d'une diurèse sodée sans perte de poids témoigne d'un non-respect du régime désodé.

## ► Autres traitements

On les utilise lorsque l'ascite devient difficilement ponctionnable ou lorsque les hospitalisations se répètent souvent.

- Shunt porto-sus-hépatique par voie transjugulaire ou TIPS (*Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt*) : c'est la mise en place par voie transjugulaire d'une prothèse expansible intrahépatique après dilatation d'un trajet entre les veines sus-hépatiques et intrahépatiques ; c'est donc l'équivalent d'une anastomose porto-cave par voie percutanée. On utilise cette méthode en cas d'ascite réfractaire, dans l'attente d'une transplantation hépatique, si le délai d'attente prévisible est > 6 mois.

- Shunt péritonéo-jugulaire (valve de Le Veen) ; il n'est plus utilisé en raison de ses nombreuses complications : infection, obturation du shunt.

- Anastomose porto-cave : elle n'est plus utilisée du fait de la mortalité et de la morbidité qu'elle entraîne.



## CIRRHOSE COMPLIQUÉE (3)

**Infection spontanée du liquide d'ascite [1]**

C'est une des principales causes de mortalité. Le risque de récurrence est de 40 à 70 % à 1 an. La translocation bactérienne est à l'origine d'infections à germes digestifs qui sont les plus fréquentes.

L'infection spontanée du liquide d'ascite est définie par un nombre de polynucléaires neutrophiles altérés dans l'ascite  $> 250/\text{mm}^3$  ; la présence de germes n'est pas indispensable pour affirmer l'infection.

**Mise en condition du patient**

C'est une urgence médicale, le pronostic vital est en jeu.

- Hospitalisation en médecine.
- Mesures hygiéno-diététiques identiques à celles de l'ascite non infectée.

**Antibiothérapie**

En urgence, dès les prélèvements bactériologiques effectués (ascite, sang, urine), sans en attendre les résultats mais à adapter secondairement à l'antibiogramme ; antibiotiques à bonne diffusion dans le liquide d'ascite, si possible non métabolisés par le foie, actifs sur les germes rencontrés : bacilles Gram- (*Escherichia coli*, *Klebsiella*) et cocci Gram+, par exemple :

- en l'absence d'allergie : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** IV : 1 g/8 h ;
- ou **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCEPHINE)** : 2 g IV/24 h en 1 inj. ;
- et/ou association à une **fluoroquinolone, ofloxacine (OFLOXET)** IV : 200 mg/12 h.

Un contrôle bactériologique du liquide d'ascite est nécessaire après 48 h de traitement.

Les **aminosides** sont contre-indiqués chez le cirrhotique.

Le relais peut se faire par voie orale après

48 h d'apyrexie. La durée totale de l'antibiothérapie est de 5 à 7 j.

Le pronostic est sévère : 50 % de décès à 1 mois et 75 % à 1 an ; le décès n'est pas dû à l'infection elle-même mais à la gravité de l'insuffisance hépatique.

**Apport d'albumine**

L'apport d'**albumine humaine 20 % (ALBUMINE HUMAINE BAXTER)** est systématique en cas d'infection d'ascite car il réduit l'incidence de l'insuffisance rénale et la mortalité : J1 : 1,5 g/kg et J3 : 1 g/kg.

**Prévention**► *Prévention secondaire*

La prévention des récurrences par de la **norfloxacine (NOROXINE 400)** : 1 cp. (400 mg) en 1 prise/j, permet de limiter les récurrences.

► *Prévention primaire*

Elle est discutée. On peut proposer de la **norfloxacine (NOROXINE 400)** : 1 cp. (400 mg) en 1 prise/j chez les patients ayant moins de 10 g/L de protides dans le liquide d'ascite car le risque d'infection est alors élevé.

**Syndrome hépato-rénal**

C'est l'apparition d'une insuffisance rénale fonctionnelle mais qui a la particularité de ne pas répondre au remplissage vasculaire.

On distingue :

- le syndrome hépato-rénal de type 1 : insuffisance rénale aiguë rapidement évolutive en moins de 15 j (survie  $< 15$  j) ;
- le syndrome hépato-rénal de type 2 : insuffisance rénale moins sévère et d'évolution plus lente.

Le traitement curatif est la transplantation hépatique. Dans l'attente, on peut proposer :

- un traitement vasoactif, **terlipressine (GLYPRESSINE)** : 1 mg x 2 à 4 /j en IV associé à une expansion volémique par **albumine humaine 20 %** ;
- un TIPS.

**CONSENSUS**

[1] Revising consensus in portal hypertension : Report of the Baveno V consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension, EASL, 2010

## CIRRHOSE COMPLIQUÉE (4)

### Complications pleuro-pulmonaires

#### Hydrothorax hépatique

C'est une pleurésie chez un cirrhotique en l'absence de toute pathologie cardiaque ou pulmonaire. Elle se traite comme une ascite. En cas de récurrence, on peut proposer un TIPS avant une transplantation ou bien, à défaut, une pleurodèse chimique sous thoracoscopie.

#### Syndrôme hépato-pulmonaire (5 % des cirrhotiques)

Il est défini par une hypoxémie ( $\text{PaO}_2 < 70 \text{ mmHg}$ ), une élévation du gradient alvéolo-artériel en  $\text{O}_2 > 20 \text{ mmHg}$  et une vasodilatation pulmonaire. L'hypoxémie est majorée par l'orthostatisme. Le traitement repose sur la transplantation. En attendant, on propose une oxygénothérapie.

#### Hypertension portopulmonaire (2 à 5 % des cirrhotiques)

Elle est définie par une élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne ( $\text{PAPm} > 25 \text{ mmHg}$ ). Les  $\beta$ -bloquants deviennent contre-indiqués. Le traitement repose sur la transplantation hépatique.

### Encéphalopathie hépatique

Elle reflète la gravité de l'insuffisance hépatique. Sa survenue doit faire rechercher une cause de décompensation.

#### Facteurs déclenchants d'une encéphalopathie hépatique

- Infection : ascite, sang, urine.
- Hémorragie digestive.
- Troubles hydroélectrolytiques et insuffisance rénale.
- Hépatite (alcoolique, virale, médicamenteuse).
- Prise de toxiques : médicaments sédatifs ; intoxication alcoolique aiguë.
- Constipation.
- Régime trop riche en protéides.
- Anastomose porto-cave (chirurgicale, percutanée ou shunts spontanés).
- Carcinome hépatocellulaire.

#### Traitement curatif

- Prise en charge en milieu médical.
- Arrêt de tous les médicaments sédatifs.
- Réduction de la production d'ammoniac : régime pauvre en protéides ( $< 20 \text{ g/j}$ ) pendant 48 h puis augmentation progressive jusqu'à  $1 \text{ g/j}$ . Si la tolérance est

médiocre, on peut remplacer les protéines animales par des protéines végétales.

- Limitation de l'absorption d'ammoniac, lactulose (**DUPHALAC**) 2 càs ou sach. x 3/j ( $20 \text{ à } 60 \text{ g/j}$ ) *per os* ou en lavement. En traitement d'attaque on peut augmenter la posologie jusqu'à  $90 \text{ g/j}$ . Le lactitol (**IMPORTAL**) peut être utilisé à la même posologie.

- Antibiothérapie orale visant à réduire la flore colique productrice d'urée ; amino-side par voie orale, néomycine (**NÉOMYCINE DIAMANT**) : jusqu'à  $6 \text{ g/j}$  (cp.  $250 \text{ mg}$ ). Un faible pourcentage du médicament est absorbé, d'où la nécessité de surveiller de façon rapprochée la fonction rénale. La rifaximine (antibiotique encore non disponible en France) a montré son efficacité à la dose de  $550 \text{ mg x 2/j}$ .

**L'efficacité de ces traitements est limitée et c'est plutôt le traitement du facteur déclenchant qui permettra de sauver le patient.**

- La transplantation hépatique peut être indiquée en cas d'encéphalopathie invalidante, chez un patient sévère et ayant moins de 65 ans.

#### Traitement préventif

Interdiction de tout médicament sédatif chez un cirrhotique. L'insomnie (inversion du rythme nyctéméral) du cirrhotique est un des premiers signes d'encéphalopathie ; la prescription de **somnifères** ne peut qu'aggraver la maladie du foie.

- Régime limité en protéides à  $1 \text{ g/kg/j}$ .
- Lactulose (**DUPHALAC**) :  $1 \text{ à } 2 \text{ sach. x 2 à } 3/j$  ; la posologie idéale est celle qui permet d'obtenir 2 selles/j.

#### Carcinome hépatocellulaire

Cf. Chapitre Cancer du foie.

La transplantation hépatique ou à défaut la chirurgie d'exérèse est le seul traitement curatif.

En cas de contre-indication, on peut proposer une destruction tumorale par radiofréquence, une chimio-embolisation ou un traitement par sorafénib (**NEXAVAR**).

#### Hépatite alcoolique aiguë

Cf. Chapitre suivant.

L'arrêt définitif de l'absorption de toute boisson alcoolisée est indispensable.

Dans les formes sévères, une corticothérapie orale par prednisolone (**SOLUPRED**) :  $40 \text{ mg/j}$  pendant 28 j est indiquée car elle améliore le pronostic.

## HÉPATITE ALCOOLIQUE AIGÜE

### Diagnostic

Le diagnostic, évoqué sur la clinique et la biologie, est prouvé par l'étude histologique du foie. L'hépatite alcoolique est souvent associée à une cirrhose mais peut également survenir sur un foie non cirrhotique.

### Clinique

Les signes sont aspécifiques : hépatomégalie, fièvre, ictère, douleur de l'hypochondre droit.

### Biologie

Les anomalies sont évocatrices : transaminases augmentées jusqu'à 10N environ

avec ASAT > ALAT ; hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée, hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.

### Ponction-biopsie hépatique

Elle est indispensable en cas de forme sévère (c'est-à-dire avec un score de Maddrey > 32) afin d'obtenir une certitude diagnostique : la présence d'une hépatite alcoolique à l'examen histologique est une indication à la corticothérapie.

La biopsie est réalisée par voie transpariétale ou, en cas de troubles de l'hémostase (ce qui est fréquent dans les formes sévères), par voie transjugulaire (plaquettes < 50 000/mm<sup>3</sup>; taux de prothrombine < 50 %).

Une hépatite alcoolique aiguë est définie comme sévère si l'indice de Maddrey est de 32. Indice de Maddrey =  $4,6 \times (\text{temps de Quick du patient [s]} - \text{temps de Quick du témoin [s]}) + (\text{bilirubine } [\mu\text{mol/L}]/17)$ .

En pratique, il s'agit souvent des patients ayant une bilirubine totale > 100  $\mu\text{mol/L}$  et un taux de prothrombine < 50 %.

À l'histologie, les lésions retrouvées sont des foyers de nécrose hépatocytaire, un infiltrat inflammatoire à polynucléaires neutrophiles autour des hépatocytes nécrosés et des corps de Mallory.

### Traitement

#### Abstinence alcoolique

Elle est indispensable et permet d'obtenir la guérison dans les formes mineures. Une hospitalisation de quelques jours peut être nécessaire.

Une polyvitaminothérapie B, **VITAMINE B1-B6 BAYER** : 1 cp. x 3/j, permet de prévenir l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

**Les médicaments sédatifs sont interdits.**

Du fait du risque infectieux chez ces patients, il faut éviter de débiter une corticothérapie sans la preuve histologique de l'hépatite alcoolique aiguë.

#### Corticothérapie

Elle est indiquée dans les formes sévères, définies par un score de Maddrey de 32, et en l'absence d'infection non contrôlée.

On utilise la **prednisolone (SOLUPRED)** : 40 mg/j en une prise le matin pendant 28 jours, avec un arrêt brutal en fin de traitement.

Lorsque la corticothérapie est contre-indiquée, on peut proposer de la **pentoxifylline (TORENTAL)** qui a une action anti-inflammatoire. Certains l'associent systématiquement à la corticothérapie. D'autres proposent la **N-acétylcystéine**.

#### Pronostic

La survie spontanée des formes sévères est de l'ordre de 50 % à 1 mois. Sous **SOLUPRED**, la survie atteint 70 % à 1 mois. En l'absence d'amélioration sous **SOLUPRED**, une transplantation hépatique en urgence peut être proposée dans le cadre de protocoles, même en l'absence d'une période d'abstinence supérieure à 6 mois.

## CANCER DU FOIE (1)


### Cancer primitif du foie [1]

#### Carcinome hépatocellulaire

C'est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Il se développe habituellement sur une cirrhose.

Chez un patient ayant une cirrhose, le diagnostic peut reposer sur les examens radiologiques lorsque la tumeur mesure plus de 1 cm ; dans ce cas, la biopsie hépatique n'est pas obligatoire.

#### Attitude diagnostique face à un nodule découvert en échographie chez un patient cirrhotique\*



La décision thérapeutique dépend de la taille et du nombre de tumeurs, de leur extension à distance (poumon, surrénales,

tronc porte, veines sus-hépatiques) et de la fonction hépatique.

\* Le wash-out est une hypodensité ou hypointensité à la phase portale ou à la phase tardive après injection du produit de contraste, par rapport au parenchyme non tumoral.

## CANCER DU FOIE (2)

### ► Chirurgie

#### Transplantation hépatique

C'est le meilleur traitement lorsqu'elle est possible.

Les indications sont :

- tumeur unique < 5 cm ;
- 2 à 3 nodules < 3 cm ;
- absence de thrombose portale ou sous-hépatique, même segmentaire.

Dans ces cas, la survie rejoint celle des patients transplantés pour cirrhose sans carcinome hépato-cellulaire : 60 à 80 % de survie à 5 ans.

#### Résection tumorale

Moins de 10 % des patients peuvent en bénéficier. Les conditions d'opérabilité sont :

- tumeur limitée : 1 nodule < 5 cm ou 3 nodules < 3 cm ;
- absence de métastase extrahépatique ;
- absence de thrombose porte ;
- bonne fonction hépatocellulaire (absence de cirrhose ou cirrhose classée Child A).

Le type de résection dépend de la localisation tumorale, de la taille tumorale et de la fonction hépatique. Il est nécessaire de passer à distance (au moins 1 cm) de la tumeur. Malgré le traitement, la survie n'est que de l'ordre de 30 à 50 % à 5 ans. Le taux de récurrence sur le foie restant est très élevé. Une nouvelle intervention chirurgicale ou bien un traitement non chirurgical peuvent alors être proposés.

### ► Traitements non chirurgicaux

#### Traitements curatifs

##### • Radiofréquence

Ce traitement consiste à détruire les nodules par des « micro-ondes ». Les nodules doivent être :

- accessibles par ponction ;

– < 3 cm de diamètre ;

– non superficielles ;

– situées à distance du hile et des voies biliaires.

La radiofréquence peut également être pratiquée en peropératoire.

#### Traitement palliatif

##### • Chimio-embolisation artérielle

La vascularisation du carcinome hépato-cellulaire est principalement artérielle.

La chimio-embolisation consiste à injecter dans l'artère hépatique un mélange **LIPIODOL-cisplatine** qui va se concentrer dans le foie tumoral ; cette injection est suivie d'une obstruction de l'artère hépatique par du **SPONGEL**. Le traitement doit être renouvelé tous les 2 à 4 mois.

C'est le traitement palliatif de première ligne du carcinome hépatocellulaire. La cirrhose doit être classée Child A.

Les contre-indications sont l'insuffisance hépatique et l'obstruction portale.

##### • Thérapie ciblée : **sorafénib (NEXAVAR)**.

Le **sorafénib** est un inhibiteur de protéine-kinase. On l'utilise à la posologie de 2 cp. à 200 mg x 2/j (800 mg/j). Le traitement augmente la survie (médiane augmentée de 2 mois). Il est réservé aux carcinomes hépatocellulaires non éligibles pour un autre traitement, sur une cirrhose Child A, OMS 0-2. Le coût est de l'ordre de 4 000 €/mois.

### ► Dépistage

Le dépistage précoce est actuellement la seule méthode qui permettrait d'améliorer le pronostic.

Le dépistage concerne les patients cirrhotiques ayant une fonction hépatique relativement conservée. Il consiste à pratiquer un dosage d'alpha-fœto-protéine et une échographie hépatique tous les 6 mois.

## CANCER DU FOIE (3)

### Autres tumeurs

#### ► *Carcinome fibrolamellaire*

C'est un carcinome hépatocellulaire particulier qui touche des patients jeunes, non cirrhotiques. Le taux de résecabilité est donc élevé. L'alpha-fœto-protéine est le plus souvent normale.

#### ► *Hépatoblastome*

C'est une prolifération d'hépatocytes embryonnaires qui touche l'enfant de moins de 3 ans. Le pronostic dépend de la résecabilité.

#### ► *Cholangiocarcinome intra-hépatique*

C'est une tumeur développée à partir des voies biliaires intra-hépatiques, sur un foie non cirrhotique. L'alpha-fœto-protéine est le plus souvent normale. Le traitement est chirurgical. Les récurrences sont quasi constantes à 3 ans.

#### ► *Angiosarcome*

C'est une tumeur développée à partir des cellules endothéliales bordant les sinu-

soïdes hépatiques. L'évolution est rapidement fatale et la résection rarement possible.

#### ► *Hémangio-endothéliome*

Variante de l'angiosarcome, son évolution est lente. L'exérèse chirurgicale d'une tumeur localisée est le meilleur traitement. Si la tumeur est plus étendue, on peut proposer une transplantation.

#### ► *Cystadénocarcinome*

Il se développe toujours sur un cystadénome. Le traitement est chirurgical. La prévention repose sur la résection des cystadénomes.

### Cancer secondaire du foie [1]

Le pronostic et le traitement dépendent du type de tumeur.

La recherche d'une tumeur primitive, lorsqu'elle est inconnue, n'est utile que si un traitement peut être envisagé.

*Se référer aux chapitres concernant la prise en charge de la tumeur primitive.*

### CONSENSUS

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFC, SFRO, SNFGE) – Cancer du foie, SNFGE, 2011

**TUMEURS BÉNIGNES DU FOIE (1)**

L'utilisation large de l'échographie hépatobiliaire conduit à la découverte fréquente de tumeurs hépatiques bénignes, le plus souvent asymptomatiques. Les lésions les plus fréquentes sont le kyste biliaire, l'adénome, l'hémangiome et l'hyperplasie nodulaire focale.

**Kyste biliaire****Clinique**

Il est retrouvé chez 4 % des personnes ayant une échographie hépatique.

Il est le plus souvent asymptomatique, sauf s'il est très volumineux et comprime les organes de voisinage (nausées, vomissements, douleurs).

**Imagerie**

- Lésion régulière, anéchogène avec renforcement postérieur et paroi fine.
- Parenchyme hépatique normal.

**Traitement****► Kyste asymptomatique**

Aucune surveillance et aucun traitement.

**► Kyste symptomatique**

Il est difficile d'attribuer les symptômes au kyste ; leur régression après ponction du kyste est un bon test diagnostique mais les récurrences sont fréquentes.

Le seul traitement efficace est la chirurgie ; l'intervention consiste à pratiquer une kys-

tectomie partielle (résection du dôme saillant).

**Adénome****Clinique**

- Tumeur rare touchant dans 95 % des cas la femme entre 25 et 35 ans ; le risque est augmenté par la contraception orale.
- Asymptomatique ; lorsqu'il devient volumineux, l'adénome peut se compliquer d'une hémorragie intratumorale ou intrapéritonéale.

**Imagerie**

L'aspect est très voisin de celui de l'hyperplasie nodulaire focale. Une nécrose centrale d'un adénome peut mimer la fibrose centrale de l'hyperplasie nodulaire focale.

**► Échographie**

Image aspécifique ; tumeur souvent moins échogène que le parenchyme hépatique.

**► Angioscanner**

Avant injection : tumeur mal limitée hypodense.

Après injection : hyperdensité.

**► IRM**

T1 : hypo- ou iso-intense.

T2 : légèrement hyper-intense.

**Traitement**

Les œstroprogestatifs doivent être arrêtés.

En fonction de la taille, on discute une surveillance ou une résection chirurgicale.

**TUMEURS BÉNIGNES DU FOIE (2)****Hyperplasie nodulaire focale****Clinique**

- C'est une tumeur rare touchant la femme dans 85 % des cas.
- Elle est le plus souvent asymptomatique.

**Imagerie**

L'aspect est très voisin de celui de l'adénome. Une nécrose centrale d'un adénome peut mimer la fibrose centrale de l'hyperplasie nodulaire focale.

**► Échographie**

Absence d'échogénicité caractéristique.

La présence inconstante d'une fibrose centrale est de grande valeur.

**► Angioscanner et IRM**

Aspect comparable à l'adénome.

La présence d'une fibrose centrale étoilée est caractéristique.

**Traitement**

Il n'y a pas d'indication opératoire pour une hyperplasie nodulaire focale.

Toutefois, il peut être difficile avant l'intervention chirurgicale de distinguer un adénome d'une hyperplasie nodulaire focale. On est donc souvent contraint de réséquer

les hyperplasies nodulaires focales pour ne pas laisser évoluer un adénome.

**Hémangiome****Clinique**

Tumeur fréquente, asymptomatique.

**Imagerie****► Échographie**

Elle permet souvent de porter le diagnostic : lésion hyperéchogène, bien limitée, à discret renforcement postérieur.

**► Angioscanner**

- Lésion hypodense.

- Accumulation lente du produit de contraste du centre vers la périphérie ; l'opacification persiste tardivement.

**► IRM**

T1 : hypo-intense.

T2 : très hyper-intense.

**Traitement**

L'abstention thérapeutique est la règle, même en cas d'hémangiome géant.

L'hémorragie et la rupture sont exceptionnelles.

Si l'hémangiome devient gênant du fait de son volume, la chirurgie en milieu spécialisé est le traitement de choix.



## TUMEURS BÉNIGNES DU FOIE (3)

En résumé, il est très difficile de différencier un adénome d'une hyperplasie nodulaire focale et même d'un carcinome hépatocellulaire bien différencié. La biopsie dirigée comporte un risque hémorragique et ne permet pas toujours de conclure.

C'est pourquoi on a tendance à opérer les patients ayant une tumeur non kystique du foie après avoir éliminé un angiome.

Toutefois, depuis l'utilisation des pilules minidosées en **œstrogènes**, la fréquence de l'adénome a considérablement diminué. L'abstention thérapeutique associée à une surveillance est donc possible lorsqu'il existe des arguments morphologiques en faveur d'une hyperplasie nodulaire focale.

L'arrêt des **œstroprogestatifs** est souvent recommandé.

### Tumeurs bénignes du foie

	KYSTE BILIAIRE	ADÉNOME	HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE	HÉMANGIOME
Terrain Clinique	4 % des patients ayant une écho. hépatique asymptomatique	Femme entre 25 et 35 ans (95 %) Asymptomatique	Rare Femme (85 %) Asymptomatique	Fréquente Asymptomatique
Échographie	Lésion régulière anéchogène avec renforcement postérieur et paroi fine	Aspécifique : tumeur moins échogène que le parenchyme hépatique	Aspécifique. Fibrose centro-tumorale inconstante de grande valeur	Lésion hyperéchogène bien limitée à discret renforcement postérieur
Angio-scanner	Hypodense avant et après injection de produit de contraste	Avant injection : hypodense Après injection : hyperdense	Avant injection : hypodense Après injection : hyperdense Fibrose centro-tumorale inconstante de grande valeur	Accumulation lente du produit de contraste de la périphérie vers le centre (centripète)
IRM	Ne doit pas être pratiquée (sauf complication) T1 : hypo-intense T2 : très hyper-intense	T1 : hypo- ou iso-intense T2 : faiblement hyperintense	T1 : hypo- ou iso-intense T2 : hyperintense en particulier en son centre	T1 : hypo-intense T2 : très hyper-intense (flash)
Traitement	Abstention	Abstention (surveillance) ou résection	Abstention (mais le diagnostic différentiel avec un adénome est difficile en l'absence de chirurgie)	Abstention

## CHOLANGITE SCLÉROSANTE PRIMITIVE - CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE (1)

### Diagnostic

Ces deux maladies ont un tableau clinico-biologique et des traitements très voisins.

#### Cirrhose biliaire primitive (CBP) et cholangite sclérosante primitive (CSP)

	CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE	CHOLANGITE SCLÉROSANTE PRIMITIVE
Terrain	Femme : 90 %	Homme : 66 %
Clinique	Cholestase	Cholestase, douleurs hypocondre droit, angiocholite
Pathologies associées	Manifestations auto-immunes : syndrome de Gougerot-Sjögren, thyroïdite, polyarthrite rhumatoïde	Colite inflammatoire, rectocolite hémorragique principalement
Biologie	Anticorps antimitochondrie de type II ; autres auto-anticorps Élévation des IgM avec IgG et IgA stables	pANCA (anticorps anticytoplasme des neutrophiles ; fluorescence péri-nucléaire)
Imagerie biliaire	Normale	Alternance de rétrécissement et de dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques
Diagnostic	Histologie (ponction-biopsie hépatique)	Imagerie (histologie pour le pronostic)
Traitement	Acide ursodésoxycholique Transplantation	Acide ursodésoxycholique Transplantation

## CHOLANGITE SCLÉROSANTE PRIMITIVE - CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE (2)

### Traitement étiologique

#### Traitement médical

Pour la cirrhose biliaire primitive, l'**acide ursodésoxycholique (DELURSAN)** est le traitement de référence : 13 à 15 mg/kg/j en 2 prises pendant les repas. Il améliore les symptômes et la biologie et retarde la transplantation. Il est surtout efficace dans les stades précoces de la maladie.

Pour la cholangite sclérosante primitive, la preuve de l'efficacité de l'**acide ursodésoxycholique** n'a jamais été démontrée. Certaines études suggèrent même qu'il pourrait diminuer la survie, surtout à dose élevée > 15 mg/kg/j. En cas de sténose biliaire avec cholestase, une dilatation biliaire peut être proposée.

Les autres médicaments qui sont proposés sont les suivants : **budésone, ciclosporine, méthotrexate, colchicine, D-pénicillamine, bézafibrate**.

#### Transplantation hépatique

C'est le traitement de choix en stade avancé. La survie à 1 an est de 85 % ; et rejoint ensuite celle de la population normale. La récidive sur le greffon est rare.

### Traitement symptomatique

#### Prurit

La **colestyramine** est un des produits les plus utilisés (**QUESTRAN**) : 1 à 2 sach. x 3/j. La posologie doit être adaptée individuellement. Le délai d'efficacité est de 2 à 4 j. En cas d'échec, à la place du **QUESTRAN**, on propose l'**acide ursodésoxycholique (DELURSAN)** qui est également utilisé pour le traitement étiologique (cf. *infra*).

Les autres produits sont moins étudiés : **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **phénobarbital (GARDÉNAL)**, **rifampicine (RIFADINE)**, **odansétron (ZOPHREN)**, etc.

#### Stéatorrhée et malabsorption

Elles apparaissent tardivement et sont dues à la diminution de la sécrétion biliaire. Le traitement n'est pas spécifique.

- Régime pauvre en graisses, enrichi en triglycérides à chaîne moyenne (**LIPROCIL**).

Le dosage des vitamines liposolubles et le contrôle de l'hémostase permettent d'ajuster les doses (les posologies suivantes sont donc indicatives) ; les carences sont rares mais favorisées par le **QUESTRAN**.

- **Rétinol (VITAMINE A ROCHE ou VITAMINE A DULCIS)** : 1 cp. (50 000 UI)/15 j.
- **Vitamine K1** : 20 mg en IV lente.
- **Ergocalciférol ou vitamine D2 (STÉROGYL)** : 2 gtt/j.

## TRANSPLANTATION HÉPATIQUE (1)

Les indications font l'objet d'un consensus de l'AFEF et de l'HAS [1].

La transplantation hépatique est actuellement une technique bien rodée. Elle permet, lorsque les indications sont bien posées, d'atteindre un taux de survie supérieur à 80 % à 3 ans.

### Indications

La transplantation hépatique doit être discutée dans tous les cas d'hépatopathie irréversible et mortelle.

Le score MELD (*Model for End-stage Liver Disease*) est utilisé pour discuter de l'inscription d'un patient sur liste. Ce score (de 6 à 40) permet d'évaluer le risque de mourir du foie à 3 mois. Un score  $> 17$  est en faveur de la transplantation et  $< 15$  en défaveur.

MELD score :  $3,8 \times \ln(\text{bilirubine mg/dL}) + 11,2 \times \ln(\text{INR}) + 9,6 \times \ln(\text{créatinine mg/dL})$ .

### Hépatopathies chroniques cholestatiques

#### ► Cirrhose biliaire primitive et cholangite sclérosante primitive

Ce sont deux très bonnes indications puisque la survie à 5 ans est de l'ordre de 80 %. Le risque de récurrence de la maladie sur le greffon est faible. Les critères de transplantation sont une bilirubinémie  $> 100\text{--}150 \mu\text{mol/L}$  et/ou une ascite et/ou une hémorragie digestive récidivante ou non contrôlée et/ou un prurit intolérable et/ou une asthénie majeure.

#### ► Atresie des voies biliaires extra-hépatiques de l'enfant

C'est l'absence totale ou partielle de la voie biliaire principale, interrompant tout écoulement biliaire. Les résultats de la transplantation sont excellents chez un enfant de plus de 2 ans.

### Hépatopathies chroniques non cholestatiques : les cirrhoses

#### ► Cirrhose alcoolique

Les indications à la transplantation sont les cirrhoses sévères (Child C) qui ne s'améliorent pas malgré un sevrage prolongé. En cas d'hépatite alcoolique, le sevrage permet parfois une amélioration spectaculaire et c'est pourquoi les indications sont difficiles à prendre.

#### ► Cirrhose post-hépatitique B ou B + Delta

Le risque est la réinfection du greffon. On réserve donc la transplantation aux patients ayant une cirrhose grave et sans répllication virale, pour éviter une réinfection du greffon. Une immunoprophylaxie après la transplantation par injection régulière d'immunoglobulines anti-HBs est indiquée. La survie est de l'ordre de 70 % à 2 ans.

#### ► Cirrhose post-hépatitique C

La récurrence de l'infection sur le greffon dépasse 75 %. Le pronostic de la réinfection est mal connu. Grâce à l'arrivée des nouveaux **antiviraux** actifs sur le VHC, on espère réduire les effets de la réinfection sur le greffon.

### Hépatite fulminante

Elle peut être d'origine virale ou médicamenteuse. Schématiquement, la transplantation est indiquée lorsqu'apparaît une confusion ou un coma avec un facteur  $V < 20\%$  ou  $> 30\%$  (respectivement avec un âge  $<$  ou  $> 30$  ans) car dans ce cas, la mortalité spontanée atteint 85 à 90 %. La survie à 1 an atteint environ 70 %.

### Carcinome hépatocellulaire

Les indications les mieux validées sont :

- tumeur unique  $< 5 \text{ cm}$  ;
- ou 2 à 3 nodules  $< 3 \text{ cm}$ .

La transplantation est contre-indiquée en cas de métastases, d'adénopathies ou d'envahissement vasculaire.

## TRANSPLANTATION HÉPATIQUE (2)

### Contre-indications

#### Absolues

- Tumeur maligne (qu'elle soit métastasée ou non au foie).
- Maladie extra-hépatique sévère.

#### Relatives

- Âge > 65 ans.
- Intoxication alcoolique persistante.
- Séropositivité VIH ; répllication virale B.
- Hypertension artérielle pulmonaire sévère.
- Hypoxémie par shunt droite-gauche.
- Antécédents d'interventions multiples sur le foie et les voies biliaires.
- Prévision d'une prise aléatoire du traitement immunosuppresseur.

La transplantation hépatique est possible chez des patients infectés par le VIH, stables et bien sélectionnés.

### Technique

#### Intervention chirurgicale

Le prélèvement est effectué chez un malade en état de mort cérébrale.

La transplantation hépatique est le plus souvent orthotopique : le foie malade est enlevé et remplacé par le foie du donneur. Dans les hépatites fulminantes, une transplantation hétérotopique auxiliaire est parfois pratiquée : le foie du donneur permet alors au foie malade de régénérer.

Au cours de l'intervention chirurgicale, les anastomoses vasculaires pratiquées sont les suivantes : cavo-sus-hépatique, cavo-sous-hépatique, porto-porte et artérielle hépatique. La continuité biliaire est assurée par une anastomose cholédoco-jéjunale sur anse en Y ou cholédoco-cholédocienne termino-terminale.

La pénurie en greffon conduit à rechercher de nouvelles techniques qui permettent de partager un foie entre plusieurs receveurs.

#### Évolution immédiate

##### ► Modifications biologiques et histologiques

- Élévation transitoire des transaminases et de la bilirubine.
- Remontée rapide des facteurs de la coagulation (facteur V notamment).
- Apparition de zones de nécrose hépatocytaires, d'une stéatose et d'un infiltrat

inflammatoire. Plus à distance, apparition de lésions de cholestase.

##### ► Non-fonction primaire du greffon

C'est une reprise insuffisante de la fonction du greffon, incompatible avec la survie du receveur. Elle serait due à des lésions induites par la conservation du greffon et est diagnostiquée 24 à 48 h après la transplantation. Le seul traitement est la retransplantation.

#### Traitement immunosuppresseur

L'introduction de la **ciclosporine (SANDIMUN)** a permis d'améliorer considérablement les résultats.

Elle est au départ utilisée par voie IV, le relais se faisant par voie orale à la régression de la cholestase (l'absorption de **ciclosporine** est liée à la présence de bile).

La posologie est ajustée à la ciclosporinémie qui doit être entre 100 et 150 ng/mL. Une liste des médicaments interagissant avec la **ciclosporine** doit être remise au patient.

Une corticothérapie et de l'**azathioprine (IMUREL)** sont associées à la **ciclosporine**.

### Complications

#### Rejet

##### ► Rejet hyperaigu

Il est rare et apparaît dès la fin de l'intervention chirurgicale avec des troubles de l'hémostase et une insuffisance hépatocellulaire. Une retransplantation en urgence est indiquée.

##### ► Rejet aigu

Il est très fréquent (30 à 70 % des cas) et se manifeste vers la 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> sem. post-transplantation.

Les signes sont aspécifiques : fièvre, asthénie, hépatomégalie, ascite, perturbation de la biologie hépatique.

La défaillance du greffon n'apparaît que rarement mais chaque épisode de rejet aigu entraîne une diminution irréversible de la fonction hépatique.

Le traitement repose sur la corticothérapie IV et en cas d'échec sur les **anticorps monoclonaux murins anti-CD3 (ORTHOCLONE OKT3)**.

## TRANSPLANTATION HÉPATIQUE (3)

### ► Rejet chronique

Il apparaît chez 10 % des patients, 6 mois après la transplantation et est caractérisé par une cholestase chronique.

L'histologie retrouve une disparition progressive des canaux biliaires. Ce type de rejet aboutit à une cirrhose biliaire secondaire et nécessite alors une nouvelle transplantation.

### Infections

L'infection par le CMV est la plus fréquente et survient 2 à 4 mois après la transplantation. Elle se traduit par une atteinte digestive et hépatique. Le traitement repose sur le **ganciclovir (CYMÉVAN)**.

D'autres infections virales sont possibles (virus herpès, adénovirus).

Des infections bactériennes (principalement bronchopulmonaires et abdominales), fongiques (*Candida*) et parasitaires peuvent également se rencontrer.

### Complications chirurgicales

#### ► Vasculaires

La thrombose de l'artère hépatique est la complication principale et peut être asymptomatique (30 % des cas). Plus souvent, elle se manifeste par une insuffisance hépatique aiguë et un sepsis (abcès, bactériémie, péritonite).

La thrombose de la veine porte est rare (2 %).

#### ► Biliaires

Elles sont fréquentes (7 à 20 %) et se manifestent par une cholestase. Elles sont dues à des sténoses anastomotiques ou des voies biliaires intrahépatiques, des fistules et au drainage biliaire externe. Le traitement est chirurgical ou instrumental.


### Récidive de la maladie sur le foie greffé

Le risque pour chaque pathologie est détaillé dans le paragraphe « Indications ». La fréquence de cette récurrence conditionne les résultats à long terme de la transplantation.

Ce risque semble faible dans la cirrhose d'origine auto-immune, la cirrhose biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive.

La réinfection virale du greffon est fréquente chez les patients transplantés pour cirrhose post-hépatitique B ou C ou Delta. Elle conduit à la formation rapide d'une cirrhose sur le greffon. Les immunoglobulines anti-HBs à forte dose diminuent le risque de récurrence de l'infection par le VHB. L'intoxication alcoolique reprend dans moins de 20 % des cas.

La récurrence d'un carcinome hépatocellulaire est possible.



Transplantation hépatique orthotopique. Anastomose hépatojéjunale sur anse en Y.

## TRANSPLANTATION HÉPATIQUE (4)

### Surveillance du patient transplanté

#### Avant la transplantation

- Médecin généraliste : consultation tous les 7 à 15 j ; état général et hépatique, surveillance des traitements.
- Hépatologue : consultation au moins mensuelle ; adaptation des traitements ; bilan de la fonction hépatique.
- Centre de transplantation : consultation trimestrielle.

#### Après la transplantation

##### ► Buts

- Contrôle du traitement immunosuppresseur.
- Détection du rejet aigu et chronique.
- Diagnostic des infections.
- Recherche d'autres complications.

##### ► Fréquence des consultations ambulatoires en milieu spécialisé

D'abord hebdomadaire puis bimensuelle pendant 6 mois ; puis mensuelle pendant 1 an puis tous les 2 à 3 mois à vie.

##### ► Médecin généraliste

Le médecin généraliste est l'intermédiaire entre le patient greffé et le centre de transplantation.

Une liste des médicaments interagissant avec la **ciclosporine** doit être remise au patient.

L'alimentation doit tenir compte de la prise de **corticoïdes** : régime limité en sel, en sucres rapides, enrichi en calcium et en vitamine D.

##### ► Consultations spécialisées

Le recours à des consultations spécialisées doit être régulier : stomatologie, ophtalmologie, gynécologie (la contraception par stérilet est interdite), diabétologie, etc. Une psychothérapie de soutien du patient et de sa famille peut être nécessaire.

##### ► La vie après la transplantation

La qualité de vie est satisfaisante à long terme. La reprise d'une activité familiale, sociale et professionnelle normale est possible.

Le risque de malformation congénitale n'est pas augmenté et les transplantés peuvent avoir des enfants.

#### Examens biologiques de routine

- NFS.
- Fonction hépatique : transaminases,  $\gamma$ -GT, phosphatases alcalines, bilirubine totale et conjuguée, taux de prothrombine avec facteurs de coagulation.
- Ionogramme sanguin et fonction rénale (urémie et créatininémie).

– Ciclosporinémie résiduelle : prélèvement le matin à jeun avant nouvelle prise de **ciclosporine** pour adapter la posologie au résultat.

La ciclosporinémie doit être comprise entre 100 et 150 ng/mL.

#### CONSENSUS

[1] Indications de la transplantation hépatique, HAS et AFEF, 2005

## HÉMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE (1)

### Lésions responsables d'une hématomèse

- Rupture de varices œsophagiennes (25 %).
- Ulcérations aiguës de la muqueuse gastro-duodénale (17 %).
- Ulcère duodénal (17 %).
- Ulcère gastrique (17 %).
- Ulcère œsophagien et œsophagite (10 %).
- Syndrome de Mallory-Weiss (3 %).
- Autres causes : gastrite hémorragique, lésion sur sonde naso-gastrique, cancer gastrique, ulcère anastomotique, angiome gastrique, maladie de Rendu-Osler.

### Évaluation de la gravité de l'hémorragie

L'importance de l'hémorragie est souvent surestimée par le patient et sa famille : elle ne peut être évaluée que grossièrement sur la quantité de sang extériorisée. Les éléments objectifs sont :

- les signes cliniques d'hypovolémie : tachycardie, hypotension, marbrures, polypnée, cyanose des extrémités, augmentation du temps de recoloration cutanée ;
- l'hémoglobine et l'hématocrite (mais qui sont souvent normales au début) ;
- le meilleur critère pour évaluer l'importance d'une hémorragie est la quantité de concentrés globulaires transfusés pour rétablir un état hémodynamique correct.

Toute hématomèse doit être hospitalisée car même si elle semble peu importante, elle peut récidiver sur un mode grave à tout moment.

### Conduite à tenir

#### À domicile

Les gestes à pratiquer sont :

- décubitus latéral, tête basse pour éviter une régurgitation ;
- une ou deux voies veineuses périphériques pour expansion volémique par **soluté macromoléculaire**.

L'expansion volémique doit être prudente car un excès de remplissage peut favoriser la récidive en augmentant la pression dans les varices œsophagiennes.

Transfert en urgence en milieu hospitalier par le Samu.

#### À l'hôpital

C'est une urgence médico-chirurgicale : le pronostic vital est en jeu ; hospitalisation

en unité de soins intensifs (sauf en l'absence de retentissement hémodynamique où une surveillance continue peut être suffisante).

Un certain nombre de gestes sont à pratiquer en urgence.

#### ► Mise en place de :

- 1 ou 2 voies veineuses périphériques ;
- scope cardiaque ; dynamap ;
- dispositif de recueil des urines ;
- oxygénothérapie.

Plutôt que la mise en place d'une sonde gastrique, on propose une perfusion d'**érythromycine** 250 mg en 30 min qui permet de stimuler la vidange gastrique et améliore les conditions de la gastroscopie.

#### ► Patient à jeun strict

#### ► Si l'état hémodynamique le nécessite

- Expansion volémique par **sérum physiologique ou soluté macromoléculaire**.

- Dès que possible, transfusion de concentrés globulaires isogroupe, isorhésus (ou à défaut O négatif). Le but est l'obtention d'une pression artérielle moyenne à 80 mmHg avec un hématocrite à 25-30 % et une hémoglobine à 7 g/dL.

#### ► Endoscopie digestive haute

Elle est pratiquée :

- chez un patient conscient, réanimé, dans un état hémodynamique stable ;
- ou à défaut chez un patient intubé et ventilé.

### Intérêts de l'endoscopie

- À visée diagnostique.
- À visée pronostique (cf. Classification de Forrest).
- À visée thérapeutique.



**ANALOGUE DE LA VASOPRESSINE****■ Terlipressine**

<b>GLYPRESSINE</b>					
Toutes les 4 h, voie IV : poids > 70 kg : 2 mg ; entre 50 et 70 kg : 1,5 mg ; < 70 kg : 1 mg		5 fl. 1 mg + 5 mL solv. 5 amp. 1 mg/ 8,5 mL	<b>HOP</b> <b>HOP</b>	I I	

**PROPRIÉTÉS**

Analogue synthétique de la **vasopressine**.

Dans les hypertensionns portales, la **GLYPRESSINE** diminue la pression portale par vasoconstriction dans le territoire porte.

Après injection IV, la **GLYPRESSINE** est métabolisée en lysine-vasopressine qui est l'hormone active (délai d'action : 40-60 min ; durée d'action : 180 min).

**INDICATIONS**

Ruptures de varices œsophagiennes (en attendant le traitement spécifique).

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolues :

- **grossesse** : effet embryofœtotoxique ;
- choc septique.

Relatives :

- insuffisance coronaire ; antécédent d'infarctus du myocarde ;
- troubles du rythme cardiaque ;
- hypertension artérielle non contrôlée ;

- insuffisance vasculaire cérébrale ou périphérique ;
- asthme, insuffisance respiratoire ;
- insuffisance rénale chronique ;
- âge > 70 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Voie IV stricte : risque de nécrose cutanée en cas d'extrasation.

Surveillance rapprochée de la PA, de la fréquence cardiaque, de la diurèse et du ionogramme.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont rares.

Graves : poussée hypertensive (cédant souvent spontanément) ; bradycardie ; insuffisance coronaire (chez les sujets à risque).

Mineurs :

- crampes abdominales, diarrhée ;
- céphalées ;
- acrocyanose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Incompatibilité majeure avec les solutés alcalins ou contenant des sucres réducteurs.

## HÉMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE (2)

### Patient cirrhotique connu ou probable

#### Rupture de varices œsophagiennes

Elle est retrouvée dans 75 % des cas.

#### ► Traitement de l'hémorragie

##### Traitement vasoactif

Le diagnostic de rupture de varices œsophagiennes étant le plus probable, on débute, avant même la réalisation de la gastroscopie, un traitement par drogues vasoactives ; la durée de ce traitement est de 2 à 5 j :

- **octréotide (SANDOSTATINE)** : 25 µg/h en continu (600 µg/j) ;
- ou **somatostatine (MODUSTATINE 2 mg)** : 0,250 mg en IV lente puis 0,250 mg/h en continu ;
- ou **terlipressine (GLYPRESSINE)** : 1 inj. IV toutes les 4 h (poids > 70 kg : 2 mg/4 h ; 50 à 70 kg : 1,5 mg/4 h ; < 50 kg : 1 mg/4 h).

##### Traitement endoscopique

L'endoscopie en urgence permet d'affirmer l'origine du saignement. Elle doit être pratiquée chez un patient :

- en état hémodynamique stable ;
- conscient, réanimé ou bien intubé et ventilé.

On réalise une ligature élastique des varices œsophagiennes.

En cas de persistance ou de récurrence précoce (20 à 30 % des cas), une nouvelle endoscopie est nécessaire.

Si malgré tout l'hémorragie persiste ou récidive précocement (5 à 10 %), on discute :

- une nouvelle gastroscopie avec ligature ;
- une **sonde à double ballonnet de Blake-more** pour comprimer les varices. Sa position doit être vérifiée radiologiquement et elle sera laissée en place 48 h maximum ;

– la mise en place par voie transjugulaire d'une prothèse expansible intra-hépatique entre la veine sus-hépatique et la veine porte intra-hépatique (TIPS pour *Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt* ; cf. Cirrhose).

#### ► Traitements associés

- Recherche et prévention des infections : prélèvements multiples (ECBU, ascite, hémocultures), puis antibiothérapie systématique : **NOROXINE** 400 mg/12 h.
- Prévention du delirium tremens et de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke (chambre individuelle, éclairée 24 h/24) ; hydratation abondante ; éviter les sédatifs ; vitaminothérapie B.
- Prévention des gastrites aiguës de stress : **oméprazole** 40 à 160 mg/j.
- Prévention de l'encéphalopathie hépatique (cf. Cirrhose).
- Prévention des récurrences hémorragiques (cf. Cirrhose).
- Nursing.

#### Rupture de varices gastriques

On effectue une obturation endoscopique des varices par des colles (**HISTOACRYL**).

#### Autres étiologies

Si la gastroscopie ne retrouve pas de rupture de varices, une autre lésion est responsable de l'hémorragie.

#### ► Gastropathie d'hypertension portale

Le traitement est difficile.

On peut tenter d'utiliser les **drogues vasoactives** (cf. *supra*) et/ou les **β-bloquants** non cardiosélectifs si la PA le permet : **propranolol (AVLOCARDYL)** ou **nadolol (CORCARD)** ; posologie à adapter pour faire baisser la fréquence cardiaque de 25 %.

#### ► Ulcère gastrique ou duodénal

Le traitement est le même que chez le patient non cirrhotique (cf. *infra*).

**ANALOGUE DE LA SOMATOSTATINE**■ **Somatostatine**

<b>SOMATOSTATINE EUMEDICA</b>					
Perf. continue 0,004 mg/kg/h environ	1 inj. 0,25 mg	HOP	I		
Rupture de varices œsophagiennes : 0,250 mg IV lente puis 0,250 mg/h	1 inj. 3 mg	HOP	I		
Fistule digestive : 0,250 mg/h	1 inj. 6 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Analogue de synthèse de la somatostatine naturelle ; demi-vie de 2 à 3 min impliquant une perfusion continue.

Inhibition des sécrétions exocrines et endocrines digestives (acide chlorhydrique, sécrétions pancréatiques et biliaires).

Réduction du débit circulatoire splanchnique.

Inhibition de la motilité gastrique et intestinale.

**INDICATIONS**

Soins intensifs en gastro-entérologie :

- ruptures de varices œsophagiennes (en attendant le traitement spécifique) ;
- fistule digestive postopératoire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller la glycémie (inhibition de la sécrétion d'insuline et de **glucagon**).

Réduire progressivement la vitesse de perfusion avant d'arrêter le traitement : risque d'effet rebond sécrétoire en cas d'arrêt brutal.

Inhibition de l'absorption intestinale de certains nutriments : nutrition parentérale conseillée.

Injecter lentement un éventuel bolus en dose de charge (> 1 min) (cf. Effets indésirables).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

En cas d'injection trop rapide : bradycardie, flush, nausées, inconfort abdominal.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Une synergie avec la **cimétidine** a été rapportée.

Incompatibilité majeure : la **somatostatine** est instable à pH alcalin : éviter sa dilution dans une solution alcaline.

## HÉMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE (3)

### Patient non cirrhotique

La fibroscopie permet de déterminer l'origine de l'hémorragie.

### Ulcère hémorragique

#### ► Traitement endoscopique

Le traitement de première intention est la **sclérose endoscopique** de l'ulcère hémorragique. Le risque de récurrence hémorragique est évalué par la classification de Forrest. La mise en place d'un clip peut

suivre la sclérose. En cas de récurrence et en fonction des équipes on discute :

- une nouvelle sclérose endoscopique ;
- ou une intervention chirurgicale d'hémostase (suture, gastrectomie partielle).

#### ► Traitement médical

On associe systématiquement un traitement antisécrétoire, d'abord par voie parentérale puis par voie orale avec de très fortes doses d'**oméprazole** : bolus de 80 mg puis perfusion de 8 mg/h pendant 72 h.

### Classification des stigmates d'hémorragie ulcéreuse (Forrest)

STADE DE FORREST	TYPE DE SAIGNEMENT	RISQUE DE RÉCIDIVE HÉMORRAGIQUE À 48 h
I	Hémorragie en cours Ia : saignement artériel en jet Ib : hémorragie par suintement	55 à 75 %
II	Signes d'hémorragie récente IIa : vaisseau visible IIb : caillot adhérent IIc : taches pigmentées au fond de l'ulcère	50 % 20 % 10 %
III	Aucun signe d'hémorragie	5 %

#### ► Traitement chirurgical

Il est réservé aux échecs du traitement endoscopique. On doit y avoir recours d'autant plus rapidement que :

- le sujet est âgé (morbidity et mortalité des hémorragies à cet âge) ;
- il existe des signes de choc ;
- le saignement est d'origine artériel (artère gastro-duodénale à la face postérieure du bulbe, coronaire stomacale au niveau de la petite courbure gastrique, splénique à la face postérieure de l'estomac).

Le geste consiste en une suture de l'ulcère (associée ou non à une vagotomie) ou en une gastrectomie partielle.

### Syndrome de Mallory-Weiss

C'est une déchirure longitudinale de la jonction œsogastrique qui apparaît après

des efforts de vomissements. Le traitement est simple :

- mise au repos du tube digestif (jusqu'à l'arrêt des vomissements et la régression endoscopique des lésions) ;
- **antisécrétoire** : **oméprazole**, 40 mg/j IV ;
- **antiémétique** : **PRIMPÉRAN**, 10 mg/8 h IV.

Un contrôle endoscopique peut être fait dans les 48 h pour vérifier la cicatrisation. Dans les formes graves (qui sont rares), on propose un traitement endoscopique.

### Gastrite aiguë

Le traitement est étiologique : arrêt des médicaments gastro-toxiques, de la prise d'alcool, etc.

On associe souvent des **antisécrétoires** mais l'utilité de cette prescription n'a jamais été démontrée : **oméprazole** 40 mg/j IV.

## HÉMORRAGIE DIGESTIVE BASSE

### Hémorragie de faible abondance

Dans la majorité des cas, l'hémorragie est peu importante et s'arrête spontanément, ce qui permet de rechercher l'étiologie.

L'examen proctologique est systématique mais, même s'il permet de retrouver une cause probable (hémorroïdes), **la coloscopie doit être systématique**.

Lorsque ces examens ne permettent pas de porter le diagnostic, une gastroscopie doit être pratiquée.

Les autres examens ne sont indiqués qu'en cas de négativité des précédents : vidéocapsule, entéroscopie totale, artériographie coélio-mésentérique, scintigraphie aux hématies marquées.

### Hémorragie de grande abondance

Elle est rare et peut témoigner d'une hémorragie digestive haute.

La mise en condition du malade et le contrôle hémodynamique sont décrits au chapitre Hémorragie digestive haute (1).

#### Hémorragie digestive haute

Une hémorragie digestive haute doit être recherchée (pose d'une sonde gastrique et fibroscopie). Si cette recherche est positive, la conduite à tenir devient celle d'une hématomèse.

#### Hémorragie digestive basse

La gastroscopie est l'examen à pratiquer en première intention car toute hémorragie digestive haute peut s'extérioriser sous forme d'une hémorragie digestive basse. L'absence de sang à la gastroscopie éli-

mine quasiment une hémorragie digestive haute.

#### ► *L'état hémodynamique est contrôlé*

Une coloscopie doit être pratiquée en urgence après une préparation rapide par lavements. Cet examen permet de porter le diagnostic dans 75 % des cas et parfois de réaliser un geste thérapeutique sur des polypes hémorragiques ou des angiodysplasies.

L'artériographie mésentérique est peu utile si l'hémorragie s'est tarie.

#### ► *L'hémorragie persiste et reste abondante*

La coloscopie doit être tentée ; la préparation se fait par de grands lavements.

L'angioscintigraphie hélicoïdale permet de localiser le saignement dans 50 % des cas et d'évoquer la cause dans 30 %.

L'artériographie mésentérique supérieure et inférieure est une alternative : elle permet de localiser l'hémorragie lorsque le débit atteint 0,5 à 1 mL/min et d'effectuer éventuellement une embolisation pour la stopper.

La scintigraphie aux hématies marquées au  $^{99m}\text{Tc}$  est plus sensible (détection de saignement ayant un débit de 0,05 mL/min) que l'artériographie mais ne permet pas de réaliser de geste hémostatique.

Si l'ensemble des examens est négatif, il devient nécessaire de pratiquer une laparotomie en urgence. Une endoscopie peropératoire pourra aider à localiser l'hémorragie. Lorsque aucune lésion n'est retrouvée, une colectomie totale doit alors être discutée.

#### Causes d'hémorragie digestive basse

Toute hémorragie digestive haute.

Lésions proctologiques : ce sont les plus fréquentes mais elles doivent rester un diagnostic d'élimination (la recherche d'une cause sous-jacente est systématique) : hémorroïdes, cancer anal ; fissure anale ; ulcération thermométrique.

Lésions rectocoliques : diverticulose colique (première cause) ; angiodysplasies ; cancer ; colite inflammatoire, ischémique, radique, infectieuse ; corps étranger.

Lésions du grêle : diverticule de Meckel ; entérite radique, ischémique, infectieuse ; tumeur.

## NAUSÉES - VOMISSEMENTS (1)

Nausées et vomissements dépendent d'un même mécanisme et doivent être traités de la même façon.

Des vomissements répétés peuvent rapidement retentir sur l'équilibre hydroélectrolytique qu'il faut prévenir ou traiter.

**Une grossesse doit systématiquement être recherchée chez une femme en âge de procréer.**

### Traitement

#### Rééquilibration hydroélectrolytique

Elle peut être orale lorsque l'intolérance alimentaire n'est pas trop importante ; on utilise des jus de fruits, des bouillons salés ou du *Coca-Cola*.

En cas d'intolérance, la voie IV sera utilisée en milieu hospitalier. En fonction des troubles hydroélectrolytiques, on utilise du sérum salé isotonique, du sérum glucosé à 5 % avec des électrolytes : NaCl 4g/L et KCl 2g/L.

Une aspiration digestive douce et continue peut être utile.

#### Médicaments antiémétiques

Ils sont très efficaces mais la plupart sont des **antipsychotiques** et exposent donc à des effets secondaires extrapyramidaux ou à des troubles de la vigilance.

En fonction de la tolérance digestive on utilisera la forme orale, rectale ou parentérale IM ou IV.

Ex. : **métoclopramide (PRIMPÉRAN)** : 10 mg x 3/j (cp., IM ou IV lente) ou 1 sup. (20 mg) x 2/j ou **métopimazine (VOGALÈNE)** : 1 gél. (15 mg) x 2/j ou 1 sup. (5 mg) x 1 à 3/j ou 1 amp. (10 mg) x 1 à 3/j IM ou IV lente.

En cas d'occlusion intestinale, on préfère éviter les **antiémétiques** qui peuvent aggraver les douleurs abdominales en stimulant la motricité digestive. La mise en place d'une sonde gastrique est préférable.

#### Traitement étiologique

Il est évidemment indispensable.

#### Formes particulières

##### Vomissements secondaires à la chimiothérapie

Cf. Chapitre spécifique.

On utilise pour la prévention les **antagonistes des récepteurs 5HT<sub>3</sub> de la sérotonine** de type **granisétron** ou **odansétron** (respectivement **KYTRIL** et **ZOPHREN**) que l'on associe à une corticothérapie.

En traitement curatif, les **antipsychotiques (PRIMPÉRAN, PLITICAN)** à forte dose et les **corticoïdes** sont les produits les plus efficaces.

##### Vomissements gravidiques

Le **PRIMPÉRAN** peut être utilisé sans crainte au cours de la grossesse. Le **VOGALÈNE** semble également être utilisable mais est moins bien évalué.

Dans les cas de vomissements très importants, comme au cours de l'hyperemesis gravidarum, on peut utiliser les **antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> à la sérotonine** type **odansétron (ZOPHREN)**. Dans ce cas, associer la réhydratation et une recharge en **vitamine B1** pour éviter un syndrome de Gayet-Wernicke.

##### Vomissements d'origine labyrinthique

Les vomissements induits par le mal des transports peuvent être traités par un **anticholinergique** : **scopolamine** par voie transcutanée (**SCOPODERM TTS** 0,5 mg/72 h) : 1 patch à appliquer 6 à 12 h avant le départ et à garder 48 h. Des **antihistaminiques H<sub>1</sub>** ont également été proposés ; par exemple **diménhydrinate (DRAMAMINE)** : 1 à 2 cp. 30 min avant le départ à renouveler 3 fois toutes les 4 h.

La **maladie de Ménière** est traitée par des produits plus spécifiques comme le **TAN-GANIL** 1 cp. ou 1 inj. IV (500 mg) x 2 à 3 /j ou le **SERC** 1 cp.(8 mg) x 3/j.

**ANTIÉMÉTIQUES (1)****■ Métopimazine**

<b>VOGALÈNE</b>					
1 lyoc x 2 à 4 /j	16 lyoph. 7,5 mg	3,68	II	30 %	0,23
	20 lyoph. 7,5 mg	4,77	II	30 %	0,24
1 à 2 càc x 2 à 3/j	30 càc 5 mg (fl. 150 mL)	3,40	II	30 %	0,11
E. : 0,5 mg/kg/j en 2 à 3 prises	1200 gttes (1 mg = 10 gttes) fl. 30 mL	2,52	II	30 %	0,00
1 à 2 amp./j IM (ou IV lente)	10 amp. 10 mg	4,22	II	65 %	0,42
Chimiothérapie : la posologie peut être portée à 50 mg/j en IM ou en perf.					
En 3 prises :	10 sup. séc. 5 mg	2,13	II	30 %	0,21
< 6 ans : 1 mg/kg/j					
6-12 ans : 1,5-3 sup./j					
> 12 ans : 3 à 6 sup./j					
<b>VOGALIB</b>					
1 lyoc x 2 à 4 /j	8 lyoph. 7,5 mg		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiémétique appartenant à la classe des phénothiazines (**antipsychotique**) se caractérisant par une activité antidopaminergique élective en raison de son très faible passage à travers la barrière hémato-encéphalique.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des nausées et vomissements.

Prévention et traitement des vomissements induits par la chimiothérapie anticancéreuse (forme IV).

**CONTRE-INDICATIONS**

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Risque de rétention urinaire lié à des troubles uréthro-prostatiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : pas d'effet tératogène chez l'animal ; absence d'effet tératogène rapporté chez l'homme ; toutefois, la sécurité d'emploi lors de la grossesse chez la femme n'a pas été évaluée lors d'essais thérapeutiques et il est conseillé par prudence de limiter la prescription pendant la grossesse (analogie avec les **phénothiazines**).

Éviter l'absorption de boissons alcoolisées pendant le traitement.

Voie IV : risque d'hypotension ; éviter cette forme chez les sujets âgés ; injecter chez un patient en décubitus.

Risque de somnolence : prévenir les conducteurs et utilisateurs de machines.

Présence d'aspartam dans la forme lyoc : éviter en cas de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Neurologiques** : sédation, somnolence, dyskinesies précoces (torticollis spasmodique, crises oculogyres, trismus) cédant à l'administration d'un **antiparkinsonien anticholinergique** ; syndrome extrapyramidal ; possibilité de dyskinesies tardives en cas d'utilisation prolongée (comme avec tous les **antipsychotiques**).

**Végétatifs** : hypotension orthostatique, sécheresse buccale, constipation, troubles de l'accommodation, rétention urinaire.

**Endocriniens** : impuissance, frigidité, aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, hyperprolactinémie.

Rarement éruption cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Risque de potentialisation des **antihypertenseurs** et des dépresseurs du système nerveux central : **hypnotiques, sédatifs, analgésiques, anesthésiques**.

## NAUSÉES - VOMISSEMENTS (2)

### Vomissements récents aigus

PATHOLOGIE	PARTICULARITÉS SÉMIOLOGIQUES
Urgences chirurgicales Péritonite aiguë Occlusion intestinale aiguë Pancréatite aiguë Infarctus mésentérique	Contracture abdominale Météorisme abdominal, arrêt des matières et des gaz Hyperamylasémie Hyperamylasémie Silence abdominal à l'auscultation
Urgences neurologiques Méniges Hémorragie méningée	Raideur méningée (ponction lombaire) Début très brutal (scanner cérébral)
Urgences gynécologiques Hyperemesis gravidarum Grossesse extra-utérine Salpingite aiguë Torsion d'un kyste de l'ovaire (Échographie)	Premier trimestre de la grossesse β-hCG, toucher pelvien douloureux Infection génitale
Urgences métaboliques Insuffisance surrénale aiguë Acidocétose diabétique Hypercalcémie Infarctus mésentérique	Hyponatrémie, hyperkaliémie Hyperglycémie, glycosurie, cétonurie, acidose Silence abdominal à l'auscultation
Urgences cardiologiques Infarctus du myocarde	Douleur thoracique intense (électrocardiogramme)
Autres urgences Colique hépatique ou néphrétique Rétention urinaire Glaucome aigu	Lithiase biliaire ou urinaire Globe vésical Hypertension oculaire
Causes iatrogènes Intoxications volontaires Surdosages (digitaliques, antipsychotiques, alcool, etc.)	Tentative de suicide
Affections digestives Gastroentérite infectieuse Hépatite virale aiguë	Diarrhée, intoxication alimentaire Syndrome grippal

### Vomissements chroniques

PATHOLOGIE	PARTICULARITÉS CLINIQUES
Causes digestives Sténose du pylore ; sténose du grêle Séquelles de gastrectomie	Ulcère, cancer, tumeur, maladie de Crohn
Causes neurologiques Migraine Maladie de Ménière Hypertension intracrânienne Intoxication chronique au monoxyde de carbone (CO)	Céphalées Surdité, vertiges, bourdonnements d'oreille Scanner cérébral, fond d'œil Intoxication collective, circonstances particulières
Causes psychiatriques	Vomissements volontaires



## HOQUET

Le hoquet passager ne nécessite aucun traitement médicamenteux mais quelques manœuvres simples.

Lorsque la crise se prolonge, un bilan étiologique doit être pratiqué à la recherche d'une maladie organique avant de débiter un traitement symptomatique.

### Hoquet passager

Plusieurs manœuvres peuvent être tentées :

- absorption d'un grand verre d'une boisson gazeuse froide : limonade, eau gazeuse, *Coca-Cola* ;
- manœuvre de Valsalva : blocage de la respiration en fin d'inspiration profonde ;
- compression simultanée des deux artères radiales dans la gouttière du pouls pendant une vingtaine de secondes, au besoin associée à une manœuvre de Valsalva ;
- compression des 2 nerfs phréniques à la base du cou.

### Hoquet prolongé

#### En première intention

On utilise le **PRIMPÉRAN** ou le **VOGALÈNE** : 2 amp. de 10 mg IV à répéter en cas d'échec ou de rechute 1 à 2 h plus tard sans dépasser 6 amp./j.

Un relais par voie orale doit être systématique : **PRIMPÉRAN** 1 cp. x 3/j ou **VOGALÈNE** 1 gél. x 2/j.

#### En cas d'échec

Le traitement est difficile. On peut utiliser les produits suivants :

- antipsychotique, chlorpromazine (**LARGACTIL**) : 1/2 à 1 amp. à 25 mg ou halopéridol (**HALDOL**) : 1 amp. (5 mg) x 1 à 3/j en IM ou en perfusion à répéter une fois dans la journée ;
- corticothérapie et antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> de la sérotonine de type granisétron ou odansétron (respectivement **KYTRIL** et **ZOPHREN**) dans les hoquets secondaires à la chimiothérapie ;
- le baclofène (**LIORÉSAL**) à la dose de 10 à 40 mg/j peut être efficace.

### Principales causes de hoquet

#### Atteinte du système nerveux central

- Traumatisme crânien.
- Tumeur cérébrale.
- Accident vasculaire cérébral.
- Encéphalite, méningite.

#### Excitation du nerf phrénique

- Affection ORL.
- Tumeur de l'œsophage, de l'estomac, bronchopulmonaire.

- Compression médiastinale.
- Péricardite, infarctus du myocarde.
- Pleurésie.
- Hernie hiatale.
- Diverses atteintes digestives sous-diaphragmatiques : péritonite, carcinose péritonéale, abcès du foie, etc.
- Hoquet essentiel.

## TUMEUR ENDOCRINE DIGESTIVE (1)

### Types de tumeur

Les tumeurs endocrines digestives sont encore appelées neuro-endocrines ou APUDome. Elles peuvent être localisées dans tout le tube digestif, le pancréas et le foie.

Elles peuvent être fonctionnelle en sécrétant des hormones : gastrine/gastrinome (ou syndrome de Zollinger-Ellison), insuline/insulinome, sérotonine/carcinoïde, glucagon/glucagonome, VIP/vipome. Ces tumeurs peuvent s'intégrer dans une néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) qui doit être recherchée systématiquement en cas de tumeur duodéno-pancréatique.

### Bilan préthérapeutique

#### Examens biologiques

Chromogranine A, après (si possible) 7 j d'arrêt d'un traitement par **inhibiteur de la pompe à protons** (faux positifs : causes d'hypergastrinémie telles qu'insuffisance rénale, prise d'**inhibiteurs de la pompe à protons**, maladie de Biermer, infection à *Helicobacter pylori*).

- Si tumeur duodéno-pancréatique : recherche de l'hormone sécrétée : insuline, glucagon, somatostatine, VIP.
- Si tumeur de l'intestin grêle ou du côlon droit : recherche d'un syndrome carcinoïde, 5-HIAA urinaires.

#### Examens morphologiques

- TDM thoraco-abdominopelvienne avec temps artériel précoce à la recherche d'une hypervascularisation.
- Échoendoscopie (tumeur gastrique, duodénale, pancréatique, rectale) ; IRM hépatique si suspicion de métastase résécable.
- Octréoscan (scintigraphie des récepteurs à la somatostatine).
- PET-scan si octréoscan négatif.
- Échographie cardiaque si syndrome carcinoïde.

#### Anatomopathologie

Indispensable avant tout traitement médical, l'examen anatomopathologique permet d'affirmer le diagnostic et d'établir le pronostic.

Facteurs de mauvais pronostic : faible niveau de différenciation, grade élevé (indice de prolifération, indice mitotique), métastases.

#### Recherche d'une prédisposition génétique

Indiquée si tumeur duodénale ou pancréatique.

Interrogatoire à la recherche d'antécédents familiaux.

Recherche d'une hyperparathyroïdie : calcémie, calcium ionisé, parathormone.

Recherche d'une tumeur hypophysaire, surrénalienne, endocrine bronchique ou thymique.

Recherche de mutations constitutionnelles du gène de la ménine.

**TUMEUR ENDOCRINE DIGESTIVE (2)****Traitement [1]****Traitement de l'hypersécrétion hormonale**

Il dépend du type de tumeur.

- Gastrinome (syndrome de Zollinger-Ellison) : **inhibiteur de la pompe à protons** à forte dose.
- Syndrome carcinoïde, VIPome, glucagonome : **analogue de la somatostatine** type octréotide ou lanréotide.
- Insulinome : sucre, **analogue de la somatostatine**, diazoxide.

**Traitement de la tumeur**

- *Absence de métastase hépatique*

Tumeur gastrique : si tumeur bénigne, surveillance ; si maligne : chirurgie.

Tumeur duodénale, pancréatique : traitement chirurgical en l'absence de NEM1 : résection de la tumeur. Si NEM1, chirurgie à discuter au cas par cas.

Tumeur du grêle, appendiculaire : chirurgie.

Tumeur rectale : résection endoscopique ou chirurgicale.

- *Présence de métastases hépatiques*

À discuter au cas par cas en milieu soécialisé en RCP ; décision prise en fonction du type de tumeur, de son degré de différenciation, de son indice de prolifération, de la résécabilité : chirurgie, chimioembolisation, chimiothérapie voire surveillance. Pour information, le produit de chimiothérapie utilisés en fonction des protocoles et des études sont : **5-FU, streptozotocine, oxaliplatine, dacarbazine, sunitinib, évérolimus.**

**Surveillance**

Clinique : état général, syndrome hormonal.

Imagerie : TDM ou IRM ; octréoscan si l'examen initial était positif.

Biologie : marqueurs initiaux.

**CONSENSUS**

[1] Thésaurus national de cancérologie digestive (FFCD, FNCLCC, GERCOR, SFC, SFRO, SNFGE) – Tumeurs endocrines digestives, SNFGE, 2011

## ANTIREFLUX (1) – ANTIÉMÉTIQUES

### ■ Dompéridone

<b>MOTILIUM</b>						
Reflux gastro-œsophagien et œsophagite, nausées, vomissements : 1 à 2 cp. (ou c-mes.) x 3/j	40 cp. 10 mg 80 c-mes. (2,5 mL = 2,5 mg) susp. buv. 200 mL	3,65 2,97	II II	30 % 30 %	0,09 0,04	
<b>PÉRIDYS</b>						
Idem <b>MOTILIUM</b>	40 cp. 10 mg 40 c-mes. à 5 mg (ou 160 c-mes. à 1,25 mg) (fl. 200 mL)	3,65 2,97	II II	30 % 30 %	0,09 0,07	
<b>OROPÉRIDYS</b>						
Idem <b>MOTILIUM</b>	30 cp. orodisp. 10 mg	3,19	II	30 %	0,11	
<b>BIPÉRIDYS</b>						
Mêmes indications que <b>MOTILIUM</b> 1 cp. x 3/j Dose maximale : 80 mg/j	20 cp. 20 mg 40 cp. 20 mg	3,67 5,84	II II	30 % 30 %	0,18 0,15	
<b>BIPÉRIDYSFLASH</b>						
Idem <b>MOTILIUM</b>	30 cp. orodisp. 20 mg	3,92	II	30 %	0,13	

### PROPRIÉTÉS

Antiémétique neuroleptique sans effet anticholinergique passant très faiblement la barrière hémato-encéphalique. Il augmente la vitesse de vidange de l'estomac et s'oppose au reflux duodéno-œsophagien. Il renforce le péristaltisme du tube digestif supérieur :

- augmentation du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage ;
- inhibition de la relaxation du fundus gastrique et stimulation de l'activité motrice ;
- élargissement du pylore au moment de son ouverture ;
- augmentation de la fréquence, de l'amplitude et de la durée des contractions duodénales.

La **dompéridone** normalise les contractions anarchiques de la maladie des spasmes étagés de l'œsophage. Elle ne modifie pas les fonctions sécrétoires.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser si la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : hémor-

ragie gastro-intestinale, obstruction mécanique, perforation digestive. Dyskinésies tardives iatrogènes (neuroleptiques).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : diminuer les doses de 30 à 50 % en cas d'utilisation prolongée.

**Grossesse** : aucune malformation rapportée.

**Allaitement** : passage dans le lait.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Syndrome extrapyramidal exceptionnel (1,4 cas par million) presque toujours en rapport avec un surdosage ou une perméabilité anormale de la barrière hémato-encéphalique (immaturité, lésion).

Rarement, à posologie élevée et prolongée : gynécomastie, troubles des règles.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association d'**anticholinergiques** est illogique car ils ont des effets opposés à la **dompéridone**.

Cf. aussi **métoclopramide**.

## REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (2)

### Traitement médicamenteux [1]

#### Reflux gastro-œsophagien typique, sans œsophagite

S'il n'existe pas de signes d'alarme (amaigrissement, dysphagie, hémorragie, anémie) et si l'âge du sujet est < 50 ans, on peut pratiquer un traitement d'épreuve sans fibroscopie.

► *Si les symptômes sont espacés (moins d'une fois par sem.), on propose la démarche suivante.*

- Traitement à la demande par alginates  
Ex. : **alginate de sodium + bicarbonate de sodium (GAVISCON)** : 1 càc 30 min après chaque repas et au coucher.

- Renforcement de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage

Il est souvent utilisé mais n'a jamais prouvé son efficacité.

Ex. : **dompéridone (MOTILIUM)** : 1 cp. 15 min avant chaque repas et au coucher.

Durée du traitement : 6 sem.

► *Si les symptômes sont rapprochés (une fois par sem. ou plus), on peut proposer un traitement antisécrétoire à faible dose.*

- **Inhibiteur de la pompe à protons** : **MOPRAL (oméprazole)**, 1 gél. à 10 mg/j ou **LANZOR (lanzoprazole)**, 1 gél. à 15 mg/j.

La durée du traitement est de 4 sem. Au terme de ces 4 sem., si les symptômes disparaissent, il faut arrêter le traitement ; s'ils persistent ou récidivent de façon précoce, on doit pratiquer une endoscopie.

#### Reflux gastro-œsophagien avec signes d'alarme et/ou âge du sujet > 50 ans et/ou résistance au traitement symptomatique

L'endoscopie est indispensable pour fixer l'attitude thérapeutique ultérieure, qui est fonction de l'existence d'une œsophagite peptique et/ou d'une complication.

S'il n'y a pas d'œsophagite ou si l'œsophagite n'est pas sévère (perte de substance non circonscrite), on propose un traitement antisécrétoire, de préférence par **IPP** à pleine dose (par exemple **MOPRAL (oméprazole)** 20 mg : 1 cp./j) pendant 4 sem. En fin de traitement, un contrôle endoscopique de cicatrisation n'est pas utile sauf en cas de persistance des symptômes.

S'il existe une œsophagite, cf. *Œsophagite par reflux*.

### Récidive

La récurrence est fréquente (> 75 %) à l'arrêt du traitement. On peut proposer un traitement d'entretien par un gel antireflux et/ou un stimulant de la motricité digestive. En cas d'échec, les **inhibiteurs de la pompe à protons** à faible dose peuvent être efficaces : **MOPRAL (oméprazole)**, 1 gél. à 10 mg/j, ou **LANZOR (lanzoprazole)**, 1 gél. à 15 mg/j.

### Complications

#### œsophagite peptique et ses complications

- Dysphagie.
- Hémorragies : anémie ferriprive, hémartémèse, méléna.
- Amaigrissement.
- Métaplasie (endobrachyœsophage), dysplasie, cancérisation.
- Ulcère, perforation, sténose.

#### Complications respiratoires

- Asthme.
- Toux quinteuse nocturne.
- Infections broncho-pulmonaires à répétition.

#### Complications ORL

- Pharyngite, paresthésies laryngées, dysphonie.
- Otalgies.

**ANTIREFLUX (2) – GELS ANTIREFLUX****■ Alginate de sodium + bicarbonate de sodium**

<b>GAVISCON</b>					
1 à 2 sach. x 3/j après les repas et éventuellement au coucher	24 sach. à 500 mg	3,16		15 %	0,13
2 à 3 càc. x 3/j après les repas et éventuellement au coucher	50 càc (250 mg/càc ; fl. 250 mL)	2,47		15 %	0,05
<b>TOPAAL</b>					
(acide alginique)	42 cp. à 200 mg	3,49		15 %	0,08
Idem <b>GAVISCON</b>	14 càs (susp. buv. ; fl. 210 mL)	3,37		15 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Formation d'un gel visqueux surnageant au-dessus du contenu gastrique. En cas de reflux, le gel régurgite en premier et forme une barrière évitant le contact entre la muqueuse œsophagienne et le liquide gastrique acide.

**INDICATIONS**

Pyrosis, reflux gastro-œsophagien, œsophagite par reflux.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnels et liés à la présence d'aluminium : constipation, déplétion phosphorée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Rares et liées à la présence d'aluminium : retard et/ou diminution de l'absorption des médicaments suivants : **furosémide, indométacine, tétracyclines, digoxine, isoniazide, anticholinergiques.**

## INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (1)

## ■ Oméprazole

<b>MOPRAL</b>					
œsophagite évolutive, ulcère gastroduodénal évolutif : 1 gél. (20 mg)/j Éradication d' <i>Helicobacter pylori</i> : 1 gél. (20 mg) x 2/j pendant 7 j, en association avec des antibiotiques Traitement symptomatique du RGO (si échec des autres traitements) : 10 mg/j Traitement d'entretien des œsophagites grade III et IV : 1 gél. (10 ou 20 mg)/j Traitement préventif et curatif des lésions induites par les AINS : 1 gél. (20 mg)/j Syndrome de Zollinger-Ellison : jusqu'à 80 mg/j Voie IV si voie orale impossible : 40 à 80 mg/j en IV lente (5 min) Hémorragie digestive : 8 mg/h pendant 72 h en IVSE	14 gél. 10 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 gél. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
	7 gél. 20 mg	4,50	II	65 %	0,64
	14 gél. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57
	5 lyoph. pour usage parentéral 40 mg	HOP	II		
<b>MOPRALPRO</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>ZOLTUM</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	28 gél. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
	14 gél. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57

## ■ Lansoprazole

<b>LANZOR</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	15 gél. 15 mg	7,90	II	65 %	0,53
Pleine dose : 30 mg	30 gél. 15 mg	16,67	II	65 %	0,56
Demi-dose : 15 mg	14 gél. 30 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57
<b>OGAST</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	15 gél. 15 mg	7,90	II	65 %	0,53
	30 gél. 15 mg	16,67	II	65 %	0,56
	14 gél. 30 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 gél. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57
<b>OGASTORO</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. orodisp. 15 mg	5,82	II	65 %	0,42
	28 cp. orodisp. 15 mg	11,03	II	65 %	0,39
	14 cp. orodisp. 30 mg		II	NR	
	28 cp. orodisp. 30 mg	15,93	II	65 %	0,57

## ULCÈRE DUODÉNAL (2)

### Traitement d'attaque

#### Règles hygiéno-diététiques

Seul l'**arrêt du tabac** a montré son utilité. On peut toutefois conseiller d'autres règles hygiéno-diététiques de base bien qu'elles n'aient jamais montré leur efficacité au cours de l'ulcère duodénal :

- repas au calme, à heures fixes, en mâchant bien ;
- arrêt de l'alcool, du café, des boissons gazeuses ;
- arrêt des **anticoagulants** (sauf indication vitale).

Éviter les médicaments gastro-toxiques (cf. Œsophagite par reflux) : **anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine**. Les **corticoïdes** ont longtemps été réputés gastro-toxiques ; en pratique, cette toxicité n'a jamais pu être démontrée ; ainsi, on ne doit plus considérer que les **corticoïdes** sont à l'origine d'ulcères gastroduodénaux ; il n'y a donc plus de contre-indication absolue à introduire des **corticoïdes** chez un patient ayant un antécédent d'ulcère.

#### Traitement médicamenteux

##### ► Éradication d'*Helicobacter pylori*

Du fait du développement de résistance, le traitement actuel repose sur une antibiothérapie séquentielle [1] :

#### Éradication d'*Helicobacter pylori* par traitement séquentiel

Traitement	J1 à J5	J6 à J10
<b>Inhibiteur de la pompe à protons</b>	Double dose	
<b>Amoxicilline</b>	1 g x 2/j	X
<b>Clarithromycine</b>	X	500 mg x 2/j
<b>Métronidazole</b>	X	500 mg x 2/j

Du fait du développement de résistances, la vérification de l'éradication par un **test respiratoire** devrait être **systématique [1]** ; les tests en vente sont : *Helikit* et *Helicobacter Test INFAI*. 15 j. d'arrêt d'un traitement antisécrétoire sont recommandés avant de pratiquer un test respiratoire.

#### Résistance d'*Helicobacter* à l'antibiothérapie (30 %)

- Le traitement de seconde intention peut reposer sur l'association **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole** (20 mg matin et soir) + **amoxicilline** (1 g matin et soir) + **métronidazole** (500 mg matin et soir).
- L'utilisation de **sels de bismuth** couplés à des antibiotiques est une nouvelle alternative : **PYLERA** (bismuth 140 mg/gél. + **métronidazole** 125 mg/gél. + **tétracycline** 125 mg/gél.), 3 gél. après chaque repas et au coucher soit 12 gél./j. On associe systématiquement de l'**oméprazole**, 20 mg matin et soir. La durée du traitement est de 10 j. En cas, d'oubli, il faut prendre la totalité du traitement.
- En cas d'échec, une mise en culture avec réalisation d'un antibiogramme ou une recherche par PCR de mutations entraînant des résistances est justifiée.
- Le traitement peut alors associer : un **inhibiteur de la pompe à protons**, de l'**amoxicilline** et une **fluoroquinolone, lévofloxacine (TAVANIC)** 500 mg x 2/j pendant 10 jours.
- La **lévofloxacine** peut être remplacée par la **rifabutine (ANSATIPINE, gél 150 mg)** : 300 mg le matin pendant 10 jours ; le risque est l'émergence de mycobactéries résistantes.



**INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (2)****■ Pantoprazole**

<b>INIPOMP</b>					
Idem <b>MOPRAL</b> Pleine dose : 40 mg Demi-dose : 20 mg	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	7 cp. 40 mg	4,50	II	65 %	0,64
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	1 fl. 40 mg (IV)	8,68	II	65 %	8,68
<b>EUPANTOL</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	7 cp. 40 mg	4,50	II	65 %	0,64
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	1 fl. 40 mg (IV)	8,68	II	NR	8,68
<b>PANTOZOL Control</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>PANTOLOC Control</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	
<b>IPRAALOX</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	7 cp. 20 mg			NR	
	14 cp. 20 mg			NR	

**■ Rabéprazole**

<b>PARIET</b>					
Idem <b>MOPRAL</b>	14 cp. 10 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 10 mg	14,27	II	65 %	0,51
	50 cp. 10 mg	HOP	II		
	14 cp. 20 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 20 mg	15,93	II	65 %	0,57
	50 cp. 20 mg	HOP	II		

## ULCÈRE DUODÉNAL (3)

### ► Traitement de l'ulcère lui-même

Après le traitement antibiotique pour éradiquer *Helicobacter pylori*, il n'est pas obligatoire de poursuivre un traitement antisécrétoire. Ce traitement reste recommandé chez les patients ayant un ulcère compliqué ou une affection sévère concomitante, chez ceux prenant un traitement par **anticoagulants**, **AINS** ou **aspirine** ou chez ceux qui conservent des douleurs à la fin de la trithérapie : **inhibiteurs de la pompe à protons**, **oméprazole (MOPRAL)** : 1 gél. (20 mg)/j (matin ou soir) pendant 3 sem.

### ► Dans les cas où *Helicobacter pylori* est absent

On traite l'ulcère par traitement antisécrétoire : **inhibiteurs de la pompe à protons**, **oméprazole (MOPRAL)** : 1 gél. (20 mg)/j (matin ou soir) pendant 4 sem.

### Indications d'un contrôle par gastroscopie en fin de traitement

- Tout ulcère gastrique.
  - Avant un traitement chirurgical.
  - En cas de nécessité de prescrire des médicaments gastrotoxiques (**aspirine**) ou des **anticoagulants**.
  - Si les symptômes persistent malgré un traitement bien conduit.
- Lorsque la gastroscopie est réalisée, on contrôle l'éradication d'*Helicobacter pylori* (biopsie).

### Indications d'un contrôle de l'éradication d'*Helicobacter pylori*

Du fait de l'augmentation de la prévalence de la résistance aux antibiotiques (30 % d'échec de l'éradication en 1<sup>re</sup> intention), le contrôle de l'éradication d'*Helicobacter pylori* doit être systématique. Elle se fait par la gastroscopie si celle-ci est réalisée. En l'absence de gastroscopie, on pratique un test respiratoire (HELI-KIT et *Helicobacter* Test INFAI).

## INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS (3)

## ■ Ésoméprazole

INEXIUM					
Idem <b>MOPRAL</b>	28 sach. 10 mg	19,41	II	65 %	0,69
Pleine dose : 40 mg	7 cp. 20 mg	4,10	II	65 %	0,59
Demi-dose : 20 mg	14 cp. 20 mg	7,41	II	65 %	0,53
	28 cp. 20 mg	25,46	II	65 %	0,91
	50 cp. 20 mg	HOP	II		
	14 cp. 40 mg	8,23	II	65 %	0,59
	28 cp. 40 mg	25,46	II	65 %	15,93
	50 cp. 40 mg	HOP	II		
	10 fl. 5 mL 40 mg	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur extrêmement puissant de la sécrétion acide gastrique par inhibition de la pompe à protons H<sup>+</sup>K<sup>+</sup>ATPase de la cellule pariétale gastrique. Efficacité supérieure aux autres antiulcéreux.

## INDICATIONS

œsophagite par reflux gastro-œsophagien (prouvée par endoscopie) : traitement d'attaque ; traitement d'entretien si stade III ou IV. Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien avec ou sans œsophagite, après échec du traitement de première intention (règles hygiéno-diététiques, alginates). Ulcère gastrique et duodénal évolutif. Éradication d'*Helicobacter pylori* en association avec des antibiotiques.

Traitement préventif et curatif des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Syndrome de Zollinger-Ellison.

## CONTRE-INDICATIONS

Allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : l'utilisation de l'oméprazole au cours de la grossesse est autorisée. Toutefois la prescription de ce produit ne doit être envisagée que si nécessaire.

Ulcère gastrique : vérifier l'absence de malignité par biopsie avant de traiter.

Insuffisance hépatique : ne pas dépasser 20 mg/j d'oméprazole, 30 mg/j de lansoprazole et 40 mg/j de pantoprazole.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares (plus fréquents avec l'oméprazole) et réversibles à l'arrêt du traitement.

Digestifs : diarrhée, constipation, nausées, vomissements.

Cutanés : éruption, prurit, urticaire.

Neuropsychiques : céphalées, vertiges, confusion, agitation, hallucinations (sujets âgés).

Hématologiques : leucopénie, neutropénie, thrombopénie ; exceptionnellement anémie hémolytique et pancytopenie.

Hépatiques : élévation des transaminases.

Oculaires : quelques rares cas de cécité ont été rapportés avec l'oméprazole IV mais l'imputabilité du produit reste douteuse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ces produits sont des inducteurs enzymatiques : ils peuvent en théorie diminuer l'efficacité de la théophylline et des contraceptifs oraux (mais en pratique courante, l'effet sur la contraception est négligeable).

Diminution de l'efficacité du clodogrel en cas d'association aux inhibiteurs de la pompe à protons, en particulier avec l'oméprazole. L'oméprazole est en vente libre.

## TOPIQUES ANTIULCÉREUX

## ■ Sucralfate

<b>KÉAL</b>				
Traitement curatif d'un ulcère :	30 cp. séc. 1 g	5,17	15 %	0,17
2 g x 2/j ou 1 g x 4/j	30 sach. 1 g	5,17	15 %	0,17
Traitement d'entretien :	15 sach. 2 g	6,40	15 %	0,43
1 g x 2/j ou 2 g au coucher				
<b>ULCAR</b>				
Idem <b>KÉAL</b>	30 cp. séc. 1 g		NR	
	30 sach. 1 g		NR	

## PROPRIÉTÉS

Le **sucralfate** est un **antiulcéreux** dépourvu d'activité antisécrétoire ou antiacide. Il s'agit d'un sel d'aluminium qui se fixe électivement sur les lésions des muqueuses œsophagienne, gastrique, duodénale et colique par une interaction entre les protéines de l'exsudat inflammatoire et le **sucralfate**. Cette interaction isole les lésions et favorise leur cicatrisation. De plus, le **sucralfate** inhibe les lésions induites par les **AINS** et l'**aspirine** sur la muqueuse gastro-duodénale.

## INDICATIONS

Traitement d'attaque et d'entretien de l'ulcère gastrique et duodénal.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : autorisée.

**Allaitement** : autorisé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale chronique : risque d'accumulation tissulaire d'aluminium pouvant conduire à l'encéphalopathie en cas de traitement prolongé.

Hypophosphatémie (hyperparathyroïdie primitive, rachitisme dystrophique vitamino-résistant) : risque de déplétion phosphorée en cas de traitement prolongé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Constipation liée à la présence d'aluminium. Très rarement : nausées, vomissements, sécheresse buccale, vertiges, rashes cutanés. Risque théorique de déplétion phosphorée par fixation d'aluminium sur les phosphates alimentaires en cas de traitement prolongé à forte dose.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Prendre le **sucralfate** à distance (2 h) des autres médicaments, notamment la **digoxine** et les **antivitamines K**.

## PROSTAGLANDINES ANTIULCÉREUSES

### ■ Misoprostol

<b>CYTOTEC</b>					
Prévention des lésions induites par les <b>AINS</b> : 1 cp. x 2/j ou 1/2 cp. x 4/j Ulcère gastrique ou duodénal : 1 cp. x 4/j	60 cp. séc. 200 µg	18,64	I	15 %	0,31

#### PROPRIÉTÉS

Antiulcéreux antisécrétoire (moins efficace que les **inhibiteurs de la pompe à protons**) et cytoprotecteur, analogue des prostaglandines naturelles. Protège la muqueuse gastrique contre les lésions induites par des facteurs agressifs (**aspirine**, **AINS**, alcool, tabac).

#### INDICATIONS

Traitement préventif et curatif des lésions gastroduodénales induites par les **AINS** chez les sujets à risque (âge > 65 ans, antécédent d'ulcère, intolérance) pour lesquels la poursuite des **AINS** est indispensable.  
Traitement d'attaque et d'entretien de l'ulcère gastrique et duodénal.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux prostaglandines.

**Grossesse** : contre-indiquée (contraception nécessaire).

**Allaitement** : absence d'études.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Vérifier la bénignité d'un ulcère gastrique avant de débiter le traitement.**

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée modérée et transitoire cédant à la poursuite du traitement. Moins de 1 % des malades doivent arrêter le traitement du fait de cette diarrhée.

Rarement : nausées, vertiges, céphalées, gêne abdominale.

ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>2</sub> (1)

## ■ Ranitidine

AZANTAC					
300 mg au coucher (posologie à augmenter en cas de gastrinome)	28 cp. efferv. 75 mg	6,62	II	15 %	0,24
Traitement d'entretien : 150 mg au coucher	30 cp. 150 mg	14,23	II	15 %	0,47
	30 cp. efferv. 150 mg	13,53	II	15 %	0,45
	14 cp. 300 mg	13,08	II	15 %	0,93
	14 cp. efferv. 300 mg	12,47	II	15 %	0,89
1 à 4 amp./j en IV lente ou en perf.	5 amp. 50 mg	5,25	II	15 %	1,05
RANIPLEX					
300 mg au coucher (posologie à augmenter en cas de gastrinome)	30 cp. efferv. 150 mg	11,58	II	15 %	0,39
Traitement d'entretien : 150 mg au coucher	14 cp. efferv. 300 mg	10,68	II	15 %	0,76

## ■ Nizatidine

NIZAXID					
300 mg au coucher (posologie à augmenter en cas de gastrinome)	30 gél. 150 mg	20,79	II	15 %	0,69
Traitement d'entretien : 150 mg au coucher					

## PROPRIÉTÉS

Antiulcéreux majeurs réduisant la sécrétion acide gastrique par blocage des récepteurs H<sub>2</sub> à l'histamine de la cellule pariétale. Absence d'effet anti-androgénique et d'inhibition du métabolisme hépatique des autres médicaments (contrairement à la **cimétidine**). Efficacité inférieure aux **inhibiteurs de la pompe à protons** et équivalente à la **cimétidine**.

## INDICATIONS

Ulcère duodénal, ulcère gastrique.  
Syndrome de Zollinger-Ellison.  
œsophagite par reflux.  
Éradication d'*Helicobacter pylori* (associé aux antibiotiques).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **ranitidine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : pas d'effet néfaste démontré.

**Allaitement** : déconseillé (passage dans le lait).  
Ulcère gastrique : vérifier l'absence de malignité avant de traiter.

**Ranitidine**, diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère :

- clairance créatinine > 50 mL/min : posologie normale ;
- clairance créatinine < 50 mL/min : 150 mg/24 h ;
- clairance créatinine < 20 mL/min : 150 mg/48 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : myalgies, céphalées, rashs cutanés, vertiges, diarrhées, constipation, asthénie, excitation, nausées, réactions anaphylactoides (parfois à la 1<sup>re</sup> administration), élévation transitoire et réversible des transaminases.  
Exceptionnels et réversibles : hépatite cytolytique, confusion (sujet âgé, insuffisance rénale sévère), bradycardie sinusale, tension mammaire. Leucopénie, thrombopénie, agranulocytose, pancytopenie avec ou sans hypoplasie médullaire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Prescrire les **antiacides** à distance (2 h) de la **ranitidine**.

ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>2</sub> (2)■ **Cimétidine**

<b>STOMEDINE</b>					
800 mg au coucher (posologie à augmenter en cas de gastrinome)	10 cp. efferv. 200 mg			NR	
<b>CIMÉTIDINE MYLAN</b>					
Idem <b>STOMEDINE</b>	60 cp. efferv. 200 mg	11,56	II	30 %	0,19
	30 cp. 400 mg	12,25	II	15 %	0,41
	15 cp. 800 mg	12,25	II	15 %	0,82

**PROPRIÉTÉS**

Antiulcéreux majeur réduisant la sécrétion acide gastrique par blocage des récepteurs H<sub>2</sub> à l'histamine de la cellule pariétale. Efficacité inférieure aux **inhibiteurs de la pompe à protons** mais équivalente à la **ranitidine**. Inhibition du métabolisme hépatique des autres médicaments (inhibition du cytochrome P450).

**INDICATIONS**

Ulcère duodénal, ulcère gastrique.  
Syndrome de Zollinger-Ellison.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **cimétidine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : pas d'effet néfaste démontré.

**Allaitement** : déconseillé (passage dans le lait).  
Ulcère gastrique : vérifier l'absence de malignité par biopsie avant de traiter.

Insuffisance rénale : diminuer la posologie :  
– clairance créatinine > 5 mL/min : posologie normale ;  
– clairance créatinine < 50 mL/min : 200 mg/6 h ;  
– clairance créatinine < 30 mL/min : 200 mg/8 h ;

– clairance créatinine < 15 mL/min : 200 mg/12 h.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhée, myalgies, étourdissements, éruption cutanée, fièvre, élévation transitoire et réversible des transaminases, augmentation légère de la créatininémie.

Rares et réversibles : gynécomastie, galactorrhée, confusion (sujet âgé, insuffisance rénale), bradycardie sinusale, tachycardie, bloc auriculo-ventriculaire, hépatite, néphrite interstitielle, pancréatite, leucopénies, agranulocytose (3 cas/million), thrombopénie, anémie aplasique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Mécanisme : inhibition du cytochrome P450 hépatique. Risques de surdosage des produits suivants : **phénytoïne**, **antivitamines K**, **benzodiazépines** (**chlordiazépoxide**, **diazépam**), **β-bloquants** (**labétalol**, **métoprolol**, **propranolol**), **lidocaïne** (parentérale), **théophylline** et dérivés, **ciclosporine**, **carmustine**, **lidocaïne** (parentérale).

Incompatibilité physico-chimique avec le **phénobarbital**.

**Antiacides** : prescrire à distance (2 h) de la **ranitidine**.

**La cimétidine est en vente libre.**

**TOPIQUES ANTIACIDES****■ Hydroxydes d'aluminium et de magnésium**

<b>MAALOX MAUX D'ESTOMAC</b>					
1 à 2 cp. après chaque repas	12 cp. à croquer 40 cp. à croquer			NR NR	
1 càs après chaque repas	16 càs (fl. 250 mL)			NR	
1 sach. après chaque repas	20 sach. 15 mL			NR	
<b>MAALOX MAUX D'ESTOMAC</b> sans sucre	40 cp. à croquer			NR	
1 à 2 cp. après chaque repas					
<b>GELOX</b>					
1 sach. après chaque repas	30 sach. 2,5 g	5,33		15 %	0,18
<b>ROCGEL</b>					
(sans magnésium)	24 sach.	4,39		15 %	0,18
1 sach. après chaque repas					
<b>POLYSILANE DELALANDE</b>					
Idem <b>MAALOX MAUX D'ESTOMAC</b>	32 cp.			NR	
<b>POLYSILANE UPSA</b>					
Idem <b>MAALOX MAUX D'ESTOMAC</b>	12 sach. 15 g			NR	
<b>PHOSPHALUGEL</b>					
(phosphate d'aluminium)	12 càs (fl. 250 mL)	2,48		15 %	0,21
1 à 2 càs après chaque repas					
1 à 2 sach. après chaque repas	26 sach. 12,38 g	4,05		15 %	0,16
<b>GASTROPULGITE</b>					
(+ attapulgite [silicate])	30 sach.	4,23		15 %	0,14
1 sach. x 3/j					
<b>RIOPAN</b>					
1 à 2 cp. après chaque repas	20 cp. à 800 mg			NR	
1 à 2 sach.-dose après chaque repas	10 sach.-dose à 800 mg/10 mL			NR	
<b>XOLAAM</b>					
1 à 2 cp. après chaque repas	40 cp. à 400 mg	2,62		15 %	0,07
	50 càc (fl. 250 mL)	2,04		15 %	0,04

**PROPRIÉTÉS**

Antiacide : diminution de l'acidité gastrique par le pouvoir tampon et neutralisant.

Efficacité brève et suivie d'un rebond d'acidité ; absence d'action antisécrétoire.

Traitement uniquement symptomatique ne permettant pas aux ulcères de cicatriser. Transparent aux rayons X.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs liées aux affections œsogastroduodénales.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** autorisés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Du fait de l'effet tampon propre des aliments, ne pas prendre les **antiacides** à proximité immédiate d'un repas.

Vérifier l'absence de lésion organique et de malignité avant de prescrire un traitement symptomatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Aluminium** : risque d'encéphalopathie à l'aluminium en cas d'insuffisance rénale (à posologie élevée et prolongée) ; possibilité de déplétion phosphorée par captation des phosphates alimentaires (hydroxyde d'aluminium) ; effet constipant (phosphate d'aluminium).

**Magnésium** : effet laxatif.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prendre les autres médicaments à distance (2 h) des **antiacides**.



**ANTIARRHÉIQUES (1) – ANTISÉCRÉTOIRES INTESTINAUX****■ Racécadotril**

<b>TIORFAN</b>					
1 gél. x 3/j avant chaque repas	20 gél. 100 mg	9,43	II	30 %	0,47
Nourrisson de 1 à 9 mois (< 9 kg) :	16 sach. 10 mg	9,43	I	30 %	0,59
1 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 1 sach. x 3/j					
Nourrisson de 9 à 30 mois (9-13 kg) :					
2 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 2 sach. x 3/j					
E. de 30 mois à 9 ans (13-27 kg) : 1 sach.	30 sach. 30 mg	9,43	I	30 %	0,31
x 4 le 1 <sup>er</sup> j, puis 1 sach. x 3/j					
E. ≥ 9 ans (≥ 27 kg) : 2 sach. x 4 le 1 <sup>er</sup> j,					
puis 2 sach. x 3/j					
<b>TIORFANOR</b>					
1 cp. x 3/j avant chaque repas	12 cp. 175 mg	6,76	II	30 %	0,56
<b>TIORFAST</b>					
Idem <b>TIORFAN</b>	10 gél. 100 mg			NR	
<b>DIARFIX</b>					
Idem <b>TIORFAN</b>	10 gél. 100 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de l'enképhalinase, enzyme responsable de la dégradation des enképhalines endogènes qui régulent les échanges hydro-électrolytiques transmembranaires et la motricité intestinale (mais dont les rôles précis sont mal connus).

**Antisécrétoire intestinal** pur : diminue l'hyper-sécrétion intestinale induite par l'inflammation et la toxine cholérique sans avoir d'effet sur la sécrétion basale.

Absence d'action sur le système nerveux central.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des diarrhées aiguës de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse, allaitement** : absence d'étude chez l'homme.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas poursuivre le traitement plus de 7 j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rarement : somnolence.

**DIARRHÉE AIGÜE (2)****Correction de la déshydratation****Voie orale**

La réhydratation se fait par voie orale tant qu'elle est possible. Elle consiste en des apports hydriques associés à du glucose et des électrolytes. On peut utiliser par exemple la **PRÉPARATION DE L'OMS** ou plus simplement du **COCA-COLA non light** : la posologie est à adapter à l'état d'hydratation de chaque patient.

**Voie intraveineuse**

Indications à une hospitalisation pour réhydratation par voie intraveineuse :

- déshydratation 10 % poids du corps ;
- vomissements importants ;
- collapsus ;
- troubles de conscience.

On utilise du **GLUCOSÉ** à 5 % + NaCl 3 g/L + KCl 1,5 g/L + **gluconate de calcium** 1 g/L + **gluconate de magnésium** 0,5 g/L : 120 à 150 mL/kg/24 h dont la moitié dans les 6 premières heures puis le rythme de perfusion doit être adapté à l'état de chaque patient.

**Limitation du retentissement fonctionnel****Réduction de la diarrhée**

On peut utiliser :

- un **antisécrétoire** intestinal, **racécadotril** (**TIORFAN**) : 1 gél. avant chaque repas, sans dépasser 7 j de traitement ;
- un **ralentisseur du transit intestinal**, **lopéramide** (**IMODIUM**) : 2 gél. en 1 prise puis 1 gél. après chaque selle liquide sans dépasser 8/j. Ce traitement ne doit pas dépasser 48 h (risque d'iléus ou de coléctasie) et est déconseillé dans les diarrhées invasives pour ne pas retarder l'élimination des agents infectieux ;
- un **pansement digestif** et un **antispa-smodique** peuvent éventuellement être ajoutés : **SMECTA** : 1 sach. x 3/j ; **SPASFON** : 1 à 2 cp. x 3/j.

**Traitement de l'infection**

Les antiseptiques intestinaux peuvent être proposés dans les formes modérées. L'antibiothérapie n'est indiquée que dans les formes invasives.

**CONSENSUS**

[1] Indications des examens de selles chez l'adulte, SNFGE, 2003

**ANTIARRHÉIQUES (2) – RALENTISSEURS DU TRANSIT**■ **Lopéramide**

<b>IMODIUM</b>					
Diarrhée aiguë : 2 gél. en 1 prise puis 1 gél. après chaque selle liquide sans dépasser 8/j	20 gél. 2 mg	3,37	II	30 %	0,16
Diarrhée aiguë : 1 dose-kg après chaque selle liquide sans dépasser 5/j	90 mL (fl. sol. buv.)	2,89	II	30 %	0,14
<b>IMODIUMCAPS</b>					
Idem <b>IMODIUM</b>	12 gél. 2 mg			NR	
<b>DIASTROLIB</b>					
Idem <b>IMODIUM</b>	20 lyoph. 2 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antidiarrhéique opiacé.

Le **sulfate d'atropine** présent dans la préparation a pour but d'éviter un abus.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des diarrhées en association avec une réhydratation.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

Liées au **sulfate d'atropine** : glaucome par fermeture de l'angle et obstacle uréthro-prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À éviter dans les syndromes dysentériques et en cas de diarrhée post-antibiothérapie : risque de stase bactérienne intestinale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements, ballonnement, céphalées, sécheresse buccale, somnolence.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialise les effets des dépresseurs du système nerveux central (alcool, **benzodiazépines**, etc.).

## DIARRHÉE AIGÜE (3) – BACTÉRIENNE

### Traitement symptomatique

Il est fondé sur les éléments suivants :

- correction de la déshydratation ;
- limitation du retentissement fonctionnel (réduction de la diarrhée ; **antispasmodique** ; **pansements digestifs**).

### Traitement étiologique

#### Antibiothérapie

L'antibiothérapie n'est indiquée que dans les diarrhées bactériennes invasives, c'est-à-dire avec syndrome dysentérique. Elle ne doit pas être systématique mais réservée aux cas suivants :

- terrain fragile ;
- tableau sévère ;
- bactériémie (présumée ou confirmée) ;
- entérocolite endoscopique sévère ;
- complications extra-intestinales.

**Le traitement antibiotique n'est indiqué que dans les diarrhées invasives :**

- il diminue l'intensité de la diarrhée ;
- il évite la diffusion extra-intestinale du germe ;
- il réduit la contagiosité.

L'antibiotique à utiliser dépend du germe retrouvé. En attendant les résultats bactériologiques, on peut utiliser une **fluoroquinolone** par voie orale (ou à défaut IV), par exemple **ciprofloxacine (CIFLOX)** : 1 cp. à 500 mg matin et soir (ou à défaut 200 mg x 2/j en perfusion IV) qui est efficace sur la plupart des germes. La durée du traitement varie de 3 à 7 j.

#### Antiseptiques intestinaux

Les **antiseptiques intestinaux** peuvent être proposés dans les formes modérées. Leur efficacité, inconstante et discutée, est surtout nette lorsque le traitement est débuté précocement. On peut proposer des **nitrofuranes**, **nifuroxazide (ERCÉFURYL 100 mg)** : 1 gél. x 4/j.

#### Micro-organismes et produits d'origine bactérienne

Leur efficacité dans cette indication n'a jamais été démontrée.

GERME	ANTIBIOTIQUE EN 1 <sup>RE</sup> INTENTION	ANTIBIOTIQUES ALTERNATIFS
<i>Salmonella non typhi</i> , <i>Shigella</i>	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 4-7 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 7-10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j
<i>Salmonella typhi</i>	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 10 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 10 j <b>Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération IV (ROCÉPHINE)</b> : 5-10 j
<i>Campylobacter jejuni</i>	<b>Macrolide (JOSACINE)</b> : 5-7 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 5-7 j
<i>Yersinia enterocolitica</i>	<b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j <b>Tétracycline (VIBRAMYCINE N)</b> : 7-10 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 7-10 j
<i>Clostridium difficile</i>	<b>Vancomycine (VANCOCINE)</b> : 10 j	<b>Métronidazole (FLAGYL)</b> : 10 j
<i>Escherichia coli</i> entéro-invasif	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 4-7 j	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 7-10 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 7-10 j
<i>Vibrio cholerae</i>	<b>Tétracycline (VIBRAMYCINE N)</b> : 2-3 j	<b>Fluoroquinolone (CIFLOX)</b> : 2-3 j <b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> : 2-3 j <b>Cotrimoxazole (BACTRIM)</b> : 2-3 j

# ANTIDIARRHÉIQUES (3) – RÉHYDRATATION ORALE

## Solutions de réhydratation orale

<b>COCA-COLA (non light)</b>				
Glucides : 110 g/L Sodium : 147 mg/L (6,4 mmol/L) Potassium : 508,3 mg/L (13 mmol/L) Calories : 440 kcal/L	Bout. 19 et 25 cL Bout. 1,5 L et 1 L Canettes 33 cL		NR NR NR	
<b>PRÉPARATION DE L'OMS</b>				
Glucides : 20 g/L Sodium : 2,07 mg/L (90 mmol/L) Potassium : 977,5 mg/L (25 mmol/L) Bicarbonates : 30 mmol/L Calories : 80 kcal/L	qsp eau 1 L		NR	

## PROPRIÉTÉS

Solutés de réhydratation.

L'avantage du *Coca-Cola* est sa disponibilité partout dans le monde et son conditionnement qui assure sa stérilité.

Le soluté de l'OMS, très riche en sel, peut parfois provoquer une hypernatrémie.

## INDICATIONS

Réhydratation des diarrhées.

Le *Coca-Cola* permet d'éviter de boire l'eau du

robinet dans les pays à risque de diarrhée du voyageur.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le *Coca-Cola* non light, très riche en sucre, expose à des risques de déséquilibre d'un diabète sucré, mais le *Coca-Cola* light ne permet pas d'assurer une réhydratation correcte en cas de diarrhée.

**ANTISEPTIQUES INTESTINAUX (1) – MACROCYCLIQUE**■ **Fidaxomicine**

<b>DIFCLIR</b>					
A : 200 mg x 2/j pendant 10 j	20 cp. 200 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactéricide à spectre étroit actif sur *Clostridium difficile*.

**INDICATIONS**

Traitement des infections à *Clostridium difficile* particulièrement si forme sévère ou récidivante.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.  
Nouveau-né, nourrisson.  
Allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prudence en cas d'insuffisance rénale sévère, d'insuffisance hépatique modérée à sévère ou de maladie inflammatoire de l'intestin.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : vomissements, nausées, constipation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibiteurs de la glycoprotéine P, entraînant un surdosage en **fidaxomicine** : ciclosporine, **kétoconazole**, **érythromycine**, **clarithromycine**, **vérapamil**, **dronédarone**, **amiodarone**.

**DIARRHÉE AIGÜE (8) – DIARRHÉE DES ANTIBIOTIQUES (3)****Forme sévère**

Lorsque existe un retentissement sur l'état général, un terrain fragile ou un doute sur une complication (perforation colique, colectasie), le pronostic vital peut être engagé.

**► Traitement général**

- Hospitalisation du patient en urgence en milieu spécialisé.

- Arrêt du (des) antibiotique(s) utilisé(s).

- Arrêt de l'alimentation orale.

- Les **ralentisseurs du transit** sont contre-indiqués (risque de colectasie).

- Mise en place d'une voie veineuse périphérique pour rééquilibration hydroélectrolytique : **GLUCOSÉ** à 5 % + NaCl 3 g/L + KCl 1,5 g/L + **gluconate de calcium** 1 g/L + **gluconate de magnésium** 0,5 g/L : 120 à 150 mL/kg/24 h dont la moitié dans les 6 premières heures puis le rythme de perfusion doit être adapté à l'état de chaque patient.

- Antalgique périphérique (**PERFALGAN**) IV : 1 à 2 g/8 h.

- **Antispasmodique** IV (**SPASFON**) : 1 à 2 amp./8 h.

- Traitement de *Clostridium difficile* par **antibiothérapie orale** : **vancomycine (VAN-COCINE)** *per os* en première intention, 500 mg x 4/j pendant 10-14 j. Si l'antibiothérapie orale est impossible, mieux vaut utiliser des lavements de **vancomycine** plu-

tôt qu'une antibiothérapie IV (germe intraluminal).

Remarque : la **VAN-COCINE** n'est disponible qu'en milieu hospitalier.

**► Traitement des complications**

En cas de colectasie, une exsufflation colique avec mise en place d'un drainage aspiratif permet parfois d'éviter la colectomie.

En cas d'échec ou de perforation, une colectomie s'impose.

**► Prévention des rechutes**

Les produits d'origine bactérienne tels que **Saccharomyces boulardii (ULTRA-LEVURE)** à forte dose : 1 sach. (500 mg) x 2/j pendant 1 mois minimum après la **première rechute** (mais pas après la première poussée) à débiter en même temps que la **vancomycine** permettent de limiter les rechutes ultérieures.

**Prévention**

- N'utiliser les antibiotiques que s'ils sont indispensables.

- Ne pas utiliser des antibiotiques responsables de diarrhée antérieurement chez un même patient.

- En cas de terrain à risque (antécédent de diarrhée sous antibiotiques, patients âgés ou hospitalisés), on peut proposer des produits d'origine microbienne tels que **Saccharomyces boulardii (ULTRA-LEVURE)** à forte dose : 1 sach. (500 mg) x 2/j.

**ANTISEPTIQUES INTESTINAUX (2) – NITROFURANES**■ **Nifuroxazide**

<b>ERCÉFURYL</b>					
100 à 200 mg x 4/j	12 gél. 200 mg			NR	
<b>BACTERIX</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>DIAFURYL</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>IMOSEPTYL</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	
<b>PANFUREX</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b> 1 c-mes. x 3/j	28 gél. 200 mg 18 c-mes. (1 fl. 90 mL)			NR NR	
<b>EDISTON</b>					
Idem <b>ERCÉFURYL</b>	12 gél. 200 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Anti-infectieux intestinal à action locale intraluminaire actif sur la plupart des germes habituellement rencontrés dans les infections intestinales.

Spectre d'action : *Escherichia coli*, *Staphylococcus saprophyticus*, streptocoques, entérocoques, *Bacteroides* ; à un moindre degré : *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*.

Résistance fréquente de *Proteus*, *Providencia*, *Pseudomonas*, colibacilles entéro-pathogènes.

**INDICATIONS**

Diarrhée aiguë infectieuse non invasive en complément de la réhydratation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **nitrofuranes**.  
Prématurité et nouveau-nés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : absence de tératogénicité chez l'animal.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

En cas de suspicion de diarrhée invasive, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.



**PURIFICATION DE L'EAU DE BOISSON**■ **Tosylchloramide sodium**

<b>HYDROCLONAZONE</b>				
1 cp. pour 1 L d'eau	180 cp. 12,2 mg 1 000 cp. 12,2 mg			NR NR

■ **Complexe de chlorure de sodium et d'argent**

<b>MICROPUR</b>				
1 cp. pour 1 L d'eau	100 cp. pour 1 L (MT1)			NR
1 cp. pour 5 L d'eau	50 cp. pour 5 L (MT5)			NR
1 cp. pour 20 L d'eau	20 cp. pour 20 L (MT20)			NR

**PROPRIÉTÉS**

Antisepsie pour la désinfection de l'eau de boisson.

**INDICATIONS**

Cf. Propriétés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Filtrer préalablement l'eau si besoin (filtre à café) ; mettre 1 cp. dans l'eau ; agiter et laisser agir 1 à 2 h avant de consommer.

## ALIMENTS SANS GLUTEN (2) – SPÉCIALITÉS SANS GLUTEN VENDUES EN PHARMACIE

### AGLUTELLA

Pâtes (spaghetti et tagliatelle)	Boîte de 500 g
Pâtes (fusilli, rigatoni)	Boîte de 250 g
Gaufrettes à la vanille	Boîte de 150 g
Semoule	Paquet de 150 g

### APROTEN

Biscottes	Boîte de 240 g
Biscuits	Boîte de 180 g
Pâtes (annellini, rigatini, tagliatelle, penne, fusilli, spaghetti)	Boîte de 500 g
Farine pour gâteaux	Boîte de 300 g
Farine pour pâte à pain	Boîte de 250 g

### DREI PAULY

Pâtes (spaghetti)	Sachet de 500 g
Pâtes (spiraies)	Sachet de 250 g
Farine pour gâteaux et pour pâte à pain	Boîte de 400 g
Cookies aux noisettes	Boîte de 100 g
Biscuits au muesli	Boîte de 150 g
Pain précuit	500 g

### RIESAL

Biscottes	Sachet de 200 g
Toasts	Sachet de 200 g
Coquillettes	Sachet de 250 g
Nouilles	Sachet de 200 g
Biscuits (vanille, chocolat ou citron)	Sachet de 200 g
Biscuits à la cuiller	Sachet de 150 g
Pain	Boîte de 350 g
Farine	Sachet de 500 g
Semoule	Sachet de 500 g

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (1)

## ■ Mésalazine (ou acide 5-aminosalicylique ou 5-ASA)

<b>PENTASA</b>				
RCH (attaque) : 2 à 4 g/j en 3-4 prises	100 cp. séc. 500 mg	43,23	65 %	0,43
Crohn (attaque) : 4 g/j en 4 prises	60 cp. 1 g	50,77	65 %	0,85
RCH (entretien) : 0,75 à 1,5 g/j en 3 prises	120 sach. dose 1 g	97,73	65 %	0,81
	60 sach. dose 2 g	97,73	65 %	1,63
Crohn (entretien) : 2 g/j en 4 prises	15 sup. 1 g	32,25	65 %	2,15
1 sup. le soir au coucher	5 susp. rectale 1 g	22,54	65 %	4,51
1 lavement au coucher				

**ROWASA**

Idem <b>PENTASA</b>	90 cp. 250 mg	19,72	65 %	0,22
	90 cp. 500 mg	39,33	65 %	0,44
1 sup. x 2 à 3/j	15 sup. 500 mg	10,72	65 %	0,71
	30 sup. 500 mg	20,90	65 %	0,70

**FIVASA**

RCH (attaque) : 4 à 8 cp. à 400 mg/j ou 2 à 4 cp. à 800 mg/j ou 2 à 3 sup./j	100 cp. 400 mg	39,22	65 %	0,39
	30 sup. 500 mg	22,04	65 %	0,73
RCH (entretien) : 2 à 4 cp. à 400 mg/j ou 1 à 2 cp. à 800 mg/j ou 1 sup. le soir au coucher	90 cp. 800 mg	67,15	65 %	0,75
Crohn (entretien) : 6 cp. à 400 mg/j ou 3 cp. à 800 mg/j				

## ■ Olsalazine

**DIPENTUM**

Idem <b>FIVASA</b>	100 gél. 250 mg	40,33	65 %	0,40
	60 cp. 500 mg	47,54	65 %	0,79

**MALADIE DE CROHN (2)****Poussée plus intense ou résistant au traitement précédent****Traitement symptomatique et diététique**

Il est le même que pour les formes minimales et modérées.

**Traitement anti-inflammatoire**

Une corticothérapie orale est indiquée. On utilise de la **prednisone (CORTANCYL)** à la dose d'attaque de 1 mg/kg/j en une prise le matin.

Ce traitement est poursuivi jusqu'à l'obtention d'une rémission clinique (3 à 7 sem.). Il est ensuite progressivement diminué : 10 mg/sem. jusqu'à mi-dose puis 5 mg/sem. pour une durée totale de traitement d'environ 12 sem. On adjoint habituellement à la corticothérapie un traitement préventif de l'ostéoporose (qui

n'a jamais démontré son efficacité) ; par exemple **biphosphonate, ACTONEL 5** : 1 cp./j ou **ACTONEL 35** : 1 cp./sem. à associer à une supplémentation en **calcium et vitamine D** type **CACIT VITAMINE D3** 1 000 mg/880 UI 1 sach./j.

Si la corticothérapie n'est pas efficace (corticorésistance) ou bien son arrêt impossible (corticodépendance) en cas de rechute, on propose un traitement par **anticorps anti-TNF alpha (REMICADE)** 5 mg/kg en perf. de 2 h à renouveler après 2 et 6 sem., avec ou sans **immunosupresseur** type **azathioprine (IMUREL)**.

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC, doit être systématique car le risque est important.

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

La **mésalazine (5-ASA)**, fraction active de la **sulfasalazine** (responsable de l'activité thérapeutique) a des actions immunosuppressives et anti-inflammatoires.

La libération digestive de la molécule active (pour les formes orales) est fonction de la spécialité :

**PENTASA** : le **5-ASA**, encapsulé dans des microgranules enfermés dans un cp., diffuse à travers la membrane de ces granules sur toute la longueur de l'intestin, du duodénum au rectum ; 65 % de la dose est retrouvée dans le côlon.

**ROWASA** et **FIVASA** : cp. gastrorésistants libérant le **5-ASA** dans l'iléon terminal et le côlon ascendant.

**DIPENTUM** : deux molécules de **5-ASA** sont reliées entre elles par un pont azoïque (comme dans la **SALAZOPYRINE**). Sous l'action des bactéries coliques, le pont azoïque est rompu et le **5-ASA** libéré : 95 % du produit arrive au niveau colique.

## INDICATIONS

– Voie orale

Rectocolite hémorragique : traitement d'attaque des poussées légères ou modérées ; traitement d'entretien.

Maladie de Crohn : traitement des poussées légères ou modérées ; prévention des poussées aiguës, pour les formes fréquemment récidivantes.

– Voie rectale

Localisations rectales ou rectosigmoïdiennes des poussées légères ou modérées de rectocolite hémorragique.

## CONTRE-INDICATIONS

## Allaitement.

Hypersensibilité à l'**aspirine** et aux salicylés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène

de la **mésalazine** et un effet malformatif chez l'homme n'est pas attendu ; il n'existe pas actuellement de données suffisantes pour évaluer un effet malformatif ou fœtotoxique de la **mésalazine** lorsqu'elle est administrée pendant la grossesse. Le traitement par **mésalazine** sera poursuivi aux doses efficaces les plus faibles possibles, en évitant de dépasser 2 g/j.

Le métabolisme hépatique et l'élimination rénale imposent la prudence en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Une intolérance à la **sulfasalazine** ne contre-indique pas l'emploi du **5-ASA** (en l'absence d'hypersensibilité aux salicylés) car elle traduit vraisemblablement une intolérance à la **sulfapyridine**, partie inactive de la molécule.

Des néphropathies (néphrite tubulo-interstitielles ou syndromes néphrotiques) ont été rapportées (exceptionnellement avec la forme rectale). L'hypovolémie serait favorisante et la réversibilité dépend de la durée du traitement. Un calcul de la clairance de la créatinine et une recherche de protéinurie doivent être pratiqués tous les 6 mois.

## EFFETS INDÉSIRABLES

– Néphropathies (cf. Précautions d'emploi).

– Pneumopathies interstitielles (toux fébrile) régressent à l'arrêt du traitement.

Exceptionnellement : fibrose pulmonaire.

Voie orale : **olsalazine (DIPENTUM)** : diarrhée (25 %), prévenue par une augmentation progressive des doses, pouvant conduire à diminuer la posologie voire à arrêter le traitement. Rarement et en début de traitement : céphalées, nausées, vomissements, vertiges ; exceptionnellement : pancréatite aiguë, péricardite, myocardite, leucopénie, alopecie.

Voie rectale : intolérance, douleurs abdominales.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Absence de données.

## MALADIE DE CROHN (3)

### Poussée sévère

Le traitement doit être fait en milieu spécialisé.

### Traitement symptomatique

Des **antalgiques** périphériques, des **antispasmodiques** et des **ralentisseurs du transit intestinal** peuvent être prescrits (cf. *supra*).

Le patient doit rester à jeun jusqu'à l'amélioration des symptômes. La nutrition artificielle pendant plusieurs semaines, par voie parentérale ou entérale, est aussi efficace que la corticothérapie pour obtenir une rémission. Elle nécessite toutefois des hospitalisations de longue durée et est réservée à des cas particuliers (enfants, complications, etc.).

La prévention des thromboses veineuses par **héparine de bas poids moléculaire** type **FRAGMINE** : 2 500 UI en SC, doit être systématique car le risque est important.

### Traitement anti-inflammatoire

Le traitement repose soit :

– sur une corticothérapie parentérale intraveineuse : **méthylprednisolone (SOLU-MÉDROL)** à la dose de 1 mg/kg/j d'équivalent prednisone (soit 0,8 mg/kg/j) en une injection le matin. Le relais par voie orale se fait après 5 j de traitement IV.

– soit les **anticorps anti-TNF- $\alpha$** , **infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg en une injection IV à renouveler ; on peut associer de l'**azathioprine (IMUREL)** pour éviter la formation d'anticorps anti-TNF- $\alpha$ .

### Formes corticodépendantes

C'est une rechute de la colite à la décroissance de la corticothérapie.

Le maintien d'une corticothérapie à long terme est impossible en raison des effets secondaires.

On introduit un **immunosuppresseur** : **azathioprine (IMUREL)** à la dose de 2 à 2,5 mg/kg/j en 1 ou 2 prises. L'effet bénéfique apparaît après au minimum 3 mois de traitement et un arrêt progressif de la corticothérapie devient possible. On ne peut conclure à un échec de l'**azathioprine** qu'après 1 an de traitement bien conduit.

#### Prévention de la toxicité hématologique de l'IMUREL

Le risque de l'**azathioprine (IMUREL)** est la toxicité hématologique. Elle est liée à des polymorphismes de la TMPT (thiopurine méthyl-transférase) qui est une enzyme clé du métabolisme des purines. Dans la population, il existe 11 % d'hétérozygotes et 0,3 % d'homozygotes mutants pour la TMPT. La posologie doit être réduite de 50 % chez les hétérozygotes et le traitement ne doit pas être administré chez les homozygotes. Un phénotypage de la TMPT peut être recommandé avant l'introduction de l'**IMUREL**.

On peut également proposer de doser les métabolites de l'**azathioprine** : les 6TGN. Un niveau sérique correct témoigne de la bonne posologie de l'**azathioprine**.

La présence d'anticorps anti-TNF- $\alpha$  peut expliquer une inefficacité du traitement ; ils peuvent être prévenus par l'ajout d'**IMUREL**.

En cas d'inefficacité du **REMICADE**, on peut tester un autre **anti-TNF- $\alpha$** , l'**adalimumab (HUMIRA)** toutes les 2 sem. par voie SC : 80 mg à S0 puis 40 mg toutes les 2 sem., voire 160 mg à S0, 80 mg à S2 puis 40 mg toutes les 2 sem.

Une intervention chirurgicale peut être envisagée en cas de lésions limitées mais le risque est la récurrence à très court terme.

## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (3)

## ■ Budésônide

ENTOCORT					
Maladie de Crohn, hépatite auto-immune Traitement d'attaque : 9 mg en 1 prise le matin avant le petit-déjeuner pdt 8 sem., puis arrêt progressif du traitement Traitement d'entretien : en attente de l'efficacité du traitement immunosuppresseur : substitution de la <b>prednisolone</b> à une dose < 30 mg/j	45 gél. 3 mg	55,70	I	65 %	1,24
	90 gél. 3 mg	107,09	I	65 %	1,19
MIKICORT					
Maladie de Crohn Traitement d'attaque : 1 gél. x 3/j Colite collagène : traitement de la diarrhée	50 gél. 3 mg	55,70	I	65 %	1,11

## PROPRIÉTÉS

Glucocorticoïde dont les particularités sont :

- une résorption digestive au niveau de l'iléon et du côlon ascendant ;
- des métabolites hépatiques avec peu d'effet glucocorticoïde. Ainsi, le **budésônide** entraîne peu d'effet sur la cortisolémie (donc faible freinage surrénalien). Globalement, par rapport à la **prednisone**, les Effets indésirables sont franchement diminués ;
- une efficacité sur l'inflammation colique à peine inférieure à celle de la prednisone.

## INDICATIONS

Traitement d'attaque de la maladie de Crohn d'intensité légère à modérée affectant l'iléon et/ou le côlon ascendant.

Hépatite auto-immune.

## CONTRE-INDICATIONS

Bien qu'il n'existe aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie vitale, le **budésônide** est contre-indiqué dans les situations suivantes :

- tout état infectieux, certaines viroses évolutives (herpès, varicelle, zona) ;
- vaccins vivants ;
- états psychotiques non contrôlés par un traitement ;

– hypersensibilité aux différents constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : pas d'effet tératogène des **corticoïdes** connu chez l'homme. Surveillance néonatale du nouveau-né rapprochée (poids, diurèse, glycémie).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares (< 5 %) : aggravation d'une diarrhée ou de rectorragies.

Non différents du placebo : nausées, dyspepsie.

Peuvent aussi être observés : crampes, tremblements, palpitations, nervosité, vision floue, réactions cutanées (éruption, prurit), troubles menstruels.

Les effets secondaires inhérents à toute corticothérapie peuvent être observés mais sont beaucoup plus rares (5 à 15 %).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter l'association avec des médicaments donnant des torsades de pointe : **suinidiniques, disopyramide, sotalol, amiodarone, bépridil, antidépresseurs tricycliques, sultopride, cispripide, érythromycine IV, sparfloxacine, halofantrine**, et en général tous les médicaments pouvant provoquer une hypokaliémie.

**MALADIE DE CROHN (4)****Formes corticorésistantes**

C'est une réponse clinique incomplète après 7 sem. de traitement par prednisone à la dose de 1 mg/kg/j.

Le traitement par **anticorps anti-TNF alpha, infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg en une injection éventuellement associée à l'**azathioprine (IMUREL)** par voie orale à la dose de 2 mg/kg/j est devenu la référence.

**Traitement d'entretien**

Il doit être envisagé dès la première poussée.

On utilise la **mésalazine (PENTASA)** : 2 à 4 g/j répartis sur le nyctémère bien que les études ne confirment pas son efficacité.

En cas de corticothérapie préalable, le **PENTASA** est introduit lorsque la dose de **prednisone** atteint 10 mg.

En cas d'échec, la mise sous immunosuppresseur, **azathioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j, est indiquée, pour une durée minimale de 4 ans.

Dans les formes distales rechutant malgré le traitement oral, on peut proposer un traitement topique anti-inflammatoire d'entretien ; par exemple : **PENTASA** (suspension rectale) : 1 lavement tous les 1 à 3 j.

Un traitement d'entretien par **anticorps anti-TNF alpha, infliximab (REMICADE)** doit être proposé : 5 à 10 mg/kg IV toutes les 8 sem. ou **adalimumab (HUMIRA)** : 20 mg toutes les 2 sem. en SC. L'adjonction d'**aza-**

**thioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j doit être discutée.

**Formes particulières****Formes ano-périnéales**

Ulcérations et fissures répondent au traitement général et ne nécessitent pas de chirurgie.

Abcès et fistules imposent un traitement chirurgical (drainage, mise à plat) en respectant à tout prix le sphincter anal.

En général, les lésions anopérinéales répondent au **métronidazole (FLAGYL)** : 1 cp. à 500 mg x 3/j ou à la **ciprofloxacine (CIFLOX)** : 1 cp. à 500 mg x 2/j.

Dans les formes difficiles à cicatriser, en l'absence d'abcès, l'**infliximab (REMICADE)** 5 mg/kg répété 3 fois à 8 sem. d'intervalle est utilisé.

**Forme localisée iléo-cæcale**

Une forme localisée iléo-cæcale avec des manifestations obstructives mais sans signe d'activité peut être traitée soit de façon chirurgicale soit, si la longueur de la sténose est inférieure à 10 cm, par stricturoplastie.

**Formes avec manifestations extradigestives**

Les manifestations extradigestives répondent en général à la corticothérapie.

Si les atteintes articulaires sont prédominantes, la **sulfasalazine (SALAZOPYRINE)** doit être utilisée car la **sulfapyridine** est active sur les atteintes articulaires : 1 g x 2 à 3/j. On peut également proposer les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** malgré leur toxicité intestinale.



## ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES (4)

## ■ Sulfasalazine

SALAZOPYRINE					
Traitement d'attaque : 4 à 6 g/j en 3 à 6 prises	100 cp. 500 mg	14,07	I	65 %	0,14
Traitement d'entretien : 1 g x 2/j					

## PROPRIÉTÉS

Molécule unissant par un pont azoïque une molécule d'acide 5-aminosalicylique (partie active) et une molécule d'un **sulfamide (sulfapyridine)** qui sert de transporteur.

Après ingestion, la **sulfasalazine** est scindée par les bactéries de la flore colique en acide 5-aminosalicylique (absorbé à 30 %) et en **sulfapyridine** (absorbée presque totalement et métabolisée au niveau du foie).

L'acide 5-aminosalicylique a des actions immunosuppressives et anti-inflammatoires.

## INDICATIONS

Rectocolite hémorragique (traitement d'attaque et d'entretien).

Maladie de Crohn colique (traitement d'attaque et d'entretien).

Polyarthrite rhumatoïde.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux **sulfamides** ou aux salicylés.

Déficit en G6PD.

Prématurés et nouveau-nés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : réduire les doses mais ne pas arrêter le traitement du fait du risque de poussée de la maladie.

Assurer une hydratation abondante.

Surveiller régulièrement la NFS et les urines (diurèse).

Réduire les doses en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, anorexie (cédant avec la diminution des doses).

Troubles hématologiques : anémies hémolytiques immunoallergiques, neutropénies, thrombopénie, aplasie médullaire ; ces manifestations imposent l'arrêt du traitement.

Réactions d'hypersensibilité : éruption cutanée (rash, urticaire), syndrome de Lyell, fièvre, anaphylaxie, éosinophilie ; ces manifestations imposent l'arrêt du traitement.

Coloration possible des urines en brun pendant le traitement.

Rares : oligospermie chez l'homme, lentement réversible.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K** et des **sulfamides hypoglycémiants**.

Absorption du produit augmentée en cas d'utilisation de **ralentisseur du transit**.

Diminution de l'absorption d'**acide folique**.

Diminution de la digoxinémie.

## ANTICORPS ANTI-TNF ALPHA

■ **Infliximab**

<b>REMICADE</b>					
Maladie de Crohn sévère : 5 mg/kg en 2 h suivis de la même perf. après 2 et 6 sem. Maladie de Crohn fistulisée : 5 mg/kg en 2 h suivis de la même perf. après 2 et 6 sem. Retraitement : possible dans les 14 sem. suivant la dernière perf. Polyarthrite rhumatoïde : 3 mg/kg en 2 h suivis par des perf. supplémentaires	1 fl. 100 mg	HOP	I		

L'**adalimumab (HUMIRA)** est décrit en Rhumatologie - Orthopédie.

**PROPRIÉTÉS**

Anticorps monoclonal chimérique humain/souris inhibant l'activité fonctionnelle du TNF (Tumor Necrosis Factor) alpha humain.

**INDICATIONS**

Maladie de Crohn active, sévère ou fistulisée chez des patients n'ayant pas répondu à un traitement corticoïde ou immunosuppresseur bien conduit.

Maladie de Crohn fistulisée ne répondant pas aux autres traitements.

Polyarthrite rhumatoïde lorsque la réponse au traitement de fond est inappropriée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : nécessité d'une contraception efficace.

**Allaitement.**

Sepsis, infection évolutive.

Hypersensibilité à l'**infliximab**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réaction aiguë à la perfusion : elle survient au cours de la première ou seconde perfusion ou dans les 2 h qui les suivent. Dans ce cas, ralentir voire interrompre la perfusion jusqu'à régression des symptômes et reprendre à une vitesse plus faible. Une prémédication par **paracétamol** ou **antihistaminique H<sub>1</sub>** peut être pratiquée. Risque de réaction allergique sévère en cas d'apparition d'anticorps anti-infliximab. Hypersensibilité retardée : elle s'observe en cas de retraitement après une période sans traitement de 2 à 4 ans.

Prédisposition aux infections opportunistes par

diminution de l'immunité à médiation cellulaire (tuberculose principalement) : traiter toute infection avant l'administration d'**infliximab** et durant les 4 mois qui suivent son arrêt.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

cf. Précautions d'emploi.

Réaction aiguë à la perfusion : fièvre, frissons, urticaire, douleurs thoraciques, hypo- ou hypertension.

Hypersensibilité retardée : myalgies, arthralgies, fièvre, rash, prurit, œdème facial pouvant être associé à une dysphagie, céphalées.

Infections opportunistes : tuberculose, pneumocystose, histoplasmosis ; coccidioïdomycose, aspergillose, candidose.

Apparition d'anticorps antichimériques humains (AACH) : risque augmenté d'effets secondaires.

Troubles lymphoprolifératifs : des lymphomes et des myélomes ont été rapportés sous **infliximab** sans que la responsabilité de ce produit soit certaine.

Anticorps anti-ADN natif (double brin), rarement lupus.

De nombreux autres effets ont été rapportés avec une fréquence rare de l'ordre de 1 pour 1 000 ; sans être exhaustif :

- anémie, leucopénie, thrombopénie ;
- aggravation de maladies démyélinisantes ;
- bradycardie, palpitations ;
- myalgies, arthralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'**infliximab** ne doit pas être mélangé à d'autres médicaments.

## LAXATIFS (1) – LAXATIFS OSMOTIQUES (1)

## ■ Lactulose

<b>DUPHALAC</b>					
Constipation : 1 à 3 sach./j ou 15 mL x 1 à 3/j	20 sach. 10 g 400 sach. 10 g	3,58 HOP		30 %	0,18
Encéphalopathie hépatique : 6 à 10 sach./j ou 30 mL x 1 à 3/j	200 mL (fl. + godet)	2,55		30 %	0,20
<b>LAXARON</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	12 sach. 10 g/15 mL			NR	

## ■ Lactitol

<b>IMPORTAL</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 10 g	4,05		30 %	0,20

## ■ Sorbitol

<b>SORBITOL DELALANDE</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 5 g			NR	

## ■ Pentaérythritol

<b>AUXITRANS</b>					
Constipation : idem <b>DUPHALAC</b>	20 sach. 5 g	4,00		15 %	0,20

## ■ Macrogol

<b>FORLAX</b>					
A. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach. 10 g	3,81		30 %	0,19
E. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach. 4 g	3,42		30 %	0,17
<b>MOVICOL</b>					
A. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach.	4,83		30 %	0,24
<b>MOVICOL ENFANTS</b>					
E. : 1 à 2 sach./j en 1 prise le matin	20 sach.	6,64		30 %	0,33
<b>TRANSIPEG</b>					
A. : 1 à 2 sach. à 5,9 g/j ou 2 à 4 sach. à 2,95 g/j en 1 prise le matin	30 sach. 2,95 g 200 sach. 2,95 g 20 sach. 5,9 g 200 sach. 5,9 g	5,65 HOP 4,44 5,72		30 % 30 %	0,19 0,22
<b>MOXALOLE</b>					
Idem <b>MOVICOL</b>	10 sach. 13,125 g			NR	

## ■ Magnésium (hydroxyde)

<b>CHLORUMAGÈNE</b>					
A. : 1 càc/j le matin à jeun ou le soir au coucher	100 g (pdre sups. buv.)			NR	

## CONSTIPATION (2)

### Constipation terminale

#### Dyschésie rectale

► *Rééduquer le réflexe exonérateur*

- Horaire précis et régulier pour aller à la selle, de préférence au réveil, même en l'absence de besoin.

- Favoriser les facteurs péristaltogènes : ingestion au réveil d'un verre d'eau glacée ou d'un jus de fruit frais pour stimuler le réflexe gastrocolique.

► *Reconstituer l'appareil musculaire d'exonération*

- Exercices pour muscler la sangle abdominale.
- Traitement d'une hernie, d'une éventration.

► *Traitement local de la dyschésie*

On utilise des laxatifs par voie rectale : **ÉDUCTYL** : 1 sup./j ou **MICROLAX** : 1 lavement/j.

#### Fécalome

C'est l'accumulation d'un important volume de matières déshydratées dans le rectum, qui apparaît souvent chez le vieillard alité ou après un lavement baryté.

Il peut se traduire sous forme d'une fausse diarrhée.

► *Ramollissement des matières*

En fonction de l'importance du fécalome, on peut proposer des laxatifs par voie rectale (**MICROLAX** : 4 à 5 lavements/j) ou bien un lavement plus important (**NORMACOL** : 4 à 5 lavements/j).

Si ces traitements sont insuffisants, on utilise la préparation suivante : 10 amp. d'**huile de paraffine** dans 500 mL d'eau tiède.

► *Extraction du fécalome*

Lorsqu'elle est nécessaire, elle est réalisée par fragmentation mécanique au doigt ou instrumentale (sous anuscopie ou rectoscope).

**LAXATIFS (2) – LAXATIFS OSMOTIQUES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Laxatifs osmotiques augmentant l'hydratation du bol fécal. Le **lactulose** et le **lactitol** sont hypoammoniémisants : ils abaissent le pH colique en étant hydrolysés et facilitent ainsi la diffusion de l'ammoniac sanguin dans la lumière intestinale.

Les **macrogols** sont des polymères linéaires sur lesquels sont retenues les molécules d'eau. Ils entraînent une augmentation du volume des liquides intestinaux.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique de la constipation. Encéphalopathie hépatique pour le **lactulose** et le **lactitol**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Colites inflammatoires : rectocolite hémorragique, maladie de Crohn ; syndrome occlusif

(ou subocclusif) ; douleurs abdominales d'origine indéterminée.

Régime sans galactose pour les **laxatifs anti-hyperammoniémiques (lactulose et lactitol)**. Intolérance au fructose pour le **sorbitol**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Posologie à atteindre progressivement pour éviter un météorisme abdominal. L'efficacité est meilleure si le laxatif est pris en une seule prise (le matin ou le soir) car l'appel d'eau par effet osmotique est plus important. L'utilisation prolongée d'un laxatif est déconseillée et ne remplace pas les règles hygiéno-diététiques.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Météorisme abdominal, diarrhée (signe de surdosage).

## LAXATIFS (3) – LAXATIFS LUBRIFIANTS

## ■ Huile de paraffine (ou huile de vaseline)

<b>LANSOYL</b>					
<b>LANSOYL</b> FRAMBOISE gel oral 1 à 3 càs/j	15 càs 15 g (pot 225 g)			NR	
<b>LANSOYL</b> FRAMBOISE gel oral 1 à 3 doses/j	9 unidoses 15 g			NR	
<b>LANSOYL</b> ORANGE gel oral 1 à 3 càs/j	9 càs 15 g (pot 225 g)			NR	
<b>LANSOYL</b> sans sucre gel oral 1 à 3 càs/j	15 càs 15 g (pot 215 g)			NR	
<b>LANSOYL</b> sans sucre gel oral 1 à 3 doses/j	220 unidoses 15 g			NR	
<b>LUBENTYL</b>					
2 càc/j	50 càc (pot 250 g)	2,87		15 %	0,06
<b>TRANSITOL</b>					
2 à 6 càc/j	1 pot 200 g			NR	
<b>HUILE DE PARAFFINE GILBERT</b>					
1 à 3 càs/j	16 fl. 250 mL 33 fl. 500 mL			NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

L'**huile de paraffine ou de vaseline** est un laxatif à action mécanique qui agit en lubrifiant le contenu du tube digestif et en ramollissant les selles.

Elle n'est pas absorbée et son apport calorique est donc nul.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique de la constipation.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de réduction de l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K) en cas d'utilisation prolongée.

Risque de pneumopathie d'inhalation en cas de fausse route ou de régurgitations (sujets âgés alités) : paraffinome.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Suintement anal assez fréquent.

Irritation périanale plus rarement.

**LAXATIFS (4) – LAXATIFS DE LEST****Mucilages et fibres alimentaires**■ **Gomme de sterculia**

<b>NORMACOL</b>					
1 à 3 c-mes. x 3/j	200 c-mes. (boîte 1 kg)	9,92		15 %	0,05
1 à 3 sach. x 3/j (1 sachet = 2 càc)	30 sach. 10 g	5,35		15 %	0,18

■ **Hémicellulose de psyllium**

<b>TRANSILANE sans sucre</b>					
2 càc matin et soir	40 càc (boîte 140 g)	3,40		30 %	0,09
<b>PSYLIA</b>					
1 sach. x 1 à 3/j	20 sach. 3,6 g	3,40		30 %	0,17

**Fibres diététiques : sons, blé et orge**■ **Ispaghul**

<b>IMEGUL</b>					
1 à 2 gél./j	20 gél. 100 mg	3,80		30 %	0,19
<b>SPAGULAX MUCILAGE PUR</b>					
1 sach. avant ou après chacun des principaux repas, à absorber en doses fractionnées	20 sach.	3,80		30 %	0,19
3 càc avant ou après chacun des principaux repas	160 càc (boîte 700 g)	8,34		30 %	0,05

**PROPRIÉTÉS**

Polysaccharides ou fibres non digérés ayant des propriétés hydrophiles et agissant en quelques jours en hydratant le bol fécal. L'augmentation du volume du bol fécal stimule le péristaltisme.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique de la constipation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Affections sténosantes du tube digestif.  
Colites inflammatoires (rectocolite hémorragique, maladie de Crohn).

Syndrome douloureux abdominal d'étiologie indéterminée ; fécalome.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Boire abondamment à chaque prise pour éviter une stagnation du produit dans le tube digestif.  
Ne pas croquer les granulés.  
Ne pas absorber en position allongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Météorisme abdominal.  
Risque d'accidents obstructifs en cas de prise sans eau des mucilages.

## LAXATIFS (5) – LAXATIFS STIMULANTS

## ■ Laxatifs anthraquinoniques (ou dérivés anthracéniques)

<b>TAMARINE</b>				
1 à 2 gél./j le soir	10 gél.		NR	
<b>MODANE</b>				
1 à 2 cp./j le soir	20 cp.		NR	

## ■ Laxatif salin : magnésie

<b>LUBENTYL à la magnésie</b>				
2 càc le matin à jeun ou à distance des repas	52 càc (pot 260 g)		NR	

## ■ Docusate de sodium

<b>JAMYLÈNE</b>				
2 à 6 cp./j en 1 ou 2 prises	50 cp. 50 mg		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Laxatifs stimulants augmentant la motricité colique et la sécrétion intestinale d'eau, d'électrolytes et de protéines. Les laxatifs salins agissent par effet osmotique en entraînant une hyperhydratation du contenu intestinal.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique de courte durée de la constipation.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse ; allaitement ;** âge < 15 ans.

Colite inflammatoire (rectocolite hémorragique et maladie de Crohn).

Syndrome occlusif ou subocclusif ; douleurs abdominales d'étiologie indéterminée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser de façon prolongée. L'utilisation au long cours de dérivés anthracéniques expose à la **maladie des laxatifs**.

Tous ces laxatifs exposent à un risque de dépendance avec besoin régulier d'augmenter les doses, souvent à l'insu du médecin.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs abdominales, diarrhée (signe de surdosage).

Troubles hydroélectrolytiques : alcalose hypokaliémique.

Mélanose colique, hyperpigmentation de la marge anale.

Phénolphtaléine : hypersensibilité (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson), photosensibilisation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqué avec les médicaments hypokaliémants :

– médicaments responsables de torsades de pointes : **amiodarone, sotalol, bépridil, disopyramide, érythromycine IV, sultopride, vincamine** ;

– **digitaliques** : toxicité favorisée par l'hypokaliémie ;

– autres **hypokaliémants** : **amphotéricine B (IV), gluco- et minérolocorticoïdes, diurétiques hypokaliémants**.



**LAXATIFS (6) – LAXATIFS PAR VOIE RECTALE****■ Bicarbonate de Na + tartrate acide de K**

<b>ÉDUCTYL</b>					
1 sup./j	12 sup. adulte	2,35		30 %	0,20
1 sup./j	12 sup. enfant	2,17		30 %	0,18

**■ Citrate et laurylsulfoacétate de sodium + sorbitol**

<b>MICROLAX</b>					
1 microlavement/j	4 unidoses de gel rectal 12 unidoses de gel rectal 50 unidoses de gel rectal	HOP		NR NR	
<b>MICROLAX BÉBÉ</b>					
1 microlavement/j	4 unidoses de gel rectal			NR	

**■ Glycérine**

<b>GLYCÉRINE GIFRER</b>					
1 sup./j	10 sup. adulte			NR	

**■ Docusate sodique**

<b>NORGALAX</b>					
1 microlavement/j	6 unidoses de gel rectal			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Produits utilisés par voie rectale, ramollissant les matières fécales et provoquant l'évacuation du rectosigmoïde en déclenchant le réflexe de la défécation.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique occasionnel des constipations basses par dyschésie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Lésions locales : poussées hémorroïdaires, fissures anales, anites, rectites (rectocolite hémorragique et maladie de Crohn).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Un usage prolongé peut donner lieu à des sensations de brûlures anales et exceptionnellement à des rectites congestives.

**Spécialités contenant des dérivés anthracéniques**

- Dépuratif des Alpes
- Dépuratif Parnel
- Dépuratum
- Dragées Fuca
- Dragées végétales Rex
- Grains de Vals
- Herbesan tisane
- Ideolaxyl
- Médiflor tisane laxative n° 7
- Mucinum et Mucinum à l'extrait de cascara
- Néo-Boldolaxine
- Normacol à la Bourdaine
- Opobyl
- Peristaltine
- Petites pilules Carters pour le foie
- Pilule Dupuis
- Pursennide
- Rhubarbe Larfan
- Sénokot
- Sirop Manceau
- Spark pilules
- Spévin
- Tamarine
- Tisane (T) : T abbé Hamon laxative, T Clair, T des Familles, T Grandes Char treuse, T Obéflorine, T Touraine
- Végé lax
- Vulcase

**Spécialités contenant de la phénolphthaléine**

- Boldolaxine
- Mucinum
- Purganol Daguin

## PANSEMENTS DIGESTIFS

## ■ Silicates + silicones

<b>SMECTA</b>					
1 sach. x 3/j	30 sach. 60 sach.	4,67 8,01		30 % 30 %	0,16 0,13
<b>GASTROPULGITE</b>					
(+ hydroxyde d'aluminium) 1 sach. x 3/j	30 sach.	4,23		15 %	0,14
<b>POLYSILANE DELALANDE</b>					
(+ oxyde d'aluminium) 1 à 2 cp. x 3/j	32 cp.			NR	
<b>PEPSANE</b>					
1 à 2 sach. x 2 à 3/j 1 caps. au moment des douleurs	30 sach. 30 caps.			NR NR	
<b>KARAYAL</b>					
(+ oxyde de magnésium) 1 à 2 c-mes. x 2 à 3/j	200 c-mes. de 10 g (boîte 1 kg)			NR	
<b>BOLINAN</b>					
2 cp. midi et soir	15 cp. 2 g 40 cp. 2 g			NR NR	
<b>CARBOSYLANE</b>					
(+ charbon activé) 1 dose (2 gél.) x 3/j	24 doses 48 doses	3,62 5,46		NR NR	0,15 0,11
<b>CARBOSYLANE ENFANT</b>					
Entre 6 et 10 ans : 1 dose (2 gél.) x 2/j > 10 ans : idem <b>CARBOSYLANE</b> ad.	24 doses 48 doses	3,16 5,26		NR NR	0,13 0,11

**PROPRIÉTÉS**

Les silicates (argiles naturelles), les silicones et la gomme karaya ne sont pas absorbés. Ils tapissent la muqueuse digestive et la protègent des agressions.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs liées aux affections œsogastroduodénales et coliques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Affections sténosantes du tube digestif.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement symptomatique ne dispensant pas d'un traitement étiologique.  
Insuffisance rénale : tenir compte de la présence d'aluminium (**GASTROPULGITE**).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**KARAYAL** : diarrhée due à la présence de magnésium.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prendre les autres médicaments à distance (2 h) des **pansements digestifs**.

**SANG DANS LES SELLES (RECHERCHE DE)****■ Réaction peroxydasique de l'hémoglobine**

<b>HÉMOCCULT II</b>				
Mise en évidence de sang dans les selles	30 plaquettes 100 plaquettes 3 plaquettes			NR NR NR
<b>HÉMOCCULT II unitaire</b>				
Mise en évidence de sang dans les selles	3 plaquettes			NR

**PROPRIÉTÉS**

Recherche d'hémoglobine dans les selles par une réaction peroxydasique de l'hémoglobine.

évacateurs) doivent être explorés par des techniques endoscopiques.

**INDICATIONS**

Dépistage des polypes et cancers colorectaux chez les patients asymptomatiques de plus de 40 ans.

Les patients ayant des facteurs de risque importants (antécédents familiaux, symptômes

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter de consommer de la viande, des betteraves, des navets, des médicaments contenant du fer, de l'**acide ascorbique**, de l'**aspirine** ou des **AINS** afin de réduire le risque de fausse positivité du test.

Éviter de pratiquer le test en période menstruelle.

Il s'agit d'un test qui doit être utilisé dans des campagnes de dépistage de masse. Il ne doit pas être proposé à titre individuel par un médecin à son patient en dehors de ces campagnes. En effet, le test est :

- peu sensible : 50 % des cancers ne sont pas dépistés (nombre élevé de faux négatifs) ;
- peu spécifique : environ 50 % de tests faussement positifs.

Néanmoins, il est socioéconomiquement satisfaisant dans le cadre de campagnes de dépistage de masse.

**ANTIHÉMORROÏDAIRES LOCAUX****Sans anesthésiques ni corticoïdes****■ Trimébutine + ruscogénines**

<b>PROCTOLOG</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	10 sup.		II	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**■ Oxyde de zinc**

<b>TITANORÉINE</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	12 sup.		II	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 tube crème 40 g		II	NR	

**Avec anesthésiques, sans corticoïdes****■ Oxyde de zinc + lidocaïne**

<b>TITANORÉINE</b>					
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**■ Quinisocaïne + cétrimide**

<b>RECTOQUOTANE</b>					
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 20 g		II	NR	

**Avec anesthésiques et corticoïdes****■ Prednisolone + cinchocaïne**

<b>DELIPROCT</b>					
1 à 2 sup./j après les selles	6 sup.		I	NR	
1 à 2 appl./j après les selles	1 pommade 10 g		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Topiques antihémorroïdaires à action anti-inflammatoire (**corticoïdes**), antalgique et antiprurigineuse (anesthésiques) et veinotonique (**ruscogénines**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'un des constituants (**lidocaïne** surtout).

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses et prurigineuses anales, en parti-

culier dans la crise hémorroïdaire et les fissures.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement de courte durée ne dispensant pas d'un traitement spécifique (mesures hygiéno-diététiques, traitement instrumental ou chirurgical).

Ne pas appliquer de **corticoïdes** en cas de lésion infectieuse locale (syphilis, tuberculose, etc.).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques locales (anesthésiques surtout).

**SCLÉROSANT HÉMMORROÏDAIRE**

## ■ Quinine-urée

<b>KINURÉA H</b>					
Hémorroïdes : inj. sous-muqueuse de 1 à 5 mL tous les 15 j, x 2 à 3 Fissure : inj. sous-fissuraire de quelques gttes	6 amp. 5 mL	10,71	I	30 %	1,79

**PROPRIÉTÉS**

Produit sclérosant utilisé pour la sclérose des hémorroïdes en ambulatoire.

**INDICATIONS**

Saignement d'origine hémorroïdaire.  
Fissure anale jeune.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Intolérance à la **quinine**.  
Anus douloureux.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Hémorroïdes : traitement réservé aux hémorroïdes internes.

Traitement réservé aux fissures jeunes non infectées ; 2 à 3 gttes de produit suffisent.

Une anesthésie locale avec au moins 6 à 8 mL de **lidocaïne** à 1 % doit toujours précéder l'injection.

Éviter les scléroses chez les patients sous anti-coagulants.

Éviter la répétition des séances de sclérose qui témoignent d'une inefficacité de la technique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur au point d'injection.

Sensation de corps étranger intra-rectal.

Rectorragies.

Atteinte cochléovestibulaire avec bourdonnement d'oreille, hypoacousie, vertiges.

**EXTRAITS PANCRÉATIQUES****■ Poudre de pancréas**

<b>CRÉON</b>				
2 à 3 gél. au cours des repas À adapter au degré de malabsorption	60 gél. 12 000 U de lipase	12,82	65 %	0,21
	100 gél. 12 000 U de lipase	HOP		
	120 gél. 12 000 U de lipase	22,90	65 %	0,19
	60 gél. 25 000 U de lipase	20,66	65 %	0,34
	100 gél. 40 000 U de lipase		NR	
<b>EUROBIOL</b>				
6 gél. ou 8 à 12 c-mes. au cours des repas À adapter au degré de malabsorption	90 gél. 25 000 U de lipase	32,21	65 %	0,36
	100 gél. 25 000 U de lipase	34,50	65 %	0,35
	105 c-mes. 12 500 U/dose (fl. 20 g)	18,57	65 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Extraits de pancréas apportant les activités enzymatiques pancréatiques nécessaires à la digestion (activités lipolytique, amylolytique et protéolytique). Les spécialités en gélules sont gastrorésistantes, évitant une destruction des enzymes par l'acidité gastrique.

**INDICATIONS**

Insuffisance pancréatique exocrine : pancréatite chronique, mucoviscidose, séquelles de gastrectomie et de pancréatectomie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de troubles digestifs chez les sujets ayant une hypersensibilité aux extraits pancréatiques.

Ouvrir les gélules en cas de gastrectomie.

Deux à trois mois de traitement sont nécessaires pour obtenir l'efficacité optimale. La posologie peut être exceptionnellement augmentée en cas de stéatorrhée rebelle ; un traitement antisécrétoire complémentaire peut être utile.

**TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE**■ **Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)**

<b>LIPROCIL</b>				
1,2 g/kg de poids/j à inclure dans la quantité de lipides prévue dans le régime	1 fl. 1 L		NR	

Participation TIPS pour la mucoviscidose : 17,6 €/boîte

**PROPRIÉTÉS**

Triglycérides à chaîne moyenne. Ils sont absorbés directement par l'intestin sans nécessiter une hydrolyse par les enzymes pancréatiques.

**INDICATIONS**

Apport lipidique :

- troubles de l'absorption des graisses : mucoviscidose, insuffisance pancréatique exocrine ;

- exceptionnelles hyperlipidémies de type I.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas chauffer à plus de 130 °C.

Fractionner les doses.

Ne pas dépasser 40 % de l'apport énergétique total du régime.

**ANTISPASMODIQUES (1) – NON ANTICHOLINERGIQUES (1)**■ **Phloroglucinol + triméthylphloroglucinol**

<b>SPASFON</b>					
2 cp. x 3/j	30 cp. 80 mg	2,95		15 %	0,10
Traitement d'attaque : 2 lyoph. x 3/j	10 lyoph. oraux 80 mg	2,32		15 %	0,23
	5 lyoph. oraux 160 mg	2,32		15 %	
1 sup. x 2 à 3/j	10 sup. 150 mg	3,00		15 %	0,30
1 à 3 amp./j en IM ou IV lente	6 amp. 40 mg	3,64		15 %	0,61

■ **Trimébutine**

<b>DÉBRIDAT</b>					
1 cp. x 3/j	30 cp. 100 mg	6,51	II	15 %	0,22
	30 cp. 200 mg	7,48	II	15 %	0,25
1 sach. x 3/j	30 sach. 74,4 mg	6,65	II	15 %	0,22
1 càs x 3/j	16 càs à 72 mg (fl. 250 mL)	3,96	II	15 %	0,25
1 à 3 amp./j en IM ou IV lente	25 amp. 50 mg/5 mL	HOP	II		
<b>DÉBRIDAT</b> enfant et nourrisson	25 graduations (fl. 125 mL)	2,82	II	15 %	0,11
4,8 mg/mL					
1 mL/kg/j, soit 1 graduation/kg/j en 3 prises					

■ **Mébévérine**

<b>DUSPATALIN</b>					
1 gél. x 2 à 3/j	30 gél. 200 mg		II	NR	
<b>MEBEVERINE ZENTIVA</b>					
100 à 200 mg x 3/j	30 gél. 100 mg	2,64	II	15 %	0,09
	30 cp. séc.	4,44	II	30 %	0,15

■ **Pinavérium bromure**

<b>DICETEL</b>					
1 cp. x 3 à 4/j	20 cp. 50 mg	4,31	II	15 %	0,22
1 cp. x 2/j	30 cp. 100 mg	8,05	II	15 %	0,27

■ **Alvérine**

<b>MÉTÉOSPASMYL</b>					
1 caps. x 2 à 3/j	20 caps. 60 mg	3,69	II	15 %	0,18



**ANTISPASMODIQUES (2) – NON ANTICHOLINERGIQUES (2) –  
PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antispasmodiques non atropiniques (sans effet anticholinergique) agissant directement au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies biliaires et urinaires et du muscle utérin.

**INDICATIONS**

Colique hépatique ou néphrétique (**phloroglucinol** et **alvérine**).

Colopathie fonctionnelle ; traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal.

**Phloroglucinol**, **alvérine** et **mébévérine chlorhydrate** : manifestations spasmodiques ou douloureuses d'origine utérine telles que dysménorrhées, tranchées du post-partum, menaces d'avortement, dystocies dynamiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Exceptionnelle allergie à l'un de ces produits.  
Suppositoires de **SPASMAVÉRINE** : allergie à la benzocaïne.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse et allaitement** : le **phloroglucinol** a été bien étudié et est autorisé. Les données sont insuffisantes pour les autres produits.

**Pinavérium** : prendre les comprimés en position debout, avec un verre d'eau sans les sucer ni les croquer.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont très rares.

Troubles digestifs mineurs.

Réactions cutanées allergiques (**phloroglucinol** et **trimébutine**).

**Trimébutine** : risque de lipothymies en cas d'injection IV trop rapide.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Phloroglucinol** et **morphiniques** : annulation de l'effet antispasmodique.

**Phloroglucinol** : incompatibilité avec la **noramidopyrine**.

**Trimébutine** : incompatibilité physico-chimique en solution injectable avec **dihydrostreptomycine**, **bipénicilline**, **pentobarbital sodique** injectable, **gamma-OH**, **oxyferriscorbine sodique**.

**ANTISPASMODIQUES (3) – ANTICHOLINERGIQUES**■ **Dihexyvérine**

<b>SPASMODEX</b>					
1 à 5 cp./j	30 cp. 10 mg		II	NR	
1 à 3 sup./j	6 sup. 50 mg		II	NR	

■ **Atropine**

<b>ATROPINE SULFATE LAVOISIER</b>					
0,25 à 0,50 mg x 2 à 3/j sans dépasser 2 mg/j	10 amp. 0,25 mg/1 mL	2,06	I	30 %	0,21
	100 amp. 0,25 mg/1 mL	HOP	I		
	10 amp. 0,5 mg/1 mL	2,09	I	30 %	0,21
	100 amp. 0,5 mg/1 mL	HOP	I		
	10 amp. 1 mg/1 mL	HOP	I		
	100 amp. 1 mg/1 mL	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Antispasmodiques anticholinergiques agissant au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies biliaires et urinaires.

**INDICATIONS**

Coliques hépatiques et néphrétiques (formes injectables).

Colopathie fonctionnelle ; traitement symptomatique des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal.

Manifestations spasmodiques ou douloureuses d'origine utérine : dysménorrhées, tranchées du post-partum.

**CONTRE-INDICATIONS**

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Risque de rétention urinaire par obstacle uréthro-prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : éviter par prudence, bien qu'aucun effet tératogène n'ait été rapporté.

**Allaitement** : déconseillé (passage dans le lait). Utiliser avec prudence en cas d'insuffisance

hépatique ou rénale, d'insuffisance coronarienne, de troubles du rythme, d'hyperthyroïdie, de bronchite chronique, d'hypertrophie prostatique et chez la personne âgée ou alitée (risque d'iléus paralytique).

Risque de troubles de l'accommodation pouvant perturber la vigilance et la conduite.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ce sont principalement les effets atropiniques qui sont dose-dépendants : sécheresse buccale, troubles de l'accommodation, épaississement des sécrétions bronchiques, diminution des sécrétions lacrymales, constipation, rétention d'urine, tachycardie, palpitations, irritabilité et confusion mentale (personnes âgées).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Addition des effets anticholinergiques en cas d'administration concomitante d'autres substances atropiniques : **antiparkinsoniens anticholinergiques**, **antidépresseurs imipraminiques**, **antipsychoptiques phénothiaziniques**, certains **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **disopyramide**.

**VACCIN ANTI-HÉPATITE A****■ Vaccin anti-hépatite A**

<b>HAVRIX</b>					
A. 1 440 U 1 inj. suivie d'un rappel à 6 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 1 440 U 1 mL	24,66	I	65 %	24,66
E. 720 U 2 inj. à 1 mois d'intervalle ; rappel à 6 ou 12 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 720 U 1 mL	16,35	I	65 %	16,35
<b>AVAXIM</b>					
A. 1 inj. suivie d'un rappel à 6 mois puis tous les 10 ans	1 ser. 0,5 mL + 2 aig.	24,66	I	65 %	24,66

**■ Vaccin anti-hépatite A + vaccin anti-hépatite B**

<b>VACCIN TWINRIX</b>					
A. 1 inj. suivie d'un rappel à 1 mois et à 6 mois	1 ser. 1 mL 720 U VHA + 20 µg Ac HBs		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir du virus de l'hépatite A, purifié et inactivé. L'immunité apparaît chez plus de 99 % des sujets immunocompétents.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite A.

Cette vaccination est recommandée :

- chez les voyageurs se rendant en zone endémique (régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie (Moyen et Extrême-Orient), d'Amérique (centrale et du Sud) ;
- chez les sujets exposés professionnellement : employés de crèches et d'institutions d'enfants ou d'adolescents, assistantes maternelles, personnel médical et paramédical ; employés du secteur alimentaire, agents des cuisines, professions d'entretien d'eaux usées ;
- chez les sujets à risque particulier de contamination : homosexuels (rapports oraux-anaux), toxicomanes ;
- chez les sujets au contact de personnes infectées car l'excrétion du virus peut se prolonger après la maladie ;
- chez les personnels militaires.

Il est possible que l'infection soit méconnue au moment de la vaccination. Dans ce cas, la vaccination ne modifie pas le cours de la maladie. La vaccination est recommandée systématiquement en cas de contagie si les conditions suivantes sont réunies : naissance après 1945, absence d'antécédent connu d'ictère et absence de séjour de plus d'un an dans un pays de forte endémicité. Dans les autres cas, une sérologie préalable est préférable.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants du vaccin (albumine).

Infection fébrile.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : effet non évalué mais le risque sur le fœtus devrait être négligeable (comme avec tous les vaccins viraux inactivés).

**Allaitement** : effet non évalué.

Ne pas injecter par voie IV : vérifier avant l'injection que l'aiguille n'est pas dans une veine ; préférer l'injection dans le deltoïde plutôt que dans le muscle fessier ; exceptionnellement, le vaccin pourra être administré par voie SC en cas de risque hémorragique grave.

La réponse immunitaire est moins bonne chez les patients immuno-déprimés ; une administration répétée du vaccin peut être nécessaire. Bien agiter le vaccin avant l'injection.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réaction locale transitoire cédant en 48 h.

Rarement, réactions générales : fièvre, céphalées, nausées, vertiges, fatigue.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Injecter en un site différent avec une aiguille différente les **immunoglobulines anti-hépatite A**.

Le contrôle des taux sériques d'anticorps anti-VHA est inutile avant (il n'y a pas de risque à vacciner un sujet ayant déjà contracté la maladie) et après la vaccination chez les sujets immunocompétents.

**IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES ANTI-HÉPATITE A****■ Immunoglobulines G contenant des anticorps anti-VHA**

<b>IMMUNOGLOBULINES anti-VHA</b>				
Inj. IM	1 ser. 2 mL		NR	
Protection de l'adulte : 1 dose unique de 5 mL	1 ser. 5 mL		NR	
Protection de l'enfant : 1 dose unique de 2 mL				

Ces immunoglobulines ne sont pas disponibles en France. On peut les obtenir en Autriche, en Belgique, en Allemagne ou en Suisse.

**PROPRIÉTÉS**

Gammaglobulines spécifiques anti-hépatite A assurant une immunoprotection contre cette maladie pendant les 2 mois qui suivent l'injection. Le mode d'obtention de ces immunoglobulines exclut le risque de transmission du VIH et des hépatites virales.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite A en cas d'épidémie ou de contagion en milieu hospitalier, en crèche et en général dans toutes les collectivités de sujets fragiles. Les indications sont limitées depuis le développement de la vaccination.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit complet en IgA.  
Immunisation anti-IgA.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'association au vaccin anti-hépatite A, pratiquer les 2 inj. à des sites différents avec des aiguilles différentes.

Ne pas utiliser de vaccins à virus vivants atténués dans les 15 j qui précèdent et les 2 mois qui suivent l'injection des **gammaglobulines** (risque d'échec de la vaccination).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnellement, sensation de malaise ou rash cutané cédant spontanément ou après injection d'**antihistaminiques H<sub>1</sub>** ou de **corticoïdes**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cf. Précautions d'emploi.

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (1)****■ Entécavir**

<b>BARACLUDE</b>					
Patient n'ayant jamais reçu de traitement par un analogue nucléosidique : 0,5 mg x 1/j	30 cp. 0,5 mg	477,75	I	65 %	15,93
Patient résistant à la <b>lamivudine</b> : 1 mg x 1/j, prise à jeun (plus de 2 h avant ou plus de 2 h après un repas)	30 cp. 1 mg 1 fl. 210 mL 0,05 mg/mL	477,75 554,28	I I	65 % 65 %	15,93 554,28

Le **ténofovir (VIRÉAD)** est décrit in Maladies infectieuses.

**PROPRIÉTÉS**

Analogue nucléosidique de la guanosine phosphorylé en forme triphosphate active. Par compétition avec le substrat naturel, le désoxyguanosine triphosphate, l'entécavir triphosphate inhibe les 3 fonctions de la polymérase virale : l'amorce des polymérases du VHB, la transcription inverse du brin négatif d'ADN à partir de l'ARN messager pré-génomique, et la synthèse du brin positif d'ADN du VHB.

**INDICATIONS**

Hépatite chronique virale B en phase de répliation et active histologiquement ou fibrose. Cirrhose virale B.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active. Grossesse, allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la posologie (cf. Tableau *infra*). Surveiller une fois/an la fonction rénale avec clairance, protéinurie, hématurie, glucosurie.

Cl. créatinine (mL/min)	Posologie du <b>BARACLUDE</b>	
	Patients naïfs de nucléosides	Patients résistants à la <b>lamivudine</b>
≥ 50	0,5 mg x 1/j	1 mg x 1/j
30-49	0,25 mg x 1/j* ou 0,5 mg/48 h	0,5 mg x 1/j
10-29	0,15 mg x 1/j ou 0,5 mg/72 h	0,3 mg x 1/j ou 0,5 mg/48 h
< 10 Hémodialyse ou DPAC**	0,05 mg x 1/j ou 0,5 mg/5-7 j	0,1 mg x 1/j ou 0,5 mg/72 h

*Exacerbations de l'hépatite* : augmentation transitoire des transaminases.

L'**entécavir** ne doit pas être utilisé chez les patients co-infectés VIH/VHB ne recevant pas de traitement antirétroviral hautement actif (HAART).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalée, sensation vertigineuse, somnolence. Vomissements, diarrhée, nausée, dyspepsie. Fatigue, insomnie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation de la concentration sérique de l'**entécavir** en cas de prise simultanée d'une molécule altérant la fonction rénale.

\* Pour les doses < 0,5 mg, **BARACLUDE** solution buvable est recommandée.

\*\* Les jours d'hémodialyse, administrer l'**entécavir** après l'hémodialyse.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (3)

### Diagnostic sérologique d'une infection par le VHB

MARQUEURS	SIGNIFICATION
Ag HBs+ ; Ac anti-HBs- ; IgM anti-HBc+	Hépatite virale B aiguë (ou dans certains cas particuliers réactivation virale B)
Ag HBs- ; Ac anti-HBs- ; IgM anti-HBc+	Hépatite virale B aiguë en voie de guérison (avant l'apparition des Ac anti-HBs)
Ag HBs- ; Ac anti-HBs+ ; Ac anti-HBc+	Hépatite virale B ancienne et guérie
Ag HBs- ; Ac anti-HBs+ ; Ac anti-HBc-	Sujet vacciné contre l'hépatite B (ou hépatite B guérie très ancienne)
Ag HBs+ ; Ag HBe+ ; Ac anti-HBe- ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB+ > 2 000 UI/mL	Hépatite chronique B en phase de réplication
Ag HBs+ ; Ag HBe- ; Ac anti-HBe+ ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB- (ou < 2 000 UI/mL)	Porteur inactif de l'antigène HBs
Ag HBs+ ; Ag HBe- ; Ac anti-HBe+ ; IgM anti-HBc- ; ADN VHB+	Hépatite chronique B en phase de réplication à virus mutant
NB : Il est important de déterminer s'il existe une surinfection par le virus Delta ; l'Ag Delta est rarement retrouvé et l'infection est donc affirmée par la présence d'Ac anti-Delta	
Ag Delta+ ou Ac anti-Delta+ ; IgM anti-HBc+	Co-infection VHB et virus Delta
Ag Delta+ ou Ac anti-Delta+ ; IgM anti-HBc-	Surinfection à virus Delta chez un porteur chronique du VHB

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (2)****■ Lamivudine**

<b>ZEFFIX</b>					
Hépatite chronique B : 100 mg/j Choisir la suspension buvable si des doses < 100 mg/j sont utilisées (insuffisance rénale)	28 cp. 100 mg 1 fl. 240 mL (5 mg/mL) + pipette doseuse	90,02 41,05	I I	65 % 65 %	3,22 41,05
<b>EPIVIR</b>					
Idem <b>ZEFFIX</b>	60 cp. séc. 150 mg 30 cp. 300 mg 48 càc 1 fl. 240 mL 10 mg/mL	145,81 145,81 51,47	I I I	100 % 100 % 100 %	2,43 4,86 1,07

**PROPRIÉTÉS**

Antiviral très actif contre le virus VHB. La **lamivudine** est transformée en lamivudine triphosphate dans les hépatocytes, s'intègre dans le génome viral et inhibe la transcriptase inverse et l'ADN polymérase virale. Elle n'interfère pas avec le métabolisme cellulaire normal. La **lamivudine** entraîne des résistances qui sont quasi constantes après 1 an de traitement.

**INDICATIONS**

La **lamivudine** ne doit plus être utilisée en première intention du fait des résistances qu'elle entraîne.

Hépatite B chronique de l'adulte avec répléction virale et :

- inflammation hépatique active histologiquement documentée et/ou fibrose ;
- ou atteinte hépatique décompensée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement.**

Hypersensibilité à la **lamivudine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Expérience clinique**

Le traitement doit être administré jusqu'à la séroconversion dans le système e (ou dans le système) avec VHB DNA négatif. L'arrêt du traitement peut aussi être envisagé en cas de retour à des valeurs sériques d'ALAT préthérapeutiques ou à une détérioration histologique. La **lamivudine** entraîne des mutations virales, notamment la mutation YMDD : 20 % à 1 an et 53 % à 3 ans de traitement. La poursuite du traitement malgré ces mutations permettrait toutefois de maintenir un certain bénéfice. Les implications à long terme de ces mutations sont inconnues. 53 % des patients reviennent au virus sauvage après arrêt de la **lamivudine**. Il existe ainsi un risque d'exacerbation de la maladie à l'arrêt du traitement. En pratique, la présence d'une mutation YMDD implique de ne pas arrêter le traitement.

**Insuffisance rénale**

Adapter la posologie (cf. Tableau *infra*).

Cl. créatinine (mL/min)	Posologie initiale	Dose d'entretien
30 à 50	20 mL (100 mg)	10 mL (50 mg)
15 à 30	20 mL (100 mg)	5 mL (25 mg)
5 à 15	7 mL (35 mg)	3 mL (15 mg)
< 5	7 mL (35 mg)	2 mL (10 mg)

**EFFETS INDÉSIRABLES**

La **lamivudine** est très bien tolérée chez les patients infectés par le VHB. Les effets indésirables les plus fréquents sont : malaise, asthénie, infections respiratoires, gêne au niveau de la gorge et des amygdales, céphalées, douleur ou gêne abdominale, nausée, vomissements, diarrhées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**BACTRIM** : augmentation de 40 % de l'exposition à la **lamivudine** mais en l'absence d'insuffisance rénale, ne pas modifier la posologie de la **lamivudine**.

**HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (4)****Évaluation de l'atteinte hépatique - décision de traitement**

La décision de traité dépend de la virémie du niveau des transaminases et de l'atteinte histologique.

La biopsie du foie doit être discutée au cas pas cas.

Les méthodes non invasives pour évaluer l'atteinte hépatique n'ont été validées que dans l'hépatite C et pas dans l'hépatite B, même si des extrapolations sont souvent faites (cf. Hépatite C).

En fonction de l'activité, de la fibrose et du terrain, on décide de la mise en route ou non du traitement.

**Indications thérapeutiques****Cas général**

Les patients doivent être traités si ADN VHB > 2 000 UI/mL et/ou ALAT > N et/ou lésions nécrotico-inflammatoires et/ou fibrose modérée à sévère (A2F2).

Doivent être également pris en compte l'âge et l'état général.

**Indications particulières**

- Patients immunotolérants : ALAT normales, ADN VHB > 10<sup>7</sup> UI/mL en l'absence de cirrhose ou d'antécédent familial de carcinome hépatocellulaire : surveillance.
- Femme enceinte au 3<sup>e</sup> trimestre avec une virémie > 10<sup>7</sup> UI/mL quel que soit le niveau des transaminases : traitement par **ténofovir (VIRÉAD)** pour diminuer le risque de transmission à l'enfant qui persiste, malgré la sérovaccination à la naissance, du fait de la virémie élevée.
- Patient ayant une hépatite chronique B peu sévère : ALAT < 2N et lésions histologiques < A2F2.
- Patients ayant une cirrhose compensée et un ADN viral détectable : traitement, quelle que soit la virémie (même < 2 000 UI/mL).
- Patients ayant une cirrhose décompensée : traitement urgent.



**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE B (3)****■ Adéfovir dipivoxil**

<b>HEPSERA</b>					
1 cp. x 1/j, à prendre au moment ou en dehors des repas	30 cp. 10 mg	528,14	I	65 %	17,60

**PROPRIÉTÉS**

L'**adéfovir dipivoxil** est une prodrogue orale de l'adéfovir, analogue nucléotidique phosphate acyclique de l'adénosine monophosphate, qui est converti en adéfovir diphosphate. L'adéfovir diphosphate inhibe les polymérases virales par compétition directe de liaison avec le substrat naturel (désoxyadénosine triphosphate) et, après incorporation dans l'ADN viral, il provoque la terminaison de la chaîne d'ADN. L'adéfovir diphosphate inhibe de manière sélective les polymérases de l'ADN du VHB à des concentrations 12, 700 et 10 fois plus faibles que celles nécessaires pour inhiber respectivement les polymérases a, b et g de l'ADN humain. L'adéfovir diphosphate a une demi-vie intracellulaire comprise entre 12 et 36 h dans les lymphocytes activés et au repos.

L'**adéfovir** entraîne des résistances et n'est plus utilisé en première intention.

**INDICATIONS**

Du fait des résistances qu'il entraîne, l'**adéfovir** ne doit plus être utilisé en première intention. Hépatite B chronique avec répllication virale

active, élévation persistante des ALAT, inflammation hépatique active et fibrose histologiquement prouvées.

Hépatite B décompensée.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Adapter la posologie à la clairance de la créatinine :

- 20 à 49 mL/min : 1 cp./48 h ;
- 10 à 19 mL/min : 1 cp./72 h ;
- hémodialyse : 1 cp./7 h après la dialyse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquent : asthénie.

Fréquents : nausées, flatulences, diarrhées, dyspepsie, douleurs abdominales, céphalées.

Apparition fréquente d'une insuffisance rénale (néphropathie tubulaire).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Adapter la posologie des médicaments associés en cas d'élévation de la créatininémie.

## IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES ANTI-HÉPATITE B

### ■ Immunoglobulines G contenant des anticorps anti-HBs

IMMUNOGLOBULINES ANTI-HBs					
Inj. IV ou IM Prévention après contact sexuel : 500 UI Sérovaccination des nouveau-nés de mère HBs- : 30 UI/kg à la naissance, à répéter jusqu'à ce que la protection soit assurée par des anticorps produits activement Prévention d'une contamination accidentelle par voie IV : 5 000 UI si le traitement est débuté dans les 24 h ; cette dose doit être doublée si le délai dépasse 24 h ou si l'Ag HBs est présent dans le produit contaminant Prévention de la réinfection du greffon lors de transplantations hépatiques : 10 000 UI/j le jour de la greffe et les 6 j qui suivent puis traitement d'entretien à renouveler en fonction du taux d'Ac anti-HBs qui doit rester > 100 UI/L	1 ser. 100 UI (1 mL) 1 ser. 500 UI (5 mL)			I I	NR NR

#### PROPRIÉTÉS

Gammaglobulines spécifiques anti-HBs assurant une immunoprotection contre l'hépatite B ; demi-vie de 21 jours. Le mode d'obtention de ces immunoglobulines exclut le risque de transmission du VIH et des hépatites virales.

#### INDICATIONS

Prévention de l'hépatite B :

- chez les nouveau-nés de mère HBs+ (à associer à la vaccination) ;
- chez un sujet en cours de vaccination ou dont la sérologie vis-à-vis du VHB est inconnue ou négative, après contamination accidentelle (produit sanguin HBs+, contact sexuel, toxicomanie, etc.) ;
- chez les sujets à risque lorsque la vaccination est inefficace (insuffisants rénaux, immunodéprimés).

Prévention de la réinfection du greffon par le VHB lors des transplantations hépatiques chez les patients porteurs du VHB.

#### CONTRE-INDICATIONS

Déficit complet en IgA.  
Immunisation anti-IgA.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de contact, pratiquer la recherche des marqueurs du VHB avant l'injection des gammaglobulines.

En cas d'association au vaccin anti-hépatite B,

pratiquer les 2 inj. à des sites différents avec des aiguilles différentes.

Ne pas utiliser de vaccins à virus vivants atténués (rougeole, oreillons, rubéole, poliomyélite buvable, etc.) dans les 15 j qui précèdent et les 2 mois qui suivent l'injection des gammaglobulines (risque d'échec de la vaccination).

L'injection IV doit se faire en une seule fois, immédiatement après la reconstitution du produit, à l'aide d'un filtre, sans dépasser un débit de 0,01 mL/kg/min pendant la première demi-heure puis en augmentant progressivement en fonction de la tolérance.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Exceptionnellement, sensation de malaise ou rash cutané cédant spontanément ou après injection d'antihistaminiques H<sub>1</sub> ou de corticoïdes.

Voie IV : réactions d'intolérance en cas de débit trop rapide (fièvre, frissons, modifications hémodynamiques) ; dans ce cas, arrêter transitoirement la perfusion et injecter en IV des corticoïdes ou des antihistaminiques H<sub>1</sub> ; de telles réactions impliquent la recherche d'anticorps anti-IgA.

Rarement, réactions d'intolérance chez les transplantés hépatiques.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Cf. Précautions d'emploi.

**VACCIN ANTI-HÉPATITE B (1)**■ **Vaccin anti-hépatite B**

<b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>					
Primovaccination : 3 inj. IM à 1 mois d'intervalle ; rappel : 1 inj. à 1 an puis tous les 5 ans En cas d'insuffisance rénale faire une 4 <sup>e</sup> inj. 2 mois après la 3 <sup>e</sup> Autre schéma possible : 2 inj. à 1 mois d'intervalle ; rappel à 6 mois puis tous les 5 ans Chez les nouveau-nés de mère HBs+, administrer simultanément la 1 <sup>re</sup> dose de vaccin et les immunoglobulines spécifiques	1 ser. 0,5 mL	18,12		65 %	18,12
<b>ENGERIX B</b>					
<b>ENGERIX B</b> adulte 20 µg Idem <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>	1 ser. 1 mL	18,12		65 %	18,12
<b>ENGERIX B</b> enfant et nourrisson 10 µg Même schéma vaccinal que <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b> mais forme réservée à l'enfant	1 ser. 0,5 mL	10,42		65 %	10,42
<b>HBVAXPRO</b>					
Vaccin 10 µg Idem <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b>	1 ser. 1 mL	17,24	I	65 %	17,24
Vaccin 5 µg Même schéma vaccinal que <b>VACCIN GENHEVAC B PASTEUR</b> mais forme réservée à l'insuffisant rénal	1 ser. 1 mL	9,92	I	65 %	9,92

**HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B (7)****Hépatite chronique Delta**

L'**interféron** est le seul traitement à avoir montré une certaine efficacité. On peut proposer **PEGASYS** : 180 µg/sem. pendant 1 an.

**Cirrhose post-hépatitique B**

Les complications et les traitements sont les mêmes que pour la cirrhose alcoolique (Cf. Cirrhose non compliquée) (sauf bien sûr l'hépatite alcoolique aiguë).

La transplantation est indiquée en cas de cirrhose sévère, c'est-à-dire avec un taux

de prothrombine < 50 % et/ou compliquée d'ascite.

L'infection sur le greffon peut entraîner une hépatite aiguë parfois sévère voire fulminante ; le risque est l'hépatite chronique sur le greffon qui se complique souvent de cirrhose. On utilise les **analogues nucléosi(t)idiques** et les **immunoglobulines anti-HBs** pour prévenir les récurrences.

**Cirrhose post-hépatitique Delta**

Le risque de récurrence sur le greffon est faible si une immunoprophylaxie anti-HBs est instituée.

**On parle de portage inactif de l'antigène HBs à deux conditions :**

- transaminases strictement normales à plusieurs dosages successifs ;

– ADN VHB- ou < 2 000 UI/mL.

Une surveillance tous les 6 mois est recommandée du fait du risque de réactivation virale.

**— CONSENSUS —**

[1] Chronic hepatitis B : an update, *AASLD*, 2009

[2] Clinical Practice Guidelines : Management of chronic hepatitis B virus infection, *EASL*, 2012

[3] Vaccination contre le virus de l'hépatite B, *Anaes*, 2003

**VACCIN ANTI-HÉPATITE B (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir d'une fraction antigénique virale non infectante (Ag HBs). L'immunité apparaît dans presque 100 % des cas après la troisième injection.

Le vaccin protège également de l'hépatite Delta puisque ce virus ne peut se répliquer chez les patients infectés par le virus de l'hépatite B.

Durée de la protection : 5 ans minimum.

**INDICATIONS**

Prévention de l'hépatite B.

La vaccination devrait être systématique dans l'enfance.

Chez l'adulte, elle concerne tous les sujets exposés à un risque de contamination, en particulier les professions médicales et paramédicales ; les patients insuffisants rénaux et poly-transfusés ; les militaires, pompiers, grands voyageurs, toxicomanes prostitués, homosexuels, etc.

La sérovaccination est indiquée chez les nouveau-nés de mère HBs+ et chez les sujets non vaccinés pour prévenir une infection accidentelle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas congeler ; conserver au frais (4 à 8 °C) ; agiter le vaccin avant l'injection.

L'injection doit être faite de préférence chez l'adulte dans le deltoïde et chez le nouveau-né et l'enfant dans la partie antéro-latérale de la cuisse. Exceptionnellement, en cas de risque hémorragique (hémophiles), le vaccin pourra être injecté par voie sous-cutanée.

Faire une 4<sup>e</sup> injection en cas d'insuffisance rénale.

Étant donné la longue période d'incubation de

l'hépatite B, il est possible que l'infection, non reconnue, soit présente au moment de la vaccination. Dans de tels cas, il se peut que la vaccination soit sans effet sur le développement de l'hépatite B.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur locale transitoire cédant en 48 h, voire induration.

Très rarement, syndrome pseudo-grippal, vertiges, rash, prurit, urticaire.

D'autres syndromes ont été décrits mais la relation avec la vaccination est douteuse : anaphylaxie, hypotension, syndrome de Guillain-Barré, névrite optique, sclérose en plaques.

Bien que les études soient contradictoires, la vaccination contre l'hépatite B pourrait favoriser les poussées chez les patients ayant une sclérose en plaques avérée et doit donc être évitée chez ces patients. Le rapport bénéfice/risque doit être évalué au cas par cas pour les apparentés à une personne ayant une sclérose en plaques. Les autres vaccinations sont autorisées en dehors des poussées chez une patiente atteinte de sclérose en plaques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de l'efficacité du vaccin chez les patients immunodéprimés (cirrhotiques, insuffisants rénaux, transplantés, sujets infectés par le VIH, etc.).

Injecter en un site différent avec une aiguille différente les immunoglobulines anti-HBs.

Le contrôle des taux sériques d'anticorps anti-HBs est inutile :

- avant la vaccination (il n'y a pas de risque de vacciner un sujet HBs+) ;

- après la vaccination chez les sujets immuno-compétents.

Un taux 10 UI/L est considéré comme protecteur.

**INTERFÉRON ALPHA (1)****■ Peginterféron alfa-2b recombinant**

<b>VIRAFERONPEG</b>					
Hépatite chronique C : 1,5 mg/kg/sem. SC	1 fl. 50 µg stylo prérempli	95,44	I	65 %	95,44
	4 fl. 50 µg stylo prérempli	362,47	I	65 %	90,62
	1 fl. 80 µg stylo prérempli	150,12	I	65 %	150,12
	4 fl. 80 µg stylo prérempli	571,00	I	65 %	142,75
	1 fl. 100 µg stylo prérempli	186,45	I	65 %	186,45
	4 fl. 100 µg stylo prérempli	703,47	I	65 %	175,87
	1 fl. 120 µg stylo prérempli	221,66	I	65 %	221,66
	4 fl. 120 µg stylo prérempli	835,93	I	65 %	208,98
	1 fl. 150 µg stylo prérempli	274,46	I	65 %	274,46
	4 fl. 150 µg stylo prérempli	1034,64	I	65 %	258,66

**■ Peginterféron alfa-2a recombinant**

<b>PEGASYS</b>					
Hépatite chronique C : 180 mg/sem. SC	1 fl. 135 µg	156,77	I	65 %	156,77
	4 fl. 135 µg	595,15	I	65 %	148,79
	1 fl. 180 µg	179,93	I	65 %	179,93
	4 fl. 180 µg	679,31	I	65 %	169,83

**■ Interféron alfa-2b recombinant**


<b>INTRONA</b>					
Hépatite chronique C : 3 MUI x 3/sem.	1 fl. 10 MUI/1 mL	78,63	I	65 %	78,63
Hépatite chronique B : 5 MUI/m <sup>2</sup> x 3/sem.	1 fl. 18 MUI/3 mL	138,10	I	65 %	138,10
Leucémie à tricholeucocytes : 3 MUI x 3/sem.	1 fl. 18 MUI/1,2 mL	138,10	I	65 %	138,10
	1 fl. 30 MUI/1,2 mL	225,80	I	65 %	225,80
Sarcome de Kaposi : jusqu'à 36 MUI/j	1 stylo 60 MUI/1,2 mL	441,15	I	65 %	441,15
Leucémie myéloïde chronique : 9 MUI/j					
Lymphome cutané à cellules T : 18 MUI/j					
Mélanome malin, cancer du rein : 10 MUI/m <sup>2</sup> /j					

**■ Interféron alfa-2a recombinant**

<b>ROFÉRON-A</b>					
Idem <b>INTRONA</b>	1 fl. 3 MUI	25,92	I	65 %	25,92
	12 fl. 3 MUI	268,86	I	65 %	22,40
	1 fl. 4,5 MUI	37,76	I	65 %	37,76
	12 fl. 4,5 MUI	398,08	I	65 %	33,17
	1 fl. 6 MUI	48,91	I	65 %	48,91
	12 fl. 6 MUI	527,32	I	65 %	43,94
	1 fl. 9 MUI	71,22	I	65 %	71,22
	12 fl. 9 MUI	770,45	I	65 %	64,20

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (2)

### Conduite à tenir devant une sérologie VHC positive (à 2 reprises)



### Évaluation de l'atteinte hépatique

La méthode de référence est la ponction biopsie hépatique.

Les tests non invasifs sont maintenant recommandés par l'HAS en première intention pour l'évaluation de l'atteinte hépatique. Ils permettent d'éviter la biopsie mais ne sont pas remboursés.

#### Fibrotest/Actitest

Les dosages des paramètres suivants permettent d'évaluer la fibrose hépatique : alpha2-macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine A1, la bilirubine totale et la gamma-GT, paramètres ajustés sur l'âge et le sexe du patient.

L'ajout de l'ALAT aux dosages précédents permet d'évaluer l'activité.

Pour prescrire le *Fibrotest/Actitest*, il faut mentionner sur l'ordonnance le dosage des paramètres précédents et demander en plus le calcul de l'*Actitest* et du *Fibrotest*.

Cet examen est actuellement pris en charge pour l'hépatite C.

Limites de ce test : il ne donne qu'un risque d'activité et de fibrose. Il n'est pas interprétable en cas d'hémolyse ou d'un syndrome de Gilbert (élévation de la bilirubine).

#### Élastographie impulsionnelle ultrasonore (*fibroscan*)

Cette méthode permet de mesurer l'élasticité du foie et de quantifier la fibrose en kPa. Cet examen n'est pas réalisable en cas d'obésité (paroi abdominale trop épaisse). Cet examen est pris en charge par la sécurité sociale pour l'hépatite C.

#### Ponction biopsie hépatique

C'est la méthode de référence. On l'utilise surtout en cas de résultats discordants entre les méthodes non invasives ou si un cofacteur (alcool, surpoids, autre virus) est associé au VHC.

**INTERFÉRON ALPHA (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Interféron alpha 2a ou 2b produit par génie génétique. Propriétés multiples dont les mécanismes restent imparfaitement compris :

- activité antivirale : inhibition de la réplication en modulant le métabolisme de la cellule hôte ;
- activité immunomodulatrice : augmentation de l'activité phagocytaire des macrophages ;
- activité antiproliférative sur certaines tumeurs.

L'**interféron pégylé** a une demi-vie prolongée et permet de ne pratiquer qu'une seule injection par sem. au lieu de 3. L'efficacité est supérieure et la tolérance identique à l'**interféron** non pégylé.

**INDICATIONS**

Hépatite chronique virale C histologiquement prouvée chez des patients n'ayant jamais été traités par **interféron alpha** et présentant des transaminases élevées, en l'absence de cirrhose décompensée.

Hépatite chronique active virale B de l'adulte histologiquement prouvée avec réplication virale persistante prouvée par le taux d'ADN sérique du VHB à 2 examens au moins, réalisés à environ 2 mois de distance dont 1 dans le mois précédant la mise sous traitement.

Leucémie à tricholeucocytes ; leucémie myéloïde chronique ; sarcome de Kaposi associé au sida ; lymphome cutané à cellules T.

Mélanome malin disséminé ; cancer du rein métastatique ou récidivant.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'interféron ou à l'excipient.

Affection cardiaque préexistante (la fièvre et les frissons peuvent décompenser une insuffisance cardiaque).

Insuffisance rénale, hépatique ou médullaire sévère ; cirrhose du foie décompensée.

Antécédent d'épilepsie et/ou atteinte du système nerveux central ; antécédents psychiatriques graves.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : nécessité d'évaluer le bénéfice d'un traitement par rapport au risque pour le fœtus ; pas d'effet tératogène rapporté.

**Allaitement** : absence de données sur le passage dans le lait ; évaluation du bénéfice par rapport au risque nécessaire.

Chez des patients transplantés, l'effet du traitement immunosuppresseur peut être diminué du fait de l'activité immunomodulatrice de l'**interféron**.

Le développement de manifestations auto-immunes est favorisé par l'**interféron** chez des patients prédisposés.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Généraux : syndrome pseudo-grippal quasi constant, fatigue, fièvre, myalgies, lassitude ; ces effets peuvent être atténués par la prise de **paracétamol** (1 g avant l'inj. d'**interféron**) et l'injection de l'**interféron** au coucher.

Digestifs : anorexie, nausées, vomissements, troubles du transit.

Hépatiques : élévation des transaminases.

Neurologiques : vertiges, troubles mnésiques et du sommeil ; somnolence ; paresthésies.

Cardio-pulmonaires : variations tensionnelles, palpitations.

Cutanés : alopecie réversible, sécheresse cutané-muqueuse, psoriasis.

Rénaux : rarement insuffisance rénale.

Hématologiques : leucopénie fréquente, anémie et thrombopénie plus rarement.

Endocriniens : dysthyroïdies, hyperglycémie, hypocalcémie.

Réaction au point d'injection ; apparition d'anticorps anti-interféron.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Salicylés et **corticoïdes** inhibent l'action de l'interféron.

Toxicité digestive du **5-FU** augmentée.

**Théophylline** : contrôler les taux sériques.

Éviter les sédatifs.

**Conditions de délivrance de l'interféron et de la ribavirine pour l'hépatite chronique C**

- Prescription initiale hospitalière (privée ou publique), réservée aux spécialistes ou services spécialisés en gastro-entérologie, hépatologie, maladies de l'appareil digestif, médecine interne. Délivrance en officine sur présentation de l'ordonnance initiale.
- Renouvellement de la prescription : non restreint. Délivrance en officine sur présentation de l'ordonnance de renouvellement et de l'ordonnance initiale.
- La délivrance est uniquement hospitalière dans les autres indications.



## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (1)

## ■ Ribavirine

RÉBÉTOL					
Hépatite chronique C :	84 gél. 200 mg	161,91	I	65 %	1,93
< 65 kg : 2 gél. x 2/j	112 gél. 200 mg	213,37	I	65 %	1,91
65-85 kg : 2 gél. matin + 3 gél. le soir	140 gél. 200 mg	264,11	I	65 %	1,89
> 85 kg : 3 gél. x 3/j	168 gél. 200 mg	314,84	I	65 %	1,87
2 mL/10 kg de poids matin et soir	1 fl. sol. buv. 40 mg/mL	95,11	I	65 %	95,11
COPEGUS					
Hépatite chronique C :	42 cp. 200 mg	83,11	I	65 %	1,98
< 75 kg : 2 cp. matin + 3 cp. le soir	112 cp. 200 mg	213,37	I	65 %	1,91
≥ 75 kg : 3 cp. x 2/j	168 cp. 200 mg	314,84	I	65 %	1,87
	14 cp. 400 mg	56,84	I	65 %	4,06
	56 cp. 400 mg	213,37	I	65 %	3,81

Prescription initiale par un médecin habitué à prendre en charge les hépatites C

## PROPRIÉTÉS

Antiviral à large spectre actif sur les virus à ADN et ARN : virus de l'hépatite C (VHC), *influenza A et B*, *parainfluenza*, virus respiratoire syncytial (VRS), virus de la fièvre de Lassa. La **ribavirine** pénètre dans les cellules et est convertie en dérivés mono-, di- et triphosphates. Son mécanisme d'action reste mal connu. Elle pourrait entraîner la synthèse d'un ARN viral anormal ou empêcher la réplication du génome viral. Seule, elle n'a pas prouvé son effet sur le VHC. Son association à l'interféron montre une action synergique entre les 2 molécules.

## INDICATIONS

Hépatite chronique à virus C.  
Infection à VRS.  
Fièvre de Lassa.  
Hépatite virale chronique E (hors AMM).

## CONTRE-INDICATIONS

## Absolues

**Grossesse** : tératogène et clastogène chez l'animal.

## Allaitement.

Les contre-indications absolues à la **ribavirine** sont :

- insuffisance rénale terminale ;
- anémie, hémoglobinopathie ;
- cardiopathie sévère ;
- absence de contraception.

## Relatives

Hypertension artérielle.

Âge avancé.

À ces contre-indications s'ajoutent celles de l'interféron lorsque ces deux molécules sont associées.

Hypertension artérielle ;

Âge avancé.

À ces contre-indications s'ajoutent celles de l'**interféron** lorsque ces deux molécules sont associées.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## Prévention de la grossesse.

*Homme traité* : utilisation par le malade et sa partenaire, d'une contraception efficace pendant le traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt ; la femme partenaire doit effectuer un test de grossesse tous les mois pendant le traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt. L'homme dont la partenaire est enceinte doit porter des préservatifs pour éviter que la **ribavirine** n'entre en contact avec le vagin.

*Femme traitée* : un test de grossesse doit être réalisé avant de débiter le traitement puis tous les mois pendant les traitements et les 4 mois qui suivent son arrêt.

Insuffisance cardiaque, angor, antécédent d'infarctus : surveillance rapprochée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie hémolytique pouvant nécessiter une adaptation de la posologie.

Dépression.

Bronchospasme : favorisé par un asthme préexistant, une bronchopneumopathie préexistante et la prise en aérosol du produit. Conjonctivite.

Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La **ribavirine** inhibe la phosphorylation de la **zidovudine** et de la **stavudine** *in vitro*. En cas d'association à ces médicaments, surveiller la virémie du VIH. Si elle augmente, arrêter la **ribavirine**. Ce risque d'interaction peut persister 2 mois après l'arrêt de la **ribavirine**.

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (4)

Avec le **VIRAIFERONPEG** :

- < 65 kg : 2 gél. 200 mg x 2/j ;
- 65-85 kg : 2 gél. 200 mg le matin + 3 gél. 200 mg le soir ;
- > 85 kg : 3 gél. 300 mg x 2/j.

Avec le **PEGASYS** :

- génotype 1 ou 4 : < 75 kg, 1 000 mg/j ; ≥ 75 kg : 1 200 mg/j ;
- génotype 2 ou 3 : 800 mg/j.

NB : Plutôt que diminuer la dose de **ribavirine** en cas d'anémie, on peut préférer ajouter une **érythropoïétine** ; ex : **NÉORE-CORMON** : 30 000 UI/sem. en SC (à discuter au cas par cas) ; de même, on peut préférer en cas de neutropénie induite par l'interféron ajouter un **facteur de croissance** plutôt que diminuer la dose (**NEULASTA** : 6 mg en SC).

- 3. **Sofosbuvir (SOVALDI)** : 1 cp./j (400 mg)

La durée totale du traitement est de 12 sem. Elle pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée). Chez les patients naïfs de tout traitement, l'efficacité globale du traitement (guérison) est d'environ 90 %.

• B) soit une bithérapie sans interféron associant :

- **sofosbuvir** + **daclatasvir** pendant 12 à 24 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **siméprévir** si génotype 1b (sauf en cas d'échec d'un traitement antérieur par **télaprévir** ou **bocéprévir**).

NB : Les AMM, conditions de remboursement et recommandations des sociétés savantes ne sont pas encore toutes disponibles lors de l'écriture de ce chapitre. Le coût très élevé d'un traitement par **sofosbuvir** ou **daclatasvir** (le prix définitif n'est pas encore fixé mais serait de quelques dizaines de milliers d'euros), pourrait faire envisager l'utilisation d'une bithérapie classique (**interféron alpha pégylé** + **ribavirine**)

chez les patients ayant des facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement.

### ► Virus de génotype 2

Une bithérapie **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine** est indiquée pendant 12 sem. La durée pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée). Chez les patients naïfs de tout traitement, l'efficacité du traitement (guérison) dépasse 90 %.

### ► Virus de génotype 3

• On recommande la trithérapie : **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine** + **interféron alpha pégylé** pendant 12 sem. La durée pourrait être portée à 24 sem. chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse au traitement (rechuteurs, cirrhose, charge virale élevée).

• On peut en alternative proposer :

- une bi ou une trithérapie sans **interféron** associant **sofosbuvir** + **daclatasvir** ± **ribavirine** pendant 24 sem. ;
- une bithérapie sans interféron associant **sofosbuvir (SOVALDI)** + **ribavirine (COPEGUS)** pendant 24 sem. sauf chez les patients ayant des facteurs prédictifs de mauvaise réponse (cirrhose chez un patient en échec thérapeutique antérieur).

### ► Virus de génotype 4

On peut proposer l'association :

- **sofosbuvir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 sem. ;
- ou **siméprévir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 à 14 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **ribavirine** pendant 24 sem.

### ► Virus de génotypes 5 et 6

On recommande l'association :

- **sofosbuvir** + **ribavirine** + **interféron** pendant 12 sem. ;
- ou **sofosbuvir** + **daclatasvir** pendant 24 sem.

**ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (2) – ANTIPROTÉASES (1)****■ Télaprévir**

<b>INCIVO</b>					
2 cp. x 3/j (toutes les 8 h) à avaler entier avec de la nourriture. Traitement à administrer pdt 12 sem. dans le cadre d'une trithérapie, en association avec l' <b>interféron alfa</b> et la <b>ribavirine</b>	42 cp. 375 mg 168 cp. 375 mg	HOP HOP	I I		

**■ Bocéprévir**

<b>VICTRELIS</b>					
4 gél. x 3/j (toutes les 8 h) avec de la nourriture. La trithérapie débute après 4 sem. de bithérapie associant l' <b>interféron alfa</b> et la <b>ribavirine</b>	336 gél. 200mg	3313,88	I	65 %	9,86

**■ Siméprévir**

<b>OLYSIO</b>					
1 gél. x 1/j pendant 12 sem., avec de la nourriture. A associer avec l'interféron alpha et la ribavirine.	7 gél. 150 mg 28 gél. 150 mg	HOP HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Le **télaprévir**, le **bocéprévir** et le **siméprévir** sont des inhibiteurs de la sérine-protéase NS3/4A du VHC qui joue un rôle majeur dans la répllication du virus. Le **télaprévir** et le **bocéprévir** sont de très forts inhibiteurs de la répllication du VHC de génotype 1. Le **siméprévir** est également un très bon inhibiteur de la répllication du VHC de génotype 4. Ils peuvent entraîner rapidement des résistances donc **doivent tous être associés au peg-interféron alfa et à la ribavirine**.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hépatite chronique virale C due au virus VHC de génotype 1 (**télaprévir** et **bocéprévir**) ou 4 (**siméprévir**) chez les patients adultes ayant une maladie hépatique compensée (au stade de fibrose F4 pour le **siméprévir**), naïfs ou en échec après un précédent traite-

ment. Le **siméprévir** ne peut être prescrit, lors de la rédaction de ce chapitre, que sous forme d'ATU.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

**INCIVO** : toute substance dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A ou induisant le CYP3A. Grossesse/allaitement/absence de contraception.

**VICTRELIS** : toute substance dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A4/5 ou induisant le CYP3A4/5. Grossesse/allaitement/absence de contraception. Hépatite auto-immune.

**OLYSIO** : toute substance fortement inductrice ou inhibitrice du CYP3A, ou dont la métabolisation dépend fortement du CYP3A4 intestinal. Allaitement (risque non exclu).

Associations aux molécules suivantes :

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (5)

### Adaptation de la posologie de l'interféron pégylé (VIRAFERONPEG) et de la ribavirine

Test	Diminuer la <b>ribavirine</b> à 600 mg/j (1 gél. le matin et 2 le soir) si :	Diminuer <b>VIRAFERONPEG</b> de moitié si :	Interrompre le traitement si :
Hémoglobine	< 10 g/dL		< 8,5 g/dL
Hémoglobine avec antécédents cardiaques	Chute $\geq 2$ g/dL sur 1 mois de traitement		< 12 g/dL après 1 mois de traitement à dose réduite
Leucocytes		< 1 500/mm <sup>3</sup>	< 1 000/mm <sup>3</sup>
Neutrophiles		< 750/mm <sup>3</sup>	< 500/mm <sup>3</sup>
Plaquettes		< 50 000/mm <sup>3</sup>	< 25 000/mm <sup>3</sup>
Bilirubine conjuguée			2,5 x limite supérieure de la normale
Bilirubine non conjuguée	> 8,5 $\mu$ mol/L		> 68,4 $\mu$ mol/L pendant plus de 4 sem.
Créatininémie			> 177 $\mu$ mol/L
ALAT/ASAT			2 x valeurs initiales et > 10 x limite supérieure de la normale

## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (3) – ANTIPROTÉASES (2)

## Principaux médicaments contre-indiqués en association avec les antiprotéases

Nature de l'interaction	Substances impliquées
Inducteurs de CYP3A (diminuent l'efficacité des inhibiteurs de protéase)	<b>Rifampicine</b> , rifabutine, millepertuis, dexaméthasone, <b>carbamazépine</b> , <b>phénytoïne</b> , <b>phénobarbital</b>
Inhibiteurs de CYP3A (risque de toxicité par accumulation des inhibiteurs de protéase)	<b>Antifongiques azolés</b> , <b>macrolides</b> , cimetidine, pamplemousse, <b>INNTI (éfavirenz, étravirine, névirapine)</b> , <b>inhibiteurs de protéases anti-VIH</b>
L'efficacité des composés suivants est augmentée avec <b>INCIVO</b> , <b>VICTRÉLIS</b> ou <b>OLYSIO</b> Attention : risque de toxicité	<b>Antiarythmiques de classe I et III</b> (amlodaroné, flécaïnide, quinidine, propafénone, etc.), <b>dérivés de l'ergot</b> , <b>benzodiazépines</b> (midazolam, triazolam, etc.), <b>statines</b> (sauf fluvastatine), <b>inhibiteurs calciques</b> , <b>inhibiteurs de PDE5</b> (HTAP), <b>bosentan</b> , <b>salmétérol</b> , <b>immunosuppresseurs</b> (ciclosporine, sirolimus, tacrolimus), <b>astémizole</b> , <b>terfénaire</b>
L'efficacité des composés suivants est diminuée avec <b>INCIVO</b> ou <b>VICTRÉLIS</b> Risque d'inefficacité	<b>Éthinylestradiol</b> , <b>déscitalopram</b> , <b>désipramine</b> , <b>zolpidem</b>

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les règles d'arrêt sont les suivantes :

## Règles d'arrêt de la trithérapie comprenant un antiprotéase

Spécialité	Télaprévir ( <b>INCIVO</b> )	Bocéprévir ( <b>VICTRÉLIS</b> )	Siméprévir ( <b>OLYSIO</b> )
Mesure de l'ARN VHC	À S4 et S12	À S8 et S24	À S4, S12 et S24
Arrêt de la trithérapie	Si ARN VHC $\geq 1000$ UI/mL	Si ARN VHC $\geq 100$ UI/mL à S8 ou détectable à S24	Si ARN VHC $\geq 25$ UI/mL à S4
Arrêt du traitement en cours	Si ARN VHC détectable à S36 ou S48	Si détectable à S8 et négatif à S24, poursuite jusqu'à S36	Si détectable à S12 ou S24

**OLYSIO** : éviter une exposition directe importante aux UV pendant le traitement.

**VICTRÉLIS** et **OLYSIO** contiennent du lactose.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Télaprévir** : éruptions cutanées parfois sévères pouvant évoluer jusqu'au syndrome de Lyell (la présence de bulles doit faire arrêter le traite-

ment), anémie, symptômes anorectaux (hémorroïdes, proctalgie, prurit anal), nausées, diarrhées, vomissements.

**Bocéprévir** : anémie, neutropénie, nausées, céphalées, asthénie.

**Siméprévir** : éruption cutanée, prurit, bilirubinémie augmentée, réaction de photosensibilité (peu fréquente).

## HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE C (6)

### Adaptation de la posologie de l'interféron pégylé (PEGASYS) et de la ribavirine

Test	Posologie de <b>PEGASYS</b>	Posologie de la <b>ribavirine</b>
Neutropénie < 750/mm <sup>3</sup> < 500/mm <sup>3</sup>	135 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Thrombopénie < 50 000/mm <sup>3</sup> < 25 000/mm <sup>3</sup>	90 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Élévation des ALAT 1 <sup>er</sup> temps 2 <sup>e</sup> temps si persistance	90 µg Arrêt	Pas de modification Pas de modification
Variation de l'hémoglobine		
- Pas d'antécédent cardiovasculaire Hb < 12 g/dL 8,5 < Hb < 10,5 g/dL Hb < 8,5 g/dL	Pas de modification Pas de modification Pas de modification	Pas de modification Arrêt 600 mg/j
- Antécédent cardiovasculaire Hb < 12 g/dL Chute Hb > 2 g/dL dans les 4 premières sem.	Pas de modification Pas de modification	600 mg/j Arrêt
Hb < 12 g/dL après 4 sem. de <b>ribavirine</b> à 600 mg/j	Pas de modification	Arrêt

## ANTIVIRAUX - ANTI-HÉPATITE C (4) – INHIBITEURS DES PROTÉINES NS5A ET NS5B (3)

### ■ Sofosbuvir

<b>SOVALDI</b>					
Pré-transplantation : 1 cp./j pdt 48 sem. Post-transplantation : 1 cp./j pdt 24 sem. De nouvelles indications vont se développer. A associer ou non avec l'interféron alpha et la ribavirine en fonction des génotypes viraux.	28 cp. 400 mg	HOP	I		

### ■ Daclatasvir

<b>BMS-790052</b>					
60 mg x 1/j En association avec <b>sofosbuvir</b> 400 mg pendant 24 sem. (± <b>peginterféron alfa</b> ± <b>ribavirine</b> )	33 cp. 30 mg 33 cp. 60 mg	HOP HOP			

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs pan-génotypiques de composants essentiels à la réplication du virus de l'hépatite C :

- **daclatasvir** : protéine NS5A qui participe à la réplication virale ;
- **sofosbuvir** : protéine NS5B ARN-polymérase ARN-dépendante.

#### INDICATIONS

**Sofosbuvir** : AMM.

**Daclatasvir** : ATU de cohorte.

Traitement du patient adulte atteint d'infection virale C chronique :

- qui présente une maladie à un stade avancé (avec fibrose hépatique F3/F4 ou manifestations extra-hépatiques du VHC), sans alternative thérapeutique appropriée ;
- ou qui est sur liste d'attente pour une transplantation hépatique ou rénale et nécessite un traitement pour éviter la réinfection par le VHC ;
- ou qui a subi une transplantation hépatique et présente une récurrence agressive de l'infection.

Le **sofosbuvir** est également pris en charge par l'assurance-maladie en cas de contre-indication ou d'échec de traitement par une alternative thérapeutique prise en charge.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.  
Utilisation en monothérapie.

Allaitement.

Cf. Interactions médicamenteuses.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Non recommandés pendant la grossesse : contraception efficace.

Bilans hépatique, rénal et hématologique à réaliser avant traitement. Surveillance clinique et biologique étroite à l'instauration.

La présentation du **daclatasvir** contient du lactose.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : fatigue, céphalées, nausée.

Fréquents : appétit diminué, anxiété, insomnie, dépression, vertiges, bouffées de chaleur, dyspnée, douleur abdominale, myalgie, prurit, etc.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inducteurs puissants du CYP3A4 et de la Pgp (diminution de l'exposition), contre-indiqués avec le **sofosbuvir** et le **daclatasvir** : **carbamazépine**, **rifampicine**, **phénytoïne**, **phénobarbital**, **dexaméthasone**, **millepertuis**.

Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (adaptation de posologie du **daclatasvir**) : **amiodarone**, **clarithromycine**, **érythromycine**, **itraconazole**, **kétoconazole**, **quinidine**, **ranolazine**, **ritonavir**, **atazanavir**, **efavirenz**, etc.

**Modafinil** déconseillé avec le **sofosbuvir**.

**Digoxine**, **rosuvastatine** : prudence avec le **daclatasvir**.

## CHÉLATEUR DU FER

## ■ Déféroxamine

DESFÉRAL					
20 à 60 mg/kg/j, la voie d'administration est à adapter à chaque patient Idéalement, voie SC lente continue sur 8 à 12 h par pompe miniaturisée Voie IM seulement si voie SC impossible Voie IV pendant une transfusion	1 fl. + solv.	6,63	I	100 %	6,63

## PROPRIÉTÉS

Agent chélateur des anions trivalents: ion ferrique et ion aluminium trivalents.

La **déféroxamine** est capable de fixer le fer libre du plasma ou des cellules pour former le complexe ferrioxamine qui est éliminé dans les urines et les fèces. La **déféroxamine** réduit ainsi les dépôts pathologiques de fer dans les organes.

La **déféroxamine** est rapidement absorbée après administration par bolus intramusculaire ou perfusion lente sous-cutanée, mais son absorption gastro-intestinale est médiocre.

## INDICATIONS

Hémochromatose primitive non curable par saignées.

Hémosidérose secondaire.

Intoxications martiales aiguës.

Intoxication aluminique chez l'insuffisant rénal dialysé.

Test au **DESFÉRAL** : diagnostic de l'intoxication aluminique.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité à la **déféroxamine**.

Insuffisance rénale sévère non dialysée.

Infection bactérienne évolutive.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier mais à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue : en cas d'intoxication maternelle sévère au fer, on ne retrouve pas d'augmentation parallèle des concentrations

du fer sérique chez l'enfant ; de plus, le traitement de la mère par la **déféroxamine** semble sans retentissement sur les concentrations en fer de l'enfant.

**Allaitement** : absence d'information sur le passage de la substance active dans le lait.

En cas de perfusion trop rapide : risque de réaction vasomotrice (hypotension, collapsus, tachycardie, érythème).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs, tuméfaction, érythème, prurit au point d'injection.

Fréquemment myalgies et arthralgies.

Nausées, vomissements, fièvre, urticaire, asthme, douleurs abdominales.

Troubles visuels et auditifs, surtout en cas de ferritine basse, nécessitant l'interruption immédiate de la **déféroxamine**.

Majoration de l'encéphalopathie des dialysés. Retards de croissance, notamment chez l'enfant.

Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Infections à *Yersinia enterocolitica* et *pseudotuberculosis* en cas de surcharge en fer : interrompre le traitement, pratiquer les tests bactériologiques et une antibiothérapie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Solution injectable d'**héparine**.

**Vitamine C** : la prise concomitante de **vitamine C** augmente l'excrétion du fer ; il existe un risque d'insuffisance cardiaque en début de traitement.

Cesser l'administration de **déféroxamine** 48 h avant une scintigraphie.



## ACIDES BILIAIRES

## ■ Acide ursodésoxycholique

<b>DELURSAN</b>					
Cirrhose biliaire primitive : 13 à 15 mg/kg/j Cholangite sclérosante primitive : 20 mg/kg/j maximum Cholestase gravidique : 10 à 20 mg/kg/j en 2 prises, sans dépasser 1000 mg/j, jusqu'à l'accouchement	20 cp. 250 mg	10,86	I	65 %	0,54
	60 cp. 500 mg	58,7	I	65 %	0,98
<b>URSOLVAN</b>					
Idem <b>DELURSAN</b>	30 gél. 200 mg	9,80	I	65 %	0,33
<b>CHOLURSO</b>					
Idem <b>DELURSAN</b>	50 cp. 250 mg	25,30	I	NR	0,42
	60 cp. 250 mg		I	65 %	
	50 cp. 500 mg	47,82	I	NR	0,80
	60 cp. 500 mg		I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

Inhibition du cycle entéro-hépatique : diminution de l'absorption des acides biliaires hydrophobes (la modification de la composition de la bile par augmentation du pool des acides biliaires la rend moins lithogène).

Effet cytoprotecteur : amélioration de la fluidité et de la perméabilité membranaire.

Effet immunomodulateur : augmentation de la réaction mixte lymphocytaire expérimentale et augmentation de l'expression du complexe majeur d'histocompatibilité de classe I.

Le traitement médical des calculs biliaires n'a que très peu d'indication.

L'**acide ursodésoxycholique** est de plus en plus utilisé pour le traitement de certaines cholestases.

## INDICATIONS

- Cirrhose biliaire primitive, surtout en début de maladie : amélioration de la biologie hépatique, retardement de la date de transplantation, augmentation de l'espérance de vie.
- Cholangite sclérosante primitive : améliora-

tion de la biologie hépatique mais pas d'effet sur l'espérance de vie.

- Cholestase gravidique symptomatique.
- Cholestase chronique de la mucoviscidose
- Traitement symptomatique du prurit secondaire à une cholestase.
- Dissolution des calculs biliaires de moins de 15 mm, radiotransparents avec une vésicule fonctionnelle. Cette indication est obsolète depuis l'avènement de la cholécystectomie par voie laparoscopique.

## CONTRE-INDICATIONS

Infections biliaires, affections gastro-intestinales organiques.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'utilisation pour le traitement d'une lithiase vésiculaire, vérifier par cholécystographie orale que la vésicule est bien fonctionnelle.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement diarrhée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter les produits hépatotoxiques et les **chélateurs des sels biliaires (colestyramine)**.

**ANALOGUE DE LA VASOPRESSINE****■ Terlipressine**

<b>GLYPRESSINE</b>					
Toutes les 4 h, voie IV : poids > 70 kg : 2 mg ; entre 50 et 70 kg : 1,5 mg ; < 70 kg : 1 mg		5 fl. 1 mg + 5 mL solv. 5 amp. 1 mg/ 8,5 mL	<b>HOP</b> <b>HOP</b>	I I	

**PROPRIÉTÉS**

Analogue synthétique de la **vasopressine**.

Dans les hypertensionns portales, la **GLYPRESSINE** diminue la pression portale par vasoconstriction dans le territoire porte.

Après injection IV, la **GLYPRESSINE** est métabolisée en lysine-vasopressine qui est l'hormone active (délai d'action : 40-60 min ; durée d'action : 180 min).

**INDICATIONS**

Ruptures de varices œsophagiennes (en attendant le traitement spécifique).

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolues :

- **grossesse** : effet embryofœtotoxique ;
- choc septique.

Relatives :

- insuffisance coronaire ; antécédent d'infarctus du myocarde ;
- troubles du rythme cardiaque ;
- hypertension artérielle non contrôlée ;

- insuffisance vasculaire cérébrale ou périphérique ;
- asthme, insuffisance respiratoire ;
- insuffisance rénale chronique ;
- âge > 70 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Voie IV stricte : risque de nécrose cutanée en cas d'extrasation.

Surveillance rapprochée de la PA, de la fréquence cardiaque, de la diurèse et du ionogramme.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont rares.

Graves : poussée hypertensive (cédant souvent spontanément) ; bradycardie ; insuffisance coronaire (chez les sujets à risque).

Mineurs :

- crampes abdominales, diarrhée ;
- céphalées ;
- acrocyanose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Incompatibilité majeure avec les solutés alcalins ou contenant des sucres réducteurs.

**ANALOGUE DE LA SOMATOSTATINE**■ **Somatostatine**

<b>SOMATOSTATINE EUMEDICA</b>					
Perf. continue 0,004 mg/kg/h environ	1 inj. 0,25 mg	HOP	I		
Rupture de varices œsophagiennes : 0,250 mg IV lente puis 0,250 mg/h	1 inj. 3 mg	HOP	I		
Fistule digestive : 0,250 mg/h	1 inj. 6 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Analogue de synthèse de la somatostatine naturelle ; demi-vie de 2 à 3 min impliquant une perfusion continue.

Inhibition des sécrétions exocrines et endocrines digestives (acide chlorhydrique, sécrétions pancréatiques et biliaires).

Réduction du débit circulatoire splanchnique.

Inhibition de la motilité gastrique et intestinale.

**INDICATIONS**

Soins intensifs en gastro-entérologie :

- ruptures de varices œsophagiennes (en attendant le traitement spécifique) ;
- fistule digestive postopératoire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller la glycémie (inhibition de la sécrétion d'insuline et de **glucagon**).

Réduire progressivement la vitesse de perfusion avant d'arrêter le traitement : risque d'effet rebond sécrétoire en cas d'arrêt brutal.

Inhibition de l'absorption intestinale de certains nutriments : nutrition parentérale conseillée.

Injecter lentement un éventuel bolus en dose de charge (> 1 min) (cf. Effets indésirables).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

En cas d'injection trop rapide : bradycardie, flush, nausées, inconfort abdominal.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Une synergie avec la **cimétidine** a été rapportée.

Incompatibilité majeure : la **somatostatine** est instable à pH alcalin : éviter sa dilution dans une solution alcaline.

**ANTIÉMÉTIQUES (1)****■ Métopimazine**

<b>VOGALÈNE</b>					
1 lyoc x 2 à 4 /j	16 lyoph. 7,5 mg	3,68	II	30 %	0,23
	20 lyoph. 7,5 mg	4,77	II	30 %	0,24
1 à 2 càc x 2 à 3/j	30 càc 5 mg (fl. 150 mL)	3,40	II	30 %	0,11
E. : 0,5 mg/kg/j en 2 à 3 prises	1200 gttes (1 mg = 10 gttes) fl. 30 mL	2,52	II	30 %	0,00
1 à 2 amp./j IM (ou IV lente)	10 amp. 10 mg	4,22	II	65 %	0,42
Chimiothérapie : la posologie peut être portée à 50 mg/j en IM ou en perf.					
En 3 prises :	10 sup. séc. 5 mg	2,13	II	30 %	0,21
< 6 ans : 1 mg/kg/j					
6-12 ans : 1,5-3 sup./j					
> 12 ans : 3 à 6 sup./j					
<b>VOGALIB</b>					
1 lyoc x 2 à 4 /j	8 lyoph. 7,5 mg		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiémétique appartenant à la classe des phénothiazines (**antipsychotique**) se caractérisant par une activité antidopaminergique élective en raison de son très faible passage à travers la barrière hémato-encéphalique.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des nausées et vomissements.

Prévention et traitement des vomissements induits par la chimiothérapie anticancéreuse (forme IV).

**CONTRE-INDICATIONS**

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Risque de rétention urinaire lié à des troubles uréthro-prostatiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : pas d'effet tératogène chez l'animal ; absence d'effet tératogène rapporté chez l'homme ; toutefois, la sécurité d'emploi lors de la grossesse chez la femme n'a pas été évaluée lors d'essais thérapeutiques et il est conseillé par prudence de limiter la prescription pendant la grossesse (analogie avec les **phénothiazines**).

Éviter l'absorption de boissons alcoolisées pendant le traitement.

Voie IV : risque d'hypotension ; éviter cette forme chez les sujets âgés ; injecter chez un patient en décubitus.

Risque de somnolence : prévenir les conducteurs et utilisateurs de machines.

Présence d'aspartam dans la forme lyoc : éviter en cas de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Neurologiques** : sédation, somnolence, dyskinesies précoces (torticollis spasmodique, crises oculogyres, trismus) cédant à l'administration d'un **antiparkinsonien anticholinergique** ; syndrome extrapyramidal ; possibilité de dyskinesies tardives en cas d'utilisation prolongée (comme avec tous les **antipsychotiques**).

**Végétatifs** : hypotension orthostatique, sécheresse buccale, constipation, troubles de l'accommodation, rétention urinaire.

**Endocriniens** : impuissance, frigidité, aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, hyperprolactinémie.

Rarement éruption cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Risque de potentialisation des **antihypertenseurs** et des dépresseurs du système nerveux central : **hypnotiques, sédatifs, analgésiques, anesthésiques**.

**NAUSÉES - VOMISSEMENTS (2)****Vomissements récents aigus**

PATHOLOGIE	PARTICULARITÉS SÉMIOLOGIQUES
Urgences chirurgicales Péritonite aiguë Occlusion intestinale aiguë Pancréatite aiguë Infarctus mésentérique	Contracture abdominale Météorisme abdominal, arrêt des matières et des gaz Hyperamylasémie Hyperamylasémie Silence abdominal à l'auscultation
Urgences neurologiques Méningites Hémorragie méningée	Raideur méningée (ponction lombaire) Début très brutal (scanner cérébral)
Urgences gynécologiques Hyperemesis gravidarum Grossesse extra-utérine Salpingite aiguë Torsion d'un kyste de l'ovaire (Échographie)	Premier trimestre de la grossesse β-hCG, toucher pelvien douloureux Infection génitale
Urgences métaboliques Insuffisance surrénale aiguë Acidocétose diabétique Hypercalcémie Infarctus mésentérique	Hyponatrémie, hyperkaliémie Hyperglycémie, glycosurie, cétonurie, acidose Silence abdominal à l'auscultation
Urgences cardiologiques Infarctus du myocarde	Douleur thoracique intense (électrocardiogramme)
Autres urgences Colique hépatique ou néphrétique Rétention urinaire Glaucome aigu	Lithiase biliaire ou urinaire Globe vésical Hypertension oculaire
Causes iatrogènes Intoxications volontaires Surdosages (digitaliques, antipsychotiques, alcool, etc.)	Tentative de suicide
Affections digestives Gastroentérite infectieuse Hépatite virale aiguë	Diarrhée, intoxication alimentaire Syndrome grippal

**Vomissements chroniques**

PATHOLOGIE	PARTICULARITÉS CLINIQUES
Causes digestives Sténose du pylore ; sténose du grêle Séquelles de gastrectomie	Ulcère, cancer, tumeur, maladie de Crohn
Causes neurologiques Migraine Maladie de Ménière Hypertension intracrânienne Intoxication chronique au monoxyde de carbone (CO)	Céphalées Surdité, vertiges, bourdonnements d'oreille Scanner cérébral, fond d'œil Intoxication collective, circonstances particulières
Causes psychiatriques	Vomissements volontaires

## ANTIÉMÉTIQUES (2) – MAL DES TRANSPORTS (MÉDICAMENTS DU)

### ■ Scopolamine

<b>SCOPODERM TTS</b>					
1 patch à placer derrière l'oreille 6 à 12 h avant le voyage et à retirer à l'arrivée Le patch délivre du produit pendant 72 h	5 patches 1 mg 30 patches 1 mg	HOP	I I	NR	

### ■ Diménhydrinate

<b>MERCALM</b>					
(contient de la caféine) 1 à 2 cp. 30 min avant le départ à renouveler toutes les 6 à 8 h sans dépasser 3 prises	15 cp. séc. 50 mg		I I	NR	
<b>NAUSICALM</b>					
1 à 2 cp. 30 min avant le départ à renouveler toutes les 6 à 8 h sans dépasser 3 prises E. : 1 à 2 càc 30 min avant le départ à renouveler toutes les 6 à 8 h sans dépasser 3 prises	14 gél. 50 mg  30 càc (16 mg/càc) ; fl. 150 mL		I I	NR NR	

### ■ Diphénhydramine

<b>NAUTAMINE</b>					
Idem <b>NAUSICALM</b>	20 cp. séc. 90 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

**Scopolamine** : parasympatholitique de type atropinique.

**Diménhydrinate** et **diphénhydramine** : **anti-histaminiques H<sub>1</sub>**.

Ces produits seraient plus efficaces que les autres **antiémétiques** dans le mal des transports.

#### INDICATIONS

Mal des transports.

Les **antihistaminiques H<sub>1</sub>** sont proposés dans les nausées et vomissements autres que ceux induits par la chimiothérapie.

#### CONTRE-INDICATIONS

##### Allaitement.

Risque de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire par obstacle uréthroprostatique.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : à éviter par prudence ; pas d'effets malformatifs rapporté pour la **scopolamine**.

Éviter l'absorption de boissons alcoolisées pendant le traitement.

Risque de somnolence : prévenir les conducteurs et utilisateurs de machines ; utiliser avec prudence chez le sujet âgé.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Effets atropiniques : bouche sèche, constipation, troubles de l'accommodation, risque de poussée de glaucome par fermeture de l'angle et de rétention urinaire, somnolence, confusion.

**SCOPODERM TTS** (0,5 mg/72 h) : à l'arrêt du traitement après une utilisation de quelques jours, des cas de vertiges, nausées, vomissements et céphalées ont été rapportés.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Risque de potentialisation des dépresseurs du système nerveux central : **hypnotiques, sédatifs, analgésiques, anesthésiques**.

Majoration des effets atropiniques en cas de prise simultanée d'autres **anticholinergiques**.

## HOQUET

Le hoquet passager ne nécessite aucun traitement médicamenteux mais quelques manœuvres simples.

Lorsque la crise se prolonge, un bilan étiologique doit être pratiqué à la recherche d'une maladie organique avant de débuter un traitement symptomatique.

### Hoquet passager

Plusieurs manœuvres peuvent être tentées :

- absorption d'un grand verre d'une boisson gazeuse froide : limonade, eau gazeuse, *Coca-Cola* ;
- manœuvre de Valsalva : blocage de la respiration en fin d'inspiration profonde ;
- compression simultanée des deux artères radiales dans la gouttière du pouls pendant une vingtaine de secondes, au besoin associée à une manœuvre de Valsalva ;
- compression des 2 nerfs phréniques à la base du cou.

### Hoquet prolongé

#### En première intention

On utilise le **PRIMPÉRAN** ou le **VOGALÈNE** : 2 amp. de 10 mg IV à répéter en cas d'échec ou de rechute 1 à 2 h plus tard sans dépasser 6 amp./j.

Un relais par voie orale doit être systématique : **PRIMPÉRAN** 1 cp. x 3/j ou **VOGALÈNE** 1 gél. x 2/j.

#### En cas d'échec

Le traitement est difficile. On peut utiliser les produits suivants :

- antipsychotique, chlorpromazine (**LARGACTIL**) : 1/2 à 1 amp. à 25 mg ou halopéridol (**HALDOL**) : 1 amp. (5 mg) x 1 à 3/j en IM ou en perfusion à répéter une fois dans la journée ;
- corticothérapie et antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> de la sérotonine de type granisétron ou odansétron (respectivement **KYTRIL** et **ZOPHREN**) dans les hoquets secondaires à la chimiothérapie ;
- le baclofène (**LIORÉSAL**) à la dose de 10 à 40 mg/j peut être efficace.

### Principales causes de hoquet

#### Atteinte du système nerveux central

- Traumatisme crânien.
- Tumeur cérébrale.
- Accident vasculaire cérébral.
- Encéphalite, méningite.

#### Excitation du nerf phrénique

- Affection ORL.
- Tumeur de l'œsophage, de l'estomac, bronchopulmonaire.

- Compression médiastinale.
- Péricardite, infarctus du myocarde.
- Pleurésie.
- Hernie hiatale.
- Diverses atteintes digestives sous-diaphragmatiques : péritonite, carcinose péritonéale, abcès du foie, etc.
- Hoquet essentiel.

**ANTIÉMÉTIQUES (3) – ANTIREFLUX****■ Métoclopramide**

<b>PRIMPÉRAN</b>					
1/2 à 1 cp. x 3/j	40 cp. séc. 10 mg	3,87	I	30 %	0,10
	150 cp. 10 mg	HOP	I		
1 sup. x 2/j	10 sup. 10 mg	2,13	I	30 %	0,21
	10 sup. 20 mg	2,28	I	30 %	0,23
1 à 2 càc x 3/j	40 càc fl. 200 mL (5 mg/càc)	2,70	I	30 %	0,07
1/2 à 1 amp. x 3/j IM ou IV lente	3 amp. 2 mL (10 mg)	1,90	I	65 %	0,63
Réservé à la chimiothérapie :	12 amp. 2 mL (10 mg)	2,82	I	65 %	0,24
2 à 10 mg/kg/j IM ou IV lent	6 amp. 5 mL (100 mg)	8,73	I	65 %	1,46

**■ Alizapride**

<b>PLITICAN</b>					
Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie : 100 à 200 mg/j	12 cp. 50 mg 6 amp. 50 mg	5,55	II II	NR 65 %	0,93

**PROPRIÉTÉS**

Antiémétique antipsychotique de la famille des benzamides modificateur du comportement digestif. Il augmente l'amplitude des ondes de contractions œsophagiennes, le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et la vitesse de vidange gastrique. Il normalise le péristaltisme gastroduodénal et augmente celui du grêle.

Les effets antipsychotiques de ces antagonistes dopaminergiques «périphériques» s'expliquent par leur passage significatif de la barrière hémato-encéphalique ; ils vont donc agir comme antagoniste des récepteurs dopaminergiques centraux.

**INDICATIONS**

Nausées, vomissements, hoquet.

Reflux gastro-œsophagien, œsophagite par reflux.

Manifestations dyspeptiques liées à un trouble de la motricité digestive.

**Métoclopramide** : chez l'adulte uniquement.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Métoclopramide** : contre-indiqué chez l'enfant de moins de 18 ans du fait des effets neuroleptiques.

Ne pas utiliser si la stimulation de la motricité gastro-duodénale présente un danger : hémorragie gastro-intestinale, obstruction mécanique, perforation digestive.

Dyskinésies tardives iatrogènes (**antipsychotiques**).

Phéochromocytome (suspecté ou connu) : risque d'accident hypertensif.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : utilisé couramment ; pas de malformation rapportée.

**Allaitement** : passage dans le lait.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont liés aux propriétés antipsychotiques.

Somnolence, lassitude, vertiges.

Exceptionnellement : céphalées, insomnie, diarrhée, gaz intestinaux, syndrome extrapyramidal précoce avec un risque majoré chez l'adulte jeune (parfois dès la première administration), syndrome parkinsonien.

Dyskinésies tardives en cas de traitement prolongé, aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, hyperprolactinémie, tendance dépressive, méthémoglobinémie chez le prématuré.

Les dyskinésies étaient plus fréquentes chez l'enfant et pouvaient présenter un caractère aigu.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Antipsychotiques** : synergie d'effet central.

**Anticholinergiques** : effets antagonistes sur la motricité digestive.

**Antiparkinsoniens** : inhibition possible de l'effet des 2 produits.

Cf. aussi **dompéridone**.



## ENTÉROCINÉTIQUE

## ■ Prucalopride

<b>RESOLOR</b>					
Médicament réservé à la femme 2 mg en une prise à n'importe quel moment de la journée, au cours ou en dehors des repas Réduire à 1 mg si > 65 ans, en cas d'insuffisance rénale sévère, et d'insuffisance hépatique sévère	7 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	14 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	28 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	
	84 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

Le **prucalopride** est un agoniste sélectif de haute affinité des récepteurs 5-HT<sub>4</sub> de la sérotonine. Cette activation implique une action entérokinétique.

Biodisponibilité orale absolue > 90 % avec une absorption rapide (C<sub>max</sub> atteinte en 2 à 3 h) non influencée par une prise alimentaire. La métabolisation est faible (15 %), élimination urinaire sous forme initiale à plus de 60 %.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de la constipation chronique chez les femmes pour lesquelles les laxatifs n'ont pas eu les effets escomptés. En l'attente de données, **RESOLOR** n'est pas recommandé chez l'homme et avant l'âge de 18 ans.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **prucalopride** ou à l'un des excipients. Intolérance au lactose. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse. Perforation ou obstruction intestinale quelle qu'en soit l'étiologie.

Les médicaments pouvant provoquer des torsades de pointe doivent être évités : **antiarythmiques de classe Ia (quinidiniques)** et **III (amiodarone)**, **antipsychotiques**, **antidépresseurs**, **macrolides**, **fluoroquinolones**, imidazolés et triazolés.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'excrétion rénale étant la principale voie d'élimination du **prucalopride**, la dose recommandée est de 1 mg/j chez l'insuffisant rénal sévère. En l'absence de données, cette même dose de 1 mg/j est recommandée chez l'insuffisant hépatique sévère malgré la faible probabilité de conséquences significatives. L'excipient majoritaire est le lactose, les patients intolérants ne doivent donc pas prendre ce médicament.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, diarrhée, douleurs abdominales, maux de tête, vertiges, vomissements, rectorragie, fatigue.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **prucalopride** ne présente que peu de risques d'interactions médicamenteuses. On note tout de même l'augmentation des taux plasmatiques de **prucalopride** en présence d'inhibiteurs puissants de la P-gp comme : le **kétoconazole**, le **vérapamil**, la **ciclosporine A** et la **quinidine** mais sans conséquence clinique *a priori*. Une attention particulière doit être portée en cas de prise de médicaments allongeant l'intervalle QT. L'utilisation d'analogues atropiniques peut réduire les effets du **prucalopride** par interaction pharmacodynamique.

## OLIGOÉLÉMENTS (1) – ZINC ET DÉRIVÉS (1)

## ■ Acétate de zinc

WILZIN					
A. 50 mg x 3/j (jusqu'à 5/j si nécessaire) E. 25 mg x 2/j jusqu'à 6 ans puis x 3/j jusqu'à 16 ans Femme enceinte : 25 mg x 3/j Posologies à adapter en fonction du contexte clinique	250 gél. 25 mg	HOP	I		
	250 gél. 50 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

La maladie de Wilson (dégénérescence hépatolenticulaire) est un déficit métabolique autosomal récessif de l'excrétion hépatique du cuivre dans la bile.

Le cation zinc, fraction active de l'acétate de zinc dihydraté, bloque l'absorption intestinale du cuivre provenant de l'alimentation et la réabsorption du cuivre endogène sécrété. Il induit la formation d'une métallothionéine dans les entérocytes, protéine qui fixe le cuivre, empêchant ainsi son transport dans la circulation sanguine. Le cuivre lié est ensuite éliminé dans les selles après desquamation des cellules intestinales.

## INDICATIONS

Traitement à vie de la maladie de Wilson.

## MODE D'ADMINISTRATION

Médicament à prendre par voie orale.

Ce médicament doit être pris à jeun, au moins 1 h avant ou 2 à 3 h après les repas. En cas d'intolérance gastrique, survenant fréquemment lors la prise du matin, cette prise peut être retardée jusqu'au milieu de la matinée, entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Il est également possible de prendre ce médicament avec un peu de protéines, avec de la viande par exemple mais pas de lait.

En cas de besoin, les gélules peuvent être ouvertes et diluées dans de l'eau.

**OLIGOÉLÉMENTS (2) – ZINC ET DÉRIVÉS (2)****CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au zinc ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez les patients symptomatiques, l'acétate de zinc n'est pas recommandé seul en traitement initial car son délai d'action est trop long. Le traitement de référence dans ce cas est un chélateur du cuivre jusqu'à abaissement des concentrations de cuivre en dessous du seuil toxique et stabilisation clinique auquel l'acétate de zinc peut être associé.

Une aggravation clinique peut se produire en début de traitement.

Le traitement vise à maintenir les concentrations en cuivre libre plasmatique (également appelé cuivre plasmatique non lié à la céruloplasmine) en dessous de 250 µg/L (taux normal : 100 à 150 µg/L) et l'excrétion urinaire en dessous de 125 µg/24 h (taux normal : < 50 µg/24 h).

L'excrétion urinaire de cuivre reflète précisément la surcharge en cuivre de l'organisme, uniquement chez les patients qui ne sont pas traités par un agent chélateur.

Chez les patients traités, les dosages urinaires et/ou plasmatiques du zinc peuvent être utiles pour évaluer l'observance du traitement. Des concentrations en zinc urinaire > 2 mg/24 h et en zinc plasmatique > 1 250 µg/L indiquent généralement une bonne observance.

Comme avec tous les agents anticuivre, tout surdosage peut entraîner un risque de déficit en cuivre, particulièrement nocif chez les enfants et les femmes enceintes car le cuivre est nécessaire à la croissance et au développement mental. Dans ces groupes de patients, les concentrations en cuivre urinaire doivent être maintenues légèrement au-dessus de la limite supérieure de la normale ou à la limite supérieure de la normale (soit 40 à 50 µg/24 h).

Un suivi biologique comprenant la surveillance des paramètres hématologiques et le dosage des lipoprotéines doit également être réalisé afin de détecter les manifestations précoces d'un déficit en cuivre, tels qu'une anémie et/ou une leucopénie résultant d'une aplasie médullaire et une diminution du cholestérol HDL et du rapport HDL/cholestérol total.

Le zinc est absorbé dans l'intestin grêle et la

cinétique de son absorption indique une tendance à la saturation à des doses croissantes. L'absorption fractionnaire du zinc est corrélée négativement avec l'accumulation du zinc. Elle varie entre 30 et 60 % avec une prise alimentaire normale (7 à 15 mg/j) et diminue à 7 % aux doses pharmacologiques de 100 mg/j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents mais généralement avec un degré de sévérité modéré : gastralgies, gastrite, augmentation des phosphatases alcalines, hyperamylasémie et hyperlipasémie.

Rares ou exceptionnels : ostéopénie, anémie, anémie hémolytique, hypocrurémie, leucopénie, neutropénie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Autres agents anticuivre** : lors du relais d'un traitement chélateur par ce médicament comme traitement d'entretien, l'agent chélateur doit être poursuivi et co-administré pendant 2 à 3 semaines, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le traitement par zinc produise une induction maximale de la métallothionéine et un blocage complet de l'absorption du cuivre. L'administration d'un agent chélateur et celle de ce médicament doivent être séparées d'au moins 1 h.

**Autres médicaments** : l'absorption de zinc peut être réduite par les compléments de **fer** et de **calcium**, les **tétracyclines** et les composés phosphorés, alors que le zinc peut réduire l'absorption du **fer**, des **tétracyclines** et des **fluoroquinolones**.

**INTOXICATION**

L'intoxication par voie orale avec du zinc ou des sels de zinc peut provoquer une irritation gastrique, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des ulcérations digestives, et une hémorragie digestive avec un méléna, et une anémie voire un coma.

Le traitement du surdosage doit comprendre un lavage gastrique ou un vomissement provoqué le plus tôt possible pour éliminer le zinc non absorbé. Il faut envisager un traitement par chélation des métaux lourds si les taux plasmatiques du zinc sont considérablement élevés (> 10 mg/L).

**PRESCRIPTION**

Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle.

## OLIGOÉLÉMENTS (3) – MAGNÉSIUM ET DÉRIVÉS

## ■ Carbonate de magnésium

MAG 2				
3 à 4 cp/j en 2 à 3 prises	60 cp. 100 mg 120 cp. 100 mg		NR NR	

## ■ Citrate de magnésium + pyridoxine

MAGNEVIE B6				
3 à 4 cp/j en 2 à 3 prises	60 cp. 100 mg/10 mg		NR	

## PROPRIÉTÉS

Le magnésium est un cation principalement intracellulaire. Il diminue l'excitabilité neuronale et la transmission neuromusculaire, et intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques. Élément constitutionnel, la moitié du capital magnésien est osseux. Cette absorption, maximale au niveau du duodénum, ne dépasse pas 50 %. L'excrétion de magnésium est urinaire. Après absorption de carbonate de magnésium, la concentration maximale est atteinte en 60 à 90 min.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de la carence en magnésium.

Sur le plan clinique, une magnésémie sérique :  
– comprise entre 12 et 17 mg/L (1 à 1,4 mEq/L ou 0,5 à 0,7 mmol/L) indique une carence magnésienne modérée ;  
– inférieure à 12 mg/L (1 mEq/L ou 0,5 mmol/L) indique une carence magnésienne sévère.

## MODE D'ADMINISTRATION

Médicament par voie orale.

Les cp. doivent être avalés avec un demi-verre d'eau à répartir de préférence en plusieurs prises avant ou au cours des repas.

La cure de supplémentation ne doit généralement pas dépasser 1 mois de traitement.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

Enfants et nourrissons car absence de données cliniques.

Insuffisance rénale chronique sévère.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares ou exceptionnels : réaction allergique, hypermagnésémie, troubles gastro-intestinaux tels que diarrhées, flatulences ou douleurs abdominales.

La **pyridoxine (vitamine B6)** contenue dans le **MAGNEVIE B6** peut être exceptionnellement à l'origine de paresthésies et neuropathies périphériques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pas de contre-indications.

Associations déconseillées : **sels de phosphate** ou de **calcium**.

Ces produits inhibent l'absorption intestinale du magnésium.

À prendre en compte : **tétracyclines** par voie orale. Il est recommandé de laisser un espace de 2 h entre les prises des 2 médicaments car le magnésium diminue l'absorption digestive des cyclines.

## SELS DE BISMUTH

## ■ Bismuth (subcitrate)

PYLERA					
(+ <b>métronidazole</b> + tétracycline) 3 gél./prise x 4/j, après le repas pendant 10 j	120 gél. 140 mg/ 125 mg/125 mg	60	I	65 %	0,50

**PROPRIÉTÉS**

Bismuth : toxicité directe et indirecte sur *Helicobacter pylori*. Effet exact inconnu.

**Métronidazole** : antibiotique bactéricide et anti-parasitaire de la classe des **nitro-imidazolés**.

Tétracycline : antibiotique bactériostatique de la classe des **tétracyclines**.

**INDICATIONS**

En association avec l'**oméprazole** (20 mg x 2/j) :

- éradication d'*Helicobacter pylori* ;
- prévention des récives d'ulcères gastro-duodénaux chez les patients ayant un ulcère actif ou un antécédent d'ulcère associés à *Helicobacter pylori*.

**CONTRE-INDICATIONS**

Grossesse et allaitement.

Enfant < 12 ans.

Insuffisance rénale chronique.

Insuffisance hépatique.

Hypersensibilité à l'un des composants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Effet antabuse (**métronidazole**) pendant et au moins 24 h après arrêt du traitement.

Photosensibilité (tétracycline).

Prudence chez le sujet âgé et le patient atteint de troubles du système nerveux central, de myathénie ou d'anomalie sanguine.

Lactose + 96 mg de potassium par prise.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Troubles digestifs** : dysgueusie, diarrhées, nausées, selles noires, anorexie, perte d'appétit, vomissements, douleurs abdominales, constipation, sécheresse buccale, flatulences.

**Troubles neurologiques** : céphalées, sensations vertigineuses, somnolence.

**Autres** : asthénie, infection vaginale, éruption cutanée, élévation des ASAT et ALAT, chromaturie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec le bismuth : **ranitidine** (absorption du bismuth augmentée)

Avec le métronidazole : alcool, **disulfirame**, **antivitamine K** (surdosage), **phénobarbital**, **phénytoïne**, **5-fluorouracile**, **ciclosporine**, **busulfan**, **lithium**.

Avec la tétracycline : méthoxyflurane (néphrotoxicité), **antivitamine K** (allongement du TP et du TCA), **antiacides**/supplémentation en Fe, **Zn**, **Al**, **Ca**/produits laitiers (absorption de la tétracycline diminuée), **rétinoïdes**, **atovaquone**.

**CANCER DU PANCRÉAS – CHIMIOTHÉRAPIE****Protocole GEMOX**

PRODUIT	POSOLOGIE	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Oxaliplatine (ELOXATINE)</b>	100 mg/m <sup>2</sup> dans 500 mL G5 % sur 2 h	Toutes les 2 sem.
<b>gemcitabine (GEMZAR)</b>	1 000 mg/m <sup>2</sup> dans 250 mL NaCl sur 30 min	

**CANCER DU CÔLON – CHIMIOTHÉRAPIE****Protocole FOLFOX4**

PRODUIT	POSOLOGIE	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Oxaliplatine (ELOXATINE)</b>	85 mg/m <sup>2</sup> en 2 h dans 250 mL de G5 % en Y de l' <b>acide folinique</b> avec <b>gluconate de calcium</b> (1 g) et <b>sulfate de magnésium</b> (1 g) en 30 min IV avant et après l' <b>oxaliplatine</b> au J1 du LV5FU2	Toutes les 2 sem. (12 cycles)
LV5FU2 (simplifié)	<b>Acide folinique</b> 400 mg/m <sup>2</sup> (ou <b>I-folinique</b> 200 mg/m <sup>2</sup> ) en 2 h dans 250 mL G5 %, rincer puis <b>5-FU</b> 400 mg/m <sup>2</sup> en 10 min dans 100 mL de G5 % puis <b>5-FU</b> 2 400 mg/m <sup>2</sup> en perf. continue de 44 h dans G5 % par infuseur portable (qsp 220 mL, 5 mL/h), pompe ou pousse-seringue portable	Toutes les 2 sem.

**Protocole FOLFIRI**

PRODUIT	POSOLOGIE	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Irinotécan (CAMPTO)</b>	180 mg/m <sup>2</sup> en perf. de 90 min dans 250 mL de G5 % en Y de l' <b>acide folinique</b> au J1 du LV5FU2 simplifié.	Tous les 14 j avec évaluation après 4 cures (2 mois)

**PERTES VAGINALES (1) - CANDIDOSES VULVOVAGINALES**

Il faut différencier le pathologique du physiologique. Il ne s'agit pas d'une infection sexuellement transmissible, le *Candida* fait partie de la flore physiologique du vagin, les symptômes sont dus à un déséquilibre de la flore locale.

Il s'agit d'une leucorrhée blanchâtre, caillé, bottée, inodore, avec prurit vulvaire et brûlures.

Le prélèvement vaginal n'est utile pour le diagnostic qu'en cas de mycose récidivante ou atypique (couleur, odeur).

**Règles hygiéniques**

- Toilette avec un savon alcalin type **GYN HYDRALIN savon** : proscrire les douches vaginales.
- Port de sous-vêtements en coton.
- Éviter les vêtements serrés.

**Traitement spécifique**

- **Antifongiques imidazolés vaginaux**, traitement minute éconazole (**GYNO-PEVARYL LP**) 1 ovule le soir en administration

unique intravaginale, à renouveler au bout de 3 j si persistance des symptômes.

- Pommade antimycosique à appliquer sur la vulve en cas de prurit intense : **éconazole (PEVARYL LAIT)** 1 appl. x 2/j sur peau propre et sèche.

**En cas de récurrences fréquentes (▷ 4/an)**

- Prélèvements vaginaux pour examen mycologique avec antimycogramme.
- Recherche et traitement d'un facteur favorisant (diabète, antibiothérapie, immunodépression, corticothérapie, non-respect des règles hygiéniques).

Décontamination d'un éventuel foyer digestif par **antifongiques oraux** : **BÉAGYNE** 1 cp. 150 mg en prise unique.

- **Antifongiques imidazolés locaux** avant ou pendant les facteurs déclenchants s'ils sont connus : 1 ovule de **GYNO-PEVARYL LP**.

- Traitement du partenaire par **antifongiques locaux** : **PEVARYL** 1 % lait 1 appl./j pendant 1 sem.



## PERTES VAGINALES (2) - VAGINOSE BACTÉRIENNE

Il faut différencier le pathologique du physiologique. La flore vaginale à l'état physiologique contient une majorité de lactobacilles mais également des germes d'origine digestive ou oropharyngée.

Cette flore peut être déséquilibrée par un changement hormonal (au moment des règles, lors de la grossesse, lors d'un changement de contraception œstroprogestative, lors d'un stress, d'un voyage) ou par un traitement antibiotique.

Certains germes peuvent alors être en concentration plus importante et être responsables de symptômes comme la mycose (*Candida* en proportion plus importante) ou la vaginose bactérienne (flore polymicrobienne).

Ce ne sont pas des pathologies sexuellement transmissibles ! La présence de ces germes est commensale et il ne faut traiter qu'en présence de symptômes.

### Diagnostic

#### Clinique

Leucorrhées grisâtres, malodorantes (odeur de «poisson pourri»), sécrétions adhérentes à la paroi du vagin sur sa partie inférieure et bulleuses au niveau du col.

#### Biologique

Prélèvement vaginal : prolifération bactérienne importante à l'examen direct (La concentration bactérienne atteint  $10^9$  à  $10^{12}$  bactéries/g de sécrétions : 10 à 1000 fois la concentration normale). Les germes retrouvés sont le plus souvent : *Gardnerella vaginalis*, les bactéries anaérobies, *Streptococcus viridans*, *Mycoplasma homi-*

*nis*, et *Atopobium vaginae*  $\pm$  ; disparition des lactobacilles (score de Nugent 7 à 10).

### Traitement

**Métronidazole (FLAGYL)** local : 1 ovule/j pendant 10 j (le soir au coucher)  
ou systémique **métronidazole (FLAGYL)** per os : 500 mg x 2/j pendant 7 j ou 2 g/j en prise unique  
ou **secnidazole (SECNOL)** per os 2 g (1 sach.) en prise unique.

La vaginose doit être recherchée et traitée chez la femme enceinte en cas d'antécédent de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré ou en cas d'écoulement vaginal pathologique.

### Mycoplasme

Trois types peuvent être retrouvés dans le tractus génital.

– 2 dont la pathogénicité est remise en question : *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum*. À traiter *a priori* seulement chez les couples infertiles (traitement identique à celui de *Chlamydia*) ;

– 1 pathogène : *Mycoplasma genitalium* ; pathogénicité semblable à celle de *Chlamydia trachomatis*. Traitement identique à celui de *Chlamydia* (diagnostic par PCR).

### Chez la femme ménopausée

L'atrophie vaginale et l'ambiance hormonale de la femme ménopausée peuvent favoriser le déséquilibre de la flore hormonale.

Une œstrogénothérapie locale peut aider à rétablir un environnement vaginal équilibré : **promestriène (COLPOTROPHINE)** ou **TROPHIGIL**.

## HERPÈS GÉNITAL (1)

### Primo-infection [1]

Le diagnostic se fait par un prélèvement des lésions vulvaires avec recherche d'HSV.

- Traitement antiviral *per os* pendant 10 j par **aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5 /j ou **valaciclovir (ZELITREX)** 500 mg x 2/j.

- Le traitement antiviral local n'a pas fait la preuve de son utilité clinique.

- **Antalgiques**, parfois usage des **morphiniques**.

### Récurrence [1]

Elles sont souvent frustes, parfois asymptomatiques et régressives sans traitement.

#### Si la récurrence est symptomatique

- Le traitement antiviral local n'a pas fait la preuve de son utilité clinique.

- Traitement antiviral *per os* : accélérerait la guérison de 1 ou 2 j, ne diminuerait pas

la durée de la douleur ; traitement justifié en cas de gêne ressentie ou s'il existe un risque de contamination. **Aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5 /j pendant 5 j ou **valaciclovir (ZELITREX)** 500 mg/j pendant 5 j.

**Antalgiques** .

#### Si les récurrences sont fréquentes (> 6 poussées/an)

Traitement antiviral en continu par **aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5/j ou **valaciclovir (ZELITREX)** 500 mg x 2/j pendant 6 mois au moins. Effet suspensif du traitement.

L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible; la transmission se fait principalement lors des poussées mais attention les symptômes peuvent être frustes lors des récurrences. Encourager la pratique de rapports sexuels protégés.

## HERPÈS GÉNITAL (2)


### Herpès et grossesse [1]

C'est une infection grave responsable d'herpès néonatal disséminé en cas de poussée proche du terme.

- Primo-infection plus d'un mois avant l'accouchement : traitement antiviral *per os* pendant 10 j par **aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5/j puis en continu à partir de 36 SA jusqu'à l'accouchement.

- Primo-infection moins d'un mois avant l'accouchement : traitement antiviral *per os* jusqu'à l'accouchement par **aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5/j.
- Récurrence herpétique : traitement antiviral *per os* pendant 10 j par **aciclovir (ZOVIRAX 200)** 1 cp. x 5/j.
- Remarque : 2/3 des enfants atteints d'herpès néonatal sont nés de mères sans notion d'herpès génital.

### Herpès génital et grossesse



### CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'herpès cutanéomuqueux chez le sujet immunocompétent, HAS, 2001

## PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (1)

### Le papillomavirus

Il existe environ 40 types de papillomavirus impliqués dans la pathologie génitale chez l'Homme.

Ils sont responsables de lésions bénignes : les condylomes (« verrues génitales ») et de lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, du vagin et de la région vulvo-anale.

Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Le port du préservatif en réduit la transmission mais les lésions non recouvertes par le préservatif sont contagieuses au contact de la peau.

### Prévention primaire : vaccination

Deux vaccins existent en France :

– le **GARDASIL** : il protège contre les virus 6 et 11 (90 % des condylomes) et 16 et 18 (70 % des lésions précancéreuses et cancéreuses) ;

– le **CERVARIX** : il protège contre les virus 16 et 18.

Vaccination des filles à partir de 9 ans et au plus tard dans la première année qui suit le début des rapports sexuels.

Il ne dispense pas du suivi régulier par frottis tous les 2 ans car d'autres virus

peuvent être responsables de lésions précancéreuses et cancéreuses.

### Condylomes

Les HPV 6 et 11 sont responsables de 90% des condylomes. Lésions récidivantes, contagieuses, plus ou moins étendues.

- En cas de lésions peu nombreuses : traitement à domicile par la patiente par **imiquimod (ALDARA)** crème 5 % 1 application x 3/sem. le soir au coucher, lavage le lendemain matin (exposition 6-10 h) jusqu'à disparition des lésions ; au max pendant 16 semaines.

- Jusqu'à 10-15 lésions : cryothérapie ou **podophylotoxine**.

- En cas de condylomes diffus : électrocoagulation ou laser sous anesthésie locale ou générale (cf. Infections sexuellement transmissibles en dermatologie).

### Lésions précancéreuses : dysplasie cervicale

#### Prévention secondaire : frottis cervicovaginal

À réaliser tous les 3 ans à partir de la première année suivant le début des rapports sexuels, de 25 à 65 ans.

### Conduite à tenir en fonction des résultats du frottis

Résultats du frottis (classification de Bethesda)	Choix d'explorations complémentaires
Normal	Frottis dans 3 ans
ASC-US : <i>Atypical Squamous Cells of Unknown Significance</i>	Frottis à 6 et 12 mois ou test HPV ou colposcopie
ASC-H : <i>Atypical Squamous Cells evocating High grade lesions</i>	Colposcopie
AGC : <i>Atypical Glandular Cells</i>	Colposcopie avec curetage de l'endocol ; échographie pelvienne ± biopsie de l'endomètre
L-SIL : <i>Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions</i>	Frottis à 6 mois et 1 an ou colposcopie
H-SIL : <i>High-grade Squamous Intraepithelial Lesions</i>	Colposcopie

## VACCIN CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN

## ■ Vaccin Papillomavirus humain

<b>GARDASIL</b>					
3 doses de 0,5 mL à 0, 2 et 6 mois	1 ser. préempl. 0,5 mL	123,44	I	65 %	123,44
<b>CERVARIX</b>					
3 doses à 0, 1 et 6 mois	1 ser. préempl. 0,5 mL	111,52	I	65 %	111,52

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin recombinant préparé à partir de pseudo-particules virales hautement purifiées de la principale protéine L1 de la capsid des HPV de types 6, 11, 16 et 18 pour **GARDASIL** et 16 et 18 pour **CERVARIX**.

**INDICATIONS**

**GARDASIL** : prévention des dysplasies de haut grade du col de l'utérus (CIN 2/3), des cancers du col de l'utérus, des dysplasies de haut grade de la vulve (VIN 2/3) et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux *Papillomavirus* humains de types 6, 11, 16 et 18.

**CERVARIX** : prévention des dysplasies de haut grade du col de l'utérus (CIN 2/3), des cancers du col de l'utérus, des dysplasies de haut grade de la vulve (VIN 2/3) et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux *Papillomavirus* humains de types 16 et 18.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au produit.

L'administration d'un vaccin doit être différée chez les individus souffrant d'une maladie fébrile aiguë sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les mesures de précaution appropriées vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles doivent être poursuivies.

La vaccination ne remplace pas les tests de dépistage de routine du cancer du col de l'utérus.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fièvre.

Au site d'injection : érythème, douleur, gonflement, prurit.

**Grossesse** : aucun événement indésirable grave n'a été détecté lors de l'administration de **GARDASIL/CERVARIX** pendant la grossesse ; les données sont insuffisantes pour en recommander l'utilisation dans ce contexte. La vaccination doit ainsi être reportée après le terme de la grossesse. Il n'y a pas d'indication d'interruption de grossesse en cas d'administration de **GARDASIL/CERVARIX** pendant la grossesse.

## PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (2)


### Prévention tertiaire : traitement des dysplasies cervicales

L'enjeu est de traiter les lésions susceptibles d'évoluer vers un cancer tout en évitant les

complications chez les femmes jeunes en âge de procréer (les conisations augmentent le risque de fausse couche tardive et d'accouchement prématuré et les infertilités d'origine cervicale).

#### ► CIN1 [1]

#### Conduite à tenir face à une néoplasie intra-épithéliale cervicale de grade 1



**PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (3)**► **CIN2**

Traitement conservateur par vaporisation laser si la femme est jeune (< 30 ans), si les lésions sont peu étendues, si la jonction est bien vue en colposcopie et si les impressions colposcopiques et les résultats du frottis sont concordants.

En cas d'élément péjoratif, il est conseillé de réaliser une conisation pour ne pas

méconnaître une lésion de plus haut grade.

► **CIN3**

Conisation.

**Surveillance après traitement**

- Frottis et test HPV à 6 mois et 18 mois puis tous les ans, à compléter par une colposcopie si l'un des tests est pathologique.


**CONSENSUS**

[1] Prévention du cancer du col de l'utérus - Recommandations pour la pratique clinique, CNGOF, 2007

**SALPINGITE (1)****Diagnostic**

Il existe deux formes de salpingite : la salpingite aiguë symptomatique et une forme «subaiguë» pauci- ou asymptomatique.

Il faut savoir y penser systématiquement lors de douleurs pelviennes et surtout chez la femme jeune en âge de procréer. Il faut recourir facilement au prélèvement vaginal à la recherche de *Chlamydia* chez la femme jeune.






**SALPINGITE (2)****Traitement antibiotique**

Il repose sur une antibiothérapie et un traitement antalgique (antalgiques adaptés au niveau de la douleur).

Le traitement est ambulatoire/hospitalier *per os*/intraveineux en fonction de la gravité des symptômes.




## SALPINGITE (3)

### Conduite à tenir

Il faudra avoir recours à la coelioscopie en urgence s'il existe une suspicion de complication (abcès, pelvipéritonite) et à moyen terme, elle sera discutée si la femme est jeune et si des symptômes persistent.

Toujours penser aux prélèvements bactériens ; adapter l'antibiothérapie en fonction des résultats ; penser aussi au dépistage et à la prévention des autres infections sexuellement transmissibles.



### Complications

#### À court terme

Abcès, pelvipéritonite.

#### À long terme

Maladie inflammatoire du péritoine :

- douleurs chroniques ;

- altération des trompes, adhérences :


- infertilité,
- grossesse extra-utérine,
- hydrosalpinx.

**CONTRACEPTION (1)**

Toute méthode contraceptive doit être simple, efficace, bien tolérée et réversible [1] [2].

La bonne méthode de contraception est celle qui convient à la femme (bonne tolé-

rance, pas d'oubli, pas d'échec) ; il existe un très grand nombre de méthodes contraceptives et il faut aider la femme à choisir le mode de contraception qui lui convient.

**Les différentes méthodes contraceptives**

## ESTROPROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (1) – CONTRACEPTIFS DE 2<sup>E</sup> GÉNÉRATION

### Voie orale

#### ■ Éthinylestradiol + lévonorgestrel

<b>LEELOO</b>					
1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt pendant 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>lévo.</b> 100 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>MINIDRIL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>lévo.</b> 150 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>ADÉPAL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>lévo.</b> 150-200 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>TRINORDIOL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>lévo.</b> 50-75-125 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>LOVAPHARM</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>lévo.</b> 150 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>OPTILOVA</b>					
1 cp./j en continu (7 cp. inactifs)	28 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>lévo.</b> 100 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,09</b>

#### ■ Éthinylestradiol + norgestrel

<b>STÉDIRIL</b>					
Contraception classique : cures de 1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt de 7 j	21 cp. <b>éthín.</b> 50 µg + <b>norg.</b> 0,5 mg	<b>1,90</b>	I	65 %	<b>0,09</b>

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

### Voie transdermique

#### ■ Éthinylestradiol + norelgestromine

<b>EVRA</b>					
1 pch./sem. pdt 3 sem. et 1 sem. sans pch. puis reprise	3 pch. 33,9 µg/ 203 µg/24 h		I	NR	
À appliquer sur peau sèche et saine (éviter les seins)	9 pch. 33,9 µg/ 203 µg/24 h		I	NR	

### Voie vaginale

#### ■ Éthinylestradiol + étonogestrel

<b>NUVARING</b>					
1 dispositif vaginal posé par la femme pdt 3 sem. retiré 1 sem. et nouveau pch. au 8 <sup>e</sup> j	1 anneau vaginal 15 µg/120 µg/24 h		I	NR	
	3 anneau vaginal 15 µg/120 µg/24 h		I	NR	

**CONTRACEPTION (2)****Efficacité des différentes méthodes contraceptives**

Efficacité	Méthode	Taux de grossesses (%) au cours des 12 premiers mois d'utilisation	
		En pratique courante	En utilisation optimale
Toujours très efficace	Implants	0,1	0,1
	DIU	0,8	0,6
	Pilules progestatives pures (au cours de l'allaitement)	1	0,5
Efficace dans son emploi courant	Méthode de l'aménorrhée lactationnelle	2	0,5
	Contraception orale œstroprogestative	6-8	0,1
	Pilules progestatives pures (en dehors de l'allaitement)		0,5
Faible efficacité lors de son emploi courant	Préservatifs masculins	14	3
	Préservatifs féminins	21	5
	Diaphragmes et spermicides	20	6
Spermicides		26	6
Méthodes naturelles		20	1-9

**CONSENSUS**

[1] Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme, HAS, 2004

[2] Commission de la transparence - Réévaluation des contraceptifs oraux de 3<sup>e</sup> génération, HAS, 2007

## CONTRACEPTION NON HORMONALE (1)

### Contraception locale

L'efficacité de ces méthodes est très variable, liée à une bonne compréhension de la méthode et à une utilisation régulière.

### Préservatifs

Il s'agit de la seule prophylaxie contre les IST, notamment le sida (en dehors de l'abstinence).

- Une situation estimée à risque du fait de l'existence de plusieurs partenaires, de l'évocation de relations occasionnelles ou de l'absence de relation stable (notamment chez l'adolescente) doit conduire le professionnel de santé à recommander l'utilisation de cette méthode contraceptive, en complément ou non d'une autre méthode médicale.
- Contraception par effet mécanique.
- La seule contre-indication est l'allergie au latex.
- Le préservatif féminin existe également. Plus solide que les préservatifs masculins

classiques, il protège de plus le méat urétral des infections ascendantes.

### Diaphragme, cape cervicale

- Contraception par effet mécanique.
- À utiliser en association avec un produit spermicide.
- Les contre-indications sont l'allergie au latex ou aux spermicides et les infections cervicovaginales.

### Spermicides

- Attention : ils ne sont pas efficaces dans la prévention des IST.
- Ils existent en crèmes, en ovules, ou en comprimés.
- La seule contre-indication est l'hypermensibilité aux différents produits.

### Dispositifs intra-utérins

Le DIU est une autre méthode contraceptive de 1<sup>re</sup> intention, considérée comme toujours très efficace, qui présente l'avantage d'une longue durée d'action et pour laquelle aucun risque cancéreux ou cardiovasculaire n'est établi.

**DISPOSITIFS INTRA-UTÉRINS (DIU)**■ **DIU au cuivre**

<b>TT 380</b>					
À changer tous les 10 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>UT 380</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif short	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif standard	30,50		65 %	30,50
<b>NT 380</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif short	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>GYNELLE</b>					
À changer tous les 4 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>MULTILOAD</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>MONA LISA</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif Cu 375	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif Cu 375 SL	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif NTCu375	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif CuT 380A QL	30,50		65 %	30,50
À changer tous les 10 ans					

■ **DIU hormonal**

<b>MIRENA</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif	125,15	I	65 %	125,15

## CONTRACEPTION NON HORMONALE (2)

### Contre-indications

- Antécédents ou existence de pathologies utérines endocavitaires (malformation, néoplasie, endométrite, fibrome ou polype gênant son insertion).
- Hémorragie génitale non explorée.
- Pathologie tubaire.
- Risque élevé d'infection génitale haute (IST à répétition, infection génitale haute en cours, datant de moins de 3 mois ou récurrente, infection génitale en post-partum, avortement septique, partenaires multiples).
- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Grossesse suspectée ou avérée.
- Post-partum (entre 48 h et 4 sem. [d'après l'OMS]).
- Contre-indications des microprogestatifs pour le **MIRENA**.
- Maladie de Wilson pour le stérilet au cuivre.

### DIU au cuivre ou au lévonorgestrel (LNG) ?

Compte tenu de la moins bonne tolérance et du coût plus élevé du DIU au LNG par rapport au DIU au cuivre, il est recommandé de ne privilégier le DIU au LNG qu'en cas de bénéfice complémentaire attendu, par ex. en cas de ménorragies fonctionnelles (après recherche et élimination de causes organiques décelables) ou de dysménorrhées importantes.

### En contraception d'urgence : DIU au cuivre

Taux d'échec de 0,1 à 0,2 % (quel que soit le moment du cycle) et avec un délai de

pose possible jusqu'à 5 j après la date estimée de l'ovulation.

### Prescription du DIU

- Les risques de grossesse, de pathologie infectieuse et de GEU doivent être écartés.
- En présence de facteurs de risque infectieux des tests diagnostiques portant sur *C. trachomatis* et *N. gonorrhoea* sont recommandés avant la pose.
- La pose est précédée d'un examen gynécologique bimanuel afin d'estimer la taille, la forme et la position de l'utérus, et si possible d'une hystérométrie.
- Hors problème signalé par la consultante, les consultations de suivi gynécologique sont programmées 1 à 3 mois après la pose puis 1 fois par an. L'objectif de la 1<sup>re</sup> consultation de suivi est de s'assurer que le DIU est bien toléré, qu'il n'a pas été expulsé et que sa pose n'a pas provoqué d'inflammation pelvienne.

L'examen clinique peut être complété par une échographie en cas de doute.

### Contraception définitive : stérilisation

- Chez la femme :
  - ligature des trompes par coelioscopie (clips, coagulation-section) ;
  - dispositif intratubaire (ESSURE) posé par hystéroscopie avec ou sans anesthésie.
- Chez l'homme : vasectomie (section du canal déférent).
- Considérée comme irréversible.
- Interdite chez les mineures.
- Délai de réflexion de 4 mois.
- Information +++.



## ENDOMÉTRIOSE (1)

Il s'agit de tissu endométrial ectopique entraînant des douleurs pelviennes cycliques, puis chroniques et pouvant être responsable de troubles de la fertilité.

Macroscopiquement, on distingue trois formes d'endométriose :

- le kyste endométriosique de l'ovaire ;
- l'endométriose péritonéale superficielle ;
- l'endométriose sous-péritonéale profonde : lésions d'endométriose qui infiltrant le rétropéritoine ou les viscères (rectum, vagin, utérus, vessie, uretère, intestin grêle, etc.).

Il n'y a pas d'indication à traiter une endométriose asymptomatique (ni douleur, ni infertilité, ni masse pelvienne) [1].

### Cœlioscopie

Elle est :

- diagnostique ;
- pronostique (stades : score de l'*American Fertility Society*) ;
- thérapeutique.

Elle permet de pratiquer l'ablation des noyaux d'endométriose et de rétablir une anatomie compatible avec la fécondation :

- destruction de lésions par électrocoagulation ou laser ;
- kystectomie ;
- plastie tubaire ;
- adhésiolyse.

En cas de cœlioscopie réalisée dans le cadre de l'urgence (suspicion de salpingite, de torsion d'annexe ou de complication de kyste), la chirurgie d'exérèse des lésions d'endométriose de découverte péropératoire n'est pas recommandée [1],

l'étendue des lésions (profondes) devant être au préalable évaluée par des examens complémentaires (IRM, rectoscopie, cystoscopie).

### Prise en charge d'une endométriose douloureuse [1]

La prise en charge psychologique des patientes souffrant de douleurs pelviennes chroniques améliore les résultats du traitement.

#### Traitement médical

- Effet suspensif sur les douleurs et sur la maladie.
- Le diagnostic d'endométriose doit autant que possible être confirmé histologiquement ou chirurgicalement avant de mettre en œuvre un traitement prolongé.
- Il s'agit d'un traitement médical hormonal visant à l'obtention d'une aménorrhée (contraceptifs œstroprogestatifs monophasiques en continu, progestatifs, **danazol** ou **analogues de la GnRH**).
- Dans tous les cas, le recours à des **antalgiques** peut être utile. Les **antalgiques de niveau III** peuvent être utilisés dans les formes hyperalgiques.
  - **Endométriose peu évoluée**
  - Douleurs cycliques mensuelles en dehors d'un besoin de contraception : **AINS** ayant l'AMM « dysménorrhée » dans les périodes douloureuses. Ex. : **acide méfénamique (PONSTYL)** 2 gél. à 250 mg x 3/j ou **ibuprofène (BRUFEN)** 400 mg à renouveler si besoin, max. 1 600 mg/j.
  - Dans les autres cas : progestatif à dose antigonadotrope ou contraception œstroprogestative monophasique en continu.

**PROGESTATIFS DE SYNTHÈSE (1)****Dérivé de la 17-alpha-hydroxyprogestérone (noyau prégnane)****■ Chlormadinone**

<b>LUTÉRAN</b>					
Endométriose : 10 mg/j en continu	10 cp. 2 mg	1,25	I	65 %	0,13
Ménométrorragies : du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)	10 cp. 5 mg	2,25	I	65 %	0,23
Ménopause : 10 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique	12 cp. 10 mg	3,69	I	65 %	0,31

**Dérivé de la 17-méthylprogestérone (noyau prégnane)****■ Médrogestone**

<b>COLPRONE</b>					
Endométriose : 5 à 10 mg/j en continu.	20 cp. 5 mg	4,41	I	65 %	
Ménométrorragies : 5 à 10 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)					
Ménopause : 5 à 10 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique					

**Dérivés de la 19-norprogestérone (noyau prégnane)****■ Nomégestrol**

<b>LUTÉNYL</b>					
Endométriose : 5 mg/j en continu	10 cp. 5 mg	5,08	I	65 %	0,51
Ménométrorragies : 5 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)					
Ménopause : 5 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique					

**■ Promégestone**

<b>SURGSTONE</b>					
Endométriose : 0,125 à 0,5 mg/j en continu	10 cp. 0,125 mg	3,38	I	65 %	
	10 cp. 0,25 mg	5,37	I	65 %	0,54
Fibrome, insuffisance lutéale : 0,125 à 0,5 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)	10 cp. 0,5 mg	8,25	I	65 %	0,82
Ménopause : 0,125 à 0,5 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique	12 cp. 0,5 mg	9,80	I	65 %	0,82

## ENDOMÉTRIOSE (2)

### ► Endométriose profonde

- Le traitement est instauré pour un minimum de 3 mois.

- Les progestatifs à dose antgonadotrope sont le plus souvent recommandés en première intention. Ex. :

- **acétate de chlormadinone (LUTÉ-  
NYL)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois ;

- **acétate de nomégestrol (hors AMM) (LUTÉ-  
NYL)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois ;

- **médrogestone (COLPRONE)** 1 à 3 cp./j du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j ou traitement continu ;

- **promégestone (hors AMM) (SURGES-  
TONE)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois.

- La prescription des **analogues de la GnRH** ne devrait pas être prolongée au-delà de 1 an (AMM). Ex. : **triptoréline (DÉCA-  
PEPTYL LP)** 1 inj. IM/4 à 6 sem. pendant 6 mois.

- À la fin du traitement par **agonistes de la GnRH**, un relais par progestatifs à doses antgonadotropes peut être proposé.

### Traitement chirurgical

Il vise l'exérèse des foyers d'endométriose.

- En cas d'exérèse complète :

- un traitement médical complémentaire par progestatifs à dose antgonadotrope pour augmenter l'intervalle libre sans douleur est à discuter ;

- un traitement complémentaire par **analogues de la GnRH** n'est pas recommandé.

- En cas d'exérèse suboptimale, un traitement médical complémentaire est recommandé.

### Prise en charge de l'infertilité liée à l'endométriose

- Dans le cadre d'un bilan d'infertilité, il est recommandé de recourir d'emblée à la coelioscopie en cas de suspicion clinique ou échographique d'endométriose.

- Lorsqu'une coelioscopie est réalisée, le traitement chirurgical des lésions, s'il est possible, est recommandé pour améliorer la fertilité.

- Si la coelioscopie découvre des lésions extensives pour lesquelles la chirurgie expose à un risque élevé de complications, le recours direct à la FIV sans geste chirurgical est recommandé.

- Après une chirurgie satisfaisante chez une patiente ne présentant pas d'autres facteurs négatifs, il est recommandé de respecter un délai d'attente de 6 à 12 mois avant de proposer une nouvelle thérapeutique ; ce délai est à moduler en fonction de l'âge de la patiente et des autres facteurs d'hypofertilité.

- La chirurgie itérative n'est pas recommandée pour la seule raison d'une infertilité persistante après la chirurgie.

- Les endométriomes n'ont pas d'impact sur le résultat final d'une FIV. Pour les endométriomes de moins de 6 cm, ni le traitement chirurgical itératif ni leur ponction ne sont recommandés avant la FIV.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'endométriose, CNGOF, 2006

## FIBROME (1)

### Les fibromes qui ne doivent pas être traités [1]

Un fibrome asymptomatique (n'entraînant ni saignement, ni douleur, ni compression) et mesurant moins de 10 cm ne justifie aucune prise en charge médicale en dehors du cas de la femme infertile.

Ce type de fibrome ne nécessite pas de surveillance supplémentaire, ni clinique, ni par imagerie.

En revanche, un fibrome de plus de 10 cm se doit d'être surveillé annuellement au moins cliniquement et avec échographie pelvienne au moindre doute.

Des explorations complémentaires (IRM, biopsie d'endomètre) voire une intervention chirurgicale seront nécessaires si le fibrome augmente de taille ou s'il présente des caractères suspects.

### Place du traitement médical [1]

#### Méno/métrorragies liées au fibrome

- Le **fibrome sous-muqueux** ne relève jamais d'un traitement médical mais représente toujours une indication chirurgicale, indépendamment de l'état endométrial.

- Dans le cas d'un **fibrome interstitiel** provoquant un saignement :

- un traitement par progestatif de synthèse peut être indiqué. Il a pour but de traiter l'hyperplasie endométriale associée au fibrome et responsable du saignement.

Il ne réduit pas la taille du fibrome et n'empêche pas sa croissance. Ex. : **nomégestrol (LUTENYL)** 1 cp./j du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle ou du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j si effet contraceptif désiré ; l'utilisation en continu n'a pas été évaluée.

- l'utilisation du **MIRENA** peut diminuer les saignements.

- au cours du saignement, l'**acide tranexamique**, un **antifibrinolytique**, peut être prescrit. Ex. : **EXACYL** 500 mg 2 cp. x 3/j pendant 5 à 10 j ;

En préopératoire :

- agoniste de la GnRH** :

- indiqué dans le traitement préopératoire des fibromes en cas d'anémie ( $Hb \leq 8$  g/dL) associée au fibrome et/ou dans le cas où une réduction de la taille du fibrome est nécessaire pour faciliter ou modifier la technique opératoire,

- la réduction du volume apparaît au bout de 6 à 8 sem.,

- la durée maximale de traitement recommandée est de 3 mois. Ex. : **triptoréline (DÉCAPEPTYL LP)** 1 inj. IM/4 sem.,

- l'adjonction de **tibolone** permet de diminuer les effets indésirables de l'**analogue de la GnRH** (bouffées de chaleur et autres symptômes de la déplétion œstrogénique) sans diminuer l'efficacité de celle-ci sur les fibromes. L'utilisation d'un traitement substitutif par œstrogènes et progestérone n'est pas recommandée car il diminuerait l'efficacité de l'**agoniste de la GnRH** ;

- traitement martial en cas d'anémie.

#### Nécrobiose aseptique du fibrome

Responsable de douleurs pelviennes paroxystiques souvent intenses et d'un fébricule.

Favorisée par la grossesse.

Le traitement est un traitement antalgique. Ex. : **acide niflumique (NIFLURIL)** 1 à 2 gél. x 3/j (attention en cas de grossesse : utilisation très restreinte et interdite au troisième trimestre de la grossesse) et **paracétamol (DAFALGAN)** 1 à 2 gél. x 3/j ; voire passage aux **antalgiques** par voie intraveineuse ou de classe III.

Les antibiotiques ne sont pas indiqués en l'absence de surinfection.

## FIBROME (2)

### Place du traitement chirurgical [1]

#### Myomes sous-muqueux

L'intervention est justifiée en cas de symptômes (ménométrorragies) mais également en cas d'infertilité.

La résection hystéroscopique se fera dans de bonnes conditions si :

- le diamètre du fibrome est inférieur ou égal à 4 cm ;
- le fibrome est de type 0, 1 ou 2 (entièrement intracavitaire, > 50 % intracavitaire ou < 50 % intracavitaire respectivement) ;
- il existe une épaisseur de myomètre d'au moins 5 mm en arrière du fibrome.

Entre 4 et 6 cm le fibrome peut être traité par hystérocopie, éventuellement en plusieurs interventions.

En cas d'infertilité, le traitement du myome intracavitaire augmente les chances de grossesse, son traitement est donc indiqué même en l'absence de ménométrorragies.

Il est recommandé d'utiliser alors une énergie bipolaire, des traitements anti-adhérentiels et de réaliser une hystérocopie diagnostique après un cycle pour diagnostiquer et de traiter d'éventuelles synéchies.

#### Myomes sous-séreux et interstitiels

##### ► Traitement chirurgical conservateur

- L'indication du traitement conservateur des fibromes est guidée par le désir de la patiente de préserver sa fertilité.

##### • Indications

- myomes sous-séreux pédiculés tordus ;
- myomes comprimant les organes de voisinage avec retentissement ;
- utérus myomateux volumineux responsable de pesanteur pelvienne ;
- utérus myomateux associé à des ménométrorragies fonctionnelles résistantes au traitement médical.

- En cas d'infertilité, il peut être discuté de retirer un fibrome interstitiel déformant la cavité ; il faut mettre en balance les adhérences que peuvent entraîner la myomectomie et les bénéfices escomptés.

- Deux voies d'abord : la laparotomie et la coelioscopie (si nombre de myomes  $\leq 2$  et diamètre des myomes  $\leq 8$  cm).

##### ► Traitement chirurgical radical

En préménopause ou après la ménopause (à partir de 45 ans) c'est le traitement de choix car en cas de traitement conservateur il y a un risque de récurrence non négligeable.

Voies d'abord : laparotomie, voie vaginale, coelioscopie.

### Place du traitement par embolisation [1]

L'embolisation peut être une alternative à la chirurgie :

- en l'absence de désir de grossesse ;
- à l'exclusion des fibromes intracavitaires type 0 et 1 et des fibromes sous-séreux pédiculés.

**FIBROME (3)****Situations particulières [1]****Fibrome et grossesse**

Le fibrome peut entraîner des complications lors d'une grossesse (fausse couche spontanée, douleurs, troubles de la placentation, présentations dystociques, retard de croissance, accouchement prématuré, hématome rétro-péritonéal, hémorragie du post-partum). Il n'existe pas de donnée indiquant que la myomectomie diminue ces complications. Il n'est donc pas recommandé pour l'instant de traiter les fibromes asymptomatiques chez une patiente désireuse d'une grossesse. Il n'existe pas plus de complications lorsque la myomectomie est réalisée au cours de la césarienne, celle-ci n'est donc pas contre-indiquée.

**Fibrome et traitement hormonal**

Il n'y a pas aujourd'hui d'argument dans la littérature pour penser que la contraception orale favorise l'apparition des myomes utérins ou leur croissance. Le fibrome utérin ne représente donc pas une contre-indication à la contraception orale.

Seuls les myomes sous-muqueux sont une contre-indication aux dispositifs intra-utérins.


Le traitement hormonal substitutif de la ménopause peut entraîner la croissance des fibromes après la ménopause, mais ne semble pas entraîner de symptômes cliniques. Le fibrome n'est donc pas une contre-indication à l'instauration d'un THM.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge des fibromes, CNGOF, 1999

## FIBROME (4)

## Prise en charge des fibromes



## PRÉMÉNOPAUSE

Cette période est caractérisée par une insuffisance lutéale avec hyperœstrogénie relative.

Ce dérèglement hormonal peut être à l'origine de troubles fonctionnels à type :

- d'irrégularité menstruelle ;
- d'augmentation de la taille des fibromes utérins ;
- de ménométorragies ;
- d'œdème cyclique ;
- de tension mammaire, mastodynies.

Toujours rechercher une cause organique aux symptômes avant d'instaurer un traitement symptomatique.

En cas de signes fonctionnels, le traitement repose sur les progestatifs qui diminuent l'insuffisance lutéale et ainsi l'hyperœstrogénie relative ; ils ont un rôle immédiat mais aussi préventif des complications ultérieures.

### Absence de pathologie et pas de contraception désirée

**Progestatifs naturels ou de synthèse** en 2<sup>e</sup> partie de cycle.

Ex. : **progestérone (UTROGESTAN)** 2 caps./j du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle.

Ex. : **chlormadinone (LUTÉLAN)** 1 cp./j du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j.

### Absence de pathologie et désir de contraception

**Progestatifs de synthèse** pendant tout le cycle.

Ex. : **chlormadinone (LUTÉLAN)** 1 cp./j du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du cycle.

### Présence de pathologie

S'il existe une pathologie sensible à l'hyperœstrogénie relative (fibromes utérins, hyperplasie de l'endomètre, mastopathie bénigne) : progestatifs de synthèse plus puissants pendant la 2<sup>e</sup> partie du cycle ou tout le cycle si nécessaire.

Ex. : **nomégestrol (LUTÉNYL)** 2 cp./j du 16<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j, ou du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j.

### En cas de mastodynies

**Progestatifs** locaux.

Ex. : **progestérone** à 1 % (**PROGESTOGEL**) 1 mes./j sur chaque sein.

On interrompt le traitement par progestatif dès l'aménorrhée qui signe l'installation de la ménopause.



## MÉNOPAUSE (1)

Le diagnostic est clinique (absence de cycle menstruel pendant 1 an) dans la majorité des cas ; il a besoin d'être conforté par des dosages hormonaux dans moins de 10 % des cas.

### Risques associés à la prise d'un traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM) [1]

- Il existe un sur-risque :
  - de cancer du sein ; il augmente avec la durée du traitement. Pas de différence en fonction de la voie d'administration (orale, cutanée), ni en fonction du schéma d'administration (séquentiel ou continu). Néanmoins, le dernier consensus [2] affirme que le risque lié au THM reste faible et diminue à l'arrêt du traitement ;
  - de cancer de l'endomètre lorsque les œstrogènes sont utilisés seuls. Ce risque est diminué en cas d'utilisation séquentielle des progestatifs et annulé en cas d'utilisation continue des progestatifs ;
  - coronarien et cérébrovasculaire (pas de variation en fonction de la durée de traitement) ;
  - de maladie veineuse thromboembolique.
- Le THM n'entraîne pas de protection vis-à-vis du déclin cognitif et de la démence.

### Quel est le rapport bénéfice/risque du THM ? [1]

#### Dans le traitement des troubles climatiques (bouffées de chaleur)

Le rapport bénéfice/risque du THM est favorable lorsque les troubles du climatère perçus par la patiente sont suffisamment gênants pour altérer sa qualité de vie. Le traitement peut être instauré si la femme le souhaite, à la dose minimale efficace, pour une durée la plus courte possible.

#### Dans le traitement de l'ostéoporose

Dans la prévention du risque fracturaire, le rapport bénéfice/risque du THM, quel que soit le produit envisagé, est défavorable sur la base des données actuellement disponibles. L'administration d'un THM pourra être envisagée chez la femme ménopausée qui a un risque élevé de fractures :

- lorsque la patiente présente des troubles du climatère qu'elle perçoit comme altérant sa qualité de vie ;
- lorsque la patiente présente une intolérance à un autre traitement indiqué dans la prévention de l'ostéoporose et après une évaluation individuelle précise et soignée du rapport bénéfice/risque.

**ŒSTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE ORALE (1)**■ **Estradiol 17 bêta (per os)**

<b>ESTROFEM</b>					
1 cp./j pdt 25 j/mois	28 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg		II II	NR NR	
<b>PROVAMES</b>					
1 à 2 mg/j pdt 25 j/mois	30 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg	2,50 2,50	II II	65 % 65 %	0,08 0,09
<b>OROMONE</b>					
1 cp./j pdt 25 j/mois	28 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg	2,50 2,50	II II	65 % 65 %	0,09 0,09
<b>PROGYNOVA</b>					
2 mg/j pdt 20 j/mois	20 cp. 1 mg 20 cp. 2 mg 60 cp. 2 mg		II II II	NR NR NR	
<b>ESTREVA</b>					
1 cp./j pdt 28 j/mois	28 cp. 1,5 mg	2,50	II	65 %	0,09

■ **œstrogènes conjugués**

<b>PHYSIOGINE</b>					
1/2 à 1 cp./j pdt 28 j/mois	30 cp. séc. 1 mg	5,37	II	30 %	0,18

## MÉNOPAUSE (2)

### Règles de prescription d'un THM [1]

- Une information objective sur les bénéfices escomptés et les risques encourus lors de la prise du THM doit être fournie à la patiente.
- Contre-indications absolues :
  - antécédent personnel de cancer du sein ;
  - antécédent personnel de tumeur œstrogéno-dépendante ;
  - antécédent personnel de maladie coronarienne ;
  - antécédent personnel d'accident vasculaire cérébral ;
  - antécédent personnel de maladie veineuse thromboembolique ;
  - antécédent personnel d'accident thromboembolique artériel ;
  - haut risque cardiovasculaire ;
  - hémorragie génitale sans diagnostic étiologique établi ;
  - affection hépatique aiguë ou chronique.
- En cas de prescription ou de renouvellement d'un THM, il n'est recommandé aucune surveillance particulière autre que le bilan cardiovasculaire d'usage et la palpation des seins.
- Il est recommandé de surveiller régulièrement le risque cardiovasculaire, ce qui inclut la recherche des facteurs de risque traditionnels (pression artérielle, cholestérol total et HDL, glycémie, tabagisme), et de traiter ces éventuels facteurs de risque.
- Les femmes doivent être incitées à participer régulièrement au dépistage organisé du cancer du sein par mammographie, notamment en début de traitement. L'augmentation de densité mammaire peut cependant gêner le diagnostic et pourrait faire envisager une stratégie de surveillance adaptée (échographie complémentaire, réduction de l'intervalle des mammographies, etc.).
- Il paraît opportun de vérifier la nécessité de poursuivre le traitement une fois par an, à l'aide d'une fenêtre thérapeutique :
  - soit en réduisant progressivement la dose d'œstrogène administrée ;
  - soit en suspendant quelques semaines le traitement.
- En cas d'hystérectomie : il est recommandé de prescrire un THM par œstrogènes seuls.

**ŒSTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE ORALE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

œstrogène de synthèse chimiquement et biologiquement identique à l'estradiol endogène humain. Il remplace l'arrêt de production des œstrogènes chez les femmes ménopausées et soulage les symptômes climatiques de la ménopause.

**INDICATIONS**

Symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes ménopausées.

Prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes ayant un risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Cancer du sein connu ou suspecté, ou antécédent de cancer du sein.

Tumeurs malignes œstrogénodépendantes connues ou suspectées (exemple : cancer de l'endomètre).

Hémorragie génitale d'étiologie inconnue.

Antécédent d'accident thromboembolique veineux idiopathique ou accident thromboembolique veineux en évolution (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

Accident thromboembolique artériel récent ou en évolution (exemple : angor, infarctus du myocarde).

Haut risque cardiovasculaire.

Affection hépatique aiguë ou antécédents d'affection hépatique, jusqu'à normalisation des tests hépatiques.

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique, puis annuel avec réévaluation de la nécessité du traitement et du rapport bénéfice/risque.

Incitation au dépistage des cancers gynécologiques.

Association systématique à un progestatif en 2<sup>e</sup> partie de cycle (sauf hystérectomie).

Augmenter la posologie si persistance des signes de carence œstrogénique.

Arrêt du traitement en cas d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets œstrogéniques excessifs (réduire la posologie).

Rares, mais nécessitant l'arrêt du traitement : accident cardiovasculaire ou embolique, HTA, céphalées importantes, troubles neurologiques, tumeur du sein ou de l'utérus, diabète, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

## MÉNOPAUSE (3)

### Différents schémas possibles

- Association d'**œstrogènes per os** ou percutanés et de **progestérone**.

Ex. : **estradiol (PROVAMES)** 1 cp. à 1 mg/j du 1<sup>er</sup> au 25<sup>e</sup> j du mois et **progestérone (UTROGESTAN)** 2 caps./j du 10<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du mois.  
Ex. : **17-bêta-estradiol (OESTRODOSE)** 2 mes./j en continu à appliquer sur le corps (sauf sur les seins) et **progestérone (UTROGESTAN)** 2 caps./j du 10<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j du mois.

- Associations œstroprogestatives qui augmentent l'observance du traitement, mais qui ne permettent pas l'adaptation des doses.

Ex. : **17-bêta-estradiol** à 2 mg, **médroxyprogestérone** à 10 mg (**DIVINA**) 1 cp./j pendant 21 j.

Ex. : **estradiol + lévonorgestrel (FEMSEPT-COMBI)** 1 patch par sem.

### Surveillance du traitement

- Surveillance du risque cardiovasculaire, dépistages gynécologiques (sein, col, etc.).

- Surveillance de l'efficacité du traitement : disparition des troubles climatiques.

- Surveillance de la tolérance : les signes de hyperœstrogénie (tension mammaire, nausées, gonflement abdomino-pelvien, irritabilité) doivent faire diminuer les posologies d'œstrogènes.

### Traitements symptomatiques [1]

Ils sont indiqués en cas de signes fonctionnels persistants sous traitement hormonal substitutif ou bien en cas de contre-indication au traitement hormonal.

### Troubles vasomoteurs

**Inhibiteur non hormonal des bouffées de chaleur, bêta-alanine (ABUFÈNE)** : 1 à 2 cp./j en cure de 5 j.

### Atrophie vulvovaginale

**Œstrogènes locaux, promestriène (COLPO-TROPHINE)** 1 caps. gyn./j pendant 20 j.

## CONSENSUS

[1] Les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, HAS, 2004

[2] Consensus international sur le traitement hormonal de la ménopause, IMS, 2013

## KYSTE DE L'OVAIRE

### Kyste organique non compliqué [1]

L'exérèse chirurgicale est la règle par crainte d'une tumeur maligne ou borderline.

Après dosage des marqueurs tumoraux (CA 125 chez une femme ménopausée ; ACE, HCG,  $\alpha$ FP en péri-pubertaire) :

- kystectomie intrapéritonéale par coelioscopie ou laparotomie avec extraction protégée ;
- ovariectomie uni- ou bilatérale si ménopause.

### Kyste fonctionnel non compliqué [1]

- Critères échographiques : diamètre inférieur à 6 cm, parois fines, contenu liquidien homogène, absence de végétations.
- Le traitement recommandé d'un kyste fonctionnel asymptomatique est l'abstention thérapeutique.
- Il n'est pas recommandé de modifier la contraception d'une femme ayant un kyste de l'ovaire fonctionnel isolé et asymptomatique.
- L'indication opératoire est recommandée lors d'une augmentation de volume ou de modifications morphologiques d'un kyste d'allure fonctionnelle.

En principe, les kystes fonctionnels disparaissent au cycle suivant. Réévaluer par une échographie 1 à 3 cycles plus tard.

### Kyste compliqué [1]

- Torsion aiguë de l'ovaire : tentative de détorsion, kystectomie, ovariectomie en cas de nécrose.
- Hémorragie intrakystique ou rupture : la coelioscopie est indiquée en cas de douleurs persistantes ou de déglobulisation, on réalise alors une kystectomie et un lavage péritonéal.
- Compression de voisinage : kystectomie.

### Kyste ovarien et grossesse [1]

- Premier trimestre : kystes le plus souvent fonctionnels, ensuite kystes fonctionnels et dermoïdes. Surveillance simple en cas de kyste non suspect et non symptomatique.
- En cas de kyste de plus de 6 cm : le risque de complication augmente, pas d'argument faisant préférer l'abstention thérapeutique ou la chirurgie.
- En cas d'indication d'intervention, la coelioscopie semble la technique de choix jusqu'à 16-17 SA \* . À un stade plus tardif, la laparotomie a été la voie d'abord la plus évaluée.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge des kystes de l'ovaire présumés bénins, CNGOF, 2001

\* Niveau de preuve 3 : preuves obtenues d'études de cohorte ou de cas-témoins bien menées, de préférence dans plus d'un centre ou par plus d'un groupe de recherche.

**MÉNOMÉTRORRAGIES (1)****Anamnèse [1]**

- Rechercher une étiologie possible :
  - rechercher un oubli de pilule ;
  - rechercher une interaction avec les autres traitements en cours (inducteurs enzymatiques) ;
  - dépister des troubles de l'hémostase (saignement gingival fréquent lors du brossage de dents, ecchymose au moindre choc) ;
  - rechercher une pathologie utérine connue ;
  - éliminer la grossesse.
- Évaluer l'abondance des saignements (score de Higham : 1 point est attribué par serviette/tampon peu rempli, 5 points sont attribués par serviette/tampon moyennement rempli et 20 points sont attribués par serviette/tampon totalement rempli ; un score > 150 menstruel indique la nécessité d'une prise en charge chirurgicale des ménométrorragies.
- Tolérance du saignement, rechercher des signes d'anémie.

**Examen clinique [1]**

- Tolérance du saignement (pouls, PA, coloration cutanéomuqueuse).
- Palpation abdominale, toucher vaginal, examen au spéculum.

**Examens paracliniques [1]****Biologie**

- NFS plaquettes (rechercher une anémie, une thrombopénie).
- TP, TCA si suspicion de troubles de l'hémostase ou prise en charge chirurgicale envisagée.
- Toujours penser à éliminer une grossesse.

**Imagerie**

- Échographie pelvienne.
- ± hystéroscopie, hystérosonographie.
- ± biopsie d'endomètre (dirigée sous hystéroscopie) : en cas de point d'appel ou âge > 45 ans.
- ± IRM : cartographie complexe de fibromes, adénomyose.


**CONSENSUS**

[1] Prise en charge des ménométrorragies en préménopause - Recommandations pour la pratique clinique, *NGOF*, 2008


## MÉNOMÉTRORRAGIES (2)

### Traitement des ménométrorragies (MMT) [1]

#### Traitement des ménométrorragies en cas de désir de grossesse



#### Traitement des ménométrorragies en absence de désir de grossesse





## SYNDROME DES OVAIRES POLYKYSTIQUES

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est dû à une anomalie de fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysio-ovarien.

Il est souvent associé à un syndrome métabolique qu'il faut dépister et traiter le cas échéant (HTA, surpoids/obésité, hyperglycémie ou hyperlipidémie).

Critères diagnostiques [1] :

- oligo ou anovulation ;
- signes cliniques et/ou biologiques d'hyperandrogénie ;
- ovaires polykystiques à l'échographie (> 12 follicules/ovaire) ;
- et exclusion des autres étiologies :
  - hyperplasie congénitale des surrénales,
  - tumeurs androgénosécrétantes,
  - syndrome de Cushing.

### En dehors d'un désir de grossesse

Si les signes d'hyperandrogénie sont marqués : on choisit de préférence un **œstroprogestatif** dont l'activité androgénique serait très faible voire nulle type **norgestimate (TRIAFEMI, TRICILEST)**.

### En cas de désir de grossesse [1]

- La perte de poids est essentielle si la patiente est en surpoids ; une réduction de 5% du poids peut permettre une reprise des cycles ovulatoires. Elle peut permettre également un traitement dans de meilleures conditions.

- Traitement de l'anovulation par **citrate de clomifène (CLOMID)** : 1 cp./j de J2 à J6 d'un cycle (spontané ou induit par **DUPHASTON**).

En cas d'échec, les doses de **CLOMID** peuvent être doublées. Max. : 150 mg/j.

Il est important au cours d'une stimulation par **CLOMID** de surveiller :

- que l'ovulation a bien lieu ;
- qu'un seul ou deux follicules arrivent à maturité ; il s'agit d'éviter les grossesses multiples.
- En cas de résistance au **CLOMID**, plusieurs options sont possibles :
  - stimulation par les **gonadotrophines** ; ATTENTION, le risque d'hyperstimulation est important (utiliser un protocole step-up chronic low dose) ;
  - une solution chirurgicale : le drilling ovarien, consiste à percer la corticale ovarienne en 6 à 10 points sur chaque ovaire (600 J/ovaire) ; il permet dans certains cas de récupérer une ovulation spontanée. Cette solution permet dans le même temps d'explorer la cavité pelvienne.
- Il n'y a pas à ce jour de critère de choix bien établi entre l'une ou l'autre de ces techniques.
- Il en est de même pour la **metformine** dont la place dans la stratégie thérapeutique reste à déterminer (son action sur l'insulinorésistance, peut favoriser l'obtention d'une grossesse).

## CONSENSUS

[1] Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS), *ESHRE*, 2003

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (1)

### Généralités

- Classiquement, la stérilité est définie comme l'impossibilité de concevoir un enfant après 2 ans malgré des rapports sexuels réguliers et fréquents. Cependant, en fonction de l'âge de la patiente, de ses antécédents et de son examen clinique, une prise en charge diagnostique et thérapeutique peut débuter avant ce délai de 2 ans.
- La stratégie thérapeutique devra tenir compte de l'âge de la femme, de la durée de l'infécondité et des facteurs associés.
- Un bilan étiologique comportant au minimum un contrôle de la perméabilité tubaire, des dosages hormonaux de base, un spermogramme est requis avant de décider d'une stratégie de traitement.
- Des mesures hygiéno-diététiques visant à amener la patiente à un poids optimal sont recommandées avant toute stimulation de l'ovulation.

- Il est recommandé d'une manière générale de promouvoir des mesures préventives en luttant contre les facteurs qui peuvent diminuer la fertilité : la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles des deux partenaires (risque de stérilité tubaire par infection génitale haute), un arrêt du tabac chez les deux partenaires, une prise en charge nutritionnelle de la patiente pour réduire un surpoids, une information sur la diminution de la fertilité avec l'âge.
- Le maniement des inducteurs de l'ovulation nécessite une formation médicale spécifique et une expérience adaptée. Tous les médicaments inducteurs de l'ovulation, à part le **citrate de clomifène**, ont une prescription réservée aux spécialistes en gynécologie, et/ou gynécologie obstétrique, et/ou endocrinologie et métabolisme.

### Bilan étiologique de stérilité [1]

FEMME	HOMME
Anamnèse, examen clinique - Évaluation de l'ovulation Dosages de FSH, LH, œstradiol, AMH ± prolactine, TSH Échographie pelvienne avec compte des follicules antraux Hystérosalpingographie Sérologie <i>Chlamydiae</i> , rubéole, toxoplasmose	Anamnèse, examen clinique Spermogramme ± échographie testiculaire

- La recherche des marqueurs biologiques d'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH1/VIH2), de l'hépatite B (VHB) (antigène HBs, anticorps anti-HBc et anti-HBs), de l'hépatite C (VHC) et de l'agent de la syphilis est effectuée chez les 2 membres du couple dans les 6 mois à un an précédant la tentative.
- Un traitement inducteur de l'ovulation

n'est pas recommandé après 45 ans, quel que soit le taux de base de la FSH, car les taux de grossesses à terme sont extrêmement faibles et les risques fœtaux et maternels maximum. À partir de 43 ans, les indications de traitement doivent être exceptionnelles pour les mêmes raisons.

- En cas d'échec après 6 cycles de stimulation ou d'insémination, la stratégie thérapeutique doit être réévaluée.

**INDUCTEURS DE L'OVULATION (2) – GONADOTROPHINES HUMAINES****■ Gonadoreline acétate**

<b>LUTRELEF</b>					
Perfusion IV ou SC pulsatile (toutes les 90 min, depuis le début du cycle jusqu'à obtention d'une ovulation)	1 fl. 3,2 mg	413,64	I	100 %	413,64

**■ Urofollitropine**

<b>FOSTIMONKIT</b>					
- Stimulation de l'ovulation : 75 à 150 UI/j les 7 premiers j du cycle Augmentation contrôlée des doses si besoin en fonction de la réponse de la patiente - Hyperstimulation ovarienne contrôlée dans le cadre des techniques d'aide médicale à la procréation 150 à 450 UI de FSH durant les 7 premiers j La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse ovarienne	1 ser. prérempl. 75 UI/mL	19,56	I	100 %	19,56
	5 ser. prérempl. 75 UI/mL	85,46	I	100 %	17,09
	1 ser. prérempl. 150 UI/mL	35,96	I	100 %	35,96
	5 ser. prérempl. 150 UI/mL	161,96	I	100 %	32,39

**■ Gonadotrophine ménopausique (ou HMG ou ménotropine)**

<b>MENOPUR</b>					
Idem <b>FOSTIMONKIT</b>	5 amp.	110,56	I	100 %	22,11

**PROPRIÉTÉS****• LUTRELEF**

Analogue synthétique de la LH-RH qui stimule la sécrétion hypophysaire de la LH et de FSH.

**• MENOPUR**

**HMG** : gonadotrophines obtenues à partir d'urine de femme ménopausée.

L'**HMG** associe FSH et LH (activité FSH prédominante).

**• FOSTIMONKIT**

FSH hautement purifiée, à partir de gonadotrophine ménopausique humaine (**HMG**).

**HMG** et FSH sont injectées en 1<sup>re</sup> partie de cycle, elles entraînent une croissance et une maturation folliculaire.

**INDICATIONS**

Induction de l'ovulation dans le cadre de la procréation médicalement assistée.

Selon la classification des anovulations par l'OMS, seules les classes I et IIa, en cas d'échec

du **citrate de clomifène**, relèvent de l'administration de GnRH (LH-RH).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Cancers hormono-dépendants, hémorragies génitales d'étiologie inconnue, tumeurs hypophysaires, stérilité mécanique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance médicale **stricte** (dosages plasmatiques d'estradiol, échographie).

En cas d'hyperstimulation ovarienne, le traitement doit être immédiatement interrompu.

Aucun cas de contamination virale associée à l'administration de gonadotrophine extraite de l'urine humaine n'a été rapporté, le risque de transmission d'agents infectieux, y compris ceux dont la nature est encore inconnue, ne peut cependant pas être définitivement exclu.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Grossesses multiples.


Syndrome d'hyperstimulation.

Hypersensibilité.

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (2)

### Stratégies thérapeutiques [1]

Situation	Stratégie
Ovaires polykystiques	<b>Citrate de clomifène</b> après recherche et éventuelle correction du surpoids et éléments du syndrome métabolique Seconde intention : <b>gonadotrophines/drilling ovarien/metformine</b>
Anovulation d'origine hypothalamique	Mesures hygiéno-diététiques et prise en charge psychologique éventuelle Administration pulsatile de GnRH, ou <b>gonadotrophines</b> avec un monitoring soigneux À taux égal de grossesses, il y a moins d'hyperstimulation ovarienne et de grossesses multiples avec la <b>GnRH pulsatile</b> qu'avec les <b>gonadotrophines</b> .
Stimulation d'une femme normo-ovulante en vue d'une insémination infra-utérine	Les <b>gonadotrophines</b> peuvent s'utiliser seules ou en association au <b>citrate de clomifène</b> L'objectif est d'augmenter de façon limitée le nombre de follicules en croissance (stimulation pauci-folliculaire)
Fécondation in vitro	Stimulation multifolliculaire : <b>gonadotrophines humaines</b> ou recombinantes Blocage de l'ovulation : <b>agoniste de la GnRH : DÉCAPAPETYL (DT)</b> , <b>antagoniste de la GnRH : CETROTIDE, ORGALUTRAN</b> Déclenchement de l'ovulation : <b>gonadotrophines chorioniques</b>



HCG : Human Chorionic Gonadotrophin ; DT : **DÉCAPEPTYL**.

## INDUCTEURS DE L'OVULATION (3) – GONADOTROPHINES HUMAINES RECOMBINANTES (1)

### ■ Follitropine alpha

<b>GONAL-F</b>					
- Stimulation de l'ovulation : 75 à 150 UI/j les 7 <sup>es</sup> j du cycle Augmentation contrôlée des doses si besoin en fonction de la réponse de la patiente - Hyperstimulation ovarienne contrôlée dans le cadre des techniques d'aide médicale à la procréation : 150 à 450 UI de FSH durant les 7 premiers j La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse ovarienne	1 pdre + ser. 75 UI SC	32,57	I	100 %	32,57
	6 pdre + ser. 450 UI SC	174,02	I	100 %	174,02
	15 pdre + ser. 1 050 UI SC	392,79	I	100 %	392,79
	1 styl. 300 UI SC	117,44	I	100 %	117,44
	1 styl. 450 UI SC	174,02	I	100 %	174,02
	1 styl. 900 UI SC	338,21	I	100 %	338,21

### ■ Follitropine bêta

<b>PUREGON</b>					
Idem <b>GONAL-F</b>	5 fl. 50 UI	98,56	I	100 %	19,71
	5 fl. 75 UI	145,71	I	100 %	29,14
	5 fl. 150 UI	283,55	I	100 %	56,71
	6 sol. inj. 300 UI bte de 1 cart. de 0,36 mL	117,43	I	100 %	19,57
	7 sol. inj. 600 UI bte de 1 cart. de 0,72 mL	228,92	I	100 %	32,70
	1 sol. inj. 900 UI bte de 1 cart. de 1,08 mL	338,16	I	100 %	338,16

### ■ Lutropine alpha

<b>LUVERIS</b>					
75 UI/j en association avec la FSH	1 fl. 75 UI pdre/solv	58,25	I	100 %	58,25
	3 fl. 75 UI pdre/solv	166,13	I	100 %	55,38

### ■ Follitropine alpha + lutropine alpha

<b>PERGOVERIS</b>					
Stimulation ovarienne contrôlée : 1 à 2 amp./j	1 fl. 150 UI <b>folli.</b> + 75 UI <b>lutro.</b> pdre/solv.	92,21	I	100 %	92,21
	10 fl. 150 UI <b>folli.</b> + 75 UI <b>lutro.</b> pdre/solv.	839,74	I	100 %	89,97

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (3)

### Chirurgie de l'infertilité

#### Chirurgie de l'ovulation (SOPK)

N'est recommandée qu'en deuxième intention (échec du traitement par **citrate de clomifène**).

#### Adhésiolyse

N'est recommandée qu'en cas d'adhérences légères à modérées. L'utilisation d'un score adhérentiel est préconisé.

Dans le cas d'adhérences sévères, une prise en charge en AMP est recommandée en première intention car le bilan bénéfice/risque de la chirurgie est en sa défaveur.

Une coelioscopie de « second look » n'est pas recommandée.

#### Chirurgie tubaire

##### ► *Trompe distale*

La coelioscopie est indiquée en cas d'obstruction tubaire distale.

Utiliser un score d'atteinte de la trompe.

Lorsque la trompe est en bon état, une fimbrioplastie ou une néosalpingostomie peuvent être proposées.

Lorsque la trompe est en mauvais état, le passage à la FIV est recommandé.

Si un hydrosalpinx est présent, il est recommandé d'effectuer une salpingectomie ou une occlusion tubaire proximale si

la salpingectomie est difficile techniquement.

##### ► *Trompe proximale*

Cathétérisme sélectif sous contrôle radiologique ou par hystéroscopie.

##### ► *Atteintes tubaires multiples ou étendues*

Recours à l'AMP d'emblée.

#### Cloisons utérines

Indication à une métroplastie hystéroscopique si fausses couches à répétition ; en l'absence de fausses couches : à discuter au cas par cas.

#### Myomes, polypes

Réséction hystéroscopique.

#### Endométriose

Lorsqu'une endométriose est suspectée, une coelioscopie est recommandée. Le traitement chirurgical est préconisé dans les formes légères à moyennes (électrocoagulation bipolaire, vaporisation laser). Dans les formes sévères la balance bénéfice/risque doit être évaluée ; la chirurgie peut être lourde.

En présence d'**endométriomes**, le traitement chirurgical est recommandé si le kyste fait plus de 6 cm, s'il est responsable d'une symptomatologie invalidante, ou en cas de doute diagnostique sur la nature histologique de la lésion.

### CONSENSUS

[1] La prise en charge du couple infertile - Recommandations pour la pratique clinique, CNGOF, 2010

## MÉTORRAGIE DU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE DE LA GROSSESSE (1)

Ne pas oublier l'injection de gammaglobulines anti-D si la femme est de Rhésus négatif.

### En cas de métrorragies abondantes avec retentissement hémodynamique

- Urgence.
- Biologie en urgence : NFS, groupe sanguin, Rh, RAI, TP, TCA,  $\beta$ -HCG.
- 2 voies d'abord périphériques et remplissage vasculaire par solutés de macromolécules type **VOLUVEN** ; au besoin transfusions de culots globulaires iso-groupe iso-Rhésus.
- Bilan étiologique en urgence : examen au spéculum (origine du saignement). Échographie : grossesse intra/extra-utérine, évolutive ?

### En dehors d'une situation d'urgence hémodynamique

Le bilan étiologique comprend le plus souvent un examen clinique, une échographie pelvienne et un dosage de  $\beta$ -HCG. L'obsession est la grossesse extra-utérine.

#### Grossesse intra-utérine évolutive

- Repos à domicile. Arrêt de travail.
- **Antispasmodiques** essentiellement à but antalgique, **phloroglucinol (SPASFON)** 1 à 2 cp. x 3/j.

- Contrôle clinique et échographique 1 sem. plus tard.

#### Grossesse intra-utérine arrêtée

- **Terme échographique**
- Traitement médical par **prostaglandines**, **misoprostol (CYTOTEK)** 1 cp. x 3/j pendant 3 à 5 j et antalgiques. La patiente sera prévenue qu'il faut consulter en urgence en cas de douleurs ou de saignements importants.
- Vérification de la vacuité utérine par une échographie 1 sem. plus tard.

► **Terme échographique > 8 SA et/ou échec du traitement médical et/ou fausse couche spontanée hyperalgique ou hémorragique**  
Curetage aspiratif qui permet de vider l'utérus des débris trophoblastiques qui sont soumis à un examen anatomopathologique (qui vérifie la présence de trophoblaste donc la présence d'une grossesse intra-utérine).

Un bilan de stérilité n'est entrepris qu'au terme de 3 fausses couches précoces consécutives ou une fausse couche tardive (> 16 SA).

#### Grossesse extra-utérine

Cf. Grossesse extra-utérine.

**MÉTORRAGIE DU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE DE LA GROSSESSE (2)****Môle hydatiforme (MH) [1]****► Diagnostic**

Il repose sur l'échographie endovaginale et le dosage de l'HCG totale sérique.

La confirmation du diagnostic doit être réalisée par un anatomopathologiste référent qui définira également le caractère complet ou partiel de la môle.

Il n'y a pas d'indication à réaliser un bilan d'extension lors du diagnostic de MH.

**► Traitement**

Il repose sur une aspiration utérine sous contrôle échographique afin de réduire les risques de rétention et de perforation.

Dans l'éventualité d'un utérus volumineux (atteignant l'ombilic), il est recommandé de prévoir :

- une voie d'abord veineuse de bon calibre ;
- des concentrés érythrocytaires ;
- une laparotomie ou une coelioscopie.

L'indication d'une hystérectomie est une option qui peut être évoquée et discutée avec les patientes présentant une môle avérée dès lors que la patiente considère comme accompli son projet parental. L'hystérectomie ne dispense pas de la surveillance ultérieure du taux d'hCG totale sérique. Il n'est pas justifié d'effectuer une ovariectomie en cas d'hystérectomie pour MH.

Il est important de faire une déclaration auprès du centre de référence des maladies trophoblastiques ; il permet de colliger l'ensemble des cas et d'assurer avec nous la surveillance des patientes et leur prise en charge en cas de complication.

**► Surveillance**

Elle est réalisée par :

- une échographie dans les 15 j pour vérifier l'absence de rétention ; une échographie doit être également réalisée en cas de reprise des métrorragies ou de réascension des HCG (une nouvelle aspiration peut être réalisée s'il existe une rétention de diamètre > 17 mm) ;
- un suivi des HCG totales sériques hebdomadaire jusqu'à négativation confirmée sur 3 dosages successifs puis mensuel pendant 6 mois pour une môle partielle et 12 mois pour une môle complète (6 mois si la négativation des HCG s'est produite en moins de 8 sem. initialement).

Une contraception doit être recommandée pendant 1 an après la négativation car la réascension des HCG liée à la grossesse perturberait la surveillance.

**CONSENSUS**

[1] Diagnostic et prise en charge des maladies trophoblastiques gestationnelles (môles hydatiformes et tumeurs trophoblastiques gestationnelles), CNGOF, 2010



**GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE (1)**

Injection de **gammaglobulines anti-D** si la femme est de **Rhésus négatif**.

Dans tous les cas, le traitement de la grossesse extra-utérine (GEU) est une urgence [1].

**En cas d'instabilité hémodynamique**

Il s'agit d'une urgence.

- Bilan préopératoire.
- Deux voies d'abord veineuses, remplissage vasculaire par solutés de **macromolécules**, et au besoin transfusion de culots globulaires iso-groupe iso-Rhésus. Chirurgie en urgence.

**En cas de stabilité hémodynamique [1]**

Le traitement est soit chirurgical, soit médical.

**Traitement chirurgical**

Traitement de référence : **coelioscopie** (diagnostique, pronostique et thérapeutique). Bénéfice démontré en terme de pertes sanguines, consommation en analgésiques postopératoires, durée d'hospitalisation et de convalescence.

La laparotomie reste indiquée si :

- contre-indications générales et locales à la coelioscopie ;
- conversion secondaire pour difficulté d'hémostase ;
- indication (relative) importance de l'hémopéritoine.

**► Geste chirurgical**

- **Traitement conservateur** : salpingotomie et aspiration de la GEU.

- **Traitement radical** : salpingectomie.

Le choix se fait en fonction :

- de l'importance des lésions tubaires ;
- de l'âge de la patiente et de son désir de grossesse.

**► Surveillance**

Seulement en cas de traitement conservateur. Dosage des  $\beta$ -HCG à 48 h ; succès du traitement si chute de plus de 30 % du taux initial, suivi d'une surveillance hebdomadaire jusqu'à leur négativation.

**► En cas d'échec du traitement conservateur**  
Traitement médical ou reprise chirurgicale pour traitement radical.

## GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE (2)

### Traitement médical

#### ► Principe

Injection d'un **antimitotique** type antifolique, **méthotrexate (MÉTHOTREXATE)** par voie générale ou par voie locale échoguidée.

#### ► Injection locale de méthotrexate

Elle est réservée aux GEU formellement visualisées en échographie.

Pourrait avoir une meilleure efficacité que la voie systémique mais non démontrée.

#### ► Modalités du traitement par voie systémique

**Méthotrexate (MÉTHOTREXATE)** 1 inj. IM de 1 mg/kg en inj. unique.

#### ► Surveillance

- Surveillance clinique, essentiellement les douleurs pelviennes.
- Surveillance biologique par dosages des  $\beta$ -HCG à 4 et 7 j (il existe une élévation transitoire immédiate du taux de  $\beta$ -HCG) puis chaque semaine jusqu'à négativation complète.

Dans tous les cas la femme sera prévenue des risques d'échec du traitement (si traitement médical ou traitement chirurgical conservateur), des risques de salpingectomie et de laparotomie.

### Indications

- **Le traitement chirurgical** est recommandé si :

- hémodynamique instable ;
- HCG > 10 000 UI/L ;
- hématosalpinx > 4 cm à l'échographie ;
- contre-indication au traitement médical ;
- impossibilité d'un suivi en ambulatoire.

- **Le traitement médical** est recommandé, en concertation avec la patiente, si tous les critères suivants sont présents :

- HCG < 5 000 UI/L ;
- GEU pauci ou asymptomatique ;
- GEU non visible à l'échographie.

- **Le traitement médical** reste envisageable si le taux d'HCG est inférieur à 5 000 UI (voire 10 000 pour certains) et si l'hématosalpinx est inférieur à 4 cm.

- Le score de Fernandez peut aider à la prise de décision.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de la grossesse extra-utérine, CNGOF, 2003

## INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Elle est autorisée jusqu'à 14 sem. d'aménorrhée (délai allongé de 2 sem. depuis la loi du 4 juillet 2001).

Elle nécessite :

- une 1<sup>re</sup> consultation médicale,
- une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou une assistante sociale qui sera systématiquement proposée (obligatoire pour les mineures),
- un délai de réflexion de 7 j, qui peut être raccourci à 48h si le terme de la grossesse se situe entre 12 et 14 SA ;
- une 2<sup>e</sup> consultation médicale.

*L'accès à l'IVG doit être simple et rapide ; plus l'IVG intervient précocement pendant la grossesse et plus le risque de complication est faible.*

Une consultation 14 à 21 j après l'IVG doit s'assurer de la vacuité utérine (échographie si nécessaire).

Ne pas oublier :

- gammaglobulines anti-D si le Rhésus est négatif,
- contraception post-IVG (elle peut être débutée le lendemain de l'expulsion),
- occasion de dépistage des infections sexuellement transmissibles, du frottis cervicovaginal,
- prise en charge de la douleur (**paracétamol, ibuprofène**).

### Avant 7 SA (49 j) [1]

On peut utiliser la méthode médicale en l'absence de contre-indications aux 2 produits : association d'un **antiprogestérone** et de **prostaglandines**.

**Mifépristone** - RU 486 (**MIFÉGYNE**) 200 à 600 mg PO. et **misoprostol** (**CYTOTEC**) 400 mg par voie orale ou vaginale 36 à 48 h plus tard ; si l'expulsion ne s'est pas produite 3 h après la première administration de **misoprostol**, une 2<sup>e</sup> dose de 400 mg peut être administrée par la même voie. L'hémorragie débute dans les 3 à 4 h suivant la prise de **prostaglandines**.

En cas de prise de **misoprostol** à domicile, les précautions suivantes doivent être prises :

- distance entre le domicile de la patiente et le centre hospitalier référent limitée

(délai de transport de l'ordre de 1 h) et possibilité de le joindre et/ou de s'y rendre 24 h/24 ;

- choix laissé à la patiente du lieu, hôpital ou domicile, de réalisation de l'IVG et accompagnement de la patiente par un proche à domicile ;
- précautions particulières d'information de la patiente notamment sur la conduite à tenir en cas d'hémorragie ;
- évaluation médico-psychosociale des patientes éligibles pour ce type de procédure ;
- le jour de l'administration à l'hôpital de la **mifépristone**, les comprimés de **misoprostol** doivent être confiés à la patiente pour qu'elle les prenne à domicile 36 à 48 h plus tard par voie orale.

### Entre 7 et 9 SA (50 à 63 j) [1]

Les deux techniques chirurgicale et médicale sont utilisables en théorie mais de nouvelles recommandations en décembre 2010 préconisent l'utilisation de **géméprost** et non de **misoprostol**. Le **géméprost** est très peu utilisé en France du fait des violentes douleurs qu'il provoque. La technique chirurgicale est donc la méthode de choix.

### Entre 10 et 14 SA (64 à 98 j)

La méthode médicale n'est pas recommandée.

La technique chirurgicale est la méthode de référence à ce terme ; elle consiste en une aspiration du contenu utérin précédée d'une dilatation cervicale.

Une préparation cervicale médicamenteuse est recommandée. Elle repose sur :

- **misoprostol** 400 µg par voie orale ou vaginale 3 à 4 h avant l'aspiration ;
- et/ou **mifépristone** 200 mg *per os* 36 à 48 h avant l'aspiration (termes > 10-12 SA).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines, HAS, 2010

**GROSSESSE (1)**

Sont remboursés à 100 % par la sécurité sociale : 7 consultations prénatales, 1 consultation postnatale et un certain nombre d'examen complémentaires [1].

**Répartition des examens au cours de la grossesse**

Contenu	3 <sup>e</sup> mois	4 <sup>e</sup> mois	5 <sup>e</sup> mois	6 <sup>e</sup> mois	7 <sup>e</sup> mois	8 <sup>e</sup> mois	9 <sup>e</sup> mois
<b>Examens obligatoires</b>							
Examen clinique	x	x	x	x	x	x	x
Entretien individuel ou en couple	x	Évaluation par une sage-femme des besoins de prévention et d'éducation : séances de préparation à la naissance et/ou orientation vers des dispositifs d'aide et d'accompagnement					
HCG qualitatif	Si doute						
Diagnostic de grossesse	x						
Déclaration de grossesse	Avant 15 SA *						
Groupe sanguin	x					2 <sup>e</sup> détermination si non faite avant	
Recherche d'agglutinines irrégulières	x	Si Rhésus négatif ou si antécédent de transfusion, poursuite des recherches d'agglutinines irrégulières mensuelles au cours du 6 <sup>e</sup> , 8 <sup>e</sup> et 9 <sup>e</sup> mois					
Identification et titrage dans anticorps	Si RAI ** +			Si RAI+		Si RAI+	
Sérologie rubéole	x***	Si résultat négatif : mensuelle jusqu'à 18 SA					
Sérologie syphilis	x						
Sérologie toxoplasmose	x	Si résultat - : mensuelle jusqu'au 9 <sup>e</sup> mois et après accouchement					
Recherche antigène HBs				x			
Glycosurie-Albuminurie	x	x	x	x	x	x	x
Hémogramme				x			
<b>Examens à proposer systématiquement</b>							
Échographie obstétricale	11-13 SA + 6 j	20-22 SA			31-32 SA		
Marqueurs sériques (trisomie 21)	11-13 SA + 6 j	Entre 14 et 18 SA					
Sérologie VIH 1 et 2	x						
Prélèvement vaginal : rech. strept. B						Entre 35 et 38 SA	
Dépistage du diabète	x			x			

\* SA : semaine d'aménorrhée

\*\* RAI : recherche d'agglutinines irrégulières

\*\*\* sauf immunité acquise

**GROSSESSE (2)****Première consultation obligatoire**

Avant la 15<sup>e</sup> semaine d'aménorrhée (SA).

**Examen clinique**

- Antécédents personnels et familiaux.
- Date des dernières règles (terme théorique).
- Pression artérielle, poids, état veineux des membres inférieurs.
- Examen des seins.
- Auscultation cardiopulmonaire.
- Examen du col sous spéculum, frottis cervicovaginal si précédent > 2 ans.

**Recherche des facteurs de risque pour la grossesse**

- Antécédents personnels et familiaux, poids, taille des parents.
- Prise médicamenteuse.
- Antécédents obstétricaux.
- Contexte psychosocial ; profession.
- Intoxication(s) : tabac, alcool, drogues.

*Orienter vers une consultation spécialisée si nécessaire.*

**Déclaration de grossesse****Prescription des examens complémentaires****Information à fournir à la patiente/ au couple [1]**

- Alimentation : *Listeria* (cf. Grossesse et listériose), toxoplasmose (cf. Grossesse et toxoplasmose), salmonellose (conserver les œufs au réfrigérateur ; ne pas consommer d'œufs crus ou mal cuits ; préparer les produits à base d'œufs sans cuisson : mayonnaises, crèmes, mousse au chocolat, pâtisseries, etc. le plus près possible du

moment de la consommation et les maintenir au froid).

- Mode de vie (sport, voyages, sexualité).
- Mettre un terme aux intoxications au maximum (tabac, alcool, drogues, etc.).
- Pas d'automédication.
- Droits et avantages liés à la maternité (notamment en relation avec les conditions de travail, les congés de parentalité).
- Organisation des soins, séances de préparation à la naissance.
- Symptômes devant conduire à une consultation médicale : fièvre, contractions, saignement, douleurs abdominales, troubles urinaires, écoulement liquidien, diminution des mouvements actifs fœtaux.
- Intérêt des examens de dépistage.

**Compléments nutritionnels recommandés au cours de la grossesse**

- **Acide folique** : 28 j avant la conception jusqu'à la 12<sup>e</sup> sem. de gestation à la dose de 0,04 mg/j.
- En cas de carence :
  - fer : dépister les risques de carence avec l'interrogatoire et les confirmer avec un hémogramme ;
  - vitamine D. Elle est prescrite systématiquement aux femmes qui s'exposent peu au soleil ou en cas de port de vêtements couvrants ou de faible apport alimentaire et pour les grossesses qui se développent en hiver. Dans ces cas, une dose unique de 100 000 UI administrée au début du 6 ou 7 mois est recommandée ;
  - iode et calcium : populations carencées.

## GROSSESSE (3)

**Dépistage de la trisomie 21**

Se faisait entre 14 et 17 SA + 6 j. Peut être proposé à présent entre 11 et 13 SA + 6 j avec une échographie chez un échographe aggré pour le dépistage de la trisomie 21 au 1<sup>er</sup> trimestre et une prise de sang (HCG libres et PAPP-A) dans un laboratoire agréé.

Si le risque calculé est supérieur à 1/250, des explorations complémentaires peuvent être proposées : biopsie de trophoblaste entre 11 et 13 SA ou amniocentèse après 15 SA.

**Autres consultations obstétricales obligatoires pendant la grossesse (mensuelles du 4<sup>e</sup> au 9<sup>e</sup> mois)**
**Interrogatoire**

- Survenue de signes anormaux : diminution des mouvements actifs fœtaux, contractions, saignement, troubles urinaires, perte de liquide, fièvre.
- Rechercher d'éventuels facteurs de stress ou toute forme d'insécurité.

**Examen physique**

- Pression artérielle, poids.
- Hauteur utérine [(SA - 4 à SA + 1) jusqu'à 32 SA puis 0,5 cm/sem.], présentation fœtale.
- Toucher vaginal (état du col).
- Auscultation fœtale.

**Prescription des examens complémentaires****À noter :**

- À partir du 7<sup>e</sup> mois les consultations se font de préférence dans le lieu prévu d'accouchement.
- Le dépistage du diabète gestationnel entre 24 et 28 SA est recommandé par la méthode OMS (glycémie à jeun puis 1 h et 2 h après ingestion de 75 g de glucose) si la femme présente des facteurs de risque : âge > 35 ans, surpoids, antécédents familiaux de diabète de type 2, antécédent

personnel de diabète gestationnel, de macrosomie ou d'hydramnios, prise de poids importante.

- en cas d'augmentation importante de la hauteur utérine, de suspicion de macrosomie ou d'hydramnios une glycémie à jeun et post prandiale sont recommandés.
- Lors de la consultation du 9<sup>e</sup> mois, évaluer le pronostic obstétrical et discuter avec la femme du mode d'accouchement.

**Consultation d'anesthésie obligatoire en fin de grossesse (à partir du 8<sup>e</sup> mois)**

Recherche de contre-indications et information sur l'anesthésie péridurale.

**Prévention des infections materno-fœtales [2]**
**Infections cervicovaginales**

- Toute femme enceinte ayant un prurit vulvaire ou des brûlures vulvaires, des leucorrhées anormales, nauséabondes, une menace d'accouchement prématuré, une rupture prématurée des membranes ou une suspicion de chorioamnionite, doit bénéficier d'un prélèvement vaginal.
- Il faut préciser sur la demande la recherche de *Chlamydia* et de gonocoque.
- Les femmes enceintes ayant un antécédent d'accouchement prématuré doivent avoir, en début de grossesse, un prélèvement vaginal orienté sur la recherche de vaginose bactérienne. Si ce prélèvement est positif, il doit être renouvelé une fois par trimestre après traitement.
- Le traitement de la vaginose bactérienne repose sur le **métronidazole (FLAGYL)** per os 1 g/j pendant 7 j.
- Celui des infections à *Chlamydia trachomatis* sur l'**azithromycine (ZITHROMAX)** 1 g en dose unique ou l'**érythromycine (ÉRYTHROCINE)** 2 g/j pendant 7 j, avec traitement du partenaire.
- Celui des gonocoques sur la **ceftriaxone (ROCÉPHINE 250 mg IM)** ou la **céfixime (OROKEN 400 mg per os)**.

**GROSSESSE (4)****Portage vaginal du streptocoque B**

- Le dépistage systématique du portage du SGB (streptocoque du groupe B) est recommandé en fin de grossesse, entre 34 et 38 sem. d'aménorrhée.
- Prélèvement vaginal à l'écouvillon concernant l'ensemble de la cavité vaginale, incluant impérativement le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve.
- Une antibioprophylaxie per-partum vis-à-vis du SGB par l'**amoxicilline** en IV (2 g, puis 1 g toutes les 4 h) est recommandée en cas de dépistage positif, chez les femmes ayant un antécédent d'infection néonatale à SGB ou une bactériurie à SGB au cours de la grossesse. Elle doit être débutée le plus précocement possible au cours du travail. En cas d'allergie à la **pénicilline**, l'**érythromycine** ou une **céphalosporine** seront utilisées en fonction de l'antibiogramme.
- En l'absence de recherche de SGB, une antibioprophylaxie doit être administrée en cas de prématurité, rupture des membranes supérieure à 12 h ou fièvre maternelle (température > 38 °C).

**Consultation postnatale obligatoire**

Elle permet de faire le point sur les pathologies de la grossesse et d'envisager des explorations complémentaires.

**Interrogatoire**

- Vécu de l'accouchement, des suites de couches.
- Qualité de la relation avec l'enfant.
- Préoccupations de puériculture.
- Rechercher des signes de dépression du post-partum.
- Intimité du couple.
- Discuter du mode de contraception souhaité et adapté.
- recherche de troubles de la continence urinaire, aux gaz ou selles ; notion de pesanteur pelvienne.

**Examen physique**

- Poids, PA.
- Examen du périnée (cicatrisation et tonus).
- Nécessité d'une rééducation du post-partum (prises en charge périnéo-sphinctérienne, pelvi-rachidienne et de la sangle abdominale).
- Examen des seins.
- Frottis cervicovaginal si nécessaire.

**Vaccination contre la rubéole si nécessaire****CONSENSUS**

[1] Comment mieux informer les femmes enceintes, HAS, 2005

[2] Prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce, HAS, 2001

**GROSSESSE ET HTA (1)****Bilan initial****Bilan maternel**

- Contrôle tensionnel au repos.
- Recherche de prise de poids, d'œdèmes.
- Recherche des signes de gravité : céphalées, acouphènes, phosphènes, réflexes ostéotendineux vifs, barre épigastrique.
- Biologie : protéinurie à la bandelette (éliminer une protéinurie d'autre origine avec ECBU et prélèvements vaginaux) et protéinurie des 24 h, NFS plaquettes, bilan d'hémostase, ionogramme sanguin, créatininémie, uricémie, bilan hépatique.

**Bilan fœtal**

- Rythme cardiaque fœtal.
- Échographie (biométrie fœtale, quantité de liquide amniotique) avec Doppler ombilical et utérin.

**Traitement de l'HTA modérée sans signes de gravité****Mesures hygiénodietétiques**

- Essentielles.
- Arrêt de travail et repos.
- Régime normosodé sans restriction hydrique.

**Si persistance de l'HTA : traitement médical**

- Traitement antihypertenseur *per os*, débuté en monothérapie à doses progressives pour éviter une hypoperfusion placentaire source de souffrance fœtale.

Le but du traitement est d'obtenir une pression à 140/80 mmHg.

- Début du traitement en hospitalisation.
- On a le choix entre différents traitements :
  - antihypertenseur central, méthildopa (**ALDOMET**) 250 à 1 500 mg/j en 1 à 4 prises ;
  - $\alpha$ - $\beta$ -bloquant, labétalol (**TRANDATE**) 400 à 800 mg/j en 2 prises ;
  - inhibiteurs calciques, nicardipine (**LOXEN 50 LP**) 1 à 2 cp./j (hors AMM).

**Surveillance**

- À domicile si pression artérielle équilibrée.
- Contrôle tensionnel, bandelette urinaire 2 fois/sem.
- Examen obstétrical tous les 15 j.

**Consultation en post-partum**

- Contrôle tensionnel.
- Contrôle du bilan biologique (si antérieurement perturbé).
- Contre-indication aux **inhibiteurs de la lactation**.



## GROSSESSE ET HTA (2)

### Pré-éclampsie

C'est l'association d'une HTA et d'une protéinurie ( $> 0,3$  g/24 h).

#### Mesures générales

- Hospitalisation en milieu obstétrical.
- Repos; en position allongée on préférera le décubitus latéral gauche.
- Régime normosodé sans restriction hydrique.

#### Antihypertenseurs

On a le choix entre différents traitements :

- **antihypertenseur central, méthildopa (ALDOMET)** 250 à 1 500 mg/j en 1 à 4 prises ;
- **$\alpha$ - $\beta$ -bloquant, labétalol (TRANDATE)** 400 à 800 mg/j en 2 prises ;
- **inhibiteurs calciques, nicardipine (LOXEN 50 LP)** 2 cp./j.

Si la pression est toujours mal contrôlée, antihypertenseurs intraveineux à doses progressives, pour éviter les chutes tensionnelles, au choix/voire en association :

- **labétalol (TRANDATE)** 0,1 mg/kg/h ;
- **nicardipine (LOXEN)** 1 à 4 mg/h, hors AMM, très utilisé en pratique courante.

#### Surveillance maternelle à adapter à la gravité de la situation

- Monitoring de la pression artérielle.
- Signes fonctionnels d'HTA.
- Métorrhagies (HRP).
- Diurèse des 24 h (bilan des entrées et sorties) et bandelette urinaire.
- Bilan biologique complet 2 à 3 fois/sem.

#### Surveillance fœtale

- Perception des mouvements actifs fœtaux.

- Mesure de la hauteur utérine.
- RCF ; fréquence à adapter en fonction de la gravité du tableau clinique.
- Échographie fœtale couplée aux Dopplers.
- L'extraction fœtale est discutée en fonction des paramètres de surveillance maternelle et fœtale et du terme de la grossesse ; lorsque celle-ci est envisagée à court ou moyen terme on discutera une corticothérapie pour la maturation pulmonaire fœtale.
- Poursuite du traitement antihypertenseur en post-partum, car les risques d'éclampsie et de survenue d'un HELLP syndrome persistent.

Le **HELLP** syndrome est une forme grave de pré-éclampsie. Elle est définie par l'association d'une anémie hémolytique (**Hemolysis**), d'une cytolysé hépatique (**Elevated Liver enzyme**) et d'une thrombopénie (**Low Platelets**). Les risques sont maternels (coagulation intravasculaire disséminée, hématome sous-capsulaire du foie, décès) et fœtaux (prématurité, mort fœtale *in utero*).

### Éclampsie (peut survenir en post-partum)

Survenue de convulsions dans un contexte hypertensif.

- Assurer la liberté des voies aériennes.
- **Benzodiazépine, diazépam (VALIUM)** 10 mg en IV lente, puis relais 40 mg/24 h.
- Traitement antihypertenseur intraveineux (*cf. supra*).
- Utilisation de **sulfate de magnésium** sous contrôle anesthésique strict.
- Extraction fœtale en urgence.

## GROSSESSE ET INFECTION URINAIRE

Souvent asymptomatiques, les infections urinaires doivent être dépistées si :

- menace d'accouchement prématuré,
- fièvre au cours de la grossesse,
- antécédents d'infection urinaire, uropathie.

La bandelette urinaire est systématique à chacune des consultations.

Une bandelette urinaire retrouvant la présence de nitrites, de leucocytes, de sang ou de protéines dans les urines impose un ECBU.

### Cystite

- Boisson (eau) abondante.
- Antibiothérapie, après ECBU, active sur les BGN et non contre-indiquée pendant la grossesse.

Ex. : amoxicilline (**CLAMOXYL**) 1 g x 3/j pendant 1 sem. ou nitrofurantoïne (**FURADANTINE**) 1 gél. x 3/j pendant 1 sem ou céfixime (**OROKEN**) 200 mg x 2/j pendant 1 sem.

- ECBU de contrôle 48 h après l'arrêt du traitement, puis chaque mois jusqu'à l'accouchement.

### Pyélonéphrite aiguë

#### Mesures générales

- Hospitalisation.
- Antipyrétiques type paracétamol (**PERFALGAN**) 1 g x 3/j en IV.

#### Traitement spécifique

- Antibiothérapie, dès les prélèvements bactériologiques effectués (ECBU, hémocultures), active sur les bacilles Gram-, autorisée pendant la grossesse, le plus souvent en bithérapie initiale par voie parentérale.

L'existence de résistance des germes urinaires à la **pénicilline** même associée à l'**acide clavulanique** (30 à 40 %), fait préférer les **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** en première intention chez la femme enceinte en l'absence de suspicion de listériose.

Ex. : **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)** 1 g x 3/j.

- Dans les formes graves, bi-antibiothérapie avec association d'**aminosides, gentamicine (GENTALLINE)** 3 mg/kg/j en 1 inj. La prescription d'**aminosides** doit être limitée à 3 j.

- La voie parentérale est maintenue pendant 24 à 48 h après l'apyrexie.

- Relais *per os* en monothérapie, adaptée à l'antibiogramme pendant 2 sem.

Ex. : **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération, céfixime (OROKEN)** 200 mg x 2/j.

- Au besoin, levée d'un obstacle sur les voies urinaires, qui sera systématiquement recherché par une échographie rénale.

#### Surveillance

##### ► Surveillance maternelle

- Température.
- Diurèse.
- Contractions utérines.
- ECBU à 48 h de traitement, 48 h après l'arrêt des antibiotiques puis mensuellement jusqu'à l'accouchement.
- Bilan urologique à prévoir après l'accouchement si pyélonéphrites récidivantes.

##### ► Surveillance fœtale

- Mouvements actifs fœtaux.
- Bruits du cœur, ou rythme cardiaque fœtal en fonction du terme de la grossesse.

**GROSSESSE ET LISTÉRIOSE**

A évoquer chez toute femme enceinte ayant de la fièvre en raison du risque de retentissement fœtal et néonatal.

Toute fièvre au cours de la grossesse doit faire rechercher une listériose (hémocultures, préciser recherche de *Listeria monocytogenes*) et débiter un traitement par amoxicilline (1 g x 3/j pendant 10 j).

**Prévention**

La contamination se fait principalement par voie digestive; certaines précautions alimentaires doivent être prises au cours de la grossesse.

**Aliments fortement déconseillés**

- Viandes ou poisson crus, fumés ou marinés, tarama, coquillages crus.
- Produits laitiers non pasteurisés ou stérilisés.
- Graines germées crues (soja).
- Charcuteries (rillettes, pâté, foie gras, produits en gelée).

**Règles d'hygiène**

- Laver soigneusement les fruits et légumes, les herbes aromatiques.

- Laver soigneusement les ustensiles, plans de travail, réfrigérateur (désinfecter à l'eau de javel).
- Bien cuire les viandes et poissons.
- Consommer rapidement les restes alimentaires.
- Conserver séparément les aliments crus des aliments cuits.
- **Lavage des mains le plus fréquemment possible.**

**Traitement (listériose confirmée)**

**Amoxicilline** 3 à 6 g/j pendant 4 sem. ± **aminosides** (gentamicine 3 mg/kg/j pendant 5 j).

**Maladie à déclaration obligatoire.****Risques liés à la listériose en cours de grossesse**

- Fausse couche spontanée fébrile.
  - Mort fœtale *in utero*.
  - Chorioamniotite.
  - Listériose néonatale avec risque de septicémie et de méningo-encéphalite.
- Au moment de l'accouchement si suspicion de listériose maternelle périnatale : examen bactériologique et anatomopathologique du placenta.

**GROSSESSE ET TOXOPLASMOSE (1)****Prévention**

La prévention est essentielle.

**Sérologie de la toxoplasmose**

Sérologie à faire au mieux avant de mettre en route une grossesse ou en début de grossesse puis chaque mois si sérologie négative ; dernier prélèvement 2 à 3 sem. après la naissance.

**Mesures hygiéno-diététiques (toxoplasmose dans la viande, la terre, les chats)**

Pour les patientes non immunisées :

- se laver les mains avant les repas, et après avoir manipulé de la viande ou des légumes crus ; laver à grande eau les ustensiles de cuisine et les plans de travail ;
- manger la viande bien cuite, oublier la viande marinée, fumée ;
- laver soigneusement les fruits et les légumes qui sont consommés crus ;
- éviter les chats, attention au jardinage.

**En cas de séroconversion**

**Risque de transmission materno-fœtale** (en moyenne, risque de transmission de 30 % sans traitement, croissant au cours de la grossesse mais la sévérité de la pathologie néonatale diminue au fur et à mesure). Un traitement par **macrolides** : **spiramycine (ROVAMYCINE)** cp. de 3 MUI : 1 cp. x 3/j diminue ce risque.

**Recherche d'une contamination fœtale**

Amniocentèse dès 17 SA, et 1 mois après la séroconversion pour recherche du toxoplasme par PCR et inoculation du liquide amniotique à la souris.

**Possibilité de contamination périconceptionnelle**

1 mois avant à 15 j après le début de la grossesse.

IgM positives lors du prélèvement du début de grossesse (si IgG positives, recherche de leur avidité).

**PCR positive = contamination fœtale****Atteinte échographique sévère (dilatation ventriculaire, hydrocéphalie, microcéphalie)**

On propose une interruption thérapeutique de grossesse (ITG).

**Absence d'atteinte échographique sévère**

On ne propose pas systématiquement une ITG.

Le traitement repose alors sur l'association **sulfadiazine (ADIAZINE)** 2 cp. x 4/j et **pyriméthamine (MALOCIDE)** 1 cp./j prescrit par cures de 4 sem., en alternance avec la **ROVAMYCINE**, poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse. On adjoint à ce traitement une supplémentation en **folates, acide folique (SPECIAFOLDINE)** 1 cp. x 2/j. Surveillance NFS plaquettes hebdomadaire.

Une surveillance échographique toutes les 3 sem. est instituée à la recherche de signes de gravité (dilatation ventriculaire, hydrocéphalie, microcéphalie).

Si l'on retrouve de telles anomalies, l'ITG sera discutée.

Si le diagnostic de toxoplasmose congénitale a été établi par le diagnostic anténatal, l'enfant doit être traité en continu par **pyriméthamine - sulfamides** pendant au moins 1 an.

**GROSSESSE ET TOXOPLASMOSE (2)****Si la PCR est négative**

Le traitement par **ROVAMYCINE** est poursuivi pendant toute la grossesse.

Le fœtus est surveillé par une échographie mensuelle  $\pm$  IRM cérébrale en cas de doute.

Après l'accouchement on réalisera :


- examen clinique de l'enfant (fond d'œil, échographie transfontanellaire) ;
- biologie :
  - 1. sang de la mère (IgG, IgM et IgA) ;

- 2. sang de cordon/sérum de l'enfant : IgG, IgM, IgA, inoculation à la souris ou PCRentre J4 et J10 : profils immunologiques comparés mère/enfant (IgG, IgM, IgA) ;

- 3. placenta : examen histologique et inoculation à la souris ;

- 4. LCR de l'enfant en cas de point d'appel neurologique (biochimie et parasitologie).

Surveillance de l'enfant pendant 1 an (clinique, sérologies).

**Arbre décisionnel pour la toxoplasmose**

## GROSSESSE ET RUBÉOLE

La séroconversion rubéolique pendant la grossesse expose au risque de rubéole congénitale.

- Malformations cardiaques.
- Atteintes oculaires, cérébrales et de l'oreille interne.

La contamination est d'autant plus grave et d'autant plus fréquente que la séroconversion survient tôt dans la grossesse.

Le risque de rubéole congénitale existe si la séroconversion survient avant la 20<sup>e</sup> sem. d'aménorrhée.

Après ce terme le risque de malformations est quasi nul.

### Prévention

Elle est essentielle puisqu'il n'existe pas de traitement curatif.

- Sérologie rubéole à faire au mieux avant de mettre en route une grossesse.
- Vaccination par **RUDIVAX**, vaccin vivant atténué.

Cette vaccination est fortement conseillée pour toutes les filles avant la puberté.

- En période d'activité génitale, la vaccination doit être pratiquée sous couvert d'une contraception efficace commencée 1 mois avant la vaccination et poursuivie pendant 3 mois après.
- Il faut réaliser une vaccination des femmes séronégatives dans le post-partum.

- Ce vaccin est formellement contre-indiqué pendant la grossesse, bien qu'il n'ait jamais été décrit de rubéole congé-

nitale (l'interruption médicale de grossesse n'est donc pas licite).

- Pour les femmes séronégatives en début de grossesse et travaillant dans un milieu exposé (crèche, école), il est licite de faire un arrêt de travail durant le 1<sup>er</sup> trim. de la grossesse.

### Sérologie rubéoleuse négative en début de grossesse

- Répéter la sérologie entre 18 et 20 SA.
- En cas de contag pendant la grossesse ou d'éruption maternelle suspecte : réaliser une sérologie maternelle le plus rapidement possible. Si elle est négative, répéter la sérologie à 2 reprises à 15 j d'intervalle.

### En cas de séroconversion

#### Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre

L'interruption médicale de grossesse (IMG) peut être proposée d'emblée, compte tenu de la gravité potentielle de l'atteinte.

#### Entre 13 et 18 SA

Recherche d'atteinte fœtale par :

- amniocentèse (PCR) ;
- ponction de sang fœtal.

Le diagnostic de contamination fœtale fait discuter l'interruption médicale de grossesse.

#### Après 18 SA

Surveillance échographique standard.

Examen de l'enfant à la naissance.

Pas de diagnostic prénatal de rubéole congénitale car risque malformatif quasi nul.

## MENACE D'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ (1)

### Définition [1]

La menace d'accouchement prématuré (MAP) survient entre 22 et 36 SA révolues et se caractérise par l'association de modifications cervicales et de contractions utérines (CU) régulières et douloureuses.

### Prévention [1]

- Surveillance mensuelle des grossesses avec éducation de la patiente.
- Éviter les facteurs favorisants :
  - trajets excessifs ;
  - activité physique intense.
- Mesures sociales :
  - respect des congés prénataux, éventuellement arrêt de travail ;
  - si besoin aide ménagère et adaptation du poste de travail.
- Dépistage et traitement rapide des infections urinaire et cervicovaginale.

### Bilan

#### Affirmer le diagnostic/pronostic

- Contractions utérines : interrogatoire, palper, tocométrie externe.
- Modifications cervicales : toucher vaginal, échographie du col +++ : valeur seuil de la longueur cervicale entre 20 et 30 mm (plus fiable et plus reproductible que le toucher vaginal). La mesure de la longueur cervicale semble être le facteur le plus discriminant dans le pronostic de la menace d'accouchement prématuré.
- Faire une échographie : mesure des biométries fœtales, quantité de liquide amniotique.

#### Recherche d'un facteur étiologique

- Biologie : NFS plaquettes, CRP, ECU, prélèvement vaginal.

### Contre-indications à une tocolyse

- Suspicion de chorioamnionite (une tocolyse peut être envisagée en cas d'infection maternelle sans chorioamnionite).
- Souffrance fœtale.
- Pré-éclampsie.
- Métrorragies abondantes liées à un placenta prævia, ou d'autre étiologie.

Entre 34 et 36 SA, les bénéfices néonataux attendus d'une tocolyse sont à évaluer en fonction des risques et effets secondaires maternels des traitements utilisés et des conditions d'accueil du nouveau-né. Il n'y a pas d'argument objectif pour réfuter une tentative de tocolyse en fonction d'une limite inférieure d'âge gestationnel. En cas de dilatation cervicale avancée (5-6 cm), une tocolyse peut être indiquée pour tenter de retarder l'accouchement si cela permet de réaliser une maturation pulmonaire fœtale.

### Tocolyse [1]

#### Quelle classe thérapeutique utiliser ?

Deux principales classes thérapeutiques :  
 – les **inhibiteurs calciques** (pas d'AMM dans cette indication) ;  
 – les **antagonistes de l'ocytocine**.  
 Protocoles : exemples

#### Inhibiteurs calciques

- **IV : nicardipine (LOXEN)** : **attaque** : 2 mL/h IVSE ; **entretien** : 1 cp. à 50 mg LP x 1 à 2/j ou 1 cp. à 20 mg x 1 à 3/j.
- **PO : nifédipine (ADALATE)** : **attaque** : **ADALATE** 10 mg : 1 gél. à H0. À renouveler toutes les 15 min pendant 1 h si persistance des contractions utérines (et PA stable), soit une dose maximale de 40 mg (4 gél.) à H1 puis arrêt. 1 gél. à H2. **Entretien** : deux possibilités : **ADALATE** 20 mg 2 à 3 gél./24 h ; **CHRONADALATE LP** 30 mg, 1 à 2 cp./j.

## TOCOLYTIQUES

### ■ Nicardipine

<b>LOXEN</b>					
<b>LOXEN</b> IVSE 1 à 3 mL/h	5 amp. 10 mg/10 mL		I	NR	
<b>LOXEN</b> PO 20 mg 2 à 3cp./j	30 cp. séc. 20 mg	5,31	I	65 %	0,18
	90 cp. séc. 20 mg	13,96	I	65 %	0,16
<b>LOXEN</b> PO 50 mg LP 1 à 2 cp./j	60 gél. LP 50 mg	15,36	I	65 %	0,26
	180 gél. LP 50 mg	43,24	I	65 %	0,24

### ■ Nifédipine

<b>ADALATE</b>					
1 caps. à renouveler toutes les 15 min pdt 1 h jusqu'à diminution des contractions	30 caps. 10 mg	2,93	I	65 %	0,10
	90 caps. 10 mg	6,41	I	65 %	0,07
<b>ADALATE LP</b>					
2 à 3 cp./j en traitement d'entretien	30 cp. 20 mg	3,96	I	65 %	0,13
	180 cp. 20 mg	20,04	I	65 %	0,11
<b>CHRONADALATE</b>					
1 à 2 cp. LP/j en traitement d'entretien	30 cp. 30 mg	8,99	I	65 %	0,30
	90 cp. 30 mg	25,29	I	65 %	0,28

#### PROPRIÉTÉS

Myorelaxant utérin.

#### INDICATIONS

Menace d'accouchement prématuré.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.

Contractions utérines symptomatiques d'infection (chorioamniotite), d'hématome rétro-placentaire, souffrance fœtale aiguë, pré-éclamp-

sie sévère, rupture prématurée des membranes après 32 SA.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Bouffées vasomotrices, céphalées (apparition en début de traitement puis disparition).

Plus rarement : tachycardie, palpitations, éruption cutanée, asthénie, vertiges, troubles du sommeil, nausées, gastralgie, dyspepsie.

Exceptionnel pour la **nifédipine** : atteinte hépatique réversible à l'arrêt du traitement.



## MENACE D'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ (2)

### Antagonistes de l'ocytocine

- Dose d'attaque :

**TRACTOCILE** 0,9 mL en bolus sur 1 min (IVL) de solution injectable à 7,5 mg/mL (soit 6,75 mg IV) ; puis perfusion de charge (3 h) à 24 mL/h (dilution d'une amp. de 37,5 mg/5 mL reconstituée dans 50 mL de sérum physiologique ou de glucosé 5 %).

- Dose d'entretien :

**TRACTOCILE** 8 mL/h (dilution d'une amp. de 37,5 mg de 5 mL reconstituée à 50 mL de sérum physiologique ou de glucosé 5 %).

### Quelle durée pour la tocolyse ?

- Il ne semble pas y avoir de bénéfice à la poursuite du traitement au-delà de 48 h en cas de tocolyse efficace.
- L'instauration d'un traitement d'entretien après 48 h de tocolyse efficace n'a pas d'intérêt pour la prolongation de la grossesse ou l'état néonatal.
- Le traitement d'entretien pourrait réduire les ré-hospitalisations et la nécessité de re-traitement tocolytique par voie intraveineuse.

### Transfert *in utero*

- Contre-indications :
  - souffrance fœtale;
  - MAP non stabilisée;
  - métrorragies liées à un placenta prævia abondantes, ou d'autre étiologie.
- À envisager vers une maternité de niveau III entre 24 et 31 SA, vers une maternité de niveau II entre 31 et 36 SA.

### Corticothérapie (maturation pulmonaire) [1]

- Une cure : **bétaméthasone (CÉLESTÈNE)** 12 mg IM, 2 inj. à 24 h d'intervalle.
- Il semble utile de débiter une cure de corticoïdes même quand l'accouchement paraît imminent.
- Il n'y a pas de démonstration d'un effet bénéfique des corticoïdes au-delà de 34 SA.
- Efficacité jusqu'à 7 j.
- Au-delà de cette période, si la MAP semble s'aggraver, on peut réaliser une seconde cure.
- Le rapport bénéfice/effets indésirables au-delà des 2 cures ne semble pas être en faveur de la répétition des cures. Le suivi à domicile de femmes ayant été traitées et hospitalisées pour une menace d'accouchement prématuré ne réduit pas la prématurité. En revanche, il augmente nettement la satisfaction des patientes qui en bénéficient.

### Cas particulier : grossesse multiple

Les **inhibiteurs calciques** exposent à un risque accru de complications cardiovasculaires, notamment d'œdème aigu du poumon, en cas de grossesse multiple. Utiliser les antagonistes de l'ocytocine.

Le bénéfice des **corticoïdes** en cas de grossesse multiple est moins bien démontré que pour les grossesses uniques. En l'absence de données spécifiques, la réalisation d'une corticothérapie selon les mêmes modalités que pour les grossesses uniques est recommandée.

### CONSENSUS

[1] La menace d'accouchement prématuré (MAP) à membranes intactes, *CNGOF*, 2002

## GROSSESSE ET DIABÈTE (1)

Dans tous les cas, la prise en charge de la grossesse sera pluridisciplinaire avec une étroite collaboration entre la patiente, l'obstétricien, le diabétologue et le médecin traitant.

### Diabète gestationnel [1]

#### Définition

Le diabète gestationnel (DG) est un trouble de la tolérance glucidique de gravité variable, survenant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse.

#### Dépistage

- Préconceptionnel, 1<sup>er</sup> trimestre : en cas de facteurs de risque (antécédent familial de diabète, obésité, âge > 35 ans, antécédents obstétricaux de pré-éclampsie, mort *in utero*, macrosomie, malformation) : dépistage au mieux avant la grossesse ou dès le 1<sup>er</sup> trimestre par une glycémie à jeun (pathologique si > 1,26 g/L, 7 mmol/L).
  - Dépistage entre 24 et 28 SA : fortement recommandé pour les patientes à risque ; proposé aux autres patientes.
- Ingestion de 75 g de glucose à jeun.

Heure	H0	H1	H2
Valeur seuil (g/L)	0,92	1,80	1,53
Valeur seuil (mmol/L)	5	10	8,4

- Au cours de la grossesse : une glycémie à jeun et postprandiale doit être proposée en cas de signe d'appel : prise de poids importante, macrosomie fœtale, hydramnios.

#### Conséquences

##### ► Maternelles

À court terme : HTA gravidique, fréquence de la césarienne augmentée.

À long terme : diabète de type 2.

##### ► Fœtales

- À court terme
  - La macrosomie est présente dans 15 à 30 % des cas avec un risque accru de dystocie des épaules.
  - Hydramnios, menace d'accouchement prématuré.
  - La mortalité *in utero* est augmentée en l'absence de traitement si les glycémies à jeun sont supérieures à 1,05 g/L.
  - Le risque de malformations congénitales n'est pas significativement augmenté (sauf en cas de diabète préalable méconnu).
  - Le principal risque néonatal est l'hypoglycémie ; les risques liés à la prématurité.
- À long terme : obésité, diabète.

#### Prise en charge

##### ► Traitement maternel

- Règles diététiques
  - Essentielles.
  - Apports journaliers de 1 800 à 2 000 cal, dont 50 % de glucides, en privilégiant les glucides de faible index glycémique et les fibres, fractionnés en 3 repas et 3 collations.
  - Glycémie capillaire 6 fois/j rapportée sur un carnet. L'objectif glycémique est de 0,95 g/L à jeun et de 1,2 g/L en postprandial.
- Insulinothérapie
  - Utile en cas d'échec d'un régime bien suivi (une semaine)
  - Toujours associée au régime.
  - Instituée en milieu hospitalier.
  - Une injection d'insuline rapide avant chaque repas si les glycémies postprandiales sont élevées et une injection d'insuline d'action intermédiaire au dîner ou au coucher, si la glycémie au réveil est élevée.

## GROSSESSE ET DIABÈTE (2)

### ► Surveillance/accouchement

- Lorsque les objectifs glycémiques sont atteints et en l'absence de complications, la surveillance et l'accouchement ne présentent pas de particularité.
- En cas de diabète déséquilibré et/ou de retentissement fœtal (macrosomie, hypertrophie septale) et/ou de complication de la grossesse, la surveillance doit être rapprochée.
- En cas de risque d'immaturité pulmonaire, une corticothérapie prénatale doit être envisagée avant 34 SA. Elle impose une adaptation de la prise en charge diabétologique.
- Si le poids fœtal estimé est supérieur ou égal à 4 500 g, une césarienne peut être indiquée.
- Dans les autres cas, un déclenchement dans la 39<sup>e</sup> SA peut être envisagé en cas de macrosomie.
- L'accouchement est un moment d'instabilité du diabète ; lors de la délivrance les besoins en insuline diminuent de 30 %, doses d'insuline à adapter.
- L'allaitement maternel est à encourager (contre-indication des antidiabétiques oraux).
- La contraception par les **œstrogènes** n'est pas contre-indiquée du seul fait de l'antécédent de diabète gestationnel, sous réserve d'une normalisation des glycémies et d'un contrôle sous traitement.

### Grossesse chez une diabétique

La grossesse est programmée, afin d'équilibrer parfaitement le diabète 2 mois avant la conception.

Chez la diabétique de type 2, arrêter le traitement oral avant la conception et passer à l'insuline.

### Conséquences (grossesse à haut risque)

#### ► Maternelles

• **Instabilité métabolique** : anabolisme facilité au début de la grossesse (diminution des besoins en insuline, tendance aux hypoglycémies de jeûne), et catabolisme privilégié dans la deuxième partie de la grossesse (altération de la sensibilité à l'insuline, nécessité d'augmenter les doses régulièrement). Instabilité glycémique accrue avec risque d'acidocétose (et de mort fœtale *in utero*) au troisième trimestre.

• **Complications dégénératives** : en dehors de complications dégénératives très sévères (rétinopathie floride, néphropathie avancée avec insuffisance rénale et HTA sévère, coronaropathie), la grossesse n'est pas contre-indiquée chez la femme diabétique. Les risques d'aggravation de ces complications ne sont pas augmentés sauf en cas de rétinopathie proliférative ou préproliférative ; une pan-photocoagulation avant ou au début de la grossesse limite ce risque.

#### ► Obstétricales

- Complications infectieuses.
- Hydramnios/macrosomie/splanchnomégalie ; menace d'accouchement prématuré.
- Toxémie gravidique.
- Augmentation du risque de césarienne.

#### ► Fœtales

• **Malformations** : effet tératogène des désordres métaboliques dominés par l'hyperglycémie maternelle au cours des 8 premières sem. de grossesse (appareil cardiovasculaire, système nerveux central, squelette, appareil uro-génital) ; formes possiblement létales.

• **Souffrance fœtale chronique (vasculaire et métabolique) et aiguë.**

• **Prématurité.**

• **Détresse respiratoire, hypoglycémie néonatales.**

**GROSSESSE ET DIABÈTE (3)****Surveillance (rapprochée, multidisciplinaire)**► *Surveillance maternelle*

- Glycémie capillaire 6 fois/j rapportée sur un carnet. L'objectif glycémique est de 0,8 g/L à jeun et de 1,2 g/L en post-prandial.
- Consultation tous les 15 j : pression artérielle, bandelette urinaire.
- Chaque mois : créatininémie, uricémie, fructosamine (évaluation de la glycémie

sur 3 sem./1 mois), ECBU, recherche de protéinurie et de micro-albuminurie.

- Fond d'œil aux 6<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> mois.
- Tous les 3 mois : hémoglobine glyquée (HbA1c).

► *Surveillance fœtale*

- Hauteur utérine (hydramnios).
- Mouvements actifs fœtaux.
- Échographie fœtale.
- Rythme cardiaque fœtal.

**CONSENSUS**

[1] Diabète et grossesse, CNGOF, 1996

**MÉTORRAGIES DU 3<sup>E</sup> TRIMESTRE DE LA GROSSESSE**

Les causes sont diverses. Il ne faut pas passer à côté des plus graves que sont l'hématome rétroplacentaire et le placenta prævia. Penser à l'injection de gammaglobulines anti-D en cas de Rhésus négatif.

**En règle générale**

Hospitalisation - Urgence obstétricale

**Retentissement maternel**

- Quantification des saignements, pression artérielle, pouls.
- Voie d'abord veineuse.
- Si besoin : remplissage vasculaire, et transfusion iso-groupe iso-Rhésus.
- Bilan biologique : NFS, plaquettes, groupe Rhésus, hémostase complète, bilan hépatique, créatininémie, protéinurie.
- Examen gynécologique.

L'examen sous spéculum précise l'origine du saignement.

Le toucher vaginal ne sera fait que si l'échographie élimine un placenta prævia (risque d'hémorragie cataclysmique si placenta prævia).

**Retentissement fœtal**

- Rythme cardiaque fœtal.
- Échographie obstétricale : vitalité fœtale, localisation placentaire, image d'hématome rétro-placentaire, Doppler ombilical.
- Test de Kleihauer (quantification des hématies fœtales dans le sang maternel).

**Métrorragies très abondantes**

- le temps de l'évaluation doit être réduit au minimum : rythme cardiaque fœtal, terme de grossesse, notion de placenta bas inséré/recouvrant;
- prise en charge réanimatoire;
- anesthésie ;
- césarienne de sauvetage fœtal.

**Hématome rétroplacentaire****Hospitalisation****Si le fœtus est vivant**

Césarienne en urgence pour sauvetage fœtal.

**Si le fœtus est mort**

Expulsion par voie basse si l'état maternel le permet, sinon césarienne pour sauvetage maternel.

**Placenta prævia****En cas de saignement abondant : hospitalisation**

Tentative de rupture des membranes si le placenta ne semble pas recouvrant en échographie, ce qui peut par effet mécanique arrêter le saignement, pour permettre un accouchement par voie basse.

- Si le saignement ne s'arrête pas : césarienne en urgence.
- Si le placenta recouvre l'orifice cervical interne on pratiquera une césarienne en urgence.

**En cas de métrorragie peu abondante**

On proposera en fonction du terme de la grossesse un traitement tocolytique en l'absence de signe infectieux (les contractions favorisent le saignement) ou bien un déclenchement du travail. Corticothérapie pour la maturation pulmonaire fœtale, effectuée en cas de terme inférieur à 34 sem. d'aménorrhée.

## ACCOUCHEMENT NORMAL

L'entrée en travail a une définition dynamique : c'est l'apparition de contractions utérines entraînant des modifications cervicales.

Le déroulement du travail se divise en 3 phases :

- 1<sup>re</sup> phase : effacement et dilatation du col,
- 2<sup>e</sup> phase : expulsion du fœtus,
- 3<sup>e</sup> phase : délivrance.

La parturiente est perfusée et surveillée pendant tout le temps du travail en salle d'accouchement.

### Première phase

C'est une période de surveillance.

#### Surveillance maternelle

- Pouls, pression artérielle.
- Température.
- Tolérance à la douleur (nécessité d'une anesthésie péridurale).

#### Surveillance de la dynamique du travail

- Contractions utérines :
  - cliniquement (palper) ;
  - tocographie externe ou interne si le capteur externe enregistre mal les contractions (ex. : obésité).
- Le toucher vaginal renseigne chaque heure sur :
  - le col (position, longueur, épaisseur et dilatation) ;
  - l'état de la poche des eaux ;
  - la nature, la hauteur et la variété de la présentation fœtale.

Ces éléments d'examen sont retranscrits sur un programme.

Si la dynamique du travail n'est pas satisfaisante, on peut s'aider d'**ocytociques** en intraveineux qui renforcent et régularisent les contractions utérines. Le travail est alors dirigé.

L'**ocytocique** le plus utilisé est l'**oxytocine (SYNTOCINON)** en IV lente ; la posologie est à adapter en fonction de l'efficacité sur la contractilité utérine et de la tolérance fœtale.

#### Surveillance fœtale

- Couleur du liquide amniotique.
- Enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal (RCF) par cardiographie.

- D'autres paramètres de surveillance fœtale peuvent être utilisés en cas d'anomalies du RCF : pH au scalp, oxymétrie de pouls fœtal, ECG fœtal (à l'étude).

### Deuxième phase

La femme doit fournir des efforts expulsifs qui sont contemporains des contractions et guidés par la sage-femme ou l'obstétricien.

#### Surveillance maternelle

- Essentiellement le périnée pour juger de l'utilité d'une épisiotomie préventive.
- Tolérance à la douleur.

#### Surveillance dynamique

Cette phase ne doit pas excéder 30 min.

#### Surveillance fœtale

RCF et progression de la présentation.

Une extraction instrumentale doit être pratiquée en cas de non-progression de la présentation ou d'anomalies du RCF.

### Troisième phase

On surveillera les saignements et l'hémodynamique maternels. Si la délivrance ne s'est pas produite 10 min après l'accouchement (délivrance dirigée) ou si les saignements sont trop importants, on pratiquera une délivrance artificielle. Systématiquement on vérifiera l'intégrité du placenta et des membranes.

Au moindre doute, on pratiquera une révision utérine.

En cas de gestes endo-utérins, on administre une antibioprophylaxie, par **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** 1 g IV en l'absence d'allergie.

### Après l'accouchement

#### Surveillance maternelle

- Pendant 2 h en salle de naissance.
- Hémodynamique maternelle.
- Saignement.
- Globe utérin.

En fonction de ces deux derniers paramètres, on ajuste les doses d'**ocytociques** nécessaires (cf. Hémorragies du post-partum immédiat).

## HÉMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMÉDIAT (1)

### Définition [1]

Perte sanguine de plus de 500 mL dans les 24 h qui suivent la naissance.

### Traitement préventif [1]

- Toute femme en début de travail doit disposer de 2 déterminations du groupe sanguin ABO RH D et Kell 1 valides et du résultat de la recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) datant de moins de 1 mois.

- En cas de risque très élevé d'hémorragie du post-partum : RAI de moins de 3 j nécessaire à l'entrée en salle de naissance ; prise en charge dans une structure adaptée. Cela concerne les patientes présentant :

- un placenta recouvrant ;
- une suspicion de placenta accreta ;
- ou des troubles sévères de l'hémostase.

- Systématiquement :

- Une **surveillance régulière en salle de naissance pendant les 2 h qui suivent un accouchement** (importance des pertes sanguines, qualité du globe utérin, fréquence cardiaque et mesure de la pression artérielle). Ces données seront consignées dans le dossier de la patiente.

- Une **prise en charge active de la délivrance** : au moment du décollement placentaire, traction contrôlée du cordon associée à une contre-pression suspubienne à l'aide de la main abdominale et

une **injection d'oxytocine (SYNTOCINON)** 5 à 10 UI en intraveineuse lente au moment du dégagement de l'épaule antérieure de l'enfant (délivrance dirigée).

- Un **massage de l'utérus** effectué après l'expulsion du placenta si l'utérus est hypotonique.

- Un **examen du placenta** afin de vérifier s'il est complet. La rétention de cotylédons ou de membranes indique une révision utérine.

- Une **délivrance artificielle** lorsque le placenta n'est pas expulsé dans un délai de 10-20 min.

### Cas particulier : placenta accreta [1]

- En l'absence d'hémorragie, le placenta peut être laissé en place en partie ou en totalité.

- En cas d'hémorragie modérée, une ligature artérielle éventuellement associée à un capitonnage utérin (en cas de césarienne) ou une embolisation artérielle (en cas de voie basse) peuvent être réalisées. Une hystérectomie s'impose en cas d'échec ou d'hémorragie grave d'emblée.

### Conduite à tenir [1]

**Prévenir** tous les intervenants (la prise en charge doit se faire en équipe : aide-soignante, sage-femme, infirmière, obstétricien, anesthésiste-réanimateur).

**Facteur temps** primordial : consigner tous les temps de la prise en charge.

### Dans les premières 15 à 30 min

Réanimation	Obstétrique
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Monitoring : pouls, PA, SaO<sub>2</sub></li> <li>– Vérification de la voie d'abord veineuse</li> <li>– Remplissage (cristalloïdes)</li> <li>– Vérification de la carte de groupe (et RAI)</li> <li>– Anesthésie adaptée à la pratique des gestes obstétricaux dans les conditions de sécurité optimale et dans de brefs délais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurer la vacuité utérine : délivrance artificielle ou révision utérine</li> <li>– Vider la vessie</li> <li>– Masser l'utérus s'il est hypotonique</li> <li>– Examiner la filière génitale sous valves</li> <li>– Pratiquer une antibioprophylaxie (gestes endo-utérins)</li> </ul> <p><b>Oxytocine (SYNTOCINON)</b> : 5 à 10 UI en intraveineuse lente puis en perfusion (5 à 10 UI/h pendant 2 h)</p>

**OCYTICIQUES INJECTABLES (2)****■ Sulprostone**

<b>NALADOR</b>					
Hémorragie du post-partum immédiat : 1 amp. sur 1 h puis 1 amp. sur 4 à 5 h ITG ou MFIU : 2 amp./10 h Adapter à l'efficacité	1 amp. 500 µg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé synthétique de la prostaglandine E<sub>2</sub> provoquant des contractions, et une dilatation du col.

**INDICATIONS**

Hémorragie du post-partum immédiat.  
Interruption thérapeutique de grossesse, mort fœtale *in utero* au 2<sup>e</sup> trim.

**CONTRE-INDICATIONS**

En cas d'hémorragie du post-partum immédiat si le risque vital maternel peut être mis en jeu, les contre-indications habituelles deviennent relatives.

Femmes > 35 ans ou grande fumeuse, antécédents d'hypersensibilité au produit, antécédents cardiocirculatoires, asthme, antécédents comitiaux, utérus cicatriciel, insuffisance rénale ou hépatique grave, hyperthyroïdie, dia-

bète décompensé, ulcère, thalassémie, drépanocytose.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En perfusion IV, avec surveillance cardiorespiratoire, et matériel de réanimation disponible. L'augmentation des doses n'augmente pas l'efficacité thérapeutique, mais conduit à plus d'effets indésirables.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Des accidents cardiovasculaires graves (potentiellement mortels) ont été notifiés (spasme coronarien).

Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhée, céphalée, obnubilation.

Bronchoconstriction si prédispositions.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudente avec **oxytocine** (potentialisation).

**AINS** (antagonisme).



## HÉMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMÉDIAT (2)

### Si l'hémorragie persiste après 30 min ou s'aggrave

Réanimation	Obstétrique
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pose d'une deuxième voie d'abord veineuse ± abord veineux fémoral gauche/cathéter artériel</li> <li>– Prélèvement sanguin : hémogramme, hémostase</li> <li>– Avertissement du site transfusionnel</li> <li>– Remplissage</li> <li>– Transfusion de culots globulaires (objectif : hémoglobine : 7 à 10 g/dL)</li> <li>– Plasma frais congelé si troubles de l'hémostase</li> <li>– Transfusion de concentrés plaquettaires (si thrombopénie)</li> <li>– Intubation trachéale si troubles de la conscience ou hémodynamique instable</li> </ul>	<p><b>Sulprostone (NALADOR)</b> en perfusion intraveineuse à la seringue électrique (débuter à une posologie comprise entre 100 et 500 µg/h à adapter en fonction de la réponse au traitement : persistance de l'hémorragie, tonicité utérine)</p> <p>Ex. : <b>NALADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 amp. en 1 h</li> <li>– puis amp. en 4 à 5 h</li> </ul> <p>Relais par <b>oxytocine (SYNTOCINON)</b> 10 à 20 UI en perfusion pendant 2 h</p> <p>Sondage vésical à demeure permettant la surveillance de la diurèse horaire</p>

#### Si l'hémorragie persiste après 30 min de sulprostone ou s'aggrave

- Utilisation de méthodes invasives :
  - embolisation utérine ;
  - chirurgie (ligature artérielle, hystérectomie d'hémostase).
- Possibilité d'un transfert si l'état de la patiente le permet.
- L'embolisation peut être préférée en cas :
  - d'atonie utérine résistante aux utérotoniques ;
  - d'hémorragie d'origine cervico-utérine (placenta recouvrant) ;

- de thrombus vaginal ;
- de déchirure cervicovaginale déjà suturée ou non accessible.
- La ligature artérielle peut être préférée en cas de césarienne.
- Le choix est laissé à l'équipe en fonction de la sévérité de l'hémorragie, des structures présentes à proximité, de l'expérience du chirurgien.
- Après embolisation ou chirurgie, surveillance de la patiente dans une structure adaptée de type réanimation, soins intensifs ou salle de surveillance post-interventionnelle.

#### CONSENSUS

[1] Hémorragies du post-partum immédiat, CNGOF, 2004

## IMMUNISATION SANGUINE FŒTO-MATERNELLE (1)

### Traitement préventif [1]

≤ 15 SA	15 à 27 SA	27 à 29 SA	29 SA à l'accouchement	Accouchement
Prévention ciblée FCS, IVG, GEU, IMG, métrorragies, môle, réduction embryonnaire, cerclage, traumatisme abdominal, ponction amniotique, biopsie de trophoblaste	Prévention ciblée – <i>Risque élevé d'HFM</i> : FC tardive, IMG, MFIU, traumatisme abdomino-pelvien, cordocentèse – <i>Risque faible d'HFM</i> : amniocentèse simple, métrorragies, cerclage tardif	Prévention systématique des femmes Rhésus D négatif	Prévention ciblée Abstention si l'injection de 300 µg a été faite à 28 SA sauf si risque élevé d'HFM (version par manœuvres externes, MFIU, traumatisme abdomino-pelvien, ponction cordon ou organe fœtal)	Si nouveau-né RhD positif : <b>RHOPHYLAC</b> Abstention possible si : – et Kleihauer négatif – et anti-D > 6 ng/mL
Kleihauer : non	Kleihauer : oui si risque d'HFM important	Kleihauer : non	Kleihauer : oui si risque d'HFM important	Kleihauer : oui
<b>RHOPHYLAC</b> 200 µg IV dans les 72 h	<b>RHOPHYLAC</b> 200 µg IV dans les 72 h Adapter les doses au Kleihauer si risque d'HFM élevé	<b>RHOPHYLAC</b> 300 µg IM ou IV	Adapter les doses au Kleihauer si risque d'HFM élevé	<b>RHOPHYLAC</b> 200 µg IV dans les 72 h

FCS : fausse couche spontanée ; IVG : interruption volontaire de grossesse ; GEU : grossesse extra-utérine ; IMG : interruption médicale de grossesse ; HFM : hémorragie fœto-maternelle ; FC : fausse couche ; MFIU : mort fœtale *in utero*.

- Prélever une RAI avant toute injection d'IgRh (pour s'assurer *a posteriori* de l'absence d'immunisation).
- Calendrier des RAI :
  - **premier trimestre** (avec groupe sanguin si non fait) ;
  - **6<sup>e</sup> mois** (peut correspondre à la RAI avant l'injection systématique à 28 SA) ;
  - **8<sup>e</sup> mois** seulement si **RHOPHYLAC** 300 µg non fait à 28 SA ;
  - quatre dernières sem. : dans le cadre d'une possible transfusion au cours de l'accouchement.
- Voie IV préférée pour la prophylaxie post-exposition, lorsqu'on se rapproche des 72 h, lorsqu'il existe un risque élevé d'hémorragie fœto-maternelle.
- Abstention possible si risque faible d'HFM et précédente injection de **RHOPHYLAC** 200 µg < 9 sem. ou **RHOPHYLAC** 300 µg < 12 sem. ; si le risque d'HFM est élevé, on pourra s'abstenir seulement si le test de Kleihauer est négatif.

**IMMUNOGLOBULINE ANTI-D****■ Immunoglobuline humaine anti-D (Rh)**

<b>RHOPHYLAC</b>					
Prévention de l'allo-immunisation fœto-maternelle : 200 à 300 µg selon les indications	1 inj. 200 µg/2 mL (1 000 UI)	60,89	I	100 %	60,89
Hémorragie fœto-maternelle importante (> 4 mL) : doses complémentaires de 20 µg/mL d'hématies fœtales	1 inj. 300 µg/2 mL (1 500 UI)	84,62	I	100 %	84,62
Transfusions incompatibles : 20 µg/2 mL de sang Rh D positif transfusé ou par mL de concentré érythrocytaire					

**PROPRIÉTÉS**

Contient des anticorps spécifiques de type IgG, dirigés contre l'antigène Rh(D) des érythrocytes humains.

Si la mère est Rh(D)-négatif et le fœtus Rh(D)-positif, la mère peut s'immuniser contre l'antigène Rh(D) et produire des anticorps anti-Rh(D) qui traversent le placenta pouvant provoquer une maladie hémolytique du nouveau-né (principalement au cours d'une grossesse ultérieure).

L'injection assez tôt et en quantité suffisante d'**immunoglobuline anti-D** prévient l'immunisation Rh(D) dans plus de 99 % des cas.

L'élimination des hématies Rh(D)-positif est retardée en cas d'injection intramusculaire (les immunoglobulines injectées par voie intraveineuse sont immédiatement détectables dans la circulation alors qu'elles doivent être absorbées à partir du point d'injection en cas d'intramusculaire).

**INDICATIONS**

Prévention de l'allo-immunisation fœto-maternelle (femmes Rh négatif).

Traitement des sujets Rh(D)-négatif après transfusions incompatibles de sang Rh(D)-positif ou d'autres produits contenant des hématies Rh(D)-positif.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

La voie intramusculaire est contre-indiquée

chez les sujets présentant un trouble de l'hémostase.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Des réactions allergiques.

Les patients doivent être informés des signes de réaction d'hypersensibilité.

Le patient doit être gardé en observation au moins 20 min après administration.

Certains individus avec un déficit en IgA peuvent développer des anticorps anti-IgA (**RHO-PHYLAC** contient une quantité < 5 % d'IgA).

La transmission d'agents infectieux ne peut pas être totalement exclue lors de l'administration de médicaments préparés à partir de sang ou de plasma humain.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur et sensibilité locales au point d'injection.

Hyperthermie, malaise, céphalées, réactions cutanées et frissons.

Réactions de type allergique ou anaphylactique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'immunisation active avec des vaccins à virus vivant atténué (ex. le vaccin de la rougeole, des oreillons, de la rubéole ou de la varicelle) doit être reportée de 3 mois après la dernière administration de l'**immunoglobuline anti-D** car l'efficacité du vaccin peut être altérée.

## IMMUNISATION SANGUINE FŒTO-MATERNELLE (2)

### Conduite à tenir en cas d'allo-immunisation érythrocytaire

Il faut **dépister une anémie fœtale** par des explorations plus ou moins invasives.

Le résultat de ces différentes explorations

permettra une prise en charge *in utero* de l'anémie fœtale.

### Dosage pondéral des anticorps maternels

Une valeur sous le seuil élimine l'éventualité d'un accident hémolytique majeur chez le fœtus.

### Anticorps anti-D (seuils en fonction du terme)

Titre IgG (ng/mL)	4	3	2	1	0,7
Terme (SA)	18	24	28	32	36

### Échographie fœtale

**Vélocimétrie cérébrale** : pic de vitesse systolique de l'artère cérébrale moyenne (permet de détecter une anémie fœtale précoce).

Recherche des premiers signes de décompensation de l'anémie (anasarque débutante puis plus marquée).

### Cordocentèse

Permet de mesurer le taux d'hémoglobine fœtale et de poser l'indication d'un traitement.

### Traitement anténatal

Il consiste en une transfusion ou une exsanguino-transfusion *in utero*.

L'indication est posée par le dosage de l'hémoglobine fœtale par cordocentèse.

Le but à atteindre est de remonter l'hémoglobine fœtale à 16 g/dL (14 g/dL seulement en cas d'anasarque).

La transfusion se fait à 18-20 SA au plus tôt et est répétée toutes les 2 à 4 semaines en fonction de l'évaluation (vélocimétrie cérébrale, Hb fœtale).

L'extraction fœtale est décidée en mettant en balance les risques de la prématurité/la gravité de l'anémie fœtale et le rendement des transfusions.

### CONSENSUS

[1] Prévention de l'allo-immunisation Rhésus-D foeto-maternelle, CNGOF, 2005

## ALLAITEMENT

### Si la femme ne souhaite pas allaiter

**Agoniste dopaminergique, bromocriptine (PARLODEL)** à posologie progressive pour éviter les hypotensions dès le premier jour du post-partum : 1/2 cp. le 1<sup>er</sup> j ; 1 cp. le 2<sup>e</sup> j ; puis 1 cp. x 2 /j pendant 14 j, à prendre au milieu des repas.

**Cabergoline (DOSTINEX)** 1 cp. à J1 et J2. Contre-indiqués en cas d'HTA/pré-éclampsie.

Ce sont des vasoconstricteurs ; ne pas utiliser en association avec d'autres vasoconstricteurs (dérivés de l'ergot de seigle, vasoconstricteur nasal).

ARRÊTER immédiatement en cas de symptôme anormal notamment les céphalées.

### Si la femme souhaite allaiter [1]

#### Principes de l'allaitement

- Bonne position du nouveau-né : face à la mère, bouche grande ouverte sur le mamelon.
- Durée et fréquence des tétées : allaitement à la demande (aussi fréquemment et longtemps que le nourrisson le désire), changer de sein lorsque le nourrisson arrête de téter de lui-même.

#### Contraception en cas d'allaitement

Information du couple. Choix du couple.

- Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA). Conditions : allaitement maternel exclusif et persistance de l'aménorrhée ; taux de grossesses inférieur à 2 %.
- Contraception hormonale :
  - **œstroprogestatifs** non recommandés car ils pourraient diminuer la production de lait ;
  - les **microprogestatifs** peuvent être utilisés ; éviter les 2 à 4 premières semaines du post partum car risque thromboembolique augmenté.
- Dispositif intra-utérin : possible dans les premières 48h ou à partir de la 4<sup>e</sup> sem. du post-partum.
- Préservatifs et spermicides possibles.

#### Complications

- **Douleurs et lésions des mamelons**
- Une sensibilité douloureuse est souvent inévitable en début d'allaitement.

- Rougeur, irritation, crevasses sont avant tout causées par une mauvaise position au cours de la tétée ; des crèmes type *Lansinoh* peuvent soulager ces symptômes.
- Une douche quotidienne assure une hygiène suffisante à l'allaitement.
- Rechercher une mycose en cas de lésions persistantes malgré une bonne position.

#### ► Engorgement mammaire

- À ne pas confondre avec la congestion mammaire qui est physiologique : augmentation du volume des seins, tension et chaleur dans les jours qui suivent la naissance ; pathologique si associé à de la fièvre, des frissons, une douleur ou une gêne à l'écoulement du lait.
- Tétées précoces sans restriction de durée ou de fréquence.
- Expression des seins : manuelle : masser les seins sous une douche chaude pour faire sortir le lait.

*La restriction hydrique, le bandage des seins ne sont pas recommandés.*

#### ► Mastite ou lymphangite mammaire

- Symptômes le plus souvent unilatéraux : inflammation d'un segment du sein et habituellement signes généraux (fièvre).
- Recherche des facteurs favorisants (lésions du mamelon, engorgement), évaluation de la pratique de l'allaitement.
- Drainage du sein : tétées sans restriction, expression du lait.
- Antibiotiques si symptômes graves d'emblée, infection associée (écoulement de pus par le mamelon), persistance des symptômes après 24 à 48 h, lésion du mamelon ; le traitement antibiotique doit être compatible avec une poursuite de l'allaitement.
- Traitement symptomatologique par application de chaud ou froid possible.

#### ► Abcès

- Traitement chirurgical.
- Poursuite de l'antibiothérapie avec adaptation à l'antibiogramme.

### CONSENSUS

[1] Allaitement maternel : mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l'enfant, HAS, 2002

## PERTES VAGINALES (3) - INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Trois germes sexuellement transmissibles sont responsables de pertes vaginales :

- *Trichomonas vaginalis* ;
- *Chlamydia trachomatis* ;
- *Neisseria gonorrhea*.

En cas d'infection sexuellement transmissible :

- recherche d'une autre IST (prélèvement vaginal avec recherche de *Chlamydia*, *Mycoplasma* et du gonocoque, sérologies TPHA, VDRL, VIH, hépatite B, *Chlamydia*) ;
- traitement du (ou des) partenaire(s).

GERME	DIAGNOSTIC	TRAITEMENT
<i>Trichomonas</i>	Leucorrhée abondante, verdâtre, spumeuse, odeur âcre. Brûlures vaginales avec muqueuse framboisée et granuleuse. Visible à l'examen direct du prélèvement vaginal.	Idem vaginose
<i>Chlamydia</i>	Le plus souvent asymptomatique ou pauci-symptomatique, responsable d'infection génitale haute. Diagnostic par PCR sur le prélèvement vaginal ou sur le 1 <sup>er</sup> jet d'urine.	<b>ZITHROMAX MONODOSE</b> 1 g (4 cp.) en prise unique Contrôle biologique à 15 j si échec du traitement minute <b>VIBRAMYCINE N</b> 200 mg/j ou <b>OFLOCET</b> 200 mg x 2/j pendant 7 à 10 j
Gonocoque	Leucorrhée jaunâtre, purulente. Diagnostic à la culture du prélèvement vaginal.	<b>CIFLOX</b> 500 mg en 1 prise Ou <b>OROKEN</b> 400 mg en 1 prise

Les *Chlamydia* peuvent donner des infections génitales hautes qui peuvent être pauci-symptomatiques et être responsables d'infertilité et de grossesse extra-utérine.

Il est important de dépister et de traiter le *Chlamydia* chez la femme en âge de procréer au moindre doute.

## CONTRACEPTION HORMONALE (1)

### Première demande de pilule

#### Bilan préthérapeutique

- Interrogatoire (recherche de contre-indications, antécédents gynéco-obstétriques, élimination d'une grossesse en cours).
- Examen clinique avec évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires.
- Bilan biologique glucidolipidique : triglycérides, cholestérol total, glycémie à jeun à faire avant de débiter la contraception hormonale si facteurs de risque de perturbation du bilan glucidolipidique (sinon 3 à 6 mois après le début du traitement). Bilan thrombophilique avant le début du traitement en cas d'antécédents évocateurs personnels ou familiaux.
- Ne pas oublier la prévention (palpation des seins, frottis, information sur les IST).

#### Évaluation du mode de vie de la patiente :

- âge ;
- profession ;
- tabac ;
- partenaire stable ;
- contraception déjà utilisée ;
- souhait particulier.

#### Contre-indications absolues aux œstroprogestatifs

- Antécédent personnel d'accident thromboembolique veineux ou artériel.
- Thrombophilie.
- Diabète avec complications vasculaires.
- Dyslipidémie.
- HTA.
- Migraine avec signes focaux neurologiques ou évolutive sous contraception.
- Cardiopathie (fibrillation auriculaire, valvulopathie, coronaropathie, etc.).
- Facteurs de risque de thrombose : < 4 sem. du post-partum, immobilisation prolongée, postopératoire, accumulation

de plusieurs facteurs de risque : âge > 35 ans, tabagisme, surpoids/obésité, HTA.

- Antécédent personnel de cancer du sein ou de l'utérus.
- Mutation de BRCA1/2, haut risque de prédisposition.
- Antécédent de tumeur hépatique.
- Hépatopathie sévère.
- Antécédent de pancréatite ou de cholestase liée à une hypertriglycémie ou à l'utilisation de la contraception.

#### Contraception de 1<sup>re</sup> intention chez une femme jeune sans pathologie particulière : œstroprogestatifs

Les contraceptions œstroprogestatives de 3<sup>e</sup> génération ne sont pas indiquées en 1<sup>re</sup> intention du fait d'un risque thrombotique accru.

Les œstroprogestatifs de 2<sup>e</sup> génération sont donc prescrits en 1<sup>re</sup> intention.

Le bénéfice attendu des progestatifs de 3<sup>e</sup> génération est un climat hormonal moins androgénique ; la contraception de 3<sup>e</sup> génération pourra donc être prescrite en cas de mauvaise tolérance des œstroprogestatifs de 2<sup>e</sup> génération (prise de poids, œdème des membres inférieurs, acné, hyperséborrhée, etc.).

Les œstroprogestatifs existent sous plusieurs formes :

- pilule à prendre 21 j/28 (arrêt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette) ;
- pilule à prendre en continu ;
- patch (dispositif transdermique) : à changer toutes les sem. et à prendre 3 sem./4 ;
- anneau vaginal : à insérer dans le vagin pendant 3 semaines, arrêt une semaine et mise en place d'un nouveau dispositif.

## GESTROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (3) – CONTRACEPTIFS DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION (2)

### ■ Éthinylestradiol + désogestrel

<b>MERCILON</b>					
Cures de 1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt de 7 j	21 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	
<b>VARNOLINE</b>					
Idem <b>MERCILON</b>	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	
<b>VARNOLINE CONTINU</b>					
1 cp./j en continu (7 cp. inactifs)	28 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes



## ŒSTROPROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (4) – AUTRES ŒSTROPROGESTATIFS

### ■ Éthinylestradiol+ chlormadinone

<b>BELARA</b>					
1 cp. à heure fixe pdt 21 j, arrêt pdt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>chlor.</b> 2 mg		I	NR	

### ■ Éthinylestradiol + drospirénone

<b>JASMINELLE</b>					
1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt pdt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>JASMINELLE CONTINU</b>					
1 cp./j à heure fixe en continu	28 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>JASMINE</b>					
Idem <b>JASMINELLE</b>	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>YAZ</b>					
Idem <b>JASMINELLE CONTINU</b>	28 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>DROSPIBEL</b>					
Idem <b>JASMINELLE</b>	21 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	

### ■ Estradiol + diénogest

<b>QLAIRA</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 3-2-2-1 mg <b>éthin.</b> + 2-3 mg <b>dién.</b>		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

**ŒSTROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (5) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Contraceptifs par 3 actions complémentaires :

- blocage de l'ovulation,
- modification de la glaire qui devient imperméable aux spermatozoïdes,
- atrophie de l'endomètre qui devient impropre à la nidation.

La « génération » de l'**œstrogestatif** fait référence à une différence dans le type de progestatif utilisé. Les termes de mono, bi ou triphasiques font référence à des différences de dosages des progestatifs et/ou œstrogènes au cours de la plaquette tentant de se rapprocher au mieux des variations hormonales au cours du cycle naturel.

**INDICATIONS**

Contraception.

Utilisés en cas de dysménorrhées invalidantes. Les **œstrogestatifs de 2<sup>e</sup> génération** doivent être prescrits en 1<sup>re</sup> intention car ceux de **3<sup>e</sup> génération** augmentent le risque thromboembolique. Le bénéfice des **œstrogestatifs de 3<sup>e</sup> génération** est un climat hormonal moins androgénique ; on peut les utiliser en cas d'acné, prise de poids ou mastodynies.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Accidents thromboemboliques artériels (présence ou antécédent).

Accidents thromboemboliques veineux (présence ou antécédent) tels que thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire ; immobilisation prolongée, chirurgie majeure ; identification de mutations liées à la thrombophilie (facteur II, facteur V).

Prédisposition héréditaire ou acquise aux thromboses veineuses ou artérielles.

Maladie cérébrovasculaire ou coronarienne.

Hypertension artérielle.

Facteurs de risque multiples cardiovasculaires ; association tabac et âge  $\geq 35$  ans ; hyperlipidémie avérée.

Valvulopathie, troubles du rythme thrombogènes.

Diabète compliqué de micro ou de macroangiopathie et/ou évoluant depuis plus de 20 ans.

Migraine avec signes neurologiques focaux ou âge  $\geq 35$  ans.

Tumeur maligne connue ou suspectée du sein. Carcinome de l'endomètre ou toute autre tumeur œstrogénodépendante connue ou suspectée.

Adénome hépatique ou carcinome hépatocellulaire, affection hépatique sévère jusqu'au retour à la normale de la fonction hépatique ; antécédent de cholestase liée à la prise d'œstrogènes.

Hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

Post-partum  $< 4$  sem.

Allaitement maternel.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préalable : examen clinique, frottis cervicovaginal (FCV), bilan glucidolipidique.

Revoir la patiente à 3 et 6 mois pour vérifier la bonne tolérance clinique et biologique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares mais nécessitant l'arrêt du traitement : réactions allergiques, intolérance au glucose, HTA, accidents thromboemboliques et cardiovasculaires, ictère cholestatique, hyperlipidémie, adénome hépatique, CHC, lithiase biliaire, érythème noueux, céphalées.

Plus fréquents : nausées, vomissements, acné, prise de poids, nervosité, dépression, baisse de la libido, rétention hydrique/œdèmes, tension mammaire, modification des sécrétions vaginales, métrorragies/oligoménorrhée, signes d'hyperandrogénie, jambes lourdes, candidose vaginale.

Aménorrhée post-thérapeutique avec anovulation, d'autant plus fréquente qu'il existait des troubles du cycle avant le traitement. Nécessite la recherche d'une étiologie si elle est prolongée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

**CONTRACEPTION HORMONALE (2)****Situations particulières**

**Contre-indications aux œstroprogestatifs (allaitement, etc.)**

- *Progestatifs microdosés*
- Contraception très utilisée au cours de l'allaitement.
- Nécessite une prise en continu.

Ex. : **lévonorgestrel (MICROVAL)** 1 cp./j à heure fixe sans interruption.

Les **microprogestatifs** peuvent être mal tolérés (ils peuvent notamment entraîner des métrorragies).

► *Contraception par implant*

Seul **NEXPLANON** (68 mg d'**étonorgestrel**) a l'AMM en France. Il est introduit sous la peau du bras non dominant après une anesthésie locale par un médecin formé à sa mise en place. Il est efficace pour une durée de 3 ans.

**Manifestations androgéniques**

En cas manifestations acnéiques, on peut proposer des pilules de 3<sup>e</sup> génération telles que **TRICILEST** et **TRIAFEMI**.

**Dysménorrhée sous œstroprogestatifs minidosés ou dystrophie ovarienne : œstroprogestatifs normodosés**

Ils présentent aussi un intérêt quand la prise d'un médicament inducteur enzymatique est nécessaire.

Ex. : **éthinyloestradiol 50 µg + norgestrel 0,5 mg (STÉDIRIL)**.

Mêmes modalités de prise que les pilules minidosées.

**Préménopause : macroprogestatifs de synthèse**

Effet anti-œstrogénique intéressant.

Ex. : **chlormadinone (LUTÉRAN)** 10 mg/j du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> jour du cycle.

Attention : effets indésirables +++.

**Symptômes lors de l'arrêt de la pilule**

En cas de symptômes lors des 7 jours d'arrêt de la pilule ou lors de la prise des comprimés blancs (céphalées, troubles de l'humeur), il est possible d'enchaîner les plaquettes sans période d'arrêt ; l'effet secondaire alors possible est l'apparition de métrorragies.

**En cas d'oubli****Oubli < 12 h**

Pas de modification de la contraception : prendre le comprimé oublié et poursuivre la contraception normalement ; pas de mesures de protection supplémentaires.

**Oubli > 12 h**

Contraception pouvant ne plus être efficace : prendre le comprimé oublié, continuer la contraception, mesures de protection supplémentaires pendant 7 jours.

Si un rapport a eu lieu dans les 5 jours précédant l'oubli, il peut être nécessaire de compléter la protection avec une contraception d'urgence. Pour **MICROVAL**, cette durée est réduite à 3 h.

**PROGESTATIFS MICRODOSÉS (CONTRACEPTION)****■ Lévonorgestrel**

<b>MICROVAL</b>					
1 cp./j en continu à heure fixe	28 cp. 30 µg	1,90	I	65 %	0,07
	84 cp. 30 µg	3,89	I	65 %	0,05

**■ Désogestrel**

<b>CERAZETTE</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>ANTIGONE</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	56 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>CLAREAL</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>DÉSOPOP</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Progestatifs de synthèse ayant à faible dose et en administration continue une action contraceptive par modification de la glaire et inhibition de l'ovulation.

**INDICATIONS**

Contraception.

**CONTRE-INDICATIONS**

Accidents thromboemboliques veineux tels que thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire en cours.

Adénome hépatique ou carcinome hépatocellulaire, affection hépatique sévère jusqu'au retour à la normale de la fonction hépatique.

Hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

Tumeur maligne connue ou suspectée du sein. Compte tenu de la diminution de motilité tubaire qu'ils induisent : antécédent ou risque de grossesse extra-utérine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À prendre à heure très fixe, le retard de prise ne devant pas dépasser 3 h pour **MICROVAL**, 12 h pour **CERAZETTE**.

À éviter chez les femmes ayant un antécédent de GEU ou de chirurgie à risque de GEU.

Mode de contraception à éviter en cas de dystrophie ovarienne, mastopathie bénigne, mastodynie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hyperœstrogénie (mastodynie, œdèmes cycliques, douleurs pelviennes).

Perturbations du cycle menstruel (saignements, absence ou irrégularités des règles) qui s'observent chez environ 70 % des utilisatrices.

Kystes fonctionnels de l'ovaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inducteurs enzymatiques.

**CONTRACEPTION HORMONALE (3)****Contraception d'urgence**

Deux produits ont l'AMM : **NORLEVO** et **ELLAONE**. **NORLEVO** est délivré sans ordonnance, gratuitement aux mineures.

La contraception d'urgence doit être prise le plus vite possible après le rapport à risque de grossesse au maximum dans les 72 h qui suivent le rapport pour **NORLEVO** et dans les 5 j qui suivent le rapport pour **ELLAONE**. Taux d'échec < 4 %.

La contraception d'urgence peut aussi être assurée par la pose d'un stérilet dans les 5 j qui suivent le rapport à risque.

**BPC : Surveillance biologique de la contraception orale**

Ces pratiques ne remettent pas en cause le bien fondé d'un examen clinique annuel.

- 1. Il n'y a pas lieu, au cours de la surveillance biologique d'une contraception orale, chez une femme de moins de 35 ans, lorsque ni le 1<sup>er</sup> bilan comportant nécessairement la mesure à jeun de la glycémie, du cholestérol total et des triglycérides plasmatiques, ni les bilans de contrôle effectués à 3 mois puis 12 mois après n'ont pas montré d'anomalies, de pratiquer d'autres explorations biologiques.
- 2. Il n'y a pas lieu non plus de répéter ces examens plus d'une fois tous les 2 ans, en l'absence de faits nouveaux.

**PROGESTATIFS INJECTABLES (CONTRACEPTION) (1)****■ Implant étonogestrel**

<b>NEXPLANON</b>					
1 implant entre le 1 <sup>er</sup> et le 5 <sup>e</sup> J du cycle, le lendemain de la dernière prise d'un œstroprogestatif, immédiatement après une IVG ou 4 sem. après un accouchement Efficacité : 3 ans	1 implant = 68 mg	106,44	I	65 %	106,44

**PROPRIÉTÉS**

Progestatif de synthèse, ayant une action contraceptive puissante par blocage de l'ovulation et modification de la glaire cervicale. Jusqu'à 3 ans d'efficacité contraceptive avec un retour rapide à un cycle menstruel normal après retrait.

**INDICATIONS**

Contraception pour les femmes qui ne peuvent s'astreindre à une prise quotidienne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Grossesse connue ou suspectée.

Affection ou antécédents hépatiques sévères, accidents thromboemboliques veineux évolutifs, hypersensibilité à l'un des composants, tumeurs progestogène-dépendantes, hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Définir le moment de la pose :

- en l'absence de contraception hormonale antérieure : J1 à J5 du cycle ;
- à l'arrêt d'une contraception orale œstroprogestative : le jour suivant le dernier comprimé actif ;

- à l'arrêt d'une contraception microprogestative orale : à tout moment ;
- dans le post-abortum (1<sup>er</sup> trim.) : dès l'avortement ;
- dans le post-abortum (2<sup>e</sup> trim.) : entre J21 et J28 ;
- dans le post-partum : entre J21 et J28.

L'insertion sera réalisée à la face interne du bras non dominant, à 6-8 cm au-dessus du pli du coude, dans le sillon entre le biceps et le triceps en sous-cutané, sous anesthésie locale, en respectant les conditions d'asepsie par un médecin entraîné à sa pose. Idem pour le retrait.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles du cycle dans 60 % des cas : ménorrhées, aménorrhées.

Très fréquents : céphalées, acné, vaginite, augmentation du poids corporel, tension mammaire, mastodynie.

Plus rares : accident thromboembolique veineux et artériel, HTA, tumeur progestogène-dépendante et chloasma.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillés : **inducteurs enzymatiques.**

**CONTRACEPTION HORMONALE (4)****Contraception en situation particulière**

	OP	Micropro- gestatifs	DIU cuivre	DIU lévonor- gestrel	Préservatif
Thrombose veineuse : ATCD avec ou sans thrombophilie	-	±	+	±	+
Thrombose veineuse en cours	-	-	+	-	+
Thrombose artérielle : ATCD ou FDR	-	-	+	-	+
Cardiopathie emboligène	-	-	+	-	+
1 seul FDR métabolique	±	+	+	+	+
> 1 FDR métabolique	-	±	+	±	+
FDR thrombose	-	±	+	±	+
Diabète sans complication vasculaire, évoluant depuis < 20 ans = 1 seul FDR métabolique	±	+	+	+	+
Diabète avec complication vasculaire ou instable avec la contraception ou évoluant depuis > 20 ans	-	±	+	±	+
Tumeur hépatique	-	-	+	-	+
Cholestase	-	-	+	-	+
Cirrhose ou autre altération de la fonction hépatique	-	-	+	-	+
1er mois du post-partum/sans allaitement	-	+	-	-	+
1er mois du post-partum/avec allaitement	-	-	-	-	+
Allaitement après le 1er mois	-	+	+	+	+
Post-abortion immédiat	+	+	+	+	+
Nullipare/adolescente	+	+	±	±	+
ATCD GEU	+	±	±	±	+
Infection génitale récente ou risque	+	+	-	-	+
Cancer hormonodépendant (sein, utérus)	-	-	+	-	+

OP : œstroprogestatifs ; DIU : dispositif intra-utérin ; FDR : facteur de risque ; ATCD : antécédent ; GEU : grossesse extra-utérine.

+ : autorisé, - : contre-indiqué ; ± : à utiliser avec précaution.

FDR métabolique : HTA, diabète sans complication, surpoids/obésité, tabac, âge > 35 ans.  
FDR thrombose : toutes les situations à risque de thrombose : post-partum, immobilité prolongée, intervention chirurgicale, pathologie à risque de thrombose (insuffisance rénale, lupus, etc.).

## LICHEN SCLÉRO-ATROPHIQUE VULVAIRE

### Diagnostic

Maladie inflammatoire de la peau pouvant toucher l'homme et la femme à tout âge mais principalement autour de la ménopause et de la puberté. Il se manifeste par un prurit intense et des lésions vulvaires : les lésions débutent au niveau des petites lèvres et du clitoris. Les tissus perdent leur élasticité puis s'atrophient et se rétractent ; ils prennent une couleur blanche.

### Traitement

#### Médical : dermocorticoïdes

Le traitement est essentiel car il permet d'arrêter l'évolution des lésions.

Il repose sur l'utilisation de **dermocorticoïdes de classe IV**.

Le schéma utilisé peut être le suivant : **clobétasol propionate (DERMOVAL)** crème 0,05 % (un tube de 30 g au max. pour 3 mois), 1 quantité équivalente à un petit pois :

- chaque soir pendant 4 semaines ;
- puis un soir sur 2 pendant les 4 semaines suivantes ;
- et enfin une fois par semaine pendant encore 4 semaines.

#### Chirurgical

- Dans le cas d'une lésion atypique ou persistante : faire une biopsie afin de dépister un cancer vulvaire.
- Dans le cas d'une sténose invalidante, une chirurgie fonctionnelle peut être envisagée.



**ANTIFONGIQUES LOCAUX GYNÉCOLOGIQUES**■ **Éconazole**

<b>GYNO-PEVARYL</b>					
1 ovule le soir en administration unique	1 ovule LP 150 mg	4,54		30 %	4,54
1 ovule le soir pdt 3 j	3 ovules 150 mg	4,65		30 %	1,55

■ **Miconazole**

<b>GYNO-DAKTARIN</b>					
1 ovule le soir pdt 3 j à prolonger pdt 6 j si persistance des symptômes	3 ovules 400 mg	4,77	I	30 %	1,59

■ **Tioconazole**

<b>GYNO-TROSYD</b>					
1 ovule le soir en administration unique	1 ovule 300 mg	4,36	I	30 %	4,36

■ **Fenticonazole**

<b>LOMEXIN</b>					
1 caps. le soir en administration unique	1 caps. vaginale 600 mg	4,74	I	30 %	4,74
	2 caps. vaginales 600 mg		I	NR	

■ **Isoconazole**

<b>FAZOL G</b>					
1 ovule le soir pdt 3 j	3 ovules 300 mg	4,93	I	30 %	1,64

■ **Sertaconazole**

<b>MONAZOL</b>					
1 ovule le soir en 1 administration unique À renouveler à J7 si persistance des symptômes	1 ovule 300 mg	4,32	I	30 %	4,32

**PROPRIÉTÉS**

Antifongiques locaux actifs sur *Candida albicans* et sur les bacilles Gram+.

**INDICATIONS**

Candidoses vulvovaginales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Placer l'ovule au fond du vagin (en général le soir au coucher) et rester allongé un quart d'heure.

Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

Éviter les rapports sexuels, les tampons vaginaux pendant le traitement.

Préservatifs, diaphragmes en latex : risque de rupture.

Spermicides : risques d'inactivation.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation locale.

**ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES POLYVALENTS (1)****Ovules****■ Métronidazole**

<b>FLAGYL</b>					
1 à 2 ovules le soir pdt 15 j	10 ovules 500 mg	3,22	I	30 %	0,32

**Per os****■ Métronidazole**

<b>FLAGYL</b>					
2 g en prise unique à répéter 15 j plus tard ou 500 mg/j en 2 prises à 10 j pour le traitement des <i>Trichomonas</i> urogénitales	20 cp. 250 mg	3,71	I	65 %	0,19
	4 cp. 500 mg	3,23	I	65 %	0,81
	14 cp. 500 mg	5,08	I	65 %	0,36
	1 fl. 120 mL sol. buv. (25 mg/mL)	4,66	I	65 %	4,66

**■ Secnidazole**

<b>SECNOL</b>					
2 g en 1 prise au début d'un repas	1 dose 2 g	8,08	I	65 %	8,08

**PROPRIÉTÉS**

Antiparasitaires et antibactériens.

**INDICATIONS**

Trichomonase vaginale.  
 Vaginites non spécifiques.  
 Lambliase, amibiase.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité connue.  
**Grossesse** : au cours du 1<sup>er</sup> trim., autrement déconseillée.

**Allaitement** : déconseillé.**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Alcool : effet antabuse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Modérés et rares.  
 Nausées, vomissements, douleur abdominale.  
 Hypersensibilité rarement sévère.  
 Céphalées, asthénie, vertiges.  
 Leucopénie transitoire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES****Disulfirame** : confusion.

## PERTES VAGINALES (3) - INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Trois germes sexuellement transmissibles sont responsables de pertes vaginales :

- *Trichomonas vaginalis* ;
- *Chlamydia trachomatis* ;
- *Neisseria gonorrhea*.

En cas d'infection sexuellement transmissible :

- recherche d'une autre IST (prélèvement vaginal avec recherche de *Chlamydia*, *Mycoplasma* et du gonocoque, sérologies TPHA, VDRL, VIH, hépatite B, *Chlamydia*) ;
- traitement du (ou des) partenaire(s).

GERME	DIAGNOSTIC	TRAITEMENT
<i>Trichomonas</i>	Leucorrhée abondante, verdâtre, spumeuse, odeur âcre. Brûlures vaginales avec muqueuse framboisée et granuleuse. Visible à l'examen direct du prélèvement vaginal.	Idem vaginose
<i>Chlamydia</i>	Le plus souvent asymptomatique ou pauci-symptomatique, responsable d'infection génitale haute. Diagnostic par PCR sur le prélèvement vaginal ou sur le 1 <sup>er</sup> jet d'urine.	<b>ZITHROMAX MONODOSE</b> 1 g (4 cp.) en prise unique Contrôle biologique à 15 j si échec du traitement minute <b>VIBRAMYCINE N</b> 200 mg/j ou <b>OFLOCET</b> 200 mg x 2/j pendant 7 à 10 j
Gonocoque	Leucorrhée jaunâtre, purulente. Diagnostic à la culture du prélèvement vaginal.	<b>CIFLOX</b> 500 mg en 1 prise Ou <b>OROKEN</b> 400 mg en 1 prise

Les *Chlamydia* peuvent donner des infections génitales hautes qui peuvent être pauci-symptomatiques et être responsables d'infertilité et de grossesse extra-utérine.

Il est important de dépister et de traiter le *Chlamydia* chez la femme en âge de procréer au moindre doute.

**ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES POLYVALENTS (2)****Antibactérien, antifongique et trichomonacide****■ Ternidazole + néomycine + prednisolone + nystatine**

<b>TERGYNAN</b>					
1 à 2 cp./j pdt 15 j	10 cp. gyn.	3,80	I	30 %	0,38

**Antibactériens et antifongiques****■ Polyvidone iodée**

<b>BÉTADINE</b>					
1 ovule le soir pdt 2 à 3 sem. 1 inj. vaginale le soir pdt 2-3 sem. (diluer 2 càs/L d'eau tiède)	8 ovules 250 mg 8 càs (fl. 125 mL : 10 g/100 mL)		I I	NR NR	

**■ Nystatine + néomycine + polymyxine B**

<b>POLYGYNAX</b>					
1 ovule/j pdt 12 j	6 ovules	3,51	I	30 %	0,58
<b>POLYGYNAX VIRGO</b>					
1 instillation le soir pdt 6 j Utilisable chez les petites filles et femmes vierges	6 caps. effilées	3,51	I	30 %	0,58

**PROPRIÉTÉS**

Anti-infectieux locaux non résorbés par la muqueuse vaginale, SAUF la polyvidone iodée.

Actions différentes suivant les produits :

- **nystatine** (anticandidosique) ;
- **polyvidone** (antifongique et antibactérien).

**INDICATIONS**

Infections bactériennes cervicovaginales.

Vulvo-vaginite de la petite fille (**POLYGYNAX VIRGO**).

Candidoses vulvo-vaginales.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** : pour la **polyvidone**.

Hypersensibilité connue (**polyvidone ++**).

**Polyvidone iodée** : pathologie thyroïdienne.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Idem anticandidosique.

Traitement du partenaire si *Trichomonas*.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irritation, allergie de contact.

Surcharge iodée avec **polyvidone**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas associer la **polyvidone** avec les dérivés mercuriels.

**PROGESTATIFS DE SYNTHÈSE (1)****Dérivé de la 17-alpha-hydroxyprogestérone (noyau prégnane)****■ Chlormadinone**

<b>LUTÉRAN</b>					
Endométriose : 10 mg/j en continu	10 cp. 2 mg	1,25	I	65 %	0,13
Ménométrorragies : du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)	10 cp. 5 mg	2,25	I	65 %	0,23
Ménopause : 10 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique	12 cp. 10 mg	3,69	I	65 %	0,31

**Dérivé de la 17-méthylprogestérone (noyau prégnane)****■ Médrogestone**

<b>COLPRONE</b>					
Endométriose : 5 à 10 mg/j en continu.	20 cp. 5 mg	4,41	I	65 %	
Ménométrorragies : 5 à 10 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)					
Ménopause : 5 à 10 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique					

**Dérivés de la 19-norprogestérone (noyau prégnane)****■ Nomégestrol**

<b>LUTÉNYL</b>					
Endométriose : 5 mg/j en continu	10 cp. 5 mg	5,08	I	65 %	0,51
Ménométrorragies : 5 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)					
Ménopause : 5 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique					

**■ Promégestone**

<b>SURGESTONE</b>					
Endométriose : 0,125 à 0,5 mg/j en continu	10 cp. 0,125 mg	3,38	I	65 %	
	10 cp. 0,25 mg	5,37	I	65 %	0,54
Fibrome, insuffisance lutéale : 0,125 à 0,5 mg/j du 15 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle (du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j du cycle si désir de contraception)	10 cp. 0,5 mg	8,25	I	65 %	0,82
Ménopause : 0,125 à 0,5 mg/j les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique	12 cp. 0,5 mg	9,80	I	65 %	0,82

## ENDOMÉTRIOSE (2)

### ► Endométriose profonde

- Le traitement est instauré pour un minimum de 3 mois.

- Les progestatifs à dose antgonadotrope sont le plus souvent recommandés en première intention. Ex. :

- **acétate de chlormadinone (LUTÉ-  
NYL)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois ;

- **acétate de nomégestrol (hors AMM) (LUTÉ-  
NYL)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois ;

- **médrogestone (COLPRONE)** 1 à 3 cp./j du 5<sup>e</sup> au 25<sup>e</sup> j ou traitement continu ;

- **promégestone (hors AMM) (SURGES-  
TONE)** : 1 cp./j au moins 20 j par mois.

- La prescription des **analogues de la GnRH** ne devrait pas être prolongée au-delà de 1 an (AMM). Ex. : **triptoréline (DÉCA-  
PEPTYL LP)** 1 inj. IM/4 à 6 sem. pendant 6 mois.

- À la fin du traitement par **agonistes de la GnRH**, un relais par progestatifs à doses antgonadotropes peut être proposé.

### Traitement chirurgical

Il vise l'exérèse des foyers d'endométriose.

- En cas d'exérèse complète :

- un traitement médical complémentaire par progestatifs à dose antgonadotrope pour augmenter l'intervalle libre sans douleur est à discuter ;

- un traitement complémentaire par **analogues de la GnRH** n'est pas recommandé.

- En cas d'exérèse suboptimale, un traitement médical complémentaire est recommandé.

### Prise en charge de l'infertilité liée à l'endométriose

- Dans le cadre d'un bilan d'infertilité, il est recommandé de recourir d'emblée à la coelioscopie en cas de suspicion clinique ou échographique d'endométriose.

- Lorsqu'une coelioscopie est réalisée, le traitement chirurgical des lésions, s'il est possible, est recommandé pour améliorer la fertilité.

- Si la coelioscopie découvre des lésions extensives pour lesquelles la chirurgie expose à un risque élevé de complications, le recours direct à la FIV sans geste chirurgical est recommandé.

- Après une chirurgie satisfaisante chez une patiente ne présentant pas d'autres facteurs négatifs, il est recommandé de respecter un délai d'attente de 6 à 12 mois avant de proposer une nouvelle thérapeutique ; ce délai est à moduler en fonction de l'âge de la patiente et des autres facteurs d'hypofertilité.

- La chirurgie itérative n'est pas recommandée pour la seule raison d'une infertilité persistante après la chirurgie.

- Les endométriomes n'ont pas d'impact sur le résultat final d'une FIV. Pour les endométriomes de moins de 6 cm, ni le traitement chirurgical itératif ni leur ponction ne sont recommandés avant la FIV.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de l'endométriose, CNGOF, 2006

**PROGESTATIFS DE SYNTHÈSE (2) - PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Action progestomimétique, anti-œstrogénique, antagonadotrope.

Les **norstéroïdes** ont l'action la plus puissante, mais également des effets androgéniques responsables des effets indésirables.

**INDICATIONS**

Endométriose : traitement continu de 6 à 12 mois, à dose suffisante pour obtenir une aménorrhée.

Ménorragies fonctionnelles ou des fibromes.

Insuffisance lutéale de la préménopause.

Contraception en préménopause.

Hormonothérapie substitutive de la ménopause : progestatif à noyau prégnane, les 2 dernières sem. du traitement œstrogénique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

Antécédents de maladie thromboembolique.

Insuffisance hépatique grave.

Hémorragie génitale d'étiologie inconnue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utiliser avec prudence si antécédents coronariens, ou vasculaires cérébraux, si HTA, diabète ou hyperlipidémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Irrégularités menstruelles, métrorragies, aménorrhée.

Androgéniques : prise de poids, œdèmes, acné, chloasma, séborrhée, augmentation de la pilosité, diminution du HDL-cholestérol (augmentation du risque cardiovasculaire).

Hépatiques : ictère cholestatique (norstéroïdes surtout).

Nausées, vomissements.

Troubles visuels.

**PROGESTÉRONNE ET ASSIMILÉS**■ **Dydrogéstérone**

<b>DUPHASTON</b>					
Insuffisance lutéale : 20 mg/j en 2 prises du 16 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j	10 cp. 10 mg	3,67	I	65 %	0,37
Endométriose : 30 mg en continu ou du 5 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j					
Ménopause : 20 mg/ en 2 prises les 2 dernières sem. du traitement oestrogénique					
Déclenchement des règles, test au <b>DUPHASTON</b> : 1 à 2 cp./j pendant 10 j					

■ **Progestérone naturelle micronisée**

<b>UTROGESTAN</b>					
Capsules orales et vaginales	30 caps. 100 mg	7,48	I	65 %	0,25
Insuffisance lutéale :	90 caps. 100 mg	20,32	I	65 %	0,23
200 mg le soir au coucher du 16 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j	15 caps. 200 mg	7,48	I	65 %	0,50
Ménopause : 200 mg le soir au coucher les 2 dernières sem. du traitement oestrogénique	45 caps. 200 mg	20,32	I	65 %	0,45
Soutien de la phase lutéale : 200 ou 400 mg en 2 prises par voie vaginale					
<b>PROGESTAN</b>					
Idem <b>UTROGESTAN</b>	30 caps. 100 mg	5,53	I	65 %	0,18
	90 caps. 100 mg	14,52	I	65 %	0,16
	15 caps. 200 mg	13,09	I	65 %	0,29
	45 caps. 200 mg	5,03	I	65 %	0,34

■ **Caproate d'hydroxyprogestérone**

<b>PROGESTÉRONNE-RETARD PHARLON</b>					
Insuffisance lutéale lorsque la voie parentérale est indispensable : 1 amp. IM au 16 <sup>e</sup> j	3 amp. 2 mL = 500 mg	7,97	I	30 %	2,66

■ **Progestérone**

<b>MENAELE</b>					
Insuffisance lutéale : 200 mg le soir au coucher du 16 <sup>e</sup> au 25 <sup>e</sup> j ou 300 mg en 2 prises	30 caps. 100 mg	5,03	I	65 %	0,17
Ménopause : 200 mg le soir au coucher les 2 dernières sem. de chaque séquence thérapeutique	90 caps. 100 mg	13,09	I	65 %	0,15

**PROPRIÉTÉS**

Activité progestomimétique et gestagène comparable à celle de la progestérone endogène, sans les effets androgéniques et métaboliques des progestatifs de synthèse (moins d'effets secondaires), mais sans activité antigonadotrope (pas d'effet contraceptif).

**INDICATIONS**

Insuffisance lutéale.  
Ménopause.

Prévention des avortements à répétition quand une insuffisance lutéale est prouvée.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Métrorragies si prise précoce dans le cycle.  
Somnolence et sensation vertigineuse (prendre au coucher).  
Quelques cas d'hypospadias décrits avec le **caproate d'hydroxyprogestérone**.



**INDUCTEURS DE L'OVULATION (1) – CITRATE DE CLOMIFÈNE**■ **Citrate de clomifène**

<b>CLOMID</b>					
Adapter la dose au poids de la femme et éventuellement aux réponses antérieures 50 à 100 mg/j de J2 à J6 En l'absence de réponse ovarienne (pas de follicule préimplantatoire à l'échographie), augmenter les doses de 50 mg/j et par cycle Max 150 mg/j En l'absence d'ovulation aux doses maximales, réévaluer la stratégie thérapeutique	5 cp. 50 mg	4,53	I	65 %	0,91
<b>PERGOTIME</b>					
Idem <b>CLOMID</b>	5 cp. 50 mg	3,76	I	65 %	0,75

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur compétitif du rétrocontrôle des œstrogènes sur l'hypothalamus, entraînant une élévation de la FSH.

**INDICATIONS**

Traitement de l'infertilité liée au syndrome des ovaires polykystiques.

Diagnostic et le traitement de certaines aménorrhées, notamment celles qui peuvent suivre l'arrêt d'une contraception orale.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse, allaitement.**

Affections hépatiques sévères ou récentes, hémorragies gynécologiques d'étiologies non diagnostiquées, tumeurs hormono-dépendantes, kystes organiques de l'ovaire, troubles

visuels pendant le traitement ou lors de traitements antérieurs.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance médicale stricte : l'enjeu est d'éviter les grossesses multiples.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles visuels.

Hyperstimulation ovarienne.

Grossesse multiple.

Divers : allergie cutanée, nausées, vomissements, métrorragies, tension mammaire, bouffées de chaleur, asthénie, vertiges, céphalées, tendance dépressive.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association exceptionnelle avec les **gonadotrophines** (risque d'hyperstimulation).

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (1)

### Généralités

- Classiquement, la stérilité est définie comme l'impossibilité de concevoir un enfant après 2 ans malgré des rapports sexuels réguliers et fréquents. Cependant, en fonction de l'âge de la patiente, de ses antécédents et de son examen clinique, une prise en charge diagnostique et thérapeutique peut débuter avant ce délai de 2 ans.
- La stratégie thérapeutique devra tenir compte de l'âge de la femme, de la durée de l'infécondité et des facteurs associés.
- Un bilan étiologique comportant au minimum un contrôle de la perméabilité tubaire, des dosages hormonaux de base, un spermogramme est requis avant de décider d'une stratégie de traitement.
- Des mesures hygiéno-diététiques visant à amener la patiente à un poids optimal sont recommandées avant toute stimulation de l'ovulation.

- Il est recommandé d'une manière générale de promouvoir des mesures préventives en luttant contre les facteurs qui peuvent diminuer la fertilité : la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles des deux partenaires (risque de stérilité tubaire par infection génitale haute), un arrêt du tabac chez les deux partenaires, une prise en charge nutritionnelle de la patiente pour réduire un surpoids, une information sur la diminution de la fertilité avec l'âge.
- Le maniement des inducteurs de l'ovulation nécessite une formation médicale spécifique et une expérience adaptée. Tous les médicaments inducteurs de l'ovulation, à part le **citrate de clomifène**, ont une prescription réservée aux spécialistes en gynécologie, et/ou gynécologie obstétrique, et/ou endocrinologie et métabolisme.

### Bilan étiologique de stérilité [1]

FEMME	HOMME
Anamnèse, examen clinique - Évaluation de l'ovulation Dosages de FSH, LH, œstradiol, AMH ± prolactine, TSH Échographie pelvienne avec compte des follicules antraux Hystérosalpingographie Sérologie <i>Chlamydiae</i> , rubéole, toxoplasmose	Anamnèse, examen clinique Spermogramme ± échographie testiculaire

- La recherche des marqueurs biologiques d'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH1/VIH2), de l'hépatite B (VHB) (antigène HBs, anticorps anti-HBc et anti-HBs), de l'hépatite C (VHC) et de l'agent de la syphilis est effectuée chez les 2 membres du couple dans les 6 mois à un an précédant la tentative.
- Un traitement inducteur de l'ovulation

n'est pas recommandé après 45 ans, quel que soit le taux de base de la FSH, car les taux de grossesses à terme sont extrêmement faibles et les risques fœtaux et maternels maximum. À partir de 43 ans, les indications de traitement doivent être exceptionnelles pour les mêmes raisons.

- En cas d'échec après 6 cycles de stimulation ou d'insémination, la stratégie thérapeutique doit être réévaluée.

**INDUCTEURS DE L'OVULATION (2) – GONADOTROPHINES HUMAINES****■ Gonadoreline acétate**

<b>LUTRELEF</b>					
Perfusion IV ou SC pulsatile (toutes les 90 min, depuis le début du cycle jusqu'à obtention d'une ovulation)	1 fl. 3,2 mg	413,64	I	100 %	413,64

**■ Urofollitropine**

<b>FOSTIMONKIT</b>					
- Stimulation de l'ovulation : 75 à 150 UI/j les 7 premiers j du cycle Augmentation contrôlée des doses si besoin en fonction de la réponse de la patiente - Hyperstimulation ovarienne contrôlée dans le cadre des techniques d'aide médicale à la procréation 150 à 450 UI de FSH durant les 7 premiers j La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse ovarienne	1 ser. prérempl. 75 UI/mL	19,56	I	100 %	19,56
	5 ser. prérempl. 75 UI/mL	85,46	I	100 %	17,09
	1 ser. prérempl. 150 UI/mL	35,96	I	100 %	35,96
	5 ser. prérempl. 150 UI/mL	161,96	I	100 %	32,39

**■ Gonadotrophine ménopausique (ou HMG ou ménotropine)**

<b>MENOPUR</b>					
Idem <b>FOSTIMONKIT</b>	5 amp.	110,56	I	100 %	22,11

**PROPRIÉTÉS****• LUTRELEF**

Analogue synthétique de la LH-RH qui stimule la sécrétion hypophysaire de la LH et de FSH.

**• MENOPUR**

**HMG** : gonadotrophines obtenues à partir d'urine de femme ménopausée.

L'**HMG** associe FSH et LH (activité FSH prédominante).

**• FOSTIMONKIT**

FSH hautement purifiée, à partir de gonadotrophine ménopausique humaine (**HMG**).

**HMG** et FSH sont injectées en 1<sup>re</sup> partie de cycle, elles entraînent une croissance et une maturation folliculaire.

**INDICATIONS**

Induction de l'ovulation dans le cadre de la procréation médicalement assistée.

Selon la classification des anovulations par l'OMS, seules les classes I et IIa, en cas d'échec

du **citrate de clomifène**, relèvent de l'administration de GnRH (LH-RH).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Cancers hormono-dépendants, hémorragies génitales d'étiologie inconnue, tumeurs hypophysaires, stérilité mécanique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance médicale **stricte** (dosages plasmatiques d'estradiol, échographie).

En cas d'hyperstimulation ovarienne, le traitement doit être immédiatement interrompu.

Aucun cas de contamination virale associée à l'administration de gonadotrophine extraite de l'urine humaine n'a été rapporté, le risque de transmission d'agents infectieux, y compris ceux dont la nature est encore inconnue, ne peut cependant pas être définitivement exclu.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Grossesses multiples.


Syndrome d'hyperstimulation.

Hypersensibilité.

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (2)

### Stratégies thérapeutiques [1]

Situation	Stratégie
Ovaires polykystiques	<b>Citrate de clomifène</b> après recherche et éventuelle correction du surpoids et éléments du syndrome métabolique Seconde intention : <b>gonadotrophines/drilling ovarien/metformine</b>
Anovulation d'origine hypothalamique	Mesures hygiéno-diététiques et prise en charge psychologique éventuelle Administration pulsatile de GnRH, ou <b>gonadotrophines</b> avec un monitoring soigneux À taux égal de grossesses, il y a moins d'hyperstimulation ovarienne et de grossesses multiples avec la <b>GnRH pulsatile</b> qu'avec les <b>gonadotrophines</b> .
Stimulation d'une femme normo-ovulante en vue d'une insémination infra-utérine	Les <b>gonadotrophines</b> peuvent s'utiliser seules ou en association au <b>citrate de clomifène</b> L'objectif est d'augmenter de façon limitée le nombre de follicules en croissance (stimulation pauci-folliculaire)
Fécondation in vitro	Stimulation multifolliculaire : <b>gonadotrophines humaines</b> ou recombinantes Blocage de l'ovulation : <b>agoniste de la GnRH : DÉCAPAPETYL (DT)</b> , <b>antagoniste de la GnRH : CETROTIDE, ORGALUTRAN</b> Déclenchement de l'ovulation : <b>gonadotrophines chorioniques</b>



HCG : Human Chorionic Gonadotrophin ; DT : **DÉCAPEPTYL**.

## INDUCTEURS DE L'OVULATION (3) – GONADOTROPHINES HUMAINES RECOMBINANTES (1)

### ■ Follitropine alpha

<b>GONAL-F</b>					
- Stimulation de l'ovulation : 75 à 150 UI/j les 7 <sup>es</sup> j du cycle Augmentation contrôlée des doses si besoin en fonction de la réponse de la patiente - Hyperstimulation ovarienne contrôlée dans le cadre des techniques d'aide médicale à la procréation : 150 à 450 UI de FSH durant les 7 premiers j La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse ovarienne	1 pdre + ser. 75 UI SC	32,57	I	100 %	32,57
	6 pdre + ser. 450 UI SC	174,02	I	100 %	174,02
	15 pdre + ser. 1 050 UI SC	392,79	I	100 %	392,79
	1 styl. 300 UI SC	117,44	I	100 %	117,44
	1 styl. 450 UI SC	174,02	I	100 %	174,02
	1 styl. 900 UI SC	338,21	I	100 %	338,21

### ■ Follitropine bêta

<b>PUREGON</b>					
Idem <b>GONAL-F</b>	5 fl. 50 UI	98,56	I	100 %	19,71
	5 fl. 75 UI	145,71	I	100 %	29,14
	5 fl. 150 UI	283,55	I	100 %	56,71
	6 sol. inj. 300 UI bte de 1 cart. de 0,36 mL	117,43	I	100 %	19,57
	7 sol. inj. 600 UI bte de 1 cart. de 0,72 mL	228,92	I	100 %	32,70
	1 sol. inj. 900 UI bte de 1 cart. de 1,08 mL	338,16	I	100 %	338,16

### ■ Lutropine alpha

<b>LUVERIS</b>					
75 UI/j en association avec la FSH	1 fl. 75 UI pdre/solv	58,25	I	100 %	58,25
	3 fl. 75 UI pdre/solv	166,13	I	100 %	55,38

### ■ Follitropine alpha + lutropine alpha

<b>PERGOVERIS</b>					
Stimulation ovarienne contrôlée : 1 à 2 amp./j	1 fl. 150 UI <b>folli.</b> + 75 UI <b>lutro.</b> pdre/solv.	92,21	I	100 %	92,21
	10 fl. 150 UI <b>folli.</b> + 75 UI <b>lutro.</b> pdre/solv.	839,74	I	100 %	89,97

## STÉRILITÉ DU COUPLE - AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (3)

### Chirurgie de l'infertilité

#### Chirurgie de l'ovulation (SOPK)

N'est recommandée qu'en deuxième intention (échec du traitement par **citrate de clomifène**).

#### Adhésiolyse

N'est recommandée qu'en cas d'adhérences légères à modérées. L'utilisation d'un score adhérentiel est préconisé.

Dans le cas d'adhérences sévères, une prise en charge en AMP est recommandée en première intention car le bilan bénéfice/risque de la chirurgie est en sa défaveur.

Une coelioscopie de « second look » n'est pas recommandée.

#### Chirurgie tubaire

##### ► *Trompe distale*

La coelioscopie est indiquée en cas d'obstruction tubaire distale.

Utiliser un score d'atteinte de la trompe.

Lorsque la trompe est en bon état, une fimbrioplastie ou une néosalpingostomie peuvent être proposées.

Lorsque la trompe est en mauvais état, le passage à la FIV est recommandé.

Si un hydrosalpinx est présent, il est recommandé d'effectuer une salpingectomie ou une occlusion tubaire proximale si

la salpingectomie est difficile techniquement.

##### ► *Trompe proximale*

Cathétérisme sélectif sous contrôle radiologique ou par hystéroscopie.

##### ► *Atteintes tubaires multiples ou étendues*

Recours à l'AMP d'emblée.

#### Cloisons utérines

Indication à une métroplastie hystéroscopique si fausses couches à répétition ; en l'absence de fausses couches : à discuter au cas par cas.

#### Myomes, polypes

Réséction hystéroscopique.

#### Endométriose

Lorsqu'une endométriose est suspectée, une coelioscopie est recommandée. Le traitement chirurgical est préconisé dans les formes légères à moyennes (électrocoagulation bipolaire, vaporisation laser). Dans les formes sévères la balance bénéfice/risque doit être évaluée ; la chirurgie peut être lourde.

En présence d'**endométriomes**, le traitement chirurgical est recommandé si le kyste fait plus de 6 cm, s'il est responsable d'une symptomatologie invalidante, ou en cas de doute diagnostique sur la nature histologique de la lésion.

### CONSENSUS

[1] La prise en charge du couple infertile - Recommandations pour la pratique clinique, CNGOF, 2010

**INDUCTEURS DE L'OVULATION (4) – GONADOTROPHINES HUMAINES RECOMBINANTES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

FSH recombinante fabriquée par génie génétique; structure identique à la FSH humaine.

Croissance et maturation des follicules.

La lutopine alfa est une hormone lutéinisante humaine recombinante. Elle est utilisée pour stimuler le développement folliculaire en association avec la **follitropine alpha**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.

Cancers de l'ovaire, du sein, de l'utérus.

Tumeur de l'hypophyse ou de l'hypothalamus.

Saignements gynécologiques d'étiologie inconnue.

Insuffisance ovarienne, hypertrophie ou kystes de l'ovaire, non imputables à un syndrome des ovaires polykystiques.

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne devra être utilisée que par des médecins spécialistes de la prise en charge des problèmes d'infertilité.

Suivi régulier de la réponse ovarienne par examen échographique et dosages hormonaux.

L'existence d'endocrinopathies non contrôlées (thyroïdiennes, surrénaliennes ou hypophysaires) devra être exclue.

Une réponse ovarienne excessive au traitement par **gonadotrophines** provoque rarement un syndrome d'hyperstimulation ovarienne si l'**HCG** n'est pas administrée pour déclencher l'ovulation.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

*Hyperstimulation ovarienne.*

*Grossesse multiple.*

Accident thromboembolique : dans de rares cas, des accidents thromboemboliques artériels ont été observés.

Prurit, douleur, œdème, ecchymose au point d'injection.

## INDUCTEURS DE L'OVULATION (5) – GONADOTROPHINE CHORIONIQUE (HCG)

### ■ Gonadotrophine chorionique (ou HCG)

<b>GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO</b>					
3 000 à 10 000 UI 24 à 48 h après la dernière administration d'HMG ou de FSH	6 amp. 1 500 UI	10,71	I	65 %	1,78
	1 amp. 5 000 UI	5,95	I	65 %	5,95

### ■ Gonadotrophine chorionique alpha

<b>OVITRELLE</b>					
FIV : 1 stylo équivalent à 6 500 U	1 stylo prérempl. 0,5 mL (250 µg)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Gonadotrophine placentaire à activité LH qui déclenche l'ovulation.

#### INDICATIONS

Déclenchement de l'ovulation.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'injection d'**HCG** ne doit pas être faite si le taux d'estradiol plasmatique est trop élevé. Aucun cas de contamination virale associée à l'administration de gonadotrophine extraite de l'urine humaine n'a été rapporté, le risque de transmission d'agents infectieux, y compris ceux dont la nature est encore inconnue, ne peut cependant pas être définitivement exclu.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Grossesses multiples.  
Syndrome d'hyperstimulation.



**INDUCTEURS DE L'OVULATION (6) – AGONISTES DE LA GNRH****■ Triptoréline**

<b>DÉCAPEPTYL</b>					
Infécondité : 1 inj. SC/j à partir du 2 <sup>e</sup> j du cycle jusqu'à la veille du jour choisi pour le déclenchement	7 fl. 0,1 mg	40,90	I	100 %	5,84
<b>DÉCAPEPTYL LP</b>					
Endométriose : 1 IM (3 mg)/4 sem. ou 1 IM (11,25 mg)/3 mois, max 6 mois	1 fl. 3 mg + ser. + aig.	133,44	I	65 %	133,44
Infécondité : 1 IM (3 mg) le 20 <sup>e</sup> j du cycle précédant la stimulation	1 fl. 11,25 mg + ser. + aig.	376,15	I	65 %	376,15
	1 fl. 22,5 mg + ser. + aig.	715,44	I	100 %	715,44

**■ Leuproréline**

<b>ENANTONE LP</b>					
Endométriose : 1 IM (3,75 mg)/4 sem. ou 1 IM (11,25 mg)/3 mois	1 fl. 3,75 mg	137,17	I	65 %	137,17
	1 fl. 11,25 mg	376,15	I	65 %	376,15

**■ Nafareline**

<b>SYNAREL</b>					
Endométriose : 200 µg le matin dans 1 narine, le soir dans l'autre	60 fl. 8 mL (60 doses de 0,2 mg)	123,89	I	65 %	123,89

**PROPRIÉTÉS**

Stimulation initiale de la sécrétion d'hormones gonadotropes (effet flare up), puis en 2 à 4 sem. inhibition de cette sécrétion aboutissant à une castration pharmacologique réversible à l'arrêt du traitement.

Prévention de l'ovulation prématurée au cours de la stimulation de l'ovulation par les **gonadotrophines** en vue d'une procréation médicalement assistée.

**INDICATIONS**

Endométriose.

Infécondité féminine, en association avec les **gonadotrophines** pour le **DÉCAPEPTYL**.

Fibromes utérins en préopératoire.

Cancer de la prostate (**DÉCAPEPTYL LP**, **ENANTONE LP**).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité aux produits.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Vérifier l'absence de grossesse avant le début du traitement.

Éviter les traitements de plus de 6 mois, car risque d'ostéoporose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Liés à l'effet thérapeutique et fréquents : bouffées de chaleur, disparition de la libido, prise de poids, sécheresse vaginale, peau grasse, nausées, céphalées, syndrome dépressif ; perte de masse osseuse *a priori* réversible 6 mois après l'arrêt du traitement.

## INDUCTEURS DE L'OVULATION (7) – ANTAGONISTES DE LA GnRH

## ■ Ganirélix

<b>ORGALUTRAN</b>					
0,25 mg SC x 1/j, en commençant autour du 6 <sup>e</sup> j de l'administration de <b>FSH</b> À poursuivre jusqu'au jour où un nombre suffisant de follicules de taille adéquate est obtenu	1 inj. SC 0,25 mg/0,5 mL	46,23	I	100 %	46,23
	5 inj. SC 0,25 mg/0,5 mL	212,88	I	100 %	42,58

## ■ Cétorélix

<b>CETROTIDE</b>					
<b>Protocole multidoses</b> 0,25 mg SC x 1/j, en commençant autour du 6 <sup>e</sup> j de l'administration de <b>FSH</b> À poursuivre pdt toute la période de traitement par les <b>gonadotrophines</b>	1 inj. SC 0,25 mg pdre/solv.	48,43	I	100 %	48,43

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste compétitif de la GnRH entraînant une suppression rapide, profonde et réversible des gonadotrophines endogènes, sans stimulation initiale.

Utilisé dans les protocoles de stimulation ovarienne contrôlée pour bloquer le pic de LH pouvant entraîner une ovulation précoce.

## INDICATIONS

Prévention des pics prématurés d'hormone lutéinisante (LH) chez les femmes en cours d'hyperstimulation ovarienne contrôlée (HOC) dans le cadre des techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux analogues de la GnRH (agonistes et antagonistes).  
Pathologie modérée ou sévère du rein ou du foie.

Grossesse ou allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les **antagonistes de la GnRH** sont d'un usage récent. Leur place exacte dans la stratégie thérapeutique de l'assistance médicale à la procréation est en cours de définition. Surveillance médicale **stricte**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hyperstimulation ovarienne.

Allergie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

En cours d'étude.

## VACCIN CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN

## ■ Vaccin Papillomavirus humain

<b>GARDASIL</b>					
3 doses de 0,5 mL à 0, 2 et 6 mois	1 ser. préempl. 0,5 mL	123,44	I	65 %	123,44
<b>CERVARIX</b>					
3 doses à 0, 1 et 6 mois	1 ser. préempl. 0,5 mL	111,52	I	65 %	111,52

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin recombinant préparé à partir de pseudo-particules virales hautement purifiées de la principale protéine L1 de la capsid des HPV de types 6, 11, 16 et 18 pour **GARDASIL** et 16 et 18 pour **CERVARIX**.

**INDICATIONS**

**GARDASIL** : prévention des dysplasies de haut grade du col de l'utérus (CIN 2/3), des cancers du col de l'utérus, des dysplasies de haut grade de la vulve (VIN 2/3) et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux *Papillomavirus* humains de types 6, 11, 16 et 18.

**CERVARIX** : prévention des dysplasies de haut grade du col de l'utérus (CIN 2/3), des cancers du col de l'utérus, des dysplasies de haut grade de la vulve (VIN 2/3) et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux *Papillomavirus* humains de types 16 et 18.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au produit.

L'administration d'un vaccin doit être différée chez les individus souffrant d'une maladie fébrile aiguë sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les mesures de précaution appropriées vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles doivent être poursuivies.

La vaccination ne remplace pas les tests de dépistage de routine du cancer du col de l'utérus.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fièvre.

Au site d'injection : érythème, douleur, gonflement, prurit.

**Grossesse** : aucun événement indésirable grave n'a été détecté lors de l'administration de **GARDASIL/CERVARIX** pendant la grossesse ; les données sont insuffisantes pour en recommander l'utilisation dans ce contexte. La vaccination doit ainsi être reportée après le terme de la grossesse. Il n'y a pas d'indication d'interruption de grossesse en cas d'administration de **GARDASIL/CERVARIX** pendant la grossesse.

**ANTIPROGESTÉRONE**■ **Mifépristone - RU 486**

<b>MIFÉGYNE</b>					
Dilatation cervicale : 3 cp. en prise unique	3 cp. 200 mg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé de la noréthindrone ; antagoniste compétitif de la progestérone au niveau des récepteurs tissulaires qui déclenche un avortement.

**INDICATIONS**

IVG.

Interruption thérapeutique de grossesse et mort fœtale *in utero* : permet de réduire la dose de **prostaglandines** nécessaires à l'expulsion de la grossesse.

**CONTRE-INDICATIONS**

Intolérance connue au produit.

Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse :

- doute sur grossesse extra-utérine ;

– si contre-indication aux **prostaglandines**.

Femmes de plus de 35 ans, ou fumeuses.

HTA, angor, syndrome de Raynaud.

Trouble du rythme, insuffisance cardiaque.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prise en présence du médecin, dans un établissement satisfaisant aux dispositions de l'article L.176 du code de la santé publique.

Prévention Rhésus si femme Rhésus négatif.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Métrorragie abondante durant 6 à 12 j.

Échec du traitement < 5 % des cas.

Nausées, vomissements, douleurs pelviennes, céphalées, allergie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

**AINS** (antagonistes des prostaglandines).

## TOCOLYTIQUES

### ■ Nicardipine

<b>LOXEN</b>					
<b>LOXEN</b> IVSE 1 à 3 mL/h	5 amp. 10 mg/10 mL		I	NR	
<b>LOXEN</b> PO 20 mg 2 à 3cp./j	30 cp. séc. 20 mg	5,31	I	65 %	0,18
	90 cp. séc. 20 mg	13,96	I	65 %	0,16
<b>LOXEN</b> PO 50 mg LP 1 à 2 cp./j	60 gél. LP 50 mg	15,36	I	65 %	0,26
	180 gél. LP 50 mg	43,24	I	65 %	0,24

### ■ Nifédipine

<b>ADALATE</b>					
1 caps. à renouveler toutes les 15 min pdt 1 h jusqu'à diminution des contractions	30 caps. 10 mg	2,93	I	65 %	0,10
	90 caps. 10 mg	6,41	I	65 %	0,07
<b>ADALATE LP</b>					
2 à 3 cp./j en traitement d'entretien	30 cp. 20 mg	3,96	I	65 %	0,13
	180 cp. 20 mg	20,04	I	65 %	0,11
<b>CHRONADALATE</b>					
1 à 2 cp. LP/j en traitement d'entretien	30 cp. 30 mg	8,99	I	65 %	0,30
	90 cp. 30 mg	25,29	I	65 %	0,28

#### PROPRIÉTÉS

Myorelaxant utérin.

#### INDICATIONS

Menace d'accouchement prématuré.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.

Contractions utérines symptomatiques d'infection (chorioamniotite), d'hématome rétro-placentaire, souffrance fœtale aiguë, pré-éclamp-

sie sévère, rupture prématurée des membranes après 32 SA.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Bouffées vasomotrices, céphalées (apparition en début de traitement puis disparition).

Plus rarement : tachycardie, palpitations, éruption cutanée, asthénie, vertiges, troubles du sommeil, nausées, gastralgie, dyspepsie.

Exceptionnel pour la **nifédipine** : atteinte hépatique réversible à l'arrêt du traitement.

## ANTAGONISTE DE L'OCYTOCINE

## ■ Atosiban

<b>TRACTOCILE</b>					
MAP	1 fl. 0,9 mL	HOP	I		
Attaque : bolus : 0,9 mL en 1 min, perf. de charge (3 h) : 24 mL/h	1 fl. 5 mL	HOP	I		
Entretien : 8 mL/h					

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste compétitif de l'ocytocine au niveau des récepteurs.

Diminue la fréquence des contractions et la tonicité du muscle utérin.

**INDICATIONS**

Menace d'accouchement prématuré.

**CONTRE-INDICATIONS**

Contre-indications de la tocolyse : tout facteur, chez la mère ou le fœtus, rendant la poursuite de la grossesse dangereuse (souffrance fœtale, métrorragies, pré-éclampsie sévère, rupture prématurée des membranes après 32 SA, suspicion de chorioamniotite), mort fœtale *in utero*.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il n'existe pas de données cliniques sur l'utilisation de l'**atosiban** chez des patientes souffrant de troubles de la fonction hépatique ou rénale. L'**atosiban** n'a pas été utilisé chez des patientes

présentant une localisation anormale du placenta.

Le renouvellement d'un traitement par **TRAC-TOCILE** est possible, mais l'expérience clinique avec des traitements répétés, jusqu'à 3 renouvellements, est faible.

En tant qu'**antagoniste de l'ocytocine**, l'**atosiban** peut théoriquement favoriser le relâchement du muscle utérin et une hémorragie post-partum.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements, hyperglycémie, céphalées, vertiges, tachycardie, bouffées de chaleur, hypotension. Réaction au point d'injection, prurit, rash, fièvre, insomnie.

Des cas isolés d'hémorragies utérines et d'atonies utérines ont été rapportés. Leur fréquence n'est pas supérieure à celle des groupes témoins inclus dans les essais cliniques.

Réaction allergique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune relevée au cours des études cliniques.

## IMMUNOGLOBULINE ANTI-D

## ■ Immunoglobuline humaine anti-D (Rh)

<b>RHOPHYLAC</b>					
Prévention de l'allo-immunisation fœto-maternelle : 200 à 300 µg selon les indications	1 inj. 200 µg/2 mL (1 000 UI)	60,89	I	100 %	60,89
Hémorragie fœto-maternelle importante (> 4 mL) : doses complémentaires de 20 µg/mL d'hématies fœtales	1 inj. 300 µg/2 mL (1 500 UI)	84,62	I	100 %	84,62
Transfusions incompatibles : 20 µg/2 mL de sang Rh D positif transfusé ou par mL de concentré érythrocytaire					

**PROPRIÉTÉS**

Contient des anticorps spécifiques de type IgG, dirigés contre l'antigène Rh(D) des érythrocytes humains.

Si la mère est Rh(D)-négatif et le fœtus Rh(D)-positif, la mère peut s'immuniser contre l'antigène Rh(D) et produire des anticorps anti-Rh(D) qui traversent le placenta pouvant provoquer une maladie hémolytique du nouveau-né (principalement au cours d'une grossesse ultérieure).

L'injection assez tôt et en quantité suffisante d'**immunoglobuline anti-D** prévient l'immunisation Rh(D) dans plus de 99 % des cas.

L'élimination des hématies Rh(D)-positif est retardée en cas d'injection intramusculaire (les immunoglobulines injectées par voie intraveineuse sont immédiatement détectables dans la circulation alors qu'elles doivent être absorbées à partir du point d'injection en cas d'intramusculaire).

**INDICATIONS**

Prévention de l'allo-immunisation fœto-maternelle (femmes Rh négatif).

Traitement des sujets Rh(D)-négatif après transfusions incompatibles de sang Rh(D)-positif ou d'autres produits contenant des hématies Rh(D)-positif.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

La voie intramusculaire est contre-indiquée

chez les sujets présentant un trouble de l'hémostase.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Des réactions allergiques.

Les patients doivent être informés des signes de réaction d'hypersensibilité.

Le patient doit être gardé en observation au moins 20 min après administration.

Certains individus avec un déficit en IgA peuvent développer des anticorps anti-IgA (**RHO-PHYLAC** contient une quantité < 5 % d'IgA).

La transmission d'agents infectieux ne peut pas être totalement exclue lors de l'administration de médicaments préparés à partir de sang ou de plasma humain.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur et sensibilité locales au point d'injection.

Hyperthermie, malaise, céphalées, réactions cutanées et frissons.

Réactions de type allergique ou anaphylactique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'immunisation active avec des vaccins à virus vivant atténué (ex. le vaccin de la rougeole, des oreillons, de la rubéole ou de la varicelle) doit être reportée de 3 mois après la dernière administration de l'**immunoglobuline anti-D** car l'efficacité du vaccin peut être altérée.

**OCYTOCIQUES INJECTABLES (1)****■ Oxytocine****SYNTOCINON**

Induction des contractions utérines :  
0,1 à 0,4 mL/min en IVL à dose progressive. Jusqu'à 2 mL/min (5 UI/500 mL de glucose)  
Rétraction utérine : 5 à 10 UI IVL

3 amp. 1 mL = 5 UI  
10 amp. 1 mL = 5 UI

**2,78**  
**HOP**

II  
II

65 %

**0,93**

**PROPRIÉTÉS**

Analogue synthétique de l'ocytocine hypophysaire, augmentant la fréquence et l'intensité des contractions utérines.

**INDICATIONS**

Induction des contractions pendant le travail.  
Rétraction utérine au moment de la délivrance.  
Hémorragie du post-partum immédiat.

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolues : hypersensibilité, hypertonie utérine, hématome rétro-placentaire, placenta prævia compliqué, toxémie gravidique sévère.  
Relatives : utérus cicatriciel ou surdistendu, mort fœtale *in utero*.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Pendant le travail : il est indispensable de monitorer l'activité de l'utérus et l'état du fœtus

pour prévenir une souffrance fœtale ou une hypertonie utérine, réversibles à l'arrêt du traitement.

Dans les hémorragies du post-partum immédiat, s'assurer de la vacuité utérine et de l'intégrité de la filière génitale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Surdosage : hypercinésie de fréquence, hypertonie utérine et risque de souffrance fœtale.  
Rupture utérine.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Déconseillées : analogues des prostaglandines.**  
Les prostaglandines peuvent potentialiser l'effet de l'ocytocine et réciproquement. En conséquence, l'utilisation simultanée des deux produits doit être faite avec précaution.



## HÉMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMÉDIAT (1)

### Définition [1]

Perte sanguine de plus de 500 mL dans les 24 h qui suivent la naissance.

### Traitement préventif [1]

- Toute femme en début de travail doit disposer de 2 déterminations du groupe sanguin ABO RH D et Kell 1 valides et du résultat de la recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) datant de moins de 1 mois.

- En cas de risque très élevé d'hémorragie du post-partum : RAI de moins de 3 j nécessaire à l'entrée en salle de naissance ; prise en charge dans une structure adaptée. Cela concerne les patientes présentant :

- un placenta recouvrant ;
- une suspicion de placenta accreta ;
- ou des troubles sévères de l'hémostase.

- Systématiquement :

- Une **surveillance régulière en salle de naissance pendant les 2 h qui suivent un accouchement** (importance des pertes sanguines, qualité du globe utérin, fréquence cardiaque et mesure de la pression artérielle). Ces données seront consignées dans le dossier de la patiente.

- Une **prise en charge active de la délivrance** : au moment du décollement placentaire, traction contrôlée du cordon associée à une contre-pression suspubienne à l'aide de la main abdominale et

une **injection d'oxytocine (SYNTOCINON)** 5 à 10 UI en intraveineuse lente au moment du dégagement de l'épaule antérieure de l'enfant (délivrance dirigée).

- Un **massage de l'utérus** effectué après l'expulsion du placenta si l'utérus est hypotonique.

- Un **examen du placenta** afin de vérifier s'il est complet. La rétention de cotylédons ou de membranes indique une révision utérine.

- Une **délivrance artificielle** lorsque le placenta n'est pas expulsé dans un délai de 10-20 min.

### Cas particulier : placenta accreta [1]

- En l'absence d'hémorragie, le placenta peut être laissé en place en partie ou en totalité.

- En cas d'hémorragie modérée, une ligature artérielle éventuellement associée à un capitonnage utérin (en cas de césarienne) ou une embolisation artérielle (en cas de voie basse) peuvent être réalisées. Une hystérectomie s'impose en cas d'échec ou d'hémorragie grave d'emblée.

### Conduite à tenir [1]

**Prévenir** tous les intervenants (la prise en charge doit se faire en équipe : aide-soignante, sage-femme, infirmière, obstétricien, anesthésiste-réanimateur).

**Facteur temps** primordial : consigner tous les temps de la prise en charge.

### Dans les premières 15 à 30 min

Réanimation	Obstétrique
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Monitoring : pouls, PA, SaO<sub>2</sub></li> <li>– Vérification de la voie d'abord veineuse</li> <li>– Remplissage (cristalloïdes)</li> <li>– Vérification de la carte de groupe (et RAI)</li> <li>– Anesthésie adaptée à la pratique des gestes obstétricaux dans les conditions de sécurité optimale et dans de brefs délais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurer la vacuité utérine : délivrance artificielle ou révision utérine</li> <li>– Vider la vessie</li> <li>– Masser l'utérus s'il est hypotonique</li> <li>– Examiner la filière génitale sous valves</li> <li>– Pratiquer une antibioprophylaxie (gestes endo-utérins)</li> </ul> <p><b>Oxytocine (SYNTOCINON)</b> : 5 à 10 UI en intraveineuse lente puis en perfusion (5 à 10 UI/h pendant 2 h)</p>

**OCYTICIQUES INJECTABLES (2)****■ Sulprostone**

<b>NALADOR</b>					
Hémorragie du post-partum immédiat : 1 amp. sur 1 h puis 1 amp. sur 4 à 5 h ITG ou MFU : 2 amp./10 h Adapter à l'efficacité	1 amp. 500 µg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé synthétique de la prostaglandine E<sub>2</sub> provoquant des contractions, et une dilatation du col.

**INDICATIONS**

Hémorragie du post-partum immédiat.  
Interruption thérapeutique de grossesse, mort fœtale *in utero* au 2<sup>e</sup> trim.

**CONTRE-INDICATIONS**

En cas d'hémorragie du post-partum immédiat si le risque vital maternel peut être mis en jeu, les contre-indications habituelles deviennent relatives.

Femmes > 35 ans ou grande fumeuse, antécédents d'hypersensibilité au produit, antécédents cardiocirculatoires, asthme, antécédents comitiaux, utérus cicatriciel, insuffisance rénale ou hépatique grave, hyperthyroïdie, dia-

bète décompensé, ulcère, thalassémie, drépanocytose.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En perfusion IV, avec surveillance cardiorespiratoire, et matériel de réanimation disponible. L'augmentation des doses n'augmente pas l'efficacité thérapeutique, mais conduit à plus d'effets indésirables.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Des accidents cardiovasculaires graves (potentiellement mortels) ont été notifiés (spasme coronarien).

Nausées, vomissements, douleur abdominale, diarrhée, céphalée, obnubilation.

Bronchoconstriction si prédispositions.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudente avec **oxytocine** (potentialisation).

**AINS** (antagonisme).

**ŒSTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE ORALE (1)**■ **Estradiol 17 bêta (per os)**

<b>ESTROFEM</b>					
1 cp./j pdt 25 j/mois	28 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg		II II	NR NR	
<b>PROVAMES</b>					
1 à 2 mg/j pdt 25 j/mois	30 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg	2,50 2,50	II II	65 % 65 %	0,08 0,09
<b>OROMONE</b>					
1 cp./j pdt 25 j/mois	28 cp. 1 mg 28 cp. 2 mg	2,50 2,50	II II	65 % 65 %	0,09 0,09
<b>PROGYNOVA</b>					
2 mg/j pdt 20 j/mois	20 cp. 1 mg 20 cp. 2 mg 60 cp. 2 mg		II II II	NR NR NR	
<b>ESTREVA</b>					
1 cp./j pdt 28 j/mois	28 cp. 1,5 mg	2,50	II	65 %	0,09

■ **œstrogènes conjugués**

<b>PHYSIOGINE</b>					
1/2 à 1 cp./j pdt 28 j/mois	30 cp. séc. 1 mg	5,37	II	30 %	0,18

## MÉNOPAUSE (2)

### Règles de prescription d'un THM [1]

- Une information objective sur les bénéfices escomptés et les risques encourus lors de la prise du THM doit être fournie à la patiente.
- Contre-indications absolues :
  - antécédent personnel de cancer du sein ;
  - antécédent personnel de tumeur œstro-géno-dépendante ;
  - antécédent personnel de maladie coronarienne ;
  - antécédent personnel d'accident vasculaire cérébral ;
  - antécédent personnel de maladie veineuse thromboembolique ;
  - antécédent personnel d'accident thromboembolique artériel ;
  - haut risque cardiovasculaire ;
  - hémorragie génitale sans diagnostic étiologique établi ;
  - affection hépatique aiguë ou chronique.
- En cas de prescription ou de renouvellement d'un THM, il n'est recommandé aucune surveillance particulière autre que le bilan cardiovasculaire d'usage et la palpation des seins.
- Il est recommandé de surveiller régulièrement le risque cardiovasculaire, ce qui inclut la recherche des facteurs de risque traditionnels (pression artérielle, cholestérol total et HDL, glycémie, tabagisme), et de traiter ces éventuels facteurs de risque.
- Les femmes doivent être incitées à participer régulièrement au dépistage organisé du cancer du sein par mammographie, notamment en début de traitement. L'augmentation de densité mammaire peut cependant gêner le diagnostic et pourrait faire envisager une stratégie de surveillance adaptée (échographie complémentaire, réduction de l'intervalle des mammographies, etc.).
- Il paraît opportun de vérifier la nécessité de poursuivre le traitement une fois par an, à l'aide d'une fenêtre thérapeutique :
  - soit en réduisant progressivement la dose d'œstrogène administrée ;
  - soit en suspendant quelques semaines le traitement.
- En cas d'hystérectomie : il est recommandé de prescrire un THM par œstrogènes seuls.

**ŒSTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE ORALE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

œstrogène de synthèse chimiquement et biologiquement identique à l'estradiol endogène humain. Il remplace l'arrêt de production des œstrogènes chez les femmes ménopausées et soulage les symptômes climatiques de la ménopause.

**INDICATIONS**

Symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes ménopausées.

Prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes ayant un risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Cancer du sein connu ou suspecté, ou antécédent de cancer du sein.

Tumeurs malignes œstrogénodépendantes connues ou suspectées (exemple : cancer de l'endomètre).

Hémorragie génitale d'étiologie inconnue.

Antécédent d'accident thromboembolique veineux idiopathique ou accident thromboembolique veineux en évolution (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

Accident thromboembolique artériel récent ou en évolution (exemple : angor, infarctus du myocarde).

Haut risque cardiovasculaire.

Affection hépatique aiguë ou antécédents d'affection hépatique, jusqu'à normalisation des tests hépatiques.

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique, puis annuel avec réévaluation de la nécessité du traitement et du rapport bénéfice/risque.

Incitation au dépistage des cancers gynécologiques.

Association systématique à un progestatif en 2<sup>e</sup> partie de cycle (sauf hystérectomie).

Augmenter la posologie si persistance des signes de carence œstrogénique.

Arrêt du traitement en cas d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets œstrogéniques excessifs (réduire la posologie).

Rares, mais nécessitant l'arrêt du traitement : accident cardiovasculaire ou embolique, HTA, céphalées importantes, troubles neurologiques, tumeur du sein ou de l'utérus, diabète, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

**ESTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE PERCUTANÉE (1)****■ Estradiol 17 bêta**

<b>OESTRODOSE</b>					
2 pressions/j pdt 3 sem. sur 4	64 pressions 0,75 mg (fl. 80 g)	5,77	II	65 %	0,09
<b>ESTREVA</b>					
2 pressions/j pdt 3 sem. sur 4	100 pressions 0,5 mg (tube 50 g)	5,55	II	65 %	0,06
<b>ESTRADERM TTS</b>					
1 pch. à renouveler 2 fois/sem. pdt 3 sem. sur 4	8 pch. 50 µg 8 pch. 100 µg	7,49 7,49	II II	NR NR	0,94 0,94
<b>ÆSCIM</b>					
Idem <b>ESTRADERM TTS</b>	8 pch. 25 µg 8 pch. 37,5 µg 8 pch. 50 µg	7,49 7,49 7,49	II II II	65 % 65 % 65 %	0,94 0,94 0,94
<b>DERMESTRIL</b>					
Idem <b>ESTRADERM TTS</b>	8 pch. 25 µg 8 pch. 50 µg 8 pch. 100 µg	7,32 7,32 7,32	II II II	65 % 65 % 65 %	0,92 0,92 0,92
<b>DERMESTRIL SEPTEM</b>					
1 pch./sem.	4 pch. 25 µg 4 pch. 50 µg 4 pch. 75 µg	7,32 7,32 7,32	II II II	65 % 65 % 65 %	1,83 1,83 1,83
<b>CLIMARA</b>					
1 pch./7 j 3 ou 4 sem. ou en continu	4 pch. 50 µg	7,32	II	65 %	1,83
<b>FEMSEPT</b>					
Idem <b>ESTRADERM TTS</b>	4 pch. 50 µg 4 pch. 75 µg 4 pch. 100 µg	7,32 7,32 7,32	II II II	65 % 65 % 65 %	1,83 1,83 1,83
<b>VIVELLEDOT</b>					
Idem <b>ESTRADERM TTS</b>	8 pch. 25 µg 8 pch. 37,5 µg 8 pch. 50 µg 8 pch. 75 µg 8 pch. 100 µg	7,32 7,32 7,32 7,32 7,32	II II II II II	65 % 65 % 65 % 65 % 65 %	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

## ŒSTROGÉNOTHÉRAPIE SUBSTITUTIVE PERCUTANÉE (2)

## ■ Estradiol 17 bêta

<b>THAIS</b>					
1 pch. à renouveler 2 fois/sem. pdt 3 sem. sur 4	8 pch. 25 µg	7,32	II	65 %	0,92
	8 pch. 50 µg	7,32	II	65 %	0,92
	8 pch. 100 µg	7,32	II	65 %	0,92
<b>THAIS SEPT</b>					
1 pch./sem.	4 pch. 25 µg	7,32	II	65 %	1,83
	4 pch. 50 µg	7,32	II	65 %	1,83
	4 pch. 75 µg	7,32	II	65 %	1,83
<b>ESTRAPATCH</b>					
1 pch./sem.	4 pch. 40 µg	7,32	II	65 %	1,83
	4 pch. 60 µg	7,32	II	65 %	1,83
	4 pch. 80 µg	7,32	II	65 %	1,83
<b>DÉLIDOSE</b>					
1 à 2 sach./j	28 sach. 0,5 mg	3,23	II	65 %	0,12
	28 sach. 1 mg	4,80	II	65 %	0,17
<b>OESTROGEL</b>					
1 mes./j	32 mes. (tube 80 g)	3,51	II	65 %	0,11

**PROPRIÉTÉS**

Œstrogène de synthèse chimiquement et biologiquement identique à l'estradiol endogène humain. Il remplace l'arrêt de production des œstrogènes chez les femmes ménopausées et soulage les symptômes climatiques de la ménopause.

**INDICATIONS**

Symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes ménopausées.

Prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes ayant un risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Cancer du sein connu ou suspecté, ou antécédent de cancer du sein.

Tumeurs malignes œstrogénodépendantes connues ou suspectées (exemple : cancer de l'endomètre).

Hémorragie génitale d'étiologie inconnue.

Antécédent d'accident thromboembolique veineux idiopathique ou accident thromboembolique veineux évolutif (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

Accident thromboembolique artériel récent ou évolutif (exemple : angor, infarctus du myocarde).

Haut risque cardiovasculaire.

Affection hépatique aiguë ou antécédents d'affection hépatique, jusqu'à normalisation des tests hépatiques.

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique, puis annuel avec réévaluation de la nécessité du traitement et du rapport bénéfice/risque.

Incitation au dépistage des cancers gynécologiques.

Association systématique à un progestatif en 2<sup>e</sup> partie de cycle (sauf hystérectomie).

Augmenter la posologie si persistance des signes de carence œstrogénique.

Arrêt du traitement en cas d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Prurit, allergie de contact.

Effets œstrogéniques excessifs (réduire la posologie).

Rares, mais nécessitant l'arrêt du traitement : accident cardiovasculaire ou embolique, HTA, céphalées importantes, troubles neurologiques, tumeur du sein ou de l'utérus, diabète, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inducteurs enzymatiques.

**ESTROPROGESTATIFS SUBSTITUTIFS COMBINÉS (1)****■ Estradiol 17 bêta + médroxyprogestérone**

<b>DIVINA</b>					
1 cp./j pdt 21 j/mois	21 cp. (cp. blanc : estradiol 2 mg ; cp. bleu : estradiol 2 mg + médroxyprogestérone 10 mg)	7,75	I	65 %	0,37
<b>DUOVA</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 1 mg/2,5 mg	7,75	I	65 %	0,28
	28 cp. 1 mg/5 mg	7,75	I	65 %	0,28
	28 cp. 2 mg/5 mg	7,75	I	65 %	0,28

**■ Estradiol 17 bêta + cyprotérone**

<b>CLIMÈNE</b>					
1 cp./j pdt 21 j/mois	21 cp. (cp. blanc : estradiol 2 mg ; cp. rose : estradiol 2 mg et acétate de ciproterone 1 mg)	7,75	I	65 %	0,37

**■ Estradiol 17 bêta + noréthistérone**

<b>TRISEQUENS</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. (cp. bleu : estradiol 2 mg ; cp. blanc : estradiol 2 mg et noréthistérone 1 mg ; cp. rouge : estradiol 1 mg)	7,75	I	65 %	0,28
<b>KLIOGEST</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 2 mg/1 mg	7,75	I	65 %	0,28
<b>NOVOFEMME</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. (cp. blanc : estradiol 1 mg et noréthistérone 1 mg ; cp. rouge : estradiol 1 mg)	7,75	I	65 %	0,28
<b>ACTIVELLE</b>					
1 cp./j en continu, à la même heure	28 cp. 1 mg/0,5 mg	7,75	I	65 %	0,28
<b>CLIMASTON</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 1 mg/5 mg	7,40	I	65 %	0,26
	28 cp. 1 mg/10 mg	7,40	I	65 %	0,26
	28 cp. 2 mg/10 mg	7,40	I	65 %	0,26

**■ Estradiol 17 bêta + gestodène**

<b>CLIMODIENE</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 2 mg/2 mg	7,75	I	65 %	0,28
<b>AVADÈNE</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 1 mg/0,025 mg	7,75	I	65 %	0,28



**GESTROGESTATIFS SUBSTITUTIFS COMBINÉS (2)**■ **Estradiol 17 bêta + drospirénone**

<b>ANGELIQ</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 1 mg/2 mg		I	NR	

■ **Estradiol + lévonorgestrel**

<b>FEMSEPTCOMBI</b>					
1 pch. à renouveler 1 fois par sem.	4 pch. 50 µg + 10 µg	11,29	I	65 %	2,82
<b>FEMSEPTVO</b>					
Idem <b>FEMSEPTCOMBI</b>	4 pch. 50 µg + 7 µg	10,75	I	65 %	2,69

■ **Estradiol + nomégestrol**

<b>NAEMIS</b>					
1 cp./j pdt 24 j/mois	24 cp. (cp. rose : estradiol 1,5 mg ; cp. blanc : estradiol 1,5 mg et nomégestrol 3,75 mg)	7,75	I	65 %	0,32
<b>ZOELY</b>					
1 cp./j tous les j	28 cp. 24 (blancs) : 1,5 mg d'estradiol et 2,5 mg de nomegestrol 4 (jaunes) : placebos		I	NR	
	84 cp. 3 plaquettes de 28 cp.		I	NR	

**ŒSTROGESTATIFS SUBSTITUTIFS COMBINÉS (3) –  
PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Les œstrogestatifs combinés associent un œstrogène naturel et un progestatif non androgénique.

L'association à un progestatif est indispensable chez les patientes non hystérectomisées pour réduire le sur-risque de cancer de l'endomètre.

**INDICATIONS**

Symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes ménopausées.

Prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes ayant un risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Cancer du sein connu ou suspecté, ou antécédent de cancer du sein.

Tumeurs malignes œstrogénodépendantes connues ou suspectées (exemple : cancer de l'endomètre).

Hémorragie génitale d'étiologie inconnue.

Antécédent d'accident thromboembolique veineux idiopathique ou accident thromboembolique veineux en évolution (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

Accident thromboembolique artériel récent ou en évolution (exemple : angor, infarctus du myocarde).

Haut risque cardiovasculaire.

Affection hépatique aiguë ou antécédents d'affection hépatique, jusqu'à normalisation des tests hépatiques.

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique, puis annuel avec réévaluation de la nécessité du traitement et du rapport bénéfice/risque.

Incitation au dépistage des cancers gynécologiques.

Association systématique à un progestatif en 2<sup>e</sup> partie de cycle (sauf hystérectomie).

Augmenter la posologie si persistance des signes de carence œstrogénique.

Arrêt du traitement en cas d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effet œstrogénique excessif nécessitant une diminution de la posologie.

Rares, mais nécessitant l'arrêt du traitement : accident cardiovasculaire ou embolique, HTA, céphalées importantes, troubles neurologiques, tumeur du sein ou de l'utérus, diabète, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

## ŒSTROGÈNES PAR VOIE VAGINALE

## ■ Estriol

<b>PHYSIOGINE</b>					
1 ovule chaque soir pdt 3 sem. 1 dose le soir pdt 3 sem.	15 ovules 0,5 mg 1 tube 15 g (0,5 mg/dose)	3,96 5,11	II II	15 % 30 %	0,26 5,11
<b>GYDRELLE</b>					
1 dose/j pdt 3 sem.	1 tube 30 g (100 mg/dose)	4,17	II	30 %	4,17
<b>TROPHICRÈME</b>					
1 à 2 appl./j	1 tube 30 g	5,60	II	30 %	5,60

## ■ Estriol + progestérone + bacille de Döderlein

<b>TROPHIGIL</b>					
1 gél. x 2/j pdt 3 sem.	14 gél. vaginales	4,56	I	30 %	0,33
<b>FLORGYNAL</b>					
1 gél. x 2/j pendant 20j	14 gél. vaginales	4,18	I	30 %	0,30

## ■ Promestriène

<b>COLPOTROPHINE</b>					
1 caps. pdt 20 j 1 à 2 appl./j	20 caps. 10 mg 1 tube 30 g	5,42 5,47	II II	30 % 30 %	0,27 5,47

## ■ Promestriène + chlorquinaldol

<b>COLPOSEPTINE</b>					
1 cp./j pdt 18 j	18 cp. (chlorquinaldol 200 mg et promestriène 10 mg)		II	NR	

## ■ PROPRIÉTÉS

Œstrogènes naturels ayant un effet trophique local ± associés à un antiseptique (**chlorquinaldol**) ou à un progestatif et des bacilles de la flore vaginale (**TROPHIGIL**, **FLORGYNAL**).

## ■ INDICATIONS

Affections vulvovaginales secondaires à la carence œstrogénique liée à la ménopause :

- sécheresse vaginale ;
- dyspareunie ;
- retard de cicatrisation, troubles trophiques.

*Capsule, ovule vaginales* : troubles trophiques vulvo-vaginaux.

*Crème* : troubles trophiques vulvaires.

## ■ CONTRE-INDICATIONS

## ■ Grossesse et allaitement.

Antécédents de cancers du sein et de l'utérus, maladie thromboembolique.

## ■ EFFETS INDÉSIRABLES

Très rares : irritation locale, mastodynie.

## ■ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Utilisation de préservatifs masculins en latex avec des corps gras ou des lubrifiants contenant des huiles minérales (risque de rupture), de spermicides (risque d'inactivation).

**INHIBITEUR NON HORMONAL DES BOUFFÉES DE CHALEUR**■ **Bêta-alanine**

<b>ABUFÈNE</b>				
1 à 2 cp. en cure de 5 à 10 j	30 cp. 400 mg 60 cp. 400 mg		NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur des bouffées de chaleur non œstrogénique, de la classe des acides aminés.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des bouffées de chaleur chez la femme ménopausée.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **bêta-alanine** ou au gluten.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares paresthésies des extrémités, exceptionnellement éruption cutanée et prurit.

## PROSTAGLANDINE

## ■ Misoprostol

<b>CYTOTEC</b>					
<b>Interruption volontaire de grossesse :</b> 2 cp. à renouveler 4 h plus tard si pas de saignements	60 cp. séc. 200 µg	18,64	I	15 %	0,31
<b>Évacuation d'une fausse couche ou rétention :</b> 2 cp. x 3/j pendant 3 j					
<b>Déclenchement du travail</b> (hors AMM) : 1/4 cp à mettre dans le vagin. À renouveler au bout de 4 h, attention à ne faire que sous surveillance maternelle et fœtale rapprochée en milieu hospitalier					

**PROPRIÉTÉS**

Prostaglandine ; provoque des contractions utérines.

**INDICATIONS**

Interruption volontaire de grossesse.  
Évacuation d'une fausse couche ou rétention.  
Déclenchement du travail (hors AMM).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.  
Utérus cicatriciel, grossesse gémellaire, dystocie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Dans ces indications, **CYTOTEC** ne peut être employé que sous contrôle médicale rapproché le plus souvent en hospitalisation ou avec des contrôles rapprochés.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée.  
Malaise.

## ESTROPROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (1) – CONTRACEPTIFS DE 2<sup>E</sup> GÉNÉRATION

### Voie orale

#### ■ Éthinylestradiol + lévonorgestrel

<b>LEELOO</b>					
1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt pendant 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>lévo.</b> 100 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>MINIDRIL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>lévo.</b> 150 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>ADÉPAL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>lévo.</b> 150-200 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>TRINORDIOL</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>lévo.</b> 50-75-125 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>LOVAPHARM</b>					
Idem <b>LEELOO</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>lévo.</b> 150 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,11</b>
<b>OPTILOVA</b>					
1 cp./j en continu (7 cp. inactifs)	28 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>lévo.</b> 100 µg	<b>2,39</b>	I	65 %	<b>0,09</b>

#### ■ Éthinylestradiol + norgestrel

<b>STÉDIRIL</b>					
Contraception classique : cures de 1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt de 7 j	21 cp. <b>éthín.</b> 50 µg + <b>norg.</b> 0,5 mg	<b>1,90</b>	I	65 %	<b>0,09</b>

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

### Voie transdermique

#### ■ Éthinylestradiol + norelgestromine

<b>EVRA</b>					
1 pch./sem. pdt 3 sem. et 1 sem. sans pch. puis reprise	3 pch. 33,9 µg/ 203 µg/24 h		I	NR	
À appliquer sur peau sèche et saine (éviter les seins)	9 pch. 33,9 µg/ 203 µg/24 h		I	NR	

### Voie vaginale

#### ■ Éthinylestradiol + étonogestrel

<b>NUVARING</b>					
1 dispositif vaginal posé par la femme pdt 3 sem. retiré 1 sem. et nouveau pch. au 8 <sup>e</sup> j	1 anneau vaginal 15 µg/120 µg/24 h		I	NR	
	3 anneau vaginal 15 µg/120 µg/24 h		I	NR	

**CONTRACEPTION (2)****Efficacité des différentes méthodes contraceptives**

Efficacité	Méthode	Taux de grossesses (%) au cours des 12 premiers mois d'utilisation	
		En pratique courante	En utilisation optimale
Toujours très efficace	Implants	0,1	0,1
	DIU	0,8	0,6
	Pilules progestatives pures (au cours de l'allaitement)	1	0,5
Efficace dans son emploi courant	Méthode de l'aménorrhée lactationnelle	2	0,5
	Contraception orale œstroprogestative	6-8	0,1
	Pilules progestatives pures (en dehors de l'allaitement)		0,5
Faible efficacité lors de son emploi courant	Préservatifs masculins	14	3
	Préservatifs féminins	21	5
	Diaphragmes et spermicides	20	6
Spermicides		26	6
Méthodes naturelles		20	1-9

**CONSENSUS**

[1] Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme, HAS, 2004

[2] Commission de la transparence - Réévaluation des contraceptifs oraux de 3<sup>e</sup> génération, HAS, 2007

## ESTROPROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (2) – CONTRACEPTIFS DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION (1)

### ■ Éthinylestradiol + norgestimate

<b>TRIAFEMI</b>					
1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt pendant 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j NB : propriétés antiacnéiques	21 cp. <b>éthín.</b> 35 µg + <b>norg.</b> 180-215-250 µg		I	NR	
<b>TRICILEST</b>					
Idem <b>TRIAFEMI</b> NB : propriétés antiacnéiques	21 cp. <b>éthín.</b> 35 µg + <b>norg.</b> 180-215-250 µg		I	NR	
<b>CILEST</b>					
Idem <b>TRIAFEMI</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 35 µg + <b>norg.</b> 250 µg		I	NR	
<b>EFFIPREV</b>					
Idem <b>TRIAFEMI</b>	63 cp. <b>éthín.</b> 35 µg + <b>norg.</b> 250 µg		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

### ■ Éthinylestradiol + gestodène

<b>MÉLODIA</b>					
1 cp./j en continu (4 cp. inactifs)	28 cp. <b>éthín.</b> 15 µg + <b>gest.</b> 60 µg		I	NR	
<b>MINESSE</b>					
Idem <b>MÉLODIA</b>	28 cp. <b>éthín.</b> 15 µg + <b>gest.</b> 60 µg		I	NR	
<b>HARMONET</b>					
Cures de 1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt de 7 j	21 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>gest.</b> 75 µg		I	NR	
<b>MÉLIANE</b>					
Idem <b>HARMONET</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>gest.</b> 75 µg		I	NR	
<b>MONEVA</b>					
Idem <b>HARMONET</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>gest.</b> 75 µg		I	NR	
<b>MINULET</b>					
Idem <b>HARMONET</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>gest.</b> 75 µg		I	NR	
<b>TRI-MINULET</b>					
Idem <b>HARMONET</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>gest.</b> 50-70-100 µg		I	NR	
<b>PHAEVA</b>					
Idem <b>HARMONET</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30-40 µg + <b>gest.</b> 50-70-100 µg		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes



## CONTRACEPTION HORMONALE (1)

### Première demande de pilule

#### Bilan préthérapeutique

- Interrogatoire (recherche de contre-indications, antécédents gynéco-obstétriques, élimination d'une grossesse en cours).
- Examen clinique avec évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires.
- Bilan biologique glucidolipidique : triglycérides, cholestérol total, glycémie à jeun à faire avant de débiter la contraception hormonale si facteurs de risque de perturbation du bilan glucidolipidique (sinon 3 à 6 mois après le début du traitement). Bilan thrombophilique avant le début du traitement en cas d'antécédents évocateurs personnels ou familiaux.
- Ne pas oublier la prévention (palpation des seins, frottis, information sur les IST).

#### Évaluation du mode de vie de la patiente :

- âge ;
- profession ;
- tabac ;
- partenaire stable ;
- contraception déjà utilisée ;
- souhait particulier.

#### Contre-indications absolues aux œstroprogestatifs

- Antécédent personnel d'accident thromboembolique veineux ou artériel.
- Thrombophilie.
- Diabète avec complications vasculaires.
- Dyslipidémie.
- HTA.
- Migraine avec signes focaux neurologiques ou évolutive sous contraception.
- Cardiopathie (fibrillation auriculaire, valvulopathie, coronaropathie, etc.).
- Facteurs de risque de thrombose : < 4 sem. du post-partum, immobilisation prolongée, postopératoire, accumulation

de plusieurs facteurs de risque : âge > 35 ans, tabagisme, surpoids/obésité, HTA.

- Antécédent personnel de cancer du sein ou de l'utérus.
- Mutation de BRCA1/2, haut risque de prédisposition.
- Antécédent de tumeur hépatique.
- Hépatopathie sévère.
- Antécédent de pancréatite ou de cholestase liée à une hypertriglycémie ou à l'utilisation de la contraception.

#### Contraception de 1<sup>re</sup> intention chez une femme jeune sans pathologie particulière : œstroprogestatifs

Les contraceptions œstroprogestatives de 3<sup>e</sup> génération ne sont pas indiquées en 1<sup>re</sup> intention du fait d'un risque thrombotique accru.

Les œstroprogestatifs de 2<sup>e</sup> génération sont donc prescrits en 1<sup>re</sup> intention.

Le bénéfice attendu des progestatifs de 3<sup>e</sup> génération est un climat hormonal moins androgénique ; la contraception de 3<sup>e</sup> génération pourra donc être prescrite en cas de mauvaise tolérance des œstroprogestatifs de 2<sup>e</sup> génération (prise de poids, œdème des membres inférieurs, acné, hyperséborrhée, etc.).

Les œstroprogestatifs existent sous plusieurs formes :

- pilule à prendre 21 j/28 (arrêt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette) ;
- pilule à prendre en continu ;
- patch (dispositif transdermique) : à changer toutes les sem. et à prendre 3 sem./4 ;
- anneau vaginal : à insérer dans le vagin pendant 3 semaines, arrêt une semaine et mise en place d'un nouveau dispositif.

## GESTROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (3) – CONTRACEPTIFS DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION (2)

### ■ Éthinylestradiol + désogestrel

<b>MERCILON</b>					
Cures de 1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt de 7 j	21 cp. <b>éthín.</b> 20 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	
<b>VARNOLINE</b>					
Idem <b>MERCILON</b>	21 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	
<b>VARNOLINE CONTINU</b>					
1 cp./j en continu (7 cp. inactifs)	28 cp. <b>éthín.</b> 30 µg + <b>déso.</b> 150 µg		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

## ŒSTROPROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (4) – AUTRES ŒSTROPROGESTATIFS

### ■ Éthinylestradiol+ chlormadinone

<b>BELARA</b>					
1 cp. à heure fixe pdt 21 j, arrêt pdt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>chlor.</b> 2 mg		I	NR	

### ■ Éthinylestradiol + drospirénone

<b>JASMINELLE</b>					
1 cp./j à heure fixe pdt 21 j, arrêt pdt 7 j et reprise d'une nouvelle plaquette au 8 <sup>e</sup> j	21 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>JASMINELLE CONTINU</b>					
1 cp./j à heure fixe en continu	28 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>JASMINE</b>					
Idem <b>JASMINELLE</b>	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>YAZ</b>					
Idem <b>JASMINELLE CONTINU</b>	28 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
<b>DROSPIBEL</b>					
Idem <b>JASMINELLE</b>	21 cp. <b>éthin.</b> 20 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	
	21 cp. <b>éthin.</b> 30 µg + <b>drosp.</b> 3 mg		I	NR	

### ■ Estradiol + diénogest

<b>QLAIRA</b>					
1 cp./j en continu	28 cp. 3-2-2-1 mg <b>éthin.</b> + 2-3 mg <b>dién.</b>		I	NR	

Il existe également des boîtes de 3 plaquettes

**ŒSTROGESTATIFS (CONTRACEPTION) (5) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Contraceptifs par 3 actions complémentaires :

- blocage de l'ovulation,
- modification de la glaire qui devient imperméable aux spermatozoïdes,
- atrophie de l'endomètre qui devient impropre à la nidation.

La « génération » de l'**œstrogestatif** fait référence à une différence dans le type de progestatif utilisé. Les termes de mono, bi ou triphasiques font référence à des différences de dosages des progestatifs et/ou œstrogènes au cours de la plaquette tentant de se rapprocher au mieux des variations hormonales au cours du cycle naturel.

**INDICATIONS**

Contraception.

Utilisés en cas de dysménorrhées invalidantes.

Les **œstrogestatifs de 2<sup>e</sup> génération** doivent être prescrits en 1<sup>re</sup> intention car ceux de **3<sup>e</sup> génération** augmentent le risque thromboembolique. Le bénéfice des **œstrogestatifs de 3<sup>e</sup> génération** est un climat hormonal moins androgénique ; on peut les utiliser en cas d'acné, prise de poids ou mastodynies.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Accidents thromboemboliques artériels (présence ou antécédent).

Accidents thromboemboliques veineux (présence ou antécédent) tels que thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire ; immobilisation prolongée, chirurgie majeure ; identification de mutations liées à la thrombophilie (facteur II, facteur V).

Prédisposition héréditaire ou acquise aux thromboses veineuses ou artérielles.

Maladie cérébrovasculaire ou coronarienne.

Hypertension artérielle.

Facteurs de risque multiples cardiovasculaires ; association tabac et âge  $\geq 35$  ans ; hyperlipidémie avérée.

Valvulopathie, troubles du rythme thrombogènes.

Diabète compliqué de micro ou de macroangiopathie et/ou évoluant depuis plus de 20 ans.

Migraine avec signes neurologiques focaux ou âge  $\geq 35$  ans.

Tumeur maligne connue ou suspectée du sein.

Carcinome de l'endomètre ou toute autre tumeur œstrogénodépendante connue ou suspectée.

Adénome hépatique ou carcinome hépatocellulaire, affection hépatique sévère jusqu'au retour à la normale de la fonction hépatique ; antécédent de cholestase liée à la prise d'œstrogènes.

Hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

Post-partum  $< 4$  sem.

Allaitement maternel.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préalable : examen clinique, frottis cervicovaginal (FCV), bilan glucidolipidique.

Revoir la patiente à 3 et 6 mois pour vérifier la bonne tolérance clinique et biologique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares mais nécessitant l'arrêt du traitement : réactions allergiques, intolérance au glucose, HTA, accidents thromboemboliques et cardiovasculaires, ictère cholestatique, hyperlipidémie, adénome hépatique, CHC, lithiase biliaire, érythème noueux, céphalées.

Plus fréquents : nausées, vomissements, acné, prise de poids, nervosité, dépression, baisse de la libido, rétention hydrique/œdèmes, tension mammaire, modification des sécrétions vaginales, métrorragies/oligoménorrhée, signes d'hyperandrogénie, jambes lourdes, candidose vaginale.

Aménorrhée post-thérapeutique avec anovulation, d'autant plus fréquente qu'il existait des troubles du cycle avant le traitement. Nécessite la recherche d'une étiologie si elle est prolongée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques.**

**PROGESTATIFS MICRODOSÉS (CONTRACEPTION)**

## ■ Lévonorgestrel

<b>MICROVAL</b>					
1 cp./j en continu à heure fixe	28 cp. 30 µg	1,90	I	65 %	0,07
	84 cp. 30 µg	3,89	I	65 %	0,05

## ■ Désogestrel

<b>CERAZETTE</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>ANTIGONE</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	56 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>CLAREAL</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	
<b>DÉSOPOP</b>					
Idem <b>MICROVAL</b>	28 cp. 75 µg		I	NR	
	84 cp. 75 µg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Progestatifs de synthèse ayant à faible dose et en administration continue une action contraceptive par modification de la glaire et inhibition de l'ovulation.

**INDICATIONS**

Contraception.

**CONTRE-INDICATIONS**

Accidents thromboemboliques veineux tels que thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire en cours.

Adénome hépatique ou carcinome hépatocellulaire, affection hépatique sévère jusqu'au retour à la normale de la fonction hépatique.

Hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

Tumeur maligne connue ou suspectée du sein. Compte tenu de la diminution de motilité tubaire qu'ils induisent : antécédent ou risque de grossesse extra-utérine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À prendre à heure très fixe, le retard de prise ne devant pas dépasser 3 h pour **MICROVAL**, 12 h pour **CERAZETTE**.

À éviter chez les femmes ayant un antécédent de GEU ou de chirurgie à risque de GEU.

Mode de contraception à éviter en cas de dystrophie ovarienne, mastopathie bénigne, mastodynie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hyperœstrogénie (mastodynie, œdèmes cycliques, douleurs pelviennes).

Perturbations du cycle menstruel (saignements, absence ou irrégularités des règles) qui s'observent chez environ 70 % des utilisatrices.

Kystes fonctionnels de l'ovaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inducteurs enzymatiques.

**PROGESTATIFS INJECTABLES (CONTRACEPTION) (1)****■ Implant étonogestrel**

<b>NEXPLANON</b>					
1 implant entre le 1 <sup>er</sup> et le 5 <sup>e</sup> J du cycle, le lendemain de la dernière prise d'un œstroprogestatif, immédiatement après une IVG ou 4 sem. après un accouchement Efficacité : 3 ans	1 implant = 68 mg	106,44	I	65 %	106,44

**PROPRIÉTÉS**

Progestatif de synthèse, ayant une action contraceptive puissante par blocage de l'ovulation et modification de la glaire cervicale. Jusqu'à 3 ans d'efficacité contraceptive avec un retour rapide à un cycle menstruel normal après retrait.

**INDICATIONS**

Contraception pour les femmes qui ne peuvent s'astreindre à une prise quotidienne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Grossesse connue ou suspectée.

Affection ou antécédents hépatiques sévères, accidents thromboemboliques veineux évolutifs, hypersensibilité à l'un des composants, tumeurs progestogène-dépendantes, hémorragies génitales d'étiologie inconnue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Définir le moment de la pose :

- en l'absence de contraception hormonale antérieure : J1 à J5 du cycle ;
- à l'arrêt d'une contraception orale œstroprogestative : le jour suivant le dernier comprimé actif ;

- à l'arrêt d'une contraception microprogestative orale : à tout moment ;
- dans le post-abortum (1<sup>er</sup> trim.) : dès l'avortement ;
- dans le post-abortum (2<sup>e</sup> trim.) : entre J21 et J28 ;
- dans le post-partum : entre J21 et J28.

L'insertion sera réalisée à la face interne du bras non dominant, à 6-8 cm au-dessus du pli du coude, dans le sillon entre le biceps et le triceps en sous-cutané, sous anesthésie locale, en respectant les conditions d'asepsie par un médecin entraîné à sa pose. Idem pour le retrait.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles du cycle dans 60 % des cas : ménorrhées, aménorrhées.

Très fréquents : céphalées, acné, vaginite, augmentation du poids corporel, tension mammaire, mastodynie.

Plus rares : accident thromboembolique veineux et artériel, HTA, tumeur progestogène-dépendante et chloasma.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillés : **inducteurs enzymatiques.**

**CONTRACEPTION HORMONALE (4)****Contraception en situation particulière**

	OP	Micropro-gestatifs	DIU cuivre	DIU lévonor-gestrel	Préservatif
Thrombose veineuse : ATCD avec ou sans thrombophilie	-	±	+	±	+
Thrombose veineuse en cours	-	-	+	-	+
Thrombose artérielle : ATCD ou FDR	-	-	+	-	+
Cardiopathie emboligène	-	-	+	-	+
1 seul FDR métabolique	±	+	+	+	+
> 1 FDR métabolique	-	±	+	±	+
FDR thrombose	-	±	+	±	+
Diabète sans complication vasculaire, évoluant depuis < 20 ans = 1 seul FDR métabolique	±	+	+	+	+
Diabète avec complication vasculaire ou instable avec la contraception ou évoluant depuis > 20 ans	-	±	+	±	+
Tumeur hépatique	-	-	+	-	+
Cholestase	-	-	+	-	+
Cirrhose ou autre altération de la fonction hépatique	-	-	+	-	+
1er mois du post-partum/sans allaitement	-	+	-	-	+
1er mois du post-partum/avec allaitement	-	-	-	-	+
Allaitement après le 1er mois	-	+	+	+	+
Post-abortion immédiat	+	+	+	+	+
Nullipare/adolescente	+	+	±	±	+
ATCD GEU	+	±	±	±	+
Infection génitale récente ou risque	+	+	-	-	+
Cancer hormonodépendant (sein, utérus)	-	-	+	-	+

OP : œstroprogestatifs ; DIU : dispositif intra-utérin ; FDR : facteur de risque ; ATCD : antécédent ; GEU : grossesse extra-utérine.

+ : autorisé, - : contre-indiqué ; ± : à utiliser avec précaution.

FDR métabolique : HTA, diabète sans complication, surpoids/obésité, tabac, âge > 35 ans.  
FDR thrombose : toutes les situations à risque de thrombose : post-partum, immobilité prolongée, intervention chirurgicale, pathologie à risque de thrombose (insuffisance rénale, lupus, etc.).

**PROGESTATIFS INJECTABLES (CONTRACEPTION) (2)**■ **Médroxyprogestérone****DÉPO-PROVÉRA**

1 amp. IM profonde/3 mois	1 fl. 3 mL = 150 mg	3,44	I	65 %	3,44
---------------------------	---------------------	------	---	------	------

**PROPRIÉTÉS**

Progestatif de synthèse injectable à longue durée d'action, ayant une action contraceptive puissante par blocage de l'ovulation, modification de la glaire et atrophie endométriale.

**INDICATIONS**

Contraceptif à longue durée d'action (3 mois) lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes contraceptives.

**CONTRE-INDICATIONS**

Accidents thromboemboliques veineux (évolutifs ou antécédents).  
Antécédents d'accidents thromboemboliques artériels.  
Présence d'autres facteurs de risque thromboemboliques : diabète, HTA, obésité.  
Tumeurs sensibles aux progestatifs ; cancer du sein et cancer de l'endomètre.

Hémorragie génitale non expliquée.

Fibrome utérin.

Présence ou antécédents de pathologie hépatique sévère, tant que les paramètres hépatiques ne sont pas normalisés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Première injection entre le 1<sup>er</sup> et le 5<sup>e</sup> j du cycle.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Augmentation pondérale.

Disparition du cycle menstruel, remplacé par des épisodes d'aménorrhée ou de ménoménorrhées qui peuvent parfois être importantes.

Troubles digestifs.

Réactions allergiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillés : **inducteurs enzymatiques**.



## CONTRACEPTION D'URGENCE (1)

## ■ Lévonorgestrel

<b>NORLEVO</b>					
1 cp. à prendre le plus rapidement possible et au maximum dans un délai de 72 h après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive	1 cp. 1,5 mg	7,41	I	65 %	7,41

**PROPRIÉTÉS**

Le mode d'action exact de **NORLEVO** est inconnu. Aux doses utilisées, le **lévonorgestrel** pourrait bloquer l'ovulation, il pourrait également empêcher l'implantation. Il est inefficace dès lors que le processus d'implantation a commencé. L'efficacité semble diminuée en fonction du temps écoulé depuis le rapport non protégé (95 % à 24 h, 85 % entre 24 et 48 h, et 58 % entre 48 et 72 h). L'efficacité après 72 h n'est pas connue. Avec la dose utilisée, le **lévonorgestrel** n'induit pas de modification significative des facteurs de la coagulation, ni du métabolisme des lipides et des glucides.

**INDICATIONS**

Contraception d'urgence dans un délai de 72 h après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **lévonorgestrel**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La contraception d'urgence est une méthode occasionnelle ; elle ne doit, en aucun cas, se substituer à une contraception régulière. Cette méthode ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas.

Il n'est pas recommandé d'utiliser plusieurs fois **NORLEVO** au cours d'un même cycle menstruel en raison de taux élevés d'hormones et de la possibilité de perturbations importantes du cycle menstruel.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements, douleurs abdominales, céphalées, vertiges, tension mammaire, métrorragies, retard de règles.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillés : **inducteurs enzymatiques**.

**CONTRACEPTION D'URGENCE (2)**■ **Ulipristal acétate**

<b>ELLAONE</b>					
1 cp. en prise unique le plus tôt possible, au maximum 5 j après le rapport	1 cp. 30 mg	23,59	I	65 %	23,59

**PROPRIÉTÉS**

Modulateur synthétique des récepteurs de la progestérone.

Inhibe ou retarde l'ovulation.

**INDICATIONS**

Contraception d'urgence à prendre le plus rapidement possible et au maximum dans un délai de 5 j après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Grossesse.

Asthme sévère non équilibré.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne remplace pas une contraception.

Peut diminuer l'efficacité de la contraception

régulière, précautions le reste du cycle (associer une contraception mécanique).

Ne prévient pas la grossesse dans 100 % des cas, faire un test de grossesse en cas de retard de règles ou en cas de règles anormales.

Peut perturber le cycle en cours.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, nausées, douleurs abdominales.

Myalgies, douleurs dorsales.

Dysménorrhées, douleurs pelviennes, mastodynies.

Asthénie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inducteurs enzymatiques : peuvent diminuer sa concentration.

Contraception hormonale dont l'efficacité peut être diminuée.

**DISPOSITIFS INTRA-UTÉRINS (DIU)**■ **DIU au cuivre**

<b>TT 380</b>					
À changer tous les 10 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>UT 380</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif short	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif standard	30,50		65 %	30,50
<b>NT 380</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif short	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>GYNELLE</b>					
À changer tous les 4 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>MULTILOAD</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif	30,50		65 %	30,50
<b>MONA LISA</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif Cu 375	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif Cu 375 SL	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif NTCu375	30,50		65 %	30,50
	1 dispositif CuT 380A QL	30,50		65 %	30,50
À changer tous les 10 ans					

■ **DIU hormonal**

<b>MIRENA</b>					
À changer tous les 5 ans	1 dispositif	125,15	I	65 %	125,15

**CONTRACEPTION LOCALE****Préservatifs répondant aux normes françaises**■ **Préservatifs**

<b>DUREX GOSSAMER</b>
<b>OLLA</b>
<b>STYMUŁÈVE</b>

**Crèmes spermicides**■ **Benzalkonium**

<b>PHARMATEX</b>					
Mettre au fond du vagin juste avant le rapport	6 tubes unidose 54 mg 1 tube 72 g		I	NR	
			I	NR	
<b>ALPAGELLE</b>					
Idem <b>PHARMATEX</b>	6 tubes unidose 1 tube 80 g			NR	
				NR	

**Ovules et capsules spermicides**■ **Benzalkonium**

<b>PHARMATEX</b>					
Mettre au fond du vagin 30 min avant le rapport	10 ovules		I	NR	
	20 ovules		I	NR	
	6 caps. molles		I	NR	

**Diaphragme**■ **Diaphragme**

<b>DIAPHRAGME MILEX</b>					
Mettre au fond du vagin juste avant le rapport	1 diaphragme		I	NR	

**Préservatif féminin**■ **Préservatif féminin**

<b>PRÉSERVATIF FÉMININ FÉMIDOM</b>					
Usage unique	3 préservatifs		I	NR	

## HÉMOSTATIQUE EN GYNÉCOLOGIE

## ■ Fibrinogène humain

CLOTTAFAC <sup>®</sup>				
Hémorragie en cas de déficit secondaire en fibrinogène (post-partum, insuffisance hépatique) A. : dose initiale de 1 à 2 g, voire de 4 à 8 g dans les hémorragies aiguës sévères obstétricales E. : 0,02 à 0,03 g/kg	1 fl. pdre + solv. 1,5 g/100 mL	HOP	I	NR

## PROPRIÉTÉS

Le **fibrinogène** injecté forme un réseau stable de fibrine sous l'action de la thrombine et en présence de facteur XIII activé et d'ions calcium, ce qui assure la coagulation.

Valeurs normales de fibrinogène circulant : 1,5 à 4,5 g/L.

Valeur critique de fibrinogène, en dessous de laquelle une hémorragie peut apparaître : 0,5-1 g/L.

## INDICATIONS

Traitement complémentaire dans la prise en charge d'une hémorragie sévère incontrôlée dans le cadre d'une hypofibrinogénémie acquise telle que :

- augmentation de la consommation du fibrinogène associée à un **saignement incontrôlé menaçant le pronostic vital dans les complications obstétricales** (ex : **hémorragie de la délivrance**), en situation chirurgicale ou en traumatologie ;
- altération de la synthèse hépatique du fibri-

nogène (insuffisance hépatique ou traitement par **L-asparaginase**).

Traitement de l'hypo-, dys- ou afibrinogénémie constitutionnelle chez les patients présentant une hémorragie spontanée ou post-traumatique.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vaccination contre les hépatites A et B pour les patients recevant régulièrement du **fibrinogène**.

Contient du sodium.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : céphalées, sueurs nocturnes.

Rares : réaction d'hypersensibilité, thrombose (surveillance étroite, prise en compte des facteurs de risque).

Possibilité non exclue de transmissions d'infections, notamment du virus de l'hépatite A et du parvovirus.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

## CANCERS - PRISE EN CHARGE (1)

Le traitement des cancers associe des moyens dirigés contre la tumeur elle-même, destinés à enrayer son évolution et à soulager les symptômes qu'elle entraîne, ou s'adresse à des complications : infectieuses, nutritionnelles, hématologiques, neurologiques ou psychologiques en particulier.

Des études contrôlées, souvent internationales, ont permis d'établir de nombreux protocoles de référence qui sont autant de guides que le médecin doit adapter à chaque cas particulier, pour un traitement personnalisé, après avoir pris les mesures du patient et de sa maladie par le bilan préthérapeutique.

### Bilan préthérapeutique

Toute indication thérapeutique se fonde sur un bilan préalable destiné à préciser les caractères particuliers de chaque cancer, de chaque malade. Cela doit être fait parfois en urgence (compressions, hémorragie, trouble métabolique, infection grave) en réalisant le nécessaire, en se limitant au suffisant. Ce bilan est conditionné principalement par l'état du malade (âge physiologique, autre atteinte pathologique), par le diagnostic anatomopathologique indispensable, par les caractères biologiques et évolutifs du cancer en cause, ainsi que par les disponibilités thérapeutiques. Il doit permettre de préciser si le traitement va être à visée curative ou seulement palliatif.

#### Bilan du cancer

##### ► Anatomopathologie

Elle ne donne pas seulement le diagnostic mais aussi le degré de malignité (grade), la différenciation, l'extension locale, les récepteurs hormonaux, les anomalies génétiques (mutations, amplifications de gènes).

##### ► Inventaire topographique

Il se fait par examen clinique, imagerie, endoscopie, isotopes, biologie.

Il y a trois niveaux d'extension pour la plupart des tumeurs :

- **T** : tumeur primitive de T1 à T4 ;
- **N** : ganglions satellites de N0 à N3 ;
- **M** : métastases, M0 ou M1.

Ils sont regroupés en général en stades (I à IV).

##### ► Volume tumoral

De la masse principale et des autres foyers tumoraux. Par mensuration clinique, imagerie, marqueurs sériques.

##### ► Vitesse évolutive

Selon l'histoire clinique, l'anatomie pathologique, l'aspect inflammatoire.

#### Bilan du malade

##### ► Âge et sexe

Pour contraception ou conservation de sperme.

Plus de la moitié des diagnostics de cancers sont faits après 65 ans, mais l'âge civil compte moins que l'âge physiologique.

L'âge aggrave le pronostic, gêne l'application du traitement ou son renforcement.

##### ► Grandes fonctions

Insuffisance viscérale avant intervention chirurgicale ou selon toxicité d'une chimiothérapie : rein, cœur, foie en particulier.

##### ► Contact psychologique

Appréhension du diagnostic, niveau socioéducatif, profil émotionnel, souci de participer activement à son traitement.

##### ► Insertion familiale, sociale et professionnelle

### Traitement

Le traitement d'un cancer fait souvent appel à des *associations* pour concentrer l'activité sur la tumeur et donc améliorer l'efficacité, en « diluant » la toxicité sur différents tissus ou fonctions, pour améliorer la tolérance.

Des maladies graves comme les cancers appellent des traitements agressifs et toute décision relève d'une *stratégie de risque calculé*.

Cela rend nécessaire une *concertation pluridisciplinaire* plus ou moins marquée selon le temps de la prise en charge d'un malade. Une fois l'indication du traitement posée, sa réalisation coordonnée par l'oncologue médical fait aussi appel à divers intervenants : médecins spécialiste ou généraliste, biologiste, auxiliaire paramédical.

## CANCERS - PRISE EN CHARGE (2)

Chaque technique thérapeutique est prise en charge par un spécialiste différent dont l'action doit être bien coordonnée avec celle de son ou ses confrères pour la chirurgie, la radiothérapie, les traitements médicaux spécifiques (chimiothérapie, hormonothérapie, biothérapie) et les traitements non spécifiques.

La stratégie thérapeutique est déterminée au cours de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) : le dossier de tout nouveau patient atteint de cancer doit bénéficier d'un avis émis lors d'une RCP. Cet avis doit être communiqué au patient et placé dans le dossier. La pluridisciplinarité correspond à la présence d'au moins trois spécialités différentes qui doivent être adaptées au type de la RCP. Leur fonctionnement doit être formalisé : rythme (au moins 2 fois par mois), coordonnateur, secrétariat, type de dossiers à présenter, référentiels utilisés. Avant la réunion, une fiche standardisée de données médicales est remplie par le médecin qui inscrit le dossier à la RCP. Tous les nouveaux cas doivent être présentés avant mise en route du premier traitement. Les dossiers des patients nécessitant une modification substantielle du traitement (reprise évolutive, toxicité, etc.) sont également présentés.

### Préparation

#### Organique

Bilan préopératoire, équilibre d'une fonction défaillante, implantation d'un site d'accès veineux en vue d'une chimiothérapie prolongée, bilan et nettoyage buccodentaire, conservation de sperme, contraception.

#### Psychologique

Selon les recommandations du Plan Cancer sur le dispositif d'annonce : information du patient, sans décalage par rapport à celle de ses proches ; explications sur la

maladie pour justifier la thérapeutique ; repères pronostiques - initiaux, après bilan préthérapeutique, en cours de traitement - grandes lignes du traitement ; motivation du malade pour une bonne observance ; annonce des principaux signes toxiques (par ex. alopecie) ; recueil du consentement éclairé, de façon formelle en cas d'essai thérapeutique.

#### Sociale

Arrêt de travail, mise en congé de longue durée, remboursement à 100 %.

### Organisation

- En hospitalisation classique, en hôpital de jour, à domicile.
- Avec médecin traitant, infirmière, laboratoire de biologie, pharmacie et carnet de liaison entre les différents intervenants.
- Transmission par téléphone, courrier standard ou électronique, télécopie dans le respect du secret médical.

### Réalisation

- Avec traitement d'appoint adapté, par ex. **antiémétiques, antalgiques, facteurs de croissance**.
- Avec soutien psychosocial, information adaptée.

### Surveillance

- En cours de traitement : durant une perfusion de chimiothérapie, pendant une radiothérapie.
- Après l'acte thérapeutique, dans l'intercycle entre deux chimiothérapies : poids, nausées, vomissements, alimentation, activités, fièvre ou infection, manifestations hémorragiques, incidents intercurrents.
- Réadaptation physique et professionnelle, suivi psychologique. Séquelles ou complications tardives éventuelles.

### Rechute

Après un nouveau bilan, l'indication dépend de ses résultats et du traitement antérieur.

## CANCERS - CHIMIOTHÉRAPIE (1)

### Règles générales

#### **Intégrer la chimiothérapie dans la stratégie thérapeutique**

#### **Préciser les enjeux qui conditionnent la réalisation du traitement**

##### ► *Chimiothérapie première (néoadjuvante)*

Elle représente le premier acte thérapeutique d'une stratégie pluridisciplinaire (chirurgie ou radiothérapie). Elle vise :

- à réduire le volume ou l'évolutivité d'une tumeur primitive en place pour en faciliter le traitement ultérieur, notamment du point de vue fonctionnel ou d'épargne d'organe ;
- mais également à détruire les micrométastases.

Son efficacité est jugée sur la réponse tumorale initiale, la conservation d'organe ou fonctionnelle lors des traitements ultérieurs et la survie.

##### ► *Chimiothérapie adjuvante*

Elle fait suite au traitement d'une tumeur apparemment localisée, le plus souvent par chirurgie, ayant permis d'obtenir une rémission complète macroscopique, quand il existe des arguments pronostiques exposant le patient à un risque jugé élevé de rechute. La chimiothérapie a pour but d'éradiquer les micrométastases. Son enjeu est curatif. Son efficacité ne peut être jugée que sur le gain de survie. Le protocole est défini précisément à l'avance : type de protocole avec mêmes molécules de chimiothérapie que le protocole de référence, nombre de cycles, respect des intervalles et des doses +++.

##### ► *Chimiothérapie palliative*

L'enjeu est d'assurer la meilleure qualité de vie, avec la période la plus longue sans

symptômes de la maladie, sans but curatif. La chimiothérapie, quand elle est efficace, représente l'un des meilleurs moyens thérapeutiques symptomatiques. Elle doit s'intégrer, dès le départ, dans une stratégie thérapeutique comprenant les autres moyens thérapeutiques spécifiques et les traitements symptomatiques non spécifiques. Elle doit être évaluée régulièrement sur les bénéfices et les effets indésirables qu'elle engendre.

#### **Apprécier les compétences de l'ensemble de l'équipe, tout le long de la chaîne de la chimiothérapie**

En cas de maladie rare, présentation complexe, insuffisance de moyens ou difficulté de suivi, il ne faut pas hésiter à référer à des structures plus spécialisées pour ne pas entraîner de perte de chances.

#### **Présenter le traitement au patient**

La consultation se déroule en suivant les recommandations du dispositif d'annonce et comporte :

- un temps médical : il correspond à l'annonce du diagnostic et du projet thérapeutique déterminé lors de la RCP avec remise d'un projet personnalisé de soins ;
- un temps paramédical : il permet au malade et à ses proches d'accéder à des soignants qui reformulent et présentent tous les acteurs paramédicaux (kinésithérapeute, psychologue, etc.) ;
- un accès à l'équipe des soins de support ;
- un temps d'articulation avec la médecine de ville : pour assurer la continuité des soins avec le médecin traitant.



## PRESCRIPTION D'UN PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

## Protocole CMF-Cycle 3

Madame X.

née le 01/01/1954

le 03.06.2014

Poids : 55 kg. Taille : 1,63 m.

Surface corporelle : 1,52 m<sup>2</sup>

Hémogramme : OK

<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg/m <sup>2</sup>	soit 900 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>Méthotrexate</b>	40 mg/m <sup>2</sup>	soit 60 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>Fluorouracile</b>	600 mg/m <sup>2</sup>	soit 900 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>SOLUMÉDROL</b>	60 mg/m <sup>2</sup>	soit 90 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>PRIMPÉРАН</b>	40 mg/m <sup>2</sup>	soit 60 mg	IV	Le 03.06.2014

#### CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXTRAVASATION DE CHIMIOTHÉRAPIE

- Arrêt de la perfusion tout en conservant l'aiguille ou le cathéter en place.
- Aspirer 3 à 5 mL de sang pour retirer du médicament cytotoxique.
- Injecter, par l'aiguille laissée en place, 5 à 10 mL de **chlorure de sodium** isotonique pour diluer le médicament.
- Injecter l'antidote du produit cytotoxique s'il existe en cas d'impossibilité de recours à la chirurgie pour un médicament antivésicant :
- **Anthracyclines** :
  - 500 mg à 1 g de **SOLUMÉDROL** ou 1 à 2 mL d'**hydrocortisone hémisuccinate** en IV par le dispositif d'injection et/ou au pourtour immédiat de l'extravasation,
  - ou DMSO (50 à 99 %) en application locale :

15 mL sur une compresse pendant 15 min à répéter toutes les 4 à 6 h pendant 48 h ;

- **Alkylants** : **thiosulfate de sodium** à 10 % + 6 mL eau ppi par voie IV ou SC autour du point d'extravasation.
- Prévenir le médecin responsable de la chimiothérapie.
- Enlever l'aiguille.
- Aspirer, à l'aide d'une aiguille sous-cutanée, le maximum de liquide infiltré au pourtour du point d'injection. Anesthésie locale par spray ou crème si possible.
- Appliquer des compresses froides s'il existe un antidote pour éviter la diffusion, ou chaudes pour favoriser l'élimination du produit.
- Appliquer, toutes les 2 h, une pommade calmante sur la zone d'extravasation (**hydrocortisone** à 1 %, **pommade anti-œdémateuse**).
- Surveillance clinique.

## CANCERS - CHIMIOTHÉRAPIE (2)

### Prescrire la chimiothérapie

Elle est établie par le médecin prescripteur, précisant l'identité du patient, le poids, la taille, la surface corporelle, le protocole précis de chimiothérapie utilisé, le nom de chaque médicament, la dose unitaire et la dose calculée, les jours d'administration, la chronologie si nécessaire, le mode d'administration, les traitements associés. Elle n'est validée qu'après vérification des bilans cliniques et biologiques autorisant sa réalisation. Elle précise les éléments de surveillance. Elle est enfin datée et signée par le médecin prescripteur.

### Préparer la chimiothérapie selon les bonnes pratiques

#### Administer la chimiothérapie par du personnel infirmier formé

#### Surveillance de la chimiothérapie

Elle est d'autant plus aisée que le patient et le médecin traitant sont informés.

#### Évaluer la toxicité

- Conditionne, selon le type d'effets indésirables et leur sévérité, la poursuite de la chimiothérapie, selon le même protocole et aux doses identiques.

#### Évaluer l'efficacité

- Selon la maladie tumorale et l'enjeu de la chimiothérapie, programmer de manière régulière tous les 2 à 3 cycles un bilan d'évaluation.
- Ne réaliser que les examens susceptibles d'influencer la prise en charge thérapeutique.

### Complications

#### Lors de la réalisation du protocole d'administration

##### ► Extravasation

- Suspectée si symptômes autour du point d'injection ou absence de retour sanguin après aspiration.

- Risque de nécrose variable selon les médicaments :

- *risque élevé* : amsacrine, carboplatine, cisplatine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, mitomycine, mitoxantrone, plicamycine, vinblastine, vincristine, vindésine, vinorelbine ;

- *risque modéré* : carmustine, cyclophosphamide, dacarbazine, docétaxel, ifosfamide, melphalan, paclitaxel, streptozocine, ténaposide, thiopeta.

##### ► Nausées - vomissements

Différencier les nausées-vomissements aigus survenant dans les 24 h suivant l'administration de la chimiothérapie, des nausées-vomissements retardés survenant au-delà et des nausées-vomissements anticipés.

- Risque émétique élevé : cisplatine ( $> 75 \text{ mg/m}^2$ ), dacarbazine ( $\geq 500 \text{ mg/m}^2$ ), cyclophosphamide ( $> 1 \text{ g/m}^2$ ), cytarabine ( $> 1 \text{ g/m}^2$ ), streptozocine, 6-thioguanine.

- Risque intermédiaire : cisplatine ( $< 75 \text{ mg/m}^2$ ), dacarbazine ( $< 500 \text{ mg/m}^2$ ), cyclophosphamide ( $0,5 \text{ à } 1 \text{ g/m}^2$ ), dacarbazine ( $> 75 \text{ mg/m}^2$ ), méthotrexate ( $\geq 250 \text{ mg/m}^2$ ), carboplatine, oxaliplatine, doxorubicine, épirubicine, irinotécane.

- Risque faible : paclitaxel, docétaxel, étoposide, pémétréxed, gemcitabine, fluorouracile, cétuximab, trastuzumab, topotécane, mitoxantrone.

- Risque minime : bléomycine, bévaccizumab, rituximab, vinblastine, vinorelbine, vincristine.

## ANTIÉMÉTIQUES (1) – ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS 5-HT<sub>3</sub> À LA SÉROTONINE

### ■ Granisétron

<b>KYTRIL</b>					
Prise orale : 1 cp. avant la chimiothérapie Injection ou perfusion intraveineuse avant la chimiothérapie	2 cp. 1 mg	12,35	I	65 %	6,18
	10 cp. 1 mg	HOP	I		
	1 cp. 2 mg	12,35	I	65 %	12,35
	5 cp. 2 mg	HOP	I		
	1 amp. 3 mg	20,85	I	65 %	20,85
	5 amp. 3 mg	HOP	I		

### ■ Ondansétron

<b>ZOPHREN</b>					
<b>ZOPHREN</b> cp. Prise orale : 1 cp. avant la chimiothérapie 10 mL avant la chimiothérapie	2 cp. 4 mg	9,57	I	65 %	4,79
	2 cp. lyoph. 4 mg	9,57	I	65 %	4,79
	4 cp. 4 mg	18,59	I	65 %	4,65
	4 cp. lyoph. 4 mg	18,59	I	65 %	4,65
	10 cp. 4 mg	HOP	I		
	10 cp. lyoph. 4 mg	HOP	I		
	2 cp. 8 mg	8,85	I	65 %	4,43
	2 cp. lyoph. 8 mg	8,85	I	65 %	4,43
	4 cp. 8 mg	17,15	I	65 %	4,29
	4 cp. lyoph. 8 mg	17,15	I	65 %	4,29
	10 cp. 8 mg	HOP	I		
	10 cp. lyoph. 8 mg	HOP	I		
	1 amp. 2 mL	8,13	I	65 %	8,13
	1 amp. 4 mL	15,30	I	65 %	15,30
<b>ZOPHREN</b> injectable Injection ou perfusion intraveineuse avant la chimiothérapie	5 amp. 4 mL	HOP	I		
<b>ZOPHREN</b> suppositoire 1 sup. avant la chimiothérapie	2 sup. 16 mg	33,58	I	65 %	16,79
<b>ZOPHREN</b> sirop 10 mL avant la chimiothérapie	1 fl. 50 mL (4 mg/5 mL)	39,06	I	65 %	39,06

### PROPRIÉTÉS

Antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> à la sérotonine qui sont impliqués dans les vomissements secondaires à la chimiothérapie cytotoxique. Ces molécules sont très efficaces en traitement préventif.

### INDICATIONS

Prévention des nausées et vomissements aigus induits par une chimiothérapie ou une radiothérapie cytotoxique.

L'utilisation de ces molécules en traitement curatif, une fois que nausées et vomissements sont apparus, est moins efficace.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.  
Grossesse et allaitement : éviter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'administration de ces **antiémétiques** doit précéder d'une heure la chimiothérapie émettante.

### EFFETS INDÉSIRABLES

- Constipation (diminution de la motricité colique).
- Ballonnements, céphalées, hypotension.
- Élévation modérée des transaminases.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Phénobarbital** : augmentation de la clairance plasmatique de l'**antiémétique**.

## CANCERS - CHIMIOTHÉRAPIE (3)

*Traitement des nausées - vomissements aigus [1]*

- Risque élevé : **antisérotinine J1 + corticoïdes J1-4 + aprépitant J1-3 ± lorazépam**. Si échec + **phénothiazine**.
- Risque intermédiaire : **antisérotinine J1 + corticoïdes J1 + aprépitant J1-3**. Si échec ± **lorazépam ± phénothiazine**.
- Risque faible : **métoclopramide ou métopimazine ou alizapride + corticoïdes J1**.

*Traitement des nausées - vomissements retardés*

- Risque élevé : en préventif, **métoclopramide - corticoïdes**.
- Risque intermédiaire : non systématique, si nausées - vomissements aigus ou si prophylaxie secondaire.

► *Tolérance hémodynamique et rénale des protocoles avec hydratation et médicaments néphrotoxiques*

Poids, diurèse, balance hydrique, PA, clinique, ± biologie.

### Toxicités au décours de la chimiothérapie

Elles sont dominées par l'aplasie médullaire (neutropénie fébrile et thrombopénie).

► *Neutropénie fébrile [1] [2]*

Si température  $\geq 38,3$  °C ou 2 mesures  $\geq 38$  °C à 1 heure d'intervalle et si granulocytes neutrophiles (GN)  $< 0,5$  ou  $1.10^9/L$  avec chute prévisible dans les heures qui suivent → risque de choc infectieux.

- Hospitalisation, d'autant plus que PNN  $< 0,5.10^9/L$ .

• Rechercher porte d'entrée, notamment si système implantable endoveineux.

- Prélèvement bactériologique.

• Antibiothérapie empirique à large spectre : **pipéracilline + tazobactam** ou **céfipime** ou **ceftazidime ± vancomycine + aminosides** si signes de choc.

- Pas d'indication de facteurs de croissance hématopoïétiques.

• Doit faire rediscuter lors de la cure suivante de chimiothérapie, de maintenir ou de diminuer les doses, ou d'associer des facteurs de croissance hématopoïétique en prophylaxie secondaire.

► *Thrombopénie*

Jugée sévère si traduite cliniquement ou si  $< 10.10^9/L$ .

- Transfusions plaquettaires.

• Doit faire rediscuter, lors de la cure suivante de chimiothérapie, le maintien ou la diminution des doses.

### CONSENSUS

[1] American Society of Clinical Oncology Guideline for Antiemetics in Oncology : Update 2006, ASCO, 2006

[2] Indication des agents stimulant l'érythropoïèse (ASE : époétine alpha, époétine bêta et darbepoétine) dans la prise en charge de l'anémie en cancérologie, SOR, 2007

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (1)

### Définition

Les thérapies moléculaires ciblées désignent des molécules antitumorales capables d'inhiber une voie oncogénique directement impliquée dans la carcinogenèse et/ou la progression des cellules tumorales. Schématiquement, huit altérations cellulaires sont impliquées dans la carcinogenèse : résistance à l'apoptose, immortalisation, capacité d'invasion et pouvoir métastatique, angiogenèse, activation autonome des voies de prolifération, indépendance vis-à-vis des signaux antiprolifératifs, échappement à l'immunosurveillance et anomalies du métabolisme. Les thérapies moléculaires ciblées visent à bloquer une ou plusieurs de ces caractéristiques retrouvées de façon prépondérante dans une tumeur. Actuellement, les thérapies moléculaires ciblées les plus avancées dans leur développement sont celles inhibant l'angiogenèse et l'activation des voies de prolifération.

### Classification

On peut distinguer deux types de thérapies moléculaires ciblées : les **anticorps monoclonaux** et les **inhibiteurs de tyro-**

**sine-kinase**. Leurs cibles peuvent être membranaires (EGFR, HER2), cytoplasmiques (mTOR) ou présentes dans le milieu extracellulaire (VEGF).

Les **anticorps monoclonaux** ont une terminologie spécifique : ils finissent tous par le suffixe -mab. La syllabe qui précède le suffixe -mab détermine la source de l'anticorps : u pour humain, xi pour chimérique, zu pour humanisé et o pour murin.

Les **inhibiteurs de tyrosine-kinase** bloquent l'activité tyrosine-kinase d'un récepteur ou d'une protéine cytoplasmique indispensable à la transduction du signal de prolifération. Ces inhibiteurs pénètrent dans la cellule et bloquent de façon spécifique l'activité tyrosine-kinase en rentrant en compétition avec l'ATP.

### Les différentes thérapies moléculaires ciblées actuelles

Le tableau ci-dessous résume les thérapies ciblées validées actuellement. En général, les **inhibiteurs de tyrosine-kinase** s'administrent par voie orale souvent de façon quotidienne tandis que les anticorps s'administrent par voie intraveineuse à un intervalle d'une à plusieurs semaines.

**INHIBITEURS DE KINASE (1)****■ Erlotinib**

<b>TARCEVA</b>					
Prise orale 150 mg/j en une prise	30 cp. 25 mg	528,46	I	100 %	17,62
En continu	30 cp. 100 mg	1 814,06	I	100 %	60,47
À distance des repas	30 cp. 150 mg	2 231,08	I	100 %	74,37

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant le récepteur à l'EGF (HER-1) à la surface des cellules tumorales. L'**erlotinib** induit un arrêt de croissance et l'apoptose des cellules tumorales.

**INDICATIONS**

Traitement des cancers du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique après échec d'une chimiothérapie à base de **platine** ou en 1<sup>re</sup> intention chez les patients avec mutation du gène EGFR.

Traitement des cancers du pancréas métastatique en association avec la **gemcitabine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter toute prise médicamenteuse concomitante, en particulier les inhibiteurs du CYP3A4.

**■ Sorafénib**

<b>NEXAVAR</b>					
Prise orale 400 mg x 2/j	28 cp. 200 mg	3 535,50	I	100 %	126,27
En continu					
À distance des repas					

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGFR-1 et 2), PDGFR, c-Kit, Raf-kinase à la surface des cellules tumorales. Le **sorafénib** inhibe la croissance tumorale en diminuant la vascularisation des tumeurs.

**INDICATIONS**

Traitement du carcinome rénal avancé après échec d'un traitement préalable à base d'**interféron alfa** ou d'interleukine 2 ou chez des patients pour lesquels ces traitements sont considérés comme inadaptés.

Traitement du carcinome hépatocellulaire localement avancé et/ou métastatique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, galactosémie, déficit en lactase.

Déconseillé en cas de grossesse ou d'allaitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Éruption cutanée acnéiforme, paronychies, diarrhée, kératoconjunctivites sèches, nausée, pneumopathie interstitielle, élévation de la bilirubine, hépatite cytolytique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec les inhibiteurs du CYP3A4 : les azolés (**itraconazole**, **kétoconazole**, **voriconazole**), **clarithromycine**, **ritonavir**, **indinavir**, **saquinavir** et le jus de pamplemousse.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Complication de cicatrisation des plaies.

En cas d'antécédent d'infarctus du myocarde, d'angor, d'insuffisance coronarienne, de clip vasculaire, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire. Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie des 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, grossesse, allaitement.

Insuffisance coronarienne sévère, HTA instable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhées, nausées, élévation des enzymes pancréatiques et hépatiques, hypertension artérielle, troubles cardiaques, dysphonie, alopecie rare, éruptions cutanées, acouphènes, hémorragies, thrombopénie.

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (2)

## Thérapies ciblées\*

DCI	Nom commercial	Cible moléculaire	Indications préférentielles	Type
<b>Erlotinib</b>	<b>TARCEVA</b>	EGFR	Cancer du poumon non à petites cellules, cancer du pancréas	IK
<b>Sorafénib</b>	<b>NEXAVAR</b>	VEGFR, PDGFR, RAF	Cancer du rein, hépatocarcinome	IK
<b>Sunitinib</b>	<b>SUTENT</b>	VEGFR, PDGFR, c-Kit	Cancer du rein, tumeurs stromales gastro-intestinales, tumeur neuro-endocrine	IK
<b>Imatinib</b>	<b>GLIVEC</b>	Bcr-Abl, c-Kit	LMC, tumeurs stromales gastro-intestinales	IK
<b>Axitinib</b>	<b>INLYTA</b>	VEGFR, PDGFR	Cancer du rein	IK
<b>Dasatinib</b>	<b>SPRYCEL</b>	Bcr-Abl	LMC	IK
<b>Nilotinib</b>	<b>TASIGNA</b>	Bcr-Abl	LMC	IK
<b>Temsirolimus</b>	<b>TORISEL</b>	mTOR	Cancer du rein	IK
<b>Cétuximab</b>	<b>ERBITUX</b>	EGFR	Cancer colorectal, cancer ORL	Ac
<b>Panitumumab</b>	<b>VECTIBIX</b>	EGFR	Cancer colorectal	Ac
<b>Trastuzumab</b>	<b>HERCEPTIN</b>	HER2	Cancer du sein, cancer gastrique	Ac
<b>Rituximab</b>	<b>MABTHERA</b>	CD20	Lymphome non hodgkinien	Ac
<b>Alemtuzumab</b>	<b>MABCAMPATH</b>	CD52	LLC	Ac
<b>Bévacizumab</b>	<b>AVASTIN</b>	VEGF	Cancer colorectal, cancer du poumon non à petites cellules, cancer du rein, cancer des ovaires	Ac
<b>Aflibercept</b>	<b>ZALTRAP</b>	VEGF	Cancer du côlon	Ac
<b>Bortézomib</b>	<b>VELCADE</b>	Protéasome	Myélome, lymphome du manteau	IK
<b>Pertuzumab</b>	<b>PERJETA</b>	HER1	Cancer du sein	Ac
<b>Vemurafenib</b>	<b>ZELBORAF</b>	BRAF	Mélanome	IK
<b>Dabrafenib</b>	<b>TAFINLAR</b>	BRAF	Mélanome	IK
<b>Crizotinib</b>	<b>XALKORI</b>	ALK, MET, ROS	Cancer du poumon	IK
<b>Pazopanib</b>	<b>VOTRIENT</b>	VEGFR	Cancer du rein, sarcome des tissus mous	IK
<b>regorafenib</b>	<b>STIVARGA</b>	VEGFR	Cancer du côlon	IK
<b>Vismodegib</b>	<b>ERIVEDGE</b>	Smoo	Carcinome baso-cellulaire	IK

\* Ac : anticorps ; IK : inhibiteur de tyrosine-kinase

## INHIBITEURS DE KINASE (2)

## ■ Sunitinib

<b>SUTENT</b>					
50 mg/j pendant 4 sem.	28 gél. 12,5 mg	1 368,73	I	100 %	48,88
puis fenêtre thérapeutique de 2 sem.	28 gél. 25 mg	2 696,34	I	100 %	96,30
ou 37,5 mg/j en continu	28 gél. 50 mg	5 351,56	I	100 %	191,13

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGFR-1 et 2), PDGFR, c-Kit, Raf-kinase à la surface des cellules tumorales. Le **sunitinib** inhibe la croissance tumorale en diminuant la vascularisation des tumeurs.

**INDICATIONS**

Traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) malignes nonrésécables et/ou métastatiques, après échec d'un traitement par le **mésylate d'imatinib** dû à une résistance ou à une intolérance.

Traitement des cancers du rein avancés et/ou métastatiques après échec d'un traitement à base d'**interféron alpha** ou d'interleukine 2. Tumeurs neuroendocrines du pancréas, non résécables ou métastatiques bien différenciées avec progression de la maladie chez l'adulte.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'antécédent d'infarctus du myocarde, d'angor, d'insuffisance coronarienne, de clip

vasculaire, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire. Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie dès 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, grossesse, allaitement. Insuffisance coronarienne sévère, HTA instable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fatigue précoce, diarrhées, nausées, stomatites, dyspepsie (digestion difficile), pigmentation jaune de la peau, hypertension artérielle, hypothyroïdie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association déconseillée avec la **dexaméthasone**, la **phénytoïne**, la **carbamazépine**, la **rifampicine**, le **phénobarbital**, les préparations à base de millepertuis, le **ritonavir**, l'**itraconazole**, l'**érythromycine**, la **clarithromycine**, le jus de pamplemousse et le **kétoconazole** qui font varier les concentrations du **sunitinib**.



## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (3)

## Effets indésirables

Même si les cibles visées par ces thérapies sont présentes de façon prépondérante dans les tumeurs, elles ne sont pas pour autant absentes des tissus normaux, expliquant la survenue d'effets indésirables des thérapies ciblées.

Ainsi, les antiangiogéniques (**AVASTIN**, **NEXAVAR**, **SUTENT**) s'accompagnent d'une hypertension artérielle ou d'une protéinurie résultant du blocage du VEGF rénal ou de diarrhée.

## Effets indésirables cutanés

Les anti-EGFR (**TARCEVA**, **ERBITUX**) induisent fréquemment un rash cutané acnéiforme (EGFR exprimé au niveau de la peau). Ces effets indésirables peuvent avoir des répercussions sur l'observance du traitement.

**Ordonnance pour les effets indésirables cutanés induits par les inhibiteurs d'Epidermal Growth Factor**

**DEXERYL** (glycérol + vaseline) tube de 250 g : 1 appl./j sur le corps (zones sèches).

**DERMOCUIVRE** tube de 100 g : appl. à volonté sur le visage.

**ÉRYTHROGEL** tube de 30 g : 1 appl./j sur les zones pustuleuses sur peau sèche et nettoyée au savon.

Si lésion très inflammatoire : **DIPROSONE** crème : 1 appl. matin et soir.

**VIBRAMYCINE N** 100 mg : 1 cp./j pendant 15 j puis 1 cp. un jour sur deux pendant 15 j puis arrêt.

## Effets indésirables digestifs

La diarrhée est fréquente, parfois sévère, conduisant à diminuer la posologie des thérapies ciblées. On propose un traitement symptomatique :

– **IMODIUM** : 2 gél. après la première selle diarrhéique puis 1 gél. après chaque selle diarrhéique ;

– **QUESTRAN** : 1 à 3 sach./j.

**Ordonnance pour la mucite induite par les inhibiteurs de mTOR**

Bains de bouche : 150 mL d'**ÉLUDRIL** dans 350 mL de **bicarbonate de sodium** (1,4 %) : faire 4 à 6 bains de bouche par jour.

**LORAMYC** (miconazole) (50 mg cp. gingival muco-adhésif LP) : application d'un cp. x 1/j, pendant 7 à 14 j en fonction de la réponse clinique (appliquer sur la gencive supérieure au-dessus d'une incisive).

**HYALUGEL** (spray ou gel gingival anti-inflammatoires) : appl. 3 à 5 fois par jour après les principaux repas, pendant 3 à 4 sem., jusqu'à disparition complète des symptômes.

## INHIBITEURS DE KINASE (3)

## ■ Axitinib

INLYTA				
Dose de départ recommandée : 5 mg x 2/j à 12 h d'intervalle	56 cp. 1 mg	786,58	100 %	14,05
La tolérance et l'efficacité du traitement justifient l'adaptation posologique	56 cp. 5 mg	3768,43	100 %	67,29
En cas de bonne tolérance : la posologie pourra être augmentée à 7 mg x 2/j puis 10 mg x 2/j				
En cas de nécessaire diminution de la dose : la posologie sera abaissée à 3 mg x 2/j puis à 2 mg x 2/j				

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGF-1, 2 et 3).

**INDICATIONS**

Traitement du cancer du rein avancé après l'échec d'une thérapie antérieure.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Complication de cicatrisation des plaies.

En cas d'antécédant d'HTA, d'infarctus du myocarde, d'accident ischémique, d'AVC, d'hypothyroïdie, d'anomalie du bilan hépatique, de risque hémorragique ou thromboembolique et de risque de fistule/perforation gastro-intestinale.

Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie dès 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**axitinib**, grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique sévère et HTA non contrôlée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Par fréquence décroissante : diarrhées, HTA, fatigue, anorexie, nausées, dysphonie, syndrome «main-pied», perte de poids, vomissements, constipation, hypothyroïdie et troubles dermatologiques (rashes, érythèmes, prurit et xérose).

On note des cas de leucoencéphalopathie postérieure réversible.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La co-administration avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP3A4/5 doit être évitée.

Cf. **VOTRIENT**.

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (4)

### Effets indésirables cardiovasculaires des antiangiogéniques : hypertension artérielle

Si la pression artérielle est  $> 140/90$  mmHg avant le traitement antiangiogénique (ou  $> 120/80$  mmHg avec facteurs de risque cardiovasculaire) : introduire un traitement par un **inhibiteur calcique** puis débiter le traitement antiangiogénique.

Surveiller la pression artérielle chaque semaine pendant les 8 premières sem. puis avant chaque cycle :

- si la pression artérielle est  $< 130/80$  mmHg : continuer le traitement antiangiogénique ;
- si la pression artérielle est  $> 130/80$  mmHg :
  - en cas d'antécédent de cardiopathie ischémique, faire une dose test de dérivés nitrés (5 à 10 mg). Si la pression artérielle se normalise rapidement, ajouter des dérivés nitrés en libération prolongée au traitement antihypertenseur antérieur et continuer les antiangiogéniques. En l'absence de réponse aux dérivés nitrés, ren-

forcer le traitement antihypertenseur antérieur et continuer les antiangiogéniques, – en l'absence de cardiopathie ischémique : continuer les antiangiogéniques et renforcer le traitement antihypertenseur antérieur.

Privilégier : **dérivés nitrés, inhibiteurs calciques** autres que le **vérapamil** et **diltiazem** (inhibiteurs du CYP3A4), **bêtabloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion** et **diurétiques**.

### Effets indésirables néphrologiques des antiangiogéniques

Réaliser une bandelette urinaire avant chaque cycle.

En cas de protéinurie ++, réaliser une protéinurie sur 24 h :

- si la pression artérielle est  $< 130/80$  mmHg : avis néphrologique en cas d'hématurie associée ou de protéinurie  $> 1$  g/24 h ;
- si la pression artérielle est  $> 130/80$  mmHg : traiter l'hypertension artérielle. En cas de persistance de la protéinurie, raisonner comme précédemment.

## CANCERS - RADIOTHÉRAPIE

### Règles générales

- Intégrer la radiothérapie dans la stratégie thérapeutique.
- Préciser les enjeux car elle conditionne la réalisation du traitement.

### Radiothérapie à visée curative ou palliative

Elle conditionne :

- la dose totale, la dose par fraction, en grays (Gy) ;
- l'étalement du traitement ;
- la protection  $\pm$  importante des organes sains.

### Association à d'autres étapes thérapeutiques : chirurgie ou chimiothérapie

- *Préciser des critères techniques*
- Apprécier la radiosensibilité attendue.
- Déterminer le volume cible.
- Déterminer les contraintes anatomiques du volume cible, des organes de voisinage (conformation/TDM/IRM).
- Choix du rayonnement (radiothérapie externe : photons X,  $\gamma$ , électrons, curiethérapie).
- Choix des faisceaux.
- Dosimétrie.
- *Développer la cardiothérapie conformationnelle*
- *Présenter le traitement au patient*
- *Prescription et surveillance du traitement*

### Surveillance

Elle est d'autant plus aisée que le patient et le médecin traitant sont informés.

### Évaluer la toxicité

- Surveillance clinique  $\pm$  biologique en fonction des cibles d'irradiation (hémo-gramme).

- Description et sévérité des effets secondaires.

### Évaluer l'efficacité

Selon l'enjeu fixé de la radiothérapie :

- contrôle local curatif ;
- contrôle local palliatif ;
- traitement symptomatique : à visée antalgique, hémostatique, décompressive.

### Complications

#### Cutanées

- *Érythème cutané, ou brûlures cutanées* : **ÉOSINE AQUEUSE, BIAFINE** (sauf dans les 4 h précédant l'irradiation).
- *Exfoliation cutanée, suintement* : arrêt momentané de la radiothérapie.
- *Épidermite sèche* : crème hydratante.

#### Muqueuses

- *Mucite oropharyngée* : bains de bouche (**tricarbonates + antifongiques**), **antalgiques**.
- *Œsophagite* : **topiques antiulcéreux (KÉAL)**, **inhibiteur de la pompe à protons, oméprazole 20 mg/j**, **antalgiques**, surveiller l'apport hydrique et alimentaire.
- *Irritation intestinale* : **IMODIUM**, surveiller l'apport hydrique et alimentaire.
- *Cystite* : ECU, **antiseptique**, apport hydrique.

#### Digestives

- *Nausées - vomissements* : **antiémétiques** ; **5 anti-HT3** si irradiation abdominale étendue.

#### Hématologiques

- *Anémie, leuconéutropénie et/ou thrombopénie.*

## CANCERS - DOULEUR (1)

### Prérequis pour le traitement de la douleur

- Évaluation des caractéristiques de la douleur.
- Évaluation de son intensité.
- Évaluation des traitements antérieurs reçus.
- Examen clinique, centré sur la tumeur, les zones douloureuses et examen neurologique.
- Conséquences de la douleur sur le psychisme du patient, l'entourage et les retombées sociales.

#### Objectifs :

- Comprendre le ou les mécanismes impliqués : douleur par excès de stimulation nociceptive, par désafférentation ou neurogène, post-thérapeutique, intercurrente, et/ou composante psychoaffective.
- Définir les objectifs et les priorités de la prise en charge : retrouver un sommeil nocturne, conserver un éveil diurne, permettre une mobilisation passive et active, éduquer le patient à une autogestion de l'évaluation de la douleur et de son traitement, vivre dans l'environnement familial.
- Diriger le(s) traitement(s) proposé(s) et les soins.
- Permettre l'évaluation (échelles qualitatives et quantitatives, etc.).

### Moyens thérapeutiques

#### Traitement de la maladie tumorale

Si la maladie tumorale est cause de la douleur.

- *Traitement médical*  
Chimiothérapie, hormonothérapie.
- *Radiothérapie*  
Radiothérapie antalgique osseuse ou de décompression.
- *Chirurgie*  
Exérèse tumorale, dérivation digestive ou urinaire, chirurgie d'exérèse ou de consolidation osseuse, chirurgie de décompression médullaire ou d'épidurite.

- *Isotopes*  
Strontium 90.
- *Radiologie interventionnelle*  
Embolisation, cimentoplastie.

#### Traitements antalgiques

- **Antalgiques non opioïdes :**
  - paracétamol ;
  - aspirine.
- **Opioïdes faibles :**
  - codéine seule ou associée ;
  - tramadol associé.
- **Opioïdes forts :**
  - agonistes purs : sulfate de morphine, chlorhydrate de morphine, péthidine, dextromoramide ;
  - agonistes antagonistes : buprénorphine, nalbuphine.

#### Rapport de dose entre la morphine et les autres antalgiques

Morphine orale	1
Codéine	1/6
10 mg morphine : 60 mg codéine	
Péthidine	1/5
10 mg morphine : 50 mg péthidine	
Dextromoramide	2
10 mg morphine : 5 mg dextromoramide	
Buprénorphine	30
10 mg morphine : 0,33 mg buprénorphine	
Fentanyl	100
10 mg morphine : 0,01 mg fentanyl	

#### Co-analgie

Anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes, antidépresseurs, antiépileptiques, neuroleptiques, antispasmodiques, biphosphonates.

#### Aide psychologique

#### Traitements invasifs

Blocs nerveux, neurochirurgie.

#### Méthodes physiques

Physiothérapie.

## CANCERS - DOULEUR (2)

### Indications thérapeutiques

#### 10 principes

- Croire aux plaintes douloureuses.
- Traiter, si possible, la cause.
- Hiérarchiser la prescription en fonction du type et de l'intensité de la douleur.
- Prescription régulière, à heure fixe.
- Privilégier la voie orale.
- Garder le patient vigilant.
- Prévenir et dépister les effets indésirables.
- Privilégier les associations co-analgésiques.
- Réévaluer régulièrement l'efficacité du traitement.
- Maintenir un soutien psychologique.

Les indications et les choix thérapeutiques seront d'autant mieux pris en charge que l'évaluation étiopathogénique aura été faite.

### Douleurs par excès de stimulation

#### Douleurs légères (palier 1 de l'OMS)

Elles permettent au patient de réaliser la plupart de ses activités. On utilise des antalgiques non opioïdes :

- **paracétamol** : 1 cp. à 500 mg ou 1 g toutes les 4 h ;
- alternance de **paracétamol** : 1 cp. à 500 mg ou 1 g toutes les 8 h, et d'**aspirine** 500 mg à 1 g toutes les 8 h.

#### Douleurs d'intensité moyenne (palier 2 de l'OMS)

Elles limitent les activités, pouvant perturber le repos. On utilise d'emblée des opioïdes faibles : **codéine** associée au **paracétamol** : de 30 à 60 mg toutes les 4 h, ou **tramadol** (associé) : de 37,5 à 75 mg toutes les 4-6 h.

#### Douleurs intenses (palier 3 de l'OMS)

Elles sont invalidantes avec retentissement clinique général et psychoaffectif. On utilise des opioïdes forts : **morphine** ou **fentanyl** :

- par voie orale ;

- en débutant à la dose quotidienne de 1 mg/kg répartie :

- soit toutes les 4 h (**morphine**),
- soit toutes les 12 h (**morphine LP**) ;

- **fentanyl** par voie transdermique/72 h en cas de besoin stable en morphine. Correspondance **morphine - fentanyl** : cf. Tableau antalgiques opiacés dans le chapitre *Rhumatologie* ;

- après insuffisance ou inefficacité des paliers antérieurs qui ne doivent pas être trop prolongés, ou d'emblée si les douleurs se présentent intenses.

En cas de douleur paroxystique, de nouvelles formulations à base de **fentanyl** sont possibles :

- **ABSTRAL** (100, 200, 300, 400, 600 ou 800 µg) cp. sublingual à dissolution rapide ;
- **ACTIQ** (200, 400, 600, 800, 1 200 ou 1 600 µg) cp. avec applicateur buccal ;
- **EFFENTORA** (100, 200, 400, 600 ou 800 µg) cp. gingival utilisant la technique de diffusion de principe actif **ORAVESCENT** ;
- **INSTANYL** (50, 100 ou 200 µg/dose) solution pour pulvérisation nasale ;
- **PECFENT** (100 ou 400 µg/dose) solution pour pulvérisation nasale.

Prévention immédiate des effets secondaires attendus : constipation (activité physique), apports liquides, **lubrifiants**, **laxatifs**, élimination de fécalome ; nausées, vomissements : **antiémétiques**.

### Douleurs osseuses : co-antalgie

#### Anti-inflammatoires non stéroïdiens

+ **antalgiques** qui sont souvent d'efficacité partielle, nécessitant une co-antalgie. La persistance de douleurs ne doit pas conduire à l'augmentation systématique des doses du fait de leur inefficacité et de l'apparition des effets indésirables. Représente une des causes fréquentes de surdosage en **morphine**.

- ± **corticoïdes**,
- ± **biphosphonates**,
- + repos,
- ± **cytoprotecteurs** ou **antiacides**.

**CANCERS - DOULEUR (3)****Alternative à la morphine orale****Voie intraveineuse**

En perfusion continue sur cathéter : dose/24 h = 1/2 de la dose par voie orale ; on peut discuter avec un centre spécialisé l'utilisation d'une pompe autocontrôlée qui permet, à partir d'une dose de morphine de fond, de rajouter des bolus lors de douleurs paroxystiques.

**Voie sous-cutanée**

- Injections toutes les 4 h.
- Infusion continue ou pompe portable externe.

**Voie rectale**

Poudre de morphine, à posologie équivalente à la voie orale, dans 4 g de beurre de cacao et 1 g de cire blanche fondue sans dépasser 30 mg par prise.

**Douleurs de désafférentation nécessitant en règle une association médicamenteuse\*****Douleurs neurogènes**

- **Antalgiques** pouvant être efficaces dans les phases aiguës ; beaucoup moins efficaces sur la phase chronique. De ce fait, il ne faut pas augmenter systématiquement la posologie car cela se traduit par une poursuite de l'inefficacité et l'apparition d'effets indésirables. Surdosage en morphine fréquent.

- **Antidépresseurs imipraminiques** ou **antiépileptiques** type **NEURONTIN** ou **LYRICA**.

- **Corticoïdes** si les douleurs sont dues à une compression nerveuse.

**Douleurs viscérales**

- **Antalgiques** adaptés à l'intensité de la douleur.

- **Corticoïdes**.

- **Antispasmodiques**.

\* La pharmacologie des **antalgiques** est traitée dans le chapitre Rhumatologie-Antalgiques opiacés.

## CANCER DU SEIN (1) – CANCER DU SEIN NON MÉTASTATIQUE (1)

L'enjeu est curatif [1] [2].

Les objectifs sont les suivants :

- contrôle local ;
- contrôle de la maladie métastatique potentielle ;
- contrôle des effets indésirables du traitement ;
- résultat fonctionnel et esthétique ;
- réinsertion.

### Cancer du sein non métastatique opérable d'emblée

- Traitement loco-régional dicté par le geste chirurgical.
- Traitement médical adjuvant basé sur des critères pronostiques.

### Chirurgie conservatrice + radiothérapie [3] ou chirurgie non conservatrice

#### ► Chirurgie conservatrice

Si la tumeur est unique, limitée, à exérèse complète histologique probable avec un résultat esthétique ( $T \leq 30$  mm) :

- tumorectomie élargie à résection tumorale complète ;
- examen extemporané pour confirmation de tumeur maligne invasive ;
- évidement ganglionnaire axillaire emportant au minimum 10 ganglions ; étude du ganglion sentinelle en cours d'évaluation ;
- puis radiothérapie du sein de 50 Gy en 25 séances  $\pm$  surimpression du lit tumoral (+ 10 à 30 Gy), aires ganglionnaires (axillaire voire sus-claviculaire, sous-claviculaire et mammaire interne).

#### ► Chirurgie non conservatrice

Si la conservation est non indiquée ou si c'est le choix de la patiente :

- examen extemporané pour confirmer le diagnostic de tumeur maligne invasive ;
- mastectomie radicale modifiée (conservant le grand et le petit pectoral) ;
- évidement ganglionnaire axillaire ; étude du ganglion sentinelle en cours d'évaluation ;
- radiothérapie des aires ganglionnaires.

#### ► Cas particuliers

Si la marge d'exérèse est envahie après chirurgie d'exérèse :

- discuter reprise chirurgicale pour réexcision ou mastectomie radicale modifiée ;
- en cas de refus de la mastectomie : radiothérapie du sein avec surimpression du lit tumoral ;
- discuter reconstruction mammaire d'emblée à condition qu'elle ne gêne pas l'application du traitement local (radiothérapie) et général (chimiothérapie) d'emblée.

#### ► Complications chirurgicales

- Mastectomie radicale modifiée : rares infections ou désunions. Cicatrice inesthétique.
- Chirurgie conservatrice : hématomes, abcès peu fréquents. Résultats esthétiques inconstants.
- Évidement ganglionnaire axillaire : hématomes, lymphocèle, limitation transitoire de la mobilité de l'épaule et lymphoedème.

#### ► Complications de la radiothérapie

- Aiguës : érythème cutané, épithélite exsudative, lymphoedème.
- À distance : oedème du sein, fibrose, rétraction cutanée, douleur, déformation, téléangiectasies, complications cardiaques, pulmonaires, plexite.



**CANCER DU SEIN - CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	DOSES /m <sup>2</sup>	VOIE D'ADMINIS- TRATION	RYTHME D'ADMINIS- TRATION
CMF	<b>Cyclophosphamide</b>	120 mg	PO	J1 à J14
	<b>Méthotrexate</b>	40 mg	IV	J1 et J5
	<b>Fluorouracile</b>	600 mg	IV	J1 et J8 J1 = J28
Le <b>cyclophosphamide</b> oral peut être remplacé par du <b>cyclophosphamide</b> IV à la dose de 600 mg/m <sup>2</sup> à J1 et J8				
FAC	<b>Fluorouracile</b>	500 mg	IV	J1
	<b>Doxorubicine</b>	50 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	J1 J1 = J21
La <b>doxorubicine</b> peut être remplacée par l' <b>épirubicine</b> IV à la dose de 50 mg/m <sup>2</sup> (FEC50) ou de 75 mg/m <sup>2</sup> (FEC75) à J1				
AC	<b>Doxorubicine</b>	60 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg	IV	J1 J1 = J21
TC	<b>Docétaxel</b>	75 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	J1 = J21
TAC	<b>Docétaxel</b>	75 mg	IV	J1
	<b>Doxorubicine</b>	50 mg	IV	J1 = J21
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	
<b>TAXOL</b> hebdo	<b>Paclitaxel</b>	80 mg	IV	J1, J8, J15, J21, J28, J35 J1 = J49
<b>TAXOTÈRE</b>	<b>Docétaxel</b>	100 mg	IV	J1 J1 = J21

## CANCER DU SEIN (2) – CANCER DU SEIN NON MÉTASTATIQUE (2)

### Traitement général

Il dépend de la mise en évidence de facteurs pronostiques péjoratifs du cancer du sein non métastatique :

- envahissement ganglionnaire axillaire : N+ (nombre) ;
- récepteurs hormonaux négatifs ;
- récepteurs œstrogéniques (RO-) ;
- récepteurs à la progestérone (RP-) ;
- surexpression du récepteur c-ERB2 ou amplification du gène HER2 ;
- grade histologique III ;
- âge < 35 ans.

#### ► Cas de figure

#### • Tumeurs sans surexpression ou amplification d'HER2, quel que soit le statut hormonal :

- Pour les N+, chimiothérapie associant **anthracyclines** et **taxanes** de manière séquentielle ou concomitante ou schéma avec **taxanes** et sans **anthracyclines**.
- Pour les N-, schéma avec **anthracyclines** et sans **taxanes**. Un schéma avec **taxanes** sans **anthracyclines** ou associant **taxanes** et **anthracyclines** peut être proposé.

#### • Tumeurs avec surexpression ou amplification d'HER2, quel que soit le statut hormonal :

Schéma séquentiel associant **anthracyclines** et **taxanes** pour diminuer la dose cumulée d'**anthracyclines** avant la prescription du **trastuzumab**.

#### • Tumeurs hormonosensibles quel que soit le statut HER2 :

- Patientes non ménopausées : castration quelle que soit la méthode ou **tamoxifène**.
- Patientes ménopausées : **inhibiteurs de l'aromatase** d'emblée : **létrozole**, **anastrozole**.
- Si absence de rechute après 2 ans de **tamoxifène** : **exémestane** ou **anastrozole**.

– Prolongation de l'hormonothérapie après 5 ans de **tamoxifène** par un **inhibiteur de l'aromatase** pour les patientes à mauvais pronostic (N+) : **létrozole** ou **anastrozole**.

#### • Prescription du trastuzumab en adjuvant :

Le **trastuzumab** est prescrit après les **anthracyclines**, pour une durée de 12 mois. Les administrations toutes les semaines ou toutes les 3 semaines sont acceptées.

#### ► Complications de la chimiothérapie

- Complications aiguës : alopecie, nausées, vomissements, extravasation, neutropénie fébrile.
- Complications tardives : cardiotoxicité, leucémie aiguë.

### Cancer du sein localement évolué non métastatique T3, T4 Nx ou Tx N2, N3

• Traitement médical initial par chimiothérapie première, néoadjuvante (pas de protocole de référence) pour assurer le contrôle précoce des micrométastases et permettre un traitement local conservateur.

• Puis traitement loco-régional en fonction du résidu tumoral : chirurgie conservatrice si possible + radiothérapie [3] ou radiothérapie exclusive plutôt que chirurgie + radiothérapie (traitement médical adjuvant).

### Cancer du sein inflammatoire

**Définition clinique** : sein augmenté de volume avec érythème cutané.

• Traitement médical initial du fait de la fréquence élevée des micrométastases (80 à 100 %) : polychimiothérapie. Pas de protocole de référence. Essai thérapeutique recommandé.

• Puis traitement loco-régional : radiothérapie [3] ou mastectomie + radiothérapie.

### CONSENSUS

[1] Cancer du sein in situ, *INCa*, 2009

[2] Cancer du sein infiltrant non métastatique, *INCa*, 2012

[3] Indications de la radiothérapie : cancer du sein, *INCa*, 2008

**CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE - CHIMIOTHÉRAPIE PALLIATIVE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS (DCI)	DOSES /m <sup>2</sup> /j	VOIE D'ADMINIS- TRATION	RYTHME D'ADMINIS- TRATION
FAC	Fluorouracile Doxorubicine Cyclophosphamide	500 mg 50 mg 500 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
FEC	Fluorouracile Épirubicine Cyclophosphamide	500 mg 50 ou 75 mg 500 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
AC	Doxorubicine Cyclophosphamide	60 mg 600 mg	IV IV	J1 J1 J1 = J21
EMV	Épirubicine Méthotrexate Vincristine	50 mg 20 mg 1 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
<b>NAVELBINE</b>	Vinorelbine	30 mg	IV	J1 J1 = J8
FUN	Fluorouracile Vinorelbine	750 mg 30 mg	IV 24 h IV	J1 à J5 J1 et J5 J1 = J21
<b>TAXOTÈRE</b>	Docétaxel	100 mg	IV	J1 = J21

## CANCER DU SEIN (3) – CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

L'enjeu est palliatif.

Les objectifs sont les suivants :

- contrôle de la maladie symptomatique ;
- contrôle des effets indésirables du traitement ;
- conservation et prolongement d'une bonne qualité de vie.

### Indications thérapeutiques de 1<sup>re</sup> ligne métastatique

#### Traitement spécifique

Ses indications sont définies sur des éléments pronostiques :

- âge ;
- statut hormonal ;
- présentation métastatique : site, évolutivité, caractéristiques de la tumeur primitive, essentiellement la positivité des récepteurs hormonaux, traitement adjuvant et délai sans rechute et sur les symptômes ou les risques fonctionnels.

► *Lésion non viscérale (peau, ganglions) ou viscérale non menaçante, peu évolutive (ex. poumon ou faible volume tumoral)*

- Hormonothérapie par **tamoxifène** ou **létrazole** si non prescrit en phase adjuvante ou si reprise évolutive après arrêt de celui-ci depuis un délai > 12 à 24 mois.

• Sinon envisager une hormonothérapie par un **inhibiteur d'aromatase**, un **progestatif** ou une chimiothérapie.

- Chez les femmes non ménopausées, envisager une castration hormonale soit chimique par analogue LH-RH soit radicale par chirurgie plutôt que par radiothérapie, associée ou non au **tamoxifène** ou **létrazole**.

► *Lésion viscérale lentement évolutive, peu menaçante avec délai depuis le traitement de la lésion primitive > 24 à 36 mois*

- Hormonothérapie d'autant plus que la tumeur initiale présentait des récepteurs hormonaux positifs et/ou que le délai sans rechute est long (> 5 ans).

• En cas de progression sous **inhibiteurs de l'aromatase**, prescription d'**exémestane** en association avec l'**exémestane** chez les femmes ménopausées sans expression de HER2.

► *Lésion viscérale menaçante sur le plan vital ou fonctionnel ou si évolution rapide ou si rechute dans les 12 mois d'un traitement adjuvant*

Chimiothérapie.

- Si femme < 70 ans et rechute après 12 mois ou rechute dans les 12 mois d'un traitement adjuvant sans **anthracyclines** : protocole de première ligne métastatique comprenant une **anthracycline** ou un **taxane**.

• Si femme < 70 ans et rechute dans les 12 mois d'un traitement adjuvant avec **anthracyclines** : proposer protocole comprenant **taxane** (plutôt **docétaxel** que **paclitaxel** en monothérapie) ou de la **vinorelbine (NAVELBINE)** seule ou protocole FUN), association en cours d'évaluation.

- Si femme d'âge physiologique élevé : **NAVELBINE** ou **capécitabine** seule ou un **taxane**.

► *Recherche d'une surexpression de Her2 Neu*

Si positif : +++ **Herceptest** ou FISH **HERCEPTIN** seul ou associé à **paclitaxel**.

En cas d'échec, association de la **capécitabine** et du **lapatinib**.

#### Traitement symptomatique

Il faut envisager, dans tous les cas, le traitement symptomatique non spécifique à chaque décision de modalités thérapeutiques :

- radiothérapie antalgique ;
- métastasectomie ;
- chirurgie d'enclouage ou d'ostéosynthèse si lésion ostéolytique menaçante ;
- chirurgie de décompression médullaire de localisations vertébrales ou d'épidurite ;
- cimentoplastie de lésion ostéolytique vertébrale, de lésion unique notamment cérébrale ;
- prescription de diphosphonates à visée préventive ou consolidatrice des ostéolyses secondaires ;
- traitement des hypercalcémies, en plus des traitements antalgiques non spécifiques des douleurs chroniques.

## CANCER DE L'OVAIRE (1)

### Tumeurs épithéliales de l'ovaire au stade précoce

Stade I (FIGO\*), limité à 1 ovaire (IA), aux 2 ovaires (IB), avec végétations néoplasiques à la surface ovarienne, ou avec rupture capsulaire ou avec ascite (IC).

#### Traitement chirurgical [1]

Il doit suivre une procédure standard (checklist préétablie) et complète qui doit mener au stade exact et à la rémission complète macroscopique. Sa qualité influence de façon prépondérante les résultats de la stratégie thérapeutique.

##### ► Voie d'abord

Médiane sous-ombilicale agrandie si besoin.

##### ► Cytologie d'ascite

Avec évacuation si elle est présente, ou irrigation-lavage de la cavité péritonéale avec prélèvement de liquide dans le cul-de-sac de Douglas, les gouttières pariéto-coliques et sous les coupes diaphragmatiques en son absence.

##### ► Examen de l'ensemble de la cavité abdomino-pelvienne

Avec biopsies systématiques péritonéales des lésions suspectes :

– péritoine : coupole sous-diaphragma-

tique droite et gauche, capsule de Glisson, péritoine pariétal, péritoine viscéral ;

– foie, voies biliaires, estomac, pancréas, rate ;

– épiploon avec résection ;

– grêle, mésentère, appendice, cadre colique ;

– ovaire controlatéral, utérus, trompes ;

– ganglions mésentériques, pelviens et lombo-aortiques : biopsie de ganglion suspect.

##### ► Exérèse de la tumeur primitive

Annexectomie bilatérale avec hystérectomie + omentectomie + appendicectomie.

##### ► Cas particuliers

• Femme désirant conserver la possibilité d'une grossesse : conservation de l'ovaire controlatéral si macroscopiquement normal ± biopsie et de l'utérus dans les stades IA, ± IB et de grade 1 ou 2 de malignité.

• Chirurgie première incomplète : envisager nouvelle intervention.

#### Traitement complémentaire ou adjuvant [2]

• Pas de traitement complémentaire dans les stades IA, IB, ou grade 1 ou 2.

• Si stade IC ou grade 3 de malignité ou tumeurs à cellules claires : traitement complémentaire par chimiothérapie (par association de **carboplatine** - **paclitaxel**) pour 4 à 6 cycles.

### CONSENSUS

[1] Traitement chirurgical du cancer de l'ovaire, *INCa*, 2009

[2] Traitements adjuvants et de consolidation du cancer de l'ovaire, *INCa*, 2009

\* FIGO : Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.

**CANCER DE L'OVAIRE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS (DCI)	DOSES /m <sup>2</sup> /j	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>CISPLATYL</b>	Cisplatine	75 mg	IV (3 à 4 h)	J1
<b>ENDOXAN ASTA</b>	Cyclophosphamide	750 mg	IV	J1 J1 = J21
ou	Cisplatine	100 mg	IV (3 à 4 h)	J1
	Cyclophosphamide	600 mg	IV	J1 J1 = J21
ou	Cisplatine	100 mg	Intrapéritonéal	J1
	Cyclophosphamide	600 mg	IV	J1 J1 = J21
<b>TAXOL</b>	Paclitaxel	175 mg 135 mg	IV (sur 3 h) IV (sur 24 h)	J1
<b>CISPLATYL</b>	Cisplatine	75 mg	IV (3 à 4 h)	J1 J1 = J21
<b>TAXOL</b>	Paclitaxel	175 mg	IV (sur 3 h)	J1
<b>PARAPLATINE</b>	Carboplatine	AUC à 6 mg/mL/j	IV (en 30 min, après le <b>paclitaxel</b> )	J1 J1 = J21

## CANCER DE L'OVAIRE (2)

### Tumeurs épithéliales de l'ovaire localement avancées

Stade II FIGO avec extension pelvienne (IIA, B, C), stade III FIGO avec métastases péritonéales en dehors de pelvis ou adénopathies régionales métastatiques, et stade IV FIGO avec atteinte métastatique.

Le traitement associe chirurgie et traitement complémentaire.

#### Traitement chirurgical initial

##### ► But

Réduction tumorale la plus complète possible, tout en limitant la morbidité :

- à réaliser par un chirurgien formé à ce type d'intervention ;
- sa qualité influence le pronostic.

##### ► Voie d'abord

Médiane à cheval par l'ombilic, agrandie au besoin.

##### ► Exploration abdominale

Cf. Traitement chirurgical stade précocé.

##### ► Exérèse tumorale

- Annexeomie bilatérale avec hystérectomie.

- Omentectomie.

- ± Appendicectomie.

- Résection maximale des masses tumorales intrapéritonéales et péritonéales, ± résection partielle, économe de grêle ou de côlon.

- ± Exérèse ganglionnaire en fonction de la qualité de l'exérèse des masses tumorales intra-abdominales.

##### ► Équipe entraînée

Bon équilibre entre exérèse maximale et morbidité pour ne pas retarder la mise en route de la chimiothérapie complémentaire.

##### ► Cas particuliers

- Si l'intervention chirurgicale initiale est jugée insuffisante par l'équipe entraînée :

- soit reprise chirurgicale immédiate ;
- soit différée après 2 à 3 cycles de traitement médical par chimiothérapie.

- En cas de blindage pelvien, d'évolution métastatique importante, d'altération de l'état général ne permettant pas d'envisager une chirurgie maximale, peuvent être discutées, après entretien avec l'équipe entraînée, une chirurgie limitée pour biopsie, une exploration pour inventaire de l'atteinte et la mise en route d'une chimiothérapie première, avant de rediscuter en fonction de l'évolution d'une chirurgie d'exérèse tumorale.

#### Traitement médical : chimiothérapie

- Polychimiothérapie à base de platine : **paclitaxel - carboplatine** pour une durée de 6 cycles (stades II, III).

La place de la **doxorubicine** reste controversée.

- En cas d'intervention chirurgicale initiale suboptimale : éventuelle réintervention après le 2<sup>e</sup> ou le 3<sup>e</sup> cycle, puis reprise de la chimiothérapie.

##### ► Toxicité de la chimiothérapie

Paramètres hématologiques.

#### Chirurgie de réévaluation (second look)

Elle n'est plus systématique.

Même si elle assure la meilleure évaluation de la réponse obtenue par les traitements de première ligne (chirurgie d'exérèse, puis chimiothérapie), elle ne modifie pas le pronostic, tant qu'aucun traitement de consolidation n'a fait la preuve de son efficacité.

Elle est limitée aux situations où elle modifie l'orientation thérapeutique qui reste du domaine de la recherche clinique.

#### Traitement de consolidation

Aucun traitement de consolidation (chimiothérapie ou intensification de chimiothérapie ou radiothérapie) n'a fait la preuve de son efficacité.

En pratique :

- pas de traitement de consolidation ;
- inclusion dans essai thérapeutique prospectif.

## CANCER DU COL DE L'UTÉRUS (1)

- Bilan clinique et évaluation de l'appareil urinaire.
- Classification en stades selon la FIGO [1].
- Décision de la stratégie thérapeutique en comité pluridisciplinaire.
- À noter dans les moyens thérapeutiques :
  - l'exploration chirurgicale à visée diagnostique et d'inventaire peut être réalisée par laparotomie ou par coelioscopie ;
  - l'hystérectomie élargie peut être réalisée par laparotomie ou par voie basse ;
  - la lymphadénectomie peut être réalisée par laparotomie ou par coelioscopie ;
  - toujours envisager une transposition ovarienne lors de la laparotomie ou de la coelioscopie.

### Indications thérapeutiques des stades IA de la FIGO (carcinome invasif infraclinique)

- Enjeu curatif.
- Conisation à visée diagnostique et pronostique (profondeur de l'invasion et embolies vasculaires ou lymphatiques tumoraux).
- Stade IA1 avec invasion inférieure à 1 mm :  
conisation en territoire sain (endo- et exocol), plutôt qu'hystérectomie, si surveillance post-thérapeutique régulière réalisable.
- Stade IA1 avec invasion de 1 à 3 mm :
  - soit conisation en territoire sain, si pas d'embolies tumoraux, et femme en âge de procréer et désirant une grossesse,
  - soit hystérectomie simple ou élargie (Piver II) ± lymphadénectomie si embolies lymphatiques tumoraux.

- Stade IA2 avec invasion de 3 à 5 mm :  
hystérectomie simple ou élargie (Piver II) ± lymphadénectomie si embolies lymphatiques tumoraux.

### Indications thérapeutiques des stades limités IB, IIA, IIB proximaux de la FIGO de bon pronostic (taille < 4 cm, N<sub>0</sub>)

- Enjeu curatif.
- Soit chirurgie par hystérectomie totale élargie (Piver III ou IV) + lymphadénectomie pelvienne + radiothérapie externe complémentaire si adénopathies envahies ou si exérèse incomplète.
- Soit radiothérapie exclusive par radiothérapie externe + curiethérapie adaptée à la taille tumorale :  
Soit :
  - radiothérapie externe pelvienne de 20 à 40 Gy ;
  - curiethérapie 85 Gy dose totale au point A ;
  - radiothérapie latéro-pelvienne complémentaire pour une dose totale de 50 Gy.
- Soit :
  - curiethérapie 85 Gy dose totale au point A + radiothérapie latéro-pelvienne de 50 Gy.

L'intérêt d'une hystérectomie totale élargie post-radiothérapique n'est pas démontré, mais elle peut être envisagée en présence d'un échec à la radiothérapie dans les 6 à 8 sem. après la fin de celle-ci.

- Soit association radiochirurgicale :
  - curiethérapie ;
  - ± radiothérapie externe pelvienne ;
  - + hystérectomie élargie (Piver III) + lymphadénectomie pelvienne.



## CANCER DU COL DE L'UTÉRUS (2)

### Indications thérapeutiques des stades limités IB, IIA, IIB proximaux de la FIGO de mauvais pronostic (taille $\geq$ à 4 cm, atteinte ganglionnaire pelvienne)

- Radiochimiothérapie concomitante, dont chimiothérapie contenant un sel de platine. Hystérectomie complémentaire si réponse insuffisante.
- Enjeu curatif.
- Plutôt radiothérapie externe pelvienne + curiethérapie + radiothérapie lombo-aortique si envahissement ganglionnaire lombo-aortique prouvé que chirurgie d'exérèse associée à une radiothérapie.
- La place de la chimiothérapie première ou en association concomitante avec la radiothérapie reste à démontrer ; elle ne doit s'envisager que dans des protocoles prospectifs.

### Indications thérapeutiques des stades métastatiques IV de la FIGO

- Enjeu palliatif.
- Contrôle symptomatique loco-régional.
- Radiothérapie externe ou chimiothérapie.

- Peut se discuter dans certains cas de forme tumorale centro-pelvienne une pelvectomie ; uniquement par équipe entraînée (à base de cisplatine  $\pm$  topotécan).

### Prévention

La prévention repose sur :

- le frottis cervicovaginal tous les 2 ou 3 ans si le frottis précédant est normal ;
- vaccination préventive (**GARDASIL**) [2] : il existe un vaccin contre 4 *Papillomavirus* oncogènes (HPV 6, 11, 16, 18) indiqué pour la prévention des dysplasies de haut grade et les cancers du col de l'utérus ainsi que les verrues génitales externes dues à ces virus. Le schéma recommandé est de 3 injections (0, 2 et 6 mois). L'indication est fondée sur la démonstration de l'efficacité du vaccin chez les femmes de 16 à 26 ans et sur l'immunogénicité (la fabrication d'anticorps spécifiques après vaccination) chez les enfants et adolescents de 9 à 15 ans. Voir aussi dans le chapitre Gynécologie - Obstétrique : Vaccin contre le *Papillomavirus* humain.

### CONSENSUS

[1] Cancer invasif du col utérin : Guide ALD n° 30 (médecin et patient), HAS, 2010

[2] Avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18, DGS, 2007

**CANCER DU CORPS DE L'UTÉRUS****Traitement du cancer localisé du corps de l'utérus**

- Enjeu curatif.
- Chirurgie : hystérectomie + ovariectomie bilatérale.
- + Radiothérapie pelvienne :
  - si tumeur de grade histologique élevé,
  - si envahissement tumoral en profondeur > 1/3 de l'épaisseur.
- ± Curiethérapie endovaginale.

- Pas de traitement adjuvant médical.

**Traitement de la forme métastatique**

- Enjeu palliatif.
- Dépend du traitement antérieur de la tumeur primitive :
  - à commencer après la radiothérapie palliative le plus souvent symptomatique ;
  - traitement médical : chimiothérapie (à base de **cisplatine** ± associé au **topotécane**), hormonothérapie (**progestérone**).

## CANCERS DU TESTICULE (1)

L'enjeu est curatif même au stade métastatique.

La prise en charge se fait par une équipe entraînée pour éviter une perte de chance. Les objectifs sont les suivants :

- contrôle des micrométastases ;
- éradication des métastases ;
- diminution des séquelles.

### Éléments de la décision thérapeutique [1]

- Type histologique : séminome *versus* tumeur germinale non séminomateuse.
- Stade d'extension : TNM.
- Classification du risque primitif : extragonadique, métastases viscérales non pulmonaires ;  $\beta$ hCG,  $\alpha$ FP, LDH.

### Traitement [1]

Le diagnostic est porté par l'orchidectomie.

Ne pas oublier de proposer systématiquement au patient un prélèvement de sperme pour cryopréservation dans un Centre d'étude et de conservation des ovocytes et du sperme (CECOS) avec au moins un prélèvement avant l'orchidectomie si possible.

### Stade I : T<sub>x</sub> N<sub>0</sub> M<sub>0</sub>

#### ► Séminome

Radiothérapie des aires ganglionnaires lombo-aortiques (25 Gy).

Chimiothérapie par un cycle de **carboplatine** (ASC = 7).

Surveillance armée.

#### ► Tumeurs germinales non séminomateuses 3 options :

- Surveillance si absence de critères de rechute et si surveillance stricte et régulière : examen clinique, RP,  $\alpha$ FP,  $\beta$ hCG tous les mois pendant un an, puis plus espacé.
- Si non-observance prévisible à la surveillance ou si critères exposant à la rechute :
  - soit chimiothérapie : 2 cycles de BEP ;
  - soit évidemment ganglionnaire rétro-péritonéal sélectif avec risque d'éjaculation rétrograde, d'infertilité (cette option est quasiment abandonnée actuellement).

### Stade II : T<sub>x</sub> N<sub>1 à 3</sub> M<sub>0</sub>

#### ► Séminome

• Stade IIA : radiothérapie des aires ganglionnaires lombo-aortiques (25 Gy) , sauf si élément de mauvais pronostic.

• Stade IIB : radiothérapie des aires ganglionnaires (si ganglions < 3 cm) ou chimiothérapie par 3 cycles de BEP (ou 4 cycles d'EP).

• Stade IIC : chimiothérapie par 3 cycles de BEP (ou 4 cycles d'EP).

**CANCERS DU TESTICULE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	DOSES /m <sup>2</sup>	VOIE D'ADMINIS-TRATION	ADMINIS-TRATION RYTHME
PVeB	<b>Cisplatine</b>	120 mg	IV 4 h	J1
	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Bléomycine</b>	50 mg	IV ou IM	J1 et J8 J1 = J21
BEP	<b>Bléomycine</b>	30 mg	IV	J1, J8, J15
	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	J1 à J5 J1 = J21
EP	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	J1 à J5 J1 = J21
VIP Protocole fortement toxique, notamment hématologique	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV	
	<b>Ifosfamide</b>	1,5 g	IV 3 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	
	<b>Mesna</b>	1,5 g	IV	J1 = J21

## CANCERS DU TESTICULE (2)

► *Tumeurs germinales non séminomateuses*  
 Traitement médical par chimiothérapie  
 + traitement de la maladie résiduelle.

• Tumeurs germinales de bon pronostic :  
 3 cycles de BEP ou 4 cycles d'EP :

- respecter doses et intervalles entre les cycles ;
- ne pas différer même si toxicité hématologique ;
- ne pas substituer le **cisplatine** par du **carboplatine** ;
- surveillance du risque de fibrose pulmonaire, syndrome de Raynaud.

• Tumeurs germinales de pronostic intermédiaire : 4 cycles de BEP.

• Tumeurs germinales de mauvais pronostic : 4 cycles de BEP ou proposition d'un schéma intensifié en cas de décroissance défavorable des marqueurs tumoraux à l'issue du 1<sup>er</sup> cycle.

• Traitement de la maladie résiduelle :  
 – séminome : TEP-scan si masses résiduelles (surtout si > 3 cm). En cas de fixation pathologique : évidement ganglionnaire rétropéritonéal ;  
 – tumeurs germinales non séminomateuses : exérèse des masses résiduelles > 1 cm. En fonction des résultats de l'ana-

lyse anatomopathologique, si persistance de cellules tumorales actives : avis spécialisé pour la poursuite d'une chimiothérapie contenant en général de l'**ifosfamide** (type VIP) pour 1 à 2 cycles.

**Stade III : T<sub>x</sub> N<sub>x</sub> M<sub>1</sub>, soit d'emblée, soit en reprise évolutive**

• Chimiothérapie : adaptée aux chimiothérapies antérieurement reçues :

– soit à base de platine, type BEP, dont le nombre de cycles est à adapter en fonction de la classification pronostique. Proposition d'un schéma intensifié en cas de décroissance défavorable des marqueurs tumoraux à l'issue du 1<sup>er</sup> cycle pour les formes de mauvais pronostic ;

– soit en association **platine-ifosfamide**, type VIP en cas de rechute de bon pronostic.

Une rechute de mauvais pronostic peut faire discuter une intensification de chimiothérapie dans le cadre de protocoles prospectifs.

• Chirurgie des masses résiduelles si normalisation des marqueurs, avec résidus macroscopiques, quel que soit le siège, doit faire discuter l'éradication chirurgicale.

### CONSENSUS

[1] Cancers urologiques : démarche diagnostique, traitement et suivi , *InCa et AFU*, 2012

## LEUCÉMIES AIGÜES (LA) (1)

### Mesures générales

- Pathologie grave justifiant une prise en charge spécialisée, éventuellement en réanimation et en urgence [1].
- Groupage HLA du patient et de sa fratrie chez les patients jeunes et/ou éligibles à l'allogreffe.
- Les chimiothérapies utilisées entraînant des aplasies profondes durant 3-4 sem. nécessitent des mesures anti-infectieuses et transfusionnelles systématiques.

### Mesures anti-infectieuses

#### En préventif

- Isolation septique : chambre seule, éventuellement chambres à flux laminaire et pression positive, lavage des mains, surblouse, port de masque et gants par le personnel soignant, limitation des visites.
- Antisepsie des portes d'entrées muqueuses et cutanée (bains de bouche systématiques et pluriquotidiens de bicarbonates).
- Traitement antifongique (**posaconazole**, **NOXAFIL**) et **anti-herpétique** systématique.

#### En curatif

Dès le 1<sup>er</sup> épisode fébrile et en urgence, début d'une antibiothérapie à large spectre couvrant les germes Gram+ et Gram- :

- en absence de documentation bactériologique : poursuite jusqu'à la sortie d'aplasie ;
- en cas de documentation : adaptation de la durée et du type d'antibiotiques.

### Mesures transfusionnelles

- Plaquettes : maintien du chiffre  $> 20\,000/\text{mm}^3$  et  $> 50\,000/\text{mm}^3$  en cas de geste hémorragique ou autre facteurs

modifiant l'hémostase. Transfusion de concentrés de plaquettes d'aphérèse irradiés.

- Hémoglobine : maintien du chiffre  $> 8\text{ g/dL}$  ou  $> 10\text{ g/dL}$  en cas de terrain cardiovasculaire. Transfusion de culots globulaires phénotypés et irradiés.

### LA myéloblastiques (LAM)

Les décisions thérapeutiques reposent sur l'âge du patient et la cytogénétique.

#### Sujet jeune

- Chimiothérapie d'induction selon le schéma classique 3+7: association de **cytarabine (ARACYTINE)** 200 mg/m<sup>2</sup>/j pendant 7 j et **anthracycline (idarubicine 12 mg/m<sup>2</sup>/j ou daunorubicine 90 mg/m<sup>2</sup>/j)** à fortes doses pendant 3 j. Elle permet l'obtention d'une rémission complète dans 60 à 80 % des cas.
- Chimiothérapie de consolidation : 3 cycles d'**ARACYTINE** à forte dose suivie d'une allogreffe. Plus rarement, selon la cytogénétique, l'indication d'une autogreffe est possible.

#### Sujet âgé

- Chimiothérapie d'induction : **cytarabine (ARACYTINE)** associée, si l'état général le permet, à une **anthracycline** à doses faibles (ex : **daunorubicine 50 mg/m<sup>2</sup>**).
- Chimiothérapie de consolidation : 3 cycles d'**ARACYTINE** à faibles doses suivie soit d'une allogreffe à conditionnement réduit, soit d'une chimiothérapie de maintenance comprenant **cytarabine** et **anthracycline** à doses réduites et alternées.
- En cas de LAM dites pauciblastiques (20-30 % de blastes médullaires), un traitement par agent déméthylant (**décitabine**) peut être discuté.

## LEUCÉMIES AIGÜES - PROTOCOLES D'INDUCTION (1)

## Protocole LAP

## ■ Trétinoïne

ATRA VESANOÏD				
45 mg/m <sup>2</sup> /j en 2 prises pendant les repas, 30 à 90 j selon la rémission complète	100 caps. 10 mg	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Métabolite endogène de la vitamine A (classe des **rétinoïdes**). La **trétinoïne** pourrait modifier l'action d'un récepteur nucléaire à l'acide rétinolique (RAR). Elle induirait une différenciation des cellules et une inhibition de la prolifération dans les lignées hématopoïétiques transformées, notamment au cours de la leucémie aiguë promyélocytaire où le récepteur alpha de l'acide rétinolique est fusionné avec une protéine appelée PML.

## INDICATIONS

Leucémie aiguë promyélocytaire.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, allergie aux **rétinoïdes**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Syndrome d'hypervitaminose A. Syndrome d'activation leucocytaire (hyperleucocytose, fièvre, dyspnée, œdèmes et épanchements séreux, hypotension et insuffisance hépatorenale, infiltrats pulmonaires), justifiant corticothérapie et admission en réanimation si nécessaire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les **tétracyclines** (risque d'hypertension intracrânienne) et les **progestatifs**.

## Protocole LAM

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES /m <sup>2</sup> /j	ADMINISTRATION RYTHME
7 + 3	<b>Cytarabine</b>	Perfusion continue	100 à 200 mg	J1 à J7
	<b>Doxorubicine</b> ou	Bolus IV	30 mg	J1 à J3
	<b>daunorubicine</b>	Bolus IV	13 mg	
	<b>Cytarabine</b>	En 3 h, matin et soir (à 12 h d'intervalle)	3 000 mg x 2	J1 à J3

## LEUCÉMIES AIGÜES (LA) (2)

### LA lymphoblastiques (LAL)

Le traitement repose sur :

- l'utilisation séquentielle et alternée d'**ONCOVIN** à 1 mg/m<sup>2</sup>, **ENDOXAN** 300 à 600 mg/m<sup>2</sup> et **asparaginase** ;
- la réalisation, après obtention de la réponse initiale, d'une seconde séquence de chimiothérapie à forte dose dite induction retardée ;
- une chimioprophylaxie neuroméningée par **méthotrexate** intrathécal ;
- l'utilisation d'**inhibiteurs de tyrosine-kinase (imatinib)** pour les LAL avec chromosome Philadelphie ;
- la réalisation d'une allogreffe dans la majorité des cas, notamment LAL avec chromosome Philadelphie.

### Forme particulière des LAM

#### Leucémie à promyélocytes (LAP)

La chimiothérapie d'induction (type 3+7) doit être associée systématiquement à l'acide tout-trans rétinoïque (**ATRA VESANOÏD**)

45 mg/m<sup>2</sup>/j. Celui-ci est poursuivi tout au long de la consolidation et en entretien.

Les LAP sont systématiquement accompagnées d'un syndrome de coagulation intravasculaire disséminé biologique pouvant se traduire par des symptômes cliniques.

La prise en charge de la CIVD doit être précoce. Les plaquettes doivent être maintenues > 50 000/mm<sup>3</sup> pendant la durée de la coagulopathie. Les transfusions de PFC et l'administration d'héparine se font au cas par cas.

L'administration de l'**ATRA VESANOÏD** peut s'accompagner d'un syndrome de différenciation ou ATRA syndrome (hyperleucocytose, dyspnée avec infiltrats pulmonaires, épanchements pleuraux, insuffisance rénale). La prévention et le traitement repose sur l'administration précoce de **corticoïdes** à forte dose (**dexaméthasone** 10 mg x 2/j) dès l'hyperleucocytose (GB > 10 000/mm<sup>3</sup>) et/ou l'arrêt de l'**ATRA** selon la réponse aux **corticoïdes**.

### CONSENSUS

[1] Leucémies aiguës de l'adulte, HAS, 2011



## LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE (LLC) (1)

La leucémie lymphoïde est encore incurable. Cependant, de nombreuses nouvelles molécules sont actuellement développées et l'inclusion dans des essais thérapeutiques doit être proposée aux patients chaque fois que possible. Les stratégies thérapeutiques sont en mise à jour permanente, justifiant une prise de décision thérapeutique par des équipes spécialisées lors des *Réunions de concertation pluridisciplinaire* (RCP).

### Évaluation préalable - éléments décisionnels [1]

- Classification de Binet : définit 3 groupes pronostiques selon le nombre de territoires ganglionnaires atteints et des cytopénies (anémie et thrombopénie):

- Stade A : atteinte < 3 territoires, Hb > 10 g/dL, plaquettes > 100 000/mm<sup>3</sup>
- Stade B : atteinte ≥ 3 territoires, Hb < 10 g/dL, plaquettes > 100 000/mm<sup>3</sup>
- Stade C : quelle que soit l'atteinte ganglionnaire, Hb < 10 g/dL et/ou plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup>

- Facteur pronostique thérapeutique : le caryotype en FISH
  - del 17p : présage une résistance primaire à la **fludarabine** ;
  - del 11q : présage une résistance aux **alkylants**.
- Autres facteurs pronostiques :
  - expression de ZAP 70 et CD38 ;

- statut mutationnel de IgH (statut non muté de mauvais pronostic) ;
- temps de doublement des lymphocytes (si chiffre > 30 000/mm<sup>3</sup>) < 6 mois.

### Moyens thérapeutiques

#### ► Chimiothérapie

Parmi les **alkylants**, le **chlorambucil** est le plus employé, du moins en monochimiothérapie. Néanmoins, la **bendamustine** a récemment montré une efficacité significativement supérieure.

La **fludarabine** est l'**analogue des purines** le plus couramment utilisé. Elle semble supérieure en termes d'efficacité au **chlorambucil**.

Le **cyclophosphamide** est utilisé en association à la **fludarabine** (FC) ou à la **doxorubicine**, **vincristine** et aux **corticoïdes** (CHOP).

#### ► « Immunothérapie » par des anticorps monoclonaux

- **Alemtuzumab** (**CAMPATH**), anticorps monoclonal anti CD52 particulièrement indiqué dans les LLC del(17p).
- **Rituximab**.

#### ► Radiothérapie

D'une grosse rate ou de masses ganglionnaires massives résistantes à la chimiothérapie.

#### ► Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Indications protocolaires. À proposer notamment aux LLC del(17p), ou aux rechutes précoces, particulièrement de mauvais pronostic.

**LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE (LLC) (2)****Indications thérapeutiques de 1<sup>re</sup> ligne**

- Stade A : abstention thérapeutique.
- Stades B et C, éventuellement stade A avec del(17p) et/ou signes d'évolutivité de la maladie notamment par le temps de doublement lymphocytaire : indication d'un traitement spécifique à établir selon l'âge du patient et le caryotype.

**► Polychimiothérapie (R-FC, R-CHOP)**

L'association de **cyclophosphamide** et **fludarabine** en combinaison avec **rituximab** (R-FC) est le traitement de référence en 1<sup>re</sup> ligne chez le sujet jeune, stade B.

Elle peut être proposée, à doses adaptées, chez les sujets > 70 ans en bon état général (scores gériatriques).

La combinaison R-bendamustine pourrait être proposée en 1<sup>re</sup> ligne chez des patients non éligibles au R-FC ou en rechute.

La combinaison R-CHOP est à proposer en cas de contre-indication à la **fludarabine** chez les sujets jeunes et la combinaison R-mini-CHOP peut être proposée chez les sujets âgés stade C en bon état général.

**► Monochimiothérapie**

Elle est indiquée chez les sujets âgés, ayant un état général ne permettant pas la polychimiothérapie. Elle repose sur le

**chlorambucil** par voie orale en cure continue ou discontinue ± associée aux **corticoides** ou sur les **analogues des purines** dont la **fludarabine**.

**► LLC del 17p**

Les patients présentant une del(17p) doivent recevoir un traitement comportant du **CAMPATH** en 1<sup>re</sup> ligne (ATU nominative avec AMM) et une intensification thérapeutique (allogreffe de cellules souches hématopoïétiques) doit être discutée.

**► Radiothérapie splénique**

Il s'agit d'un traitement palliatif en cas d'hypersplénisme, à faible dose journalière (20 à 25 Gy).

**Traitements associés****► Anémie hémolytique auto-immune**

Concerne 2 % des stades A et 10 % des stades B et C. Elle peut survenir en cours de traitement par **fludarabine**. Elle est traitée selon les protocoles de corticothérapie classiques des autres AHAI.

**► Hypogammaglobulinémie**

Elle concerne la quasi-totalité de patients et est source d'une immunosuppression sévère, responsable de la 1<sup>re</sup> cause de mortalité au cours de la LLC.

Indication à une substitution par Ig IV 0,4 g/kg mensuelle.

**CONSENSUS**

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (1) – GÉNÉRALITÉS

### Préalables au traitement

#### Anatomie pathologique [1]

La biopsie ganglionnaire ou d'une masse tumorale est indispensable au diagnostic.

Elle conduit à l'identification anatomopathologique selon une classification internationalement reconnue par l'OMS/REAL (*Revised European-American classification of Lymphoid neoplasm*).

### Classification schématique des lymphomes non hodgkiniens (liste non exhaustive)

Lymphomes B d'évolution agressive	Lymphomes B d'évolution indolente	Lymphomes T
Lymphome diffus à grandes cellules	Lymphome folliculaire	Lymphome nasal NK/T
Lymphome B du médiastin	Lymphome lymphocytaire (cf. LLC)	Lymphome angio-immunoblastique
Lymphome de Burkitt	Lymphome du MALT	Lymphome T associé aux entéropathies
Lymphome du manteau*	Lymphome de la zone marginale splénique	Lymphome T hépatosplénique
Lymphome lymphoblastique	Lymphome de la zone marginale ganglionnaire	Lymphome anaplasique T
	Lymphome lymphoplasmocytaire (cf. Waldenström)	Leucémie/lymphome T de l'adulte (HTLV1)

#### Stade d'extension selon Ann Arbor

- Évaluation de l'extension de la maladie selon le nombre de territoires ganglionnaires ou extraganglionnaires envahis (examen clinique, TDM ± PET-TDM, BOM et selon la localisation : ponction lombaire, endoscopie digestive, examen ORL, etc.).

- Stade I : un territoire ganglionnaire ou viscéral (IE) envahi.
- Stade II : plusieurs territoires ganglionnaires d'un seul côté du diaphragme ou un territoire ganglionnaire associé à une atteinte extraganglionnaire contiguë.
- Stade III : territoires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme, avec ou sans atteinte splénique.
- Stade IV : territoires extraganglionnaires ou territoire ganglionnaire associé à une atteinte extraganglionnaire non contiguë.

- Schéma daté des « cibles » tumorales permettant le suivi.

#### Signes généraux : A (absents), B (présents)

- Fièvre, sueurs profuses, amaigrissement > 10 %.

#### Signes biologiques : a (absents), b (présents)

- VS, CRP.

#### Scores pronostiques

- Adaptés à chaque type de lymphome.

#### Préparation

- Consultation d'annonce.
- Pose d'une voie d'abord centrale selon le type de traitement.
- Préservation de la fertilité selon le patient et le traitement.

### CONSENSUS

[1] Lymphomes non hodgkiniens de l'adulte, HAS, 2012

\* Évolution indolente/agressive

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE FAIBLE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE

### Protocole CVP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Vincristine</b>	IV	1,4	J1
<b>Cyclophosphamide</b>	PO	500	J1 à J5
<b>Prednisolone</b>	PO	40	J1 à J5
Reprise J21			

### Protocole R-CVP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375	J1
<b>Vincristine</b>	IV	1,4	J1 à J5
<b>Cyclophosphamide</b>	PO	500	J1
<b>Prednisolone</b>	PO	40	J1 à J5
Reprise J21			

### Protocole CEC

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Lomustine</b> (CCNU)	Orale	80	J1
<b>Étoposide</b> (VP 16)	Orale	100	J1-J5
<b>Chlorambucil</b> (CLB)	Orale	10	

#### SURVEILLANCE

Toxicité immédiate minime et différée (hémogramme).

Efficacité après 4 cycles de chimiothérapie : si elle est insuffisante, changer de protocole.

#### COMPLICATIONS

Acutisation : transformation en LNH de grande malignité.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (2) – LYMPHOME FOLLICULAIRE

Le **lymphome folliculaire** est le plus fréquent des lymphomes dits d'évolution indolente.

### Éléments décisionnels

#### Stade Ann Arbor

Cf. *supra*.

#### Score pronostique : FLIPI (*Follicular International Prognostic Index*)

Attribue 1 point par facteur : risque bas (0-1), intermédiaire (2), élevé (3-5).

- Âge > 60 ans.
- Stade Ann Arbor > III/IV.
- Hb < 12 g/dL.
- LDH > 1N.
- Nombre de territoires ganglionnaires atteints > 4.

#### Critères de forte masse tumorale du GELF (1 seul critère suffit)

- LDH > 1N.
- Bêta-2-microglobuline > 3 mg/L.
- Indice de performance PS > 2.
- Présence de signes généraux « B ».
- Masse tumorale bulky (> 7 cm) ou plus de 3 adénopathies > 3 cm.
- Épanchements séreux.
- Syndrome compressif.
- Splénomégalie symptomatique.

### Indications thérapeutiques

Les décisions thérapeutiques sont prises par des équipes spécialisées en réunion de concertation pluridisciplinaires (RCP).

L'élément décisionnel est le critère de forte masse tumorale.

#### Faible masse tumorale

- Standard : abstention thérapeutique.
- La radiothérapie localisée peut être proposée aux atteintes localisées.
- Le **rituximab** seul ne semble pas apporter de bénéfices par rapport à l'abstention thérapeutique.

#### Forte masse tumorale

- Association **rituximab**-polychimiothérapie 6 à 8 cycles : plusieurs protocoles possibles dont R-CVP, R-CHOP.
- L'autogreffe en 1<sup>re</sup> ligne peut être discutée pour un faible nombre de patients éligibles.

#### Rechutes

- À confirmer par une nouvelle biopsie.
- Reprendre le bilan préthérapeutique avec évaluation de la masse tumorale.
- Les rechutes avec forte masse tumorale peuvent bénéficier de l'autogreffe (< 65 ans) voire d'une allogreffe si rechute précoce (< 12 mois).

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (1)

### Protocole CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cyclophosphamide</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>		50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	J1-J7

### Protocole R-CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Cyclophosphamide</b>	IV	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	de J1 à J7

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (3) – LYMPHOMES B DIFFUS À GRANDES CELLULES

Le **lymphome B diffus à grandes cellules** est le plus fréquent des lymphomes dits agressifs.

Le traitement des lymphomes agressifs nécessite une décision collégiale préalable en RCP dédiée.

### Éléments décisionnels

#### Stade Ann Arbor

Cf. *supra*.

#### Score pronostique : IPI (*International Prognostic Index* - révisé)

Il attribue 1 point par critère : risque bas (0), intermédiaire (1-2), haut (3-5).

- Âge > 60 ans.
- Nombre d'atteintes extraganglionnaires > 1.
- LDH > 1N.
- PS > 2.
- Stade Ann Arbor > III/IV.

#### Sous type : GC (centre germinatif) versus non GC

La distinction se fait selon le profil d'expression génique de la tumeur déterminant l'origine du lymphocyte B tumoral provenant du centre germinatif ou autre. Cette information nécessite une technique longue et non compatible avec le délai d'initiation du traitement à ce jour. Elle sera néanmoins utile dans la décision thérapeutique dans l'avenir et est demandée dans la plupart des protocoles de recherche clinique.

### Indications thérapeutiques

- *Sujets d'âge < 60 ans*
- Chimiothérapie :
  - R-CHOP (cycles tous les 21 j) : 6 à 8 cycles selon le stade Ann Arbor et l'IPI ;
  - R-ACVBP : alternative plus intense au R-CHOP pour les stades III/IV et/ou IPI haut. Elle aurait aussi un bénéfice dans les sous types « non GC ».
  - Autogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> ligne pour les stades III/IV et/ou IPI haut et chimio-

sensibles, (généralement protocole R-ACVBP + **méthotrexate** haute dose + autogreffe).

- Radiothérapie : surtout indiquée en IFRT (*Involved Field Radiotherapy*) pour les masses tumorales localisées et surtout bulky. Pas de bénéfice démontré dans les autres cas.

L'évaluation par PET-TDM en cours de traitement permet un ajustement thérapeutique dans les protocoles.

- *Sujets d'âge > 60 ans*
- R-CHOP (tous les 21 j) x 8 cycles.
- Âge > 80 ans : R-mini-CHOP (moitié dose).
- Adaptation de l'utilisation de l'**anthracycline** à la fonction cardiaque.

- *Rechutes*
- Chimiothérapie de rattrapage à base de **sels de platine** (ex : R-DHAP, R-ICE).
- Autogreffe : indication systématique après obtention d'une réponse post-chimiothérapie de rattrapage.
- Allogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> rechute pour les rechutes à haut risque (stade diffus, IPI haut, précoces).

#### ► *Cas particulier des lymphomes indolents transformés*

Le pronostic est réservé.

Le traitement doit prendre en compte le passé thérapeutique (notamment l'utilisation d'**anthracyclines**).

Les chimiothérapies de type « Lymphome diffus à grandes cellules » s'appliquent. Ici l'autogreffe en 1<sup>re</sup> ligne doit être proposée.

- *Prophylaxie neuroméningée*
- Systématique en cas d'atteinte ophtalmique, ORL, épidurale, extraganglionnaire particulière (testicules, sein, surrénales, rein), stades III/IV (notamment BOM+), IPI haut (notamment LDH élevées).
- Repose sur l'injection intrathécale de **méthotrexate** ± **cytarabine** à chaque cycle de R-CHOP (max 3 inj.) ou cycle de chimiothérapie complémentaire par **méthotrexate** haute dose IV.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (2)

### Protocole R-DHAP - Lymphomes du manteau

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (CYCLE DE 21 J)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Dexaméthasone</b>	40 mg	PO	J3, J4
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	2 000 mg/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1

### R-ICE – Lymphome B diffus à grandes cellules

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (J1 = J14)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Isofosfamide</b>	5 g/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1 à J3
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1 à J3

### BEAM - Intensification - Autogreffe - Lymphomes

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	200 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Carmustine</b>	300 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-6
<b>Melphalan</b>	140 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-2

#### SURVEILLANCE

Toxicité immédiate (vomissements) ou différée (hémogramme, alopecie).

Efficacité après 2 séries de chimiothérapie : si insuffisante changer de protocole; éventuellement chimiothérapie intensive avec support de cellules souches sanguines.

#### COMPLICATIONS RETARDÉES

Deuxième cancer généralisé (leucémie aiguë myéloïde) ou localisé dans le territoire irradié.



## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (4) – LYMPHOME DU MANTEAU

Le **lymphome du manteau** se distingue par une présentation de type « indolent » ou « non agressive » mais un pronostic péjoratif justifiant des traitements agressifs.

Les traitements actuels sont en constante évolution et les patients doivent être inclus dans des protocoles thérapeutiques.

### Facteurs pronostiques : MIPI (*Mantel cell lymphoma International Prognostic Index*)

Attribue différents points sur l'âge, le PS, les LDH, les leucocytes. Score faible (0-3), intermédiaire (4-5), élevé (6-11). S'y ajoute le marquage Ki-67 évaluant l'index de prolifération des cellules en anatomopathologie.

Le MIPI n'est actuellement pas décisionnel.

### Modalités thérapeutiques

#### Âge < 65 ans ou « éligible à l'autogreffe »

La **cytarabine** à haute dose est la pierre angulaire du traitement actuel.

- Chimiothérapie d'induction alternant R-CHOP et R-DHAP (ou R-DHAox : **oxaliplatine** moins néphotoxique que **cisplatine**) x 6 cycles.

- Autogreffe : indication consensuelle en 1<sup>re</sup> ligne.

#### Âge > 65 ans ou « non éligible à l'autogreffe »

- Chimiothérapie: R-CHOP x 8 cycles ou R-bendamustine.

- Entretien par **rituximab**.

### Rechutes et cas réfractaires

Les traitements de rattrapage ne sont pas consensuels.

L'allogreffe doit être discutée selon les cas et réalisée dans des protocoles d'inclusion.

Différents agents ont montré leur efficacité : **lénalidomide**, **bortézomib**.

De nombreuses molécules et thérapeutiques ciblées sont en cours d'essai.

**LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (5) – LYMPHOMES T**

Les **lymphomes T** constituent une famille hétérogène de sous-types anatomopathologiques ayant leurs spécificités cliniques et pronostiques.

Les modalités thérapeutiques ne sont pas consensuelles à ce jour et les patients doivent être inclus dans des protocoles thérapeutiques et confiés à des équipes spécialisées.

À stade égal, le pronostic est plus péjoratif que celui des lymphomes B.

**Traitements et indications**

- **CHOP** : chimiothérapie de référence pour les LNH T périphériques (pas d'indication du **rituximab**).
- **CAMPATH** : associé aux polychimiothérapies, peut apporter un bénéfice mais au prix d'une toxicité accrue et de risques de réactivations virales (CMV, EBV).
- **Asparaginase** : traitement de référence dans le lymphome T nasal type NK/T, en association au **méthotrexate**.
- **Bortézomib** : efficacité constante mais à des niveaux variables selon le type de LNH T et en association à une polychimiothérapie type CHOP.
- Inhibiteurs HDAC, anticorps monoclonaux anti-CD30, **REVLIMID** : font partie des protocoles en cours d'évaluation.

## MALADIE DE HODGKIN (1)

### Préalables au traitement

#### Anatomopathologie

Biopsie ganglionnaire indispensable au diagnostic ; classement en deux groupes principaux : sclérose nodulaire plus favorable que cellularité mixte.

#### Stade d'extension

- La **TEP-TDM** est indispensable pour la stadification au diagnostic, sans pour autant remplacer la TDM.
- La TEP-TDM remplace la biopsie ostéo-médullaire pour l'évaluation de l'infiltration médullaire.
- La **classification de Ann Arbor** s'établit selon l'atteinte des territoires ganglionnaires et extraganglionnaires.

- Stade I : 1 territoire ganglionnaire envahi.
- Stade II : plusieurs territoires ganglionnaires d'un seul côté du diaphragme.
- Stade III : territoires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme
- Stade IV : atteinte extraganglionnaire (ex. moelle osseuse)

#### • Signes généraux : A (absents) ou B (présents)

Fièvre (38 °C plus d'une sem. sans autre cause), sueurs profuses, amaigrissement (10 %).

#### • Signes inflammatoires biologiques : a (absents) ou b (présents)

VS, fibrinogène.

#### Facteurs de risque pour les stades localisés sus-diaphragmatiques (I et II)

- Âge défavorable au-delà de 50 ans.
- Atteinte > 3 aires ganglionnaires.
- Vitesse de sédimentation > 30 si symptômes « B » ou > 50 si « A ».
- Forte masse tumorale : définie par une masse ganglionnaire > 10 cm ou un rapport masse médiastinale/diamètre thoracique

en regard de T5/T6 (radio thorax) ≥ 0,35.

#### Préparation

- Information du malade, consultation d'annonce.
- Voie d'abord centrale.
- Préservation de la fertilité (CECOS).
- Repérage précis des « cibles » tumorales sur schéma avec mesures, date, cosignature avec le radiothérapeute.

#### Traitement

##### Chirurgie

N'a pas d'autre place que diagnostique (biopsie sans curage ganglionnaire, sans excérèse de masse).

##### Radiothérapie

- Elle est réalisée en complément de la chimiothérapie et reste indispensable à tous les stades.
- Les champs d'irradiation larges sont abandonnés au profit de champs restreints déterminés par la PET-TDM : IFRT (*Involved Field Radiotherapy*), INRT (*Involved Node Radiotherapy*), STNI (*Subtotal Nodal Irradiation*) selon les équipes.

##### Chimiothérapie

- Seules deux associations ont prouvé leur efficacité :
  - ABVD : traitement de référence ;
  - BEACOPP renforcé : meilleure efficacité immédiate (réponse, survie sans progression) sans bénéfice sur la survie globale. Risque augmenté de toxicité immédiate (aplasie fébrile, cytopénies) et tardive (fertilité, cancers secondaires).
- Le choix repose sur le bénéfice attendu du contrôle immédiat de la maladie *versus* risques.
- La TEP-TDM précoce, après 2 cures, permettrait d'escalader ou de désescalader le traitement.

## MALADIE DE HODGKIN - CHIMIOTHÉRAPIE

## Protocole ABVD

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME
<b>Doxorubicine</b>	En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de soluté glucosé à 5 % l'un après l'autre, dans l'ordre, etc.	25 mg/m <sup>2</sup>	J1 et J15
<b>Bléomycine</b>		10 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Vinblastine</b>		6 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Dacarbazine</b>	En perfusion lente d'une heure dans soluté glucosé 250 mL	375 mg/m <sup>2</sup>	Reprise J28

## Protocole MOPP/ABV

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME
<b>Chlorméthine</b>	IV	6 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Vincristine</b>	Dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté glucosé à 5 %	1,4 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Doxorubicine</b>	IV	35 mg/m <sup>2</sup>	J8
<b>Bléomycine</b>	Dans la tubulure d'une perfusion de 500 mL de soluté glucosé à 5 %	10 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Vinblastine</b>		6 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Procarbazine</b>	Orale	100 mg/m <sup>2</sup>	J1 à J7
<b>Prednisone</b>	Orale	40 mg	J1 à J14
		Arrêt progressif dans les 48 h suivantes	

## SURVEILLANCE

- Toxicité immédiate (vomissements) et différée (hémogramme).
- Efficacité après deux cycles de chimiothérapie : si elle est insuffisante, changer de protocole.

## COMPLICATIONS RETARDÉES

- Deuxième cancer généralisé (rarement leucémie aiguë myéloïde) ou localisé dans le territoire irradié (sein chez les jeunes femmes irradiées).
- Rétrécissement vasculaire (infarctus du myocarde) en territoire irradié.

**MALADIE DE HODGKIN (2)****Indications en 1<sup>re</sup> ligne****Stades I et II sus-diaphragmatiques**► *Favorables (sans facteurs de risque)*

ABVD x 2 + IFTR 20 Gy.

► *Défavorables (avec facteurs de risque)*

- ABVD x 4 + IFRT 30 Gy

ou

- ABVD x 2 + BEACOPP-R x 2 + IFTR 20 Gy.

**Stades disséminés (III/IV et IIB avec forte masse tumorale)**

- ABVD x 6-8

ou

- BEACOPP-R x 6.

**Traitement de la rechute**► *Facteurs de risques à la rechute*

- Durée de la réponse < 12 mois.
- Stade III/IV à la rechute.
- Autres : rechute en territoire irradié, anémie, symptômes B.

► *Chimiothérapie de rattrapage*

Plusieurs associations ont montré des résultats comparables. Le choix repose sur la dose cumulée d'**anthracyclines** reçue, l'état général du patient.

► *Autogreffe*

- De préférence après obtention d'une réponse au moins partielle à la chimiothérapie de rattrapage.
- Conditionnement par BEAM.
- Double autogreffe voire auto puis allo-greffe en cas de rechute à haut risque (> 2 facteurs de risque).

## MYÉLOME MULTIPLE (1)

### Mesures générales

La prise en charge médicale justifie le transfert dans un service spécialisé en raison des choix thérapeutiques variables selon le tableau initial et des progrès récents qui ont amélioré la prise en charge mais ont aussi compliqué les décisions [1]. Le diagnostic de myélome multiple (MM) implique la présence de > 10 % de plasmocytes monoclonaux sur le myélogramme.

Le bilan préalable évalue l'atteinte osseuse, médullaire, l'hémogramme et la fonction rénale.

### Définition et éléments décisionnels

#### MM asymptomatique (*smoldering MM*)

- IgG ou IgA < 3g/dL
- ET
- Absence de symptômes **CRAB** : hypercalcémie - insuffisance rénale - anémie - atteinte osseuse.

#### MM symptomatique

- Quel que soit le taux d'Ig monoclonales.
- Présence de symptômes CRAB.

#### Classification de Salmon et Durie

Elle est historique et initialement d'intérêt pronostique selon l'évaluation de la masse tumorale. Ses critères s'apparentent à ceux du MM symptomatique vs non symptomatique.

#### Stade I à faible masse tumorale (< $0,6 \cdot 10^{12}$ cellules/m<sup>2</sup>) : avec tous ces critères

- Absence de lésions osseuses
- Hémoglobine > 10 g/dL
- Calcémie < 3 mmol/L
- Taux des Ig monoclonales si :
  - IgA < 30 g/L
  - IgG < 50 g/L
  - protéinurie de chaînes légères < 4 g/24 h

#### Stade II à masse tumorale intermédiaire ( $0,6$ à $1,2 \cdot 10^{12}$ cellules/m<sup>2</sup>)

Ne répond à la définition ni du stade I, ni du stade III

#### Stade III à forte masse tumorale (> $1,2 \cdot 10^{12}$ cellules/m<sup>2</sup>) : avec l'un de ces critères

- Lésions osseuses multiples (> 3)
- Hémoglobine < 8,5 g/dL
- Calcémie > 3 mmol/L
- Taux des Ig monoclonales si :
  - IgA > 50 g/L
  - IgG > 70 g/L
  - protéinurie de chaînes légères > 12 g/24 h

Selon qu'il y ait une insuffisance rénale ou pas : A (créatininémie < 180 µmol/L) ou B (créatininémie ≥ 180 µmol/L).

### Facteurs pronostiques

Ils ont pas ou peu de caractère décisionnel, mais peuvent influencer le suivi ultérieur est certains choix thérapeutiques

#### Score pronostique international (ISS)

- Stade I :  $\beta_2$ -microglobuline < 3,5 mg/L et albumine ≥ 35 g/L.
- Stade III :  $\beta_2$ -microglobuline ≥ 5,5 mg/L.
- Stade II : ni I ni III.

### Cytogénétique

del(17p), t(4;14), del(13), anomalies du 11q.

## MYÉLOME MULTIPLE - CHIMIOTHÉRAPIE

### Protocole VTD - Myélome du sujet jeune

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Bortézomib (VELCADE)</b>	1,3 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1, J4, J8, J11
<b>Thalidomide</b>	100 mg dose totale	PO	Continu
<b>Dexaméthasone</b>	40 mg dose totale	PO	J1, J8, J11, J21

### Protocole MP/Thalidomide - Myélome du sujet âgé

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Melphalan</b>	0,18-0,2 mg/kg	PO	J1-J4
<b>Thalidomide</b>	100 mg dose totale	PO	Continu
<b>Prednisone</b>	2 mg/kg	PO	J1-J4

### Protocole REVLIMID/Dexaméthasone - Myélome

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Lénalidomide (REVLIMID)</b>	25 mg dose totale	PO	J1-J21
<b>Dexaméthasone</b>	20 mg dose totale	PO	J1, J8, J11, J21

## MYÉLOME MULTIPLE (2)

### Traitement spécifique

#### Chimiothérapie

► *MM asymptomatique (stade I de Salmon et Durie) : abstention thérapeutique*

Il faut rechercher certains facteurs de risque (FDR) de progression vers un MM symptomatique :

- atteinte multifocale osseuse à l'IRM osseuse (rachis + pelvis) ;
- chaînes légères libres sériques : ratio kappa/lambda < 0,26 ou > 1,65 ;
- hypogammaglobulinémie ou diminution des autres classes d'Ig.

La surveillance standard se fait tous les 2-3 mois la 1<sup>re</sup> année, tous les 4-6 mois la 2<sup>e</sup> année puis tous les 6-12 mois en absence d'évènement intercurrent. Elle peut être plus rapprochée en cas de FDR. L'initiation d'un traitement peut néanmoins être proposée dans le cadre de protocoles de recherche en cas de FDR. Les études actuelles (association **lénalidomide - dexaméthasone - carfilzomib**) suggèrent un ralentissement de la progression vers un MM symptomatique, mais le bénéfice sur la survie à long terme et la qualité de vie, et l'absence de résistance aux chimiothérapies ultérieures restent à prouver.

► *MM symptomatique (stade II ou III de Salmon et Durie)*

• Sujet jeunes (< 65 ans) en 1<sup>re</sup> ligne, réalisation d'une séquence consensuelle :

- association **bortézomib (VELCADE) + thalidomide + dexaméthasone (VTD)** 2 à 3 cycles ;
- mobilisation de cellules souches périphériques (CSP) par **cyclophosphamide** et recueil de CSP ;
- autogreffe de CSP conditionnée par **melfalhan** 200 mg/m<sup>2</sup> ;
- consolidation par 2 nouvelles cures de VTD.

• Sujets âgés (> 65 ans) en 1<sup>re</sup> ligne :  
– **melfalhan** + **prednisone** associés soit au **thalidomide** (voie orale) soit au **bortézomib** (voie IV ou SC) ;

– l'association **REVLIMID** + dexaméthasone pourrait être une alternative.

• Les nouveaux **antiangiogéniques (pomalidomide)** et **inhibiteurs du protéasome (carfilzomib)** ainsi que la **bendamustine** peuvent être proposés en ATU de cohorte lors des rechutes ultérieures, résistantes aux traitements classiques.

### Traitement de l'atteinte osseuse

#### Biphosphonates

Recommandés en 1<sup>re</sup> ligne de traitement de tout MM actif, avec ou sans atteinte osseuse documentée.

• L'**acide zolédronique** est le seul à avoir montré un bénéfice sur la diminution de la survenue d'évènement osseux, l'amélioration des douleurs, l'amélioration de la survie sans progression et la survie globale. Il aurait aussi un effet direct antitumoral.

• Il doit être poursuivi jusqu'à obtention d'une rémission complète ou très bonne réponse partielle, sinon minimum 24 mois ou jusqu'à la progression.

• Il faut s'assurer de l'absence d'anomalies dentaires (infections, caries, intervention récente), d'hypocalcémie et éviter d'associer des néphrotoxiques.

#### Kyphoplastie

Doit être proposée en cas de fracture/compression vertébrale. Améliore les douleurs, la qualité de vie à long terme et la stature.

#### Radiothérapie

• Il s'agit d'un traitement palliatif à visée antalgique sur des douleurs non contrôlables ou sur des masses compressives ou importantes.

• Irradiation de préférence concentrée et courte (8-10 Gy en 1 séance).

#### Chirurgie

En concertation avec l'équipe orthopédique, sur des fractures des os longs essentiellement.



## MYÉLOME MULTIPLE (3)

### Traitements symptomatiques

#### Traitement de la douleur

Primordial d'emblée et tout au long de la maladie. La kyphoplastie et la radiothérapie ont montré leur bénéfice quand indiquées. Les douleurs diffuses peuvent bénéficier d'un traitement antalgique oral, généralement par **morphiniques** (cf. Douleurs).

#### Traitement des infections

Risque élevé car déficit de l'immunité humorale. Les atteintes respiratoires sont favorisées par les lésions osseuses des

côtes. Préférer les antibiotiques visant les germes encapsulés et à tropisme pulmonaire et non néphrotoxiques.

#### Traitement de l'anémie

Transfusions ponctuelles si l'hémoglobine est  $< 8$  g/dL ; préférer les transfusions phénotypées et déleucocytées pour retarder les réactions d'allo-immunisation anti-érythrocytaires et anti-HLA qui risquent d'apparaître à terme. L'utilisation de l'**érythropoïétine** peut se justifier dans les conditions de l'AMM.

#### Traitement de l'hypercalcémie

Initial et symptomatique (cf. Encadré).

#### Hypercalcémie

- Hydratation salée isotonique de 2 à 3 L/24 h et obtention d'une diurèse équivalente après correction de la déshydratation.
- **Pamidronate de sodium**, 60 à 90 mg en 2 à 4 h en perf. salée de 500 mL, renouvelable après 3<sup>e</sup> jour si réponse partielle, ou **acide clodronique**, **CLASTOBAN**, 300 mg en perf. salée de 500 mL, 3 à 5 j de suite, ou **acide zolédronique**, **ZOMETA**, 4 mg en perf. de 15 min.
- **Corticoïdes** à fortes doses (120 mg/j).
- Surveillance : fonction rénale, ionogramme, calcémie, poids et diurèse.

### CONSENSUS

[1] Myélome multiple, HAS, 2010

## OSTÉOSARCOME

L'enjeu est curatif même au stade métastatique.

La prise en charge se fait par équipe spécialisée pour éviter la perte de chance vitale et/ou fonctionnelle.

### Traitement des formes localisées

- Biopsie faite par chirurgien devant assurer le geste chirurgical curatif.
- Diagnostic par anatomopathologiste spécialisé.

### Chimiothérapie première pour prévention des micrométastases

- **Méthotrexate (MTX)** à fortes doses (3 cures hebdomadaires) + **doxorubicine**.

– **MTX** : 12 g/m<sup>2</sup> pour enfant, 8 g/m<sup>2</sup> pour adolescent.

– Associé à antidote à partir de la 24<sup>e</sup> h (**LEDERFOLINE**).

– Suivi de la concentration sérique du **MTX** pour surveillance de la toxicité et recherche d'efficacité.

– Risque iatrogène mortel +++ → uniquement en unité spécialisée.

– 3 cycles.

– Suivi clinique, radiologique (radio standard, TDM, IRM) pour adaptation du protocole si inefficacité du traitement.

- Ou protocole à base de **cisplatine**, **ifosfamide** et **doxorubicine** si adulte ou échec 1<sup>re</sup> ligne **MTX** à fortes doses.

Pas de protocole de référence. Inclusion dans protocoles prospectifs.

### Chirurgie

- Elle doit avoir lieu dans les 21 j suivant la fin de la chimiothérapie préopératoire.

- Plutôt conservatrice qu'amputation.

- Elle doit comprendre :

– résection de la cicatrice de biopsie ;

– exérèse de la tumeur en bloc sans l'ouvrir ;

– limites larges ;

– reconstruction pour la fonction.

- Elle permet l'analyse anatomopathologique de la tumeur pour analyser le pourcentage de cellules viables de la pièce opératoire. Elle précise l'efficacité de la chimiothérapie préopératoire qui conditionne la poursuite thérapeutique.

### Chimiothérapie postopératoire

- Protocole identique à la phase préopératoire si la pièce opératoire est classée en bonne réponse, pour 3 cycles supplémentaires.

- Modification de protocole préopératoire si la pièce opératoire est classée en mauvaise réponse. Pas de protocole standard.

- Inclusion dans protocoles prospectifs.

### Traitements des formes métastatiques

- **Chimiothérapie première** : protocoles identiques à la forme localisée.

- **Chirurgie** : doit se discuter si efficacité de la chimiothérapie sur la tumeur primitive aussi bien que sur les métastases.

## SARCOME DES TISSUS MOUS DE L'ADULTE

### Traitement des tumeurs primitives sans métastases

L'enjeu est curatif :

- préservation de la fonction ;
- tumeur rare justifiant la prise en charge par une équipe spécialisée et une décision pluridisciplinaire ;
- diagnostic et grading pronostique apportés par anatomopathologiste spécialisé.

#### Tumeur primitive opérable d'emblée

##### ► Chirurgie

- Chirurgie large conservatrice :
  - exérèse de la tumeur en bloc, sans l'ouvrir, sans être vue pendant la dissection ;
  - exclusive uniquement si tumeur superficielle ou profonde de faible grade de malignité ;
  - ou associée à une radiothérapie.
- Résection compartimentale ou amputation ou désarticulation si chirurgie exclusive.

##### ► Radiothérapie

- Pour améliorer le contrôle local et la préservation fonctionnelle.
- Radiothérapie externe de 50 Gy + 10 Gy sur volume réduit si résidu microscopique.
- Curiethérapie non validée.

##### ► Chimiothérapie adjuvante

- Discuter au cas par cas de l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante en RCP.

- Protocoles contenant de la **doxorubicine** mais pas de protocoles de référence : seule ou associée.

- À considérer pour les sarcomes des tissus mous de grade élevé de malignité. À discuter pour les tumeurs de grade intermédiaire en fonction de la taille de la tumeur, de l'envahissement en profondeur, de la qualité de l'exérèse.

#### Tumeur primitive non opérable d'emblée

##### ► Traitement premier

- Chimiothérapie néoadjuvante par le protocole de référence, polychimiothérapie contenant de la **doxorubicine**, ou
- Radiothérapie préopératoire.
- Suivie d'une chirurgie fonctionnelle ± radiothérapie.

##### ► Amputation ou désarticulation

Perfusion isolée de membre avec TNF, **melphalan** et hyperthermie (centres spécialisés).

### Traitements des formes métastatiques

- Enjeu : palliatif. Peut être curatif pour certaines formes pulmonaires.
- Monochimiothérapie par **doxorubicine**.
- Polychimiothérapie de type MAID si enjeu curatif comprenant une association chirurgicale sur les sites tumoraux.
- Inclusion recommandée dans des essais thérapeutiques.

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (1)

Les quatre syndromes myéloprolifératifs - la leucémie myéloïde chronique, la polyglobulie de Vaquez, la thrombocythémie, la splénomégalie myéloïde - ne posent pas des problèmes identiques même s'ils partagent un même mécanisme de prolifération (de l'une des lignées myéloïdes).

### Leucémie myéloïde chronique (LMC)

La LMC est associée à la translocation (9;22) constituant le chromosome Phila-

delphie (Ph) et aboutissant à l'activité anormale de la tyrosine-kinase Bcr-Abl.

Les avancées thérapeutiques reposent sur la découverte de traitements ciblant l'activité tyrosine-kinase et ayant bouleversé le pronostic de cette maladie.

### Préalables au traitement

► *Stade de la maladie*

### Stades évolutifs de la LMC

Phase chronique	Phase accélérée	Phase blastique
Absence d'argument pour la phase accélérée ou blastique	Blastes > 15 % (moelle ou sang) ou Blastes + précurseurs granuleux > 30 % (moelle ou sang)	Blastes > 30 % (moelle ou sang)

► *Critères de réponse au traitement par inhibiteur de tyrosine-kinase (ITK) de 1<sup>re</sup> génération*

### Définition de réponses et suivi sous traitement par ITK

Réponse hématologique	Complète (RHC)	NFS normale (leucocytes < 10 000/mm <sup>3</sup> ), basophiles < 5 % et rate non palpable	Suivi tous les 15 j jusqu'à obtention de RHC puis tous les 3 mois
Réponse cytogénétique (recherche du chromosome Ph sur métaphases)	Complète (RCyC) Partielle (RCyP) Mineure (RCyM) Absente	Absence de Ph+ 1-35 % de Ph+ 36-65 % de Ph+ > 95 % de Ph+	Suivi tous les 3 mois jusqu'à RCyC puis/6mois <i>La persistance de &gt; 35 % de Ph+ à 3 mois sous ITK est considérée comme un échec</i>
Réponse moléculaire (quantification du transcrit Bcr-Abl en biologie moléculaire par PCR quantitative en temps réel)	Complète (RMC) Majeure (RMM)	Transcrit indétectable Ratio Bcr-Abl/Abl (ou autre gène de référence)	Suivi tous les 3 mois jusqu'à RMC puis tous les 6 mois

► *Recherche de mutations de Bcr-Abl*  
Les mutations au sein de la tyrosine-kinase entraînent des résistances au traitement par ITK.

Elles doivent être recherchées (biologie moléculaire) en cas d'échec ou réponse suboptimal sous ITK, avant changement de traitement.

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (2)

### Moyens thérapeutiques

#### ► Inhibiteurs de tyrosine-kinase

- ITK 1<sup>re</sup> génération : **imatinib (GLIVEC)** : dose classique 400 mg/j, peut être administré d'emblée ou secondairement à 800 mg/j. La surveillance du résiduel sérique permet également d'adapter la dose. Le recul actuel sur l'efficacité et la tolérance sur plus de 10 ans en administration continue permet une prescription « rassurante » au long cours. La disponibilité du générique permet une administration à moindre coût.

- ITK 2<sup>e</sup> génération :

- **nilotinib (TASIGNA)** : efficacité significativement supérieure à l'**imatinib** 400 en termes de rapidité et taux d'obtention de réponse (RCyC et RMC) et frein à la progression de la maladie mais survie globale identique à 4 ans. Recul de 5 ans sur le traitement prolongé. **Contre-indiqué pour certaines mutations de Bcr-Abl (dont T315I)**. Risque accru d'accidents cardiovasculaires sous traitement et augmentation des facteurs de risques (diabète, dyslipidémie) ;

- **dasatinib (SPRYCEL)** : efficacité significativement supérieure à l'**imatinib** 400 en termes de rapidité et taux d'obtention de réponse (RCyC et RMC) et frein à la progression de la maladie mais survie globale identique. Risques majeurs d'épanchement pleuraux et d'hypertension artérielle pulmonaire à surveiller. Absence de recul sur le traitement prolongé.

- ITK 3<sup>e</sup> génération :

- **ponatinib** : à ce jour seul ITK efficace sur les mutations T315I. Nécessite une surveillance des enzymes pancréatiques ;
- **bosutinib** : réservé en 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> ligne de traitement.

#### ► Cytokine (interféron pégylé)

Effet de cytoréduction lente mais dose dépendante et pouvant s'accompagner d'un effet réducteur sur le nombre de cellules chromosome Ph (réponse cytogénétique).

Seul à pouvoir être prescrit pendant la grossesse.

Les bénéfices de son association à un ITK restent controversés mais en cours d'évaluation.

#### ► Chimiothérapie

- **Hydroxyurée (HYDRÉA)** : prescription en attendant la confirmation diagnostique, pour diminuer l'hyperleucocytose (associer à un traitement de prévention du syndrome de lyse tumorale).

- Chimiothérapie type « leucémie aiguë » en cas de phase blastique.

#### ► Allogreffe

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques a une place de plus en plus restreinte compte tenu de l'efficacité et l'arrivée sur la marché de nombreux ITK. Elle reste indiquée :

- en cas d'échec de 2 lignes d'ITK dont **ponatinib**, sous réserve de la faisabilité (état du patient, donneur) ;

- en phase accélérée et blastique : en 1<sup>re</sup> intention.

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (3)

### Stratégie thérapeutique en phase chronique

La stratégie thérapeutique n'est pas encore consensuelle. Les patients doivent être traités en centres spécialisés et inclus dans des protocoles thérapeutiques autant que possible.

#### ► Patients jeunes

L'objectif est, après obtention de la RMM, de prolonger le « temps sans traitement », c'est-à-dire d'arrêter les **ITK** sans risque de rechute.

Les **ITK** de 2<sup>e</sup> génération auraient un bénéfice à être administrés en 1<sup>re</sup> ligne.

La durée du traitement après obtention de la réponse (RMC minimum) reste à établir.

En cas d'échec d'**ITK** de 2<sup>e</sup> génération, proposer un **ITK** de 3<sup>e</sup> génération (après

recherche de mutations), puis l'allogreffe si absence de réponse.

► *Patients âgés ou ayant des comorbidités*  
L'objectif est l'obtention de réponse et le frein à la transformation blastique.

Débuter l'**ITK** le mieux toléré en 1<sup>re</sup> intention.

### Polyglobulie de Vaquez

La polyglobulie primitive ou maladie de Vaquez est associée à la mutation de la kinase JAK2 induisant une activation constitutive de la voie de signalisation en aval de récepteurs aux cytokines.

La principale complication est la thrombose (responsable de 45 % des décès).

### Préalables au traitement

► *Critères diagnostiques* : 2M + 1m (98 % des cas) ou 1M + 2m

### Critères diagnostiques de la maladie de Vaquez

Critères Majeurs (M)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hb &gt; 18,5 g/dL (homme) ou &gt; 16,5 g/dL (femme) ou masse sanguine &gt; 25 % par rapport à la normale</li> <li>• Présence de mutation de JAK2 (95 % de mutations V617F, 5 % mutations de l'exon 12) sur prélèvement sanguin</li> </ul>
Critères mineurs (m)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolifération myéloïde des 3 lignées sur l'aspiration médullaire</li> <li>• Dosage de l'EPO sérique abaissé</li> <li>• Pousse spontanée de colonies érythroïdes <i>in vitro</i></li> </ul>

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (4)

### Traitements disponibles

#### ► Correction des facteurs de risques (FDR) cardiovasculaires (CV)

Le tabac est le seul FDR significativement associé aux événements CV dans cette maladie. Néanmoins, la recherche et la correction des autres FDR CV (dyslipidémie, surpoids, diabète, HTA, etc.) semble de bon sens.

#### ► Antiagrégants plaquettaires

**Aspirine** faible dose (100 mg/j) pour tous les patients en dehors de contre-indication (saignement : le risque de saignement est augmenté paradoxalement en cas de thrombocytose extrême par Willebrand acquis) ou ulcère gastrique.

#### ► Saignées

- Saignées de réduction sanguine de 300 à 500 mL/j tous les j jusqu'à obtention d'un Ht < 50 % (voire < 45 %).
- Indication pour les patients à faible risque de thrombose et sans myéloprolifération importante des autres lignées.
- La carence martiale secondaire aux saignées implique une substitution en fer courte (5-10 j) et uniquement en cas de carence symptomatique (thrombocytose réactionnelle, signes cliniques).

#### ► Chimiothérapie

- **Hydroxyurée (HYDRÉA)** à la dose de 500 à 1 500 mg/j en fonction de la myéloprolifération initiale. Risque de LAM secondaire variable selon les études mais existant.
- **Alkylants : pipobroman (VERCYTE)** 25 à 50 mg/j ou **busulfan**. Risque de LAM secondaire élevé.

#### ► Interféron alfa-2a pégylé

**INF pégylé** 45 µg/sem. SC. Dose secondairement augmentée à 90 voire 135

µg/sem. selon la réponse. Efficacité sur la diminution du transcrit JAK2 muté donc potentiellement un effet direct sur le clone pathologique.

#### ► Inhibiteurs de JAK2

Le **ruxolitinib (JAKAVI)** a montré son efficacité sur le contrôle des paramètres biologiques et les symptômes cliniques ainsi que sur la diminution du transcrit JAK2. Des essais sont en cours pour évaluer sa place en 2<sup>e</sup> ligne de traitement.

### Stratégie thérapeutique

#### ► Patients à faible risque thrombotique (< 60 ans, sans antécédents de thrombose)

- Saignées en 1<sup>re</sup> ligne.
- **Hydroxyurée** ou **INF** en cas d'échappement ou intolérance.
- **Aspirine** 100 mg/j.

#### ► Patients à haut risque thrombotique (> 60 ans ou antécédents de thrombose)

- **INF pégylé** : surtout si jeunes (car risque LAM), femmes à désir de grossesse.
- **Hydroxyurée** : en 1<sup>re</sup> ligne.
- **Pipobroman** ou **busulfan** en 2<sup>e</sup> ligne (progression sous **HYDRÉA**).
- **JAKAVI** : intolérance ou échappement à l'**hydroxyurée** : indication à valider.

### Myélofibrose primitive (MFP)

La myélofibrose peut être primitive (appelée aussi splénomégalie myéloïde) ou secondaire à une maladie de Vaquez ou une thrombocytemie essentielle.

Les 3 entités suivent les mêmes modalités thérapeutiques.

### Préalables au traitement

- *Score pronostique de la MF primitive : DIPSS plus*

## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (5)

## Score pronostique DIPSS plus

Facteurs pronostiques	Score
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Âge &gt; 65 ans</li> <li>– Plaquettes &lt; 100 000/mm<sup>3</sup></li> <li>– Hb &lt; 10 g/dL</li> <li>– Besoins transfusionnels</li> <li>– Symptômes cliniques (perte de poids &gt; 10 %, fièvre, sueurs, etc.)</li> <li>– Leucocytose &gt; 25 000/mm<sup>3</sup></li> <li>– Caryotype défavorable</li> <li>– Blastés circulants 10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bas (0 facteur)</li> <li>– Intermédiaire 1 (1 facteur)</li> <li>– Intermédiaire 2 (2-3 facteurs)</li> <li>– Élevé (&gt; 4 facteurs)</li> <li>– Risque de transformation en leucémie aiguë si plaquettes &gt; 100 000/mm<sup>3</sup> ou caryotype complexe</li> </ul>

## Traitements à envisager

► *Traitement médicamenteux*

• **Érythropoïétine (EPO)** : envisager si Hb < 10 g/dL. Efficacité uniquement en absence de splénomégalie majeure (rate dépassant < 5 cm sous le rebord costal), si dosage sérique de l'EPO > 125 U/L, si absence de besoins transfusionnels.

• **Corticoïdes** : éviter si risque de déséquilibre de diabète.

• **Hydroxyurée** : inefficace si MF secondaire et antécédent de traitement par hydroxyurée.

• **Androgènes ou danazol** : en absence de problèmes de prostate (PSA élevé).

• **Antiangiogéniques** : **thalidomide** ou **lénalidomide**. Efficaces surtout si caryotype 5q-. À associer à l'**aspirine** car risque augmenté de thrombose.

• **Inhibiteurs de JAK** : efficaces sur la splénomégalie et les symptômes liés à la maladie.

► *Radiothérapie*

• Radiothérapie splénique : en cas de splénomégalie importante résistante au traitement médicamenteux.

• Radiothérapie des sites d'hématopoïèse extramédullaires.

• Radiothérapie pulmonaire en cas d'hypertension artérielle pulmonaire.

► *Splénectomie*

En cas de splénectomie importante et symptomatique résistant au traitement médicamenteux, prévoir une anticoagulation préventive systématique postopératoire et de l'**aspirine** si les plaquettes avant opération sont > 200 000/mm<sup>3</sup>.

► *Allogreffe*

Indiquée pour les patients jeunes et à score pronostique Int-2 ou élevé.

Il y aurait un bénéfice à diminuer la taille de la rate par traitement médicamenteux avant la greffe.



## SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS (6)

### Stratégie thérapeutique

L'objectif du traitement est dit palliatif (diminuer les symptômes, retarder l'évolution). Il n'y a aucune thérapeutique de guérison à ce jour. Les décisions sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire.

#### ► Score pronostique bas ou Int-1

- Surveillance.
- En cas de symptômes invalidants envisager un traitement médicamenteux (choix selon les contre indications et bénéfices attendus).

#### ► Score pronostique Int-2 ou élevé

- Patients jeunes (< 45 ans) voire < 65 ans : envisager une allogreffe, précédée d'un traitement médicamenteux d'attente et permettant de diminuer les symptômes et la taille de la rate.
- Caryotype del(5q) isolé : **légalidomide**.
- Inclusion dans des protocoles thérapeutiques : nouveaux anti-JAK2, nouveaux **antiangiogéniques (pomalidomide)**.

### Thrombocytémie essentielle (TE)

La TE partage des similitudes diagnostiques avec la maladie de Vaquez et la myélofibrose primitive, dont la mutation de JAK2 dans 50 % des cas.

Comme dans la maladie de Vaquez, le risque majeur est la thrombose.

#### Préalables au traitement : identifier le risque thrombotique

Les facteurs de risques significativement associés au risque thrombotique sont l'âge > 60 ans ou les antécédents de thromboses (artérielles ou veineuses). Les autres facteurs de risque à prendre en compte sont :

- les facteurs de risques d'athérosclérose ;
- le taux de plaquettes supérieur à 1 500 000/mm<sup>3</sup> ;
- l'hyperleucocytose et la présence de fibrose médullaire ;
- la présence de la mutation de JAK2, notamment homozygote.

### Traitements à envisager

- **Antiagrégants plaquettaires** : l'aspirine à 100 mg/j est indiquée pour tous les patients.
- Agents cytoréducteurs :
  - **hydroxyurée (HYDRÉA)** : le risque de leucémie secondaire a été évoqué mais reste débattu ;
  - **anagrélide (XAGRID)** : efficacité inférieure à l'hydroxyurée sur le risque thrombotique et augmentation de l'incidence de fibrose médullaire ;
  - phosphore 32, **alkylants (busulfan)** et dérivés d'alkylants (**pipobroman**) : risque élevé de leucémie secondaire.
- **Interféron alpha** : pas de risque de leucémie secondaire mais efficacité moindre et tolérance médiocre.

### Stratégie thérapeutique

#### ► Tous les patients

- **Aspirine**.
- Prévention et traitement des facteurs de risques d'athérosclérose (**statine**, contrôle tensionnel, surpoids, tabac, etc.).

#### ► Risque thrombotique élevé

- 1<sup>re</sup> ligne : **hydroxyurée**. Sauf patients jeunes (crainte de leucémie secondaire) ou grossesse : **interféron**.
- 2<sup>e</sup> ligne : **anagrélide**.
- Patients âgés et ne pouvant supporter l'hydroxyurée ou l'**interféron** : **alkylants** ou P32 en cures courtes.

## AGRANULOCYTOSE IATROGÈNE

Elle est définie par la diminution à moins de  $0,5 \cdot 10^9$  granulocytes/L. Sont exclues de cette partie les granulopénies de la chimiothérapie ou de la radiothérapie.

Elle met en jeu un mécanisme souvent immunologique (le médicament joue le rôle d'haptène), plus rarement directement toxique.

Le myélogramme est indispensable à la confirmation diagnostique et renseigne sur le pronostic : la rapidité de résolution dépend de la profondeur d'atteinte sur la pyramide de maturation lignée granulocytique.

En cas d'arrêt du facteur déclenchant, la durée de sortie d'agranulocytose est généralement de 8 à 10 j.

### Mesures générales

- Hospitalisation.
- Enquête étiologique.
- Déclaration à la pharmacovigilance.
- Contre-indication à vie du médicament, voire de sa classe thérapeutique.
- Isolement protecteur du patient : chambre seule, limitation des visites, port du masque, gants, surblouse pour le personnel soignant.
- Mesures anti-infectieuses préventives : bains de bouche (bicarbonate de Na), asepsie des portes d'entrée cutanées et muqueuses.

L'arrêt du médicament incriminé est indispensable.

- Le traitement par les **facteurs de croissance granulocytaire (G-CSF)** n'est pas sys-

tématique mais peut être envisagé si la granulopénie est profonde et prolongée.

### Mesures thérapeutiques

#### En cas de fièvre

Urgence thérapeutique.

Les prélèvements bactériologiques ne doivent pas retarder l'introduction des antibiotiques.

Antibiothérapie probabiliste à large spectre couvrant les BGN (notamment pyocyanique) :

– bêtalactamine à large spectre (ex : **TAZOCILLINE** 4 g x 3/j IV) ou **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** (ex : **FORTUM** 1 g x 3/j), éventuellement associées aux **quinolones** ;

– association aux **aminosides** (ex : **amikacine** 15 mg/kg/j en 1 inj.) en cas de sepsis sévère ou choc septique ;

– en cas de neutropénie prolongée (> 21 j), le risque d'infection fongique est réel et un traitement antifongique doit être envisagé.

Poursuite de l'antibiothérapie jusqu'à la sortie d'agranulocytose en absence de documentation. Sinon, adaptation de la durée selon l'infection documentée, même en cas de sortie d'agranulocytose.

#### En dehors de la fièvre

Les neutropénies modérées (aux environs de  $0,5 \cdot 10^6$  granulocytes/L) sans conséquence clinique (fièvre, aphtose, etc.) justifient des mesures générales seules et d'une surveillance rapprochée.

## ANÉMIES (1)

## Démarches préliminaires

- Éliminer une fausse anémie par hémodilution (ex : surcharge hydrique, hyperprotidémie dans le myélome multiple).
- Évaluer la tolérance clinique : symp-

tômes cardiovasculaires (dyspnée, palpitations, étourdissement, voire douleurs précordiales), asthénie, signes neurologiques centraux.

- Déterminer la cause avant toute tentative thérapeutique.

## Démarche étiologique devant une anémie

Anémie microcytaire (VGM < 80 fl)	Anémie normo ou macrocytaire (VGM > 100 fl)	
Toujours arégénérative (réticulocytes normaux)	Arégénérative	Régénérative (réticulocytes > 150 000/mm <sup>3</sup> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carence martiale</li> <li>• Inflammation</li> <li>• Thalassémie</li> <li>• Saturnisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toxique/médicamenteuse</li> <li>• Hypothyroïdie</li> <li>• Cirrhose</li> <li>• Alcoolisme chronique</li> <li>• Carence B12/B9</li> <li>• Myélodysplasie</li> <li>• Aplasie médullaire</li> <li>• Fibrose médullaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hémolyse</li> <li>• Hémorragie</li> </ul>

## Traitement symptomatique

- Réduction ou absence d'activité physique. Le repos réduit les besoins en oxygène.
- *Oxygénothérapie* par voie nasale si anémie profonde et d'autant plus indiquée en cas de dyspnée de repos ou de signes neurologiques centraux (céphalées, acouphènes).
- *Transfusion* érythrocytaire à discuter selon l'étiologie et la tolérance clinique. Dans tous les cas, mesurer le rapport risque/bénéfice.
- Contre-indication relative à la transfusion en cas :
  - d'anémie hémolytique auto-immune : inefficace et pouvant augmenter les symptômes liés à la lyse cellulaire ;
  - d'hyperviscosité (myélome multiple,

maladie de Waldenström) : risque de surcharge aiguë/œdème aigu du poumon.

## Anémies par carence martiale

Tout traitement substitutif en fer ne s'envoie qu'après recherche et correction de la cause.

## Rechercher et traiter la cause [1]

- Saignement chronique : digestif (ulcère gastroduodénal, tumeur colique), gynécologique (menstruations abondantes, stérilet, endométriose, cancer, fibrome), hématurie macroscopique, hémolyse chronique sur valves mécaniques.
- Malabsorption : maladie coéliqua = 5 % des carences martiales. Amputation digestive.
- Insuffisance des apports : grossesses répétées, dons de sang répétés, anorexie mentale, alimentation déséquilibrée.

**SELS FERREUX (1) – FER SEUL ORAL (SEL FERREUX)**■ **Ascorbate ferreux**

<b>ASCOFER</b>				
A. : 100 à 200 mg/j en 1 à 2 prises, jusqu'à reconstitution du stock en fer (3 mois) E. et N. : 6 à 10 mg/kg/j	30 gél. 33 mg	3,23	65 %	0,11

Reprise J28 (une cure toutes les 4 sem.)

■ **Ferédétate de sodium**

<b>FERROSTRANE</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	25 càc 34 mg (fl. 125 mL)	2,62	65 %	0,10

■ **Fumarate ferreux**

<b>FUMAFER</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	50 cp. 66 mg 100 cp. 66 mg 50 doses 33 mg	HOP 2,78	65 % NR	0,03

■ **Succinate ferreux + acide succinique**

<b>INOFER</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	100 cp. séc. 100 mg	6,31	65 %	0,06

■ **Sulfate ferreux**

<b>TARDYFERON</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 80 mg 100 cp. 80 mg	3,56 HOP	65 %	0,12

**SELS FERREUX (2) – FER ET VITAMINE C ORAL (SULFATE)**■ **Sulfate ferreux + acide ascorbique**

<b>FERO GRAD VITAMINÉ C 500</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 105 mg + ac. ascorbique 500 mg	3,16	65 %	0,11

## ANÉMIES (2)

### Traitement martial substitutif

#### ► *Traitement curatif*

• Voie orale à privilégier (en absence de troubles d'absorption) :

– **sel ferreux** : 2-3 mg de fer/kg/j (soit minimum 100 mg/j) chez l'adulte. Avertir le patient de la survenue de flatulences et de coloration noire des selles pour améliorer l'observance ;  
– l'association de **vitamine C** n'a pas démontré de bénéfices.

• Voie parentérale : dans le circuit de dialyse d'une insuffisance rénale dialysée, en cas de malabsorption et plus rarement en cas de résistance ou intolérance de la voie orale. **VENOFER** 100 à 200 mg x 2 à 3/sem.

• Objectif : normalisation de la ferritine (durée habituelle du traitement : 4 à 6 mois).

#### ► *En prophylaxie*

Pour les patients à risque de carence martiale : grossesse (1 mg/kg/j à partir du 4<sup>e</sup> mois), prématurés (2-3 mg/kg/j dès le 3<sup>e</sup> mois de vie), nourrissons (lait supplé-  
menté en fer).

### Conduite à tenir devant une anémie microcytaire hypochrome

• Éliminer la cause inflammatoire et les hypochromies congénitales (fer sérique bas, ferritine normale ou élevée, électrophorèse de l'hémoglobine).

• Rechercher l'origine :

– carence d'apport (anamnèse),  
– troubles d'absorption (examen digestif),  
– perte digestive bénigne ou maligne (exploration digestive),  
– pertes gynécologiques bénignes ou malignes (examen gynécologique),  
– dons répétés de sang (anamnèse),  
– automutilation (anamnèse, bilan psychologique).

• Compenser parfois, corriger la carence martiale toujours.

### Carence en fer (pour adulte) et en l'absence de carence vitaminique et d'amputation digestive

**TARDYFERON** : cp. 80 mg, 4 boîtes de cp. :

- 1 cp. x 2/j, en dehors des repas pendant 1 mois ;
- 1 cp./j par la suite pendant 3 mois ;

ou

**FUMAFER** : cp. 66 mg, 3 boîtes de cp. :

- 1 cp. x 3/j avant les repas pendant 1 mois ;
- puis 1 cp. x 2/j pendant 3 mois.

**Ordonnance** de surveillance du dosage de la ferritine en fin de traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.

### Anémies par carence en folates et vitamine B12

Les vitamines B9 (folates) et B12 (cobalamines) sont essentielles à la synthèse d'ADN pour les divisions cellulaires. Toute carence entraîne une macrocytose voire une mégalo-blastose (VGM > 120 fl) par arrêt des divisions.

L'enquête étiologique est indispensable avant le traitement substitutif.

Le myélogramme est indispensable pour éliminer une myélodysplasie ou hémopathie maligne.

En cas de carence mixte, il faut commencer par substituer en vitamine B12.

## SELS FERREUX (3) – FER INJECTABLE

## ■ Fer

<b>VENOFER</b>					
Quantité de fer (mg) = poids (kg) x 2,4 x [Hb <sub>cible</sub> - Hb <sub>actuelle</sub> ] (g/100 mL) Ne pas dépasser 300 mg/inj. en IV lente (90 min)	5 amp. 5 mL (100 mg)	HOP	I		
<b>FERINJECT</b>					
Posologie maximale : 1 000 mg/j Sans jamais dépasser 15 mg/kg/j en IV bolus et 20 mg/kg en perf. (dans du NaCl 0,9%) Hb < 10 g/dL : 1 500 mg si poids < 70 kg 2 000 mg si poids ≥ 70 kg Hb ≥ 10 g/dL : 1 000 mg si poids < 70 kg 1 500 mg si poids ≥ 70 kg	1 fl. 2 mL (100 mg) 2 fl. 10 mL (500 mg)	27,65 123,44	I I	65 % 65 %	27,65 61,72

**PROPRIÉTÉS**

Le fer administré sous forme de **sels ferreux** par voie orale est absorbé dans le duodénum et le jéjunum, le fer ferreux entre dans la formation de l'hémoglobine. 10 à 20 % du fer ingéré est absorbé. Cette absorption intéresse l'ion ferreux.

**INDICATIONS**

Carence martiale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Surcharge martiale normale ou hypersodémique : thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les **sels ferreux** sont à l'origine d'une irritation du tube digestif à l'initiation du traitement. Les doses utiles peuvent être atteintes par paliers. Nausées, épigastralgies, diarrhée ou au contraire constipation. Ces effets sont rares. Selles noires (avertir le patient).

La voie IV peut en plus entraîner exceptionnellement une altération de l'état général ou une réaction anaphylactique.

**INTERACTIONS**

Absorption diminuée par l'alimentation.

Absorption augmentée par la prise concomitante d'**acide ascorbique**.

Conduite à tenir devant une anémie hémolytique

- Avant toute correction, il convient de prendre des échantillons de sang pour déterminer la cause. Toute transfusion ou corticothérapie intempestive «brouille» la démarche diagnostique quand elle n'aggrave pas la situation.
- Anémie hémolytique congénitale chez l'enfant, dans un contexte connu : rechercher une hémoglobinopathie (électrophorèse), une enzymopathie (dosage), ou anomalie membranaire (tests appropriés).
- Anémie hémolytique acquise souvent auto-immune : aucune transfusion avant d'avoir précisé la nature de l'anticorps :
  - hémolyse immunologique par accident transfusionnel ou auto-immune ;
  - hémolyse toxique ou chimique parfois médicamenteuse ;
  - hémolyse infectieuse (germe de type streptocoque) dans un contexte fébrile ou de choc ;
  - hémolyse mécanique des valves (rarement) ou des CIVD (parfois), même de cause toxique (morsure de serpent).
- Définir l'auto-anticorps de l'anémie hémolytique immunologique de façon à prévoir une transfusion compatible (pas forcément iso-groupe, iso-Rhésus).

## ANÉMIES (3)

**Anémie par carence en acide folique**► **Traitement étiologique**

*Suppression de la cause quand cela est possible* : alcoolisme, troubles du transit, prophylaxie de la malnutrition, arrêt de la chimiothérapie (ce qui n'est pas toujours possible).

► **Traitement substitutif**

• *Par voie orale* en l'absence de troubles d'absorption :

– **acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** 30 mg/j pour adulte pendant 2 mois. 5 mg/j en préventif (grossesse, gastrectomie, traitement toxique) ;

– **acide folinique (LEDERFOLDINE)** IV ou oral.

• *Par voie parentérale* si troubles d'absorption.

**Causes de carence en acide folique**

- Besoins journaliers : 3 à 4 mg/kg/j.
- Causes acquises à chercher :
  - déficit d'apport,
  - troubles digestifs par diarrhée chronique ou amputation du grêle,
  - alcoolisme
  - chimiothérapie par antifolique (**méthotrexate**).
- Causes congénitales : déficits enzymatiques du métabolisme des folates.

**Carence en acide folique  
et anémie mégaloblastique  
en l'absence d'autres carences  
(partielle, vitamine B12, etc.)**

1. En l'absence de troubles du transit ou d'absorption

**LEDERFOLDINE** : cp. 2 mg, 2 boîtes :

- 1 cp. x 2/j pendant 10 j,
- 1 cp./j après le 10<sup>e</sup> j, pendant 20 j ;

ou

**SPÉCIAFOLDINE** : cp. 5 mg, 2 boîtes :

- un 1 cp. x 2/j pendant 10 j,
- puis 1 cp./j pendant 20 j.

2. En cas de troubles du transit ou d'absorption (amputation digestive)

**FOLINATE DE CALCIUM** : 25 mg, 1 boîte de 10 amp. :

- une inj. IM de 25 mg tous les 2 j pendant 10 j ;
- une inj. de 50 mg (2 amp.) par la suite x 1/sem.

**Anémie par carence en vitamine B12****Conduite à tenir devant une anémie mégaloblastique**

- Voir si le patient est sous chimiothérapie (quel que soit le produit).
- En établir le type (déficit en **acide folique** ou en **vitamine B12**).
- En établir la cause :
  - carence d'apport (souvent),
  - troubles d'absorption fonctionnels ou mécaniques (parfois),
  - causes congénitales (rarement).
- Compenser selon la cause par apport oral ou parentéral.

**La maladie de Biermer** est la principale étiologie à rechercher en cas de carence en B12 :

- maladie auto-immune: recherche d'Ac antifacteur intrinsèque et anticellules pariétales de l'estomac ;
- gastroscopie : recherche d'atrophie gastrique et cancer gastrique ;
- rechercher une autre carence associée (fer).

Les autres causes de carence en **vitamine B12** sont rares et dominées de nos jours par l'origine végétarienne mais aussi la sous-alimentation d'origine sociale. Toute entrave à l'absorption de **vitamine B12** entraîne la même pathologie.

• *Le traitement de la cause* est prépondérant si cela est possible (ce qui est plutôt rare) : prévention chez les végétariens et les gastrectomisés.

• Apport de **vitamine B12** plutôt par voie parentérale : les carences vraies sont exceptionnelles, les troubles souvent liés aux problèmes d'absorption. Apport journalier de 1 000 µg pendant 8 j, puis 1 000 µg/sem. pendant 1 mois, puis 1 000 µg x 1/mois tant que la cause persiste.

**SELS FERREUX (4) – FER ET ACIDE FOLIQUE****■ Sulfate ferreux et acide folique**

<b>TARDYFERON B9</b>				
1 cp./j à partir de la 24 <sup>e</sup> semaine de grossesse	30 cp. 50 mg de fer + 0,35 mg d'acide folique	3,73	65 %	0,12

**INDICATIONS**

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Des troubles gastro-intestinaux tels que : nausées, états nauséux, constipation, diarrhée, douleur abdominale sont liés à la présence de fer.

Une coloration habituelle des selles en noir ou gris-noir est observée.



## ANÉMIES (4)

**Causes de la carence en vitamine B12**

- Besoins journaliers (0,1 mg pour l'enfant, 1 mg pour l'adulte, 1,4 mg pour la femme enceinte).
- Troubles acquis à chercher :
  - déficit d'apport (essentiellement végétariens),
  - gastrectomie totale non compensée,
  - maladie de Biermer et atrophies associées,
  - exceptionnellement parasitose de type *tænia*.
- Troubles congénitaux (rares) :
  - déficit du facteur intrinsèque,
  - troubles du transport (*Imerslund*),
  - déficit en haptocarrin,
  - déficit en transcobalamine II,
  - acidurie méthylmalonique.

**Carence en vitamine B12  
et anémie mégaloblastique  
et en l'absence d'autres carences  
(acide folique, fer, etc.)**

**Vitamine B12**

- 1 inj. de 1 000 µg/j par voie IM pendant 8-10 j ;
- puis 1 inj./sem. jusqu'à normalisation de l'Hb (environ 1 mois) ;
- maintenir ensuite le rythme d'une inj. mensuelle de 1 000 µg par voie IM [1] ;
- traitement à vie (Biermer, gastrectomie, malabsorptions, etc.).

**Traitement des anémies hémolytiques  
auto-immunes (AHAI) [2]**

- En 1<sup>re</sup> ligne : corticothérapie
- traitement d'attaque : 1 à 2 mg/kg/j de

durée minimale 4-6 sem. (efficacité dans 70 % des cas : négativation du test de Coombs et arrêt du processus hémolytique) ;

– traitement d'entretien : diminution prudente et progressive de la dose. Durée cumulée totale entre 12 et 18 mois.

- En 2<sup>e</sup> ligne :
  - splénectomie en cas d'échec de la corticothérapie, corticodépendance, intolérance ou contre-indication aux **corticoïdes** (associée aux mesures préventives) ;
  - **rituximab** (hors AMM) ;
  - **immunosuppresseurs** : **azathioprine** 2 mg/kg/j (seul ayant l'AMM) ou hors AMM : **ENDOXAN** en bolus IV, **ciclosporine A**, **mycofénoate mofétil**.

• Traitement étiologique : l'AHAI liée à la LLC n'est pas une indication à débuter la chimiothérapie si isolée. AHAI secondaire à une autre maladie auto-immune (lupus, etc) : traitement de la maladie auto-immune.

• Abstention transfusionnelle, sauf intolérance clinique majeure (car efficacité très éphémère).

• Particularité de la maladie des agglutinines froides (AHAI à anticorps froids) : les globules rouges des culots globulaires réchauffés à 37 °C lors de la transfusion ont une durée de vie normale (non hémolysés) donc ont une efficacité symptomatique.

## ÉRYTHROPOÏÉTINE HUMAINE

## ■ Époétine alpha

<b>EPREX</b>					
Traitement de l'anémie symptomatique chez des patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie : 150 UI/kg x 3/sem ou 450 UI/kg x 1/sem. En pratique : 30 000 à 60 000 UI/sem. SC initialement puis adapter Transfusion autologue programmée 600 UI/kg x 2/sem. IV pendant 3 sem.	1 ser. 0,5 mL (40 000 UI/mL soit 20 000 UI)	146,89	I	65 %	146,89
	1 ser. 0,75 mL (40 000 UI/mL soit 30 000 UI)	216,99	I	65 %	216,99
	1 ser. 1 mL (40 000 UI/mL soit 40 000 UI)	285,82	I	65 %	285,82
<b>BINOCRIT</b>					
Idem <b>EPREX</b> Les dosages de 1 000 à 10 000 UI existent aussi en conditionnement de 6 ser.	1 ser. 1 000 UI/0,5 mL	7,52	I	65 %	7,52
	1 ser. 2 000 UI/1 mL	14,50	I	65 %	14,50
	1 ser. 3 000 UI/0,3 mL	21,47	I	65 %	21,47
	1 ser. 4 000 UI/0,4 mL	28,45	I	65 %	28,45
	1 ser. 5 000 UI/0,5 mL	34,97	I	65 %	34,97
	1 ser. 6 000 UI/0,6 mL	41,10	I	65 %	41,10
	1 ser. 8 000 UI/0,8 mL	53,36	I	65 %	53,36
	1 ser. 10 000 UI/1 mL	65,63	I	65 %	65,63
	1 ser. 20 000 UI/0,5 mL	126,96	I	65 %	126,96
	1 ser. 30 000 UI/0,75 mL	188,10	I	65 %	188,10
	1 ser. 40 000 UI/1 mL	247,32	I	65 %	247,32

## ■ Époétine bêta

<b>NÉORECORMON</b>					
Idem <b>EPREX</b> Prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré : 250 UI/kg x 3/sem. pendant 6 sem. A débiter avant le 3 <sup>e</sup> j de vie.	1 ser. 0,6 mL (20 000 UI/mL)	HOP	I		
	1 ser. 0,6 mL (30 000 UI/mL)	HOP	I		
	4 ser. 0,6 mL (30 000 UI/mL)	829,45	I	65 %	207,36

## ■ Darbépoétine alpha

<b>ARANESP</b>					
Traitement de l'anémie symptomatique chez des patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie : 2,25 µg/kg/sem. en 1 inj. SC ou 6,75 µg/kg/3 sem. En pratique : 500 µg/3 sem. ou 150 à 300 µg/sem.	1 ser. 0,3 mL (150 µg)	231,56	I	65 %	231,56
	1 stylo SC 0,3 mL (150 µg)	231,56	I	65 %	231,56
	1 ser. 0,6 mL (300 µg)	452,71	I	65 %	452,71
	1 stylo SC 0,6 mL (300 µg)	452,71	I	65 %	452,71
	1 ser. 1 mL (500 µg)	734,56	I	65 %	734,56
	1 stylo SC 1 mL (500 µg)	734,56	I	65 %	734,56

Voir la pharmacologie des **agents stimulant l'érythropoïèse (ASE)** en néphrologie.

## ANÉMIES (5) – GÉNÉRALITÉS

### Autres anémies de cause centrale

#### Autres anémies d'origine centrale : traitement étiologique

Étiologie de l'anémie	Traitement
Insuffisance rénale chronique	<b>Agents stimulant l'érythropoïèse (ASE)</b> ( <b>NÉORECORMON</b> , <b>EPREX</b> ) 20 UI/kg x 3/sem, ou <b>ARANESP</b> 2,25 µg/kg/sem.
Dysthyroïdie	Traitement de la pathologie endocrinienne
Inflammation aigue ou chronique	Traitement de la pathologie inflammatoire. Il existe une séquestration du fer par les macrophages: l'apport de fer sera inefficace.
Myélodysplasie, hémopathies malignes, métastases médullaires de cancers (envahissement médullaire)	Chimiothérapie adaptée <b>ASE</b>
Anémie post chimiothérapie et aplasie médullaire secondaire au traitement	Transfusion <b>ASE</b>
Toxiques/Alcoolisme chronique	Arrêt des toxiques

Si un traitement par **ASE** est instauré, l'Hb ne doit pas dépasser la valeur de 120 g/L.

En cas de néoplasie associée, il faut savoir

qu'un traitement par **ASE** augmente les facteurs de risque thromboemboliques proportionnellement à l'augmentation de l'Ht.

#### — CONSENSUS —

[1] Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer, *HAS*, 2011

[2] Anémies hémolytiques auto-immunes – Protocole national de diagnostic et de soins, *HAS*, 2009

## APLASIE MÉDULLAIRE – SYMPTÔME

### Bases thérapeutiques

Ces déficits de production des cellules sanguines dans la moelle hématopoïétique ont une origine variée, souvent néoplasique. Leur traitement est donc double : symptomatique contre les conséquences les plus visibles, les plus gênantes, étiologique contre la cause quand cela est possible.

### Traitement symptomatique

Les aplasies médullaires associent à des degrés divers une anémie centrale, une granulopénie et une thrombopénie.

#### Traitement de l'anémie

Il se fait plutôt en fonction des signes cliniques que des taux de l'hémoglobine, même si le chiffre plancher de 7 g/dL ne doit pas être dépassé. Il est à base de transfusions et doit prévenir les conséquences lointaines d'une allo-immunisation anti-érythrocytaire, ou d'une allo-immunisation anti-HLA, et prévenir une contamination virale. D'où la règle de transfuser en sang phénotypé après précautions d'usage (cf. Transfusions). Les anémies bien tolérées ne sont pas à transfuser rapidement. Une immobilisation pour d'autres raisons réduit les besoins en oxygène.

#### Traitement de la granulopénie

Une prophylaxie anti-infectieuse est de rigueur : bains de bouche par **antiseptique** bicarbonaté, lavage des mains et de la peau, nettoyage du périnée au savon, limitation des gestes traumatisants (piqûres, plaies opératoires, etc.), limitation des visites, suppression des fleurs surtout en pots, alimentation cuite. La granulopénie apyrétique sera ainsi surveillée. En cas de fièvre, après prélèvements sur un site infecté ou pour hémoculture, antibiothérapie à large spectre jusqu'à la remontée des granulocytes au-dessus de  $0,5 \cdot 10^9/L$  et apyrexie sans documentation bactériolo-

gique. L'adjonction d'un **antifongique**, comme le **fluconazole**, ou d'un 3<sup>e</sup> antibiotique peut se justifier au bout de quelques jours de fièvre persistant malgré les antibiotiques. Il n'y a pas lieu d'utiliser des **immunoglobulines**, ni des transfusions granulocytaires désuètes.

#### Traitement de la thrombopénie et de ses conséquences

À titre prophylactique, il convient d'éviter les situations hémorragiques : injections intramusculaires, interventions diverses (pose de chambre implantable, de cathéter), traitements risqués tels que **aspirine**, **héparine**, **antiagrégants**, anticoagulants ; utiliser une brosse à dents souple. Les transfusions plaquettaires prophylactiques sont discutables. En revanche des transfusions à titre curatif sont nécessaires devant un purpura pétéchial diffus et/ou des hémorragies muqueuses. On s'adresse de préférence aux concentrés plaquettaires d'aphérèse pour plus d'efficacité et pour prévenir une allo-immunisation.

### Traitement étiologique

Les aplasies toxiques (chimiothérapie ou autre) sont en général aiguës, spontanément résolutive dans des délais variables. Les aplasies courtes sont souvent bien tolérées, les aplasies longues en revanche entraînent des complications à traiter. L'utilisation des facteurs de croissance granulocytaires peut être discutée à raison de  $5 \mu g/kg/j$  (**GRANOCYTE**, **NEUPOGEN** et **NEULASTA** en préventif), ils peuvent accélérer la récupération médullaire. Les aplasies néoplasiques sont en principe l'indication d'une chimiothérapie si le cancer est sensible au traitement. L'aplasie s'aggrave provisoirement après le traitement. Les autres aplasies (radiations, virus, etc.) sont plus rares et les principes du traitement restent les mêmes, même si, en général, les durées d'aplasie sont plus longues.

**COAGULATION INTRAVASCULAIRE DISSÉMINÉE (CIVD) (1)**

Il s'agit d'un syndrome clinico-biologique caractérisé par :

- l'apparition des thrombi de fibrine dans la microcirculation entraînant une défaillance d'organes (rein, foie, poumons, cerveau) ;
- et consommation des plaquettes et des facteurs de coagulation entraînant un syndrome hémorragique.

Il existe toujours une cause sous-jacente déclenchante (sepsis, traumatisme, néoplasie, causes obstétriques, toxiques/venins, etc.).

Parmi les néoplasies, la leucémie aiguë promyélocytaire (LAM3) est quasi systématiquement accompagnée d'une CIVD.

**Scores diagnostiques et pronostiques**

Plusieurs scores ont été décrits. Leur utilisation est difficile en pratique mais importante en recherche clinique pour la corrélation avec le pronostic.

Ils reposent sur : numération plaquettaire + marqueurs de dégradation de la fibrine (D-dimères, PDF), allongement du TP, diminution du fibrinogène.

**Traitement de la cause**

Le traitement de la cause sous-jacente est l'élément clé thérapeutique.

Elle permet la résolution de la CIVD dans la majorité des cas sans autre intervention.

À noter que le traitement spécifique de la LAM3 (**ATRA VESANOÏD**) permet la diminution du risque et/ou d'aggravation de CIVD.

**Principes thérapeutiques**

Le déclenchement de la CIVD entraîne un déficit global en facteurs de la coagulation et une consommation périphérique des plaquettes, et fait apparaître par réaction des produits de dégradation de la fibrine (formée dans les microvaisseaux).

**Compenser les plaquettes et les facteurs de la coagulation****► Transfusion de plaquettes**

Elle ne doit pas être décidée sur le chiffre plaquettaire seul mais en conjonction avec le terrain et la clinique.

La transfusion préventive est déconseillée. Il est généralement recommandé d'envisager la transfusion en cas de saignements et si le chiffre de plaquettes est  $< 50\,000/\text{mm}^3$ .

En absence de facteurs de risque hémorragique et/ou en absence de symptômes cliniques, le seuil peut être abaissé à  $20\,000/\text{mm}^3$ .

Transfusion de 1 U/10 kg de poids.

**► Plasma frais congelé**

Les PFC sont envisagés en cas de baisse du fibrinogène  $< 1\text{ g/L}$  voire  $0,5\text{ g/L}$  et/ou  $\text{TP} > 1,5\text{N}$  et/ou syndrome hémorragique. Administration de 10 à 20 mL/kg.

En cas de surcharge empêchant l'administration d'un volume important de PFC, on peut considérer des concentrés de fibrinogène (**CLOTTAFAC**) 0,5 à 1 g/10 kg. Cela ne corrigera pas les autres facteurs consommés.

Le PPSB n'a pas d'indication dans ces cas et doit être évité (il s'agit de facteurs stables).

**COAGULATION INTRAVASCULAIRE DISSÉMINÉE (CIVD) (2)****Empêcher l'activation extensive de la coagulation****► Héparine**

Les **héparines de bas poids moléculaire** sont à manier prudemment en cas d'atteinte rénale fonctionnelle. Leur utilisation est controversée. L'héparine en injection ou mieux en perfusion continue est utilisée à faibles doses de l'ordre de 100 à 200 UI/kg/j. Il existe une résistance relative en raison de l'abaissement du taux de l'antithrombine III liée à la CIVD. Son effet est variable, elle peut même aggraver le syndrome hémorragique. L'ajustement de la dose doit se faire de façon très rapprochée, en raison de la remontée de l'antithrombine III, le cofacteur de l'héparine.

**► Protéine C activée**

Absence de données formellement concluantes. À discuter uniquement en cas de CIVD secondaire au sepsis (perf. continue 24 µg/kg/h pendant 4 j) ET en absence de thrombopénie < 30 000/mm<sup>3</sup> ET/OU gestes à risque hémorragique.

**► Antithrombine III**

Pas de bénéfice démontré à ce jour dans la CIVD.

**► Antifibrinolytiques**

Ils sont à éviter *a priori* car ils bloquent la réponse fibrinolytique physiologique ; à n'utiliser qu'en cas de forte réaction fibrinolytique et exclusivement des anti-enzymes tels que l'**aprotinine (TRASYLOL)**.

## GREFFE DE MOELLE (1)

Sous le terme de greffe de moelle, on englobe deux techniques très différentes et qui ne posent pas les mêmes problèmes en termes de réalisation, de surveillance et de complications potentielles :

- *l'allogreffe* est l'apport d'un système hématopoïétique et immunitaire nouveau et étranger au receveur, rendant la procédure complexe à court et long terme ;
- *l'autogreffe* utilise les cellules souches hématopoïétiques (CSH) du patient (auto-transfusion) et constitue un support cellulaire pour pouvoir réaliser une chimiothérapie intensive.

### Problème global

Il s'agit d'une technique thérapeutique lourde, pour le patient et pour la société. Les indications de l'allogreffe peuvent concerner les pathologies non malignes (hémoglobinopathies, déficits immunitaires) nécessitant l'apport d'un nouveau système hématopoïétique et/ou immunitaire.

Les indications de l'auto et allogreffe concernent majoritairement les néoplasies hématologiques et certains cancers solides.

Les indications consensuelles sont en perpétuelle réévaluation et les techniques évoluent rapidement. Les décisions sont donc à prendre par des équipes et centres spécialisés.

### Allogreffe

- Procédure associant :
  - *l'apport d'un système hématopoïétique et immunitaire allogénique* : pour les pathologies malignes, l'objectif est l'apport de cellules immunitaires qui vont reconnaître et détruire les cellules tumorales du patient (receveur) = effet du greffon contre la maladie (GVM) ;
  - *une chimiothérapie de conditionnement* permettant en priorité l'immunosuppression et la prise de greffe, mais aussi le contrôle de la maladie ;
  - *un traitement immunosuppresseur* post-allogreffe.

### • Problématiques :

- existence d'un **donneur HLA compatible** (minimum HLA A, B, C, DR, DQ), familial (génomique) ou ficher (phénotypique). Des donneurs alternatifs (sang de cordon ou donneurs haplo [semi]-identiques) peuvent être discutés selon les indications ;
- **balance GVH/GVM** : les cellules immuno-compétentes du greffon reconnaissent et détruisent les cellules normales du receveur (effet du greffon contre l'hôte : GVH) se traduisant par une mortalité et une morbidité importantes mais parallèlement ont un effet bénéfique sur le contrôle de la maladie (effet du greffon contre la maladie : GVM) en détruisant les cellules tumorales. À ce jour, la découverte de thérapeutiques immunosuppressives permettant de moduler GVH et GVM reste un challenge.

### Modalités pratiques

- Bilan prégreffe : évaluation du terrain selon des scores de comorbidités ayant un impact sur le choix du conditionnement
- Obtention des CSH :
  - CSH médullaires par ponction de la crête iliaque postérieure sous anesthésie générale. Richesse nécessaire  $2-3 \times 10^8$  cellules nucléaires/kg de poids du receveur ;
  - CSH périphériques après mobilisation par **G-CSF (filgrastim ou lenograstim)**  $10 \mu\text{g/kg/j}$  et cytophérèse. Richesse nécessaire  $4 \times 10^6$  CD34/kg ;
  - CSH de sang de cordon.
- Conditionnement (secteur protégé, chambres à flux laminaire et pression positive) : les doses cytotoxiques et immunosuppressives varient selon l'effet désiré sur la tumeur, la source du greffon et le terrain compatible. Schématiquement, les conditionnements dits myéloablatifs entraînent une destruction totale hématologique (effet antitumoral) et immunitaire ; les conditionnements à intensité réduite privilégient une immunosuppression permettant la prise de greffe, tout en préservant temporairement le système hématopoïétique de l'hôte (faible effet antitumoral et plus faible toxicité).
- Transfusion du greffon le jour de son recueil, rarement congélation avant.

## GREFFE DE MOELLE (2)

### Indications potentielles

#### ► Maladies néoplasiques

- Leucémies aiguës lymphoïde et myéloïde (selon la cytogénétique et la réponse au traitement d'induction)
- Leucémie myéloïde chronique résistante aux **ITK**.
- Myélodysplasies selon le score pronostique.
- Lymphomes et myélomes sont rarement concernés en 1<sup>re</sup> ligne.

#### ► Maladies non néoplasiques

- Aplasie médulaire (maladie).
  - Hémoglobinopathies dans leurs formes graves : thalassémie, drépanocytose.
  - Syndromes d'immunodépression congénitaux de diverses formes.
  - Maladies métaboliques congénitales.
- Ces indications sont rares en soi, mais l'absence de néoplasie sous-jacente et l'évolution spontanément grave en font des indications de choix.

### Complications potentielles (non exhaustif)

- Thérapeutique hautement toxique, entraînant globalement 30 % de mortalité directement liée à la procédure.
- GVH aiguë (par définition survenant avant J100 post-allogreffe) : organes cibles = foie, peau, tube digestif.
- GVH chronique (> J100) : présentation de type pathologie auto-immune touchant tous les organes.
- Maladie veino-occlusive.
- Déficit immunitaire : risque infectieux viral (CMV, EBV, HSV, HHV6, adénovirus, BK virus), fongique (aspergillose), parasitaire (toxoplasmose) nécessitant un suivi rapproché.
- Secondairement, leucoencéphalite démyélinisante, syndrome myélodysplasique, cataracte, stérilité, troubles de la puberté, hypothyroïdie, seconde néoplasie et enfin rechute de la maladie initiale.

### Exemples de conditionnement myéloablatif

DCI et produit	Dose (mg/kg/j)	Rythme d'administration (le jour de la greffe est J0)
Cyclophosphamide	60 IV	J-6, J-5
Irradiation corporelle totale	2 Gy	J-3, J-2, J-1

DCI et produit	Dose (mg/kg/j)	Rythme d'administration (le jour de la greffe est J0)
Busulfan	4 PO	J-9 à J-6
Cyclophosphamide	50 IV	J-5 à J-2

### Exemple de conditionnement atténué

DCI et produit	Dose (mg/m <sup>2</sup> /j)	Rythme d'administration (le jour de la greffe est J0)
Fludarabine	30 IV	J-4 à J-1
Irradiation corporelle totale	2 Gy	J0



## GREFFE DE MOELLE (3)

### Autogreffe

- Procédure associant :
  - une chimiothérapie intensive dite de conditionnement : il s'agit d'un effet « dose intensité » ayant pour objectif d'augmenter l'effet antitumoral ;
  - une réinjection des cellules souches hématopoïétiques périphériques du patient permettant une restauration hématopoïétique et donc de compenser la toxicité hématologique du traitement.
- Problématiques :
  - risque de contamination du greffon par les cellules malignes. Le recueil du greffon et l'autogreffe sont réalisés au mieux après obtention d'une rémission complète. Les essais de traitement ou purge du greffon préalables peuvent être réalisés dans le cadre de protocoles ;
  - difficultés de recueil de CSP chez des patients multitraités.

### Indications potentielles

- Maladies néoplasiques sensibles à une chimiothérapie.
- Les myélomes multiples (indication en 1<sup>re</sup> ligne du sujet jeune), les lymphomes de Hodgkin (indication en 1<sup>re</sup> rechute chimio-sensible) et les lymphomes non hodgkiniens représentent 2/3 des pratiques consensuelles.
- Les tumeurs non hématopoïétiques telles que cancer pulmonaire, cancer du sein potentiellement évolutif, cancer de l'ovaire et quelques cas de tumeurs testiculaires font aussi partie des indications.

### Modalités pratiques

- Bilan prégreffe large et complet. Élimination des contre indications à la cytophérèse (consultation de thérapie cellulaire).
- Recueil des CSP :

- mobilisation en fin de cycle de chimiothérapie ou stimulation de l'hématopoïèse par une chimiothérapie neutropénisante associée à un facteur de croissance granulocytaire **G-CSF** 5 µg/kg/j. La mobilisation peut être réalisée par **G-CSF** (**filgrastim** ou **lenograstim**) seul 10 µg/kg/j ;
- le début de la cytophérèse nécessite un nombre de cellules CD34 circulantes suffisant (monitoring quotidien) et une hématopoïèse correcte (plaquettes > 50 G/L, Hb > 8 g/dL) ;
- recueil minimal nécessaire pour assurer la reconstitution hématopoïétique :  $2-3 \times 10^6$  CD34/kg ;
- congélation du greffon en attendant l'autogreffe.
- Chimiothérapie de conditionnement : il s'agit de molécules adaptées à la chimio-sensibilité de la pathologie néoplasique et ayant une relation dose-effet linéaire connue.

- Autogreffe ou transfusion du greffon de CSP autologues (décongélation) : réalisé minimum 24 h après l'administration du dernier cytotoxique et associé à une pré-médication (**antihistaminiques** ou **corticoïdes**).

### Complications potentielles

- Liées à la mobilisation par **G-CSF** : myalgies et douleurs osseuses (50 % des cas) pouvant être très invalidantes et nécessitant des **morphiniques**.
- Liées à la cytophérèse : hypocalcémie, anémie, thrombopénie (à surveiller en fin de procédure).
- Liées au conditionnement : aplasie fébrile (5 % de mortalité), syndrome myélodysplasique, néoplasie secondaire.
- Rechute.

Contrairement à l'allogreffe, absence de complication dysimmunitaire.

## HÉMOGLOBINOPATHIES (1) – DRÉPANOCYTOSE

La drépanocytose [1] est une maladie génétique autosomique récessive affectant la synthèse de l'hémoglobine (hémoglobine S de *sickle cell* ou hématie en faucille). En conséquence, la perte de la déformabilité des globules rouges conduit à des phénomènes vaso-occlusifs et hémolytiques.

Les patients hétérozygotes sont généralement asymptomatiques mais requièrent des conseils génétiques sur la procréation. Les patients homozygotes ou hétérozygotes composites ont des manifestations cliniques chroniques et aiguës. La prise en charge aiguë doit considérer le terrain de l'évolution chronique de la maladie.

### Complications aiguës et chroniques de la drépanocytose

Manifestations aiguës	Manifestations chroniques (liste non exhaustive)
Crise vaso-occlusive (CVO) Syndrome thoracique aigu Accidents vasculaires cérébraux ischémiques Accidents ischémiques rétiens Accès de séquestration splénique Priapisme	Cardiaques : cardiomyopathie dilatée, hypertension artérielle pulmonaire Pulmonaires, syndrome restrictif ± obstructif Néphropathie glomérulaire Rétinite proliférative Manifestations ostéoarticulaires (ostéonécrose ischémique, notamment de la tête fémorale) Asplénie fonctionnelle suite aux infarctus spléniques Calculs biliaires

### Mesures préventives

- Éviction des facteurs déclenchants : modifications de température (antipyrétiques précoces, protection contre le froid), hydratation équilibrée, etc.
- Antibio prophylaxie par **ORACILLINE** 1 MUI x 2/j et vaccination (asplénie fonctionnelle) antipneumocoque, anti-*Haemophilus*. Éradication des foyers infectieux.
- Supplémentation en **acide folique**.
- Exsanguino-transfusion préventive en cas de chirurgie programmée.
- Éducation du patient et de sa famille.

### Traitement des complications aiguës

#### Critères d'hospitalisation d'un patient drépanocytaire

- Tout signe de gravité (*cf. infra*)
- Échec des **antalgiques** palier II
- Tout signe inhabituel dans une CVO simple
- Tout signe fonctionnel pulmonaire
- Douleur abdominale aiguë
- Malade isolé, sans surveillance extérieure
- Impossibilité d'assurer une hydratation correcte

Il faut avoir un dossier transfusionnel à jour.

## CHÉLATEURS DU FER (1)

## ■ Déféroxamine

<b>DESFÉRAL</b>					
Hémochromatose primitive ou secondaires transfusions, intoxication martiale ou aluminique aiguë À perfuser en SC au moyen d'une pompe portable sur 8-24 h, 5 à 7 j/sem.	1 fl. 500 mg + 5 mL solv.	6,63	I	100 %	6,63
	1 fl. 2 g + 20 mL solv.	24,89	I	100 %	24,89

## ■ Déférasirox

<b>EXJADE</b>					
Surcharge en fer des patients thalassémiques de plus de 6 ans, et surcharge transfusionnelle pour patients de 2-5 ans en cas de contre-indication à la <b>déféroxamine</b> 20 mg/kg en une prise 30 min avant un repas (le même) en suspension dans un demi-verre d'eau ou jus de fruit	28 cp. 125 mg	203,71	I	65 %	7,28
	28 cp. 500 mg	768,40	I	65 %	27,44

## ■ Défériprone

<b>FERRIPROX</b>					
Surcharge en fer dans thalassémie et pour contre-indication à la <b>déféroxamine</b> 25 mg/kg x 3/j	100 cp. séc. 500 mg	HOP	I		
	50 cp. séc. 1 000 mg	HOP	I		
	1 fl. sol. buv. (100 mg/mL)	HOP	I		

## HÉMOGLOBINOPATHIES (2) – DRÉPANOCYTOSE

### Traitement des crises vaso-occlusives

#### Critères de gravité d'une CVO : discuter un transfert en réanimation

- Respiratoires : FR > 30/min ou < 10/min, respiration superficielle, parole difficile, hypoxémie ( $\text{PaO}_2 < 60$  mmHg), acidose.
- Neurologiques : altération de la conscience, signes neurologiques centraux.
- Fièvre > 39 °C.
- Signes d'intolérance d'une anémie aiguë.
- Défaillance hémodynamique.
- Défaillance viscérale.

#### Traitement de la CVO simple

- Hydratation orale 3 L d'eau /j + eau de Vichy (alcalinisation) 1/2 L/j.
- Repos au calme et au chaud.
- Arrêt de l'activité pendant 24 h.
- **Antalgiques** palier I ou II.
- Contact en cas d'inefficacité ou apparition de signes de gravité.

#### Traitement de la CVO avec signes de gravité ou en hospitalisation

- Hydratation IV.
- **Antalgiques** palier III = **morphine** :  
– titration 0,1 mg/kg/min (soit environ 3 mg/min) jusqu'à EVA douleur < 4. Surveiller l'échelle de sédation et la fréquence respiratoire ;  
– puis PCA (*Patient Controlled Analgesia* : méthode de choix) : concentration 1 mg/mL. Bolus 1-2 mg. Période réfractaire 7-15 min. Pas de dose continue. **DROLEP-TAN** 2,5 mg/ser. de 50 mL de **morphine** (effet antinauséeux) ;

– ou **morphine** IV (PCA non disponible) : bolus 5 mg/2-4 h. Dose continue, si besoin, à adapter à la douleur ; max 2 mg/h ;

– antalgiques adjuvants : **AINS**, **paracétamol**.

- **Folates** : **SPÉCIAFOLDINE** 5 mg/j PO.
- Oxygénothérapie 1-2 L, lunettes.
- **Anxiolytiques non benzodiazépines** (ex : **ATARAX** 25 mg/j PO).

#### Saignée thérapeutique et échange transfusionnel

##### ► Indications

- AVC.
- Syndrome thoracique aigu sévère.
- CVO durée > 8 j.
- Priapisme aigu.
- Défaillance multiviscérale.

##### ► Modalités

- Manuel ou automatisé (érythraphérèse) : les tableaux d'échanges transfusionnels indiquent un volume de saignée vs un nombre de CG à transfuser.
- Objectif = HbS < 30 % et Hb > 9-11 g/dL.
- En général, ne pas dépasser l'Hb de base du patient.

#### Traitements spécifiques

- **HYDREA** : en cours d'évaluation.
- Allogreffe de moelle peut être discutée en cas de donneur HLA compatible. La morbidimortalité en rapport avec la procédure est de 20 à 30 %. L'allogreffe n'est actuellement suggérée que pour les patients homozygotes SS avec des manifestations vaso-occlusives et des douleurs, surtout chez l'enfant. Sont éliminées de la greffe les formes déjà compliquées.
- La thérapie génique est en cours d'évaluation.

## CHÉLATEURS DU FER (2) – PHARMACOLOGIE

## INDICATIONS

**DESFÉRAL** :

- hémochromatose primitive non curable par les saignées;
- hémosidérose secondaire;
- intoxications martiales aiguës;
- intoxications aluminiques chez l'insuffisant rénal dialysé;
- indications diagnostiques : dépistage des surcharge ferrique, de l'hémochromatose et de l'intoxication aluminique.

**EXJADE** : surcharge en fer post transfusionnelle.

**FERRIPROX** : surcharge en fer des patients présentant une thalassémie majeure et pour lesquels le traitement par la **déféroxamine** est contre-indiqué ou inadapté.

## CONTRE-INDICATIONS

**DESFÉRAL** : hypersensibilité à la **déféroxamine**, insuffisance rénale sévère non dialysée, infection bactérienne, grossesse, déconseillé pendant l'allaitement.

**EXJADE** : hypersensibilité au **déférasirox**, insuffisance rénale, intolérance au galactose, malabsorption du galactose et du glucose ; déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement et en cas d'insuffisance hépatique sévère.

**FERRIPROX** : hypersensibilité à la **défériprone**, antécédent d'agranulocytose, grossesse, allaitement, absence de contraception féminine efficace, enfant de moins de 6 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respect des doses maximales.

Examen ophtalmologique et audiométrie en cas de traitement prolongé.

Surveillance cardiaque en cas d'association du traitement avec la vitamine C.

Surveillance des courbes de croissance chez l'enfant.

Surveillance de la créatinine, des transaminases et de la ferritinémie.

Surveillance hebdomadaire de la NFS (PNN) car

risque de neutropénie et d'agranulocytose (**FERRIPROX**).

Risque tératogène (**FERRIPROX**).

Sérologie HCV avant traitement par **FERRIPROX** car aggravation de la fibrose hépatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction anaphylactique.

Céphalée, vertige, encéphalopathie aluminique.

Scotome, dégénérescence pigmentaire de la rétine, névrite optique, cataracte, baisse de l'acuité visuelle, dyschromatopsie.

Surdité, acouphènes.

Asthme, syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Retard de croissance.

Érythème et douleur au point d'injection (**DESFÉRAL**).

Hépatite, lithiase biliaire (**EXJADE**).

Agranulocytose, neutropénie (**FERRIPROX**).

Troubles neurologiques : diplopie, nystagmus, ralentissement psychomoteur (**FERRIPROX**).

Coloration des urines rouge-marron (**FERRIPROX**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**DESFÉRAL** :

- surveillance cardiaque si association avec la **vitamine C** ;
- risque de résultats faussés lors d'examen au gallium 67 (arrêt du **DESFÉRAL** 48 h avant scintigraphie).

**EXJADE** :

- association avec les **antiacides** contenant de l'aluminium déconseillée;
- diminution de la concentration plasmatique si association avec des inducteurs des UGT (**rifampicine**, **phénobarbital** et **phénytoïne**).

**FERRIPROX** :

- association prudente avec la **vitamine C** (surveillance de la fonction cardiaque);
- association avec les **antiacides** contenant de l'aluminium déconseillée;
- association avec d'autres médicaments pouvant entraîner une agranulocytose contre-indiquée.

## HÉMOGLOBINOPATHIES (3) – THALASSÉMIES

Troubles de régulation de la synthèse de la globine (chaînes  $\alpha$ ,  $\beta$  ou  $\delta$ ), les thalassémies ont une expression variable, dans un tableau clinique également variable. C'est une anomalie très répandue dans le pourtour de la Méditerranée, où dans certaines zones la fréquence du gène atteint 1 % de la population. Son tableau clinique peut être parfaitement asymptomatique ou aller jusqu'à l'anémie majeure (maladie de Cooley). Sa prise en charge doit être assurée par une équipe spécialisée.

### Mesures générales

Les mesures préventives concernent d'abord le conseil génétique, le dépistage des couples à risques (voire diagnostic prénatal) et, chez le sujet atteint, la recherche et la prévention des complications, en particulier l'hémossidérose, les troubles cardiaques et endocriniens.

### Traitements des formes majeures et intermédiaires [2]

#### Transfusions

- Objectif : maintenir le chiffre de l'hémoglobine 9,5-10,5 g/dL, stable.
- Rythme de transfusion environ toutes les 3-5 sem. Cette stabilité permet de prévenir les complications cardiaques, l'hépatosplénomégalie et les déformations inesthétiques majeures (visage mongoloïde). Les transfusions répétées justifient le recours systématique aux produits phénotypés.

#### Chélateur du fer

- Débuté après 10-20 transfusions ou si la ferritine est  $> 1\ 000\ \mu\text{g/L}$ .
- **Déféroxamine (DEFÉRAL)** : 1 à 4 g en perf. SC par pompe portative programmable, après chaque transfusion et dans le traitement de l'hémossidérose. La contre-indication ou l'inadaptation de la **déféroxamine** conduit à son remplacement soit par **déféripone (FERRIPROX)** soit par **déférasirox (EXJADE)** qui ont au moins l'avantage de la voie orale.
- Traitement des endocrinopathies, de l'hypothyroïdie et de l'hypogonadisme éventuels, recherche et prévention du diabète.
- *Traitements associés*
  - Supplémentation orale en **vitamine B12** (1 000  $\mu\text{g}$ /mois) et **acide folique** (1 mg/j) en raison de la forte consommation protéique et vitaminique de la moelle dans l'érythropoïèse inefficace.
  - Vaccination anti-hépatite B et A dans le cadre de la polytransfusion.
  - *Splénectomie*  
Peut se justifier si un hypersplénisme se manifeste. Une vaccination antipneumocoque et antiméningocoque et à envisager auparavant.
  - *Allogreffe de la moelle osseuse*  
C'est le seul traitement curatif de la thalassémie majeure. La recherche d'un donneur HLA compatible doit être systématique au diagnostic.

### CONSENSUS

[1] Syndromes drépanocytaires majeurs de l'enfant et l'adolescent : guide ALD n° 10, HAS, 2010

[2] Syndromes thalassémiques majeurs et intermédiaires, HAS, 2008

## HÉMOPHILIES (1)

### Mesures générales

- Informer le patient et son entourage des risques hémorragiques et des mesures immédiates à envisager.
  - Proscrire les médicaments susceptibles d'aggraver les troubles d'hémostase. Prévoir une vaccination antihépatite B en prévision des transfusions. Assurer la prise en charge administrative du patient et sa surveillance par une équipe médicale spécialisée.
  - Récupérer le carnet et la carte d'hémophile du patient. Elle contient :
    - le type et la profondeur du déficit ;
    - l'existence ou non d'un anticorps inhibiteur acquis du facteur XI ou VIII ;
    - la sensibilité au test à la desmopressine (dans l'hémophilie A mineure ou modérée).
- Cf. Transfusions.

### Traitement préventif

Il s'agit :

- d'une prévention primaire ou secondaire en cas de déficit sévère de l'enfant ou antécédents répétés d'accidents hémorragiques ;
- d'une prévention en cas de geste traumatique ou chirurgical.
- Prévoir un accès veineux, site implantable nécessaire.
- La **desmopressine** peut être une alternative en cas d'hémophilie fruste si le FAHA\* est de 5 à 10 %.
- Chez le petit enfant prévoir 3 inj./sem. de 25-30 U/kg jusqu'à la fin de l'adolescence, pour l'hémophilie B, x 2/sem.
- Prévention du développement d'inhibiteurs : utilisation de FVIII recombinant à demi-vie prolongée dans l'hémophilie A (ex : couplé à la fraction constante [Fc] des immunoglobulines [phase III en cours]).

### Traitement de l'accident hémorragique [1]

#### Mesures générales

- Compression locale quand c'est possible (peau, nez) elle permet parfois d'arrêter l'hémorragie sans autre intervention.

\* Facteur anti-hémophilique A

- Protection avec une gouttière en résine synthétique adaptée à la denture pour extraction dentaire éventuelle.
- Immobilisation en cas d'hémarthrose ou hématome musculaire, suivie de la kinésithérapie dès que possible.

#### Moyens associés

- **Desmopressine (MINIRIN ou OCTIM)** uniquement si hémophilie A : peut suffire en cas d'hémorragie mineure.
- **EXACYL IV** ou PO dans les hémorragies cutanéomuqueuses, en traitement adjuvant.
- Transfusion éventuelle si déglobulisation : culots globulaires phénotypés.

#### Traitement substitutif

Il dépend de la nature de l'hémophilie et de la gravité de l'hémorragie.

##### ► Hémophilie A

D'abord une dose de charge suivie du maintien du taux du facteur VIII. La dose de charge est en UI : le poids (en kg) x l'augmentation souhaitée (%) x 0,5. À renouveler toutes les 8 à 24 h (demi-vie du FVIII = 8-14 h).

- Pour l'hémorragie grave, maintenir le facteur VIII > 50 %, pendant 7 j.
- Pour l'hémorragie mineure, maintenir le facteur VIII entre 30 et 50 %, pendant 4 j.
- Pour l'hémorragie minime, maintenir le facteur VIII entre 15 et 30 %, pendant 1 j.

##### ► Hémophilie B

D'abord en dose de charge initiale suivie du maintien du taux du facteur IX. La dose de charge est en UI : poids (en kg) x l'augmentation souhaitée (%). À renouveler toutes les 12 à 24 h (demi-vie du FIX = 12-20 h).

Puis maintenir le taux à 15-30 % pour hémorragie minime, pendant 3 j et à 30-50 % pour hémorragie grave, pendant 7 j.

**FACTEURS DE COAGULATION (1) – FACTEURS ANTIHÉMOPHILIQUES****■ Facteur antihémophilique A recombinant**

<b>HELIXATE NEXGEN</b>					
Poudre + solvant pour IV	250 fl. 250 UI/2,5 mL	HOP	I		
	500 fl. 500 UI/2,5 mL	HOP	I		
	1000 fl. 1 000 UI/2,5 mL	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI/5 mL	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI/5 mL	HOP	I		
<b>KOGENATE BAYER</b>					
Poudre + solvant pour IV + bioset	1 fl. 250 UI	HOP	I		
	1 fl. 500 UI	HOP	I		
	1 fl. 1 000 UI	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI	HOP	I		
<b>ADVATE</b>					
Poudre + solvant pour IV	1 fl. 250 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 500 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 1 000 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 1 500 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI/5 mL	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI/5 mL	HOP	I		

**■ Facteur antihémophilique B cryodesséché**

<b>MONONINE</b>					
Poudre + solvant pour injection IV	1 fl. 1 000 UI/10 mL	HOP			



## HÉMOPHILIES (2)

### En cas d'inhibiteur anti-FVIII ou FIX

En cas d'urgence : **FVII activé (NOVOSEVEN)** ou concentrés de facteurs activés dans les pharmacies et centres spécialisés.

Les traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs sont en cours d'évaluation.

### Conseils pratiques pour l'hémophile et sa famille [1]

Tout enfant hémophile récemment diagnostiqué doit être pris en charge par le centre de référence local et régional formé d'une équipe d'hématologistes, de médecins transfuseurs, de pédiatres et disposant d'un laboratoire d'hémostase performant disponible 24 h/24. Ce centre de référence doit avoir accès en consultations spécialisées d'orthopédistes, de rhumatologues, de stomatologues et d'infectiologues de référence.

Le centre de référence local participe avec le médecin traitant à l'éducation du patient. Ce centre de référence est en principe en connexion avec des kinésithérapeutes, des psychologues et des assistantes sociales entrant dans le cadre de l'éducation globale du patient et de sa famille avec l'aide de l'Association française des hémophiles qui permet de disposer d'une carte et d'un livret de santé d'hémophiles et procure des revues d'information.

Des stages d'apprentissage pour auto-transfusions sont souhaitables, sinon nécessaires, autant pour le patient que pour éventuellement un membre de la famille. Ils sont organisés et dirigés par le centre spécialisé. Il est également important que l'équipe de référence informe et conseille les médecins généralistes du patient.

### CONSENSUS

[1] Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves – Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare, HAS, 2007

## PURPURA THROMBOPÉNIQUE

Toute thrombopénie accompagnée de signes cliniques hémorragiques (purpura, hématomes, saignements extériorisés) est *a priori* vraie ; un second prélèvement de contrôle ne doit pas retarder la prise en charge.

Une thrombopénie isolée doit être vérifiée par examen du frottis sanguin et/ou prélevé sur tube citraté.

Les purpuras thrombopéniques sont d'origine auto-immune dans 2/3 des cas. Néanmoins il s'agit d'un diagnostic d'exclusion ; notamment les microangiopathies thrombotiques (MAT) et les CVID doivent être éliminées en urgence.

### Mesures générales

- Contre-indication des gestes invasifs : injection IM, avulsion dentaire, injection intra-articulaire ou biopsie.
- Éliminer et éviter tous les médicaments qui pourraient modifier l'hémostase (**aspirine, anti-inflammatoires, antiagrégants** et anticoagulants).
- Prévoir une information et des mesures d'éducation du patient.
- Suppression de la cause.

### Transfusion plaquettaire

L'objectif est une suppléance d'urgence en attendant un traitement étiologique ou un geste d'hémostase.

La transfusion est **contre-indiquée** dans les purpuras thrombopéniques thrombotiques (MAT, CVID, TIH\*) et dans les thrombopénies auto-immunes en absence de

Pour les thrombopénies de mécanisme auto-immun, en cas transfusion justifiée par une hémorragie engageant le pronostic vital, il est recommandé de réaliser des transfusions fractionnées et d'associer des perfusions de **corticoïdes** et/ou **immunoglobulines intraveineuses**.

\* MAT : microangiopathie thrombotique, CVID : coagulation intravasculaire disséminée, TIH : thrombopénie induite par l'héparine.

### Traitement spécifique

#### Purpura thrombopénique immunologique idiopathique (PTI) [1]

L'indication des **traitements d'urgence** repose sur les **scores hémorragiques** [1].

##### ► Corticothérapie

Il s'agit d'un traitement ponctuel, à 1 mg/kg/j pendant 1 à 2 sem. suivi d'une décroissance rapide (la durée totale maximale est de 4 à 5 sem., contrairement à l'AAH). Elle doit permettre une remontée plaquettaire dès le 4<sup>e</sup> j, la voie IV étant efficace plus rapidement.

##### ► Immunoglobulines intraveineuses (TÉGÉLINE)

En cas de score hémorragique élevé, associées ou non aux **corticoïdes**.

À fortes doses (0,8 à 1 g/kg/j à J1, pouvant être répétées à J2 et J3).

Pour les formes **persistantes (évolution > 3 mois) et chroniques (> 12 mois)**, concernant 70 % des adultes, doivent être discutées différentes indications :

- corticothérapie ou IgIV séquentielles ;
- splénectomie. Après vaccination anti-pneumococcique et antiméningococcique. Efficacité prédite par l'étude de la durée de vie des plaquettes.

##### ► Agonistes des récepteurs à la thrombo-poïétine (NPLATE, REVOLADE)

##### ► Rituximab

375 mg/m<sup>2</sup> IV x 1/sem. pendant 4 sem. en cas de contre-indication ou échec des **corticoïdes**, des **immunoglobulines IV** ou de la splénectomie.

##### ► Immunodépresseurs (azathioprine, cyclophosphamide)

#### Purpura thrombopénique immunologique secondaire

Traitement étiologique (du lupus, des syndromes lymphoprolifératifs, du VIH, etc.).

#### Thrombopénie post-transfusionnelle

**Corticoïdes**, éventuelle plasmaphérèse.

### CONSENSUS

[1] Purpura thrombopénique immunologique de l'enfant et de l'adulte – Protocole national de diagnostic et de soins, HAS, 2009

## THROMBOPATHIES

Troubles des fonctions plaquettaires liées aux anomalies fonctionnelles des plaquettes, parfois sans thrombopénie, elles entraînent des troubles de l'hémostase d'intensité variable. La plupart des thrombopathies « symptomatiques » sont d'origine congénitale chez des familles répertoriées. Les thrombopathies acquises sont souvent de manifestations discrètes au cours de pathologies diverses.

### Thrombopathies constitutionnelles

De nombreuses pathologies sont recensées. La thrombopathie peut être isolée ou associée à un syndrome malformatif plus complexe ou à d'autres dysfonctions d'organes.

#### Classification schématique des thrombopathies congénitales

- Anomalies de production plaquettaires (ex : amégakaryocytose congénitale), pouvant s'associer à un défaut de myélopoïèse plus général, voire des myélodysplasies.
- Anomalies de motilité et forme (implication du gène de la myosine MYH9).
- Anomalies de phospholipides membranaires.
- Anomalies des granules cytoplasmiques.
- Déficits de récepteurs de surface (ex : syndrome de Bernard-Soulier).

Cette diversité de pathologies rares et complexes justifie une prise en charge spécialisée.

#### Mesures générales et préventives

- Éducation du patient : éviction des sports à risque, éviction des **antiagrégants plaquettaires** et autres traitements modifiant l'hémostase, hygiène générale.
- Information des praticiens sur l'éviction d'actes invasifs, injection IM.

- Contraception orale pour les femmes réglées.

#### Mesures spécifiques

- En cas d'hémorragie :
  - topiques locaux et **agents hémostatiques** : méches hémostatiques, **acide tranexamique** ;
  - transfusion de plaquettes : HLA compatibles (éviter le développement d'allo-anticorps) ;
  - **desmopressine** : activité indirecte par relargage de macropolymères de facteur von Willebrand. Indication non consensuelle. Inefficacité dans la maladie de Glanzmann ;
  - transfusion de facteur VII.
- Traitements de fond, dans des milieux spécialisés :
  - agonistes de la TPO ;
  - allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

### Thrombopathies acquises

Elles sont parfois d'origine médicamenteuse et nécessitent la suppression du produit en cause (**aspirine, anti-inflammatoires, antagonistes calciques**, certains antibiotiques), parfois dans le cadre d'une pathologie sous-jacente (syndrome myéloprolifératif, insuffisance rénale, dysglobulinémies monoclonales malignes), enfin parfois délibérée (**antiagrégants** dont l'**aspirine**).

Quelle que soit la cause, le mécanisme de l'atteinte fonctionnelle concerne soit les interactions plaquettes/paroi vasculaire (adhésion), soit les interactions interplaquettaires et/ou interactions plaquettes/plasma (agrégation, et *release*).

Le traitement concerne l'arrêt de médicament incriminé ou le traitement de la pathologie sous-jacente.

## TRANSFUSION SANGUINE (1)

### Règles générales

- S'assurer de l'indication transfusionnelle (une supplémentation en fer peut suffire dans une anémie ferriprive...).
- Éviter de transfuser la nuit, sauf urgence vitale, quand le patient - sans et surtout avec **somnifères** et **anxiolytiques** - s'est assoupi et a des réflexes peu vifs.
- S'assurer du type d'urgence transfusionnelle : la commande urgente d'une transfusion non urgente augmente les risques d'erreur.
- Toujours respecter le protocole transfusionnel en vigueur (contact de l'EFS), indication de la qualification du sang (ou ses dérivés).
- Au préalable : information du patient et accord signé à consigner dans le dossier transfusionnel.

### Règlementation de la compatibilité transfusionnelle [1]

#### Hors urgence

- Groupage ABO, Rhésus D (2 déterminations). Détermination Rhésus Cc Ee et Kell.
- Recherche des agglutinines irrégulières (RAI) : doit dater de moins de 72 h avant la transfusion.
- Épreuve de compatibilité *in vitro* prétransfusionnelle : en cas de RAI positive, absence de rendement transfusionnel, antécédent d'accident transfusionnel.
- Recherche d'anticorps anti HLA ou HPA en cas d'inefficacité de transfusion de plaquettes.

#### Urgence vitale (livraison 30 min)

- Groupage ABO, Rhésus D (2 déterminations). Détermination Rhésus Cc Ee et Kell.
- Pas de RAI, pas d'épreuve de compatibilité *in vitro*.

#### Urgence vitale immédiate (pas de délai de livraison)

Pas de groupage. Transfusion de produits O+ ou O-, Kell-.

#### Toujours

Contrôle ultime au lit du malade, sous la responsabilité du médecin prescripteur : épreuve de Beth Vincent.

#### Règle de prescription des produits sanguins labiles (PSL)

Elle doit comporter les indications précises :

- sur le produit : le type, sa quantité, sa transformation, sa qualification ;
- sur le patient (identité précise, date de naissance) ;
- sur le prescripteur et moyen de le contacter.

#### Type et quantité

##### ► Culots globulaires (CG)

- 1 CG augmente l'Hb de 1 g/dL chez l'adulte de 70 kg.
- Prescrire minimum 2 CG, éventuellement fractionné (1 CG/12 h) si surcharge ou risque d'intolérance cardiaque.
- 1 CG est généralement transfusé en 60 min.

##### ► Concentrés plaquettaires (CP)

- Deux types de produits :
  - concentrés plaquettaires d'aphérèse (CPA) : isolés à partir d'un seul don de sang. Diminue le risque infectieux ;
  - mélange de concentrés plaquettaires (MCP) : mélange à partir de 2 à 12 dons de sang.
- Posologie chez l'adulte, en 1<sup>re</sup> intention : 0,5 à 0,7.10<sup>11</sup> plaquettes pour 7 kg de poids. **Le poids du malade et la numération plaquettaire doivent figurer réglementairement sur l'ordonnance. Ils permettent de choisir au mieux un CP apportant une quantité suffisante de plaquettes.**

##### ► Plasma frais congelé [2]

- Règles transfusionnelles inverses des PLS cellulaires (CG et CP).
- Posologie chez l'adulte 10-15 mL/kg.
- Transformation : viro-atténuée (si provenance d'un seul donneur) ou viro-inactivée (pool de donneurs).

## PRODUITS SANGUINS

Seuls les produits labiles les plus utilisés sont mentionnés.

### Produits sanguins labiles

#### Produits cellulaires

##### ► Concentrés de globules rouges

(déleucocytés systématiquement depuis 1998)

- Unité adulte d'environ 200 mL avec minimum 45 g d'Hb, 80 % d'hématocrite.

- Unité enfant :

- qualification déplasmatisée : protéines plasmatiques résiduelles < 0,5 g de conservation de courte durée, d'environ 6 h ;

- qualification phénotypée : avec détermination des groupes Cc Ee Kell ou détermination étendue des phénotypes ;

- qualification irradiée : pour la destruction de toutes les cellulaires nucléées (leucocytes).

##### ► Concentrés plaquettaires

- Standard (CPS) isolé à partir d'un don de sang : plaquettes  $0,5 \cdot 10^{11}$ , volume 40-60 mL de plasma. La dose est d'une unité par 10 kg de poids.

- D'aphérèse (CPA), préparé par cytophérèse chez un donneur, toujours déleucocyté :

- 1<sup>re</sup> catégorie : de  $2$  à  $4 \cdot 10^{11}$  plaquettes ;

- 2<sup>e</sup> catégorie : de  $4$  à  $6 \cdot 10^{11}$  plaquettes ;

- 3<sup>e</sup> catégorie :  $> 6 \cdot 10^{11}$  plaquettes.

- Qualification irradiée : pour la destruction des leucocytes résiduels.

- Qualification CMV négative : donneur CMV négatif.

#### Produits non cellulaires (plasmatiques)

- Plasma frais congelé isogroupe.

- Indication : coagulopathie de consommation, déficits graves et/ou complexes.

- Qualification viro-atténuée par traitement par solvant-détergeant contre les virus à enveloppes.

#### Produits sanguins stables

Ils ont le statut de médicaments.

- Immunoglobulines polyvalentes : du LFB (laboratoire français de biofractionnement),

**SANDOGLOBULINE, TÉGELINE, VIVAGLOBIN.**

- Immunoglobulines spécifiques : **GAMMATÉ-TANOS.**

- Facteur VII : **FACTEUR VII LFB, NOVOSEVEN.**

- Facteur VIII : **ADVATE, HELIXATE NEXGEN, KOGENATE.**

- Facteur IX : **MONONINE.**

- Facteur de Willebrand : **WILFACTIN.**

- Albumine : **ALBUNORM, VIALEBEX.**

- Hémine.

- Fibrinogène : seul ou associé (**BIICOL** : avec facteur XIII et fibronectine).

## TRANSFUSION SANGUINE (2)

### Transformation et qualification des CP et CG

Transformation	Indications
Déleucocytation	Tous les CP et les CG depuis le 1 <sup>er</sup> avril 1998
Irradiation (permet l'inactivation des leucocytes résiduels)	Déficit immunitaire congénital cellulaire Avant et pendant un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques autologues Patients traités par greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues ou allogéniques Certaines chimiothérapies anticancéreuses ( <b>fludarabine</b> , <b>CAMPATH</b> , etc.) Transfusion <i>in utero</i> ou chez le prématuré Dons dirigés intra-familiaux (encadrés réglementairement) Transfusion de CP HLA identiques ou approuvés
Déplasmatisation (vise à éliminer les protéines plasmatiques)	Antécédents de réaction transfusionnelle anaphylactique majeure Déficit en IgA avec présence d'anticorps anti-IgA chez le receveur Transfusion de plaquettes maternelles en cas de thrombopénie allo-immune
Préparation pédiatrique	Diminuer la quantité de plaquettes à transfuser sans modifier la concentration du produit Assurer une deuxième transfusion à partir du même don
Cryoconservation (attention : diminue environ de 50 % l'efficacité transfusionnelle ; entraîne systématiquement une déplasmatisation)	CPA de phénotype rare
Réduction de volume	Prévention de surcharge volémique essentiellement en pédiatrie
Qualification	Indications
Phénotypé	État réfractaire avec allo-immunisation anti-HLA ou anti-HPA
Compatibilisé	Mêmes indications que pour le phénotypé après échec des CPA phénotypés État réfractaire avec allo-immunisation anti-HLA polyspécifique
CMV négatif (qualification rare car prévalence de 50 à 80 % dans la population générale : en cas d'indisponibilité, un produit déleucocyté est acceptable)	Receveurs CMV négatifs de cellules souches hématopoïétiques d'un donneur CMV négatif Receveurs de greffe de poumon, quel que soit leur statut sérologique vis-à-vis du CMV Femmes enceintes CMV négatives ou de statut sérologique inconnu vis-à-vis du CMV Nouveau-né dont la mère est séronégative ou de statut sérologique inconnu vis-à-vis du CMV

## TRANSFUSION SANGUINE (3)

### Prescription des produits sanguins stables

Ils ont le statut de médicaments.

• Albumine humaine : 20 % (hyperonco-tique) ou 4 % (légèrement hypo-onco-tique).

• Immunoglobulines polyvalentes : **TÉGÉLINE**, endobulines.

• Immunoglobulines spécifiques : anti-D, **sérum antitétanique**, sérum antirabique.

• Protéines de la coagulation :

- facteur VIII ;
- facteur IX ;
- concentrés de facteur von Willebrand ;
- concentrés de fibrinogène ;
- PPSB ;
- concentrés d'antithrombine III ;
- concentrés de protéine C activée.

### Mesures préventives

Elles sont toujours de rigueur : groupage en double détermination, recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) récente de moins de 72 h, prescription adéquate, vérification du groupe, vérification du nom et du numéro de dossier, test ultime (suivre le protocole transfusionnel).

### Mesures immédiates

• Clamper pour arrêter le flux sanguin transfusionnel, **ne pas débrancher** (maintenir la voie d'abord).

• Vérifier la concordance du sang délivré avec le patient (groupe, identité complète, prescription, test ultime), répéter le contrôle ultime.

• En déterminer la nature : fièvre, fièvre/frissons, urticaire et manifestations cutanées, hausse tensionnelle, anxiété et oppression thoracique, douleurs lombaires et/ou abdominales, émission d'urines colorées, état d'hypotension voire de collapsus, infection bactérienne.

• En déterminer l'importance et la gravité : évaluer l'état respiratoire du patient, la fréquence du pouls et sa consistance, la pression artérielle et son écart par rapport à la PA prétransfusionnelle.

### Complications engageant le pronostic vital

**Accident toxi-infectieux ou syndrome frissons-hyperthermie (gravité majeure)**

- **Survient dès les premières gouttes.** Peut s'accompagner de choc hémodynamique.
- Arrêt complet de la transfusion.
- Hémocultures chez le patient.
- Antibiothérapie large, couvrant notamment les bacilles Gram négatif.
- **Antipyrétiques** non salicylés (**paracétamol**).
- Avertir la réanimation.
- L'ensemble de la poche et du dispositif transfusionnel est adressé au laboratoire de bactériologie, pour culture.

**Accident hémolytique aigu (incompatibilité ABO ou RAI positives et sang non compatibilisé)**

- Frissons, hyperthermie avec douleurs lombaires, hémoglobinurie pouvant aller jusqu'au choc hémolytique, collapsus cardio vasculaire, CIVD, insuffisance rénale.
- Arrêt immédiat de la transfusion, conservation de la (des) poche(s) pour vérification immunologique.
- État de collapsus et insuffisance rénale : appeler le réanimateur de garde.
- Respecter les RAI sur les prochaines transfusions

**TRALI (Transfusion Related Lung Injury)**

- Détresse respiratoire aigue type SDRA, survenant 2 à 6 h post-transfusion.
- Traitement en réanimation.

### Autres complications

**Hausse tensionnelle**

- Ralentir la transfusion.
- Utiliser des **diurétiques** (**furosémide** 20 mg).
- Espacer les transfusions de différentes poches (1 par demi-journée).

**Anxiété et oppression thoracique (en général d'origine allergique)**

- Ralentir la transfusion.
- **Antihistaminiques.**

## TRANSFUSION SANGUINE (4)

### Manifestations cutanées

Justification des **antihistaminiques** et/ou rajout des **corticoïdes** en cas de résistance.

### Frissons en cours de transfusion

- La survenue d'intolérance en cours de transfusion indique rarement un accident infectieux, bien qu'il n'y ait pas de règle absolue.
- Survient **en particulier avec les plaquettes**.
- Arrêt temporaire de la transfusion. Faire des hémocultures chez le patient de façon systématique
- Antipyrétiques et **antihistaminiques** en injection ± **corticoïdes** si frissons extrêmes.
- Une antibiothérapie peut s'avérer nécessaire s'il y a doute sur la nature infectieuse de la fièvre post/prétransfusionnelle.
- RAI systématique au 8-10<sup>e</sup> j, recherche d'anti-HLA à distance.

- La répétition de ces réactions conduit à :
  - une préparation prétransfusionnelle par **antihistaminiques** et/ou **corticoïdes** ;
  - une déplasmatisation des concentrés plaquettaires.

### Autres accidents à prévoir (mesures préventives éventuelles)

- Purpura post-transfusionnel immunologique.
- Maladies virales diverses.
- GVH chez les patients immunodéprimés.
- Surcharge en fer.
- Toxicité de citrate ou hyperkaliémie en cas de transfusions massives.

**Dans tous les cas**, il convient de conserver les données sur fiche transfusionnelle et d'assurer la traçabilité des produits. Déclaration obligatoire au correspondant d'hémovigilance et/ou à l'Établissement français du sang.



## TRANSFUSION SANGUINE (5)

### Tarifs des produits sanguins (arrêté du 12 avril 2011)

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)	183,84 €
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse	524,84 €
Concentré de plaquettes standard, concentration minimale de $1 \times 10^{11}$ plaquettes par poche	75,02 €
puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de $0,5 \times 10^{11}$	37,51 €
Concentré de plaquettes d'aphérèse, concentration minimale de $2 \times 10^{11}$ plaquettes par poche	217,56 €
puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de $0,5 \times 10^{11}$	54,39 €
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent ou par bleu de méthylène (200 mL au minimum)	97,21 €
Forfait pour concentrés globules rouges autologues	430,80 €
Majoration pour transformation « mélange de concentrés de plaquettes standard » (part fixe)	22,32 €
Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)	24,92 €
Majoration pour transformation « cryoconservé »	118,28 €
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »	3,23 €
Majoration pour qualification « phénotype étendu »	15,00 €
Majoration pour qualification « CMV négatif »	10,61 €
Majoration pour transformation « déplasmatisé »	71,81 €
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)	14,52 €
Majoration pour transformation « réduction de volume »	22,82 €
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »	24,04 €

### CONSENSUS

- [1] Transfusions de globules rouges en hématologie et en oncologie, *Afssaps*, 2002
- [2] Transfusion de plasma thérapeutique : produits, indications, *ANSM*, 2012

## GREFFE DE MOELLE (1)

Sous le terme de greffe de moelle, on englobe deux techniques très différentes et qui ne posent pas les mêmes problèmes en termes de réalisation, de surveillance et de complications potentielles :

- *l'allogreffe* est l'apport d'un système hématopoïétique et immunitaire nouveau et étranger au receveur, rendant la procédure complexe à court et long terme ;
- *l'autogreffe* utilise les cellules souches hématopoïétiques (CSH) du patient (auto-transfusion) et constitue un support cellulaire pour pouvoir réaliser une chimiothérapie intensive.

### Problème global

Il s'agit d'une technique thérapeutique lourde, pour le patient et pour la société. Les indications de l'allogreffe peuvent concerner les pathologies non malignes (hémoglobinopathies, déficits immunitaires) nécessitant l'apport d'un nouveau système hématopoïétique et/ou immunitaire.

Les indications de l'auto et allogreffe concernent majoritairement les néoplasies hématologiques et certains cancers solides.

Les indications consensuelles sont en perpétuelle réévaluation et les techniques évoluent rapidement. Les décisions sont donc à prendre par des équipes et centres spécialisés.

### Allogreffe

- Procédure associant :
  - *l'apport d'un système hématopoïétique et immunitaire allogénique* : pour les pathologies malignes, l'objectif est l'apport de cellules immunitaires qui vont reconnaître et détruire les cellules tumorales du patient (receveur) = effet du greffon contre la maladie (GVM) ;
  - *une chimiothérapie de conditionnement* permettant en priorité l'immunosuppression et la prise de greffe, mais aussi le contrôle de la maladie ;
  - *un traitement immunosuppresseur* post-allogreffe.

### • Problématiques :

- existence d'un **donneur HLA compatible** (minimum HLA A, B, C, DR, DQ), familial (génomique) ou ficher (phénotypique). Des donneurs alternatifs (sang de cordon ou donneurs haplo [semi]-identiques) peuvent être discutés selon les indications ;
- **balance GVH/GVM** : les cellules immuno-compétentes du greffon reconnaissent et détruisent les cellules normales du receveur (effet du greffon contre l'hôte : GVH) se traduisant par une mortalité et une morbidité importantes mais parallèlement ont un effet bénéfique sur le contrôle de la maladie (effet du greffon contre la maladie : GVM) en détruisant les cellules tumorales. À ce jour, la découverte de thérapeutiques immunosuppressives permettant de moduler GVH et GVM reste un challenge.

### Modalités pratiques

- Bilan prégreffe : évaluation du terrain selon des scores de comorbidités ayant un impact sur le choix du conditionnement
- Obtention des CSH :
  - CSH médullaires par ponction de la crête iliaque postérieure sous anesthésie générale. Richesse nécessaire  $2-3 \times 10^8$  cellules nucléaires/kg de poids du receveur ;
  - CSH périphériques après mobilisation par **G-CSF (filgrastim ou lenograstim)**  $10 \mu\text{g/kg/j}$  et cytophérèse. Richesse nécessaire  $4 \times 10^6$  CD34/kg ;
  - CSH de sang de cordon.
- Conditionnement (secteur protégé, chambres à flux laminaire et pression positive) : les doses cytotoxiques et immunosuppressives varient selon l'effet désiré sur la tumeur, la source du greffon et le terrain compatible. Schématiquement, les conditionnements dits myéloablatifs entraînent une destruction totale hématologique (effet antitumoral) et immunitaire ; les conditionnements à intensité réduite privilégient une immunosuppression permettant la prise de greffe, tout en préservant temporairement le système hématopoïétique de l'hôte (faible effet antitumoral et plus faible toxicité).
- Transfusion du greffon le jour de son recueil, rarement congélation avant.

## WILLEBRAND (MALADIE DE)

### Classification

#### Sous-types de la maladie de Willebrand

Type	1	2A	2B	2N	3
Déficit	Quantitatif	Qualitatif Baisse de l'affinité pour le Gp Ib	Qualitatif Augmentation de l'affinité pour le Gp Ib	Qualitatif Baisse de l'affinité pour le FVIII	Quantitatif
Transmission autosomique	Dominante	Dominante	Dominante	Récessive	Récessive

### Mesures générales

- Informer le patient et son entourage des risques hémorragiques et des mesures immédiates à envisager.
- Proscrire les médicaments susceptibles d'aggraver les troubles d'hémostase.
- Chez les femmes non ménopausées, prévoir une contraception hormonale.
- Prévoir une vaccination anti-hépatite B en prévision des transfusions.
- Assurer la prise en charge administrative du patient, sa surveillance et son éducation par une équipe médicale spécialisée.
- Carnet Willebrand nominatif du patient à porter sur soi (indique le type de Willebrand et l'efficacité ou non de la desmopressine).

### Traitements disponibles

- Antifibrinolytique type **EXACYL** 15 mg/kg x 3/j PO si saignement ORL, ménorragies. Contre-indication dans les situations à risque thrombotique (ex : hématurie).
- **Desmopressine** :
  - contre-indiquée dans le type 2B ;
  - inefficace dans le type 3 ;
  - à administrer uniquement si le patient est répondeur : efficace dans le type 1, mais efficacité  $\pm$  constante dans les types 2A et 2N : le test est fait hors situation d'urgence et la sensibilité est connue et écrite dans le carnet patient ;
  - **MINIRIN** 0,5  $\mu$ g/kg IVL 30 min ou **OCTIM** 2 pulv. nasales. À répéter, toutes les 12 h, max 3-4 fois ;
  - restriction hydrique (risque hyponatrémie).
- Transfusion de concentrés plasmatiques riches en **facteur von Willebrand (FvW)** :
  - **WILFACTIN** = FvW seul : indiqué si FvW spontané > 40 % ou hémorragie modérée ;

- **WILSTART** = FvW + FVIII : 40-60 UI/kg si forme sévère ; 20-40 UI/kg si déficit modéré ;
- à répéter toutes les 12 à 24 h.

### Traitement curatif d'une hémorragie

#### Accidents mineurs

- Compression de la lésion, méchage des épistaxis, colle hémostatique en cas d'avulsion dentaire.
- Antifibrinolytiques.
- Discuter un traitement hémostatique.

#### Accidents importants ou patient non répondeur à la desmopressine

- Concentrés plasmatiques de **FvW**.
- Transfusion de concentrés érythrocytaires en cas de baisse majeure de l'hémoglobine (cf. Transfusions).

#### Surveillance sous desmopressine

- Risque de rétention hydrique : en cas d'injections répétées, prévoir la restriction hydrique.
- Risque de tachycardie : surveiller le cœur et réduire les doses chez les personnes avec troubles cardiovasculaires et les personnes âgées (0,2 g/kg).

### Traitement préventif en cas d'intervention chirurgicale ou dentaire

**Desmopressine (MINIRIN)** à la dose de 0,3  $\mu$ g/kg IVL 30 min, juste avant l'intervention, répétée 8 à 12 h après si nécessaire.

Concentrés de **FvW** si risque de saignement postopératoire prolongé. Les taux des facteurs VIII et FvW doivent être maintenus à un niveau suffisant pour permettre la cicatrisation (80 % au début et 40 % par la suite).

## MALADIE DE WALDENSTRÖM

Pathologie incurable à ce jour. L'objectif est le contrôle et la prévention des symptômes et complications liés à la maladie. Les patients doivent être inclus dans des protocoles de recherche autant que possible.

### Score pronostique international (ISSWM : International Scoring System for Waldenström Macroglobulinemia)

Les facteurs pronostiques identifiés à ce jour sont (1 point par facteur) :

- âge > 65 ans ;
- Hb < 11,5 g/dL ;
- $\beta_2m$  > 3 mg/L ;
- plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup> ;
- taux IgM monoclonales > 70 g/L.

On distingue 3 groupes pronostiques : faible (score 0-1), intermédiaire (âge ou 2) et élevé (≥ 3).

### Critères d'initiation du traitement [1]

- IgM symptomatique (hyperviscosité, cryoglobulinémie, neuropathie invalidante, troubles de l'hémostase, maladie des agglutinines froides).
- Présence de signes généraux en rapport avec la maladie (sueurs nocturnes, perte de poids).
- Cytopénies (Hb < 10 g/dL et/ou plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup>).
- Masse tumorale importante.

En absence de critères de traitement, une surveillance simple s'impose et la médiane de survie des patients peut atteindre 15 ans.

### Traitement spécifique de 1<sup>re</sup> ligne [2]

La maladie de Waldenström est une pathologie du sujet âgé. L'évaluation des comorbidités et de l'état général est un

préalable indispensable à l'initiation du traitement.

### Patients en bon état général (Fit)

L'association **rituximab** + chimiothérapie est la référence actuelle.

Parmi les chimiothérapies pouvant être associées :

- **cyclophosphamide** + **dexaméthasone** (R-CD) semble à ce jour la meilleure option en termes de toxicité et efficacité (87 % de réponse globale) ;
- la **bendamustine** a montré une excellente efficacité et une bonne tolérance ;
- le **bortézomib** semble particulièrement prometteur et est en cours d'évaluation ;
- les **analogues des purines** (**fludarabine** ou **cladribine**).

### Patients ayant des comorbidités (Unfit)

Monochimiothérapie par **fludarabine**, **chlorambucil**, **bendamustine**, associés ou non au **rituximab** sont à discuter au cas par cas sachant que la **fludarabine** semble être supérieure au **chlorambucil**.

### Particularités

- Pour les patients jeunes à score ISSWM élevé, une chimiothérapie R-CHOP peut être proposée, éventuellement suivie d'une intensification thérapeutique.
- L'administration de **rituximab** peut être associée à un effet *flare* d'augmentation transitoire de l'IgM. Ceci est à prendre en compte en cas de taux élevé ou de syndrome d'hyperviscosité et peut être prévenu par l'administration préalable de **dexaméthasone** et/ou échanges plasmatiques.

### Traitements associés

- *Échanges plasmatiques* en cas d'hyperviscosité.
- Surveillance du risque infectieux.

## CONSENSUS

[1] Maladie de Waldenström, *SFH*, 2009

[2] Diagnosis and management of Waldenström macroglobulinemia : Mayo stratification of macroglobulinemia and risk-adapted therapy (mSMART) Guidelines, *Mayo Clinic*, 2010

## THROMBOPÉNIE INDUITE PAR L'HÉPARINE (TIH) (1)

C'est une complication iatrogène immune peu fréquente mais potentiellement sévère. Le risque de TIH est maximal aux environs du 10<sup>e</sup> j d'un traitement par héparine. La TIH survient quasi exclusivement avec les héparines standard mais peut survenir très rarement avec les HBPM.

### Diagnostic de probabilité

Le diagnostic repose sur la combinaison de probabilité clinique et biologique aboutissant à un organigramme décisionnel.

### Anamnèse et examen clinique

- Thrombopénie :
  - diminution du chiffre des plaquettes > 50 % du maximum de la numération avant traitement ;

– baisse survenant entre 5 et 14 j du début du traitement (peut survenir dans les 24 h en cas de réexposition).

- Thrombose artérielle ou veineuse (généralement après J5 d'héparine et jusqu'à J30 après arrêt de l'héparine).
- Nécrose cutanée au point d'injection.
- Absence d'autre cause de thrombopénie.

### Score des 4 T (cf. Encadré)

Il s'agit d'un score de calcul de probabilité. Il ne remplace pas le jugement clinique. La valeur prédictive négative d'un score faible est de 99,8 %.

La valeur prédictive positive d'un score intermédiaire ou haut est de 14 et 64 % respectivement.

### Probabilité de thrombopénie induite par l'héparine : score des 4 T

#### Thrombopénie relative

Chute > 50 % et nadir $\geq 20000/\text{mm}^3$ .....	2
Chute 30-50 % ou nadir 10000-19000/ $\text{mm}^3$ .....	1
Chute < 30 % ou nadir < 10000/ $\text{mm}^3$ .....	0

#### Timing de survenue de la thrombopénie

J5-J10 ou $\leq$ J1 si exposition $\leq$ 30 j .....	2
> J10 ou $\leq$ J1 si exposition 31-100 j .....	1
ou timing incertain (NFS manquante) mais compatible thrombopénie immunoallergique .....	1
< J4 sans exposition récente .....	0

#### Thrombose ou autre manifestation clinique

Nouvelle thrombose documentée ; nécrose cutanée .....	2
Réaction systémique aiguë après bolus IV HNF .....	2
Extension ou récurrence de thrombose .....	1
Thrombose suspectée non prouvée ; plaques érythémateuses .....	1
Aucune .....	0

#### Autre cause de thrombopénie

Aucune évidente .....	2
Possible .....	1
Définie .....	0

Probabilité pré-test : 6-8 haute ; 4-5 intermédiaire ; 0-3 faible

### Diagnostic biologique

- Recherche d'anticorps anti PF4 ou anti héparine (Se > 95 % ; Sp 50-89 %).
- Tests fonctionnels : anticorps induisant l'activation plaquettaire en présence d'héparine (Se 90-98 % ; Sp 90-95 %).

### Traitement

Le traitement doit être aussi précoce que possible.

### Anticoagulants non héparines

Le **danaparoïde (ORGARAN)** est le plus couramment utilisé.

L'**argatroban (ARGANOVA)** peut être privilégié en cas d'insuffisance rénale, mais augmente l'INR (attention si associé aux **AVK**). Les nouveaux anticoagulants oraux n'ont pas été évalués dans cette indication et ne doivent pas être proposés en dehors de protocoles de recherche.

## TRAITEMENTS APPARENTÉS À L'HÉPARINE (1)

## ■ Danaparoïde

ORGARAN					
Prophylaxie chez sujets aux ATCD de thrombose induite par héparine (TIH) : 750 UI anti-Xa x 2 inj. SC/j Traitement préventif en cas de TIH : 750 UI x 3 inj./j (1 250 UI x 3/j si > 90 kg) Traitement curatif des manifestations thromboemboliques en cas de TIH : 2 500 U anti-Xa en bolus IV suivi d'un schéma en IV ou en SC pendant 5 à 7 j	10 amp. 750 UI anti-Xa/0,6 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antithrombotique du groupe de l'héparine mais n'ayant pas de réactivité croisée avec l'anticorps héparine-dépendant.

Faible risque hémorragique à dose thérapeutique.

## INDICATIONS

Prophylaxie de la maladie thromboembolique en chirurgie orthopédique et oncologique.

Prophylaxie de la maladie thromboembolique chez les sujets avec une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) ou aux antécédents de TIH. Traitement curatif des thromboses et embolies en cas de TIH ou d'antécédent de TIH.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **danaparoïde**.

Purpura thrombocytopénique idiopathique.

Accident vasculaire cérébral aigu.

Saignement non contrôlé.

Endocardite bactérienne aiguë.

HTA sévère non contrôlée.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Ulcère gastro-duodénal évolutif.

Rétinopathie diabétique.

Déconseillé pendant l'allaitement.

Test d'agrégation plaquettaire *in vitro* positif avec le **danaparoïde** en cas de TIH ou de thrombopénie sous anticoagulant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLI

Surveillance des plaquettes.

Mesure de l'activité anti-Xa en cas d'insuffisance rénale et de poids > 90 kg (objectif : anti-Xa entre 0,2 et 0,4 UI/mL).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, hémorragie, ecchymose, hématome au point d'injection.

Thrombopénie.

Réaction d'hypersensibilité.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association possible avec les anticoagulants oraux, l'**aspirine**, les **AINS**, les **corticostéroïdes** mais avec prudence car risque hémorragique majoré.

## THROMBOPÉNIE INDUITE PAR L'HÉPARINE (TIH) (2)

### Relais par AVK

Envisagé seulement si les plaquettes sont  $> 150\,000/\text{mm}^3$ .

L'anticoagulant doit être maintenu jusqu'à l'obtention de l'INR cible.

La durée de l'anticoagulation doit être minimum 30 j (risque de thrombose jusqu'à J30 après arrêt de l'héparine) et 3 mois en cas de thrombose associée.

### Transfusion de plaquettes contre-indiquée

Elle est risquée (activation et thrombose) donc contre-indiquée sauf en cas d'hémorragie avec risque vital.


### Réintroduction de l'héparine (standard ou HBPM)

La réintroduction est risquée et contre-indiquée dans les 3 mois suivant la TIH.

En cas de nécessité (durant la chirurgie cardiaque essentiellement), l'introduction d'héparine ne se fait qu'après contrôle de l'absence d'Ac circulants.

Dans les autres cas, le **danaparoïde** ou les anticoagulants oraux sont indiqués.

### Algorithme décisionnel devant une suspicion de TIH



## MGUS

La gammopathie monoclonale de signification indéterminée (*Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance* - MGUS) ou encore gammopathie monoclonale bénigne est considérée comme un état pathologique précurseur du myélome multiple (MM).

La progression vers un MM est de 1 % par an.

Il faut noter que les MGUS à IgM sont le plus souvent précurseurs d'une hémopathie lymphoïde (maladie de Waldenström) et que les MGUS à IgG/IgA peuvent être rarement précurseurs d'une hémopathie lymphoïde (lymphome, LLC).

### Définition

Selon les critères IMWG (*International Myeloma Working Group*), elle se définit par :

- la présence d'une immunoglobuline monoclonale  $< 3$  g/dL ;

ET

- $< 10$  % de plasmocytes médullaires ;

ET

- l'absence de symptômes CRAB (hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie, atteinte osseuse).

### Facteurs de risques et éléments décisionnels

Certaines caractéristiques au diagnostic sont des facteurs de risque (FDR) de progression accélérée vers un MM.

Ces FDR varient selon les équipes et sont

l'objet de recherche active, donc à ce jour non consensuels.

On peut citer :

- Ig monoclonale  $> 1,5$  g/dL ;

- MGUS non IgG ;

- dosage des chaînes légères libres sériques (sFLC) : ratio kappa/lambda anormal ( $< 0,26$  ou  $> 1,65$ ) ;

- cytométrie en flux sur les plasmocytes médullaires : ratio plasmocytes anormaux/normaux  $> 95$  %.

### Modalités de prise en charge

#### Abstention thérapeutique

L'attitude consensuelle est l'abstention thérapeutique.

Il n'y a pas lieu de proposer un traitement en dehors de protocoles de recherche.

Les **biphosphonates** peuvent être envisagés en cas d'ostéoporose, de façon non consensuelle.

#### Surveillance

- MGUS à faible risque (0 FDR) : biologie (électrophorèse de protéines plasmatiques [EPP], NFS, calcémie, créatinine) à 6 mois puis tous les 2-3 ans.

- MGUS à haut risque ( $> 1$  FDR) :

- le bilan initial doit être complété par une analyse cytogénétique en FISH (del(13), t(4;14), del(17p)) et une IRM osseuse (rachis et bassin, voire corps entier) ;

- la surveillance inclut biologie à 6 mois puis tous les ans.



## MYÉLODYSPLASIES (1)

Les myélodysplasies constituent un ensemble hétérogène de maladies caractérisées par des altérations clonales des cellules souches hématopoïétiques et des anomalies du microenvironnement

médullaire aboutissant à une hématopoïèse inefficace.

La dernière classification de l'OMS (2008) rend compte de cette hétérogénéité.

### Classification schématique des MDS selon l'OMS 2008

Nom	Caractéristiques médullaires au diagnostic
Cytopénies réfractaires avec dysplasie unilignée	< 5 % blastes < 15 % sidéroblastos
Anémie réfractaire Neutropénie réfractaire Thrombopénie réfractaire	
Anémie réfractaire avec sidéroblastos en couronne	< 5 % blastes > 15 % sidéroblastos
Cytopénies réfractaires avec dysplasie multilignée	> 10 % progéniteurs dysplasiques dans > 2 lignées < 5 % blastes ± 15 % sidéroblastos
Anémies réfractaires avec excès de blastos AREB1 AREB2	5-9 % blastes 10-19 % blastes
MDS non classables	< 10 % de dysplasie médullaire
MDS del(5q)	del(5q) isolée (généralement plaquettes N ou hautes sur la NFS)
Leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC)	

L'évolution est marquée par :

– les cytopénies et symptômes associés ;

– l'évolution vers une leucémie aigue myéloïde.

## MYÉLODYSPLASIES (2)

### Éléments décisionnels

#### Score pronostique IPSS [1]

Il repose sur le pourcentage de blastes médullaires, les caractéristiques cytogénétiques et le nombre de cytopénies.

Le caryotype médullaire (ou sanguin si impossible) doit être réalisé dès la suspicion diagnostique.

**L'existence d'une del(5q) isolée entraîne le diagnostic d'une entité séparée : MDS del(5q).**

Le score IPSS est décisionnel et définit les MDS :

- à faible risque : score faible ou intermédiaire 1 ;
- à haut risque : score intermédiaire 2 ou élevé.

#### Score IPSS-R (IPSS révisé en 2012)

Des nouvelles anomalies cytogénétiques ont été décrites et ont permis une définition plus fine des sous groupes pronostiques (très faible, faible, intermédiaire, élevé, très élevé). Le score pronostique IPSS-R doit être calculé au diagnostic pour tous les patients.

L'utilisation de l'IPSS-R dans les décisions thérapeutiques reste à évaluer.

#### Score de prédiction de réponse aux agents stimulant l'érythropoïèse (ASE)

Il repose sur les besoins transfusionnels et le dosage de l'EPO sérique : meilleure probabilité de réponse si 0 à 1 point.

- Transfusion > 2 CG/mois (1 point).
- EPO sérique > 500 UI/mL (1 point).

### Traitements à envisager

#### Transfusions érythrocytaires et traitement chélateur du fer

Seuil critique transfusionnel : < 8 g/dL, mais varie selon la tolérance clinique.

Chélation du fer dès > 20 CG transfusés ou ferritine > 1 000 µg/mL.

La **déféroxamine** (40-50 mg/kg/j, 5-6 j/sem. en SC) doit être privilégiée en 1<sup>re</sup> ligne.

#### Facteurs de croissance

Les **agents stimulant l'érythropoïèse (ASE)** sont indiqués dès que Hb < 10 g/dL. Leur utilisation améliore significativement la qualité de vie.

À envisager le plus tôt possible, car les patients transfusés répondent moins bien. Posologies élevées :

- **époétine alpha** ou **bêta** : 30 000 UI x 1/sem. ;
- **darbépoétine alpha** : 150 µg/sem. ou 300 µg/2 sem.

La réponse est évaluée à 8 sem. En l'absence de réponse, doubler les posologies et/ou l'ajout de G-CSF peut permettre une réponse sur l'Hb.

L'Hb ne doit pas dépasser 12 g/dL.

Pour les MDS avec sidéroblastes, indication à associer d'emblée le **G-CSF**.

Le traitement est maintenu jusqu'à l'échappement.

#### Lénalidomide

Indiqué dans les MDS del(5q), avec blastes médullaires < 5 % et ne répondant pas ou plus aux ASE. Administré à faible dose (10 mg/j).

#### Immunosuppresseurs

Sérum antilymphocytaire (SAL), préférentiellement de cheval : à discuter uniquement pour les patients < 60 ans, sans comorbidités majeures et les MDS à faible risque.

**Ciclosporine** 5 mg/kg/j en 2 prises, seule ou après le SAL.

## MYÉLODYSPLASIES (3)

### Allogreffe de CSH

Seul traitement pouvant conduire à une guérison.

Bénéfice débattu dans les MDS à faible risque (IPSS bas, int-1). Indication retenue dans les MDS à haut risque (IPSS int-2, haut). Le score de comorbidités préallogreffe de l'EBMT entre en compte pour la prise de décision.

Précédée d'une chimiothérapie d'induction type LAM (anthracycline-cytarabine) ou d'agents hypométhylants selon le pourcentage de blastes médullaires.

### Agents hypométhylants

- La **5-azacitidine** (75 mg/m<sup>2</sup> SC pendant 7 j, 21 j de pause) permet une amélioration significative des cytopénies et de la survie globale. Elle est indiquée dans les MDS haut risque, chez les patients non éligibles à l'allogreffe, mais son efficacité a aussi été rapportée dans les MDS sans cytogénétique péjorative. L'efficacité doit être jugée après minimum 6 cycles, et le traitement est poursuivi jusqu'à échappement.

- La **décitabine** a également démontré son effet mais les résultats obtenus sont à ce jour inférieurs (efficacité et tolérance) à ceux rapportés avec la 5-Aza.

### Chimiothérapie

Chimiothérapie intensive type LAM, suivie ou non d'allogreffe.

**ARACYTINE** à faible dose (efficacité démontrée inférieure à l'**azacitidine** dans les MDS haut risque).

### Algorithme décisionnel

Les modalités thérapeutiques sont en continue évaluation. Les patients doivent être dirigés vers de centres spécialisés.

### MDS faible risque (IPSS bas ou int-1)

L'objectif est le contrôle des cytopénies et l'amélioration de la qualité de vie.

MDS del(5q) : **ASE** en 1<sup>re</sup> intention. **Lénalidomide** en cas d'inefficacité ou échappement.

MDS score prédictif de réponse à l'EPO 0-1 : **ASE**. Sinon discuter **azacitidine** ou immunosuppresseurs (SAL).

La place de l'allogreffe est à discuter au cas par cas (notamment selon les besoins transfusionnels et la cytogénétique).

### MDS haut risque (IPSS int-2 ou élevé)

En plus du contrôle des cytopénies et l'amélioration de la qualité de vie, l'objectif est de freiner l'évolution vers une LAM. L'allogreffe est indiquée en 1<sup>re</sup> ligne si le patient est éligible et si une rémission complète est obtenue prégreffe. Pour cela, une chimiothérapie intensive type LAM doit être réalisée si > 10 % de blastes médullaires.

En absence d'allogreffe possible et selon la cytogénétique, discuter **azacitidine** ou chimiothérapie intensive.

### LMMC

L'**azacitidine** est indiquée en absence d'excès de blastes médullaires.

L'allogreffe précédée d'une chimiothérapie intensive doit être discutée au cas par cas.

### Traitement symptomatique

Il s'agit du traitement des neutropénies fébriles et du risque hémorragique, communs avec les pancytopénies d'autres causes.

L'administration de **G-CSF** est envisagée en cas d'infections récidivantes.

Les transfusions (plaquettes ou culots globulaires) doivent être réduites à leur strict minimum pour éviter les allo-immunisations. Les produits doivent être irradiés et phénotypés.

Le danazol peut être efficace en cas de thrombopénie.

### CONSENSUS

[1] Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques – Syndromes myélodysplasiques, HAS, 2008

## APLASIE MÉDULLAIRE IDIOPATHIQUE (1)

Il s'agit d'une maladie rare, nécessitant une prise en charge spécialisée et en urgence.

L'aplasie médullaire (*Aplastic Anemia* - AA) désigne une défaillance médullaire aboutissant à une ou plusieurs cytopénies.

Il s'agit d'une pathologie médullaire impliquant une anomalie intrinsèque de la cellule souche hématopoïétique et/ou du micro-environnement médullaire et/ou une dérégulation du système immunitaire. Elle doit être distinguée des pancytopenies post chimiothérapie.

Le diagnostic différentiel avec les myélodysplasies à moelle pauvre peut être difficile.

Le tableau initial peut comporter seulement une cytopénie (le plus souvent thrombopénie), et faire conclure à tort à une pathologie auto-immune.

### Variétés et étiologies

Différentes entités au sein des AA doivent être recherchées, dont :

- le **syndrome AA/HPN (hémoglobinurie paroxystique nocturne)**. Il s'agit d'une maladie clonale de la cellule souche médullaire. Le déficit en protéines de surface GPI ancrées rend les cellules susceptibles à l'attaque par le complément. L'existence d'un clone cellulaire caractéristique (clone HPN) est recherchée en cytométrie en flux. Le syndrome associe pancytopenie, hémolyse, hémoglobinurie et thromboses ;
- la **maladie de Fanconi** chez les sujets jeunes (rarement > 40 ans), et autres pathologies congénitales ;
- l'AA post-hépatitique (survenant dans les mois après une hépatite séronégative), post-grossesse, post-virale, etc. ;

- l'existence de prise de toxiques ou de médicaments (à rechercher sans retarder la prise en charge) ;
- Dans 60 % des cas aucune cause évidente ou association syndromique ne peut être retenue.

### Critères de sévérité

La profondeur des cytopénies oriente la décision thérapeutique.

#### AA sévère

- Moelle hypocellulaire (< 30 % de cellules hématopoïétiques résiduelles)
- ET > 2 critères parmi:
  - PNN < 500/mm<sup>3</sup> ;
  - plaquettes < 20 000/mm<sup>3</sup> ;
  - réticulocytes < 20 000/mm<sup>3</sup>.

#### AA très sévère

Critères identique sauf PNN < 200/mm<sup>3</sup>.

#### AA modérée

PNN > 500/mm<sup>3</sup>, absence de besoins transfusionnels.

### Traitements spécifiques

#### Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Seul traitement curatif.

Il faut privilégier un greffon de cellules souches médullaires et non des cellules souches périphériques. Les meilleurs résultats sont obtenus chez un receveur > 40 ans, avec un donneur génoidentique et un conditionnement associant sérum antilymphocytaire (SAL) + **ciclosporine** (CSA), suivie d'une prévention de la GVH par **CSA** + **méthotrexate**. Dans ce cas la survie globale à long terme peut atteindre 80 %.

Les donneurs alternatifs (phénoïdéniques, mismatch, cordon) sont envisagés selon les cas.

## APLASIE MÉDULLAIRE IDIOPATHIQUE (2)

### Immunosuppresseurs

#### ► Sérum antilymphocytaire

Le SAL de cheval donne de meilleurs résultats que le SAL de lapin et doit être privilégié.

Il est administré sur 4 à 5 j (40 mg/kg/j), associé à une courte corticothérapie (1 mg/kg/j, 15 j) pour prévenir la maladie sérique.

L'administration doit se faire sous surveillance rapprochée car risque d'anaphylaxie.

Le délai de réponse est environ 3 mois (dans 90 % des cas), mais peut être retardé jusqu'à 6 mois.

#### ► Cyclosporine A

Administrée par voie orale (10 mg/kg/j) ou IV, avec un objectif de résiduel entre 200-400 ng/mL en absence d'augmentation de la créatinine et d'une HTA. La durée est de 3 à 6 mois, et jusqu'à 1 an en cas de réponse.

#### ► Androgènes

Rares indications en rechute ou cas réfractaires.

#### ► Facteurs de croissance hématopoïétiques

Absence d'efficacité prouvée et risque possible d'évolution vers une LAM.

L'**eltrombopag** peut être proposé au sein de protocoles de recherche dans les AA réfractaires ou en rechute sans allogreffe possible.

#### ► Autres immunosuppresseurs

Le **micophénolate mofétil**, le **sirolimus**, le **tacrolimus** n'ont pas montré de bénéfice supérieur à remplacer ou s'ajouter à la **CSA** dans l'association **CSA** + **SAL**. L'utilisation de **cyclophosphamide** ou d'**alemtuzumab** augmente le risque infectieux et n'est pas recommandée en 1<sup>re</sup> ligne.

### Indications thérapeutiques [1]

#### Aplasie médullaire sévère ou très sévère

- Patients < 40 ans et donneur géno-identique : allogreffe en 1<sup>re</sup> ligne.

- Patients > 40 ans, ou pas de donneur géno-identique :

- association **SAL** + **CSA** en 1<sup>re</sup> ligne ;
- en absence de réponse, envisager une allogreffe phéno-identique ;
- en absence de donneur fichier, indication des immunosuppresseurs de 2<sup>e</sup> ligne (dont **alemtuzumab**) et discussion des greffes haplo-identiques, mismatch ou sang de cordon.

#### Aplasie médullaire modérée

- Patients jeune : **SAL** + **CSA**.
- Sujets âgés ou comorbidités : **CSA** seule ou support transfusionnel seul.

#### Aplasie médullaire/HPN

- En cas d'hémolyse et/ou thrombose : **éculizumab** (inhibiteur du facteur 5 du complément) selon les protocoles et indications dans l'HPN.
- Sinon : traitement comme l'AA classique.

#### Maladie de Fanconi

- Prise en charge pédiatrique dans la majorité des cas.
- Androgènes en 1<sup>re</sup> ligne (délai de réponse 3 mois).
- Allogreffe : doses de conditionnement adaptées car fragilité chromosomique. Les greffes de sang de cordon ont montré de bons résultats en absence de donneur familial.

### Traitements symptomatiques

Ils sont indispensables.

- Prévention et traitement des infections bactériennes et fongiques.
- Transfusion :
  - produits exclusivement irradiés (risque de GVH transfusionnelle) ;
  - limitation des transfusions car risque d'allo-immunisation ;
  - association aux **chélateurs du fer** (si programme transfusionnel au long cours).

## PRESCRIPTION D'UN PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE

## Protocole CMF-Cycle 3

Madame X.

née le 01/01/1954

le 03.06.2014

Poids : 55 kg. Taille : 1,63 m.

Surface corporelle : 1,52 m<sup>2</sup>

Hémogramme : OK

<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg/m <sup>2</sup>	soit 900 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>Méthotrexate</b>	40 mg/m <sup>2</sup>	soit 60 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>Fluorouracile</b>	600 mg/m <sup>2</sup>	soit 900 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>SOLUMÉDROL</b>	60 mg/m <sup>2</sup>	soit 90 mg	IV	Le 03.06.2014
<b>PRIMPÉRAN</b>	40 mg/m <sup>2</sup>	soit 60 mg	IV	Le 03.06.2014

#### CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXTRAVASATION DE CHIMIOTHÉRAPIE

- Arrêt de la perfusion tout en conservant l'aiguille ou le cathéter en place.
- Aspirer 3 à 5 mL de sang pour retirer du médicament cytotoxique.
- Injecter, par l'aiguille laissée en place, 5 à 10 mL de **chlorure de sodium** isotonique pour diluer le médicament.
- Injecter l'antidote du produit cytotoxique s'il existe en cas d'impossibilité de recours à la chirurgie pour un médicament antivésicant :

- **Anthracyclines** :  
– 500 mg à 1 g de **SOLUMÉDROL** ou 1 à 2 mL d'**hydrocortisone hémisuccinate** en IV par le dispositif d'injection et/ou au pourtour immédiat de l'extravasation,  
– ou DMSO (50 à 99 %) en application locale :

15 mL sur une compresse pendant 15 min à répéter toutes les 4 à 6 h pendant 48 h ;

- **Alkylants** : **thiosulfate de sodium** à 10 % + 6 mL eau ppi par voie IV ou SC autour du point d'extravasation.
- Prévenir le médecin responsable de la chimiothérapie.
- Enlever l'aiguille.
- Aspirer, à l'aide d'une aiguille sous-cutanée, le maximum de liquide infiltré au pourtour du point d'injection. Anesthésie locale par spray ou crème si possible.
- Appliquer des compresses froides s'il existe un antidote pour éviter la diffusion, ou chaudes pour favoriser l'élimination du produit.
- Appliquer, toutes les 2 h, une pommade calmante sur la zone d'extravasation (**hydrocortisone** à 1 %, **pommade anti-œdémateuse**).
- Surveillance clinique.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (1)

### Protocole CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cyclophosphamide</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>		50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	J1-J7

### Protocole R-CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Cyclophosphamide</b>	IV	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	de J1 à J7

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (3) – LYMPHOMES B DIFFUS À GRANDES CELLULES

Le **lymphome B diffus à grandes cellules** est le plus fréquent des lymphomes dits agressifs.

Le traitement des lymphomes agressifs nécessite une décision collégiale préalable en RCP dédiée.

### Éléments décisionnels

#### Stade Ann Arbor

Cf. *supra*.

#### Score pronostique : IPI (*International Prognostic Index* - révisé)

Il attribue 1 point par critère : risque bas (0), intermédiaire (1-2), haut (3-5).

- Âge > 60 ans.
- Nombre d'atteintes extraganglionnaires > 1.
- LDH > 1N.
- PS > 2.
- Stade Ann Arbor > III/IV.

#### Sous type : GC (centre germinatif) versus non GC

La distinction se fait selon le profil d'expression génique de la tumeur déterminant l'origine du lymphocyte B tumoral provenant du centre germinatif ou autre. Cette information nécessite une technique longue et non compatible avec le délai d'initiation du traitement à ce jour. Elle sera néanmoins utile dans la décision thérapeutique dans l'avenir et est demandée dans la plupart des protocoles de recherche clinique.

### Indications thérapeutiques

- *Sujets d'âge < 60 ans*
- Chimiothérapie :
  - R-CHOP (cycles tous les 21 j) : 6 à 8 cycles selon le stade Ann Arbor et l'IPI ;
  - R-ACVBP : alternative plus intense au R-CHOP pour les stades III/IV et/ou IPI haut. Elle aurait aussi un bénéfice dans les sous types « non GC ».
  - Autogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> ligne pour les stades III/IV et/ou IPI haut et chimio-

sensibles, (généralement protocole R-ACVBP + **méthotrexate** haute dose + autogreffe).

- Radiothérapie : surtout indiquée en IFRT (*Involved Field Radiotherapy*) pour les masses tumorales localisées et surtout bulky. Pas de bénéfice démontré dans les autres cas.

L'évaluation par PET-TDM en cours de traitement permet un ajustement thérapeutique dans les protocoles.

- *Sujets d'âge > 60 ans*
- R-CHOP (tous les 21 j) x 8 cycles.
- Âge > 80 ans : R-mini-CHOP (moitié dose).
- Adaptation de l'utilisation de l'**anthracycline** à la fonction cardiaque.

- *Rechutes*
- Chimiothérapie de rattrapage à base de **sels de platine** (ex : R-DHAP, R-ICE).
- Autogreffe : indication systématique après obtention d'une réponse post-chimiothérapie de rattrapage.
- Allogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> rechute pour les rechutes à haut risque (stade diffus, IPI haut, précoces).

#### ► *Cas particulier des lymphomes indolents transformés*

Le pronostic est réservé.

Le traitement doit prendre en compte le passé thérapeutique (notamment l'utilisation d'**anthracyclines**).

Les chimiothérapies de type « Lymphome diffus à grandes cellules » s'appliquent. Ici l'autogreffe en 1<sup>re</sup> ligne doit être proposée.

- *Prophylaxie neuroméningée*
- Systématique en cas d'atteinte ophtalmique, ORL, épidurale, extraganglionnaire particulière (testicules, sein, surrénales, rein), stades III/IV (notamment BOM+), IPI haut (notamment LDH élevées).
- Repose sur l'injection intrathécale de **méthotrexate** ± **cytarabine** à chaque cycle de R-CHOP (max 3 inj.) ou cycle de chimiothérapie complémentaire par **méthotrexate** haute dose IV.



## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (2)

### Protocole R-DHAP - Lymphomes du manteau

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (CYCLE DE 21 J)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Dexaméthasone</b>	40 mg	PO	J3, J4
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	2 000 mg/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1

### R-ICE – Lymphome B diffus à grandes cellules

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (J1 = J14)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Isofosfamide</b>	5 g/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1 à J3
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1 à J3

### BEAM - Intensification - Autogreffe - Lymphomes

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	200 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Carmustine</b>	300 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-6
<b>Melphalan</b>	140 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-2

#### SURVEILLANCE

Toxicité immédiate (vomissements) ou différée (hémogramme, alopecie).

Efficacité après 2 séries de chimiothérapie : si insuffisante changer de protocole; éventuellement chimiothérapie intensive avec support de cellules souches sanguines.

#### COMPLICATIONS RETARDÉES

Deuxième cancer généralisé (leucémie aiguë myéloïde) ou localisé dans le territoire irradié.

## ANTINÉOPLASIQUES (1) – ALKYLANTS (1)

## ■ Altrétamine

<b>HEXASTAT</b>					
Prise orale 150 à 250 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j toutes les 3 sem. ou pendant 14 j/mois	25 gél. 100 mg	21,34	I	100 %	0,85

## ■ Busulfan

<b>MYLERAN</b>					
Prise orale de 3 à 5 mg/m <sup>2</sup> /j ou 4 à 6 mg/j, puis adaptée en fonction des résultats de l'hémogramme : en général de 1 à 3 mg/j en entretien	25 cp. 2 mg	69,83	I	100 %	2,79
<b>BUSILVEX</b>					
Indication : conditionnement avant greffe de CSH A. : 0,8 mg/kg IV sur 2 h toutes les 6 h pendant 4 j (16 doses)	8 amp. 10 mL (6 mg/mL)	HOP	I		

## ■ Carmustine

<b>BICNU</b>					
Perfusion IV dans 125 à 250 mL de solution isotonique en 1 à 2 h, à l'abri de la lumière	1 fl. lyophilisat 100 mg + fl. solv. 3 mL d'éthanol pur incompatible avec PVC	HOP	I		

## ■ Chlorambucil

<b>CHLORAMINOPHÈNE</b>					
Prise orale avant le repas 4 à 8 mg/m <sup>2</sup> /j ou 0,1 à 0,2 mg/kg/j pendant 2 à 3 sem. ou 6 à 10 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j/mois Les doses sont ensuite adaptées au contrôle de l'hémogramme	30 gél. 2 mg	22,10	I	100 %	0,74

## ■ Cyclophosphamide

<b>ENDOXAN</b>					
Prise orale : 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> /j en continu ou 150 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 15 j Posologie individuelle selon la pathologie et la réponse au traitement E. 150 à 1200 mg/m <sup>2</sup> A. 500 à 4 000 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem. Administrés en 1 à 3 j à chaque cycle ou 2 inj. à 7 j d'intervalle	50 cp. 50 mg  1 fl. pour inj. 500 mg 1 fl. pour inj. 1 000 mg	12,74  HOP HOP	I	100 %	0,25

## ANTINÉOPLASIQUES (2) – ALKYLANTS (2)

## ■ Dacarbazine

<b>DÉTICÈNE</b>					
Reconstitution avec eau ppi Injection IV directe ou perf. IV courte (30 min à 1 h) avec protection de la lumière 400 à 1 000 mg/m <sup>2</sup> répartis sur 1 à 5 j toutes les 3 sem.	10 fl. 100 mg + 10 mL d'eau ppi	HOP	I		

## ■ Témzolomide

<b>TEMODAL</b>					
Prise orale 150 mg/m <sup>2</sup> /j pdt 5 j tous les 28 j si ATCD de chimiothérapie et risque d'aplasie Sinon 200 mg/m <sup>2</sup> /j pdt 5 j tous les 28 j	5 gél. 5 mg 5 gél. 20 mg 5 gél. 100 mg 5 gél. 140 mg 5 gél. 180 mg 5 gél. 250 mg 1 fl. pdre 100 mg pour perf. (2,5 mg/mL)	HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP	I I I I I I I		
IV lente de 90 min Idem forme orale					

## ■ Fotémustine

<b>MUPHORAN</b>					
Reconstitution avec solvant pour une concentration de 50 mg/mL Perf. IV dans glucosé à 5 % sur 1 h Protection de la lumière du flacon, de la tubulure et du bras 100 mg/m <sup>2</sup> à J1, J8 et J15 Repos de 4 à 5 sem. puis 100 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	1 amp de 200 mg + 1 fl. solv. + eau ppi qsp 4 mL	501,56	I	100 %	501,56

## ■ Hydroxyurée (ou hydroxycarbamide)

<b>HYDRÉA</b>					
En attaque : 30 à 60 mg/kg/j (1 à 4 gél. selon le poids), en entretien 15 à 30 mg/mm <sup>2</sup> /j (1 à 2 gél./j)	20 gél. 500 mg 100 gél. 500 mg	6,06 HOP	I I	100 %	0,30

## ■ Ifosfamide

<b>HOLOXAN</b>					
Lyophilisat reconstitué avec 14 mL d'eau ppi Dilution dans un soluté isotonique Injection IV ou intratubulaire ou perf. courte de 2 à 3 h ou perf. continue 1 à 3 g/m <sup>2</sup> de 1 à 3 j toutes les 3 sem. Association systématique avec du <b>mesna</b> ( <b>UROMITEXAN</b> ) à dose au moins égale pendant 12 à 24 h après la fin de la perfusion d' <b>ifosfamide</b>	1 fl. 1 000 mg 1 fl. 2 000 mg	HOP HOP	I I		

## ANTINÉOPLASQUES (3) – ALKYLANTS (3)

## ■ Melphalan

<b>ALKÉРАН</b>					
Prise orale en discontinu : 0,10 à 0,25 mg/kg/j pendant 4 à 7 j toutes les 3 à 6 sem. ou en continu 0,02 à 0,05 mg/kg/j puis adaptée en fonction de la surveillance de l'hémogramme Lyophilisat reconstitué avec le solvant Injection intratubulaire d'une perf. rapide de 15 à 30 min de sérum salé isotonique Posologie IV : 20 à 30 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	50 cp. pell. 2 mg 1 fl. 50 mg (10 mL) + 1 amp. solv.	9,64 HOP	I I	100 %	0,19

## ■ Mitomycine C

<b>AMÉTYCINE</b>					
Tumeur de la vessie, voie endovésicale Posologie : 10 à 20 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem. Application intravésicale : 40 mg/sem. pendant 8 sem. (curatif) ou 40 mg/2 sem. pendant 6 mois puis 1/mois (préventif) Adénocarcinome de l'estomac, du pancréas, du côlon, du rectum, du sein et leurs métastases Posologies variables : 10-15 mg/m <sup>2</sup> /cure, intervalle entre 2 cures : 4-8 sem., dose totale : 80 mg/m <sup>2</sup>	1 fl. 40 mg (pour inj. vésicale)	91,46	I	100 %	91,46
	1 fl. 10 mg	24,16	I	100 %	24,16
	5 fl. 10 mg	HOP			
	1 fl. 20 mg	45,81	I	100 %	45,81

## ■ Pipobroman

<b>VERCYTE</b>					
Traitement d'attaque : 1 mg/kg/j sous contrôle hebdomadaire de l'hémogramme, augmenté à 1,5 à 3 mg/kg/j en l'absence de réponse Traitement d'entretien : après rémission hématologique : 0,1 à 0,2 mg/kg/j ou 0,25 à 0,40 mg/kg 2 fois par sem.	30 cp. 25 mg	10,93	I	100 %	0,36

## ■ Procarbazine

<b>NATULAN</b>					
Prise orale 250 à 300 mg/j en 5 à 6 j, pour 1 à 2 sem./mois	50 gél. 50 mg	184,15	I	100 %	3,68

**ANTINÉOPLASIQUES (4) – ALKYLANTS (4)****■ Streptozocine**

<b>ZANOSAR</b>					
Posologie : 1 g/m <sup>2</sup> /sem. ou 500 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j toutes les 6 sem. Lyophilisat reconstitué dans 9,5 mL de soluté isotonique Injection IV lente ou en perf. courte de 15 à 30 min	1 fl. 1 g	HOP	I		

**■ Thiotepa**

<b>THIOTEPA GENOPHARM</b>					
Reconstitution avec eau ppi Injection IV directe ou intratubulaire, en perfusion continue dans soluté isotonique ou Ringer lactate, IM, intracavitaire, intravésicale, intrathécale Posologie : IV ou IM : 8 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j toutes les 4 à 6 sem. Perfusion continue : 12 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j ou 4 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 21 j Intracavitaire : 10 mg par injection Intrathécale : 1 à 10 mg/m <sup>2</sup> (1 mg/mL d'eau ppi)	1 fl. de 15 mg	HOP	I		

**■ Bendamustine**

<b>LEVACT</b>					
Leucémie lymphoïde chronique (en cas de CI à la polychimiothérapie) 100 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 1-2 j toutes les 4 sem. En cas d'insuffisance hépatique modérée : 70 mg/m <sup>2</sup> /j Lymphomes non hodgkiniens (en 2 <sup>e</sup> intention) 120 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 1-2 j toutes les 3 sem. En cas d'insuffisance hépatique modérée : 84 mg/m <sup>2</sup> /j Myélome multiple (en association avec la prednisone en cas de non-éligibilité à la greffe de cellules souches) 120-150 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 1-2 j toutes les 3 sem. En cas d'insuffisance hépatique modérée : 84-105 mg/m <sup>2</sup> /j	5 fl. 25 mg 20 fl. 25 mg 5 fl. 100 mg	HOP HOP HOP	I I I		

**ANTINÉOPLASQUES (5) – ALKYLANTS (5) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'action cytotoxique des **alkylants** est due à leur fixation covalente pour alkylation sur les atomes d'azote, de soufre ou de phosphore des bases d'ADN. Ils réalisent des ponts intra- ou interbrins d'ADN. La création de cassures et de sites apuriniques empêche la réplication de l'ADN et la transcription en ARN. Certains de ces médicaments doivent être métabolisés pour être activés en métabolite actif (ex : **cyclophosphamide**, **ifosfamide**).

**INDICATIONS**

Adénocarcinomes (sein, ovaire), carcinomes épidermoïdes, sarcomes des tissus mous, ostéosarcomes, sarcome d'Ewing, mélanome, cancer du testicule, gliome (**carmustine**). Lymphome malin non hodgkinien, leucémie aiguë, leucémies chroniques, myélome, maladie de Vaquez, intensification de chimiothérapie avant greffe de cellules souches ou de moelle osseuse.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse**, **allaitement**, insuffisance rénale grave, hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Protection du personnel assurant la manipulation (lunettes, masque, gants). Risque tératogène.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aplasie médullaire, neutropénie, anémie, thrombopénie.

Nausées, vomissements, mucite.

Alopécie, éruption cutanée, nécrose cutanée si extravasation.

Exacerbation des réactions cutanées à la radiothérapie.

Toxicité vésicale (formation d'acroléine) (**ifosfamide**, **cyclophosphamide**).

Rétention hydrosodée. Syndrome ADH-like.

Encéphalopathie (**ifosfamide**).

Aménorrhée. Azoospermie.

Fibrose pulmonaire rare pour la **carmustine** au-delà d'une dose totale de 1 200 mg/m<sup>2</sup>, pour le **busulfan** au-delà d'une dose totale de 3 g.

Effets tératogènes.

Leucémogénèse.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Inducteurs enzymatiques** qui peuvent réduire l'activité pour les alkylants activés au niveau hépatique.

Médicaments susceptibles de modifier l'élimination urinaire : **allopurinol**, **anti-inflammatoires non stéroïdiens**.

**Hypoglycémifiants**.

## ANTINÉOPLASQUES (6) – ANTIMÉTABOLITES (1)

## Analogues de l'acide folique

## ■ Méthotrexate

<b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>					
Faibles doses : 30 à 75 mg/m <sup>2</sup> /j, pendant 1 à 2 sem. Fortes doses : 250 mg/m <sup>2</sup> à 3 g/m <sup>2</sup> Dans ce cas, association systématique avec de la <b>LEDERFOLINE</b> (antidote) car risque mortel : 15 à 30 mg/m <sup>2</sup> /sem.	20 cp. 2,5 mg	5,33	I	100 %	0,27
<b>METHOTREXATE BIODIM</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b> Voie IM, SC et intrathécale	1 amp. 5 mg 1 amp. 25 mg	3,55 9,01	I I	100 % 100 %	3,55 9,01

## ■ Raltitrexed

<b>TOMUDEX</b>					
1 inj. de 3 mg/m <sup>2</sup> en 15 min dans 250 mL de sérum physiologique toutes les 3 sem.	1 fl. 2 mg	HOP	I		

## ■ Pémétrexed

<b>ALIMTA</b>					
Mésothéliome pleural et cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde : 500 mg/m <sup>2</sup>	1 fl. 500 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Analogue de l'acide folinique, antimétabolite, inhibiteur direct de la thymidilate synthétase, entraînant ainsi une fragmentation de l'ADN des cellules tumorales.

## INDICATIONS

Traitement du cancer colorectal métastatique chez les patients n'ayant pas reçu de **fluoropyrimidine**.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Absence de contraception.

Insuffisance rénale sévère (clairance créat. < 25 mL/min).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance de la concentration plasmatique et de l'adaptation des doses et de l'antidote (**folinate de calcium**) pour le **méthotrexate** à fortes doses. Risque mortel. Implique équipe spécialisée.

Pas d'**anti-inflammatoires** ou d'autres médicaments entrant en compétition avec l'élimination du **méthotrexate**, car augmente la toxicité. Toxicité neurologique centrale accrue et parfois sévère lorsqu'il y a association synchrone ou décalée du **méthotrexate** et de la radiothérapie encéphalique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Insuffisance rénale, troubles digestifs (dyspepsie, diarrhée, anorexie), élévation des transaminases, de la bilirubine, cytopénie, éruption cutanée, prurit, alopecie, dysgueusie, asthénie, fièvre.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indications absolues : phénytoïne** (diminution de son absorption digestive avec risque de convulsions), vaccin contre la fièvre jaune, **acide folinique**.

Contre-indications relatives : vaccins vivants atténués.

## ANTINÉOPLASQUES (7) – ANTIMÉTABOLITES (2)

### Analogues de la purine

#### ■ Mercaptopurine

<b>PURINÉTHOL</b>					
Prise orale 1 à 2,5 mg/kg/j ou 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> tous les 8 à 15 j	25 cp. séc. 50 mg	66,25	I	100 %	2,65

#### ■ Fludarabine

<b>FLUDARA</b>					
Lyophilisat pour sol. inj. de 2 mL 25 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j ; reprise J28 40 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j ; reprise J28	5 fl. 50 mg	HOP	I		
	15 cp. 10 mg	439,55	I	100 %	29,30
	20 cp. 10 mg	580,09	I	65 %	29,00

#### ■ Pentostatine

<b>NIPENT</b>					
Perfusion IV de 15 min : 4 mg/m <sup>2</sup> /14 j	1 fl. 10 mg	HOP	I		

#### ■ Thioguanine

<b>LANVIS</b>					
60 à 200 mg/m <sup>2</sup> de surface corporelle par jour (en 1 à 2 prises), en traitement continu ou intermittent	25 cp. séc. 40 mg	HOP	I		

#### ■ Cladribine

<b>LEUSTATINE</b>					
Traitement de la leucémie à tricholeucocytes : 0,1 mg/kg/j pdt 7 j	1 fl. 10 mL sol. inj. pour perf. (1 mg/mL)	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

La **thioguanine** est un analogue sulfhydryl de la guanine qui se comporte comme un antimétabolite purique. Les métabolites de la **thioguanine** inhibent la synthèse purique *de novo* et les interconversions des nucléotides puriques. La **thioguanine** est également incorporée dans les acides nucléiques et l'incorporation à l'ADN est sans doute à l'origine de son action cytotoxique.

**Fludarabine** : analogue de l'adénine, inhibe l'ADN polymérase.

#### INDICATIONS

Traitement d'entretien des leucémies aiguës myéloïdes.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Voir interactions médicamenteuses.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Leucopénie.  
Thrombopénie.  
Déficit en thiopurine.  
Méthyltransférase.  
Syndrome de Lesch-Nyhan.  
Femme en âge de procréer.  
Homme fertile.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Aplasie médullaire avec leucopénie et thrombopénie. Intolérance gastro-intestinale. Stomatite. Nécrose intestinale et perforation. Troubles de la fonction hépatique et ictère, réversibles à l'arrêt du traitement. Maladie veino-occlusive du foie, la plupart du temps réversible à l'arrêt du traitement.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Phénytoïne.** Vaccin contre la fièvre jaune. Vaccins vivants atténués. **Busulfan.**



**ANTINÉOPLASQUES (8) – ANTIMÉTABOLITES (3)****Analogues de la pyrimidine****■ Cytarabine**

<b>ARACYTINE</b>					
Reconstitution du lyophilisat avec solvant Injection SC ou perfusion IV de 1 à 3 h dans soluté isotonique Intrathécale (avec reconstitution avec du sérum salé isotonique pour la <b>cytarabine</b> et non pas avec le solvant) Posologie : SC ou IV de 20 mg/m <sup>2</sup> /j, pendant 14 j par mois à 1 g/m <sup>2</sup> x 2 j pendant 6 j toutes les 3 à 4 sem. Intrathécale : 30 à 100 mg/m <sup>2</sup> à répéter tous les 2 à 3 j	1 fl. 100 mg + amp. solv. 5 mL	5,37	I	100 %	5,37
	1 fl. 500 mg	HOP	I		
	+ lyophilisat				
	1 fl. 1 g + lyophilisat	HOP	I		
	1 fl. 2 g + lyophilisat	HOP	I		

**■ Fluorouracile (ou 5-FU)**

<b>FLUOROURACILE ACCOR</b>					
Injection IV en 1 à 2 min ou perfusion continue dans du soluté isotonique ou du Ringer Posologie : 450 à 500 mg/m <sup>2</sup> IVD pendant 5 j/mois ou 1 fois/sem. ; perf. continue de 1 g/m <sup>2</sup> /j de 4 à 6 j toutes les 3 à 4 sem.	1 fl. 250 mg	HOP	I		
	1 fl. 500 mg	HOP	I		
	1 fl. 1 000 mg	HOP	I		
	1 fl. 2 500 mg	HOP	I		
	1 fl. 5 000 mg	HOP	I		
<b>EFUDIX</b>					
Voie cutanée	20 g (tube de crème 5 %)	26,30	I	65 %	1,32

**■ Capécitabine**

<b>XELODA</b>					
Administration orale : 1250 mg/m <sup>2</sup> x 2/j pendant 14 j, suivie d'un repos de 7 j	60 cp. 150 mg	52,85	I	100 %	0,88
	120 cp. 500 mg	322,87	I	100 %	2,69

**■ Gemcitabine**

<b>GEMZAR</b>					
Reconstitution du lyophilisat avec solvant Perfusion IV de 30 min Posologie : 1 000 mg/m <sup>2</sup> x 1/sem. pendant 3 à 7 sem., toutes les 4 sem. ou toutes les 8 sem.	1 fl. lyoph. 200 mg	HOP	I		
	1 fl. lyoph. 1 000 mg	HOP	I		

## ANTINÉOPLASQUES (9) – ANTIMÉTABOLITES (4)

### ■ Décitabine

<b>DACOGEN</b>					
20 mg/m <sup>2</sup> x 1/j en perf. IV de 1 h pendant 5 j consécutifs Cure répétée toutes les 4 sem. Minimum de 4 cycles	1 fl. lyoph. 50 mg	HOP	I		

### ■ Azacitidine

<b>VIDAZA</b>					
Posologie initiale : 75 mg/m <sup>2</sup> x 1/j en SC pendant 7 j consécutifs Puis ajustement posologique en fonction de la toxicité hématologique Cure répétée toutes les 4 sem. Minimum de 6 cycles	1 fl. lyoph. 100 mg	318,6	I		318,60

#### PROPRIÉTÉS

Agissent comme faux substrat.

**Le 5-FU** inhibe la thymidilate-synthase.

La décitabine inhibe les méthyltransférases de l'ADN, entraînant une hypométhylation.

#### INDICATIONS

Adénocarcinomes mammaires, digestifs ; cancers urothéliaux ; ostéosarcomes ; carcinomes épidermoïdes des VADS ; leucémies aiguës.

#### CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance rénale, hépatique. Cardiopathie.

**Grossesse. Allaitement.**

Hypersensibilité au produit. Vaccins vivants atténués.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Adaptation des doses ou contre-indication si atteinte viscérale hépatique, rénale ou cardiaque.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Myélosuppression, diarrhée, mucite, pigmentation cutanée et unguéale, syndrome main-pied, érythrodermie desquamative, alopecie, coronaropathie, syndrome restrictif respiratoire, troubles neurologiques centraux, neuropathie périphérique, conjonctivite, oligospermie, cytolysé ou cholestase hépatique, insuffisance rénale.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Fluorouracile, cisplatine.**

**Anti-inflammatoires non stéroïdiens, ciclosporine.**

**Amphotéricine B** : augmente son effet et sa toxicité (contre-indication).

**Diazépam** : précipitation.

Anticoagulants oraux.

**ANTINÉOPLASQUES (10) – ANTHRACYCLINES (1)**■ **Doxorubicine**

<b>ADRIPLASTINE</b>					
Reconstitution du lyophilisat pour une concentration de 5 mg/mL Inj. IV intrabutulaire de soluté isotonique Posologie : 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	1 fl. 10 mg/5 mL 1 fl. 50 mg/25 mL 1 fl. pdre 50 mg	HOP HOP HOP	I I I	100 %	
<b>MYOCET</b>					
Reconstitution de la <b>doxorubicine</b> avec <b>chlorure de sodium</b> , puis chauffage pendant 10 min (appareil chauffe-bloc <i>Techne DB-3 Dri Block</i> ou bain-marie), puis ajustement du pH des liposomes, et mélange liposome- <b>doxorubicine</b> Posologie : 60 à 75 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	2 ens. 3 fl. 50 mg	HOP	I		
<b>CAELYX</b>					
À diluer dans du soluté glucosé isotonique Perf. IV de 60 min Posologie : 50 mg/m <sup>2</sup> toutes les 4 sem.	1 fl. 20 mg 1 fl. 50 mg	HOP HOP	I I		

■ **Daunorubicine**

<b>CERUBIDINE</b>					
30 à 60 mg/m <sup>2</sup> pendant 3 à 5 j toutes les 3 à 4 sem.	10 fl. 20 mg	HOP	I		
<b>DAUNOXOME</b>					
Reconstitution pour une concentration de 0,2 à 1 mg/mL Posologie : 40 mg/m <sup>2</sup> toutes les 2 sem.	1 fl. 50 mg	HOP	I		

■ **Épirubicine**

<b>FARMORUBICINE</b>					
Reconstitution avec eau ppi ou sérum salé isotonique ou solution injectable prête à l'emploi Injection IV intratubulaire de 5 à 10 min d'un soluté isotonique Posologie : 40 à 100 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem.	1 fl. pdre 10 mg 1 fl. 10 mg/5 mL 1 fl. 20 mg/10 mL 1 fl. pdre 50 mg 1 fl. pdre 150 mg 1 fl. 200 mg/100 mL 1 amp. 20 mg/10 mL 1 amp. 50 mg/25 mL	25,01 108,28 HOP HOP HOP HOP HOP HOP	I I I I I I I I	100 % 100 %	25,01 108,28

## ANTINÉOPLASQUES (11) – ANTHRACYCLINES (2)

## ■ Idarubicine

ZAVEDOS					
Reconstitution du lyophilisat avec eau ppi ou perf. IV prêtes à l'emploi	1 fl. pdre 5 mg	HOP	I		
Injection IV intratubulaire de 5 à 15 min d'un soluté salé isotonique	1 fl. 5 mg/5 mL	HOP	I		
LAM chez A. : 12 mg/m <sup>2</sup> x 1/j pendant 3 j consécutifs ou 8 mg/m <sup>2</sup> x 1/j pendant 5 j	1 fl. pdre 10 mg	HOP	I		
LAL chez A. : 12 mg/m <sup>2</sup> x 1/j pendant 3 j consécutifs	1 fl. 10 mg/10 mL	HOP	I		
LAL chez E. : 10 mg/m <sup>2</sup> x 1/j pendant 3 j consécutifs	1 fl. 20 mg/20 mL	HOP	I		
<b>Schéma hebdomadaire</b> : pendant 4 sem. max	1 gél. 5 mg	32,42	I	100 %	32,42
LAM (induction et consolidation) : 20 mg/m <sup>2</sup> x 1/sem.	1 gél. 10 mg	56,10	I	100 %	56,10
LAM (patients non répondeurs) : 40 mg/m <sup>2</sup> x 1/sem.	1 gél. 25 mg	138,86	I	100 %	138,86
<b>Schéma quotidien</b> : pendant 3 j consécutifs					
LAM (monochimiothérapie) : 30 mg/m <sup>2</sup> x 1/j					
LAM (polychimiothérapie) : 15 à 30 mg/m <sup>2</sup> x 1/j					
Posologie à adapter au vu de la fonction hépatique					

## ■ Mitoxantrone

NOVANTRONE					
Injection IV	1 fl. 10 mg/5 mL	HOP	I		
Posologie : 10 à 12 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem.	1 fl. 20 mg/10 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Intercalation entre les brins d'ADN avec activité antitopo-isomérase II. Formation de radicaux libres.

## INDICATIONS

Adénocarcinomes du sein, de l'estomac. Sarcomes des parties molles. Cancers urothéliaux. Maladie de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, leucémies aiguës.

## CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance cardiaque, cardiopathie, troubles du rythme.

## Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité au produit.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Qualité de l'état veineux pour éviter toute extravasation. Voie veineuse centrale au moindre risque (à juger par l'infirmière et non par le seul médecin). Implication médico-légale.

Bilan hépatique et cardiaque.

Respecter les doses toxiques cardiaques cumulatives :

- doxorubicine < 550 mg/m<sup>2</sup> ;
- épirubicine < 900 mg/m<sup>2</sup> ;
- daunorubicine < 600 mg/m<sup>2</sup> ;
- idarubicine < 900 mg/m<sup>2</sup> ;
- mitoxantrone < 160 mg/m<sup>2</sup>.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Myélosuppression, nausées, vomissements, alopecie, veinite, mucite, nécrose cutanée, pigmentation cutanée et unguéale, cardiomyopathie, troubles du rythme.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Cyclophosphamide, ifosfamide, dacarbazine : majorent la toxicité cardiaque.

Héparine, dexaméthasone, fluorouracile : précipitation.

Vérapamil : augmente la myélotoxicité + risque de BAV et de bradycardie.

Phénobarbital : activation du métabolisme et toxicité accrue.

## ANTINÉOPLASIQUES (12) – ANTIFUSORIAUX

## ■ Vinblastine

<b>VELBÉ</b>					
IV directe ou perfusion courte Posologie : 6 mg/m <sup>2</sup> /sem. sur 1 j ou réparation sur 2 à 3 j	10 fl. 10 mg	17,58	I	100 %	1,76

## ■ Vincristine

<b>ONCOVIN</b>					
IV directe ou perfusion rapide Posologie : 1,4 à 2 mg/m <sup>2</sup> /sem. sans dépasser la dose de 2 mg/inj.	1 fl. 1 mg	10,99	I	100 %	0,79

## ■ Vindésine

<b>ELDISINE</b>					
IV stricte rapide Posologie : 3 à 4 mg/m <sup>2</sup> /j tous les 7 à 10 j ou 2 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 2 j toutes les sem.	1 fl. 1 mg	HOP	I		
	1 fl. 5 mg	HOP	I		

## ■ Vinorelbine

<b>NAVELBINE</b>					
Perf. IV courte de 25 à 30 mg/m <sup>2</sup> /sem.	1 fl. 10 mg	HOP	I		
	10 fl. 10 mg	HOP	I		
	1 fl. 50 mg	HOP			
	10 fl. 50 mg	HOP	I		
	1 caps. 20 mg	62,68	I	100 %	62,68
	1 caps. 30 mg	91,87	I	100 %	91,87

## PROPRIÉTÉS

Blocage de la cellule en mitose par fixation sur la tubuline.

Inhibition de la polymérisation de la tubuline en microtubules et de la dépolymérisation des microtubules constitués.

## INDICATIONS

Cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancers urothéliaux, cancers du sein, sarcomes des tissus mous, cancers bronchiques non à petites cellules, choriocarcinome. Maladie de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, leucémies aiguës. Néphroblastome, neuroblastome.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse, allaitement, hypersensibilité au produit, insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance du bilan hématologique et neurologique.

Extravasation cutanée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Myélosuppression, nausées, vomissements, mucite, neurotoxicité, constipation (iléus paralytique), paralysie des nerfs crâniens, veinite, alopecie, nécrose cutanée, photosensibilisation, infarctus myocardique, insuffisance cardiaque, hyponatrémie.

Des hyperglycémies ont été signalées.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## ANTINÉOPLASQUES (13) – ANTITOPO-ISOMÉRASES I

## ■ Irinotécan

CAMPTO					
Perfusion IV de 30 à 60 min Posologie : 350 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	1 fl. 40 mg	HOP	I		
	1 fl. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 300 mg	HOP	I		

## ■ Topotécan

HYCANTIN					
Perfusion IV de 30 min Posologie : 1,5 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem. Posologie initiale : 2,3 mg/m <sup>2</sup> 5 j consécutifs toutes les 3 sem.	1 amp. 4 mg	HOP	I		
	10 gél. 0,25 mg	215,36	I	100 %	21,54
	10 gél. 1 mg	812,23	I	100 %	81,22
POTACTASOL					
Idem <b>HYCANTIN</b>	1 fl. 4 mg	HOP	I	100 %	

## PROPRIÉTÉS

Inhibition des topo-isomérases I permettant la modification de typologie de l'ADN au cours de la réplication et de la transcription.

## INDICATIONS

**HYCANTIN** : Cancer colorectal.

**POTACTASOL** :

Cancer du poumon à petites cellules et carcinome de l'ovaire en monothérapie.

En polychimiothérapie dans le cancer du col utérin à la posologie de 0,75 mg/m<sup>2</sup> toutes les 3 sem.

## CONTRE-INDICATIONS

**HYCANTIN** : grossesse, allaitement, hypersensibilité au produit, antécédents de pathologie intestinale inflammatoire.

**POTACTASOL** : allaitement, insuffisance médullaire sévère, porphyrie hépatique ou cutanée, hypersensibilité au produit

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance hématologique et hépatique.

**HYCANTIN** : diarrhée fébrile en phase leucopénisante.

**POTACTASOL** : prudence en cas d'antécédents de pneumopathie ou de fibrose pulmonaire

## EFFETS INDÉSIRABLES

Myélosuppression, nausées, vomissements, diarrhée aiguë et retardée, syndrome cholinergique, troubles rénaux et génito-urinaires, asthénie.

**ANTINÉOPLASIQUES (14) – ANTITOPO-ISOMÉRISE II****■ Étoposide**

<b>ÉTOPOSIDE TEVA</b>					
IV lente : 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 1 à 5 j	1 fl. 100 mg/5 mL	HOP	I		
	1 fl. 200 mg/10 mL	HOP	I		
	1 fl. 25 mL (20 mg/mL)	HOP	I		
	1 fl. 50 mL (20 mg/mL)	HOP	I		
<b>CELLTOP</b>					
Caps. par voie orale : 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> /j pdt 3 à 5 j tous les 21 à 28 j ou 50 à 100 mg/m <sup>2</sup> /j pdt 21 j tous les mois	40 caps. 25 mg	237,39	I	100 %	5,93
	20 caps. 50 mg	185,21	I	100 %	9,26

**PROPRIÉTÉS**

Épipodophyllotoxine.

**INDICATIONS**

Cancer du testicule, cancer du poumon à petites cellules, tumeur de l'ovaire, neuroblastome.

Lymphome malin non hodgkinien, maladie de Hodgkin, leucémie aiguë.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse, allaitement,** hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance de l'hémogramme.

Adaptation des doses si insuffisance rénale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Myélosuppression, alopecie, nausées et vomissements, diarrhée, mucite, veinite, hypotension artérielle, neuropathie périphérique, cytolyse hépatique, leucémogène.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les **inhibiteurs calciques** augmentent la concentration intracellulaire du médicament anticancéreux.

**Ciclosporine.**

Vaccins vivants atténués.

## ANTINÉOPLASQUES (15) – PLATINE (DÉRIVÉS DU)

### ■ Carboplatine

<b>CARBOPLATINE AGUETTANT</b>					
Perfusion IV brève de 15 à 60 min Dose adaptée en fonction de l'AUC souhaitée, selon les formules de Chatelut ou de Calvert Entre 200 à 400 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem.	1 fl. 50 mg	HOP	I		
	1 fl. 150 mg	HOP	I		
	1 fl. 450 mg	HOP	I		

### ■ Cisplatine

<b>CISPLATYL</b>					
Perf. IV lente (3 à 8 h) À l'abri de la lumière Posologie : 25 à 120 mg/m <sup>2</sup> en 1 à 5 j toutes les 3 à 4 sem. Associé à une hydratation de 3 L/24 h	10 fl. 10 mg + solv.	HOP	I		
	10 mL				
	10 fl. 25 mg + solv.	HOP	I		
	25 mL				
	5 fl. 50 mg + solv.	HOP	I		
	50 mL				

### ■ Oxaliplatine

<b>ELOXATINE</b>					
Perfusion IV de 2 h Posologie : 80 à 130 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem. Dose cumulative : 1,5 g/m <sup>2</sup> Pas de néphrotoxicité	1 fl. 50 mg	HOP	I		
	1 fl. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 200 mg	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Alkylation et intercalation au niveau de l'ADN.

#### INDICATIONS

Cancer du testicule, tumeur trophoblastique, cancer de l'ovaire, cancer du poumon à petites cellules, tumeur urothéliale, cancer de l'estomac, cancers épidermoïdes, ostéosarcome cancer colo-rectal.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, hypersensibilité au produit.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Extravasation cutanée.  
Surveillance hématologique, rénale et ionique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

**Cisplatine** : nausées et vomissements, nécrose tubulaire rénale, insuffisance rénale, diminution de l'acuité auditive, neuropathie, hypocalcémie, hypomagnésémie, hypokaliémie.

**Carboplatine** : myélosuppression, nausées et vomissements, diminution de l'acuité auditive, neuropathie, hypokaliémie.

**Oxaliplatine** : nausées et vomissements, neuropathie.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques et ototoxiques, **étoposide, fluorouracile**.



**ANTINÉOPLASIQUES (16) – INTERCALANTS**■ **Amsacrine**

<b>AMSALYO</b>					
Perf. IV lente dans 500 mL de soluté glucosé isotonique Utilisation de seringue en verre Posologie : 90 à 300 mg/m <sup>2</sup> pendant 4 à 5 j toutes les 2 à 4 sem.	1 amp. 75 mg	HOP	I		

■ **Bléomycine**

<b>BLÉOMYCINE BELLON</b>					
Injection IV stricte ou en perf. Posologie : 10 à 20 mg/m <sup>2</sup> /sem. ou 15 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 3 à 4 j toutes les 3 sem. Voie IM : 15 mg Dose cumulative maximale : 300 mg/m <sup>2</sup>	1 fl. 15 mg 10 fl. 15 mg	43,94 HOP	I I	100 %	43,94

**PROPRIÉTÉS**

Intercalaction entre paire de bases de l'ADN.

**INDICATIONS**

Cancer du testicule, cancer du sein, cancer épidermoïde cutané, maladie de Hodgkin, leucémies aiguës.

**CONTRE-INDICATIONS**

Risque de nécrose si extravasation.  
Surveillance hématologique, hépatique et rénale.

Surveillance cardiaque.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse, allaitement**, hypersensibilité au produit, insuffisance respiratoire (**bléomycine**).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Myélosuppression modérée, mucite, nausées et vomissements, diarrhée, veinite, alopecie, hyperthermie, nécrose locale cutanée, hyperpigmentation, érythème, syndrome de Raynaud, fibrose pulmonaire, cytolysé hépatique, cardiomyopathie.

## ANTINÉOPLASQUES (17) – TAXANES

### ■ Paclitaxel

<b>TAXOL</b>					
Perf. IV de 3 ou 24 h 135 à 175 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 à 4 sem. Prémédication antiallergique systématique (dexaméthasone, antihistaminiques H <sub>1</sub> et H <sub>2</sub> )	1 fl. 30 mg	HOP	I		
<b>ABRAXANE</b>					
Perf. IV de 30 min Cancer du sein métastatique : 260 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	1 fl. 100 mg (5 mg/mL)	HOP	I		

### ■ Docétaxel

<b>TAXOTÈRE</b>					
Perf. IV 1 h 70 à 100 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem.	1 fl. 20 mg	HOP	I		
	1 fl. 80 mg	HOP	I		
	1 fl. 160 mg	HOP	I		
<b>PAXENE</b>					
Perf. IV de 3 ou 24 h 100 à 175 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem. Idem <b>TAXOL</b>	1 fl. 30 mg	HOP	I		
	1 fl. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 150 mg	HOP	I		
	1 fl. 300 mg	HOP	I		

### ■ Cabazitaxel

<b>JEVTANA</b>					
Perf. IV de 1 h 25 mg/m <sup>2</sup> toutes les 3 sem. Prémédication : idem <b>TAXOL</b>	1 fl. 60 mg/1,5 mL + solv. 4,5 mL	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Ces taxoïdes sont des dérivés hémisynthétiques du **paclitaxel** qui lui est présent naturellement chez certaines espèces d'if.

Ils agissent par inhibition de la dépolymérisation des microtubules en dimères de tubuline, la stabilisation des microtubules va bloquer le cycle mitotique.

### INDICATIONS

Cancer du sein, cancer de l'ovaire.

**JEVTANA** : traitement du cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration après un traitement par **docétaxel**.

**TAXOTÈRE** : adénocarcinome de l'estomac/de l'œsophage/des voies aérodigestives supérieures, cancer de la prostate résistant à la castration, cancer du poumon non à petites cellules.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, hypersensibilité sévère au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser de PVC (**paclitaxel**).  
Prémédication préventive des réactions d'hypersensibilité sévères : **antihistaminiques H<sub>1</sub>/corticoïdes/antihistaminiques H<sub>2</sub>**.  
Surveillance hématologique et hépatique.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Myélosuppression, hypersensibilité, érythème, œdèmes périphériques ou viscéraux, neuropathie périphérique, alopecie, pigmentation des ongles, bradycardie, hypotension artérielle, nausées, vomissements, mucite, arthralgies, myalgies, cytolysse hépatique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Cisplatine.**

Inhibiteurs et inducteurs du CYP3A.

## ANTINÉOPLASQUES (18) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (1)

### ■ Bévacizumab

<b>AVASTIN</b>					
Perf. IV de 90 min puis 60 min	1 fl. 4 mL	HOP	I		
Posologie : 5 mg/kg tous les 14 j	1 fl. 16 mL	HOP	I		

### ■ Afibercept

<b>ZALTRAP</b>					
4 mg/kg par perf. sur 1 h suivis du schéma posologique du <b>FOLFIRI</b>	1 fl. sol. 25 mg/mL à diluer pour perf.	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Le **bévacizumab** (anticorps monoclonal) et l'**afibercept** (protéine de fusion) se lient au VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*), inhibant la liaison à ses récepteurs à la surface des cellules endothéliales.

Il inhibent ainsi la croissance tumorale en diminuant la vascularisation des tumeurs.

### INDICATIONS

**AVASTIN** et **ZALTRAP** : cancer colorectal métastatique, en association avec la chimiothérapie **irinotécan/5-fluorouracile/acide folinique (FOLFIRI)** chez l'adulte.

**AVASTIN** possible en première ligne. **ZALTRAP** si cancer résistant ou ayant progressé après un traitement à base d'oxaliplatine.

Autres indications d'**AVASTIN** en première ligne : cancers du sein, bronchique non à petites cellules, du rein, épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope, péritonéal.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.

**Bévacizumab** contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. **Afibercept** contre-indiqué pendant l'allaitement.

**Bévacizumab** : hémorragie pulmonaire récente.

**Afibercept** : trouble de l'hémostase, maladie hémorragique, insuffisance cardiaque NYHA III ou IV.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

HTA : doit être contrôlée avant initiation du traitement.

ATCD cardiovasculaires.

Ne pas initier le traitement avant cicatrisation d'une plaie chirurgicale, même mineure. Interrompre le traitement au moins 4 sem. avant une intervention chirurgicale.

Patient âgé : risque de diarrhée et de déshydratation accru.

ECOG  $\geq 2$ , comorbidités significatives : surveillance étroite.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions d'hypersensibilité.

**Diarrhée** parfois grave, à incidence élevée : diminution de posologie, réhydratation, traitement antidiarrhéique.

Neutropénie, thrombocytopénie en cas d'association avec la chimiothérapie : NFS avant instauration du traitement et avant chaque cycle, éventuellement **G-CSF** pour corriger la neutropénie.

Hémorragie, hypertension, thrombose artérielle et/ou veineuse.

Insuffisance cardiaque, cardiomyopathie.

**Perforation gastro-intestinale, formation de fistules.**

Protéinurie, syndrome néphrotique, microangiopathie thrombotique : bandelette urinaire avant chaque administration.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Anticorps monoclonaux anti-EGFR (**panitumumab, cétuximab**) + **bévacizumab** : toxicité accrue.

**Malate de sunitinib** + **bévacizumab** : risque d'anémie hémolytique microangiopathique.

**Sels de platine et taxanes** + **bévacizumab** : augmentation de l'incidence des neutropénies et infections.

## ANTINÉOPLASQUES (19) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (2)

### ■ Cétuximab

<b>ERBITUX</b>					
Perf. IV de 120 min puis 60 min	1 fl. 20 mL (5 mg/mL)	HOP	I		
Dose initiale 400 mg/m <sup>2</sup>	1 fl. 100 mL	HOP			
Dose hebdomadaire : 250 mg/m <sup>2</sup>	(5 mg/mL)				
Prémédication par un <b>antihistaminique</b>					

### ■ Panitumumab

<b>VECTIBIX</b>					
6 mg/kg toutes les 2 sem.	1 fl. 5 mL (20 mg/mL)	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (20 mg/mL)	HOP			

### PROPRIÉTÉS

Le **cétuximab**, anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du facteur de croissance épidermique EGFR, se lie à l'EGFR avec une forte affinité. Il bloque la liaison des ligands endogènes de l'EGFR entraînant l'inhibition de la fonction du récepteur.

Le **panitumumab** est un anticorps monoclonal IgG2 humain anti-EGFR, produit à partir d'une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique de l'ADN recombinant, donc sans risque théorique de réaction d'hypersensibilité.

### INDICATIONS

Cancer colorectal métastatique chez les patients dont les cellules tumorales expriment le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le gène KRAS « de type sauvage », en association avec une chimiothérapie, ou en monothérapie, après échec d'un traitement à base d'**oxaliplatine** et d'**irinotécan** ou en cas d'intolérance à l'**irinotécan**.

Traitement du carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou en association avec la radiothérapie.

Traitement des patients présentant un carcinome épidermoïde récidivant et/ou métasta-

tique de la tête et du cou en association à une chimiothérapie à base de **sels de platine**.

**VECTIBIX** est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients atteints de cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR et présentant le gène KRAS non muté (type sauvage), après échec des protocoles de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, **oxaliplatine** et **irinotécan**.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, hypersensibilité au **cétuximab**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de réaction d'hypersensibilité avec dyspnée et éruption cutanée.

Nécessité de prémédication par un antihistaminique.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée, mucite, alopecie, fièvre, frissons, réaction d'hypersensibilité, éruption cutanée, urticaire, acné, hypotension artérielle, dyspnée, conjonctivite.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pas de modification de la pharmacocinétique en cas de co-administration avec l'**irinotécan**.

## ANTINÉOPLASQUES (20) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (3)

### ■ Alemtuzumab

<b>CAMPATH</b>					
ATU nominative Perf. IV de 120 min J1 : 3 mg J2 : 10 mg J3 : 30 mg > J3 : 30 mg x 3/sem. (max. 12 sem.)	3 fl. 1 mL (30 mg/mL)	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal dirigé contre une cglycoprotéine (CD52) à la surface des lymphocytes. L'**alemtuzumab** lyse les lymphocytes B et T par l'intermédiaire d'une fixation au complément et d'une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant de l'anticorps.

#### INDICATIONS

Traitement des leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) chez des patients qui ont été exposés à des **alkylants** et qui n'ont pas manifesté de réponse, complète ou partielle, au **phosphate de fludarabine**, ou chez qui un traitement de ce type a produit une rémission de courte durée seulement (moins de 6 mois).

### ■ Rituximab

<b>MABTHERA</b>					
375 mg/m <sup>2</sup> 1 <sup>re</sup> perf. : 50 mg/h puis après 30 min augmentation de 50 mg/h toutes les 30 min (max 400 mg/h) Perf. suivantes : 100 mg/h puis après 30 min augmentation de 100 mg/h toutes les 30 min (max 400 mg/h)	2 fl. 10 mL (100 mg) 1 fl. 50 mL (500 mg)	HOP HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Le **rituximab** se lie à l'antigène CD20 situé sur les lymphocytes B et induit la lyse cellulaire.

#### INDICATIONS

**LNH folliculaire** : en IV x 1/sem. pendant 4 sem. En association avec une chimiothérapie : 1<sup>er</sup> j de chaque cure. Traitement d'entretien : en IV tous les 3 mois jusqu'à progression de la maladie (max. 2 ans).

**LNH diffus à grandes cellules B** : 1<sup>er</sup> j de chaque cure de chimiothérapie.

#### CONTRE-INDICATIONS

Grossesse, allaitement, hypersensibilité à l'**alemtuzumab**, infection généralisée, VIH.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de réaction d'hypersensibilité avec dyspnée. Fièvre, frissons, hypotension artérielle. Nécessité de prémédication par **corticostéroïde** et **antihistaminique**.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Infection. Septicémie. Pneumonie. Herpes simplex. Infection à cytomégalovirus. Infections à *Pneumocystis carinii*. Pancytopénie. Céphalée. Conjonctivite. Hypotension artérielle. Dyspnée. Rage cutanée. Fatigue.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Hypersensibilité au **rituximab**.

Infection sévère, infection cardiaque sévère.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Syndrome grave de relargage des cytokines. Réaction d'anaphylaxie. Hypotension artérielle. Angine de poitrine. Arythmie. Fibrillation auriculaire. Réactivation d'hépatite B.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Fièvre. Frissons. Hypotension artérielle. HTA. Nausées.

## ANTINÉOPLASQUES (21) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (4)

### ■ Trastuzumab

HERCEPTIN					
En situation métastatique et adjuvante : 1 <sup>re</sup> inj. : 4 mg/kg en 90 min suivie d'une surveillance de 6 h Inj. suivantes : 2 mg/kg en 30 min toutes les sem. En situation adjuvante : 8 mg/kg en 90 min puis 6 mg/kg toutes les 3 sem.		1 fl. pdre 150 mg	HOP	I	

#### PROPRIÉTÉS

Le **trastuzumab** est un anticorps monoclonal humanisé recombinant de classe IgG1 dirigé contre le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Le **trastuzumab** inhibe la prolifération des cellules tumorales humaines qui surexpriment HER2.

#### INDICATIONS

Cancer du sein métastatique HER2+ chez le patient prétraité (+ **paclitaxel** ou **docétaxel** ou + **inhibiteur de l'aromatase**) ou prétraité par chirurgie, chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante), radiothérapie.

Cancer du sein localement avancé HER2+.

PTT : + **paclitaxel** hebdomadaire, chez le patient non prétraité par cette association ou + **capécitabine**, après progression sous **trastuzumab** ± **taxane**

Adénocarcinome métastatique de l'estomac ou de la jonction œsogastrique HER2+ (+ **capéci-**

**tabine** ou **5-FU/cisplatine**), chez le patient non prétraité.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie. Insuffisance cardiaque. Association aux **anthracyclines**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une surveillance étroite doit être réalisée chez les patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques ; la surveillance de la fonction cardiaque de tous les patients doit être effectuée pendant la durée du traitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs abdominales, asthénie, douleurs thoraciques, frissons, fièvre, céphalées, nausées, les vomissements, arthralgie, myalgie. La perfusion de **HERCEPTIN** peut être associée à des réactions, le plus souvent des frissons, de la fièvre et des symptômes de type grippaux. Insuffisance cardiaque.

## ANTINÉOPLASQUES (22) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (5)

### ■ Dénosumab

<b>XGEVA</b>					
120 mg en SC toutes les 4 sem. avec une supplémentation en <b>calcium</b> ( $\geq 500$ mg) et <b>vitamine D</b> ( $\geq 400$ UI) sauf en cas d'hypercalcémie Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez l'insuffisant rénal	1 fl. sol. inj.	HOP	I		
	120 mg/1,7 mL 4 fl. sol. inj. 120 mg/1,7 mL	HOP			

#### PROPRIÉTÉS

RANKL est une protéine qui stimule l'activité des ostéoclastes, responsables de la résorption osseuse. Le **dénosumab** est un anticorps monoclonal humain qui cible RANKL, s'opposant ainsi à l'interaction RANK/RANKL et réduisant le nombre et la fonction des ostéoclastes. Le **dénosumab** diminue ainsi la résorption et la destruction osseuses induites par un cancer.

#### INDICATIONS

Prévention des complications des métastases osseuses de tumeurs solides chez l'adulte.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypercalcémie sévère non traitée. Hypersensibilité au **dénosumab**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Toute hypocalcémie doit être corrigée avant l'instauration du traitement. Une supplémentation en **Ca/vit. D** est impérative sauf en cas d'hypercalcémie. L'apparition d'une hypocalcémie au cours du traitement doit conduire à l'augmentation de la supplémentation en **Ca/vit. D**. Une surveillance de la calcémie est recommandée chez l'insuffisant rénal sévère.
- En raison du risque d'ostéonécrose de la

mâchoire, un examen dentaire et les soins nécessaires doivent être réalisés avant l'initiation du traitement par **XGEVA** et une bonne hygiène bucco-dentaire doit être maintenue tout au long du traitement.

- Non recommandé chez la femme en âge de procréer sans contraception, enceinte ou en cas d'allaitement. (Il existe des programmes de surveillance des grossesses/de l'allaitement d'Amgen.)

#### EFFETS INDÉSIRABLES

- Hypocalcémie très fréquente (notamment par rapport à l'**acide zolédronique**).
- Autres effets indésirables : diarrhée, dyspnée, hypophosphatémie, hyperhidrose, ostéonécrose de la mâchoire, cellulite.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas associer à un **bisphosphonate** ou à tout autre médicament contenant du **dénosumab** (comme **PROLIA**, indiqué dans le traitement de l'ostéoporose post-ménopausique). Aucune étude d'interaction n'a été réalisée mais aucune modification du profil de **XGEVA** n'a été observée lors des essais cliniques avec les chimiothérapies/hormonothérapies concomitantes.

## ANTINÉOPLASQUES (23) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (6)

### ■ Brentuximab védotin

ADCÉTRIS					
Perf. IV de 30 min 1,8 mg/kg toutes les 3 sem. sans dépasser 180 mg/administration Adapter en cas d'apparition d'une neutropénie ou d'une neuropathie périphérique	1 fl. 50 mg pdre	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Conjugué anticorps-médicament qui libère dans la cellule un agent antinéoplasique, la MMAE. En résulte une mort apoptotique sélective des cellules tumorales exprimant l'anti-gène CD30.

#### INDICATIONS

Traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif récidivant ou réfractaire chez l'adulte :  
– après greffe autologue de cellules souches (ASCT) ;

– ou après au moins 2 traitements antérieurs quand l'ASCT ou une polychimiothérapie n'est pas une option de traitement.

Traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules systémique récidivant ou réfractaire chez l'adulte.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.  
Allaitement.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé pendant la grossesse.

Femme traitée en âge de procréer : 2 méthodes efficaces de contraception pendant le traitement et pendant les 30 j suivant l'arrêt.  
Homme traité : cryoconservation du sperme avant traitement (toxicité testiculaire).

Masse tumorale importante (risque de syndrome de lyse tumorale).

Conserver entre +2 et +8°C.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : infection, **neutropénie (adaptation posologique)**, **neuropathie périphérique sensitive (adaptation posologique)**, diarrhée, nausée, vomissements, alopecie, prurit, myalgie, fatigue.

Fréquents : infection grave ou opportuniste, toux, dyspnée, anémie, thrombopénie, syndrome de lyse tumorale, neuropathie périphérique motrice, éruption cutanée, arthralgie.

Fréquence indéterminée : réaction anaphylactique, syndrome de Stevens-Johnson, leucoencéphalopathie multifocale progressive (arrêt immédiat du traitement).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indiquée : bléomycine** (toxicité pulmonaire).

Inhibiteurs puissants du CYP450 (augmentation du taux de MMAE et de l'incidence des neutropénies) : **macrolides**, **antifongiques azolés**, **inhibiteurs de protéases du VIH**, **diltiazem**, **vérapamil**, **acide valproïque**, **cimétidine**, jus de pamplemousse, etc.

Inducteurs puissants du CYP450 (diminution du taux de MMAE) : **carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **phénobarbital**, **phénytoïne**, **rifampicine**, **rifabutine**, **dexaméthasone**, millepertuis, etc.



## ANTINÉOPLASQUES (24) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (7)

### ■ Ofatumumab

<b>ARZERRA</b>					
300 mg (1 <sup>re</sup> perf.) puis 2000 mg (perf. suivantes) Fréquence : 1 perf./sem. pendant 8 sem. consécutives, puis 4 à 5 sem. plus tard, 1 perf./mois pendant 4 mois consécutifs	3 fl. sol. inj. 100 mg/5 mL	HOP	I		
	1 fl. sol. inj. 1000 mg/50 mL	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal humain dirigé contre l'antigène CD20.

#### INDICATIONS

Traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez les patients réfractaires à la **fludarabine** et à l'**alemtuzumab**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.  
Allaitement (pendant le traitement et pendant les 12 mois suivant son arrêt).  
Hépatite B chronique active (dépistage chez les patients à haut risque avant traitement, surveillance étroite des porteurs du VHB).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé pendant la grossesse.  
Pathologie cardiaque (surveillance étroite).

Conserver entre +2 et +8°C.

Contient du sodium.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : infections respiratoires, neutropénie, anémie, rash.

Fréquents : sepsis, thrombocytopénie, réaction liée à la perfusion (dont événements anaphylactoïdes et syndrome de relargage de cytokines), occlusion intestinale, tachycardie, hypertension, dyspnée, bronchospasme, prurit, etc.

Peu fréquent : syndrome de lyse tumorale.

Rare : leucoencéphalopathie multifocale progressive.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Vaccins vivants atténués ou inactivés (efficacité altérée et risque d'infection).

## ANTINÉOPLASQUES (25) – ANTICORPS MONOCLONAUX OU PROTÉINES DE FUSION (8)

### ■ Pertuzumab

PERJETA				
Dose de charge : <b>Pertuzumab</b> : 840 mg en perf. IV de 60 min + <b>trastuzumab</b> : 8 mg/kg + <b>docétaxel</b> : 75 mg/m <sup>2</sup> <b>Dose d'entretien, toutes les 3 sem. :</b> <b>Pertuzumab</b> : 420 mg en perf. IV de 30 à 60 min + <b>trastuzumab</b> : 6 mg/kg + <b>docétaxel</b> : 75 mg/m <sup>2</sup> (max. 100 mg/m <sup>2</sup> ) 30 à 60 min entre chaque administration d'un médicament <b>Docétaxel</b> toujours administré après les autres	1 fl. pdr. 240 mg	HOP	I	

#### PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal humanisé recombinant :  
– ciblant spécifiquement la protéine récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), bloquant ainsi sont hétérodimérisation avec d'autres récepteurs de la famille des HER (EGFR, HER3, HER4). En résulte un arrêt de la prolifération cellulaire et à une apoptose ;  
– médiateur de la cytotoxicité cellulaire anti-corps-dépendante (ADCC).

#### INDICATIONS

Traitement de patients adultes atteints d'un cancer du sein métastatique ou localement récidivant non résécable HER2+, n'ayant pas reçu au préalable de traitement anti-HER2 ou de chimiothérapie pour leur maladie métastatique.

En association au **trastuzumab** et au **docétaxel**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.  
Grossesse et allaitement.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Évaluation fréquente de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG).

Antédécédent de radiothérapie du thorax ou de traitement par une **anthracycline** (risque augmenté de diminution de la FEVG).

Femmes en âge de procréer ou patient masculin avec partenaire féminine en âge de procréer : contraception efficace pendant traitement et pendant 6 mois après arrêt.  
Conserver entre +2 et +8°C.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquent : infection respiratoire haute, **neutropénie** (fébrile ou non), anémie, leucopénie, réaction d'hypersensibilité, syndrome de relargage des cytokines, neuropathie périphérique, mucite, douleur, œdème, prurit, alopecie, diarrhée, vomissements, etc.

Fréquent : épanchement pleural, **dysfonction ventriculaire gauche** (interruption du traitement pendant au mois 3 sem. si FEVG < 40 % ou si FEVG entre 40 et 45 % avec diminution > 10 % par rapport à sa valeur initiale).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association du **pertuzumab** au **trastuzumab** renforce significativement l'activité antitumorale.

**ANTINÉOPLASIQUES (26) – INHIBITEURS DE PROTÉASOME (1)**■ **Bortézomib**

<b>VELCADE</b>					
1,3 mg/m <sup>2</sup> J1, J4, J8, J11 toutes les 3 sem.	1 fl. pdre 1 mg 1 fl. pdre 3,5 mg	HOP HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Le **bortézomib** inhibe le protéasome 26S entraînant un arrêt du cycle cellulaire et une apoptose de la cellule cancéreuse.

**INDICATIONS**

En monothérapie pour le traitement du myélome multiple en progression chez des patients ayant reçu au moins 1 traitement antérieur et qui ont déjà bénéficié ou qui sont inéligibles pour une greffe de moelle osseuse.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse, allaitement.**

Hypersensibilité au **bortézomib**.

Insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de saignement. Surveillance NFS. Surveillance plaquettaire. Thrombocytopénie. Neuropathie périphérique. Risque de convulsion. Hypotension orthostatique. Rétention hydrique. Cardiopathie. Insuffisance hépatique. Amylose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Zona, pneumonie. thrombocytopénie, neutropénie, anémie. neuropathie périphérique hypotension. Dyspnée. vomissements, diarrhées, myalgie perte de poids Insuffisance hépatique

## ANTINÉOPLASQUES (27) – INHIBITEURS DE PROTÉASOME (2)

## ■ Carfilzomib

KYPROLIS				
En phase III en France (pas encore d'AMM) Cycles de 28 j, voie IV Adm. J1, J2, J8, J9, J15, J16 puis repos de J17 à J28 Posologie initiale : 20 mg/m <sup>2</sup> En cas de bonne tolérance : augmentation possible pour les cycles suivants à 27 mg/m <sup>2</sup>	1 fl. 60 mg	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Carfilzomib est un inhibiteur irréversible du protéasome. Cela lui confère des activités anti-prolifératives et proapoptotiques sur les cellules tumorales solides et hématologiques.

**INDICATIONS**

Patients présentant un myélome multiple, préalablement traités par **bortézomib** et un agent immunomodulateur et ayant montré une progression significative de la maladie dans les 60 j suivant la dernière thérapie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune contre-indication recensée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prémédication par la **dexaméthasone** en raison de nombreuses réactions allergiques.  
Test de grossesse car tératogène.

Surveillance cardiaque, pulmonaire, hépatique, hématologique pendant le traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets indésirables reportés à ce jour (fréquence supérieure à 10 %) :

- état général : fatigue, céphalées, œdèmes périphériques, toux, insomnies, anorexie ;
- hématologique : anémie, thrombopénie, lymphopénie, neutropénie, leucopénie ;
- gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, vomissements, constipation ;
- immunitaires : pyrexie, infections des voies respiratoires supérieures, pneumonie ;
- biologique : augmentation créatininémie, enzymes hépatiques, hypokaliémie, hyponatrémie, hypercalcémie ;
- musculo-squelettiques : dorsalgies, myalgies, spasmes, douleurs aux extrémités.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune interaction médicamenteuse notable référencée.

## ANTINÉOPLASQUES (28) – INHIBITEURS DE MTOR

### ■ Temsirolimus

<b>TORISEL</b>					
25 mg administrés en perf. IV d'une durée de 30 à 60 min x 1/sem. après dilution de la solution initiale, prélèvement de la quantité voulue puis inj. dans une sol. inj. de NaCl 0,9 %	fl. 30 mg/1,2mL	HOP	I		

### ■ Évérolimus

<b>AFINITOR</b>					
10 mg x 1/j à la même h Insuffisance hépatique modérée : 5 mg x 1/j La survenue d'effets indésirables peut justifier une réduction posologique à 5 mg ou une interruption du traitement suivie d'une reprise à 5 mg/j À prendre avec un verre d'eau et ne pas écraser	30 cp. 5 mg 30 cp. 10 mg	2909,11 4138,56	I I	100 % 100 %	96,97 137,95

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs de protéine mTOR qui contrôle l'induction de la transcription de nombreux ARNm impliqués dans la carcinogenèse.

L'**évérolimus** possède également des propriétés immunosuppressives.

### INDICATIONS

**TORISEL** : traitement de première intention du carcinome rénal avancé chez les patients présentant au moins 3 des 6 facteurs de risque pronostique.

**AFINITOR** : traitement du cancer du rein avancé en progression durant ou après une thérapie par anti-VEGF. Cancers du sein récepteurs hormonaux positifs, HER2/neu négatifs, en association avec l'**exémestane**, chez les femmes ménopausées sans atteinte viscérale symptomatique dès récidive ou progression de la maladie et précédemment traitées par un inhibiteur non stéroïdien de l'aromatase.

Tumeurs neuroendocrines d'origine pancréatique.

### CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère et hypersensibilité à la substance active.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une prémédication avec 25 à 50 mg de **diphényhydramine** en intraveineuse (ou un antihistaminique comparable) doit être instaurée environ 30 min avant le début de chaque perfusion de **TORISEL**.

Une surveillance des concentrations sanguines résiduelles doit être menée en cas d'insuffisance hépatique sévère avec **AFINITOR**. Surveiller la fonction rénale et le bilan lipidique.

### EFFETS INDÉSIRABLES

**TORISEL** : anémie, rash, hyperlipidémie, hyperglycémie, hypercholestérolémie, œdèmes périphériques, diarrhée et stomatite.

**AFINITOR** : infections virales, bactériennes et fongiques. Leucopénie, anémie, troubles de la coagulation, syndrome hémolytique et urémique, purpura thrombopénique. Épanchement péricardique, pleural, pneumopathie. Douleurs abdominales, diarrhée, nausée, vomissements, élévation des transaminases, œdème de Quincke, éruption cutanée. Tumeur maligne, lymphome, syndrome lymphoprolifératif, cancer cutané.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**AFINITOR** : inhibiteurs ou inducteurs puissants du CYP3A4.

## ANTINÉOPLASQUES (29) – AUTRES ANTINÉOPLASQUES (1)

## ■ Dactinomycine

COSMEGEN					
IV 0,3 à 0,5 mg/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j, toutes les 3 à 4 sem. sans dépasser 0,5 mg par inj.	1 fl. 0,5 mg	HOP	I		

## ■ Asparaginase

KIDROLASE					
IV directe ou en perf. ou IM ou intrathécale - IV : 1 000 U/kg/j, tous les jours pendant 10 à 15 j, ou 5 000 à 10 000 U/m <sup>2</sup> , x 3/sem. pendant 3 à 4 sem., puis 500 à 1 000 U/kg x 1 à 2/sem. - Intrathécale : 3 000 U/m <sup>2</sup> ou 50 à 100 U/kg par inj.	1 fl. 10 000 UI	87,70	I	NR	87,70

## ■ Hydroxycarbamide

HYDRÉA					
Per os 1 à 2,5 g/m <sup>2</sup> /j en continu ou en intermittence ou 2 g/m <sup>2</sup> /j pendant 5 j tous les 15 j	20 gél. 500 mg	6,06	I	100 %	0,30

## PROPRIÉTÉS

La **L-asparaginase** est une enzyme qui catalyse la réaction d'hydrolyse de la **L-asparaginase** extracellulaire en acide L-aspartique et ammonium au niveau sanguin et intracellulaire. Une inhibition de la synthèse protéique des blastes leucémiques est obtenue en raison du déficit en asparagine-synthétase observée chez les cellules leucémiques.

La **mitoguazone** agit en inhibant la biosynthèse de polyamines et en déstabilisant l'ADN.

## INDICATIONS

Leucémie aiguës et lymphomes non hodgkiens.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, insuffisance hépatique et pancréatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance du fibrinogène, de la fonction hépatique, de la glycémie et de la lipasémie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Pancytopenie - réaction allergique - fièvre - cytolysse - cholestase - hypofibrinémie - pancréatite aiguë.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

**ANTINÉOPLASQUES (30) – AUTRES ANTINÉOPLASQUES (2)**■ **Anagrélide**

<b>XAGRID</b>					
0,5 mg x 2/j, augmenter par paliers d'une sem. jusqu'à 2,5 mg x 2/j	100 gél. 0,5 mg	451,31	I	100 %	4,51

**PROPRIÉTÉS**

Les études *in vitro* de la mégacaryocytopoïèse chez l'homme ont établi que l'action inhibitrice de l'**anagrélide** sur la formation des plaquettes s'opère par retardement de la maturation des mégacaryocytes et par réduction de leur taille et de leur ploïdie. L'**anagrélide** est un inhibiteur de l'AMP cyclique phosphodiesterase III.

**INDICATIONS**

Réduction du nombre élevé de plaquettes chez les patients à risque atteints de thrombocythémie essentielle, présentant une intolérance à leur traitement actuel ou dont le nombre élevé de plaquettes n'est pas réduit à un niveau acceptable par leur traitement actuel.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**anagrélide**.  
Insuffisance hépatique modérée ou sévère.  
Insuffisance rénale (Clcr < 50 mL/min).  
Absence de contraception féminine efficace.

**Grossesse, allaitement.****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance hépatique. Insuffisance rénale.  
Surveillance : hémoglobinémie, leucocytaire, plaquettaire, ASAT, ALAT, urémie, créatinémie.  
Pathologie cardiaque.  
Femme en âge de procréer.  
Enfants.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées. Palpitations. Tachycardie. Rétention hydrique. Nausées. Vomissements. Diarrhées. Anémies. Vertiges. Fatigue et éruptions cutanées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Absorption des contraceptifs hormonaux par voie orale.  
Jus de pamplemousse : il inhibe le CYP1A2 et, par conséquent, il est également susceptible de réduire la clairance de l'**anagrélide**.

## ANTINÉOPLASQUES (31) – AUTRES ANTINÉOPLASQUES (3)

### ■ Tasonermine

<b>BÉROMUN</b>					
Perf. du membre isolé (ILP : <i>Isolated Limb Perfusion</i> ) sous légère hyperthermie Membre supérieur : dose totale de 3 mg Membre inférieur : dose totale de 4 mg <b>Melphalan</b> associé : 13 mg/unité de volume (en litre) du membre supérieur perfusé 10 mg/ unité de volume (en litre) du membre inférieur perfusé Résection chirurgicale de la tumeur résiduelle effectuée dès que possible. Si nécessaire, seconde ILP pratiquée 6 à 8 sem. après la 1 <sup>re</sup>		1 pdr. + solv. 1 mg/5 mL	HOP	I	

### PROPRIÉTÉS

Cytokine de la famille du TNF $\alpha$ .

- Inhibition directe de la prolifération des cellules tumorales par effet cytotoxique ou cytostatique.
- Effet direct sur la vascularisation tumorale par induction de thromboses microvasculaires.
- Infiltration facilitée de la tumeur par les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires.
- Effet immunomodulateur direct et indirect.

### INDICATIONS

Traitement en association avec le **melphalan** des sarcomes des tissus mous des membres :

- avant résection chirurgicale de la tumeur, afin d'éviter ou de retarder l'amputation ;
- à titre palliatif, pour les sarcomes inopérables.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce sont celles de la **tasonermine** et de la technique d'ILP.

- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Maladies cardiovasculaires ou pulmonaires graves.
- Ulcère gastrique évolutif ou antécédents récents d'ulcère gastrique.
- Ascite sévère.
- Altérations sévères hématologique, des fonctions rénale ou hépatique.
- Hypercalcémie > 12 mg/dL (2,99 mmol/L).
- Lymphoedème sévère du membre.
- Patients chez qui les vasopresseurs ou antioagulants sont contre-indiqués.
- Contre-indication aux marqueurs radioactifs.
- Contre-indication à l'hyperthermie du membre.

- Patients dont on suppose que l'irrigation du membre en aval de la tumeur dépend très étroitement des vaisseaux tumoraux (artériographie parfois nécessaire).
- Grossesse et allaitement.
- Contre-indications au **melphalan**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Technique d'ILP mise en œuvre dans des centres spécialisés, sous anesthésie générale. Hydrater le patient avant, pendant et après l'ILP.

Surveillance du patient les 3 premiers j suivant la perf.

Conditionnement contenant du latex.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : arythmies (cardiotoxicité), hépatotoxicité, réaction cutanée.

Fréquents : infection, leucopénie, thrombocytopénie, réaction d'hypersensibilité, neurotoxicité, insuffisance cardiaque, thromboses veineuse et artérielle, syndrome de détresse respiratoire, nécrose cutanée et des extrémités (amputation parfois nécessaire), etc.

Peu fréquents : sepsis, maladie artérielle périphérique occlusive, oedème pulmonaire, syndrome de compression des loges musculaires, onychomadèse.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indiqués : substances cardiotoxiques** (ex : **anthracyclines**).

Déconseillés : médicaments susceptibles de provoquer une importante hypotension.

+ interactions médicamenteuses avec le **melphalan**.



**INHIBITEURS DE KINASE (1)****■ Erlotinib**

<b>TARCEVA</b>					
Prise orale 150 mg/j en une prise	30 cp. 25 mg	528,46	I	100 %	17,62
En continu	30 cp. 100 mg	1 814,06	I	100 %	60,47
À distance des repas	30 cp. 150 mg	2 231,08	I	100 %	74,37

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant le récepteur à l'EGF (HER-1) à la surface des cellules tumorales. L'**erlotinib** induit un arrêt de croissance et l'apoptose des cellules tumorales.

**INDICATIONS**

Traitement des cancers du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique après échec d'une chimiothérapie à base de **platine** ou en 1<sup>re</sup> intention chez les patients avec mutation du gène EGFR.

Traitement des cancers du pancréas métastatique en association avec la **gemcitabine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter toute prise médicamenteuse concomitante, en particulier les inhibiteurs du CYP3A4.

**■ Sorafénib**

<b>NEXAVAR</b>					
Prise orale 400 mg x 2/j	28 cp. 200 mg	3 535,50	I	100 %	126,27
En continu					
À distance des repas					

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGFR-1 et 2), PDGFR, c-Kit, Raf-kinase à la surface des cellules tumorales. Le **sorafénib** inhibe la croissance tumorale en diminuant la vascularisation des tumeurs.

**INDICATIONS**

Traitement du carcinome rénal avancé après échec d'un traitement préalable à base d'**interféron alfa** ou d'interleukine 2 ou chez des patients pour lesquels ces traitements sont considérés comme inadaptés.

Traitement du carcinome hépatocellulaire localement avancé et/ou métastatique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, galactosémie, déficit en lactase.

Déconseillé en cas de grossesse ou d'allaitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Éruption cutanée acnéiforme, paronychies, diarrhée, kératoconjunctivites sèches, nausée, pneumopathie interstitielle, élévation de la bilirubine, hépatite cytolytique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec les inhibiteurs du CYP3A4 : les azolés (**itraconazole**, **kétoconazole**, **voriconazole**), **clarithromycine**, **ritonavir**, **indinavir**, **saquinavir** et le jus de pamplemousse.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Complication de cicatrisation des plaies.

En cas d'antécédent d'infarctus du myocarde, d'angor, d'insuffisance coronarienne, de clip vasculaire, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire. Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie des 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, grossesse, allaitement.

Insuffisance coronarienne sévère, HTA instable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhées, nausées, élévation des enzymes pancréatiques et hépatiques, hypertension artérielle, troubles cardiaques, dysphonie, alopecie rare, éruptions cutanées, acouphènes, hémorragies, thrombopénie.

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (2)

## Thérapies ciblées\*

DCI	Nom commercial	Cible moléculaire	Indications préférentielles	Type
<b>Erlotinib</b>	<b>TARCEVA</b>	EGFR	Cancer du poumon non à petites cellules, cancer du pancréas	IK
<b>Sorafénib</b>	<b>NEXAVAR</b>	VEGFR, PDGFR, RAF	Cancer du rein, hépatocarcinome	IK
<b>Sunitinib</b>	<b>SUTENT</b>	VEGFR, PDGFR, c-Kit	Cancer du rein, tumeurs stromales gastro-intestinales, tumeur neuro-endocrine	IK
<b>Imatinib</b>	<b>GLIVEC</b>	Bcr-Abl, c-Kit	LMC, tumeurs stromales gastro-intestinales	IK
<b>Axitinib</b>	<b>INLYTA</b>	VEGFR, PDGFR	Cancer du rein	IK
<b>Dasatinib</b>	<b>SPRYCEL</b>	Bcr-Abl	LMC	IK
<b>Nilotinib</b>	<b>TASIGNA</b>	Bcr-Abl	LMC	IK
<b>Temsirolimus</b>	<b>TORISEL</b>	mTOR	Cancer du rein	IK
<b>Cétuximab</b>	<b>ERBITUX</b>	EGFR	Cancer colorectal, cancer ORL	Ac
<b>Panitumumab</b>	<b>VECTIBIX</b>	EGFR	Cancer colorectal	Ac
<b>Trastuzumab</b>	<b>HERCEPTIN</b>	HER2	Cancer du sein, cancer gastrique	Ac
<b>Rituximab</b>	<b>MABTHERA</b>	CD20	Lymphome non hodgkinien	Ac
<b>Alemtuzumab</b>	<b>MABCAMPATH</b>	CD52	LLC	Ac
<b>Bévacizumab</b>	<b>AVASTIN</b>	VEGF	Cancer colorectal, cancer du poumon non à petites cellules, cancer du rein, cancer des ovaires	Ac
<b>Aflibercept</b>	<b>ZALTRAP</b>	VEGF	Cancer du côlon	Ac
<b>Bortézomib</b>	<b>VELCADE</b>	Protéasome	Myélome, lymphome du manteau	IK
<b>Pertuzumab</b>	<b>PERJETA</b>	HER1	Cancer du sein	Ac
<b>Vemurafenib</b>	<b>ZELBORAF</b>	BRAF	Mélanome	IK
<b>Dabrafenib</b>	<b>TAFINLAR</b>	BRAF	Mélanome	IK
<b>Crizotinib</b>	<b>XALKORI</b>	ALK, MET, ROS	Cancer du poumon	IK
<b>Pazopanib</b>	<b>VOTRIENT</b>	VEGFR	Cancer du rein, sarcome des tissus mous	IK
<b>regorafenib</b>	<b>STIVARGA</b>	VEGFR	Cancer du côlon	IK
<b>Vismodegib</b>	<b>ERIVEDGE</b>	Smoo	Carcinome baso-cellulaire	IK

\* Ac : anticorps ; IK : inhibiteur de tyrosine-kinase

**INHIBITEURS DE KINASE (2)****■ Sunitinib**

<b>SUTENT</b>					
50 mg/j pendant 4 sem.	28 gél. 12,5 mg	1 368,73	I	100 %	48,88
puis fenêtre thérapeutique de 2 sem.	28 gél. 25 mg	2 696,34	I	100 %	96,30
ou 37,5 mg/j en continu	28 gél. 50 mg	5 351,56	I	100 %	191,13

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGFR-1 et 2), PDGFR, c-Kit, Raf-kinase à la surface des cellules tumorales. Le **sunitinib** inhibe la croissance tumorale en diminuant la vascularisation des tumeurs.

**INDICATIONS**

Traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) malignes nonrésécables et/ou métastatiques, après échec d'un traitement par le **mésylate d'imatinib** dû à une résistance ou à une intolérance.

Traitement des cancers du rein avancés et/ou métastatiques après échec d'un traitement à base d'**interféron alpha** ou d'interleukine 2. Tumeurs neuroendocrines du pancréas, non résécables ou métastatiques bien différenciées avec progression de la maladie chez l'adulte.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'antécédent d'infarctus du myocarde, d'angor, d'insuffisance coronarienne, de clip

vasculaire, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire. Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie dès 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité, grossesse, allaitement. Insuffisance coronarienne sévère, HTA instable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fatigue précoce, diarrhées, nausées, stomatites, dyspepsie (digestion difficile), pigmentation jaune de la peau, hypertension artérielle, hypothyroïdie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association déconseillée avec la **dexaméthasone**, la **phénytoïne**, la **carbamazépine**, la **rifampicine**, le **phénobarbital**, les préparations à base de millepertuis, le **ritonavir**, l'**itraconazole**, l'**érythromycine**, la **clarithromycine**, le jus de pamplemousse et le **kétoconazole** qui font varier les concentrations du **sunitinib**.

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (3)

## Effets indésirables

Même si les cibles visées par ces thérapies sont présentes de façon prépondérante dans les tumeurs, elles ne sont pas pour autant absentes des tissus normaux, expliquant la survenue d'effets indésirables des thérapies ciblées.

Ainsi, les antiangiogéniques (**AVASTIN**, **NEXAVAR**, **SUTENT**) s'accompagnent d'une hypertension artérielle ou d'une protéinurie résultant du blocage du VEGF rénal ou de diarrhée.

## Effets indésirables cutanés

Les anti-EGFR (**TARCEVA**, **ERBITUX**) induisent fréquemment un rash cutané acnéiforme (EGFR exprimé au niveau de la peau). Ces effets indésirables peuvent avoir des répercussions sur l'observance du traitement.

**Ordonnance pour les effets indésirables cutanés induits par les inhibiteurs d'Epidermal Growth Factor**

**DEXERYL** (glycérol + vaseline) tube de 250 g : 1 appl./j sur le corps (zones sèches).

**DERMOCUIVRE** tube de 100 g : appl. à volonté sur le visage.

**ÉRYTHROGEL** tube de 30 g : 1 appl./j sur les zones pustuleuses sur peau sèche et nettoyée au savon.

Si lésion très inflammatoire : **DIPROSONE** crème : 1 appl. matin et soir.

**VIBRAMYCINE N** 100 mg : 1 cp./j pendant 15 j puis 1 cp. un jour sur deux pendant 15 j puis arrêt.

## Effets indésirables digestifs

La diarrhée est fréquente, parfois sévère, conduisant à diminuer la posologie des thérapies ciblées. On propose un traitement symptomatique :

– **IMODIUM** : 2 gél. après la première selle diarrhéique puis 1 gél. après chaque selle diarrhéique ;

– **QUESTRAN** : 1 à 3 sach./j.

**Ordonnance pour la mucite induite par les inhibiteurs de mTOR**

Bains de bouche : 150 mL d'**ÉLUDRIL** dans 350 mL de **bicarbonate de sodium** (1,4 %) : faire 4 à 6 bains de bouche par jour.

**LORAMYC** (miconazole) (50 mg cp. gingival muco-adhésif LP) : application d'un cp. x 1/j, pendant 7 à 14 j en fonction de la réponse clinique (appliquer sur la gencive supérieure au-dessus d'une incisive).

**HYALUGEL** (spray ou gel gingival anti-inflammatoires) : appl. 3 à 5 fois par jour après les principaux repas, pendant 3 à 4 sem., jusqu'à disparition complète des symptômes.

**INHIBITEURS DE KINASE (3)****■ Axitinib**

<b>INLYTA</b>				
Dose de départ recommandée : 5 mg x 2/j à 12 h d'intervalle	56 cp. 1 mg	786,58	100 %	14,05
La tolérance et l'efficacité du traitement justifient l'adaptation posologique	56 cp. 5 mg	3768,43	100 %	67,29
En cas de bonne tolérance : la posologie pourra être augmentée à 7 mg x 2/j puis 10 mg x 2/j				
En cas de nécessaire diminution de la dose : la posologie sera abaissée à 3 mg x 2/j puis à 2 mg x 2/j				

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGF-1, 2 et 3).

**INDICATIONS**

Traitement du cancer du rein avancé après l'échec d'une thérapie antérieure.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Complication de cicatrisation des plaies.

En cas d'antécédant d'HTA, d'infarctus du myocarde, d'accident ischémique, d'AVC, d'hypothyroïdie, d'anomalie du bilan hépatique, de risque hémorragique ou thromboembolique et de risque de fistule/perforation gastro-intestinale.

Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie dès 24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**axitinib**, grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique sévère et HTA non contrôlée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Par fréquence décroissante : diarrhées, HTA, fatigue, anorexie, nausées, dysphonie, syndrome «main-pied», perte de poids, vomissements, constipation, hypothyroïdie et troubles dermatologiques (rashes, érythèmes, prurit et xérose).

On note des cas de leucoencéphalopathie postérieure réversible.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La co-administration avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP3A4/5 doit être évitée.

Cf. **VOTRIENT**.

## THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES (4)

### Effets indésirables cardiovasculaires des antiangiogéniques : hypertension artérielle

Si la pression artérielle est  $> 140/90$  mmHg avant le traitement antiangiogénique (ou  $> 120/80$  mmHg avec facteurs de risque cardiovasculaire) : introduire un traitement par un **inhibiteur calcique** puis débiter le traitement antiangiogénique.

Surveiller la pression artérielle chaque semaine pendant les 8 premières sem. puis avant chaque cycle :

- si la pression artérielle est  $< 130/80$  mmHg : continuer le traitement antiangiogénique ;
- si la pression artérielle est  $> 130/80$  mmHg :
  - en cas d'antécédent de cardiopathie ischémique, faire une dose test de dérivés nitrés (5 à 10 mg). Si la pression artérielle se normalise rapidement, ajouter des dérivés nitrés en libération prolongée au traitement antihypertenseur antérieur et continuer les antiangiogéniques. En l'absence de réponse aux dérivés nitrés, ren-

forcer le traitement antihypertenseur antérieur et continuer les antiangiogéniques, – en l'absence de cardiopathie ischémique : continuer les antiangiogéniques et renforcer le traitement antihypertenseur antérieur.

Privilégier : **dérivés nitrés, inhibiteurs calciques** autres que le **vérapamil** et **diltiazem** (inhibiteurs du CYP3A4), **bêtabloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion** et **diurétiques**.

### Effets indésirables néphrologiques des antiangiogéniques

Réaliser une bandelette urinaire avant chaque cycle.

En cas de protéinurie ++, réaliser une protéinurie sur 24 h :

- si la pression artérielle est  $< 130/80$  mmHg : avis néphrologique en cas d'hématurie associée ou de protéinurie  $> 1$  g/24 h ;
- si la pression artérielle est  $> 130/80$  mmHg : traiter l'hypertension artérielle. En cas de persistance de la protéinurie, raisonner comme précédemment.

## INHIBITEURS DE KINASE (4)

## ■ Pazopanib

VOTRIENT					
Dose recommandée : 800 mg x 1/j	30 cp. 200 mg	752,42	I	100 %	25,08
L'adaptation se fait par paliers de 200 mg	30 cp. 400 mg	1463,70	I	100 %	48,79
en fonction de la tolérance du patient sans dépasser la dose de 800 mg	60 cp. 400 mg	2886,28	I	100 %	48,10
À distance de toute prise alimentaire : ≥ 1 h avant et ≥ 2 h après les repas					

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur oral de tyrosine-kinase ciblant les récepteurs au VEGF (VEGFR-1, 2 et 3), les récepteurs au PDGF (PDGFR- $\alpha$  et  $\beta$ ) et c-KIT sur les cellules tumorales. Le **pazopanib** est inhibe la néoangiogenèse tumorale.

## INDICATIONS

Traitement de 1<sup>re</sup> ligne des cancers du rein avancés et chez les patients ayant été traités par des cytokines à un stade avancé de la pathologie.

Sarcome des tissus mous métastatique, hors liposarcome et GIST, en échec avec un traitement à base d'**anthracyclines** ou d'**ifosfamide**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Complication de cicatrisation des plaies.

En cas d'antécédant d'allongement de l'intervalle QT, d'HTA, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'accidents ischémiques, d'anomalie du bilan hépatique, d'hypothyroïdie, de risque hémorragique et de risque de fistule/perforation gastro-intestinale.

Surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie dès 24 h.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **pazopanib**, grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique sévère et HTA non stabilisée par un traitement antihypertenseur.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Asthénie, anorexie, modification de la couleur des cheveux, HTA, nausées, vomissements, diarrhées, rash, prurit, syndrome «main-pied», xérose et dysphonie.

Thrombopénie, leucopénie, neutropénie et complications relatives à ces déplétions : hémorragies et infections notamment.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les inhibiteurs de CYP3A4 comme les **azolés** (**kétoconazole**, **itraconazole**, etc.), la **clarithromycine**, la **télithromycine**, le jus de pamplemousse, le **ritonavir**, le **saquinavir** et l'**indinavir** notamment.

Avec les inducteurs de CYP3A4 comme la **rifampicine**, la **carbamazépine**, le millepertuis ou la **phénytoïne**.

## INHIBITEURS DE KINASE (5)

## ■ Imatinib

GLIVEC					
LMC en phase chronique 400 mg (en une seule prise/j) LMC en phase accélérée 600 mg (en une seule prise/j) LMC en phase blastique : 800 mg (en 2 prises/j) Les doses peuvent être augmentées en phase chronique ou accélérée, d'abord à 600 puis à 800 mg s'il n'y a pas de réponse après 3 mois ou s'il y a une perte de réponse après réponse initiale Tumeur stromale gastro-intestinale : 400 mg/j	60 cp. 100 mg	1 175,41	I	100 %	19,59
	30 cp. 400 mg	2 309,69	I	100 %	76,99

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de la tyrosine kinase Bcr-Abl. L'**imatinib** inhibe la prolifération dans les lignées Bcr/Abl+ et en induit l'apoptose.

Inhibiteur de la prolifération et inducteur d'apoptose des cellules de tumeur gastro-intestinales Kit positives.

Inhibiteur des tyrosine-kinases du récepteur PDGF (*Platelet Derived Growth Factor*), PDGFR et du SCF (*Stem Cell Factor*) c-Kit.

## INDICATIONS

LMC chromosome Philadelphie (bcr-abl) positive (Ph+) nouvellement diagnostiquée lorsque la greffe de moelle osseuse ne peut être envisagée comme un traitement de première intention.

LMC Ph+ en phase chronique après échec du traitement par l'**interféron alpha**, ou en phase accélérée ou en crise blastique.

Leucémie aiguë lymphoïde Ph+ nouvellement diagnostiquée en association avec la chimiothérapie. LAL Ph+ réfractaire ou en rechute en monothérapie.

Syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs (SMD/SMP) associés à des réarrangements du gène du PDGFR (*Platelet-Derived Growth Factor Receptor*).

Syndrome hyperéosinophilique (SHE) à un stade avancé et/ou leucémie chronique à éosi-

nophiles (LCE) associés à un réarrangement du FIP1L1-PDGFR alpha.

Tumeurs stromales gastro-intestinales malignes Kit (CD 117) positives non résécables et/ou métastatiques.

Dermatofibrosarcome protuberans (DFSP ou maladie de Darier-Ferrand) non résécable et patients adultes atteints de DFSP en rechute et/ou métastatique ne relevant pas d'un traitement chirurgical.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie.

Grossesse et allaitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neutropénie, thrombopénie.

Myalgies, rash, œdèmes périorbitaux et des membres inférieurs.

Céphalées, nausées, douleurs abdominales, constipation, insomnie, anorexie.

Élévation des enzymes hépatiques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Prudence avec les inhibiteurs du CYP3A4 (par exemple : **kétoconazole**, **itraconazole**, **érythromycine**, **clarithromycine**) et les inducteurs du CYP3A4 (**dexaméthasone**, **phénytoïne**, **carbamazépine**, **rifampicine**, **phénobarbital**, **fosphénytoïne**, **primidone**, *Hypericum perforatum* (millepertuis)).



## INHIBITEURS DE KINASE (6)

## ■ Dasatinib

SPRYCEL					
70 mg x 2/j	60 cp. 20 mg	2 004,78	I	100 %	33,41
	60 cp. 50 mg	3 967,45	I	100 %	66,12
	60 cp. 70 mg	3 967,45	I	100 %	66,12
	30 cp. 100 mg	3 967,45	I	100 %	132,25
	30 cp. 140 mg	3 967,45	I	100 %	132,25

## ■ Nilotinib

TASIGNA					
400 mg x 2/j	28 gél. 150 mg	775,98	I	100 %	27,71
	112 gél. 150 mg	2 980,54	I	100 %	26,61
	28 gél. 200 mg	1 020,90	I	100 %	36,46
	112 gél. 200 mg	3 960,25	I	100 %	35,36

## PROPRIÉTÉS

Le **dasatinib** inhibe l'activité de la kinase BCR-ABL, des kinases de la famille SRC, d'un certain nombre d'autres kinases oncogènes sélectives dont le c-KIT, des récepteurs de l'éphrine (EPH), et du récepteur bêta du PDGF.

## INDICATIONS

LMC en phase chronique, accélérée ou blastique, en cas de résistance ou intolérance à un traitement antérieur incluant l'**imatinib** mésylate.

LAL Ph+ et LMC en phase blastique lymphoïde en cas de résistance ou intolérance à un traitement antérieur.

**TASIGNA** est indiqué chez l'adulte dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) chromosome de Philadelphie positive (Ph+) en phase chronique et en phase accélérée, résistant ou intolérant à un traitement antérieur incluant l'**imatinib**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active.

**Grossesse, allaitement.**

Intolérance au galactose.

Déficiences en lactase.

Malabsorption du glucose.

Malabsorption du galactose.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance hépatique modérée à sévère. Surveillance NFS. Symptomatologie respiratoire. QT long. Hypokaliémie. Hypomagnésémie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rétention hydrique, épanchement pleural, diarrhée, rash, céphalée, hémorragie, fatigue, nausée et dyspnée. Neutropénie fébrile.

Allongement du QT.

Hypokaliémie, hypomagnésémie.

Élévation des enzymes hépatiques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Prudence avec les inhibiteurs du CYP3A4 (par exemple : **kétoconazole**, **itraconazole**, **érythromycine**, **clarithromycine**) et les inducteurs du CYP3A4 : **dexaméthasone**, **phénytoïne**, **carbamazépine**, **rifampicine**, **phénobarbital**, **fosphénytoïne**, **primidone**, *Hypericum perforatum* (millepertuis).

Éviter la prise concomitante d'**antihistaminiques H<sub>2</sub>** et les **inhibiteurs de pompe à protons**.

## INHIBITEURS DE KINASE (7)

## ■ Ruxolitinib

JAKAVI					
Plaquettes comprises entre 10 et 20 G/L :	60 cp. 5 mg	2 126,84	I	100 %	35,45
15 mg x 2/j	60 cp. 15 mg	4 211,95	I	100 %	70,20
Si au-delà : 20 mg x 2/j	60 cp. 20 mg	4 211,95	I	100 %	70,20

## PROPRIÉTÉS

Le **ruxolitinib** est un inhibiteur sélectif des Janus kinases (JAK) JAK1 et JAK2. Ces enzymes sont impliquées dans la signalisation de différents facteurs de croissance et cytokines importants dans l'hématopoïèse et la fonction immunitaire.

## INDICATIONS

Traitement de la splénomégalie ou des symptômes liés à la maladie chez l'adulte atteint de myélofibrose primitive ou secondaire à la polyglobulie de Vaquez ou à la thrombocythémie essentielle.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (contient du lactose et du galactose).

Grossesse et allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère ou d'insuffisance rénale sévère : diviser les posologies de moitié.

Bilan hématologique à réaliser avant le traitement pour déterminer la posologie.

Surveillance clinique et hématologique étroite

recommandées pendant et après le traitement (risque de rebond).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Saignements fréquents : épistaxis, ecchymoses, hémorragies.

Survenue d'infection : infection urinaire, tuberculose secondaire, zona.

Céphalées, vertiges, troubles gastro-intestinaux, hypertension artérielle.

Au niveau biologique : anémie, thrombopénie, neutropénie, élévation des transaminases, hypercholestérolémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **ruxolitinib** est métabolisé au niveau hépatique par les CYP 3A4 (principal) et 2C9.

En cas d'administration concomitante d'un inhibiteur puissant du 3A4 tel que les **inhibiteurs de protéase** et les **antifongiques azolés**, ou d'un double inhibiteur 3A4/2C9 (**fluconazole** par exemple), la posologie du **ruxolitinib** doit être diminuée de moitié.

En présence d'un inducteur puissant (tel que **rifampicine**, millepertuis, **carbamazépine**), une surveillance étroite est recommandée afin d'adapter la posologie en fonction de la tolérance et de l'efficacité.

## INHIBITEURS DE KINASE (8)

## ■ Lapatinib

TYVERB				
Associé au <b>trastuzumab</b> : 1 000 mg x 1/j	70 cp. 250 mg	1 297,46	I	100 %
Associé à la <b>capécitabine</b> : 1 250 mg x 1/j	84 cp. 250 mg	1 548,41	I	100 %
Associé à un <b>inhibiteur de l'aromatase</b> : 1 500 mg x 1/j	140 cp. 250 mg	2 553,12	I	100 %

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur des domaines intracellulaires de la tyrosine-kinase des récepteurs EGFR (ErbB1) et ErbB2 (HER2).

## INDICATIONS

Chez l'adulte, en association, dans le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique, avec surexpression des récepteurs HER2 (ErbB2) en cas d'échec thérapeutiques ou lorsque la chimiothérapie ne peut pas être envisagée.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité, grossesse, allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Bilan hépatique et cardiovasculaire à effectuer avant traitement.

Pendant le traitement : surveillance clinique, cardiaque, respiratoire, biologique et hépatique et de l'état d'hydratation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhées sévères pouvant entraîner une déshydratation.

Troubles cardiovasculaires : bouffées de chaleur, troubles de l'éjection plus rarement arythmie, cardiomyopathie.

Asthénie, céphalées, insomnies, douleurs musculaires, anorexie.

Le **lapatinib** peut également entraîner des troubles respiratoires tels dyspnée, pneumopathie, toux mais ces effets sont plus rares.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **lapatinib** est métabolisé par le CYP3A4. Une surveillance étroite de l'efficacité et des effets indésirables est recommandée en cas d'administration concomitante avec un inducteur ou un inhibiteur de ce cytochrome.

Le **lapatinib** est lui-même inhibiteur des CYP3A4 et 2C8. La prudence est donc requise lors de l'administration de médicaments métabolisés par ces CYP comme le **paclitaxel**, l'**irinotecan** ou le midazolam.

## INHIBITEURS DE KINASE (9)

## ■ Crizotinib

<b>XALKORI</b>					
250 mg x 2/j	60 gél. 200 mg	5 777,10	I	100 %	96,29
En cas d'intolérance : 250-400 mg/j en 1 à 2 prises	60 gél. 250 mg	5 777,10	I	100 %	96,29

**PROPRIÉTÉS**

Petite molécule inhibitrice sélective du récepteur à activité tyrosine-kinase (RTK) ALK (*Anaplastic Lymphoma Kinase*) et de ses variants oncogéniques.

**INDICATIONS**

Traitement des patients adultes ayant reçu au moins un traitement antérieur pour un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK-positif et avancé.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique sévère, allaitement, hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique, rénal, électrolytique, cardiovasculaire et ophtalmique à effectuer avant traitement.

Surveillance de ces paramètres plus biologiques et respiratoires pendant le traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Bradycardie, pneumopathies, kyste rénal, hépatite, troubles de la vue (altération de la vision, diplopie). Ces effets indésirables sont fréquents et de gravité modérée à sévère.

Anémie, neutropénie, thrombopénie, hyperkaliémie.

Vertiges, paresthésies, dysgueusie, éruption cutanée, troubles gastro-intestinaux, fièvre, asthénie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibiteurs puissants et inducteurs du CYP3A4 à éviter lors du traitement par **crizotinib**, qui est métabolisé au niveau hépatique par ce CYP essentiellement.

Médicaments bradychardisants et allongeant l'intervalle QT à utiliser avec précaution.

## INHIBITEURS DE KINASE (10)

## ■ Ponatinib

ICLUSIG					
45 mg/j	60 cp. 15 mg	HOP	I		
En cas d'intolérance : 15-45 mg/j	30 cp. 45 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur puissant de la protéine tyrosine-kinase BCR-ABL. Il possède des éléments structuraux qui lui confèrent une forte affinité de liaison à la fois à la protéine BCR-ABL native et aux formes mutantes de l'ABL-kinase.

## INDICATIONS

- Leucémie myéloïde chronique avec résistance ou intolérance au **dasatinib** ou au **nilotinib** et pour qui un traitement ultérieur par **imatinib** n'est pas cliniquement approprié, ou qui expriment la mutation T315I.
- Leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+) avec résistance ou intolérance au **dasatinib** et pour qui un traitement ultérieur par **imatinib** n'est pas cliniquement approprié, ou qui expriment la mutation T315I.

## CONTRE-INDICATIONS

Allaitement et hypersensibilité au produit.  
 Il ne sera utilisé chez la femme enceinte qu'en cas d'absolue nécessité.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il n'existe à ce jour aucune données de sécurité et d'efficacité chez les patients de moins de 18 ans.  
 À utiliser avec prudence chez les insuffisants rénaux et hépatiques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables cliniques, fréquents ou très fréquents :  
 – troubles de l'état général : asthénie, douleur, frissons, œdèmes, insomnies ;  
 – troubles du système nerveux : céphalées,

paresthésies, léthargie, étourdissements, migraines ;  
 – troubles du système immunitaire : fièvre, infections en particulier respiratoires ;  
 – troubles ophtalmologiques : vue trouble, sécheresse oculaire ;  
 – troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales, dyspepsie, stomatites, sécheresse buccale ;  
 – troubles hépatiques : augmentation des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, PAL, GGT), plus rarement hépatotoxicité ;  
 – troubles pancréatiques : augmentation de la lipase et plus rarement pancréatite ;  
 – troubles cardiovasculaires : bouffées de chaleur ou vasomotrices, thrombose veineuse profonde, fibrillation auriculaire, hypertension, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, épanchement péricardique, angor ;  
 – troubles respiratoires : dyspnée, toux, épanchement pleural, épistaxis.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **ponatinib** est métabolisé par le CYP3A4 : sa concentration sérique peut donc être augmentée en présence d'un inhibiteur de ce CYP (**inhibiteurs de protéase, antifongiques azolés**) et diminuée en cas de présence d'un inducteur (**rifampicine, carbamazépine, phénobarbital**) du CYP3A4.

Il est lui-même inhibiteur de la glycoprotéine P (P-gp) et de la protéine de résistance au cancer du sein (BCRP). De ce fait, le **ponatinib** pourrait avoir le potentiel d'augmenter la concentration plasmatique de substrats co-administrés de la P-gp (ex : **digoxine, dabigatran, colchicine, pravastatine**) ou de la BCRP (ex : **méthotrexate, rosuvastatine**).

## INHIBITEURS DE KINASE (11)

## ■ Régorafénib

STIVARGA					
160 mg/j pendant 3 sem. puis 1 sem. d'arrêt En cas d'intolérance : 80-160 mg/j pendant 3 sem. puis 1 sem. d'arrêt	84 cp. 40 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur des protéines-kinases, y compris des kinases impliquées dans l'angiogenèse tumorale (VEGFR1, 2, 3, TIE2), l'oncogénèse (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) et le microenvironnement tumoral (PDGFR, FGFR).

## INDICATIONS

Traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique qui ont été traités antérieurement ou qui ne sont pas éligibles aux traitements disponibles.

## CONTRE-INDICATIONS

Patients de moins de 18 ans, grossesse, allaitement ou hypersensibilité au produit (contient de l'huile de soja).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Bilan hépatique et électrolytique avant traitement.

Surveillance clinique (cardiaque, tensionnelle, hématologique, hépatique, neurologique) et biologique (hydroélectrolytique, bilirubine, enzymes hépatiques, coagulation) étroite pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables fréquents ou très fréquents :  
 – troubles de l'état général : asthénie, douleur ;  
 – troubles neurologiques : céphalées, tremblements ;  
 – troubles dermatologiques : sécheresse ou éruption cutanée, alopecie, syndrome main-pieds ;  
 – troubles immunologiques : infection, fièvre ;  
 – troubles hématologiques : anémie, thrombopénie, leucopénie, hémorragies ;  
 – raideur musculosquelettique ;  
 – troubles gastro-intestinaux : diarrhées, dysgueusie, reflux gastro-œsophagien, gastro-entérite, bouche sèche, stomatites ;  
 – augmentation des enzymes hépatiques et pancréatiques ;  
 – hypertension artérielle ;  
 – dysphonie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter l'administration concomitante d'inducteurs ou inhibiteurs puissants des CYP3A4 : risque respectivement de diminution ou d'augmentation de l'exposition au **régorafénib**.  
 L'administration concomitante de **régorafénib** peut augmenter l'exposition systémique aux substrats de l'UGT1A1 et de l'UGT1A9 comme l'**irinotécan**.

## INHIBITEURS DE KINASE (12)

■ **Bosutinib****BOSULIF**

Voie orale, en 1 prise/j au cours d'un repas Bonne tolérance : 500 mg/j Intolérance : 300-500 mg/j Posologie max : 600 mg/j	28 cp. 100 mg	HOP HOP	I I		
	28 cp. 500 mg				

**PROPRIÉTÉS**

Le **bosutinib** appartient à la classe des inhibiteurs des protéines-kinases. Il inhibe la protéine-kinase anormale Bcr-Abl à l'origine de la LMC.

**INDICATIONS**

Traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphia positif (LMC Ph+) en phase chronique, en phase accélérée et en crise blastique précédemment traités par un ou plusieurs **inhibiteurs de la tyrosine-kinase** et pour lesquels l'**imatinib**, le **nilotinib** et le **dasatinib** ne sont pas considérés comme des traitements appropriés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Atteinte hépatique, insuffisance hépatique, allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique, hématologique avant traitement. Surveillance hématologique, transaminases, cardiaque, ECG pendant le traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets indésirables cliniques fréquents :

- état général : fatigue, douleur, œdème, asthénie ;
- système nerveux : céphalées, vertiges, dysgueusie ;
- peau : rash, urticaire, acné, prurit ;
- immunitaire : fièvre, neutropénie fébrile, infection des voies respiratoires, pneumonies, bronchites, nasopharyngites, grippe ;
- musculaire : arthralgie, myalgie, dorsalgie ;
- gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, gastrite ;
- hépatique : augmentation des enzymes hépatiques, bilirubine, hépatotoxicité ;
- insuffisance rénale
- cardiaques : épanchement péricardique, allongement du QT ;
- pulmonaires : toux, dyspnée, épanchement pleural.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **bosutinib** est métabolisé par le CYP3A4 et substrat de la P-gp, ce qui entraîne de nombreuses interactions médicamenteuses.

- Inhibiteurs du CYP3A

L'administration concomitante de **bosutinib** et

d'inhibiteurs puissants (par. ex. **ritonavir**, **indinavir**, **saquinavir**, **kétoconazole**, **itraconazole**, **voriconazole**, **posaconazole**, **darithromycine**, **télithromycine**, **boceprevir**, **télaprevir**, jus de pamplemousse) ou modérés (par. ex. **fluconazole**, **darunavir**, **érythromycine**, **diltiazem**, **atazanavir**, **imatinib**, **vérapamil**, **ciprofloxacine**) du CYP3A doit être évitée, car elle entraîne une élévation de la concentration plasmatique en **bosutinib**.

Il est recommandé, dans la mesure du possible, de s'orienter vers un autre traitement concomitant sans potentiel d'inhibition de l'enzyme CYP3A (ou avec un faible potentiel).

Si un inhibiteur du CYP3A puissant ou modéré doit être administré pendant le traitement, une interruption ou une réduction de la dose de **bosutinib** doit être envisagée.

- Inducteurs du CYP3A

L'administration concomitante de **bosutinib** et d'inducteurs puissants (par. ex. rifampicine, **phénytoïne**, **carbamazépine**, **phénobarbital**) ou modérés du CYP3A doit être évitée, car elle entraîne une baisse de la concentration plasmatique en **bosutinib**.

- **Inhibiteurs de la pompe à protons**

La prudence est de rigueur lors de l'administration concomitante de **bosutinib** et d'**IPP**. Des **anti-acides** d'action rapide doivent être envisagés en remplacement des **IPP**. Les heures d'administration de **bosutinib** et des **antiacides** doivent être différentes dans la mesure du possible.

- Substrats de la P-gp

La prudence est de rigueur car le **bosutinib** risquerait d'augmenter les concentrations plasmatiques des substrats de la P-gp, tels que la **digoxine**, la **colchicine**, le **tacrolimus** et la quinine, des agents chimiothérapeutiques, des agents immunosuppresseurs, des **glucocorticoïdes** tels que la **dexaméthasone**, les **inhibiteurs de la protéase** et les **inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse**.

- **Antiarythmiques** et autres substances susceptibles d'allonger l'intervalle QT

Le **bosutinib** doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant, ou susceptibles de développer un allongement de l'intervalle QT, notamment les patients sous **antiarythmiques** ou d'autres médicaments pouvant entraîner un allongement de l'intervalle QT.

## INHIBITEURS DE KINASE (13)

## ■ Vandétanib

CAPRELSA					
300 mg x 1/j, environ à la même heure À adapter en fonction de l'intervalle QT	30 cp. 100 mg	1 556,29	I	100 %	51,88
	30 cp. 300 mg	4 586,61	I	100 %	152,89

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur puissant de tyrosine-kinase du VEGFR-2 (récepteur 2 du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire), de l'EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) et des récepteurs à tyrosine-kinase RET.

Inhibiteur du récepteur 3 de la tyrosine-kinase de l'endothélium vasculaire.

## INDICATIONS

Traitement du cancer médullaire de la thyroïde (CMT) agressif et symptomatique chez les patients avec une maladie localement avancée non opérable ou métastatique.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants ou à un produit de la classe des pipéridines.

Syndrome du QTc long congénital.

Patients avec un intervalle QTc > 480 ms.

Antécédent de torsades de pointe (sauf si tous les facteurs en cause ont été corrigés).

Allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé pendant la grossesse.

Femmes en âge de procréer : contraception efficace pendant le traitement et pendant au moins les quatre mois suivant son arrêt.

Surveillance fréquente de l'ECG.

Veiller à maintenir l'équilibre électrolytique du patient.

Test de mutation RET recommandé lors de l'initiation du traitement. Chez les patients pour lesquels elle n'est pas connue ou est négative : risque de bénéfice plus faible.

Métastases cérébrales (risque d'hémorragie intracrânienne).

Calcitonine < 500 pg/mL : bénéfice du traitement non démontré.

Carte d'alerte pour le patient donnée lors de chaque prescription.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables parfois difficiles à gérer car demi-vie du médicament = 19 j.

Très fréquents : **allongement du QTc dose-dépendant** (les premiers apparaissent le plus souvent dans les 3 premiers mois de traitement, arrêt du traitement si ≥ 500 ms), infec-

tion respiratoire, infection urinaire, diminution de l'appétit, hypocalcémie, insomnie, dépression, vertiges, céphalées, vision trouble voire dépôts cornéens, **hypertension**, **diarrhée** (maintenir l'équilibre électrolytique), vomissements, photosensibilité, éruption cutanée, lithiase rénale.

Fréquents : pneumopathie, pyélonéphrite, hypothyroïdie, anxiété, léthargie, perte de conscience, glaucome, kératopathie, colite, syndrome d'érythrodysesthésie palmoplantaire, augmentation ALAT/ASAT, épistaxis, hémoptysie, etc.

Rares : syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, syndrome de Stevens-Johnson.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Sont **contre-indiqués** les médicaments connus pour également allonger l'intervalle QTc et/ou entraîner des torsades de pointe : arsenic, **érythromycine IV**, torémifène, mizolastine, **moxifloxacine**, antiarythmiques de classes **IA** et **III**.

Non recommandés : **méthadone**, **halopéridol**, **amisulpride**, **chlorpromazine**, **sulpride**, **zuclopenthixol**, **halofantrine**, **pentamidine**, **lumefantrine**, **ondansétron**.

Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (augmentation du taux de **vandétanib**) : **macrolides**, **antifongiques azolés**, **inhibiteurs de protéases du VIH**, **diltiazem**, **vérapamil**, **cimétidine**, jus de pamplemousse, etc.

Inducteurs puissants du CYP3A4 (diminution de la concentration de **vandétanib**) : **rifampicine**, millepertuis, **carbamazépine**, **phénobarbital**, **phénytoïne**, **dexaméthasone**, etc.

Substrats du CYP3A4 (diminution de leur concentration par le **vandétanib** inducteur) : **œstrogénostatifs**, immunosuppresseurs (**closporine**, **tacrolimus**), agents antinéoplasiques (**docétaxel**, **bortézomib**).

Substrats de la P-gp (augmentation de leur concentration par le **vandétanib** inhibiteur) : **dabigatran**, **digoxine**, etc.

Substrat de l'OCT-2 (augmentation de sa concentration par le **vandétanib** inhibiteur) : **metformine**, etc.

Surveillance plus fréquente de l'INR si patient sous **antivitamine K**.



**INHIBITEURS DE KINASE (14)****■ Vémurafénib**

<b>ZELBORAF</b>				
4 cp. x 2/j (soit 960 mg x 2/j) Adapter en fonction de la survenue d'effets indésirables et de l'intervalle QT	56 cp. 240 mg	2 288,98	I 100 %	40,87

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur puissant de la sérine-thréonine-kinase BRAF. Activée constitutivement quand porteuse de mutations au niveau du codon 600, BRAF est capable d'entraîner la prolifération cellulaire en l'absence des facteurs de croissance normalement requis pour la prolifération.

**INDICATIONS**

Traitement des patients adultes atteints d'un mélanome non résectable ou métastatique porteur d'une mutation BRAF V600.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.  
Syndrome du QTc long congénital.  
Patients avec un intervalle QTc > 500 ms.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.  
Test validé pour confirmer la présence de la mutation BRAF V600 avant le début du traitement.

Surveillance étroite dermatologique et ophtalmologique.

Surveillance fréquente de l'ECG. Veiller à maintenir l'équilibre électrolytique du patient.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents : **réactions cutanées** (carcinome épidermoïde cutané, kératose séborrhéique, papillome cutané, photosensibilité, éruption cutanée, prurit, alopecie, etc.), céphalées, diarrhée, vomissements, arthralgie, etc.  
Fréquents : nouveau mélanome primitif, paralysie du nerf facial, uvéite, arthrite, élévation des ALAT/ASAT.

Peu fréquents : carcinome épidermoïde non cutané, occlusion de la veine rétinienne.

Rares : syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique.  
+ allongement du QT (arrêt du traitement si ≥ 500 ms).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Idem que le **vandétanib**.

+ Substrats du CYP1A2 (augmentation de leur concentration par le **vémurafénib** inhibiteur) : **imipraminiques**, **clozapine**, etc.

**CANCER DU SEIN - CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	DOSES /m <sup>2</sup>	VOIE D'ADMINIS- TRATION	RYTHME D'ADMINIS- TRATION
CMF	<b>Cyclophosphamide</b>	120 mg	PO	J1 à J14
	<b>Méthotrexate</b>	40 mg	IV	J1 et J5
	<b>Fluorouracile</b>	600 mg	IV	J1 et J8 J1 = J28
Le <b>cyclophosphamide</b> oral peut être remplacé par du <b>cyclophosphamide</b> IV à la dose de 600 mg/m <sup>2</sup> à J1 et J8				
FAC	<b>Fluorouracile</b>	500 mg	IV	J1
	<b>Doxorubicine</b>	50 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	J1 J1 = J21
La <b>doxorubicine</b> peut être remplacée par l' <b>épirubicine</b> IV à la dose de 50 mg/m <sup>2</sup> (FEC50) ou de 75 mg/m <sup>2</sup> (FEC75) à J1				
AC	<b>Doxorubicine</b>	60 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg	IV	J1 J1 = J21
TC	<b>Docétaxel</b>	75 mg	IV	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	J1 = J21
TAC	<b>Docétaxel</b>	75 mg	IV	J1
	<b>Doxorubicine</b>	50 mg	IV	J1 = J21
	<b>Cyclophosphamide</b>	500 mg	IV	
<b>TAXOL</b> hebdo	<b>Paclitaxel</b>	80 mg	IV	J1, J8, J15, J21, J28, J35 J1 = J49
<b>TAXOTÈRE</b>	<b>Docétaxel</b>	100 mg	IV	J1 J1 = J21

**CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE - CHIMIOTHÉRAPIE PALLIATIVE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS (DCI)	DOSES /m <sup>2</sup> /j	VOIE D'ADMINIS- TRATION	RYTHME D'ADMINIS- TRATION
FAC	Fluorouracile Doxorubicine Cyclophosphamide	500 mg 50 mg 500 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
FEC	Fluorouracile Épirubicine Cyclophosphamide	500 mg 50 ou 75 mg 500 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
AC	Doxorubicine Cyclophosphamide	60 mg 600 mg	IV IV	J1 J1 J1 = J21
EMV	Épirubicine Méthotrexate Vincristine	50 mg 20 mg 1 mg	IV IV IV	J1 J1 J1 J1 = J21
<b>NAVELBINE</b>	Vinorelbine	30 mg	IV	J1 J1 = J8
FUN	Fluorouracile Vinorelbine	750 mg 30 mg	IV 24 h IV	J1 à J5 J1 et J5 J1 = J21
<b>TAXOTÈRE</b>	Docétaxel	100 mg	IV	J1 = J21

**ANTIŒSTROGÈNES**■ **Tamoxifène**

<b>NOLVADEX</b>					
20 mg pendant 5 ans pour le traitement	30 cp. 10 mg	8,40	I	100 %	0,28
adjuvant	30 cp. 20 mg	17,28	I	100 %	0,58

■ **Fulvestrant**

<b>FASLODEX</b>					
250 mg x 1/mois	1 sol. inj. 250 mg/5 mL	286,54	I	100 %	286,54

**PROPRIÉTÉS**

Hormone antiœstrogène. Action œstrogénique faible. Action sur les récepteurs œstrogéniques cellulaires et sur les facteurs de croissance tumorale.

**INDICATIONS**

Cancer du sein.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque d'augmentation des symptômes cliniques à l'initiation du traitement. Suivi gyné-

cologique car augmentation de fréquence du cancer de l'endomètre.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Bouffées de chaleur, hyperplasie ou atrophie endométriale, métrorragies, nausées, troubles visuels, thrombose veineuse, prurit vulvaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Anticoagulants oraux** (augmentation d'effet).

## INHIBITEURS DE L'AROMATASE

## ■ Anastrozole

<b>ARIMIDEX</b>					
1 cp./j	30 cp. 1 mg	102,48	I	100 %	3,42
	90 cp. 1 mg	280,62	I	100 %	3,12

## ■ Létrozole

<b>FÉMARA</b>					
1 cp./j	30 cp. 2,5 mg	102,77	I	100 %	3,43

## ■ Exémestane

<b>AROMASINE</b>					
1 cp. x 1/j, de préférence après un repas	30 cp. 25 mg	67,19	I	100 %	2,24

**PROPRIÉTÉS**

Inhibition de l'aromatase. Inhibition de la biosynthèse des œstrogènes. Diminution des taux d'œstradiol et des androgènes. Pas de retentissement sur la stéroïdogénèse surrénalienne.

**INDICATIONS**

Cancer du sein.

**CONTRE-INDICATIONS**

Grossesse et allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance hépatique ou rénale sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Prurit, douleur au point d'injection, ou tuméfaction ou granulome, éruption cutanée, alopecie, somnolence, céphalées, vertiges, bouffées de chaleur, phlébite, troubles digestifs, spotting, crampes.

**PROGESTATIFS**■ **Acétate de médroxyprogestérone**

<b>FARLUTAL</b>					
500 mg ou 1 g/j	30 cp. 500 mg		I	NR	
<b>FARLUTAL RETARD</b>					
500 mg ou 1 g/j en IM profonde pendant 4 sem., puis 1 g/sem.	1 amp. inj. IM, 5 mL/500 mg retard		I	NR	

■ **Mégestrol**

<b>MEGACE</b>					
160 mg/j en une prise orale	30 cp. 160 mg	82,40	I	100 %	2,75

**PROPRIÉTÉS**

Progestatifs de synthèse. Blocage de l'axe hypophyso-ovarien et surrénalien. Diminution des taux d'œstradiol et des androgènes. Diminution de l'activité de l'œstradiol sur les cellules tumorales en se fixant sur les récepteurs à la progestérone.

**INDICATIONS**

Cancers du sein et de l'endomètre.

**CONTRE-INDICATIONS**

HTA sévère, antécédents de thrombophlébite, anomalies biologiques hépatiques, **grossesse** et **allaitement**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Prise de poids, aménorrhée, métrorragies, phlébite, embolie pulmonaire, sueurs, tremblements, prurit.

**CANCER DE L'OVAIRE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS (DCI)	DOSES /m <sup>2</sup> /j	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>CISPLATYL</b>	<b>Cisplatine</b>	75 mg	IV (3 à 4 h)	J1
<b>ENDOXAN ASTA</b>	<b>Cyclophosphamide</b>	750 mg	IV	J1 J1 = J21
ou	<b>Cisplatine</b>	100 mg	IV (3 à 4 h)	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg	IV	J1 J1 = J21
ou	<b>Cisplatine</b>	100 mg	Intrapéritonéal	J1
	<b>Cyclophosphamide</b>	600 mg	IV	J1 J1 = J21
<b>TAXOL</b>	<b>Paclitaxel</b>	175 mg 135 mg	IV (sur 3 h) IV (sur 24 h)	J1
<b>CISPLATYL</b>	<b>Cisplatine</b>	75 mg	IV (3 à 4 h)	J1 J1 = J21
<b>TAXOL</b>	<b>Paclitaxel</b>	175 mg	IV (sur 3 h)	J1
<b>PARAPLATINE</b>	<b>Carboplatine</b>	AUC à 6 mg/mL/j	IV (en 30 min, après le <b>paclitaxel</b> )	J1 J1 = J21

**CANCERS DU TESTICULE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	DOSES /m <sup>2</sup>	VOIE D'ADMINIS- TRATION	ADMINIS- TRATION RYTHME
PVeB	<b>Cisplatine</b>	120 mg	IV 4 h	J1
	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Bléomycine</b>	50 mg	IV ou IM	J1 et J8 J1 = J21
BEP	<b>Bléomycine</b>	30 mg	IV	J1, J8, J15
	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	J1 à J5 J1 = J21
EP	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV 1 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	J1 à J5 J1 = J21
VIP Protocole fortement toxique, notamment hématologique	<b>Étoposide</b>	100 mg	IV	
	<b>Ifosfamide</b>	1,5 g	IV 3 h	J1 à J5
	<b>Cisplatine</b>	20 mg	IV 4 h	
	<b>Mesna</b>	1,5 g	IV	J1 = J21



## LEUCÉMIES AIGÜES - PROTOCOLES D'INDUCTION (1)

## Protocole LAP

## ■ Trétinoïne

ATRA VESANÖD				
45 mg/m <sup>2</sup> /j en 2 prises pendant les repas, 30 à 90 j selon la rémission complète	100 caps. 10 mg	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Métabolite endogène de la vitamine A (classe des **rétinoïdes**). La **trétinoïne** pourrait modifier l'action d'un récepteur nucléaire à l'acide rétinolique (RAR). Elle induirait une différenciation des cellules et une inhibition de la prolifération dans les lignées hématopoïétiques transformées, notamment au cours de la leucémie aiguë promyélocytaire où le récepteur alpha de l'acide rétinolique est fusionné avec une protéine appelée PML.

## INDICATIONS

Leucémie aiguë promyélocytaire.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement**, allergie aux **rétinoïdes**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Syndrome d'hypervitaminose A. Syndrome d'activation leucocytaire (hyperleucocytose, fièvre, dyspnée, œdèmes et épanchements séreux, hypotension et insuffisance hépatorenale, infiltrats pulmonaires), justifiant corticothérapie et admission en réanimation si nécessaire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les **tétracyclines** (risque d'hypertension intracrânienne) et les **progestatifs**.

## Protocole LAM

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES /m <sup>2</sup> /j	ADMINISTRATION RYTHME
7 + 3	<b>Cytarabine</b>	Perfusion continue	100 à 200 mg	J1 à J7
	<b>Doxorubicine</b> ou	Bolus IV	30 mg	J1 à J3
	<b>daunorubicine</b>	Bolus IV	13 mg	
	<b>Cytarabine</b>	En 3 h, matin et soir (à 12 h d'intervalle)	3 000 mg x 2	J1 à J3

## LEUCÉMIES AIGÜES (LA) (2)

**LA lymphoblastiques (LAL)**

Le traitement repose sur :

- l'utilisation séquentielle et alternée d'**ONCOVIN** à 1 mg/m<sup>2</sup>, **ENDOXAN** 300 à 600 mg/m<sup>2</sup> et **asparaginase** ;
- la réalisation, après obtention de la réponse initiale, d'une seconde séquence de chimiothérapie à forte dose dite induction retardée ;
- une chimioprophylaxie neuroméningée par **méthotrexate** intrathécal ;
- l'utilisation d'**inhibiteurs de tyrosine-kinase (imatinib)** pour les LAL avec chromosome Philadelphie ;
- la réalisation d'une allogreffe dans la majorité des cas, notamment LAL avec chromosome Philadelphie.

**Forme particulière des LAM****Leucémie à promyélocytes (LAP)**

La chimiothérapie d'induction (type 3+7) doit être associée systématiquement à l'acide tout-trans rétinoïque (**ATRA VESANOÏD**)

45 mg/m<sup>2</sup>/j. Celui-ci est poursuivi tout au long de la consolidation et en entretien.

Les LAP sont systématiquement accompagnées d'un syndrome de coagulation intravasculaire disséminé biologique pouvant se traduire par des symptômes cliniques.

La prise en charge de la CIVD doit être précoce. Les plaquettes doivent être maintenues > 50 000/mm<sup>3</sup> pendant la durée de la coagulopathie. Les transfusions de PFC et l'administration d'héparine se font au cas par cas.

L'administration de l'**ATRA VESANOÏD** peut s'accompagner d'un syndrome de différenciation ou ATRA syndrome (hyperleucocytose, dyspnée avec infiltrats pulmonaires, épanchements pleuraux, insuffisance rénale). La prévention et le traitement repose sur l'administration précoce de **corticoïdes** à forte dose (**dexaméthasone** 10 mg x 2/j) dès l'hyperleucocytose (GB > 10 000/mm<sup>3</sup>) et/ou l'arrêt de l'**ATRA** selon la réponse aux **corticoïdes**.

**CONSENSUS**

[1] Leucémies aiguës de l'adulte, HAS, 2011

**LEUCÉMIES AIGUËS - PROTOCOLES D'INDUCTION (2)****Protocole LAL**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES /m <sup>2</sup> /j	ADMINIS- TRATION RYTHME
Induction	<b>Vincristine</b>	Bolus IV	1 mg	J1, J7, J15, J22
	<b>Cyclophosphamide</b>	Bolus IV	300 à 600 mg	J1, J7, J15, J22
	<b>Doxorubicine</b>	Bolus IV	30 à 50 mg	J1 à J15
	<b>Prednisone</b>	PO	40-60 mg	J1 à J18
Consolidation	<b>Asparaginase</b>	IV	60 000 U	J1 à J10

## LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE - MALADIE DE WALDENSTRÖM - CHIMIOTHÉRAPIE

### Mini-CHOP (LLC)

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES (mg/m <sup>2</sup> /j)	RYTHME
<b>Doxorubicine</b>	IV	25	J1 mensuel
<b>Vincristine</b>	IV	1,4 (max. 2 mg)	J1 mensuel
<b>Cyclophosphamide</b>	Orale	300	J1-J15 mensuel
<b>Prednisone</b>	Orale	40	J1-J15 mensuel

### R-FC (LLC)

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES (mg/m <sup>2</sup> /j)	RYTHME
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375	J1
<b>Fludarabine</b>	IV	25	J1, J2, J3
<b>Cyclophosphamide</b>	Orale	300	J1, J2, J3

### CHLORAMBUCIL - CORTICOÏDES CONCENTRÉS (LLC et maladie de Waldenström)

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES	RYTHME
<b>Chlorambucil</b>	Orale	10 mg/m <sup>2</sup> /j	4 j toutes les 4 sem.
<b>Prednisone</b>	Orale	40 à 80 mg/m <sup>2</sup> /j	Toutes les 4 sem.

### FLUDARABINE (LLC et maladie de Waldenström)

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES	RYTHME
<b>Fludarabine</b>	IV	25 mg/m <sup>2</sup> /j	5 j de suite, reprise J28
	Orale	40 mg/m <sup>2</sup> /j	5 j de suite, reprise J28

### SURVEILLANCE

Clinique : état général, poids, adénopathies, splénomégalie.

Hémogramme.

État immunitaire : test de Coombs, dosage d'immunoglobulines.

### Penser au syndrome de Richter :

- en cas d'évolution aiguë d'adénopathie localisée ;
- confirmer l'acutisation par biopsie ;
- et traiter comme un lymphome non hodgkinien de grande malignité.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE FAIBLE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE

### Protocole CVP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Vincristine</b>	IV	1,4	J1
<b>Cyclophosphamide</b>	PO	500	J1 à J5
<b>Prednisolone</b>	PO	40	J1 à J5
Reprise J21			

### Protocole R-CVP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375	J1
<b>Vincristine</b>	IV	1,4	J1 à J5
<b>Cyclophosphamide</b>	PO	500	J1
<b>Prednisolone</b>	PO	40	J1 à J5
Reprise J21			

### Protocole CEC

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES (mg/m <sup>2</sup> )	RYTHME
<b>Lomustine</b> (CCNU)	Orale	80	J1
<b>Étoposide</b> (VP 16)	Orale	100	J1-J5
<b>Chlorambucil</b> (CLB)	Orale	10	

#### SURVEILLANCE

Toxicité immédiate minime et différée (hémogramme).

Efficacité après 4 cycles de chimiothérapie : si elle est insuffisante, changer de protocole.

#### COMPLICATIONS

Acutisation : transformation en LNH de grande malignité.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (1)

### Protocole CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cyclophosphamide</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>		50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	J1-J7

### Protocole R-CHOP

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Rituximab</b>	IV en perfusion	375 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Cyclophosphamide</b>	IV	750 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Doxorubicine</b>	IV En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté salé isotonique ou en glucosé à 5 % l'un après l'autre, séparément dans l'ordre et après un autre de 100 mL : - <b>doxorubicine</b> - <b>cyclophosphamide</b> - <b>vincristine</b>	50 mg/m <sup>2</sup>	Puis J21
<b>Vincristine</b>		1,4 mg/m <sup>2</sup>	Puis J42
<b>Prednisolone</b>	Orale	40 mg/m <sup>2</sup>	de J1 à J7

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH) (3) – LYMPHOMES B DIFFUS À GRANDES CELLULES

Le **lymphome B diffus à grandes cellules** est le plus fréquent des lymphomes dits agressifs.

Le traitement des lymphomes agressifs nécessite une décision collégiale préalable en RCP dédiée.

### Éléments décisionnels

#### Stade Ann Arbor

Cf. *supra*.

#### Score pronostique : IPI (*International Prognostic Index* - révisé)

Il attribue 1 point par critère : risque bas (0), intermédiaire (1-2), haut (3-5).

- Âge > 60 ans.
- Nombre d'atteintes extraganglionnaires > 1.
- LDH > 1N.
- PS > 2.
- Stade Ann Arbor > III/IV.

#### Sous type : GC (centre germinatif) versus non GC

La distinction se fait selon le profil d'expression génique de la tumeur déterminant l'origine du lymphocyte B tumoral provenant du centre germinatif ou autre. Cette information nécessite une technique longue et non compatible avec le délai d'initiation du traitement à ce jour. Elle sera néanmoins utile dans la décision thérapeutique dans l'avenir et est demandée dans la plupart des protocoles de recherche clinique.

### Indications thérapeutiques

- *Sujets d'âge < 60 ans*
- Chimiothérapie :
  - R-CHOP (cycles tous les 21 j) : 6 à 8 cycles selon le stade Ann Arbor et l'IPI ;
  - R-ACVBP : alternative plus intense au R-CHOP pour les stades III/IV et/ou IPI haut. Elle aurait aussi un bénéfice dans les sous types « non GC ».
  - Autogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> ligne pour les stades III/IV et/ou IPI haut et chimio-

sensibles, (généralement protocole R-ACVBP + **méthotrexate** haute dose + autogreffe).

- Radiothérapie : surtout indiquée en IFRT (*Involved Field Radiotherapy*) pour les masses tumorales localisées et surtout bulky. Pas de bénéfice démontré dans les autres cas.

L'évaluation par PET-TDM en cours de traitement permet un ajustement thérapeutique dans les protocoles.

- *Sujets d'âge > 60 ans*
- R-CHOP (tous les 21 j) x 8 cycles.
- Âge > 80 ans : R-mini-CHOP (moitié dose).
- Adaptation de l'utilisation de l'**anthracycline** à la fonction cardiaque.

#### ► *Rechutes*

- Chimiothérapie de rattrapage à base de **sels de platine** (ex : R-DHAP, R-ICE).
- Autogreffe : indication systématique après obtention d'une réponse post-chimiothérapie de rattrapage.
- Allogreffe : discutée en 1<sup>re</sup> rechute pour les rechutes à haut risque (stade diffus, IPI haut, précoces).

#### ► *Cas particulier des lymphomes indolents transformés*

Le pronostic est réservé.

Le traitement doit prendre en compte le passé thérapeutique (notamment l'utilisation d'**anthracyclines**).

Les chimiothérapies de type « Lymphome diffus à grandes cellules » s'appliquent. Ici l'autogreffe en 1<sup>re</sup> ligne doit être proposée.

#### ► *Prophylaxie neuroméningée*

Systématique en cas d'atteinte ophtalmique, ORL, épidurale, extraganglionnaire particulière (testicules, sein, surrénales, rein), stades III/IV (notamment BOM+), IPI haut (notamment LDH élevées).

Repose sur l'injection intrathécale de **méthotrexate** ± **cytarabine** à chaque cycle de R-CHOP (max 3 inj.) ou cycle de chimiothérapie complémentaire par **méthotrexate** haute dose IV.

## LYMPHOMES NON HODGKINIENS DE GRANDE MALIGNITÉ - CHIMIOTHÉRAPIE (2)

### Protocole R-DHAP - Lymphomes du manteau

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (CYCLE DE 21 J)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Dexaméthasone</b>	40 mg	PO	J3, J4
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	2 000 mg/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1

### R-ICE – Lymphome B diffus à grandes cellules

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION (J1 = J14)
<b>Rituximab</b>	375 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1
<b>Isofosfamide</b>	5 g/m <sup>2</sup>	IV	J2
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1 à J3
<b>Carboplatine</b>	5 AUC (mg)	IV	J1 à J3

### BEAM - Intensification - Autogreffe - Lymphomes

MÉDICAMENTS	DOSE/J	VOIE D'ADMINISTRATION	RYTHME D'ADMINISTRATION
<b>Cytarabine (ARACYTINE)</b>	200 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Étoposide</b>	100 mg/m <sup>2</sup> x 2/j	IV	J-6, J-5, J-4, J-3
<b>Carmustine</b>	300 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-6
<b>Melphalan</b>	140 mg/m <sup>2</sup>	IV	J-2

#### **SURVEILLANCE**

Toxicité immédiate (vomissements) ou différée (hémogramme, alopecie).

Efficacité après 2 séries de chimiothérapie : si insuffisante changer de protocole; éventuellement chimiothérapie intensive avec support de cellules souches sanguines.

#### **COMPLICATIONS RETARDÉES**

Deuxième cancer généralisé (leucémie aiguë myéloïde) ou localisé dans le territoire irradié.



**MYÉLOME MULTIPLE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocole VTD - Myélome du sujet jeune**

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Bortézomib (VELCADE)</b>	1,3 mg/m <sup>2</sup>	IV	J1, J4, J8, J11
<b>Thalidomide</b>	100 mg dose totale	PO	Continu
<b>Dexaméthasone</b>	40 mg dose totale	PO	J1, J8, J11, J21

**Protocole MP/Thalidomide - Myélome du sujet âgé**

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Melphalan</b>	0,18-0,2 mg/kg	PO	J1-J4
<b>Thalidomide</b>	100 mg dose totale	PO	Continu
<b>Prednisone</b>	2 mg/kg	PO	J1-J4

**Protocole REVLIMID/Dexaméthasone - Myélome**

Médicament	Dose/j	Voie	Rythme d'administration (cycle de 28 j)
<b>Lénalidomide (REVLIMID)</b>	25 mg dose totale	PO	J1-J21
<b>Dexaméthasone</b>	20 mg dose totale	PO	J1, J8, J11, J21

## ANTINÉOPLASQUES (31) – AUTRES ANTINÉOPLASQUES (3)

### ■ Tasonermine

<b>BÉROMUN</b>				
Perf. du membre isolé (ILP : <i>Isolated Limb Perfusion</i> ) sous légère hyperthermie Membre supérieur : dose totale de 3 mg Membre inférieur : dose totale de 4 mg <b>Melphalan</b> associé : 13 mg/unité de volume (en litre) du membre supérieur perfusé 10 mg/ unité de volume (en litre) du membre inférieur perfusé Résection chirurgicale de la tumeur résiduelle effectuée dès que possible. Si nécessaire, seconde ILP pratiquée 6 à 8 sem. après la 1 <sup>re</sup>	1 pdr. + solv. 1 mg/ 5 mL	HOP	I	

### PROPRIÉTÉS

Cytokine de la famille du TNF $\alpha$ .

- Inhibition directe de la prolifération des cellules tumorales par effet cytotoxique ou cytostatique.
- Effet direct sur la vascularisation tumorale par induction de thromboses microvasculaires.
- Infiltration facilitée de la tumeur par les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires.
- Effet immunomodulateur direct et indirect.

### INDICATIONS

Traitement en association avec le **melphalan** des sarcomes des tissus mous des membres :  
– avant résection chirurgicale de la tumeur, afin d'éviter ou de retarder l'amputation ;  
– à titre palliatif, pour les sarcomes inopérables.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce sont celles de la **tasonermine** et de la technique d'ILP.

- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Maladies cardiovasculaires ou pulmonaires graves.
- Ulcère gastrique évolutif ou antécédents récents d'ulcère gastrique.
- Ascite sévère.
- Altérations sévères hématologique, des fonctions rénale ou hépatique.
- Hypercalcémie > 12 mg/dL (2,99 mmol/L).
- Lymphoedème sévère du membre.
- Patients chez qui les vasopresseurs ou antioagulants sont contre-indiqués.
- Contre-indication aux marqueurs radioactifs.
- Contre-indication à l'hyperthermie du membre.

- Patients dont on suppose que l'irrigation du membre en aval de la tumeur dépend très étroitement des vaisseaux tumoraux (artériographie parfois nécessaire).
- Grossesse et allaitement.
- Contre-indications au **melphalan**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Technique d'ILP mise en œuvre dans des centres spécialisés, sous anesthésie générale. Hydrater le patient avant, pendant et après l'ILP.

Surveillance du patient les 3 premiers j suivant la perf.

Conditionnement contenant du latex.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : arythmies (cardiotoxicité), hépatotoxicité, réaction cutanée.

Fréquents : infection, leucopénie, thrombocytopénie, réaction d'hypersensibilité, neurotoxicité, insuffisance cardiaque, thromboses veineuse et artérielle, syndrome de détresse respiratoire, nécrose cutanée et des extrémités (amputation parfois nécessaire), etc.

Peu fréquents : sepsis, maladie artérielle périphérique occlusive, oedème pulmonaire, syndrome de compression des loges musculaires, onychomadèse.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indiqués : substances cardiotoxiques** (ex : **anthracyclines**).

Déconseillés : médicaments susceptibles de provoquer une importante hypotension.

+ interactions médicamenteuses avec le **melphalan**.

**SARCOME DES TISSUS MOUS DE L'ADULTE - CHIMIOTHÉRAPIE****Protocoles**

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS (DCI)	DOSES (/m <sup>2</sup> /j)	VOIE D'ADMINISTRATION	ADMINISTRATION RYTHME
DOXO	<b>Doxorubicine</b>	50 mg	IV	J1 J1 = J21
MAID	<b>Mesna</b> <b>Doxorubicine</b> <b>Ifosfamide</b> <b>Dacarbazine</b>	2,5 g 20 mg 2,5 g 300 mg	IV perf. continue IV IV 3 h IV	J1, J2, J3 J1, J2, J3 J1, J2, J3 J1, J2, J3 J1 = J21

## MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE AGRANULOCYTOSE

(seuls les produits les plus utilisés sont cités)

	DCI	NOM COMMERCIAL
Anti-inflammatoires	Phénylbutazone	<i>BUTAZOLIDINE</i>
	Indométacine	<i>INDOCID</i>
	Fénoprophène	<i>NALGESIC</i>
Antiulcéreux	Cimétidine	<i>TAGAMET CIMÉTIDINE STOMÉDINE</i>
	Ranitidine	<i>AZANTAC RANIPLEX</i>
Psychotropes	Diazépam	<i>VALIUM ROCHE DIAZÉPAM RATIOPHARM</i>
	Carbamazépine	<i>TÉGRÉTOL</i>
	Clomipramine	<i>ANAFRANIL</i>
	Chlorpromazine	<i>LARGACTIL</i>
	Imipramine	<i>TOFRANIL</i>
	Méprobamate	<i>ÉQUANIL MÉPRONIZINE</i>
	Alimémazine	<i>THÉRALÈNE</i>
	Phénytoïne	<i>DI-HYDAN</i>
	Primidone	<i>MYSOLINE</i>
Anti-infectieux	Céphalosporines	
	Pénicillines	
	Zidovudine	<i>RÉTROVIR</i>
Anti-uriques	Allopurinol	<i>ZYLORIC</i>
	Colchicine	<i>COLCHICINE OPOCALCIUM COLCHIMAX</i>
Antihypertenseurs	Propranolol	<i>AVLOCARDYL</i>
	Captopril	<i>LOPRIL CAPTEA</i>
Antiarythmiques	Disopyramide	<i>RYTHMODAN</i>
Anticoagulants et antiagrégants	Ticlopidine	<i>TICLID</i>
Antithyroïdiens	Carbimazole	<i>NÉO-MERCAZOLE</i>
	Benzylthiouracile	<i>BASDÈNE</i>

## MALADIE DE HODGKIN - CHIMIOTHÉRAPIE

## Protocole ABVD

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME
<b>Doxorubicine</b>	En injection lente dans la tubulure d'une perfusion de soluté glucosé à 5 % l'un après l'autre, dans l'ordre, etc.	25 mg/m <sup>2</sup>	J1 et J15
<b>Bléomycine</b>		10 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Vinblastine</b>		6 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Dacarbazine</b>	En perfusion lente d'une heure dans soluté glucosé 250 mL	375 mg/m <sup>2</sup>	Reprise J28

## Protocole MOPP/ABV

MÉDICAMENTS	VOIE D'ADMINISTRATION	DOSES UNITAIRES	RYTHME
<b>Chlorméthine</b>	IV	6 mg/m <sup>2</sup>	J1
<b>Vincristine</b>	Dans la tubulure d'une perfusion de 250 mL de soluté glucosé à 5 %	1,4 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Doxorubicine</b>	IV	35 mg/m <sup>2</sup>	J8
<b>Bléomycine</b>	Dans la tubulure d'une perfusion de 500 mL de soluté glucosé à 5 %	10 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Vinblastine</b>		6 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Procarbazine</b>	Orale	100 mg/m <sup>2</sup>	J1 à J7
<b>Prednisone</b>	Orale	40 mg	J1 à J14
		Arrêt progressif dans les 48 h suivantes	

## SURVEILLANCE

- Toxicité immédiate (vomissements) et différée (hémogramme).
- Efficacité après deux cycles de chimiothérapie : si elle est insuffisante, changer de protocole.

## COMPLICATIONS RETARDÉES

- Deuxième cancer généralisé (rarement leucémie aiguë myéloïde) ou localisé dans le territoire irradié (sein chez les jeunes femmes irradiées).
- Rétrécissement vasculaire (infarctus du myocarde) en territoire irradié.

## OSTÉOSARCOME - CHIMIOTHÉRAPIE

## Protocoles

PROTOCOLE	MÉDICAMENTS	DOSES /m <sup>2</sup>	VOIE D'ADMINIS- TRATION	ADMINIS- TRATION RYTHME
<b>MTX</b> fortes doses + <b>DOXORUBICINE</b>	<b>Méthotrexate</b>	8 g après la puberté 12 g avant la puberté	IV sur 4 h	J1, J8, J15 Débuté à H0
	<b>LEDERFOLINE</b>	15 mg toutes les 6 h à partir de H24	IV	J2 H24
	<b>Doxorubicine</b>	75 mg	IV	J21
Protocole hautement toxique. Les concentrations sériques de <b>MTX</b> doivent être : – < 5 µmol/L à H24 – < 1,5 µmol/L à H48 Surveillance : hydratation, diurèse, poids, troubles digestifs, pH urinaire.				

## SELS FERREUX (1) – FER SEUL ORAL (SEL FERREUX)

## ■ Ascorbate ferreux

<b>ASCOFER</b>				
A. : 100 à 200 mg/j en 1 à 2 prises, jusqu'à reconstitution du stock en fer (3 mois) E. et N. : 6 à 10 mg/kg/j	30 gél. 33 mg	3,23	65 %	0,11

Reprise J28 (une cure toutes les 4 sem.)

## ■ Ferédétate de sodium

<b>FERROSTRANE</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	25 càc 34 mg (fl. 125 mL)	2,62	65 %	0,10

## ■ Fumarate ferreux

<b>FUMAFER</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	50 cp. 66 mg 100 cp. 66 mg 50 doses 33 mg	HOP 2,78	65 % NR	0,03

## ■ Succinate ferreux + acide succinique

<b>INOFER</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	100 cp. séc. 100 mg	6,31	65 %	0,06

## ■ Sulfate ferreux

<b>TARDYFERON</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 80 mg 100 cp. 80 mg	3,56 HOP	65 %	0,12

## SELS FERREUX (2) – FER ET VITAMINE C ORAL (SULFATE)

## ■ Sulfate ferreux + acide ascorbique

<b>FERO GRAD VITAMINÉ C 500</b>				
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 105 mg + ac. ascorbique 500 mg	3,16	65 %	0,11

## ANÉMIES (2)

### Traitement martial substitutif

#### ► *Traitement curatif*

• Voie orale à privilégier (en absence de troubles d'absorption) :

– **sel ferreux** : 2-3 mg de fer/kg/j (soit minimum 100 mg/j) chez l'adulte. Avertir le patient de la survenue de flatulences et de coloration noire des selles pour améliorer l'observance ;  
– l'association de **vitamine C** n'a pas démontré de bénéfices.

• Voie parentérale : dans le circuit de dialyse d'une insuffisance rénale dialysée, en cas de malabsorption et plus rarement en cas de résistance ou intolérance de la voie orale. **VENOFER** 100 à 200 mg x 2 à 3/sem.

• Objectif : normalisation de la ferritine (durée habituelle du traitement : 4 à 6 mois).

#### ► *En prophylaxie*

Pour les patients à risque de carence martiale : grossesse (1 mg/kg/j à partir du 4<sup>e</sup> mois), prématurés (2-3 mg/kg/j dès le 3<sup>e</sup> mois de vie), nourrissons (lait supplémenté en fer).

### Conduite à tenir devant une anémie microcytaire hypochrome

• Éliminer la cause inflammatoire et les hypochromies congénitales (fer sérique bas, ferritine normale ou élevée, électrophorèse de l'hémoglobine).

• Rechercher l'origine :

– carence d'apport (anamnèse),  
– troubles d'absorption (examen digestif),  
– perte digestive bénigne ou maligne (exploration digestive),  
– pertes gynécologiques bénignes ou malignes (examen gynécologique),  
– dons répétés de sang (anamnèse),  
– automutilation (anamnèse, bilan psychologique).

• Compenser parfois, corriger la carence martiale toujours.

### Carence en fer (pour adulte) et en l'absence de carence vitaminique et d'amputation digestive

**TARDYFERON** : cp. 80 mg, 4 boîtes de cp. :

- 1 cp. x 2/j, en dehors des repas pendant 1 mois ;
- 1 cp./j par la suite pendant 3 mois ;

ou

**FUMAFER** : cp. 66 mg, 3 boîtes de cp. :

- 1 cp. x 3/j avant les repas pendant 1 mois ;
- puis 1 cp. x 2/j pendant 3 mois.

**Ordonnance** de surveillance du dosage de la ferritine en fin de traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.

### Anémies par carence en folates et vitamine B12

Les vitamines B9 (folates) et B12 (cobalamines) sont essentielles à la synthèse d'ADN pour les divisions cellulaires. Toute carence entraîne une macrocytose voire une mégalo-blastose (VGM > 120 fl) par arrêt des divisions.

L'enquête étiologique est indispensable avant le traitement substitutif.

Le myélogramme est indispensable pour éliminer une myélodysplasie ou hémopathie maligne.

En cas de carence mixte, il faut commencer par substituer en vitamine B12.



## SELS FERREUX (3) – FER INJECTABLE

## ■ Fer

<b>VENOFER</b>					
Quantité de fer (mg) = poids (kg) x 2,4 x [Hb <sub>cible</sub> - Hb <sub>actuelle</sub> ] (g/100 mL) Ne pas dépasser 300 mg/inj. en IV lente (90 min)	5 amp. 5 mL (100 mg)	HOP	I		
<b>FERINJECT</b>					
Posologie maximale : 1 000 mg/j Sans jamais dépasser 15 mg/kg/j en IV bolus et 20 mg/kg en perf. (dans du NaCl 0,9%) Hb < 10 g/dL : 1 500 mg si poids < 70 kg 2 000 mg si poids ≥ 70 kg Hb ≥ 10 g/dL : 1 000 mg si poids < 70 kg 1 500 mg si poids ≥ 70 kg	1 fl. 2 mL (100 mg) 2 fl. 10 mL (500 mg)	27,65 123,44	I I	65 % 65 %	27,65 61,72

**PROPRIÉTÉS**

Le fer administré sous forme de **sels ferreux** par voie orale est absorbé dans le duodénum et le jéjunum, le fer ferreux entre dans la formation de l'hémoglobine. 10 à 20 % du fer ingéré est absorbé. Cette absorption intéresse l'ion ferreux.

**INDICATIONS**

Carence martiale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Surcharge martiale normale ou hypersodémique : thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les **sels ferreux** sont à l'origine d'une irritation du tube digestif à l'initiation du traitement. Les doses utiles peuvent être atteintes par paliers. Nausées, épigastralgies, diarrhée ou au contraire constipation. Ces effets sont rares. Selles noires (avertir le patient).

La voie IV peut en plus entraîner exceptionnellement une altération de l'état général ou une réaction anaphylactique.

**INTERACTIONS**

Absorption diminuée par l'alimentation.

Absorption augmentée par la prise concomitante d'**acide ascorbique**.

Conduite à tenir devant une anémie hémolytique

- Avant toute correction, il convient de prendre des échantillons de sang pour déterminer la cause. Toute transfusion ou corticothérapie intempestive «brouille» la démarche diagnostique quand elle n'aggrave pas la situation.
- Anémie hémolytique congénitale chez l'enfant, dans un contexte connu : rechercher une hémoglobinopathie (électrophorèse), une enzymopathie (dosage), ou anomalie membranaire (tests appropriés).
- Anémie hémolytique acquise souvent auto-immune : aucune transfusion avant d'avoir précisé la nature de l'anticorps :
  - hémolyse immunologique par accident transfusionnel ou auto-immune ;
  - hémolyse toxique ou chimique parfois médicamenteuse ;
  - hémolyse infectieuse (germe de type streptocoque) dans un contexte fébrile ou de choc ;
  - hémolyse mécanique des valves (rarement) ou des CIVD (parfois), même de cause toxique (morsure de serpent).
- Définir l'auto-anticorps de l'anémie hémolytique immunologique de façon à prévoir une transfusion compatible (pas forcément iso-groupe, iso-Rhésus).

## ANÉMIES (3)

**Anémie par carence en acide folique**► **Traitement étiologique**

*Suppression de la cause quand cela est possible* : alcoolisme, troubles du transit, prophylaxie de la malnutrition, arrêt de la chimiothérapie (ce qui n'est pas toujours possible).

► **Traitement substitutif**

• *Par voie orale* en l'absence de troubles d'absorption :

– **acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** 30 mg/j pour adulte pendant 2 mois. 5 mg/j en préventif (grossesse, gastrectomie, traitement toxique) ;

– **acide folinique (LEDERFOLDINE)** IV ou oral.

• *Par voie parentérale* si troubles d'absorption.

**Causes de carence en acide folique**

- Besoins journaliers : 3 à 4 mg/kg/j.
- Causes acquises à chercher :
  - déficit d'apport,
  - troubles digestifs par diarrhée chronique ou amputation du grêle,
  - alcoolisme
  - chimiothérapie par antifolique (**méthotrexate**).
- Causes congénitales : déficits enzymatiques du métabolisme des folates.

**Carence en acide folique  
et anémie mégaloblastique  
et en l'absence d'autres carences  
(partielle, vitamine B12, etc.)**

1. En l'absence de troubles du transit ou d'absorption

**LEDERFOLDINE** : cp. 2 mg, 2 boîtes :

- 1 cp. x 2/j pendant 10 j,
- 1 cp./j après le 10<sup>e</sup> j, pendant 20 j ;

ou

**SPÉCIAFOLDINE** : cp. 5 mg, 2 boîtes :

- un 1 cp. x 2/j pendant 10 j,
- puis 1 cp./j pendant 20 j.

2. En cas de troubles du transit ou d'absorption (amputation digestive)

**FOLINATE DE CALCIUM** : 25 mg, 1 boîte de 10 amp. :

- une inj. IM de 25 mg tous les 2 j pendant 10 j ;
- une inj. de 50 mg (2 amp.) par la suite x 1/sem.

**Anémie par carence en vitamine B12****Conduite à tenir devant une anémie mégaloblastique**

- Voir si le patient est sous chimiothérapie (quel que soit le produit).
- En établir le type (déficit en **acide folique** ou en **vitamine B12**).
- En établir la cause :
  - carence d'apport (souvent),
  - troubles d'absorption fonctionnels ou mécaniques (parfois),
  - causes congénitales (rarement).
- Compenser selon la cause par apport oral ou parentéral.

**La maladie de Biermer** est la principale étiologie à rechercher en cas de carence en B12 :

- maladie auto-immune: recherche d'Ac antifacteur intrinsèque et anticellules pariétales de l'estomac ;
- gastroscopie : recherche d'atrophie gastrique et cancer gastrique ;
- rechercher une autre carence associée (fer).

Les autres causes de carence en **vitamine B12** sont rares et dominées de nos jours par l'origine végétarienne mais aussi la sous-alimentation d'origine sociale. Toute entrave à l'absorption de **vitamine B12** entraîne la même pathologie.

• *Le traitement de la cause* est prépondérant si cela est possible (ce qui est plutôt rare) : prévention chez les végétariens et les gastrectomisés.

• Apport de **vitamine B12** plutôt par voie parentérale : les carences vraies sont exceptionnelles, les troubles souvent liés aux problèmes d'absorption. Apport journalier de 1 000 µg pendant 8 j, puis 1 000 µg/sem. pendant 1 mois, puis 1 000 µg x 1/mois tant que la cause persiste.

**SELS FERREUX (4) – FER ET ACIDE FOLIQUE****■ Sulfate ferreux et acide folique**

<b>TARDYFERON B9</b>				
1 cp./j à partir de la 24 <sup>e</sup> semaine de grossesse	30 cp. 50 mg de fer + 0,35 mg d'acide folique	3,73	65 %	0,12

**INDICATIONS**

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Des troubles gastro-intestinaux tels que : nausées, états nauséeux, constipation, diarrhée, douleur abdominale sont liés à la présence de fer.

Une coloration habituelle des selles en noir ou gris-noir est observée.

## ÉRYTHROPOÏÉTINE HUMAINE

## ■ Époétine alpha

<b>EPREX</b>					
Traitement de l'anémie symptomatique chez des patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie : 150 UI/kg x 3/sem ou 450 UI/kg x 1/sem. En pratique : 30 000 à 60 000 UI/sem. SC initialement puis adapter Transfusion autologue programmée 600 UI/kg x 2/sem. IV pendant 3 sem.	1 ser. 0,5 mL (40 000 UI/mL soit 20 000 UI)	146,89	I	65 %	146,89
	1 ser. 0,75 mL (40 000 UI/mL soit 30 000 UI)	216,99	I	65 %	216,99
	1 ser. 1 mL (40 000 UI/mL soit 40 000 UI)	285,82	I	65 %	285,82
<b>BINOCRIT</b>					
Idem <b>EPREX</b> Les dosages de 1 000 à 10 000 UI existent aussi en conditionnement de 6 ser.	1 ser. 1 000 UI/0,5 mL	7,52	I	65 %	7,52
	1 ser. 2 000 UI/1 mL	14,50	I	65 %	14,50
	1 ser. 3 000 UI/0,3 mL	21,47	I	65 %	21,47
	1 ser. 4 000 UI/0,4 mL	28,45	I	65 %	28,45
	1 ser. 5 000 UI/0,5 mL	34,97	I	65 %	34,97
	1 ser. 6 000 UI/0,6 mL	41,10	I	65 %	41,10
	1 ser. 8 000 UI/0,8 mL	53,36	I	65 %	53,36
	1 ser. 10 000 UI/1 mL	65,63	I	65 %	65,63
	1 ser. 20 000 UI/0,5 mL	126,96	I	65 %	126,96
	1 ser. 30 000 UI/0,75 mL	188,10	I	65 %	188,10
	1 ser. 40 000 UI/1 mL	247,32	I	65 %	247,32

## ■ Époétine bêta

<b>NÉORECORMON</b>					
Idem <b>EPREX</b> Prévention de l'anémie du nouveau-né prématuré : 250 UI/kg x 3/sem. pendant 6 sem. A débiter avant le 3 <sup>e</sup> j de vie.	1 ser. 0,6 mL (20 000 UI/mL)	HOP	I		
	1 ser. 0,6 mL (30 000 UI/mL)	HOP	I		
	4 ser. 0,6 mL (30 000 UI/mL)	829,45	I	65 %	207,36

## ■ Darbépoétine alpha

<b>ARANESP</b>					
Traitement de l'anémie symptomatique chez des patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie : 2,25 µg/kg/sem. en 1 inj. SC ou 6,75 µg/kg/3 sem. En pratique : 500 µg/3 sem. ou 150 à 300 µg/sem.	1 ser. 0,3 mL (150 µg)	231,56	I	65 %	231,56
	1 stylo SC 0,3 mL (150 µg)	231,56	I	65 %	231,56
	1 ser. 0,6 mL (300 µg)	452,71	I	65 %	452,71
	1 stylo SC 0,6 mL (300 µg)	452,71	I	65 %	452,71
	1 ser. 1 mL (500 µg)	734,56	I	65 %	734,56
	1 stylo SC 1 mL (500 µg)	734,56	I	65 %	734,56

Voir la pharmacologie des **agents stimulant l'érythropoïèse (ASE)** en néphrologie.

## FOLATES - FOLINATES

## ■ Acide folique

<b>SPÉCIAFOLDINE</b>					
5 à 10 mg/j soit 1 à 2 cp./j En l'absence de troubles de transport ou de métabolisme ou de folate	20 cp. 5 mg	2,33		65 %	0,12

## ■ Acide folinique

<b>FOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA</b>					
5 à 10 mg par voie injectable Les fortes doses sont réservées pour le sauvetage de <b>méthotrexate</b>	25 amp. 5 mg/2 mL 10 fl. 50 mg 1 inj 100 mg 1 inj 200 mg 1 inj. 350 mg	HOP HOP HOP HOP HOP			
<b>FOLINORAL</b>					
Anémie mégalo-blastique iatrogène : <b>triméthoprim</b> ou <b>salazopyridine</b> 5 à 10 mg/j <b>pyriméthamine</b> 10 à 25 mg/j ou 30 à 75 mg/sem.	28 gél. 5 mg 14 gél. 25 mg	9,75 14,71	I	65 % 65 %	0,35 1,05
<b>LEDERFOLINE</b>					
Idem <b>FOLINORAL</b> Les fortes doses sont réservées pour le sauvetage de <b>méthotrexate</b>	30 cp. 5 mg 30 cp. 15 mg 30 cp. 25 mg	10,40 20,63 30,87	I	65 % 65 % 65 %	0,35 0,69 1,03

## PROPRIÉTÉS

L'**acide folinique** entre dans la synthèse de l'ADN de la lignée érythroblastique. Il permet la maturation harmonieuse du noyau parallèlement à l'évolution du cytoplasme et de la charge en hémoglobine. Normalement les **folates** sont apportés par l'alimentation diversifiée.

## INDICATIONS

Carence en acide folique.

## CONTRE-INDICATIONS

L'apport de l'**acide folinique** ou de l'**acide folique** doit être réservé aux anémies mégaloblastiques par déficit en vitamine B12 sans apport de **vitamine B12**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence de troubles d'absorption, la voie orale doit être préférée. En cas de troubles d'absorption, la voie parentérale peut être utilisée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Possibilité de réduction de l'activité des **anti-épileptiques**.

## VITAMINE B12

## ■ Cyanocobalamine

<b>VITAMINE B12 DELAGRANGE</b>				
Traitement d'attaque : 1 000 µg/j pendant 7 j, puis 1 000 µg 1/sem. pendant 1 mois Traitement d'entretien : 1 000 µg x 1/mois Chez le végétarien : 1 amp. par voie orale dans 1/2 verre d'eau	6 amp. 1 000 µg/2 mL	2,73	65 %	0,46
<b>VITAMINE B12 GERDA</b>				
Carence d'apport chez les végétariens : 1 amp. par voie orale dans 1/2 verre d'eau	6 amp. 1 000 µg/2 mL	2,73	65 %	0,46

## ■ Hydroxocobalamine

<b>DODÉCAVIT</b>				
Traitement d'attaque : 1 mg (1 amp.) en IM/j ou x 3/sem., soit 10 mg au total Traitement d'entretien : 1 mg (1 amp.) en IM/mois	6 amp. de 2 mL dosée à 1 mg	3,37	30 %	0,56

**PROPRIÉTÉS**

La **vitamine B12**, ou plus exactement la **cobalamine** est un composé de substances présentes exclusivement dans les produits d'origine animale (l'œuf) ; les végétaux en sont dépourvus. Elle permet la maturation de noyaux de la lignée érythroblastique en intervenant dans la synthèse des acides nucléiques.

Il y a deux types de produits :

- soit **cyanocobalamine** ;
- soit **hydroxocobalamine**.

Il faudrait préférer l'**hydroxocobalamine** dans les prescriptions.

**INDICATIONS**

Traitement correcteur et préventif des anémies mégalo-blastiques par déficit en **vitamine B12**

ou par troubles d'absorption de la **vitamine B12**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Toute néoplasie évolutive, hypersensibilité aux cobalamines.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez les végétariens, la voie orale peut être utilisée. Dans les amputations digestives ou en cas de troubles d'absorption ou d'anémie de Biermer, la voie injectable est indispensable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques : prurit, urticaire, action eczématiforme, possibilité de choc anaphylactique, nécrose cutanée ou œdème de Quincke. Possibilités de douleurs aux points d'injection ou de coloration rouge des urines. Risque d'acné.

## CHÉLATEURS DU FER (1)

## ■ Déféroxamine

<b>DESFÉRAL</b>					
Hémochromatose primitive ou secondaires transfusions, intoxication martiale ou aluminique aiguë À perfuser en SC au moyen d'une pompe portable sur 8-24 h, 5 à 7 j/sem.	1 fl. 500 mg + 5 mL solv.	6,63	I	100 %	6,63
	1 fl. 2 g + 20 mL solv.	24,89	I	100 %	24,89

## ■ Déférasirox

<b>EXJADE</b>					
Surcharge en fer des patients thalassémiques de plus de 6 ans, et surcharge transfusionnelle pour patients de 2-5 ans en cas de contre-indication à la <b>déféroxamine</b> 20 mg/kg en une prise 30 min avant un repas (le même) en suspension dans un demi-verre d'eau ou jus de fruit	28 cp. 125 mg	203,71	I	65 %	7,28
	28 cp. 500 mg	768,40	I	65 %	27,44

## ■ Défériprone

<b>FERRIPROX</b>					
Surcharge en fer dans thalassémie et pour contre-indication à la <b>déféroxamine</b> 25 mg/kg x 3/j	100 cp. séc. 500 mg	HOP	I		
	50 cp. séc. 1 000 mg	HOP	I		
	1 fl. sol. buv. (100 mg/mL)	HOP	I		

## HÉMOGLOBINOPATHIES (2) – DRÉPANOCYTOSE

### Traitement des crises vaso-occlusives

#### Critères de gravité d'une CVO : discuter un transfert en réanimation

- Respiratoires : FR > 30/min ou < 10/min, respiration superficielle, parole difficile, hypoxémie ( $\text{PaO}_2 < 60$  mmHg), acidose.
- Neurologiques : altération de la conscience, signes neurologiques centraux.
- Fièvre > 39 °C.
- Signes d'intolérance d'une anémie aiguë.
- Défaillance hémodynamique.
- Défaillance viscérale.

#### Traitement de la CVO simple

- Hydratation orale 3 L d'eau /j + eau de Vichy (alcalinisation) 1/2 L/j.
- Repos au calme et au chaud.
- Arrêt de l'activité pendant 24 h.
- **Antalgiques** palier I ou II.
- Contact en cas d'inefficacité ou apparition de signes de gravité.

#### Traitement de la CVO avec signes de gravité ou en hospitalisation

- Hydratation IV.
- **Antalgiques** palier III = **morphine** :  
– titration 0,1 mg/kg/min (soit environ 3 mg/min) jusqu'à EVA douleur < 4. Surveiller l'échelle de sédation et la fréquence respiratoire ;  
– puis PCA (*Patient Controlled Analgesia* : méthode de choix) : concentration 1 mg/mL. Bolus 1-2 mg. Période réfractaire 7-15 min. Pas de dose continue. **DROLEPTAN** 2,5 mg/ser. de 50 mL de **morphine** (effet antinauséeux) ;

– ou **morphine** IV (PCA non disponible) : bolus 5 mg/2-4 h. Dose continue, si besoin, à adapter à la douleur ; max 2 mg/h ;

– antalgiques adjuvants : **AINS**, **paracétamol**.

- **Folates** : **SPÉCIAFOLDINE** 5 mg/j PO.
- Oxygénothérapie 1-2 L, lunettes.
- **Anxiolytiques non benzodiazépines** (ex : **ATARAX** 25 mg/j PO).

#### Saignée thérapeutique et échange transfusionnel

##### ► Indications

- AVC.
- Syndrome thoracique aigu sévère.
- CVO durée > 8 j.
- Priapisme aigu.
- Défaillance multiviscérale.

##### ► Modalités

- Manuel ou automatisé (érythraphérèse) : les tableaux d'échanges transfusionnels indiquent un volume de saignée vs un nombre de CG à transfuser.
- Objectif = HbS < 30 % et Hb > 9-11 g/dL.
- En général, ne pas dépasser l'Hb de base du patient.

#### Traitements spécifiques

- **HYDREA** : en cours d'évaluation.
- Allogreffe de moelle peut être discutée en cas de donneur HLA compatible. La morbidimortalité en rapport avec la procédure est de 20 à 30 %. L'allogreffe n'est actuellement suggérée que pour les patients homozygotes SS avec des manifestations vaso-occlusives et des douleurs, surtout chez l'enfant. Sont éliminées de la greffe les formes déjà compliquées.
- La thérapie génique est en cours d'évaluation.



## CHÉLATEURS DU FER (2) – PHARMACOLOGIE

## INDICATIONS

**DESFÉRAL** :

- hémochromatose primitive non curable par les saignées;
- hémosidérose secondaire;
- intoxications martiales aiguës;
- intoxications aluminiques chez l'insuffisant rénal dialysé;
- indications diagnostiques : dépistage des surcharge ferrique, de l'hémochromatose et de l'intoxication aluminique.

**EXJADE** : surcharge en fer post transfusionnelle.

**FERRIPROX** : surcharge en fer des patients présentant une thalassémie majeure et pour lesquels le traitement par la **déféroxamine** est contre-indiqué ou inadapté.

## CONTRE-INDICATIONS

**DESFÉRAL** : hypersensibilité à la **déféroxamine**, insuffisance rénale sévère non dialysée, infection bactérienne, grossesse, déconseillé pendant l'allaitement.

**EXJADE** : hypersensibilité au **déférasirox**, insuffisance rénale, intolérance au galactose, malabsorption du galactose et du glucose ; déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement et en cas d'insuffisance hépatique sévère.

**FERRIPROX** : hypersensibilité à la **défériprone**, antécédent d'agranulocytose, grossesse, allaitement, absence de contraception féminine efficace, enfant de moins de 6 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respect des doses maximales.

Examen ophtalmologique et audiométrie en cas de traitement prolongé.

Surveillance cardiaque en cas d'association du traitement avec la vitamine C.

Surveillance des courbes de croissance chez l'enfant.

Surveillance de la créatinine, des transaminases et de la ferritinémie.

Surveillance hebdomadaire de la NFS (PNN) car

risque de neutropénie et d'agranulocytose (**FERRIPROX**).

Risque tératogène (**FERRIPROX**).

Sérologie HCV avant traitement par **FERRIPROX** car aggravation de la fibrose hépatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction anaphylactique.

Céphalée, vertige, encéphalopathie aluminique.

Scotome, dégénérescence pigmentaire de la rétine, névrite optique, cataracte, baisse de l'acuité visuelle, dyschromatopsie.

Surdité, acouphènes.

Asthme, syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Retard de croissance.

Érythème et douleur au point d'injection (**DESFÉRAL**).

Hépatite, lithiase biliaire (**EXJADE**).

Agranulocytose, neutropénie (**FERRIPROX**).

Troubles neurologiques : diplopie, nystagmus, ralentissement psychomoteur (**FERRIPROX**).

Coloration des urines rouge-marron (**FERRIPROX**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**DESFÉRAL** :

- surveillance cardiaque si association avec la **vitamine C** ;
- risque de résultats faussés lors d'examen au gallium 67 (arrêt du **DESFÉRAL** 48 h avant scintigraphie).

**EXJADE** :

- association avec les **antiacides** contenant de l'aluminium déconseillée;
- diminution de la concentration plasmatique si association avec des inducteurs des UGT (**rifampicine**, **phénobarbital** et **phénytoïne**).

**FERRIPROX** :

- association prudente avec la **vitamine C** (surveillance de la fonction cardiaque);
- association avec les **antiacides** contenant de l'aluminium déconseillée;
- association avec d'autres médicaments pouvant entraîner une agranulocytose contre-indiquée.

## PRODUITS SANGUINS

Seuls les produits labiles les plus utilisés sont mentionnés.

### Produits sanguins labiles

#### Produits cellulaires

##### ► Concentrés de globules rouges

(déleucocytés systématiquement depuis 1998)

- Unité adulte d'environ 200 mL avec minimum 45 g d'Hb, 80 % d'hématocrite.

- Unité enfant :

- qualification déplasmatisée : protéines plasmatiques résiduelles < 0,5 g de conservation de courte durée, d'environ 6 h ;

- qualification phénotypée : avec détermination des groupes Cc Ee Kell ou détermination étendue des phénotypes ;

- qualification irradiée : pour la destruction de toutes les cellulaires nucléées (leucocytes).

##### ► Concentrés plaquettaires

- Standard (CPS) isolé à partir d'un don de sang : plaquettes  $0,5 \cdot 10^{11}$ , volume 40-60 mL de plasma. La dose est d'une unité par 10 kg de poids.

- D'aphérèse (CPA), préparé par cytophérèse chez un donneur, toujours déleucocyté :

- 1<sup>re</sup> catégorie : de  $2$  à  $4 \cdot 10^{11}$  plaquettes ;

- 2<sup>e</sup> catégorie : de  $4$  à  $6 \cdot 10^{11}$  plaquettes ;

- 3<sup>e</sup> catégorie :  $> 6 \cdot 10^{11}$  plaquettes.

- Qualification irradiée : pour la destruction des leucocytes résiduels.

- Qualification CMV négative : donneur CMV négatif.

#### Produits non cellulaires (plasmatiques)

- Plasma frais congelé isogroupe.

- Indication : coagulopathie de consommation, déficits graves et/ou complexes.

- Qualification viro-atténuée par traitement par solvant-détergeant contre les virus à enveloppes.

#### Produits sanguins stables

Ils ont le statut de médicaments.

- Immunoglobulines polyvalentes : du LFB (laboratoire français de biofractionnement),

**SANDOGLOBULINE, TÉGELINE, VIVAGLOBIN.**

- Immunoglobulines spécifiques : **GAMMATÉ-TANOS.**

- Facteur VII : **FACTEUR VII LFB, NOVOSEVEN.**

- Facteur VIII : **ADVATE, HELIXATE NEXGEN, KOGENATE.**

- Facteur IX : **MONONINE.**

- Facteur de Willebrand : **WILFACTIN.**

- Albumine : **ALBUNORM, VIALEBEX.**

- Hémine.

- Fibrinogène : seul ou associé (**BIACOL** : avec facteur XIII et fibronectine).

## AGENTS HÉMOSTATIQUES

## ■ Desmopressine

<b>MINIRIN</b>					
Solution injectable à 4 µg/mL	10 amp. 40 µg/1 mL	HOP	II		
<b>OCTIM</b>					
Solution pour pulvérisation nasale à 150 µg/dose	25 doses sol. endonasales (une dose = 0,1 mL) fl. pulvérisateur de 2,5 mL + embout nasal	273,50	I	65 %	10,94

**PROPRIÉTÉS**

Analogue de l'hormone antidiurétique (vasopressine). Induit la libération du facteur de Willebrand et du facteur VIII.

**INDICATIONS**

Traitement correcteur et préventif des accidents hémorragiques de la maladie de Willebrand en dehors des formes sévères ou de type 2B.

**CONTRE-INDICATIONS**

Maladie de Willebrand de type 2B et hypersensibilité aux constituants de la préparation.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Perfusion intraveineuse lente (15 à 30 min), la dose totale doit être diluée dans 50 à 100 mL de sérum physiologique.  
La posologie est de 0,3 à 0,4 µg/kg de poids

corporel. Elle doit être réduite à 0,2 µg/kg chez le sujet âgé ou présentant des troubles cardiovasculaires.

En cas de traitement préventif, l'administration doit avoir lieu immédiatement avant l'acte chirurgical.

Si une augmentation suffisante du facteur VIII est observée après la première perfusion de **MINIRIN** injectable, les administrations peuvent être répétées toutes les 12 h tant que la prophylaxie est jugée nécessaire, sous réserve des contrôles répétés du facteur VIII.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, bouffées vasomotrices, crampes abdominales, rares et aux doses élevées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Précautions d'emploi avec la **carbamazépine (TÉGRÉTOL)** en raison de son effet hyponatrémiant.

**FACTEURS DE CROISSANCE GRANULOCYTAIRE (1)****■ Lénograstim**

<b>GRANOCYTE</b>					
Lyoph. + solvant 1 mL + ser. + aiguilles pour inj. SC Perf. IV 150 µg/m <sup>2</sup> ou 19,2.10 <sup>6</sup> UI/m <sup>2</sup>	1 fl. 13 MUI	51,71	I	100 %	51,71
	5 fl. 13 MUI	HOP	I	100 %	
	1 fl. 34 MUI	99,10	I	100 %	99,10
	5 fl. 34 MUI	HOP	I		

**■ Filgrastim**

<b>NEUPOGEN</b>					
Solution inj. SC ou perf. IV 5 µg/kg/j	1 ser. 30 MU/0,5 mL	101,67	I	100 %	101,67
	5 ser. 30 MU/0,5 mL	480,54	I	100 %	96,11
	5 fl. 30 MU/1 mL	480,54	I	100 %	96,11
	1 ser. 48 MU/0,5 mL	160,15	I	100 %	160,15
<b>ZARZIO</b>					
Idem <b>NEUPOGEN</b> , à adapter en fonction de l'indication	1 ser. 30 MU/0,5 mL	95,44	I	100 %	95,44
	1 ser. 48 MU/0,5 mL	150,18	I	100 %	150,18
<b>TEVAGRASTIM</b>					
Biosimilaire Idem <b>NEUPOGEN</b>	1 ser. 30 MU/0,5 mL	95,44	I	100 %	95,44
	1 ser. 30 MU/0,5 mL	150,18	I	100 %	150,18
<b>RATIOGRASTIM</b>					
Biosimilaire. Idem <b>NEUPOGEN</b>	1 ser. 30 MU/0,5 mL	95,44	I	100 %	95,44
	1 ser. 30 MU/0,5 mL	150,18	I	100 %	150,18

**PROPRIÉTÉS**

Facteurs de croissance, hématopoïétiques produits par génie génétique. Stimulant la croissance de la lignée neutrophile.

**INDICATIONS**

Les indications des facteurs de croissance sont actuellement de deux ordres :

- Mobilisation des cellules souches périphériques en prévision de recueil pour greffe.
- Granulopénie sévère dans les conditions suivantes :
  - réduction de la durée des neutropénies et de l'incidence des granulopénies fébriles suites de la chimiothérapie anti-néoplasique (sauf affections myéloïdes) ou dans les suites de greffe de moelle ou greffe des cellules souches périphériques ;
  - neutropénies sévères congénitales avec

moins de 0,5 G/L de neutrophiles et antécédents d'infections ;

– neutropénies persistantes de moins de 1 G/L chez des patients atteints de VIH pour réduire les risques d'infection bactérienne.

L'indication peut être préventive quand le risque granulopénique est établi. Elle est curative devant une neutropénie fébrile, sévère et durable.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas administrer simultanément à une chimiothérapie cytotoxique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance de la trame osseuse, de l'état rénal et hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs osseuses, myalgies, vomissements, diarrhées, atteintes hépatiques et rénales.

## FACTEURS DE CROISSANCE PLAQUETTAIRE (2)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ajustement posologique du **NPLATE**

Taux de plaquettes (x 10 <sup>9</sup> /L)	Action
< 50	Augmenter la dose hebdomadaire de 1 µg/kg
> 200 pdt 2 sem. consécutives	Diminuer la dose hebdomadaire de 1 µg/kg
> 400	Interruption du traitement et surveillance hebdomadaire de la numération plaquettaire si le taux de plaquettes a chuté < 200 x 10 <sup>9</sup> /L : reprendre le traitement à la dose d'arrêt minorée de 1 µg/kg

Ajustement posologique du **REVLADE**

Taux de plaquettes (x 10 <sup>9</sup> /L)	Action
< 50 après au moins 2 sem. de traitement	Augmenter la dose journalière de 25 mg jusqu'à 75 mg/j
Compris entre 50 et 150	Continuer à la dose minimale permettant de maintenir le taux plaquettaire souhaité
Compris entre 150 et 250	Diminuer la dose journalière par palier de 25 mg en attendant 2 sem pour tout nouvel ajustement posologique
> 250	Arrêter <b>eltrombopag</b> et augmenter la fréquence de surveillance du taux de plaquettes à x 2/sem, reprendre le traitement à la dose quotidienne de 25 mg lorsque le taux de plaquettes a chuté < 100 (x 10 <sup>9</sup> /L)

Le traitement par **NPLATE** ou **REVLADE** est interrompu après 4 sem. à la dose maximale si le taux de plaquettes n'augmente pas suffisamment pour réduire dans les proportions voulues le risque hémorragique.

Une surveillance hépatique étroite sera réalisée.

Le **REVLADE** implique un phénomène de chélation notamment lors de la consommation de produits laitiers, de compléments minéraux cationiques (Fe<sup>2+</sup>/Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup>/Al<sup>3+</sup>/Zn<sup>2+</sup>) ou lors de la prise d'antiacides. Cela peut diminuer l'absorption d'**eltrombopag** ; la chélation sera par ailleurs utilisée en cas de surdosage.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents : céphalées, insomnies, parasthésies, sécheresses oculaires, cataractes, nausées, diarrhée, constipation, douleurs abdominales

hautes, éruptions cutanées, prurits, alopecie, arthralgies, myalgies, spasmes musculaires, douleurs osseuses, asthénie et œdèmes périphériques. Les augmentations des transaminases et de la bilirubinémie sont possibles.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La co-administration avec des inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (**statines**) doit être faite avec une dose réduite de **statine** et une surveillance accrue des effets indésirables relatifs à ces traitements.

L'**eltrombopag** chélate les cations polyvalents et doit être administré au minimum à une distance de 4 h de la consommation de produits laitiers, compléments minéraux et antiacides.

La co-administration avec le **lopinavir/ritonavir** peut entraîner une diminution de la concentration plasmatique d'**eltrombopag**.

**FACTEURS DE COAGULATION (1) – FACTEURS ANTIHÉMOPHILIQUES****■ Facteur antihémophilique A recombinant**

<b>HELIXATE NEXGEN</b>					
Poudre + solvant pour IV	250 fl. 250 UI/2,5 mL	HOP	I		
	500 fl. 500 UI/2,5 mL	HOP	I		
	1000 fl. 1 000 UI/2,5 mL	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI/5 mL	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI/5 mL	HOP	I		
<b>KOGENATE BAYER</b>					
Poudre + solvant pour IV + bioset	1 fl. 250 UI	HOP	I		
	1 fl. 500 UI	HOP	I		
	1 fl. 1 000 UI	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI	HOP	I		
<b>ADVATE</b>					
Poudre + solvant pour IV	1 fl. 250 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 500 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 1 000 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 1 500 UI/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 2 000 UI/5 mL	HOP	I		
	1 fl. 3 000 UI/5 mL	HOP	I		

**■ Facteur antihémophilique B cryodesséché**

<b>MONONINE</b>					
Poudre + solvant pour injection IV	1 fl. 1 000 UI/10 mL	HOP			

## HÉMOPHILIES (2)

### En cas d'inhibiteur anti-FVIII ou FIX

En cas d'urgence : **FVII activé (NOVOSEVEN)** ou concentrés de facteurs activés dans les pharmacies et centres spécialisés.

Les traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs sont en cours d'évaluation.

### Conseils pratiques pour l'hémophile et sa famille [1]

Tout enfant hémophile récemment diagnostiqué doit être pris en charge par le centre de référence local et régional formé d'une équipe d'hématologistes, de médecins transfuseurs, de pédiatres et disposant d'un laboratoire d'hémostase performant disponible 24 h/24. Ce centre de référence doit avoir accès en consultations spécialisées d'orthopédistes, de rhumatologues, de stomatologues et d'infec-tiologues de référence.

Le centre de référence local participe avec le médecin traitant à l'éducation du patient. Ce centre de référence est en principe en connexion avec des kinésithérapeutes, des psychologues et des assistantes sociales entrant dans le cadre de l'éducation globale du patient et de sa famille avec l'aide de l'Association française des hémophiles qui permet de disposer d'une carte et d'un livret de santé d'hémophiles et procure des revues d'information.

Des stages d'apprentissage pour auto-transfusions sont souhaitables, sinon nécessaires, autant pour le patient que pour éventuellement un membre de la famille. Ils sont organisés et dirigés par le centre spécialisé. Il est également important que l'équipe de référence informe et conseille les médecins généralistes du patient.

### CONSENSUS

[1] Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves – Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare, HAS, 2007

## FACTEURS DE COAGULATION (2) – COMPLEXE PROTHROMBINIQUE ACTIVÉ

### ■ Complexe prothrombinique activé

<b>FEIBA</b>					
Poudre + solvant + dispositif d'injection IV lente sans dépasser 2 U/kg/min Posologie de 80 à 240 U/kg/inj x 2-3/j sans jamais dépasser 100 U/kg/inj	1 fl. 500 U/20 mL	451,25	I	100 %	451,25
	1 fl. 1 000 U/20 mL	902,5	I	100 %	902,50

#### PROPRIÉTÉS

Les facteurs antihérophiliques A et B permettent la coagulation du sang par la voie intrinsèque et vont participer à la formation de la thromboplastine qui va, à son tour, transformer la prothrombine en thrombine. L'intégrité de la voie extrinsèque ne compense pas le déficit de la voie intrinsèque.

Le complexe prothrombinique activé induit la formation d'une "activité coagulante court-circuitant l'action des facteurs anti-hérophiliques VIII et IX" induisant la coagulation à un moment où les facteurs VIII et IX ne sont plus nécessaires.

#### INDICATIONS

Le complexe prothrominique activé est utilisé dans le traitement préventif, curatif ou substitutif des hémorragies dues à une hémophilie A ou B en cas de présence d'un inhibiteur.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants. Le complexe prothrombinique activé est également contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique ou de risques de complications thrombotiques, notamment cardiovasculaires.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les posologies en fonction de la gravité de l'hémorragie et du taux du facteur VIII avant le traitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Possibilité de réactions allergiques au cours de l'administration. Possibilité de transmission d'agents infectieux viraux connus ou inconnus, VHB, VHC, VIH, *Parvovirus* B19. Apparition d'un inhibiteur de facteur VIII dans 10 à 20 % des cas.

**FEIBA** induit également fréquemment des troubles cardio-vasculaires tels que CIVD, thrombophlébite, thromboembolie ou infarctus du myocarde notamment en cas de posologie élevée.



## FACTEURS DE COAGULATION (3) – FACTEUR VII (1)

## ■ Facteur VII activé

NOVOSEVEN					
Hémorragie hémophilique	1 fl. 1 mg/1 mL	HOP	I		
90 µg/kg/adm. à renouveler si besoin	1 fl. 2 mg/2 mL	HOP	I		
toutes les 2-3 h	1 fl. 5 mg/5 mL	HOP	I		
Déficit facteur VII	1 fl. 8 mg/8 mL	HOP	I		
20-30 µg/kg/adm. à renouveler si besoin					
toutes les 4-6 h					
Thrombopathie de Glanzmann					
80-120 µg/kg/adm. à renouveler si besoin					
toutes les 90-120 min					

**FACTEURS DE COAGULATION (4) – FACTEUR VII (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Ce médicament contient le facteur de coagulation VII activé recombinant. Le mécanisme d'action comprend la liaison du facteur VIIa au facteur tissulaire exposé. Ce complexe va directement activer le facteur IX en facteur IXa et le facteur X en facteur Xa, qui permet la conversion initiale de faibles quantités de prothrombine en thrombine. La thrombine provoque l'activation des plaquettes et des facteurs V et VIII au niveau du site de la lésion et conduit à la formation du caillot hémostatique en transformant le fibrinogène en fibrine.

**INDICATIONS**

Traitement des épisodes hémorragiques et dans la prévention des hémorragies survenant lors d'interventions chirurgicales ou de procédures invasives pour les groupes de patients suivants :

- chez les patients ayant une hémophilie congénitale avec inhibiteurs dirigés contre les facteurs de coagulation VIII ou IX ;
- chez les patients ayant une hémophilie congénitale ;
- chez lesquels une forte réponse anamnétique à l'administration de facteur VIII ou IX est prévisible.chez les patients ayant une hémophilie acquise ;
- chez les patients ayant un déficit congénital en FVII ;
- chez les patients ayant une thrombasthénie de Glanzmann avec anticorps anti-GP IIb-IIIa et/ou anti-HLA, et présentant une absence de réponse (passée ou présente) aux transfusions plaquettaires.

Ce médicament a obtenu un protocole temporaire thérapeutique dans l'indication suivante :

- syndrome hémorragique en obstétrique : persistance de l'hémorragie malgré une prise en charge conforme aux RPC de la HAS publiées en 2004 (incluant ocytociques, révi-

sion de la filière génitale et utérine et sulprostone ;

- syndrome hémorragique en chirurgie cardiaque, en dernier recours au bloc opératoire ou en réanimation ;
- hémorragies par rupture de varices œsophagiennes chez des patients ayant un projet thérapeutique défini (TIPS ou transplantation hépatique) et qui, après l'échec du traitement conventionnel (glypressine et traitement endoscopique), présentent un syndrome hémorragique persistant.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au principe actif, ou à l'un des excipients, ou aux protéines de souris, de hamster ou protéines bovines.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Dans les conditions pathologiques où le facteur tissulaire peut être libéré de façon plus importante que la normale (septicémie, athérosclérose, insuffisance coronarienne, angor, insuffisance hépatique, maladie thromboembolique, etc.) il peut y avoir un risque potentiel de développement d'un événement thrombotique ou d'induction de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) associé au traitement par ce médicament.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont peu fréquents ou rares :

- réaction au point d'injection ;
- céphalées ;
- rash, prurit, urticaire, réaction anaphylactique ;
- CIVD ;
- événements thromboemboliques veineux et plus rarement artériels, angine de poitrine.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le risque d'une interaction potentielle entre ce médicament et des concentrés de facteurs de coagulation n'est pas connu. L'utilisation simultanée des concentrés de complexes prothrombiques, activés ou non, doit être évitée.

## FACTEURS DE COAGULATION (5) – FACTEUR VON WILLEBRAND

## ■ Facteur Willebrand humain

WILFACTIN					
Traitement curatif/substitutif : 40-80 UI/kg/adm. x 1 à 2/j	1 fl. 1 000 UI/10 mL	HOP	I	100 %	
Traitement préventif/substitutif 40-60 UI/kg/adm x 2 à 3/sem.					

## PROPRIÉTÉS

L'apport de facteur Willebrand permet de corriger les troubles de l'hémostase observés chez les malades atteints d'un déficit en facteur Willebrand. Son effet est double :

- il rétablit l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium vasculaire au niveau de la lésion, ce qui assure l'hémostase dite primaire, comme en témoigne le raccourcissement fréquemment observé du temps de saignement ;
- il a une action retardée dans les déficits associés en facteur VIII.

## INDICATIONS

Traitement et prévention des hémorragies et situation chirurgicale dans la maladie de Willebrand quand le traitement seul par la **desmopressine** (DDAVP) est inefficace ou contre-indiqué.

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le traitement de l'hémophilie A.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une surveillance clinique et biologique est recommandée.

À utiliser avec prudence chez les nouveau-nés, nourrissons et enfants en raison de l'absence de données cliniques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares réactions d'hypersensibilité ou d'allergie. Risque de complications thromboemboliques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction connue.

**FACTEURS DE COAGULATION (6) – ASSOCIATION DE FACTEURS****■ Facteur Willebrand + facteur VIII**

<b>WILSTART</b>				
Posologie à adapter sachant que : 1 UI/kg de facteur Willebrand et 1 UI/kg de facteur VIII augmentent le taux plasma- tique de VWF:RCo et de FVIII:C d'environ 0,02 UI/mL (2 %)	1 inj. 1 000 UI FvW + 500 UI FVIII	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Le facteur VIII et le facteur Willebrand sont des composants normaux du plasma humain et ils agissent comme le facteur VIII et le facteur Willebrand endogènes.

**INDICATIONS**

Spécifiquement dans la phase initiale du traitement de la maladie de Willebrand quand le traitement par la **desmopressine** (dDAVP) est inefficace ou contre-indiqué.

Il ne doit pas être utilisé dans le traitement de l'hémophilie A.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Injecté exclusivement par voie IV, en une seule fois, immédiatement après reconstitution, sans dépasser 4 mL/min.

Surveillance clinique et biologique recommandée.

Attention à la présence de sodium dans les excipients.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Idem **WILFACTIN** et **HELIXATE NEXGEN**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune interaction médicamenteuse avec ce médicament n'est connue à ce jour. Néanmoins, le mélange préalable avec d'autres produits ou médicaments est formellement déconseillé.

## TRAITEMENTS APPARENTÉS À L'HÉPARINE (1)

## ■ Danaparoïde

ORGARAN					
Prophylaxie chez sujets aux ATCD de thrombose induite par héparine (TIH) : 750 UI anti-Xa x 2 inj. SC/j Traitement préventif en cas de TIH : 750 UI x 3 inj./j (1 250 UI x 3/j si > 90 kg) Traitement curatif des manifestations thromboemboliques en cas de TIH : 2 500 U anti-Xa en bolus IV suivi d'un schéma en IV ou en SC pendant 5 à 7 j	10 amp. 750 UI anti-Xa/0,6 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antithrombotique du groupe de l'héparine mais n'ayant pas de réactivité croisée avec l'anticorps héparine-dépendant.

Faible risque hémorragique à dose thérapeutique.

## INDICATIONS

Prophylaxie de la maladie thromboembolique en chirurgie orthopédique et oncologique.

Prophylaxie de la maladie thromboembolique chez les sujets avec une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) ou aux antécédents de TIH. Traitement curatif des thromboses et embolies en cas de TIH ou d'antécédent de TIH.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **danaparoïde**.

Purpura thrombocytopénique idiopathique.

Accident vasculaire cérébral aigu.

Saignement non contrôlé.

Endocardite bactérienne aiguë.

HTA sévère non contrôlée.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 mL/min).

Ulcère gastro-duodénal évolutif.

Rétinopathie diabétique.

Déconseillé pendant l'allaitement.

Test d'agrégation plaquettaire *in vitro* positif avec le **danaparoïde** en cas de TIH ou de thrombopénie sous anticoagulant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLI

Surveillance des plaquettes.

Mesure de l'activité anti-Xa en cas d'insuffisance rénale et de poids > 90 kg (objectif : anti-Xa entre 0,2 et 0,4 UI/mL).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, hémorragie, ecchymose, hématome au point d'injection.

Thrombopénie.

Réaction d'hypersensibilité.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association possible avec les anticoagulants oraux, l'**aspirine**, les **AINS**, les **corticostéroïdes** mais avec prudence car risque hémorragique majoré.

## THROMBOPÉNIE INDUITE PAR L'HÉPARINE (TIH) (2)

### Relais par AVK

Envisagé seulement si les plaquettes sont  $> 150\,000/\text{mm}^3$ .

L'anticoagulant doit être maintenu jusqu'à l'obtention de l'INR cible.

La durée de l'anticoagulation doit être minimum 30 j (risque de thrombose jusqu'à J30 après arrêt de l'héparine) et 3 mois en cas de thrombose associée.

### Transfusion de plaquettes contre-indiquée

Elle est risquée (activation et thrombose) donc contre-indiquée sauf en cas d'hémorragie avec risque vital.


### Réintroduction de l'héparine (standard ou HBPM)

La réintroduction est risquée et contre-indiquée dans les 3 mois suivant la TIH.

En cas de nécessité (durant la chirurgie cardiaque essentiellement), l'introduction d'héparine ne se fait qu'après contrôle de l'absence d'Ac circulants.

Dans les autres cas, le **danaparoïde** ou les anticoagulants oraux sont indiqués.

### Algorithme décisionnel devant une suspicion de TIH



## TRAITEMENTS APPARENTÉS À L'HÉPARINE (2)

## ■ Argatroban

ARGANOVA					
Thrombopénie induite par l'héparine de type II : 2 µg/kg/min (à réduire à 0,5 µg/kg/min si insuffisance hépatique, chirurgie cardiaque récente, état critique) Contrôler le TCA 2 h après le début du traitement puis x 1/j	6 fl. 2,5 mL (100 mg/mL)	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur direct de la thrombine.

**INDICATIONS**

Anticoagulation chez les adultes ayant une thrombopénie induite par l'héparine (TIH) de type II, nécessitant un traitement antithrombotique par voie parentérale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hémorragie non contrôlée.  
Hypersensibilité à l'**argatroban** ou à l'un des excipients.  
Insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller le TCA 2 h après le début de l'injection puis une fois par jour ; TCA cible : 1,5 à 3 fois le témoin.

Attendre 1 à 2 h après un traitement par héparine pour débiter l'**argatroban**.

Diminuer les doses en cas d'insuffisance hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Événement hémorragique.  
Hypoglycémie, hyponatrémie.  
Vertiges, céphalées, confusion.  
Troubles du rythme cardiaque.  
Nausées, vomissements.  
Éruption cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation du risque hémorragique si association à d'autres anticoagulants ou à des **antiagrégants plaquettaires**.

## HYPO-URICÉMIANT

## ■ Rasburicase

FASTURTEC					
1,5 mg/mL	3 amp. 1 mL (1,5 mg)	HOP	I		
0,2 mg/kg/j pendant 1 à 7 j maximum	1 amp. 5 mL (7,5 mg)	HOP	I		

**PROPRIÉTÉ**

L'augmentation brutale de l'uricémie consécutive à la lyse d'un nombre important de cellules malignes observée dans les affections malignes et sous chimiothérapie cytotoxique peut entraîner une altération de la fonction rénale et une insuffisance rénale liées à la précipitation des cristaux d'acide urique dans les tubules rénaux.

La rasburicase est un agent uricolytique puissant qui catalyse l'oxydation enzymatique de l'acide urique en allantoiné, substance hydrosoluble, facilement excrétée par le rein, dans les urines.

**INDICATIONS**

Traitement et prophylaxie de l'hyperuricémie aiguë, en vue de prévenir l'insuffisance rénale aiguë, chez les adultes, enfants et adolescents (âgés de 0 à 17 ans) souffrant d'une hémopathie maligne avec masse tumorale élevée et ayant un risque de réduction ou de lyse tumorale rapide lors de l'initiation de la chimiothérapie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit en G6PD et autres désordres métaboliques connus pour entraîner une anémie hémolytique.

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de réactions allergiques importantes de type réactions anaphylactiques en particulier chez les patients présentant un terrain allergique connu ou fragilisés : surveillance rapprochée systématique.

Ce médicament n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception et en cas d'allaitement

**EFFETS INDÉSIRABLES**

La rasburicase étant administrée de façon concomitante à la chimiothérapie cytotoxique dans le cadre des affections malignes, ses effets indésirables sont difficiles à identifier en raison d'un grand nombre d'effets indésirables liés à ces maladies et à leurs traitements.

- Effets indésirables cliniques fréquents : fièvre, diarrhées, nausées, vomissements, céphalées.
- Effets indésirables rares : urticaire, réactions anaphylactiques, bronchospasmes, hypotension artérielle, anémie hémolytique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune étude de métabolisme n'a été réalisée à ce jour. La rasburicase étant une enzyme, il est peu vraisemblable qu'elle soit impliquée dans des interactions médicamenteuses.



## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (1)

### Principes généraux de prise en charge

#### Diagnostic

Il repose sur des données anamnestiques et sur l'examen clinique du patient, beaucoup plus que sur les examens complémentaires.

L'examen clinique comporte deux temps : l'évaluation rapide des fonctions vitales, puis un examen plus détaillé permettant une orientation toxicologique :

- évaluation de la conscience chiffrée (score de Glasgow) ;
  - évaluation respiratoire : mesure de la fréquence respiratoire, amplitude des mouvements thoraciques, coloration des téguments, existence ou non d'un encombrement ;
  - évaluation circulatoire : fréquence cardiaque, pression artérielle, ECG ;
- Ce premier bilan rapide permet d'évaluer la nécessité de traitement urgent :
- mise en place d'un abord vasculaire ;
  - perméabilité des voies aériennes ;
  - oxygénation ou ventilation assistée ;
  - traitement d'une arythmie ou d'un trouble de conduction ;
  - remplissage vasculaire ;
  - traitement inotrope ou vasoactif.

Réalisation dans un second temps d'un examen plus complet qui permettra une orientation vers un diagnostic plus précis de l'intoxication (recherche de toxidromes) :

- examen des téguments à la recherche de traces d'injection, de traces de traumatisme, d'une cyanose ;
- examen de la sphère oropharyngée (ingestion de caustique) ;
- examen neurologique (mouvements anormaux, diamètre pupillaire) (cf. encadrés Comas, Toxiques convulsivants et tableau Pupilles et mouvements oculaires + score de Glasgow en neurologie) ;
- température (cf. tableau Troubles de la température) ;
- évaluation respiratoire ;
- évaluation cardiocirculatoire (cf. encadré Atteintes cardiovasculaires toxiques) :
  - dépression myocardique effet inotrope négatif (**méprobamate, colchicine, bêtabloquants, inhibiteurs calciques**),
  - vasoplégie,
  - hypovolémie diarrhée (**colchicine, arsenic**) : vomissements (**théophylline**), troisième secteur (caustiques),
  - troubles du rythme ou de conduction : bradycardie (**bêtabloquants, diltiazem, vérapamil, digitaliques**), troubles du rythme ventriculaire (**tricycliques, chloroquine, digitaliques**), poussées hypertensives (**amphétamines, cocaïne, cannabis, L-dopa, IMAO**) ;
- examen abdominal : iléus, globe vésical ;
- examen des membres : lésions de compression, syndrome des loges, compression nerveuse.

**PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (2)****Critères d'admission en réanimation\***

Coma

- score de Glasgow < 12 (patient ne répondant pas aux stimulations verbales),
- crises convulsives.

Détresse respiratoire :

- OAP toxique,
- pneumopathie d'inhalation.

Acidose respiratoire ( $\text{PaCO}_2 > 45$  mmHg).

Pression artérielle < 80 mmHg.

BAV 2° ou 3° degré.

Hyperexcitabilité ventriculaire.

Intoxication aux antidépresseurs et/ou antipsychotiques avec syndrome anticholinergique (tachycardie), troubles neurologiques, QRS > 0,12 s ou QT > 0,5 s.

Acidose métabolique.

Body packers.

Envenimation avec signes généraux (ou extension de l'œdème sur tout le membre ou le tronc).

Hypothermie profonde.

Hyperthermie maligne (syndrome malin des neuroleptiques).

Hyperkaliémie ± insuffisance rénale aiguë sévère.

**Critères d'admission en réanimation en fonction des toxiques [1]**

L'admission en réanimation ou en unité de surveillance continue des intoxications par psychotropes est en particulier indiquée :

- pour l'intoxication par les benzodiazépines, chez le sujet âgé ou insuffisant respiratoire ;
- pour les barbituriques, en raison du risque prolongé de coma et d'arrêt respiratoire d'apparition parfois brutale (barbituriques d'action rapide) ;
- pour les antipsychotiques, en raison du risque de troubles de la repolarisation voire de la conduction ; pour le méprobamate, en raison du risque de choc d'allure vasoplégique ou cardiogénique ;
- pour le lithium, chez le sujet préalablement traité ou en cas de surdosage.

Les toxiques à l'origine d'une surmortalité sont les cardiotropes et notamment les toxiques avec effet stabilisant de membrane. Toute intoxication par cardiotrope doit être admise en réanimation.

Les intoxications aiguës par les antidépresseurs polycycliques sont potentiellement graves, en raison du risque de convulsions, d'arythmie ventriculaire et de défaillance myocardique. Le principal facteur pronostique est l'élargissement des QRS.

**CONSENSUS**

[1] Intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation, SRLF, 2006

\* Adapté de Moleski et al. *Chest*. 2003 ; 123 : 577-592.

## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (3)

### Place des examens complémentaires

#### ► Analyse toxicologique

- Inutile dans la plupart des cas où l'histoire et la présentation cliniques sont concordantes, elle se justifie comme moyen diagnostique dans la situation de troubles de la conscience inexplicables. Dans certains cas, l'analyse quantitative est nécessaire pour évaluer la gravité de l'intoxication ou surveiller l'efficacité du traitement.

- Le dosage sanguin du toxique est indiqué s'il a une incidence sur la prise en charge. C'est le cas de l'acide valproïque, de la carbamazépine, du fer, de la digoxine, du lithium, du paracétamol, du phénobarbital, des salicylés et de la théophylline.

#### ► Examens biologiques

Les anomalies biologiques peuvent être un élément diagnostique, notamment lorsqu'elles sont liées à un effet direct du toxique.

- La recherche d'une hypoglycémie doit être systématique. Associée à un syndrome hyperadrénergique, elle oriente vers une intoxication par la théophylline, les amphétamines ou le trichloréthylène.

- Urée et créatinine : les atteintes rénales secondaires à un effet néphrotoxique direct sont rares (métaux lourds, éthylène glycol, paraquat, certains antibiotiques). L'hypovolémie et la déshydratation sont responsables d'insuffisances rénales fonctionnelles alors que les insuffisances rénales organiques sont le plus souvent dues aux états de choc, aux hémolyses intravasculaires ou rhabdomyolyses.

- Natrémie : risque d'hypernatrémie liée à l'administration de sels de sodium hyperotoniques (intoxication par les **tricycliques**). Les diarrhées importantes (syndrome phalloïdien, colchicine) peuvent être responsables d'une hyponatrémie.

- Kaliémie : hyperkaliémie de l'intoxication digitale (inhibition de l'ATPase membranaire). Hypokaliémie lors de l'intoxication par la **chloroquine** (corrélée avec la gravité de l'intoxication).

- Osmolalité : une hyperosmolalité non liée à l'élévation de l'urée, du glucose ou d'électrolytes indique la présence plasmatique d'une substance non dosée. Il existe alors une différence entre l'osmolalité mesurée et l'osmolalité calculée. Ce trou osmolaire fait préférentiellement évoquer une intoxication par un alcool, un glycol ou de l'acétone.

- L'ECG doit être systématique ; il permet en cas d'anomalie d'évoquer une absorption de produit toxique non avouée et/ou d'évaluer la gravité de certains produits (cf. encadré Atteintes cardiovasculaires toxiques).

#### ► Troubles acido-basiques

L'étude des gaz du sang artériel permet d'évaluer les effets respiratoires centraux ou périphériques des toxiques. Une alcalose ventilatoire est évocatrice d'une intoxication salicylée ; une acidose respiratoire est un facteur de risque et justifie une surveillance en réanimation. Les alcaloses métaboliques sont le plus souvent secondaires aux vomissements ou aux perfusions de **bicarbonate**. Les acidoses métaboliques permettent une orientation diagnostique (cf. tableau Acidoses métaboliques toxiques). Les examens radiologiques sont utiles pour évaluer les conséquences pulmonaires de l'intoxication, ou éliminer une autre cause aux troubles neurologiques ou métaboliques.

### Critères de gravité et d'admission en réanimation

À l'évidence, les intoxications très graves (coma profond, détresse respiratoire, état de choc, arrêt cardiorespiratoire) justifient une admission directe en réanimation. Le risque beaucoup plus fréquent est de sous-évaluer la gravité d'une intoxication et donc de ne pas proposer un transfert dans une unité où la surveillance est continue. Les indications pour un transfert en réanimation sont résumées dans l'encadré Critères d'admission en réanimation.

## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (4)

## TOXIQUES CONVULSIVANTS

- *Toxiques hypoglycémiantes* :
  - Insuline.
  - **Biguanides**.
  - **Sulfamides hypoglycémiantes**.
  - Alcool, surtout chez l'enfant.
- *Psychotropes* :
  - **Antidépresseurs tri- et tétracycliques**,
  - **Phénothiazines** antihistaminiques,
  - **Lithium** (intoxication aiguë/chronique),
  - **IMAO**.
- *Autres médicaments* :
  - **Carbamazépine**.
  - **Salicylés** (enfant).
  - **Dextropropoxyphène**.
  - **Isoniazide**.
- **Théophylline**.
- **XYLOCAÏNE**, lidocaïne (IV, inhalée).
- **Phénytoïne**.
- **Bétabloquants**.
- *Toxicomanie* :
  - Cocaïne, crack.
  - **Amphétamines** et dérivés.
  - Ecstasy.
  - Strychnine.
- *Produits industriels* :
  - Carbamates anticholinestérasiques.
  - Organophosphorés, organochlorés.
  - Méthanol, éthylène glycol.
  - Paraldéhyde.
- *Monoxyde de carbone*

## PUPILLES ET MOUVEMENTS OCULAIRES

Myosis serré	Mydriase peu réactive	Nystagmus horizontal	Multidirectionnel ou rotatoire
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Opiacés</b></li> <li>– <b>Phénothiazines</b> sédatives</li> <li>– <b>Anticholinestérasiques</b></li> <li>– Organophosphorés</li> <li>– <b>Clonidine</b></li> <li>– Nicotine</li> <li>– Acétone</li> <li>– Bromures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Antidépresseurs tricycliques</b></li> <li>– <b>Atropiniques</b></li> <li>– Cocaïne</li> <li>– Haschich</li> <li>– <b>Carbamazépine</b></li> <li>– <b>Antihistaminiques</b></li> <li>– <b>Sympathicomimétiques</b></li> <li>– Méthanol</li> <li>– Méthaqualone</li> <li>– Butyrophénones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alcool</li> <li>– <b>Carbamazépine</b></li> <li>– <b>Lithium</b></li> <li>– <b>Méprobamate</b></li> <li>– <b>Quinine</b></li> <li>– <b>Primidone</b></li> <li>– Solvants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Phénylclidine</li> <li>– <b>Diphénylhydantoïne</b></li> <li>– Encéphalopathie de Wernicke</li> </ul>

En cas de coma profond, soit myosis, soit mydriase :

- alcool (alternance rapide possible) ;

- **benzodiazépines** ;
- **barbituriques**.

## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (5)

### Prise en charge thérapeutique

Le traitement des intoxications comporte trois axes :

- une prise en charge symptomatique : support hémodynamique, ventilatoire, correction des troubles métaboliques, prévention des complications ;
- une prise en charge spécifique ayant pour but de :
  - diminuer la dose absorbée (soustraction du site toxique, charbon activé, etc.) ;
  - favoriser l'élimination du toxique (oxygénothérapie hyperbare, alcalinisation des urines, hémodialyse) ;

- neutraliser le toxique : antidote.

Les modalités thérapeutiques spécifiques dépendent du toxique et de la dose absorbée, mais très peu d'intoxications justifient le recours aux méthodes visant à augmenter l'élimination du toxique, ou peuvent être contrecarrées par des antidotes.

- Très souvent secondaires à un acte volontaire, les intoxications traduisent un syndrome dépressif qui doit être systématiquement évalué par un psychiatre. En cas d'intoxication collective type CO, une enquête est obligatoire.

### COMAS

#### Éliminer une atteinte organique

- Signes de localisation.
- Asymétrie pupillaire.
- Anomalies des paires crâniennes (les réflexes du tronc sont rarement atteints en cas d'intoxication).

#### Coma calme, hypotonique avec hyporéflexivité

- Benzodiazépines.
- Barbituriques.
- Carbamates.
- Opiacés.
- Phénothiazines sédatives.

#### Coma avec agitation, hypertonie, hyperréflexivité

Avec hypertonie extrapyramidale :

- antidépresseurs tricycliques,
- CO.

Avec hypertonie pyramidale :

- *Coma toxique*
  - Antidépresseurs tri- ou tétracycliques
  - Anticholinergiques
  - CO
  - Cocaïne, amphétamines
  - Lithium
  - Phénothiazines
- *Coma non toxique*
  - Hémorragie méningée
  - Méningite
  - Encéphalite
  - Hypoglycémie

## PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (6)

## TROUBLES DE LA TEMPÉRATURE

Hypothermie	Hyperthermie
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Éthanol</li> <li>– <b>Barbituriques</b></li> <li>– <b>Benzodiazépines</b></li> <li>– <b>Tricycliques</b></li> <li>– <b>Hypoglycémiantes</b></li> <li>– <b>Opiacés</b></li> <li>– <b>Paracétamol</b></li> <li>– <b>Phénothiazines</b></li> <li>– CO</li> <li>– Exposition au froid associée</li> </ul>	<p>Infection : pneumopathie d'inhalation ou autre cause</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Syndrome de sevrage</li> <li>– <b>Amphétamines</b></li> <li>– Cocaïne</li> <li>– <b>Lithium</b></li> <li>– LSD</li> <li>– Ecstasy et dérivés</li> <li>– <b>IMAO</b></li> <li>– <b>Phénothiazines</b></li> <li>– <b>Théophylline</b></li> <li>– <b>Salicylés</b> (enfants)</li> <li>– <b>Sérotoninergiques</b> (inhibiteurs de recaptage de la sérotonine)</li> <li>– <b>Fibrates</b></li> <li>– Certains <b>anti-inflammatoires</b></li> <li>– Syndrome malin des neuroleptiques</li> </ul>

## ACIDOSES MÉTABOLIQUES TOXIQUES\*

Trou anionique normal (perte de bicarbonates)	Trou anionique augmenté (en l'absence de signes de choc)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertes digestives</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Champignon</li> <li>– Colchicine</li> <li>– Trichloréthylène ingéré</li> <li>– Arsenic, mercure</li> </ul> </li> <li>– <b>Digitaliques</b></li> <li>• <b>Acidoses rénales</b> (défaut d'excrétion) <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Lithium</b></li> <li>– Mercure</li> <li>– Cadmium</li> <li>– Paraquat</li> </ul> </li> <li>• <b>Acidoses tubulaires</b> <p>Avec hypokaliémie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Amphotéricine</b></li> <li>– <b>Lithium</b></li> </ul> <p>Avec hyperkaliémie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Amiloride, spironolactone, triamtèrene</b></li> <li>– <b>Ciclosporine</b></li> <li>– <b>Méticilline</b></li> <li>– <b>Bétabloquants</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acidose lactique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Convulsions</li> <li>– Colchicine</li> <li>– Intoxication au CO</li> <li>– Méthémoglobinémie</li> <li>– Cyanure</li> <li>– <b>Biguanides</b></li> <li>– Éthanol</li> <li>– Inhibiteur reverse transcriptase</li> </ul> </li> <li>• <b>En l'absence d'hyperlactatémie</b> <p>Trou osmolaire augmenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Éthylène glycol</li> <li>– Méthanol</li> <li>– Paraldéhyde</li> </ul> <p>Acidocétose alcoolique diabétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dissolvants (acide acétique)</li> </ul> </li> <li>• <b>Insuffisance rénale sévère</b></li> </ul>

\* En l'absence de perfusion de soluté salé isotonique en pré-hospitalier.

**PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE (7)****ATTEINTES CARDIOVASCULAIRES TOXIQUES****Tachycardie supraventriculaire (hors infection et choc)**

- Alcool
- **Amphétamines**
- Cocaïne
- **Atropine**
- Antihistaminiques anti-H<sub>1</sub>
- Salbutamol
- Théophylline

**Bradycardie sans collapsus**

- Digitaliques
- Bêtabloquants
- Amiodarone
- Inhibiteurs calciques (diltiazem)
- Alpha-méthylidopa
- Aconitine

**Bradycardie avec collapsus**

- Bêtabloquants
- Alphabloquants
- Anticholinestérasiques
- Effet stabilisant de membrane
- Diltiazem
- Clonidine
- Hypothermie

**Collapsus et tachycardie à complexes fins (hors hypovolémie et infection)**

- Carbamates
- Salbutamol
- Théophylline
- Dérivés nitrés
- Alphabloquants
- Inhibiteurs calciques
- Inhibiteurs enzyme de conversion, ou angiotensine II
- Effet antabuse

**Collapsus et tachycardie à complexes larges**

- *Effet stabilisant de membrane*
- Antidépresseurs polycycliques, chloroquine, certains bêtabloquants, antiarythmiques de classe I.
- Hypokaliémie.
- Digitaliques
- Cocaïne
- Phencyclidine ou PCP (*Angel Dust* ou *Angel Hair*)
- Aconitine

## INTOXICATIONS PAR ANTIDÉPRESSEURS (1)

### Antidépresseurs polycycliques

Les intoxications par les **antidépresseurs polycycliques** représentent 20 % des intoxications médicamenteuses admises en réanimation. La mortalité est proche de 2 %.

#### Pharmacologie

Dose toxique : à partir de 500 mg, les intoxications sévères se voient pour des doses supérieures à 1 g. Le pronostic vital est menacé pour des doses supérieures à 3 g. Les **antidépresseurs polycycliques** peuvent être détectés dans le sang, les urines ou le liquide gastrique par des méthodes semi-quantitatives peu spécifiques (croisement avec les **phénothiazines**), la **maprotiline (LUDIOMIL)** n'est pas détectée.

#### Symptomatologie

Apparition des signes cliniques après un intervalle libre de quelques heures. Ils sont maximums avant la 6<sup>e</sup> heure.

- Encéphalopathie anticholinergique associant :
  - un syndrome confusionnel, une dysarthrie, un tremblement des extrémités ;
  - un syndrome pyramidal avec hyperréflexie, hypertonie, parfois signe de Babinski bilatéral ;
  - un syndrome atropinique avec sécheresse de bouche, mydriase bilatérale

symétrique peu réactive, tachycardie, rétention d'urine.

- Coma souvent peu profond en cas d'intoxication pure, sans signe de localisation.
- Convulsions fréquentes (incidence estimée à 11 %, première cause toxique de convulsions). Elles sont précoces et surviennent exceptionnellement après les 24 premières heures. Une dose ingérée supérieure à 3 g ou un élargissement du QRS supérieur à 0,10 s sont prédictifs du risque de survenue de convulsions.
- Dépression respiratoire liée à la profondeur du coma et à la réduction de l'amplitude thoracique favorisée par l'hypertonie. L'acidose respiratoire et l'hypoxémie aggravent la toxicité cardiaque.
- Atteinte cardiovasculaire liée à un effet direct stabilisant de membrane quinidine-like et à une action indirecte en rapport avec un blocage de la recapture des catécholamines et à l'activité anticholinergique. Elle se manifeste par une tachycardie sinusale, des troubles de la repolarisation à type d'aplatissement des ondes T, un allongement du QT, des troubles de conduction intraventriculaires (élargissement du QRS > 0,10 s). Des troubles du rythme ventriculaire à type de tachycardie ventriculaire ou de torsades de pointes sont possibles mais beaucoup plus rares.
- Manifestations biologiques : hypokaliémie fréquemment associée aux intoxications graves.



## INTOXICATIONS PAR ANTIDÉPRESSEURS (2)

### Traitement

#### ► *Traitement évacuateur ou épurateur*

Les indications du lavage gastrique se limitent aux patients conscients après ingestion d'une dose potentiellement mortelle sous réserve que le lavage soit réalisé dans l'heure qui suit l'ingestion. Le charbon activé peut être proposé dans les intoxications bénignes ou vues tardivement.

#### ► *Traitement des troubles cardiovasculaires*

- **Bloc intraventriculaire** : le traitement des blocs intraventriculaires doit être débuté dès que la durée du QRS dans les dérivations frontales dépasse 0,12 s. Administration de **bicarbonate de sodium** molaire (84 ‰) ou de **lactate** molaire (100 à 250 mmol), à renouveler en cas de persistance de QRS larges (en l'absence de bloc de branche préexistant). Des administrations itératives de **bicarbonate** peuvent être nécessaires (tenir compte du risque d'hypokaliémie induite) jusqu'à une dose totale maximale de 750 mL. Les critères d'efficacité sont la correction du QRS et de l'hypotension.

- **Tachycardie ventriculaire** : peut être confondue avec une tachycardie supraventriculaire à complexes larges. L'alcalinisation constitue un moyen diagnostique. En l'absence d'affinement des complexes, réalisation d'un choc électrique externe (les **antiarythmiques de classe I** sont dangereux). Correction associée des dyskaliémies.

- **Collapsus** : habituellement lié à l'élargissement des QRS, il faut donc rechercher une autre cause (autre toxique associé, pneumopathie précoce). En cas de persistance après alcalinisation, utilisation de **catécholamines** à effet alpha (**noradrénaline**, éventuellement **dopamine**). En cas de bradycardie à complexe large sans effet de l'alcalinisation, utilisation d'**isoprénaline** ou d'**adrénaline** (l'entraînement électrosystolique est peu efficace compte tenu du siège distal intraventriculaire du bloc).

#### ► *Traitement des crises convulsives*

En cas de crise unique, utilisation de **benzodiazépine** (**diazépam** : 10 mg IVD ou **clonazépam** 1 mg IVD). L'intubation doit être envisagée rapidement car les crises sont multiples dans la moitié des cas et le risque d'état de mal élevé.

### Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (**SÉROPRAM**, **DEROXAT**, **ZOLOFT**, **FLOXITRAL**)

La majorité des intoxications est bénigne. Le diagnostic est clinique : agitation, hyperthermie, myoclonie, ataxie, syndrome pyramidal, coma, tachycardie, polypnée. Une hyperthermie maligne, une rhabdomyolyse et une insuffisance rénale peuvent survenir dans les intoxications graves.

Le traitement est symptomatique ; l'efficacité du lavage gastrique ou du charbon activé sur l'absorption digeste et l'évolution clinique est sujette à caution.

## INTOXICATIONS AUX ANTIPSYCHOTIQUES

### Pharmacologie

Les antipsychotiques recouvrent plusieurs classes pharmacologiques :

- **Phénothiazines** : **aliphatiques** (dérivés de la chlorpromazine : **TERCIAN**, **NOZINAN**), **pipérazinées** (dérivés de la fluphénazine : **MODITEN**), **pipéridinées** (dérivés de la pipotiazine : **PIPORTIL**).
- **Butyrophénones** (dérivés de l'halopéridol : **SÉMAP**, **ORAP**).
- **Benzamides** (dérivés du métoclopramide : **SOLIAN**).

L'absorption orale est importante (70 à 90 %) avec un pic plasmatique à la 3<sup>e</sup> heure pour les **phénothiazines**, plus retardé (6<sup>e</sup> heure) pour les **butyrophénones**.

### Symptomatologie

#### Phénothiazines

Coma calme, volontiers prolongé, associé à une hypotonie pour les **phénothiazines** sédatives aliphatiques. À l'inverse, coma agité avec hypertonie extrapyramidale et

parfois dyskinésies buccolinguofaciales et myosis fréquent pour les dérivés pipérazinés.

#### Butyrophénones et benzamides

Agitation, confusion, troubles modérés de la vigilance, signes extrapyramidaux. Association possible de troubles circulatoires à type de collapsus ou d'anomalies de la conduction auriculoventriculaire ou intraventriculaire.

### Traitement

#### Traitement des troubles circulatoires

Troubles de la conduction auriculoventriculaire : **ISUPREL** ou entraînement électro-systolique. Troubles de la conduction intraventriculaire : **lactate de sodium**.

#### Traitement des anomalies neurologiques

Purement symptomatique. Les manifestations de dystonie sont améliorées par l'**ARTANE** (1/2 à 3 amp. par j par voie IM). Le traitement doit être poursuivi 48 à 72 h (relais *per os* possible).

## INTOXICATION AUX BENZODIAZÉPINES

### Pharmacologie

- Absorption rapide avec pic plasmatique en 1 à 3 h.
- Volume de distribution élevé, fixation protéique importante.
- Le métabolisme est hépatique.
- La demi-vie plasmatique est très variable selon les différentes molécules (de 3 à 70 h), elle ne reflète pas la durée de l'action clinique : **les dosages quantitatifs sont donc inutiles.**

### Symptomatologie

- Troubles neurologiques à type d'obnubilation, de somnolence, de coma.
  - Dépression respiratoire soit d'origine centrale, soit liée à la relaxation des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures.
- L'évolution est parfois très lente (réveil au bout de plusieurs jours), notamment chez les sujets âgés.

### Traitement

#### Traitement évacuateur

Le lavage gastrique est inutile compte tenu de la rapidité d'absorption de ces molécules et de la faible quantité réellement évacuée. Le charbon activé (une dose unique de 50 g) peut être justifié dans les 30 min suivant l'ingestion.

#### Traitement symptomatique

Représente l'essentiel de la thérapeutique. Surveillance neurologique et respiratoire, ventilation mécanique si nécessaire.

### Place du flumazénil

Le **flumazénil (ANEXATE)** est un **antagoniste des benzodiazépines**. Il modifie l'apparence clinique mais ne modifie pas la toxico-cinétique du produit. Ses indications doivent être limitées à l'obtention d'un réveil satisfaisant pour éviter l'intubation dans quelques situations particulières comme le sujet âgé ou l'insuffisant respiratoire chronique, et au diagnostic étiologique d'un coma calme, hypotonique, sans mydriase d'étiologie inconnue (dans ce cas, l'absence d'effet sur les troubles de la conscience permet d'exclure une intoxication par les **benzodiazépines**).

Les antécédents épileptiques ou la co-ingestion d'agents proconvulsivants sont des contre-indications relatives à l'utilisation du **flumazénil**.

L'administration doit être titrée et effectuée sous surveillance clinique. Un schéma possible est l'administration d'une dose initiale de 0,3 mg en 1 min, suivie de doses additionnelles de 0,1 mg/min jusqu'à une dose cumulative de 1-2 mg. L'absence de réponse clinique au-delà de 2 mg remet en cause le diagnostic d'intoxication pure aux **benzodiazépines**.

Il n'existe aucune étude validant l'administration de **flumazénil** en perfusion continue. Cette pratique impose une surveillance prolongée au moins dans une unité de surveillance continue [1].

### CONSENSUS

- [1] Intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation, SRLF, 2006

## INTOXICATIONS PAR PRODUITS ILLICITES OU LIÉES À UNE TOXICOMANIE (1)

Les drogues impliquées peuvent être ingérées (éthanol, **codéine**, **benzodiazépines**), inhalées permettant l'absorption rapide au niveau pulmonaire (cannabis, cocaïne, substances volatiles, phencyclidine), absorbées à travers la muqueuse nasale (cocaïne), ou injectées le plus souvent par voie veineuse (**morphine**, **produits de substitution**). Les consommateurs sont fréquemment polyintoxiqués (produits illécites, alcool, médicaments), association majorant la toxicité à laquelle s'ajoutent le « degré de pureté » du produit et les risques inconnus des additifs.

### Opiacés

L'héroïne, qui peut être fumée ou injectée, est la plus fréquemment utilisée. Il peut aussi s'agir de préparation commerciale (**MOSCONTIN**, **SKÉNAN**), de **codéine** ou de **produits de substitution** (**méthadone**, **SUBUTEX IV**). L'association coma, bradypnée, myosis, sites d'injections IV permet de porter le diagnostic d'overdose qui peut être compliquée d'œdème pulmonaire, d'arrêt cardio-respiratoire, de pneumopathie d'inhalation, de rhabdomyolyse. La **naloxone** (**NARCAN**) peut être administrée par voie veineuse ou intramusculaire. Antagoniste compétitif, elle permet d'obtenir en 30 à 40 s une régression spectaculaire des troubles, mais sa demi-vie brève (20 min), beaucoup plus courte que celle de l'héroïne, expose aux risques de rechute et d'arrêt respiratoire secondaire. Titration de 0,1 mg par 0,1 mg à répéter toutes les 2-3 min jusqu'à la réversibilité de la dépression respiratoire. En cas d'échec d'une dose cumulée de 2 mg, il faut rechercher une autre étiologie au coma. Il est impossible de prédire la durée clinique de l'antagonisation par la **naloxone**, et une surveillance continue est indispensable après l'injection. Une perfusion continue est recommandée s'il existe un risque de remorphinisation secondaire. La **naloxone** n'est pas logique en cas de complications pulmonaires justifiant une ventilation mécanique. Son efficacité en cas d'intoxication par **SUBUTEX IV** est controversée.

### Amphétamines - Ecstasy

Les **amphétamines** stimulent la vigilance, rendent l'utilisateur plus confiant, euphorique, extraverti, logorrhéique. Elles peuvent induire, après plusieurs prises, une agitation, un délire paranoïaque, des hallucinations, une hypertonie, des convulsions, une hyperthermie, une rhabdomyolyse voire des troubles du rythme cardiaque mortels. Le traitement est essentiellement symptomatique.

L'**ecstasy** (MDMA), dont la consommation augmente régulièrement, est essentiellement utilisée par des jeunes adultes lors de « rave party » (sessions de danses intenses pouvant durer plusieurs jours). Elle est souvent associée à la prise d'alcool, LSD, cocaïne. Plus souvent vendue sous forme de comprimés de 50 à 150 mg de MDMA, elle peut être fumée « crystal » ou injectée par voie veineuse (comprimé écrasé, dilué, filtré). Les intoxications mineures se traduisent par une agitation, une tachycardie, une hypertension artérielle, une mydriase, un trismus, une sudation. Les intoxications graves entraînent des troubles psychiatriques, neurologiques (myoclonies, épilepsie, état de mal, AVC), cardiovasculaires (collapsus, tachycardie, troubles du rythme) et une hyperthermie qui peut être maligne, responsable d'un syndrome de défaillance multiviscérale parfois mortel. Le traitement est symptomatique, il n'existe pas d'antidote.

### LSD - Phénylcyclidines (« Angel Dust », « Peace Pill »)

Substances entraînant des hallucinations visuelles et un état d'excitation, et un haut niveau d'adhérence du sujet avec risques de violences, de défenestration. Elles induisent une mydriase, une tachycardie, une hypertension, une hyperthermie, une ataxie, une dysarthrie, une nystagmus. Dans les formes massives : un coma, des crises convulsives, un arrêt respiratoire peuvent survenir.

## ANTAGONISTE DES OPIACÉS

## ■ Naloxone

NARCAN				
IV bolus, IV perfusion dans NaCl 0,9 % ou G5 %	10 amp. 1 mL 0,4 mg/mL		I	NR
IM ou SC si voie IV impossible				

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste pur et spécifique des morphinomimétiques sans effet agoniste.

Lorsque la **naloxone** est injectée à des sujets ayant reçu des morphinomimétiques, elle antagonise leurs effets (dépression respiratoire, myosis, analgésie). Son action dépend de la dose, de la puissance du morphinomimétique à antagoniser et de l'intervalle séparant les injections des deux produits.

## INDICATIONS

La **naloxone** est indiquée en traitement de l'intoxication aux opiacés ou de la dépression respiratoire secondaire aux opiacés après intervention chirurgicale.

Elle peut également être utilisée à des fins diagnostiques : diagnostic différentiel des comas toxiques et confirmation de non dépendance aux opiacés chez les toxicomanes.

## POSOLOGIE

## Intoxication aux opiacés :

- posologie initiale : 0,4 à 2 mg ;
- posologie d'entretien :
  - en bolus : 0,1 mg/administration,
  - en perfusion : 2 mg/administration.

Les posologies et la durée de traitement sont à adapter en fonction du contexte clinique.

**Dépression respiratoire post-intervention :** 1 à 2 µg/kg/administration à renouveler si besoin.

**Diagnostic des comas toxiques :** 3 administrations de 0,4 mg, espacées chacune de 5 min.

**Diagnostic de non-dépendance :** administration de 0,2 mg.

En cas de non-réponse, la posologie peut être augmentée jusqu'à 1,6 mg.

## CONTRE-INDICATIONS

Enfants de moins de 3 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez les sujets en état de dépendance aux opiacés, la levée brutale et complète des effets

morphiniques peut provoquer un syndrome de sevrage. La **naloxone** sera donc administrée à des doses progressives.

La **naloxone** doit également être administrée avec prudence chez les malades atteints d'affections cardiovasculaires graves : risque d'hypertension artérielle et de tachycardie.

La **naloxone** ayant une durée d'action assez courte (30 min en moyenne par voie IV), le patient doit faire l'objet d'une surveillance générale attentive jusqu'à ce que tout risque de remorphinisation ait été écarté. Cette surveillance est également nécessaire en raison de la survenue éventuelle de dépression respiratoire secondaire dans le cas où le morphinomimétique a une durée d'action supérieure à celle de la **naloxone**. Dans ce cas, l'utilisation de la perfusion permet de prolonger l'action de la **naloxone**.

Les meilleurs critères de surveillance sont la fréquence respiratoire, la ventilation/minute appréciée par la spirométrie, la PCO<sub>2</sub> et le diamètre pupillaire : ce dernier, en particulier, est un bon témoin clinique de l'action de la **naloxone**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Des frissons, une hyperventilation, des vomissements, (une agitation, une anxiété) ont été quelquefois signalés : ils correspondent à l'utilisation de doses trop fortes de **naloxone** chez les sujets ayant reçu des morphinomimétiques. Exceptionnellement, des troubles cardiovasculaires peuvent être observés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Lorsque la réponse clinique est en faveur d'une intoxication par les morphinomimétiques, ne pas oublier la possibilité de prise conjointe d'autres médicaments ou toxiques (alcool, **benzodiazépines**, **barbituriques**) qui peuvent majorer le risque de dépression respiratoire.

## INTOXICATIONS PAR PRODUITS ILLICITES OU LIÉES À UNE TOXICOMANIE (2)

### Cocaïne

Alcaloïde présent dans les feuilles de coca, elle peut être consommée sous forme : de feuilles sèches à mastiquer ; de « pasta » ou sulfate de cocaïne, fumable ; de chlorhydrate inhalable ou injectable. Mélangée avec du bicarbonate de sodium, elle peut être chauffée « crack » et fumée. Le « speed ball » correspond à un mélange cocaïne-héroïne. La voie muqueuse oropharyngée est la plus utilisée (« sniffer une ligne de cocaïne »), mais les voies sous-cutanée, rectale ou vaginale peuvent être utilisées. L'absorption digestive est importante et risque de poser problème en cas de transport intracorporel (*Body packing*). L'absorption est rapide, la durée d'action courte (2 h), les métabolites urinaires sont retrouvés jusqu'à 1 sem. après la prise. La cocaïne entraîne un état de désinhibition ; aux doses élevées surviennent une agitation, une confusion, des mouvements stéréotypés, des convulsions, une hypertension artérielle, des sueurs, une mydriase, une hyperthermie maligne. L'effet vasoconstricteur explique les ischémies myocardiques, cérébrales ou digestives.

Le traitement est symptomatique, l'**AVLOCARDYL** est déconseillé si nécrose myocardique. **La naloxone majore la toxicité de la cocaïne**, elle ne doit pas être utilisée en cas de « speed ball ».

### « Body packing » (transport intracorporel)

Cause d'intoxication accidentelle et létale pour les transporteurs ayant ingéré ou placé par voie rectale ou vaginale un nombre important de petits sachets contenant de grandes quantités de produits dangereux (cocaïne, héroïne, cannabis). La toxicité peut être secondaire à la rupture du conditionnement ou à la diffusion à travers l'emballage. En cas d'ingestion digestive, l'administration de **muclages** ± des **accélérateurs du transit** est en général suffisante.

### Cannabis

Essayé par la majorité des adultes américains, australiens, et beaucoup d'Européens, le cannabis est fumé. Sa consommation est souvent collective, mais limitée dans le temps ; la majorité des utilisateurs

arrêtent vers 30 ans. Le principe actif est rapidement absorbé, mais son élimination est lente : on peut le retrouver plus de 5 semaines après une prise. Il peut être fumé directement (**marijuana**) ou mélangé avec du tabac (**haschich** : « joint »).

Il provoque une euphorie, une sensation de relaxation, une augmentation des sensations habituelles (vision des couleurs, des sons, des sensations tactiles) et des risques lors de la conduite automobile ; une anxiété, un état de panique apparaissent (à la première prise). À doses élevées : hallucinations, syndrome de dépersonnalisation, tachycardie, injection conjonctivale, hypotension et ataxie. Un traitement symptomatique, une sédation (**diazépam** : 10 mg IV) sont parfois nécessaires. Des effets au long cours (bronchite chronique, cancer ORL/oesophagien) sont probables. Ces intoxications sont également responsables de répétition des hallucinations à distance de la prise : **flash-back**. Le traitement des formes graves reste symptomatique (pas d'antidote).

### Toxicomanie aux substances volatiles (« inhalation de colle »)

Toxicomanie de l'adolescent qui « sniffe » un « chiffon imprégné » ou un récipient ou dans un sac (risque de suffocation surajouté). Il peut s'agir d'essence, de white-spirit, d'acétone, de butane (gaz de briquet), de produits de nettoyage, de peinture, de vernis (hydrocarbures chlorés) ou de fluorocarbones (aérosols, extincteur d'incendie). L'inhalation entraîne une euphorie, des hallucinations, des troubles du comportement, une agitation, et à fortes doses un coma et un arrêt respiratoire. Un décès sur deux est dû à l'anoxie ou à une inhalation par utilisation d'un sac plastique autour de la tête ! À long terme, une atteinte cérébelleuse apparaît. Le traitement est symptomatique, une sédation est parfois nécessaire. S'agissant d'un adolescent, il ne peut quitter les urgences qu'en présence d'un parent (+++).

Au décours de la phase aiguë, chaque patient devrait se soumettre à une évaluation psychiatrique et être pris en charge par les intervenants en toxicomanie.

## INTOXICATIONS AU LITHIUM

Le **lithium**, traitement de référence de la psychose maniaque-dépressive, à index thérapeutique étroit (concentration plasmatique thérapeutique : 0,6 à 0,8 mmol/L) peut être responsable de trois formes cliniques, posant des problèmes particuliers, qui doivent être impérativement précisées.

### Formes cliniques

#### Surdosage thérapeutique

De loin le plus fréquent, sans doute le plus grave, favorisé par les **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, les **diurétiques**, la déplétion sodée (déshydratation) et l'insuffisance rénale.

**Au début** : tremblements fins des extrémités persistant au repos, asthénie, nausées, vomissements, diarrhées, troubles de l'élocution.

**En l'absence de diagnostic** : encéphalopathie myoclonique avec tremblements entre les accès cloniques, hypertonie, hyper-réflexivité, troubles de la repolarisation, collapsus.

#### Intoxication volontaire du sujet traité

Responsable d'une symptomatologie sévère, souvent retardée : encéphalopathies, convulsions, collapsus.

#### Intoxication aiguë en l'absence de traitement antérieur

- Nettement moins grave : somnolence ± diarrhée.

- Discordance (+++) entre lithémie et symptomatologie.

### Diagnostic biologique

Absence de corrélation entre la sévérité clinique et la lithémie car la forme active est intracellulaire (dosage intra-érythrocytaire ; de pratique non courante).

### Traitement

#### Évacuateur

Charbon activé non efficace.

Lavage gastrique dans les 60 min (doit tenir compte des contre-indications liées au patient : absence de protection efficace des voies aériennes).

Corriger la déshydratation : soluté salé isotonique (sauf en cas de diabète insipide néphrogénique).

#### Épurateur

L'élimination du lithium est accélérée par une diurèse saline (minimum 2 L de soluté salé isotonique).

**L'hémodialyse** (clairance : 60 à 120 mL/min, soit 5 fois la clairance rénale) n'est pas une urgence. Elle est discutée en cas de symptomatologie neurologique grave (coma, convulsion), avec lithémie élevée et demi-vie sérique > 36 h, et/ou insuffisance rénale organique, surtout dans les intoxications aiguës et chroniques.

## INTOXICATIONS PAR LE PARACÉTAMOL (1)

### Doses toxiques

- Adultes > 150 mg/kg; en cas de consommation d'alcool, il y a carence de glutathion et les doses toxiques peuvent être plus faibles.
- Adolescent > 125 mg/kg.
- Enfant moins de 10 ans : serait plus tolérant.

### Mécanismes de toxicité

Aux doses thérapeutiques, 90 % du paracétamol subit une sulfo- et une glucuroconjugaison hépatique, 10 % sont transformés en N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI), via le cytochrome P450 (2E1) et inactivés par le glutathion réduit. Après une intoxication aiguë, les réserves en glutathion s'épuisent, le NAPQI formé en grande quantité se fixe par une liaison « SH » aux protéines des hépatocytes et les dénature. Par ailleurs, il existe une dégradation des lipides membranaires et une activation des enzymes cytotolytiques, une sécrétion de TNF- $\alpha$  et d'IL-1. Ces anomalies induisent une nécrose hépatique centrolobulaire, qui peut être prévenue par l'administration précoce de molécules possédant un groupement « SH » qui, en se combinant au métabolite, suppléent le glutathion déficient. La **N-acétylcystéine**, précurseur du glutathion, corrigerait aussi les lésions oxydatives.

La mésaventure au paracétamol est une toxicité hépatique aiguë observée en cas de prise paracétamol à dose thérapeutique plusieurs jours consécutifs. On l'observe en cas de consommation excessive d'alcool. Ce risque d'hépatite sévère s'explique par l'induction du cytochrome P450 2E1 (cytochrome commun au métabolisme de l'éthanol et du paracétamol) par l'alcool. Cette induction est responsable d'une transformation accélérée du paracétamol, pris à dose thérapeutique, en son métabolite toxique, NAPQI.

De plus, l'alcool entraîne une déplétion hépatique en glutathion. Or, le glutathion permet d'éliminer par conjugaison la NAPQI. Ainsi, par ces deux mécanismes, la consommation d'alcool augmente le risque de toxicité du paracétamol. Les « mésaventures » au paracétamol ont une présentation proche de l'hépatite aiguë toxique (cytolyse brutale avec pic de transaminases concomitant du nadir du taux de prothrombine [TP]) et un pronostic aussi sévère en cas de forme grave.

### Symptomatologie

Intervalle libre de plusieurs heures (12 à 24 h).

#### Phase précoce

Asymptomatique, nausées ou vomissements.

- Cytolyse hépatique :
  - à partir de la 12<sup>e</sup>-24<sup>e</sup> h ;
  - maximale au 3<sup>e</sup> j (hépatite grave : ALAT > 1 000 UI/L).
- Allongement du temps de prothrombine.

#### Phase tardive (3<sup>e</sup>-6<sup>e</sup> j)

En l'absence de traitement antidote : douleurs abdominales, de l'hypocondre droit,  $\pm$  tableau d'insuffisance hépatocellulaire (clinique et biologique).

L'atteinte rénale est rare (nécrose tubulaire).

### Patients à risque accru de toxicité

Alcoolisme chronique, dénutrition.

Cirrhose.

Traitement par **phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine**, **isoniazide**, **rifampicine**, **zidovudine**, **BACTRIM**.

Prise en charge tardive.

Prise chronique.

Attention à ne pas confondre une hépatite alcoolique aiguë (ASAT le plus souvent < 300 UI/L) avec une intoxication au **paracétamol** vue tardivement (ASAT > 1 000 UI/L).



## MUCOLYTIQUE

## ■ Acétylcystéine

FLUIMUCIL					
Dose de charge : 150 mg/kg dans 250 mL de G5 % en 15 min. puis 50 mg/kg dans 500 mL de G5 % en 4 h puis 100 mg/kg dans 1 000 mL de G5 % en 16 h Poursuite du traitement jusqu'à négativation de la paracétamolémie	1 fl. 5 g/25 mL 5 inj.	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Précurseur du glutathion. Neutralisation des entités électrophiles produites par les métabolites du paracétamol.

## INDICATIONS

Intoxications aiguës par le paracétamol.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou intolérance connue à ce produit ou aux **benzodiazépines**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements.

Réactions anaphylactoïdes (urticaire, œdème facial, œdème laryngé, bronchospasme, hypotension) régressant à l'arrêt de la perfusion.

Réaction inflammatoire locale en cas d'extravasation.

## INTOXICATIONS PAR LE PARACÉTAMOL (2)

## Traitement

**Prise en charge urgente (+++).**

## Admission précoce

Lavage gastrique dans les 2 h suivant une prise > 125 mg/kg.

Le charbon activé réduit l'absorption mais impose la voie veineuse pour l'antidote.

En fonction de la paracétamolémie, déterminée au moins 4 h après l'ingestion, **N-acétylcystéine** par voie IV.

Risques toxiques	H4	H12
Hépatite fulminante	≥ 300 mg/L	≥ 75 mg/L
Absence de risque	< 150 mg/L	< 30 mg/L (pas de TT)

Nomogramme valable uniquement en cas d'intoxication aiguë, de prise unique chez un sujet en bonne santé.

Non utilisable en cas de surdosage chronique, de prises répétées, de préparation à libération prolongée, de sujets à hauts risques (abaisser le seuil de toxicité de 30 %).

**N-acétylcystéine (NAC) (FLUIMICIL) : IV**

- 150 mg/kg en 20 à 30 min \*
  - + 50 mg/kg en 4 h (G5 % : 500 mL)
  - + 100 mg/kg - 16 h suivantes
- Durée : jusqu'à négativation de la paracétamolémie.

## Phase tardive

En cas d'absorption supérieure à 125 mg/kg, débuter NAC avant les résultats de la paracétamolémie.

► *Indications de transfert en unité de greffe hépatique*

Encéphalopathie + taux de prothrombine < 40 %, ou temps de thrombine supérieure à 100 s.

► *Critères de transplantation hépatique du King's College\*\**

- Lactate artériel > 3,5 mmol/L (après correction de l'hypovolémie).
- Patients « super urgents » :
  - pH < 7,30 ou lactate > 3 mmol/L (après correction de l'hypovolémie) ;
  - ou présence simultanée : encéphalopathie = stade III, INR > 6,5, créatinine > 300 µmol/L.

\* Risque de réaction anaphylactoïde si perfusion trop rapide.

\*\* Bernard et al., *Lancet*. 2002 ; 359 : 558-563.

**INTOXICATIONS AIGÜES AUX SALICYLÉS (1)****Doses toxiques**

- Adultes : 10 à 15 g (ou > 300 mg/kg).
- Enfants > 100 mg/kg.

**Toxicocinétique**

- Absorption digestive ralentie (doses thérapeutiques : 30 min).
- Pic plasmatique : 2-24 h.
- Saturation de la voie hépatique (glycine/acide glucuronique) : élimination rénale prépondérante (++).
- Demi-vie augmentée (jusqu'à 40 h ; doses thérapeutiques : 2-4 h).

**Physiopathologie**

- Stimulation des centres respiratoires : alcalose respiratoire.
- Inhibition de la synthèse des prostaglandines.
- Toxicité cellulaire directe :
  - découplage des réactions de phosphorylation oxydative mitochondriale, avec baisse de production d'ATP ;

- inhibition de l'ATPase membranaire ;
- consommation d'O<sub>2</sub> augmentée ;
- surproduction de CO<sub>2</sub> ;
- baisse de la synthèse du glycogène et de la glutamine et des protéines.
- Stimulation sympathique :
  - troubles de la glycorégulation : augmentation de la glycogénolyse (hyperglycémie), hyperconsommation périphérique + baisse de la néoglucogenèse (hypoglycémie) ;
  - augmentation de la lipolyse : cétose ;
  - augmentation du catabolisme protéidique.

**Facteurs de gravité**

Enfants (+++), vieillards.  
Troubles de la conscience, convulsions.  
Hypoglycémie.  
Acidose métabolique.  
Acidose mixte.  
Taux sériques > 500 mg/L.  
Retard de prise en charge.

**INTOXICATIONS AIGÜES AUX SALICYLÉS (2)****Symptomatologie****Troubles neurosensoriels**

Céphalées, bourdonnements d'oreilles, hypoacousie, vertiges, somnolence voire coma (enfants +++), convulsions (enfants +++).

**Troubles digestifs**

Épigastralgies, nausées, vomissements.

**Troubles respiratoires**

- Hyperventilation (+++) initiale (salicylémie = 300 mg/L).
- Dépression respiratoire secondaire (enfants ++).
- œdèmes pulmonaires lésionnels (rares, intoxications massives).

**Troubles de la thermorégulation**

Hyperthermie, hypersudation, vasodilatation, tachycardie.

**Troubles acidobasiques**

Alcalose respiratoire initiale, constante, rapidement associée à une acidose métabolique (*Standard Base Excess* < - 5). Hyperlactatémie.

Acidose métabolique et respiratoire [gravité (+++), enfants (+++)].

**Troubles biologiques**

Hyperglycémie.

Hypoglycémie secondaire [gravité (+++), enfants (+++)].

Hypokaliémie (transfert cellulaire + fuite rénale par alcalose respiratoire). Déshydratation extra ± intracellulaire.

**Chez l'enfant**

Alors que chez l'adulte, la conscience est très longtemps conservée, les troubles de la conscience sont précoces, les convulsions fréquentes, la déshydratation intense. L'absence d'anamnèse, l'hyperglycémie initiale, la cétose et l'acidose métabolique peuvent faire évoquer à tort une acidocétose diabétique. L'hypoglycémie et l'acidose lactique sont des facteurs pronostiques.

**Traitement**

- Le lavage gastrique reste efficace en cas d'intoxication massive même vue tardivement ; le charbon activé absorbe l'acide acétylsalicylique, mais l'intérêt clinique n'a pas été démontré.

**L'alcalinisation des urines (pH urinaire > 7,5) accroît l'élimination urinaire.**

La diurèse forcée est inutile.

- Symptomatique :
  - réhydratation ;
  - apport de glucose, de KCl ;
  - correction de l'acidose métabolique.
- Hémodialyse (corrige l'acidose, multiplie par 4 l'épuration du toxique) : si salicylémie ≥ 1 000 mg/L.

**INTOXICATION AIGUË AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) (1)**

Le CO, gaz incolore, inodore, très diffusible, de densité proche de l'air, reste la première cause de décès par intoxication en France (300 à 350 décès par an). Le CO est produit par la combustion incomplète des dérivés carbonés. Les causes domestiques sont prédominantes (convecteur à charbon, chauffe-eau et chauffage au gaz), et responsables d'intoxications collectives.

**Toxicité du CO**

- La très grande affinité du CO (230 fois celle de l'O<sub>2</sub>) pour l'hémoglobine forme la carboxyhémoglobine (HbCO) ( $\text{HbO}_2 + \text{CO} \rightarrow \text{HbCO} + \text{O}_2$ ), responsable d'une anoxie tissulaire aiguë.
- L'affinité spécifique pour le cerveau et le myocarde accentue le déficit en O<sub>2</sub>.
- Au niveau mitochondrial : fixation sur les enzymes de la chaîne respiratoire (cytochrome A3, P450, catalase, peroxydase).
- Lésions d'ischémie - reperfusion lors de la phase de réoxygénation.
- Femme enceinte : traverse la barrière placentaire, et se fixe sur Hb fœtale (affinité supérieure à celle de l'Hb adulte).

**Élimination du CO**

Demi-vie :

- air ambiant : 4 h ;
- O<sub>2</sub> pur : 1 atmosphère : 90 min ;
- O<sub>2</sub> pur : 2 atmosphères : 20 min.

**Diagnostic [1]****Signes aigus**

Forme immédiatement mortelle (teinte cochenille, problème médico-légal).

**Formes graves**

Coma inaugural :

- 3 à 13 % sur lieu d'intoxication ;
- peut persister (malgré soustraction de l'atmosphère toxique + oxygénothérapie) ;
- syndrome pyramidal, extrapyramidal.
- Agitation, crises hypertoniques, convulsions (rares).
- Collapsus, troubles du rythme, insuffisance coronarienne/arrêt cardiorespiratoire.

**Formes bénignes**

- Céphalées, vertiges, faiblesse musculaire, troubles digestifs.
- Perte de connaissance brève (+++).
- Manifestations psychiatriques.
- Troubles visuels.
- Y penser (+++) : plus de 30 % des cas non diagnostiqués.

**Diagnostic biologique**

- Détection/mesure du CO dans l'atmosphère.
- Dosage sanguin : HbCO > 10 % (sensibilité élevée, spécificité faible).

**Complications neurologiques tardives (syndrome post-intervallaire)**

- 30 à 40 % des victimes.
- Facteurs favorisants : absence d'oxygénothérapie (diagnostic non fait), retard au traitement, âge > 60 ans, existence d'un coma initial.
- Syndromes neuropsychiques : asthénie, troubles visuels ou de la mémoire, céphalées, irritabilité, syndrome parkinsonien.

**INTOXICATION AIGUË AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) (2)****Traitement [1]**

Antidote : O<sub>2</sub>.

**Sur les lieux de l'intoxication**

- Soustraction de la victime (risque d'explosion, protection des sauveteurs).
  - Administration d'O<sub>2</sub> à fort débit à l'aide de masque à haute concentration.
  - En cas de coma :
    - intubation + ventilation à FiO<sub>2</sub> : 100 % ;
    - transfert vers centre d'oxygénothérapie hyperbare (OHB).
- Prélèvements sanguins, si possible.

**En milieu hospitalier**

- O<sub>2</sub> normobare avec masque à haute concentration minimum 6 h.

**Indications à l'oxygénothérapie hyperbare :**

- coma,
  - perte de connaissance brève,
  - grossesse.
- Pas d'indication en l'absence de trouble initial de la conscience, quel que soit le taux d'HbCO.
  - Traitement symptomatique des formes graves.
- Prévention des récides**
- Enquête technique obligatoire sur l'installation responsable.
  - Informer du danger d'utilisation de cette installation avant l'enquête et la mise en conformité.

**CONSENSUS**

[1] Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées, *CSHPF*, 2005

## INTOXICATION AUX BÊTABLOQUANTS

### Symptomatologie

Elle est souvent de survenue brutale, sans prodrome.

#### Manifestations cardiovasculaires

- État de choc par vasoplégie (effet stabilisant de membrane) ou par dépression de la contractilité myocardique.
- Troubles du rythme et de conduction à type de bradycardie sinusale, de bloc auriculoventriculaire ou intraventriculaire (effet stabilisant de membrane), allongement de l'espace QT et torsades de pointe (**SOTALEX**).

#### Manifestations respiratoires

Le plus souvent liées aux troubles neurologiques et cardiovasculaires. Bronchospasme chez les sujets asthmatiques.

#### Manifestations neurologiques

Convulsions (effet stabilisant de membrane).

#### Signes biologiques

Hypoglycémie, hyperkaliémie.

### Facteurs de gravité et pronostic

La mortalité globale est faible (0,3 %). La liposolubilité des produits ingérés est un facteur de gravité (le **propranolol** est responsable de 71 % des décès). Plus de la moitié des arrêts cardiaques surviennent en milieu hospitalier. La co-ingestion de psychotropes ou d'autres cardiotropes est un facteur d'augmentation de la mortalité, comme l'existence d'une cardiopathie associée.

### Traitement

Nécessité d'une prise en charge immédiate.

### Traitement épurateur

Peut être proposé à la phase très précoce de l'intoxication. Le lavage gastrique ne doit être réalisé que chez un patient parfaitement conditionné et stabilisé. Absence d'efficacité démontrée du charbon activé.

### Traitement du choc

Remplissage initial prudent lors de la prise en charge, mais l'hypotension est le plus souvent secondaire à une vasodilatation ou à une altération de la contractilité myocardique justifiant l'utilisation de **sympathomimétiques** :

- **dobutamine** (5 à 15 µg/kg/min) ou **adrénaline** (0,2 à 1 µg/kg/min). Des posologies parfois très élevées peuvent être nécessaires ;
- **glucagon** (5 à 10 mg IVD puis 1 à 5 mg/h IVSE) : il peut être utilisé précocement pour son action chronotrope et inotrope positive mais ne peut constituer à lui seul le traitement des complications hémodynamiques de l'intoxication.

### Troubles de conduction

**Catécholamines** en première intention (collapsus généralement associé). Entraînement électrosystolique en cas d'inefficacité.

### Convulsions

Traitement symptomatique par **benzodiazépines**, ventilation artificielle.

### Troubles respiratoires

Oxygénothérapie. Ventilation mécanique d'autant plus qu'il existe un état de choc, des troubles du rythme graves, un OAP.

## INTOXICATIONS AUX INHIBITEURS CALCIQUES

### Pharmacologie

#### Mécanisme d'action

Diminution de l'influx de calcium dans les cellules à travers les canaux calciques lents entraînant une altération de la contractilité myocardique, une dépression sinusale et de la conduction auriculoventriculaire, et une vasodilatation.

#### Pharmacocinétique

Absorption digestive importante et rapide avec un effet de premier passage hépatique important. La fixation protéique est faible, le volume de distribution élevé.

### Symptomatologie

#### Manifestations cliniques :

- arrêt circulatoire par dissociation électromécanique compliquant des troubles de conduction dans 20 % des intoxications ;
- collapsus secondaire soit à une vasoplégie, soit à une atteinte de la contractilité myocardique ;
- anomalies de la fréquence cardiaque bradycardie (**vérapamil**, **diltiazem**) ou tachycardie (**dihydropyridines**) ;
- troubles de conduction : bloc auriculoventriculaire, dépression du nœud sinusal ;
- rares cas d'œdème lésionnel.

**Anomalies biologiques** : hyperglycémie possible.

### Facteurs de gravité et pronostic

La gravité dépend de la dose ingérée. Elle est plus importante en cas de cardiopathie

préexistante ou en cas d'intoxication associant d'autres **antiarythmiques**. La mortalité globale est estimée à 18 % (variant de 25 % pour le **vérapamil** à 7 % pour le **diltiazem** ou la **nifédipine**).

### Traitement

**Traitement épurateur** : pas d'efficacité démontrée du charbon activé. Un traitement évacuateur peut être réalisé avant la quatrième heure si l'état hémodynamique est stabilisé.

**Traitement symptomatique** d'un arrêt cardiocirculatoire.

**Traitement d'un état de choc** : correction de la vasoplégie par **dopamine** (5-20 µg/kg/min) ou **norépinéphrine** (ou **noradrénaline**), restauration de la contractilité myocardique par **dobutamine** (5-20 µg/kg/min) ou **épinéphrine** (ou **adrénaline**) (les doses de **catécholamines** nécessaires peuvent être très supérieures à celles habituellement préconisées).

Un traitement par insuline-glucose peut être proposé en complément des autres thérapeutiques (bolus de 10 unités, suivi d'une perfusion continue à la vitesse de 0,5 U/kg/h).

**Traitement des troubles de la conduction** : préférentiellement par **bêtamimétiques**. L'entraînement électrosystolique est justifié en cas d'inefficacité des traitements pharmacologiques, de troubles conductifs préexistants ou d'association avec d'autres **antiarythmiques** (**bêtabloquants** notamment).



## INTOXICATIONS AIGUËS AUX ALCOOLS, GLYCOLS

Les intoxications aiguës par l'éthanol sont fréquentes, banalisées, parfois associées à des intoxications médicamenteuses ou à des complications liées à l'état de conscience (insuffisance respiratoire, pneumopathie d'inhalation, hypothermie, hypotension, hypoglycémie, rhabdomyolyse). Elles relèvent d'un traitement avant tout symptomatique, à la différence des intoxications par les glycols (dont l'éthylène glycol) et les alcools toxiques (dont le méthanol) qui sont rares, mais potentiellement graves et justifient l'utilisation précoce d'inhibiteur de l'alcool-déshydrogénase hépatique (ADH).

### **Intoxication aiguë par l'éthylène glycol (EG) (dose létale : 1-2 mL/kg)**

Principal composant des antigels, lave-vitres, produits de nettoyage, l'EG, liquide incolore à saveur aromatique, est rapidement absorbé, et métabolisé au niveau du foie par l'ADH en glycolaldéhyde puis en acide glycolique, principal responsable de l'acidose métabolique à trous anionique et osmolaire augmentés. Après un intervalle libre, l'EG peut entraîner une insuffisance rénale aiguë, une hypocalcémie, un coma convulsif, des troubles respiratoires par précipitations (dans les tissus) de cristaux d'oxalate de calcium.

### **Intoxication aiguë par le méthanol (dose létale : 1,2 mL/kg)**

Présent dans l'alcool à brûler, l'alcool dénaturé ou les alcools frelatés (responsables d'épidémie de décès), le méthanol n'est pas toxique lui-même, ce qui explique l'intervalle libre de 12 h. L'ADH le transforme en formaldéhyde qui forme

l'acide formique, métabolite toxique. Après une période de latence (12-24 h), surviennent une hyperventilation, des troubles digestifs, des céphalées, des vertiges, des troubles visuels et une mydriase aréactive puis un coma.

### **Diagnostic biologique**

- Acidose métabolique à trou anionique augmenté, non expliqué par le taux de lactates, associé à un trou osmolaire.
- Dosage spécifique.
- Cristaux d'oxalate de calcium dans les urines (intoxication par EG).

### **Traitement des intoxications par glycols ou alcools toxiques**

Lavage gastrique (dans les 2 h après l'ingestion)

Apport hydrique important.

Alcalinisation en cas d'acidose métabolique.

Éthylène glycol : **vit. B6** (100 mg/j) par voie veineuse.

Méthanol : **acide folinique** (50 mg/6 h) par voie veineuse.

Blocage de l'ADH (++++) - **4 méthyl-pyrazole (FOMÉPIZOLE)**

- IV : 10 mg/kg toutes les 12 h en 30 min (sérum physiologique)
- Durée du traitement : 60 h (5 demi-vies)

### **Hémodialyse**

Éthylène glycol : insuffisance rénale et/ou cardiaque.

Méthanol :

- insuffisance rénale, troubles visuels, acidose majeure non corrigée, par alcalinisation ;
- méthanolémie > 500 mg/L.

## INTOXICATION AIGUË À LA CHLOROQUINE (1)

Toute la gravité de cette intoxication tient aux manifestations cardiovasculaires qui très rapidement vont mettre en jeu le pronostic vital. Les troubles digestifs, neurosensoriels ont une valeur d'alarme.

### Toxicocinétique

L'absorption est rapide avec une biodisponibilité de 90 % ; 60 % des intoxiqués présentent des signes cliniques dans la première heure ; la totalité dans les 3 h. L'élimination rénale est lente avec une 1/2 vie de 25 h (mais avec des variations individuelles très importantes 27 h, 30-60 j !).

### Clinique

**Signes neurosensoriels** : céphalées, agitation, obnubilation voire coma, vertiges, bourdonnements d'oreille, hypoacousie, vision floue, diplopie.

**Troubles digestifs** : nausées, vomissements.

Valeurs d'alarmes, ces troubles attestent de l'intoxication et peuvent survenir avant les **complications cardiaques** :

- hypotension ;
- collapsus (effet inotrope négatif, stabilisant de membrane) ;
- arrêt cardiaque ;
- troubles du rythme.

ECG :

- troubles de la repolarisation précoces, fréquents ;
- signes d'alarmes : T négatif, QRS < 0,10 s ;
- bradyarythmie, torsades de pointe ;
- tachycardie ventriculaire.

**Biologie** : hypokaliémie profonde, rapide (moins de 2 h), par transfert intracellulaire, corrélée à la dose absorbée.

### Critères de gravité

Intoxication	DSI*	PAS**	dQRS***
Bénigne	< 2 g	≥ 100 mmHg	et ≤ 0,10 s
Intermédiaire	≥ 2 ≤ 4 g	≥ 100 mmHg	et ≤ 0,10 s
Grave	> 4 g	< 100 mmHg	ou > 0,10 s

En plus :

- chloroquinémie > 25 µmol/L ;
- acidose lactique (en l'absence de choc) ;
- délai entre prise et troubles.

### Traitement

L'extrême brutalité de survenue d'un arrêt cardiaque, de torsade de pointes ou de tachycardie ventriculaire impose une prise

en charge immédiate, pré-hospitalière médicalisée. Les modalités de prise en charge reposent sur l'**épinéphrine (ou adrénaline)**, le **diazépam** et la ventilation mécanique. Elles ont fait l'objet d'un consensus [1]. En l'absence de symptômes initiaux, une chloroquinémie permet de confirmer ou d'infirmer l'intoxication et « d'alléger » le traitement en cas de dose supposée ingérée ≥ 4 g.


\* DSI : dose supposée ingérée

\*\* PAS : pression artérielle systolique

\*\*\* dQRS : durée de QRS

## INTOXICATION AIGUË À LA CHLOROQUINE (2)

## Intoxication aiguë à la chloroquine [1]



## CONSENSUS

[1] Traitement de l'intoxication aiguë à la chloroquine, SRLF, 1987

## INTOXICATIONS PAR LES CHAMPIGNONS (1)

Les intoxications par les champignons ne sont pas exceptionnelles et certaines sont particulièrement graves ; le pronostic dépend du champignon ingéré mais l'identification est souvent difficile. Le délai écoulé entre l'ingestion et le début des symptômes est un élément clé pour suspecter le syndrome et établir un pronostic ; le diagnostic étant fondé sur l'anamnèse, la symptomatologie, les données biologiques ± l'identification du champignon, voire des toxines. L'interrogatoire recherchera en plus le nombre de repas, d'espèces ingérées, le mode de cuisson, l'absorption d'éthanol, le nombre de convives atteints ou indemnes.

### Syndromes précoces = délai d'incubation < 6 h

Six syndromes peuvent être individualisés, ils dépendent de l'espèce ; la symptomatologie plus moins sévère, de la quantité (donc de la dose de toxine) absorbée.

#### Syndrome coprinien (antabuse)

La coprine bloque l'acétyl-déshydrogénase et inhibe le métabolisme de **l'éthanol absorbé pendant le repas** : nausées, vomissements, bouffées de chaleur, sueurs, goût métallique, tachycardie et vasodilatation (face, thorax) sont les principaux symptômes. Parfois, collapsus et fibrillation auriculaire. L'évolution est spontanément favorable dans la majorité des cas. Le traitement est symptomatique ; le 4-méthyl pyrazole pourrait être discuté dans les formes sévères et prolongées.

#### Syndrome muscarinien (ou sudorien)

La muscarine se fixe de façon compétitive mais réversible sur les récepteurs d'acétylcholine des muscles lisses, de certaines glandes, du tissu nodal et du myocarde. Les troubles apparaissent entre 30 et 120 min après l'ingestion et durent en

général 15 à 20 min, parfois 24 h : nausées, vomissements, diarrhées, larmoiement, sueurs profuses, hypersécrétion salivaire et bronchique, myosis serré, bradycardie, hypotension, bronchospasme. Le traitement est symptomatique ; dans les formes sévères : **atropine** 0,5 mg IV, à répéter si besoin toutes les 30 min.

#### Syndrome narcotinique (hallucinatoire)

Les champignons hallucinogènes sont rares en Europe, mais peuvent être utilisés par les toxicomanes. 30 à 60 min après l'ingestion apparaissent des hallucinations visuelles, auditives, tactiles, une anxiété, une désorientation, une psychose, une tachycardie, une mydriase, une hypertension voire des troubles digestifs. La régression est spontanée, des « flashbacks » tardifs sont possibles.

#### Syndrome myco-atropinien (panthérien)

Les toxines, à effet *atropine-like*, agissent comme un faux neurotransmetteur agoniste du GABA. En quelques minutes : hallucinations, sensation d'ébriété, agitation, délire, ataxie, mydriase, tachycardie, parfois collapsus, coma, convulsion. Les formes mineures régressent spontanément, les formes sévères justifient un traitement symptomatique.

#### Syndrome résinoïdien (irritation gastro-intestinale)

Débute en 15 min, régresse en 4 h. Les troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, sont rarement responsables de déshydratation et/ou troubles hydroélectrolytiques sévères.

#### Syndromes immuno-allergiques (*Paxillus*)

Chez les patients initialement sensibilisés, l'ingestion induit 1 à 2 h après une hémolyse intravasculaire aiguë. Le traitement reste symptomatique.

## COUMARINE

## ■ Silymarine

LÉGALON				
5 mg/kg en 60 min, puis 20 mg/kg/j	40 cp. 70 mg		NR	

**PROPRIÉTÉS**

La silymarine favoriserait l'intégrité des hépatocytes.

Proposé dans les troubles fonctionnels digestifs au cours des hépatopathies.

**INDICATIONS**

Intoxication aux champignons sécréteurs d'amatoxine cytolytique (amanite phalloïde ou vireuse).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rarement : gastralgies, nausées.  
Exceptionnellement : allergie.

## INTOXICATIONS PAR LES CHAMPIGNONS (2)

### Syndromes tardifs : délai d'incubation > 6 h

Ce sont les intoxications les plus graves, provoquées le plus souvent par les champignons contenant des amatoxines cytolytiques (amanite phalloïde ou vireuse). Toute intoxication survenant après un délai d'incubation supérieur à 6 h impose l'hospitalisation de tous les convives du repas incriminé.

#### Syndrome phalloïdien

Les premiers signes digestifs apparaissent dans les 12 h après l'ingestion, l'atteinte hépatique entre le 2<sup>e</sup> et le 5<sup>e</sup> j.

##### ► Mécanisme de toxicité

Les amatoxines, rapidement absorbées, se fixent à l'ARN polymérase II des hépatocytes, bloquent la transcription, inhibent la synthèse de l'ARN messager et entraînent la cytolysse hépatique.

**Dose létale** : 1 seule amanite phalloïde (5 à 6 mg d'amatoxine).

##### ► Symptomatologie

Après une incubation totalement silencieuse (6 à 24 h), surviennent des troubles digestifs intenses avec **syndrome cholériforme**, responsables, en l'absence de traitement symptomatique de déshydratation, d'acidose métabolique, de collapsus et d'insuffisance rénale (initialement fonctionnelle). Ces troubles peuvent durer plusieurs jours. Vers le 3<sup>e</sup>-4<sup>e</sup> j apparaissent les signes de **l'insuffisance hépatocellulaire** (ictère, encéphalopathie, troubles de la coagulation), alors que la cytolysse débute vers la 36<sup>e</sup> h.

**L'insuffisance rénale** est due soit au bas débit, soit à un syndrome hépatorénal.

##### ► Facteurs de mauvais pronostic

- Jeune âge.
- Bilirubine > 50 mg/L (85 µmol/L).
- Acidose lactique.
- Encéphalopathie (grade ≥ III).
- Syndrome hépatorénal.
- Chute précoce et brutale du TP et du facteur V.

##### ► Traitement symptomatique

- Admission en réanimation (même en cas de suspicion).
- Correction rapide et agressive de l'hypotension et de l'hypovolémie.
- Maintien d'une diurèse (85 % de la toxine absorbée sont éliminés par le rein).
- Maintien de la diarrhée (élimination de la toxine).
- Aspiration gastroduodénale + charbon activé en l'absence de vomissements (empêche le cycle entérohépatique).
- Surveillance clinique et biologique complète (toutes les 6 h).

##### ► Traitements spécifiques

Discutés, efficacité clinique non prouvée.

• Soit **PENI G** : 1 MU/kg J1, puis 0,5 MU/kg à J2-J3.

• Soit **silymarine (LÉGALON)** : 5 mg/kg en 60 min puis 20 mg/kg/j.

(agiraient comme inhibiteur du système de transport).

##### ► Transplantation hépatique

Facteur V < 10 %, acidose lactique, encéphalopathie, insuffisance rénale.

#### Syndrome orellanien (*Cortinarius orellanus*)

Après une période de latence de quelques jours : troubles digestifs, douleurs lombaires, céphalées, somnolence, puis insuffisance rénale aiguë oligo-anurique.

- Séquelles rénales sévères dans 30 à 50 % des cas.
- Le traitement est uniquement symptomatique.

## PIQÛRES D'HYMÉNOPTÈRES

La sévérité des lésions est très variable, allant de la réaction locale au choc anaphylactique fatal (50 décès/an aux États-Unis ; 10/an en France).

### Piqûres d'abeille (*Apis mellifera*)

Survivant à l'hiver, les abeilles se nourrissant uniquement de pollens, reprenant leur activité dès le printemps, piquent lorsqu'elles se sentent menacées. Leur dard est muni de crochets. En s'envolant, l'abeille abandonne le dard avec le réservoir et l'appareil musculaire associé permettant l'injection pendant 20 min après la piqûre. L'élimination doit être réalisée en raclant la peau avec l'ongle ou la lame d'un couteau (éviter de pincer le réservoir !). Lors de la piqûre, elle libère une phéromone qui alerte la colonie et incite à venir à son aide (attaque massive de l'agresseur).

### Piqûres de guêpes (*Vespula vulgaris* et *germanica*)

Omnivores (recherchent les habitations), les guêpes, sauf la reine, ne survivent pas à l'hiver. La plupart des piqûres surviennent en été. Dotées d'un dard lisse, elles peuvent piquer plusieurs fois. Leur venin contient un puissant neurotoxique utilisé pour neutraliser les larves (la guêpe est un prédateur).

### Piqûres de frelon (*Vespa crabro*)

Plus gros, moins agressif, il a un dard lisse.

### Piqûres de bourdon (*Bombus terrestris*)

Les piqûres sont rares (faible agressivité) mais l'utilisation des bourdons dans les serres risque d'accroître le nombre de victimes.

### Réactions anaphylactiques au venin d'hyménoptères

Réaction d'hypersensibilité immédiate de type 1. Lors d'un second contact, les sub-

stances antigéniques se fixent aux IgE, déclenchent une dégranulation mastocytaire et libèrent l'histamine en grande quantité. Si 5 à 45 % de la population possèdent des IgE spécifiques, le choc ne survient que dans 0,02 à 4 % des piqûres.

### Tableaux cliniques

#### Réactions locales directes

Placard érythématopapuleux, induré, douloureux, prurigineux maximum à H24, pouvant atteindre tout le membre (10 %). Risque lors de l'ingestion accidentelle d'obstruction des voies respiratoires.

#### Réactions systémiques directes

Peuvent être sans risque vital (urticaire, œdème angiocutané), ou correspondre à des risques vitaux majeurs (choc anaphylactique, arrêt cardiorespiratoire) ou potentiels (bronchospasme, œdème de Quincke) ; en cas de piqûres multiples (> 50), risque de cytolysse, de rhabdomyolyse, de nécrose tubulaire aiguë.

### Traitement

#### Affections potentiellement létales

Administration immédiate d'épinéphrine (ou adrénaline) (IV, SC, sublingual).

+ Remplissage.

+ O<sub>2</sub> ± aérosols de β<sub>2</sub> (si bronchospasme). Les corticoïdes et les antihistaminiques sont sans effet à la phase aiguë, permettent d'éviter la récurrence.

#### Affections locales sans caractère vital

- S'assurer que le dard n'est plus en place (abeille).
- Crème anti-inflammatoire.
- Antalgique (paracétamol) ± antihistaminique.
- Vérifier VAT.

#### Angio-œdème cutané

Corticoïdes (5 à 8 j) + antihistaminiques. Discuter désensibilisation ultérieure.

## ENVENIMATIONS PAR MORSURE DE SERPENTS (1)

### Épidémiologie

Dans la majeure partie de l'Europe, les seuls serpents venimeux sont les vipères (aspi, berus). En dehors du milieu naturel, les morsures par des serpents exotiques surviennent chez les éleveurs, ou après abandon de ces espèces dans la nature.

### Vipères européennes

#### Circonstances

Les morsures (3,5/100 000 habitants ; décès : 10/an en France) surviennent au cours de promenades pieds nus dans un terrain herbeux (75 % des cas), lors de l'exploration à mains nues d'un taillis, chez les jeunes enfants du fait de leur curiosité.

#### Physiopathologie

Le venin, mélange complexe de protéines toxiques (protéase, hyaluronidase, hydrolases, phosphodiesterases), de toxines et de diverses autres substances (métalloprotéines), est rapidement détecté dans le sang (30 min après la morsure) ; les conséquences dépendent de la quantité de venin et de l'espèce.

#### Conséquences

Une morsure sur deux est blanche, sans injection de venin (grade 0).

#### Signes locaux

Une douleur locale immédiate témoigne de la pénétration du venin responsable d'un œdème local, douloureux (grade 1).

Les signes généraux et l'extension à tout le membre (grade 2) ou **au tronc** (grade 3) nécessitent, en dehors du traitement symptomatique, des **immunoglobulines antivenin (SAV : VIPERFAV)**.

#### Patients à risque

Enfants, femmes enceintes, sujets âgés ou débilisés.

#### Signes de gravité

- Extension à tout le membre et/ou au tronc.
- œdème de Quincke, bronchospasme, œdème pulmonaire.
- Choc hypovolémique : fuite capillaire intense associée à des troubles digestifs (diarrhées, vomissements).
- Acidose métabolique.
- Insuffisance rénale par bas débit prolongé ± hémolyse ± rhabdomyolyse.
- Troubles de la coagulation avec syndrome hémorragique, hématurie.

#### Traitement immédiat

- Allonger le patient, repos, immobiliser le membre mordu.
- Enlever les garrots éventuels (bracelets, colliers, bagues).
- Bandage non serré.
- Glace locale.
- Éviter : garrot, incision, aspiration, cautérisation, antivenin hors service hospitalier, injection de **SAV (VIPERFAV)** autour de la morsure.

#### Milieu hospitalier

Cf. Tableau.



## IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES

## ■ Sérum antivenimeux

VIPERFAV					
1 fl. de 4 mL dilué dans 100 mL de NaCl 9 ‰, en perfusion d'une heure Peut être renouvelé 2 fois, à 5 h d'intervalle, selon évolution clinique	1 fl. 4 mL	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Fragments F(ab')<sub>2</sub> d'immunoglobuline équine neutralisant le venin des vipères : *Vipera aspis*, *Vipera berus* et *Vipera ammodytes*.

**INDICATIONS**

Traitement des envenimations (grade II ou III) pour les vipères européennes chez les patients

qui présentent un œdème rapidement extensible et/ou l'apparition de signes systémiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Contre-indication relative en cas d'allergie connue aux protéines hétérologues d'origine équine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement débuté sous surveillance médicale à un rythme lent (50 mL/h).

## ENVENIMENTS PAR MORSURE DE SERPENTS (2)

### Échelle de gravité des envenimations par vipères européennes et conduite à tenir

Grade 0	Envenimation nulle	Pas d'œdème Crochets visibles ou non	Désinfection locale + antibiothérapie ( <b>AUGMENTIN</b> ), vérifier VAT
Grade 1	Envenimation minime	Œdème localisé Pas de signes généraux	Hospitalisation 24 h minimum, surveillance rapprochée Désinfection locale + antibiothérapie ( <b>AUGMENTIN</b> ), vérifier VAT
Grade 2	Envenimation modérée	Œdème extensif isolé Ou signes généraux modérés	Traitement local + symptomatique + <b>antibiotique (AUGMENTIN</b> + <b>aminosides)</b> ± antivenin : <b>immunoglobulines purifiées équine ViperFAV</b> 4 mL dilués 100 mL de NaCl 0,9 ‰ en 60 min ; à répéter toutes les 5 h jusqu'à disparition des signes généraux et diminution de l'œdème
Grade 3	Envenimation sévère	Œdème très étendu Signes généraux Complication viscérale	Idem grade 2 ± <b>héparine</b> si CIVD ; les <b>corticoïdes</b> n'ont pas d'effet

## INTOXICATIONS PAR GAZ DE COMBAT (1)

Les gaz de combat (gaz, vapeur ou aérosol) attaquent préférentiellement l'appareil respiratoire, mais la toxicité percutanée est parfois très importante (gaz vésicants). Depuis l'attentat de New York du 11/9/2001, le plan vigipirate a été réactivé et tous les centres d'urgences ont reçu des instructions et du matériel de protection pour le personnel. L'intoxication collective peut être connue, et donc le gaz responsable. Par contre, tout SAU pouvant être amené à recevoir le « cas-index », le diagnostic doit pouvoir être fait très rapidement afin de mettre en route le traitement adapté et donner l'alerte.

### Neurotoxiques ou organophosphorés

Les organophosphorés (sarin, soman, tabun) inhibent les cholinestérases et provoquent :

- un syndrome muscarinique : vision floue, diminution de l'acuité visuelle (myosis +++), hypersécrétion bronchique, bradycardie, hypotension, crampes abdominales associées à des troubles digestifs ;
  - un syndrome nicotinique : fasciculations musculaires (+++), faiblesse musculaire avec risque respiratoire ;
  - un syndrome central : confusion, somnolence, tremblements, ataxie, dysarthrie.
- Les formes graves associent : coma, épilepsie, détresse respiratoire et choc.

L'association vision floue, myosis, fasciculation, bronchospasme, confusion chez 2 patients consultant en très peu de temps et venant du même endroit permet le diagnostic.

### Gravité

Grade 0	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
– Aucun signe	– Patient conscient – Majoration des sécrétions – Fasciculations +	– Somnolence – Bronchorrhée sévère – Fasciculations (+++) – OAP – PA systolique < 90 mmHg	– Coma + – Tous les signes – Ventilation spontanée avec $\text{FIO}_2$ élevée	– Coma – Détresse respiratoire – OAP – Ventilation mécanique +

**ANTIDOTE DES ORGANOPHOSPHORÉS**■ **Pralidoxime**

<b>CONTRATHION</b>				
1 <sup>re</sup> administration : 1 ou 2 fl. 2 <sup>e</sup> administration : 1 fl. une 1/2 h après Puis 1 fl. toutes les 4 à 6 h	10 fl. 200 mg		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antidote des produits organophosphorés anticholinestérasiques (poisons du système neurovégétatif agissant indirectement en inactivant par phosphorylation les enzymes régulatrices de la transmission nerveuse).

Faible résorption digestive, faible diffusion au niveau du système nerveux central, métabolisme hépatique, excrétion rénale tubulaire entraînant une élimination rapide (quelques heures) du produit.

**INDICATIONS**

Intoxication par les organophosphorés anticholinestérasiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ce produit n'est pas indiqué dans les intoxications par insecticides carbamates anticholinestérasiques.

Il est d'autant plus efficace qu'il est administré peu de temps après l'intoxication. Il a peu d'effet si le délai entre l'intoxication et le début du traitement est supérieur à 36 h.

**Grossesse** : absence de données. Son indication chez la femme enceinte doit donc se limiter aux intoxications engageant le pronostic vital.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles visuels : diplopie, vision floue.

Malaise, vertiges, céphalées, tachycardie.

À doses très élevées, la **pralidoxime** pourrait aggraver le bloc neuromusculaire dû à l'organophosphoré.

## INTOXICATIONS PAR GAZ DE COMBAT (2)

### Traitement

- Protection du personnel.
- Décontamination cutanée et oculaire.
- Symptomatique.
- Spécifique : **atropine** dose de charge : adulte 2 mg IVD (enfant 0,02 mg/kg) toutes les 10 min jusqu'à disparition du myosis, de la bradycardie et tarissement bronchique. Entretien : 0,02 à 0,08 mg/kg/h. **CONTRATHION** : 1 à 2 g/100 mL NaCl 0,9 % en 30 min (adulte) (enfant : 20 à 40 mg/kg) puis 10 mg/kg/h. En l'absence d'action sur les cholinestérases cérébrales, n'améliore pas les troubles de la conscience (l'usage préventif de la **pyridostigmine** pourrait être responsable du syndrome de la guerre du Golfe).

### Vésicants : ypérite (gaz moutarde), lewisite, oxyme de phosgène

Après une période de latence variable (absorption non douloureuse), des lésions cutanées, oculaires et trachéobronchiques surviennent.

### Symptômes

**Atteinte oculaire** : conjonctivite, photophobie, œdème palpébral.

**Atteinte cutanée** : érythème avec des douleurs intolérables, vésicules, bulles confluentes responsables de phlyctènes évoluant vers la nécrose (régions humides).

**Atteinte respiratoire** : toux, inflammation voire nécrose extensive des muqueuses, responsables de broncho-pneumonie voire de détresse respiratoire. Une aplasie médullaire peut survenir ultérieurement.

### Traitement

Prophylaxie pour le personnel (+++) : tenue spéciale (TOM).

### Décontamination

- Attention : une douche augmente la surface contaminée (+++).
- Limiter contamination : poudre absorbante (terre de foulon, talc, farine).
- Puis décontamination : solution d'eau de Javel à 1 %.

Spécifique : intoxication à lewisite BAL : 3 mg/kg IM toutes les 6 h.

### Suffocants : chlore, phosgène (+++)

- La majorité des agents suffocants sont à base de chlore, gaz très volatil (phosgène +  $H_2O \rightarrow HCl$ ) responsable d'OAP lésionnel.

• Cette intoxication peut aussi survenir lors du nettoyage des cuvettes de WC avec un détartrant acide et l'utilisation malencontreuse d'eau de Javel : « coup de chlore » : toux douloureuse, barre constrictrice, céphalées, vomissements avec risque secondaire d'OAP.

- **Exposition au phosgène** : gaz à odeur caractéristique de « foin coupé », le phosgène provoque, 2 à 6 h après l'exposition, une irritation des yeux et des voies aériennes supérieures (larmoiement, irritation pharyngée, toux, oppression thoracique), un OAP lésionnel responsable d'une détresse respiratoire (2 ppm). En cas d'intoxication massive, la suffocation peut aboutir à la mort en moins de 3 min (3 ppm).

Le traitement est symptomatique, l'efficacité des **corticoïdes** n'est pas démontrée.

## ENVENIMATION SCORPIONIQUE

Accident fréquent des pays tropicaux, véritable problème de santé publique, l'ES n'entraîne, dans 80 % des cas, que des simples douleurs locales. Les manifestations systémiques sont essentiellement une hypertension (11 % des cas), une hypersudation (8 %), un état de choc (6 %), une détresse respiratoire (4 %). Elles

sont secondaires à la libération massive de catécholamines responsables de la défaillance myocardique ultérieure. Le traitement est symptomatique ; l'effet de l'immunothérapie antiscorpionique est loin d'être évident dans les études randomisées, contrôlées et double aveugle.

## MUCOLYTIQUE

## ■ Acétylcystéine

FLUIMUCIL					
Dose de charge : 150 mg/kg dans 250 mL de G5 % en 15 min. puis 50 mg/kg dans 500 mL de G5 % en 4 h puis 100 mg/kg dans 1 000 mL de G5 % en 16 h Poursuite du traitement jusqu'à négativation de la paracétamolémie	1 fl. 5 g/25 mL 5 inj.	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Précurseur du glutathion. Neutralisation des entités électrophiles produites par les métabolites du paracétamol.

## INDICATIONS

Intoxications aiguës par le paracétamol.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou intolérance connue à ce produit ou aux **benzodiazépines**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements.

Réactions anaphylactoïdes (urticaire, œdème facial, œdème laryngé, bronchospasme, hypotension) régressant à l'arrêt de la perfusion.

Réaction inflammatoire locale en cas d'extravasation.

## FOMÉPIZOLE

## ■ Fomépizole

**FOMÉPIZOLE AP-HP**

Dose de charge de 15 mg/kg (diluée dans 250 mL de G5 % ou de NaCl 9 %) en 45 min puis dose d'entretien toutes les 12 h en fonction du taux sérique initial d'éthylène glycol

5 amp. 20 mL 100 mg  
(5 mg/mL)

I

NR

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur compétitif de l'alcool-déshydrogénase.

**INDICATIONS**

Intoxication par l'éthylène glycol.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie connue aux pyrazolés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réactions allergiques mineures (éruption cutanée, éosinophilie) ou plus importantes (bronchospasme, choc anaphylactique).

**Dosage du fomépizole en fonction de l'éthylène glycol**

Taux sérique initial d'éthylène glycol		Dose de charge du fomépizole	Dose d'entretien du fomépizole (mg/kg) toutes les 12 h				
g/L	mmol/L	mg/kg	D2	D3	D4	D5	D6
6	96	15	10	10	10	7,5	5
3	48	15	10	10	10	7,5	
1,5	24	15	10	10	7,5		
0,75	12	15	10	7,5			
0,35	5,6	15	7,5				
0,1-0,3	1,6-5,5	15					



## COUMARINE

## ■ Silymarine

LÉGALON				
5 mg/kg en 60 min, puis 20 mg/kg/j	40 cp. 70 mg		NR	

**PROPRIÉTÉS**

La silymarine favoriserait l'intégrité des hépatocytes.

Proposé dans les troubles fonctionnels digestifs au cours des hépatopathies.

**INDICATIONS**

Intoxication aux champignons sécréteurs d'amatoxine cytolytique (amanite phalloïde ou vireuse).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rarement : gastralgies, nausées.  
Exceptionnellement : allergie.

## IMMUNOGLOBULINES SPÉCIFIQUES

## ■ Sérum antivenimeux

VIPERFAV					
1 fl. de 4 mL dilué dans 100 mL de NaCl 9 ‰, en perfusion d'une heure Peut être renouvelé 2 fois, à 5 h d'intervalle, selon évolution clinique	1 fl. 4 mL	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Fragments F(ab')<sub>2</sub> d'immunoglobuline équine neutralisant le venin des vipères : *Vipera aspis*, *Vipera berus* et *Vipera ammodytes*.

**INDICATIONS**

Traitement des envenimations (grade II ou III) pour les vipères européennes chez les patients

qui présentent un œdème rapidement extensible et/ou l'apparition de signes systémiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Contre-indication relative en cas d'allergie connue aux protéines hétérologues d'origine équine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement débuté sous surveillance médicale à un rythme lent (50 mL/h).

## ADSORBANT INTESTINAL

### ■ Charbon activé

<b>CARBOMIX</b>					
50 g après adjonction de 250 mL d'eau	1 fl. 500 mL (granulés 50 g pour susp. buv.)	HOP			
<b>TOXICARB</b>					
< 1 an : 1 g/kg De 1 à 12 ans : 25 à 50 g > 12 ans : 25 à 100 g	60 mL (fl. 12 g) 250 mL (fl. 50 g)			NR NR	

#### PROPRIÉTÉS

Absorbant de substances toxiques.

#### CONTRE-INDICATIONS

Intoxication par les produits caustiques.

#### INDICATIONS

Intoxications et surdosages médicamenteux consécutifs à une prise orale.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Troubles de la vigilance ; fausses routes.

## ANTAGONISTE DES BENZODIAZÉPINES

## ■ Flumazénil

ANEXATE					
Injection de 0,2 à 0,3 mg jusqu'au réveil (sans dépasser 2 mg)		6 amp. 0,5 mg/5 mL 6 amp. 1 mg/10 mL	HOP HOP	I I	

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste des benzodiazépines par inhibition compétitive de leurs effets sur le système nerveux central.

## INDICATIONS

L'**ANEXATE** est indiqué pour neutraliser les effets sédatifs exercés par les **benzodiazépines** sur le système nerveux central. En soins intensifs :

- diagnostic et/ou traitement d'un surdosage intentionnel ou accidentel en **benzodiazépines** ;
- diagnostic étiologique d'un coma inexplicable afin de distinguer ce qui revient à une **benzodiazépine** ou à une autre cause (pharmacologique ou neurologique) ;
- annulation spécifique des effets exercés sur le système nerveux central par des doses excessives de **benzodiazépines** (rétablissement de la ventilation spontanée afin d'éviter une intubation ou d'interrompre l'assistance ventilatoire).

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

L'**ANEXATE** peut être administré par perfusion, dilué dans du G5 % ou du NaCl 9 ‰. D'autres mesures de réanimation peuvent être prises parallèlement.

En soins intensifs : la dose initiale IV recommandée est de 0,3 mg ; si le degré de conscience souhaité n'est pas obtenu dans les 60 s, de nouvelles injections d'**ANEXATE** peuvent être pratiquées jusqu'au réveil du patient ou jusqu'à concurrence d'une dose totale de 2 mg.

En cas de récurrence de la somnolence, la perfusion IV de 0,1 à 0,4 mg/h s'est avérée utile. La vitesse de la perfusion doit être réglée individuellement en fonction du degré d'éveil souhaité. Si l'état de conscience du patient et sa fonction respiratoire ne présentent pas une amélioration significative après administration répétée des doses d'**ANEXATE**, il faut admettre

que le tableau clinique n'est pas dû à des **benzodiazépines**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou intolérance connue à ce produit ou aux **benzodiazépines**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La durée d'action du produit étant souvent plus courte que celle des **benzodiazépines**, la surveillance doit être poursuivie jusqu'à l'épuisement prévisible de l'action du **flumazénil** car des réendormissements secondaires peuvent survenir. Chez les sujets à haut risque, il convient de mettre en balance les avantages de la suppression de la dépression liée aux **benzodiazépines** avec les inconvénients d'un réveil rapide. Chez des patients traités de façon chronique par les **benzodiazépines**, l'injection rapide de forte dose de **flumazénil** (plus de 1 mg) peut provoquer l'apparition de symptômes de sevrage et devrait donc être évitée. En cas de manifestation inattendue de symptômes de sevrage, il convient d'injecter lentement en IV une **benzodiazépine**. Chez des patients traités au long cours par les **benzodiazépines** ou présentant un surdosage polymédicamenteux (notamment en **antidépresseurs imipraminiques** associés aux **benzodiazépines**), l'antagonisme par le **flumazénil** de l'effet des **benzodiazépines** peut favoriser l'apparition de troubles neurologiques (convulsions) et de troubles du rythme cardiaque supraventriculaire.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Lors de l'administration en anesthésiologie, il a été fait état, dans de rares cas, de nausées et (ou) vomissements. Il a parfois été fait mention d'anxiété, de palpitations et de peur, surtout après injection rapide d'**ANEXATE**. Habituellement, les effets indésirables mentionnés n'ont pas nécessité de traitement particulier. Même lors d'administration à raison de 100 mg IV, aucun signe de surdosage n'a été observé.

**ANTIDOTE DES ORGANOPHOSPHORÉS**■ **Pralidoxime**

<b>CONTRATHION</b>				
1 <sup>re</sup> administration : 1 ou 2 fl. 2 <sup>e</sup> administration : 1 fl. une 1/2 h après Puis 1 fl. toutes les 4 à 6 h	10 fl. 200 mg		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antidote des produits organophosphorés anticholinestérasiques (poisons du système neurovégétatif agissant indirectement en inactivant par phosphorylation les enzymes régulatrices de la transmission nerveuse).

Faible résorption digestive, faible diffusion au niveau du système nerveux central, métabolisme hépatique, excrétion rénale tubulaire entraînant une élimination rapide (quelques heures) du produit.

**INDICATIONS**

Intoxication par les organophosphorés anticholinestérasiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ce produit n'est pas indiqué dans les intoxications par insecticides carbamates anticholinestérasiques.

Il est d'autant plus efficace qu'il est administré peu de temps après l'intoxication. Il a peu d'effet si le délai entre l'intoxication et le début du traitement est supérieur à 36 h.

**Grossesse** : absence de données. Son indication chez la femme enceinte doit donc se limiter aux intoxications engageant le pronostic vital.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles visuels : diplopie, vision floue.

Malaise, vertiges, céphalées, tachycardie.

À doses très élevées, la **pralidoxime** pourrait aggraver le bloc neuromusculaire dû à l'organophosphoré.

## ANTIDOTE DU CYANURE

## ■ Hydroxocobalamine

CYANOKIT					
A. > 18 ans : 5 g/administration Dose max. : 10 g/j < 18 ans : 0,07 g/kg/administration Dose max. : 0,14 g/kg/j	1 fl. pdre pour sol. perf. 5 g		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Chélateur des ions cyanures pour former la cyanocobalamine excrétée dans les urines.

**INDICATIONS**

Traitement des intoxications confirmées ou suspectées au cyanure dans toutes les tranches d'âge.

**MODE D'ADMINISTRATION**

Utiliser le matériel stérile fourni.  
La solution doit être reconstituée avec 200 mL de solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 %.

**CONTRE-INDICATIONS**

Relative : hypersensibilité au principe actif.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Coloration rouge foncé réversible des urines au cours des 3 j suivant l'administration, pouvant persister jusqu'à 35 j.

Coloration rouge réversible de la peau et des muqueuses pouvant persister jusqu'à 15 j après administration.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments.

## ANTAGONISTE DES OPIACÉS

## ■ Naloxone

NARCAN				
IV bolus, IV perfusion dans NaCl 0,9 % ou G5 %	10 amp. 1 mL 0,4 mg/mL		I	NR
IM ou SC si voie IV impossible				

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste pur et spécifique des morphinomimétiques sans effet agoniste.

Lorsque la **naloxone** est injectée à des sujets ayant reçu des morphinomimétiques, elle antagonise leurs effets (dépression respiratoire, myosis, analgésie). Son action dépend de la dose, de la puissance du morphinomimétique à antagoniser et de l'intervalle séparant les injections des deux produits.

## INDICATIONS

La **naloxone** est indiquée en traitement de l'intoxication aux opiacés ou de la dépression respiratoire secondaire aux opiacés après intervention chirurgicale.

Elle peut également être utilisée à des fins diagnostiques : diagnostic différentiel des comas toxiques et confirmation de non dépendance aux opiacés chez les toxicomanes.

## POSOLOGIE

## Intoxication aux opiacés :

- posologie initiale : 0,4 à 2 mg ;
- posologie d'entretien :
  - en bolus : 0,1 mg/administration,
  - en perfusion : 2 mg/administration.

Les posologies et la durée de traitement sont à adapter en fonction du contexte clinique.

**Dépression respiratoire post-intervention :** 1 à 2 µg/kg/administration à renouveler si besoin.

**Diagnostic des comas toxiques :** 3 administrations de 0,4 mg, espacées chacune de 5 min.

**Diagnostic de non-dépendance :** administration de 0,2 mg.

En cas de non-réponse, la posologie peut être augmentée jusqu'à 1,6 mg.

## CONTRE-INDICATIONS

Enfants de moins de 3 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez les sujets en état de dépendance aux opiacés, la levée brutale et complète des effets

morphiniques peut provoquer un syndrome de sevrage. La **naloxone** sera donc administrée à des doses progressives.

La **naloxone** doit également être administrée avec prudence chez les malades atteints d'affections cardiovasculaires graves : risque d'hypertension artérielle et de tachycardie.

La **naloxone** ayant une durée d'action assez courte (30 min en moyenne par voie IV), le patient doit faire l'objet d'une surveillance générale attentive jusqu'à ce que tout risque de remorphinisation ait été écarté. Cette surveillance est également nécessaire en raison de la survenue éventuelle de dépression respiratoire secondaire dans le cas où le morphinomimétique a une durée d'action supérieure à celle de la **naloxone**. Dans ce cas, l'utilisation de la perfusion permet de prolonger l'action de la **naloxone**.

Les meilleurs critères de surveillance sont la fréquence respiratoire, la ventilation/minute appréciée par la spirométrie, la PCO<sub>2</sub> et le diamètre pupillaire : ce dernier, en particulier, est un bon témoin clinique de l'action de la **naloxone**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Des frissons, une hyperventilation, des vomissements, (une agitation, une anxiété) ont été quelquefois signalés : ils correspondent à l'utilisation de doses trop fortes de **naloxone** chez les sujets ayant reçu des morphinomimétiques. Exceptionnellement, des troubles cardiovasculaires peuvent être observés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Lorsque la réponse clinique est en faveur d'une intoxication par les morphinomimétiques, ne pas oublier la possibilité de prise conjointe d'autres médicaments ou toxiques (alcool, **benzodiazépines**, **barbituriques**) qui peuvent majorer le risque de dépression respiratoire.

## MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (1)

### Liste des 31 maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire (2012)

Maladie	Cas à signaler sans délai par téléphone ou télécopie	Cas à notifier par fiche*
Botulisme	Probables et confirmés	Probables et confirmés
Brucellose	Probables et confirmés	Probables et confirmés
Charbon	Suspects, probables et confirmés	Probables et confirmés
Chikungunya importé ou autochtone	Suspects et confirmés, en particulier dans les Alpes-Maritimes et en Haute-Corse	Confirmés
Choléra	Suspects et confirmés	Confirmés
Dengue importée ou autochtone	Suspects et confirmés, en particulier dans les Alpes-Maritimes et en Haute-Corse	Confirmés
Diphthérie	Suspects, confirmés et tout isolement de souche toxinogène	Confirmés et tout isolement de souche toxinogène
Fièvres hémorragiques africaines	Suspects, probables et confirmés	Probables et confirmés
Fièvre jaune	Suspects et confirmés	Confirmés
Fièvre typhoïde et paratyphoïde	Confirmés	Confirmés
Hépatite A aiguë	Confirmés	Confirmés
Hépatite B aiguë symptomatique	Aucun	Confirmés
Infection à VIH et sida quel que soit le stade	Aucun	Confirmés
Infection invasive à méningocoques	Probables et confirmés	Confirmés
Légionellose	Probables et confirmés	Probables et confirmés

\* Les fiches VIH et hépatite B sont à retirer à la Ddass (feuillets autocopiants non téléchargeables). Les autres peuvent être téléchargés sur le site de l'Institut de veille sanitaire ([www.invs.sante.fr](http://www.invs.sante.fr)).  
Suspects : à signaler sur la base d'une présomption clinique sans attendre la confirmation



## MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (2)

### Liste des 31 maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire (2012) - suite

Maladie	Cas à signaler sans délai par téléphone ou télécopie	Cas à notifier par fiche*
Listériose	Confirmés	Confirmés
Mésothéliome	Aucun	Cliniques ou confirmés
Orthopoxviroses dont la variole	Suspects et confirmés	Confirmés
Paludisme autochtone	Confirmés	Confirmés
Paludisme d'importation dans les DOM	Confirmés	Confirmés
Peste	Suspects et confirmés	Confirmés
Poliomyélite	Suspects, confirmés et tout isolement de poliovirus au laboratoire	Confirmés et tout isolement de poliovirus sauvage ou dérivé d'une souche vaccinale
Rage	Suspects et confirmés	Confirmés
Rougeole	Cliniques ou confirmés	Cliniques et confirmés
Saturnisme de l'enfant mineur	Suspects	Confirmés
Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et autres encéphalites spongiformes transmissibles (ESST)	Suspects de MCJ ou autre ESST	Suspects de MCJ ou autre ESST
Tétanos	Aucun	Confirmés
Toxi-infection alimentaire collective	Tout foyer	Tout foyer quels que soient les résultats des enquêtes épidémiologiques et environnementales (y compris en l'absence de résultats)
Tuberculose	Probables et confirmés	Probables et confirmés
Tularémie	Suspects, probables et confirmés	Probables et confirmés
Typhus exanthématique	Suspects et confirmés	Confirmés

\* Les fiches VIH et hépatite B sont à retirer à la Ddass (feuillets autocopiants non téléchargeables). Les autres peuvent être téléchargés sur le site de l'Institut de veille sanitaire ([www.invs.sante.fr](http://www.invs.sante.fr)).  
Suspects : à signaler sur la base d'une présomption clinique sans attendre la confirmation

## AMIBIASE

L'amibiase est une protozoose digestive, transmise par voie fécale-orale, très fréquente dans les pays pauvres (50 millions de cas/an). Elle est due à *Entamoeba histolytica*, qui existe sous une forme kyste résistante dans un environnement extérieur humide et sous une forme végétative invasive (trophozoïte hématophage).

La maladie se rencontre plus fréquemment chez les immigrés, les voyageurs, les immunodéprimés et les homosexuels masculins.

Le diagnostic repose sur l'identification du parasite dans les selles. Des techniques immunologiques peuvent le différencier d'*Entamoeba dispar* (morphologiquement identique mais non pathogène). La sérologie est utile dans les formes tissulaires (prévalence de 15 à 30 % dans les pays endémiques).

### Prophylaxie

#### Prophylaxie individuelle

- Éviter les aliments crus, les coquillages, le lait non pasteurisé, les glaces et les glaçons.
- Lavage des fruits et légumes (15 min dans de l'eau vinaigrée).
- Traitement de l'eau par ébullition, décontamination (**MICROPUR**, **AQUATABS**) ou filtrage (filtres *Katadyn*).
- Nettoyage systématique des mains avant les repas et après le passage aux toilettes.

#### Prophylaxie collective

Elle repose sur le dépistage de l'entourage, l'assainissement du milieu (eau, déchets), le contrôle de l'hygiène alimentaire (personnel manipulant les aliments) et la lutte contre les mouches.

### Amibiase aiguë intestinale ou dysenterie amibienne

Administration d'un amœbicide tissulaire, par exemple **métronidazole (FLAGYL)** :

500 mg x 3/j pendant 7 à 14 j *per os* ou par voie IV en cas d'intolérance digestive (30-50 mg/kg/j chez l'enfant).

Il doit être suivi d'une ou plusieurs cures d'amœbicide de contact pour prévenir le portage chronique : **tibroquinol (INTÉTRIX)** : 2 gél. x 3/j pendant 10 j. Contrôle parasitologique des selles.

### Amibiase hépatique ou abcès amibien du foie

- C'est un abcès du foie d'évolution subaiguë.
- 90 % des malades sont des hommes jeunes.
- Une diarrhée est présente dans moins de 1 cas sur 3.
- Le parasite n'est retrouvé dans les selles que dans 20 % des cas ; le diagnostic repose sur la sérologie dont le résultat peut être obtenu en une demi-journée en cas d'urgence.
- Le traitement médical est le plus souvent suffisant.

#### Traitement

Amœbicides tissulaires, par exemple **métronidazole (FLAGYL)** : 500 mg x 3/j pendant 10 à 15 j *per os* ou par voie IV en cas d'intolérance digestive suivi d'un traitement par amœbicide tissulaire pour prévenir le portage chronique : **tibroquinol (INTÉTRIX)** : 2 gél. x 3/j pendant 10 j. Contrôle parasitologique des selles.

#### Évolution

La régression des signes cliniques en 72 h confirme le diagnostic.

Les images échographiques et tomographiques mettent plusieurs mois pour disparaître. La sérologie se négative entre 3 et 12 mois.

Le traitement chirurgical ou le drainage de l'abcès amibien, sous contrôle échographique, est réservé aux échecs médicamenteux et aux exceptionnels cas où la rupture semble imminente (plèvre, bronches, péricarde, péritoine).

## BILHARZIOSE

Cinq espèces de schistosomes (classe des Trématodes) infestent plus de 200 millions de personnes dans le monde.

Leur répartition mondiale est celle de l'hôte intermédiaire : un escargot aquatique vivant dans les marigots.

On distingue : (1) *Schistosoma mansoni*, *S. japonicum*, *S. mekongi* qui entraînent une bilharziose intestinale et hépatique, (2) *S. haematobium* qui entraîne une bilharziose urinaire, et (3) *S. intercalatum*, habituellement peu symptomatique, qui peut être responsable de douleurs abdominales et de diarrhées sanglantes.

### Cycle

L'homme est le seul hôte définitif des schistosomes. Les vers adultes qui vivent dans les systèmes veineux de l'intestin ou de la vessie pondent des œufs qui sont libérés dans les excréments de l'hôte. Dans l'eau, ils se déplacent jusqu'à leur hôte intermédiaire. Après une reproduction asexuée, des milliers de cercaires sont libérés. Ces formes mobiles infestantes traversent la peau humaine et gagnent la circulation sanguine après une phase migratrice à travers le poumon et le foie (phase aiguë allergique). Les complications tardives résultent de la présence d'œufs dans certains organes (foie, poumons, système nerveux central, etc.).

### Épidémiologie

*S. mansoni* : Arabie, Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes.

*S. japonicum* : Japon, Chine, Philippines, Indonésie.

*S. mekongi* : Asie du Sud-Est, le long du Mekong.

*S. haematobium* : Afrique, Arabie, Syrie, Irak.

*S. intercalatum* : Afrique centrale et de l'Ouest.

### Diagnostic

- Interrogatoire +.
- Éosinophilie sanguine.
- Sérologie spécifique.
- Recherche des œufs dans les selles ou par biopsies rectales dans les schistosomiasis intestinales, dans les urines (collectées après un effort et de préférence entre midi et 2 h) ou par biopsies vésicales ou rectales dans la schistosomiasis urinaire.

### Traitement

**Curatif** : praziquantel (**BILTRICIDE**). Dans les formes aiguës immuno-allergiques, discuter l'adjonction de **corticoïdes** et un 2<sup>e</sup> traitement à quelques semaines d'intervalle.

**Préventif** : ne pas se baigner dans les marigots dans les pays endémiques (préviendrait aussi la leptospirose et les hépatites).

### Manifestations cliniques des schistosomiasis

DÉLAI	PHASE	<i>S. MANSONI</i> , <i>S. JAPONICUM</i>	<i>S. HAEMATOBIMUM</i>
1-4 mois	Aiguë allergique	Fièvre, sueurs, frissons, diarrhées, céphalées, toux, hépatosplénomégalie, adénopathies, éosinophilie	Pas de signe allergique, hématospermie, forme pulmonaire (lac Malawi)
Indéfini	Chronique	Diarrhées, douleurs abdominales, ulcérations digestives, anémie	Hématurie, dysurie, protéinurie
> 5 ans après l'infestation	Complications	Hépatosplénomégalie, hypertension portale, varices œsophagiennes, hypertension artérielle pulmonaire, épilepsie, décompensation de l'hypertension portale	Hydronéphrose, infections urinaires, insuffisance rénale chronique, polypes et cancer de vessie

## BRUCELLOSE (1)

Zoonose due à un bacille gram-négatif : *Brucella* dont l'espèce *melitensis* est la plus fréquemment rencontrée chez l'Homme. Répartition mondiale avec une prédilection pour le bassin méditerranéen (fièvre de Malte), la péninsule arabique, le sous-continent indien et une partie du Mexique et de l'Amérique centrale et du Sud. L'incidence est en diminution en France avec 20 cas en 2010 dont 90 % importés et 10 % de contamination au laboratoire.

### Contamination

- Transmission humaine par contact avec des animaux contaminés (bétail) ou leurs produits : ingestion de lait non pasteurisé, inhalation dans les abattoirs ou inoculation à travers des lésions cutanées. La transmission interhumaine est exceptionnelle.
- Incubation de 2-3 sem.

### Diagnostic

- Isolement de *Brucella* à partir du sang ou d'une ponction (abcès, articulation).
- Synthèse précoce d'IgM puis des IgG au bout de 7-14 j (sérologie de Wright et Rose Bengale peu spécifiques).

### Manifestations cliniques

- Phase aiguë symptomatique dans la moitié des cas et insidieuse dans l'autre moitié (favorise le passage à la chronicité).
- **Signes généraux** non spécifiques avec

une fièvre ondulante assez caractéristique, sueurs malodorantes.

- **Examen clinique** peu contributif : adénopathies, hépatomégalie et/ou splénomégalie dans 20-30 % des cas.

### Complications viscérales

- **Digestives** (70 %) : anorexie, amaigrissement, douleurs abdominales, diarrhée, constipation, hépatite granulomateuse.
- **Ostéo-articulaires** (20-60 %) : arthrite, ostéomyélite, spondylite.
- **Neurologiques** : méningite (chronique), neuropathie périphérique, encéphalite, troubles psychiatriques.
- **Pulmonaires** après inhalation (25 %) : bronchite, pneumopathie, nodule pulmonaire, abcès, adénopathie, pleurésie.
- **Cardiaques** (< 2 %) : endocardite (parfois mortelle), myocardite, péricardite.
- **Localisations diverses** : génito-urinaire, hématologique, cutanée (5 %).

### Manifestations biologiques

- Anémie, leucopénie et thrombopénie fréquentes, vitesse de sédimentation normale ou accélérée.
- Hémocultures positives dans 15-70 % des cas (à conserver  $\geq 30$  j, prévenir le laboratoire de microbiologie), myélocultures, PCR en cours d'évaluation.
- Sérologie de Wright  $\geq 1/160$  en IgG (faux positifs avec *Yersinia*, *Francisella*, *Salmonella* et *Coxiella*).

## BRUCELLOSE (2)

### Traitement

- Maladie professionnelle, déclaration obligatoire.
- Enquête alimentaire.
- **Prophylaxie** : ne pas consommer de produits laitiers non pasteurisés dans les zones endémiques, contrôle vétérinaire (dépistage, vaccination, abattage des animaux malades).

### Traitement de la brucellose

Brucellose non compliquée (6 sem.)	<b>Doxycycline</b> 100 mg x 2/j + <b>rifampicine</b> 15 mg/kg/j
Enfants d'âge < 8 ans (3 sem.)	<b>Cotrimoxazole</b> + <b>gentamicine</b> 5 mg/kg/j pendant 5 j
Enfants d'âge > 8 ans (3 sem.)	<b>Doxycycline</b> 5 mg/kg/j + <b>gentamicine</b> 5 mg/kg/j pendant 5 j
Femmes enceintes et contre-indication aux <b>tétracyclines</b>	<b>Cotrimoxazole</b> seul ou associé à <b>rifampicine</b> ou <b>gentamicine</b>
Neurobrucellose (6-8 sem.)	<b>Doxycycline</b> 100 mg x 2/j <b>rifampicine</b> 15 mg/kg/j ± <b>cotrimoxazole</b> ± corticothérapie
Endocardite/arthritis/phase septique (6 sem.)	<b>Doxycycline</b> + <b>gentamicine</b> 5 mg/kg/j pendant 5 j puis <b>rifampicine</b>

## CANDIDOSES INVASIVES (1)

Ce sont des infections septicémiques ou viscérales à *Candida*, habituellement iatrogènes (cathéter) et associées aux soins (0,2 à 0,38 pour 1 000 hospitalisations en Europe). Elles sont augmentées ces dernières années car elles surviennent principalement chez des immunodéprimés (neutropénie, leucémies, greffes d'organe ou de moelle) ou des malades de réanimation (50 % des cas rapportés). Si *Candida albicans* est l'espèce majoritaire, d'autres espèces sont de plus en plus fréquemment rencontrées, qui peuvent avoir une sensibilité diminuée voire une résistance au **fluconazole**. La mortalité globale est évaluée entre 36 % et 63 %. Il faut traiter toute hémoculture qui pousse à *Candida*.

### Candidoses invasives [1]

La dissémination est hémotogène, tous les organes peuvent être infectés. Les localisations oculaires ou cutanées peuvent révéler le diagnostic devant une fièvre ou un choc septique inexpliqué.

### Diagnostic

Le diagnostic est fait du vivant du malade dans seulement 15-40 % des cas.

Les hémocultures sont négatives dans 50 % des candidoses généralisées. Toute hémoculture positive doit être traitée.

Les tests immunologiques *Candida* sont en cours d'évaluation (antigène, anticorps,  $\beta$ -D-glucane).

La présence de *Candida* dans les selles, les urines, les crachats, un lavage broncho-alvéolaire ou sur la peau peut correspondre à une colonisation ou une infection.

### Traitement

Les cathéters doivent être retirés et mis en culture, les hémocultures périphériques sont poursuivies jusqu'à négativation.

Un fond d'œil est réalisé de façon systématique et des localisations secondaires doivent être recherchées (peau, os, etc.).

Un traitement est préconisé dans la mesure où :

- il est impossible de déterminer les malades qui guérissent uniquement après le retrait du cathéter ;

- la mortalité après candidémie est élevée ;

- les traitements par **fluconazole** ou **échinocandines** sont efficaces et bien tolérés.

Un traitement empirique est démarré chez les malades à risque (neutropéniques, réanimation, etc.) qui restent fébriles après 3 à 5 j d'antibiothérapie probabiliste à large spectre, ou qui redeviennent fébriles sous antibiothérapie après une période d'apyrexie. On assiste à une émergence hospitalière de *Candida* (*krusei*, *glabrata*) de sensibilité diminuée ou même résistantes au **fluconazole**.

Chez le neutropénique, et le non-neutropénique ayant été exposé au **fluconazole** ou ayant des signes de gravité, le traitement de référence est une **échinocandine**. L'**amphotéricine B liposomale** est réservée en 2<sup>e</sup> intention. Attention à la mauvaise diffusion des **échinocandines** dans l'œil en cas de localisation secondaire. Chez le non-neutropénique sans signe de gravité et naïf de traitement antifongique, du **fluconazole** peut être prescrit en 1<sup>re</sup> intention. Dans tous les cas, on ajustera le traitement aux résultats des tests de sensibilité *in vitro*.

## ANTIFONGIQUES (1) – AMPHOTÉRICINE B (1)

## ■ Amphotéricine B

<b>FUNGIZONE</b>					
<b>FUNGIZONE orale</b> En 2 à 3 prises orales en dehors des repas A. : 1,5 à 2 g/j E. et N. : 50 mg/kg/j (1 càc/10 kg/j) <b>FUNGIZONE injectable</b> En 1 perf. lente/j de 6 à 10 h 0,7 à 1 mg/kg/j à doses progressives	1 fl. 40 mL + pip (enf. et nour.)	5,65	I	65 %	5,65
	8 mL (fl.)	5,65	I	65 %	0,71
	1 fl. 50 mg (à diluer dans du glucosé 5 %)	HOP	I		

**CANDIDOSES INVASIVES (2)****Endocardite candidosique**

En augmentation avec le nombre de septicémies à *Candida*, elle est favorisée par :

- des lésions valvulaires préexistantes ;
- une toxicomanie intraveineuse ;
- une chimiothérapie ;
- une valve prothétique ;
- l'utilisation prolongée de cathéters intraveineux ;
- un antécédent d'endocardite bactérienne.

Elle survient dans plus de 50 % des cas après une chirurgie cardiaque.

Les hémocultures sont régulièrement positives. Le péricarde et le myocarde peuvent être également infectés.

**Traitement** : **amphotéricine B** ( $\pm$  **flucytosine**) poursuivie 6 à 10 sem. et **chirurgie** très précoce.

**Candidose ophtalmique**

Voie hémato-gène ou inoculation.

Peut toucher toutes les structures oculaires.

Clinique : douleur, scotome, vision floue.

À rechercher attentivement chez les malades de réanimation.

**Traitement** : **amphotéricine B** avec vitrectomie en cas d'abcès du vitré ( $\pm$  **flucytosine**).

**Candidose urinaire**

Favorisée par les gestes sur les voies urinaires, sondage, antibiothérapie et âge avancé.

Le plus souvent, candidurie sans symptôme ne justifiant pas de traitement mais pouvant aussi refléter une candidémie.

**Traitement** :

- candidurie sans symptômes : pas de traitement ;
- candidurie avec symptômes : retrait ou changement de la sonde et **fluconazole** *per os* ou IV ou **amphotéricine B** IV.

**CONSENSUS**

[1] Antifungal Therapy in Leukemia Patients, ECIL 4 (4th European Conference on Infections in Leukemia), 2011



**ANTIFONGIQUES (2) – AMPHOTÉRICINE B (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Antifongique** lipophile qui active les canaux potassiques à faibles concentrations et crée, à plus fortes concentrations, des pores dans la membrane cytoplasmique des champignons.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Par les méthodes actuelles, les dosages d'**amphotéricine B** ne sont pas corrélés aux résultats cliniques.

Usage *per os* (pas d'absorption digestive), en topique (cutané ou préparation magistrale), ou par voie intraveineuse. Concentrations sériques proportionnelles aux doses administrées, inchangées au cours de l'insuffisance rénale ou hépatique en raison d'une métabolisation *in situ* (> 80 %). Bonne diffusion dans les liquides inflammatoires (plèvre, péritoine, synoviale, humeur aqueuse, vitré) avec des concentrations au 2/3 de la concentration sérique résiduelle. Faible diffusion dans les méninges (2-4 %). Élimination urinaire et biliaire.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Paracoccidioides brasiliensis*.

Espèces inconstamment sensibles : *C. lusitanae*, *C. glabrata*, *Aspergillus* sp., *Fusarium* sp., *Trichosporon beigelii*, *Actinomyces* sp., *Pseudolallescheria boydii*, mucorales.

Résistances acquises : exceptionnelles.

**INDICATIONS**

- Infections invasives à *Candida*.
- Aspergillose.

- Cryptococcose.
- Coccidioidomycose, blastomycose, histoplasmosse.
- Aspergillose.
- Mucormycose.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Allergie connue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- 10-30 mL/min : 0,5 mg/kg/j ;
- < 10 mL/min et dialyse : 0,5 mg/kg/48 h.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents : céphalées, frissons, fièvre, hypotension, toxicité veineuse.

Rares : tachypnée, choc anaphylactique, collapsus cardiovasculaire.

Troubles généraux : malaise, douleurs des muscles et articulations.

Troubles digestifs : anorexie, dyspepsie, vomissements, nausées, douleurs épigastriques.

Troubles neurologiques : vertiges, convulsions, paresthésies.

Troubles rénaux et métaboliques : toxicité rénale (80 %), hypokaliémie, hyperuricémie, protéinurie, hématurie, hyponatrémie, hypomagnésémie.

Troubles biologiques : anémie normochrome, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie, augmentation des enzymes hépatiques, de la bilirubine, des phosphatases alcalines.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Médicaments néphrotoxiques.  
Hypokaliémiantes.

**Précautions d'emploi de la FUNGIZONE injectable**

- Diluer l'**amphotéricine B** dans 500 à 1 000 mL de sérum glucosé 5 % (concentration de 0,1 mg/mL).
- Administrer une dose test de 1 mg en 1 h pour apprécier la tolérance clinique puis perfuser le reste de la dose en 4 à 10 h en fonction de la tolérance.
- En cas de fièvre ou frissons, ralentir le débit et injecter 25 mg d'**hémisuccinate d'hydrocortisone** en IV lente à répéter 1/2 h avant chaque perfusion.
- Hydratation par au moins 1 L de sérum physiologique avec potassium et magnésium.
- La toxicité veineuse de l'**amphotéricine B** nécessite souvent un abord veineux central.
- Surveillance : créatinine, ionogramme sanguin, calcémie, phosphorémie, hémogramme 2 à 3 fois/sem. au début puis une fois par semaine en traitement d'entretien.

## CANDIDOSES INVASIVES (3)

## Récapitulatif du traitement

DIAGNOSTIC	TRAITEMENT	PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Candidémie ou candidose invasive chez les adultes neutropéniques	<b>Échinocandine</b> (par exemple) : <b>CANCIDAS</b> IV 70 mg à J1 puis 50 mg/j ou <b>amphotéricine B liposomale</b> <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j	Retrait des cathéters, fond d'œil et recherche de localisations secondaires. Pendant 14 j après guérison clinique et microbiologique et la fin de la neutropénie. Ajuster le traitement aux résultats des tests in vitro. Surveillance les complications des médicaments. Pour l' <b>amphotéricine B</b> : créatinine et kaliémie, perfusion lente $\geq 4$ h.
Candidémie chez les adultes non neutropéniques*	<b>Fluconazole</b> 12 mg/kg/j IV ou <i>per os</i> puis 6 mg/kg/j (sauf exposition préalable aux azolés, colonisation avec souche résistante) Alternatives : <b>Échinocandine</b> : <b>Caspofungine</b> IV 70 mg J1 puis 50 mg/j ou <b>amphotéricine B liposomale</b> <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j	
Endocardite	<b>CANCIDAS</b> IV 70 mg à J1 puis 50 mg/j ou <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j + <b>ANCOTIL</b> 100-150 mg/kg/j <i>per os</i> en 4 prises Chirurgie précoce	
Candidose ophtalmique	<b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j ou <b>fluconazole</b> 12 mg/kg/j IV ou <i>per os</i> + <b>ANCOTIL</b> 100-150 mg/kg/j <i>per os</i> en 4 prises ± vitrectomie	6-12 sem. après la chirurgie

\* Sauf allogreffés de moelle osseuse où **AMBISOME** ou **CANCIDAS** doivent être envisagés

## ANTIFONGIQUES (3) – AMPHOTÉRICINE B LIPOSOMALE

### ■ Amphotéricine B liposomale

AMBISOME					
<b>Mycoses systémiques :</b> A. et E. : 3 à 5 mg/kg/j en 1 perf. quotidienne de 30 à 60 min <b>Leishmanioses viscérales :</b> dose cumulative de 18 à 24 mg/kg à administrer en 6 inj. (1 inj./j pendant 5 j puis une 6 <sup>e</sup> inj. au 10 <sup>e</sup> j) Peu de données chez les immunodéprimés	10 fl. 50 mg	HOP	I		
ABELCET					
Idem <b>AMBISOME</b>	10 fl. 20 mL (5 mg/mL)	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

**Amphotéricine B** insérée dans la membrane de liposomes d'un diamètre < 100 nm permettant une diffusion tissulaire plus élevée et une moindre toxicité rénale que l'**amphotéricine B** libre.

#### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : *Candida albicans*, *Rhodotorula*, *Aspergillus fumigatus*, *Cryptococcus neoformans*, mucormycoses, *Histoplasma capsulatum*, *Blastomyces dermatidis*, *Sporothrix shenkii*, *Coccidioides immitis*.

Espèces inconstamment sensibles : *Candida parapsilosis*, *Conidiobolus*, sporotrichose lymphocutanée, coccidioïdomycose pulmonaire diffuse.

#### INDICATIONS

Mycoses systémiques et/ou profondes à *Aspergillus* ou *Candida* en cas d'insuffisance rénale préexistante ou secondaire à l'administration d'**amphotéricine B** libre : créatinémie  $\geq 220$  mmol/L ou clairance de la créatinine  $\geq 25$  mL/min.

Leishmanioses viscérales.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allergie connue à l'**amphotéricine B**.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets secondaires rapportés avec l'**amphotéricine B** libre peuvent survenir avec **AMBISOME**.

#### MODE D'ADMINISTRATION

Reconstituer le médicament dans du glucosé à 5 % de façon à obtenir une concentration finale à administrer comprise entre 0,2 et 2 mg/mL.

Une dose-test initiale de 1 mg/kg doit être injectée en 15 min. En l'absence de toxicité, administrer le reste de la perfusion en 30 à 60 min. Ralentir le débit de perfusion en cas de gêne.

En cas de réactions aiguës, se référer aux précautions d'emploi de l'**amphotéricine B** non liposomale.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Enfant : doses par kg de poids corporel identiques à l'adulte.

Insuffisant rénal : en cas d'aggravation de la fonction rénale, il est proposé d'abaisser les doses à 1,5 mg/kg/j de manière transitoire ou d'espacer les perfusions.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Risque de torsades de pointes : **terfénadine**, **vincamine**, **astémizole**, **érythromycine IV**, **halofantrine**, **pentamidine**, **sultopride**, **amiodarone**, **disopyramide**, **quinidiniques**, **sotalol**.

**Digitaliques** : toxicité augmentée en cas d'hypokaliémie.

**Hypokaliémisants** : l'hypokaliémie augmente le risque de torsades de pointes.

**Zidovudine** : augmentation de la toxicité hématologique.

**Ciclosporine**, **tacrolimus** : augmentation de la toxicité rénale.

## CANDIDOSES INVASIVES (4)

Sensibilité habituelle des espèces de *Candida* aux antifongiques\*

Espèces de <i>Candida</i>	Fluconazole	Echino-candines	Itraconazole	Voriconazole	Amphotéricine B
<i>C. albicans</i>	S à R**	S	S	S	S
<i>C. tropicalis</i>	S	S	S	S	S
<i>C. parapsilosis</i>	S	S à R	S	S	S
<i>C. glabrata</i>	S-DD à R	S	S-DD à R	S	S à I
<i>C. krusei</i>	R	S	S-DD à R	S	S à I
<i>C. lusitanae</i>	S	S	S	S	Variable

\* D'après Guidelines for Treatment of Candidiasis. Clin Infect Dis 2004 ; 38 :161-89.

\*\* S : sensible, I : intermédiaire, R : résistant, S-DD : sensibilité dépendante de la dose, risque d'échec si dose non maximale (**fluconazole** 12 mg/kg/j et **itraconazole** avec concentrations plasmatiques  $\geq 0,5$  mg/L).

## COQUELUCHE

La coqueluche est une toxi-infection bactérienne endémo-épidémique due à *Bordetella pertussis*. Elle est présente dans le monde entier et occasionne 300 000 morts, en particulier chez les nourrissons. En raison d'une recrudescence récente en France, le calendrier vaccinal a été modifié avec des injections de rappel chez l'adolescent et l'adulte. Il n'y a ni réservoir animal, ni portage asymptomatique connu en dehors des épidémies. La transmission se fait directement par les sécrétions respiratoires des malades. L'immunité vaccinale disparaît au bout de 10 ans et des formes atypiques de l'adulte constituent une source majeure de transmission. Le diagnostic devrait être évoqué devant une toux chronique de l'adulte.

### Clinique

- **Incubation** : 7-15 j.
- **Phase invasive** (7-15 j) : trachéo-bronchite banale accompagnée d'une toux spasmodique prédominant la nuit et parfois émetisante. La contagiosité dure 3 sem. après le début des signes en l'absence de traitement antibiotique.
- **Phase des quintes** : quintes de toux, reprise inspiratoire bruyante (cri du coq) et parfois cyanose, se terminant par une expectoration muqueuse épaisse, voire un vomissement. Peu fréquentes chez les nourrissons et rares chez les adultes. L'examen clinique et les examens complémentaires sont normaux.
- **Phase de déclin** (4<sup>e</sup> semaine) : avec une guérison entre la 6<sup>e</sup> et la 8<sup>e</sup> semaine.

### Complications

- **Respiratoires** : surinfections bronchiques, pneumopathies (principale cause de décès), atélectasies, augmentation de la pression intrathoracique (hémorragies sous-conjonctivales, épistaxis, pétéchies du visage, pneumothorax, emphysème sous-cutané, hernies et prolapsus rectal).
- **Neurologiques** : rares chez l'adulte : convulsions (3 %), encéphalopathie coquelucheuse (0,9 %), hémorragies cérébrales secondaire aux efforts de toux.

### Diagnostic

- **Lymphocytose** parfois  $> 15\,000/\text{mm}^3$ .  
Pour les enfants hospitalisés : culture et PCR. Pour les autres, PCR jusqu'au 20<sup>e</sup> jour d'évolution puis sérologie (sauf vaccination récente). Seuls les anticorps antitoxine pertussis (TP) sont spécifiques.

### Traitement

#### Curatif et isolement (se référer au BEH n° 7/2005)

- Éviction légale dans les milieux à risque : milieu familial, haltes-garderies, crèches familiales ou collectives, assistantes maternelles, hôpitaux, écoles et collectivités ; pendant 5 j après le début d'une antibiothérapie par un **macrolide** ou par un autre antibiotique efficace.
- Hospitalisation des nourrissons en soins intensifs si besoin : surveillance permanente respiratoire et cardiaque, aspiration bronchique, hydratation et nutrition.
- Antibiotique dirigé contre *B. pertussis* : **clarithromycine** 15 mg/kg/j en 2 prises x 7 j (max. 500 mg x 2/j chez l'enfant, 500 à 1 000 mg/j en 2 prises chez l'adulte), ou **azithromycine** 10 mg/kg J1 puis 5 mg/kg/j J2-J5 (max. 500 mg J1 puis 250 mg/j).
- Antitussifs et sédatifs inefficaces.
- Antibiothérapie en cas de surinfection bactérienne.
- Traitement symptomatique des complications, antibiothérapie en cas de surinfection bactérienne.

### Antibioprophylaxie

Sujets contacts non vaccinés : idem traitement curatif (cf. Curatif et isolement ci-dessus).

### Vaccination

- Recommandée avec une primovaccination à 2 et 4 mois de vie. Rappels avant l'âge de 11 mois, puis à l'âge de 6 ans (avec diphtérie, tétanos, polio : DTCaP), puis entre 11 et 13 ans avec le rappel diphtérie tétanos polio (dTCaP).
- Référence : BEH n° 14-15 (avril 2013).

## GRIPPE (1)

La grippe saisonnière est une infection virale épidémique due aux virus *influenza* (types A et B).

La transmission interhumaine se fait par l'intermédiaire des particules virales aérosolisées par les malades. La durée d'incubation varie de 18 à 72 h en fonction de l'inoculum. Le virus est détectable dans les sécrétions respiratoires dans les 24 h qui précèdent la maladie et disparaît en 5-10 j. Les anticorps apparaissent au bout d'une semaine et persistent plusieurs années. L'immunité acquise contre une souche protège contre l'infection (intérêt d'un vaccin). Cependant, il apparaît régulièrement de nouveaux variants antigéniques qui expliquent la survenue d'épidémies et la nécessité de revacciner chaque année les personnes à risque.

Le virus de la grippe aviaire (virus H5N1), s'il mutait, pourrait être responsable d'épidémies chez l'homme. À l'heure actuelle, le virus se transmet de l'oiseau vers l'homme mais aucun cas de transmission interhumaine n'a été clairement rapporté. Pour plus de renseignements : [www.grippeaviaire.gouv.fr](http://www.grippeaviaire.gouv.fr).

La grippe A est liée au virus H1N1 qui a muté à partir d'un virus d'origine porcine. La transmission est interhumaine et le virus est actuellement responsable d'une épidémie mondiale. L'incubation et les signes cliniques sont superposables à ceux de la grippe saisonnière. L'immunité vis-à-vis de la grippe saisonnière ne protège pas de la grippe A. Pour plus de renseignements :

[www.pandemie-grippale.gouv.fr](http://www.pandemie-grippale.gouv.fr).

### Manifestations cliniques

- Non spécifiques et de début souvent brutal.
- Initialement : fièvre, frissons, sueurs, céphalées, myalgies (extrémités des muscles du dos), douleurs à la mobilisa-

tion des globes oculaires, malaise, anorexie, parfois prostration.

- Puis diminution des signes généraux et augmentation des signes respiratoires : toux avec brûlures rétrosternales, obstruction nasale, rhinorrhée, douleurs pharyngées.
- Toux et malaise peuvent persister plusieurs semaines.

### Complications

- Le risque de complications est plus important chez les sujets de plus de 65 ans, les très jeunes enfants, et les personnes atteintes d'une maladie grave sous-jacente.

- **Pneumopathie virale** : dyspnée, hypoxémie, infiltrats pulmonaires bilatéraux voire syndrome de détresse respiratoire, mortalité élevée y compris chez les adultes jeunes.

- **Pneumopathie bactérienne secondaire** : survenue d'une pneumopathie bactérienne typique (pneumocoque, *Haemophilus*, staphylocoque) pendant la phase grippale ou après une amélioration transitoire (4-14 j), plus fréquente chez les malades âgés ou sur terrain fragilisé (insuffisance pulmonaire ou cardiaque), amélioration sous antibiotiques.

- **Autres** : myosite, myocardite, péricardite, syndrome de choc toxique, myélite, encéphalite, syndrome de Guillain-Barré, syndrome de Reye.

### Diagnostic

- **Sérologique** : diagnostic rétrospectif de valeur essentiellement épidémiologique.

- **Virologique** : isolement du virus et détection d'antigènes viraux dans les sécrétions nasales, pharyngées ou mieux les crachats, onéreux et le plus souvent sans conséquence thérapeutique.

- **Épidémiologique** : la survenue des signes cliniques dans un contexte épidémique correspond à un diagnostic correct dans environ 85 % des cas.

## ANTIVIRAL ANTIGRIPPAL (1)

## ■ Oseltamivir

<b>TAMIFLU</b>					
Traitement curatif :	10 gél. 30 mg	12,40	I	30 %	1,24
A. et E. > 40 kg : 75 mg x 2/j	10 gél. 45 mg	18,34	I	30 %	1,83
E. ≤ 15 kg : 30 mg x 2/j	10 gél. 75 mg	24,27	I	30 %	2,43
15-23 kg : 45 mg x 2/j	1 ser. graduée 6 mg/mL	12,40	I	30 %	12,40
24-40 kg : 60 mg x 2/j					
Traitement préventif :					
A. et E. > 13 ans : 75 mg/j					
E. ≤ 15 kg : 30 mg x 1/j					
15-23 kg : 45 mg x 1/j					
24-40 kg : 60 mg x 1/j					
> 40 kg : 75 mg x 1/j					

Les antiviraux sont dans certains cas gratuits pour les cas suspects de grippe A.

## ■ Zanamivir

<b>RELENZA</b>					
2 inhalations orales : 5 mg x 2/j durant 5 j	20 doses de 5 mg + syst. pour inhal.	19,86	I	30 %	0,99

## GRIPPE (2)

### Traitement

#### Symptomatique

- Repos au lit (arrêt de travail).
- Hydratation orale abondante.
- **Antipyrétiques** (aspirine **ASPÉGIC**, paracétamol **DOLIPRANE**). Risque de syndrome de Reye avec l'aspirine chez l'enfant.
- Décongestionnant nasal (**ACTIFED** : 1 cp. x 3/j).
- Pas d'antibiothérapie préventive.

#### Curatif

- Chez les adultes à haut risque de complications : **inhibiteur de la neuraminidase**, **oseltamivir (TAMIFLU)** pendant 5 j. L'**amantadine (MANTADIX)** est déconseillée en raison de ses effets secondaires. De plus, le nouveau virus H1N1 (grippe A) est résistant à l'amantadine.
- L'**inhibiteur de la neuraminidase RELENZA (zanamivir)** réduit la durée des symptômes de 1 à 2,5 j quand il est débuté dans les 48 h. Il n'y a pas d'effet sur les complications de la grippe.

#### Préventif

##### ► Vaccination

- **Grippe A** : la vaccination concerne l'ensemble de la population âgée de plus de 6 mois qui le souhaite.
- **Grippe saisonnière** : la vaccination est indiquée chez les sujets à risque de complications et chez toute personne qui le souhaite :
  - sujets de plus de 65 ans ;
  - sujets en institution ;
  - affection chronique : broncho-pulmonaire, cardiaque, rénale ;
  - enfants et adolescents recevant de l'**aspirine** au long cours (risque de syndrome de Reye) ;
  - femmes enceintes de 2 ou 3 trimestres au moment de l'épidémie ;
  - maladie métabolique, diabète, hémop

globinopathie, immunodéprimé (infection par le VIH) ;

- personnel susceptible de transmettre la grippe à des sujets à risque de complications ;
- sujets au contact de très jeunes enfants ;
- professionnels de santé ;
- personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, et personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs ;
- sujets actifs désirant se prémunir.

##### ► Traitement antiviral

- **Oseltamivir (TAMIFLU)** pendant 10 j (à 6 sem.). Les traitements antigrippaux en préventif sont chers et non remboursés. Ils doivent être réservés à des situations particulières : vaccination tardive chez les sujets à haut risque de complications, contrôle épidémiologique, contre-indication à la vaccination, immunodéprimés, sujets contacts.

##### ► Port de masque en période épidémique

Une personne symptomatique doit porter un masque de type chirurgical. Le masque de protection respiratoire (FFP2) est réservé aux professionnels dont le rôle en situation de pandémie serait capital et qui seraient amenés à être en contact régulier avec des malades.

La transmission du virus se fait principalement par voie aérienne (toux, éternuements), mais également par les mains et objets contaminés :

- se couvrir le nez et la bouche lors des accès de toux et d'éternuements ;
- se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle équipée d'un sac plastique, si possible munie d'un couvercle avec commande au pied ;
- respecter les mesures d'hygiène de base : se laver les mains fréquemment au savon et/ou une solution hydroalcoolique ;
- aérer les lieux de vie.



## HERPÈS (1)

Les virus herpétiques humains HSV-1 et HSV-2 sont responsables d'infections essentiellement cutanéomuqueuses transmises par contact interhumain (oral pour HSV-1 et génital pour HSV-2). Après une primo-infection habituellement asymptomatique, ils persistent à l'état latent dans les racines nerveuses sensibles. Ils peuvent donner des récurrences, parfois très fréquentes et invalidantes, souvent déclenchées par un facteur identifié (le stress, le soleil, la fièvre, les règles, etc.). Un portage asymptomatique est possible et représente une source de contamination non négligeable.

### Primo-infection orale (HSV-1)

- Fréquemment asymptomatique parfois sévère : gingivostomatite ou pharyngite (avant l'âge de 5 ans).
- Incubation de 2-12 j.
- Guérison spontanée en 10-14 j.
- Risque d'auto-inoculation sur d'autres sites.

#### Traitement

- Alimentation liquide ou semi-liquide.
- Bains de bouche antalgiques et antiseptiques et application locale de **XYLOCAÏNE GEL**.
- Général *per os* par **ZOVIRAX** 200 mg x 5/j pendant 10 j.

### Primo-infection génitale (HSV-2)

- Adolescents et adultes jeunes (70-95 %).
- Incubation de 2-7 j.
- Parfois radiculomyélite sacrée avec rétention urinaire, douleurs neurologiques, constipation.
- Les lésions peuvent persister plusieurs semaines avant la guérison complète.

#### Traitement

- Désinfection locale (**SEPTIVON**) et application de **ZOVIRAX crème à 5 %** 5 x/j pendant 5 à 10 j.
- Général, pendant 7-10 j, par **ZELITREX** 500 mg x 2/j ou **ZOVIRAX per os** 200 mg x 5/j ou IV (atteinte neurologique) 5 mg/kg toutes les 8 h jusqu'à guérison clinique.

### Primo-infection oculaire (HSV-1)

- Conjonctivite, kératite, blépharite.
- Évolution favorable en 2-3 sem. si les lésions sont limitées à la conjonctive.

#### Traitement

- Contre-indication des **corticoïdes**.
- Local par **ZOVIRAX crème à 5 %** 5 x/j.

#### Autres sites

- **Anal et périanal** : guérison spontanée en 1 à 3 sem., à traiter comme herpès génital.
- **Panaris** : guérison spontanée en 2 à 3 sem., traitement local voire général, risque de surinfection bactérienne.

## ANTI-HERPÉTIQUES (1)

## ■ Aciclovir

<b>ZOVIRAX</b>					
<b>ZOVIRAX<sup>per os</sup></b> En 5 prises <i>per os</i> A. et E. : 1 000 mg à 4 000 mg  <b>ZOVIRAX <i>pommade</i> OPH</b> En 5 appl./j Appliquer en massant légèrement les lésions  <b>ZOVIRAX <i>crème</i> à 5 %</b> En 5 appl./j Appliquer en massant légèrement les lésions  <b>ZOVIRAX <i>injectable</i></b> En perf. IV toutes les 8 h A. : 30 mg/kg/j	25 cp. 200 mg	15,01	I	65 %	0,60
	35 cp. 800 mg	67,63	I	65 %	1,93
	25 c-mes. 200 mg (susp. buv. 200 mg/5 mL)	26,61	I	65 %	1,06
	18 c-mes. 800 mg (susp. buv. 800 mg/10 mL)	49,55	I	65 %	2,75
	1 tube (4,5 g)	8,62	I	65 %	8,62
	1 tube 2 g		I	NR	
	1 tube 10 g	10,59	I	15 %	10,59
	1 fl. 250 mg		I	NR	
	1 fl. 500 mg		I	NR	
<b>REMEX</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 fl. crème 5 %/2 g			NR	
<b>HERPESDERMYL</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	
<b>ACTIVIR</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	
	1 fl. ppe dose 5 %/2 g			NR	
<b>KENDIX</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	

## ■ Valaciclovir

<b>ZELITREX</b>					
Zona : 1 000 mg x 3/j <i>per os</i> pendant 7 j à débuter dans les 72 h	10 cp. 500 mg	18,15	I	65 %	1,81
	42 cp. 500 mg	68,65	I	65 %	1,63
	112 cp. 500 mg	184,91	I	65 %	1,65

## ■ Famciclovir

<b>ORAVIR</b>					
1 cp. x 3/j pendant 7 j à débuter dans les 72 h	21 cp. 500 mg	107,82	I	65 %	5,13

## HERPÈS (2)

### Récurrences

#### Labiale

- Douleur pendant les premières 24 h.
- Guérison spontanée en 8 à 10 j.
- Discret bénéfice grâce à un traitement local précoce par **ZOVIRAX** crème à 5 % x 5/j.
- Prévention en cas de récurrences fréquentes ou avant exposition à un facteur déclenchant reconnu **ZOVIRAX** 400 mg x 2/j.

#### Génitale

- Effet modeste du traitement des récurrences qui n'est pas recommandé systématiquement chez les immunocompétents.
- Prévention en cas de récurrences fréquentes ( $\geq 6/\text{an}$ ) ou sévères : **ZOVIRAX** 400 mg x 2/j.

#### Oculaire

À traiter comme une primo-infection.

#### Autres

Méningite herpétique, érythème polymorphe ou eczéma herpétique peuvent bénéficier d'un traitement prophylactique.

### Complications herpétiques

#### Encéphalite herpétique (HSV 1)

- Rare mais représente l'une des plus fréquentes encéphalites virales.
- Mortalité spontanée entre 60 et 80 %.
- Traitement intraveineux **en urgence** par **ZOVIRAX** 10 mg/kg toutes les 8 h pendant 14-21 j.

#### Infection généralisée néonatale (HSV 2)

- Prévention par césarienne si récurrences génitales chez la mère.
- Mortalité autour de 85 %.
- À traiter comme une encéphalite herpétique.

## HYDATIDOSE (1)

L'hydatidose est due à l'infestation par un ténia du chien : *Echinococcus granulosus*.

### Épidémiologie

Il y a une répartition mondiale de la maladie avec une prédilection pour les zones d'élevage du mouton : bassin méditerranéen, Nouvelle-Zélande, sud-est de l'Australie, Europe centrale, Amérique du Sud. L'endémie diminue dans les pays qui opèrent un contrôle vétérinaire.

### Cycle parasitaire

Les vers adultes vivent dans l'intestin des canidés domestiques (chiens) ou sauvages (renards, loups) et pondent leurs œufs dans les matières fécales de l'hôte. Certains animaux (moutons, dromadaires, bétail) et accidentellement l'homme peuvent se contaminer en consommant de l'eau ou des végétaux souillés. Les œufs absorbés traversent la paroi intestinale et gagnent un ou plusieurs organes où ils se transforment en larve puis s'enkystent. L'homme peut également s'infecter par contact avec la fourrure des chiens contaminés.

### Physiopathologie

Les kystes peuvent se développer dans la plupart des organes : foie (63-70 %), poumon (15-25 %), cerveau (3 %), reins, rate, muscle, os, etc. Ils sont entourés d'une coque fibreuse et contiennent un liquide sous pression et de nombreux parasites. Plusieurs organes sont envahis dans 20 % des cas. Dans le foie, il grossit de 0,3 cm/an et reste habituellement asymptomatique en dessous de 10 cm de diamètre.

### Manifestations cliniques

- Découverte souvent accidentelle à l'occasion d'une échographie abdominale.
- Peu symptomatique : vagues douleurs de l'hypocondre droit, prurit, crises d'urticaire.
- Complications fréquentes (dans 40-60 % des cas au moment du diagnostic) : compression biliaire (cholestase, angio-

cholite, douleurs biliaires), rupture dans une séreuse (plèvre, péricarde, péritoine) ou dans un organe de voisinage (voies biliaires, poumon, duodénum, côlon, estomac), infection du kyste, compression de structures vasculaires (hépatique, porte, veine cave inférieure).

### Diagnostic

**Radiographie de l'abdomen** : calcifications très évocatrices.

**Échographie hépatique** : nombre et taille des kystes (à partir de 1 cm), hypoéchogénicité, retentissement sur les organes de voisinage, diagnostic de rupture.

**Scanner abdominal** : hypodensités rondes non spécifiques, retentissement sur les organes de voisinage.

**Sérologie** +++ (sensibilité 80-100 %, spécificité 88-96 %).

### Traitement


#### Chirurgical ++

Tous les kystes doivent être retirés en raison du risque d'infection et de rupture, en protégeant soigneusement la cavité péritonéale du risque d'essaimage pendant l'évacuation. Le contenu du kyste est préalablement stérilisé par l'injection de produits scolicides (**chlorhexidine**, eau oxygénée, alcool à 80 %, **cétrimide** à 0,5 %) sauf si le liquide est teinté de bile ou s'il y a une suspicion clinique ou radiologique de communication avec les voies biliaires. Plusieurs équipes ont proposé un drainage des kystes par voie percutanée associé à l'injection de produits scolicides.

#### Médical

L'**albendazole** (**ZENTEL**) permet d'améliorer l'état de 55 à 80 % des malades et d'en guérir 30 % par cures de 400 mg x 2/j pendant 28 j à répéter 1 à 3 fois avec un intervalle de 14 j entre 2 cures. Le traitement médical est recommandé en préopératoire et prescrit systématiquement dans les cas inopérables, dans les ruptures spontanées de kyste, dans les formes multikystiques et dans les 10 j qui précèdent un drainage percutané.

## HYDATIDOSE (2)



D'après *Color atlas and textbook of diagnostic microbiology*  
KONEMAN et al., Lippincott, 5<sup>e</sup> édition 1997.

## INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (1)

### Définition\*

Une infection est dite associée aux soins (IAS) si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative), et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.

Lorsque que l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une IAS.

Les infections du site opératoire surviennent habituellement dans les 30 jours suivant l'intervention voire, s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention.

Il est recommandé d'apprécier dans chaque cas la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection.

### Diagnostic d'infection

- Toute fièvre acquise à l'hôpital n'est pas nécessairement infectieuse et toute infection associée aux soins n'est pas nécessairement iatrogène.
- Rechercher des germes dans les sites possibles : cathéters, urines, poumons, site opératoire, etc.
- Ne pas traiter systématiquement les bactéries isolées si elles ne sont pas responsables d'infection (ex. : colonisation asymptomatique sur sonde urinaire, contamination d'une hémoculture par un staphylocoque coagulase négative).

### Prévention de la transmission croisée

- **Précautions standard** : hygiène des mains, utilisation de solution hydro-alcoolique, lavage des mains, port de gants (en

cas de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine, ou avec les muqueuses ou la peau lésée), tenue professionnelle, port de masque ± lunettes (si risque de projection), désinfection du matériel non jetable (stéthoscope).

En plus des ces mesures universelles, certaines situations justifient l'**isolement des patients en chambre individuelle** et la mise en route de **précautions complémentaires** : signalisation et limitation des visites, port de masque chirurgical ou FFP2, précautions d'hygiène lors des déplacements, élimination de certains déchets par une filière spécifique, utilisation de matériel jetable ou individuel, tenue professionnelle spécifique, regroupement des soins.

- **Précautions contacts** des malades porteurs ou suspects de portage de bactéries multirésistantes (BMR) : staphylocoques méti-R, entérobactéries multirésistantes productrices de bêta-lactamases à spectre étendu, etc.
- **Précautions complémentaires contacts** : entérocoques résistants aux glycopeptides, BMR productrices de carbapénémase, *Clostridium difficile* producteur de toxine, etc.
- **Précautions gouttelettes** : virus respiratoires (VRS, grippe, adénovirus, etc.) ou de bactéries (méningocoques, coqueluche, etc.).
- **Précautions air** : suspicion de tuberculose, grippe aviaire.
- Dépistages systématiques en réanimation (écouvillonnage rectal et cutané) et chez des patients à risque de BMR (récemment hospitalisées dans un pays à haute endémie de BMR)\*\*.
- Collaboration étroite avec le service d'hygiène et de microbiologie.
- Contrôle de la prescription des antibiotiques.

\* SFHH. Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, septembre 2010

\*\* HSCP. Maîtrise de la diffusion des bactéries commensales multirésistantes aux antibiotiques importées en France lors de la prise en charge de patients rapatriés ou ayant des antécédents d'hospitalisation à l'étranger, novembre 2010.

## INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (2)

### Traitement probabiliste

- Initialement à large spectre puis réajusté aux résultats bactériologiques.
- Doit tenir compte du risque de BMR et du site infecté. Augmentation de fréquence des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) à traiter par carbapénèmes. Risque croissant de portage de bactérie productrices de carbapénémase (résistantes aux carbapénèmes) en particulier chez les patients hospitalisés dans des pays à haute endémie\*.
- Déterminer la source de contamination (auto-infection, manuportage, environnement) et éradiquer les réservoirs de BMR.

### Infection urinaire

#### Mesures de prévention

Limiter le nombre de sondages, respect des règles d'hygiène, pose aseptique de la sonde, système de drainage clos (vidange par le bas), toilette soigneuse périnéale.

#### Traitement curatif

##### ► Bactériurie asymptomatique

Ne pas traiter, retirer la sonde et contrôler les urines à 48 h. Traiter si persistance.

##### ► Infection urinaire symptomatique

T > 38 °C, impériosités, pollakiurie, tension suspubienne. Traitement pendant 10 j chez la femme et 21 j chez l'homme. Associer un **aminoside** à la phase initiale.

### Pneumopathie nosocomiale

#### Diagnostic

Opacités parenchymateuses récentes, évolutives et

- identification d'une bactérie dans un prélèvement bactériologique de bonne qualité (lavage alvéolaire, prélèvement distal protégé ou brossage bronchique) ou
- détérioration de la gazométrie, sécrétions bronchiques purulentes chez un malade ventilé, T > 38 °C, hémocultures positives ou
- sérologie microbienne positive.

### Mesures de prévention

Lavage de mains, port de gants, utilisation d'eau stérile, décontamination des réservoirs d'humidification, stérilisation des ventilateurs, prévention de l'inhalation de sécrétions gastriques et oropharyngées, alimentation entérale dès que possible, kinésithérapie respiratoire.

#### Traitement curatif

- Voir tableau en tenant compte de l'écologie du service.

### Infections sur cathéter

- Contamination : culture du cathéter < 10<sup>3</sup> /mL, pas de signe clinique.
- Colonisation : culture du cathéter > 10<sup>3</sup> /mL, pas de signe clinique.
- Infection clinique : culture > 10<sup>3</sup> /mL et signes cliniques locaux ou généraux.
- Bactériémie sur cathéter : culture > 10<sup>3</sup> /mL et bactériémie au même germe.

**Facteurs de risque** : immunodépression, chimiothérapie, manipulation du cathéter, voie fémorale.

**Signes locaux d'infection de cathéter** : orifice purulent, infection du trajet de tunnelisation.

**Signes généraux sur cathéter** : signes de sepsis, hémocultures positives à staphylocoque, candida, bacilles Gram-.

**Traitement curatif** : cf. Tableau.

\* HSCP. Maîtrise de la diffusion des bactéries commensales multirésistantes aux antibiotiques importées en France lors de la prise en charge de patients rapatriés ou ayant des antécédents d'hospitalisation à l'étranger, novembre 2010.

## INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (3)

### Microbes fréquemment responsables d'infections associées aux soins

Infections urinaires	Pneumopathies	Infections sur cathéter
<i>E. coli</i> (résistants aux bêta-lactamines) Entérocoque <i>P. aeruginosa</i> <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i> <i>Candida</i>	Bacilles gram-négatifs (60 %) : <i>Pseudomonas</i> (30 %), <i>Acinetobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i> Staphylocoques Champignons : <i>Candida</i> Pneumocoques et <i>Haemophilus</i> Plurimicrobiennes	Staphylocoques (30 % à 50 %) Bacilles gram-négatifs <i>Candida</i>

### Antibiothérapie empirique des pneumopathies nosocomiales

Pneumopathie précoce (< 1 sem.) Pas d'antibiothérapie	Entérobactéries <i>Haemophilus</i> Streptocoques Staphylocoque méti-S	<b>Amoxicilline - acide clavulanique</b> ou <b>céfotaxime</b> ou <b>ceftriaxone</b> ± <b>aminoside</b>
Pneumopathie précoce (< 1 sem.) Antibiothérapie préalable	Entérobactéries <i>Pseudomonas</i> Streptocoques <i>Haemophilus</i> Staphylocoque	<b>Pipéracilline-tazobactam</b> ou <b>ticarcilline - acide clavulanique</b> + <b>aminoside</b>
Pneumopathie tardive (> 1 sem.) Pas d'antibiothérapie	Entérobactéries Staphylocoque (± méti-R) <i>Pseudomonas</i> , streptocoques	<b>Pipéracilline-tazobactam</b> ou <b>ticarcilline - acide clavulanique</b> + <b>aminoside</b>
Pneumopathie tardive (> 1 sem.) Antibiothérapie préalable	<i>Pseudomonas</i> Entérobactéries résistantes Staphylocoque méti-R <i>Acinetobacter</i> , streptocoques	<b>Ceftazidime</b> ou <b>imipénem</b> + <b>aminoside</b> + <b>vancomycine</b>



## INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (4)

### Antibiothérapie empirique des infections urinaires nosocomiales symptomatiques

Pas de suspicion de bactéries multirésistantes	Entérobactéries	<b>Céfotaxime</b> ou <b>ceftriaxone</b> voire carbapénème en cas de souches productrices de bêta-lactamases à spectre étendu + <b>amikacine</b>
Suspicion de bactéries multirésistantes Manipulation urinaire	Entérobactéries multirésistantes <i>Pseudomonas</i> <i>Acinetobacter</i>	<b>Ceftazidime</b> ou <b>pipéracilline-tazobactam</b> ou <b>céfépime</b> ou <b>imipénem</b> + <b>amikacine</b>

### Antibiothérapie empirique des infections sur cathéter vasculaire\*

Cathéter veineux périphérique ou artériel	Retrait du cathéter + culture	Antibiothérapie si signes généraux ou neutropénie Immunodépression : <b>vancomycine</b> Immunocompétent : pas d'antibiotique si résolution spontanée
Thrombophlébite septique	Retrait du cathéter + culture	<b>Vancomycine</b> puis antibiothérapie adaptée après le retrait
Cathéter central de courte durée	Signes locaux : retrait du cathéter + culture	Pas d'antibiothérapie si résolution spontanée (sauf choc septique) sinon cf. ci-dessus
Cathéter veineux central	Retrait du cathéter + culture Maintien du cathéter	<b>Vancomycine</b> puis antibiothérapie adaptée après le retrait

Si infection documentée à staphylocoque : verrou antibiotique à discuter au cas par cas.

\* Proposition du groupe de travail du bureau de la Société de pathologie infectieuse de langue française (1992) et <http://cid.oxfordjournals.org/content/49/1/1.full>

## LEISHMANIOSE

### Définition

Les leishmanioses sont des zoonoses dues à un protozoaire du genre *Leishmania*. Elles sont transmises à partir du crépuscule, par la femelle d'un diptère hématophage, le phlébotome. Le réservoir parasitaire est constitué de mammifères, principalement le chien.

### Leishmaniose cutanée

3 types sont présentes en France.

- Sud de l'Europe et Afrique du Nord (*L. infantum*).
- Importées du Nouveau Monde, principalement la Guyane (*L. guyanensis*, *L. braziliensis*).
- Importées de l'Ancien Monde, principalement l'Afrique (*L. major*, *L. tropica*).

### Clinique

3 types : localisées (type bouton d'Orient et dues à *L. tropica*, *L. major*, *L. guyanensis*, *L. peruviana*, *L. mexicana* et *L. infantum* en Méditerranée occidentale), cutanéomuqueuse (type *espundia* en Amérique du Sud due essentiellement à *L. braziliensis* et *L. panamensis*) et cutanée diffuse (rare et due à *L. amazonensis* en Amérique du Sud et *L. aethiopica* en Afrique de l'Est).

- Durée d'incubation : 3 j à 3 mois.
- Phase initiale : papule inflammatoire (entre 1 et 5) recouverte de fines squames blanchâtres, bien limitée, de forme ronde ou ovale, au point de piqure de l'insecte.
- Phase d'état : taille entre 0,5 et 10 cm, apparition d'une ulcération centrale, à fond irrégulier et sanieux, à bords surélevés inflammatoires.
- Évolution : surinfection bactérienne possible, guérison spontanée en 6 mois à 3 ans en laissant une cicatrice, récidives (10 % des cas).

### Diagnostic

Examens peu sensibles : 3 frottis (examen direct) et 3 cultures (sensibilité de 60 %) pour identifier l'espèce (laboratoire spécialisé).

Biopsie cutanée en zone ulcérée peu rentable (15 %), permet de chercher un autre diagnostic.

Chercher d'autres localisations : adénopathies, rhinoscopie.

### Traitement [1]

Prise en charge en milieu spécialisé. Pas de traitement consensuel car peu d'essais thérapeutiques contrôlés disponibles.

À titre indicatif, quelques conduites à tenir qui sont à discuter en fonction de la zone géographique, de l'espèce isolée et de la clinique.

► *Leishmaniose cutanée du Nouveau Monde (retour de Guyane française)*

**Pentamidine (PENTACARINAT injectable)** : 4 mg/kg x 3 ou 5 j ou 7 mg/kg unique.

Si le malade a été exposé à *L. braziliensis* (dont ville de Saül) : **GLUCANTIME** 20 mg/kg/j IM x 20 j.

► *Leishmaniose de l'Ancien Monde*

- Abstention : zone de *L. major* (autour du Sahara), lésion en zone couverte, non évolutive ou en voie d'amélioration.

- En l'absence des critères ci-dessus (y compris *L. tropica* ou *infantum*), cryothérapie et infiltrations de **GLUCANTIME** : lésions en petit nombre, pas de diffusion lymphatique, lésion évolutive, péri-orificielle ou articulaire. Si lésions > 4 ou impossibilité de faire des injections : **fluconazole** ou **amphotéricine B liposomale**.

### Leishmaniose viscérale

Rares, plutôt chez l'immunodéprimé, le plus souvent à *L. infantum*.

### Diagnostic

Altération de l'état général, fièvre, pancytopenie, hépato-splénomégalie.

Syndrome inflammatoire, hypergamma-globulinémie, culture de moelle.

### Traitement (prendre un avis spécialisé) [1]

**Amphotéricine B liposomale (AMBISOME)** : chez l'immunocompétent, 20 mg/kg totale répartie en 10 mg/kg J1 et J2 ou 5 mg/kg J1-J4 avec suivi standardisé. La **miltéfosine** 2,5 mg/kg/j *per os* pendant 28 j a obtenu une ATU nominative dans la leishmaniose.

**Sels d'antimoine (GLUCANTIME)** : 20 mg/kg/j, traitement pendant 30 j.

### CONSENSUS

- [1] Le traitement des leishmanioses en France : proposition d'un référentiel consensuel, FFI, 2010

## MALADIE DE LYME (1)

La maladie de Lyme est une infection à un spirochète du genre *Borrelia* (espèces *burgdorferi*, *garinii* ou *afzelii*) transmise par une tique du complexe *Ixodes ricinus*.

Sa distribution est mondiale. La contamination est plus fréquente entre le printemps et le début de l'automne.

De nombreux animaux sylvestres composent le réservoir de la maladie (cervidés, petits rongeurs). Les activités de loisirs et professionnelles en forêt exposent au risque de morsure de tique.

Une conférence de consensus française a été publiée en décembre 2006 [1].

### Physiopathologie

Après morsure, la bactérie se multiplie localement (peau) ou à distance (sang, LCR, etc.).

Elle échappe à la phagocytose mais fait l'objet d'une réaction immunitaire humorale avec un pic d'IgM entre la 3<sup>e</sup> et la 6<sup>e</sup> sem. d'infection. Les IgG se développent en quelques mois. *Borrelia* semble capable de survivre dans certains tissus (liquide articulaire, LCR, système nerveux, etc.) jusqu'à 10 ans après la morsure et explique l'intérêt des antibiotiques à tous les stades de la maladie (sauf le syndrome post-Lyme).

### Clinique

#### Phase primaire

L'érythème chronique migrant (40-77 % des cas) débute au site de la morsure par une macule ou une papule rouge. Il s'étend de façon centrifuge (15 cm de diamètre en moyenne). Le centre se décolore ou devient induré, vésiculaire ou nécrotique. Les cuisses, le creux poplité ou la lisière du cuir chevelu sont les sièges les plus fréquents. La lésion est chaude et habituellement indolore. Elle guérit sans séquelles en 3-4 sem. (même sous antibiotiques).

Des lésions secondaires sans point de morsure central sont rares (3-4 %).

Signes associés :

– souvent présents : malaise, fatigue, céphalées, fièvre, frissons, douleurs diffuses, adénopathie régionale, conjonctivite ;

– moins fréquents : hépatite, toux, splénomégalie ou oedème testiculaire.

#### Phase secondaire (en l'absence de traitement d'une phase primaire)

► *Manifestations neurologiques mineures (15 % des malades en France)*

Dans un délai de 5 j à 3 mois après la piqûre.

Méningoradiculites (67-85 %) dont paralysie faciale (90 %), méningite lymphocytaire. Rarement : encéphalite, chorée, atteinte des paires crâniennes, radiculonévrite.

► *Douleurs ostéo-articulaires*

Dans un délai de quelques semaines à 2 ans après le début.

Il s'agit principalement de mono ou oligoarthrite des grosses articulations touchant presque toujours le genou.

► *Autres manifestations rares ou exceptionnelles*

Lymphocytome cutané, atteintes cardiaques ou oculaires.

#### Phase tardive

• Oligoarthrites aiguës, chronique ou récidivante des grosses articulations (presque toujours le genou).

• Acrodermatite chronique atrophiante.

• Encéphalomyélites chroniques, polyneuropathies sensitives axonales.

#### Syndrome post-Lyme

Association d'asthénie, polyalgies diffuses, plaintes cognitives. Pas de traitement antibiotique.

## MALADIE DE LYME (2)

**Biologie**

- VS normale, augmentation des enzymes hépatiques et des LDH.
- **Sérodiagnostic** peu sensible, positif dans 30-40 % des cas pendant l'érythème migrant, 60-70 % des cas en phase de

régression. Faux positifs en relation avec les autres spirochètes (*T. pallidum*). La synthèse d'IgG dans le LCR ou le liquide articulaire est très évocatrice du diagnostic. La PCR peut être réalisée en 2<sup>e</sup> intention dans la peau, le liquide articulaire ou le LCR.

Formes cliniques	Examens nécessaires en 1 <sup>re</sup> intention
Érythème chronique migrant	Aucun
Neuroborréliose précoce	LCR : pléiocytose, hyperprotéinorachie, synthèse d'IgG Sérologie positive, parfois retardée
Lymphocytome borrélien/acrodermatite	Histologie + sérologie
Atteinte cardiaque	Sérologie
Arthrite	Sérologie + liquide articulaire inflammatoire
Neuroborréliose clinique	LCR : synthèse d'IgG
Formes oculaires	Avis ophtalmologique + sérologie

**Traitement****Préventif**

- Port de chapeau, manches longues, pantalons dans les chaussettes en forêt endémique, utilisation éventuelle de répulsifs sur la peau et les vêtements contenant du **N, N-diéthyl-3-méthylbenzamide** : **INSECT-ÉCRAN peau adulte**, **INSECT-ÉCRAN peau enfant**, ou **INSECT-ÉCRAN Vêtements et Voilages**.
- Après promenade, rechercher des tiques et les retirer le plus vite possible, de préférence à l'aide d'un tire-tique disponible en pharmacie. Ne pas comprimer le corps de la tique ou la tuer chimiquement, ce qui risquerait d'augmenter le risque de contamination. Désinfection locale et vaccination antitétanique le cas échéant.
- Antibio prophylaxie (non recommandée de façon systématique en France) : dose unique de 200 mg de **doxycycline** (chez l'enfant, **amoxicilline** 50 mg/kg/j pendant 10 j) dans les 72 h après une piqure, en

fonction du nombre de morsures, du délai d'attachement, de la prévalence des tiques infectées dans la zone géographique concernée.

**Curatif**

L'objectif est l'éradication complète pour stopper la progression mais pas la négativation de la sérologie.

- Érythème migrant : *per os* **amoxicilline (CLAMOXYL)** 3-4 g/j ou **doxycycline (VIBRAMYCINE N)** 200 mg/j pendant 14 j, ou 21 j si lésions multiples ou signes extracutanés. Régression des signes nécessitant parfois plus d'un mois.

**Traitements des phases tardives (tableau)**

Lymphocytome : **doxycycline** 200 mg/j pendant 14-21 j.

Acrodermatite chronique atrophique : **doxycycline** 200 mg/j pendant 28 j ou **ceftriaxone (ROCEPHINE)** 2 g/j pendant 14 j.

Atteintes cardiaques : **ceftriaxone (ROCEPHINE)** 2 g/j en IV pendant 21-28 j.

## MALADIE DE LYME (3)

## Recommandations thérapeutiques pour la prise en charge de la phase primaire de la borréliose de Lyme : traitement par voie orale

	ANTIBIOTIQUE	POSOLOGIE	DURÉE
ADULTE			
1 <sup>re</sup> ligne	<b>Amoxicilline</b> ou <b>doxycycline*</b>	1 g x 3/j 100 mg x 2/j	14-21 j 14-21 j
2 <sup>e</sup> ligne	<b>Céfuroxime axétil</b>	500 mg x 2/j	14-21 j
3 <sup>e</sup> ligne si CI** 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> lignes ou allergie	<b>Azithromycine***</b>	500 mg x 1/j	10 j
ENFANT			
1 <sup>re</sup> ligne			
< 8 ans	<b>Amoxicilline</b>	50 mg/kg/j en 3 prises	14-21 j
> 8 ans	<b>Amoxicilline</b> ou <b>doxycycline</b>	50 mg/kg/j en 3 prises 4 mg/kg/j en 2 prises, max. 100 mg/prise	14-21 j
2 <sup>e</sup> ligne	<b>Céfuroxime axétil</b>	30 mg/kg/j en 2 prises, max. 500 mg/prise	14-21 j
3 <sup>e</sup> ligne si CI 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> lignes ou allergie	<b>Azithromycine</b>	20 mg/kg/j en 1 prise, max. 500 mg/prise	10 j
FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE			
1 <sup>re</sup> ligne	<b>Amoxicilline</b>	1 g x 3/j	14-21 j
2 <sup>e</sup> ligne	<b>Céfuroxime axétil</b>	500 mg x 2/j	14-21 j
3 <sup>e</sup> ligne si CI 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> lignes ou allergie À partir du 2 <sup>e</sup> trimestre de grossesse	<b>Azithromycine</b>	500 mg x 1/j	10 j

## CONSENSUS

[1] 16<sup>e</sup> Conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse - Borréliose de Lyme : démarches diagnostiques, thérapeutiques et préventives, SPILF, 2006

\* Possibilité d'une prise unique de 200 mg/j (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis - EUCLAB) sans validation par étude clinique

\*\* CI : contre-indication

\*\*\* Pas de justification d'une dose de charge (1 g) à J1 (EUCLAB) dans les études cliniques

## PALUDISME (1)

Le paludisme est une maladie parasitaire due à un protozoaire du genre *Plasmodium*. Il est transmis par un vecteur - l'anophèle - qui n'est présent que dans les régions chaudes et humides du globe, ce qui explique la répartition du paludisme en zones intertropicales.

L'espèce *falciparum* est responsable de plus de 80 % des 5 000 cas de paludisme d'importation survenant chaque année chaque année en France, dont une dizaine de décès, la majorité provenant d'Afrique noire.

C'est à elle que s'adresse la prophylaxie médicamenteuse. L'augmentation de la consommation des **antipaludéens** est responsable de la sélection de nombreuses souches résistantes à la **chloroquine** (chloroquinorésistance) et dans une moindre mesure aux autres **antipaludéens**. Les pays sont repartis selon la résistance à la **chloroquine** :

- groupe 1 : majorité de souches sensibles à la **chloroquine** ;
- groupe 2 :  $\leq 50$  % de souches résistantes ;
- groupe 3 :  $> 50$  % de souches résistantes.

Quatre autres espèces sont pathogènes pour l'homme : *vivax*, *ovale*, *malariae* et *knowlesi*. À la différence de *falciparum*, elles peuvent donner des récurrences après traitement, n'entraînent pas d'accès pernicieux et restent sensibles à la **chloroquine** à de rares exceptions près pour *P. vivax* (en Papouasie-Nouvelle Guinée, Indonésie et en Amérique du Sud).

### Prophylaxie

Tout voyageur en zone d'endémie doit bénéficier d'une consultation médicale

afin de recevoir les conseils généraux et une évaluation du risque palustre qui dépend de la région visitée, de la durée du séjour et du type d'exposition. La prophylaxie doit combiner les mesures de protection contre les piqûres d'anophèles et la chimioprophylaxie.

### Mesures de protection contre les piqûres [1]

Systématiques et efficaces contre les 4 espèces plasmodiales :

- port de vêtements longs à partir du coucher du soleil ;
- applications d'insectifuges sur la peau contenant du **diéthyltoluamide (DEET)** et sur les vêtements contenant de la **perméthrine : INSECT-ÉCRAN** ;
- utilisation d'insecticide en diffuseur électrique, en bombe, en tortillons, etc. ;
- utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (**K-OTHRINE**). L'air conditionné est une excellente prévention.

### Prophylaxie médicamenteuse

- Dirigée essentiellement contre *P. falciparum*.
- Diminue le risque d'accès palustre sans l'annuler c'est-à-dire que tout accès fébrile pendant le séjour ou après le retour doit être considéré comme palustre jusqu'à preuve du contraire.
- Près de 90 % des accès surviennent dans le mois qui suit l'exposition, ce qui justifie de poursuivre une prophylaxie pendant 4 sem. après la sortie de la zone à risque.
- Prophylaxie à débiter la veille de l'exposition sauf **LARIAM** (10 j avant pour vérifier la tolérance). Durées et modalités, voir médicaments et Tableau de chimioprophylaxie antipaludique.

## ANTIPALUDÉENS (1)

## ■ Chloroquine

NIVAQUINE					
Prophylaxie	20 cp. séc. 100 mg	2,70	II	65 %	0,14
A. : 1 cp./j	100 cp. séc. 100 mg	5,78	II	65 %	0,06
E. > 10 kg : 1,7 mg/kg/j sans dépasser 100 mg	30 mes. de 5 mL (susp. buv. 5 mg/mes.)	9,14	II	65 %	0,30
E. < 10 kg : 25 mg 1 j/2					
Traitement curatif					
A. : 1 500 mg sur 3 j soit 600 mg suivi 6 h plus tard de 300 mg le 1 <sup>er</sup> j, puis 300 mg en 1 prise les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> j					
E. et N. : 25 mg/kg/j sur 3 j soit 10 mg/kg suivi de 5 mg/kg le 1 <sup>er</sup> j, puis 5 mg/kg en 1 prise les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> j					

## PROPRIÉTÉS

Antipaludéen schizonticide dont l'utilisation est limitée par l'apparition de souches de *P. falciparum* résistantes. Toutes les souches des autres espèces plasmodiales sont restées sensibles à de rares exceptions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et en Amérique du Sud.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou IV, excellente biodisponibilité, bonne distribution tissulaire (se concentre dans les hématies), élimination rénale, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

- Prophylaxie dans les pays du groupe 1, en association avec le **proguanil** dans les pays du groupe 2.
- Traitement curatif de l'accès palustre à *P. vivax*, *ovale* et *malariae*.
- Traitement curatif de l'accès palustre simple à *P. falciparum* dans les pays du groupe 2.

## CONTRE-INDICATIONS

Rétinopathie (sauf traitement curatif).  
Enfant ≤ 5 ans.  
Allergie aux sulfites (forme injectable).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Passage transplacentaire insuffisant pour assurer une chimio prophylaxie des fœtus et nourrissons.

Absorption retardée par les pansements gastriques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

En prophylaxie (rares) : prurit, démangeaison, éruptions cutanées lichénoïdes, pigmentation ardoisée des muqueuses et des ongles, toxicité cumulée en cas de dose > 100 g.

En curatif : céphalées, nausées, vomissements, vertiges, choc anaphylactique aux sulfites, colapsus chez l'enfant < 5 ans.

## INTOXICATION

Prise > 25 mg/kg *per os* ou 10 mg/kg par voie IM : céphalées, nausées, vomissements, vertiges, agitation, vision floue, nystagmus, diplopie, mydriase, hypotension, risque d'arrêt cardiaque.

Transport en SAMU jusqu'en réanimation.

Surveillance rythme et fréquence cardiaques.

Si besoin intubation et administration de **diazépam** ou **penthotal**, lavage gastrique, correction de la kaliémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pansements gastriques : diminution de l'absorption (2 h d'intervalle).

## PALUDISME (2)

### ► Les pays de groupe 0

- Afrique : Égypte, Lesotho, Libye, Réunion, Sainte-Hélène, Maroc, Seychelles, Tunisie.
- Amérique : toutes les villes (sauf Amazonie), Antigua et Barbuda, Antilles néerlandaises, Bahamas (sauf Great Exuma), Barbade, Bermudes, Canada, Chili, Cuba, Dominique, États-Unis, Guadeloupe, Grenade, Caïmans, Malouines, Martinique, Porto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago, Uruguay, Îles Vierges.
- Asie : toutes les villes (sauf Inde), Arménie, Brunéi, Guam, Hong Kong, Japon, Kazakhstan, Macao, Maldives, Mongolie, Singapour, Taiwan, Turkménistan.
- Europe : tous les pays sauf la Grèce (y compris Açores, Canaries, Chypre, États baltes, Ukraine, Belarus et Turquie d'Europe).
- Proche-Orient : toutes les villes, Barhein, Émirats arabes unis, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar, Turquie (sauf Sud-Est).
- Océanie : toutes les villes et Australie, Fidji, Hawaï, Mariannes, Marshall, Micronésie,

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Île de Pâques, Polynésie française, Samoa, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna, Kiribati, Cook, Samoa, Niue, Nauru, Palau.

### ► Les pays à transmission sporadique\*

- Afrique : Algérie, Cap Vert, Égypte, Île Maurice.
- Amérique : Bahamas (Great Exuma).
- Asie : Azerbaïdjan, Corée du Nord, Corée du Sud, Fédération de Russie, Georgie du Sud-Est, Kirghizistan, Ouzbékistan, Thaïlande (centre).
- Europe : Grèce, Turquie du Sud-Est.
- Proche-Orient : Oman, Syrie, Turquie du Sud-Est.

### ► Les pays de groupe 1, 2 et 3

Attention, pour certains pays, il peut exister plusieurs zones ce qui justifie de bien considérer l'ensemble du voyage et de se reporter aux recommandations du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'année en cours. Il faut noter des zones de résistances à la méfloquine dans certaines régions d'Asie du Sud-Est.

### Chimioprophylaxie antipaludique chez l'adulte selon les groupes de chimiorésistance\*\*

GROUPE DE CHIMIORÉSISTANCE	POPULATION GÉNÉRALE	FEMME ENCEINTE
Groupe 1	<b>Chloroquine (NIVAQUINE)</b> 100 mg/j séjour + 4 sem. après	
Groupe 2	<b>Chloroquine + proguanil</b> 100/200 mg/j ( <b>NIVAQUINE + PALUDRINE</b> ou <b>SAVARINE</b> ) séjour + 4 sem. après ou <b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j séjour + 1 sem. après	
Groupe 3	<b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j séjour + 1 sem. après	<b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j Peut être envisagé si nécessaire, séjour + 1 sem. après
	<b>Méfloquine</b> 250 mg ( <b>LARIAM</b> ) 1 cp./sem. 10 j avant séjour + 3 sem. après	
	<b>Doxycycline</b> (monohydrate de doxycycline : <b>DOXYPALU, GRANULODOXY-Gé</b> 100 mg/j séjour + 4 sem. après	

\* Il est admissible de ne pas prendre de chimioprophylaxie dans ces pays, quelle que soit la durée du séjour. Il est cependant indispensable d'être en mesure, pendant le séjour et dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

\*\* Cf. aussi Paludisme de l'enfant au chapitre Pédiatrie.



## ANTIPALUDÉENS (2)

## ■ Proguanil

<b>PALUDRINE</b>					
En 1 prise au cours du repas toujours associée à la <b>chloroquine</b> A. et E. > 9 ans : 200 mg/j E. 5-8 ans : 150 mg/j E. 1-4 ans : 100 mg/j E. < 1 an : 50 mg/j	56 cp. séc. 100 mg	13,96	II	65 %	0,25

## ■ Proguanil + chloroquine

<b>SAVARINE</b>					
En 1 prise <i>per os</i> au cours du repas A. et E. > 15 ans : 1 cp./j	28 cp. <b>chloroquine</b> 100 mg + <b>proguanil</b> 200 mg	16,50	II	65 %	0,59

**PROPRIÉTÉS**

Biguanide antifolinique schizonticide actif sur certaines souches de sensibilité diminuée à la **chloroquine**.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, absorption de 80 %, métabolisation (30 %) en cycloguanil, élimination rénale (60 %), faible passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**INDICATIONS**

Prophylaxie du paludisme en association avec la **chloroquine** dans les pays du groupe 2 ou en cas de contre-indication ou d'intolérance à la **méfloquine** dans les pays du groupe 3.

**CONTRE-INDICATIONS**

Rétinopathie (sauf traitement curatif).  
Enfant ≤ 5 ans.  
Allergie aux sulfites (forme injectable).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Toujours associer à la **chloroquine**.  
À débiter la veille du départ et poursuivie 4 sem. après le retour.  
Ne permet pas une prophylaxie des fœtus et nourrissons par simple passage transplacentaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Intolérance digestive modérée et transitoire.  
Rares : éruptions cutanées, prurit, dépigmentation cutanée, alopecie, ulcérations buccales, stomatite.

**PALUDISME (3)****Océanie : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie**

Pays	Situation du paludisme 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Papouasie-Nouvelle Guinée	Groupe 3	Oui
Salomon (îles)	Groupe 3	Oui
Vanuatu	Groupe 3	Oui

**Afrique : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie**

Pays	Situation en 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Afrique du Sud	Nord-Est : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Angola	Groupe 3	Oui
Bénin	Groupe 3	Oui
Botswana	Groupe 3	Oui
Burkina Faso	Groupe 3	Oui
Burundi	Groupe 3	Oui
Cameroun	Groupe 3	Oui
Comores	Groupe 3	Oui
Congo	Groupe 3	Oui
Côte-d'Ivoire	Groupe 3	Oui
Djibouti	Groupe 3	Oui
Érythrée	Groupe 3	Oui
Éthiopie	Groupe 3	Oui
Gabon	Groupe 3	Oui
Gambie	Groupe 3	Oui
Ghana	Groupe 3	Oui
Guinée	Groupe 3	Oui
Guinée-Bissau	Groupe 3	Oui
Guinée équatoriale	Groupe 3	Oui
Kenya	Groupe 3	Oui
Libéria	Groupe 3	Oui

## ANTIPALUDÉENS (3)

## ■ Proguanil en association

MALARONE					
A. et E. $\geq 40$ kg : au cours d'un repas ou boisson lactée Préventif : 1 cp./j à heure fixe, débiter la veille du départ, poursuivre 7 j après sortie zone Curatif (accès simple) : 4 cp./j en 1 prise x 3 j	12 cp. enf. <b>atovaquone</b> 62,5 mg + <b>proguanil</b> 25 mg	30,99	I	NR	2,58
	12 cp. <b>atovaquone</b> 250 mg + <b>proguanil</b> 100 mg		I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

L'**atovaquone** est un inhibiteur des fonctions mitochondriales, schizonticide, synergique avec le **proguanil** sur *P. falciparum*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, faible absorption (20 %) favorisée par la prise de graisse, aucun métabolisme, demi-vie de 2-3 j, élimination par voie hépatique et biliaire.

## INDICATIONS

Traitement préventif et curatif (accès simple) du paludisme à *P. falciparum*, en association avec le **proguanil**, dans les pays des groupes 2 et 3.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse et allaitement : innocuité non démontrée.  
Enfant de moins de 40 kg.  
Allergie connue.  
Insuffisances rénales ou hépatiques graves.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de vomissements, redonner 1 dose 1 h plus tard.  
À débiter la veille du départ et poursuivre 4 sem. après le retour.  
Durée limitée à 3 mois.  
Déconseillée avec **métoclopramide (PRIM-PÉRAN)**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, céphalées, anomalies réversibles des tests hépatiques, hyponatrémie, hyperamylasémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Antagonismes *in vitro* avec **méfloquine** et **artésunate**.  
Concentrations sanguines diminuées par **rifampicine**, **rifabutine**, **métoclopramide**, **tétracyclines**.  
Diminue concentrations sanguines d'**indinavir**.

**PALUDISME (4)****Afrique (suite) : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie**

Pays	Situation en 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Madagascar	Groupe 3	Oui
Malawi	Groupe 3	Oui
Mali	Groupe 3	Oui
Mauritanie	Groupe 3	Oui
Mayotte (Île de)	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Mozambique	Groupe 3	Oui
Namibie	Groupe 3	Oui
Niger	Groupe 3	Oui
Nigéria	Groupe 3	Oui
Ouganda	Groupe 3	Oui
Rép. centrafricaine	Groupe 3	Oui
Rép. dém. du Congo (ex-Zaïre)	Groupe 3	Oui
Rwanda	Groupe 3	Oui
Sao Tomé et Príncipe	Groupe 3	Oui
Sénégal	Groupe 3	Oui
Sierra Leone	Groupe 3	Oui
Somalie	Groupe 3	Oui
Sud Soudan	Groupe 3	Oui
Swaziland	Groupe 3	Oui
Tanzanie	Groupe 3	Oui
Tchad	Groupe 3	Oui
Togo	Groupe 3	Oui
Zambie	Groupe 3	Oui
Zimbabwe	Groupe 3	Oui

\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

## ANTIPALUDÉENS (4)

## ■ Méfloquine

LARIAM					
<i>Prophylaxie palustre</i> : 1 cp./sem. à débiter 10 j avant le départ (cf. Précautions d'emploi) et poursuivre 3 sem. après la sortie de la zone à risque > 45 kg : 250 mg > 30 kg : 200 mg > 20 kg : 100 mg > 15 kg : 50 mg <i>Traitement curatif</i> : > 60 kg : 3 puis 2 puis 1 cp. 250 mg à 8 h d'intervalle > 45 kg : 3 puis 2 cp. 250 mg à 8 h d'intervalle > 15 kg : 25 mg/kg en 1 prise Ne pas reprendre la prophylaxie après le traitement curatif	8 cp. 250 mg	33,11	I	65 %	4,14

## PROPRIÉTÉS

**Antipaludéen** schizonticide actif sur les souches de *P. falciparum* chloroquino-résistantes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, variations interindividuelles d'absorption et de concentrations plasmatiques, métabolisation hépatique en dérivé inactif, élimination biliaire lente en 7 à 40 j.

## INDICATIONS

- Prophylaxie des accès palustres à *P. falciparum* dans les pays du groupe 3 (**séjour < 3 mois**), y compris chez la femme enceinte.
- Traitement curatif des accès palustres à *P. falciparum* au retour des pays du groupe 3.

## CONTRE-INDICATIONS

## Allaitement.

Antécédents convulsifs et troubles neuropsychiatriques.

Insuffisance rénale ou hépatique.

Enfant de moins de 15 kg.

Association au valproate de sodium (**DÉPAKINE**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1 cp./sem. à débiter environ 10 j avant le départ pour vérifier la bonne tolérance de la

**méfloquine** après la 2<sup>e</sup> prise (10-20 % d'effets secondaires) et à poursuivre 3 sem. après la sortie de zone à risque.

Contraception efficace pendant et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : céphalées et vertiges (5 %), nausées, vomissements, diarrhée, gastralgies, anorexie, insomnie, obnubilation, accès maniaque ou dépressif, convulsions, confusion mentale, épisodes psychotiques.

En cas de traitement curatif, les complications neuropsychiatriques sont de l'ordre de 1 pour 200 à 1 pour 1 700.

Rares : réactions cutanées allergiques, élévation des transaminases, bradycardie sinusale, extrasystoles.

## PROPRIÉTÉS

Contre-indiqué : **valproate de sodium**.

Déconseillés : **quinine IV** (intervalle libre de 12 h), **β-bloquants** (bradycardie).

La fréquence des effets indésirables doit être prise en compte dans la prophylaxie et nécessite de tester le médicament 10 j avant le départ.

## PALUDISME (5)

## Asie : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation du paludisme 2013/ Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Afghanistan	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Arabie saoudite	Sud, Ouest : groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Bangladesh	Dhaka : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Bhoutan	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Cambodge	Groupe 3	Oui
Chine**	Yunnan et Hainan : groupe 3	Oui
	Nord-Est : groupe 1***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Inde**	États du Nord-Est : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 2	
Indonésie	Bali : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Iran	Sud-Est : groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 1***	
Iraq	Zone rurale du Nord (provinces de Duhok, Erbil et Sulaimaniya) : groupe 1***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Laos	Groupe 3	Oui
Malaisie	Zones urbaines et côtières : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Myanmar (ex-Birmanie)	Groupe 3	Oui
Népal	Terai : groupe 2	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Pakistan	Groupe 3	Oui
Philippines	Groupe 3	Oui
Sri Lanka	Groupe 2***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Tadjikistan	Groupe 2***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Thaïlande	Régions frontalières avec le Cambodge et le Myanmar : groupe 3	Oui
	Reste du pays : zones de transmission sporadique	Non
Timor Leste	Groupe 3	Oui
Vietnam	Bande côtière et des deltas : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Yémen	Île de Socotra : groupe 1	Oui
	Reste du pays : groupe 3	

\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

\*\* Pays pour lesquels la situation est complexe selon les régions, se reporter à la liste des pays dans OMS, Voyages internationaux et santé

\*\*\* Essentiellement *Plasmodium vivax*.

## ANTIPALUDÉENS (5)

## ■ Halofantrine

HALFAN					
Traitement curatif à renouveler 8 j plus tard (avec augmentation du risque de complications cardiaques) A. et E. > 40 kg : 6 cp. à raison de 2 cp. toutes les 6 h E. 32-40 kg : 300 mg x 3 E. 23-31 kg : 250 mg x 3 E. 16-22 kg : 200 mg x 3 E. 13-15 kg : 150 mg x 3 E. 10-12 kg : 100 mg x 3		6 cp. 250 mg 9 c-mes. (susp. buv. 100 mg/mes.)		I I	NR NR

## PROPRIÉTÉS

Antipaludéen efficace sur les souches de *Plasmodium falciparum* chloroquino-résistants.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, absorption augmentée par une alimentation riche en lipides, biodisponibilité variable d'un sujet à l'autre, métabolisé en dérivé actif, élimination fécale, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

Traitement des accès palustres simples à *P. falciparum* déconseillé en 1<sup>re</sup> intention en raison du risque de complications cardiaques rares mais potentiellement mortelles.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allongement de l'espace QT : risque de torsades de pointes.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec une extrême prudence en raison du risque de complication cardiaque mortelle. Réaliser un ECG avant le début du traitement pour vérifier la longueur de l'espace QT et avant le voyage en cas de traitement pré-somptif. Prendre en dehors des repas (risque de surdosage).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : diarrhée (7 %), douleurs abdominales (6 %), nausées (5 %), vomissements (4 %).  
 Prurit, éruptions cutanées, élévation transitoires des transaminases, toux, céphalées, vertiges, myalgies, frissons.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Médicaments favorisant les torsades de pointes :** amiodarone, sotalol, brétylium, disopyramide, quinidiniques, érythromycine IV, sultopride, vincamine, astémizole, terféndine, cibenzoline, quinine, hypokaliémiants.

## PALUDISME (6)

## Amérique : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation du paludisme 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Argentine	Régions rurales du nord-ouest et frontière avec le Paraguay : groupe 1	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays, y compris les chutes d'Iguazu : groupe 0	Non
Belize	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Bolivie	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Brésil	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Colombie	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays groupe 2	
Costa Rica	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Équateur	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Guatemala	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Guyana	Groupe 3	Oui
Guyane	Fleuves frontaliers : groupe 3	Oui
	Zone côtière : groupe 0	Non
Haïti	Groupe 1	Oui
Honduras	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Jamaïque	Agglomération de Kingston : groupe 1	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Mexique	Yuacatan : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Nicaragua	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Panama	Ouest : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Est : groupe 3	Oui
Paraguay	Est : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Pérou	Amazonie (Loreto) : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Rép. dominicaine	Groupe 1	Oui
Salvador (El)	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Surinam	Groupe 3	Oui
Venezuela	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	

\* Essentiellement *Plasmodium vivax*.

\*\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.



## ANTIPALUDÉENS (6)

## ■ Chlorhydrate de quinine

<b>QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN</b>					
<b>82 % de quinine base</b> <i>Traitement curatif</i> , durée de 7 j : A. et E. : 24 mg/kg/j de <b>quinine</b> base en 3 prises <i>per os</i> toutes les 8 h (soit 500 mg x 3/j pour un poids de 60 kg) <i>Prophylaxie</i> : A. : 250-500 mg/j	20 cp. 250 mg (204 mg de <b>quinine</b> base)	6,76	I	65 %	0,34
	20 cp. 500 mg (409 mg de <b>quinine</b> base)	12,97	I	65 %	0,65

## ■ Bichlorate de quinine + quinine + cinchonine + cinchonidine

<b>QUINIMAX</b>					
<b>64 % de quinine base</b> Idem chlorhydrate de quinine Soit 500 mg x 3/j pour un poids de 60 kg <b>QUINIMAX IV</b> <i>Traitement curatif</i> du paludisme En 3 inj. de 8 mg/kg de <b>quinine</b> base : - à passer en 4 h dans 250 mL de glucosé à 5 % ou - à passer à la seringue électrique en continue sur 8 h dans du sérum physiologique A. et E. : 24 mg/kg/j (max. 1 800 mg/j) Un relais <i>per os</i> est possible par <b>quinine</b> ou <b>méfloquine</b>	18 cp. séc. 125 mg	36,38	I	65 %	2,02
	9 cp. séc. 500 mg	36,38	I	65 %	4,04
	3 amp. de 1 mL à 125 mg (soit 64 mg de <b>quinine</b> base)	105,48	I	65 %	35,16
	3 amp. de 2 mL à 250 mg (soit 128 mg de <b>quinine</b> base)	105,48	I	65 %	35,16

## PALUDISME (7)

## Traitement

Le traitement curatif dépend de l'espèce plasmodiale (*falciparum* ou autre), du risque de chloroquinorésistance qui évolue chaque année et de la gravité.

Tout accès fébrile pendant le séjour ou après le retour d'une zone endémique doit être considéré comme palustre jusqu'à preuve du contraire.

**Accès palustre à *Plasmodium vivax*, ovale et *malariae***

**Chloroquine (NIVAQUINE).**

► Chez l'adulte (y compris femme enceinte)

J1 : 600 mg puis 300 mg 6 h plus tard.

De J2 à J3 ou à J5 : 300 mg/j en 1 prise.

► Chez l'enfant


J1 : 10 mg/kg puis 5 mg/kg 6 h plus tard.

De J2 à J3 ou à J5 : 5 mg/kg/j en 1 prise.

► En cas de vomissements

Il est possible (sauf chez le jeune enfant) d'administrer la **chloroquine** en IM à la dose de 2,5 à 3,5 mg/kg toutes les 6 h puis relais *per os* dès que possible.

**Accès palustre à *P. falciparum***



► **Accès simple (pas de vomissements)**

Traitement ambulatoire si les conditions sont remplies (cf. Encadré).

• Traitements de choix

**Proguanil-atovaquone (MALARONE)** 4 cp./j pendant 3 j chez l'adulte et l'enfant ≥ 40 kg. Très cher, bien toléré. En cas de vomissements, redonner 4 cp. 1 h plus tard.

**Arthéméter-luméfanantrine (RIAMET)**, à partir de 12 ans et 35 kg, prendre 4 cp. en 1 prise à H0, H8, H24, H36, H48 et H60 avec prise alimentaire ou boisson avec corps gras.

• Traitements alternatifs

**Quinine (QUINIMAX)** 24 mg/kg/j en 3 prises pendant 7 j sans dépasser 1 800 mg chez l'adulte (ou association **arthéméter-luméfanantrine**, **RIAMET** en cas de risque de sensibilité diminuée à la quinine).

**Méfloquine (LARIAM)** 25 mg/kg en 2 ou

3 prises espacées de 6 à 12 h soit 3 cp. + 2 cp. (+ 1 cp. si poids ≥ 60 kg). Risques d'intolérance, traitement coûteux mais court.

**Halofantrine (HALFAN)** : à utiliser avec la plus extrême prudence en raison du risque de complication cardiaque mortelle. 25 mg/kg en 3 prises espacées de 6 h, soit 2 cp. + 2 cp. + 2 cp. (après réalisation d'un ECG pour éliminer un allongement de l'espace QT). Réaliser une 2<sup>e</sup> cure au 7<sup>e</sup> j (risque cardiaque accru). Ne pas poursuivre la prophylaxie en France.

• Traitement de réserve (autotraitement)

En cas de situation d'isolement à plus de 12 h d'une structure de soins. Ne dispense pas d'une consultation médicale.

► **Accès simple avec vomissements**

À traiter comme un accès grave sans hospitalisé en réanimation.

**ANTIPALUDÉENS (7) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Alcaloïde du quinquina, schizonticide et faiblement gamétocytocide, de mécanisme d'action mal connu, actif sur toutes les souches plasmodiales à de rares exceptions en Asie du Sud-Est.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os* ou IV, bonne biodisponibilité (90 %), bonne distribution (LCR 7 % de la concentration sanguine), métabolisation hépatique, élimination rénale totale (100 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**INDICATIONS**

- Traitement curatif du paludisme en particulier de l'accès pernicieux.
- Prophylaxie palustre en zone de chloroquinorésistance.
- Traitement de la babésiose (en association avec la **clindamycine**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Troubles de la conduction intraventriculaire.  
Fièvre bilieuse hémoglobininurique.  
Allergie à la **quinine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser la voie intramusculaire.  
Surveillance des concentrations sanguines de quinine à partir de la 24<sup>e</sup> h : thérapeutiques entre 8 et 15 mg/L et toxiques au-dessus de 15 mg/L.

Surveillance glycémique toutes les 6 h.

Relais *per os* dès l'apyrexie par **quinine** ou autre **antipaludéen** (**LARIAM**, ou **MALARONE** avec un délai de 12 h après la dernière perfusion).

Hémolyse en cas de déficit en G6PD.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypoglycémie dose-dépendante, hypotension, thrombopénie, intolérance veineuse.

Cinchonisme (effets secondaires de la **quinine**) : troubles auditifs (acouphènes, hypoaousie, surdité), visuels (amblyopie, troubles de la vision des couleurs), digestifs (nausées, douleurs abdominales) et neurologiques (céphalées, vertiges) qui peuvent apparaître quand la quininémie dépasse 5 mg/L, disparaissent à l'arrêt du traitement et ne justifient pas d'interruption thérapeutique.

Allergies (rares) : fièvre, urticaire, bronchospasme, hémolyse, thrombopénie, agranulocytose.

**INTOXICATION**

Amaurose et risque de cécité définitive, surdité, convulsions, hypotension, troubles de la conduction intraventriculaire ou auriculo-ventriculaire justifiant une hospitalisation en réanimation avec surveillance électrocardiographique continue, lavage gastrique et absorption de charbon.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Méfloquine** (augmentation du risque de convulsions).

**Halofantrine** (risque d'augmentation de l'espace QT et de torsades de pointes).

La fièvre bilieuse hémoglobininurique :

- est exceptionnelle ;
- est un syndrome hémolytique aigu (ictère et hémoglobinurie) avec un collapsus ;
- survient chez des sujets qui ont déjà consommé antérieurement de la **quinine** ;
- serait de nature allergique.

**Exemple d'ordonnance pour un homme de 70 kg**

**QUINIMAX** dilué dans du glucosé 10 %.

Dose de charge de 1 200 mg à la seringue électrique (SE) en 4 h, puis 4 h d'interruption, puis 500 mg en 8 h à la SE x 3 par jour.

## PALUDISME (8)

## ► Accès palustre grave

## Critères de définition du paludisme grave d'importation de l'adulte

Pronostic	Critères cliniques ou biologiques	Pronostic
+++	Toute défaillance neurologique incluant : – obnubilation, confusion, somnolence, prostration – coma avec score de Glasgow < 11	+++
+++	Toute défaillance respiratoire incluant : – si VM ou VNI : $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 30$ mmHg – si non ventilé : $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg et/ou $\text{SpO}_2 < 90$ % en air ambiant et/ou $\text{FR} > 32/\text{min}$ – signes radiologiques : images interstitielles et/ou alvéolaires	+
+++	Toute défaillance cardiocirculatoire incluant : – pression artérielle systolique < 80 mmHg en présence de signes périphériques d'insuffisance circulatoire – patient recevant des drogues vasoactives quel que soit le chiffre de pression artérielle – signes périphériques d'insuffisance circulatoire sans hypotension	++
++	Convulsions répétées : au moins 2/24 h	+
++	Hémorragie : définition clinique	+
+	Ictère : clinique ou bilirubine totale > 50 $\mu\text{mol/L}$	+++
+	Hémoglobininurie macroscopique	+
+	Anémie profonde : hémoglobine < 7 g/dL, hématocrite < 20 %	+
+	Hypoglycémie : glycémie < 2,2 mmol/L	+
+++	Acidose : – bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/L – ou acidémie avec $\text{pH} < 7,35$ (surveillance rapprochée dès que bicarbonates < 18 mmol/L)	++
+++	Toute hyperlactatémie : – dès que la limite supérieure de la normale est dépassée – a fortiori si lactate plasmatique > 5 mmol/L	++
+	Hypersparasitémie : dès que parasitémie > 4 %, notamment chez le non-immun (selon les contextes, les seuils de gravité varient de 4 à 20 %)	+++
++	Insuffisance rénale : – créatininémie > 265 $\mu\text{mol/L}$ ou urée sanguine > 17 mmol/L – et diurèse < 400 mL/24 h malgré réhydratation	+++
VM : ventilation mécanique ; VNI : ventilation non invasive ; FR : fréquence respiratoire		

## ANTIPALUDÉENS (8)

## ■ Artéméther + luméfantrine

RIAMET				
A., E. > 12 ans ou > 35 kg : 6 x 4 cp. en 60 h (H0, H8, H24, H36, H48, H60) À prendre avec un aliment ou une boisson Réadministrer la dose en cas de vomissement Non recommandé chez l'enfant < 12 ans ou < 35 kg	24 cp. 20 mg <b>artéméther</b> + 120 mg <b>luméfantrine</b>		I	NR

## PROPRIÉTÉS

Associations de 2 **antipaludiques** : l'**arthéméther** (dérivé de l'artémisine de mode d'action inconnu) et la **luméfantrine** (dérivé de l'halofantrine). Pas de résistance connue.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption rapide augmentée par la prise d'aliments. Demi-vie : 2 h.

## INDICATIONS

Accès palustre non compliqué à *Plasmodium falciparum* chez les sujets âgés de plus de 12 ans avec un poids corporel > 35 kg.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse (1<sup>er</sup> trimestre), allaitement.  
Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Insuffisance rénale ou hépatique sévère.  
Cardiopathie, bradycardie, allongement de l'espace QT (**luméfantrine**), antécédent familial de mort subite.  
Hypokaliémie, hypomagnésémie.  
Prise concomitante de médicaments allongeant l'espace QT : **antiarythmiques Ia et III, antipsychotiques, antidépresseurs, macrolides, fluoroquinolones, imidazolés, triazolés.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans les accès palustres sévères, le neuropaludisme, ni en prophylaxie. En cas d'aggravation sous traitement, administrer immédiatement une autre molécule.

Surveillance électrocardiographique et hydroélectrolytique.

Réservé aux traitements de *P. falciparum*.

Éviter l'association avec d'autres **antipaludéens**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, vertiges, troubles du sommeil, contractions musculaires involontaires, parés-thésies, ataxie.

Palpitations, allongement asymptomatique l'espace QT.

Toux, douleurs abdominales, anorexie, diarrhée, nausées, vomissements.

Purrit, éruption cutanée.

Myalgies, arthralgies, asthénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Molécules allongeant l'espace QT (cf. Contre-indications).

**PALUDISME (9)**

Un accès palustre peut survenir malgré une chimioprophylaxie bien suivie. La durée d'incubation minimale est de 7 j.

- Hospitalisation en soins intensifs.
- Urgence thérapeutique +++.

**Artésunate IV (MALACEF)** : en ATU, 2,4 mg/kg à 0, 12 et 24 h, puis toutes les 24 h pendant 3 j. Un relais oral peut être pris de préférence par une association contenant un dérivé d'artémisinine (**RIAMET**).

**Quinine IV (QUINIMAX)** : après une dose de charge de 16 mg/kg au cours de la 1<sup>re</sup> perf. : 24 mg/kg/j de **quinine** base en 3 perfusions de 4 h diluée dans du glucosé avec changement de seringue électrique toutes les 8 h (dose maximale de 1 800 mg/j). En cas d'insuffisance rénale : diminuer la dose à 48 h de traitement. Surveiller la quininémie (8-15 mg/L). Surveiller la glycémie toutes les 4 h.

**Cas particuliers**

Femmes enceintes : seule la **quinine** peut être prescrite mais l'artésunate peut être utilisé si le bénéfice escompté est supérieur au risque potentiel pour le fœtus.

Risque de souche de moindre sensibilité à la **quinine** (certaines zones d'Asie du Sud-Est et d'Amazonie) : **arthéméter-luméfantine (RIAMET)** ou artésunate IV (**MALACEF**).

## ANTIPALUDÉENS (9)

## ■ Artésunate

MALACEF					
Traitement de 3 jours : 2,4 mg/kg avec un débit de 3 mL/min 3 administrations à 12 h d'intervalle puis toutes les 24 h Un relais <i>per os</i> est à réaliser dès que possible à l'issue des 3 j Si ce relais est impossible, la durée max. du traitement est de 7 j		1 fl. pdre/solvant pour sol. inj.	ATU	I	

Ce médicament est disponible sous ATU nominative, cela implique des démarches de prescription, d'information du patient et de pharmacovigilance spécifiques en relation avec le pharmacien et l'ANSM (ex-Afssaps).

## PROPRIÉTÉS

Dérivé hémisynthétique de l'artémisinine. La présence de l'ester de succinate lui confère une solubilité compatible avec la réalisation de cette forme injectable par voie IV.

## INDICATIONS

Traitement en première intention de l'accès palustre grave à *Plasmodium falciparum*.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**artésunate** ou un des dérivés de l'artémisinine.

Grossesse (sauf en cas de bénéfice jugé supérieur au risque), allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Un suivi hématologique est à réaliser en raison des effets indésirables potentiels.


Les examens suivants doivent être réalisés à J3, J7, J14, J21 et J28 : NFS, taux de réticulocytes, de LDH et d'haptoglobine. En cas d'anémie, un bilan étiologique doit être réalisé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Caractéristiques des dérivés de l'artémisinine : rash, prurit, toux, vertiges, acouphènes, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, bradycardie, allongement de l'intervalle QT, fièvre, céphalées, insomnies, asthénie, polyurie.

Anomalies biologiques notables : anémie avec abaissement réversible du taux de réticulocytes, augmentation transitoire des transaminases hépatiques.

## PALUDISME (10)





## ANTIPALUDÉENS (10)

## ■ Pipéraquine + dihydroartémisinine

<b>EURARTESIM</b>					
1 prise/j pendant 3 j consécutifs à heure fixe avec de l'eau et à distance > 3 h de toute prise alimentaire La posologie est à adapter en fonction du poids du patient puisque le traitement est possible dès 5 kg de poids corporel 24-36 kg : 640 mg/80 mg 36-75 kg : 60 mg/120 mg 75-100 kg : 1 280 mg/160 mg Il est possible d'effectuer 2 cures au maximum en 12 mois et à 2 mois d'intervalle minimum	3 cp. séc.	HOP	I		
	160 mg/20 mg 12 cp. séc. 320 mg/40 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Demi-vie : 22 j.

La **pipéraquine** est un analogue structural de la **chloroquine** contenant deux noyaux quino-  
léiques chlorés et ce composé possède une  
bonne activité sur les souches de *Plasmodium*  
résistantes à la **chloroquine**.

La **dihydroartémisinine** est le second **antipa-  
ludéen** présent dans cette spécialité, il peut  
être également nommé arténimol.

**INDICATIONS**

Traitement du paludisme non compliqué à  
*P. falciparum* dès l'âge de 6 mois et pour un  
poids ≥ 5 kg.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **pipéraquine** ou la **dihy-  
droartémisinine**.  
Paludisme sévère.

Risque d'allongement ou allongement avéré de  
l'intervalle QT d'origine physiopathologique ou  
iatrogène.

En cas d'arythmie et de des troubles électroly-  
tiques suivants : hypokaliémie, hypocalcémie  
et hypomagnésémie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une surveillance cardiaque par ECG doit être  
réalisée au plus tôt puis réitérée régulièrement.  
La prise alimentaire lors de la prise augmente  
l'absorption et présente un risque de toxicité.  
Il n'y a pas de données disponibles à ce jour  
concernant les patient âgés ≥ 65 ans ou pré-  
sentant une insuffisance rénale/hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les plus fréquents : anémie, céphalées, allon-  
gement de l'intervalle QTc, tachycardie, asthé-  
nie, fièvre, toux, troubles intestinaux, syn-  
drome grippal, arthralgies, myalgies, anomalies  
du bilan hépatique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec les médicaments allongeant l'intervalle  
QT.

Les inhibiteurs du CYP3A4 présente un risque  
de surdosage toxique alors que les inducteurs  
de ce CYP peuvent rendre inefficace le trai-  
tement.

Deux autres CYP sont touchés par l'**EURARTE-  
SIM** : inhibition légère des CYP2C19 et  
CYP1A2.

## PALUDISME (11)

### Qui hospitaliser en réanimation ?

#### Les adultes ayant au moins 1 critère de gravité :

- *Unité lourde* : coma (score de Glasgow < 11), convulsions répétées, défaillance respiratoire, circulatoire, acidose métabolique et/ou hyperlactatémie, hémorragie grave, insuffisance rénale nécessitant un épuration, parasitémie > 15 %.
- *Unité de surveillance continue* :
  - risque d'aggravation rapide (confusion/obnubilation, convulsion isolée, hémorragie mineure, ictère franc isolé, parasitémie entre 10 et 15 %, insuffisance rénale modérée, anémie isolée bien tolérée) ;

– patients vulnérables (âgé, comorbidités, co-infection bactérienne, traitement par quinine IV).

- *Unité de médecine* : aucun précédent, y compris parasitémie isolée < 10 %, ictère isolé.

#### Les enfants :

- *Réanimation* : un critère de gravité OMS : prostration, dysfonction d'organe (trouble de conscience, convulsions, dyspnée ou défaillance circulatoire), hypoglycémie.
- *Soins continus ou en pédiatrie générale* : absence de ces signes de gravité y compris en cas de parasitémie isolée < 10 %.

### Critères de gravité de l'accès palustre à *P. falciparum* (OMS)\*

#### Signes mineurs

- Obnubilation ou prostration.
- Parasitémie  $\geq 5\%$  chez un sujet non immun.
- Ictère avec bilirubinémie > 50  $\mu\text{mol/L}$ .
- Hyperthermie (> 41 °C) ou hypothermie (< 36 °C).

#### Signes majeurs

- Troubles de conscience.
- Crises convulsives généralisées répétées.
- Collapsus.

- Hémoglobinurie massive.
- Hémorragie diffuse, coagulation intravasculaire disséminée.
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumopathie associée.
- Insuffisance rénale (diurèse < 400 mL, créatininémie > 265  $\mu\text{mol/L}$ ).
- Acidose métabolique (pH < 7,25, bicarbonates < 15 mmol/L).
- Hypoglycémie < 2,2 mmol/L.

\* NB : Les vomissements imposent un recours à la **quinine** intraveineuse.

## ANTIPALUDÉENS (11)

## Interactions médicamenteuses entre antipaludéens et immunosuppresseurs\*

	Modification de l'exposition (AUC**)				Métabolisme par le CYP3A4
	de la ciclosporine	du tacrolimus	du sirolimus	du mycophénolatemofétil	
<b>Chloroquine</b>	Oui	Non***	Non	Non	Oui
<b>Proguanil</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Atovaquone</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Méfloquine</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Doxycycline</b>	Oui****	Non	Non	Non	Non

## Adaptation des doses d'antipaludéens chez l'insuffisant rénal

Clairance de la créatinine (mL/min)	90-60	60-30	30-15	< 15 et hémodialyse	Dialyse péritonéale continue ambulatoire
<b>Chloroquine NIVAQUINE</b>	100 à 50 mg/j	60-40 mL/min : 50 mg/j 40-30 mL/min : 50 à 25 mg/j	25 mg/j	12,5 mg/j après la séance	12,5 mg/j
<b>Paludrine PROGUANIL</b>	200 mg/j	100 mg/j	50 mg toutes les 48 h	50 mg/sem. après la séance	50 mg/sem.
<b>Choroquine + proguanil SAVARINE</b>	80-90 mL/min : 1 cp./j 60-80 mL/min : administrer les 2 principes actifs séparément	60-40 mL/min : 1/2 cp. 40-30 mL/min : administrer les 2 principes actifs séparément	Administrer les 2 principes actifs séparément		
<b>Proguanil + atovaquone MALARONE</b>	1 cp./j	Adaptation impossible de l' <b>avotaquone</b> Choisir une alternative			
<b>Méfloquine LARIAM</b>	250 mg/sem.			250 mg/sem. après la séance	250 mg/sem.
<b>Doxycycline DOXYPALU</b>	100 mg/j			100 mg/j Non dialysable	100 mg/j

\* ICAR 2006, [www.soc-nephrologie.org/ICAR/lettre.htm](http://www.soc-nephrologie.org/ICAR/lettre.htm)

\*\* Aire sous la courbe

\*\*\* Pas de cas rapportés, mais une interaction est théoriquement possible par analogie avec la **ciclosporine** ou par interaction au niveau des transporteurs

\*\*\*\* Cas isolé

**PALUDISME (12)****Critères de la prise en charge ambulatoire chez l'adulte**

Tous les critères suivants doivent être vérifiés :

- Diagnostic parasitologique fiable (contact direct entre clinicien et biologiste).
- Pas de situation d'échec d'un premier traitement.
- Paludisme simple, sans aucun signe de gravité (voir Encadré).
- Pas de trouble digestif (vomissement, diarrhée importante).
- Parasitémie  $< 2\%$ .
- Plaquettes  $> 50\,000/\text{mm}^3$ .
- Hémoglobine  $> 10\text{ g/dL}$ .
- Créatininémie  $< 150\text{ }\mu\text{mol/L}$ .
- Absence de facteur de risque : sujet physiologiquement âgé, fragilisé par une maladie sous-jacente, notamment cardiopathie, splenectomie.
- Pas de grossesse.
- Patient entouré.
- Garantie d'une bonne observance et d'une bonne compréhension des modalités du traitement (déficit intellectuel, difficultés linguistiques, etc.)
- Garantie d'une délivrance immédiate du traitement à la pharmacie (enquête économique auprès du patient, disponibilité d'un stock d'antipaludiques dans les pharmacies de proximité).
- Résidence à proximité d'un établissement hospitalier, contact médical identifié, n° de téléphone fourni.
- Possibilité d'une consultation de suivi à J3, J7 et J28 (à défaut, possibilité d'appel téléphonique pour s'enquérir d'une évolution favorable).

**Critères de la prise en charge ambulatoire chez l'enfant**

Une hospitalisation durant toute la durée du traitement est recommandée chez le grand enfant, pour des traitements d'une durée  $> 24\text{ h}$ .

Un traitement à domicile est possible après prise en charge initiale dans une unité d'hospitalisation de courte durée si :

- bon déroulement des premières prises de traitement ;
- fiabilité du milieu familial ;
- possibilité de revoir l'enfant en consultation à J3 (H72), J7 (si parasitologie + à J3) et J28 ;
- tous les critères adultes sont réunis.

**CONSENSUS**

[1] Protection personnelle antivectorielle - protection contre les insectes piqueurs et les tiques, SMV et SFP, 2010

**NOTES**

## PARASITOSE DIGESTIVES (1)

Six helminthiases constituent les plus fréquentes parasitoses digestives. Rares en France, elles représentent un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Elles se transmettent par voie fécale-orale (sauf les tœniases). Le diagnostic se fait par la découverte des œufs ou des larves dans les selles. Ascariodose, ankylostomose et anguillulose s'accompagnent d'une éosinophilie sanguine évocatrice.

### Oxyurose

*Enterobius vermicularis* est le nématode responsable de la plus fréquente et de la plus bénigne helminthiase. Les adultes femelles qui vivent dans le cæcum pondent leurs œufs la nuit près de la marge anale. Ceci entraîne un prurit qui favorise la contamination manuportée. Les œufs sont suffisamment légers pour être véhiculés par la poussière. L'oxyurose est cosmopolite et fréquente chez les enfants et leur entourage.

### Diagnostic

- Asymptomatique ou prurit anal.
- « Scotch-test » : recherche des œufs par l'application de ruban adhésif le matin avant la toilette sur la marge anale secondairement collé sur une lame pour examen microscopique.
- Les adultes peuvent être parfois découverts dans les selles (test moins sensible).
- L'hyperéosinophilie est inconstante.

### Traitement

- Traiter tout l'entourage.
- Couper les ongles courts, se laver les mains.

- Laver tout le linge souillé le jour du traitement.

- Au choix : **FLUVERMAL** 100 mg en 1 prise quel que soit le poids, **COMBANTRIN** 12,5 mg/kg en 1 prise, **ZENTEL** 200 mg en 1 prise quel que soit l'âge.

Refaire une 2<sup>e</sup> cure 15 j plus tard.

Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Ascariodose

*Ascaris lombricoides* est un nématode qui mesure à l'état adulte plus de 15 cm de long, vit dans l'intestin grêle. Il se nourrit du contenu intestinal. Les œufs libérés dans les selles peuvent rester plusieurs années dans le milieu extérieur. Après ingestion de nourriture souillée, des larves se développent dans l'intestin, traversent la paroi digestive et atteignent par voie sanguine les poumons. Elles remontent la trachée jusqu'à l'œsophage où elles sont dégluties pour accéder à l'intestin et atteindre le stade adulte.

### Diagnostic

- Syndrome de Loeffler avec éosinophilie pendant la phase pulmonaire ; nausées, anorexie, troubles digestifs à la phase d'état. Complications : occlusion intestinale ; migration vers le cholédoque, le nez, l'urètre ; perforation digestive ; contribue à la malnutrition en pays pauvres.
- Sérologie à la phase de migration, découverte des œufs à l'examen des selles à la phase d'état.

### Traitement

- Au choix : **VERMOX** 200 mg x 2/j pendant 3 j, **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **COMBANTRIN** 10 mg/kg en 1 prise, **ZENTEL** 400 mg en 1 prise.
- Contrôle parasitologique à 2 mois.

## PARASITOSE DIGESTIVES (1)

Six helminthiases constituent les plus fréquentes parasitoses digestives. Rares en France, elles représentent un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Elles se transmettent par voie fécale-orale (sauf les tœniases). Le diagnostic se fait par la découverte des œufs ou des larves dans les selles. Ascariodose, ankylostomose et anguillulose s'accompagnent d'une éosinophilie sanguine évocatrice.

### Oxyurose

*Enterobius vermicularis* est le nématode responsable de la plus fréquente et de la plus bénigne helminthiase. Les adultes femelles qui vivent dans le cæcum pondent leurs œufs la nuit près de la marge anale. Ceci entraîne un prurit qui favorise la contamination manuportée. Les œufs sont suffisamment légers pour être véhiculés par la poussière. L'oxyurose est cosmopolite et fréquente chez les enfants et leur entourage.

### Diagnostic

- Asymptomatique ou prurit anal.
- « Scotch-test » : recherche des œufs par l'application de ruban adhésif le matin avant la toilette sur la marge anale secondairement collé sur une lame pour examen microscopique.
- Les adultes peuvent être parfois découverts dans les selles (test moins sensible).
- L'hyperéosinophilie est inconstante.

### Traitement

- Traiter tout l'entourage.
- Couper les ongles courts, se laver les mains.

- Laver tout le linge souillé le jour du traitement.

- Au choix : **FLUVERMAL** 100 mg en 1 prise quel que soit le poids, **COMBANTRIN** 12,5 mg/kg en 1 prise, **ZENTEL** 200 mg en 1 prise quel que soit l'âge.

Refaire une 2<sup>e</sup> cure 15 j plus tard.

Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Ascariodose

*Ascaris lombricoides* est un nématode qui mesure à l'état adulte plus de 15 cm de long, vit dans l'intestin grêle. Il se nourrit du contenu intestinal. Les œufs libérés dans les selles peuvent rester plusieurs années dans le milieu extérieur. Après ingestion de nourriture souillée, des larves se développent dans l'intestin, traversent la paroi digestive et atteignent par voie sanguine les poumons. Elles remontent la trachée jusqu'à l'œsophage où elles sont dégluties pour accéder à l'intestin et atteindre le stade adulte.

### Diagnostic

- Syndrome de Loeffler avec éosinophilie pendant la phase pulmonaire ; nausées, anorexie, troubles digestifs à la phase d'état. Complications : occlusion intestinale ; migration vers le cholédoque, le nez, l'urètre ; perforation digestive ; contribue à la malnutrition en pays pauvres.
- Sérologie à la phase de migration, découverte des œufs à l'examen des selles à la phase d'état.

### Traitement

- Au choix : **VERMOX** 200 mg x 2/j pendant 3 j, **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **COMBANTRIN** 10 mg/kg en 1 prise, **ZENTEL** 400 mg en 1 prise.
- Contrôle parasitologique à 2 mois.

## ANTI-HELMINTHIQUES (1)

## ■ Flubendazole

<b>FLUVERMAL</b>				
Oxyurose (en 1 prise unique à renouveler 2-3 sem. plus tard) E. : 100 mg, A. : 200 mg Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose : A. et E. : 100 mg x 2/j pendant 3 j	6 càc (fl. 100 mg/càc) 6 cp. séc. 100 mg	3,59 3,29	65 % 65 %	0,60 0,55

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé du mébendazole actif sur les helminthes.

**INDICATIONS**

– Oxyurose : enfants : croquer 1 cp. à 100 mg (quel que soit l'âge). Adultes : 200 mg en 2 prises espacées de 10-12 h. Renouveler la cure après 2 à 3 sem. pour éviter l'autoréinfestation. Traiter les autres membres de la famille + mesures hygiéno-diététiques.

– Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose : 200 mg/j pendant 3 j à prendre en 2 prises espacées de 10-12 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Occasionnels : nausées, diarrhées, douleurs abdominales, migration de l'ascaris à travers la bouche et le nez.

## ■ Pamoate de pyrantel

<b>COMBANTRIN</b>				
Ascariidase, oxyurose (en 1 prise per os) : 10 mg/kg en 1 prise per os : 10 mg/kg en 1 prise unique Ankylostomose et nécatérose : 2 cp. pour 10 kg pendant 2-3 j	6 cp. séc. 125 mg 6 mes. (susp. buv. à 125 mg/mes.)	2,73 3,02	65 % 65 %	0,46 0,50
<b>HELMINTOX</b>				
Idem <b>COMBANTRIN</b> + Trichinose : 10-15 mg/kg en 1 prise unique	6 cp. séc. 125 mg 3 cp. séc. 250 mg 6 mes. (susp. buv. à 125 mg/mes.)	2,11 2,50 2,32	65 % 65 % 65 %	0,35 0,83 0,39

**PROPRIÉTÉS**

**Anti-helminthiques** paralysant les vers qui vont être éliminés par le péristaltisme intestinal.

**INDICATIONS**

– Oxyurose, ascariidase et ankylostomose peu sévère à *Ankylostoma duodenale* : 10 mg/kg en 1 prise.  
– Ankylostomose sévère à *A. duodenale* ou nécatérose *Necator americanus* : 1 à 2 cp./10 kg pendant 2-3 j consécutifs.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non établie.

Insuffisance hépatique.

Association à la **pipérazine**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (15 %) : anorexie, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales.

Rares : céphalées, somnolence, vertiges, rashes, élévation modérée et transitoire des transaminases.



## PARASITOSE DIGESTIVES (2)

### Trichocéphalose

*Trichuris trichiuria* est un nématode qui vit à l'état adulte fixé dans la muqueuse cæcale. Son cycle est très proche d'*Ascaris*. Les enfants peuvent être infestés massivement.

#### Diagnostic

- Asymptomatique ou diarrhée chronique favorisant la dénutrition et le retard de croissance. Prolapsus rectal en cas d'infestation massive.
- Découverte des œufs dans les selles.

#### Traitement

- Au choix : **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **ZENTEL** 200 à 400 mg en 1 prise.
- Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Ankylostomose

*Necator americanus* et *Ankylostoma duodenale* sont responsables dans les régions intertropicales de l'infestation de 20 à 70 % de la population. Leurs œufs qui résident dans le sol donnent des larves capables de traverser activement la peau de l'hôte. Elles gagnent la circulation sanguine puis le poumon pour être enfin dégluties vers le duodénum. Après s'être fixés par leur large bouche dans la muqueuse duodénale, les adultes se nourrissent du sang de l'hôte.

#### Diagnostic

- Dermatite et syndrome de Loeffler pendant la phase d'invasion ; douleurs abdominales, nausées, anémie par carence martiale, œdèmes.
- Découverte des œufs dans les selles.

#### Traitement

- Au choix : **VERMOX** 200 mg x 2/j (adultes) ou 3 mg/kg/j (enfants) pendant

3 j, **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **COMBANTRIN** 12,5 mg/kg/j (ou 3 cp. à 125 mg x 2/j chez l'adulte) pendant 2 j, **ZENTEL** 400 mg en 1 prise.

Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Anguillulose

*Strongyloides stercoralis* vit dans les pays tropicaux (y compris les Antilles françaises). Le cycle parasitaire est très proche de celui des ankylostomes. Des réinfestations sont possibles et expliquent la persistance de la maladie pendant plusieurs décennies (une hyperéosinophilie chronique). À l'occasion d'une immunodépression (corticothérapie), une forme généralisée peut survenir (anguillulose maligne) dont l'évolution est souvent mortelle.

#### Diagnostic

- À la phase de migration : syndrome de Loeffler possible ; à la phase d'état : asymptomatique, troubles digestifs, diarrhée.
- Hyperéosinophilie oscillante.
- Découverte des larves dans les selles par la technique de concentration de Baermann (excrétion intermittente nécessitant  $\geq 3$  examens de selles).
- Sérologie peu sensible et peu spécifique.

#### Traitement

- Au choix : ivermectine **STROMEKTOL** 200 µg/kg (12 mg chez l'adulte) en 1 prise unique (85-90 % de guérison) ou **ZENTEL** 10 mg/kg pendant 7 j pour une efficacité équivalente car à la dose de l'AMM (1 cp./j x 3 j), l'efficacité est de 40 %.
- Contrôle parasitologique tous les mois pendant 6 mois.

Un traitement prophylactique est nécessaire avant un traitement par **corticoïde** ou **immunosuppresseur** chez un malade issu d'une zone d'endémie.

## ANTI-HELMINTHIQUES (2)

## ■ Albendazole

ZENTEL					
Ascariodose, oxyurose, trichocéphalose, ankylostomose : 400 mg en 1 prise orale à renouveler 15-20 j plus tard A. et E. > 2 ans (oxyure : 200 mg suffisent chez l'enfant de 2-6 ans) Strongyloïdose : 800 mg/j x 3 j à renouveler 2-3 sem. plus tard Neurocysticercose : 5 mg/kg/j en 2-3 prises x 8 j associées à une corticothérapie	1 cp. 400 mg 1 fl. de susp. buv. 400 mg	3,69	II	65 %	3,69
		3,96	II	65 %	3,96
ESKAZOLE					
Idem ZENTEL	56 cp. 400 mg	HOP	II		

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé des benzimidazoles, inhibiteur de la polymérisation de la  $\beta$ -tubuline qui agit sur de nombreux cestodes et nématodes.

**INDICATIONS**

- Ascariodose (90 % de succès), oxyurose (100 % de succès), ankylostomose (70-90 % de succès), trichocéphalose (35-72 % de succès).
- Strongyloïdose (90 % de succès).
- Neurocysticercose active (80-90 % de succès).
- Hydatidose en complément du geste chirurgical.
- Proposé dans la trichinose et la *larva migrans*.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ingérer au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive.  
Renouveler la cure 2 à 3 sem. plus tard.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, élévation des transaminases, rashs, prurit, céphalées, convulsions, alopecies, leuconeutropénie, migration de l'ascaris à travers la bouche.

## PARASITOSE DIGESTIVES (3)

### Tæniase

*Taenia saginata* (tænia du bœuf) et *Taenia solium* (tænia du porc) sont des vers segmentés qui sont fixés dans l'intestin grêle et libèrent des segments (ou anneaux) contenant des œufs. Ils se nourrissent par osmose et peuvent persister pendant plusieurs années. La contamination se fait en consommant des viandes contaminées insuffisamment cuites. Leur distribution est cosmopolite mais le tænia du bœuf est le plus fréquent.

### Diagnostic

- Asymptomatique ou troubles digestifs modérés. Complications possibles en raison de localisation extradigestive du tænia du porc (cysticercose). La neurocysticercose est ainsi la 1<sup>re</sup> cause d'épilepsie secondaire au Mexique.
- Hyperéosinophilie modérée.
- Découverte des œufs de *T. saginata* dans les selles ou de ses anneaux dans les selles ou les sous-vêtements. Les anneaux de *T. solium* sont mélangés aux matières

fécales et nécessitent un examen parasitologique des selles.

### Traitement

Au choix : **praziquantel (BILTRICIDE)** 10-15 mg/kg en une prise, ou **niclosamide (TRÉDÉMINE)** 4 cp. après 7 ans, 2 cp. entre 2 et 7 ans, 1 cp. avant 2 ans en 2 prises espacées de 1 h à mastiquer lentement à jeun et à avaler avec un peu d'eau, chez un malade au repos ; puis attendre avant de s'alimenter.

Cysticercose : **albendazole (ZENTEL)** 15 mg/kg/j x 8 j ou **praziquantel (BILTRICIDE)** 50 mg/kg en 2 prises pendant 15 j. Associer une corticothérapie. Traitement chirurgical dans les formes graves.

### Autres tæniases

*Hymenolepis nana* ou petit tænia (15 mm), de découverte souvent fortuite se traite par **praziquantel (BILTRICIDE)** 15-20 mg/kg en une prise, *Diphyllobothrium latum* (4-9 m de long), tænia des poissons, se traite par **niclosamide (TRÉDÉMINE)** : voir ci-dessus.

## RAGE (1)

### Virologie

La rage est une zoonose mondiale due à un virus neurotrope (genre *Lyssavirus*). Après inoculation, le virus gagne les nerfs périphériques puis remonte vers le système nerveux central avec un délai qui dépend de l'inoculum et du site de la morsure. Pendant cette latence (période d'incubation), il est possible de prévenir la maladie par un traitement spécifique. Les premiers signes débutent par une douleur ou des paresthésies dans le territoire d'inoculation quand le virus se multiplie dans les ganglions spinaux. L'encéphalite fatale se développe peu après avec une diffusion centrifuge du virus principalement vers les glandes salivaires.

### Épidémiologie

La contamination humaine se fait par les mammifères infectés qui constituent le réservoir de la maladie.

Les chiens sont responsables de > 99 % des cas de rage animale et humaine dans le monde à l'exception de l'Europe et de l'Amérique du Nord où ce sont des mammifères sauvages (renard, putois, etc.). La contamination se fait par morsure, exceptionnellement par voie aérienne. La rage des chauve-souris est en augmentation en Europe. Le virus ne traverse pas la peau saine.

### Clinique

Toute morsure doit être considérée comme enragée jusqu'à preuve du contraire.

- **Incubation** entre 20 et 90 j, 95 % des cas dans l'année.

- **Phase prodromique** (2-10 j) non spécifique.
- **Phase neurologique aiguë** : forme paralytique flasque ou forme furieuse (état d'agitation majeure fébrile avec hydrophobie et aérophobie).
- **Décès** dans tous les cas en 3-4 j.

### Diagnostic

**Intra-vitam** : recherche du virus (antigène rabique par immunofluorescence) dans la salive ou dans des biopsies de follicules pileux de la nuque.

**Post-mortem** : recherche d'antigène rabique dans le tissu cérébral, inoculation de broyats sur culture cellulaire.

### Conduite à tenir après une morsure [1]

#### Diagnostic de la rage chez l'animal

- **Animal capturé** : surveillance pendant 14 j des chats et des chiens (3 certificats à J1, J7, J14) ou 28 j en cas d'animal sauvage.

Si la rage ne s'est pas déclarée après ce délai, l'animal n'était pas infecté.

- **Animal mort ou tué** : la tête doit être adressée dans la glace à l'Institut Pasteur pour recherches virales.

#### Traitement local

- Urgence thérapeutique.
- Laver immédiatement la plaie à l'eau savonneuse, rincer à l'eau pure et désinfecter avec un **antiseptique** (**BÉTADINE**).
- Pas de suture sauf pronostic fonctionnel ou esthétique. Prophylaxie antitétanique selon le statut vaccinale.
- Antibiothérapie par **AUGMENTIN** en prévention primaire d'une infection à pyogènes.

## RAGE (2)

### Traitement spécifique après exposition

- À décider en centre antirabique.
- Maladie professionnelle, déclaration obligatoire.
- Toute morsure doit être considérée comme une exposition au virus rabique jusqu'à preuve du contraire.
- Urgence thérapeutique si l'animal est manifestement enragé. Aucune contre-indication vaccinale.
- Décider de la sérothérapie ou de la vaccination en fonction du risque endémique, de l'animal en cause, du siège et des circonstances de la morsure (cf. Tableau), et de la possibilité du diagnostic de la rage chez l'animal en cause.
- On peut différer le traitement en cas de diagnostic de certitude sous 48 h, ou de morsure avec un chien parfaitement vacciné qui peut être gardé en observation 10 j.
- Sérothérapie : uniquement en urgence en cas de morsure grave par un animal manifestement enragé dans un délai < 7 j par immunoglobulines humaines antirabiques 20 UI/kg. Infiltrer la plaie et le pourtour, le reste est administré en IM à un autre site que le vaccin. Inutile en cas de vaccination pré-exposition bien conduite.
- Traitement curatif : il doit être réalisé le plus tôt possible en IM dans le deltoïde selon 2 schémas : 1 dose à J0, J3, J7, J14, J28, ou 2 doses à J0 en 2 sites différents puis 1 dose à J7 et à J28 (sauf immunodéprimés et immunoglobulines). En cas de

vaccination préalable : une dose à J0 et J3 sans sérothérapie, à condition que la vaccination préventive ait été parfaitement faite et que le titre d'anticorps sérique soit satisfaisant.

- Surveillance sérologique semestrielle avec rappel si concentration < 0,5 UI/mL chez les professionnels fréquemment exposés (personnel de laboratoire diagnostique ou production de vaccin); annuelle chez les autres professionnels moins exposés (vétérinaire, garde-forestiers, etc).

### Prophylaxie de la rage humaine [1]

#### Mesures générales

Éviter les contacts avec les animaux errants et sauvages, abattage des animaux malades et suspects, vaccination des animaux domestiques, sauvages, des voyageurs aventureux en zone endémique, spéléologues et catégories professionnelles exposées.

#### Vaccination préventive

Séjour prolongé ou aventureux et en situation d'isolement dans un pays à haut risque (surtout en Asie et notamment en Inde et Chine). Recommandée en particulier chez les jeunes enfants dès l'âge de la marche. Trois injections à J0, J7, J21 ou J28, rappel 1 an plus tard ; durée de protection : 5 ans.

La vaccination préventive ne dispense pas d'un traitement curatif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible en cas d'exposition avérée ou suspectée.

### CONSENSUS

[1] WHO Guide for Rabies Pre and Post-exposure Prophylaxis in Humans, OMS, 2010

## ROUGEOLE

La rougeole est une fièvre éruptive très contagieuse, parfois mortelle, due à un *Morbillivirus* de la famille des *Paramyxoviridae*. L'homme est le seul réservoir connu. Le virus est transmis par l'intermédiaire des sécrétions respiratoires dès la phase invasive. Après une phase virémique, tout l'épithélium respiratoire est envahi puis apparaissent les taches de Koplik qui précèdent le rash cutané. L'immunité post-infection persiste toute la vie. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Étant donné la grande contagiosité de la rougeole, la couverture vaccinale dans la population générale doit être  $\geq 90\%$  pour éviter une épidémie.

### Clinique

#### Forme simple

- **Incubation** : 10-14 j.
- **Phase d'invasion** (4 j) : malaise, fièvre, anorexie, conjonctivite, toux, rhinite, troubles de l'humeur ; forte contagiosité ; les taches de Koplik sont spécifiques de la rougeole.
- **Phase d'état** : éruption cutanée morbilliforme à point de départ céphalique, descendante, généralisée en 3 j.
- **Guérison complète** (7-10 j après le début de la phase d'invasion) : disparition progressive du rash dans l'ordre où il est apparu, desquamation possible.

#### Complications

Respiratoires (**laryngite**, **broncho-pneumonie aiguë**), neurologiques (**encéphalomyélite aiguë morbilleuse** au 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> jour de l'éruption), rougeole maligne (cérébrale et/ou pulmonaire) en particulier chez l'immunodéprimé, prématurité et avortement chez la femme enceinte.

### Traitement

#### Curatif

**Tout cas de rougeole doit être signalé sans délai à l'autorité sanitaire (MDO).** La conduite à tenir (évacuation scolaire, recherche de cas primaire et secondaire, etc.) est détaillée dans la circulaire parue dans le BEH 2005\* . Le kit de confirmation diagnostique par prélèvement salivaire est disponible dans les DDASS.

- Pas d'agent antiviral efficace.
- Désinfection rhinopharyngée, hydratation, **antitussifs**, **antipyrétiques**, prévention des convulsions.
- Traitement antibiotique curatif des surinfections bactériennes.
- Hospitaliser les formes graves et les rougeoles chez les enfants fragiles ou atteints de maladie chronique.

#### Préventif

##### ► Vaccination

- Vaccin vivant atténué, monovalent ou combiné à rubéole et oreillons (**PRIORIX**). Contre-indiqué chez les immunodéprimés, la femme enceinte et avant l'âge de 9 mois.
- La vaccination comprend 2 doses à 1 mois d'intervalle à administrer à partir de l'âge de 12 mois. Elle est avancée à l'âge de 9 mois chez les enfants entrant en collectivité avec une 2<sup>e</sup> dose entre 12 et 15 mois.

##### ► Prophylaxie après exposition [1]

**Vaccination des sujets non immuns** dans les 72 heures après le contact.

Contre-indication vaccinale : pratiquer une sérologie en urgence et une sérothérapie par **gammaglobulines polyvalentes non spécifiques** par voie intraveineuse dans les 6 j post-exposition chez les sujets suivants :

- femme enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole ;
- sujet immunodéprimé ;
- enfants de moins de 6 mois ;
- enfants âgés de 6 à 11 mois non vaccinés en post-exposition.

### CONSENSUS

[1] Prophylaxie des sujets à risque après exposition à un cas confirmé de rougeole, *Afssaps et HAS*, 2011

\* [www.invs.sante.fr/beh/2005/41-42/index.htm](http://www.invs.sante.fr/beh/2005/41-42/index.htm)

## RUBÉOLE

La rubéole est un exanthème viral printanier dû à un *Rubivirus* (famille des *Togaviridae*). Elle survient chez les enfants (5-9 ans) et les adultes jeunes. La transmission se fait par voie aérienne (sécrétions respiratoires) et par voie sanguine (rubéole congénitale). Les malades sont contagieux pendant la phase éruptive et peuvent excréter le virus 10 j avant et 15 j après le rash. Les nouveau-nés atteints de rubéole congénitale peuvent rester contagieux pendant plusieurs mois. Malgré une immunité spécifique définitive, des réinfections asymptomatiques (augmentation d'anticorps spécifiques) sans virémie sont possibles, y compris chez des sujets vaccinés.

### Clinique

Le plus souvent asymptomatique (plus de 80 % des adultes sont immunisés).

- **Incubation** : 12 à 23 j.
- **Phase prodromale** (2 j) : fièvre, malaise, anorexie, adénopathies cervicales postérieures voire splénomégalie.
- **Phase éruptive** (3-5 j) : érythème rubéoliforme qui débute sur le visage puis s'étend aux membres et au tronc, rhinite, conjonctivite, disparition de la fièvre au 2<sup>e</sup> jour de l'éruption.
- **Guérison** : desquamation possible.

### Complications

#### Rubéole congénitale

- Risque de 40-60 % pendant les 2 premiers mois, 30-35 % pendant le 3<sup>e</sup> mois, 10 % pendant le 4<sup>e</sup> mois et occasionnel après 20 sem. de gestation.
- Accouchements prématurés, mort fœtale.
- Malformations : lésions oculaires (cataracte, glaucome), auditives (surdité), nerveuses (retard mental), malformations cardiaques, etc.

- Rubéole congénitale évolutive : infection chronique généralisée avec des lésions pluriviscérales (hypotrophie, hépatite, méningite, lésions osseuses, anomalies neurologiques, etc.) et des séquelles multiples.

#### Arthrites et arthralgies

Présentes chez 1/3 des femmes atteintes de rubéoles, rares chez les hommes et les enfants, elles touchent les doigts, les poignets, les genoux, peuvent persister un mois mais sont exceptionnellement chroniques.

#### Autres

- Purpura (1 cas/3 000), encéphalite (1 cas/5 000).
- Hépatite modérée exceptionnelle.

### Diagnostic

- **Sérologique** (apparition d'IgM ou augmentation de 4 fois du titre d'anticorps). Les réinfections entraînent une réapparition des IgM.
- Par prélèvement de sang du cordon après la 22<sup>e</sup> semaine de grossesse (IgM fœtales).

### Traitement

- Éviction scolaire du malade.
- Immunoglobulines inefficaces.

#### Vaccination

Vaccin combiné avec les oreillons et la rougeole.

Tous les enfants (selon le calendrier vaccinal, cf. Rougeole) pour diminuer le réservoir et le risque de transmission aux femmes enceintes.

- Filles entre 11 et 13 ans.
- Jeunes femmes avant une grossesse (respecter un délai > 2 mois) et en cas de test prénuptial négatif.

## SEPTICÉMIES - ÉTATS SEPTIQUES GRAVES (1)

Toute infection insuffisamment ou non traitée peut évoluer vers un syndrome septique grave. Il est défini par un sepsis avec au moins une dysfonction d'organe qui n'est pas a priori expliquée par une autre cause que l'infection. Seule la reconnaissance précoce des signes de gravité et un traitement adapté permettent d'enrayer la détérioration clinique vers le choc. L'évolution sous traitement aura une valeur importante. Il ne faut pas hésiter à demander un avis spécialisé de réanimation.

- Signes « de dépistage » de la gravité d'une infection : température  $> 38,2^{\circ}\text{C}$  ou  $< 36^{\circ}\text{C}$ , fréquence cardiaque  $> 90/\text{min}$ , fréquence respiratoire  $> 20/\text{min}$  ou pression artérielle systolique  $< 110\text{ mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 < 32\text{ mmHg}$ , globules blancs  $> 12\,000/\text{mm}^3$ ,  $< 4\,000\text{ globules}/\text{mm}^3$  ou  $> 10\%$  de cellules immatures.
- Signes d'hypoperfusion tissulaire : hypoxémie, élévation des lactates, oligurie, troubles de conscience.
- Hypotension : pression systolique  $< 90\text{ mmHg}$  ou diminution  $> 40\text{ mmHg}$  de la pression artérielle sans autre cause d'hypotension.

### Conduite à tenir [1]

#### Suspecter le diagnostic

- Devant de la fièvre, des frissons, une malaise général, une polypnée, une confusion, un purpura fébrile, etc.
- Penser aux causes non infectieuses.

#### Évaluer la gravité du malade

- Terrain sous-jacent.
- Défaillance viscérale.

#### Rechercher la porte d'entrée et des localisations septiques secondaires

Peau, poumons, urines, dispositif intravasculaire, site opératoire, etc.

#### Réaliser les prélèvements biologiques (sans retarder le traitement)

- Microbiologique : ECBU, 2 hémocultures périphériques et sur cathéter central, prélèvement de site infecté ou supposé l'être, etc.
- Lactatémie et gazométrie artérielles, hémogramme, plaquettes, TP, ionogramme sanguin, glycémie, créatinine, bilirubine.

#### Débuter le traitement en urgence et hospitaliser le malade

##### ► Surveillance hospitalière rapprochée des signes vitaux

Fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respiratoire, oxymétrie de pouls, diurèse horaire, conscience pour apprécier l'efficacité du traitement et intervenir promptement en cas d'aggravation secondaire.

##### ► Mesures associées

- **Oxygénation tissulaire** par sonde nasale, masque ou ventilation mécanique.
- **Perfusion par voie veineuse de bon calibre et remplissage vasculaire** par cristalloïdes ou sérum physiologique en évaluant la réponse.
- **Transfusion** en plasma frais congelé en cas de coagulopathie de consommation et en culots globulaires en cas d'anémie sévère.
- **Avis de réanimation** et transfert selon la gravité.



## SEPTICÉMIES - ÉTATS SEPTIQUES GRAVES (2)

► *Antibiothérapie par voie parentérale IV au plus vite*

- **Empirique mais adaptée** aux facteurs prédisposants, aux antécédents bactériologiques du malade, au point de départ et au germe supposé responsable de l'infection, à l'écologie du malade (colonisation connue par des bactéries multirésistantes) et du service. Obtenir les résultats des examens microscopiques au plus vite.

- **En urgence**, les prélèvements bactériologiques sont réalisés au plus vite mais sans retarder le traitement. Les résultats des

examens microbiologiques conduiront à un ajustement thérapeutique dans un 2<sup>e</sup> temps, le plus souvent à 48 heures.

- **Agressive**, par l'association d'**antibiotiques** : élargir le spectre du traitement à l'ensemble des germes possibles ; prévenir la sélection de mutants résistants (présents en petit nombre avant le début du traitement) ; accroître l'efficacité du traitement par l'obtention d'une synergie entre les antibiotiques.

► *Adapter le traitement antibiotique aux résultats bactériologiques*

### Antibiothérapie empirique des infections communautaires graves de l'immunocompétent

SITE DE L'INFECTION	GERMES POSSIBLES	ANTIBIOTIQUES
Peau	Staphylocoques Streptocoques (Anaérobies)	<b>Pénicilline M</b> 100 mg/kg/j en 2 à 4 inj. ou <b>amoxicilline-acide clavulanique</b> 4 à 6 g/j en 3 à 4 inj. + <b>aminoside (gentamicine)</b>
Urines	Entérobactéries	<b>Céfotaxime</b> 1 à 2 g x 3 j ou <b>ceftriaxone</b> 1 à 2 g x 1 j + <b>aminoside (amikacine)</b>
Pourmons (avec comorbidités) [2]	Pneumocoque Klebsielles Légionelles	<b>Céfotaxime</b> 1 à 2 g x 3 j ou <b>ceftriaxone</b> 1 à 2 g x 1 j + <b>macrolides ou fluoroquinolone</b> antipneumococcique
Digestif	Entérobactéries Entérocoque Anaérobies	<b>Céfotaxime</b> ou <b>ceftriaxone</b> + <b>métronidazole</b> 500 mg x 3 j ou <b>ticarcilline-acide clavulanique</b> 12 à 15 g en 3 à 4 inj. + <b>aminoside (amikacine)</b>
Inconnu	Cocci gram-positifs Bacilles gram-négatifs	<b>Céfotaxime</b> ou <b>ceftriaxone</b> + <b>aminoside</b>

### CONSENSUS

[1] Prise en charge initiale des états septiques graves de l'adulte et de l'enfant, *Groupe trans-versal sepsis*, 2007

[2] Infections respiratoires basses de l'adulte : mise au point sur l'antibiothérapie, *Afssaps*, 2010

## SIDA - CLASSIFICATION

### Révision du système de classification de l'infection VIH pour les adultes et les adolescents (1993)\*

NOMBRE DE LYMPHOCYTES T CD4+	CATÉGORIES CLINIQUES		
	(A) ASYMPTOMATIQUE PRIMO-INFECTION OU LGP	(B) SYMPTOMATIQUE SANS CRITÈRES (A) ou (C)	(C) SIDA
> 500/mm <sup>3</sup>	A1	B1	C
200-499/mm <sup>3</sup>	A2	B2	C
< 200/mm <sup>3</sup>	A3	B3	C

#### Classifications du sida de l'adulte et l'adolescent de 1993\*\*

##### Catégorie A

Une des ces maladies, si elle ne s'accompagne d'aucune autre des catégories B et C :

- infection VIH asymptomatique ;
- lymphadénopathie généralisée persistante ;
- primo-infection symptomatique.

##### Catégorie B

Une de ces maladies, en l'absence d'aucune de la catégorie C, et si :

- elles sont liées au VIH ou indicatives d'un déficit immunitaire ;
- elles ont une évolution clinique ou une prise en charge thérapeutique compliquée par l'infection VIH.
- angiomatose bacillaire ;
- candidose oropharyngée ;
- candidose vaginale, persistante, fréquente ou qui répond mal au traitement ;
- dysplasie du col (modérée ou grave), carcinome *in situ* ;
- syndrome constitutionnel : fièvre ( $\geq 38,5$  °C) ou diarrhée supérieure à 1 mois ;
- leucoplasie chevelue de la langue ;
- zona récurrent ou  $\geq 1$  dermatome ;
- purpura thrombocytopénique idiopathique ;
- salpingite, en particulier lors de complications par des abcès tubo-ovariens ;
- neuropathie périphérique.

##### Catégorie C (maladies classant le sida)

- cachexie due au VIH ;
- candidose bronchique, trachéale, œsophagienne ou pulmonaire ;

- cancer invasif du col\*\*\* ;
- coccidioïdomycose, disséminée ou extrapulmonaire ;
- cryptococcose extrapulmonaire ;
- cryptosporidiose intestinale  $\geq 1$  mois ;
- infection à CMV (autre que foie, rate ou ganglions) ;
- rétinite à CMV (avec altération de la vision) ;
- encéphalopathie due au VIH ;
- infection herpétique, ulcères chroniques  $\geq 1$  mois, ou bronchique, pulmonaire, ou œsophagienne ;
- histoplasmosse disséminée ou extrapulmonaire ;
- isosporidiose intestinale chronique ( $\geq 1$  mois) ;
- sarcome de Kaposi ;
- lymphome de Burkitt, immunoblastique ou cérébral primitif ;
- infection à *Mycobacterium avium* ou *M. kansasii*, disséminée ou extrapulmonaire ;
- infection à *M. tuberculosis* ;
- infection à mycobactérie, identifiée ou non, disséminée ou extrapulmonaire ;
- pneumonie à *Pneumocystis carinii* ;
- pneumopathie bactérienne récurrente ;
- leuco-encéphalopathie multifocale progressive ;
- septicémie récurrente à *Salmonella non typhi* ;
- toxoplasmosse cérébrale ;

\* Correspondance entre valeur absolue et pourcentage des lymphocytes T CD4+ : CD4  $\geq 500/\text{mm}^3$  :  $\geq 29$  % ; CD4+ 200-499/mm<sup>3</sup> : 14-28 % ; CD4+ < 200/mm<sup>3</sup> : < 14 %.

\*\* Cette catégorie est hiérarchique, c'est-à-dire qu'un sujet classé dans la catégorie B ne peut passer dans la catégorie A lorsque les signes cliniques ont disparu.

\*\*\* Nouvelles pathologies ajoutées en 1993.

## SIDA - PROPHYLAXIES PRIMAIRES (1)

De nombreux micro-organismes peuvent profiter de l'immunodépression liée au VIH pour occasionner des infections (dites opportunistes). Elles représentent encore une cause fréquente de maladie et de décès chez les malades ayant des lymphocytes CD4  $< 200/\text{mm}^3$ . Pour celles détaillées ici, il existe un traitement prophylactique qui permet de prévenir leur apparition chez les malades à risque [1]. Ces traitements appelés prophylaxies primaires font l'objet de recommandations dans la prise en charge des malades infectés par le VIH.

L'infection par le VIH est à déclaration obligatoire.

### **Pneumocystose pulmonaire**

Due à *Pneumocystis jirovecii*.

#### **Prophylaxie systématique**

- CD4  $\leq 200/\text{mm}^3$  ou  $< 15\%$  des lymphocytes totaux, corticothérapie prolongée ou chimiothérapie.

#### **Traitement de référence (combiné contre la toxoplasmose)**

**Cotrimoxazole (BACTRIM ou BACTRIM FORTE)** 1 cp./j prophylaxie combinée contre la toxoplasmose cérébrale et de nombreuses infections bactériennes. Allergie minime ou modérée : tenter de poursuivre le traitement.

#### **En 2<sup>e</sup> intention (inactif contre la toxoplasmose)**

- Aérosol mensuel de **pentamidine** 300 mg.
- **Atovaquone WELLVONE**, 1 500 mg/j.

#### **Arrêt de prophylaxie**

- Si CD4  $> 200/\text{mm}^3$  pendant plus de 3 mois, à reprendre si  $< 200/\text{mm}^3$  ou déficite immunitaire (chimiothérapie).

### **Toxoplasmose cérébrale**

Due à *Toxoplasma gondii*.

#### **Prophylaxie systématique**

- Sérologie négative et CD4  $< 200/\text{mm}^3$  : surveillance sérologique annuelle.
- Sérologie positive et CD4  $< 100/\text{mm}^3$  : prophylaxie médicamenteuse.
- Dans tous les cas : laver les légumes crus, manger la viande bien cuite, éviter le contact avec les chats et leur litière.

#### **Prophylaxie de référence**

- **Cotrimoxazole (BACTRIM FORTE)** (combinée contre la pneumocystose).
- Possibilité d'arrêt idem pneumocystose.

### **Tuberculose**

C'est un mode de découverte de l'infection par le VIH. Fréquence accrue de formes disséminées et/ou résistantes aux antituberculeux. La vaccination par le BCG est contre-indiquée.

L'intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et les tests de détection de la production d'interféron gamma sont difficiles à interpréter et ne permettent pas toujours de déceler une tuberculose latente (faux négatifs). Le traitement est à discuter au cas par cas.

#### **Prévention de l'exposition**

Isolement des patients infectés et surveillance des soignants et des sujets contacts. En cas de risque élevé d'exposition, surveillance clinique et radiologique annuelle à proposer.

## **CONSENSUS**

[1] Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, Groupe d'experts (Rapport Yeni), 2010

## SIDA - PROPHYLAXIES PRIMAIRES (2)

### Traitement d'une tuberculose latente

- Après contage avec un tuberculeux bacillifère et exclusion d'une tuberculose évolutive.
- Quantiféron ou IDR positive ( $> 5$  mm), pas de prophylaxie antérieure (après exclusion d'une tuberculose évolutive).
- Modalités :
  - isoniazide (**RIMIFON**) 300 mg/j + vitamine B6 50 mg/j pendant 9 mois ;
  - isoniazide (**RIMIFON**) 300 mg/j + rifampicine 600 mg/j + vitamine B6 50 mg/j pendant 3 mois mais interactions médicamenteuses importantes ;
  - rifampicine 600 mg/j + pyrazinamide 20 mg/kg/j pendant 2 mois mais risque d'hépatite grave et interactions médicamenteuses importantes.

### Pneumocoque

Le vaccin antipneumococcique est recommandé au diagnostic de l'infection par le VIH (si  $CD4 > 200/mm^3$ ) puis tous les 5 ans.

Arrêt du tabagisme.

### Infection généralisée à *Mycobacterium avium complex*

#### Prophylaxie proposée

Retarde la survenue d'une infection à MAC.

Chez les malades dont le nombre de  $CD4 \leq 75/mm^3$  si les hémocultures à la recherche de MAC sont négatives.

#### Traitements disponibles

- Azithromycine (**AZADOSE**) 2 cp. à 600 mg/sem.
- Peut sélectionner des souches de MAC résistantes aux **macrolides**, conduire à un

échec de la prophylaxie et compromettre un traitement curatif.

- Possibilité d'arrêt si  $CD4 > 100/mm^3$  au moins 3 mois et reprendre si  $< 75/mm^3$ .
- Alternative : surveillance clinique simple.

### Autres pathogènes

Il n'est pas recommandé de démarrer des prophylaxies primaires contre les infections suivantes : cryptococcose, candidose, histoplasmosse, herpesvirus simplex, et cytomégalovirus (même en cas de PCR positive dans le sang).

### Vaccination

- *Vaccins inertes*
  - Diphtérie, tétanos, poliovirus : une injection de rappel tous les 10 ans.
  - Hépatite B : primovaccination renforcée par 4 injections (J0, M1, M2, M6), contrôle des Ac anti-HBs à M7. Faire 1 à 3 injections supplémentaires en l'absence de réponse. Contrôle annuel des Ac anti-HBs.
  - Hépatite A : si sérologie négative. Primovaccination par 2 injections avec contrôle sérologique à 1 mois.
  - Pneumocoque : vaccination recommandée quel que soit le taux de  $CD4$ , avec rappel tous les 5 ans. Arrêt du tabagisme.
  - Grippe : vaccination annuelle
- *Vaccins vivants atténués*

Contre-indication lorsque les  $CD4$  sont  $< 200/mm^3$  ou 15 %.

  - BCG : contre-indiqué quel que soit le degré d'immunodépression.
  - Rougeole, oreillons, rubéole : 2 injections en cas de sérologie négative.
  - Fièvre jaune : mêmes indications que chez l'immunocompétent. Contrôle de la sérologie postvaccinale.
  - VZV : indiquée en l'absence de varicelle.

## SIDA - SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE

### Indications du traitement antirétroviral et des prophylaxies en fonction du nombre de CD4\*

NOMBRE DE CD4 (/mm <sup>3</sup> )	TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL	PROPHYLAXIES
> 350	Non recommandé	Vaccinations du calendrier vaccinal dont pneumocoque Mesures hygiéno-diététiques contre la toxoplasmose (sérologie négative) Prophylaxie de l'herpès récidivant Tuberculose (IDR positive et contage important)
200-350	Recommandé	Reprendre une prophylaxie préalablement interrompue
< 200	Recommandé	Pneumocystose (systématique) Toxoplasmose (si sérologie positive)
< 50	Recommandé	Fond d'œil tous les 1 à 3 mois (si sérologie CMV+) Mycobacterium avium (envisageable)

### Prophylaxies primaires

INFECTION OPPORTUNISTE	TRAITEMENT DE 1 <sup>re</sup> INTENTION	TRAITEMENT DE 2 <sup>e</sup> INTENTION
Combinée contre la pneumocystose et la toxoplasmose	<b>BACTRIM</b> ou <b>BACTRIM FORTE</b> 1 cp./j	<b>Dapsone</b> 50 mg/j + <b>pyriméthamine</b> 50 mg/sem. + <b>acide folinique</b> 25 mg/sem.
Pneumocystose seule		Aérosol de <b>pentamidine</b> 300 mg/mois <b>Atovaquone</b> 750 mg x 3/j <b>Dapsone</b> 50 à 100 mg/j
<i>Mycobacterium avium</i> complex	<b>Azithromycine</b> 2 cp. à 600 mg/sem.	
Tuberculose	<b>Isoniazide RIMIFON</b> 300 mg/j + <b>vitamine B6</b> 50 mg/j pendant 9 mois <b>Isoniazide RIMIFON</b> 300 mg/j + <b>rifampicine</b> 600 mg/j + <b>vitamine B6</b> 50 mg/j pendant 3 mois <b>Rifampicine</b> 600 mg/j + <b>pyrazinamide</b> 20 mg/kg/j pendant 2 mois	
CMV	Fond d'œil mensuel et surveillance PCR-CMV en cas de CD4 < 50/mm <sup>3</sup> et sérologie CMV+	
Pneumocoque	Vaccin <b>PNEUMO 23</b>	
Hépatite A	Vaccination des sujets à risque (homosexuels masculins)	

\* Examen gynécologique avec frottis systématique tous les ans, et/ou anoscopie si rapports non protégés.

## SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (1)

### Charge virale

La réplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est quantifiable par une mesure de la charge virale plasmatique exprimée en nombre de copies d'ARN viral par mL (souvent exprimée en  $\log_{10}$ /mL). Associée à une numération des lymphocytes CD4, elle sert à suivre l'efficacité du traitement antirétroviral. Les variations de la charge virale sont plus précoces que celles des CD4. Des augmentations transitoires surviennent en cas d'infections intercurrentes, ou même sous traitement efficace (augmentation < 1 000 copies/mL). En cas de variations > 1 000 copies/mL, un contrôle s'impose avant de suspecter un échappement thérapeutique.

### Objectifs du traitement

L'objectif du traitement antirétroviral (ARV) est d'obtenir une charge virale indétectable à 6 mois. Des contrôles intermédiaires permettent d'évaluer la réponse au traitement : à M1, la charge virale doit avoir baissé de 2 log, et à M3 elle doit être inférieure à 400 copies/mL. En l'absence d'atteinte de ces objectifs, rechercher une mauvaise observance, des interactions néfastes, et doser les ARV. D'autres objectifs doivent être recherchés : meilleure tolérance possible, préservation de la qualité de vie et réduction du risque de transmission du virus.

### Médicaments antirétroviraux

#### Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)

Ce sont des analogues nucléosidiques qui doivent être phosphorylés par des enzymes intracellulaires pour être actifs. Ils sont alors incorporés par la transcriptase inverse, à la place des nucléosides naturels, dans l'ADN viral en cours de synthèse

et bloquent son élongation. Ils n'y a pas de corrélation entre leurs concentrations plasmatiques et leur efficacité : rares indications à les doser (insuffisance rénale). Il faut toujours les associer entre eux ou avec d'autres **antirétroviraux**.

#### Inhibiteurs de protéase (IP)

La protéase du VIH clive un précurseur commun de protéines virales en protéines fonctionnelles. Les **IP** sont des inhibiteurs compétitifs spécifiques, qui empêchent la production de virus matures infectants. Ils ont un effet dépendant de leur concentration sanguine, ce qui justifie de les doser dans leurs concentrations résiduelles dans le plasma dans les cas suivants : échecs, interactions médicamenteuses, sujet âgé, cachexie, obésité, infections opportunistes, insuffisance hépatique, etc. On dosera le pic en cas de suspicion de malabsorption ou d'inobservance. Pour prévenir la sélection de virus résistants, il faut toujours les prescrire en association avec d'autres **antirétroviraux**.

#### Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

Ils agissent en inhibant de façon non compétitive la transcriptase inverse du VIH-1 (mais pas du VIH-2). Il existe une corrélation entre leur effet et leur concentration plasmatique : mêmes indications de dosages que les **IP**. Toujours les prescrire en association avec d'autres **antirétroviraux**.

#### Inhibiteur de fusion

L'**enfuvirtide (FUZEON)** inhibe la fusion du virus aux cellules cibles.

#### Inhibiteurs de l'intégrase

Les anti-intégrases agissent en bloquant l'intégration de l'ADN proviral au génome cellulaire. Le **raltégravir (ISENTRESS)** est le 1<sup>er</sup> commercialisé suivi par le **dolutégravir**.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (1) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (1)

## ■ Zidovudine

<b>RÉTROVIR</b>					
En 2 à 4 prises <i>per os</i> , 30 min avant ou 1 h après le repas	100 gél. 100 mg	135,41	I	100 %	1,35
A. : 500 à 600 mg/j	40 gél. 250 mg	135,41	I	100 %	3,39
E. : 90 à 180 mg/m <sup>2</sup> toutes les 6 h	60 cp. 300 mg	238,30	I	100 %	3,97
	1 fl. 200 mL à 10 mg/mL	30,46	I	100 %	30,46
<b>RÉTROVIR</b> injectable	5 fl. 200 mg	HOP	I		
En perfusion de 1 h en cas de prise orale impossible					
A. : 1 mg/kg toutes les 4 h					

## ■ Lamivudine (ou 3TC) + zidovudine (ou AZT)

<b>COMBIVIR</b>					
A. et E. > 12 ans : 1 cp. x 2/j au cours ou en dehors des repas	60 cp. à 150 mg <b>3TC</b> + 300 mg <b>AZT</b>	294,60	I	100 %	4,91

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la thymidine, qui après phosphorylation, inhibe la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Administration *per os* ou IV, biodisponibilité de 60 %, bonne distribution (LCR, placenta), métabolisme hépatique, élimination urinaire (20 %) et glucuroconjugaison (80 %), passage transplacentaire.

## INDICATIONS

- Traitement de l'infection VIH en association avec d'autres **antirétroviraux**.
- Prévention de la transmission verticale chez les femmes enceintes après 14 sem. de grossesse.
- Traitement de l'encéphalopathie ou de la thrombopénie liée au VIH : 1 à 1,5 g/j.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **zidovudine**.  
Neutropénie < 750/mm<sup>3</sup>.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## Allaitement.

Surveillance hématologique tous les 15 j au début puis tous les mois.

Risque de sélection de souches résistantes.

**Ganciclovir** en traitement d'attaque.

Insuffisance rénale : adapter en fonction de la clairance de la créatinine :

- > 25 mL/min : 300 mg/12 h ;
- ≤ 25 mL/min et dialyse : 150 mg/12 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

(Dépendants de la dose, réversibles à l'arrêt du traitement, plus fréquents en cas d'immunodépression sévère.)

Troubles hématologiques : anémie, neutropénie parfois sévère justifiant l'arrêt du traitement.

Troubles digestifs : nausées (50 %), douleurs abdominales, diarrhée (12 %), anorexie, vomissements.

Troubles musculaires : myalgies, myosite (élévation des CPK).

Troubles généraux : céphalées (50 %), asthénie, malaises, insomnie, agitation, éruption cutanée.

Troubles cutanés : éruption, pigmentations unguéales, hypertrichose ciliaire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

Interférences avec le métabolisme de la **zidovudine** : **AINS**, **salicylés**, **cimétidine**, **clofibrate**, **dapsone**, **benzodiazépines**, **codéine**, **morphine**, **isopronosine**.

**Probénécide**, **pyriméthamine**, **sulfamides**, **triméthoprime**.

Toxiques : médicaments néphrotoxiques ou hématotoxiques (**amphotéricine B IV**, **dapsone**, **interféron**, **pentamidine**, cytotoxiques).

## SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2)

### Immunomodulateurs

#### Inhibiteur du CCR-5

Le corécepteur CCR-5 est utilisé par le VIH pour entrer dans les cellules. Il existe

d'autres corécepteurs que le virus peut utiliser pour se fixer, ce qui justifie l'étude du tropisme du virus pour le CCR-5 avant de démarrer le traitement. Le **maraviroc (CEL-SENTRI)** est le seul commercialisé en 2014.

#### Associations d'antirétroviraux recommandées en 1<sup>re</sup> intention

Stratégie privilégiant 2 INTI + 1 INNTI		
<b>Ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)</b> 1 cp./j	<b>Éfavirenz</b> 600 mg/j le soir	Risque de résistance avec <b>éfavirenz</b>
Stratégie privilégiant 2 INTI + 1 IP/r (inhibiteur de protéase + ritonavir)		
<b>Ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)</b> 1 cp./j	<b>Atazanavir</b> 300 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>darunavir</b> 800 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>lopinavir/ritonavir</b> 4 cp./j en 1 ou 2 prises	
<b>Abacavir + lamivudine (KIVEXA)</b> 1 cp./j	<b>Atazanavir</b> 300 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>lopinavir/ritonavir</b> 4 cp./j en 1 ou 2 prises	Recherche de HLA-B*5701 avant prescription d' <b>abacavir</b>



## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (2) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (2)

## ■ Didanosine (ou ddl)

VIDEX					
En 2 prises <i>per os</i> toutes les 12 h, 30 min avant ou 2 h après les repas, mâché ou dissous dans un verre d'eau	60 cp. 25 mg	35,98	I	100 %	0,60
A. : $\geq 60$ kg : 200 mg x 2/j	60 cp. 50 mg	58,22	I	100 %	0,97
< 60 kg : 125 mg x 2/j	60 cp. 100 mg	109,01	I	100 %	1,82
E. (fonction de la surface corporelle) :	60 cp. 150 mg	161,37	I	100 %	2,69
1,1 à 1,4 m <sup>2</sup> : 100 mg x 2/j	30 gél. 125 mg	69,68	I	100 %	2,32
0,8 à 1 m <sup>2</sup> : 75 mg x 2/j	30 gél. 200 mg	108,91	I	100 %	3,63
0,5 à 0,7 m <sup>2</sup> : 50 mg x 2/j	30 gél. 250 mg	135,07	I	100 %	4,50
< 0,4 m <sup>2</sup> : 25 mg x 2/j	30 gél. 400 mg	212,48	I	100 %	7,08
	1 fl pdre. pour sol. buv. 2 g	HOP	I	100 %	
	1 fl pdre. pour sol. buv. de 4 g	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique, précurseur de la didéoxyadénosine, qui inhibe la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 40 % (augmentée par la prise d'un tampon, diminuée par l'acidité gastrique et la présence d'aliments), diffusion faible dans le LCR (20 %) et le placenta, métabolisation par la voie des purines, élimination urinaire (50 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux** (AZT, d4T).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **didanosine**.

**Allaitement**, **grossesse**, enfant < 6 mois.

Pancréatite, hyperamylasémie.

Neuropathie périphérique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les comprimés à jeun (2 h d'un repas).

Ne pas prendre **indinavir** et **ddl** en même temps.

Insuffisance rénale ou hépatique : diminuer la dose de 50 % et prendre en une seule fois par jour.

Surveillance de l'amyasémie et de l'uricémie.

Surveillance neurologique : si neuropathie, interrompre et reprendre à demi-dose.

Apports : 265 mg Na<sup>+</sup>/cp., 16 mEq Mg<sup>++</sup>/cp.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neuropathies périphériques (15 %) : arrêt jusqu'à guérison.

Possible nouvelle toxicité hépatique (hyperplasie nodulaire régénératrice).

Pancréatites (3 %) biologiques ou cliniques potentiellement mortelles : arrêt immédiat.

Troubles digestifs (> 15 %) : diarrhées, nausées, vomissements, élévation des transaminases nécessitent l'arrêt.

Fièvre, frissons, céphalées, douleurs, prurit et éruption cutanée, asthénie, convulsions, insomnie, confusion mentale, hyperpigmentation cutanée, diabète insipide ou sucré, hyperuricémie, hypokaliémie, hypomagnésémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

## Pharmacologiques

Peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

Les tampons de la **didanosine** diminuent l'absorption de médicaments, à prendre avec 2 h de décalage : **anti-H<sub>1</sub>**, **corticoïdes**, **cyclines**, **dapsone**, **éthambutol**, **isoniazide**, **itraconazole**, **phénothiazines**, **quinolones**, **salicylés**.

Diminution de l'absorption de la **didanosine** par les **antiacides** et les **antiulcéreux**.

## Toxiques

Déconseillé avec **stavudine** (**ZERIT**) : risque de cytopathie mitochondriale et d'acidose lactique.

Médicaments neurotoxiques : **cisplatine**, **dapsone**, **disulfirame**, hydralazines, imidazolés, **isoniazide**, **lithium**, **nitrofurantoïne**, **phénytoïne**, sels d'or, **stavudine**, **vincristine**.

Augmentation du risque de pancréatite : **pen-tamidine**.

**Ganciclovir**, **rifampicine**, **rifabutine**.

## SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (3)

### Quelle association initiale ?

Le choix doit tenir compte des effets indésirables et des interactions médicamenteuses et de l'observance. En priorité : **2 INTI + 1 IP ou 1 INNTI** (efficacité comparable aux IP).

La co-administration d'une faible dose de **ritonavir** (100 mg x 2/j) aux autres **IP** en augmente les concentrations plasmatiques (**indinavir**, **saquinavir**, **lopinavir**, etc.).

En cas de co-infection par le virus de l'hépatite B, prescrire systématiquement une bithérapie anti-VHB : **ténofovir (VIRÉAD)** + **lamivudine (EPIVIR)** ou **emtricitabine (EMTRIVA)**, ou le traitement combiné **ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)**.

### Quand débuter un traitement antirétroviral ?

- Patient sans symptômes et CD4 > 500/mm<sup>3</sup> : suivi tous les 2-4 mois sauf charge virale plasmatique > 5 log, baisse rapide du taux de CD4, co-infection à VHB ou VHC, âge > 50 ans, facteurs de risque cardiovasculaires associés, souhait de réduction du risque de transmission, néphropathie liée au VIH.
- CD4 350-500/mm<sup>3</sup> : traitement recommandé sauf cas particulier (malade pas prêt).
- Patient symptomatique ou CD4 < 350/mm<sup>3</sup> : traitement indispensable.

### Quel suivi ?

Consultations bimensuelles (surtout **abacavir**, **éfavirenz**, **névirapine**) ou mensuelles, puis trimestrielles.

Affaire de spécialiste car toxicités et interactions médicamenteuses nombreuses et complexes.

Une consultation d'observance peut anticiper ou améliorer les problèmes d'observance, d'horaires et de modalités de prises, d'effets secondaires, voire d'interactions, et d'efficacité thérapeutique (suivi virologique et immunitaire).

### Quand et comment changer de traitement ?

#### Indications

Échec virologique ou immunitaire, toxicités, mauvaise observance (à analyser avant toute modification).

#### Modalités

Les traitements de relais sont à discuter le plus souvent de façon multidisciplinaire.

- En cas d'échec thérapeutique : vérifier l'observance et les interactions médicamenteuses. Changer au minimum 2 sinon tous les médicaments. L'adjonction d'une nouvelle molécule expose au risque d'une monothérapie si la souche est résistante à l'ensemble des médicaments déjà utilisés. Les tests génotypiques peuvent être une aide à la décision.
- En cas de toxicité : remplacer un médicament toxique par un autre de la même classe, sinon arrêter tout en bloc, puis réintroduire secondairement. Ne pas diminuer les doses.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (3) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (3)

## ■ Lamivudine (ou 3TC)

EPIVIR					
En 2 prises <i>per os</i> , en dehors des repas A. et E. > 12 ans : 150 mg x 2/j	60 cp. 150 mg	145,81	I	100 %	2,43
	30 cp. 300 mg	145,81	I	100 %	4,86
	48 fl. 240 mL (sol. buv. 10 mg/mL)	51,47	I	100 %	1,07
	(15 mL = 150 mg)				

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la cytidine, inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH, actif sur les souches résistantes à l'**AZT**.

Inhibe également la réplication du virus de l'hépatite B, entraînant une normalisation des transaminases et une négativation de la virémie dans plus de 90 % des cas ; un échappement apparaît toutefois après quelques mois de traitement.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 80 % (absorption retardée par la présence d'aliments sans modification de la biodisponibilité), bonne distribution (mal connue dans le LCR), faible métabolisme hépatique (5-10 %), élimination rénale (> 70 %).

## INDICATIONS

- Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux (AZT, d4T)**.
- Hépatite B chronique. En cas de traitement d'une co-infection VHB-VIH, ne pas utiliser la **lamivudine** seule mais en association avec le **ténofovir**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **lamivudine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Allaitement et grossesse** (en cours d'étude). Possibilité de prendre en même temps la **3TC**, l'**AZT**, la **d4T**, le **ritonavir** ou le **saquinavir**. La

prise à jeun de **3TC** et **indinavir** augmente l'absorption des 2 médicaments.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement d'une infection par le VHB : risque de rebond viral.

Cirrhose hépatique sévère (TP < 50 %) liée à une hépatite B chronique : risque de réactivation à l'arrêt de la **lamivudine**.

Insuffisance rénale ; adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- > 50 mL/min : dose initiale 150 mg puis 150 mg x 2/j ;
- 30-50 mL/min : 150 mg puis 150 mg x 1/j ;
- 15-30 mL/min : 150 mg puis 100 mg x 1/j ;
- 5-15 mL/min : 150 mg puis 50 mg x 1/j ;
- < 5 mL/min : 50 mg puis 25 mg x 1/j.

Apports : contient de l'alcool et 3 g de saccharose pour 150 mg de **lamivudine**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : céphalées, fatigue, malaise, nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, insomnie, toux.

Toxicité hématologique sur les 3 lignées (aggravée avec l'**AZT**).

Élévation des transaminases, hépatite cytotolytique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

**Triméthoprime** : augmente les concentrations de **lamivudine** chez l'insuffisant rénal mais ne nécessite pas d'adaptation de doses.

**SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (4)****La primo-infection**

Dépister les partenaires.

Le traitement ne permet pas une éradication de l'infection. Un test génotypique est recommandé surtout si sujet contaminateur déjà traité.

Traitement recommandé en cas de symptômes, en particulier si infection opportu-

niste ou déficit confirmé. Choisir de préférence 2 **INTI** et 1 **IP**. Durée non validée par les études, mais habituellement de 12 à 18 mois. Proposer une inclusion dans un essai thérapeutique.

Traitement non recommandé si séroconversion récente sans symptôme.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (4) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (4)

## ■ Stavudine (ou d4T)

ZERIT					
En 2 prises <i>per os</i> , de préférence à jeun, ou pendant le repas	56 gél. 20 mg	197,12	I	100 %	3,52
A. > 60 kg : 40 mg x 2/j	56 gél. 30 mg	205,11	I	100 %	3,66
A. ≤ 60 kg : 30 mg x 2/j	56 gél. 40 mg	212,45	I	100 %	3,79
	13 cās susp. buv. 200 mg	54,01	I	100 %	4,15

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la thymidine, inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 80 %, distribution dans tout l'organisme (possible dans le LCR), élimination urinaire (80 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux**.  
N'est presque plus utilisé en raison de sa forte toxicité mitochondriale.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **stavudine**.

## Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique sévère (TP < 50 %) et transaminases > 5 N.

Antécédents de neuropathie périphérique.

Pancytopenie.

Insuffisance rénale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Possibilité de prendre la **stavudine** en même temps que la **ddl**, la **ddC**, la **3TC**, le **ritonavir**, le **saquinavir** et l'**indinavir** (augmente l'absorption des 2 médicaments).

Surveillance neurologique : si neuropathie périphérique, interrompre et reprendre à demi-dose après guérison clinique.

Insuffisance rénale ; adapter la dose à la clairance de la créatinine et du poids :

- entre 25 et 50 mL/min : ≥ 60 kg : 20 mg x 2/j, < 60 kg : 15 mg x 2/j ;
- entre 10 et 25 mL/min : ≥ 60 kg 20 mg x 1/j, < 60 kg : 15 mg x 1/j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Risque important de toxicité mitochondriale. Neuropathie périphérique (dépendante de la dose).

Nausées, diarrhées, douleurs abdominales.

Élévation de l'amylase, pancréatite (1 %).

Rash cutané.

Élévation des transaminases, troubles hématologiques modérés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

## Pharmacologiques

Peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

## Toxiques

Déconseillée avec la **didanosine (VIDEX)** : risque de cytopathie mitochondriale et d'acidose lactique.

Médicaments neurotoxiques : **amphotéricine B IV**, **cisplatine**, **cotrimoxazole**, **didanosine**, **flucytosine**, **isoniazide**, **métronidazole**, **phénytoïne**, **vincristine**.

Médicaments hépatotoxiques : **acide valproïque**, **carbamazépine**, **clofazimine**, **cotrimoxazole**, **flucytosine**, **ganciclovir**, **isoniazide**, **pentamidine**, **rifabutine**, **rifampicine**.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (5) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (5)

## ■ Abacavir

ZIAGEN					
A. : 600 mg/j à 1 200 mg/j en 2 ou 3 prises pendant ou en dehors des repas E. (≥ 3 mois) : 8 mg/kg x 2/j	60 cp. 300 mg 1 fl. 240 mL + pipette doseuse	285,85	I	100 %	4,76
		81,82	I	100 %	81,82

## ■ Abacavir + lamivudine (ou 3TC)

KIVEXA					
A. : 1 cp. x 1/j	30 cp. 600 mg <b>abacavir</b> + 300 mg <b>3TC</b>	412,55	I	100 %	13,75

## ■ Abacavir + lamivudine (ou 3TC) + zidovudine (ou AZT)

TRIZIVIR					
A. : 1 cp. x 2/j pendant ou en dehors des repas	60 cp. 300 mg <b>abacavir</b> + 300 mg <b>3TC</b> + 150 mg <b>AZT</b>	627,26	I	100 %	10,45

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité orale de 75 % (indépendante de la prise de nourriture), bonne diffusion méningée, métabolisme hépatique, élimination rénale (< 5 %).

## INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques** (zidovudine + lamivudine).

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : information manquante.

**Enfant** : information manquante.

Hypersensibilité à l'**abacavir**.

Insuffisances hépatocellulaire et rénale sévères.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Expliquer aux malades les réactions d'hypersensibilité et la conduite à tenir.

**Réactions d'hypersensibilité** chez environ 3 % des malades, généralement pendant les 6 premières sem. (délai médian : 11 j) et justifiant une consultation tous les 15 j pendant les 2 premiers mois de traitement. Une recherche HLA B57 est recommandée avant la mise sous traitement.

**Prévenir les malades d'arrêter le traitement au moindre doute** (risque mortel) et de consulter en urgence. Port en permanence d'une carte d'information.

Fièvre et/ou éruption maculopapuleuse ou urticarienne.

Symptômes respiratoires (dyspnée, toux, pharyngite dans 20 % des cas voire pneumopathie ou syndrome pseudogrippal), cutanés ou digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales).

Biologie : élévation des CPK, de la créatinémie ou lymphopénie.

**Ne jamais tenter de réintroduction après un arrêt pour intolérance.**

Insuffisance hépatique ou rénale minime : pas de modification de dose.

Risque d'acidose lactique chez les malades ayant une hépatopathie et les obèses.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents (> 10 %) et transitoires : nausées, vomissements, fatigue, léthargie, fièvre, céphalée, diarrhée, anorexie.

Réactions d'hypersensibilité (cf. ci-dessus).

**Risque d'acidose lactique** parfois fatale : arrêt du traitement en cas de cytolysé d'apparition d'une hépatomégalie ou d'acidose métabolique de cause inconnue.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pas d'interaction significative rapportée.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (6) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (6)

## ■ Emtricitabine

<b>EMTRIVA</b>					
A. : 200 mg/j en 1 prise	30 gél. à 200 mg	162,72	I	100 %	5,42
E. > 33 kg : 200 mg/j en 1 prise	1 fl. sol. buv. 170 mL	41,26	I	100 %	41,26

## ■ Emtricitabine + ténofovir disoproxil

<b>TRUVADA</b>					
Idem <b>EMTRIVA</b>	30 cp. 245 mg/200 mg	520,04	I	100 %	17,33

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique synthétique de la cytosine (FTC), ayant des résistances croisées avec la **lamivudine (3TC)** et doté d'une activité sur le VIH-1, le VIH-2 et le VHB.

**Ténofovir** en monothérapie : hépatite chronique virale B.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, absorption rapide et importante.

Concentrations maximales atteintes en 1 à 2 h après la prise.

Biodisponibilité absolue de 93 % par gélules et 75 % par solution buvable.

Élimination rénale (86 % de la dose dans les urines).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres antirétroviraux.

Efficace sur le VHB en association avec du **ténofovir (TRUVADA)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**emtricitabine**.

**Déconseillé pendant l'allaitement.**

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Posologies limitées si poids < 33 kg, insuffisance rénale (clairance < 50 mL/min), acidose lactique, hyperlactémie, élévation des transaminases, atteinte hépatique, hépatomégalie, hyperglycémie, hypertriglycéridémie, grossesse.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement d'une infection par le VHB : risque de rebond viral.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neutropénie, anémie, hémolyse.

Complications métaboliques, hyperglycémie, acidose lactique.

Céphalées, vertiges, asthénie, diarrhée, dyspepsie.

Élévation de la lipase et de l'amylase sériques.

Éruption, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Risque faible d'interactions médiées par le CYP450 entre l'**emtricitabine** et d'autres médicaments.

Augmentation des concentrations sériques si co-administration d'autres médicaments éliminés par sécrétion tubulaire active.

Association à la **lamivudine** non recommandée.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (7) – ANALOGUES NUCLÉOTIDIQUES

### ■ Ténofovir disoproxil fumarate

<b>VIRÉAD</b>					
A (≥ 18 ans). 1 cp./j au cours d'un repas	30 cp. 245 mg	365,64	I	100 %	12,19

### ■ Emtricitabine + ténofovir disoproxil

<b>TRUVADA</b>					
Idem <b>VIRÉAD</b>	30 cp. 245 mg/200 mg	520,04	I	100 %	17,33

#### PROPRIÉTÉS

**Ténofovir** : analogue nucléotidique (nucléoside monophosphate) représentant une nouvelle classe d'inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH et du virus de l'hépatite B mais ayant des mécanismes de résistance croisée avec les **inhibiteurs nucléosidiques**.

**Emtricitabine** : voir supra.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, prodogue du **ténofovir**, un analogue nucléosidique monophosphate, qui doit être phosphorylé pour être efficace, biodisponibilité de 25 % (augmentée par la prise d'aliments à 40 %), bonne distribution tissulaire, élimination urinaire majoritairement sous forme inchangée.

#### INDICATIONS

Hépatite chronique virale B en phase de répliation et active histologiquement ou fibrose.

Cirrhose virale B.

Échec thérapeutique de l'infection par le VIH, chez l'adulte ayant une charge virale ≥ 10 000 copies/mL, en association avec d'autres **antirétroviraux**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ténofovir**.

Hypersensibilité à l'**emtricitabine (TRUVADA)**.

**Grossesse** et **allaitement**.

Non évalué en cas d'insuffisance hépatique ou

rénale (créatinine ≥ 133 mmol/L ou phosphatémie < 0,65 mmol/L).

Administration de médicaments néphrotoxiques (dont **cidofovir**).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance de la fonction rénale et de la phosphatémie, au début pour tous les mois. Arrêt si phosphatémie < 0,32 mmol/L ou créatinine > 177 mmol/L.

Surveillance rapprochée en cas de co-administration avec **ddl** tamponnée.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles gastro-intestinaux minimes à modérés.

Hypophosphatémie.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Peu d'études d'interactions.

Médicaments néphrotoxiques : **aminosides**, **amphotéricine B**, **cidofovir**, **foscarnet**, **pentamidine IV**.

Pas d'interaction néfaste mise en évidence avec : **3TC**, **indinavir**, **éfavirenz**.

Augmentation des concentrations de **ddl** en cas de co-administration avec **ddl** en comprimés tamponnés.

Diminution des concentrations de **lopinavir** et augmentation des concentrations de **ténofovir** en cas de co-administration avec **ritonavir/lopinavir**.



## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (8) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (1)

## ■ Saquinavir

INVIRASE					
Associé au <b>ritonavir</b> :	120 gél. 200 mg	399,06	I	100 %	3,33
En 2 prises <i>per os</i> indépendamment de la prise alimentaire					
A. et E. > 13 ans : 400 mg x 2/j					
Associé au <b>ritonavir</b> , en 2 prises/j :	120 cp. pell. 500 mg	399,06	I	100 %	3,33
1 000 mg x 2/j					

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase**, probablement le mieux toléré (pas de perturbation biologique) mais peu absorbé par le tube digestif.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 4 % en raison d'une faible absorption (augmentée par un repas riche en graisses et par le jus de pamplemousse), améliorée par la prise de **ritonavir** et d'un large effet de 1<sup>er</sup> passage hépatique, distribution dans tout l'organisme sauf le LCR, demi-vie 1-2 h, métabolisation hépatique par CYP3A4 (dont il est un faible inhibiteur), élimination biliaire (96 %) et urinaire (4 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **saquinavir**.

**Grossesse et allaitement**.

**Rifabutine** et **rifampicine** qui réduisent la biodisponibilité du **saquinavir** en prise seule.

**Simvastatine**.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

**Terfenadine**, **astémizole**, **cisapride** : risque de torsade de pointe.

**Midazolam**, **triazolam** : risque de sédation excessive

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À toujours prescrire avec un autre **inhibiteur de protéases**, en particulier **ritonavir**.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Diarrhées ou malabsorption.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteur de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps le **saqui-**

**navir**, l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**, ne pas associer à la **ddl**.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 375 et 3 000 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

(dépendants de la dose)

Troubles digestifs : diarrhées (16 %), gêne abdominale (6 %), nausées (4 %), ulcérations buccales, pharyngite.

Neuropathie périphérique (4 %).

Asthénie, céphalées.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Saquinavir** est un substrat et un faible inhibiteur du CYP3A4.

Déconseillés car **inducteurs enzymatiques** diminuant les taux sériques de **saquinavir** : **rifabutine** : réduire la dose à 150 mg x 3/sem. (ou à 1 j/2) en cas d'association **ritonavir/saquinavir**.

**Dexaméthasone** : diminution des concentrations de **saquinavir**.

Azols : surveillance avec le **fluconazole**, l'**itraconazole**, le **miconazole**.

Substrats du cytochrome CYP3A4 : surveiller les effets toxiques des médicaments suivants (**inhibiteurs calciques**, **clindamycine**, **dapsone**, **quinidine**).

**Éfavirenz** : administration déconseillée.

**Névirapine** : diminution des concentrations de **saquinavir**.

**Ritonavir** : augmentation des concentrations du **saquinavir** : utiliser **ritonavir** 100 mg x 2/j et **saquinavir** 400 mg x 2/j.

**Phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** : interactions mal connues, doser les **antiépileptiques**.

**Méthadone** : interaction inconnue.

**Contraceptifs oraux** : interaction inconnue.

**Sildénafil** : diminuer les doses et commencer à 25 mg.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (9) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (2)

## ■ Ritonavir

NORVIR					
En 2 prises <i>per os</i> au moment des repas avec un grand verre d'eau (à distance de <b>ddl</b> )	90 mL sol. buv. (80 mg/mL) + ser. doseuse	63,63	I	100 %	0,71
En association à faible dose avec un autre <b>inhibiteur de protéase</b> A. : 100 mg x 2/j	30 cp. 100 mg	27,11	I	100 %	0,90
En monothérapie : A. : 300 mg x 2 le 1 <sup>er</sup> j puis augmenter de 100 à 200 mg/j pour atteindre 600 mg x 2/j en 5 à 14 j en fonction de la tolérance, puis introduire les autres médicaments					

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase** ayant de nombreux effets secondaires et interactions médicamenteuses. Puissant inhibiteur des cytochromes CYP3A et CYP2D6 : il fait augmenter les concentrations des médicaments qui sont dégradés par ces enzymes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité  $\geq 70$  % (améliorée par les aliments), métabolisation importante par cytochromes (3A4 > 2D6), inhibiteur puissant du CYP3A, élimination biliaire et urinaire (< 5 %).

## INDICATIONS

N'est plus prescrit en monothérapie d'**inhibiteur de protéase**, mais comme **inhibiteur enzymatique** à la faible dose de 100 mg x 2/j, en association un autre **inhibiteur de protéase** (**lopinavir**, **saquinavir**, **indinavir**) dont il augmente les concentrations sanguines, ce qui en simplifie l'administration ou en augmente l'efficacité.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ritonavir**.

**Grossesse et allaitement.**

Certains médicaments (cf. tableau).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Capsules à conserver au froid entre 2 et 8 °C.

Ne pas mélanger le sirop avec de l'eau, ne pas ouvrir les gélules.

Sécher le verre doseur avant son utilisation.

Possibilité de prendre le **ritonavir** en même temps que l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T** mais pas la **ddl** (2 h d'intervalle).

Insuffisance rénale ou hépatique.

Diarrhée (défaut d'absorption).

Hémophilies (augmente le besoin en facteur VIII).

Enfants < 12 ans, conducteurs de véhicule.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents, en particulier pendant les 2 premières semaines de traitement, interruption du traitement chez 17 % des malades.

Troubles digestifs : nausées (50 %), vomissements (25 %), douleurs abdominales, dyspepsies, altération du goût, éructations, ulcération buccale, irritation de la gorge, pharyngite occasionnelle.

Troubles neurologiques : paresthésies péri-buccales spontanément résolutive (30 %), neuropathie sensitive périphérique (15 %), vertiges, paresthésies, céphalées (15 %), somnolence, insomnie, anxiété.

Troubles cutanés : érythème, prurit, sueurs.

Vasodilatation, asthénie (23 %), fièvre, myalgie, perte de poids, toux.

Anomalies biologiques : augmentation de la GGT (12 %), triglycérides jusqu'à 10 g/L sans complication rapportée (10 %), ALAT (6 %), ASAT (4 %), bilirubine, phosphatases alcalines, cholestérol ; leucopénie (16 %), hyperleucocytose, anémie, allongement du temps de coagulation ; augmentation de : CPK, amylase, uricémie, magnésémie, glycémie ; hypokaliémie, hypocalcémie.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (10) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (3)

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4 et CYP 2D6, fort inhibiteur du CYP 3A4, inducteur des CYP 2C9, 2C19 et 1A2, avec phénomène d'auto-induction.

Cf. tableaux.

Les cytochromes sont des enzymes intervenant dans le métabolisme de nombreux médicaments. Ils sont répartis en familles dont 3 jouent un rôle prépondérant chez l'homme (CYP 1, 2, 3), en sous-familles (ex. : CYP3A) et en isoenzymes (ex. : CYP3A4). Ce dernier est majoritaire et principalement présent dans le foie et l'intestin. À lui seul, il métabolise presque la moitié des médicaments métabolisés par les cytochromes. L'activité des cytochromes peut être modifiée par des substances, dont de nombreux médicaments. Elles sont rangées en substrats, inducteurs (activité

maximum en 6-10 j) ou inhibiteurs. Tous les modificateurs de cytochromes n'agissent pas avec la même intensité, et certains d'entre eux (**ritonavir**, **nelfinavir** ou **éfavirenz**) peuvent, selon les circonstances, jouer les 3 rôles. Les interactions qui en résultent sont complexes (bénéfiques ou délétères), pas toujours prévisibles et peuvent justifier des dosages. On peut les consulter sur [www.hivatis.org](http://www.hivatis.org). Schématiquement, les **inhibiteurs non nucléosidiques** sont des inducteurs modérés du CYP3A4 et les **inhibiteurs de protéases** des inhibiteurs du CYP3A4 : **ritonavir** (le plus puissant), **saquinavir** (le plus faible) et les autres sont modérés. L'association **lopinavir/ritonavir** équivaut à **ritonavir** pleine dose. À l'inverse d'autres médicaments (**antipileptiques**, **rifampicine**, etc.) peuvent induire ou inhiber le métabolisme des **antirétroviraux**.

### Médicaments contre-indiqués avec le ritonavir (non exhaustif)

**Antiarythmiques** : amiodarone, quinidine, hydroquinidine, flécaïnide, propafénone

**Anti-inflammatoires** : piroxicam

**Anti-infectieux** : céfamandole, métronidazole, griséofulvine

**Antihistaminiques** : astémizole, terféndine

**Psychotropes** et apparentés : alprazolam (**XANAX**), clorazépate (**TRANXÈNE**, **NOCTRAN**), diazépam (**VALIUM**, **NOVAZAM**), flurazépam, lormétazépam (**NOCTAMIDE**), midazolam (**HYPNOVEL**), prazépam (**LYSANXIA**), zolpidem (**STILNOX**), clozapine (**LÉPONEX**), pimozide

**Divers** : dérivés de l'ergot de seigle, statines (simvastatine), disulfirame (**ESPERAL**), millepertuis

### Médicaments dont les taux sériques sont augmentés par le ritonavir

**Antiarythmiques** : lidocaïne, disopyramide

**Antipileptiques** : carbamazépine, phénobarbital : interactions mal connues, à doser

**Anti-infectieux** : érythromycine, clarithromycine (adapter si insuffisance rénale), azithromycine, rifabutine (diminuer la dose à 150 mg x 3/sem. ou à 1 j/2 même si **ritonavir** à faible dose), rifampicine, itraconazole, antirétroviraux, atovaquone

**Antihistaminiques** : loratadine (**CLARITYNE**, **CLARINASE**), cétirizine (**VIRLIX**, **ZYRTEC**)

**Antivitamines K** : warfarine, acénocoumarol

**Corticoides** : dexaméthasone, prednisolone

**Immunosuppresseurs** : ciclosporine, tacrolimus

**Psychotropes** : halopéridol, perphénazine, amitriptyline (**LAROXYL**, **ÉLAVIL**), désipramine (**PERTOFRAN**), imipramine (**TOFRANIL**), fluoxétine (**PROZAC**), paroxétine (**DEROXAT**), sertraline (**ZOLOFT**)

**Opiacés** : buprénorphine, fentanyl, morphine

**Statines** : pravastatine, atorvastatine, fluvastatine

Autres : sildénafil (25 mg/48 h max.)

### Médicaments dont les taux sériques peuvent être diminués par le ritonavir

**AINS**

**Antidiabétique oral** : glipizide

**Antipileptique** : phénytoïne

**Éthinil-œstradiol** : arrêt

**Inhibiteur de la pompe à protons** : oméprazole

**Théophylline** : adapter les doses

**Méthadone** : doser et/ou augmenter les doses

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (11) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (4)

## ■ Darunavir

PREZISTA					
Associé au <b>ritonavir</b> : en 2 prises <i>per os</i> indépendamment de la prise alimentaire A. et E. > 13 ans : 600 ou 800 mg x 1/j	480 cp. 75 mg	734,70	I	100 %	1,53
	240 cp. 150 mg	734,70	I	100 %	3,06
	120 cp. 300 mg	734,70	I	100 %	6,12
	60 cp. 400 mg	425,26	I	100 %	7,09
	60 cp. 600 mg	734,70	I	100 %	12,24

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de protéase du VIH. Le **darunavir** inhibe le clivage des polyprotéines encodées Gag-Pol.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 37 % en raison d'une faible absorption, améliorée par la prise de **ritonavir** et d'un large effet de 1<sup>er</sup> passage hépatique. Distribution dans tout l'organisme sauf le LCR ; demi-vie 15 h ; métabolisation hépatique par CYP3A4 (dont il est un faible inhibiteur) ; élimination 80 % fécale, 14 % urinaire.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **darunavir**.

Insuffisance hépatique sévère.

**Grossesse et allaitement.**

**Rifabutine** et **rifampicine** qui réduisent la biodisponibilité du **darunavir** en prise seule.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À toujours prescrire avec un autre **inhibiteur de protéases**, en particulier **ritonavir**.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Diarrhée ou malabsorption.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteur de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps le **darunavir**, l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**, ne pas associer à la **ddl**.

En cas d'oubli < 6 h (si cp. à 300 mg) ou < 12 h (si cp. à 400 mg), prendre la dose oubliée dès que possible, puis reprendre le schéma habituel. Si ces délais sont dépassés, reprendre le schéma habituel sans la dose oubliée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ils sont dépendants de la dose.

Troubles digestifs : diarrhée, gêne abdominale, nausées.

Céphalées, vertiges, neuropathie périphérique (4 %).

Asthénie, céphalées.

Insomnie, dépression.

Lipodystrophies, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie.

Élévation des transaminases.

Éruption cutanée, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations médicamenteuses contre-indiquées :

– par voie systémique : **amiodarone**, **quinidine**, **lidocaïne** ;

– par voie orale : **astémizole**, **terfénadine**, **midazolam**, **tiazolam**, **cisapride**, **pimozide**, **sertindole**, **simvastatine**, **dérivés de l'ergot de seigle**.

Le **darunavir** est un substrat et un faible inhibiteur du CYP3A4.

Déconseillés car inducteurs enzymatiques diminuant les taux sériques de **darunavir** : **rifabutine** ; réduire la dose à 150 mg x 3/sem. (ou à 1 j/2) en cas d'association **ritonavir/darunavir**.

Azols : surveillance avec le **fluconazole**, l'**itraconazole**, le **miconazole**.

Substrats du cytochrome CYP3A4 : surveiller les effets toxiques des médicaments suivants (**inhibiteurs calciques**, **clindamycine**, **dapsone**, **quinidine**).

**Éfavirenz** : administration déconseillée.

**Névirapine** : diminution des concentrations de **darunavir**.

**Ritonavir** : augmentation des concentrations de **darunavir**. Utiliser **ritonavir** 100 mg x 2/j et **darunavir** 400 mg x 2/j.

**Phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** : interactions mal connues, doser les **antiépileptiques**.

**Méthadone** : interaction inconnue.

**Contraceptifs oraux** : interaction inconnue.

**Sildénafil** : diminuer les doses et commencer à 25 mg.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (12) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (5)

## ■ Indinavir

CRIVAN					
En 3 prises <i>per os</i> à 8 h d'intervalle, à jeun, 30 min à 1 h avant ou > 2 h après le repas A. : 800 mg x 3/j En association avec <b>ritonavir</b> (100 mg x 2/j) : 400 à 800 mg x 2/j (dosages recommandés)	360 gél. 200 mg	331,38	I	100 %	0,92
	90 gél. 400 mg	170,48	I	100 %	1,89
	180 gél. 400 mg	331,38	I	100 %	1,84

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase** très puissant, bien toléré, et peu d'interactions médicamenteuses.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 50-60 % (diminuée par la prise alimentaire, améliorée par le jus de pamplemousse), bonne distribution (faible dans le LCR), demi-vie 1,5-2 h, métabolisation hépatique par le CYP3A, élimination biliaire et urinaire (10-20 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**indinavir**.

Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique grave.

**Astémizole, terfénaire, cisapride, alprazolam, midazolam, triazolam.**

**Rifampicine.**

**Simvastatine.**

**Dérivés de l'ergot de seigle.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de lithiase des voies urinaires nécessitant une bonne hydratation (> 1,5 L/j).

À prendre à jeun (2 h d'un repas) si prescrit sans **ritonavir**.

Insuffisance rénale.

Insuffisance hépatique légère ou modérée associée à une cirrhose : réduire les doses à 600 mg x 3/j.

Hyperbilirubinémie libre transitoire régressant à la poursuite du traitement.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteurs de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps l'**indinavir**, l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**. La **ddI** doit être prise à jeun à distance.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 150 et 800 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées (35 %), diarrhées (25 %), altération du goût (20 %), douleurs abdominales (14 %), vomissements (11 %), dyspepsies (10 %), flatulences (8 %), sécheresse de la bouche (7 %), pyrosis (6 %).

Troubles neurologiques : céphalées (25 %), asthénie (24 %), étourdissements (10 %), insomnies (7 %), hyperesthésies (7 %), paresthésies (5 %), myalgies.

Troubles urologiques : lithiase urinaire avec cristaux d'**indinavir** (3-15 %) ne pas interrompre le traitement mais réhydrater, dysuries (6 %), hématurie, protéinurie.

Troubles cutanés : rash (19 %), sécheresse de la peau (16 %), prurit (7 %), anomalie de répartition des graisses (bosse de bison).

Augmentation du VGM, des transaminases, bilirubine totale et conjuguée (10 %), diminution des polynucléaires neutrophiles.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4, et inhibiteur modéré du CYP3A4.

**Saquinavir** : augmentation de l'aire sous la courbe de 500 %.

**Ritonavir** (100 mg x 2/j) : diminuer **indinavir** à 400-800 mg x 2/j (dosages recommandés).

**Névirapine** et **éfavirenz** : augmenter **indinavir** à 400-800 mg x 2/j si associé à **ritonavir** 100 mg x 2/j (dosages recommandés).

**Rifabutine** : réduire la dose de **rifabutine** à 150 mg/j ou à 300 mg x 2/sem.

**Itraconazole** : à surveiller.

Inducteurs des cytochromes : **phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** (diminuée, à éviter), **dexaméthasone**.

**Méthadone** : risque de surdosage en **méthadone**.

**Antiarythmiques** : à surveiller.

**Sildénafil** : 25 mg/48 h maximum

Jus de pamplemousse : diminution des concentrations d'**indinavir** de 26 %.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (13) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (6)

## ■ Fosamprénavir

TELZIR					
A. > 18 ans : 700 mg x 2/j associé au <b>ritonavir</b> 100 mg x 2/j	60 cp. 700 mg 1 fl. sol. buv. 225 mL (50 mg/mL)	376,97 105,52	I I	100 % 100 %	6,28 105,52
E. : non recommandé					

## ■ Tipranavir

APTIVUS					
A. : 500 mg x 2/j, en association avec <b>ritonavir</b> faible dose : 200 mg x 2/j	120 caps. molles 250 mg 1 fl. sol. buv. 95 mL (100 mg/mL)	810,47 HOP	I I	100 %	6,75
E. : non recommandé					

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur compétitif de protéase du VIH-1 et 2 ayant peu ou pas de résistances croisées avec les autres IP.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Per os : bonne biodisponibilité (indépendante de la prise d'aliments), bonne distribution sauf LCR, fixation aux protéines plasmatiques à 90 %, demi-vie de 7-10 h, métabolisme hépatique par le CYP3A4 dont il est un substrat et un inhibiteur enzymatique, élimination essentiellement par voie fécale. La sol. buv. est moins absorbée que les caps. : pas d'équivalence mg pour mg.

## INDICATIONS

Traitement de 2<sup>e</sup> intention de l'infection. Moins efficace que **indinavir** chez des malades jamais traités. Peu étudié chez les malades lourdement prétraités.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Nouveau-né : en raison de la présence de propylène glycol.

Modificateur de l'absorption de l'alcool : **disulfirame**, **métronidazole**.

## Simvastatine.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

Effet sédatif prolongé : **alprazolam**, **clorazépate**, **diazépam**, **flurazépam**, **lormétazépam**, **midazolam**, **prazépam**, **triazolam**, **zolpidem**.

Terfénadine, astémizole, cisapride, pimozide, **quinidine** : risque de torsade de pointe.

Millepertuis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : pas d'adaptation, mais solution buvable contre-indiquée.

Insuffisance hépatique : réduire chez l'adulte à 450 mg x 2/j si modérée et à 300 mg x 2/j si grave. Pas de données chez l'enfant.

Hémophilie : risque accru de saignement.

Diabète : surveiller la glycémie.

En cas d'éruption minime ou modérée : poursuivre le traitement avec un **antihistaminique**. Arrêt définitif si signes de gravité (généraux, atteinte muqueuse).

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 1 000 et 4 000 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs, éruptions cutanées, paresthésies péri-buccales. Augmentation des enzymes hépatiques, trouble de distribution des graisses, hyperglycémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Administer à distance des **antiacides**.

**Antirétroviraux** (capsule molle, chez l'adulte) : **saquinavir**, **indinavir**, **nelfinavir** : pas ajustement.

**AZT**, **3TC**, **abacavir** : pas d'ajustement.

**ddl** : pas d'étude, différer les prises à 1 h d'intervalle.

**Éfavirenz** : déconseillé avec **saquinavir**.

**Névirapine** : interaction non connue.

Réduire la dose de **rifabutine** à 150 mg/j ou 300 mg x 2-3/sem.

**Clarithromycine** : pas d'ajustement.

Risque de surdosage ou toxicité accrue : **inhibiteurs calciques**, **statines**, **clozapine**, **carbamazépine**, **cimétidine**, **dapsone**, **itraconazole**, **loratadine**.

Risque d'échec : **œstroprogestatifs**.

**Sildénafil** : 25 mg/48 h maximum.

**Méthadone** : interaction mal connue.

Liste non exhaustive.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (14) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (7)

## ■ Lopinavir + ritonavir

KALÉTRA					
A. + ado. et enf. ayant une surface corporelle $\geq 1,3 \text{ m}^2$ : 2 cp. 200 mg/500 mg x 2/j au cours d'un repas	60 cp. 100 mg/25 mg 120 cp. 200 mg/50 mg 60 doses de 5 mL (1 mL = 80 mg/20 mg)	124,97 124,97 476,54	I I I	100 % 100 % 100 %	2,08 1,04 7,94
E ( $> 2$ ans) : cf. Tableau					

## PROPRIÉTÉS

Association de **ritonavir** à un autre **inhibiteur de protéase**, surtout étudié chez des patients jamais traités mais responsable de plus fréquents effets secondaires métaboliques que d'autres associations.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Per os, biodisponibilité du **lopinavir** augmentée par l'administration de **ritonavir** et améliorée par la prise de lipide, demi-vie de 5-6 h, bonne distribution, métabolisation hépatique principale par le CYP3A4 et moindre par le 2D6, élimination biliaire et urinaire.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres antirétroviraux. Peu étudié chez les malades lourdement prétraités.

## CONTRE-INDICATIONS

Cf. celles du **ritonavir**. Allergie au **lopinavir**.

## Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

Modificateur de l'absorption de l'alcool : **disulfirame**, **métronidazole**.

**Rifampicine** : diminution des concentrations de **lopinavir**.

**Simvastatine**.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

Effet sédatif prolongé : **alprazolam**, **clorazépate**, **diazépam**, **flurazépam**, **lormétazépam**, **mizolam**, **prazépam**, **triazolam**, **zolpidem**.

**Terfénadine**, **astémizole**, **cisapride**, **pimozide**, **amiodarone**, **quinidine** : risque de torsade de pointe.

Millepertuis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance hépatique légère ou modérée : risque augmenté de toxicité hépatique.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteurs de coagulation.

Risque de complications métaboliques, dont hypertriglycémie et pancréatite.

Présence d'un excipient pouvant donner des allergies croisées avec l'**aspirine**.

Possibilité de prendre en même temps que : **AZT**, **ddC**, **3TC**, **d4T**, **abacavir**, **névirapine**. La **ddl** doit être prise à distance. Avec **éfavirenz**, augmenter **KALÉTRA** à 4 caps. x 2/j.

Associations aux autres **inhibiteurs de protéases** mal connues.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Complications métaboliques, anomalies de répartition des graisses (lipodystrophies), diabète.

Fréquents chez l'adulte ( $> 2\%$ ) : nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, asthénie, céphalées. Hyperglycémie, augmentation des enzymes hépatiques, hypercholestérolémie.

Peu fréquents chez l'adulte (1-2 %) : rash, selles anormales, insomnie.

Les effets secondaires de fréquence inférieure à 1 % ne sont pas rapportés ici.

Propylène glycol : convulsions, stupeur, tachycardie, hyperosmolarité, acidose lactique, toxicité rénale, hémolyse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4, et inhibiteur des CYP3A4 et 2D6. Cf. **ritonavir**.

**Rifabutine** : 150 mg x 2 ou 3/ses.

**Clarithromycine** : surveillance de toxicité hépatique en cas d'insuffisance hépatique.

## Doses chez l'enfant

Surface corporelle en $\text{m}^2$	Dose de sirop à administrer x 2/j (230/57,5 mg/ $\text{m}^2$ )
0,25	0,7 mL (57,5/14,4 mg)
0,5	1,4 mL (115/28,8 mg)
0,75	2,2 mL (172,5/43,1 mg)
1	2,9 mL (230/57,5 mg)
1,25	3,6 mL (287,5/71,9 mg)
1,5	4,3 mL (345/86,3 mg)
1,75	5 mL (402,5/100,6 mg)

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (15) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (8)

## ■ Atazanavir

REYATAZ					
A. : 300 mg/j en 1 prise associé au <b>ritonavir</b> 100 mg pendant les repas	60 gél. 150 mg	455,25	I	100 %	7,59
E. : non recommandé	60 gél. 200 mg	455,25	I	100 %	7,59
	30 gél. 300 mg	455,25	I	100 %	15,18

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de protéase du VIH-1.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Amélioration de la biodisponibilité et diminution de la variabilité de concentration lors de la prise de l'**atazanavir** avec de la nourriture. Élimination urinaire et fécale.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux** chez le patient déjà traité par **antirétroviraux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**atazanavir**.

**Déconseillé pendant l'allaitement.**

Insuffisance hépatique modérée à sévère. Intolérance au galactose, déficit en lactase, malabsorption du glucose et du galactose.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pathologie hépatique, élévation des transaminases, élévation de la bilirubine, antécédent de bloc de branche complet, surveillance du cholestérol et des triglycérides, diabète, grossesse.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction allergique, anorexie, anxiété, dépression, prise de poids, lipodystrophie, céphalées, signes neurologiques périphériques, amnésie, confusion, vertiges, syncope, palpitations, HTA, dyspnée, pancréatite, hépatite, hépatosplénomégalie, élévation des transaminases, des CPK, de la bilirubine et de l'amylase, prurit, urticaire, eczéma, asthénie, fièvre, neutropénie. Urologique : lithiase avec élimination de cristaux d'**atazanavir** (fréquence inconnue).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'**atazanavir** inhibe le CYP3A4 donc l'association **azatanavir-ritonavir** est contre-indiquée avec les médicaments substrats du CYP3A4 (astémizole, terféndine, cisapride, pimozide, quinidine, alcaloïdes de l'ergot de seigle, ergotamine et dihydroergotamine). Baisse des concentrations plasmatiques de l'**atazanavir** si administration avec les **anti-acides**.

Augmentation des concentrations d'**anti-arythmiques** (amiodarone, quinidine). Associations à éviter : **contraceptifs oraux**, **inhibiteurs de la pompe à protons**, **sildénafil**, **millepertuis** ; **rifampicine** contre-indiquée.



## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (16) – INHIBITEUR DE FUSION

## ■ Enfuvirtide

FUZEON				
A. : 200 mg/j en 1 prise E. > 33 kg : 200 mg/j en 1 prise	60 fl. pdre + solvant pour 90 mg/mL (60 inj.) + matériel à inj.	1 683,99	1	100 % 28,07

## PROPRIÉTÉS

L'**enfuvirtide** appartient à la classe thérapeutique des **inhibiteurs de fusion**. Il agit en se liant à une protéine virale (gp 41 du VIH-1) dans le milieu extracellulaire, bloquant ainsi la fusion entre la membrane virale et la membrane de la cellule cible et empêchant ainsi l'ARN viral d'entrer dans la cellule cible.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité absolue de 84 %.  
Voies d'élimination non étudiées.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux** chez les patients en échec à un traitement comprenant au moins un **inhibiteur des protéases**, ou un **analogue non nucléosidique** ou avec une intolérance à ces traitements.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**enfuvirtide**.

Enfant de moins de 6 ans.

**Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pathologie hépatique, insuffisance rénale sévère (clairance < 35 mL/min).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Érythème au site d'injection, acné, eczéma, sinusite, conjonctivite, papillome cutané, pneumonie, lymphadénopathie, perte d'appétit, anorexie, anxiété, hypertriglycémie, diabète, neuropathie périphérique, hypoesthésie, pancréatite, RGO, calculs rénaux, hématurie, glomérulonéphrite, élévation des CPK et des transaminases, syndrome pseudo-grippal, frissons, fièvre.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction attendue entre **enfuvirtide** et médicaments métabolisés par les enzymes du CYP450.

# ANTIVIRAUX ANTI-VIH (17) – ANTI-CCR5

## ■ Maraviroc

CELENTRI					
A. : 150 ou 300 ou 600 mg/j en 1 prise en fonction des associations avec les autres <b>antirétroviraux</b>	60 cp. 150 mg	729,57	I	100 %	12,16
	60 cp. 300 mg	729,57	I	100 %	12,16

### PROPRIÉTÉS

Le **maraviroc** est un antagoniste du récepteur CCR5 (récepteur de chimiokines). CCR5 est un des corécepteurs du VIH-1. Le **maraviroc** empêche ainsi le VIH-1 de pénétrer dans les cellules.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité absolue de 23 %.  
Voies d'élimination urinaires et fécales.

### INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 à tropisme détecté uniquement CCR5 chez l'adulte prétraité par des **antirétroviraux** et en association avec d'autres médicaments antirétroviraux.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **maraviroc**, à l'arachide et au soja.  
Enfant.

**Grossesse et allaitement.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À associer aux autres **antirétroviraux**.  
Insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère (clairance < 35 mL/min).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Érythème au site d'injection, acné, eczéma, sinusite, conjonctivite, papillome cutané, pneumonie, lymphadénopathie, perte d'appétit, anorexie, anxiété, hypertriglycémie, diabète, neuropathie périphérique, hypoesthésie, pancréatite, RGO, calculs rénaux, hématurie, glomérulonéphrite, élévation des CPK et des transaminases, syndrome pseudogrippal, frissons, fièvre.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale ou de traitement par des inhibiteurs de CYP3A4 tels que : **itraconazole**, **clarithromycine**, **télithromycine**, **inhibiteurs de protéases** (sauf **tipranavir/ritonavir**).

# ANTIVIRAUX ANTI-VIH (18) – ANTI-INTÉGRASE

## ■ Raltégravir

ISENTRESS					
400 mg x 2/j, à prendre au cours ou en dehors des repas	60 cp. 400 mg	699,76	I	100 %	11,66

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de l'intégrase du VIH-1. L'inhibition de l'intégrase empêche l'intégration du génome du VIH dans le génome de la cellule hôte. Les génomes du VIH qui ne s'intègrent pas ne peuvent pas donner lieu à la production de nouvelles particules virales infectieuses, et par conséquent l'inhibition de l'intégration empêche la propagation de l'infection virale.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption rapide. Demi-vie : 9 h. Liaison aux protéines plasmatiques. Élimination fécale et urinaire.

### INDICATIONS

Infection par le VIH-1, en association avec d'autres agents antirétroviraux, chez des patients adultes prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en cours.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**  
Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À associer aux autres anti-rétroviraux.  
Conduite (sensations vertigineuses).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Vertiges, douleurs abdominales, flatulence, constipation, prurit, lipodystrophies, asthénie, arthralgies. Rarement : hypertriglycémie, hépatite. Possible augmentation du risque de cancer (récidives) chez des patients traités avec d'autres anti-rétroviraux.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Absence d'effet sur le cytochrome P450 (CYP).  
**Rifampicine** : doubler la dose du **raltégravir** ;  
Éviter d'associer aux molécules augmentant le pH gastrique (risque d'augmentation des concentrations du **raltégravir**).

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (19) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (1)

### ■ Névirapine

VIRAMUNE					
A. : 200 mg/j pendant 2 sem. puis 400 mg/j	1 fl. 240 mL (50 mg/5 mL)	HOP	I		
	14 cp. 200 mg	56,37	I	100 %	4,03
	60 cp. 200 mg	225,92	I	100 %	3,77
	30 cp. 400 mg	123,92	I	100 %	4,13

### PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur non nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1 inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité *per os* de 93 %, pas de modification par la prise d'aliments, de **didanosine** ou d'**antiacides** ; liaison protéique à 60 % ; inducteur de cytochrome P450 ; passage placentaire et dans le lait maternel, demi-vie 25-30 h ; métabolisme hépatique auto-inductible par cytochromes nécessitant une augmentation progressive des doses ; élimination par voie rénale (80 %) et fécale (10 %).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : information manquante.

Hypersensibilité à la **névirapine**.

Insuffisance rénale ou hépatique : pas de données.

Co-infection par le VHC.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Débuter à demi-dose (200 mg x 1/j) les 2 premières semaines.

Expliquer aux patients les manifestations toxiques de la **névirapine**.

Surveiller les tests hépatiques pendant les 6 premiers mois (tous les 15 j pendant 2 mois).

Troubles cutanés (< 10 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (20 % des cas).

### Interruption du traitement en cas de :

– anomalie modérée ou sévère des tests hépatiques (à l'exclusion de la  $\gamma$ GT) et jusqu'à normalisation. Arrêt définitif en cas de récurrence à la réintroduction ;

– éruption cutanée sévère ou s'accompagnant de signes généraux avec signes de gravité (20 % des cas) : éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, phlyctènes, œdème, signes généraux, douleurs articulaires ou musculaires, malaise général.

En cas d'arrêt supérieur à 7 j, reprendre à la dose initiale de 200 mg pendant 14 j.

Dosage plasmatique : résiduelles entre 3 000 et 8 000 ng/mL.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : troubles cutanés (< 10 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (20 % des cas).

Nausées, asthénie, fièvre, céphalées, somnolence, augmentation des enzymes hépatiques. Rares : éruption cutanée (Lyell et Stevens-Johnson), réaction allergique (anaphylactique, angio-œdème, urticaire), hépatite fulminante.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : la **névirapine** est un substrat et un inducteur modéré du cytochrome CYP3A4.

### Médicaments affectés par la névirapine

**Saquinavir** : cf. **INVIRASE**.

**Indinavir** : augmenter les doses d'**indinavir** à 1 000 mg toutes les 8 h en cas d'administration de 400 mg de **névirapine** (diminution de l'aire sous la courbe de 28 %).

**Contraceptifs oraux** : risque d'échec des **œstroprogestatifs**.

**Clarithromycine** : surveillance de la fonction hépatique (augmentation des concentrations).

**Méthadone** : diminution de 50 % des concentrations plasmatiques.

### Médicaments affectant la névirapine

**Rifampicine** et **rifabutine** : à prendre en compte si **inhibiteur de protéase**.

Utiliser la **rifabutine** à la dose de 300 mg/j.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (20) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (2)

### ■ Éfavirenz

SUSTIVA					
A. : 600 mg/j en une prise au coucher	30 gél. 50 mg	30,47	I	100 %	1,02
E. (≥ 3 ans) : 13 à 15 kg : 200 mg/j ;	30 gél. 100 mg	56,98	I	100 %	1,90
15 à 20 kg : 250 mg/j ; 20 à 25 kg :	90 gél. 200 mg	315,40	I	100 %	3,50
300 mg/j ; 25 à 32,5 kg : 350 mg/j ;	30 cp. 600 mg	254,40	I	100 %	8,48
≥ 40 kg : 600 mg/j	1 fl. sol. buv. 180 mL (30 mg/mL)	107,88	I	100 %	107,88

### PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur non nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1, inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Administration orale, biodisponibilité (50 %) augmentée par un repas riche en matières grasses, pas de modification par les **antiacides**, liaison à 99 % aux protéines plasmatiques ; métabolisme et inducteur du cytochrome CYP3A4 ; demi-vie entre 40 et 55 h ; élimination par voie fécale sous forme inchangée (16-61 %), élimination urinaire (16-34 % dont 1 % sous forme active).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux**.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité à l'**éfavirenz**.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

**Terfénadine, astémizole, cisapride, midazolam, triazolam.**

**Saquinavir** : diminution des concentrations en dessous des valeurs thérapeutiques (sauf si **ritonavir** ajouté à faibles doses).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance des enzymes hépatiques pendant les 6 premiers mois (tous les 15 j pendant 2 premiers mois).

Prendre l'**éfavirenz** au coucher.

Risque d'éruption cutanée augmenté par un antécédent d'éruption cutanée avec la **névirapine**.

Risque d'effets secondaires neurologiques.

Administration prudente en cas d'insuffisance hépatique minime à modérée ou d'insuffisance rénale.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 1 100 et 5 000 ng/mL.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Fréquents (≥ 10 %)

Troubles cutanés (18 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (plus d'un tiers des cas). Réactions croisées avec la **névirapine**. Rares érythèmes polymorphes et Stevens-Johnson. Troubles neurologiques (dans les premiers jours du traitement) : sensations vertigineuses, insomnie, somnolence, troubles de la concentration et des rêves. Rares réactions aiguës de type psychotique. Nausées.

#### Rares (< 10 %)

Diarrhée, dyspepsie, fatigue, augmentation des enzymes hépatiques, augmentation de la cholestérolémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : substrat du CYP3A4, inducteur modéré des CYP1A2, 2D6, inhibiteur du CYP3A4, 2C9 et 2C19.

### Médicaments affectés par l'éfavirenz

**Inhibiteurs de protéases** : voir chaque médicament.

**Clarithromycine, œstrogénostatifs** : à éviter.

**Rifabutine** : augmenter la dose à 450-600 mg/j.

**Méthadone** : diminution de 50 % des concentrations plasmatiques.

### Médicaments affectant l'éfavirenz

**Rifampicine** : augmenter les doses d'**éfavirenz** à 800 mg/j (diminution de l'aire sous la courbe de 26 %).

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (21) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (3)

### ■ Étravirine

INTELENCE					
A. : 600 mg/j en une prise au coucher	120 cp. 100 mg	505,13	I	100 %	4,21
E. (≥ 3 ans) :	60 cp. 200 mg	505,13	I	100 %	8,42
13 à 15 kg : 200 mg/j					
5 à 20 kg : 250 mg/j					
20 à 25 kg : 300 mg/j					
25 à 32,5 kg : 350 mg/j					
≥ 40 kg : 600 mg/j					

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse du VIH-1, inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Administration orale, biodisponibilité (50 %) augmentée par un repas riche en matières grasses ; pas de modification par les **antiacides** ; liaison à 99 % aux protéines plasmatiques ; métabolisme et inducteur du cytochrome CYP3A4 ; demi-vie entre 40 et 55 h ; élimination par voie fécale sous forme inchangée (16-61 %) ; élimination urinaire (16-34 % dont 1 % sous forme active).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux**.

### CONTRE-INDICATIONS

#### Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité à l'**étravirine**.

Intolérance au galactose.

Déficence en lactase.

Malabsorption glucose, galactose.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée, nausées, céphalées.

IDM, fibillation auriculaire, angor.

Thrombocytopénie, anémie.

Neuropathie périphérique, céphalées, convulsions, syncope, vertiges.

Bronchospasme, dyspnée d'effort.

Insuffisance rénale.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'**étravirine** est métabolisée par le CYP3A4, le CYP2C9 et le CYP2C19. Les médicaments inhibiteurs des ces cytochromes peuvent induire en association avec l'**étravirine** une diminution de sa concentration plasmatique.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (22) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (4)

### ■ Rilpivirine + emtricitabine + ténofovir disoproxil

#### ÉVIPLÉRA

A. > 18 ans : 1 cp./j avec de la nourriture	30 cp. 25/200/245 mg	756,57	I	100 %	25,22
---	----------------------	--------	---	-------	-------

#### PROPRIÉTÉS

**Rilpivirine** : inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse du VIH-1.

**Emtricitabine** et **ténofovir** : cf. *supra*.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

##### Rilpivirine :

- concentrations plasmatiques max. après 4-5h,
- 100% de liaison aux protéines plasmatiques,
- métabolisation par le CYP450 (3A4),
- $t_{1/2}$  d'élimination = 45 h,
- élimination à 80% fécale (25% sous forme inchangée).

#### INDICATIONS

Traitement du patient adulte, infecté par VIH-1, naïf de tout traitement antirétroviral, et présentant une charge virale  $\leq 100\,000$  copies/mL d'ARN VIH-1.

Remboursement à 100% seulement si l'utilisation de l'**éfavirenz** n'est pas appropriée pour le patient.

#### CONTRE-INDICATIONS

Cf. Interactions médicamenteuses contre-indiquées.

Allaitement.

Patient < 18 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Alcool à éviter.

Déconseillé en cas d'insuffisance hépatique ou rénales sévère.

Insuffisance rénale légère à modérée : adaptation de posologie (impossible avec l'association fixe **ÉVIPLÉRA**).

Déconseillé lors de la grossesse.

Contient du lactose.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Généraux : asthénie, céphalées, vertiges, somnolence.

Hématologiques : neutropénie, anémie, thrombocytopénie.

Immunitaires : réaction allergique, syndrome de restauration immunitaire (IRIS).

Métaboliques : dyslipidémie, lipodystrophie, hyperglycémie, hypophosphatémie, rare acidose lactique.

Psychiatriques : insomnie, dépression, rêves anormaux.

Gastro-intestinales : diarrhée, nausées, vomissements.

Hépatobiliaires : augmentation d'ALAT/ASAT et de bilirubinémie.

Cutanés : rash, éruption cutanée, prurit.

Musculo-squelettique : rare ostéomalacie.

Rénaux : augmentation de créatininémie, atteinte rénale.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

##### Contre-indiqués :

- **anticonvulsivants** : carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne ;
- **antimycobactériens** : rifabutine, rifampicine ;
- **inhibiteurs de la pompe à protons** ;
- **dexaméthasone** (sauf en dose unique) ;
- millepertuis ;
- autres **analogues de la cytidine (lamivudine)** ;
- **adéfovir dipivoxil**.

##### Déconseillés :

- **didanosine** ;
- médicaments néphrotoxiques : **aminosides, amphotéricine B, foscarnet, ganciclovir, pentamidine, vancomycine, cidofovir, interleukine-2 (aldesleukine)** ;
- autres **INNTI**.

NOTES

## SIDA - COMPLICATIONS DES ANTIRÉTROVIRAUX

Nombreuses toxicités à moyen et long termes, surtout métaboliques et pouvant interférer avec la qualité de vie. Se rapporter à la fiche de chaque molécule.

### Anomalie de répartition des graisses (lipodystrophie)

Atrophie graisseuse touchant surtout les membres et/ou hypertrophie touchant plutôt le tronc.

Concerne environ 50 % des malades après 1 à 2 ans de traitement, en particulier si **IP** ou **d4T**.

Diagnostic clinique : poids, modifications des formes.

Traitement : règles hygiéno-diététiques, modification de traitement au cas par cas car peu de données convaincantes dans les études (sauf gynécomastie et hypertrophie tronculaire s'améliorant souvent à l'arrêt de l'**IP**). Discuter une chirurgie esthétique.

### Troubles glucidiques

Environ 30 % des malades développent une intolérance au glucose ou un hyperinsulinisme et 5-10 % un diabète de type 2. Dosages semestriels à jeun. Maîtrise tensionnelle et surveillance des complications coronaires.

Traitement hygiéno-diététique, **metformine** (pas de **sulfamides**).

### Troubles lipidiques et risque cardiovasculaire

Environ 30 % des malades développent une hypercholestérolémie et 15-70 % une hypertriglycéridémie. L'infection à VIH constitue un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, classant les patients dans la catégorie de risque intermédiaire. Dosages semestriels à jeun. Maîtrise tensionnelle et surveillance des complications coronaires. Traitement hygiéno-diététique, arrêt ou remplacement de l'**IP** (hypertriglycéridémie).

Les **hypolipémiants** sont à considérer au cas par cas, car nombreuses interactions

médicamenteuses et toxicités combinées avec les **antirétroviraux**. Schématiquement : **fibrates** proposés si triglycérides > 10 g/L et **pravastatine** en prévention primaire du haut risque vasculaire ou en prévention secondaire.

### Toxicité mitochondriale

La toxicité des **INTI** est liée à une inhibition de l'ADN polymérase mitochondriale. Par ordre décroissant : **ddC**, **ddl**, **d4T**, **AZT**, **3TC**, **abacavir**. Les cellules modifient leur métabolisme ce qui peut produire myopathie (**AZT**), neuropathie (**ddl**, **ddC**, **d4T**), pancréatite (**ddl**, **d4T**), lipodystrophie, hyperlactatidémie ou acidose lactique.

### Hyperlactatidémie

Début insidieux, fatigabilité musculaire, douleurs, paresthésies, troubles digestifs, souvent associé à une stéatose hépatique ou lipodystrophie. Aggravation possible vers acidose lactique. Diagnostic : lactatidémie veineuse > 2 mmol/L, jeûne et au repos.

### Acidose lactique

Très rare mais très grave. Souvent précédée d'amaigrissement brutal, dyspnée et fatigabilité musculaire. Défaillance multiviscérale avec mortalité de 50 %. Lactatidémie veineuse > 5 mmol/L avec acidose.

### Conduite à tenir

Dosage des lactates au moindre doute mais pas systématique. Arrêt (> 5 mmol/L) ou modification de traitement.

### Troubles osseux

Carence en vitamine D très fréquente (80 %), à l'origine d'ostéomalacie, à traiter et à surveiller. Savoir rechercher une hyperparathyroïdie secondaire. Ostéopénie et ostéoporose rapportées (études ostéodensitométriques) mais incidence des fractures spontanées non connue. Évaluation densitométrique si malade ayant plusieurs facteurs de risque et traitement par **bisphosphonates** après avoir éliminé une carence en vitamine D.



## SIDA - COMPLICATIONS CUTANÉO-MUQUEUSES (1)

Les lésions cutanées et muqueuses sont très fréquentes (90 % des malades) et souvent précoces au cours de l'infection par le VIH. Elles doivent attirer le clinicien vers une séropositivité ignorée.

Examen gynécologique avec frottis systématique et annuel et/ou anoscopie si rapports non protégés.

### Syphilis

Penser à la syphilis devant toute éruption cutanée ou muqueuse.

Épidémie récurrente surtout chez les homosexuels masculins. Dépistage systématique et au moindre doute clinique.

Formes cliniques atypiques ou graves.

Possible ensemencement des méninges pendant la phase secondaire. Discuter un examen du liquide céphalo-rachidien surtout si  $CD4 < 200/mm^3$ , et un traitement de neurosyphilis (cf. dans *Dermatologie* : Infections sexuellement transmissibles).

Traitement de la syphilis précoce par **EXTENCILLINE** 2,4 millions d'unités.

Traitement de la syphilis tardive par 3 injections d'**EXTENCILLINE** à une semaine d'intervalle. Surveillance tous les 3 mois et contrôle éventuel du LCR tous les 6 mois jusqu'à normalisation.

### Herpès simplex

Survient à tous les stades de la maladie. Lésions cutanées et muqueuses identiques à celles de l'immunocompétent.

#### Traitement curatif

- **Valaciclovir (ZELITREX)** 500 mg x 2/j.
- **Aciclovir (ZOVIRAX)** IV 5 à 10 mg/kg toutes les 8 h si  $CD4 < 200/mm^3$  (sauf lésions traitées précocement) et atteinte viscérale ou malabsorption digestive.
- En cas de virus résistant à l'**aciclovir**, traiter par **foscarnet (FOSCAVIR)**.

#### Évolution

- **Amélioration** entre 3 et 10 j.
- **Arrêt du traitement** à cicatrisation complète.

### Traitement préventif

En cas de récurrences nombreuses (4 à 6/an) ou graves (herpès géant et  $CD4 < 100/mm^3$ ) : **ZELITREX** 500 mg x 2/j. Risque de sélection de virus résistants.

### Zona

À tous les stades de la maladie.

Traiter systématiquement par **aciclovir (ZOVIRAX)** IV 30 mg/kg/j si  $CD4 < 200/mm^3$ . Relais ou traitement d'emblée par **valaciclovir (ZELITREX)** 500 mg x 2/j en cas de formes simples et  $CD4 > 200/mm^3$ .

### Leucoplasie chevelue

Kératose blanche des bords latéraux de la langue attribuée à EBV, de survenue précoce, et souvent révélatrice de l'infection par le VIH.

Pas de traitement spécifique.

### Molluscum contagiosum

Fréquente infection cutanée à *Poxvirus*, contagieuse avec risque d'auto-inoculation.

Exérèse à la curette ou application d'azote liquide.

### Candidose buccale

Très fréquente et souvent révélatrice de l'infection par le VIH. Survient à tous les stades de la maladie et doit faire chercher une atteinte œsophagienne.

#### Formes simples

Traitement local par 4-8 appl. ou bains de bouche/j de **nystatine (MYCOSTATINE)**, **amphotéricine B (FUNGIZONE SUSPENSION)** ou **miconazole (GEL BUCCAL DAKTARIN)**. Les produits peuvent ensuite être avalés.

#### Formes sévères ou récidivantes

- **Fluconazole (TRIFLUCAN)** ou **itraconazole (SPORANOX)** pour 7 j.
- Pas de traitement d'entretien par voie générale.

## SIDA - COMPLICATIONS CUTANÉO-MUQUEUSES (2)

### Maladie de Kaposi

Tumeur liée à HHV-8. Maladie hétérogène nécessitant une prise en charge au cas par cas. La restauration d'une immunité est essentielle.

- Traitement antirétroviral seul : entraîne rémission complète en 3-6 mois si formes cutanées ou buccales modérées.
- Traitement local des localisations cutanées gênantes.
- Traitement des formes cutané-

muqueuses étendues, lymphœdème ou viscérales par chimiothérapie générale type **anthracyclines liposomales** (rémission dans 50 % des cas).

### Angiomatose bacillaire

Lésion angiomateuse cutanée due à *Bartonella henselae* parfois viscérale, d'aspect proche du Kaposi.

Traitement par **érythromycine** 500 mg x 2/j ou **doxycycline** 200 mg/j x 3 mois.

### Traitements des candidoses oro-pharyngées

FORMES	TRAITEMENTS
Formes simples	<b>Amphotéricine B (FUNGIZONE suspension)</b> 4 à 8 bains de bouche/j <b>Nystatine (MYCOSTATINE OVULES)</b> 4/j <b>Miconazole (DAKTARIN GEL BUCCAL)</b> 2-4 cuillères/j
Formes compliquées ou récidivantes	<b>Fluconazole (TRIFLUCAN)</b> 100 mg/j en 1 prise pendant 10-14 j <b>Itraconazole (SPORANOX)</b> 200 à 400 mg/j en surveillant les concentrations plasmatiques

## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (1)

Très fréquentes, souvent inaugurales, volontiers insidieuses.

### Pneumocystose pulmonaire

C'est une des plus fréquentes infections opportunistes.

A évoquer devant une pneumopathie interstitielle avec  $CD4 \leq 200/mm^3$ .

### Traitement d'attaque

#### Urgent +++

- Hospitalisation en service spécialisé ou en réanimation.
- Oxygénothérapie en fonction de la gazométrie.

- En 1<sup>re</sup> intention : **sulfaméthoxazole-triméthoprime** 15/75 mg/kg/j IV sans dépasser 12 amp./j ou *per os* si forme modérée et bonne tolérance digestive (cf. Tableau). Le plus efficace, peu cher mais 20-30 % d'intolérance.

- **Corticothérapie si  $PaO_2 < 70$  mmHg** (cf. Tableau).

En cas d'allergie peu sévère, essayer de poursuivre le traitement sinon alternatives.

Réanimation en cas de forme grave (mortalité 50 %).

#### Facteurs de mauvais pronostic

$PaO_2 < 50$  mmHg ou gradient alvéolo-artériel d' $O_2 \geq 30$  mmHg, opacités pulmonaires interstitielles et alvéolaires diffuses, > 5 % de polynucléaires dans le liquide de lavage alvéolaire en l'absence d'infection, LDH initialement élevées ne diminuant pas au cours de traitement, retard au traitement.

### Évolution

Habituellement favorable en 4 à 8 j.

### Prophylaxie secondaire

- **BACTRIM** faible ou forte : 1 cp./j.
- Rechute exceptionnelle si traitement pris régulièrement.

### Tuberculose

#### Tuberculose pulmonaire

À tous les stades de l'infection par le VIH, peut révéler la séropositivité. La latence entre la primo-infection et la maladie tuberculeuse est raccourcie par l'immuno-dépression.

Clinique polymorphe et dépendante de l'immunodépression (les  $CD4$  participent à la formation du granulome).

Traitement identique à l'immunocompétent sauf la durée, souvent allongée à 9 mois.

Tenir compte des interactions de la **rifampicine** (contre-indiquée avec les **inhibiteurs de protéases**) et de la **rifabutine** avec les **antirétroviraux**.

#### Tuberculose extrapulmonaire

Souvent concomitante d'une tuberculose pulmonaire et souvent de forme ganglionnaire.

**Traitement** (cf. dans *Pneumologie* : Tuberculose) allongé à 9 ou 12 mois.

## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (2)

### Images radiologiques des principales complications pulmonaires du sida

ASPECT DE LA RADIOGRAPHIE THORACIQUE	PATHOLOGIE
Normale	Pneumocystose, infection fongique généralisée (histoplasmosé)
Opacité alvéolaire localisée	Pneumonie bactérienne, cryptococcose, Kaposi
Infiltrat interstitiel localisé	Tuberculose, pneumonie bactérienne, cryptococcose, pneumocystose, histoplasmosé
Infiltrat interstitiel diffus	Pneumocystose, tuberculose, pneumonie lymphoïde interstitielle, infection fongique (histoplasmosé)
Épanchement pleural	Pleurésie purulente, tuberculose, Kaposi, lymphome
Adénopathie(s) médiastinale(s)	Infection à mycobactéries, lymphome, Kaposi, histoplasmosé

### Liste des principales complications pulmonaires du sida

<b>Bactéries</b> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>M. avium complex</i> <i>M. kansasii</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> Streptocoques du groupe A <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Moraxella catarrhalis</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Entérobactéries <i>Nocardia asteroides</i> <i>Legionella pneumophila</i> <i>Rhodococcus equi</i> Champignons <i>Pneumocystis jiroveci</i> <i>Cryptococcus neoformans</i> <i>Aspergillus fumigatus</i>	<i>Histoplasma capsulatum</i> (exceptionnel) <i>Coccidioides immitis</i> (exceptionnel) <i>Penicillium marneffei</i> (exceptionnel) <i>Blastomyces dermatitidis</i> (exceptionnel) Protozoaires <i>Toxoplasma gondii</i> <i>Cryptosporidium</i> spp (exceptionnel) Microsporidies (exceptionnel) <b>Virus</b> Cytomégalovirus Herpes simplex Adénovirus <b>Tumeurs</b> Cancers bronchiques Maladie de Kaposi Lymphomes malins non hodgkiniens Pneumonie lymphoïde interstitielle (enfants)
--	--

## ANTI-PNEUMOCYSTOSE (1)

## ■ Atovaquone

WELLVONE					
À prendre au moment des repas (riche en graisses) A. : 750 mg x 4/j	1 fl. 226 mL 150 mL/mL	HOP	I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

Hydroxynaphtoquinone active sur la chaîne de transport des électrons de *Pneumocystis carinii*.

## INDICATIONS

Traitement curatif et préventif de 2<sup>e</sup> intention de la pneumocystose pulmonaire en cas d'allergie aux autres médicaments plus efficaces.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**atovaquone**.

**Grossesse et allaitement.**

Enfant, sujets âgés et insuffisance rénale ou hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les repas au milieu d'un repas riche en graisses pour favoriser son absorption.  
Diminution de l'absorption en cas de diarrhée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Éruptions cutanées, nausées, diarrhée, céphalées, fièvre, vomissements, insomnie.  
Rares : asthénie, prurit, candidose buccales, douleurs abdominales, constipation, vertiges, élévation des transaminases, anémie, hyperamylasémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Métoclopramide** ou **rifampicine** : diminution des concentrations plasmatiques de l'**atovaquone**.

Risque d'inefficacité des **antivitamines K**.

## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (3)

### Traitement des complications pulmonaires du sida

INFECTIONS	TRAITEMENT DE 1 <sup>re</sup> INTENTION	TRAITEMENT DE 2 <sup>e</sup> INTENTION
Pneumocystose pulmonaire Traitement d'attaque pendant 21 j puis prophylaxie secondaire	<b>Triméthoprim</b> (TMP) 15 mg/kg/j + <b>sulfaméthoxazole</b> (SMZ) 75 mg/kg/j soit <b>BACTRIM</b> faible : 4 ampoules IV ou 4 cp. x 3/j ou <b>BACTRIM</b> forte : 2 cp. x 3/j + <b>corticoïdes (prednisone)</b> 1 mg/kg/j si PaO <sub>2</sub> < 75 mmHg	<b>Pentamidine</b> IV : 3-4 mg/kg/j ou <b>pentamidine</b> aérosol : 300 mg/j (infection peu grave) ou <b>atovaquone</b> : 750 mg x 2/j
Pneumocystose pulmonaire Prophylaxie secondaire	<b>BACTRIM</b> faible ou forte : 1 cp./j	<b>Atovaquone</b> : 1 500 mg/j en 1 prise ou <b>dapsone</b> 100 mg/j ou <b>pentamidine</b> aérosol : 300 mg/mois
Pneumopathie à pyogènes et légionelles	Idem immunocompétent	
<i>Rhodococcus equi</i>	<b>Vancomycine</b> + <b>érythromycine</b> ou + <b>rifampicine</b>	
Nocardiose Traitement d'attaque pendant > 3 mois puis Prophylaxie secondaire	<b>TMP</b> 15 mg/kg/j + <b>SMZ</b> 75 mg/kg/j ou <b>Sulfadiazine</b> 1,5-2 g x 4/j	<b>Minocycline</b> 200-400 mg/j ou <b>amikacine</b> + <b>imipénem</b> ou + <b>ceftriaxone</b>
Tuberculose pulmonaire	Quadrithérapie standard pour 6 mois	Cf. Antibiogramme
Infections à <i>Mycobacterium avium complex</i>	<b>Clarithromycine</b> 500 mg x 2/j + <b>éthambutol</b> 15 mg/kg/j ± <b>rifabutine</b> 300 mg/j	+ <b>amikacine</b> 15 mg/kg/j
<i>Mycobacterium kansasii</i>	<b>INH</b> + <b>rifampicine</b> + <b>éthambutol</b>	
Toxoplasmose pulmonaire	Cf. Toxoplasmose cérébrale	
Cryptococcose	Cf. Cryptococcose méningée	
Histoplasmose Coccidioïdomycose Aspergillose	<b>Amphotéricine B</b> en traitement d'attaque puis <b>itraconazole</b> en prophylaxie secondaire	

## ANTI-PNEUMOCYSTOSE (2)

## ■ Pentamidine

<b>PENTACARINAT</b>					
<b>En inj. IM ou perf. IV</b> - Pneumopathie à <i>Pneumocystis carinii</i> : 4 mg/kg en perf. IV lente/j x 14 j - Trypanosomiase africaine : 4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 7 à 10 inj. - Leishmanioses cutanées diffuses africaines ou cutanéomuqueuses : 3-4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 3 à 4 inj. - Leishmaniose viscérale : 3-4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 10 inj. <b>En aérosol</b> 1 aérosol mensuel de 300 mg à l'aide d'un nébulisateur <i>Respigard II</i> ou <i>Fisoneb</i>		1 fl. 300 mg à diluer dans 6 mL d'eau stérile	33,73	I	65 %
					33,73

**PROPRIÉTÉS**

Diamidine aromatique, de mode d'action mal connu, efficace dans le traitement de certaines protozooses et de la pneumocystose.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Utilisation par voie parentérale ou en aérosol, demi-vie de 29 h, élimination urinaire et fécale, pas de diffusion dans le système nerveux central, passage transplacentaire, pas d'effet systémique par voie intrapulmonaire.

**INDICATIONS**

- Trypanosomiase africaine.
- Leishmaniose cutanée, cutanéomuqueuse, viscérale (en 2<sup>e</sup> intention).
- Pneumocystose pulmonaire en traitement préventif ou curatif (moins efficace que le **cotrimoxazole**).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Tuberculose pulmonaire (risque de dissémination favorisée par l'usage des aérosols).

Enfant < 8 kg.

Allergie au **PENTACARINAT**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance fréquente pendant le traitement de la pression artérielle, de la glycémie, de la fonction rénale (protéinurie, diurèse, créatinine), de la numération et des enzymes hépatiques.

Perfusion dans du sérum glucosé pendant 1 à 2 h, malade à jeun et allongé.

Perfusion de pour prévenir le risque d'hypoglycémie.

Insuffisance rénale : diminuer la dose de 30 à 50 % (risque d'accumulation).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents par voie parentérale (> 50 %) : hypotension parfois grave, malaise, rash, nausées, vomissements, hypoglycémie potentiellement mortelle à prévenir par la perfusion de sérum glucosé, apparition d'un diabète sucré, insuffisance rénale (25 %), cytolyse hépatique, neutropénie, hypocalcémie, thrombopénie, hypocalcémie, fièvre, tachycardies, goût métallique. Rares : torsades de pointes, pancréatites.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

À surveiller : **didanosine**, **foscarnet**.

## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (4)

### Diagnostic des principales infections pulmonaires au cours du sida

INFECTIONS	MÉTHODES DIAGNOSTIQUES
Pneumocystose pulmonaire	Isolement de <i>Pneumocystis carinii</i> dans les crachats induits ou de lavage alvéolaire (réalisé en réanimation si $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg)
Infections bactériennes : ( $> 80$ % de <i>S. pneumoniae</i> , 25 % d' <i>Haemophilus</i> )	Le plus souvent traitement empirique sans prélèvement Isolement de la bactérie dans les prélèvements microbiologiques : lavage alvéolaire, prélèvement distal protégé Hémocultures
Infections à mycobactéries : Tuberculose <i>Mycobacterium avium</i> complex (MAC)	BK crachats ou tubages gastriques Hémocultures pour mycobactéries Biopsies : moelle, foie, ganglions, etc. La présence de MAC dans les crachats ne témoigne pas d'une infection mais d'une colonisation
Cryptococcose	Isolement de <i>Cryptococcus neoformans</i> dans le sang, les sécrétions bronchiques, le liquide de lavage alvéolaire Antigénémie cryptocoque $> 1/4$
Histoplasmose	Isolement d' <i>Histoplasma capsulatum</i> dans le sang ou un autre tissu
Toxoplasmose	Isolement du toxoplasme dans le liquide de lavage alvéolaire PCR dans le sang
Kaposi bronchique	Diagnostic par fibroscopie bronchique, lésion souvent très hémorragique (pas de biopsies)

#### Infections bactériennes

Très fréquentes. Pneumocoque en cause dans  $> 80$  % des cas, en particulier après 65 ans, sujets noirs, toxicomanie, alcool-tabac ou  $\text{CD4} < 500/\text{mm}^3$ .

Traitements conventionnels mais récidives fréquentes.

Arrêt tabagisme, vaccination (cf. Prophylaxies).

#### Cryptococcose pulmonaire

Porte d'entrée pulmonaire. Survient quand  $\text{CD4} \leq 100/\text{mm}^3$ .

Forme généralisée dans 90 % des cas justifiant une recherche systématique d'atteinte méningée.

Traitement : cf. forme méningée.

#### Maladie de Kaposi bronchique

Accompagne souvent une atteinte cutanée.  $\text{CD4} \leq 100/\text{mm}^3$ . Traitement au cas par cas.

#### Cancer bronchique

Risque accru, en particulier chez le fumeur.



## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (5)

### Infection à *Mycobacterium avium* complex

La plus fréquente mycobactériose non tuberculeuse rencontrée au cours de l'infection VIH.

Survient à un stade tardif ( $CD4 \leq 50/mm^3$ ) et se manifeste par une altération de l'état général modérément fébrile avec phosphatases alcalines parfois élevées. Traitement difficile car résistance naturelle à de nombreux antibiotiques et antituberculeux : clarithromycine 500 mg x 2 ou 3/j + éthambutol 15 mg/kg/j + rifabutine (ANSATIPINE) 300 mg/j pour 3 à 6 mois.

L'amikacine et la moxifloxacine peuvent être ajoutées en cas d'échec.

Traitement d'entretien par clarithromycine (1 g/j) ou azithromycine (600 mg/j), et éthambutol (15 mg/kg/j) au moins 1 ans.

- Possibilité d'arrêt après 1 an de traitement si infection guérie,  $CD4 > 100/mm^3$  au moins 6 mois, à reprendre si  $< 200/mm^3$ .
- Autres mycobactérioses : *M. kansasii*, *M. xenopi*, *M. goodii*.

### Lymphomes pulmonaires ou généralisés

1<sup>re</sup> cause de mortalité en France.

Représente environ 5-10 % des infections opportunistes inaugurales de sida.

Les stratégies thérapeutiques dépendent de la profondeur de l'immunodépression et de la possibilité d'une restauration immunitaire sous **antirétroviraux**. Elles sont centrées sur l'histologie et s'orientent de plus en plus vers des schémas proches de ceux des immunocompétents.

$CD4 > 200/mm^3$  et restauration possible : protocoles proches de l'immunocompétent.

Utilisation de facteurs de croissance hématopoïétique.

Autogreffe de moelle proposée dans certaines formes  $CD4 < 100/mm^3$  et pas d'espoir de restauration immunitaire : traitements palliatifs dont corticothérapie ou radiothérapie locale.

## SIDA - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (1)

### Toxoplasmose cérébrale

1<sup>re</sup> cause de lésions cérébrales focales au cours du sida.

Réactivation de *Toxoplasma gondii* (sérologie positive en IgG) lorsque les CD4 sont  $\leq 100/\text{mm}^3$  et en l'absence de prophylaxie.

#### Traitement d'attaque

##### Urgent +++

- Hospitalisation en milieu spécialisé ou en réanimation. En cas de troubles de conscience, assurer la liberté des voies aériennes, prévenir une pneumopathie de déglutition, soins de nursing.
- Sert de test diagnostique : **pyriméthamine (MALOCIDE)** 100 mg le 1<sup>er</sup> j puis 50 à 75 mg/j et **sulfadiazine (ADIAZINE)** 4 à 6 g/j et **acide folinique** pour 4 à 6 sem.
- Hydratation avec alcalinisation (1 L de Vichy).
- Intolérance : tenter de poursuivre l'association sauf éruption sévère avec fièvre : arrêter d'abord la **sulfadiazine**.
- **Anti-cédémateux** (si hypertension intracrânienne ou effet de masse) : **SOLUMÉDROL** 60 à 120 mg/j pendant 2-3 j puis diminution rapide (traitement également efficace sur le lymphome cérébral)  $\pm$  **mannitol**.
- **Antiépileptique** (non systématique) : **DÉPAKINE** 20-30 mg/kg/j  $\pm$  **RIVOTRIL** 2 mg/j les premiers jours.

#### Évolution

- Favorable en 10 j, contrôle scanner après au moins 15 j de traitement, si aggravation discuter une biopsie.
- Guérison complète en 6 sem. à 6 mois mais séquelles possibles surtout si lésion initiale avec effet de masse.

#### Prophylaxie secondaire

- **Systématique**,  $> 80\%$  de rechute sans traitement.

- **Pyriméthamine + sulfadiazine** (prophylaxie combinée contre la pneumocystose) moins de rechute (7 %) qu'avec **pyriméthamine + clindamycine** (28 %).

- Possibilité d'arrêt si  $\text{CD4} > 200/\text{mm}^3$  au moins 6 mois, à reprendre si  $< 300-350/\text{mm}^3$ .

### Cryptococcose neuroméningée

2<sup>e</sup> infection opportuniste du système nerveux central. Survient quand les CD4 sont  $< 100/\text{mm}^3$ .

Levure ubiquitaire en grande concentration dans les déjections de pigeons. Contamination par voie respiratoire puis ensemencement des méninges par voie hématogène.

Il faut rechercher une forme généralisée ( $> 90\%$  des cas).

#### Traitement d'attaque

**6 à 8 sem.** à adapter à l'évolution de la clinique et du LCR.

##### Urgent +++

- Hospitalisation en milieu spécialisé ou en réanimation.
- Formes graves : **amphotéricine B IV** ou **amphotéricine B liposomale** si possible associé à la **flucytosine per os** ou IV : 100 mg/kg/j pendant 15 j puis **fluconazole per os** 400 à 800 mg/j en 1 prise au moins 8 sem.
- Formes modérées : **fluconazole** 400 mg/j *per os* ou IV.

#### Évolution

- Rechutes fréquentes.

#### Prophylaxie secondaire

Systématique, à vie par **fluconazole** 200 à 400 mg/j en 1 prise *per os* en raison d'une impossibilité de stériliser les foyers infectieux.

Possibilité d'arrêt si  $\text{CD4} > 200/\text{mm}^3$  et charge virale indétectable, traitement  $> 12$  mois, antigène LCR  $< 1/512$  depuis plus de 3 mois, et à reprendre si  $< 100-200/\text{mm}^3$ .

## ANTI-TOXOPLASMOSE (1)

## ■ Sulfadiazine

ADIAZINE					
En 4 prises <i>per os</i> en dehors des repas	20 cp. 500 mg	3,46	I	65 %	0,17
A. : 8 à 12 cp./j					
E. : 150 mg/kg/j					

## PROPRIÉTÉS

**Sulfamides** bactériostatiques inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique utilisé pour son action sur certains protozoaires.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou parentéral, bonne biodisponibilité, bonne distribution tissulaire (y compris le LCR, liquides synovial, pleural et péritonéal), métabolisation hépatique, élimination urinaire, passage transplacentaire.

## INDICATIONS

- Traitement préventif et curatif de la toxoplasmose.
- Prévention de la pneumocystose pulmonaire au cours du sida.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergies aux **sulfamides**.  
Fin de **grossesse**, **allaitement**, nouveau-né.  
Insuffisances hépatiques sévères.  
Porphyries, déficit en G6PD, anémies par carence en folates.  
Exposition aux UV (photosensibilisation).  
**Méthotrexate**, **procaïne**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillés pendant la grossesse.  
Surveillance hématologiques en cas de traitement prolongé.

Associer de l'**acide folinique** en cas de traitement au long cours.

Diurèse alcaline (cristallurie).

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- < 30 mL/min : 1,5 à 3 g/12 h ;
- < 10 mL/min : 1,5 à 3 g/24 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, stomatite, colite pseudomembraneuse, ulcérations œsophagiennes, pancréatites (rares), ictère nucléaire du nouveau-né.

Réactions allergiques (fréquentes au cours du sida) : urticaires, érythème maculopapuleux, œdème de Quincke, fièvre, arthralgies, vascularites, hépatites immuno-allergiques, maladie sérique, dermatites exfoliatrices, syndrome de Lyell (0,2 cas/million).

Troubles hématologiques : neutropénie réversible, anémie mégalo-blastique, méthémoglobinémie, thrombopénie, agranulocytose.

Troubles neurologiques : céphalées, neuropathies périphériques, dépression, convulsions, ataxie, hallucinations visuelles, acouphènes, vertiges, insomnie, surdité, tremblements.

Tubulopathie et insuffisance rénale.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K**, **phénytoïne**, **sulfamides**, **hypoglycémiant**, **zidovudine**.

Diminution de la ciclosporinémie.

## SIDA - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (2)

### Traitements de la toxoplasmose cérébrale

	TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE	TRAITEMENTS DE 2 <sup>e</sup> INTENTION
Traitement d'attaque (4 à 6 sem.)	<b>MALOCIDE</b> 100 mg le 1 <sup>er</sup> j puis 50 à 75 mg/j + <b>Acide folinique</b> 25 mg/j + <b>ADIAZINE</b> 4 à 6 g/j en 3 à 4 prises Traitement antiépileptique	<b>MALOCIDE</b> + <b>acide folinique</b> + <b>DALACINE</b> 2,4 g/j en 4 prises <i>per os</i> ou IV
Prophylaxie secondaire (systématique)	Idem à demi-doses	Idem à demi-doses ou <b>MALOCIDE</b> 1 mg/kg/j + prophylaxie de la pneumocystose

### Traitements des cryptococcoses neuroméningées

	TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE
Traitement d'attaque (4 à 6 sem.)	Formes graves : <b>FUNGIZONE</b> 0,7 à 1 mg/kg/j ( <i>per os</i> ou IV) ou <b>AMBISOME</b> ± <b>ANCOTIL</b> 75 à 150 mg/j (IV) puis relais par <b>TRIFLUCAN</b> 400 à 800 mg/j ( <i>per os</i> ou IV) Formes modérées : <b>TRIFLUCAN</b> 400 mg/j ( <i>per os</i> ou IV)
Prophylaxie secondaire (systématique, à vie)	<b>TRIFLUCAN</b> 200 à 400 mg/j ( <i>per os</i> )

### Critères de mauvais pronostic des cryptococcoses neuro-méningées

1. Troubles de conscience 2. Examen direct à l'encre de Chine positif 3. Élévation de la pression d'ouverture du LCR 4. Glycorrhachie $\leq 2$ mmol/L 5. Leucocytes dans le LCR $< 20/\mu\text{L}$	6. Présence de cryptocoques en dehors du système nerveux 7. Absence d'anticorps anticryptococciques 8. Titre d'antigène cryptococcique $> 1/1\ 024$ dans sérum ou LCR
--	---

## ANTI-TOXOPLASMOSE (2)

■ **Pyriméthamine**

<b>MALOCIDE</b>					
En 1 prise/j <i>per os</i> A. : 100-200 mg le 1 <sup>er</sup> j puis 50 à 100 mg/j E. : 1 mg/kg/j en 2-3 prises/sem.	20 cp. séc. 50 mg	13,76	I	65 %	0,69

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la dihydrofolate réductase active 1 000 fois plus actif sur les protozoaires sensibles que sur les cellules humaines.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Bonne absorption *per os*, métabolisation quasi complète, excrétion de 3 % de la drogue sous forme inchangée dans les urines.

**INDICATIONS**

- Traitement curatif et préventif de la toxoplasmose au cours du sida (en association avec un **sulfamide**).
- Traitement préventif de la pneumocystose au cours du sida (en association avec la **dapsone**).
- Traitement curatif de certains accès palustre à *Plasmodium falciparum* résistants ou en cas d'allergie.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Supplémentation en **acide folinique** au cours des traitements de longue durée.  
Surveillance hebdomadaire de la numération sanguine et des plaquettes.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Anémie, neutropénie, thrombopénie par carence en **acide folique**.  
Rares : rash, vomissements, convulsions.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillées : autres médicaments myélosuppresseurs (**zidovudine**).  
Synergie avec les **sulfamides**.

## SIDA - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (3)

### Lymphome cérébral primitif

En général de type B et de haut grade de malignité et est souvent évoqué après l'évolution défavorable d'un traitement d'épreuve d'une toxoplasmose.

- **Diagnostic de certitude** : histologique mais rarement pratiqué en raison du pronostic.
- Traitement par corticothérapie à fortes doses  $\pm$  radiothérapie.
- Si restauration immunitaire possible, discuter une chimiothérapie lourde associant **méthotrexate** et **corticoïdes**.
- Évolution défavorable en quelques mois.

### Encéphalites

Difficiles à différencier cliniquement et parfois radiologiquement les unes des autres, le diagnostic repose pour certaines d'entre elles sur la recherche du virus par PCR dans le LCR.

#### Encéphalite liée au VIH

- Fréquente à un stade d'immunodépression avancée.
- Diagnostic évoqué devant une charge virale intrathécale  $>$  charge virale plasmatique.
- Traitement proposé : restauration de l'immunité par traitement antirétroviral en tenant compte du génotype du virus présent dans les méninges.

#### Encéphalite à CMV

- Lymphocytes **CD4**  $<$   $50/\text{mm}^3$ .
- Traitement par **ganciclovir**  $\pm$  **foscarnet**.
- Évolution **rapidement défavorable**.

#### Leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP)

- Atteintes neurologiques focales d'apparition insidieuse et progressive. Présence intrathécale du virus JC.

- Restauration de l'immunité par traitement antirétroviral.
- Évolution fatale dans 50 % des cas malgré traitement antirétroviral.

#### Encéphalite herpétique

Elle n'est pas plus fréquente que dans la population générale.  
Traitement par **aciclovir**.

#### Virus Zona-Varicelle (VZV)

L'encéphalite est souvent précédée d'un zona dans les 6 mois.  
Traitement par **aciclovir** **IV** 15 mg/kg toutes les 8 h.

#### Neuropathies périphériques

Une cause iatrogène (**antirétroviraux**) doit toujours être évoquée en premier.

#### Neuropathies liées au VIH

- Fréquente à un stade d'immunodépression avancée, parfois inaugurale.
- Atteinte focale ou multifocale, polynévrites, polyradiculopathies inflammatoires, syndrome de Guillain-Barré, paralysie de paires crâniennes, dysautonomie.
- **Lésions histologiques non spécifiques**.
- Mauvais pronostic, traitement symptomatique.

#### Neuropathies à cytomégalovirus

- À un stade d'immunodépression avancée.
- Atteinte asymétrique plutôt aux membres inférieurs (syndrome de la queue de cheval).
- **Rechercher une rétinite à CMV et une virémie à CMV**.
- **Réaction méningée** à polynucléaires évocatrice.
- **Biopsie nerveuse** : lésions nerveuses nécrotiques inflammatoires multifocales avec infiltrats de polynucléaires et inclusions cytomégaliqes.
- **Traitement d'attaque** : **ganciclovir** (**CYMÉVAN**) **IV** 5 mg/kg  $\times$  2/j ou **foscarnet** (**FOSCAVIR**) **IV** 90 mg/kg  $\times$  2/j.

## SIDA - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (4)

### Diagnostic des complications neurologiques centrales au cours du sida

MALADIE	IMAGERIE CÉRÉBRALE	CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
Atteintes focales		
Toxoplasmose	Scanner : lésions focales le plus souvent multiples bilatérales (70-80 %) hypodenses prenant le contraste en couronne, situées à la jonction entre substance blanche et grise ou dans les noyaux gris centraux. Petites lésions décelables uniquement en IRM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pas de diagnostic</li> <li>– Biopsie cérébrale</li> <li>– Test thérapeutique</li> </ul>
Cryptococose neuro-méningée	Scanner anormal dans 50 % des cas : atrophie corticale diffuse (34 %), lésion focale (11 %), hydrocéphalie (9 %). IRM plus sensible : foyers en hypersignal en T2 sans prise de contraste en T1, infiltrations méningées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LCR normal ou méningite lymphocytaire hypoglycorachique, augmentation de la pression d'ouverture</li> <li>– Cryptocoques à l'examen direct (encore de Chine), culture dans le LCR</li> <li>– Antigène sang ou LCR <math>\geq 1/4</math></li> </ul>
Lymphome cérébral	Scanner cérébral : lésion focale non spécifique spontanément hyperdense (50 % des cas), voire iso ou hypodense avec prise de contraste en périphérie et œdème périlésionnel, le plus souvent unique, située dans le lobe temporal ou frontal, les régions périventriculaires, le corps calleux ou les noyaux gris centraux. En cas de lésion unique, il est quasiment impossible de faire la différence entre un lymphome et une toxoplasmose cérébrale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Biopsie cérébrale</li> <li>– Test thérapeutique aux <b>corticoïdes</b> non spécifique</li> </ul>
Encéphalites		
VIH	IRM : atrophie cérébrale diffuse, plages d'hyposignal dans la substance blanche sans prise de contraste en T1, en hypersignal en T2.	Charge virale VIH intrathécale > charge virale plasmatique
CMV	IRM : lésions cérébrales proches de l'encéphalite liée au VIH, prises de contraste méningées et de la région périventriculaire évocatrices mais non spécifiques et inconstantes.	Détection de CMV par PCR dans le LCR
LEMP	IRM : multiples lésions focales dans la substance blanche en hyposignal mais sans prise de contraste en T1, en hypersignal en T2, correspondants aux déficits cliniques.	Détection du virus JC par PCR dans le LCR Sensibilité 75 % Spécificité 95 %
HSV	Nécrose(s) localisée(s), hypersignal de la substance blanche en T2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– EEG</li> <li>– Recherche HSV dans le LCR (non validée)</li> </ul>
VZV	Imagerie cérébrale proche de la LEP.	Recherche VZV dans le LCR (non validée)

## SIDA - COMPLICATIONS RÉTINIENNES (1)

### Rétinite à CMV

Elle touche entre des malades atteints de sida ou dont les lymphocytes **CD4** sont  $\leq 50/\text{mm}^3$ .

L'aspect est caractéristique au fond d'œil en plage blanche paravasculaire avec lésions, hémorragies et/ou vascularite rétinienues.

Le début est souvent asymptomatique justifiant un fond d'œil systématique tous les mois quand les lymphocytes T CD4 sont  $\leq 100/\text{mm}^3$ .

### Traitement d'attaque

#### Urgent +++

- Hospitalisation pour surveillance de la tolérance thérapeutique.
- Prise en charge psychologique.
- Mise en place d'un cathéter central si problème de voie d'abord veineuse.

Le choix du traitement repose sur les complications potentielles, les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les contraintes de chaque produit (à efficacité équivalente).

- **Par voie orale:** **valganciclovir** oral (900 mg x 2/j) pendant 14-21 j (hors AMM).
- **Alternatives : par voie IV :**
  - **ganciclovir (CYMEVAN)** : 10 mg/kg/j en 2 perfusions de 1 h pendant 21 j ;
  - **foscarnet sodique (FOSCAVIR)** : 180 mg/kg/j en 2 perfusions de 2 h pendant 21 j ;
  - **cidofovir (VISTIDE)** : 5 mg/kg/j en 1 perfusion/sem. (associée à 2 g de **probenécide**

*per os* 3 h avant la perfusion et 1 g 2 h et 8 h après), pendant 14 j.

### Évolution

- Cicatrisation ( $> 80\%$  des cas) mais absence de récupération fonctionnelle de la rétine détruite.
- Contrôles d'amélioration à 8 j et de cicatrisation avant le début du traitement d'entretien.

### Traitement d'entretien

Rechute quasi systématique sans traitement et si persistance de l'immunodépression.

**Par voie orale, valganciclovir** 900 mg/j.

Traitement parentéral ou intravitréen à discuter au cas par cas.

Possibilité d'arrêt si  $\text{CD4} > 100\text{-}150/\text{mm}^3$  au moins 6 mois, sous surveillance ophtalmologique régulière et à reprendre si  $< 200\text{-}250/\text{mm}^3$ .

### Autres rétinites

#### Toxoplasmose

Comparable à la rétinite à CMV. Le diagnostic se fait au fond d'œil.

Traitement par **pyriméthamine + sulfadiazine**.

#### VZV

Vascularite nécrotique.

Traitement par **aciclovir** IV.

#### Divers

*Herpes simplex*, *Candida*, syphilis, tuberculose (cf. traitements spécifiques).



## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (1)

## ■ Ganciclovir

CYMÉVAN				
En perf. IV de 1 h	1 fl. 500 mg	HOP	I	
Traitement d'attaque : 5 mg/kg x 2/j				
Traitement d'entretien : 5 mg/kg x 1/j				

## PROPRIÉTÉS

Analogue de la déoxyguanosine métabolisé par les enzymes cellulaires en dérivé phosphaté actif, virustatique sur les herpesvirus et plus particulièrement sur CMV.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité 10 %), intraveineux ou intravitréen, bonne diffusion y compris le LCR, l'humeur aqueuse et la rétine, pas de métabolisation, élimination rénale (> 90 %), hémodialysable.

## INDICATIONS

- Traitement curatif et prévention secondaire des infections graves à CMV chez les immuno-déprimés.
- Prophylaxie des infections à CMV chez les greffés de moelle.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ganciclovir** ou à l'**aciclovir** ; leucopénie < 500 polynucléaires/mm<sup>3</sup>. **Grossesse** et **allaitement** ; absence de contraception efficace.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les injections sous-cutanées et intramusculaires.  
Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine : cf. Tableau.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles hématologiques (fréquents) : neutropénie < 1 000/mm<sup>3</sup> (40 %) réversible dépendante de la dose et précoce (2<sup>e</sup> semaine de traitement), thrombopénie (20 %), anémie (2-4 %). Troubles neurologiques (5-15 %) : céphalées (10 %), convulsions (3 %), confusion (5 %). Troubles digestifs : nausées (10 %), vomissements (2 %), augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines. Complications au point d'injection : hémorragies intravitréennes, induration scléreuse, décollement rétinien. Divers : rashes (6 %), fièvre, myalgies, frissons, malaises, réactions anaphylactiques, élévation de la créatininémie (2 %).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation des troubles hématologiques et sur les épithéliums à renouvellement rapide (intestinal, cutané, génital) : **dapsone**, **pentamidine**, **pyriméthamine**, **flucytosine**, **anticancéreux** (vincristine, vinblastine, doxorubicine), **amphotéricine B**, **sulfaméthoxazole-triméthoprime**, **zidovudine**.

Augmentation du risque de convulsions : **imipénème-cilastatine**.

Risque élevé de convulsions : **imipénem-cilastatine**.  
Risque de toxicité accrue : **probenécide**, **AZT** (médullaire), **ddC** (neuropathie), **ciclosporine** (rénale).

## POSOLOGIE

## Posologie du ganciclovir au cours de l'insuffisance rénale

CLAIRANCE DE LA CRÉATININE (mL/min)	GANCICLOVIR IV		GANCICLOVIR ORAL
	DOSE D'ATTAQUE (mg/kg)	DOSE D'ENTRETIEN (mg/kg)	DOSE D'ENTRETIEN (mg)
> 80	5/12 h	5/24 h	1 000/8 h
50-80	5/12 h	2,5/24 h	500/8 h
30-50	2,5/12 h	2,5/24 h	250/6 h
10-30	2,5/24 h	2,5/24 h	250/12 h
< 10 et HD*	1,25/24 h	1,25/24 h	50 × 3/sem.

\* HD : hémodialyse, administrer 2,5 mg/kg en fin de séance.

## SIDA - COMPLICATIONS RÉTINIENNES (2)

### Traitements d'attaque des rétinites à cytomégalo­virus (≥ 21 j)

VOIE D'ADMINISTRATION	MÉDICAMENTS	SURVEILLANCE	CONTRE-INDICATIONS
Traitement de 1 <sup>re</sup> intention			
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 mg/kg × 2/j	NFS, plaquettes × 2/sem.	Neutrophiles < 500/mm <sup>3</sup> Plaquettes < 20 000/mm <sup>3</sup>
	<b>Foscarnet</b> 90 mg/kg × 2/j	Créatinine, ionogramme sanguin phosphorémie, NFS × 2/sem.	
Implant oculaire	<b>Ganciclovir</b> mise en place chirurgicale + <b>ganciclovir</b> ou <b>valganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique	
Traitement de 2 <sup>e</sup> intention			
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 mg/kg/sem. <b>Probénécide</b> 2 g <i>per os</i> 3 h avant puis 1 g à 2 h et à 8 h après la perf.	Créatinine, protéinurie, NFS, plaquettes avant chaque perf. (risque de néphrotoxicité irversible)	Protéinurie ≥ 2 + Créatinine ≥ 133 µmol/L Clairance de créatinine ≤ 55 mL/min Neutrophiles < 500/mm <sup>3</sup>
Intravitréenne	<b>Ganciclovir</b> 400 µg × 2/sem.	Surveillance ophtalmologique	
<i>Per os</i>	<b>Valganciclovir</b> 900 mg × 2/j		

### Traitements d'entretien des rétinites à cytomégalo­virus

VOIE D'ADMINISTRATION	MÉDICAMENTS	SURVEILLANCE
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 à 6 mg/kg/j, 5 à 7 j/sem.	NFS, plaquettes × 1/sem.
	<b>Foscarnet</b> 120 mg/kg × 1/j	Créatinine, ionogramme sanguin phosphorémie × 1/sem.
Intravitréenne	<b>Ganciclovir</b> 400 µg × 1/sem. + <b>valganciclovir</b> ou <b>ganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique
Implant oculaire	<b>Ganciclovir</b> remplacement après 6 mois + <b>valganciclovir</b> ou <b>ganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique
<i>Per os</i>	<b>Valganciclovir</b> 900 mg × 1/j	NFS, plaquettes × 1/sem.

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (2)

## ■ Foscarnet sodique

FOSCAVIR				
Traitement d'attaque : 2 perf./j	fl. 6 g	HOP	I	
Traitement d'entretien : 1 perf./j				

## PROPRIÉTÉS

Antiviral virustatique qui inhibe directement l'ADN polymérase des *Herpes viridae*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage intraveineux ou intraveineux (biodisponibilité *per os* < 20 %), concentration plasmatique variable d'un sujet à l'autre, bonne distribution (LCR, forte fixation osseuse), pas de métabolisation, élimination rénale > 80 %, hémodialysable.

## INDICATIONS

- Traitements curatifs et prévention secondaire des infections graves à CMV chez les immunodéprimés.
- Traitements des infections à HSV et VZV résistants à l'**aciclovir** et des infections à CMV résistantes au **ganciclovir**.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la créatinine plasmatique (cf. tableau).  
Supplémentation en phosphore et en potassium.  
Perfusions lentes de 2 h avec hyperhydratation ≥ 2 L de sérum physiologique/j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles néphrologiques (diminués par l'hyperhydratation) : augmentation de la créatinémie, protéinurie, diabète insipide, néphrite interstitielle aiguë, hypo- ou hypercalcémie (30-60 %), hypokaliémie (16 %), hypomagnésémie (15 %), hyperphosphorémie (8 %).

Troubles urologiques : ulcérations du gland et du méat urinaire.

Troubles hématologiques : anémie (20-50 %), leuconéutropénie, thrombopénie.

Troubles neurologiques : fatigue (100 %), hallucinations, céphalées, maux de tête, convulsions, paresthésies.

Troubles digestifs : nausées, vomissements (20-30 %), diarrhées, douleurs abdominales, ulcérations buccales.

Divers : fièvre (25 %), rashes, dermites de contact, augmentation des transaminases.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

Médicaments hypo- ou hypercalcémiant.

## POSOLOGIE

## Posologies de foscarnet chez l'insuffisant rénal

CRÉATININÉMIE (μmol/L)	DOSES D'ATTAQUE (mg/kg)	INTERVALLES (h)	DOSES D'ENTRETIEN (mg/kg/j)
< 110	60	8	90-120
110-120	55	8	90-120
120-140	49	8	78-104
140-170	42	8	75-100
170-210	35	8	71-94
210-240	28	8	63-84
240-250	21	8	57-76
> 250	NR*	NR	NR

\* NR : non recommandé.

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (3)

## ■ Valganciclovir

ROVALCYTE					
<i>Per os</i> , au cours d'un repas A. : traitement d'attaque d'une rétinite à CMV : 900 mg x 2/j pendant 21 j A. : traitement d'entretien d'une rétinite à CMV : 900 mg x 1/j Intérêt de la sol. buv. pour l'insuffisant rénal chez qui la posologie doit être réduite	5000 mL (fl.) sol. buv. 50 mg/mL 60 cp. 450 mg	254,26	I	65 %	0,05
		1443,73	I	65 %	24,06

## PROPRIÉTÉS

Prodrogue du **ganciclovir**, dont la biodisponibilité permet une exposition similaire au **ganciclovir** intraveineux, actif *in vitro* sur de nombreux herpesvirus (HSV-1 et -2, VZV, CMV), et le virus de l'hépatite B, étudié dans le traitement des rétinites à CMV au cours de l'infection par le VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, prodrogue rapidement métabolisée en **ganciclovir**, absorption orale augmentée par la prise d'aliments (10 fois mieux absorbé que le **ganciclovir** oral), biodisponibilité 60 %, métabolisé en **ganciclovir** puis éliminé sous cette forme par voie rénale. Cf. aussi la pharmacocinétique du **ganciclovir**.

## INDICATIONS

Traitement d'attaque et d'entretien des rétinites à cytomégalovirus au cours du sida de l'adulte : serait d'une efficacité égale au **ganciclovir** intraveineux.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité au **valganciclovir**, **aciclovir** ou **ganciclovir**.

Absence de contraception efficace;

Neutropénie à polynucléaires neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>.

Thrombocytopénie < 25 000/mm<sup>3</sup>.

Hémoglobine < 8 g/dL.

Hémodialyse : préférer **ganciclovir** intraveineux.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas broyer ni casser les comprimés.

Chez l'animal : mutagène, tératogène, aspermatogénique et carcinogène.

Contraception obligatoire chez la femme en âge de procréer.

Risque d'inhibition définitive de la spermatogénèse et risque de stérilité chez la femme : nécessité d'utiliser des préservatifs pendant la durée du traitement et 90 j après l'arrêt.

Agent cancérigène possible. Insuffisance rénale : cf. Tableau.

Risque de toxicité hématologique grave : surveillance bimensuelle de l'hémogramme et des plaquettes, ou hebdomadaire si antécédent de neutropénie ou neutropénie en début de traitement.

Surveillance bimensuelle ou mensuelle de la fonction rénale.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Cf. **ganciclovir**.

Traitement d'attaque : fréquents (≥ 10 %) : diarrhées, neutropénie, fièvre, candidose buccale.

Traitement d'entretien : fréquents (≥ 20 %) : diarrhées, nausées, neutropénie, anémie, fièvre.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Cf. **ganciclovir**.

## POSOLOGIE

Clairance de la créatinine (mL/min)	Traitement d'attaque	Traitement d'entretien
≥ 60	900 mg x 2/j	900 mg x 1/j
40-59	450 mg x 2/j	450 mg x 1/j
25-39	450 mg x 1/j	225 mg x 1/j
10-24	225 mg x 1/j	125 mg x 1/j
< 10	200 mg x 3/sem. après dialyse	100 mg x 3/sem. après dialyse

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (4)

## ■ Cidofovir

VISTIDE					
A. : en 1 h, à vitesse constante, après une bonne hydratation Traitement d'attaque : 5 mg/kg x 1/sem. pendant 2 sem. consécutives Traitement d'entretien : 5 mg/kg toutes les 2 sem. à démarrer 2 sem. après la fin du traitement d'attaque Administrer, avec un repas, 2 g de <b>probénécide</b> 3 h avant le <b>cidofovir</b> et 1 g de <b>probénécide</b> 1 h et 8 h après la fin de la perf. (4 g au total)		5 fl. 375 mg/5 mL	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Analogue de la cytidine inhibiteur de la réplication virale du cytomégalo virus humain.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage intraveineux, bonne diffusion dans l'humour aqueux et la rétine, pas de métabolisation (nécessite une phosphorylation intracellulaire pour être actif sur l'ADN-polymérase virale), élimination rénale sous forme inchangée (> 90 %), hémodialysable.

## INDICATIONS

Traitement curatif et prévention secondaire des rétinites à CMV au cours du sida.

En cours d'étude dans la leuco-encéphalite multifocale progressive.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **cidofovir** ou au **probénécide**.

## Grossesse et allaitement

Insuffisance rénale (créatinine > 133 µmol/L, clairance < 55 mL/min ou protéinurie > 0,1 mg/dL). Co-administration de produits néphrotoxiques. Usage intravitréen.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier la NFS et la fonction rénale avant chaque injection.

Hydrater avec 1 L de sérum physiologique administré pendant 1 h juste avant le **cidofovir** puis continuer par 1 L démarré en même temps que le **cidofovir** mais perfusé pendant 1 à 3 h.

Administrer, avec un repas, 2 g de **probénécide** 3 h avant le **cidofovir** et 1 g de **probénécide** 1 h et 8 h après la fin de la perfusion (4 g au total).

Arrêt de tout médicament néphrotoxique au moins 7 j avant le début du **cidofovir**.

Interrompre les injections et intensifier l'hydratation en cas d'augmentation de la créatininémie de 44 µmol/L ou de protéinurie à 2+, soit supérieure à 100 mg/dL.

En cas d'allergie cutanée ou d'intolérance digestive du **probénécide**, administrer un **anti-histaminique**.

Prévenir le risque de diffusion sous-cutanée par une bonne voie d'abord.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine (cf. Encadré).

Risque de neutropénie réversible.

Risque d'uvéïte à traiter localement.

Diluer dans du sérum physiologique. Utiliser des poches de perfusion en chlorure de polyvinyle ou éthylène/propylène.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Toxicité rénale responsable d'insuffisance rénale parfois irréversible par atteinte tubulaire et prévenue par l'administration de **probénécide** qui en inhibe la réabsorption tubulaire proximale. Dépistage par mise en évidence de signes avant-coureurs : protéinurie, hypophosphorémie, augmentation de la créatininémie.

Fréquents (> 10 %) : fièvre, éruption cutanée, nausées et vomissements, neutropénie, asthénie, alopecie.

Uvéïte médicamenteuse d'évolution habituellement favorable sous **corticoïdes** locaux.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions avec le métabolisme ou la sécrétion rénale de nombreux médicaments. Liste non exhaustive : **paracétamol**, **aciclovir**, **inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, **aspirine**, **barbituriques**, **benzodiazépines**, **méthotrexate**, **furosémide**, **AINS**, **théophylline**, **AZT**, etc.

**AZT** : arrêt du traitement ou diminution de 50 %.

**SIDA - COMPLICATIONS DIGESTIVES HAUTES (1)**

Les complications digestives hautes au cours du sida concernent essentiellement l'œsophage et ont une clinique commune, non spécifique : brûlures et douleurs rétrosternales, dysphagie, intolérance alimentaire, odynophagie, épigastalgies, hoquet. Les explorations digestives permettent un diagnostic de certitude. Pour éviter des endoscopies inutiles, il est habituel d'attendre le résultat d'un traitement d'épreuve d'une candidose avant de poursuivre les explorations.

**Candidose œsophagienne**

1<sup>re</sup> cause d'atteinte œsophagienne. Peut survenir précocement au cours de l'évolution et révéler une infection VIH méconnue avec des  $CD4 \leq 200/mm^3$ . Candidose buccale souvent associée.

**Traitement d'attaque**

Traitement d'épreuve sans endoscopie en cas de forme peu sévère (candidose orale associée) à réévaluer au bout de quelques jours :

- **fluconazole (TRIFLUCAN)** 400 mg/j J1 puis 200 mg/j en 1 prise *per os* pendant 2-3 sem. ;
- **itraconazole (SPORANOX)** 4 pendant 2-3 sem. en surveillant les concentrations plasmatiques.

**Évolution**

Elle est favorable en 3 à 5 j. En cas d'échec clinique : réaliser une endoscopie si elle n'a pas eu lieu. Deux attitudes possibles :  
– augmenter la dose de **fluconazole** à 400 mg/j *per os* ou par voie IV (malabsorptions fréquentes) ;

– ou traitement par **amphotéricine B (FUNGIZONE)** IV 0,2 à 0,3 mg/kg/j, éventuellement sous forme liposomale. Pas de traitement d'entretien en raison du risque de sélection de souches résistantes (peut être discuté si forme multi-récidivante).

**Œsophagite à CMV**

Plus tardivement que la candidose :  $CD4 \leq 100/mm^3$ .

**Traitement d'attaque**

- Hospitalisation.
- Prévoir une voie d'abord veineuse la durée du traitement.
- **Ganciclovir (CYMÉVAN)** 10 mg/kg/j en 2 perf. de 1 h pendant 2-3 sem.
- **Foscarnet (FOSCAVIR)** 180 mg/kg/j en 2 perf. de 2 h pendant 2-3 sem.

**Évolution**

Souvent favorable, mais risque de rechute. Contrôler la cicatrisation par endoscopie.

**Traitement d'entretien**

À discuter en cas de rechute.

**Œsophagite herpétique**

Rare et très douloureuse.

À tous les stades d'immunodépression.

- Hospitalisation.
- **Aciclovir (ZOVIRAX)** IV 10 mg/kg/j x 3 perf./j.

**Maladie de Kaposi digestive**

Découverte endoscopique. Traiter si symptômes.

**Ulçère œsophagien idiopathique**

Rare, très douloureux. Pas de cause connue, diagnostic d'élimination.  $CD4 \leq 150/mm^3$ .

## SIDA - COMPLICATIONS DIGESTIVES HAUTES (2)

### Pathologies digestives hautes observées au cours du sida

MALADIE	ASPECT ENDOSCOPIQUE	DIAGNOSTIC DE CERTITUDE	TRAITEMENT
Candidose œsophagienne	Évocateur Tiers supérieur parfois jusqu'au cardia Lésions blanchâtres non confluentes, fausses membranes noirâtres	Biopsies ou frottis pour recherche de levures et filaments	<b>Fluconazole (TRIFLUCAN)</b> 100-200 mg/j pendant 2-3 sem. <b>Amphotéricine B</b> IV 0,2-0,3 mg/kg/j
Œsophagite à CMV	Non spécifique Moitié inférieure Ulcérations à bords irréguliers, < 5 cm, de formes variables ± recouvertes de fibrine Gastrite et duodénite possibles	Biopsies pour recherche de cellules à inclusions et immunomarquage	<b>Ganciclovir (CYMÉVAN)</b> 10 mg/kg/j en 2 perf. IV pendant 2-3 sem. <b>Foscarnet (FOSCAVIR)</b> 180 mg/kg/j en 2 perf. IV pendant 2-3 sem.
Œsophagite herpétique (HSV-1)	Non spécifique Tiers inférieur Érosions ou ulcérations superficielles Parfois gastrite associée	Biopsies pour recherche d'inclusions cellulaires spécifiques et immunomarquage	<b>Aciclovir (ZOVIRAX)</b> 30 mg/kg/j en 3 perf.
Maladie de Kaposi gastrique et/ou duodéno-jéjunale	Évocateur Nodules sous-muqueux rouge-violet, de taille variable, sommet parfois ulcéré	Biopsies (rentabilité de 10-50 %) pour examen anatomopathologique	Aucun si asymptomatique sinon chimiothérapie
Lymphome non hodgkinien	Ulcérations à bords irréguliers et inflammatoires Prolifération bourgeonnante	Biopsies pour examen anatomopathologie et immunomarquage	Chimiothérapie
Ulcères idiopathiques	Idem CMV	Biopsies : lésions inflammatoires non spécifiques	<b>Prednisolone</b> <b>Thalidomide</b>

## SIDA - COMPLICATIONS DIGESTIVES BASSES (1)

La diarrhée est le symptôme le plus fréquent.

- Hospitalisation, traitement urgent.
- Réhydratation et renutrition (parentérale).
- Traitement symptomatique de la diarrhée et des douleurs abdominales.

### Colite à cytomégalovirus

Douleurs abdominales fréquentes et  $CD4 \leq 100/\text{mm}^3$ .

- Rechercher une autre localisation : fond d'œil, virémie.
- Rectosigmoïdoscopie à réaliser avant la coloscopie. Lésions parfois étendues à tout le côlon avec parfois entérite ou entérocolite nécrosante et risque de perforation.

#### Traitement

**Ganciclovir** 10 mg/kg/j en 2 perf./j ou **foscarnet** 180 mg/kg/j en 2 perf./j pendant 2 à 3 sem.

#### Évolution

- Amélioration clinique en 1 sem.
- Traitement d'entretien à discuter si rechute.

### Rectite à Herpes simplex

Plus souvent à HSV-2. Survient à tous les stades d'immunodépression. Rechercher une localisation anale symptomatique.

#### Traitement

- Hospitalisation en fonction de la gravité.
- **Valaciclovir** 500 mg x 2/j *per os* sauf lésions très étendues, intolérance alimentaire ou  $CD4 < 200/\text{mm}^3$  : **aciclovir** IV 10 mg/kg x 3/j.

#### Évolution

- Amélioration en 3-10 j, poursuite du traitement jusqu'à guérison complète.
- Si rechutes fréquentes, envisager une prophylaxie secondaire.

### Maladie de Kaposi colorectale

- Découverte endoscopique à un stade d'immunodépression avancée ou chez des malades atteints de Kaposi cutané (30 à 50 %). La localisation rectale est fréquente.
- Pas de traitement si asymptomatique.

### Lymphome digestif

- Habituellement non hodgkinien. Localisation rectale plus fréquente.
- Chimiothérapie en fonction de l'histologie.

### Diarrhées bactériennes

**Shigelles**, **salmonelles mineures**,

**Campylobacter**

**Fluoroquinolones (CIFLOX)** : 500 mg x 2/j *per os* pendant 3-5 j) ou **macrolides** si *Campylobacter*.

**Salmonelles majeures (typhoïde)**

Cf. Typhoïde.

**Colite pseudomembraneuse à C. difficile**

Discuter l'arrêt de l'antibiotique en cause. **Métronidazole** 500 mg x 3/j *per os* pendant 10 j ; si échec ou intolérance : **vancomycine** 125 mg x 4/j *per os* pendant 10 j.

### Diarrhées parasitaires

Prévention : éviter les pays tropicaux, les animaux malades, consommer eau minérale si  $CD4 < 100/\text{mm}^3$ , éviter fruits de mer, baignades, et les pratiques sexuelles favorisant la transmission oro-fécale.

**Cryptosporidiose, microsporidiose**

Diarrhées chroniques parfois cholériformes. Pas de traitement spécifique. Prendre en compte la dénutrition rapide.

Traitement symptomatique par **antidiarrhéiques(s)** : exemple, **IMODIUM** 1-10 gél./j, voire **SOMATOSTATINE UCB**.

Traitement antirétroviral efficace.

Cryptosporidiose : essai de **paromomycine (HUMATIN)** 2 g/j pour 1 mois (à l'étude) ; **azithromycine** et **nitazoxanide** en ATU ; microsporidiose : **ZENTEL** 400 mg x 2/j pour 3 sem. si infection à *Encephalitozoon intestinalis* ; **fumagiline** (en ATU) 20 mg x 3/j pendant 14 j si infection à *Enterocytozoon bieneusi*.

#### Amibiase

Traitement des partenaires et de la famille **FLAGYL** 500 mg x 3/j *per os* + **INTÉTRIX** 4 gél./j pendant 10 j.

Contrôles parasitologiques.

#### Isosporose et cyclospore

**BACTRIM FORTE** 1 cp. x 4/j pendant 10 j puis traitement d'entretien par 1 cp. x 3/sem. à vie ou **diprofloxacine** 500 mg x 2/j pendant 7 j puis 500 mg x 3/sem.

#### Giardiase

**Métronidazole** 250 mg x 3/j ou **albendazole** 400 mg x 1 ou 2/j pendant 5 à 7 j.



## SIDA - COMPLICATIONS DIGESTIVES BASSES (2)

### Pathologies digestives basses observées au cours du sida

MALADIE	ASPECT ENDOSCOPIQUE	DIAGNOSTIC DE CERTITUDE	TRAITEMENT
Rectocolite à CMV	Évocateur Colite ulcérée, érythémato-érosive	Biopsies pour examen anatomopathologique et immunomarquage	<b>Ganciclovir (CYMÉVAN)</b> 10 mg/kg/j en 2 perf. IV ou <b>Foscarnet (FOSCAVIR)</b> 180 mg/kg/j en 2 perf. IV pendant 2-3 sem.
Rectocolite herpétique (HSV-2)	Non spécifique Rectite érythémateuse, érythémato-érosive ou ulcérée	Biopsies pour recherche d'inclusions cellulaires et immunomarquage Culture virale	Valaciclovir <i>per os</i> ou <b>aciclovir</b> IV en fonction de la gravité des lésions et du nombre de CD4
Maladie de Kaposi colique et/ou rectale	Évocateur Nodules sous-muqueux rouge-violet, de taille variable, sommet parfois ulcéré	Biopsies (rentabilité de 10-50 %) pour examen anatomopathologique	Aucun si asymptomatique sinon chimiothérapie
Lymphome non hodgkinien rectal ou colique	Ulcérations à bords irréguliers et inflammatoires Prolifération bourgeonnante	Biopsies pour anatomopathologie et immunomarquage	Chimiothérapie
Microsporidiose	Normal ou atrophie villositaire	Microsporidies dans les selles	<b>Albendazole (ZENTEL)</b> si <i>Encephalitozoon intestinalis</i> <b>Fumagiline</b> si <i>Enterocytozoon bieneusi</i>
Cryptosporidiose	Normal ou muqueuse érythémateuse	Cryptosporidies dans les selles ou sur des biopsies	Pas de traitement efficace
Colite pseudo-membraneuse	Pseudomembranes, muqueuse érythémateuse parfois ulcérée	Toxine de <i>Clostridium difficile</i> dans les selles	<b>Métronidazole (FLAGYL)</b> ou <b>vancomycine</b>
Amibiase	Rectosigmoïdite en coup d'ongle, muqueuse érythémateuse ou érythémato-érosive	Entamoeba histolytica dans les selles ou sur des biopsies	<b>Métronidazole</b> x 10-15 j

## SIDA - COMPLICATIONS HÉPATIQUES

### Co-infection VIH-VHB (hépatite B) [1]

- 7 % des malades infectés par le VIH en France. Aggravation de l'évolution hépatique : moins de guérisons spontanées et accélération de la progression vers la fibrose. Pas d'influence du VHB sur la progression de l'infection à VIH.
- Rechercher systématiquement le virus delta chez les malades AgHBs positif.
- Vacciner contre le VHA si séronégatif. Règles hygiéno-diététiques (alcool).
- Arrêt de tout médicament hépatotoxique (dont certains anti-VIH).
- En cas de traitement du VIH, prescrire systématiquement une **bithérapie** anti-VHB : **ténofovir (VIRÉAD)** + **lamivudine (EPIVIR)** ou **emtricitabine (EMTRIVA)**, ou le traitement combiné **ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)**. Ne jamais arrêter un médicament anti-VHB en raison d'un risque majeur de rebond.
- Surveillance trimestrielle de la charge virale AgHBs.

### Co-infection VIH-VHC (hépatite C) [2]

- 25 % des malades infectés par le VIH en France.

- L'infection VIH aggrave l'évolution naturelle de l'infection VHC.
- Toujours maîtriser en premier l'infection VIH avant d'envisager un traitement du VHC. L'infection VIH aggrave l'évolution naturelle de l'infection VHC (réduction des guérisons spontanées, progression plus rapide vers la fibrose).
- Vacciner contre le VHA et le VHB si séronégatif. Insister sur les règles hygiéno-diététiques (alcool).
- Arrêt des médicaments hépatotoxiques (dont certains anti-VIH).
- Déterminer le moment du traitement en fonction du stade de fibrose, sauf génotypes 2 et 3 ayant une bonne réponse thérapeutique.
- En cas de traitement par **ribavirine** et **interféron pégylé**, essayer par tous les moyens de les maintenir pour la durée prévue (utilisation de facteur de croissance). Surveillance semestrielle biologique (dont signes de cirrhose et alfa-fétoprotéine), imagerie (échographie) et de la fibrose. L'arrivée des nouveaux antiviraux (**sofosbuvir**, **daclatasvir**) permettra d'améliorer l'efficacité et la tolérance du traitement, par ex. en utilisant une bithérapie orale **sofosbuvir + daclatasvir**.

### CONSENSUS

[1] Clinical Practice Guidelines : Management of chronic hepatitis B virus infection, *EASL*, 2012

[2] Prise de position de l'AFEF sur les trithérapies (Peg-IFN + ribavirine + inhibiteur de protéase) dans la prise en charge des malades atteints d'hépatite chronique C, *AFEF*, 2011

**NOTES**

**SIDA - ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (1)**

L'exposition accidentelle des professionnels en charge des malades (cliniciens, infirmières, biologistes, etc.) aux produits pathologiques favorise la transmission du VIH. Ce risque est évalué à environ 0,3 % après une piqûre septique et à environ 0,09 % après un contact avec une muqueuse. Après une exposition cutanée, le risque est très faible et n'a pas été précisément quantifié. La réduction du risque de transmission du VIH dans les études rétrospectives est estimée à 81 % (réduction de 67 % dans la transmission materno-fœtale avec la **zidovudine** seule). Les connaissances actuelles indiquent que l'infection systémique ne survient pas immédiatement après l'exposition et laisse le temps d'intervenir pour interrompre la multiplication virale.

**Que faire immédiatement ?**

*Lavage et antiseptie* d'une plaie, rinçage d'une muqueuse à grande eau.

*Tremper la blessure* dans l'eau de Javel diluée pendant 20 min.

*Évaluer le mode d'exposition* : date et heure, détails sur les circonstances en cause.

*Évaluer la gravité de l'exposition* au produit pathologique : type (sang, liquide, sécrétions), quantité, profondeur de la piqûre, dispositif en cause (aiguille creuse ou pleine, bistouri, etc.), si le produit pathologique a été injecté, la durée de contact en cas d'atteinte muqueuse, l'état de la peau (saine, abrasée, plaie, etc.).

*Évaluer la source de contamination* : statut VIH du sujet source, stade de la maladie, traitement antirétroviral antérieur, CD4, charge virale. Le cas échéant, tester en urgence le sujet source pour connaître son statut (accord préalable).

– **Risque faible** : asymptomatique ou CD4 élevés.

– **Risque fort** : maladie avancée, primo-infection VIH, charge virale élevée.

*Prélever une sérologie VIH* chez la victime.

*Évaluer le risque de transmission des hépatites B et C* (cf. Accident d'exposition au VHB et Accident d'exposition au VHC).

*Établir une observation médicale* et une déclaration d'accident de travail.

## SIDA - ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (2)

### Qui traiter ?

#### Conduite à tenir devant un accident d'exposition professionnelle au VIH

CIRCONSTANCES	STATUT VIH DU PATIENT SOURCE	
	POSITIF (risque de transmission)	INCONNU
Risque important : – Piqûre profonde, aiguille creuse et intravasculaire – Chez l'usager de drogue, partage de l'aiguille, de la seringue et/ou de la préparation	Traitement recommandé	Traitement recommandé
Risque intermédiaire : – Coupure avec bistouri – Piqûre avec aiguille IM, SC ou pleine – Exposition cutanéomuqueuse avec temps de contact > 15 min – Morsures profondes avec saignement – Chez l'usager de drogue, partage du récipient, de la cuiller, du filtre, de l'eau de rinçage	Traitement recommandé	Traitement non recommandé
Risque faible : – Autres cas – Piqûre avec seringue abandonnée – Crachats, morsures légères ou griffures	Traitement non recommandé	Traitement non recommandé

### Quels antirétroviraux ?

Le traitement doit comporter deux **INTI** et un **IP/r**, initialement prescrits pour 3 jours (durée pendant laquelle un avis spécialisé doit être donné, temps nécessaire pour obtenir les résultats de sérologie VIH du patient source). 4 semaines au total si traitement indiqué.

- 1<sup>re</sup> intention : **ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)** 1/j. Préférer **zidovudine + lamivudine (COMBIVIR)** 1 cp. x 2 en cas d'insuffisance rénale ou de grossesse.
- Si la source est VIH connue : recours au médecin référent VIH indispensable.

Nature du traitement fonction du passé thérapeutique du patient. Traitement identique à celui du patient source si celui-ci est identifié et en succès virologique.

### Quelle surveillance ?

- **Clinique** : syndrome de primo-infection, effets secondaires des médicaments.
- **Biologie usuelle** : numération sanguine, plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatinine, tests hépatiques, amylase (**didanosine, indinavir**), examen des urines (**indinavir**).
- **Sérologie VIH** à 6 sem., 3 et 6 mois voire charge virale (positive habituellement 10 à 14 j après exposition).

**SIDA - ACCIDENT D'EXPOSITION SEXUELLE (1)**

Parmi les nouveaux cas de sida déclarés en France, près de 40 % des malades se sont contaminés par voie homo- ou bisexuelle et près de 30 % par voie hétérosexuelle. La question d'une prophylaxie après un rapport non protégé est d'actualité depuis qu'il existe des **antirétroviraux** puissants. À la différence des accidents d'exposition au sang, il n'existe pas de preuve de leur efficacité après un rapport non protégé. Ils font néanmoins l'objet de recommandations analogues.

**Évaluer le risque de contamination**

La probabilité de transmission du VIH après un rapport sexuel à risque est estimée pendant une pénétration anale entre 0,3 et 3 % pour le receveur et 0,01 à 0,018 % pour le partenaire actif, et pendant une pénétration vaginale entre 0,03 et 0,15 % pour la femme et entre 0,03 et 0,09 % pour l'homme. Ces risques n'ont pas été estimés pour un rapport oral ni pour l'homme actif pendant un rapport anal.

*Détailler le rapport sexuel à risque* : conduite habituelle, rupture de préservatif, ignorance du risque, viol, etc.

*Déterminer les facteurs favorisant la transmission* : infection ou inflammation génitale, ulcérations, saignements, traumatismes.

*Rechercher les circonstances favorisant le rapport à risque* : utilisation contemporaine de drogue, préservatif non disponible, utilisation d'un autre type de contraception.

*Évaluer le délai entre le rapport sexuel et la consultation.*

*S'assurer que le patient n'est pas infecté par le VIH* : sérologie VIH antérieure, examen

clinique, refaire une sérologie VIH (voire une charge virale si plusieurs rapports non protégés dans les 4 à 6 sem. qui précèdent la consultation) sans retarder le début de la prophylaxie. Prélever les sérologies des hépatites B et C, syphilis.

*Déterminer le statut VIH du partenaire* et débiter le traitement en attendant les résultats. Si le partenaire n'est pas à disposition, il faut tenir compte de ses facteurs de risque pour le VIH et les virus des hépatites. Si le partenaire est infecté par le VIH, obtenir des informations sur le stade de la maladie, la charge virale, les traitements antérieurs, les autres maladies transmises par voie sexuelle (hépatite B, C, syphilis, gonocoque, *Chlamydia*).

**Qui traiter ?**

- Proposer une prophylaxie après un rapport sexuel anal ou vaginal non protégé et après une fellation avec éjaculation (risque non connu). Pas de prophylaxie après un cunnilingus ou une fellation sans éjaculation.
- Débiter immédiatement le traitement (au plus tard dans les 72 h qui suivent le rapport sexuel).
- Tenir compte d'autres infections transmises par voie sexuelle.

**Quels antirétroviraux ?**

Traitement pour 4 sem. Cf. Accident d'exposition au sang.

Proposer aux femmes un test de grossesse et une « contraception du lendemain » si besoin.

Évaluer la nécessité d'une prévention de l'hépatite B.

Discuter de prévention et aborder la question de l'usage des préservatifs.

## SIDA - ACCIDENT D'EXPOSITION SEXUELLE (2)

### Quelle surveillance ?

- **Clinique** : syndrome de primo-infection, effets secondaires des médicaments.
- **Biologie usuelle** : numération sanguine, plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créatinine, tests hépatiques, amylase

(didanosine, indinavir), examen des urines (indinavir).

- **Sérologie VIH** à 6 sem., 3 et 6 mois voire charge virale (positive habituellement 10 à 14 j après exposition) avec risque de faux positifs de 2-3 %.

### Conduite à tenir devant un accident d'exposition sexuelle au VIH

CIRCONSTANCES	STATUT VIH DU SUJET SOURCE	
	POSITIF (risque de transmission)	INCONNU
Rapport anal	Réceptif : 0,3-3,0 % Insertif : 0,01-0,18 % Traitement recommandé	Traitement recommandé – si le sujet source est usager de drogues IV, un homme homosexuel ou bisexuel, ou issu d'une communauté où l'épidémie est généralisée – en cas de prise de substance psychoactive ou de partenaires sexuels multiples
Rapport vaginal	Réceptif : 0,05-0,15 % Insertif : 0,03-0,09 % Traitement recommandé	
Rapport oral	Traitement recommandé	

## ACCIDENT D'EXPOSITION AU VHB

Tout liquide biologique étant potentiellement infectant, le risque de transmission du virus de l'hépatite B (VHB) doit être envisagé systématiquement.

### Conduite à tenir immédiate

- Se référer au chapitre Sida - Accident d'exposition au sang.
- Déterminer les statuts sérologiques du sujet source et de la personne exposée.
- Déclaration d'accident d'exposition au sang et d'accident du travail.

### Évaluer l'exposition au virus de l'hépatite B

Le virus est présent dans le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et peut être détecté dans certains liquides : céphalorachidien, synovial, pleural, péritonéal, péricardique, amniotique, la salive et les tissus.

Il est absent ou à très faibles concentrations dans les liquides suivants (sauf s'ils contiennent du sang) : selles, urines, sécré-

tions rhinopharyngées, expectorations, sueur, larmes, lait maternel, vomissements.

### Évaluer le risque de contamination

Sérologie VHB chez le sujet source et le sujet exposé (cf. Tableau).

Tenir compte du risque de transmission du VIH et du VHC.

### Traitement

#### Contamination possible

2 inj. de 500 UI d'immunoglobulines spécifiques à 1 mois d'intervalle et début de vaccination le même jour en un 2<sup>e</sup> site.

Surveillance du statut sérologique (AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti-HBs) à 1 mois, 3 mois et 6 mois de l'AES.

#### Risque nul

Vaccination des sujets non vaccinés. Pas de surveillance.

#### Contamination confirmée

Prise en charge en milieu spécialisé. Contacter l'Institut de veille sanitaire.

### Évaluation du risque de transmission du VHB

Sujet exposé	Sujet source*	
	AgHBs négatif**	AgHBs positif
Guérison hépatite B (Ac anti-HBs présents)	Risque nul	Risque nul
Vacciné et antécédent de réponse documentée (Ac anti-HBs = 10 UI/L)	Risque nul	Risque nul
Vacciné mais réponse non documentée (Ac anti-HBs = 10 UI/L)	Risque nul	Contamination possible
Antécédent d'hépatite B ou vaccination mal documentée	Risque nul	Contamination possible
Non vacciné, pas d'antécédent hépatite B	Risque nul	Contamination possible

\* Si le statut est inconnu, considérer le sujet source comme AgHBs positif.

\*\* Si le sujet appartient à un groupe à risque de transmission (toxicomanie, intraveineuse, partenaires sexuels multiples), se méfier d'une possible contamination récente et d'une phase d'incubation AgHBs négative.



## ACCIDENT D'EXPOSITION AU VHC

Tout liquide biologique étant potentiellement infectant, le risque de transmission du virus de l'hépatite C (VHC) doit être envisagé systématiquement.

### Conduite à tenir immédiate

- Se référer au chapitre Sida - Accident d'exposition au sang.
- Déterminer les statuts sérologiques du sujet source et de la personne exposée.
- Déclaration d'accident d'exposition au sang et d'accident du travail.

### Évaluer l'exposition au virus de l'hépatite C

Le virus est présent dans le sang. Il est absent ou à très faibles concentrations dans les liquides suivants (sauf s'ils contiennent du sang) : salive, sperme, sécrétions vaginales et autres liquides biologiques.

### Évaluer le risque de contamination

Dosage de l'ALAT et recherche d'anticorps anti-VHC chez le sujet source et le sujet exposé (cf. Tableau).

Tenir compte du risque de transmission du VIH et du VHB.

### Cas particuliers du sujet source

#### Usager de drogue par voie intraveineuse

Il peut être en phase de séroconversion (délai de 1 à 3 mois). Demander une recherche d'ARN viral circulant.

#### Immunodéprimés

Il peut être contaminé et avoir une sérologie négative. Demander une recherche d'ARN viral circulant.

#### Sujet source infecté par le VHC

Si l'ARN viral est détectable, le risque moyen de transmission est de 1,8 %.

#### Sujet source coinfected VHC-VIH

À considérer comme le cas d'un sujet source immunodéprimé.

### Prise en charge du sujet exposé

#### Contamination possible

Surveillance de l'ALAT sérique et de la sérologie VHC à 1 mois, 3 mois et 6 mois après l'AES.

#### Risque nul

Pas de surveillance.

#### Contamination confirmée

Traitement de l'hépatite C aiguë (cf. dans le chapitre *Gastro-entérologie - Hépatologie* Hépatite virale chronique C).

### Évaluation du risque de transmission du VHC\*

Sujet exposé	Sérologie du sujet source	
Négative sujet non toxicomane ou immunocompétant	Positive ou inconnue	Négative mais sujet toxicomane ou immunodéprimé
Sérologie négative	Risque nul	Contamination possible
Sérologie positive	Prise en charge spécialisée du sujet exposé	

\* Référence : BEH n°2/2000, circulaire DGS/DH/DRT n°99/680 du 8 décembre 1999.

## TÉTANOS

Le tétanos est une toxi-infection due au bacille anaérobie tellurique : *Clostridium tetani*.

Il y a environ 1 million de cas/an dans le monde, < 100 cas/an en France dont 70 % chez des sujets âgés qui ne sont pas ou plus immunisés.

Après inoculation, le bacille produit une toxine neurotrophe qui emprunte le transport axonal rétrograde pour gagner le corps cellulaire situé dans le système nerveux central. Il y bloque de façon irréversible les synapses inhibitrices des neurones moteurs et du système végétatif aboutissant à des contractures paroxystiques et à un syndrome dysautonomique.

### Clinique

- **Incubation** (délai entre l'inoculation et les premiers symptômes) : 6-15 j.
- **Invasion** (délai entre les premiers symptômes et la généralisation) : trismus, dysphagie, stase salivaire, contractures faciales et du cou puis au tronc et aux membres.
- **Période d'état** : contractures généralisées permanentes avec accès paroxystiques, syndrome dysautonomique (3-4 sem.).

### Évolution

- **Mortalité** : 25 % malgré la réanimation (complications de décubitus et du syndrome dysautonomique).
- **Formes mineures** limitées au trismus, de bon pronostic.
- **Formes néonatales** fatales dans > 90 % des cas.
- **Tétanos céphaliques** : porte d'entrée faciale, paralysie faciale ou des 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> paires crâniennes.

### Traitement

#### Curatif

- Mesures générales
- Parage de la plaie.
- Hospitalisation en réanimation.

- Ventilation mécanique au moindre signe d'extension aux muscles respiratoires ou dysphagie.
- Isolement sensoriel.
- Sédatifs et myorelaxants (**benzodiazépines**, curares).
- Hydratation et nutrition entérale par sonde gastrique.

#### ► Mesures spécifiques

- Antibiothérapie systématique : par voie veineuse dirigée contre les anaérobies (**pénicilline G** 3-4 MUI/j).
- Sérothérapie antitétanique : 250 à 500 UI de gammaglobulines (**GAMMATÉTANOS**) par voie IM selon le risque tétanigène (cf. Tableau).
- Vaccination complète.

### Préventif

#### ► Pré-exposition

Vaccination complète obligatoire chez l'enfant à partir de 2 mois et rappels à 1 an, 6 ans, 11 ans puis systématiquement tous les 10 ans (pas de contre-indication).

Vaccination des adultes non vaccinés par 2 inj. à un mois d'intervalle puis rappels à 6 mois ou 1 an et tous les 10 ans.

#### ► Post-exposition

Prophylaxie d'urgence en cas de statut vaccinal douteux ou incomplet par une vaccination associée ou non à une sérothérapie par voie IM de 250 à 500 UI d'immunoglobulines antitétaniques humaines (**GAMMATÉTANOS**) efficace pendant 1 mois (voir recommandations du ministère de la Santé [1]).

Les performances diagnostiques et l'intérêt économiques de l'utilisation des tests immunochromatographiques rapides (Tetanox Quick test, Tétanotop) n'ont pas fait l'objet d'une validation par la Haute autorité de santé\*.

### CONSENSUS

[1] Guide des vaccinations 2012 - Vaccination contre le tétanos, DGS, 2012

\* Haute autorité de santé. Mise en évidence de l'immunoprotection antitétanique en contexte d'urgence. Évaluation des tests rapides immunochromatographiques - note de cadrage. Décembre 2009.

## TYPHOÏDE

Le terme « typhoïde » regroupe les infections à *Salmonella enterica* sérotype typhi et rarement à sérotypes paratyphi types A, B et C. À la différence des autres salmonelles (dites entériques) habituellement non-invasives, les bactéries de la typhoïde traversent la muqueuse intestinale par les plaques de Peyer et gagnent les ganglions mésentériques. Elles disséminent ensuite vers le sang à partir de ce foyer lymphatique. La présentation clinique est habituellement une fièvre isolée avec peu ou pas de symptômes digestifs.

### Épidémiologie

Le réservoir est uniquement humain (à la différence des autres salmonelles dont le réservoir est essentiellement animal). La contamination se fait soit directement à partir des excréta du malade (nécessité d'un isolement entérique) soit indirectement par de l'eau ou des aliments contaminés. La quasi-totalité des cas de typhoïde en France survient chez des voyageurs.

### Clinique

- **Incubation** : habituellement de 7-14 j.
- **Phase d'invasion** : début insidieux type fièvre inexpliquée : symptômes non spécifiques (syndrome pseudo-grippal, céphalées frontales, insomnie, malaise), troubles digestifs (douleurs abdominales). Examen : bradycardie inconstante, abdomen sensible, gargouillement en fosse iliaque droite, splénomégalie inconstante, langue saburrale.
- **Phase d'état** : fièvre à 39-40 °C, tuphos (obnubilation, prostration, somnolence), douleurs abdominales, insomnie, diarrhées (2/3 des cas). En plus des signes ci-dessus, on peut observer une éruption fugace maculo-papulaire de la partie supérieure de l'abdomen très spécifique mais peu sensible (5-30 %) et de petites ulcérations du voile du palais (angine de Duguet).
- **Complications (10-15 %)** : cf. Encadré.

- **Portage chronique** : 1-10 % des malades (dans les selles ou les urines) pendant environ 3 mois, 1-4 % pendant 1 an. Favorisé chez les femmes, les sujets âgés, en cas de lithiase vésiculaire ou maladie vésicale (bilharziose).

### Diagnostic

**Repose sur l'isolement de la bactérie** et permet de tester sa sensibilité aux **antibiotiques** (augmentation des souches résistantes aux **fluoroquinolones** en particulier dans le sous-continent indien) : hémocultures, myéloculture (sous antibiotiques), coproculture (résultat tardif et ne différencie pas un portage d'une infection).

- **Biologie non spécifique** : leucopénie ou polynucléose, élévation des enzymes hépatiques.
- **Sérologie de Widal et Félix** : positive au 8<sup>e</sup> j, peu sensible et peu spécifique (réactions croisées avec d'autres bactéries).

### Traitement

#### Préventif

- *Interrompre la transmission fécale-orale* : lavage des mains, nettoyage des aliments crus et consommation d'eau stérile.
- *Vaccination des voyageurs* : **VACCIN TYPHIM VI** ou **TYPHÉRIX** (ne protège pas contre *Salmonella* sérotype paratyphi A et B).

#### Curatif

- Maladie à déclaration obligatoire.
- Isolement du malade et désinfection du linge, des selles et de la chambre.
- Hydratation, repos, traitement des complications.
- Antibiotiques *per os* ou IV pendant 5-7 j (formes simples) ou 10-14 j (formes graves) : **fluoroquinolone (CIFLOX)** : 500 mg x 2/j), ou **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération (ROCÉPHINE)** : 1 à 2 g/j) à préférer en cas de séjour dans le sous-continent indien (résistance fréquente aux fluoroquinolones).
- La défervescence thermique prend souvent plusieurs jours.
- Contrôler 2 coprocultures négatives en fin de traitement.

## VARICELLE - ZONA (1)

Le virus du zona et de la varicelle (VZV) est ainsi nommé en raison de son évolution naturelle en 3 phases : une infection primaire généralisée bénigne de l'enfance (90 % des cas avant 14 ans) - la varicelle - qui guérit spontanément, une latence de plusieurs années puis une ou plusieurs récurrences localisées chez l'adulte - le zona.

### Varicelle : formes cliniques

#### Forme simple chez l'immunocompétent

- Éviction scolaire et de crèche jusqu'à cicatrisation des croûtes.
- Prévenir l'école du diagnostic par la famille.
- Éviter les contacts avec des sujets non immuns et les immunodéprimés.
- Surveillance clinique en particulier de l'apparition de signes neurologiques.
- *Traitement local*
- Désinfection des lésions **chlorhexidine (HIBITANE)** et bains biquotidiens.
- Couper les ongles pour éviter une surin-

fection et des lésions de grattage (cicatrices).

- Pas de pommade, gel, crème, talc, etc.
- *Traitement général*
- Symptomatique, **antihistaminiques H<sub>1</sub>, hydroxyzine (ATARAX)** et **antipyrétique type paracétamol (DOLIPRANE)**. Pas d'aspirine en raison de l'association avec le syndrome de Reye.
- Antibiothérapie antistaphylococcique en cas de surinfection cutanée.
- Spécifique : pas d'indication à un traitement par voie générale.

#### Forme compliquée de l'immunocompétent

Traiter par voie intraveineuse les indications du tableau : **acidovir (ZOVIRAX)** 20 mg/kg x 3/j chez le nouveau-né, 15 mg x 3/j chez la femme enceinte pendant 8 à 10 j.

**Le purpura thrombopénique grave** nécessite des mesures symptomatiques (immunoglobulines, culots plaquettaires).

**L'ataxie cérébelleuse aiguë** est fréquente et bénigne et ne nécessite pas de traitement spécifique.

### Formes graves ou compliquées de la varicelle [1]

#### Formes graves

- Atteintes très extensives
- Atteintes hémorragiques
- Localisations viscérales : pneumopathie, myocardite, thrombopénie aiguë, purpura fulminans

#### Formes compliquées

- Surinfections bactériennes (fasciites)
- Neurologiques (syndrome de Reye, méningo-encéphalite)
- Hépatite, thrombopénie secondaire, néphropathie, arthrite, thrombose, complications oculaires, péricardite, pancréatite, orchite

### Indications au traitement antiviral de la varicelle (intraveineux) [1]

- Varicelle chez l'immunodéprimé (indication de l'AMM)
- Varicelle du nouveau-né (indication de l'AMM)
- Nouveau-né lorsque la mère a fait une éruption varicelleuse entre 5 j avant et 2 j après l'accouchement (hors AMM)
- Formes graves de l'enfant de < 1 an (hors AMM)
- Varicelle grave ou compliquée de l'adulte (hors AMM)
- Varicelle de la femme enceinte dont l'éruption survient dans les 8 à 10 j avant l'accouchement (hors AMM)

## VACCIN ANTIVARICELLEUX

## ■ Vaccin antivarielleux

<b>VARILRIX</b>				
A. : 2 doses SC à 6 à 10 sem. d'intervalle E. 12 mois à 12 ans : 1 dose SC	1 ser. 0,5 mL + fl. lyoph.	41,24	65 %	41,24
<b>VARIVAX</b>				
A. : 2 doses SC à 4 à 8 sem. d'intervalle E. 12 mois à 12 ans : 1 dose SC Pas de vaccination avant 12 mois	1 fl. lyoph. + 2 aig. + solv. 0,5 mL	41,24	65 %	41,24

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin à virus vivant atténué de la souche Oka, contre la varicelle.

**INDICATIONS**

Prévention de la varicelle chez :

- les professionnels de santé sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse), dont la sérologie est négative qui exercent les professions suivantes : contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), professions en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynécologie-obstétrique, néonatalogie, maladies infectieuses ;
- les personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, lors des situations suivantes :
  - personnes en contact étroit avec des immunodéprimés (les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d'éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 j) ;
  - adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle (dans les 3 j suivant l'exposition à un patient avec éruption).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Aplasie présente ou imminente : lymphocytes < 500/mm<sup>3</sup>, neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>.

Traitement immunosuppresseur intense : chimiothérapie d'induction, radiothérapie généralisée. Immunodépression cellulaire congénitale ou acquise (infection par le VIH), attente de greffe. Allergie à la **néomycine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque d'inactivation du vaccin en contact avec l'éther, l'alcool et les antiseptiques.

Vérifier l'hémogramme avant la vaccination.

**Test de grossesse chez les jeunes femmes en âge de procréer.**

Respecter un intervalle libre de chimiothérapie, 1 sem. avant et après chaque injection.

Pas d'administration de corticoïdes pendant les 15 j qui suivent la vaccination.

Après injection d'immunoglobulines antivarielles, risque d'inactivation du vaccin pendant 3 mois.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs et rougeurs locales de faible intensité et de courte durée.

Rash le plus souvent dû au virus sauvage (37 cas pour 100 000 injections) : exanthème varicelleux non fébrile avec moins de 50 éléments.

Transmission du virus vaccinal : 3 cas pour 15 millions de doses injectées.

Rares (incidences inférieures à celles de l'infection par le virus sauvage) : encéphalite, ataxie, érythème polymorphe, Stevens-Johnson, pneumonie, thrombopénie, épilepsie, neuropathie, zona.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Immunoglobulines antivarielles** : risque d'inactivation du virus vaccinal pendant 3 mois.

Médicaments immunosuppresseurs (corticoïdes, chimiothérapies lourdes) : risque de multiplication virale de la souche vaccinale atténuée.

## VARICELLE - ZONA (2)

### Forme de l'immunodéprimé

Les atteintes sont souvent graves avec parfois des lésions viscérales.

- Traitement par voie veineuse par **aciclovir** (cf. Immunocompétents).
- Interrompre un traitement immunosuppresseur sauf **corticoïdes**.

### Varicelle : prévention

#### Physiopathologie

La varicelle est extrêmement contagieuse par contact direct avec les vésicules et par les sécrétions respiratoires. L'incubation dure en moyenne 14 à 16 j. La période de contagion débute 1 à 2 j avant l'éruption et jusqu'à guérison complète. Elle peut durer plus longtemps chez les immunodéprimés. Le taux d'attaque est estimé à 90 % chez les sujets contacts non immuns. Chez les sujets immuns, une réexposition au virus sauvage entraîne une virémie avec réascension des anticorps spécifiques. Une résurgence clinique est exceptionnelle sauf en cas d'immunodépression.

#### Épidémiologie

Plus de 90 % des adultes sont immuns et la maladie survient dans plus de 90 % des cas avant l'âge de 15 ans, 33 % avant 4 ans, 44 % entre 5 et 9 ans.

Une varicelle congénitale survient dans moins de 1 % des infections maternelles pendant la grossesse : retard de croissance, cicatrices cutanées, hypoplasie des membres, microcéphalie, atrophie cérébrale, chorioretinite, cataracte. En revanche, une varicelle maternelle survenant entre 5 j avant l'accouchement et 2 j après peut entraîner une atteinte néonatale grave dans 17 à 30 % des cas.

Les épidémies nosocomiales ont été bien décrites ainsi que les mesures efficaces pour les limiter. Les sujets à haut risque (prématurés, immunodéprimés) peuvent faire des formes graves.

#### Chimioprophylaxie antivirale

Il n'y a pas d'indication à un traitement antiviral préventif par **aciclovir** chez les enfants en bonne santé.

En revanche, un traitement débuté dans les 24 premières h peut être indiqué chez

les adolescents et les adultes. Il faut traiter le plus tôt possible un nouveau-né dont la mère a fait une varicelle 5 j avant l'accouchement ou 2 j après, ainsi que les immunodéprimés. La posologie de l'aciclovir est de 20 mg/kg x 4/j (maximum 800 mg x 4/j) à débiter dans les 24 premières h. L'innocuité de l'aciclovir chez la femme enceinte n'a pas été démontrée et il reste contre-indiqué.

#### Immunoglobines antivarielleuses

Ne sont plus disponibles actuellement.

#### Vaccin antivarielleux

Un vaccin vivant atténué est disponible. Aux États-Unis, le vaccin est largement utilisé (plus de 10 millions de doses administrées en 1998) sans effet secondaire notable. Cependant, des études récentes semblent montrer qu'il faut un rappel pour obtenir une immunité durable (non reconnu dans l'AMM).

Indications en France :

- professionnels de santé sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse), dont la sérologie est négative qui exercent les professions suivantes : contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), professions en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynécologie-obstétrique, néonatalogie, maladies infectieuses ;

- personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, lors des situations suivantes :

- personnes en contact étroit avec des immunodéprimés (les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d'éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 j) ;

- adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle (dans les 3 j suivant l'exposition à un patient avec éruption).

## VOYAGEURS (CONSEILS) (1)

- Déconseiller un voyage touristique en pays tropical aux femmes enceintes, jeunes enfants et personnes en mauvaise santé.
- Recommander vivement de souscrire une assurance rapatriement pour la région visitée.
- Se renseigner sur les sites ministériels : [www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/index.htm](http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/index.htm) ou [www.france.diplomatie.fr](http://www.france.diplomatie.fr).

### Mesures d'hygiène

Elles constituent une mesure contre les diarrhées et les infestations parasitaires :

- se laver les mains avant de manipuler des aliments et après passage aux toilettes ;

- ne boire que de l'eau minérale scellée ou rendue potable par ébullition (5 min à gros bouillons), filtre ou désinfectant. Même mesure pour les glaçons. Le lait doit être pasteurisé ou bouilli (brucellose) ;

- ne manger que les fruits et les légumes pelés ou cuits. Éviter les crudités, les coquillages, les plats peu ou insuffisamment cuits ;

- se renseigner localement sur les risques de toxicité des poissons de mer (ciguatera) ;

- ne pas laisser sécher le linge dehors sans le repasser (myiase) ;

- ne pas marcher pieds nus (y compris sur les plages), ne pas s'étendre directement sur le sable (larbush, puce chique) ;

- porter des chaussures fermées en sol boueux ;

- ne pas marcher ni se baigner dans les cours d'eau et les eaux stagnantes (leptospirose, bilharziose, anguillulose, hépatites) ;

- ne pas s'approcher ni caresser les animaux domestiques ou sauvages (griffures, morsures, rage).

### Risques liés aux moustiques et aux arthropodes

De nombreuses espèces d'invertébrés peuvent transmettre des maladies parasitaires

(paludisme, trypanosomiase, leishmaniose, etc.) ou virales (arboviroses, encéphalite, etc.) à l'occasion d'un repas sanguin. Prendre des mesures préventives diurnes et/ou nocturnes (cf. Paludisme) dans les zones d'endémie :

- utiliser des répulsifs pour la peau et les vêtements ( cf. Tableau) ;

- dormir dans une pièce climatisée ou sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides ;

- secouer les habits les draps et les chaussures avant usage (scorpions, serpents) ;

- en zone de végétation, porter des chaussures fermées et faire du bruit en marchant ;

- se renseigner localement sur les risques des bains de mers ;

- risque d'encéphalite à tiques au printemps et en été, en forêt et en zone rurale d'Europe centrale, de l'Est et du Nord : vaccin et mesures de protection ( cf. Maladie de Lyme).

### Diarrhée du voyageur

Se reporter au chapitre *Diarrhée du voyageur*.

### Maladies sexuellement transmissibles et sida

La seule prophylaxie repose sur l'usage de préservatifs.

### Trousse de pharmacie

Cf. Encadré.

### Malades infectés par le VIH

Contre-indication des vaccins vivants.

Certains médicaments sont photosensibilisants.

Certains pays exigent un certificat de séro-négativité (se renseigner à l'ambassade). Des infections acquises sous les tropiques peuvent être aggravées par l'immunodépression (leishmaniose, tuberculose, salmonellose, histoplasmosse, etc.).

Références : BEH n° 17-18, 2011.

## VACCIN ANTIAMARIL (1)

## ■ Vaccin antiamaril

STAMARIL				
A. et E. > 6 mois : 1 dose tous les 10 ans par voie SC	10 fl. + ser. 0,5 mL	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin viral vivant inactivé cultivé sur œuf embryonné, efficace dans les 10 j qui suivent l'injection.

Validité légale : 10 ans, jour pour jour.

**INDICATIONS**

Vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs en zone d'endémie (Afrique intertropicale et Amérique latine).

Consulter la liste mise à jour sur le site de l'OMS (<http://www.who.int/entity/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf>) ou se renseigner à l'ambassade.

Effectué uniquement dans les centres de vaccinations internationaux agréés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit immunitaire congénital ou acquis (dont immunosuppresseurs, sida sauf CD4 > 200/mm<sup>3</sup>, corticothérapie prolongée > 10 mg/j). Pas de contre-indication en cas d'hydrocortisone, de corticothérapie topique ou ≤ 10 mg par jour d'équivalent-prednisone, même s'il s'agit d'un traitement prolongé. Risque de maladie vaccinale potentiellement mortelle.

Affection aiguë ou chronique évolutive.

Allergie vraie à l'œuf. Risque d'urticaire, de bronchospasme, d'anaphylaxie).

Enfant < 6 mois.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prévenir du risque d'effets indésirables graves ou létales mais exceptionnels.

**Grossesse et allaitement** : éviter la vaccination pendant le 1<sup>er</sup> trimestre. L'allaitement doit être suspendu pendant la phase de virémie post-vaccinale ; il peut être repris deux semaines après l'administration du vaccin.

Âge > 65 ans.

Don de sang : suspendu pendant la phase de virémie post-vaccinale ; il peut être repris 4 semaines après l'administration du vaccin.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents (≥ 1/10) : céphalées, réactions locales.

Fréquents (≥ 1/100 et < 1/10) : nausée, diarrhée, vomissement ; myalgies ; fièvre, asthénie. Peu fréquents (≥ 1/1000 et < 1/100) : douleur abdominale ; arthralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqués avec les immunosuppresseurs. Compatible avec tous les autres vaccins y compris vivants atténués.



## VOYAGEURS (CONSEILS) (2)

### Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs corporels jugés efficaces en fonction des tranches d'âge et de population [1]\*

Catégorie d'âge et de population	Nombre max d'appl./j	Substance active	Concentration
De 6 mois à l'âge de la marche	1	DEET** ***	10 à 30 %
	1	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)****	20 à 30 %
	1	IR3535	20 %
De l'âge de la marche à 24 mois	2	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	10 à 30 %
	2	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	2	IR3535	20 %
De 24 mois à 12 ans	2	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	20 à 30 %
	2	Picardine	20 à 30 %
	2	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	2	IR3535	20 à 35 %
Plus de 12 ans	3	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	20 à 50 %
	3	Picardine	20 à 30 %
	3	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	3	IR3535	20 à 35 %
Femmes enceintes	3	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	30 %
	3	Picardine	20 %
	3	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20%
	3	IR3535	20 %

\* Les recommandations d'utilisation figurant dans le tableau concernent l'usage de répulsifs cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de cette situation de risque grave, l'Afssaps précise qu'au vu des résultats des évaluations européennes en cours concernant les substances répulsives, l'usage de l'IR3535 est à privilégier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.

\*\* Le DEET a fait l'objet de la première expertise au niveau européen, une restriction d'usage est émise chez l'enfant de moins de 2 ans. Cependant, en cas de risque élevé de transmission d'une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte en respectant scrupuleusement le nombre d'applications maximum admis et les conditions pratiques d'usage chez l'enfant.

\*\*\* En cas d'exposition aux anophèles vecteurs des Plasmodium, vecteurs du paludisme, la concentration minimale efficace de DEET est de 30 %.


\*\*\*\* L'IR3535, l'icaridine et le PMDRBO sont en cours d'évaluation au niveau européen.

**VACCIN ANTIAMARIL (2)****Centres de vaccin antiamaril**

Voir le *Bulletin épidémiologique hebdomadaire* (BEH) n° 14-15/2013 sur le site du ministère de la Santé (<http://www.sante.gouv.fr/liste-des-centres-de-vaccination-habilites-a-effectuer-la-vaccination-anti-amarile.html?>).

Pays à risque de transmission de fièvre jaune et pays exigeant la vaccination anti-amaril (OMS)

<http://www.who.int/entity/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf>

**Zones d'endémie de la fièvre jaune - OMS 2013**

La vaccination contre la fièvre jaune n'est habituellement pas recommandée dans les zones où le risque de transmission est faible.

Cependant, la vaccination peut être conseillée pour une catégorie de voyageurs à haut risque car ils voyagent longtemps, s'exposent beaucoup aux piqûres de moustiques et ne peuvent lutter efficacement contre les piqûres. L'indication vaccinale repose sur le risque d'exposition au virus, les obligations légales par pays, et le risque d'effets indésirables potentiels de la vaccination.

## VOYAGEURS (CONSEILS) (3)

### Vaccinations

Elles dépendent de l'état sanitaire du pays, des conditions et de la durée du séjour, de l'âge et du statut vaccinal.

#### Vaccins à jour indispensables

- *Adultes* : tétanos, poliomyélite et diphtérie (vaccin à dose réduite : **REVAXIS** ou **REPEVAX**). Vérifier la rougeole pour les jeunes adultes non immunisés n'ayant pas eu l'injection de rappel.
- *Enfants* : toutes vaccinations prévues dans le calendrier vaccinal. (cf. Vaccinations en pédiatrie).

#### Vaccins spécifiques

- *Fèvre jaune* : indispensable en Afrique tropicale et Amérique centrale, Amazonie, possible à partir de 6 mois, réalisé uniquement dans les centres agréés. Se renseigner sur les mesures légales dans le pays de destination.
- *Hépatite A* : dans les zones d'endémie ou conditions d'hygiène précaire, vaccination possible à partir de l'âge de 1 an.
- *Hépatite B* : séjour à risque dans les pays de forte ou moyenne endémicité.
- *Typhoïde* : à partir de 5 ans (3 ans en cas

de risque majeur) dans les zones d'endémie ou conditions d'hygiène précaires.

- *Méningite A-C W 135* : recommandée pour les enfants (18-24 mois) et jeunes adultes en zone épidémique, adultes travaillant en zone rurale endémo-épidémique, ou zone endémique avec contacts étroits et prolongés avec la population selon un mode de vie traditionnel. Indispensable pour un pèlerinage à La Mecque annuel (Hadj) ou non (Umrah). Non recommandée si voyage bref avec peu de contacts étroits avec les populations locales. Consulter l'épidémiologie : <http://www.who.int/csr/don>.
- *Rage* : séjour aventureux ou prolongé dans un pays à haut risque (Asie). Ne dispense pas d'un traitement curatif en cas de morsure.
- *Diphtérie* : séjour en zone rurale, Europe centrale et zones épidémiques (Russie, etc.).
- *Encéphalite japonaise* : séjour prolongé en zone rurale d'Asie du Sud et de l'Est.
- *Encéphalite à tiques* : séjour en zone rurale ou randonnées en forêt en Europe centrale et de l'Est au printemps et en été.
- *Autres* : certains pays ont des exigences spécifiques, se renseigner à l'ambassade.

#### Zones à risque de méningite à méningocoques

**Pays africains de la ceinture de la méningite (en particulier de décembre à juin) :**

Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, République Centre-Africaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Togo

**Pays africains ou non dans lesquels sont survenus des épidémies depuis 1970 :**

Brésil, Burundi, Chili, Cuba, Haïti, Inde, Kenya, Malawi, Mongolie, Népal, Ouganda, Tanzanie, Vietnam

#### Trousse de pharmacie

Protection contre le paludisme : **répulsifs** et **antipaludéens**.

Médicaments généraux : **antalgiques** et **antipyrétiques** (**DOLIPRANE**, **IXPRIM**), antibiotiques (**CIFLOX**), **antidiarrhéiques** (**TIORFAN**, **IMODIUM**), antispasmodiques (**SPASFON**), **antiémétiques** (**PRIMPÉRAN**), antihistaminiques (**ZYRTEC**), collyre (**BIOCIDAN**).

Accessoires : thermomètre, pansements et sutures adhésives, crème solaire, crème pour brûlures, préservatifs, compresses stériles, antiseptiques (**BÉTADINE**), produits de désinfection de l'eau, bande de contention, tulle, pince à épiler, seringues et aiguilles stériles à usage unique, matériel de petite chirurgie, etc.

Médicaments spécifiques de maladies chroniques.

Prévenir du risque de photosensibilisation de certains médicaments (**fluoroquinolones**).

#### CONSENSUS

[1] Protection personnelle antivectorielle - protection contre les insectes piqueurs et les tiques, SMV et SFP, 2010

## MONONUCLÉOSE INFECTIEUSE (MNI) (1)

Le diagnostic de mononuclease infectieuse est le plus souvent évoqué devant une angine, une polyadénopathie cervicale fébrile et/ou la découverte d'un syndrome mononuclease.

### Physiopathologie

La MNI correspond au syndrome de primo-infection à Epstein-Barr virus (EBV). Le plus souvent asymptomatique, elle confère une immunité durable contre l'EBV (80 % des adultes sont immunisés). La distribution du virus est mondiale et l'homme représente le réservoir naturel de la maladie. La transmission s'opère par la salive à partir d'un malade ou d'un porteur asymptomatique (maladie du baiser). Après une infection des lymphocytes B, il survient une dissémination vers le foie, les organes lymphoïdes et la rate. Les symptômes sont le résultat du conflit immunologique avec l'hôte.

EBV est un cofacteur incriminé dans la survenue tardive de plusieurs maladies : lymphome de Burkitt (par immortalisation de lymphocytes B), réactivation chez les immunodéprimés (par persistance dans les lymphocytes B), carcinome du cavum (par excrétion chronique dans la salive).

### Diagnostic

#### Clinique

- Asthénie intense avec fièvre à 38 °C.
- Angine érythématopultacée bilatérale avec purpura du voile du palais.
- Adénopathies cervicales volontiers postérieures, parfois généralisées, splénomégalie.

- Exanthème morbilliforme spontané ou déclenché par la prise d'ampicilline.

- Guérison en 3-4 sem. avec asthénie résiduelle parfois prolongée.

- Signes associés : hépatite parfois ictérique, encéphalite, polyradiculonévrite, syndrome cérébelleux, méningite lymphocytaire, myocardite, pleurésie, rupture de rate exceptionnelle, auto-immunité (anémie hémolytique à Coombs positif, agglutinines froides, purpura thrombopénique, cryoglobulinémie).

#### Biologique

- *Syndrome mononuclease* (70 % des cas) : augmentation des cellules mononuclease circulantes (60-70 % des leucocytes) avec présence, sur le frottis sanguin, de grands lymphocytes stimulés hyperbasophiles à un noyau lobulé et excentré (environ 30 % des lymphocytes circulants).

D'autres infections s'accompagnent de syndrome mononuclease : CMV, toxoplasmose, VIH, hépatites virales, rubéole, oreillons ainsi que la prise de divers médicaments (phénylbutazone, hydantoïnes, etc.).

- *Neutropénie* absolue et relative (60-90 % des cas).

- *Thrombopénie*  $< 140\ 000/\text{mm}^3$  (50 % des cas).

- *Cytolyse hépatique* à 2-3 fois la normale : ASAT, ALAT et/ou LDH dans plus de 90 % des cas. Une élévation  $\geq 10$  fois la normale doit remettre en cause le diagnostic. Augmentation des phosphatases alcalines (60 %), de la bilirubine (45 %), et apparition d'un ictère ( $< 5$  %).

## MONONUCLÉOSE INFECTIEUSE (MNI) (2)

### Sérologique

#### ► Recherche d'anticorps hétérologues

- IgM dirigées contre les érythrocytes de mouton (Paul-Bunnell-Davidson) ou de cheval (MNI-test).

- Moins sensible que la recherche d'anticorps dirigés contre EBV, positivité parfois retardée de 2 à 3 sem. La sérologie peut rester positive jusqu'à un an et ne permet pas de dater rétrospectivement le début de l'infection.

- Très sensible, peu onéreuse mais de moins en moins demandée.

#### ► Recherche d'anticorps anti-EBV

- Recherche d'IgM anti-VCA (antigène de capsid virale) présente dans plus de 90 % des cas pendant les signes cliniques, persistance pendant 4-8 sem.

- L'IgG anti-VCA persiste toute la vie.

- Les anticorps contre les antigènes nucléaires (anti-EA et anti-EBNA) apparaissent après 3-4 sem. d'infection et sont réservés au cas douteux.

### Traitement

- > 95 % de guérison spontanée.

- Repos +++.

- Éviter le sport pendant 2-3 sem.

- Antipyrétique : **aspirine** ou **paracétamol**.

- Corticothérapie : **prednisone** à 1 mg/kg/j à arrêter progressivement en 1-2 sem. en cas d'obstruction sévère des voies aériennes, d'anémie hémolytique ou de thrombopénie profonde.

- Éviter les contacts trop rapprochés pendant la phase aiguë.

L'**ampicilline** et l'**amoxicilline** sont contre-indiquées car elles déclenchent un exanthème morbilliforme dans 90 % des cas.

## PÉNICILLINES G ET V (1)

## ■ Benzylpénicilline sodique

PÉNICILLINE G					
En 3 à 4 perf. IV de 30 min ou perf. continue A. : 50 000 à 100 000 UI/kg/j (max. 50 M UI/j) E. : 50 000 à 100 000 UI/kg/j (max. 20 M UI/j) N. : 75 000 à 20 000 UI/kg/j (max. 750 000 UI/kg/j)	25 inj. 5 MUI	HOP	I		
	25 fl. inj. 1 MUI	28,09	I	65 %	1,12
	1 fl. inj. 5 MUI	23,71	I	65 %	23,71

## ■ Pénicilline V (ou phénoxyéthylpénicilline)

ORACILLINE					
En 3 à 4 prises <i>per os</i> en dehors des repas A. : 3 à 4 M UI/j E. et N. : 50 000 à 100 000 UI/kg/j (max. 500 000 UI/kg/j)	12 cp. séc. 1 MUI	5,03	I	65 %	0,42
	24 c-mes. 250 000 UI (fl. 120 mL)	6,78	I	65 %	0,28
	24 c-mes. 500 000 UI (fl. 120 mL)	8,51	I	65 %	0,35
	18 c-mes. 1 000 000 UI (fl. 180 mL)	13,28	I	65 %	0,74

## ■ Benzathine-benzylpénicilline

EXTENCILLINE					
1 inj. par voie IM stricte A. : 2,4 M UI/inj. E. > 25 kg : 1,2 MUI/inj. E. < 25 kg : 0,6 MUI/inj.	1 fl. 0,6 MUI + amp. 2 mL	4,38	I	65 %	4,38
	1 fl. 1,2 MUI + amp. 4 mL	4,38	I	65 %	4,38
	1 fl. 2,4 MUI + amp. 8 mL	4,38	I	65 %	4,38

**PÉNICILLINES G ET V (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antibiotiques bactéricides qui se lient, comme toutes les bêta-lactamines, aux protéines enzymatiques (PLP) responsables des dernières étapes de la synthèse du peptidoglycane. L'inhibition de ces enzymes situées à la face externe de la membrane cytoplasmique conduit à un arrêt de la croissance puis à la mort bactérienne.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

**Pénicilline G** : usage parentéral (détruite par l'acidité gastrique), distribution dans tout l'organisme sauf le système nerveux central, l'œil, la prostate et l'os, faible passage dans le liquide céphalo-rachidien, élimination rénale sous forme active (90 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**Pénicilline V** : usage *per os*, à distance des repas, biodisponibilité de 60 %, distribution et élimination similaires à la **pénicilline G**.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : streptocoques (sauf entérocoques), pneumocoque, gonocoques, méningocoque, *Corynebacterium*, *Erysipelothrix*, *Listeria*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*, *Clostridium*, *Actinomyces*, *Treponema*, *Leptospira*, *Borrelia*, *Streptobacillus moniliformis*, *Spirillum minus*, *Pasteurella multocida*.

Résistance naturelle : entérocoques, bacilles gram-négatifs, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Mycobacterium*, *Nocardia*, *Bacteroides fragilis*.

Résistance acquise : staphylocoques producteurs de pénicillinases ( $\geq 95$  %) et staphylocoques méti-R, pneumocoque ( $> 35$  %), gonocoque (15 %).

**INDICATIONS**

- Infections à streptocoques des groupes A, B, C, et G.
- Angine streptococcique (prévention du rhumatisme articulaire aigu).
- Infections à pneumocoque sensible.
- Infections à méningocoque.
- Infections à staphylocoque non producteur de pénicillinase.
- Infections à spirochètes.
- Infections à anaérobies : clostridies, actinomycoses.
- Autres infections : pasteurellose, rouget du porc, sodoku, charbon.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **pénicillines**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine ; **pénicilline G** :

- $< 80$  mL/min : 30 MUI/j ;
- $< 50$  mL/min : 15 MUI/j ;
- $< 10$  mL/min : 10 MUI/j.

Apports sodés : 1,7 mmol de  $\text{Na}^+$  par million d'UI de **pénicilline G**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, syndrome de Stevens-Johnson, choc anaphylactique.

Toxicité neurologique (à fortes doses et favorisée par une insuffisance rénale) : agitation, convulsions, myoclonies, hallucinations, encéphalopathie.

Rares : réaction de Pick-Herxheimer dans la syphilis, neutropénie, anémie hémolytique, thrombopénie, allongement du TS.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Synergie avec les **aminosides**, l'**acide fusidique** et l'**acide clavulanique**.

## PÉNICILLINES A (1) – ORALES

## ■ Amoxicilline per os

<b>CLAMOXYL</b>					
En 3 à 4 prises/j minimum	12 gél. 500 mg	2,25	I	65 %	0,19
A. : 1 à 3 g/j (max. 6 g/j)	3 cp. 1 g disp.	1,97	I	65 %	0,66
E. et N. : 25 à 50 mg/kg/j	6 cp. 1 g disp.	2,78	I	65 %	0,46
(max. 150 mg/kg/j)	14 cp. 1 g disp.	5,24	I	65 %	0,37
	12 cuillères pdre pr susp.	1,83	I	65 %	0,15
	buv. 125 mg/5 mL				
	12 cuillères pdre pr susp.	2,20	I	65 %	0,18
	buv. 250 mg/5 mL				
	12 cuillères pdre pr susp.	2,64	I	65 %	0,22
	buv. 500 mg/5 mL				

## ■ Pivmécillinam chrohydrate

<b>SELEXID</b>					
En 2 à 3 prises	12 cp. 200 mg		I	NR	
A. : 3 à 4 cp./j					

## PÉNICILLINES A (2) – INJECTABLE

## ■ Amoxicilline injectable

<b>CLAMOXYL</b>					
<b>CLAMOXYL IV</b>	10 fl. 500 mg	HOP	I		
En 3 à 4 inj. IV	10 fl. 1 g	HOP	I		
A. : 2 à 12 g/j	10 fl. 2 g	HOP	I		
E. et N. : 100 à 200 mg/kg/j					
<b>CLAMOXYL IM</b>	10 fl. 500 mg	HOP	I		
En 3 à 4 inj. IM					
A. : 2 g/j	1 fl. 1 g + amp. 5 mL	1,81	I	65 %	1,81
E. et N. : 50 mg/kg/j					



**PÉNICILLINES A (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Pénicillines actives sur les entérocoques, les streptocoques, les entérobactéries et les *Haemophilus* non producteurs de bêta-lactamases.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Biodisponibilité *per os* > 80 % pour l'**amoxicilline**, distribution dans tout l'organisme (y compris le LCR), faible métabolisation hépatique, élimination rénale prépondérante sous forme active, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : streptocoques, pneumocoque, entérocoques, *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Erysipelothrix*, *Listeria*, *Bacillus*, *E. coli*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella*, *Shigella*, *Brucella*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella*, *Eikenella corrodens*, *Pasteurella*, *Vibrio cholerae*, *Helicobacter pylori*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*, *Clostridium*, *Actinomyces*, *Treponema*, *Leptospira*, *Borrelia*, *Streptobacillus moniliformis*, *Spirillum minus*.

Résistance naturelle : *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Morganella morganii*, *Proteus indole-positifs*, *Providencia*, *Serratia*, *Yersinia*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Campylobacter*, *Bacteroides*, *Clostridium difficile*, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Mycobacterium*, *Nocardia*.

**Résistance acquise** : staphylocoque producteur de pénicillinase (> 95 % en ville) ou méti-R, *E. coli* (≥ 40 %), *P. mirabilis* (10 à 15 %), *Salmonella* (> 10 %), *Shigella* (≥ 30 %), *H. influenzae* (25 %), *Moraxella catarrhalis* (75 %), gonocoque (≥ 15 %), pneumocoque (> 35 %).

**INDICATIONS**

- Infections des voies respiratoires supérieures (sauf otites moyennes aiguës et sinusites).
- Pneumonie communautaire non compliquée du sujet sain, bronchite aiguë.
- Méningite bactérienne à *Listeria*, *S. pneumo-*

*niae*, ou *N. meningitidis* (chez enfant > 6 ans et adulte jeune immunocompétent).

- Infections urinaires : cystite non compliquée de la femme jeune, bactériurie asymptomatique de la femme enceinte, infections à entérocoques.
- Infections à streptocoques, traitement et prophylaxie de l'endocardite bactérienne et du rhumatisme articulaire aigu.
- Maladie de Lyme, listériose, pasteurellose, syphilis.
- Infections à *Helicobacter pylori* (en association).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux bêta-lactamines.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éruptions non allergiques plus fréquentes au cours d'une infection à CMV, du psoriasis, de leucémie lymphoïde.

Insuffisance rénale : adapter la dose d'**amoxicilline** à la clairance de la créatinine :

- 30 à 10 mL/min : 500 mg à 1 g toutes les 12 h ;
- < 10 mL/min : 500 mg à 1 g toutes les 24 h.

Apports sodés : 2,7 mmol de Na<sup>+</sup> par g d'**ampicilline** ; 1,35 mmol de Na<sup>+</sup> par g d'**amoxicilline**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions cutanées allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, syndrome de Stevens-Johnson, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, colite pseudo-membraneuse, candidose.

Toxicité neurologique (à fortes doses, favorisée par une insuffisance rénale) : convulsions, encéphalopathie.

Rares : élévation transitoire des phosphatases alcalines et des transaminases, néphrite interstitielle aiguë, neutropénie, anémie hémolytique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Allopurinol** et **tisopurine** (éruption cutanée).

## AMINOPÉNICILLINES ET INHIBITEURS DE BÉTALACTAMASES (1)

## ■ Amoxicilline + acide clavulanique

<b>AUGMENTIN</b>					
<b>AUGMENTIN per os</b> En 3 à 4 prises au début des repas A. : 1 500 à 3 000 mg/j E. > 30 mois : 40 à 50 mg/kg/j	112 fl. 100 mg + <b>ac. clav.</b> 12,5 mg 30 mL (nour.)	3,91	I	65 %	0,03
	224 fl. 100 mg + <b>ac. clav.</b> 12,5 mg 60 mL (enf.)	6,45	I	65 %	0,03
	16 cp. 500 mg + <b>ac. clav.</b> 62,5 mg	7,28	I	65 %	0,46
	24 cp. 500 mg + <b>ac. clav.</b> 62,5 mg	9,03	I	65 %	0,38
	8 sach. 1 000 mg + <b>ac. clav.</b> 125 mg	7,28	I	65 %	0,91
	12 sach. 1 000 mg + <b>ac. clav.</b> 125 mg	9,03	I	65 %	0,75
	10 fl. 500 mg + <b>ac. clav.</b> 50 mg	14,33	I	65 %	1,43
	1 fl. 1 g + <b>ac. clav.</b> 200 mg	4,21	I	65 %	4,21
	10 fl. 1 g + <b>ac. clav.</b> 100 mg	HOP	I		
	10 fl. 2 g + <b>ac. clav.</b> 200 mg	27,38	I	65 %	2,74
<b>AUGMENTIN injectable</b> En 2 à 4 inj. IV ou perf. de 30 min A. : 2 à 4 g/j (max. 8 g/j) E. > 3 mois : 25 à 50 mg/kg en 3 à 4 inj.					

## ■ Ampicilline + sulbactam

<b>UNACIM</b>					
En 2 à 4 inj. IV ou perf. A. : 2 à 8 g (max. 12 g/j et 4 g de <b>sulbactam</b> ) E. : 100 à 150 mg/j (max. 300 mg/kg/j et 75 mg/kg/j de <b>sulbactam</b> )	1 fl. 1 000 mg + <b>sulbactam</b> 500 mg	HOP	I		
<b>UNACIM INJECTABLE</b>					
Par voie IM (adulte) : 1 g x 2/j	1 fl. 1 000 mg + <b>sulbactam</b> 500 mg + <b>lidocaïne</b> 3,2 mL à 0,5 %	5,28	I	65 %	5,28

## AMINOPÉNICILLINES ET INHIBITEURS DE BÊTALACTAMASES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Les **inhibiteurs de bêtalactamases** agissent comme des substrats compétitifs-suicides des bêtalactamases. Ils permettent de restaurer l'activité des aminopénicillines dans les infections à bactéries qui produisent une pénicillinase à un bas niveau (inactifs sur les céphalosporinases).

### PHARMACOCINÉTIQUE

La pharmacocinétique des **inhibiteurs de bêtalactamases**, proche de celle des **aminopénicillines**, n'est pas modifiée par l'absorption d'aliments (faible diffusion dans les méninges ne permettant pas une activité synergique dans les méningites), élimination rénale prépondérante sous forme active.

### MICROBIOLOGIE

Spectre d'action des aminopénicillines étendu aux : staphylocoque méti-S (y compris producteur de pénicillinase), gonocoque producteur de pénicillinase, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Citrobacter diversus*, *Yersinia enterocolitica*, *Campylobacter fetus*, *Moraxella catharralis*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus ducreyi*, anaérobies dont *Bacteroides*.

Résistance naturelle : *Enterobacter*, *Citrobacter freundii*, *Providencia*, *Serratia*, *Morganella morganii*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Legionella*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, entérobactérie productrice de céphalosporinases ou de pénicillinase à un haut niveau.

### INDICATIONS

– Infections urinaires basses chez la femme (pas d'indication probabiliste au cours des pyélonéphrites et des prostatites en raison de la fréquence d'E. coli résistants à l'association).

- Infections ORL : otites moyennes, sinusites, épiglottite à *H. influenzae*.
- Infections respiratoires basses au cours des BPCO en cas d'infections à *H. influenzae* sécréteur de pénicillinase ou plurimicrobienne, pneumopathie de déglutition communautaire.
- Infections cutanées ou des parties molles sur un terrain fragilisé (diabète, sujet âgé, etc.), ou après morsure non délabrante.
- Infections gynécologiques en particulier salpingite de la femme jeune (en association avec une tétracycline).
- Urétrite gonococcique non compliquée.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêtalactamines ou à l'**acide clavulanique** ou au **sulbactam**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : non tératogène mais innocuité non établie.

Éruptions cutanées plus fréquentes au cours d'une infection à CMV, du psoriasis, de leucémie lymphoïde.

Insuffisance rénale : adapter la dose d'**amoxicilline** à la clairance de la créatinine : 1 g puis 500 mg toutes les 12 h (< 30 mL/min) ou 250 mg toutes les 12 h (< 10 mL/min).

Ne pas dépasser 750 mg/j d'**acide clavulanique** per os ou 1 200 mg/j par voie IV ni 4 g/j de **sulbactam** chez l'adulte ou 75 mg/kg/j chez l'enfant.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Cf. **Aminopénicillines**.

Troubles digestifs : plus fréquents qu'avec une **aminopénicilline** seule.

Hépatites cholestatiques liées à l'**acide clavulanique**.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Synergie avec les **aminosides**.

**Allopurinol** et **tisopurine** (éruption cutanée).

## PÉNICILLINES M : ANTISTAPHYLOCOCCIQUES (1)

## ■ Cloxacilline

<b>ORBÉLINE</b>					
Forme orale : 25-50 mg/kg/j sans dépasser 3-4 g/j en 3 prises/j Forme IV : - curatif : A. 8-12 g/j et E. 100-200 mg/kg/j ≤12 g/j en 4-6 perf/j - préventif : 2 g avant puis 1 g toutes les 2 h durant l'intervention	10 fl. 1 g (IV) 16 gél. 500 mg	HOP 7,89	I I	65 %	0,49

## ■ Oxacilline

<b>BRISTOPEN</b>					
Curatif : A. 8-12 g/j et E. 100-200 mg/kg/j ≤12 g/j en 4-6 perf/j Préventif : 2 g avant puis 1 g toutes les 2 h durant l'intervention	1 fl. 1 g IV + amp. 5 mL	2,70	I	65 %	2,70

**PÉNICILLINES M : ANTISTAPHYLOCOCCIQUES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Pénicillines antistaphylococciques bactéricides qui résistent à l'hydrolyse de la pénicillinase staphylococcique présente chez plus de 95 % des souches en ville.

Les recommandations posologiques antérieures présentaient des risques de sous-dosages et donc d'échecs tout en favorisant la sélection de souches résistantes. Les réévaluations posologiques ont menées au retrait du **BRISTOPEN** *per os* en raison de l'incompatibilité des profils cinétiques et des contraintes de ces formes pharmaceutiques avec les nouvelles posologies. Par ailleurs, la voie IM est abandonnée à la fois pour le **BRISTOPEN** et l'**ORBÉNINE**.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, à distance des repas, biodisponibilité de 50 % pour la **cloxacilline**, distribution comparable à la **pénicilline G**, faible métabolisation hépatique (**cloxacilline** 20 %), élimination rénale prépondérante sous forme active, passage transplacentaire.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S (y compris producteur de pénicillinase), streptocoques (sauf entérocoques et streptocoques du groupe D), *Clostridium perfringens*.

Résistance naturelle : entérocoques, streptocoques du groupe D, bacilles gram-négatifs, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Mycobacterium*, *Bacteroides*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R (1 % des souches en ville mais jusqu'à 50 % dans certains services hospitaliers).

**INDICATIONS**

La forme orale est réservée au traitement des infections cutanées peu sévères dues aux staphylocoques et/ou aux streptocoques sensibles [1].

La forme IV garde ses indications antérieures

(en association dans les infections sévères) [1] :

- septicémies et endocardites à staphylocoques méti-S ;
- infections cutanées et des parties molles à staphylocoques méti-S ;
- infections osseuses et ostéo-articulaires à staphylocoques méti-S (préférer des antibiotiques avec une meilleure pénétration osseuse) ;
- staphylococcie pleuropulmonaire ;
- traitement préventif des infections post-opératoires en neuro-chirurgie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux bêta-lactamines.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les **céphalosporines**.

Insuffisance rénale : adaptation des doses à la clairance de créatinine :

– 30-10 mL/min : 30 mg/kg toutes les 4 à 6 h ;

– < 10 mL/min et hémodialyse : 30 mg/kg toutes les 12 h.

Insuffisance hépatocellulaire : demi-vie sérique augmentée pour la **cloxacilline**.

Apports sodés : 2,2 mmol de Na<sup>+</sup> par g d'**oxacilline** et de la **cloxacilline**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, syndrome de Stevens-Johnson, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée.

Rares : hépatites, néphrites interstitielles aiguës.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Synergie avec la **fosfomycine** en particulier sur *Staphylococcus aureus*, augmentation de la bactéricide en association avec les **aminosides**.

Certaines souches de staphylocoques ont acquis une résistance à l'ensemble des bêta-lactamines appelée communément résistance à la méticilline (méti-R). Il s'agit d'une résistance par modification de la cible (PLP) des bêta-lactamines et non par la production de bêta-lactamase (**acide clavulanique** inefficace). Les souches méti-R sont fréquemment résistantes à d'autres antibiotiques (**fluoroquinolones**, **aminosides**, **macrolides**, etc.) et se rencontrent quasi exclusivement en milieu hospitalier. En cas de suspicion d'infection à staphylocoque méti-R, il faut utiliser un glycopeptide en première intention (**vancomycine**), puis adapter le traitement à l'antibiogramme.

**CONSENSUS**

[1] Information sur la réévaluation des pénicillines du groupe M : oxacilline et cloxacilline, ANSM, 2011

## CARBOXYPÉNICILLINES (1)

## ■ Ticarcilline

<b>TICARPEN</b>					
En 3 à 8 inj. IV de 3 à 4 min, perf. de 20 à 30 min ou IM A. : 250 mg/kg/j E. : 300 mg/kg/j N. : 225 à 300 mg/kg/j	1 fl. 5 g (IV)	12,84	I	65 %	12,84

## ■ Ticarcilline + acide clavulanique

<b>CLAVENTIN</b>					
En 3 à 6 inj. IV de 3 à 4 min ou perf. de 20 à 30 min A. : 12 à 15 g/j de <b>ticarcilline</b> (max. 250 mg/kg/j) Ne pas dépasser plus de 200 mg d' <b>ac. clav.</b> par inj. E. : 225 à 300 mg/kg/j de <b>ticarcilline</b> Ne pas dépasser plus de 5 mg/kg d' <b>ac. clav.</b> par inj.	10 fl. 3 g + <b>ac. clav.</b> 200 mg	91,83	I	65 %	9,18
	1 fl. 5 g + <b>ac. clav.</b> 200 mg	13,26	I	65 %	13,26

## CARBOXYPÉNICILLINES (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

**Pénicilline** à large spectre, active sur *Pseudomonas*, hydrolysée relativement stable à l'activité des céphalosporinases. Son spectre d'action n'inclut pas les entérocoques à la différence des **acyluréidopénicillines** (**pipéracilline**).

## PHARMACOCINÉTIQUE

Voie parentérale stricte, diffusion dans tout l'organisme y compris le LCR (sauf l'**acide clavulanique**), pas de métabolisation pour la **ticarcilline**, élimination rénale (> 80 %).

## MICROBIOLOGIE

Spectre antibactérien des **aminopénicillines** étendu aux entérobactéries naturellement productrices de céphalosporinases (*Enterobacter*, *Citrobacter freundii*, *Serratia*, *Proteus* indole-positif, *Providencia*, *Morganella*), *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*, bacilles anaérobies gram-négatifs (*Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium*).

Résistance naturelle : entérocoque, *Klebsiella*, *Yersinia enterocolitica*, *Pseudomonas putida* et *cepaia*, *Xanthomonas maltophilia*, *Moraxella catharralis*, *Flavobacterium*, *Nocardia*.

Résistance acquise : staphylocoque producteur de pénicillinase (> 80 %) ou méti-R, pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, *Enterococcus faecium* (50 %), *E. coli* (20 %), *Proteus mirabilis* (10-25 %), *Providencia* (> 50 %), *Salmonella* et *Shigella* (5-20 %) *Enterobacter* (> 30 %), *Serratia* (> 30 %), *C. freundii* (40-50 %), *Morganella* (5-10 %), *P. aeruginosa* (30 %), *Acinetobacter* (40-60 %).

De nombreux bacilles gram-négatifs produisent une bêta-lactamase (pénicillinase) hydrolysant la **ticarcilline** (voir ci-dessus). L'association d'**acide clavulanique** permet de restaurer l'activité de la **ticarcilline** vis-à-vis de ces bactéries. En raison de son très large spectre d'action, **ticarcilline-acide clavulanique** induit une pression de sélection qui peut conduire à l'émergence de bactéries multirésistantes. Sa prescription doit être parcimonieuse, mûrement réfléchie et adaptée à l'antibiogramme.

## INDICATIONS

- Infection plurimicrobienne gynécologique ou digestive (mais absence d'activité sur l'entérocoque).
- Fièvre chez le neutropénique (préférer l'association **ticarcilline-acide clavulanique** en raison de la fréquence des bacilles gram-négatifs producteurs de bêta-lactamases).
- Infection à *Pseudomonas aeruginosa* sensible.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines ou à l'**acide clavulanique**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : non tératogène mais innocuité non établie de l'**acide clavulanique**.

Insuffisance rénale : adapter la dose de **ticarcilline** à la clairance de la créatinine :

- 60 à 30 mL/min : 5 g toutes les 8 h ;
- 30 à 10 mL/min : 5 g toutes les 12 h ;
- < 10 mL/min : 2 g par 24 h ;
- hémodialyse : 2 g en fin de séance.

**Ticarcilline-acide clavulanique** :

- 30 à 10 mL/min : 3 g/200 mg toutes les 12 h ;
- < 10 mL/min : 1,5 g/100 mg toutes les 12 h ;
- hémodialyse : 3 g/200 mg en fin de séance.

Apports sodés : 5,2 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **ticarcilline**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques, troubles digestifs et toxicité neurologique (cf. **Aminopénicillines**).

Rares : élévation transitoire des phosphatases alcalines et des transaminases, néphrite. interstitielle aiguë, neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif, hépatites.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Synergie avec les **aminosides** (et l'**acide clavulanique**).

## ACYLURÉIDOPÉNICILLINES (1)

## ■ Pipéracilline

<b>PIPÉRACILLINE PANPHARMA</b>					
En 3 perfusions IV de 30 min A. : 200 mg/kg/j E. : 200 à 300 mg/kg/j	1 inj. 1 g	HOP	I		
	1 inj. 4 g	HOP	I		
	10 inj. 4 g	HOP			

## ■ Pipéracilline + tazobactam

<b>TAZOCILLINE</b>					
En 3 perfusions IV de 30 min A. et E. > 12 ans : 12 à 16 g/j	1 fl. 2 g + 250 mg <b>tazocilline</b>	12,34	I	65 %	12,34
	1 fl. 4 g + 500 mg <b>tazocilline</b>	20,88	I	65 %	20,88



## ACYLURÉIDOPÉNICILLINES (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

**Pénicilline** à large spectre, active sur *Pseudomonas aeruginosa* et les entérocoques, relativement stable à l'hydrolyse des céphalosporinases.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Voie parentérale stricte, bonne diffusion tissulaire (y compris le LCR sauf pour le **tazobactam**), pas de métabolisation (métabolite inactif pour le **tazobactam**), élimination rénale (60-70 %) et biliaire (20-30 %).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : spectre antibactérien des **aminopénicillines** étendu aux entérobactéries produisant naturellement une céphalosporinase (*Enterobacter*, *Citrobacter freundii*, *Serratia*, *Proteus indole-positif*, *Providencia*, *Morganella morganii*), *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*, bacilles anaérobies gram-négatifs (*Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium*).

Résistance naturelle : *Citrobacter diversus*, *Klebsiella*, *Pseudomonas putida* et *cepacia*, *Xanthomonas maltophilia*, *Nocardia*.

Résistance acquise : staphylocoque producteur de pénicillinase (> 80 %) ou méti-R, pneumocoque de sensibilité diminuée à la **pénicilline**, *Enterococcus faecium* (50 %), entérobactérie (*E. coli* (20 %), *P. mirabilis* (10-25 %), *Providencia* (> 50 %), *Salmonella* et *Shigella* (5-20 %) *Enterobacter* (> 30 %), *Serratia* (> 30 %), *C. freundii* (40-50 %), *M. morganii* (5-10 %), *Providencia*, *P. aeruginosa* (30 %), *Acinetobacter* (40-60 %).

De nombreux bacilles gram-négatifs produisent une bêta-lactamase (pénicillinase) hydrolysant la **pipéracilline** (voir ci-dessus). L'association du **tazobactam** permet de restaurer l'activité de la **pipéracilline** vis-à-vis de ces bactéries. En raison de son très large spectre d'action, **pipéracilline-tazobactam** induit une pression de sélection qui peut conduire à l'émergence de bactéries multirésistantes. Sa prescription doit être parcimonieuse, mûrement réfléchie et adaptée à l'antibiogramme.

## INDICATIONS

– Fièvre chez le neutropénique (préférer l'association **pipéracilline-tazobactam** en raison de la fréquence des bacilles gram-négatifs producteurs de bêta-lactamases hydrolysant les **pénicillines**).

– Infections plurimicrobiennes (gynécologique, digestive, etc.).

– Infections à *Pseudomonas aeruginosa* ou à *Acinetobacter* sensible.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines ou au **tazobactam**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter les doses de **pipéracilline** à la clairance de la créatinine ; < 20 mL/min : 4 g toutes les 12 h. **Mezlocilline** : < 40 mL/min doubler l'intervalle entre deux doses ; < 10 mL/min ou tripler l'intervalle entre deux doses. **Pipéracilline-tazobactam** : 40 à 20 mL/min : 12 g/1,5 g en 3 injections ; < 20 mL/min 8 g/1 g en 2 injections.

Apports sodés : 1,85 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **pipéracilline**, 2,35 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **pipéracilline-tazobactam**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques et troubles digestifs communs avec l'**amoxicilline** (dont risque de colite pseudo-membraneuse et sélection de germes résistants).

Risque d'hypokaliémie.

Rares : élévation transitoire des transaminases, néphrite interstitielle aiguë, neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif.

Risque de fausse positivité de la recherche d'antigène aspergillaire sérique. Contrôle à l'arrêt de l'antibiotique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Diminution de l'efficacité des **aminosides**, des **contraceptifs oraux** et des **anticoagulants oraux**, antagonisme avec la **céfoxitine** sur *Pseudomonas*, augmentation du blocage neuromusculaire sous **vécuronium**.

## MONOBACTAM (1)

## ■ Aztréonam

<b>AZACTAM</b>					
En 2 à 3 perf. IV A. : 2 à 8 g/j En 1 à 2 inj. IM A. : 1 à 2 g/j	1 fl. 1 g	22,37	I	65 %	22,37
<b>CAYSTON</b>					
Mucoviscidose : infections pulmonaires chroniques à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 75 mg x 3/j pdt 28 j	84 inhal. 75 mg + 88 amp. + nébulis.	2205,64	I	65 %	26,26

**MONOBACTAM (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactéricide de la famille **bétalactamines** dont le spectre est limité aux bactéries gram-négatives.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Voie parentérale, bonne diffusion tissulaire (y compris le LCR), faible métabolisation (6-7 %), élimination rénale prépondérante (> 75 %).

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : *Neisseria*, *Escherichia coli*, *Shigella*, *Salmonella*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus indolepositif*, *Providencia*, *Morganella morganii*, *Serratia*, *Yersinia*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Campylobacter*, *Moraxella catharralis*, *Haemophilus*.

Résistance naturelle : cocci gram-positif, *Acinetobacter*, *Xanthomonas maltophilia*, *Pseudomonas cepacia*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella*, *Mycobacterium*, *Nocardia*, anaérobies.

Résistance acquise : *Enterobacter*, *Pseudomonas aeruginosa*.

**INDICATIONS**

- Infections nosocomiales abdominales, urinaires, gynécologiques, cutanées et pulmonaires à bacille gram-négatif.
- Septicémies et sepsis grave nosocomial (en réanimation).
- Fièvre chez le neutropénique.

– **CAYSTON** : infections pulmonaires chroniques à *Pseudomonas aeruginosa* chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 18 ans et plus.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **monobactams**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- < 30 mL/min : 1/2 dose ;
- < 10 mL/min : 1/4 de dose ;
- hémodialyse : 7,5 mg/kg en fin de séance.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs et thrombophlébite au point d'injection.

Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, colites pseudo-membraneuses.

Rares : saignements, hypoprothrombinémie, élévation transitoire des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Aminosides** (diminution de leur efficacité en cas d'insuffisance rénale très sévère).

**Contraceptifs oraux** (diminution de leur efficacité).

## CARBAPÉNÈMES (1)

## ■ Imipénem + cilastatine

<b>TIENAM</b>					
En 3 à 4 perfusions IV A. et E. > 40 kg : 1 à 4 g/j En 4 perfusions IV E. < 40 kg et N. > 3 mois : 60 mg/kg/j	1 fl. 500 mg + <b>cilastatine</b> 500 mg	17,49	I	65 %	17,49

## ■ Méropénem

<b>MERONEM</b>					
A. : 500 mg à 1 g x 3/j E. : 10 à 40 mg/kg x 3/j	10 fl. pdre 1 g sol. inj. IV	344,06	I	65 %	34,41

## ■ Ertapénem

<b>INVANZ</b>					
13 à 17 ans : 1g/j en 1 inj. 3 mois à 12 ans : 15 mg/kg/j en 2 inj. sans dépasser 1g/j	1 fl. pdre 1 g sol. perf.	HOP	I		

**CARBAPÉNÈMES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactéricide de la famille **bêta-lactamines** dont le spectre très large inclut la totalité des germes rencontrés en pratique quotidienne y compris la plupart des bactéries productrices de bêta-lactamases. La **cilastatine** prévient l'inactivation rénale de l'**imipénem** et rétablit des concentrations urinaires thérapeutiques.

En raison de leur large spectre d'action, les **carbapénèmes** induisent une pression de sélection qui peut conduire à l'émergence de bactéries multirésistantes. Leur prescription doit être parcimonieuse et mûrement réfléchie.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Voie parentérale, bonne diffusion tissulaire (y compris le LCR), métabolisation entre 20 et 30 %, élimination rénale prépondérante (90 % dont 75 % sous forme active).

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : bactéries gram-positives (staphylocoques méti-S, streptocoques, pneumocoques, entérocoques, *Listeria*), bactéries gram-négatives (*Neisseria*, *Moraxella catarrhalis*, *Brucella*, *Haemophilus*), entérobactéries (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter freundii*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, *Yersinia*, *Campylobacter*), *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*, anaérobies (*Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Veillonella*, *Clostridium*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*). Résistance naturelle : *Citrobacter diversus*, *Enterococcus faecium*, corynébactéries JK, *Xanthomonas maltophilia*, *Pseudomonas cepacia*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*, *Nocardia*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, entérobactéries (exceptionnel), *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*.

**INDICATIONS**

– Infections nosocomiales (ex. : abdominales, urinaires, gynécologiques, pulmonaires).

- Septicémies et sepsis grave nosocomiaux (en réanimation).
- Infections à germes multirésistants : *Pseudomonas* résistant à la **ceftazidime**, *Acinetobacter*, entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu ou hyperproductrices de céphalosporinases (adapter à l'antibiogramme).
- Infections plurimicrobiennes.
- Fièvre chez le neutropénique en cas de suspicion de germe résistant à la **ceftazidime**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux bêta-lactamines ou à la **cilastatine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Allergie croisée avec les **céphalosporines** dans 2 % des cas.

Insuffisance rénale : adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- 70 à 30 mL/min : 500 mg toutes les 6 à 8 h ;
- 30 à 10 mL/min : 500 mg toutes les 8 à 12 h ;
- < 10 à 5 mL/min : 250 à 500 mg toutes les 12 h ;
- hémodialyse : 7,5 à 15 mg/kg en fin de séance.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs et thrombophlébite au point d'injection. Réactions allergiques : exanthème maculo-papuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique. Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, colites pseudo-membraneuses, candidose. Rares : neutropénie, anémie hémolytique, élévation transitoire des transaminases, des phosphatases alcalines, néphrite interstitielle aiguë, confusion, convulsions, encéphalopathie dépendante de la dose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Aminosides** (diminution de leur efficacité en cas d'insuffisance rénale très sévère), augmentation de la ciclosporinémie, **ganciclovir** (convulsions).

## CÉPHALOSPORINES DE 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactéricides de la famille des bêta-lactamines souvent prescrits dans les infections ORL communautaires non compliquées.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité entre 75 et plus de 90 %, tolérance dépendante de la dose) ou par voie parentérale, large distribution (sauf le LCR), faible métabolisation, élimination essentiellement rénale, passage placentaire et dans le lait maternel.

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoque, pneumocoque sensible à la **pénicilline**, *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Citrobacter diversus*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Treponema*, *Leptospira*.

Résistance naturelle : entérocoque, *Listeria*, *Enterobacter*, *Citrobacter freundii*, *Proteus* indole-positif, *Providencia*, *Serratia*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Campylobacter*, *Clostridium difficile*, *Bacteroides*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, pneumocoque résistant à la pénicilline, toute entérobactérie, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*.

### INDICATIONS

– Infections ORL (risque d'échec en cas d'infection à *H. influenzae* ou à *M. catarrhalis*).

– Infections cutanées et des tissus mous à staphylocoque méti-S ou à streptocoque.

– Infections à entérobactéries sensibles (ex. : *E. coli*, *P. mirabilis*).

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines (2 % d'allergie croisée avec les **pénicillines**).

Méningites.

Infections à entérocoques.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine (cf. tableau).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Douleur au point d'injection, thrombophlébite  
Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, syndrome de Stevens-Johnson, maladie sérique, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, colites pseudo-membraneuses.

Toxicité neurologique (à fortes doses et favorisée par une insuffisance rénale) : convulsions, encéphalopathie.

Troubles hématologiques (rares) : neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif, troubles de la coagulation, agranulocytose ou pancytopenie (exceptionnelles).

Rares : élévation transitoire des transaminases, néphrite interstitielle aiguë.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

### Posologie des céphalosporines de 1<sup>re</sup> génération chez l'insuffisant rénal

CÉPHALOSPORINES DE 1 <sup>RE</sup> GÉNÉRATION	DOSE ET INTERVALLE ENTRE CHAQUE INJECTION EN FONCTION DE LA CLAIRANCE DE LA CRÉATININE (mL/min)		DOSE APRÈS HÉMODIALYSE
	30-10	< 10 et anurie	
<b>Céfaclor</b>	250 mg/12 h	250 mg/24 h	cf. anurie
<b>Céfadroxil</b>	7,5 mg/kg/12-24 h	15 mg/kg/48 h	7,5 mg/kg
<b>Céfalexine</b>	7,5 mg/kg/12-24 h	7,5 mg/kg/24-48 h	7,5 mg/kg
<b>Céfradine</b>	4-8 mg/kg/6-12 h	4 mg/kg/12 h	15 mg/kg
<b>Céfazoline</b>	7,5-15 mg/kg/24 h	15 mg/kg/48 h	15 mg/kg

CÉPHALOSPORINES DE 2<sup>e</sup> GÉNÉRATION (1)

## ■ Céfuroxime axetil

<b>ZINNAT</b>					
A. : 500 à 1 000 mg/j	8 cp. 125 mg	5,28	I	65 %	0,66
E. : 20 à 30 mg/kg/j (max. : 500 mg/j)	8 cp. 250 mg	7,79	I	65 %	0,97
En 2 prises <i>per os</i> après les repas	8 sach. 125 mg	7,79	I	65 %	0,97
	8 c-mes. 125 mg	6,34	I	65 %	0,79
	16 c-mes. 125 mg	10,95	I	65 %	0,68
<b>ZINNAT injectable</b>	1 fl. 250 mg IM/IV	HOP	I		
En 2 à 4 inj. IV ou IM	1 fl. 750 mg IM/IV	HOP			
A. : 1 à 1,5 g/j	2 fl. 750 mg/3 mL IM	6,62	I	65 %	3,31
E. et N. : 30 à 60 mg/kg/j	1 fl. 1,5 g (perf.)	HOP	I		

## ■ Céfamandole

<b>CÉFAMANDOLE PANPHARMA</b>					
En 3 à 4 inj. IV ou IM	10 fl. 750 mg	HOP	I		
A. : 3 g/j					
E. : 50 mg/kg/j					

CÉPHALOSPORINES DE 2<sup>e</sup> GÉNÉRATION (2)

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines caractérisés par une meilleure activité que les **céphalosporines de 1<sup>re</sup> génération** sur les entérobactéries, *Haemophilus influenzae* et *Moraxella catarrhalis*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité 30-50 % pour le **céfuroxime axetil**) ou par voie parentérale, large distribution (faible dans le LCR), absence de métabolisation, élimination essentiellement rénale, passage placentaire et dans le lait maternel.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoques, pneumocoque sensible à la pénicilline, *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Shigella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Providencia*, *M. catarrhalis*, *H. influenzae*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Treponema*, *Leptospira*.

Résistance naturelle : entérocoque, *Listeria*, *Serratia*, *Proteus vulgaris*, *Morganella*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Campylobacter*, *Clostridium difficile*, *Bacteroides*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, pneumocoque résistant à la **pénicilline**, toute entérobactérie.

## INDICATIONS

- Infections ORL communautaires.
- Infections bronchiques (y compris chez le bronchopathe chronique) et pneumopathies communautaires à pyogènes.
- Infections communautaires de la peau et des parties molles.
- Infections urinaires non compliquées.
- Infections à staphylocoques méti-S (**céfamandole**).

Dans les infections à entérobactérie naturellement sécrétrice de céphalosporinase (encore appelée bêta-lactamase de classe C) comme *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus* (indole-positif), *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, il est recommandé d'utiliser une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** associée à un **aminoside** ou une **fluoroquinolone**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines.

**Grossesse** et **allaitement** (formes orales).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : cf. tableau.

Apports sodés : 1,8 mmol de Na<sup>+</sup> par 750 mg de **céfuroxime** ; 2,2 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **céfoxitine** ; 2,5 mmol de Na<sup>+</sup> par 750 mg de **céfamandole**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleur au point d'injection, thrombophlébite. Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, colites pseudo-membraneuses.

Troubles hématologiques (rares) : neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif, troubles de la coagulation par diminution de la vitamine K (**céfamandole**).

Rares : élévations transitoires des transaminases, des phosphatases alcalines, des LDH et de la bilirubine, néphrite interstitielle aiguë.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Furosémide** : augmentation des effets indésirables.

**Anticoagulants, antiagrégants** : augmentation du risque de saignement (**céfamandole**), effet antabuse (**céfamandole**).

Médicaments néphrotoxiques.



CÉPHALOSPORINES DE 2<sup>e</sup> GÉNÉRATION (3)

## ■ Céfoxitine

**CEFOXITINE PANPHARMA**

En 3 inj. IV ou IM	25 fl. 1 g	HOP	I		
A. : 3 à 6 g/j	25 fl. 2 g	HOP	I		

CÉPHALOSPORINES DE 2<sup>E</sup> GÉNÉRATION (4) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

**Céphalosporines de 2<sup>e</sup> génération** (de type **ceftamycine**) caractérisées par leur résistance à l'hydrolyse de certaines bêta-lactamases mais peu utilisées en raison de leur toxicité.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage par voie parentérale, large distribution (sauf le LCR), absence de métabolisation, élimination essentiellement rénale, passage placentaire et dans le lait maternel.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoque, pneumocoque sensible à la pénicilline, *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Providencia*, *Serratia*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*.

Résistance naturelle : entérocoque, *Listeria*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Morganella*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Campylobacter*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, pneumocoque résistant à la **pénicilline**, toute entérobactérie.

## INDICATIONS

- Infections communautaires abdominales, pelviennes et gynécologiques.
- Infections d'ulcères de décubitus, du pied diabétique et des parties molles.
- Infection urinaire à entérobactérie productrice de bêta-lactamase à spectre étendu ne touchant pas les **céphamycines**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines.  
Méniges.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine (cf. tableau).

Troubles de la coagulation.

Insuffisance hépatique.

Apports sodés : 2,2 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **céfoxitine**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleur au point d'injection, thrombophlébite. Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, colites pseudo-membraneuses, candidose.

Troubles hématologiques : troubles de la coagulation par diminution de l'absorption de la vitamine K (3,2 %), neutropénie (2 %), anémie hémolytique à Coombs direct positif (0,4-3 %), modifications de l'hémoglobine (6,7 %).

Rares : élévations transitoires des transaminases, des phosphatases alcalines, des LDH et de la bilirubine, néphrite interstitielle aiguë, élévation de la créatininémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Anticoagulants, antiagrégants** : augmentation du risque de saignement.

Médicaments néphrotoxiques.

Posologie des céphalosporines de 2<sup>e</sup> génération chez l'insuffisant rénal

CÉPHALOSPORINE DE 2 <sup>E</sup> GÉNÉRATION	DOSE ET INTERVALLE ENTRE CHAQUE INJECTION EN FONCTION DE LA CLAIRANCE DE LA CRÉATININE (mL/min)		DOSE APRÈS HÉMODIALYSE
	30-10	< 10 et anurie	
<b>Céfamandole</b>	7,5-15 mg/kg/12-24 h	7,5-15 mg/kg/24-48 h	15 mg/kg
<b>Céfuroxime</b>	15 mg/kg/24 h	7,5-15 mg/kg/36 h	15 mg/kg
<b>Céfuroxime axétile</b>	7,5 mg/kg/24 h	7,5 mg/kg/48 h	idem anurie
<b>Céfoxitine</b>	7,5-30 mg/kg/12-24 h	7,5-15 mg/kg/24-48 h	1-2 g

CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION INJECTABLES (1)

## ■ Céfotaxime

<b>CEFOTAXIME MYLAN</b>					
En 3 inj. IV lentes ou IM	1 fl. 500 mg IV/IM	HOP	I		
A. : 3 à 12 g/j	1 fl. 1 g IV/IM	HOP	I		
E. et N. : 50 à 200 mg/kg/j	1 fl. 2 g IV/IM	HOP	I		

## ■ Ceftriaxone

<b>ROCÉPHINE</b>					
En 1 inj. IV lente ou IM	1 fl. 500 mg IV	4,52	I	65 %	4,52
A. : 1 à 4 g/j	1 fl. 500 mg IM ou SC	4,53	I	65 %	4,53
E. et N. : 50 à 100 mg/kg/j	+ <b>lidocaïne</b>				
	1 fl. 1 g IV	7,60	I	65 %	7,60
	1 fl. 1 g IM ou SC	9,27	I	65 %	9,27
	+ <b>lidocaïne</b>				

## CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION INJECTABLES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactéricides de la famille des bêta-lactamines caractérisés par une meilleure activité sur les bacilles gram-négatifs et les streptocoques que les **céphalosporines de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> générations**.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Usage par voie parentérale, demi-vie de 8 h pour la **ceftriaxone** permettant une injection par jour, large distribution (y compris dans le LCR), métabolisation de 30-50 %, éliminations rénale et biliaire, passage placentaire et dans le lait maternel.

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoques, pneumocoque (y compris de sensibilité diminuée à la pénicilline), *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*, *Treponema*, *Leptospira*.

Résistance naturelle : entérocoques, *Listeria*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Campylobacter*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, toute entérobactérie hyperproductrice de céphalosporinase ou productrice de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE).

### INDICATIONS

- Méningites purulentes communautaires (sauf listériose).
- Pyélonéphrite aiguë (sauf entérocoque).
- Pneumopathies bactériennes communautaires (préférer **amoxicilline (CLAMOXYL)** ± **acide clavulanique (AUGMENTIN)**).
- Infections communautaires des voies biliaires, du liquide d'ascite (en association).
- Bactériémies et septicémies (sauf suspicion d'entérocoques, d'entérobactérie hyperproductrice de céphalosporines ou de BLSE ou de *Pseudomonas*).
- Typhoïde, maladie de Lyme.
- Traitement minute de la gonococcie simple (**ceftriaxone** 250 à 500 mg en 1 injection).
- Infection nosocomiale pulmonaire ou urinaire à entérobactérie en début d'hospitalisation (sauf suspicion de souche hyperproductrice de céphalosporinase ou de BLSE).

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine.

Insuffisance rénale (clearance)	Céfotaxime	Ceftriaxone
– 30-10 mL/min – < 10 mL/min	– 10 mg/kg/8 h – 7,5 mg/kg/8 h	– 15-30 mg/kg/24 h – 7-15 mg/kg/24 h
Hémodialyse	15 mg/kg en fin de dialyse	1 g en fin de dialyse

Apports sodés : 2,1 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **céfotaxime** et 3,6 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **ceftriaxone**.

Des études ont suggéré que l'élimination principalement biliaire de la **ceftriaxone** pourrait favoriser l'émergence de souches d'entérobactéries hyperproductrices de céphalosporinase. Il serait ainsi préférable d'utiliser le **céfotaxime** en première intention.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs au point d'injection.

Réactions allergiques : exanthème maculopapuleux, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vasculite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, colites pseudo-membraneuses, « pseudo-cholélithiase » (**ceftriaxone**), candidose.

Troubles hématologiques (rares) : neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif, thrombocytose.

Rares : élévation transitoire des transaminases, des phosphatases alcalines et de la bilirubine, néphrite interstitielle aiguë.

Réaction d'Herxheimer dans le traitement de la syphilis secondaire.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Aminosides** et **colistine** : néphrotoxicité.

CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>e</sup> GÉNÉRATION INJECTABLES (3)

## ■ Ceftazidime

<b>FORTUM</b>					
En 3 inj. IV lentes ou IM	1 fl. 250 mg	4,08	I	65 %	4,08
A. : 3 à 6 g/j	1 fl. 500 mg	6,47	I	65 %	6,47
E. et N. : 50 à 200 mg/kg/j	1 fl. 1 g	12,40	I	65 %	12,40
	1 fl. 2 g	24,25	I	65 %	24,25
<b>FORTUMSET</b>					
Idem <b>FORTUM</b>	1 fl. 1 g pdre/1,182 g	12,40	I	65 %	12,40
	1 fl. 2 g pdre/2,364 g	24,25	I	65 %	24,25

**PROPRIÉTÉS**

**Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** particulièrement active sur *Pseudomonas* et d'activité comparable au **céfotaxime** sur les entérobactéries.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage par voie parentérale, large distribution (y compris dans le LCR), absence de métabolisation, élimination rénale prépondérante (80 à 90 %), passage placentaire et dans le lait maternel.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoques, pneumocoque (y compris de sensibilité réduite à la pénicilline), *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas cepacia*, *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas alcaligenes*, *Pseudomonas stutzeri*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*, *Treponema*, *Leptospira*.

Résistance naturelle : entérocoque, *Listeria*, *Acinetobacter*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, entérobactéries hyperproductrices de **céphalosporines** ou productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*), *Pseudomonas* (> 10 % de souches résistantes), *Bacteroides fragilis* (40-60 %).

**INDICATIONS**

– Infections à *Pseudomonas* prouvée ou suspectée.

- Fièvre chez le neutropénique.
- Septicémie ou syndrome septique grave nosocomial (réanimation).
- Infections pulmonaires au cours de la mucoviscidose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux bêta-lactamines.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non démontrée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- 30-10 mL/min : 15 mg/kg/24-36 h ;
- < 10 mL/min : 7,5 mg/kg/48 h ;
- hémodialyse : 15 mg/kg en fin de séance.

Apports sodés : 2,3 mmol de Na<sup>+</sup> par g de **ceftazidime**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs au point d'injection, thrombophlébites. Réactions allergiques : exanthème maculo-papuleux, rash, urticaire, œdème de Quincke, fièvre, vascularite, éosinophilie, cytopénie, choc anaphylactique. Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, colites pseudo-membraneuses, candidose. Troubles neurologiques : vertiges, paresthésies, maux de tête. Troubles hématologiques (rares) : neutropénie, anémie hémolytique à Coombs direct positif, thrombocytose. Rares : élévation transitoires des transaminases ou de la créatininémie, néphrite interstitielle aiguë.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Aminosides** (néphrotoxicité), **contraceptifs oraux** (diminution de leur efficacité), **antivitamines K** (augmentation du taux de prothrombine), **allopurinol** (augmente la fréquence des rashs).

CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>e</sup> GÉNÉRATION INJECTABLES (4)

## ■ Céfépime

AXEPIM					
En 2 à 3 inj. IV lente ou IM	1 fl. 500 mg	12,72	I	65 %	12,72
A. : 2 à 6 g/j	1 fl. 1 g	16,51	I	65 %	16,51
	1 fl. 2 g	26,90	I	65 %	26,90

## PROPRIÉTÉS

**Céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** plus résistantes que le **céfotaxime** à l'hydrolyse des céphalosporinases naturellement produites par certaines entérobactéries (*Enterobacter*, *Citrobacter*, *Morganella*, etc.), modérément actives sur *Pseudomonas aeruginosa* et d'activité comparable au **céfotaxime** sur les cocci gram-positifs.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage par voie parentérale, large distribution (y compris dans le LCR), peu ou pas de métabolisation, élimination rénale prépondérante (75-90 %).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoque méti-S, streptocoques, pneumocoque (y compris de sensibilité réduite à la pénicilline), *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*.  
Résistance naturelle : entérocoque, *Listeria*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*,

*Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoque méti-R, entérobactéries hyperproductrices de céphalosporines ou productrices de bêta-lactamases à large spectre (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*), *Pseudomonas aeruginosa* (50 %).

## INDICATIONS

À utiliser de préférence sur documentation bactériologique associé à un **aminoside** ou à une **fluoroquinolone**.

- Infections à *Enterobacter*, *Serratia*, *Citrobacter*, *Morganella*, *Proteus* indole-positif, *Providencia*.
- Fièvre chez le neutropénique.
- Septicémie ou syndrome septique grave nosocomial (réanimation).
- Suspicion de bactéries hyperproductrices de céphalosporinases.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine (cf. Tableau ci-dessous).

Insuffisance rénale (clairance)	Céfépime	Cefpirome
– 50-30 mL/min – 30-10 mL/min – < 10 mL/min	– Pas de changement de dose – 1 à 2 g/j en une injection – 0,5 à 1 g/j	– 0,5 à 1 g/12 h – 0,5 à 1 g/24 h – 0,5 g/24 h
Hémodialyse	0,5 g en fin de séance	0,5 g en fin de séance

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques : réactions cutanées, rashes, urticaire, fièvre, éosinophilie.  
Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, colite pseudo-membraneuse (rare), candidose, élévation des transaminases.  
Troubles neurologiques : sensations vertigineuses, modification du goût, acouphènes, maux de tête, vision brouillée, paresthésies.

Troubles hématologiques (rares) : neutropénie, anémie hémolytique, thrombocytopénie, granulocytopenie.

Rares : hypotension, ulcération buccale, augmentation de la créatinine.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION ORALES (1)

## ■ Céfixime

<b>OROKEN</b>					
En 2 prises <i>per os</i> au moment du repas	8 cp. 200 mg	10,19	I	65 %	1,27
A. : 400 mg/j	80 doses 40 mg susp. buv.	6,29	I	65 %	0,08
E. > 6 mois : 8 à 16 mg/kg/j	200 doses 100 mg susp. buv.	10,22	I	65 %	0,05

## ■ Cefpodoxime proxétil

<b>ORELOX</b>					
En 2 prises <i>per os</i> au moment du repas	10 cp. 100 mg	10,09	I	65 %	1,01
A. : 200 à 400 mg/j	100 doses susp. buv. 40 mg/5 mL	6,40	I	65 %	0,06
E. et N. : 8 mg/kg/j	200 doses susp. buv. 40 mg/5 mL	10,75	I	65 %	0,05

## ■ Céfotiam hexétil

<b>TAKETIAM</b>					
En 2 prises <i>per os</i>	10 cp. 200 mg	11,13	I	65 %	1,11
A. : 400 à 800 mg/j					
<b>TEXODIL</b>					
Idem <b>TAKETIAM</b>	10 cp. 200 mg	11,13	I	65 %	1,11

## CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>e</sup> GÉNÉRATION ORALES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

**Céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** administrables *per os* dont la pharmacocinétique ne permet pas une équivalence thérapeutique avec les formes injectables. Elles sont inefficaces dans les infections à staphylocoques ou à anaérobies et beaucoup moins actives que les **céphalosporines** injectables dans les infections à bacilles gram-négatifs.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, biodisponibilité entre 40 et 55 %, distribution tissulaire modérée sauf dans le LCR (poumons, liquide pleural, muqueuses bronchique et amygdalienne) avec des concentrations tissulaires susceptibles d'être inférieures aux concentrations thérapeutiques (CMI), peu ou pas de métabolisation, éliminations rénale et biliaire, passage placentaire et dans le lait maternel.

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : streptocoques, pneumocoques (y compris de sensibilité réduite à la pénicilline), *Neisseria*, *Corynebacterium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Providencia*, *Morganella*, *Serratia*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*.

Résistance naturelle : entérocoques, *Listeria*, *Pseudomonas*, *Clostridium difficile*, *Mycoplasma*, *Chlamydiae*, *Rickettsiae*, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoques, entérobactéries productrices de céphalosporines ou de bêtalactamases à large spectre (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*,

*Providencia*, *Morganella*, *Serratia*), *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, anaérobies.

### INDICATIONS

- Infections respiratoires hautes et basses non compliquées.
- Infections ORL non compliquées (angines, sinusites, otites).
- Gonococcies simples en 2<sup>e</sup> intention (**céfixime** 400 mg en 1 prise unique).
- Pyélonéphrite aiguë sans uropathie.
- Infection urinaire basse (sauf prostatite).

Les **céphalosporines** orales ne sont pas l'équivalent pharmacologique *per os* des **céphalosporines** injectables (en particulier dans les infections urinaires).

Il est souvent préférable de prescrire un antibiotique d'efficacité comparable et de moindre coût (**amoxicilline** (**CLAMOXYL**) ± **acide clavulanique** (**AUGMENTIN**), **céfotaxime** (**CLAFORAN**), **fluoroquinolone**, etc.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêtalactamines.

**Grossesse** et **allaitement**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine. **Céfixime** : < 20 mL/min : 200 mg/j ; **céfpodoxime proxétile** : < 40 mL/min : 1/2 dose à administrer en une prise ; **céfotiam hexétile** : < 25 mL/min : diminuer la dose de 75 %.

### EFFETS INDÉSIRABLES

*Cf. céfotaxime.*

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.



## AMINOSIDES (1)

## ■ Gentamicine

<b>GENTALLINE</b>					
En 1 à 2 inj. IM ou IV (30 min) A. : 3 à 5 mg/kg/j E. : 1 à 1,5 mg/kg/j en 2 inj. N. : 1 à 2 mg/kg/j en 2 inj. NN. : 2 à 3 mg/kg/j en 2 inj.	1 amp. 80 mg	2,68	I	65 %	2,68

## ■ Amikacine

<b>AMIKACINE MYLAN</b>					
En 1 à 2 perf. IV (> 30 min), ou inj. IM A. et E. : 15 mg/kg/j 0,5 mg/kg/48 h voie intrarachidienne <b>AMIKACINE MYLAN pédiatrique</b> En 1 à 2 perf. IV (30 min) ou inj. IM E. et N. : 15 mg/kg/j	20 fl. 250 mg 20 fl. 500 mg 20 fl. 1 g (IV) 10 fl. 50 mg/1 mL	HOP HOP HOP HOP	I I I I		

## ■ Nétilmicine

<b>NÉTROMICINE</b>					
En 1 à 2 perf. IV (> 30 min) ou inj. IM A. : 4 à 6 mg/kg/j E. : 6 à 7,5 mg/kg/j NN. : 7,5 à 9 mg/kg/j en 2 inj.	1 amp. 25 mg 25 amp. 25 mg 1 amp. 50 mg 25 amp. 50 mg 1 amp. 100 mg 25 amp. 100 mg 1 amp. 150 mg 25 amp. 150 mg	1,90 HOP 2,55 HOP 3,86 HOP 4,93 HOP	I I I I I I I I	65 %  65 %  65 % 65 %	1,90  2,55  3,86  4,93

## ■ Tobramycine

<b>NEBCINE</b>					
En 1 à 2 perf. IV (30 min) ou inj. IM A., E. et N. : 3 mg/kg/j	1 fl. 25 mg 1 fl. 75 mg 1 amp. 100 mg	3,86 4,27 4,39	I I I	65 % 65 % 65 %	3,86 4,27 4,39
<b>TOBI</b>					
Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> chez les patients atteints de mucoviscidose. A. et E. > 6 ans : 1 amp. x 2/j en inhalation de 15 min pendant 28 j	56 amp. (sol. pour inhal.) 300 mg/5 mL	2238,81	I	65 %	39,98
<b>TOBI PODHALER</b>					
Même indication que <b>TOBI</b> A. et E. > 6 ans : 4 gél x 2/j pendant 28 j	224 gél. 28 mg	2238,81	I	65 %	9,99

**AMINOSIDES (2) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

Antibiotiques bactéricides à large spectre qui inhibent la synthèse protéique en se fixant sur les ribosomes, utilisés presque exclusivement en association.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Pas d'absorption par voie entérale, résorption par voie IM variable dans le temps, distribution limitée (sérum, liquide synovial, poumons, reins), mauvaise diffusion dans le LCR, pas de métabolisation, élimination rénale sous forme active, passage transplacentaire, hémodialysable.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoques, gonocoque (spectinomycine), méningocoques, -entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*, *Xanthomonas*, *Aeromonas*, *Acinetobacter*, *Haemophilus influenzae*, bacilles gram-positifs aérobies, *Nocardia asteroides* (**amikacine**), *Mycobacterium tuberculosis* (**amikacine**), *Mycobacterium avium-intracellulare* (**amikacine**), *Entamoeba histolytica*, lambliaise.

Résistance naturelle : streptocoques et entérocoques (mais synergie avec les **bêtalactamines**), *Pseudomonas cepacia*, *Pseudomonas maltophilia*, *Pseudomonas stutzeri*, anaérobies stricts, spirochètes, germes intracellulaires.

Résistance acquise : (le plus souvent par production d'enzymes plasmidiques) staphylo-

coques méti-R, entérobactéries, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*.

**INDICATIONS**

- Septicémies et endocardites infectieuses.
- Infections sévères à staphylocoques, à streptocoques, à entérocoques, à bacilles gram-négatifs (en association avec une **bêtalactamine**).
- Fièvre chez le neutropénique et l'immuno-déprimé.
- Infections abdomino-pelviennes, arthrites, ostéomyélites, otites, pyélonéphrites et pneumopathies nosocomiales.
- Gonococcie aiguë simple en 2<sup>e</sup> intention (**spectinomycine**, mauvaise diffusion pharyngée).
- Infection à *Mycobacterium avium-intracellulare* et nocardiose (**amikacine**), tuberculose (**amikacine**).
- Infection à *Listeria* (en association avec **amoxicilline**).
- Préférer la **gentamicine** en cas d'infection à Gram positif, l'**amikacine** en cas d'infection à Gram négatif, la **tobramycine** en cas d'infection à *Pseudomonas*.

Plusieurs études ont montré que la toxicité des **aminosides** était diminuée par l'administration de la dose totale quotidienne en une seule injection. Cependant, cette modalité de prescription ne peut être étendue à toutes les situations cliniques (infections à entérocoque ou à cocci gram-positifs, endocardite, infection osseuse, etc.).

## AMINOSIDES (3) – PHARMACOLOGIE (2)

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **aminosides**.  
Myasthénie (blocage neuromusculaire).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il est préférable d'utiliser la **gentamicine** dans les infections à cocci gram-positifs (meilleure activité *in vitro*) et la **tobramycine** en cas de suspicion d'infection à *Pseudomonas*.

Éviter pendant la **grossesse** et en cas de lésions cochléo-vestibulaires.

Cirrhose : augmentation de la toxicité (contre-indication relative).

Insuffisance rénale : cf. Tableau.

Nouveau-né : risque de surdosage nécessitant une surveillance des dosages sériques.

Obèse : risque de surdosage lié à une diminution du volume de distribution.

Sujet âgé : à considérer comme un insuffisant rénal.

Grands brûlés, opérés, malades de réanimation, mucoviscidose impliquent d'augmenter les doses.

Surveillance par audiométrie en cas de traitement prolongé.

Il est recommandé de surveiller les dosages sériques pour obtenir un pic sérique élevé (efficacité thérapeutique) et une résiduelle basse (toxicité par accumulation).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Toxicité rénale (5 à 25 %) : en moyenne 7 à 10 j après le début du traitement, favorisée

par : insuffisance rénale préexistante, acidose, déshydratation, hyponatrémie, hypokaliémie, surdosage, traitement prolongé, médicaments néphrotoxiques, diminuée par l'administration x 1/j.

Toxicité cochléo-vestibulaire irréversible (atteinte cochléaire 3 à 14 %, atteinte vestibulaire 1 à 10 %) : vertiges, ataxie, nystagmus, acouphènes, surdité. Risque diminué par l'administration x 1/j et augmenté par des doses quotidiennes élevées, une insuffisance rénale préexistante, une atteinte cochléo-vestibulaire préexistante ou des médicaments ototoxiques. Augmentation du blocage neuromusculaire chez des malades curarisés ou atteints de myasthénie, prévenue par une injection IV > 30 min.

Rash cutané, élévation des transaminases, des phosphatases alcalines (exceptionnelles).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation de la néphro-ototoxicité : **vancomycine**, **amphotéricine B**, **furosémide**, **clindamycine**, **pipéracilline**, **céphalosporines**, **méthoxyflurane**, **foscarnet**, **polymyxines**, **ciclosporine**, **cisplatine**, **AINS**, **produits de contraste iodés**.

Effet curarisant : **curares**, **toxine botulique**.

Synergie avec les bêta-lactamines, les **glycopeptides**, les **fluoroquinolones**.

## AMINOSIDES (4) – PHARMACOLOGIE (3)

### Pics et résiduelles d'aminosides en fonction du nombre d'injections quotidiennes

ANTIBIOTIQUES	1 INJECTION PAR JOUR (mg/L)		2 INJECTIONS PAR JOUR (mg/L)	
	PIC	RÉSIDUELLE	PIC	RÉSIDUELLE
<b>Amikacine</b>	40-60	< 2	20-30	< 2
<b>Gentamicine</b>	15-20	< 0,5	4-6	< 0,5
<b>Tobramycine</b>	15-35	< 0,5	4-6	< 0,5

Attendre 24 à 48 h de traitement avant d'effectuer un dosage de la résiduelle (sauf insuffisance rénale). Les pics ne sont dosés que dans des cas particuliers (problème de volume, surdosage inexpliqué, échec thérapeutique, etc.).

Contrôle tous les 2 à 3 j pendant la durée du traitement.

Attendre le résultat de la résiduelle avant de réinjecter.

Pas d'administration en 1 dose par jour en cas d'infections à cocci gram-positifs.

### Posologie des aminosides chez l'insuffisant rénal

AMINOSIDES	DOSE PAR INJECTION (mg/kg)	INTERVALLE ENTRE CHAQUE INJECTION EN FONCTION DE LA CLAIRANCE DE LA CRÉATINE (mL/min)					SUPPLÉ- MENT HÉMO- DIALYSE (mg/kg)	APRÈS DIALYSE PÉRITO- NÉALE (mg/L)
		> 90	80-90	50-80	10-50	< 10		
<b>Amikacine</b>	7,5	12 h	12 h	12-24 h	24-48 h	48-72 h	5-7	60
<b>Nétilmicine</b>	2	8 h	12 h	12-24 h	24-48 h	48-72 h	2	20
<b>Gentamicine</b>	1,5	8 h	12 h	12-24 h	24-48 h	48-72 h	1-2	20
<b>Tobramycine</b>	1	8 h	12 h	12-24 h	24-48 h	48-72 h	1-2	20

MACROLIDES DE 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION (1)

## ■ Dihydrate d'érythromycine

ÉGÉRY					
En 2 prises <i>per os</i>	20 gél. 250 mg	5,89	I	65 %	0,29
A. : 500 mg x 2/j	40 gél. 250 mg	10,11	I	65 %	0,25
E. > 5 ans : 30 à 50 mg/kg/j					

## ■ Éthylsuccinate d'érythromycine

ABBOTICINE					
E. : 1/2 à 1 dose x 4/j	12 doses 200 mg	2,33	I	65 %	0,19
N. : 1 dose/5 kg/j en 3 à 4 prises					
ÉRY NOURRISSON					
N. : 1 sach. x 2/j	24 sach. 125 mg	3,49	I	65 %	0,15
ÉRYTHROCINE					
En 2 ou 3 prises	20 cp. 500 mg	7,41	I	65 %	0,37
A. : 1 g x 2 ou 3/j	12 sach. 500 mg	3,89	I	65 %	0,32
E. et N. : 30 à 50 mg/kg/j	10 sach. 1 g	7,71	I	65 %	0,77
ÉRY ENFANT					
Prises avant les repas	24 sach. 250 mg	3,05	I	65 %	0,13
10 à 15 kg : 1 sach. x 2/j					
15 à 25 kg : 1 sach. x 3/j					

## ■ Éthylsuccinate d'érythromycine + sulfafurazole

PÉDIAZOLE					
Sirop reconstitué à 200 mg d'érythromycine et 600 mg de sulfafurazole/5 mL	240 mL	8,05	I	65 %	0,03
Otite moyenne aiguë de l'enfant : 50 mg/kg/j d'érythromycine et 150 mg/kg/j de sulfafurazole	480 mL	14,84	I	65 %	0,03

## ■ Propionate d'érythromycine

ÉRY					
A. : 1 à 1,5 g en 2 à 3 prises 45 min avant les repas	20 cp. séc. 500 mg	4,08	I	65 %	0,20

MACROLIDES DE 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION (2)

## ■ Lactobionate d'érythromycine

<b>ÉRYTHROCINE</b>					
En 4 perfusions IV <sup>3</sup> 1 h	1 fl. 500 mg	HOP	I		
A. : 2 à 4 g/j	1 fl. 1 g	HOP	I		
E. et N. : 30 à 40 mg/kg/j					

## ■ Spiramycine

<b>ROVAMYCINE</b>					
En 2 à 3 prises/j	16 cp. séc. 1,5 MUI	10,00	I	65 %	0,62
A. : 6 à 9 M UI/j	10 cp. séc. 3 MUI	9,43	I	65 %	0,94
E. : 150 000 à 300 000 UI/kg/j	16 cp. séc. 3 MUI	14,78	I	65 %	0,92
	100 cp. séc. 3 MUI	HOP	I		
<b>ROVAMYCINE</b> injectable IV	1 fl. 1,5 MUI	HOP	I		
En 3 perfusions IV de 1 h					
A. : 1,5 M UI x 3/j					

## ■ Josamycine

<b>JOSACINE</b>					
En 2 prises/j 1 h avant les repas	20 cp. 500 mg	13,27	I	65 %	0,66
A. : 1 à 2 g/j	10 cp. 1 g	13,27	I	65 %	1,33
E. : 500 mg/10 kg/j	60 doses gran. pour sol.	4,35	I	65 %	0,07
N. : 250 mg/5 kg/j	buv. 125 mg/5 mL				
(soit 30 à 50 mg/kg/j)	120 doses gran. pour sol.	6,45	I	65 %	0,05
	buv. 250 mg/5 mL				
	240 doses susp. buv.	9,85	I	65 %	0,04
	500 mg/5 mL				

## ■ Midécamycine

<b>MOSIL</b>					
En 2 prises pendant les repas	20 cp. 400 mg	7,69	I	65 %	0,38
A. : 1 600 mg/j	20 sach. 800 mg	14,10	I	65 %	0,71

MACROLIDES DE 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION (3)

## ■ Roxithromycine

<b>RULID</b>					
A. : 1 cp. x 2/j 15 min avant les repas E. et N. : 5 à 8 mg/kg/j en 2 prises	10 cp. susp. buv. 50 mg	5,87	I	65 %	0,59
	16 cp. susp. buv. 50 mg	9,01	I	65 %	0,56
	10 cp. 150 mg	10,41	I	65 %	1,04
	16 cp. 150 mg	16,31	I	65 %	1,02

**MACROLIDES DE 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION (4) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antibiotiques bactériostatiques, qui inhibent la synthèse protéique en se fixant sur la sous-unité 50 S du ribosome.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os* ou IV, biodisponibilité variant pour les différentes formes d'**érythromycine** de 40-50 % (stéarate) à 60-80 % (éthylsuccinate, propionate), absorption dépendante de la prise d'aliments pour certaines molécules, large distribution tissulaire (œil, bile, ascite, oreille moyenne, sinus maxillaire, amygdale, sauf LCR) et intracellulaire (macrophages, polynucléaires), métabolisation hépatique, forte élimination biliaire et fécale, très faible élimination rénale (1-5 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoques méti-S (50 %), streptocoques du groupe A, C, F, G et non groupables, pneumocoques, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix*, *Listeria monocytogenes*, *Lactobacillus*, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter jejuni*, *Moraxella catarrhalis*, *Peptococcus*, *Propionibacterium*, *Clostridium perfringens*, *Treponema pallidum*, *Mycoplasma*, *Ureaplasma urealyticum*, *Chlamydia trachomatis*, *Rickettsia*, *Legionella*, *Actinomyces israelii*, *Nocardia asteroides*.

Résistance naturelle : bacilles gram-négatifs, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*.

Résistance acquise : staphylocoques méti-S (10-40 %) et méti-R, streptocoques groupables (1-18 %), streptocoques non groupables (8-30 %), pneumocoques (> 30 %), *Neisseria gonorrhoeae* (> 50 %), *Haemophilus influenzae*.

**INDICATIONS****En 1<sup>re</sup> intention**

- Pneumopathies à *Mycoplasma* et *Legionella*.
- Diphthérie, coqueluche.
- Angiomatose bacillaire au cours du sida.

**En 2<sup>e</sup> intention ou en cas d'allergie à la pénicilline**

- Infections à streptocoques, pneumocoques et prévention du rhumatisme articulaire aigu.
- Infections à *Chlamydia trachomatis*, lymphogranulomatose vénérienne, syphilis.
- Acné (traitement local).
- Gastro-entérite à *Campylobacter jejuni*.
- Antibioprophylaxie de l'endocardite bactérienne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **macrolides**.

Association aux **dérivés de l'ergot de seigle**, à la **terféndine**, à l'**astémizole**.

Insuffisance hépatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Allaitement** : en cas d'utilisation de la **spiramycine**.

Insuffisance rénale : risque de surdité.

Risque d'allongement de l'espace QT.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (puissant stimulateur de la motricité digestive) : nausées, gastralgies, vomissements, diarrhées, augmentation des ASAT, hépatite cholestatique.

Troubles neurologiques : vertiges, surdité.

Cardiotoxicité : allongement de l'espace QT, extrasystoles ventriculaires, torsades de pointes, bloc auriculo-ventriculaire.

Allergies : urticaires, œdème de Quincke, réactions anaphylactoïdes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation du risque d'effets secondaires : **triazolam** (troubles du comportement), **lovastatine** (rhabdomyolyse), **terféndine** et **astémizole** (cardiotoxicité), **dérivés de l'ergot de seigle** (ischémie périphérique).

Augmentation des concentrations plasmatiques de **carbamazépine**, **ciclosporine**, **digoxine**, **théophylline** (sauf josamycine), **antivitaminés K**, **acide valproïque**.

Diminution des concentrations de **zidovudine**. Aucune interaction rapportée avec la **spiramycine**.



MACROLIDES DE 2<sup>E</sup> GÉNÉRATION (1)

## ■ Clarithromycine

<b>ZECLAR</b>					
En 2 prises/j	10 cp. 250 mg	8,00	I	65 %	0,80
A. : 500 mg/j (infections bronchiques angines)	10 cp. 500 mg	14,91	I	65 %	1,49
A. : 1 g/j (sinusites, pneumopathies, infec- tions à <i>H. pylori</i> )	14 cp. 500 mg	20,65	I	65 %	1,48
A. : 1 g/j (infections à <i>Mycobacterium</i> <i>avium-intracellulare</i> )	30 cp. 500 mg	40,37	I	65 %	1,35
	1 fl. 60 mL (50 mg/mL)	7,31	I	65 %	7,31
	1 fl. 100 mL (25 mg/mL)	6,51	I	65 %	6,51
	1 fl. 500 mg IV	HOP	I		
<b>MONOZECLAR</b>					
Idem <b>ZECLAR</b>	5 cp. 500 mg	8,00	I	65 %	1,60
	10 cp. 500 mg	14,91	I	65 %	1,49

## ■ Azithromycine

<b>ZITHROMAX</b>					
En 1 prise/j	6 cp. 250 mg	14,10	I	65 %	2,35
A. : 500 mg à J0 puis 250 mg/j pendant 4 j (angines, bronchites aiguës, surinfection de bronchites chroniques)	1 fl. 29,3 g + pip (Enf.)	13,62	I	65 %	13,62
	1 fl. 35,6 g + pip (Enf.)	16,89	I	65 %	16,89
<b>ZITHROMAX MONODOSE</b>					
En 1 prise unique	4 cp. 250 mg	8,42	I	65 %	2,11
A. : 1 g soit 4 cp. Traitement minute des infections à <i>Chlamydia trachomatis</i> non compliquées					
<b>AZADOSE</b>					
En 1 prise/j	8 cp. 600 mg	58,12	I	65 %	7,26
A. : 1 200 mg x 1/sem. Prophylaxie des infections à <i>Mycobacterium avium</i> chez les patients infectés par le VIH et avec CD4 < 100/mm <sup>3</sup>					
<b>ORDIPHA</b>					
Idem <b>ZITHROMAX</b>	3 cp. 500 mg	9,99	I	65 %	3,33

MACROLIDES DE 2<sup>E</sup> GÉNÉRATION (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

L'**azithromycine** et la **clarithromycine** se caractérisent par une meilleure activité que l'**érythromycine** sur : les bactéries à développement intracellulaire, *Mycobacterium avium-intracellulare*, *Borrelia burgdorferi* et *Haemophilus influenzae*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, biodisponibilité de 37 % (**azithromycine**) et 50 % (**clarithromycine**), absorption de l'**azithromycine** diminuée de 50 % en présence d'aliments, large distribution tissulaire (sauf LCR) et intracellulaire (macrophages, polynucléaires), métabolisation hépatique de la **clarithromycine**, forte élimination biliaire et fécale, élimination rénale de la **clarithromycine**.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles (spectre de l'**érythromycine** étendu à) : *Haemophilus influenzae*, *Mycobacterium avium-intracellulare*, *Mycobacterium marinum*, *Toxoplasma gondii* ; *Helicobacter pylori* (**clarithromycine** seulement).

Résistance naturelle : bacilles gram-négatifs, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*.

Résistance acquise : staphylocoques méti-S (10-40 %) et méti-R, streptocoques groupables (1-18 %), streptocoques non groupables (8-30 %), pneumocoques (> 30 %), *Neisseria gonorrhoeae* (> 50 %), syphilis (échec thérapeutique avec l'**azithromycine**).

## INDICATIONS

En 1<sup>re</sup> intention

- Pneumopathies à *Mycoplasma*, *Chlamydia* et *Legionella*.
- Traitement minute des infections non compliquées à *Chlamydia trachomatis* (**ZITHROMAX MONODOSE**).

- Infections à *Mycobacterium marinum* (**clarithromycine**).
- Angiomatose bacillaire, infection à *Mycobacterium avium-intracellulare* au cours du sida.
- Infection à *Helicobacter pylori* (**clarithromycine**), en association.
- Proposé dans les formes ganglionnaires de la maladie des griffes du chat.
- Diarrhée du voyageur et choléra, en particulier chez l'enfant (**azithromycine**).

En 2<sup>e</sup> intention ou en cas d'allergie à la pénicilline

- Infections à streptocoques, pneumocoques et prévention du rhumatisme articulaire aigu.
- Lymphogranulomatose vénérienne, chancre mou, uréthrite non gonococcique, syphilis (échecs thérapeutiques décrits avec l'**azithromycine**).
- Gastro-entérite à *Campylobacter jejuni*.
- Antibiotrophylaxie de l'endocardite bactérienne.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Allergie aux **macrolides**.

Association aux **dérivés de l'ergot de seigle**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance hépatique.

Insuffisance rénale : **clarithromycine** en 1 prise par jour.

## EFFETS INDÉSIRABLES

*Cf.* **Érythromycine**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

*Cf.* **Érythromycine**.

**Clarithromycine** : fluconazole (augmentation de la **clarithromycine**), rifabutine (risque d'uvéite), inducteur enzymatique.

**Azithromycine** : pas d'interaction avec **terféridine**, théophylline, antivitamines K.

## LINCOSAMIDES

## ■ Clindamycine

<b>DALACINE</b>					
En 3 à 4 prises	12 gél. 75 mg	3,81	I	65 %	0,32
A. : 0,6 à 2,4 g/j	12 gél. 150 mg	3,81	I	65 %	0,32
E. > 1 mois : 15 mg/kg/j	16 gél. 300 mg	8,42	I	65 %	0,53
<b>DALACINE injectable</b>	1 amp. 600 mg	HOP	I		
En 3 à 4 perf. IV ou inj. IM	10 amp. 900 mg	HOP	I		
Idem <b>DALACINE</b>					

## ■ Lincomycine

<b>LINCOCINE</b>					
En 3 à 4 prises, 1 à 2 h avant les repas	12 gél. 500 mg	5,89	I	65 %	0,49
A. : 1,5 à 2 g/j					
E. > 1 mois : 30 à 60 mg/kg/j					
<b>LINCOCINE injectable</b>	1 amp. 600 mg	HOP	I		
En 2 à 3 perf. IV ou inj. IM					
A. : 0,6 à 1,8 g/j					
E > 1 mois : 10 à 20 mg/kg/j					

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques apparentés aux **macrolides** caractérisés par leur risque de survenue de colite pseudo-membraneuse.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Proche des **macrolides**, meilleure absorption digestive pour la **clindamycine** que pour la **lincomycine**, faible pénétration méningée.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques y compris producteurs de pénicillinase, streptocoques, *Bacillus*, *Corynebacterium*, anaérobies sauf clostridies et *Bacteroides*, *Mycoplasma hominis*, *Toxoplasma gondii*, *Pneumocystis carinii*, *Plasmodium*.

Résistance naturelle : entérocoques, *Neisseria*, *Haemophilus*, *Listeria*, *Erysipelothrix*, entérobactéries, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Clostridium difficile*, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*.

Résistance acquise : staphylocoques méti-R, clostridies, *Bacteroides*.

## INDICATIONS

- Infections peu sévères à staphylocoques ou à anaérobies (sauf *C. difficile*).
- Infections à streptocoques sur documentation bactériologique (30 % de souches résistantes).
- Toxoplasmose, paludisme.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **lincosamides**, nourrisson < 1 mois.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement.**

Insuffisance rénale et hépatique : diminuer les doses.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Colite pseudo-membraneuse, réactions allergiques, diarrhées, ictère, élévation des transaminases, pancytopénie, effet curarisant, bradyarythmie (en perfusion trop rapide).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Macrolides** et **synergistines** déconseillés, **curares**, **antiacides**, **colestyramine**.

## SYNERGISTINE

## ■ Pristinamycine

PYOSTACINE					
En 2 à 3 prises aux repas	16 cp. 250 mg	12,44	I	65 %	0,78
A. : 2 à 3 g/j	16 cp. 500 mg	24,32	I	65 %	1,52
E. : 50 mg/kg/j	100 cp. 500 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Association de 2 composés bactéricides inhibiteurs de la synthèse protéique ribosomale.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Peu de données chez l'homme, bonne diffusion tissulaire chez l'animal, pas de passage méningé, métabolisme hépatique, élimination principalement biliaire.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoques y compris producteurs de pénicillinase, streptocoques, pneumocoques, *Bacillus*, *Corynebacterium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Listeria*, *Haemophilus*, anaérobies dont les clostridies et les *Bacteroides*, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*.

Résistance naturelle : entérocoques, entérobactéries, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*.

Résistance acquise : staphylocoques méti-R, *Clostridium*, *Bacteroides*.

**INDICATIONS**

– Infections à staphylocoques, à streptocoques, à *Haemophilus influenzae* et à anaérobies.

– Infections cutanées, bronchites aiguës, surinfection de bronchite chronique, sinusites.

– Prophylaxie de l'endocardite bactérienne.

Le peu de données sur les concentrations plasmatiques à doses usuelles ne permet pas de garantir une efficacité dans les infections graves ou avec un risque de septicémie. Dans ces cas, préférer un antibiotique bactéricide ayant une bonne diffusion sanguine.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **synergistines**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : utilisation possible.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements, épigastralgies, réactions cutanées très rares.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Ciclosporine** (risque de surdosage).

## KÉTOLIDE (1)

## ■ Télithromycine

KETEK					
A. et E. $\geq 12$ ans : 2 cp. en une seule prise au coucher	10 cp. 400 mg	32,6	I	65 %	3,26

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique bactériostatique, de la famille des kétolides proche des **macrolides**, inhibiteur de la synthèse protéique dont la structure originale lui confère une activité *in vitro* sur les souches de pneumocoques résistants aux **macrolides** (pas de résistance croisée identifiée) ou de sensibilité diminuée à la **pénicilline**.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, absorption assez rapide indépendante de la prise d'aliments, biodisponibilité de 57 %, large distribution tissulaire, métabolisation hépatique (principalement par CYP3A4), élimination majoritairement fécale (76 %) et faiblement rénale (17 %).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques méti-S, streptocoques des groupes A, C, G pneumocoques, *Haemophilus influenzae* (activité comparable à l'azithromycine), *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma*, *Chlamydia psittaci*, *C. pneumoniae*, *Legionella*.

Résistance naturelle : bacilles gram-négatifs, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*.

Résistance acquise : staphylocoques méti-S et méti-R, pneumocoques, *Neisseria gonorrhoeae* ( $> 50$  %), *Haemophilus influenzae*.

## INDICATIONS

En raison du risque de survenue d'hépatites graves, de troubles visuels ou de perte de connaissance, **KETEK** doit être prescrit en 2<sup>e</sup> intention dans les indications ci-dessous. Les cliniciens doivent mettre en balance le rapport bénéfice/risque à chaque prescription. Le traitement doit être administré le soir au coucher.

Sujets âgés de plus de 18 ans, en alternative au traitement de 1<sup>re</sup> intention ou en cas d'allergie aux bêta-lactamines :

- Pneumonies communautaires de gravité minime à modérée (durée : 7 à 10 j).
- Exacerbations de bronchites chroniques, sinusites aiguës, angines et pharyngites lorsque les souches en cause sont connues ou suspectées résistantes aux bêta-lactamines et/ou aux **macrolides**.

Sujets âgés de plus de 12 ans : angines/pharyngites dues à *Streptococcus pyogenes* en alternative au traitement par une **bêta-lactamine** ou un **macrolide** (30 % des souches de streptocoque sont résistantes aux **macrolides** en France).

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Enfant de moins de 12 ans.

Allergie à la **télithromycine** ou aux **macrolides**. Myasthénie.

Association à : **dérivés de l'ergot de seigle** (ergotisme), **terfénadine**, **astémizole**, **pimozide**, **cisapride**, **statines** (simvastatine, atorvastatine).

Syndrome du QT long, allongement du QT ou antécédents familiaux.

**KÉTOLIDE (2)****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de troubles visuels, de perte de connaissance transitoire parfois associée à un syndrome vagal : interdiction de conduire un véhicule, d'utiliser une machine ou d'exercer une activité dangereuse.

Inhibiteur du CYP3A4 et *in vitro* du CYP2D6 : ne pas utiliser avec les substrats de ces cytochromes (cf. Interactions médicamenteuses et Contre-indications). Insuffisance rénale (cl < 30 mL/min) : diminuer la dose de moitié.

Risque d'allongement de l'espace QT.

Contient du lactose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque d'hépatite grave voire fulminante.

Risque de troubles visuels, notamment vision floue, troubles d'accommodation ou diplopie.

Des épisodes de perte de connaissance transitoire ont été rapportés dont certains associés à un syndrome vagal.

Aggravation d'une myasthénie (contre-indication).

Très fréquents (≥ 10 %) : diarrhée.

Fréquents (1-10 %) : nausées, vomissements, douleurs gastro-intestinales, flatulence, éléva-

tion des enzymes hépatiques, vertiges, céphalées, étourdissements, dysgueusie, candidose vaginale.

Peu fréquents (0,1-1 %) : constipation, anorexie, candidose buccale, stomatite, somnolence, insomnie, nervosité, vision trouble, éruptions cutanées, urticaire, prurit, flush, palpitations, éosinophilie.

Rares (< 0,1 %) : ictère cholestatique, eczéma, paresthésies, perte de connaissance transitoire, arythmie atriale, hypotension, bradycardie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Autres inhibiteurs du CYP3A4 : **inhibiteurs de protéases** du VIH.

Inducteurs du CYP3A4 (diminue les concentrations de **télithromycine**) : **rifampicine, phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital**, millepertuis.

Augmentation des concentrations plasmatiques des substrats du CYP3A4 : **benzodiazépines** (midazolam, triazolam, alprazolam) **carbamazépine, ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, digoxine**.

Interactions inconnues : **antivitamines K, ritonavir**.

## TÉTRACYCLINES (1)

## ■ Doxycycline

<b>VIBRAMYCINE N</b>					
En 1 prise <i>per os</i>	5 cp. séc. 100 mg	2,92	I	65 %	0,58
A. : 200 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	9,01	I	65 %	0,30
E. > 8 ans : 4 mg/kg/j					
<b>TOLEXINE</b>					
Idem <b>VIBRAMYCINE N</b>	14 cp. 50 mg	2,45	I	65 %	0,18
	28 cp. 50 mg	4,11	I	65 %	0,15
	15 cp. 100 mg	4,27	I	65 %	0,28
	28 cp. 100 mg	7,38	I	65 %	0,26
<b>DOXYPALU</b>					
Prophylaxie du paludisme du voyageur en zone d'endémie 100 mg/j la veille du départ, la durée du séjour et 4 sem. suivant le retour	28 cp. 50 mg	7,32	I	65 %	0,26
	28 cp. 100 mg	11,39	I	65 %	0,41

## ■ Minocycline

<b>MYNOCINE</b>					
En 1 prise <i>per os</i>	15 gél. 100 mg	8,99	I	65 %	0,60
A. : 200 mg/j					
E. > 8 ans : 4 mg/kg/j					

## ■ Métacycline

<b>PHYSIOMYCINE</b>					
En 2 prises <i>per os</i>	16 gél. 300 mg	7,44	I	65 %	0,47
A. : 600 mg/j					
E. > 8 ans : 75 à 150 mg/10 kg/j					
<b>LYSOCLINE</b>					
Idem <b>PHYSIOMYCINE</b>	12 gél. 300 mg	5,24	I	65 %	0,44

## ■ Lymécycline

<b>TÉTRALYSAL</b>					
En 2 prises <i>per os</i>	56 gél. 150 mg	10,83	I	65 %	0,19
A. : 600 mg/j	28 gél. 300 mg	10,83	I	65 %	0,39

## TÉTRACYCLINES (2)

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactériostatiques à large spectre, actifs sur les bactéries à développement intracellulaire.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, IV, IM, ou en topiques, biodisponibilité entre 58 % (**métacycline**) et 95 % (**minocycline**, **doxycycline**), bonne distribution tissulaire (faible dans le LCR, inactives dans l'os), métabolisation hépatique (sauf **chlortétracycline**), élimination rénale prépondérante (sauf **minocycline**), passage transplacentaire et dans le lait maternel.

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques méti-S, streptocoques, pneumocoques, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Corynebacterium*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia*, *Vibrio*, *Pasteurella*, *Brucella*, *Francisella*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas pseudomallei*, *Treponema pallidum*, *Leptospira*, *Borrelia*, *Mycoplasma*, *Chlamydia trachomatis*, *Ehrlichia*, *Rickettsia*, *Coxiella*, *Nocardia asteroides*, *Mycobacterium marinum*, *Actinomyces*, *Balantidium coli*, *Plasmodium*.

Résistance naturelle : *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus mirabilis*, *Providencia*, *Serratia*, *Pseudomonas*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : staphylocoques (70 %), streptocoques (50 %), pneumocoques (> 30 %), entérocoques (> 75 %), *N. gonorrhoeae* (> 50 %), *H. influenzae* (10-30 %), *M. catarrhalis* (60-80 %), entérobactéries (25-50 %), *Bacteroides fragilis* (60 %).

### INDICATIONS

#### En 1<sup>re</sup> intention

- Brucellose.
- Pneumopathies à *Chlamydia* et à *Mycoplasma*.
- Fièvre Q, rickettsiose, ehrlichiose, bartonellose.
- Pasteurellose.
- Maladie de Lyme, autres borrélioses.
- Urétrites non gonococciques, infections génitales à *Chlamydia* ou *Mycoplasma*.

– Prévention du paludisme multirésistant, en particulier dans les zones de méfloquino-résistance.

#### En 2<sup>e</sup> intention ou en cas d'allergie

- Acné sévère, rosacée ou juvénile.
- Tularémie, mélioirose, tréponématose.
- Infections après morsure de rat (*Spirillum minus*, *Streptobacillus moniliformis*), peste, leptospirose.
- Actinomycose, nocardiose, infections à *Mycobacterium marinum*.
- Balantidiose.

### CONTRE-INDICATIONS

**Allaitement, grossesse** (2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres).

Enfant d'âge < 8 ans.

Allergie aux **tétracyclines**.

**Rétinoïdes** et **psoralènes**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Photosensibilisation aux UV et au soleil.

### EFFETS INDÉSIRABLES

**Troubles digestifs** (diminués par les repas) : nausées (50 %), vomissements (3 %), épigastralgies, diarrhées, stomatites, ulcérations œsophagiennes, entérococolites à staphylocoques, colite pseudo-membraneuse, candidoses, stéatose aiguë, pancréatite.

**Fœtus** : hypoplasies et dyschromies dentaires.

**Troubles cutanés** : photosensibilisation cutanée, photo-onychose, rashes, œdèmes de Quincke, pigmentations bleutées des cicatrices et coloration diffuse du visage (minocycline).

**Troubles neurologiques** (**minocycline**) : femmes (70 %), hommes (30 %), troubles vestibulaires réversibles, syndrome myasthénique.

**Rares** : neutropénie, thrombopénie, aplasie médullaire, effet anti-ADH.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Absorption diminuée par les pansements gas-triques et le tampon contenu dans les comprimés de **didanosine**.

**Inducteurs enzymatiques** : augmenter la dose ou la répartir en 2 prises.

Potentialisation des **antivitamines K**.

Néphrotoxicité avec le **méthoxyflurane**.

Élévation de l'urée plasmatique avec les **diurétiques**.



## TÉTRACYCLINES (3)

## ■ Tigécycline

TYGACIL					
A. : dose initiale 100 mg puis 50 mg/12 h en perf. de 30 min	10 fl. 50 mg/5 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique bactériostatique du groupe des glycyclines.

Inhibe la synthèse protéique des bactéries en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S et en bloquant l'entrée de l'ARNt dans le site A du ribosome.

Échappe aux principaux mécanismes de résistance aux **tétracyclines**.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage IV, biodisponibilité 100 %, faiblement métabolisée, élimination biliaire et fécale (59 %) et rénale (33 %).

## MICROBIOLOGIE

Espèces habituellement sensibles : *Enterococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, staphylocoques blancs, *Streptococcus agalactiae* et des groupes *anginosus* et *viridans*, pneumocoque *Citrobacter freundii* et *koseri*, *Enterobacter*, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Serratia marcescens*, *oxytoca* et *pneumoniae*, *Bacteroides fragilis*, *Clostridium perfringens*, *Prevotella* sp, *Peptostreptococcus*.

Espèces incostamment sensibles : *Acinetobacter baumannii*, *Burkholderia cepacia*, *Morganella morganii*, *Providencia* sp., *Proteus* sp., *Stenotrophomonas maltophilia*.

Résistance naturelle : *Pseudomonas aeruginosa*.

## INDICATIONS

Infections compliquées de la peau et des tissus mous. Attention, des malades ayant une comorbidité grave n'ont pas été inclus dans les études (immunodéprimés, ulcère de décubitus infecté, infection nécessitant plus de 14 j de traitement comme par ex. une fasciite nécrosante). Peu d'expérience avec des patients diabétiques ayant une infection du pied, ou ayant une comorbidité (diabète, maladie vasculaire périphérique, toxicomanie intraveineuse, infection par le VIH) ou une bactériémie concomitante. Par conséquent, ces patients doivent être traités avec précaution par la **tigécycline** (RCP). Infections intra-abdominales compliquées.

## CONTRE-INDICATIONS

**Allaitement, grossesse** (2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trim.). Enfant d'âge < 8 ans. Allergie aux **tétracyclines** et intolérance à la **tigécycline**. Rétinoïdes et psoralènes.

Déconseillé au 1<sup>er</sup> trim. de la grossesse et chez l'adolescent de moins de 18 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Photosensibilisation aux UV et au soleil.

Pas d'adaptation en cas d'insuffisance rénale, hémodialyse et hépatique Child A et B.

Surveillance étroite des malades ayant une cholestase. Diminution précautionneuse de la dose d'entretien à 25 mg/12 h en cas de Child C. Pas d'adaptation chez les sujets âgés.

Les substances actives suivantes ne doivent pas être administrées en même temps que **TYGACIL** via un dispositif en Y sur la tubulure de perfusion : **amphotéricine B**, **chlorpromazine**, **méthylprednisolone** et **voriconazole**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Similaires à ceux induits par les **tétracyclines** : photosensibilité, syndrome d'hypertension intracrânienne, pancréatite, effet anti-anabolique (augmentation de l'urée, azotémie, acidose et hypophosphatémie), colite pseudomembraneuse.

Très fréquents : nausées, vomissements, diarrhées.

Fréquents : abcès, infections, vertiges, allongement du TCA et du TP, phlébite, douleurs abdominales, dyspepsie, anorexie, augmentation des transaminases, de la bilirubine, de l'urée et de l'amylase, prurit, rash, céphalées.

Peu fréquents : choc septique/sepsis, augmentation de l'INR, hypoprotidémie, thrombophlébite, pancréatite aiguë, réaction, inflammation, douleur, œdème et phlébite au site d'injection.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K** (allongement du TP et du TCA nécessitant un contrôle fréquent).

Diminution de l'efficacité des contraceptifs oraux.

## QUINOLONES CLASSIQUES

### ■ Fluméquine

APURONE					
A. : 1 cp. x 3/j	30 cp. 400 mg	11,29	I	65 %	0,38

### ■ Acide pipémidique

PIPRAM FORT					
A. : 1 cp. x 2/j	10 cp. 400 mg 50 cp. 400 mg	8,96 HOP	I I	65 %	0,90

#### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactéricides, inhibiteurs de l'ADN gyrase, utilisés dans les infections urinaires basses non compliquées et la gonococcie.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

Résorption digestive rapide, métabolisation hépatique forte, mauvaise diffusion tissulaire en dehors de l'appareil urinaire, élimination rénale sous forme active.

#### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : *Neisseria*, *Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Morganella*, *Yersinia*.

Résistance naturelle : bactéries gram-positives, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, bactéries anaérobies strictes, bactéries intracellulaires, spirochètes, mycobactéries.

Résistance acquise : (sensibilité inconstante) *Klebsiella*, *Serratia* et *Providencia*.

#### INDICATIONS

En 2<sup>e</sup> intention : infections urinaires basses non compliquées de la femme.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **quinolones**.

**Grossesse** et **allaitement**.

Enfant.

Déficit en G6PD.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réduire les doses en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Risque de photosensibilisation.

Antécédents d'épilepsie ou convulsions.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

*Troubles digestifs* : nausées, gastralgies, vomissements, diarrhées.

*Troubles cutanés* : photosensibilisation, réactions cutanées allergiques, œdème de Quincke.

*Troubles neurologiques* : céphalées, vertiges, somnolence, sensation de vision colorées, insomnie, hallucinations, convulsions.

*Troubles hématologiques* : leucopénie, thrombopénie, anémie hémolytique en cas de déficit en G6PD.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Nitrofuranes** : antagonisme.

**Psoralènes** : potentialisation du risque de photosensibilisation.

**Antivitamines K** : potentialisation de l'effet anticoagulant.

## FLUOROQUINOLONES (1)

### ■ Péfloxacin

<b>PÉFLACINE</b>					
En 2 prises/j au cours des repas A. : 800 mg/j (prescription initiale hospitalière) <b>PÉFLACINE injectable</b> En 2 perfusion IV de 1 h A. : 800 mg en 2 perfusions	28 cp. 400 mg	86,39	I	65 %	3,09
	50 cp. 400 mg	HOP	I		
	5 amp. 400 mg	HOP	I		
<b>PÉFLACINE MONODOSE</b>					
2 cp. en une prise à l'un des repas A. : 800 mg	2 cp. 400 mg		I	NR	

### ■ Ciprofloxacine

<b>CIFLOX</b>					
En 2 prises/j au cours des repas A. : 1 000 à 1 500 mg/j  <b>CIFLOX injectable</b> En 2 perfusions IV lente A. : 400 mg/j (max. : 600 mg/j)	12 cp. séc. 250 mg	8,12	I	65 %	0,68
	12 cp. séc. 500 mg	21,09	I	65 %	1,76
	100 cp. 750 mg	HOP	I		
	20 càc 500 mg (fl.)	41,66	I	65 %	2,08
	1 poche 200 mg	HOP	I		
	1 poche 400 mg	HOP	I		
<b>UNIFLOX</b>					
Cystite non compliquée : 1 cp. en monodose Urétrite et cervicite gonococcique (infection génitale) : 1/2 à 1 cp. en monodose	1 cp. 500 mg	13,64	I	65 %	13,64

## FLUOROQUINOLONES (2)

### ■ Ofloxacin

<b>OFLOXET</b>					
En 2 prises/j A. : 400 mg/j (max. : 800 mg/j)	10 cp. séc. 200 mg 50 cp. séc. 200 mg	11,50 HOP	I I	65 %	1,15
<b>MONOFLOXET</b>					
Traitement minute de la cystite 2 cp. en 1 prise	2 cp. 200 mg	9,95	I	65 %	4,97

### ■ Loméfloxacine

<b>DÉCALOGIFLOX</b>					
En 1 prise quotidienne A. : 400 mg/j pendant 3 j	10 cp. séc. 400 mg	27,46	I	65 %	2,75
<b>LOGIFLOX</b>					
Idem <b>DÉCALOGIFLOX</b>	3 cp. séc. 400 mg	13,56	I	65 %	4,52

Infections urinaires basses non compliquées de la femme en traitement de 3 j et prévention secondaire de l'infection du liquide amniotique.

### ■ Norfloxacine

<b>NORFLOXACINE ARROW</b>					
En 2 prises/j A. : 800 mg/j Prévention secondaire de l'infection du liquide d'ascite : 400 mg/j en 1 prise	10 cp. 400 mg 50 cp. 400 mg	4,68 HOP	I I	65 % 65 %	0,47

### ■ Énoxacin

<b>ENOXOR</b>					
En 2 prises/j A. : 400 à 800 mg/j	10 cp. 200 mg	8,44	I	65 %	0,84

## FLUOROQUINOLONES (3) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactéricides à très large spectre, inhibiteurs de l'ADN gyrase et de la topoisomérase de type IV, caractérisés par leur excellente diffusion tissulaire et par leur activité sur les bactéries intracellulaires et les bacilles gram-négatifs.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Résorption digestive rapide, biodisponibilité > 95 % (**ofloxacin**, **péfloxacin**), > 60 % (**ciprofloxacine**), 35 % (**norfloxacine**), faible liaison protéique, excellente diffusion intracellulaire et tissulaire y compris dans l'os, l'œil, la prostate et le LCR (sauf la **norfloxacine** qui diffuse essentiellement dans les urines), métabolisation hépatique variable < 5 % (**ofloxacin**), 20-25 % (**norfloxacine**, **ciprofloxacine**), > 80 % (**péfloxacin**), élimination rénale variable sous forme active > 85 % (**ofloxacin**), 50-60 % (**ciprofloxacine**), 35-40 % (**norfloxacine**), 10 % (**péfloxacin**).

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques méti-S, *Neisseria*, entérobactéries (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Yersinia*, *Campylobacter*), *Moraxella catarrhalis*, *Pasteurella*, *Haemophilus*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydiae pneumoniae*, *Legionella* (**ofloxacin**, **ciprofloxacine**) ; *Acinetobacter* et *Pseudomonas aeruginosa* (**ciprofloxacine**) ; *Chlamydia trachomatis* (**ofloxacin**) ; *Mycobacterium fortuitum* et *kansasii* (**ciprofloxacine**).

Résistance naturelle : streptocoques, entérocoques, staphylocoques méti-R, *Listeria*, *Corynebacterium*, *Pseudomonas cepacia*, *Xanthomonas*, anaérobies (sauf *Propionibacterium acnes*), spirochètes, *Nocardia*, *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium avium-intracellulare*.

Résistance acquise : staphylocoques, gonocoques (> 30 %), entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter*.

### INDICATIONS

Pour **péfloxacin**, **ofloxacin**, **ciprofloxacine**

– Infections urinaires basses non compliquées, prostatites, pyélonéphrites (augmentation de la fréquence des souches de *E. coli* communautaires résistantes aux **fluoroquinolones**).

– Maladies transmises par voie sexuelle : gonocoques non compliquées, chancre mou, urétrites à *Chlamydia* (**ofloxacin**).

– Diarrhées aiguës bactériennes et diarrhées du voyageur, typhoïde (**ciprofloxacine**, **ofloxacin**), salmonelloses mineures, infections intra-abdominales graves en association, infection du liquide d'ascite.

– Infections ostéo-articulaires à germes sensibles.

– Pneumopathies atypiques, communautaires graves en association à une bêta-lactamine, nosocomiale après documentation bactériologique, surinfections à pyocyanique au cours de la mucoviscidose.

– Septicémies à germes sensibles.

– Otites externes à *Pseudomonas aeruginosa* (**ciprofloxacine**), infections de la chambre postérieure de l'œil (**ofloxacin**, **péfloxacin**).

– Infections à *Mycobacterium fortuitum* (**ciprofloxacine**).

– Prévention secondaire de l'infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique (**norfloxacine**).

La **ciprofloxacine** est la seule **quinolone** ayant une activité sur *Pseudomonas aeruginosa* (antibiogramme), les doses unitaires doivent alors être augmentées (par exemple : *per os* 750 mg x 2/j).

La **norfloxacine** est réservée aux infections urinaires basses de la femme, aux infections intestinales et à la prévention de l'infection du liquide d'ascite.

La **loméfloxacin** est indiquée dans les infections urinaires basses de la femme.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allergie connue aux **fluoroquinolones**.

Antécédents de tendinopathie.

Déficit en G6PD.

Insuffisance rénale (**norfloxacine**).

Sujets âgés (**péfloxacin**).

**FLUOROQUINOLONES (4) – PHARMACOLOGIE (2)****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Enfants en période de croissance.

Antécédents d'épilepsie ou convulsions.

Myasthénie.

Sujets âgés : risque de tendinite.

Exposition au soleil et aux UV.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine.

**Ofloxaciné** :

– < 50 mL/min : 200 mg/24 h ;

– ≥ 20 mL/min : 200 mg/48 h ;

**Ciprofloxacine** : < 20 mL/min diminuer les doses de moitié.

Insuffisance hépatique sévère : diminuer la dose de **péfloxaciné** à 8 mg/kg toutes les 48 h en cas d'ascite et d'ictère, toutes les 36 h en cas d'ascite sans ictère, toutes les 24 h en cas d'ictère, toutes les 12 h en l'absence d'ictère et d'ascite ; diminuer la dose de **ciprofloxacine** de moitié en cas d'ascite.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Tendinites avec risque de rupture du tendon d'Achille (en particulier **péfloxaciné**) chez les personnes âgées et au cours d'une corticothérapie, douleurs musculaires et/ou articulaires.

Manifestations cutanées : photosensibilisation, érythème, purpura vasculaire, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, urticaire, œdème de Quincke.

Troubles hématologiques : thrombopénie, neutropénie, éosinophilie.

Troubles neurologiques : céphalées, convulsions, myoclonies, troubles de la vigilance et de la conscience ; troubles visuels et insomnie (**ofloxaciné**, **ciprofloxacine** et **norfloxacine**) ; sensations ébrieuses, paresthésies, étourdissements (**ciprofloxacine** et **norfloxacine**), polyneuropathie dont syndrome de Guillain-Barré (**norfloxacine**), hallucinations (**ofloxaciné**, **norfloxacine**).

Troubles digestifs : gastralgies, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, rares augmentation de la bilirubine, des phosphatases alcalines ou des transaminases ;

brûlures rétrosternales, pancréatite et colite pseudo-membraneuse (**norfloxacine**).

Troubles néphrologiques : augmentation de l'urée et de la créatinine, hématurie microscopique (**ciprofloxacine** et **norfloxacine**), insuffisance rénale (**péfloxaciné**), néphrite interstitielle (**norfloxacine**).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Sels de fer** et **topiques gastro-intestinaux** (sels, oxydes et hydroxydes d'Al, Ca, Fe, Mg et Zn) : diminution de l'absorption, à prendre à 4 h d'intervalle.

**antivitamines K** : augmentation de l'effet anticoagulant.

**Cimétidine** : augmentation des taux d'**ofloxaciné**, de **ciprofloxacine** et de **norfloxacine**.

**Nitrofurantoïne** : antagonisme *in vitro* avec la **norfloxacine**.

**Métronidazole** : augmentation des risques de convulsions avec la **ciprofloxacine**.

Augmentation de la théophyllinémie par la **péfloxaciné**.

Augmentation des taux de **digitaliques** et de **ciclosporine** par l'**ofloxaciné**, la **ciprofloxacine** et la **norfloxacine**.

Diminution des effets des opiacés par la **ciprofloxacine**.

**Ciprofloxacine** et **norfloxacine** déconseillés avec les médicaments augmentant l'espace QT.

Il est déconseillé d'utiliser une **fluoroquinolone** en présence d'une entérobactérie résistante à l'**acide nalidixique** (résistance croisée).

Le risque de sélection de bactéries résistantes aux **fluoroquinolones** justifie une bithérapie dans certaines situations cliniques : *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae*, *E. cloacae*, *S. marcescens*, fort inoculum bactérien, corps étranger, tissu osseux, infections graves, etc.

L'excellente biodisponibilité orale des **fluoroquinolones** permet souvent d'éviter une administration parentérale plus onéreuse.

## NOUVELLES FLUOROQUINOLONES (1)

■ **Lévofloxacin**

TAVANIC					
A. : en 1 ou 2 administrations/j :	5 cp. séc. 500 mg	20,93	I	65 %	4,19
Sinusites aiguës et exacerbation des bronchites chroniques : 500 mg/j	1 fl. 50 mL 5 mg/mL	HOP	I		
Pneumonies communautaires : 500 à 1 000 mg/j	1 fl. 100 mL 5 mg/mL	HOP	I		

■ **Moxifloxacin**

IZILOX					
A. : en 1 prise/j	5 cp. séc. 400 mg	20,88	I	65 %	4,18
Sinusites aiguës : 7 j	7 cp. séc. 400 mg	29,01	I	65 %	4,14
Exacerbation des bronchites chroniques : 5-10 j	50 cp. séc. 400 mg	HOP	I	65 %	
Pneumonies communautaires : 10 j	5 fl. 400 mg/250 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

**Fluoroquinolones** actives sur le pneumocoque, y compris de sensibilité diminuée à la **pénicilline**. La **lévofloxacin** est l'isomère L de l'**ofloxacin**.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption orale rapide, biodisponibilité indépendante de la prise alimentaire > 90 %, faible liaison protéique (40 %), bonne diffusion intracellulaire et tissulaire en particulier bronchique et pulmonaire, faible métabolisation, élimination rénale (> 85 % **lévofloxacin**) ou digestive (**moxifloxacin**).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : spectre de l'**ofloxacin** étendu aux streptocoques dont pneumocoque, *Fusobacterium*, *Propionibacterium*, *Peptostreptococcus*, *Mycobacterium tuberculosis* (**moxifloxacin**).

Résistance naturelle : entérocoques, *Pseudomonas*, anaérobies.

Résistance acquise : staphylocoques méti-R, streptocoques dont pneumocoques, entérobactéries, *Mycobacterium tuberculosis*.

## INDICATIONS

En 2<sup>e</sup> intention ou allergie aux traitements de référence.

Sinusites aiguës : en cas de risque de complications (frontales, sphénoïdales et ethmoïdales)

Exacerbations de bronchites chroniques.

Pneumonies communautaires à l'exception des formes graves (il vaut souvent mieux préférer une bêta-lactamine + un **macrolide**), infections à pneumocoque (préférer une bêta-lactamine).

Tuberculose à bacilles multirésistants ou en cas d'intolérance à un antituberculeux majeur (cf. Tuberculose).

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allergie aux **quinolones**.

Enfants et adolescents en période de croissance.

Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone.

Déficit en G6PD.

**Lévofloxacin** : épilepsie.

**Moxifloxacin** : allongement de l'espace QT, troubles hydro-électrolytiques dont hypokaliémie, bradycardie, insuffisance cardiaque gauche significative, antécédents de troubles du rythme, insuffisance hépatique, transaminases à 5 N, clairance de la créatinine < 30 mL/min.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque d'allongement de l'espace QT dépendant de la dose : cf. interactions et contre-indications.

Risque de tendinopathie surtout sujets âgés ou prise de **corticoïdes**.

Risque de photosensibilisation.

Risque de négativation de culture de *Mycobacterium tuberculosis* (**lévofloxacin**).

Risque de convulsions (**lévofloxacin**).

Insuffisance rénale : inchangé pour **moxifloxacin** ; adapter **lévofloxacin** à la clairance de créatinine ; après une dose de charge de 500 mg, diminuer selon le schéma à 1 ou 2 prises :

– ≥ 50 mL/min : 250 mg/24 h ou 250 mg/12 h (2 prises) ;

– < 20 mL/min : 125 mg/24 h ou 125 mg/12 h (2 prises) ;

– < 10 mL/min et dialyse : 125 mg/24 h (1 et 2 prises).

Insuffisance hépatique : **moxifloxacin** contre-indiquée, pas d'adaptation pour **lévofloxacin**.

**NOUVELLES FLUOROQUINOLONES (2) – PHARMACOLOGIE****EFFETS INDÉSIRABLES**

**Lévofoxacin** : cf. ofloxacin.

**Moxifloxacin** : données incomplètes car mise sur le marché récente.

Fréquents (1-10 %) : douleurs abdominales, céphalées, sensations vertigineuses, nausées, diarrhées, vomissements, dyspepsie, allongement de l'espace QT en cas d'hypokaliémie, dysgueusie, anomalies des tests hépatiques (augmentation ASAT, ALAT ou bilirubine).

Peu fréquents (0,1-1 %) : asthénie, douleurs dorsales ou thoraciques, malaise, allergie, douleurs des membres inférieurs, insomnie, nervosité, somnolence, anxiété, tremblements, paresthésies, confusion, dépression, sécheresse buccale, nausées, vomissements, flatulence, constipation, muguet, anorexie, stomatite, troubles digestifs, glossite, tachycardie, œdèmes, hypertension, palpitations, syncope, fibrillation atriale, dyspnée, arthralgies, myal-

gies, rash, prurit, hypersudation, urticaire, amblyopie, vaginite, augmentation des  $\gamma$ GT, amylasémie, leucopénie, diminution du TP, éosinophilie, thrombocytemie, thrombocytopénie, anémie.

Les effets rares ne sont pas rapportés ici.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Lévofoxacin** : cf. ofloxacin.

**Moxifloxacin** : sels de fer et topiques gastro-intestinaux : cf. ofloxacin.

**antivitamines K** : cf. ofloxacin .

Déconseillées avec médicaments augmentant le QT : **antiarythmiques** classes Ia et III, **antipsychotiques**, **tricycliques**, **antimicrobiens** (érythromycine IV, pentamidine, halofantrine), **antihistaminiques** (astémizole, terféridine, mizolastine), **cisapride**, **vincamine IV**, **dipémanil**.

Augmentation de la digoxinémie.

**Fluoroquinolones** à très large spectre (Gram+, Gram-, intracellulaires et anaérobies).

Les mécanismes de résistance sont communs entre toutes les **quinolones**.

Une large utilisation fait courir un risque d'émergence de bactéries multirésistantes (dont pneumocoques résistants aux **fluoroquinolones**) qui doit être mis en balance avec le bénéfice de la prescription.



## SULFAMIDE (1)

## ■ Cotrimoxazole

<b>BACTRIM</b>					
En 2 à 3 prises <i>per os</i> A. : 4 à 6 cp./j	20 cp. séc. SMZ 400 mg + TMP 80 mg	3,06	I	65 %	0,15
	50 cp. séc. SMZ 400 mg + TMP 80 mg	HOP	I		
<b>BACTRIM suspension</b> En 2 prises <i>per os</i> N. et E. : 1 mesure/5 kg/j ≥ 8 mesures /j	20 mesures dosées SMZ 200 mg + TMP 40 mg	2,87	I	65 %	0,14
	<b>BACTRIM perfusion</b> En 2 perfusions IV A. : 4 à 6 amp./j E. et N. : 2 mL/5 kg/j	HOP	I		
<b>BACTRIM FORTE</b>					
En 2 à 3 prises <i>per os</i> A. : 2 à 3 cp./j	10 cp. séc. SMZ 800 mg + TMP 160 mg	2,77	I	65 %	0,28
	50 p. séc. SMZ 800 mg + TMP 160 mg	HOP	I		

SMZ : sulfaméthoxazole

TMP : triméthoprim

## SULFAMIDE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Sulfamides et **triméthoprime** sont des antibiotiques bactériostatiques synergiques inhibiteurs de la synthèse de l'**acide folique**.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou parentéral, bonne biodisponibilité, bonne distribution tissulaire (y compris le LCR, liquides synovial, pleural et péritonéal), métabolisation hépatique, élimination urinaire, passage transplacentaire.

### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques, streptocoques, pneumocoques, *Neisseria*, *Bacillus*, entérobactéries, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis*, *Pseudomonas cepacia*, *Pseudomonas maltophilia*, *Legionella*, *Chlamydia*, *Actinomyces*, *Toxoplasma gondii*, *Pneumocystis carinii*.

Résistance naturelle : entérocoques, *Coxiella*, *Treponema*, *Leptospira*, *Mycobacterium*.

Résistance acquise : streptocoques, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, entérobactéries.

### INDICATIONS

#### En 1<sup>re</sup> intention

– Infections urinaires basses non compliquées, prostatites, pyélonéphrites aiguës.

- Sinusites aiguës, otites moyennes aiguës.
- Traitement de la pneumocystose pulmonaire (**cotrimoxazole**) et de la toxoplasmose (**sulfadiazine**).
- Salmonellose, shigellose, yersiniose.

#### En 2<sup>e</sup> intention

- Bronchites aiguës (au cours de la BPCO), pneumopathies à bacilles gram-négatifs.
- Infections à bacilles gram-négatifs, endocardites bactériennes (en association).
- Méningites listériennes, nocardiose, brucellose.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergies aux **sulfamides** ou au **triméthoprime**.

Fin de **grossesse**, **allaitement**, nouveau-né.

Insuffisances hépatiques sévères.

Porphyries, déficit en G6PD, anémies par carence en folates.

Exposition aux UV (photosensibilisation).

**Méthotrexate**, **procaïne**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillés pendant la **grossesse**.

Surveillance hématologique en cas de traitement prolongé.

Diurèse alcaline avec la **sulfadiazine** (cristallurie).

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine.

Insuffisance rénale (clairance)	Cotrimoxazole	Sulfadiazine
< 30 mL/min	800/160 à 400/80 mg/12 h	1,5 à 3 g/12 h
< 10 mL/min	800/160 mg/24 h	1,5 à 3 g/24 h

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, stomatite, colite pseudo-membraneuse, ulcérations œsophagiennes, pancréatites (rares), ictère nucléaire du nouveau-né.

Réactions allergiques (fréquentes au cours du sida) : urticaires, érythème maculopapuleux, œdème de Quincke, fièvre, arthralgies, vascularites, hépatites immuno-allergiques, maladie sérique, dermites exfoliatrices, syndrome de Lyell (0,2 cas/million).

Troubles hématologiques : neutropénie réversible, anémie mégaloblastique, méthémoglobinémie, thrombopénie, agranulocytose.

Troubles neurologiques : céphalées, neuropathies périphériques, dépression, convulsions, ataxie, hallucinations visuelles, acouphènes, vertiges, insomnie, surdité, tremblements.

Tubulopathie et insuffisance rénale.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K**, **phénytoïne**, **sulfamides hypoglycémiantes**, **zidovudine**.  
Diminution de la ciclosporinémie.

## NITRO-IMIDAZOLÉS (1)

## ■ Métronidazole

<b>FLAGYL</b>					
En 3 prises <i>per os</i> aux repas	24 c-mes. (susp. buv. 125 mg)	4,66	I	65 %	0,19
A. : 1 à 1,5 mg/kg/j	20 cp. 250 mg	3,71	I	65 %	0,19
E. : 20 à 30 mg/kg/j	4 cp. 500 mg	3,23	I	65 %	0,81
Traitement local de la trichomonase vaginale	14 cp. 500 mg	5,08	I	65 %	0,36
1 à 2 ovules/j pendant 10 à 20 j	10 ovules à 500 mg	3,22	I	30 %	0,32
<b>FLAGYL 0,5 % injectable</b>	25 poches 500 mg	HOP	I		
2 à 3 perfusions IV de 30 à 60 min					

## ■ Ornidazole

<b>TIBÉRAL</b>					
En 2 prises <i>per os</i> aux repas	3 cp. séc. 500 mg	HOP			
A. : 1 à 1,5 mg/kg/j					
E. : 20 à 30 mg/kg/j					
<b>TIBÉRAL injectable</b>	12 amp. 500 mg	HOP	I		
2 à 3 perfusions IV de 30 à 60 min	12 amp. 1 g	HOP	I		

## ■ Secnidazole

<b>SECNOL</b>					
À prendre <i>per os</i> au début des repas	1 sach. dose 2 g granulés	8,08	I	65 %	8,08
Amibiase aiguë digestive :					
A. : 2 g en 1 prise unique					
E. : 30 mg/kg en 1 prise unique					
Amibiase hépatique :					
A. : 1,5 g/j en 1 ou plusieurs prises pendant 5 j.					
E. : 30 mg/kg/j en 1 ou plusieurs prises pendant 5 j					
Infections à <i>Trichomonas</i> :					
2 g en 1 prise unique					
Giardiase :					
E. : 30 mg/kg en 1 prise unique					

## ■ Tinidazole

<b>FASIGYNE</b>					
En 1 prise <i>per os</i> aux repas	4 cp. 500 mg	4,09	I	65 %	1,02
A. : 2 000 mg/j					

## NITRO-IMIDAZOLÉS (2) – PHARMACOLOGIE

## ■ Métronidazole + spiramycine

<b>BIRODOGYL</b>						
<b>Métronidazole</b> 250 mg et <b>spiramycine</b> 1,5 MUI En 2 à 3 prises <i>per os</i> au repas A. et E. > 15 ans : 2 à 3 cp./j	10 cp. 250 mg	7,93	I	65 %	0,79	
<b>RODOGYL</b>						
<b>Métronidazole</b> 125 mg et <b>spiramycine</b> 0,75 MUI En 2 à 3 prises <i>per os</i> aux repas A. : 4 à 6 cp./j E. > 6 ans : 2 cp./j; E. > 10 ans : 3 cp./j	20 cp. 125 mg	6,59	I	65 %	0,33	
<b>MISSILOR</b>						
Idem <b>RODOGYL</b>	20 cp. 125 mg	6,59	I	65 %	0,33	
<b>BI MISSILOR</b>						
Idem <b>BIRODOGYL</b>	10 cp. 250 mg	6,62	I	65 %	0,66	

## ■ Ténionitroazole

<b>ATRICAN</b>						
1 caps. x 2/j pendant 4 j	8 caps. 250 mg	3,11	I	65 %	0,39	

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques bactéricides actifs sur les bactéries anaérobies strictes et certains protozoaires.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité proche de 100 %), par voie parentérale, par voie vaginale (biodisponibilité 20 %) ou par voie rectale, distribution dans tout l'organisme (y compris le système nerveux central et l'humeur aqueuse), métabolisation hépatique en dérivés actifs, élimination urinaire (60-80 %) et biliaire (6-15 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel, hémodialysable à 50 %.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : anaérobies (sauf *Propionibacterium* et *Actinomyces*), *Campylobacter fetus*, *Helicobacter pylori*, *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Balantidium coli*, *Isospora belli*, *Entamoeba histolytica*.

## INDICATIONS

En association en cas d'infections mixtes.

- Traitement curatif des infections à anaérobies.
- Colite pseudo-membraneuse.
- Infection à *Helicobacter pylori* (en association avec **amoxicilline** ou **clarithromycine**) : ulcère gastrique et duodénal.
- Trichomonases vaginales.
- Protozooses intestinales : giardiase, balantidiose, isosporose, blastomycose.
- Amibiase.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **imidazolés**.

**Grossesse** : 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** (pendant et 2 j après l'arrêt de l'antibiotique).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Effet antabuse (10-25 %) pendant et 2 j après l'arrêt de l'antibiotique).

Antécédents de convulsions.

Insuffisance rénale : 8 mg/kg/12 h lorsque la clairance de la créatinine est < 30 mL/min et en cas d'anurie. En cas d'hémodialysable, administrer 20 mg/kg en fin de séance.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Troubles digestifs** (5-10 %) : nausées, vomissements, diarrhée, goût métallique, anorexie, épigastralgies, glossite, stomatite, pancréatite.

**Troubles neurologiques** : céphalées, confusion, vertiges, atteinte cérébelleuse, paresthésies, polynevrite sensitivomotrice réversible.

**Autres** : neutropénie réversible, thrombopénie, prurit, urticaire, coloration rouge-brun des urines, gynécomastie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Antivitamines K** (surdosage).

Alcool, **disulfirame**, **phénobarbital**, **phénytoïne** (surdosage et diminution de l'effet du **métronidazole**), **5 fluoro-uracile**, **curares** type **vécuronium**.

## GLYCOPEPTIDES (1)

## ■ Vancomycine

VANCOMYCINE MYLAN					
En 2 à 3 perfusions de 1 h	1 fl. pdre 125 mg	HOP	I		
ou perfusion continue	1 fl. pdre 250 mg	HOP	I		
A. : 30 à 60 mg/kg/j à adapter aux dosages	1 fl. pdre 500 mg	HOP	I		
N. et E. : 40 mg/kg/j	1 fl. pdre 1 g	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique bactéricide, inhibiteur de la synthèse du peptidoglycane, actif sur les bactéries gram-positives y compris les staphylocoques méti-R.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (pas d'absorption digestive) ou par voie IV, distribution limitée (sérum, liquide synovial, poumons, reins), diffusion dans le LCR en cas de méningite, très faible métabolisation hépatique, élimination rénale sous forme active (80-90 %), non hémodialysable.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques, streptocoques, pneumocoques, entérocoques, corynébactéries, *Listeria*, *Clostridium*.

Résistance naturelle : bacilles gram-négatifs, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Nocardia*.

Résistance acquise : *Enterococcus faecium*, *Leuconostoc*, *Lactobacillus*, *Erysipelothrix*.

## INDICATIONS

– Infections sévères à streptocoques, entérocoques ou staphylocoques méti-S en cas d'allergie aux bêta-lactamines.

– Infections à staphylocoques méti-R.

– Fièvre chez le neutropénique en particulier en cas de suspicion d'infection à cocci gram-positifs.

– Prévention de l'endocardite bactérienne en cas d'allergie à la **pénicilline**.

– Colite pseudo-membraneuse *per os* (déconseillé en raison du risque de sélection d'entérocoque résistant à la **vancomycine**).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **vancomycine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Préférer une administration continue à la seringue électrique précédée d'une dose de charge de 15 mg/kg en 1 h.

**Grossesse** : innocuité non établie.

Surdité préexistante.

Insuffisance rénale : diminuer la dose journalière et l'adapter aux dosages de la résiduelle.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Néphro-ototoxicité, intolérance veineuse, « red man syndrome », réactions allergiques.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

## GLYCOPEPTIDES (2)

## ■ Teicoplanine

TARGOCID					
A. : 6 à 8 mg/kg/12 h pendant 1 à 4 j puis 6 à 8 mg/kg/24 h en 1 inj. E. : 10 mg/kg/j toutes les 12 h pour les 3 premières inj. puis 10 mg/kg/24 h en 1 inj. Vérifier la concentration résiduelle avant de passer à 1 inj./j	1 fl. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 200 mg	HOP	I		
	1 fl. 400 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Similaires à la **vancomycine**.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage parentéral IV ou IM, distribution proche de la **vancomycine** (sauf dans le LCR), peu ou pas de métabolite, élimination rénale sous forme active (80 %), non hémodialysable.

## MICROBIOLOGIE

Cf. **vancomycine**.

## INDICATIONS

- Cf. **vancomycine** et les recommandations ci-dessous.
- Pas d'indication dans les méningites en raison d'un passage méningé insuffisant.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement.**

Nouveau-né.

Allergie à la **teicoplanine** (pas d'allergie croisée avec la **vancomycine**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surdité.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clai-

rance de la créatinine à partir du 4<sup>e</sup> jour de traitement :

- < 60 mL/min : diminuer la dose de 1/2 ;
- < 40 mL/min : diminuer la dose de 1/3.

Surveillance des concentrations.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Néphro-ototoxicité.

Réactions allergiques, leucopénie, thrombopénie.

Intolérance veineuse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

Synergie avec les autres antistaphylocoques.

## Recommandations

Limitier la prescription de **glycopeptides** (risque d'émergence de germes résistants). En cas d'infection osseuse, associer les premiers jours un ou deux antibiotiques à bonne diffusion osseuse.

Préférer la **vancomycine** en 1<sup>re</sup> intention en raison de l'existence de staphylocoque coagulase négative de sensibilité diminuée à la **teicoplanine**.

Surveiller les concentrations résiduelles (efficacité et toxicité).

## Surveillance des concentrations sériques des glycopeptides

	CONCENTRATION RÉSIDUELLE OU À L'ÉQUILIBRE	CONCENTRATION AU PIC
<b>Vancomycine</b> (délai de 48 h avant le 1 <sup>er</sup> dosage)	20 mg/L (pneumopathie, septicémie)	40 à 60 mg/L
	20 à 30 mg/L (infection osseuse)	(perfusion continue)
	30 à 35 mg/L (méningite)	(perfusion continue)
<b>Teicoplanine</b> (délai de 72 h avant le 1 <sup>er</sup> dosage)	15 à 20 mg/L (septicémies) mal connu dans les autres indications	Sans intérêt

## OXAZOLIDONE (1)

## ■ Linézolide

ZYVOXID					
A. : 600 mg x 2/j <i>per os</i> ou IV pendant 10-14 j	10 cp. 600 mg	HOP	I		
	1 fl. sol. buv. (100 mg/5 mL)	HOP	I		
	10 poches perf. 600 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique bactériostatique appartenant à une nouvelle classe thérapeutique, les **oxazolidinones**, inhibiteurs de la synthèse protéique, dont le spectre est principalement limité aux cocci gram-positifs, y compris les staphylocoques méti-R et entérocoques vanco-R.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou intraveineux, absorption proche de 100 % *per os* indépendante de la prise alimentaire, bonne distribution tissulaire (dont poumon et parties molles), métabolisation en dérivés inactifs, excrétion rénale majoritaire.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles (CMI  $\geq 2$  mg/L) : staphylocoques (bactériostatique), *Enterococcus faecium* et *E. faecalis* (bactériostatique, y compris résistants à **vancomycine**) streptocoques y compris pneumocoques (lentement bactéricide, y compris résistants à **pénicilline**), *Neisseria*, *Bacillus*, corynébactéries, anaérobies Gram-positifs sauf *Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*, *Nocardia*, mycobactéries dont *tuberculosis*.

Résistance naturelle : entérobactéries, *Haemophilus*, *Moraxella*, *Pseudomonas*, mycoplasmes, *Chlamydia*.

## INDICATIONS

À réserver préférentiellement aux traitements d'infections à cocci gram-positifs sur documentation bactériologique.

Infections documentées ou suspectées à bactéries gram-positives sensibles chez le sujet âgé de plus de 18 ans :

- Pneumonies communautaires ou nosocomiales (10 à 14 j) à streptocoques ou staphylocoques sensibles.
- Infections de la peau et des parties molles (10 à 14 j) à streptocoques ou staphylocoques sauf brûlures graves, pied diabétique, lésions de décubitus ou ischémiques, gangrène.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Sujet de moins de 18 ans.

Allergie aux **oxazolidinones**.

Association aux **inhibiteurs de la monoamine-oxydase** y compris administrés dans les 2 sem. précédentes.

Associations contre-indiquées sauf surveillance étroite de la pression artérielle : **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine**, **antidépresseurs tricycliques**, **agonistes des récepteurs 5HT1 (triptans)**, **sympathomimétiques** (dont **bronchodilatateurs adrénergiques**, **pseudoéphédrine**, **phénylpropanolamine**), **vasopresseurs**, **dopaminergiques**, **péthidine**, **buspirone**. Maladies suivantes associées sauf surveillance étroite de la pression artérielle : hypertension artérielle non maîtrisée, phéochromocytome, syndrome carcinoïde, hyperthyroïdie, dépression bipolaire, schizophrénie dysthymique, état confusionnel aigu.

**OXAZOLIDONE (2)****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Informer les malades des complications dans l'encadré ci-dessous et surveillance hématologique hebdomadaire.

Durée maximale de traitement : 28 j.

Insuffisance rénale : pas d'ajustement (peu de données en cas d'insuffisance rénale grave).

Insuffisance hépatique : probablement pas d'ajustement mais peu de données.

**Inhibiteur de la monoamine-oxydase** sans effet antidépresseur aux doses antibiotiques.

Ne pas associer à un régime riche en tyramine (fromages affinés, extraits de levure, boissons alcoolisées non distillées, soja).

Flacons pour injection : 13,7 g/300 mL de glucose.

Arrêt du traitement en cas d'anémie, leucopénie, thrombocytopenie ; NFS x 1/sem.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Thrombocytopenie pouvant survenir dans un délai court (quelques jours).

Rares cas de neuropathie périphérique, de neuropathie optique évoluant parfois vers une perte de la vision, d'anémie nécessitant une transfusion sanguine, de thrombocytopenie et d'acidose lactique (toxicité mitochondriale) essentiellement rapportés après 28 j de traitement et nécessitant une surveillance étroite.

Informers les malades de ces risques et de la nécessité de consulter au moindre signe d'alerte.

Fréquents (1 à < 10 %) sur plus de 2 000 malades : nausées et vomissements (3,3 %), diarrhées (4,2 %), céphalées (2,1 %), candidoses orales (0,8 %) et vaginales (1,1 %), anomalies biologiques (hépatiques, LDH, urée, CPK, lipase, amylase, glycémie, hypoprotidémie, hypoalbuminémie, natrémie, kaliémie, calcémie, augmentation des bicarbonates, thrombocytose, leucopénie, leucocytose), dysgueusie.

Les effets secondaires de fréquence inférieure à 1 % ne sont pas cités ici.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Warfarine** : réduction de l'INR.



## ACIDE FUSIDIQUE

## ■ Acide fusidique

<b>FUCIDINE</b>					
<b>FUCIDINE</b> comprimé En 2 à 3 prises/j aux repas A. : 1 000 à 1 500 mg/j E. : 30 à 50 mg/kg/j	10 cp. 250 mg	11,29	I	65 %	1,13
<b>FUCIDINE</b> enfant En 2 à 3 prises/j aux repas E. : 40 à 60 mg/kg/j	18 c-mes. (sol. buv. à 250 mg/mes)	18,00	I	65 %	1,00
<b>FUCIDINE</b> nourrisson Idem <b>FUCIDINE</b> enfant	25 c-mes (sol. buv. à 100 mg/mes)	11,32	I	65 %	0,45
<b>FUCIDINE injectable</b> En 2 à 3 perfusions IV A. : 1 500 mg/j E. et N. : 20 à 40 mg/kg/j	1 inj. 500 mg (poudre) + 10 mL de solv.	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactériostatique, inhibiteur de la synthèse protéique qui est utilisé pour son activité antistaphylococcique.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os* (biodisponibilité de 90 % diminuée par l'alimentation), par voie parentérale ou en topiques, bonne distribution tissulaire (os, liquide synovial, peau, rein, sécrétions bronchiques, humeur aqueuse sauf urines et méninges) et intracellulaire (polynucléaires), métabolisation hépatique, élimination biliaire (98 %), passage transplacentaire.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* méti-S et méti-R, streptocoques, *Neisseria*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium*, *Erysipelothrix*, *Listeria*, *Lactobacillus*, *Haemophilus influenzae*, anaérobies (sauf *Fusobacterium necrophorum* et *Bacteroides*), *Nocardia*.

Résistance naturelle : bacilles gram-négatifs.  
Résistance acquise (chromosomique) : staphylocoques (5 à 15 %).

**INDICATIONS**

En association pour limiter la sélection de mutants résistants, indifféremment *per os* ou IV.

– Infections osseuses et articulaires à staphylocoques.

– Infections sévères et septicémies à staphylocoques (sauf méningites).

– Infections cutanées à staphylocoques ou à streptocoques (risque de sélection de mutants résistants en application topique).

– Infections des voies respiratoires basses au cours de la mucoviscidose.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'**acide fusidique**.

Insuffisance hépatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** (innocuité non démontrée).

Surveillance du bilan hépatique.

À toujours utiliser en association par voie générale en raison du risque élevé de sélection de mutants résistants en monothérapie. De même, l'augmentation des prescriptions de topique serait responsable d'une augmentation croissante du nombre de souches de staphylocoques de ville résistant à l'**acide fusidique**.

Apport sodé : 6,4 mmol de Na<sup>+</sup> par g d'**acide fusidique** injectable.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Intolérance veineuse.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, gastralgies, diarrhées, hépatite cholestatique dépendante de la dose (48 % IV, 13 % *per os*), ictère réversible chez le nouveau-né.

Réactions cutanées allergiques et granulopénie (exceptionnelles).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

## FOSFOMYCINE

## ■ Fosfomycine

<b>FOSFOCINE</b>					
En 2 à 3 perf. lentes	1 fl. 1 g	HOP	I		
A. et E. : 100 à 200 mg/kg/j	1 fl. 4 g	HOP	I		

## ■ Fosfomycine + trométamol

<b>MONURIL</b>					
A. : 1 sach. à jeun en 1 prise	1 sach. 3 g de <b>fosfomycine</b>	7,46	I	65 %	7,46
<b>URIDOZ</b>					
Idem <b>MONURIL</b>	1 sach. 3 g de <b>fosfomycine</b>	7,46	I	65 %	7,46

Réservée aux traitements des infections urinaires basses non compliquées de la femme jeune.

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactéricide, inhibiteur de la synthèse du peptidoglycane, utilisé en association dans les infections sévères ou profondes.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage par voie parentérale, bonne distribution tissulaire (y compris l'os et le LCR), pas de métabolisation, élimination rénale (85 %), faible passage dans le lait maternel.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : staphylocoques, streptocoques, pneumocoques, *Neisseria*, entérobactéries, *Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas*.

Résistance naturelle : *Staphylococcus saprophyticus*, entérocoques, *Corynebacterium*, *Listeria*, *Pasteurella*, *Acinetobacter*, anaérobies, *Chlamydia*, *Mycoplasma*.

Résistance acquise : staphylocoques dont méthicilline (20 %), streptocoques, pneumocoques, *Klebsiella*, *Serratia*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Providencia*, *Pseudomonas*.

**INDICATIONS**

En association, après antibiogramme.

- Infections nosocomiales à staphylocoques.
- Infections ostéo-articulaires.
- Méningites, endocardites (en 2<sup>e</sup> intention).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à la **fosfomycine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

Ne pas utiliser en monothérapie en raison du risque élevé de sélection de mutants résistants. Apports sodés : 14,4 mmol de Na<sup>+</sup> par gramme de **fosfomycine**.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- 60 à 40 mL/min : 4 g/24 h ;
- 40 à 30 mL/min : 4 g/36 h ;
- 30 à 20 mL/min : 4 g/48 h ;
- < 10 mL/min : 4 g/72 h ;
- hémodialyse : 2 g après chaque séance.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque d'hypokaliémie.

Intolérance veineuse.

Réactions allergiques (rares).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Surveillance du ionogramme avec les **digitaux**, médicaments hypokaliémants, médicaments responsables de torsade de pointes (**amiodarone**, **antiarythmiques de la classe Ia**, **sotalol**, **fénoxidil**, **lidoflaxine**, **prénylamine**, **sultopride**, **vincamine**, **érythromycine** par voie IV).

## PHÉNICOLÉ

## ■ Thiamphénicol

THIOPHÉNICOL					
En 3 à 4 prises <i>per os</i> A. : 1,5 à 3 g/j E. : 30 à 100 mg/kg/j	16 cp. 250 mg	42,69	I	65 %	2,67
<b>THIOPHÉNICOL</b> injectable En 2 inj. par voie SC, IM ou IV A. : 1,5 à 3 g/j E. : 30 à 100 mg/kg/j	1 fl. 750 mg 20 fl. 750 mg	22,77 HOP	I I	65 %	22,77

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique bactériostatique, à large spectre, inhibiteurs de la synthèse protéique dont la toxicité hématologique limite sa prescription.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité de 70 à 90 %), par voie parentérale (voie IM non recommandée), bonne distribution tissulaire (en particulier le SNC, l'œil et les ganglions mésentériques) et intracellulaire, pas de métabolisation, élimination rénale sous forme active, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : staphylocoques, streptocoques, pneumocoques, entérocoques, gonocoques, méningocoques, *Bacillus*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Erysipelothrix*, *Listeria*, *Lactobacillus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella typhi*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Proteus indologènes*, *Serratia*, *Vibrio cholerae*, *Brucella melitensis*, *Haemophilus*, *Bordetella pertussis*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Veillonella*, *Clostridium*, *Propionibacterium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium*.

Résistance naturelle : *Pseudomonas aeruginosa*, *Xanthomonas*, *Acinetobacter*.

Résistance acquise : staphylocoques (en particulier *méti-R*), pneumocoques (10-30 %), entérocoques (50 %), *Haemophilus* (≥ 25 %), entérobactéries dont *Salmonella typhi*.

## INDICATIONS

Habituellement utilisés en deuxième intention.  
– Méningites bactériennes à méningocoques, pneumocoques (30 % de résistance), ou *Haemophilus influenzae* (25 % de résistance).  
– Abscès cérébraux et empyèmes sous-duraux à pyogènes (en association avec une bêtalactamine).  
– Fièvre typhoïde.  
– Rickettsioses et ehrlichiose.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux **phénicolés**.  
Antécédents d'aplasie médullaire, anémie, leucopénie ou thrombopénie.  
Déficit en G6PD.  
Insuffisance rénale sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance hématologique hebdomadaire.  
Déconseillés en cas d'insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :  
– 30 à 10 mL/min : 7 à 10 mg/kg/12 h ;  
– < 10 mL/min : 7 à 10 mg/kg/24 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Toxicité hématologique : insuffisance médullaire précoce dépendante de la dose réversible, anémie hémolytique en cas de déficit en G6PD. Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidoses.  
Autres : hypovitaminose K (traitement prolongé), alopecie réversible, accidents anaphylactiques exceptionnels.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation de la toxicité hépatique avec tous les médicaments hépatotoxiques.

## POLYMYXINE

## ■ Colistine

COLIMYCINE					
2 à 3 perf. IV de 1 h ou inj. IM A et E. : 50 000 UI/kg/j N. : 50 à 100 000 UI/kg/j		1 fl. 1 MUI	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique polypeptidique de la famille des polymyxines E, bactéricide, à spectre étroit qui agit sur les phospholipides des membranes bactériennes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Faible distribution tissulaire (pas de diffusion dans le système nerveux central, liquide pleural, œil, liquide synovial), faible métabolisation, élimination urinaire (70-80 %).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Xanthomonas maltophilia*, *Acinetobacter*, *Pasteurella*, *Bordetella*, *Veillonella*, *Fusobacterium*.

Résistance naturelle : cocci gram-positifs, cocci gram-négatifs, bacilles gram-positifs, *Proteus*, *Providencia*, *Serratia*, *Campylobacter*, *Brucella*, *Pseudomonas pseudomallei*, *Pseudomonas cepacia*, *Nocardia*, *Mycobacterium*, anaérobies.

## INDICATIONS

Limitées par la toxicité.

- Infections à germes multirésistants.
- Infections respiratoires à *Pseudomonas aeruginosa* au cours de la mucoviscidose (en aérosols).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux polymyxines.  
Myasthénie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :  
– < 30 mL/min : 25 000 UI/kg/36-48 h ;  
– < 10 mL/min : 12 000 à 25 000 UI/kg/72-96 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles neurologiques : paresthésies, ataxie, neuropathie périphérique, vertiges, blocage neuromusculaire.  
Néphrotoxicité dépendante de la dose.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques et **curares**.

## ANTISEPTIQUE INTESTINAL

## ■ Tiliquinol + tilbroquinol

INTÉRIX					
Diarrhée aiguë bactérienne 4 à 6 gél./j en 3-4 prises	20 gél. 200 mg tilbroquinol + 100 mg tiliquinol	3,42	I	65 %	0,17
Amibiase intestinale : 1 gél x 4/j pendant 10 j					
Colopathie fonctionnelle : 1 gél. x 2/j pendant 10 j tous les mois					

## PROPRIÉTÉS

Antiseptique intestinal :

- action antibactérienne à large spectre sur la majorité des germes intestinaux ;
- action antifongique sur *Candida albicans* ;
- action amœbicide de contact sur les formes végétatives d'*Entamoeba histolytica* ;
- action vibriolytique sur *Vibrio cholerae*.


## INDICATIONS

Amibiase intestinale en complément d'un amœbicide tissulaire dans l'amibiase dysentérique ou isolément chez les porteurs sains d'amibes intestinales.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de suspicion de diarrhée invasive, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée. Des traitements continus, prolongés et à doses élevées par des **hydroxyquinolés** (cloquinol retiré du marché) ont entraîné des troubles neurologiques : myélite subaiguë, neuropathie périphérique, névrite optique. De tels cas n'ont pas été décrits avec **INTÉRIX** mais par prudence :

- ne pas prolonger le traitement plus de 4 sem. ;
- ne pas associer d'autres médicaments contenant des **hydroxyquinolés**.



## ANTIBILHARZIEN

## ■ Praziquantel

<b>BILTRICIDE</b>					
Bilharziose Distomatoses hépato-biliaires et intestinales : 75 mg/kg en 3 prises x 1-2 j Paragonimoses : 75 mg/kg en 3 prises <i>Taenia saginata</i> et <i>T. solium</i> : 10 mg/kg en 1 prise <i>Hymenolepis nana</i> : 15-25 mg/kg en 1 prise à renouveler 1 sem. plus tard	6 cp. quadrisécs. 600 mg	26,30	I	65 %	4,38

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé de l'isoquinoléine-pyrazine de mécanisme d'action incomplètement connu (paralyse par dépolarisation les muscles des parasites) actif principalement sur les formes adultes de nombreux cestodes et trématodes.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os* avec une biodisponibilité de > 80 %, bonne diffusion tissulaire y compris le LCR (14-24 %), métabolisation hépatique avec un cycle entéro-hépatique, élimination de métabolites inactifs par voie rénale (80 %) et biliaire (20 %).

**INDICATIONS**

Schistosomes (*S. mansoni*, *S. haematobium*, *S. mekongi*, *S. intercalatum*, *S. japonicum*).  
Distomatoses hépato-biliaires (*Clonorchis sinensis*, *Opisthorchis viverrini*, *O. felinus*).  
Distomatose pulmonaire (*Paragonimus* sp.).  
Distomatoses intestinales (*Fasciolopsis buski*,

*Heterophyes heterophyes*, *Metagonimus yokogawai*, *Nanophyetus salmincola*).

Cysticercose et ténias ( *Taenia solium*, *T. saginata* ).

**CONTRE-INDICATIONS**

Cysticercose oculaire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Avaler les comprimés sans les croquer de préférence après un repas.

**Allaitement** : suspendre pendant 72 h.

**Grossesse** : déconseillé au 1<sup>er</sup> trimestre.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Bien toléré.

Douleurs abdominales (10-15 %), nausées et vomissements (2-6 %).

Céphalées, somnolence, vertiges (8 %).

Rares : fièvre, urticaire, prurit.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Corticoïdes** : diminue la concentration plasmatiques de **praziquantel**.

**Traitement des schistosomias par le praziquantel**

ESPÈCES	TRAITEMENT (avalier les comprimés après un repas sans les croquer)	RÉUSSITE (%)
<i>S. mansoni</i> , <i>S. haematobium</i> , <i>S. intercalatum</i>	40 mg/kg en 1 (ou 2) prise x 1 j	60-97
<i>S. japonicum</i> , <i>S. mekongi</i>	50-60 mg/kg en 2 prises x 1-2 j	70-99

## ANTIFONGIQUES (1) – AMPHOTÉRICINE B (1)

## ■ Amphotéricine B

<b>FUNGIZONE</b>					
<b>FUNGIZONE orale</b> En 2 à 3 prises orales en dehors des repas A. : 1,5 à 2 g/j E. et N. : 50 mg/kg/j (1 càc/10 kg/j) <b>FUNGIZONE injectable</b> En 1 perf. lente/j de 6 à 10 h 0,7 à 1 mg/kg/j à doses progressives	1 fl. 40 mL + pip (enf. et nour.)	5,65	I	65 %	5,65
	8 mL (fl.)	5,65	I	65 %	0,71
	1 fl. 50 mg (à diluer dans du glucosé 5 %)	HOP	I		

**CANDIDOSES INVASIVES (2)****Endocardite candidosique**

En augmentation avec le nombre de septicémies à *Candida*, elle est favorisée par :

- des lésions valvulaires préexistantes ;
- une toxicomanie intraveineuse ;
- une chimiothérapie ;
- une valve prothétique ;
- l'utilisation prolongée de cathéters intraveineux ;
- un antécédent d'endocardite bactérienne.

Elle survient dans plus de 50 % des cas après une chirurgie cardiaque.

Les hémocultures sont régulièrement positives. Le péricarde et le myocarde peuvent être également infectés.

**Traitement** : **amphotéricine B** ( $\pm$  **flucytosine**) poursuivie 6 à 10 sem. et **chirurgie** très précoce.

**Candidose ophtalmique**

Voie hémato-gène ou inoculation.

Peut toucher toutes les structures oculaires.

Clinique : douleur, scotome, vision floue.

À rechercher attentivement chez les malades de réanimation.

**Traitement** : **amphotéricine B** avec vitrectomie en cas d'abcès du vitré ( $\pm$  **flucytosine**).

**Candidose urinaire**

Favorisée par les gestes sur les voies urinaires, sondage, antibiothérapie et âge avancé.

Le plus souvent, candidurie sans symptôme ne justifiant pas de traitement mais pouvant aussi refléter une candidémie.

**Traitement** :

- candidurie sans symptômes : pas de traitement ;
- candidurie avec symptômes : retrait ou changement de la sonde et **fluconazole** *per os* ou IV ou **amphotéricine B** IV.

**CONSENSUS**

[1] Antifungal Therapy in Leukemia Patients, ECIL 4 (4th European Conference on Infections in Leukemia), 2011



**ANTIFONGIQUES (2) – AMPHOTÉRICINE B (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Antifongique** lipophile qui active les canaux potassiques à faibles concentrations et crée, à plus fortes concentrations, des pores dans la membrane cytoplasmique des champignons.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Par les méthodes actuelles, les dosages d'**amphotéricine B** ne sont pas corrélés aux résultats cliniques.

Usage *per os* (pas d'absorption digestive), en topique (cutané ou préparation magistrale), ou par voie intraveineuse. Concentrations sériques proportionnelles aux doses administrées, inchangées au cours de l'insuffisance rénale ou hépatique en raison d'une métabolisation *in situ* (> 80 %). Bonne diffusion dans les liquides inflammatoires (plèvre, péritoine, synoviale, humeur aqueuse, vitré) avec des concentrations au 2/3 de la concentration sérique résiduelle. Faible diffusion dans les méninges (2-4 %). Élimination urinaire et biliaire.

**MICROBIOLOGIE**

Espèces sensibles : *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Paracoccidioides brasiliensis*.

Espèces inconstamment sensibles : *C. lusitanae*, *C. glabrata*, *Aspergillus* sp., *Fusarium* sp., *Trichosporon beigelii*, *Actinomyces* sp., *Pseudolallescheria boydii*, mucorales.

Résistances acquises : exceptionnelles.

**INDICATIONS**

- Infections invasives à *Candida*.
- Aspergillose.

- Cryptococcose.
- Coccidioidomycose, blastomycose, histoplasmosse.
- Aspergillose.
- Mucormycose.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Allergie connue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- 10-30 mL/min : 0,5 mg/kg/j ;
- < 10 mL/min et dialyse : 0,5 mg/kg/48 h.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents : céphalées, frissons, fièvre, hypotension, toxicité veineuse.

Rares : tachypnée, choc anaphylactique, collapsus cardiovasculaire.

Troubles généraux : malaise, douleurs des muscles et articulations.

Troubles digestifs : anorexie, dyspepsie, vomissements, nausées, douleurs épigastriques.

Troubles neurologiques : vertiges, convulsions, paresthésies.

Troubles rénaux et métaboliques : toxicité rénale (80 %), hypokaliémie, hyperuricémie, protéinurie, hématurie, hyponatrémie, hypomagnésémie.

Troubles biologiques : anémie normochrome, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie, augmentation des enzymes hépatiques, de la bilirubine, des phosphatases alcalines.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Médicaments néphrotoxiques.  
Hypokaliémiantes.

**Précautions d'emploi de la *FUNGIZONE* injectable**

- Diluer l'**amphotéricine B** dans 500 à 1 000 mL de sérum glucosé 5 % (concentration de 0,1 mg/mL).
- Administrer une dose test de 1 mg en 1 h pour apprécier la tolérance clinique puis perfuser le reste de la dose en 4 à 10 h en fonction de la tolérance.
- En cas de fièvre ou frissons, ralentir le débit et injecter 25 mg d'**hémisuccinate d'hydrocortisone** en IV lente à répéter 1/2 h avant chaque perfusion.
- Hydratation par au moins 1 L de sérum physiologique avec potassium et magnésium.
- La toxicité veineuse de l'**amphotéricine B** nécessite souvent un abord veineux central.
- Surveillance : créatinine, ionogramme sanguin, calcémie, phosphorémie, hémogramme 2 à 3 fois/sem. au début puis une fois par semaine en traitement d'entretien.

## CANDIDOSES INVASIVES (3)

## Récapitulatif du traitement

DIAGNOSTIC	TRAITEMENT	PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Candidémie ou candidose invasive chez les adultes neutropéniques	<b>Échinocandine</b> (par exemple) : <b>CANCIDAS</b> IV 70 mg à J1 puis 50 mg/j ou <b>amphotéricine B liposomale</b> <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j	Retrait des cathéters, fond d'œil et recherche de localisations secondaires. Pendant 14 j après guérison clinique et microbiologique et la fin de la neutropénie. Ajuster le traitement aux résultats des tests in vitro. Surveillance les complications des médicaments. Pour l' <b>amphotéricine B</b> : créatinine et kaliémie, perfusion lente $\geq 4$ h.
Candidémie chez les adultes non neutropéniques*	<b>Fluconazole</b> 12 mg/kg/j IV ou <i>per os</i> puis 6 mg/kg/j (sauf exposition préalable aux azolés, colonisation avec souche résistante) Alternatives : <b>Échinocandine</b> : <b>Caspofungine</b> IV 70 mg J1 puis 50 mg/j ou <b>amphotéricine B liposomale</b> <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j	
Endocardite	<b>CANCIDAS</b> IV 70 mg à J1 puis 50 mg/j ou <b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j + <b>ANCOTIL</b> 100-150 mg/kg/j <i>per os</i> en 4 prises Chirurgie précoce	
Candidose ophtalmique	<b>AMBISOME</b> 3-6 mg/kg/j ou <b>fluconazole</b> 12 mg/kg/j IV ou <i>per os</i> + <b>ANCOTIL</b> 100-150 mg/kg/j <i>per os</i> en 4 prises ± vitrectomie	6-12 sem. après la chirurgie

\* Sauf allogreffés de moelle osseuse où **AMBISOME** ou **CANCIDAS** doivent être envisagés

## ANTIFONGIQUES (3) – AMPHOTÉRICINE B LIPOSOMALE

### ■ Amphotéricine B liposomale

AMBISOME					
<b>Mycoses systémiques :</b> A. et E. : 3 à 5 mg/kg/j en 1 perf. quotidienne de 30 à 60 min <b>Leishmanioses viscérales :</b> dose cumulative de 18 à 24 mg/kg à administrer en 6 inj. (1 inj./j pendant 5 j puis une 6 <sup>e</sup> inj. au 10 <sup>e</sup> j) Peu de données chez les immunodéprimés	10 fl. 50 mg	HOP	I		
ABELCET					
Idem <b>AMBISOME</b>	10 fl. 20 mL (5 mg/mL)	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

**Amphotéricine B** insérée dans la membrane de liposomes d'un diamètre < 100 nm permettant une diffusion tissulaire plus élevée et une moindre toxicité rénale que l'**amphotéricine B** libre.

#### MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : *Candida albicans*, *Rhodotorula*, *Aspergillus fumigatus*, *Cryptococcus neoformans*, mucormycoses, *Histoplasma capsulatum*, *Blastomyces dermatidis*, *Sporothrix shenkii*, *Coccidioides immitis*.

Espèces inconstamment sensibles : *Candida parapsilosis*, *Conidiobolus*, sporotrichose lymphocutanée, coccidioïdomycose pulmonaire diffuse.

#### INDICATIONS

Mycoses systémiques et/ou profondes à *Aspergillus* ou *Candida* en cas d'insuffisance rénale préexistante ou secondaire à l'administration d'**amphotéricine B** libre : créatinémie  $\geq 220$  mmol/L ou clairance de la créatinine  $\geq 25$  mL/min.

Leishmanioses viscérales.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allergie connue à l'**amphotéricine B**.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets secondaires rapportés avec l'**amphotéricine B** libre peuvent survenir avec **AMBISOME**.

#### MODE D'ADMINISTRATION

Reconstituer le médicament dans du glucosé à 5 % de façon à obtenir une concentration finale à administrer comprise entre 0,2 et 2 mg/mL.

Une dose-test initiale de 1 mg/kg doit être injectée en 15 min. En l'absence de toxicité, administrer le reste de la perfusion en 30 à 60 min. Ralentir le débit de perfusion en cas de gêne.

En cas de réactions aiguës, se référer aux précautions d'emploi de l'**amphotéricine B** non liposomale.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Enfant : doses par kg de poids corporel identiques à l'adulte.

Insuffisant rénal : en cas d'aggravation de la fonction rénale, il est proposé d'abaisser les doses à 1,5 mg/kg/j de manière transitoire ou d'espacer les perfusions.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Risque de torsades de pointes : **terfénadine**, **vincamine**, **astémizole**, **érythromycine IV**, **halofantrine**, **pentamidine**, **sultopride**, **amiodarone**, **disopyramide**, **quinidiniques**, **sotalol**.

**Digitaliques** : toxicité augmentée en cas d'hypokaliémie.

**Hypokaliémisants** : l'hypokaliémie augmente le risque de torsades de pointes.

**Zidovudine** : augmentation de la toxicité hématologique.

**Ciclosporine**, **tacrolimus** : augmentation de la toxicité rénale.

## CANDIDOSES INVASIVES (4)

Sensibilité habituelle des espèces de *Candida* aux antifongiques\*

Espèces de <i>Candida</i>	Fluconazole	Echino-candines	Itraconazole	Voriconazole	Amphotéricine B
<i>C. albicans</i>	S à R**	S	S	S	S
<i>C. tropicalis</i>	S	S	S	S	S
<i>C. parapsilosis</i>	S	S à R	S	S	S
<i>C. glabrata</i>	S-DD à R	S	S-DD à R	S	S à I
<i>C. krusei</i>	R	S	S-DD à R	S	S à I
<i>C. lusitanae</i>	S	S	S	S	Variable

\* D'après Guidelines for Treatment of Candidiasis. Clin Infect Dis 2004 ; 38 :161-89.

\*\* S : sensible, I : intermédiaire, R : résistant, S-DD : sensibilité dépendante de la dose, risque d'échec si dose non maximale (**fluconazole** 12 mg/kg/j et **itraconazole** avec concentrations plasmatiques  $\geq 0,5$  mg/L).

## ANTIFONGIQUES (4) – AZOLÉS (1)

## ■ Fluconazole

TRIFLUCAN					
En 1 prise/j	7 gél. 50 mg	23,90	I	65 %	3,41
Candidose oropharyngée : 50-100 mg/j pendant 7 à 21 j	100 gél. 50 mg	HOP	I		
Candidose œsophagienne : 100 à 200 mg/j	7 gél. 100 mg	21,80	I	65 %	3,11
Candidose systémique : 10 mg/kg/j pendant 3 j puis 400 mg/j pendant 4 sem.	60 gél. 100 mg	HOP	I		
	7 gél. 200 mg	39,71	I	65 %	5,67
	30 gél. 200 mg	147,60	I	65 %	4,92
	1 fl. 100 mg (IV)	HOP	I		
	1 fl. 200 mg (IV)	HOP	I		
	1 fl. 400 mg (IV)	HOP	I		
	7 c. mes. susp. buv. 50 mg/5 mL	23,90	I	65 %	3,41
	7 c. mes. susp. buv. 200 mg/5 mL	103,67	I	65 %	14,81
BÉAGYNE					
Candidoses aiguës vaginales et périnéales : 150 mg <i>per os</i> en prise unique	1 gél. 150 mg		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

**Antifongique bis-triazolé** hydrosoluble actif sur les levures *Candida* (sauf *krusei* et *glabrata*) et *Cryptococcus*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou intraveineux, biodisponibilité de 85-95 %, concentration d'équilibre après 5-7 j de traitement, bonne diffusion tissulaire y compris le LCR (> 60 % des concentrations plasmatiques), métabolisation hépatique faible, élimination rénale sous forme active (80 %), hémodialysable.

## INDICATIONS

- Candidoses : oropharyngées, œsophagiennes, systémiques à souches sensibles.
- Cryptococcose y compris neuroméningée.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse, allaitement** et enfants.  
Allergie au **fluconazole** et aux autres dérivés azotés.  
Association avec le **cisapride** et l'**astémizole** (risque de torsades de pointes).  
Association avec les **antivitamines K** (risque hémorragique).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les souches de *Candida glabrata* ont une sensibilité réduite au **fluconazole** : risque d'échec à 6 mg/kg/j, préférer des doses de 12 mg/kg/j ou l'**amphotéricine B**.

Les souches de *Candida krusei* sont fréquemment résistantes, préférer l'**amphotéricine B**.

**Insuffisance rénale** : adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- 10-30 mL/min : 50-400 mg/48 h ;
- < 10 mL/min : 50-400 mg/72 h ;
- hémodialyse : 200 mg en fin de séance.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, douleurs abdominales, diarrhées, céphalées, rash, augmentation des transaminases, dermatite exfoliative, anaphylaxie, thrombocytopénie, leucopénie, hépatite exceptionnellement mortelle.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation des concentrations sériques : **ciclosporine**, **sulfamides hypoglycémiants**, **phénytoïne**, **clarithromycine**, **rifabutine**, **zidovudine**, **théophylline**.

Diminution des concentrations de **fluconazole** par la **rifampicine** : espacer les prises de 12 h. Association avec certains médicaments contre-indiquée (cf. Contre-indications).

## ANTIFONGIQUES (5) – AZOLÉS (2)

## ■ Miconazole

<b>DAKTARIN</b>					
En 4 prises en dehors des repas	1 tube de 40 g à 2 %	5,28	I	65 %	5,28
A. : 2 c-mes. x 4/j	1 tube de 80 g à 2 %	8,93	I	65 %	8,93
E. et N. : 1 c-mes. x 4/j					
<b>LORAMYC</b>					
1 cp./j. 7 à 14 j	14 cp. gingiv. 50 mg	71,02	I	65 %	5,07

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé azolé dont les indications ont été supplantées par des dérivés azolés plus récents (**fluconazole**).

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Utilisation par voie locale. Le passage transcutané est de l'ordre de 9 %.

**INDICATIONS**

Traitement des candidoses orales : muguet, perlèche, glossites, gingivites, stomatites.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Contre-indication avec : **antivitamines K, astémizole, sulfamides hypoglycémiantes**.
  - Allergie au **miconazole**.
  - Insuffisance hépatique.
- Allergie au **miconazole**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Administer à distance des repas.  
Conserver dans la bouche 2 ou 3 min avant d'avaler.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée.  
Réactions anaphylactiques exceptionnelles.

## ANTIFONGIQUES (6) – AZOLÉS (3)

## ■ Itraconazole

SPORANOX					
En 1 prise <i>per os</i> après un repas	30 gél. 100 mg	44,35	I	65 %	1,48
A. : 200 à 400 mg/j	30 mL sol. buv.	88,79	I	65 %	2,96
	10 mg/mL				

## PROPRIÉTÉS

Triazolé à large spectre d'action actif sur *Aspergillus*, de nombreux champignons dimorphes (*Histoplasma*, *Blastomyces*, *Paracoccidioides*, *Sporothrix*), des levures (*Candida*, *Cryptococcus*, *Pythium*) ainsi que des dermatophytes (*Epidermophyton*, *Microsporum*, *Trichophyton*) et certaines moisissures (chromomycoses).

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage uniquement *per os*, biodisponibilité variable de l'ordre de 55 % améliorée par l'absorption d'un repas, concentration d'équilibre obtenue après 5 à 7 j de traitement entre 0,1 et 0,3 mg/L, bonne diffusion tissulaire sauf le LCR et les urines, métabolisation hépatique en dérivé actif (hydroxy-itraconazole), excrétion biliaire.

## INDICATIONS

– Aspergillose (souvent en relais d'un traitement par **amphotéricine B**) : pulmonaire invasive, généralisée et pneumopathie nécrosante (efficacité modeste au cours des aspergillomes, de l'aspergillose bronchopulmonaire allergique).  
– Infections à champignons dimorphiques : sporotrichose, coccidioidomycose, paracoccidioidomycose, histoplasmoses, chromomycoses, cryptococcose, candidoses (sauf *C. glabrata* et *krusei*).

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse, allaitement et enfants.  
Allergie aux triazolés ou à l'itraconazole.  
Association à l'astémizole (risque de torsades de pointes).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance des concentrations sanguines après la première semaine de traitement en rai-

son des variations individuelles de la biodisponibilité (dose de charge recommandée de 600 mg en 2 prises).

Contrôle des enzymes hépatiques tous les mois.

Prendre les gélules au cours d'un repas.

Ne pas ouvrir les gélules lors d'une administration par sonde gastrique.

Au cours du sida, préconiser un traitement à 400 mg/j.

Insuffisance rénale : pas de diminution de l'élimination.

Insuffisance hépatique : demi-vie allongée à surveiller par des dosages.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Mineurs (2-20 %) : nausées (10 %), vomissements (5 %), diarrhée (3 %), douleurs abdominales (1,5 %), céphalées (3,8 %), anorexie (1 %), dyspepsie, gastralgie, élévation des transaminases (3 %), hépatites, rash (8,6 %), asthénie (3 %).

Rare : syndrome d'excès d'hormones minéralocorticoïdes avec hypokaliémie, hypocalcémie et œdèmes des membres inférieurs.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Contre-indications : **astémizole**.

**Didanosine** (prendre l'itraconazole 2 h avant).  
Diminution des concentrations sériques d'**itraconazole** par : **rifampicine** (intervalle de 12 h), **phénobarbital**, **phénytoïne**.

Augmentation des concentrations sériques d'**itraconazole** avec la **ciclosporine**, les **digitaux**.

Augmentation des effets des **antivitamines K** et des **sulfamides hypoglycémisants**.

Risque de torsades de pointes si association avec le **cisapride**.

## ANTIFONGIQUES (7) – AZOLÉS (4)

## ■ Voriconazole

VFEND					
Au moins 1 h avant ou après un repas					
<b>Doses de charge pendant 24 h :</b>					
IV : A. et E. 6 mg/kg x 2/j	28 cp. 50 mg	HOP	I		
	56 cp. 50 mg	HOP	I		
Per os chez A. ≥ 40 kg : 400 mg x 2/j,	14 cp. 200 mg	HOP	I		
A. < 40 kg : 200 mg x 2/j, E. 6 mg/kg x 2/j	28 cp. 200 mg	HOP	I		
	56 cp. 200 mg	HOP	I		
<b>Doses d'entretien (toutes les 12 h) :</b>	170 mL sol. buv.	HOP	I		
IV : A. et E. 4 mg/kg x 2/j	40 mg/mL				
Per os chez A. ≥ 40 kg : 200 mg x 2/j,	1 fl. 200 mg pdre. inj.	HOP	I		
A. < 40 kg : 100 mg x 2/j, E. 4 mg/kg x 2/j					

## PROPRIÉTÉS

Triazolé fongicide, inhibant la biosynthèse de l'ergostérol, actif sur de nombreux champignons pathogènes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Per os ou IV, absorption orale rapide diminuée par la prise de graisse, biodisponibilité 96 %, pharmacocinétique non linéaire avec augmentation des concentrations plus que proportionnelles à la dose, large distribution tissulaire, métabolisation et élimination hépatiques (principalement par le CYP3A4).

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles *in vitro* : *Candida* spp. (dont *C. krusei*, *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*), *Aspergillus* spp. (dont *A. flavus*, *A. fumigatus*, *A. terreus*, *A. niger*, *A. nidulans*) *Scedosporium* spp. (dont *S. apiospermum* et *S. prolificans*), *Fusarium*.

## INDICATIONS

Traitement des aspergilloses invasives chez l'immunodéprimé, des infections graves à *Candida*, des infections graves à *Scedosporium* spp. ou *Fusarium* spp.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse. Allaitement.** Allergie au voriconazole. Enfant de moins de 2 ans.

**Terféndine, astémizole, cisapride, pimozone, quinidine** : risque de torsade de pointe.

**Rifampicine, carbamazépine, phénobarbital** : diminution des concentrations de voriconazole.

**Dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine, dihydroergotamine)** : risque d'ergotisme.

**Sirolimus** : risque d'augmentation des concentrations de sirolimus.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Hypersensibilité croisée avec autres azolés.

Toxicités multiples dont rénales, hépatiques, cutanées et oculaires.

Pas d'adaptation de doses chez les sujets âgés. Contient du lactose.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents (< 1/10) : fièvre, céphalées, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, œdèmes, rash, troubles de la vision (30 %).

Fréquents (< 1/100) : frissons, asthénie, douleurs dorsales et thoraciques, réactions au site d'injection, œdème facial, syndrome grippal, hypotension, thrombophlébite, anomalies hépatiques (13,4 %), ictère, chéillite, gastro-entérite, thrombocytopénie, anémie, leucopénie, pupura, hypokaliémie, hypoglycémie, étourdissements, confusion, dépression, anxiété, tremblements, agitation, paresthésies, détresse respiratoire, œdème pulmonaire, sinusite, prurit, photosensibilité, alopecie, dermatite exfoliative, insuffisance rénale aiguë, hématurie.

D'autres toxicités moins fréquentes (< 1/100) ne sont pas détaillées ici.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inhibiteur du CYP3A4 : cf. Contre-indications.

Alcaloïdes de la pervenche : risque de neurotoxicité accrue.

**Benzodiazépines** : risque de potentialisation de l'effet sédatif.

**Ciclosporine** : diviser par 2 la dose de ciclosporine et surveillance des concentrations.

**Inhibiteurs de protéases et non nucléosidiques du VIH** : surveillance étroite.

**Oméprazole** : diviser par 2 la dose d'oméprazole.

**Phénytoïne** : surveiller les concentrations de phénytoïne.

**Rifabutine** : risque d'uvéite et de toxicité hémato-logique.

**Sulfamides hypoglycémisants** : risque d'hypoglycémie.

**Statines** : risque de rhabdomyolyse.

**Tacrolimus** : diviser par 3 la dose de ciclosporine et surveillance des concentrations.



## ANTIFONGIQUES (8) – AZOLÉS (5)

## ■ Posaconazole

NOXAFIL				
Infections fongiques sévères : 400 mg x 2/j Candidoses oropharyngées : J1 200 mg/j puis 100 mg/j pendant 13 j Prophylaxie des infections fongiques invasives : 200 mg x 3/j à débiter plusieurs jours avant le début estimé de la neutropénie et à poursuivre 7 j après remontée des PNN > 500/mm <sup>3</sup>		105 mL sol. buv. 40 mg/mL	HOP	I

## PROPRIÉTÉS

Antimycotique à usage systémique.

## INDICATIONS

Traitement curatif des infections fongiques suivantes :

- aspergillose invasive chez les patients réfractaires à l'amphotéricine B ou à l'**itraconazole** ;
- fusariose ;
- chromoblastomycose ;
- coccidioidomycose ;
- candidose oro-pharyngée.

Prophylaxie des infections fongiques invasives.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **posaconazole**.

Malabsorption du glucose et du galactose.

**Grossesse, allaitement**, absence de contraception orale efficace.

Déconseillé chez les moins de 18 ans.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neutropénie, leucopénie, anémie, éosinophilie.

Syndrome hémolytique et urémique.

Insuffisance surrénalienne, hyperglycémie.

Psychose, dépression.

Céphalées, convulsions, neuropathie périphérique, diplopie.

Allongement du QT, mort subite, TV, IDM, insuffisance cardiaque.

Pneumopathie interstitielle.

Pancréatite aiguë, élévation des transaminases, hépatite.

Insuffisance rénale aiguë.

Rash, alopecie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Le **posaconazole** inhibe le CYP3A4, il est donc contre-indiqué avec les médicaments substrats du CYP3A4 (**astémizole, terféndine, pimozone, quinidine, alcaloïdes de l'ergot de seigle, ergotamine et dihydroergotamine**).

Baisse des concentrations plasmatiques du **posaconazole** si administration avec des **antiacides**.

Augmentation des concentrations d'**antiarythmiques (amiodarone, quinidine)**.

Associations à éviter : **bépridil**, contraceptifs oraux, **inhibiteurs de la pompe à protons, sildénafil, millepertuis ; rifampicine** contre-indiquée.

## ANTIFONGIQUES (9) – ÉCHINOCANDINES

## ■ Caspofungine

CANCIDAS					
En perf. lente de 1 h : 70 mg le 1 <sup>er</sup> j puis 50 mg/j à partir du 2 <sup>e</sup> j (ou poursuivre à 70 mg/j si poids ≥ 80 kg)	1 fl. 50 mg	HOP	I		
	1 fl. 70 mg	HOP	I		

## ■ Micafungine sodique

MYCAMINE					
Curatif : En perf. lente de 1 h : 100 mg/j si le poids est > 40 kg, 2 mg/kg/j pour un poids inférieur. On peut doubler ces posologies en cas de non-réponse au traitement Préventif : demi-doses	1 fl. 50 mg	HOP	I		
	1 fl. 100 mg	HOP	I		

## ■ Anidulafungine

ECALTA					
En perf. lente de 1 h 30 (1,1 mg/min) : 200 mg (en 3 h) le 1 <sup>er</sup> j puis 100 mg à partir du 2 <sup>e</sup> j	1 fl. 100 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antifongiques de la classe des échinocandines. Action fongicide par inhibition non compétitive de la 1,3-β-glucan synthase, enzyme indispensable à la synthèse de la paroi fongique.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage par voie veineuse, bonne distribution y compris dans le LCR (75 % des concentrations sériques), pas de métabolisation, élimination urinaire, hémodialysable.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles *in vitro* : *Candida* (moindre activité sur *C. parapsilosis*), *Aspergillus* sp., *Pneumocystis carinii*.

## INDICATIONS

**Caspofungine** : traitement de recours de l'aspergillose invasive chez les adultes réfractaires ou intolérants à l'**amphotéricine B**, à des formulations lipidiques de l'**amphotéricine B**, et/ou à l'**itraconazole**. Traitement de la candidose invasive chez les patients adultes.

**Mycafungine** : traitement des candidoses invasives y compris chez le nouveau-né, prévention des infections à *Candida* chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de CSH. Traitement de la candidose œsophagienne lorsque le traitement IV est approprié.

**Anidulafungine** : traitement des candidoses invasives chez l'adulte non neutropénique.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**  
Allergie à la **caspofungine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitement réservé à un médecin ayant l'expérience des infections fongiques.  
Ne pas administrer ni mélanger avec d'autres médicaments.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fièvre, nausées, vomissements, complications au point d'injection, bouffées vasomotrices, élévation des transaminases.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Ciclosporine** : hépatotoxicité.

## ANTIFONGIQUES (10) – 5-FLUOROCYTOSINE

## ■ Flucytosine

ANCOTIL					
En 4 prises <i>per os</i> 100 à 200 mg/kg/j	100 cp. séc. 500 mg	55,89	I	30 %	0,56
<b>ANCOTIL injectable 1 %</b> En 4 perf./j de 45 min ou en perf. continue 100 à 200 mg/kg/j	5 fl. 250 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique inhibiteur non compétitif de la thymidylate synthétase qui participe à la synthèse de l'ADN chez certaines levures. Son usage est limité par sa toxicité médullaire, son activité moindre que l'**amphotéricine B** sur les espèces sensibles et l'émergence rapide de mutants résistants en monothérapie.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité 90 %), par voie veineuse, bonne distribution y compris dans le LCR (75 % des concentrations sériques), pas de métabolisation, élimination urinaire, hémodialysable.

## MICROBIOLOGIE

Espèces sensibles : *Candida* sp., cryptocoque, agents de la chromomycose, *Aspergillus* sp.

## INDICATIONS

En association avec l'**amphotéricine B** dans les infections sévères.

- Candidoses profondes sévères et endocardites à *Candida*.
- Aspergillose invasive sévère.
- Cryptococcose neuroméningée sévère.
- Chromomycose (seule indication en monothérapie).

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** (sauf indication vitale).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester la sensibilité de la souche par la méthode des disques.

Utiliser en association avec l'**amphotéricine B** à la dose habituelle de 0,3 mg/kg/j pour diminuer la toxicité rénale de l'association.

Surveillance bihebdomadaire des concentrations plasmatiques (pic entre 35 et 100 mg/L), des enzymes hépatiques et de la numération sanguine.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- 30-50 mL/min : 25 à 50 mg/kg/12 h ;
- 10-30 mL/min : 25 à 50 mg/kg/24 h ;
- < 10 mL/min et hémodialyse 15 à 25 mg/kg/24-48 h (après l'hémodialyse).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs dépendants de la dose (6 %) : anorexie, nausées, vomissements, diarrhées, entérocolites (rares).

Troubles hématologiques (22 %) : leucopénie, thrombocytopénie, anémie, aplasie médullaire, pancytopenie.

Manifestations allergiques : rashes, phototoxicité, érythème, prurit, oedèmes, prurit.

Troubles neurologiques : neuropathies périphériques, hallucinations, confusions, céphalées, vertiges.

Apport sodé : 34 mmol de NaCl par flacon.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments hématotoxiques.

## VACCIN ANTICOQUELUCHEUX

### ■ Bordetella pertussis + anatoxine + hémagglutinine + virus poliomyélitique

TÉTRAVAC ACCELLULAIRE				
A. et E. > 2 mois : 3 inj. SC ou IM à 1 mois d'intervalle puis rappel à 1 ou 2 ans	1 ser. 0,5 mL	14,88	65 %	14,88

#### PROPRIÉTÉS

Vaccin élaboré à partir de toxine et d'antigènes pertussiques, mieux tolérés que le vaccin à germes entiers. Des incertitudes sur son équivalence immunogène le font prescrire préférentiellement, en France, au rappel tardif entre 11 et 13 ans.

### ■ Vaccin anticoquelucheux + vaccin antitétanique + vaccin antidiphtérique + vaccin antipoliomyélitique

REPEVAX				
E. > 3 ans et A. : une dose en rappel après une primovaccination (selon les recommandations officielles)	1 ser. 0,5 mL	25,00	65 %	25,00
BOOSTRIXTETRA				
E. > 4 ans et A. : une dose en rappel après une primovaccination (selon les recommandations officielles)	1 ser. 0,5 mL	25,00	65 %	25,00

#### PROPRIÉTÉS

Vaccins combinés contre le tétanos (anatoxine), la diphtérie (faible dose d'anatoxine), la poliomyélite (virus inactivés sérotypes 1, 2 et 3) et la coqueluche (acellulaire).

#### INDICATIONS

Vaccination de rappel des adolescents et des adultes contre la diphtérie (faible dose), le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux anatoxines tétanique, diphtérique, coquelucheuse et le virus poliomyélitique, aux antibiotiques présents à l'état de trace (**néomycine, streptomycine, polymyxine B**), ou en cas de réaction sévère à une administration antérieure d'un vaccin.

#### INDICATIONS

Prévention de la coqueluche en particulier pour les rappels tardifs.  
Ce vaccin protège également de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse.**

Antécédent de complication neurologique après vaccination.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Grossesse, allaitement : déconseillé  
Différer la vaccination en cas d'infection fébrile intercurrente.  
À conserver entre + 2 et + 8 °C. Agiter avant l'emploi.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions douloureuses, érythémateuses ou nodulaires au point d'injection, abcès aseptique exceptionnel.  
Frissons, fièvre. Diarrhée, vomissements. Rash cutané, choc anaphylactique.  
Paralysie ascendante et syndrome de Guillain-Barré (**BOOSTRIXTETRA**).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

#### Indications de vaccination chez l'adulte

Depuis 2004, la vaccination coquelucheuse est recommandée chez : **les professionnels en contact avec des nourrissons** trop jeunes pour avoir reçu 3 doses de vaccin coquelucheux, c'est-à-dire le personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatalogie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de 6 mois. Pour les **étudiants des filières médicales ou paramédicales**, il est recommandé d'administrer cette vaccination à l'occasion d'un rappel d'TP en utilisant un vaccin à quatre valences (**REPEVAX**,

**BOOSTRIXTETRA**) ; et pour les **adultes susceptibles de devenir parents** dans un proche avenir et les **membres du foyer à l'occasion d'une grossesse** (enfant qui n'est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n'a pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des 10 dernières années), selon les modalités suivantes :  
– père et enfants : durant la grossesse de la mère ;  
– mère : le plus tôt possible après l'accouchement.

## ANTIVIRAL ANTIGRIPPAL (1)

## ■ Oseltamivir

<b>TAMIFLU</b>					
Traitement curatif :	10 gél. 30 mg	12,40	I	30 %	1,24
A. et E. > 40 kg : 75 mg x 2/j	10 gél. 45 mg	18,34	I	30 %	1,83
E. ≤ 15 kg : 30 mg x 2/j	10 gél. 75 mg	24,27	I	30 %	2,43
15-23 kg : 45 mg x 2/j	1 ser. graduée 6 mg/mL	12,40	I	30 %	12,40
24-40 kg : 60 mg x 2/j					
Traitement préventif :					
A. et E. > 13 ans : 75 mg/j					
E. ≤ 15 kg : 30 mg x 1/j					
15-23 kg : 45 mg x 1/j					
24-40 kg : 60 mg x 1/j					
> 40 kg : 75 mg x 1/j					

Les antiviraux sont dans certains cas gratuits pour les cas suspects de grippe A.

## ■ Zanamivir

<b>RELENZA</b>					
2 inhalations orales : 5 mg x 2/j durant 5 j	20 doses de 5 mg + syst. pour inhal.	19,86	I	30 %	0,99

## GRIPPE (2)

### Traitement

#### Symptomatique

- Repos au lit (arrêt de travail).
- Hydratation orale abondante.
- **Antipyrétiques** (aspirine **ASPÉGIC**, paracétamol **DOLIPRANE**). Risque de syndrome de Reye avec l'aspirine chez l'enfant.
- Décongestionnant nasal (**ACTIFED** : 1 cp. x 3/j).
- Pas d'antibiothérapie préventive.

#### Curatif

- Chez les adultes à haut risque de complications : **inhibiteur de la neuraminidase**, **oseltamivir (TAMIFLU)** pendant 5 j. L'**amantadine (MANTADIX)** est déconseillée en raison de ses effets secondaires. De plus, le nouveau virus H1N1 (grippe A) est résistant à l'amantadine.
- L'**inhibiteur de la neuraminidase RELENZA (zanamivir)** réduit la durée des symptômes de 1 à 2,5 j quand il est débuté dans les 48 h. Il n'y a pas d'effet sur les complications de la grippe.

#### Préventif

##### ► Vaccination

- **Grippe A** : la vaccination concerne l'ensemble de la population âgée de plus de 6 mois qui le souhaite.
- **Grippe saisonnière** : la vaccination est indiquée chez les sujets à risque de complications et chez toute personne qui le souhaite :
  - sujets de plus de 65 ans ;
  - sujets en institution ;
  - affection chronique : broncho-pulmonaire, cardiaque, rénale ;
  - enfants et adolescents recevant de l'**aspirine** au long cours (risque de syndrome de Reye) ;
  - femmes enceintes de 2 ou 3 trimestres au moment de l'épidémie ;
  - maladie métabolique, diabète, hémop

globinopathie, immunodéprimé (infection par le VIH) ;

- personnel susceptible de transmettre la grippe à des sujets à risque de complications ;
- sujets au contact de très jeunes enfants ;
- professionnels de santé ;
- personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, et personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs ;
- sujets actifs désirant se prémunir.

##### ► Traitement antiviral

- **Oseltamivir (TAMIFLU)** pendant 10 j (à 6 sem.). Les traitements antigrippaux en préventif sont chers et non remboursés. Ils doivent être réservés à des situations particulières : vaccination tardive chez les sujets à haut risque de complications, contrôle épidémiologique, contre-indication à la vaccination, immunodéprimés, sujets contacts.

##### ► Port de masque en période épidémique

Une personne symptomatique doit porter un masque de type chirurgical. Le masque de protection respiratoire (FFP2) est réservé aux professionnels dont le rôle en situation de pandémie serait capital et qui seraient amenés à être en contact régulier avec des malades.

La transmission du virus se fait principalement par voie aérienne (toux, éternuements), mais également par les mains et objets contaminés :

- se couvrir le nez et la bouche lors des accès de toux et d'éternuements ;
- se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle équipée d'un sac plastique, si possible munie d'un couvercle avec commande au pied ;
- respecter les mesures d'hygiène de base : se laver les mains fréquemment au savon et/ou une solution hydroalcoolique ;
- aérer les lieux de vie.

**ANTIVIRAL ANTIGRIPPAL (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs de la neuraminidase du virus de la grippe actif sur les souches A et B. Ils permettent d'éviter la contamination, de réduire les symptômes et l'évolution de 1 à 1,5 j chez les malades fébriles ( $T \geq 37,8$  °C). Ces molécules sont actives sur les virus de la grippe aviaire et de la grippe A (H1N1).

**PHARMACOCINÉTIQUE**

**Zanamivir** : en inhalation par la bouche, passage systémique entre 2 et 20 %, libération locale élevée (oropharynx 70-87 %, pulmonaire 8-21 %), pas de métabolisme hépatique ni rénal, élimination urinaire sous forme active.

**Oseltamivir** : biodisponibilité de 80 %, métabolisme hépatique en dérivé actif, excrétion dans les urines sous forme active et inactive.

**INDICATIONS**

Traitement de la grippe A et B chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 1 an (**oseltamivir**) ou de l'adulte et de l'adolescent âgé de plus de 12 ans (**zanamivir**).

A débuter dans les 48 premières heures après l'apparition des symptômes.

Traitement préventif (**oseltamivir**) après un contact chez l'adulte et l'adolescent âgé de plus de 13 ans à risque de complications.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non démontrée.

Enfant de moins de 12 ans (**zanamivir**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Sujets asthmatiques ou atteints d'autres affections respiratoires chroniques : risque de bronchospasme nécessitant de disposer d'un traitement bronchodilatateur à action rapide et de consulter en urgence (**zanamivir**).

Insuffisance rénale : **zanamivir** pas d'adaptation des doses, **oseltamivir** réduire la dose curative à 75 mg/j et la dose préventive à 75 mg un jour sur 2 en cas de clairance de créatinine entre 10 et 30 mL/min.

Insuffisance hépatique : pas de données.

Sujets âgés : pas d'adaptation des doses.

Informers les malades de l'usage de l'inhalateur (**zanamivir**).

Risque de sélection de souches virales résistantes.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Zanamivir** : bronchospasme (cf. Précautions d'emploi), réactions allergiques dont œdème de la face et du larynx.

**Oseltamivir** : nausées et vomissements.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Mal connues.

## VACCIN ANTIGRIPPAL (1)

## ■ Vaccin antigrippal (grippe saisonnière)

<b>IMMUGRIP</b>				
A. et E. > 10 ans : 1 inj. de 0,5 mL E. < 10 ans : 2 inj. de 0,25 mL à 1 mois d'intervalle	1 ser. 0,5 mL	6,14	65 %	6,14
<b>AGRIPPAL</b>				
Idem <b>IMMUGRIP</b>	1 ser. 0,5 mL	6,14	65 %	6,14



**VACCIN ANTIGRIPPAL (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Mélange inactivé de sérotypes prévalents cultivé sur œufs embryonnés, adapté chaque année aux données épidémiologiques, efficace 10-15 j après la vaccination.

**INDICATIONS**

Grippe saisonnière : tout sujet âgé de plus de 6 mois à risque de complications :

- sujets de plus de 65 ans ;
- sujets en institution ;
- affection chronique : broncho-pulmonaire, cardiaque, rénale, diabète ;
- enfants et adolescents recevant de l'aspirine au long cours (risque de syndrome de Reye) ;
- femmes enceintes de 2 ou 3 trimestres au moment de l'épidémie ;
- maladie métabolique, diabète, hémoglobinopathie, immunodéprimé (infection par le VIH) ;
- personnel susceptible de transmettre la grippe à des sujets à risque de complications ;
- sujets au contact de très jeunes enfants ;
- professionnels de santé ;
- personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, et personnel de l'industrie des

voyages accompagnant les groupes de voyageurs ;

- sujets actifs désirant se prémunir.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux protéines de l'œuf.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas vacciner en cas de fièvre élevée ou de maladie infectieuse évolutive.

Éviter de vacciner pendant le 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse.

Agiter avant l'emploi.

À conserver entre + 2 et + 8 °C.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

*Bénins* : douleur et inflammation locales (20 %), fièvre modérée pendant 12-48 h avec myalgies, arthralgies, sensation de malaise, céphalées, paresthésies.

Adénopathie.

Exceptionnellement : syndrome de Guillain-Barré, névrite, encéphalomyélite (< 1 cas/100 000, soit < incidence spontanée).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Compatible avec le vaccin antitétanique.

NB : Le vaccin contre la grippe A (H1N1) ne nécessite pas l'avance de frais. Il est indiqué pour toute la population âgée de plus de 6 mois. Contre la grippe saisonnière, les vaccins sont remboursés par la sécurité sociale à 65 % pour les personnes âgées de 70 ans ou plus ou les personnes atteintes des affections de longue durée [diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; accident vasculaire cérébral invalidant ; néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; forme grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie) ; mucoviscidose ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; insuffisance respiratoire chronique grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine ; drépanocytose homozygote (anémie hémolytique congénitale par hémoglobinopathie)].

## ANTI-HERPÉTIQUES (1)

## ■ Aciclovir

<b>ZOVIRAX</b>					
<b>ZOVIRAX<sup>per os</sup></b> En 5 prises <i>per os</i> A. et E. : 1 000 mg à 4 000 mg  <b>ZOVIRAX <i>pommade</i> OPH</b> En 5 appl./j Appliquer en massant légèrement les lésions  <b>ZOVIRAX <i>crème</i> à 5 %</b> En 5 appl./j Appliquer en massant légèrement les lésions  <b>ZOVIRAX <i>injectable</i></b> En perf. IV toutes les 8 h A. : 30 mg/kg/j	25 cp. 200 mg	15,01	I	65 %	0,60
	35 cp. 800 mg	67,63	I	65 %	1,93
	25 c-mes. 200 mg (susp. buv. 200 mg/5 mL)	26,61	I	65 %	1,06
	18 c-mes. 800 mg (susp. buv. 800 mg/10 mL)	49,55	I	65 %	2,75
	1 tube (4,5 g)	8,62	I	65 %	8,62
	1 tube 2 g		I	NR	
	1 tube 10 g	10,59	I	15 %	10,59
	1 fl. 250 mg		I	NR	
	1 fl. 500 mg		I	NR	
<b>REMEX</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 fl. crème 5 %/2 g			NR	
<b>HERPESDERMYL</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	
<b>ACTIVIR</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	
	1 fl. ppe dose 5 %/2 g			NR	
<b>KENDIX</b>					
Idem <b>ZOVIRAX</b> crème	1 tube crème 5 %/2 g			NR	

## ■ Valaciclovir

<b>ZELITREX</b>					
Zona : 1 000 mg x 3/j <i>per os</i> pendant 7 j à débuter dans les 72 h	10 cp. 500 mg	18,15	I	65 %	1,81
	42 cp. 500 mg	68,65	I	65 %	1,63
	112 cp. 500 mg	184,91	I	65 %	1,65

## ■ Famciclovir

<b>ORAVIR</b>					
1 cp. x 3/j pendant 7 j à débuter dans les 72 h	21 cp. 500 mg	107,82	I	65 %	5,13

## HERPÈS (2)

### Récurrences

#### Labiale

- Douleur pendant les premières 24 h.
- Guérison spontanée en 8 à 10 j.
- Discret bénéfice grâce à un traitement local précoce par **ZOVIRAX** crème à 5 % x 5/j.
- Prévention en cas de récurrences fréquentes ou avant exposition à un facteur déclenchant reconnu **ZOVIRAX** 400 mg x 2/j.

#### Génitale

- Effet modeste du traitement des récurrences qui n'est pas recommandé systématiquement chez les immunocompétents.
- Prévention en cas de récurrences fréquentes ( $\geq 6/\text{an}$ ) ou sévères : **ZOVIRAX** 400 mg x 2/j.

#### Oculaire

À traiter comme une primo-infection.

#### Autres

Méningite herpétique, érythème polymorphe ou eczéma herpétique peuvent bénéficier d'un traitement prophylactique.

### Complications herpétiques

#### Encéphalite herpétique (HSV 1)

- Rare mais représente l'une des plus fréquentes encéphalites virales.
- Mortalité spontanée entre 60 et 80 %.
- Traitement intraveineux **en urgence** par **ZOVIRAX** 10 mg/kg toutes les 8 h pendant 14-21 j.

#### Infection généralisée néonatale (HSV 2)

- Prévention par césarienne si récurrences génitales chez la mère.
- Mortalité autour de 85 %.
- À traiter comme une encéphalite herpétique.

**ANTI-HERPÉTIQUES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Analogues nucléosidiques de la guanine qui doivent être phosphorylés en dérivés triphosphates pour inhiber l'ADN polymérase virale. La 1<sup>re</sup> phosphorylation est réalisée principalement par la thymidine-kinase virale ce qui explique que ces médicaments se concentrent spécifiquement dans les cellules humaines infectées par un virus en cours de réplication.

**Valaciclovir** : prodrogue de l'**aciclovir**.

**Famciclovir** : prodrogue du **penteciclovir**.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, intraveineux ou en topique, biodisponibilité *per os* de l'**aciclovir** : 20 % du **valaciclovir** : 54 %, du **penteciclovir** (après absorption de **famciclovir**) : 77 %, distribution dans tout l'organisme de l'**aciclovir** (50 % des concentrations plasmatiques dans le LCR, 37 % dans l'humeur aqueuse), faible métabolisation (< 15 %), élimination rénale de l'**aciclovir** et du **penteciclovir** (85 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel (**aciclovir**), hémodialysable.

**INDICATIONS****Aciclovir**

- Traitement préventif des récurrences herpétiques : greffés, herpès génital chez l'immuno-compétent ( $\geq 6/\text{an}$ ), érythème polymorphe lié à HSV.
- Traitement curatif de la primo-infection génitale et des récurrences.
- Traitement curatif de l'herpès et du zona ophtalmique (local) à commencer dans les 24 premières heures et à poursuivre 7 j.
- Traitement des formes graves d'infections herpétiques (méningo-encéphalite, herpès néonatal, infections sévères à *Herpes simplex* chez l'immunocompétent et l'immunodéprimé).
- Traitement curatif de la varicelle et du zona chez l'immunodéprimé.

**Aciclovir, valaciclovir, famciclovir**

– Traitement du zona et prévention des douleurs post-zostériennes (**aciclovir**, **valaciclovir**, **famciclovir**) à débiter dans les 72 h après les premiers signes cutanés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'**aciclovir**, au **ganciclovir**, au **valaciclovir**, au **famciclovir** ou au **penteciclovir**.

**PROPRIÉTÉS**

**Grossesse** et **allaitement** : déconseillé (innocuité non établie).

Insuffisance rénale : adapter la dose d'**anti-herpétique** à la clairance de la créatinine :

**Aciclovir** :

- 30-50 mL/min : 5 mg/kg toutes les 12 h ;
- 10-30 mL/min : 5 mg/kg/j ;
- < 10 mL/min : 2,5 mg/kg/j ;
- hémodialyse : 5 mg/kg en fin de séance.

**Valaciclovir** :

- 15-30 mL/min : 2 g/j ;
- $\leq 15$  mL/min : 1 g/j ;
- hémodialyse : administrer la dose quotidienne après la séance.

**Famciclovir** :

- 20-40 mL/min : 500 mg/24 h ;
- < 10 mL/min : 500 mg/48 h ;
- hémodialyse : 500 mg après la séance.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Topiques : brûlures et irritations muqueuses.

*Per os* : nausées, diarrhées, rash, céphalées, neurotoxicité et néphrotoxicité (rares).

Intraveineux : insuffisance rénale (5 %), hématurie, cristallurie, réactions au point d'injection, phlébites, hypotension, maux de tête, léthargie, obnubilation, tremblements, confusion mentale, hallucinations, agitation, convulsions, coma.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Médicaments néphrotoxiques.

## ANTILEISHMANIEN (3)

### ■ Antimoniote de méglumine

<b>GLUCANTIME</b>				
Traitement de la leishmaniose viscérale et cutanée : 20 mg/kg/j (soit 75 mg/kg/j d'antimoine) en IM profonde sans dépasser 850 mg (2 amp.) à administrer à doses progressives, pendant 20 à 30 j	5 amp. de 1,5 g (425 mg/amp. d'antimoine pentavalent)	58,62	65 %	11,72

#### PROPRIÉTÉS

Antileishmanien de mode d'action inconnu.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

Pas d'absorption digestive, administration parentérale, élimination urinaire, risque d'accumulation tissulaire.

#### INDICATIONS

Traitement général de la leishmaniose viscérale ou cutanée : 10 à 20 mg/kg/j (soit 37 à 75 mg/kg/j d'antimoine pentavalent) pendant 20 à 30 j (au moins 4 sem. pour *L. braziliensis* et *L. amazonensis*).

Traitement local de la leishmaniose cutanée (sauf *L. braziliensis* et *L. amazonensis*) : 2 à 10 infiltrations périlésionnelles de 1 à 5 mL à 2 à 7 j d'intervalle après anesthésie locale par crème (**EMLA**).

#### CONTRE-INDICATIONS

##### Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité aux constituants.

Insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique.

Allongement du QT.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Débuter par un quart de la dose totale, puis en cas de bonne tolérance, augmenter à la moitié de la dose totale puis à la dose complète.

Risque d'anaphylaxie (stibi-intolérance) liée à la présence de sulfites.

Surveillance de l'électrocardiogramme (toxicité dépendante de la dose et réversible) : bradycardie, inversion des ondes T, sous-décalage ST, allongement de l'espace QT.

Administrer un régime riche en protéines.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Stibio-intolérance : hyperthermie, frissons, arthro-myalgie, rash, toux, tachycardie, lipothymie, hémorragies, troubles digestifs.

Stibio-intoxication (surdosage) : hyperthermie, polynévrite, myalgies, arthralgies, troubles cardiaques (bradycardie, inversion des ondes T, allongement de l'espace QT, sous-décalage ST, mort subite), hépatique (cytolyse), pancréatiques (élévation lipase, amylase), insuffisance rénale, hématologique (anémie, agranulocytose, hémorragie).

## ANTIPALUDÉENS (1)

## ■ Chloroquine

NIVAQUINE					
Prophylaxie	20 cp. séc. 100 mg	2,70	II	65 %	0,14
A. : 1 cp./j	100 cp. séc. 100 mg	5,78	II	65 %	0,06
E. > 10 kg : 1,7 mg/kg/j sans dépasser 100 mg	30 mes. de 5 mL (susp. buv. 5 mg/mes.)	9,14	II	65 %	0,30
E. < 10 kg : 25 mg 1 j/2					
Traitement curatif					
A. : 1 500 mg sur 3 j soit 600 mg suivi 6 h plus tard de 300 mg le 1 <sup>er</sup> j, puis 300 mg en 1 prise les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> j					
E. et N. : 25 mg/kg/j sur 3 j soit 10 mg/kg suivi de 5 mg/kg le 1 <sup>er</sup> j, puis 5 mg/kg en 1 prise les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> j					

## PROPRIÉTÉS

Antipaludéen schizonticide dont l'utilisation est limitée par l'apparition de souches de *P. falciparum* résistantes. Toutes les souches des autres espèces plasmodiales sont restées sensibles à de rares exceptions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et en Amérique du Sud.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou IV, excellente biodisponibilité, bonne distribution tissulaire (se concentre dans les hématies), élimination rénale, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

- Prophylaxie dans les pays du groupe 1, en association avec le **proguanil** dans les pays du groupe 2.
- Traitement curatif de l'accès palustre à *P. vivax*, *ovale* et *malariae*.
- Traitement curatif de l'accès palustre simple à *P. falciparum* dans les pays du groupe 2.

## CONTRE-INDICATIONS

Rétinopathie (sauf traitement curatif).  
Enfant ≤ 5 ans.  
Allergie aux sulfites (forme injectable).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Passage transplacentaire insuffisant pour assurer une chimio prophylaxie des fœtus et nourrissons.

Absorption retardée par les pansements gastriques.

## EFFETS INDÉSIRABLES

En prophylaxie (rares) : prurit, démangeaison, éruptions cutanées lichénoïdes, pigmentation ardoisée des muqueuses et des ongles, toxicité cumulée en cas de dose > 100 g.

En curatif : céphalées, nausées, vomissements, vertiges, choc anaphylactique aux sulfites, colapsus chez l'enfant < 5 ans.

## INTOXICATION

Prise > 25 mg/kg *per os* ou 10 mg/kg par voie IM : céphalées, nausées, vomissements, vertiges, agitation, vision floue, nystagmus, diplopie, mydriase, hypotension, risque d'arrêt cardiaque.

Transport en SAMU jusqu'en réanimation.

Surveillance rythme et fréquence cardiaques.

Si besoin intubation et administration de **diazépam** ou **penthotal**, lavage gastrique, correction de la kaliémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pansements gastriques : diminution de l'absorption (2 h d'intervalle).

## PALUDISME (2)

## ► Les pays de groupe 0

- Afrique : Égypte, Lesotho, Libye, Réunion, Sainte-Hélène, Maroc, Seychelles, Tunisie.
- Amérique : toutes les villes (sauf Amazonie), Antigua et Barbuda, Antilles néerlandaises, Bahamas (sauf Great Exuma), Barbade, Bermudes, Canada, Chili, Cuba, Dominique, États-Unis, Guadeloupe, Grenade, Caïmans, Malouines, Martinique, Porto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago, Uruguay, Îles Vierges.
- Asie : toutes les villes (sauf Inde), Arménie, Brunéi, Guam, Hong Kong, Japon, Kazakhstan, Macao, Maldives, Mongolie, Singapour, Taiwan, Turkménistan.
- Europe : tous les pays sauf la Grèce (y compris Açores, Canaries, Chypre, États baltes, Ukraine, Belarus et Turquie d'Europe).
- Proche-Orient : toutes les villes, Barhein, Émirats arabes unis, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar, Turquie (sauf Sud-Est).
- Océanie : toutes les villes et Australie, Fidji, Hawaï, Mariannes, Marshall, Micronésie,

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Île de Pâques, Polynésie française, Samoa, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna, Kiribati, Cook, Samoa, Niue, Nauru, Palau.

## ► Les pays à transmission sporadique\*

- Afrique : Algérie, Cap Vert, Égypte, Île Maurice.
- Amérique : Bahamas (Great Exuma).
- Asie : Azerbaïdjan, Corée du Nord, Corée du Sud, Fédération de Russie, Georgie du Sud-Est, Kirghizistan, Ouzbékistan, Thaïlande (centre).
- Europe : Grèce, Turquie du Sud-Est.
- Proche-Orient : Oman, Syrie, Turquie du Sud-Est.

## ► Les pays de groupe 1, 2 et 3

Attention, pour certains pays, il peut exister plusieurs zones ce qui justifie de bien considérer l'ensemble du voyage et de se reporter aux recommandations du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'année en cours. Il faut noter des zones de résistances à la méfloquine dans certaines régions d'Asie du Sud-Est.

## Chimioprophylaxie antipaludique chez l'adulte selon les groupes de chimiorésistance\*\*

GROUPE DE CHIMIORÉSISTANCE	POPULATION GÉNÉRALE	FEMME ENCEINTE
Groupe 1	<b>Chloroquine (NIVAQUINE)</b> 100 mg/j séjour + 4 sem. après	
Groupe 2	<b>Chloroquine + proguanil</b> 100/200 mg/j ( <b>NIVAQUINE + PALUDRINE</b> ou <b>SAVARINE</b> ) séjour + 4 sem. après ou <b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j séjour + 1 sem. après	
Groupe 3	<b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j séjour + 1 sem. après	<b>Atovaquone + proguanil</b> 250/100 mg ( <b>MALARONE</b> ) 1 cp./j Peut être envisagé si nécessaire, séjour + 1 sem. après
	<b>Méfloquine</b> 250 mg ( <b>LARIAM</b> ) 1 cp./sem. 10 j avant séjour + 3 sem. après	
	<b>Doxycycline</b> (monohydrate de doxycycline : <b>DOXYPALU</b> , <b>GRANULODOXY-Gé</b> ) 100 mg/j séjour + 4 sem. après	

\* Il est admissible de ne pas prendre de chimioprophylaxie dans ces pays, quelle que soit la durée du séjour. Il est cependant indispensable d'être en mesure, pendant le séjour et dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

\*\* Cf. aussi Paludisme de l'enfant au chapitre Pédiatrie.

## ANTIPALUDÉENS (2)

## ■ Proguanil

<b>PALUDRINE</b>					
En 1 prise au cours du repas toujours associée à la <b>chloroquine</b> A. et E. > 9 ans : 200 mg/j E. 5-8 ans : 150 mg/j E. 1-4 ans : 100 mg/j E. < 1 an : 50 mg/j	56 cp. séc. 100 mg	13,96	II	65 %	0,25

## ■ Proguanil + chloroquine

<b>SAVARINE</b>					
En 1 prise <i>per os</i> au cours du repas A. et E. > 15 ans : 1 cp./j	28 cp. <b>chloroquine</b> 100 mg + <b>proguanil</b> 200 mg	16,50	II	65 %	0,59

**PROPRIÉTÉS**

Biguanide antifolinique schizonticide actif sur certaines souches de sensibilité diminuée à la **chloroquine**.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, absorption de 80 %, métabolisation (30 %) en cycloguanil, élimination rénale (60 %), faible passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**INDICATIONS**

Prophylaxie du paludisme en association avec la **chloroquine** dans les pays du groupe 2 ou en cas de contre-indication ou d'intolérance à la **méfloquine** dans les pays du groupe 3.

**CONTRE-INDICATIONS**

Rétinopathie (sauf traitement curatif).  
Enfant ≤ 5 ans.  
Allergie aux sulfites (forme injectable).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Toujours associer à la **chloroquine**.  
À débiter la veille du départ et poursuivie 4 sem. après le retour.  
Ne permet pas une prophylaxie des fœtus et nourrissons par simple passage transplacentaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Intolérance digestive modérée et transitoire.  
Rares : éruptions cutanées, prurit, dépigmentation cutanée, alopecie, ulcérations buccales, stomatite.



### PALUDISME (3)

#### Océanie : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation du paludisme 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Papouasie-Nouvelle Guinée	Groupe 3	Oui
Salomon (îles)	Groupe 3	Oui
Vanuatu	Groupe 3	Oui

#### Afrique : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation en 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Afrique du Sud	Nord-Est : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Angola	Groupe 3	Oui
Bénin	Groupe 3	Oui
Botswana	Groupe 3	Oui
Burkina Faso	Groupe 3	Oui
Burundi	Groupe 3	Oui
Cameroun	Groupe 3	Oui
Comores	Groupe 3	Oui
Congo	Groupe 3	Oui
Côte-d'Ivoire	Groupe 3	Oui
Djibouti	Groupe 3	Oui
Érythrée	Groupe 3	Oui
Éthiopie	Groupe 3	Oui
Gabon	Groupe 3	Oui
Gambie	Groupe 3	Oui
Ghana	Groupe 3	Oui
Guinée	Groupe 3	Oui
Guinée-Bissau	Groupe 3	Oui
Guinée équatoriale	Groupe 3	Oui
Kenya	Groupe 3	Oui
Libéria	Groupe 3	Oui

## ANTIPALUDÉENS (3)

## ■ Proguanil en association

MALARONE					
A. et E. $\geq 40$ kg : au cours d'un repas ou boisson lactée Préventif : 1 cp./j à heure fixe, débiter la veille du départ, poursuivre 7 j après sortie zone Curatif (accès simple) : 4 cp./j en 1 prise x 3 j	12 cp. enf. <b>atovaquone</b> 62,5 mg + <b>proguanil</b> 25 mg	30,99	I	NR	2,58
	12 cp. <b>atovaquone</b> 250 mg + <b>proguanil</b> 100 mg		I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

L'**atovaquone** est un inhibiteur des fonctions mitochondriales, schizonticide, synergique avec le **proguanil** sur *P. falciparum*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, faible absorption (20 %) favorisée par la prise de graisse, aucun métabolisme, demi-vie de 2-3 j, élimination par voie hépatique et biliaire.

## INDICATIONS

Traitement préventif et curatif (accès simple) du paludisme à *P. falciparum*, en association avec le **proguanil**, dans les pays des groupes 2 et 3.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse et allaitement : innocuité non démontrée.  
Enfant de moins de 40 kg.  
Allergie connue.  
Insuffisances rénales ou hépatiques graves.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de vomissements, redonner 1 dose 1 h plus tard.  
À débiter la veille du départ et poursuivre 4 sem. après le retour.  
Durée limitée à 3 mois.  
Déconseillée avec **métoclopramide (PRIM-PÉRAN)**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, céphalées, anomalies réversibles des tests hépatiques, hyponatrémie, hyperamylasémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Antagonismes *in vitro* avec **méfloquine** et **artésunate**.  
Concentrations sanguines diminuées par **rifampicine**, **rifabutine**, **métoclopramide**, **tétracyclines**.  
Diminue concentrations sanguines d'**indinavir**.

**PALUDISME (4)****Afrique (suite) : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie**

Pays	Situation en 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Madagascar	Groupe 3	Oui
Malawi	Groupe 3	Oui
Mali	Groupe 3	Oui
Mauritanie	Groupe 3	Oui
Mayotte (Île de)	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Mozambique	Groupe 3	Oui
Namibie	Groupe 3	Oui
Niger	Groupe 3	Oui
Nigéria	Groupe 3	Oui
Ouganda	Groupe 3	Oui
Rép. centrafricaine	Groupe 3	Oui
Rép. dém. du Congo (ex-Zaïre)	Groupe 3	Oui
Rwanda	Groupe 3	Oui
Sao Tomé et Príncipe	Groupe 3	Oui
Sénégal	Groupe 3	Oui
Sierra Leone	Groupe 3	Oui
Somalie	Groupe 3	Oui
Sud Soudan	Groupe 3	Oui
Swaziland	Groupe 3	Oui
Tanzanie	Groupe 3	Oui
Tchad	Groupe 3	Oui
Togo	Groupe 3	Oui
Zambie	Groupe 3	Oui
Zimbabwe	Groupe 3	Oui

\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

## ANTIPALUDÉENS (4)

## ■ Méfloquine

LARIAM					
<i>Prophylaxie palustre</i> : 1 cp./sem. à débiter 10 j avant le départ (cf. Précautions d'emploi) et poursuivre 3 sem. après la sortie de la zone à risque > 45 kg : 250 mg > 30 kg : 200 mg > 20 kg : 100 mg > 15 kg : 50 mg <i>Traitement curatif</i> : > 60 kg : 3 puis 2 puis 1 cp. 250 mg à 8 h d'intervalle > 45 kg : 3 puis 2 cp. 250 mg à 8 h d'intervalle > 15 kg : 25 mg/kg en 1 prise Ne pas reprendre la prophylaxie après le traitement curatif	8 cp. 250 mg	33,11	I	65 %	4,14

## PROPRIÉTÉS

**Antipaludéen** schizonticide actif sur les souches de *P. falciparum* chloroquino-résistantes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, variations interindividuelles d'absorption et de concentrations plasmatiques, métabolisation hépatique en dérivé inactif, élimination biliaire lente en 7 à 40 j.

## INDICATIONS

- Prophylaxie des accès palustres à *P. falciparum* dans les pays du groupe 3 (**séjour < 3 mois**), y compris chez la femme enceinte.
- Traitement curatif des accès palustres à *P. falciparum* au retour des pays du groupe 3.

## CONTRE-INDICATIONS

## Allaitement.

Antécédents convulsifs et troubles neuropsychiatriques.

Insuffisance rénale ou hépatique.

Enfant de moins de 15 kg.

Association au valproate de sodium (**DÉPAKINE**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1 cp./sem. à débiter environ 10 j avant le départ pour vérifier la bonne tolérance de la

**méfloquine** après la 2<sup>e</sup> prise (10-20 % d'effets secondaires) et à poursuivre 3 sem. après la sortie de zone à risque.

Contraception efficace pendant et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : céphalées et vertiges (5 %), nausées, vomissements, diarrhée, gastralgies, anorexie, insomnie, obnubilation, accès maniaque ou dépressif, convulsions, confusion mentale, épisodes psychotiques.

En cas de traitement curatif, les complications neuropsychiatriques sont de l'ordre de 1 pour 200 à 1 pour 1 700.

Rares : réactions cutanées allergiques, élévation des transaminases, bradycardie sinusale, extrasystoles.

## PROPRIÉTÉS

Contre-indiqué : **valproate de sodium**.

Déconseillés : **quinine IV** (intervalle libre de 12 h), **β-bloquants** (bradycardie).

La fréquence des effets indésirables doit être prise en compte dans la prophylaxie et nécessite de tester le médicament 10 j avant le départ.

## PALUDISME (5)

## Asie : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation du paludisme 2013/ Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Afghanistan	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Arabie saoudite	Sud, Ouest : groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Bangladesh	Dhaka : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Bhoutan	Groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Cambodge	Groupe 3	Oui
Chine**	Yunnan et Hainan : groupe 3	Oui
	Nord-Est : groupe 1***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Inde**	États du Nord-Est : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 2	
Indonésie	Bali : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Iran	Sud-Est : groupe 3	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 1***	
Iraq	Zone rurale du Nord (provinces de Duhok, Erbil et Sulaimaniya) : groupe 1***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Laos	Groupe 3	Oui
Malaisie	Zones urbaines et côtières : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Myanmar (ex-Birmanie)	Groupe 3	Oui
Népal	Terai : groupe 2	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Pakistan	Groupe 3	Oui
Philippines	Groupe 3	Oui
Sri Lanka	Groupe 2***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Tadjikistan	Groupe 2***	Oui (facultative pour un séjour < 7 j*)
Thaïlande	Régions frontalières avec le Cambodge et le Myanmar : groupe 3	Oui
	Reste du pays : zones de transmission sporadique	Non
Timor Leste	Groupe 3	Oui
Vietnam	Bande côtière et des deltas : groupe 0	Non
	Reste du pays : groupe 3	Oui
Yémen	Île de Socotra : groupe 1	Oui
	Reste du pays : groupe 3	

\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

\*\* Pays pour lesquels la situation est complexe selon les régions, se reporter à la liste des pays dans OMS, Voyages internationaux et santé

\*\*\* Essentiellement *Plasmodium vivax*.

## ANTIPALUDÉENS (5)

## ■ Halofantrine

HALFAN					
Traitement curatif à renouveler 8 j plus tard (avec augmentation du risque de complications cardiaques) A. et E. > 40 kg : 6 cp. à raison de 2 cp. toutes les 6 h E. 32-40 kg : 300 mg x 3 E. 23-31 kg : 250 mg x 3 E. 16-22 kg : 200 mg x 3 E. 13-15 kg : 150 mg x 3 E. 10-12 kg : 100 mg x 3		6 cp. 250 mg 9 c-mes. (susp. buv. 100 mg/mes.)		I I	NR NR

## PROPRIÉTÉS

Antipaludéen efficace sur les souches de *Plasmodium falciparum* chloroquino-résistants.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os*, absorption augmentée par une alimentation riche en lipides, biodisponibilité variable d'un sujet à l'autre, métabolisé en dérivé actif, élimination fécale, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

Traitement des accès palustres simples à *P. falciparum* déconseillé en 1<sup>re</sup> intention en raison du risque de complications cardiaques rares mais potentiellement mortelles.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Allongement de l'espace QT : risque de torsades de pointes.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec une extrême prudence en raison du risque de complication cardiaque mortelle. Réaliser un ECG avant le début du traitement pour vérifier la longueur de l'espace QT et avant le voyage en cas de traitement pré-somptif. Prendre en dehors des repas (risque de surdosage).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : diarrhée (7 %), douleurs abdominales (6 %), nausées (5 %), vomissements (4 %).  
 Prurit, éruptions cutanées, élévation transitoires des transaminases, toux, céphalées, vertiges, myalgies, frissons.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Médicaments favorisant les torsades de pointes :** amiodarone, sotalol, brétylium, disopyramide, quinidiniques, érythromycine IV, sultopride, vincamine, astémizole, terféndine, cibenzoline, quinine, hypokaliémisants.

## PALUDISME (6)

## Amérique : situation du paludisme et indication de la chimioprophylaxie

Pays	Situation du paludisme 2013/Groupe de résistance	Chimioprophylaxie
Argentine	Régions rurales du nord-ouest et frontière avec le Paraguay : groupe 1	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays, y compris les chutes d'Iguazu : groupe 0	Non
Belize	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Bolivie	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Brésil	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Colombie	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays groupe 2	
Costa Rica	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Équateur	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Guatemala	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Guyana	Groupe 3	Oui
Guyane	Fleuves frontaliers : groupe 3	Oui
	Zone côtière : groupe 0	Non
Haïti	Groupe 1	Oui
Honduras	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Jamaïque	Agglomération de Kingston : groupe 1	Oui
	Reste du pays : groupe 0	Non
Mexique	Yuacatan : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Nicaragua	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Panama	Ouest : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Est : groupe 3	Oui
Paraguay	Est : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
	Reste du pays : groupe 0	Non
Pérou	Amazonie (Loreto) : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Rép. dominicaine	Groupe 1	Oui
Salvador (El)	Groupe 1*	Oui (facultative pour un séjour < 7 j**)
Surinam	Groupe 3	Oui
Venezuela	Amazonie : groupe 3	Oui
	Reste du pays : groupe 1*	

\* Essentiellement *Plasmodium vivax*.

\*\* Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.

## ANTIPALUDÉENS (6)

## ■ Chlorhydrate de quinine

<b>QUININE CHLORHYDRATE LAFRAN</b>					
<b>82 % de quinine base</b> <i>Traitement curatif</i> , durée de 7 j : A. et E. : 24 mg/kg/j de <b>quinine</b> base en 3 prises <i>per os</i> toutes les 8 h (soit 500 mg x 3/j pour un poids de 60 kg) <i>Prophylaxie</i> : A. : 250-500 mg/j	20 cp. 250 mg (204 mg de <b>quinine</b> base)	6,76	I	65 %	0,34
	20 cp. 500 mg (409 mg de <b>quinine</b> base)	12,97	I	65 %	0,65

## ■ Bichlorate de quinine + quinine + cinchonine + cinchonidine

<b>QUINIMAX</b>					
<b>64 % de quinine base</b> Idem chlorhydrate de quinine Soit 500 mg x 3/j pour un poids de 60 kg <b>QUINIMAX IV</b> <i>Traitement curatif</i> du paludisme En 3 inj. de 8 mg/kg de <b>quinine</b> base : - à passer en 4 h dans 250 mL de glucosé à 5 % ou - à passer à la seringue électrique en continue sur 8 h dans du sérum physiologique A. et E. : 24 mg/kg/j (max. 1 800 mg/j) Un relais <i>per os</i> est possible par <b>quinine</b> ou <b>méfloquine</b>	18 cp. séc. 125 mg	36,38	I	65 %	2,02
	9 cp. séc. 500 mg	36,38	I	65 %	4,04
	3 amp. de 1 mL à 125 mg (soit 64 mg de <b>quinine</b> base)	105,48	I	65 %	35,16
	3 amp. de 2 mL à 250 mg (soit 128 mg de <b>quinine</b> base)	105,48	I	65 %	35,16



## PALUDISME (7)

## Traitement

Le traitement curatif dépend de l'espèce plasmodiale (*falciparum* ou autre), du risque de chloroquinorésistance qui évolue chaque année et de la gravité.

Tout accès fébrile pendant le séjour ou après le retour d'une zone endémique doit être considéré comme palustre jusqu'à preuve du contraire.

**Accès palustre à *Plasmodium vivax*, *ovale* et *malariae***

**Chloroquine (NIVAQUINE).**

► Chez l'adulte (y compris femme enceinte)

J1 : 600 mg puis 300 mg 6 h plus tard.

De J2 à J3 ou à J5 : 300 mg/j en 1 prise.

► Chez l'enfant


J1 : 10 mg/kg puis 5 mg/kg 6 h plus tard.

De J2 à J3 ou à J5 : 5 mg/kg/j en 1 prise.

► En cas de vomissements

Il est possible (sauf chez le jeune enfant) d'administrer la **chloroquine** en IM à la dose de 2,5 à 3,5 mg/kg toutes les 6 h puis relais *per os* dès que possible.

**Accès palustre à *P. falciparum***



► **Accès simple (pas de vomissements)**

Traitement ambulatoire si les conditions sont remplies (cf. Encadré).

• Traitements de choix

**Proguanil-atovaquone (MALARONE)** 4 cp./j pendant 3 j chez l'adulte et l'enfant  $\geq 40$  kg. Très cher, bien toléré. En cas de vomissements, redonner 4 cp. 1 h plus tard.

**Arthéméter-luméfanantrine (RIAMET)**, à partir de 12 ans et 35 kg, prendre 4 cp. en 1 prise à H0, H8, H24, H36, H48 et H60 avec prise alimentaire ou boisson avec corps gras.

• Traitements alternatifs

**Quinine (QUINIMAX)** 24 mg/kg/j en 3 prises pendant 7 j sans dépasser 1 800 mg chez l'adulte (ou association **arthéméter-luméfanantrine**, **RIAMET** en cas de risque de sensibilité diminuée à la quinine).

**Méfloquine (LARIAM)** 25 mg/kg en 2 ou

3 prises espacées de 6 à 12 h soit 3 cp. + 2 cp. (+ 1 cp. si poids  $\geq 60$  kg). Risques d'intolérance, traitement coûteux mais court.

**Halofantrine (HALFAN)** : à utiliser avec la plus extrême prudence en raison du risque de complication cardiaque mortelle. 25 mg/kg en 3 prises espacées de 6 h, soit 2 cp. + 2 cp. + 2 cp. (après réalisation d'un ECG pour éliminer un allongement de l'espace QT). Réaliser une 2<sup>e</sup> cure au 7<sup>e</sup> j (risque cardiaque accru). Ne pas poursuivre la prophylaxie en France.

• Traitement de réserve (autotraitement)

En cas de situation d'isolement à plus de 12 h d'une structure de soins. Ne dispense pas d'une consultation médicale.

► **Accès simple avec vomissements**

À traiter comme un accès grave sans hospitalisé en réanimation.

**ANTIPALUDÉENS (7) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Alcaloïde du quinquina, schizonticide et faiblement gamétocytocide, de mécanisme d'action mal connu, actif sur toutes les souches plasmodiales à de rares exceptions en Asie du Sud-Est.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os* ou IV, bonne biodisponibilité (90 %), bonne distribution (LCR 7 % de la concentration sanguine), métabolisation hépatique, élimination rénale totale (100 %), passage transplacentaire et dans le lait maternel.

**INDICATIONS**

- Traitement curatif du paludisme en particulier de l'accès pernicieux.
- Prophylaxie palustre en zone de chloroquinorésistance.
- Traitement de la babésiose (en association avec la **clindamycine**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Troubles de la conduction intraventriculaire.  
Fièvre bilieuse hémoglobinurique.  
Allergie à la **quinine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser la voie intramusculaire.  
Surveillance des concentrations sanguines de quinine à partir de la 24<sup>e</sup> h : thérapeutiques entre 8 et 15 mg/L et toxiques au-dessus de 15 mg/L.

Surveillance glycémique toutes les 6 h.

Relais *per os* dès l'apyrexie par **quinine** ou autre **antipaludéen** (**LARIAM**, ou **MALARONE** avec un délai de 12 h après la dernière perfusion).

Hémolyse en cas de déficit en G6PD.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypoglycémie dose-dépendante, hypotension, thrombopénie, intolérance veineuse.

Cinchonisme (effets secondaires de la **quinine**) : troubles auditifs (acouphènes, hypoaousie, surdité), visuels (amblyopie, troubles de la vision des couleurs), digestifs (nausées, douleurs abdominales) et neurologiques (céphalées, vertiges) qui peuvent apparaître quand la quininémie dépasse 5 mg/L, disparaissent à l'arrêt du traitement et ne justifient pas d'interruption thérapeutique.

Allergies (rares) : fièvre, urticaire, bronchospasme, hémolyse, thrombopénie, agranulocytose.

**INTOXICATION**

Amaurose et risque de cécité définitive, surdité, convulsions, hypotension, troubles de la conduction intraventriculaire ou auriculo-ventriculaire justifiant une hospitalisation en réanimation avec surveillance électrocardiographique continue, lavage gastrique et absorption de charbon.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Méfloquine** (augmentation du risque de convulsions).

**Halofantrine** (risque d'augmentation de l'espace QT et de torsades de pointes).

La fièvre bilieuse hémoglobinurique :

- est exceptionnelle ;
- est un syndrome hémolytique aigu (ictère et hémoglobinurie) avec un collapsus ;
- survient chez des sujets qui ont déjà consommé antérieurement de la **quinine** ;
- serait de nature allergique.

**Exemple d'ordonnance pour un homme de 70 kg**

**QUINIMAX** dilué dans du glucosé 10 %.

Dose de charge de 1 200 mg à la seringue électrique (SE) en 4 h, puis 4 h d'interruption, puis 500 mg en 8 h à la SE x 3 par jour.

## PALUDISME (8)

## ► Accès palustre grave

## Critères de définition du paludisme grave d'importation de l'adulte

Pronostic	Critères cliniques ou biologiques	Pronostic
+++	Toute défaillance neurologique incluant : – obnubilation, confusion, somnolence, prostration – coma avec score de Glasgow < 11	+++
+++	Toute défaillance respiratoire incluant : – si VM ou VNI : $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 30$ mmHg – si non ventilé : $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg et/ou $\text{SpO}_2 < 90$ % en air ambiant et/ou $\text{FR} > 32/\text{min}$ – signes radiologiques : images interstitielles et/ou alvéolaires	+
+++	Toute défaillance cardiocirculatoire incluant : – pression artérielle systolique < 80 mmHg en présence de signes périphériques d'insuffisance circulatoire – patient recevant des drogues vasoactives quel que soit le chiffre de pression artérielle – signes périphériques d'insuffisance circulatoire sans hypotension	++
++	Convulsions répétées : au moins 2/24 h	+
++	Hémorragie : définition clinique	+
+	Ictère : clinique ou bilirubine totale > 50 $\mu\text{mol/L}$	+++
+	Hémoglobininurie macroscopique	+
+	Anémie profonde : hémoglobine < 7 g/dL, hématocrite < 20 %	+
+	Hypoglycémie : glycémie < 2,2 mmol/L	+
+++	Acidose : – bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/L – ou acidémie avec $\text{pH} < 7,35$ (surveillance rapprochée dès que bicarbonates < 18 mmol/L)	++
+++	Toute hyperlactatémie : – dès que la limite supérieure de la normale est dépassée – a fortiori si lactate plasmatique > 5 mmol/L	++
+	Hypersparasitémie : dès que parasitémie > 4 %, notamment chez le non-immun (selon les contextes, les seuils de gravité varient de 4 à 20 %)	+++
++	Insuffisance rénale : – créatininémie > 265 $\mu\text{mol/L}$ ou urée sanguine > 17 mmol/L – et diurèse < 400 mL/24 h malgré réhydratation	+++
VM : ventilation mécanique ; VNI : ventilation non invasive ; FR : fréquence respiratoire		

## ANTIPALUDÉENS (8)

## ■ Artéméthér + luméfantrine

RIAMET				
A., E. > 12 ans ou > 35 kg : 6 x 4 cp. en 60 h (H0, H8, H24, H36, H48, H60) À prendre avec un aliment ou une boisson Réadministrer la dose en cas de vomissement Non recommandé chez l'enfant < 12 ans ou < 35 kg	24 cp. 20 mg <b>artéméthér</b> + 120 mg <b>luméfantrine</b>		I	NR

## PROPRIÉTÉS

Associations de 2 **antipaludiques** : l'**arthéméter** (dérivé de l'artémisine de mode d'action inconnu) et la **luméfantrine** (dérivé de l'halofantrine). Pas de résistance connue.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption rapide augmentée par la prise d'aliments. Demi-vie : 2 h.

## INDICATIONS

Accès palustre non compliqué à *Plasmodium falciparum* chez les sujets âgés de plus de 12 ans avec un poids corporel > 35 kg.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse (1<sup>er</sup> trimestre), allaitement.  
Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Insuffisance rénale ou hépatique sévère.  
Cardiopathie, bradycardie, allongement de l'espace QT (**luméfantrine**), antécédent familial de mort subite.  
Hypokaliémie, hypomagnésémie.  
Prise concomitante de médicaments allongeant l'espace QT : **antiarythmiques Ia et III, antipsychotiques, antidépresseurs, macrolides, fluoroquinolones, imidazolés, triazolés.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans les accès palustres sévères, le neuropaludisme, ni en prophylaxie. En cas d'aggravation sous traitement, administrer immédiatement une autre molécule.

Surveillance électrocardiographique et hydroélectrolytique.

Réservé aux traitements de *P. falciparum*.

Éviter l'association avec d'autres **antipaludéens**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, vertiges, troubles du sommeil, contractions musculaires involontaires, parés-thésies, ataxie.

Palpitations, allongement asymptomatique l'espace QT.

Toux, douleurs abdominales, anorexie, diarrhée, nausées, vomissements.

Purrit, éruption cutanée.

Myalgies, arthralgies, asthénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Molécules allongeant l'espace QT (cf. Contre-indications).

**PALUDISME (9)**

Un accès palustre peut survenir malgré une chimioprophylaxie bien suivie. La durée d'incubation minimale est de 7 j.

- Hospitalisation en soins intensifs.
- Urgence thérapeutique +++.

**Artésunate IV (MALACEF)** : en ATU, 2,4 mg/kg à 0, 12 et 24 h, puis toutes les 24 h pendant 3 j. Un relais oral peut être pris de préférence par une association contenant un dérivé d'artémisinine (**RIAMET**).

**Quinine IV (QUINIMAX)** : après une dose de charge de 16 mg/kg au cours de la 1<sup>re</sup> perf. : 24 mg/kg/j de **quinine** base en 3 perfusions de 4 h diluée dans du glucosé avec changement de seringue électrique toutes les 8 h (dose maximale de 1 800 mg/j). En cas d'insuffisance rénale : diminuer la dose à 48 h de traitement. Surveiller la quininémie (8-15 mg/L). Surveiller la glycémie toutes les 4 h.

**Cas particuliers**

Femmes enceintes : seule la **quinine** peut être prescrite mais l'artésunate peut être utilisé si le bénéfice escompté est supérieur au risque potentiel pour le fœtus.

Risque de souche de moindre sensibilité à la **quinine** (certaines zones d'Asie du Sud-Est et d'Amazonie) : **arthéméter-luméfantine (RIAMET)** ou artésunate IV (**MALACEF**).

## ANTIPALUDÉENS (9)

## ■ Artésunate

MALACEF					
Traitement de 3 jours : 2,4 mg/kg avec un débit de 3 mL/min 3 administrations à 12 h d'intervalle puis toutes les 24 h Un relais <i>per os</i> est à réaliser dès que possible à l'issue des 3 j Si ce relais est impossible, la durée max. du traitement est de 7 j		1 fl. pdre/solvant pour sol. inj.	ATU	I	

Ce médicament est disponible sous ATU nominative, cela implique des démarches de prescription, d'information du patient et de pharmacovigilance spécifiques en relation avec le pharmacien et l'ANSM (ex-Afssaps).

## PROPRIÉTÉS

Dérivé hémisynthétique de l'artémisinine. La présence de l'ester de succinate lui confère une solubilité compatible avec la réalisation de cette forme injectable par voie IV.

## INDICATIONS

Traitement en première intention de l'accès palustre grave à *Plasmodium falciparum*.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**artésunate** ou un des dérivés de l'artémisinine.

Grossesse (sauf en cas de bénéfice jugé supérieur au risque), allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Un suivi hématologique est à réaliser en raison des effets indésirables potentiels.


Les examens suivants doivent être réalisés à J3, J7, J14, J21 et J28 : NFS, taux de réticulocytes, de LDH et d'haptoglobine. En cas d'anémie, un bilan étiologique doit être réalisé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Caractéristiques des dérivés de l'artémisinine : rash, prurit, toux, vertiges, acouphènes, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, bradycardie, allongement de l'intervalle QT, fièvre, céphalées, insomnies, asthénie, polyurie.

Anomalies biologiques notables : anémie avec abaissement réversible du taux de réticulocytes, augmentation transitoire des transaminases hépatiques.

## PALUDISME (10)



## ANTIPALUDÉENS (10)

## ■ Pipéraquine + dihydroartémisinine

<b>EURARTESIM</b>					
1 prise/j pendant 3 j consécutifs à heure fixe avec de l'eau et à distance > 3 h de toute prise alimentaire La posologie est à adapter en fonction du poids du patient puisque le traitement est possible dès 5 kg de poids corporel 24-36 kg : 640 mg/80 mg 36-75 kg : 60 mg/120 mg 75-100 kg : 1 280 mg/160 mg Il est possible d'effectuer 2 cures au maximum en 12 mois et à 2 mois d'intervalle minimum	3 cp. séc.	HOP	I		
	160 mg/20 mg 12 cp. séc. 320 mg/40 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Demi-vie : 22 j.

La **pipéraquine** est un analogue structural de la **chloroquine** contenant deux noyaux quino-  
léiques chlorés et ce composé possède une  
bonne activité sur les souches de *Plasmodium*  
résistantes à la **chloroquine**.

La **dihydroartémisinine** est le second **antipa-  
ludéen** présent dans cette spécialité, il peut  
être également nommé arténimol.

**INDICATIONS**

Traitement du paludisme non compliqué à  
*P. falciparum* dès l'âge de 6 mois et pour un  
poids ≥ 5 kg.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **pipéraquine** ou la **dihy-  
droartémisinine**.  
Paludisme sévère.

Risque d'allongement ou allongement avéré de  
l'intervalle QT d'origine physiopathologique ou  
iatrogène.

En cas d'arythmie et de des troubles électroly-  
tiques suivants : hypokaliémie, hypocalcémie  
et hypomagnésémie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une surveillance cardiaque par ECG doit être  
réalisée au plus tôt puis répétée régulièrement.  
La prise alimentaire lors de la prise augmente  
l'absorption et présente un risque de toxicité.  
Il n'y a pas de données disponibles à ce jour  
concernant les patient âgés ≥ 65 ans ou pré-  
sentant une insuffisance rénale/hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les plus fréquents : anémie, céphalées, allon-  
gement de l'intervalle QTc, tachycardie, asthé-  
nie, fièvre, toux, troubles intestinaux, syn-  
drome grippal, arthralgies, myalgies, anomalies  
du bilan hépatique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Avec les médicaments allongeant l'intervalle  
QT.

Les inhibiteurs du CYP3A4 présente un risque  
de surdosage toxique alors que les inducteurs  
de ce CYP peuvent rendre inefficace le trai-  
tement.

Deux autres CYP sont touchés par l'**EURARTE-  
SIM** : inhibition légère des CYP2C19 et  
CYP1A2.



## PALUDISME (11)

### Qui hospitaliser en réanimation ?

#### Les adultes ayant au moins 1 critère de gravité :

- *Unité lourde* : coma (score de Glasgow < 11), convulsions répétées, défaillance respiratoire, circulatoire, acidose métabolique et/ou hyperlactatémie, hémorragie grave, insuffisance rénale nécessitant un épuration, parasitémie > 15 %.
- *Unité de surveillance continue* :
  - risque d'aggravation rapide (confusion/obnubilation, convulsion isolée, hémorragie mineure, ictère franc isolé, parasitémie entre 10 et 15 %, insuffisance rénale modérée, anémie isolée bien tolérée) ;

– patients vulnérables (âgé, comorbidités, co-infection bactérienne, traitement par quinine IV).

- *Unité de médecine* : aucun précédent, y compris parasitémie isolée < 10 %, ictère isolé.

#### Les enfants :

- *Réanimation* : un critère de gravité OMS : prostration, dysfonction d'organe (trouble de conscience, convulsions, dyspnée ou défaillance circulatoire), hypoglycémie.
- *Soins continus ou en pédiatrie générale* : absence de ces signes de gravité y compris en cas de parasitémie isolée < 10 %.

### Critères de gravité de l'accès palustre à *P. falciparum* (OMS)\*

#### Signes mineurs

- Obnubilation ou prostration.
- Parasitémie  $\geq 5\%$  chez un sujet non immun.
- Ictère avec bilirubinémie > 50  $\mu\text{mol/L}$ .
- Hyperthermie (> 41 °C) ou hypothermie (< 36 °C).

#### Signes majeurs

- Troubles de conscience.
- Crises convulsives généralisées répétées.
- Collapsus.

- Hémoglobinurie massive.
- Hémorragie diffuse, coagulation intravasculaire disséminée.
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumopathie associée.
- Insuffisance rénale (diurèse < 400 mL, créatininémie > 265  $\mu\text{mol/L}$ ).
- Acidose métabolique (pH < 7,25, bicarbonates < 15 mmol/L).
- Hypoglycémie < 2,2 mmol/L.

\* NB : Les vomissements imposent un recours à la **quinine** intraveineuse.

## ANTIPALUDÉENS (11)

## Interactions médicamenteuses entre antipaludéens et immunosuppresseurs\*

	Modification de l'exposition (AUC**)				Métabolisme par le CYP3A4
	de la ciclosporine	du tacrolimus	du sirolimus	du mycophénolatemofétil	
<b>Chloroquine</b>	Oui	Non***	Non	Non	Oui
<b>Proguanil</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Atovaquone</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Méfloquine</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Doxycycline</b>	Oui****	Non	Non	Non	Non

## Adaptation des doses d'antipaludéens chez l'insuffisant rénal

Clairance de la créatinine (mL/min)	90-60	60-30	30-15	< 15 et hémodialyse	Dialyse péritonéale continue ambulatoire
<b>Chloroquine NIVAQUINE</b>	100 à 50 mg/j	60-40 mL/min : 50 mg/j 40-30 mL/min : 50 à 25 mg/j	25 mg/j	12,5 mg/j après la séance	12,5 mg/j
<b>Paludrine PROGUANIL</b>	200 mg/j	100 mg/j	50 mg toutes les 48 h	50 mg/sem. après la séance	50 mg/sem.
<b>Choroquine + proguanil SAVARINE</b>	80-90 mL/min : 1 cp./j 60-80 mL/min : administrer les 2 principes actifs séparément	60-40 mL/min : 1/2 cp. 40-30 mL/min : administrer les 2 principes actifs séparément	Administrer les 2 principes actifs séparément		
<b>Proguanil + atovaquone MALARONE</b>	1 cp./j	Adaptation impossible de l' <b>avotaquone</b> Choisir une alternative			
<b>Méfloquine LARIAM</b>	250 mg/sem.			250 mg/sem. après la séance	250 mg/sem.
<b>Doxycycline DOXYPALU</b>	100 mg/j			100 mg/j Non dialysable	100 mg/j

\* ICAR 2006, [www.soc-nephrologie.org/ICAR/lettre.htm](http://www.soc-nephrologie.org/ICAR/lettre.htm)

\*\* Aire sous la courbe

\*\*\* Pas de cas rapportés, mais une interaction est théoriquement possible par analogie avec la **ciclosporine** ou par interaction au niveau des transporteurs

\*\*\*\* Cas isolé

## ANTI-HELMINTHIQUES (1)

## ■ Flubendazole

<b>FLUVERMAL</b>				
Oxyurose (en 1 prise unique à renouveler 2-3 sem. plus tard) E. : 100 mg, A. : 200 mg Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose : A. et E. : 100 mg x 2/j pendant 3 j	6 càc (fl. 100 mg/càc) 6 cp. séc. 100 mg	3,59 3,29	65 % 65 %	0,60 0,55

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé du mébendazole actif sur les helminthes.

**INDICATIONS**

– Oxyurose : enfants : croquer 1 cp. à 100 mg (quel que soit l'âge). Adultes : 200 mg en 2 prises espacées de 10-12 h. Renouveler la cure après 2 à 3 sem. pour éviter l'autoréinfestation. Traiter les autres membres de la famille + mesures hygiéno-diététiques.

– Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose : 200 mg/j pendant 3 j à prendre en 2 prises espacées de 10-12 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Occasionnels : nausées, diarrhées, douleurs abdominales, migration de l'ascaris à travers la bouche et le nez.

## ■ Pamoate de pyrantel

<b>COMBANTRIN</b>				
Ascariidase, oxyurose (en 1 prise per os) : 10 mg/kg en 1 prise per os : 10 mg/kg en 1 prise unique Ankylostomose et nécatérose : 2 cp. pour 10 kg pendant 2-3 j	6 cp. séc. 125 mg 6 mes. (susp. buv. à 125 mg/mes.)	2,73 3,02	65 % 65 %	0,46 0,50
<b>HELMINTOX</b>				
Idem <b>COMBANTRIN</b> + Trichinose : 10-15 mg/kg en 1 prise unique	6 cp. séc. 125 mg 3 cp. séc. 250 mg 6 mes. (susp. buv. à 125 mg/mes.)	2,11 2,50 2,32	65 % 65 % 65 %	0,35 0,83 0,39

**PROPRIÉTÉS**

**Anti-helminthiques** paralysant les vers qui vont être éliminés par le péristaltisme intestinal.

**INDICATIONS**

– Oxyurose, ascariidase et ankylostomose peu sévère à *Ankylostoma duodenale* : 10 mg/kg en 1 prise.  
– Ankylostomose sévère à *A. duodenale* ou nécatérose *Necator americanus* : 1 à 2 cp./10 kg pendant 2-3 j consécutifs.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non établie.

Insuffisance hépatique.

Association à la **pipérazine**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (15 %) : anorexie, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales.

Rares : céphalées, somnolence, vertiges, rashes, élévation modérée et transitoire des transaminases.

## PARASITOSE DIGESTIVES (2)

### Trichocéphalose

*Trichuris trichiura* est un nématode qui vit à l'état adulte fixé dans la muqueuse cæcale. Son cycle est très proche d'*Ascaris*. Les enfants peuvent être infestés massivement.

#### Diagnostic

- Asymptomatique ou diarrhée chronique favorisant la dénutrition et le retard de croissance. Prolapsus rectal en cas d'infestation massive.
- Découverte des œufs dans les selles.

#### Traitement

- Au choix : **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **ZENTEL** 200 à 400 mg en 1 prise.
- Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Ankylostomose

*Necator americanus* et *Ankylostoma duodenale* sont responsables dans les régions intertropicales de l'infestation de 20 à 70 % de la population. Leurs œufs qui résident dans le sol donnent des larves capables de traverser activement la peau de l'hôte. Elles gagnent la circulation sanguine puis le poumon pour être enfin dégluties vers le duodénum. Après s'être fixés par leur large bouche dans la muqueuse duodénale, les adultes se nourrissent du sang de l'hôte.

#### Diagnostic

- Dermatite et syndrome de Loeffler pendant la phase d'invasion ; douleurs abdominales, nausées, anémie par carence martiale, œdèmes.
- Découverte des œufs dans les selles.

#### Traitement

- Au choix : **VERMOX** 200 mg x 2/j (adultes) ou 3 mg/kg/j (enfants) pendant

3 j, **FLUVERMAL** 100 mg x 2/j pendant 3 j, **COMBANTRIN** 12,5 mg/kg/j (ou 3 cp. à 125 mg x 2/j chez l'adulte) pendant 2 j, **ZENTEL** 400 mg en 1 prise.

Contrôle parasitologique à 1 mois.

### Anguillulose

*Strongyloides stercoralis* vit dans les pays tropicaux (y compris les Antilles françaises). Le cycle parasitaire est très proche de celui des ankylostomes. Des réinfestations sont possibles et expliquent la persistance de la maladie pendant plusieurs décennies (une hyperéosinophilie chronique). À l'occasion d'une immunodépression (corticothérapie), une forme généralisée peut survenir (anguillulose maligne) dont l'évolution est souvent mortelle.

#### Diagnostic

- À la phase de migration : syndrome de Loeffler possible ; à la phase d'état : asymptomatique, troubles digestifs, diarrhée.
- Hyperéosinophilie oscillante.
- Découverte des larves dans les selles par la technique de concentration de Baermann (excrétion intermittente nécessitant  $\geq 3$  examens de selles).
- Sérologie peu sensible et peu spécifique.

#### Traitement

- Au choix : ivermectine **STROMEKTOL** 200 µg/kg (12 mg chez l'adulte) en 1 prise unique (85-90 % de guérison) ou **ZENTEL** 10 mg/kg pendant 7 j pour une efficacité équivalente car à la dose de l'AMM (1 cp./j x 3 j), l'efficacité est de 40 %.
- Contrôle parasitologique tous les mois pendant 6 mois.

Un traitement prophylactique est nécessaire avant un traitement par **corticoïde** ou **immunosuppresseur** chez un malade issu d'une zone d'endémie.

## ANTI-HELMINTHIQUES (2)

## ■ Albendazole

ZENTEL					
Ascariodiose, oxyurose, trichocéphalose, ankylostomose : 400 mg en 1 prise orale à renouveler 15-20 j plus tard A. et E. > 2 ans (oxyure : 200 mg suffisent chez l'enfant de 2-6 ans) Strongyloïdose : 800 mg/j x 3 j à renouveler 2-3 sem. plus tard Neurocysticercose : 5 mg/kg/j en 2-3 prises x 8 j associées à une corticothérapie	1 cp. 400 mg 1 fl. de susp. buv. 400 mg	3,69	II	65 %	3,69
		3,96	II	65 %	3,96
ESKAZOLE					
Idem ZENTEL	56 cp. 400 mg	HOP	II		

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé des benzimidazoles, inhibiteur de la polymérisation de la  $\beta$ -tubuline qui agit sur de nombreux cestodes et nématodes.

**INDICATIONS**

- Ascariodose (90 % de succès), oxyurose (100 % de succès), ankylostomose (70-90 % de succès), trichocéphalose (35-72 % de succès).
- Strongyloïdose (90 % de succès).
- Neurocysticercose active (80-90 % de succès).
- Hydatidose en complément du geste chirurgical.
- Proposé dans la trichinose et la *larva migrans*.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ingérer au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive.  
Renouveler la cure 2 à 3 sem. plus tard.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares : nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, élévation des transaminases, rashs, prurit, céphalées, convulsions, alopecies, leuconeutropénie, migration de l'ascaris à travers la bouche.

## PARASITOSE DIGESTIVES (3)

### Tœniase

*Taenia saginata* (tœnia du bœuf) et *Taenia solium* (tœnia du porc) sont des vers segmentés qui sont fixés dans l'intestin grêle et libèrent des segments (ou anneaux) contenant des œufs. Ils se nourrissent par osmose et peuvent persister pendant plusieurs années. La contamination se fait en consommant des viandes contaminées insuffisamment cuites. Leur distribution est cosmopolite mais le tœnia du bœuf est le plus fréquent.

### Diagnostic

- Asymptomatique ou troubles digestifs modérés. Complications possibles en raison de localisation extradigestive du tœnia du porc (cysticercose). La neurocysticercose est ainsi la 1<sup>re</sup> cause d'épilepsie secondaire au Mexique.
- Hyperéosinophilie modérée.
- Découverte des œufs de *T. saginata* dans les selles ou de ses anneaux dans les selles ou les sous-vêtements. Les anneaux de *T. solium* sont mélangés aux matières

fécales et nécessitent un examen parasitologique des selles.

### Traitement

Au choix : **praziquantel (BILTRICIDE)** 10-15 mg/kg en une prise, ou **niclosamide (TRÉDÉMINE)** 4 cp. après 7 ans, 2 cp. entre 2 et 7 ans, 1 cp. avant 2 ans en 2 prises espacées de 1 h à mastiquer lentement à jeun et à avaler avec un peu d'eau, chez un malade au repos ; puis attendre avant de s'alimenter.

Cysticercose : **albendazole (ZENTEL)** 15 mg/kg/j x 8 j ou **praziquantel (BILTRICIDE)** 50 mg/kg en 2 prises pendant 15 j. Associer une corticothérapie. Traitement chirurgical dans les formes graves.

### Autres tœnias

*Hymenolepis nana* ou petit tœnia (15 mm), de découverte souvent fortuite se traite par **praziquantel (BILTRICIDE)** 15-20 mg/kg en une prise, *Diphyllobothrium latum* (4-9 m de long), tœnia des poissons, se traite par **niclosamide (TRÉDÉMINE)** : voir ci-dessus.

## ANTI-HELMINTHIQUES (3)

## ■ Niclosamide

TRÉDÉMINE					
En 2 prises <i>per os</i> à 1 h d'intervalle à jeun depuis la veille <i>Taenias</i> : A. et E. > 7 ans : 2 cp. x 2 E. < 7 ans : 1 cp. x 2 E. > 2 ans : 1/2 cp. x 2	4 cp. 500 mg	3,85	II	65 %	0,96

**PROPRIÉTÉS**

Cestocide actif sur de nombreux vers qui parasitent le tube digestif *Taenia saginata*, *T. solium*, *Hymenolepis nana*, *H. diminuta*, *Diphyllobotrium latum* (botriocéphalose) ainsi que sur les ténias des chiens et des herbivores. Très peu absorbé par le tube digestif, actif directement sur les vers adultes (peu sur les formes jeunes) par inhibition de la phosphorylation oxydative.

**INDICATIONS**

– *Taenias* : administrer un purgatif salin après la 2<sup>e</sup> prise dans le traitement du *T. solium* pour diminuer le risque d'autoinfestation (ou utiliser la **praziquantel** qui agit sur les larves).

– *Hymenolepis* : poursuivre le traitement du 1<sup>er</sup> jour par un traitement quotidien à demi-dose pendant 6 j (ou utiliser le **praziquantel**).

**CONTRE-INDICATIONS**

Absorption d'alcool.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Mâcher les comprimés et les avaler sans absorption d'eau.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares : nausées, douleurs abdominales, vomissements, rash.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

## ANTI-HELMINTHIQUES (4)

## ■ Ivermectine

<b>STROMECTOL</b>					
En 1 prise unique à jeun sans manger les 2 h qui suivent A. et E. : 200 mg/kg	4 cp. 3 mg 20 cp. 3 mg	19,56	II II	65 % NR	19,56

**PROPRIÉTÉS**

Anti-helminthique qui bloque la transmission intersynaptique via le GABA et agit sur de nombreux nématodes (*anguillule*, *larva migrans*) et certaines filaires (onchercerose, filariose lymphatique).

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Usage *per os*, excellente absorption digestive, métabolisation mal connue, excrétion biliaire, faible passage transplacentaire.

**INDICATIONS**

- Anguillulose gastro-intestinale (200 µg/kg en 1 prise).
- Gale (200 µg/kg en 1 prise).
- Onchocercose.
- Loase.
- Filariose à *W. bancrofti* et *B. malayi*.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement**.

Allergie connue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Déconseillée chez les enfants de moins de 5 ans.

Risque de réaction sévère en cas d'infestation majeure.

Pas d'évaluation du traitement de l'anguillulose chez l'immunodéprimé.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets secondaires moins fréquents qu'avec la **diéthylcarbamazine** en début de traitement : fièvre, prurit, céphalées, éruptions cutanées, asthénie, adénopathies, nausées, vomissements, douleurs abdominales, anorexie, constipation, étourdissements, vertiges, somnolence, tremblements, hyperéosinophilie, augmentation ALAT ou phosphatases alcalines.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.



## VACCIN ANTIRABIQUE

## ■ Vaccin antirabique

<b>VACCIN RABIQUE PASTEUR</b>					
Vaccin IM dans le deltoïde selon les schémas vaccinaux	1 fl. pdre. + amp. 0,5 mL solv.		I	NR	
<b>RABIPUR</b>					
Vaccin IM dans le deltoïde selon les schémas vaccinaux	1 fl. pdre. + amp. 1 mL solv.		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin viral inactivé préparé à partir de virus cultivés sur cellules Vero.

**INDICATIONS**

Traitement spécifique après exposition, 2 schémas possibles : 1 dose à J0, J3, J7, J14, J28, ou 2 doses à J0 en 2 sites différents puis 1 dose à J7 et à J21. Faire systématiquement 2 rappels à 3 j d'intervalle chez les sujets vaccinés.

Traitement préventif : 1 dose IM à J0, J7 et J21 ou J28 et rappels en cas de morsure ou à 1 an et tous les 5 ans si nécessaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas réaliser de vaccination préventive pendant une affection fébrile ou la grossesse.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions bénignes (10-15 %) : induration et érythème local, asthénie transitoire, céphalées, fébricule de durée < 24 h.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

La vaccination antirabique curative se fait uniquement dans les centres de traitement antirabique.

**Tableau décisionnel du traitement antirabique après exposition**

NATURE DU CONTACT	TRAITEMENT RECOMMANDÉ SELON QUE L'ANIMAL* EST PRÉSUMÉ ENRAGÉ, QUE LA RAGE EST CONFIRMÉE, OU QUE L'ANIMAL NE PEUT ÊTRE PLACÉ EN OBSERVATION
Contact ou alimentation de l'animal	Aucun si une anamnèse fiable peut être obtenue
Peau découverte mordillée Griffure bénigne ou excoriations sans saignement Léchage sur peau érodée	Administrar le vaccin immédiatement** Arrêter le traitement si l'animal est en bonne santé après 10 j d'observation*** ou si après euthanasie, la recherche de rage est négative
Morsure ou griffure ayant traversé la peau Contamination de muqueuse par la salive (léchage)	Administrar des immunoglobulines et le vaccin immédiatement Arrêter le traitement si l'animal est en bonne santé après 10 j d'observation ou si après euthanasie, la recherche de rage est négative

\* Les rongeurs ne justifient habituellement pas de traitement antirabique spécifique.

\*\* S'il s'agit d'un chat ou d'un chien, apparemment en bonne santé, résidant dans un secteur à faible endémie, et placé en observation, on pourra retarder la mise en route vaccinale.

\*\*\* Cette durée s'applique aux chats et aux chiens, les autres espèces sauf en voie de disparition ou menacées seront euthanasiées.

## VACCIN ANTIROUGEOLEUX

## ■ Vaccin antirougeoleux

<b>ROUVAX</b>				
A. et E. > 12 mois : 1 inj. SC ou IM	1 ser. 0,5 mL + fl. lyoph.	5,98	65 %	5,98

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin viral vivant inactivé préparé sur culture d'embryons de poulet, qui assure une efficacité de 96 % à partir du 4<sup>e</sup> jour après la vaccination pendant une durée d'au moins 20 ans.

**INDICATIONS**

Prévention de la rougeole (y compris après contage si la vaccination est réalisée dans les 3 j qui suivent le contage).

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit immunitaire congénital ou acquis (immunosuppresseurs, corticothérapie, sida).

**Grossesse.**

Allergie vraie à l'œuf.

Maladie infectieuse évolutive.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas de vaccination par erreur au cours de la grossesse, il n'est pas licite de proposer d'interruption de grossesse.

Conservation entre + 2 et + 8 °C.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fièvre transitoire (8-20 %) jusqu'à 39 °C.

Rougeole *a minima* (2-5 %) d'évolution favorable en moins de 5 j.

Réactions anaphylactiques en cas d'allergie vraie à l'œuf.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Compatible avec les vaccins contre la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, les oreillons, la rubéole, la poliomyélite, le BCG.

Incompatible avec les vaccins contre la typhoïde, le choléra.

L'administration d'immunoglobulines dans les 6 sem. précédentes ou les 2 sem. suivantes rend inefficace la vaccination.

## VACCIN ANTIROUGEOLEUX, ANTIRUBÉOLEUX, ANTIORLIEN

## ■ Vaccin anti rougeole, oreillons, rubéole

<b>PRIORIX</b>				
Pour une primo-vaccination des enfants : 1 dose à 12 mois (9 mois pour les enfants entrant en collectivités) et rappel entre 12 et 15 mois Inj. SC	1 dose vaccinante	14,75	65 %	14,75

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

**INDICATIONS**

Vaccination combinée contre la rubéole, les oreillons et la rougeole.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** (pas d'indication à une interruption de grossesse en cas de vaccination par erreur).

Allergie connue à la **néomycine** ou à tout constituant du vaccin.

Déficits immunitaires congénitaux ou acquis touchant l'immunité cellulaire.

Intolérance au fructose (présence de sorbitol).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Faire un test de grossesse avant la vaccination et assurer une contraception efficace pendant les 2 mois après la vaccination.

Associations vaccinales : se reporter à chaque vaccin.

Utiliser avec précaution en cas d'allergie à l'œuf.

Protection limitée dans les 72 h post-exposition au virus rougeoleux.

Chez les nouveau-nés de mère infectée par le VIH, attendre la séronégativité de l'enfant par Western-blot ou, en cas de séropositivité, tenir compte du nombre de lymphocytes CD4.

Conservation entre + 2 et + 8 C.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Se reporter aux effets secondaires de chacun des vaccins isolément (entre 0,5 et 4 % d'effets indésirables).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Se reporter à chaque vaccin isolément.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (1) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (1)

## ■ Zidovudine

<b>RÉTROVIR</b>					
En 2 à 4 prises <i>per os</i> , 30 min avant ou 1 h après le repas	100 gél. 100 mg	135,41	I	100 %	1,35
A. : 500 à 600 mg/j	40 gél. 250 mg	135,41	I	100 %	3,39
E. : 90 à 180 mg/m <sup>2</sup> toutes les 6 h	60 cp. 300 mg	238,30	I	100 %	3,97
	1 fl. 200 mL à 10 mg/mL	30,46	I	100 %	30,46
<b>RÉTROVIR</b> injectable	5 fl. 200 mg	HOP	I		
En perfusion de 1 h en cas de prise orale impossible					
A. : 1 mg/kg toutes les 4 h					

## ■ Lamivudine (ou 3TC) + zidovudine (ou AZT)

<b>COMBIVIR</b>					
A. et E. > 12 ans : 1 cp. x 2/j au cours ou en dehors des repas	60 cp. à 150 mg <b>3TC</b> + 300 mg <b>AZT</b>	294,60	I	100 %	4,91

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la thymidine, qui après phosphorylation, inhibe la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Administration *per os* ou IV, biodisponibilité de 60 %, bonne distribution (LCR, placenta), métabolisme hépatique, élimination urinaire (20 %) et glucuroconjugaison (80 %), passage transplacentaire.

## INDICATIONS

- Traitement de l'infection VIH en association avec d'autres **antirétroviraux**.
- Prévention de la transmission verticale chez les femmes enceintes après 14 sem. de grossesse.
- Traitement de l'encéphalopathie ou de la thrombopénie liée au VIH : 1 à 1,5 g/j.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **zidovudine**.  
Neutropénie < 750/mm<sup>3</sup>.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## Allaitement.

Surveillance hématologique tous les 15 j au début puis tous les mois.

Risque de sélection de souches résistantes.

**Ganciclovir** en traitement d'attaque.

Insuffisance rénale : adapter en fonction de la clairance de la créatinine :

- > 25 mL/min : 300 mg/12 h ;
- ≤ 25 mL/min et dialyse : 150 mg/12 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

(Dépendants de la dose, réversibles à l'arrêt du traitement, plus fréquents en cas d'immunosuppression sévère.)

Troubles hématologiques : anémie, neutropénie parfois sévère justifiant l'arrêt du traitement.

Troubles digestifs : nausées (50 %), douleurs abdominales, diarrhée (12 %), anorexie, vomissements.

Troubles musculaires : myalgies, myosite (élévation des CPK).

Troubles généraux : céphalées (50 %), asthénie, malaises, insomnie, agitation, éruption cutanée.

Troubles cutanés : éruption, pigmentations unguéales, hypertrichose ciliaire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

Interférences avec le métabolisme de la **zidovudine** : **AINS**, **salicylés**, **cimétidine**, **clofibrate**, **dapsone**, **benzodiazépines**, **codéine**, **morphine**, **isopronosine**.

**Probénécide**, **pyriméthamine**, **sulfamides**, **triméthoprime**.

Toxiques : médicaments néphrotoxiques ou hématotoxiques (**amphotéricine B IV**, **dapsone**, **interféron**, **pentamidine**, cytotoxiques).

## SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2)

### Immunomodulateurs

#### Inhibiteur du CCR-5

Le corécepteur CCR-5 est utilisé par le VIH pour entrer dans les cellules. Il existe

d'autres corécepteurs que le virus peut utiliser pour se fixer, ce qui justifie l'étude du tropisme du virus pour le CCR-5 avant de démarrer le traitement. Le **maraviroc (CEL-SENTRI)** est le seul commercialisé en 2014.

#### Associations d'antirétroviraux recommandées en 1<sup>re</sup> intention

Stratégie privilégiant 2 INTI + 1 INNTI		
<b>Ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)</b> 1 cp./j	<b>Éfavirenz</b> 600 mg/j le soir	Risque de résistance avec <b>éfavirenz</b>
Stratégie privilégiant 2 INTI + 1 IP/r (inhibiteur de protéase + ritonavir)		
<b>Ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)</b> 1 cp./j	<b>Atazanavir</b> 300 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>darunavir</b> 800 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>lopinavir/ritonavir</b> 4 cp./j en 1 ou 2 prises	
<b>Abacavir + lamivudine (KIVEXA)</b> 1 cp./j	<b>Atazanavir</b> 300 mg/j + <b>ritonavir</b> 100 mg/j ou <b>lopinavir/ritonavir</b> 4 cp./j en 1 ou 2 prises	Recherche de HLA-B*5701 avant prescription d' <b>abacavir</b>

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (2) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (2)

## ■ Didanosine (ou ddl)

VIDEX					
En 2 prises <i>per os</i> toutes les 12 h, 30 min avant ou 2 h après les repas, mâché ou dissous dans un verre d'eau	60 cp. 25 mg	35,98	I	100 %	0,60
A. : $\geq 60$ kg : 200 mg x 2/j	60 cp. 50 mg	58,22	I	100 %	0,97
< 60 kg : 125 mg x 2/j	60 cp. 100 mg	109,01	I	100 %	1,82
E. (fonction de la surface corporelle) :	60 cp. 150 mg	161,37	I	100 %	2,69
1,1 à 1,4 m <sup>2</sup> : 100 mg x 2/j	30 gél. 125 mg	69,68	I	100 %	2,32
0,8 à 1 m <sup>2</sup> : 75 mg x 2/j	30 gél. 200 mg	108,91	I	100 %	3,63
0,5 à 0,7 m <sup>2</sup> : 50 mg x 2/j	30 gél. 250 mg	135,07	I	100 %	4,50
< 0,4 m <sup>2</sup> : 25 mg x 2/j	30 gél. 400 mg	212,48	I	100 %	7,08
	1 fl pdre. pour sol. buv. 2 g	HOP	I	100 %	
	1 fl pdre. pour sol. buv. de 4 g	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique, précurseur de la didéoxyadénosine, qui inhibe la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 40 % (augmentée par la prise d'un tampon, diminuée par l'acidité gastrique et la présence d'aliments), diffusion faible dans le LCR (20 %) et le placenta, métabolisation par la voie des purines, élimination urinaire (50 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux (AZT, d4T)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **didanosine**.

**Allaitement, grossesse**, enfant < 6 mois.

Pancréatite, hyperamylasémie.

Neuropathie périphérique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les comprimés à jeun (2 h d'un repas).

Ne pas prendre **indinavir** et **ddl** en même temps.

Insuffisance rénale ou hépatique : diminuer la dose de 50 % et prendre en une seule fois par jour.

Surveillance de l'amyplasémie et de l'uricémie.

Surveillance neurologique : si neuropathie, interrompre et reprendre à demi-dose.

Apports : 265 mg Na<sup>+</sup>/cp., 16 mEq Mg<sup>++</sup>/cp.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neuropathies périphériques (15 %) : arrêt jusqu'à guérison.

Possible nouvelle toxicité hépatique (hyperplasie nodulaire régénératrice).

Pancréatites (3 %) biologiques ou cliniques potentiellement mortelles : arrêt immédiat.

Troubles digestifs (> 15 %) : diarrhées, nausées, vomissements, élévation des transaminases nécessitent l'arrêt.

Fièvre, frissons, céphalées, douleurs, prurit et éruption cutanée, asthénie, convulsions, insomnie, confusion mentale, hyperpigmentation cutanée, diabète insipide ou sucré, hyperuricémie, hypokaliémie, hypomagnésémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

## Pharmacologiques

Peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

Les tampons de la **didanosine** diminuent l'absorption de médicaments, à prendre avec 2 h de décalage : **anti-H<sub>1</sub>**, **corticoïdes**, **cyclines**, **dapsone**, **éthambutol**, **isoniazide**, **itraconazole**, **phénothiazines**, **quinolones**, **salicylés**.

Diminution de l'absorption de la **didanosine** par les **antiacides** et les **antiulcéreux**.

## Toxiques

Déconseillé avec **stavudine (ZERIT)** : risque de cytopathie mitochondriale et d'acidose lactique.

Médicaments neurotoxiques : **cisplatine**, **dapsone**, **disulfirame**, hydralazines, imidazolés, **isoniazide**, **lithium**, **nitrofurantoïne**, **phénytoïne**, sels d'or, **stavudine**, **vincristine**.

Augmentation du risque de pancréatite : **pen-tamidine**.

**Ganciclovir**, **rifampicine**, **rifabutine**.

**SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (3)****Quelle association initiale ?**

Le choix doit tenir compte des effets indésirables et des interactions médicamenteuses et de l'observance. En priorité : **2 INTI + 1 IP ou 1 INNTI** (efficacité comparable aux IP).

La co-administration d'une faible dose de **ritonavir** (100 mg x 2/j) aux autres **IP** en augmente les concentrations plasmatiques (**indinavir**, **saquinavir**, **lopinavir**, etc.).

En cas de co-infection par le virus de l'hépatite B, prescrire systématiquement une bithérapie anti-VHB : **ténofovir (VIRÉAD)** + **lamivudine (EPIVIR)** ou **emtricitabine (EMTRIVA)**, ou le traitement combiné **ténofovir + emtricitabine (TRUVADA)**.

**Quand débuter un traitement antirétroviral ?**

- Patient sans symptômes et CD4 > 500/mm<sup>3</sup> : suivi tous les 2-4 mois sauf charge virale plasmatique > 5 log, baisse rapide du taux de CD4, co-infection à VHB ou VHC, âge > 50 ans, facteurs de risque cardiovasculaires associés, souhait de réduction du risque de transmission, néphropathie liée au VIH.
- CD4 350-500/mm<sup>3</sup> : traitement recommandé sauf cas particulier (malade pas prêt).
- Patient symptomatique ou CD4 < 350/mm<sup>3</sup> : traitement indispensable.

**Quel suivi ?**

Consultations bimensuelles (surtout **abacavir**, **éfavirenz**, **névirapine**) ou mensuelles, puis trimestrielles.

Affaire de spécialiste car toxicités et interactions médicamenteuses nombreuses et complexes.

Une consultation d'observance peut anticiper ou améliorer les problèmes d'observance, d'horaires et de modalités de prises, d'effets secondaires, voire d'interactions, et d'efficacité thérapeutique (suivi virologique et immunitaire).

**Quand et comment changer de traitement ?****Indications**

Échec virologique ou immunitaire, toxicités, mauvaise observance (à analyser avant toute modification).

**Modalités**

Les traitements de relais sont à discuter le plus souvent de façon multidisciplinaire.

- En cas d'échec thérapeutique : vérifier l'observance et les interactions médicamenteuses. Changer au minimum 2 sinon tous les médicaments. L'adjonction d'une nouvelle molécule expose au risque d'une monothérapie si la souche est résistante à l'ensemble des médicaments déjà utilisés. Les tests génotypiques peuvent être une aide à la décision.
- En cas de toxicité : remplacer un médicament toxique par un autre de la même classe, sinon arrêter tout en bloc, puis réintroduire secondairement. Ne pas diminuer les doses.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (3) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (3)

## ■ Lamivudine (ou 3TC)

EPIVIR					
En 2 prises <i>per os</i> , en dehors des repas A. et E. > 12 ans : 150 mg x 2/j	60 cp. 150 mg	145,81	I	100 %	2,43
	30 cp. 300 mg	145,81	I	100 %	4,86
	48 fl. 240 mL (sol. buv. 10 mg/mL)	51,47	I	100 %	1,07
	(15 mL = 150 mg)				

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la cytidine, inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH, actif sur les souches résistantes à l'**AZT**.

Inhibe également la réplication du virus de l'hépatite B, entraînant une normalisation des transaminases et une négativation de la virémie dans plus de 90 % des cas ; un échappement apparaît toutefois après quelques mois de traitement.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 80 % (absorption retardée par la présence d'aliments sans modification de la biodisponibilité), bonne distribution (mal connue dans le LCR), faible métabolisme hépatique (5-10 %), élimination rénale (> 70 %).

## INDICATIONS

- Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux (AZT, d4T)**.
- Hépatite B chronique. En cas de traitement d'une co-infection VHB-VIH, ne pas utiliser la **lamivudine** seule mais en association avec le **ténofovir**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **lamivudine**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Allaitement et grossesse** (en cours d'étude). Possibilité de prendre en même temps la **3TC**, l'**AZT**, la **d4T**, le **ritonavir** ou le **saquinavir**. La

prise à jeun de **3TC** et **indinavir** augmente l'absorption des 2 médicaments.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement d'une infection par le VHB : risque de rebond viral.

Cirrhose hépatique sévère (TP < 50 %) liée à une hépatite B chronique : risque de réactivation à l'arrêt de la **lamivudine**.

Insuffisance rénale ; adapter les doses à la clairance de la créatinine :

- > 50 mL/min : dose initiale 150 mg puis 150 mg x 2/j ;
- 30-50 mL/min : 150 mg puis 150 mg x 1/j ;
- 15-30 mL/min : 150 mg puis 100 mg x 1/j ;
- 5-15 mL/min : 150 mg puis 50 mg x 1/j ;
- < 5 mL/min : 50 mg puis 25 mg x 1/j.

Apports : contient de l'alcool et 3 g de saccharose pour 150 mg de **lamivudine**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : céphalées, fatigue, malaise, nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, insomnie, toux.

Toxicité hématologique sur les 3 lignées (aggravée avec l'**AZT**).

Élévation des transaminases, hépatite cytolytique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

**Triméthoprime** : augmente les concentrations de **lamivudine** chez l'insuffisant rénal mais ne nécessite pas d'adaptation de doses.



**SIDA - TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (4)****La primo-infection**

Dépister les partenaires.

Le traitement ne permet pas une éradication de l'infection. Un test génotypique est recommandé surtout si sujet contaminateur déjà traité.

Traitement recommandé en cas de symptômes, en particulier si infection opportu-

niste ou déficit confirmé. Choisir de préférence 2 **INTI** et 1 **IP**. Durée non validée par les études, mais habituellement de 12 à 18 mois. Proposer une inclusion dans un essai thérapeutique.

Traitement non recommandé si séroconversion récente sans symptôme.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (4) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (4)

## ■ Stavudine (ou d4T)

ZERIT					
En 2 prises <i>per os</i> , de préférence à jeun, ou pendant le repas	56 gél. 20 mg	197,12	I	100 %	3,52
A. > 60 kg : 40 mg x 2/j	56 gél. 30 mg	205,11	I	100 %	3,66
A. ≤ 60 kg : 30 mg x 2/j	56 gél. 40 mg	212,45	I	100 %	3,79
	13 cas susp. buv. 200 mg	54,01	I	100 %	4,15

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique de la thymidine, inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité 80 %, distribution dans tout l'organisme (possible dans le LCR), élimination urinaire (80 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres **antirétroviraux**.  
N'est presque plus utilisé en raison de sa forte toxicité mitochondriale.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **stavudine**.

## Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique sévère (TP < 50 %) et transaminases > 5 N.

Antécédents de neuropathie périphérique.

Pancytopenie.

Insuffisance rénale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Possibilité de prendre la **stavudine** en même temps que la **ddl**, la **ddC**, la **3TC**, le **ritonavir**, le **saquinavir** et l'**indinavir** (augmente l'absorption des 2 médicaments).

Surveillance neurologique : si neuropathie périphérique, interrompre et reprendre à demi-dose après guérison clinique.

Insuffisance rénale ; adapter la dose à la clairance de la créatinine et du poids :

- entre 25 et 50 mL/min : ≥ 60 kg : 20 mg x 2/j, < 60 kg : 15 mg x 2/j ;
- entre 10 et 25 mL/min : ≥ 60 kg 20 mg x 1/j, < 60 kg : 15 mg x 1/j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Risque important de toxicité mitochondriale. Neuropathie périphérique (dépendante de la dose).

Nausées, diarrhées, douleurs abdominales.

Élévation de l'amylase, pancréatite (1 %).

Rash cutané.

Élévation des transaminases, troubles hématologiques modérés.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

## Pharmacologiques

Peu nombreuses en raison de l'absence d'interaction avec les cytochromes.

## Toxiques

Déconseillée avec la **didanosine (VIDEX)** : risque de cytopathie mitochondriale et d'acidose lactique.

Médicaments neurotoxiques : **amphotéricine B IV**, **cisplatine**, **cotrimoxazole**, **didanosine**, **flucytosine**, **isoniazide**, **métronidazole**, **phénytoïne**, **vincristine**.

Médicaments hépatotoxiques : **acide valproïque**, **carbamazépine**, **clofazimine**, **cotrimoxazole**, **flucytosine**, **ganciclovir**, **isoniazide**, **pentamidine**, **rifabutine**, **rifampicine**.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (5) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (5)

## ■ Abacavir

ZIAGEN					
A. : 600 mg/j à 1 200 mg/j en 2 ou 3 prises pendant ou en dehors des repas		60 cp. 300 mg 1 fl. 240 mL + pipette doseuse	285,85 81,82	I I	100 % 100 %
E. (≥ 3 mois) : 8 mg/kg x 2/j					4,76 81,82

## ■ Abacavir + lamivudine (ou 3TC)

KIVEXA					
A. : 1 cp. x 1/j	30 cp. 600 mg <b>abacavir</b> + 300 mg <b>3TC</b>	412,55	I	100 %	13,75

## ■ Abacavir + lamivudine (ou 3TC) + zidovudine (ou AZT)

TRIZIVIR					
A. : 1 cp. x 2/j pendant ou en dehors des repas	60 cp. 300 mg <b>abacavir</b> + 300 mg <b>3TC</b> + 150 mg <b>AZT</b>	627,26	I	100 %	10,45

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité orale de 75 % (indépendante de la prise de nourriture), bonne diffusion méningée, métabolisme hépatique, élimination rénale (< 5 %).

## INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques** (zidovudine + lamivudine).

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : information manquante.

**Enfant** : information manquante.

Hypersensibilité à l'**abacavir**.

Insuffisances hépatocellulaire et rénale sévères.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Expliquer aux malades les réactions d'hypersensibilité et la conduite à tenir.

**Réactions d'hypersensibilité** chez environ 3 % des malades, généralement pendant les 6 premières sem. (délai médian : 11 j) et justifiant une consultation tous les 15 j pendant les 2 premiers mois de traitement. Une recherche HLA B57 est recommandée avant la mise sous traitement.

**Prévenir les malades d'arrêter le traitement au moindre doute** (risque mortel) et de consulter en urgence. Port en permanence d'une carte d'information.

Fièvre et/ou éruption maculopapuleuse ou urticarienne.

Symptômes respiratoires (dyspnée, toux, pharyngite dans 20 % des cas voire pneumopathie ou syndrome pseudogrippal), cutanés ou digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales).

Biologie : élévation des CPK, de la créatinémie ou lymphopénie.

**Ne jamais tenter de réintroduction après un arrêt pour intolérance.**

Insuffisance hépatique ou rénale minime : pas de modification de dose.

Risque d'acidose lactique chez les malades ayant une hépatopathie et les obèses.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents (> 10 %) et transitoires : nausées, vomissements, fatigue, léthargie, fièvre, céphalée, diarrhée, anorexie.

Réactions d'hypersensibilité (cf. ci-dessus).

**Risque d'acidose lactique** parfois fatale : arrêt du traitement en cas de cytolysé d'apparition d'une hépatomégalie ou d'acidose métabolique de cause inconnue.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pas d'interaction significative rapportée.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (6) – ANALOGUES NUCLÉOSIDIQUES (6)

## ■ Emtricitabine

EMTRIVA					
A. : 200 mg/j en 1 prise	30 gél. à 200 mg	162,72	I	100 %	5,42
E. > 33 kg : 200 mg/j en 1 prise	1 fl. sol. buv. 170 mL	41,26	I	100 %	41,26

## ■ Emtricitabine + ténofovir disoproxil

TRUVADA					
Idem <b>EMTRIVA</b>	30 cp. 245 mg/200 mg	520,04	I	100 %	17,33

## PROPRIÉTÉS

Analogue nucléosidique synthétique de la cytosine (FTC), ayant des résistances croisées avec la **lamivudine (3TC)** et doté d'une activité sur le VIH-1, le VIH-2 et le VHB.

**Ténofovir** en monothérapie : hépatite chronique virale B.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, absorption rapide et importante.

Concentrations maximales atteintes en 1 à 2 h après la prise.

Biodisponibilité absolue de 93 % par gélules et 75 % par solution buvable.

Élimination rénale (86 % de la dose dans les urines).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres antirétroviraux.

Efficace sur le VHB en association avec du **ténofovir (TRUVADA)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**emtricitabine**.

**Déconseillé pendant l'allaitement.**

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Posologies limitées si poids < 33 kg, insuffisance rénale (clairance < 50 mL/min), acidose lactique, hyperlactémie, élévation des transaminases, atteinte hépatique, hépatomégalie, hyperglycémie, hypertriglycéridémie, grossesse.

Ne pas arrêter brutalement en cas de traitement d'une infection par le VHB : risque de rebond viral.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neutropénie, anémie, hémolyse.

Complications métaboliques, hyperglycémie, acidose lactique.

Céphalées, vertiges, asthénie, diarrhée, dyspepsie.

Élévation de la lipase et de l'amylase sériques. Éruption, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Risque faible d'interactions médiées par le CYP450 entre l'**emtricitabine** et d'autres médicaments.

Augmentation des concentrations sériques si co-administration d'autres médicaments éliminés par sécrétion tubulaire active.

Association à la **lamivudine** non recommandée.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (7) – ANALOGUES NUCLÉOTIDIQUES

## ■ Ténofovir disoproxil fumarate

VIRÉAD					
A (≥ 18 ans). 1 cp./j au cours d'un repas	30 cp. 245 mg	365,64	I	100 %	12,19

## ■ Emtricitabine + ténofovir disoproxil

TRUVADA					
Idem VIRÉAD	30 cp. 245 mg/200 mg	520,04	I	100 %	17,33

## PROPRIÉTÉS

**Ténofovir** : analogue nucléotidique (nucléoside monophosphate) représentant une nouvelle classe d'inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH et du virus de l'hépatite B mais ayant des mécanismes de résistance croisée avec les **inhibiteurs nucléosidiques**.

**Emtricitabine** : voir supra.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, prodogue du **ténofovir**, un analogue nucléosidique monophosphate, qui doit être phosphorylé pour être efficace, biodisponibilité de 25 % (augmentée par la prise d'aliments à 40 %), bonne distribution tissulaire, élimination urinaire majoritairement sous forme inchangée.

## INDICATIONS

Hépatite chronique virale B en phase de répliation et active histologiquement ou fibrose.

Cirrhose virale B.

Échec thérapeutique de l'infection par le VIH, chez l'adulte ayant une charge virale ≥ 10 000 copies/mL, en association avec d'autres **antirétroviraux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ténofovir**.

Hypersensibilité à l'**emtricitabine (TRUVADA)**.

**Grossesse et allaitement**.

Non évalué en cas d'insuffisance hépatique ou

rénale (créatinine ≥ 133 mmol/L ou phosphatémie < 0,65 mmol/L).

Administration de médicaments néphrotoxiques (dont **cidofovir**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance de la fonction rénale et de la phosphatémie, au début pour tous les mois. Arrêt si phosphatémie < 0,32 mmol/L ou créatinine > 177 mmol/L.

Surveillance rapprochée en cas de co-administration avec **ddl** tamponnée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles gastro-intestinaux minimes à modérés.

Hypophosphatémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Peu d'études d'interactions.

Médicaments néphrotoxiques : **aminosides, amphotéricine B, cidofovir, foscarnet, pentamidine IV**.

Pas d'interaction néfaste mise en évidence avec : **3TC, indinavir, éfavirenz**.

Augmentation des concentrations de **ddl** en cas de co-administration avec **ddl** en comprimés tamponnés.

Diminution des concentrations de **lopinavir** et augmentation des concentrations de **ténofovir** en cas de co-administration avec **ritonavir/lopinavir**.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (8) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (1)

## ■ Saquinavir

INVIRASE					
Associé au <b>ritonavir</b> : En 2 prises <i>per os</i> indépendamment de la prise alimentaire A. et E. > 13 ans : 400 mg x 2/j	120 gél. 200 mg	399,06	I	100 %	3,33
Associé au <b>ritonavir</b> , en 2 prises/j : 1 000 mg x 2/j	120 cp. pell. 500 mg	399,06	I	100 %	3,33

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase**, probablement le mieux toléré (pas de perturbation biologique) mais peu absorbé par le tube digestif.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 4 % en raison d'une faible absorption (augmentée par un repas riche en graisses et par le jus de pamplemousse), améliorée par la prise de **ritonavir** et d'un large effet de 1<sup>er</sup> passage hépatique, distribution dans tout l'organisme sauf le LCR, demi-vie 1-2 h, métabolisation hépatique par CYP3A4 (dont il est un faible inhibiteur), élimination biliaire (96 %) et urinaire (4 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **saquinavir**.

**Grossesse et allaitement**.

**Rifabutine** et **rifampicine** qui réduisent la biodisponibilité du **saquinavir** en prise seule.

**Simvastatine**.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

**Terfénaire**, **astémizole**, **cisapride** : risque de torsade de pointe.

**Midazolam**, **triazolam** : risque de sédation excessive

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À toujours prescrire avec un autre **inhibiteur de protéases**, en particulier **ritonavir**.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Diarrhées ou malabsorption.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteur de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps le **saquinavir**,

l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**, ne pas associer à la **ddl**.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 375 et 3 000 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

(dépendants de la dose)

Troubles digestifs : diarrhées (16 %), gêne abdominale (6 %), nausées (4 %), ulcérations buccales, pharyngite.

Neuropathie périphérique (4 %).

Asthénie, céphalées.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Saquinavir** est un substrat et un faible inhibiteur du CYP3A4.

Déconseillés car **inducteurs enzymatiques** diminuant les taux sériques de **saquinavir** : **rifabutine** : réduire la dose à 150 mg x 3/sem. (ou à 1 j/2) en cas d'association **ritonavir/saquinavir**.

**Dexaméthasone** : diminution des concentrations de **saquinavir**.

Azols : surveillance avec le **fluconazole**, l'**itraconazole**, le **miconazole**.

Substrats du cytochrome CYP3A4 : surveiller les effets toxiques des médicaments suivants (**inhibiteurs calciques**, **clindamycine**, **dapsone**, **quinidine**).

**Éfavirenz** : administration déconseillée.

**Névirapine** : diminution des concentrations de **saquinavir**.

**Ritonavir** : augmentation des concentrations du **saquinavir** : utiliser **ritonavir** 100 mg x 2/j et **saquinavir** 400 mg x 2/j.

**Phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** : interactions mal connues, doser les **antiépileptiques**.

**Méthadone** : interaction inconnue.

**Contraceptifs oraux** : interaction inconnue.

**Sildénafil** : diminuer les doses et commencer à 25 mg.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (9) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (2)

## ■ Ritonavir

NORVIR					
En 2 prises <i>per os</i> au moment des repas avec un grand verre d'eau (à distance de <b>ddl</b> )	90 mL sol. buv. (80 mg/mL) + ser. doseuse	63,63	I	100 %	0,71
En association à faible dose avec un autre <b>inhibiteur de protéase</b> A. : 100 mg x 2/j	30 cp. 100 mg	27,11	I	100 %	0,90
En monothérapie : A. : 300 mg x 2 le 1 <sup>er</sup> j puis augmenter de 100 à 200 mg/j pour atteindre 600 mg x 2/j en 5 à 14 j en fonction de la tolérance, puis introduire les autres médicaments					

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase** ayant de nombreux effets secondaires et interactions médicamenteuses. Puissant inhibiteur des cytochromes CYP3A et CYP2D6 : il fait augmenter les concentrations des médicaments qui sont dégradés par ces enzymes.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité  $\geq 70$  % (améliorée par les aliments), métabolisation importante par cytochromes (3A4 > 2D6), inhibiteur puissant du CYP3A, élimination biliaire et urinaire (< 5 %).

## INDICATIONS

N'est plus prescrit en monothérapie d'**inhibiteur de protéase**, mais comme **inhibiteur enzymatique** à la faible dose de 100 mg x 2/j, en association un autre **inhibiteur de protéase** (**lopinavir**, **saquinavir**, **indinavir**) dont il augmente les concentrations sanguines, ce qui en simplifie l'administration ou en augmente l'efficacité.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ritonavir**.

**Grossesse et allaitement.**

Certains médicaments (cf. tableau).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Capsules à conserver au froid entre 2 et 8 °C.

Ne pas mélanger le sirop avec de l'eau, ne pas ouvrir les gélules.

Sécher le verre doseur avant son utilisation.

Possibilité de prendre le **ritonavir** en même temps que l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T** mais pas la **ddl** (2 h d'intervalle).

Insuffisance rénale ou hépatique.

Diarrhée (défaut d'absorption).

Hémophilies (augmente le besoin en facteur VIII).

Enfants < 12 ans, conducteurs de véhicule.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents, en particulier pendant les 2 premières semaines de traitement, interruption du traitement chez 17 % des malades.

Troubles digestifs : nausées (50 %), vomissements (25 %), douleurs abdominales, dyspepsies, altération du goût, éructations, ulcération buccale, irritation de la gorge, pharyngite occasionnelle.

Troubles neurologiques : paresthésies péri-buccales spontanément résolutive (30 %), neuropathie sensitive périphérique (15 %), vertiges, paresthésies, céphalées (15 %), somnolence, insomnie, anxiété.

Troubles cutanés : érythème, prurit, sueurs.

Vasodilatation, asthénie (23 %), fièvre, myalgie, perte de poids, toux.

Anomalies biologiques : augmentation de la GGT (12 %), triglycérides jusqu'à 10 g/L sans complication rapportée (10 %), ALAT (6 %), ASAT (4 %), bilirubine, phosphatases alcalines, cholestérol ; leucopénie (16 %), hyperleucocytose, anémie, allongement du temps de coagulation ; augmentation de : CPK, amylase, uricémie, magnésémie, glycémie ; hypokaliémie, hypocalcémie.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (10) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (3)

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4 et CYP 2D6, fort inhibiteur du CYP 3A4, inducteur des CYP 2C9, 2C19 et 1A2, avec phénomène d'auto-induction.

Cf. tableaux.

Les cytochromes sont des enzymes intervenant dans le métabolisme de nombreux médicaments. Ils sont répartis en familles dont 3 jouent un rôle prépondérant chez l'homme (CYP 1, 2, 3), en sous-familles (ex. : CYP3A) et en isoenzymes (ex. : CYP3A4). Ce dernier est majoritaire et principalement présent dans le foie et l'intestin. À lui seul, il métabolise presque la moitié des médicaments métabolisés par les cytochromes. L'activité des cytochromes peut être modifiée par des substances, dont de nombreux médicaments. Elles sont rangées en substrats, inducteurs (activité

maximum en 6-10 j) ou inhibiteurs. Tous les modificateurs de cytochromes n'agissent pas avec la même intensité, et certains d'entre eux (**ritonavir**, **nelfinavir** ou **éfavirenz**) peuvent, selon les circonstances, jouer les 3 rôles. Les interactions qui en résultent sont complexes (bénéfiques ou délétères), pas toujours prévisibles et peuvent justifier des dosages. On peut les consulter sur [www.hivatis.org](http://www.hivatis.org). Schématiquement, les **inhibiteurs non nucléosidiques** sont des inducteurs modérés du CYP3A4 et les **inhibiteurs de protéases** des inhibiteurs du CYP3A4 : **ritonavir** (le plus puissant), **saquinavir** (le plus faible) et les autres sont modérés. L'association **lopinavir/ritonavir** équivaut à **ritonavir** pleine dose. À l'inverse d'autres médicaments (**antipileptiques**, **rifampicine**, etc.) peuvent induire ou inhiber le métabolisme des **antirétroviraux**.

#### Médicaments contre-indiqués avec le ritonavir (non exhaustif)

**Antiarythmiques** : amiodarone, quinidine, hydroquinidine, flécaïnide, propafénone

**Anti-inflammatoires** : piroxicam

**Anti-infectieux** : céfamandole, métronidazole, griséofulvine

**Antihistaminiques** : astémizole, terféndine

**Psychotropes** et apparentés : alprazolam (**XANAX**), clorazépate (**TRANXÈNE**, **NOCTRAN**), diazépam (**VALIUM**, **NOVAZAM**), flurazépam, lormétazépam (**NOCTAMIDE**), midazolam (**HYPNOVEL**), prazépam (**LYSANXIA**), zolpidem (**STILNOX**), clozapine (**LÉPONEX**), pimozide

**Divers** : dérivés de l'ergot de seigle, statines (simvastatine), disulfirame (**ESPERAL**), millepertuis

#### Médicaments dont les taux sériques sont augmentés par le ritonavir

**Antiarythmiques** : lidocaïne, disopyramide

**Antipileptiques** : carbamazépine, phénobarbital : interactions mal connues, à doser

**Anti-infectieux** : érythromycine, clarithromycine (adapter si insuffisance rénale), azithromycine, rifabutine (diminuer la dose à 150 mg x 3/sem. ou à 1 j/2 même si **ritonavir** à faible dose), rifampicine, itraconazole, antirétroviraux, atovaquone

**Antihistaminiques** : loratadine (**CLARITYNE**, **CLARINASE**), cétirizine (**VIRLIX**, **ZYRTEC**)

**Antivitamines K** : warfarine, acénocoumarol

**Corticoides** : dexaméthasone, prednisolone

**Immunosuppresseurs** : ciclosporine, tacrolimus

**Psychotropes** : halopéridol, perphénazine, amitriptyline (**LAROXYL**, **ÉLAVIL**), désipramine (**PERTOFRAN**), imipramine (**TOFRANIL**), fluoxétine (**PROZAC**), paroxétine (**DEROXAT**), sertraline (**ZOLOFT**)

**Opiacés** : buprénorphine, fentanyl, morphine

**Statines** : pravastatine, atorvastatine, fluvastatine

Autres : sildénafil (25 mg/48 h max.)

#### Médicaments dont les taux sériques peuvent être diminués par le ritonavir

**AINS**

**Antidiabétique oral** : glipizide

**Antipileptique** : phénytoïne

**Éthinil-œstradiol** : arrêt

**Inhibiteur de la pompe à protons** : oméprazole

**Théophylline** : adapter les doses

**Méthadone** : doser et/ou augmenter les doses



## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (11) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (4)

## ■ Darunavir

PREZISTA					
Associé au <b>ritonavir</b> : en 2 prises <i>per os</i> indépendamment de la prise alimentaire A. et E. > 13 ans : 600 ou 800 mg x 1/j	480 cp. 75 mg	734,70	I	100 %	1,53
	240 cp. 150 mg	734,70	I	100 %	3,06
	120 cp. 300 mg	734,70	I	100 %	6,12
	60 cp. 400 mg	425,26	I	100 %	7,09
	60 cp. 600 mg	734,70	I	100 %	12,24

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de protéase du VIH. Le **darunavir** inhibe le clivage des polyprotéines encodées Gag-Pol.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 37 % en raison d'une faible absorption, améliorée par la prise de **ritonavir** et d'un large effet de 1<sup>er</sup> passage hépatique. Distribution dans tout l'organisme sauf le LCR ; demi-vie 15 h ; métabolisation hépatique par CYP3A4 (dont il est un faible inhibiteur) ; élimination 80 % fécale, 14 % urinaire.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **darunavir**.

Insuffisance hépatique sévère.

**Grossesse et allaitement.**

**Rifabutine** et **rifampicine** qui réduisent la biodisponibilité du **darunavir** en prise seule.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À toujours prescrire avec un autre **inhibiteur de protéases**, en particulier **ritonavir**.

Insuffisance hépatique ou rénale.

Diarrhée ou malabsorption.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteur de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps le **darunavir**, l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**, ne pas associer à la **ddl**.

En cas d'oubli < 6 h (si cp. à 300 mg) ou < 12 h (si cp. à 400 mg), prendre la dose oubliée dès que possible, puis reprendre le schéma habituel. Si ces délais sont dépassés, reprendre le schéma habituel sans la dose oubliée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ils sont dépendants de la dose.

Troubles digestifs : diarrhée, gêne abdominale, nausées.

Céphalées, vertiges, neuropathie périphérique (4 %).

Asthénie, céphalées.

Insomnie, dépression.

Lipodystrophies, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie.

Élévation des transaminases.

Éruption cutanée, prurit.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations médicamenteuses contre-indiquées :

– par voie systémique : **amiodarone**, **quinidine**, **lidocaïne** ;

– par voie orale : **astémizole**, **terfénadine**, **midazolam**, **tiazolam**, **cisapride**, **pimozide**, **sertindole**, **simvastatine**, **dérivés de l'ergot de seigle**.

Le **darunavir** est un substrat et un faible inhibiteur du CYP3A4.

Déconseillés car inducteurs enzymatiques diminuant les taux sériques de **darunavir** : **rifabutine** ; réduire la dose à 150 mg x 3/sem. (ou à 1 j/2) en cas d'association **ritonavir/darunavir**.

Azolés : surveillance avec le **fluconazole**, l'**itraconazole**, le **miconazole**.

Substrats du cytochrome CYP3A4 : surveiller les effets toxiques des médicaments suivants (**inhibiteurs calciques**, **clindamycine**, **dapsone**, **quinidine**).

**Éfavirenz** : administration déconseillée.

**Névirapine** : diminution des concentrations de **darunavir**.

**Ritonavir** : augmentation des concentrations de **darunavir**. Utiliser **ritonavir** 100 mg x 2/j et **darunavir** 400 mg x 2/j.

**Phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** : interactions mal connues, doser les **antiépileptiques**.

**Méthadone** : interaction inconnue.

**Contraceptifs oraux** : interaction inconnue.

**Sildénafil** : diminuer les doses et commencer à 25 mg.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (12) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (5)

## ■ Indinavir

<b>CRIVAN</b>					
En 3 prises <i>per os</i> à 8 h d'intervalle, à jeun, 30 min à 1 h avant ou > 2 h après le repas A. : 800 mg x 3/j En association avec <b>ritonavir</b> (100 mg x 2/j) : 400 à 800 mg x 2/j (dosages recommandés)	360 gél. 200 mg	331,38	I	100 %	0,92
	90 gél. 400 mg	170,48	I	100 %	1,89
	180 gél. 400 mg	331,38	I	100 %	1,84

## PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur de protéase** très puissant, bien toléré, et peu d'interactions médicamenteuses.

## PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, biodisponibilité de 50-60 % (diminuée par la prise alimentaire, améliorée par le jus de pamplemousse), bonne distribution (faible dans le LCR), demi-vie 1,5-2 h, métabolisation hépatique par le CYP3A, élimination biliaire et urinaire (10-20 %).

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**indinavir**.

Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique grave.

**Astémizole**, **terfénaire**, **cisapride**, **alprazolam**, **midazolam**, **triazolam**.

**Rifampicine**.

**Simvastatine**.

Dérivés de l'ergot de seigle.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de lithiase des voies urinaires nécessitant une bonne hydratation (> 1,5 L/j).

À prendre à jeun (2 h d'un repas) si prescrit sans **ritonavir**.

Insuffisance rénale.

Insuffisance hépatique légère ou modérée associée à une cirrhose : réduire les doses à 600 mg x 3/j.

Hyperbilirubinémie libre transitoire régressant à la poursuite du traitement.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteurs de coagulation.

Possibilité de prendre en même temps l'**indinavir**, l'**AZT**, la **ddC**, la **3TC**, la **d4T**. La **ddI** doit être prise à jeun à distance.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 150 et 800 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées (35 %), diarrhées (25 %), altération du goût (20 %), douleurs abdominales (14 %), vomissements (11 %), dyspepsies (10 %), flatulences (8 %), sécheresse de la bouche (7 %), pyrosis (6 %).

Troubles neurologiques : céphalées (25 %), asthénie (24 %), étourdissements (10 %), insomnies (7 %), hyperesthésies (7 %), paresthésies (5 %), myalgies.

Troubles urologiques : lithiase urinaire avec cristaux d'**indinavir** (3-15 %) ne pas interrompre le traitement mais réhydrater, dysuries (6 %), hématurie, protéinurie.

Troubles cutanés : rash (19 %), sécheresse de la peau (16 %), prurit (7 %), anomalie de répartition des graisses (bosse de bison).

Augmentation du VGM, des transaminases, bilirubine totale et conjuguée (10 %), diminution des polynucléaires neutrophiles.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4, et inhibiteur modéré du CYP3A4.

**Saquinavir** : augmentation de l'aire sous la courbe de 500 %.

**Ritonavir** (100 mg x 2/j) : diminuer **indinavir** à 400-800 mg x 2/j (dosages recommandés).

**Névirapine** et **éfavirenz** : augmenter **indinavir** à 400-800 mg x 2/j si associé à **ritonavir** 100 mg x 2/j (dosages recommandés).

**Rifabutine** : réduire la dose de **rifabutine** à 150 mg/j ou à 300 mg x 2/sem.

**Itraconazole** : à surveiller.

Inducteurs des cytochromes : **phénobarbital**, **phénytoïne**, **carbamazépine** (diminuée, à éviter), **dexaméthasone**.

**Méthadone** : risque de surdosage en **méthadone**.

**Antiarythmiques** : à surveiller.

**Sildénafil** : 25 mg/48 h maximum.

Jus de pamplemousse : diminution des concentrations d'**indinavir** de 26 %.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (13) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (6)

## ■ Fosamprénavir

TELZIR					
A. > 18 ans : 700 mg x 2/j associé au <b>ritonavir</b> 100 mg x 2/j	60 cp. 700 mg 1 fl. sol. buv. 225 mL (50 mg/mL)	376,97 105,52	I I	100 % 100 %	6,28 105,52
E. : non recommandé					

## ■ Tipranavir

APTIVUS					
A. : 500 mg x 2/j, en association avec <b>ritonavir</b> faible dose : 200 mg x 2/j	120 caps. molles 250 mg 1 fl. sol. buv. 95 mL (100 mg/mL)	810,47 HOP	I I	100 %	6,75
E. : non recommandé					

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur compétitif de protéase du VIH-1 et 2 ayant peu ou pas de résistances croisées avec les autres IP.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Per os : bonne biodisponibilité (indépendante de la prise d'aliments), bonne distribution sauf LCR, fixation aux protéines plasmatiques à 90 %, demi-vie de 7-10 h, métabolisme hépatique par le CYP3A4 dont il est un substrat et un inhibiteur enzymatique, élimination essentiellement par voie fécale. La sol. buv. est moins absorbée que les caps. : pas d'équivalence mg pour mg.

## INDICATIONS

Traitement de 2<sup>e</sup> intention de l'infection. Moins efficace que **indinavir** chez des malades jamais traités. Peu étudié chez les malades lourdement prétraités.

## CONTRE-INDICATIONS

## Grossesse et allaitement.

Nouveau-né : en raison de la présence de propylène glycol.

Modificateur de l'absorption de l'alcool : **disulfirame**, **métronidazole**.

## Simvastatine.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

Effet sédatif prolongé : **alprazolam**, **clorazépate**, **diazépam**, **flurazépam**, **lormétazépam**, **midazolam**, **prazépam**, **triazolam**, **zolpidem**.

Terfénadine, astémizole, cisapride, pimozide, **quinidine** : risque de torsade de pointe.

Millepertuis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : pas d'adaptation, mais solution buvable contre-indiquée.

Insuffisance hépatique : réduire chez l'adulte à 450 mg x 2/j si modérée et à 300 mg x 2/j si grave. Pas de données chez l'enfant.

Hémophilie : risque accru de saignement.

Diabète : surveiller la glycémie.

En cas d'éruption minime ou modérée : poursuivre le traitement avec un **antihistaminique**. Arrêt définitif si signes de gravité (généraux, atteinte muqueuse).

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 1 000 et 4 000 ng/mL.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs, éruptions cutanées, paresthésies péri-buccales. Augmentation des enzymes hépatiques, trouble de distribution des graisses, hyperglycémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Administer à distance des **antiacides**.

**Antirétroviraux** (capsule molle, chez l'adulte) : **saquinavir**, **indinavir**, **nelfinavir** : pas ajustement.

**AZT**, **3TC**, **abacavir** : pas d'ajustement.

**ddl** : pas d'étude, différer les prises à 1 h d'intervalle.

**Éfavirenz** : déconseillé avec **saquinavir**.

**Névirapine** : interaction non connue.

Réduire la dose de **rifabutine** à 150 mg/j ou 300 mg x 2-3/sem.

**Clarithromycine** : pas d'ajustement.

Risque de surdosage ou toxicité accrue : **inhibiteurs calciques**, **statines**, **clozapine**, **carbamazépine**, **cimétidine**, **dapsone**, **itraconazole**, **loratadine**.

Risque d'échec : **œstroprogestatifs**.

**Sildénafil** : 25 mg/48 h maximum.

**Méthadone** : interaction mal connue.

Liste non exhaustive.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (14) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (7)

## ■ Lopinavir + ritonavir

KALÉTRA					
A. + ado. et enf. ayant une surface corporelle $\geq 1,3 \text{ m}^2$ : 2 cp. 200 mg/500 mg x 2/j au cours d'un repas	60 cp. 100 mg/25 mg 120 cp. 200 mg/50 mg 60 doses de 5 mL (1 mL = 80 mg/20 mg)	124,97 124,97 476,54	I I I	100 % 100 % 100 %	2,08 1,04 7,94
E ( $> 2$ ans) : cf. Tableau					

## PROPRIÉTÉS

Association de **ritonavir** à un autre **inhibiteur de protéase**, surtout étudié chez des patients jamais traités mais responsable de plus fréquents effets secondaires métaboliques que d'autres associations.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Per os, biodisponibilité du **lopinavir** augmentée par l'administration de **ritonavir** et améliorée par la prise de lipide, demi-vie de 5-6 h, bonne distribution, métabolisation hépatique principale par le CYP3A4 et moindre par le 2D6, élimination biliaire et urinaire.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH en association avec d'autres antirétroviraux. Peu étudié chez les malades lourdement prétraités.

## CONTRE-INDICATIONS

Cf. celles du **ritonavir**. Allergie au **lopinavir**.

## Grossesse et allaitement.

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

Modificateur de l'absorption de l'alcool : **disulfirame**, **métronidazole**.

**Rifampicine** : diminution des concentrations de **lopinavir**.

**Simvastatine**.

Dérivés de l'ergot de seigle (**ergotamine**, **dihydroergotamine**) : risque d'ergotisme.

Effet sédatif prolongé : **alprazolam**, **clorazépate**, **diazépam**, **flurazépam**, **lormétazépam**, **mizolam**, **prazépam**, **triazolam**, **zolpidem**.

**Terfénadine**, **astémizole**, **cisapride**, **pimozide**, **amiodarone**, **quinidine** : risque de torsade de pointe.

Millepertuis.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance hépatique légère ou modérée : risque augmenté de toxicité hépatique.

Hémophilie A ou B : augmentation des besoins en facteurs de coagulation.

Risque de complications métaboliques, dont hypertriglycéridémie et pancréatite.

Présence d'un excipient pouvant donner des allergies croisées avec l'**aspirine**.

Possibilité de prendre en même temps que : **AZT**, **ddC**, **3TC**, **d4T**, **abacavir**, **névirapine**. La **ddl** doit être prise à distance. Avec **éfavirenz**, augmenter **KALÉTRA** à 4 caps. x 2/j.

Associations aux autres **inhibiteurs de protéases** mal connues.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Complications métaboliques, anomalies de répartition des graisses (lipodystrophies), diabète.

Fréquents chez l'adulte ( $> 2\%$ ) : nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, asthénie, céphalées. Hyperglycémie, augmentation des enzymes hépatiques, hypercholestérolémie.

Peu fréquents chez l'adulte (1-2 %) : rash, selles anormales, insomnie.

Les effets secondaires de fréquence inférieure à 1 % ne sont pas rapportés ici.

Propylène glycol : convulsions, stupeur, tachycardie, hyperosmolarité, acidose lactique, toxicité rénale, hémolyse.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Substrat du CYP3A4, et inhibiteur des CYP3A4 et 2D6. Cf. **ritonavir**.

**Rifabutine** : 150 mg x 2 ou 3/ses.

**Clarithromycine** : surveillance de toxicité hépatique en cas d'insuffisance hépatique.

## Doses chez l'enfant

Surface corporelle en $\text{m}^2$	Dose de sirop à administrer x 2/j (230/57,5 mg/ $\text{m}^2$ )
0,25	0,7 mL (57,5/14,4 mg)
0,5	1,4 mL (115/28,8 mg)
0,75	2,2 mL (172,5/43,1 mg)
1	2,9 mL (230/57,5 mg)
1,25	3,6 mL (287,5/71,9 mg)
1,5	4,3 mL (345/86,3 mg)
1,75	5 mL (402,5/100,6 mg)

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (15) – INHIBITEURS DE PROTÉASES (8)

## ■ Atazanavir

REYATAZ					
A. : 300 mg/j en 1 prise associé au <b>ritonavir</b> 100 mg pendant les repas	60 gél. 150 mg	455,25	I	100 %	7,59
E. : non recommandé	60 gél. 200 mg	455,25	I	100 %	7,59
	30 gél. 300 mg	455,25	I	100 %	15,18

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de protéase du VIH-1.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Amélioration de la biodisponibilité et diminution de la variabilité de concentration lors de la prise de l'**atazanavir** avec de la nourriture. Élimination urinaire et fécale.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux** chez le patient déjà traité par **antirétroviraux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**atazanavir**.

**Déconseillé pendant l'allaitement.**

Insuffisance hépatique modérée à sévère. Intolérance au galactose, déficit en lactase, malabsorption du glucose et du galactose.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pathologie hépatique, élévation des transaminases, élévation de la bilirubine, antécédent de bloc de branche complet, surveillance du cholestérol et des triglycérides, diabète, grossesse.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction allergique, anorexie, anxiété, dépression, prise de poids, lipodystrophie, céphalées, signes neurologiques périphériques, amnésie, confusion, vertiges, syncope, palpitations, HTA, dyspnée, pancréatite, hépatite, hépatosplénomégalie, élévation des transaminases, des CPK, de la bilirubine et de l'amylase, prurit, urticaire, eczéma, asthénie, fièvre, neutropénie. Urologique : lithiase avec élimination de cristaux d'**atazanavir** (fréquence inconnue).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'**atazanavir** inhibe le CYP3A4 donc l'association **atazanavir-ritonavir** est contre-indiquée avec les médicaments substrats du CYP3A4 (**astémizole, terféndine, cisapride, pimozide, quinidine, alcaloïdes de l'ergot de seigle, ergotamine et dihydroergotamine**). Baisse des concentrations plasmatiques de l'**atazanavir** si administration avec les **anti-acides**.

Augmentation des concentrations d'**anti-arythmiques (amiodarone, quinidine)**. Associations à éviter : **contraceptifs oraux, inhibiteurs de la pompe à protons, sildénafil, millepertuis ; rifampicine** contre-indiquée.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (16) – INHIBITEUR DE FUSION

### ■ Enfuvirtide

FUZEON				
A. : 200 mg/j en 1 prise E. > 33 kg : 200 mg/j en 1 prise	60 fl. pdre + solvant pour 90 mg/mL (60 inj.) + matériel à inj.	1 683,99	1	100 % 28,07

#### PROPRIÉTÉS

L'**enfuvirtide** appartient à la classe thérapeutique des **inhibiteurs de fusion**. Il agit en se liant à une protéine virale (gp 41 du VIH-1) dans le milieu extracellulaire, bloquant ainsi la fusion entre la membrane virale et la membrane de la cellule cible et empêchant ainsi l'ARN viral d'entrer dans la cellule cible.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité absolue de 84 %.  
Voies d'élimination non étudiées.

#### INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux** chez les patients en échec à un traitement comprenant au moins un **inhibiteur des protéases**, ou un **analogue non nucléosidique** ou avec une intolérance à ces traitements.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**enfuvirtide**.

Enfant de moins de 6 ans.

**Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.**

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pathologie hépatique, insuffisance rénale sévère (clairance < 35 mL/min).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Érythème au site d'injection, acné, eczéma, sinusite, conjonctivite, papillome cutané, pneumonie, lymphadénopathie, perte d'appétit, anorexie, anxiété, hypertriglycémie, diabète, neuropathie périphérique, hypoesthésie, pancréatite, RGO, calculs rénaux, hématurie, glomérulonephrite, élévation des CPK et des transaminases, syndrome pseudo-grippal, frissons, fièvre.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction attendue entre **enfuvirtide** et médicaments métabolisés par les enzymes du CYP450.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (17) – ANTI-CCR5

## ■ Maraviroc

CELENTRI					
A. : 150 ou 300 ou 600 mg/j en 1 prise en fonction des associations avec les autres <b>antirétroviraux</b>	60 cp. 150 mg	729,57	I	100 %	12,16
	60 cp. 300 mg	729,57	I	100 %	12,16

## PROPRIÉTÉS

Le **maraviroc** est un antagoniste du récepteur CCR5 (récepteur de chimiokines). CCR5 est un des corécepteurs du VIH-1. Le **maraviroc** empêche ainsi le VIH-1 de pénétrer dans les cellules.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité absolue de 23 %.  
Voies d'élimination urinaires et fécales.

## INDICATIONS

Traitement de l'infection par le VIH-1 à tropisme détecté uniquement CCR5 chez l'adulte prétraité par des **antirétroviraux** et en association avec d'autres médicaments antirétroviraux.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **maraviroc**, à l'arachide et au soja.

Enfant.

Grossesse et allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À associer aux autres **antirétroviraux**.  
Insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère (clairance < 35 mL/min).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Érythème au site d'injection, acné, eczéma, sinusite, conjonctivite, papillome cutané, pneumonie, lymphadénopathie, perte d'appétit, anorexie, anxiété, hypertriglycémie, diabète, neuropathie périphérique, hypoesthésie, pancréatite, RGO, calculs rénaux, hématurie, glomérulonéphrite, élévation des CPK et des transaminases, syndrome pseudogrippal, frissons, fièvre.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale ou de traitement par des inhibiteurs de CYP3A4 tels que : **itraconazole**, **clarithromycine**, **télithromycine**, **inhibiteurs de protéases** (sauf **tipranavir/ritonavir**).

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (18) – ANTI-INTÉGRASE

## ■ Raltégravir

ISENTRESS					
400 mg x 2/j, à prendre au cours ou en dehors des repas	60 cp. 400 mg	699,76	I	100 %	11,66

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de l'intégrase du VIH-1. L'inhibition de l'intégrase empêche l'intégration du génome du VIH dans le génome de la cellule hôte. Les génomes du VIH qui ne s'intègrent pas ne peuvent pas donner lieu à la production de nouvelles particules virales infectieuses, et par conséquent l'inhibition de l'intégration empêche la propagation de l'infection virale.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Absorption rapide. Demi-vie : 9 h. Liaison aux protéines plasmatiques. Élimination fécale et urinaire.

## INDICATIONS

Infection par le VIH-1, en association avec d'autres agents antirétroviraux, chez des patients adultes prétraités ayant une charge virale détectable sous traitement antirétroviral en cours.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À associer aux autres anti-rétroviraux.  
Conduite (sensations vertigineuses).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Vertiges, douleurs abdominales, flatulence, constipation, prurit, lipodystrophies, asthénie, arthralgies. Rarement : hypertriglycémie, hépatite. Possible augmentation du risque de cancer (récidives) chez des patients traités avec d'autres anti-rétroviraux.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Absence d'effet sur le cytochrome P450 (CYP).  
**Rifampicine** : doubler la dose du **raltégravir** ;  
Éviter d'associer aux molécules augmentant le pH gastrique (risque d'augmentation des concentrations du **raltégravir**).

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (19) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (1)

### ■ Névirapine

VIRAMUNE					
A. : 200 mg/j pendant 2 sem. puis 400 mg/j	1 fl. 240 mL (50 mg/5 mL)	HOP	I		
	14 cp. 200 mg	56,37	I	100 %	4,03
	60 cp. 200 mg	225,92	I	100 %	3,77
	30 cp. 400 mg	123,92	I	100 %	4,13

### PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur non nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1 inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Biodisponibilité *per os* de 93 %, pas de modification par la prise d'aliments, de **didanosine** ou d'**antiacides** ; liaison protéique à 60 % ; inducteur de cytochrome P450 ; passage placentaire et dans le lait maternel, demi-vie 25-30 h ; métabolisme hépatique auto-inductible par cytochromes nécessitant une augmentation progressive des doses ; élimination par voie rénale (80 %) et fécale (10 %).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec des **inhibiteurs nucléosidiques**.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : information manquante.

Hypersensibilité à la **névirapine**.

Insuffisance rénale ou hépatique : pas de données.

Co-infection par le VHC.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Débuter à demi-dose (200 mg x 1/j) les 2 premières semaines.

Expliquer aux patients les manifestations toxiques de la **névirapine**.

Surveiller les tests hépatiques pendant les 6 premiers mois (tous les 15 j pendant 2 mois).

Troubles cutanés (< 10 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (20 % des cas).

### Interruption du traitement en cas de :

– anomalie modérée ou sévère des tests hépatiques (à l'exclusion de la  $\gamma$ GT) et jusqu'à normalisation. Arrêt définitif en cas de récurrence à la réintroduction ;

– éruption cutanée sévère ou s'accompagnant de signes généraux avec signes de gravité (20 % des cas) : éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, phlyctènes, œdème, signes généraux, douleurs articulaires ou musculaires, malaise général.

En cas d'arrêt supérieur à 7 j, reprendre à la dose initiale de 200 mg pendant 14 j.

Dosage plasmatique : résiduelles entre 3 000 et 8 000 ng/mL.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : troubles cutanés (< 10 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (20 % des cas).

Nausées, asthénie, fièvre, céphalées, somnolence, augmentation des enzymes hépatiques. Rares : éruption cutanée (Lyell et Stevens-Johnson), réaction allergique (anaphylactique, angio-œdème, urticaire), hépatite fulminante.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : la **névirapine** est un substrat et un inducteur modéré du cytochrome CYP3A4.

### Médicaments affectés par la névirapine

**Saquinavir** : cf. **INVIRASE**.

**Indinavir** : augmenter les doses d'**indinavir** à 1 000 mg toutes les 8 h en cas d'administration de 400 mg de **névirapine** (diminution de l'aire sous la courbe de 28 %).

**Contraceptifs oraux** : risque d'échec des **œstroprogestatifs**.

**Clarithromycine** : surveillance de la fonction hépatique (augmentation des concentrations).

**Méthadone** : diminution de 50 % des concentrations plasmatiques.

### Médicaments affectant la névirapine

**Rifampicine** et **rifabutine** : à prendre en compte si **inhibiteur de protéase**.

Utiliser la **rifabutine** à la dose de 300 mg/j.



## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (20) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (2)

### ■ Éfavirenz

SUSTIVA					
A. : 600 mg/j en une prise au coucher	30 gél. 50 mg	30,47	I	100 %	1,02
E. (≥ 3 ans) : 13 à 15 kg : 200 mg/j ;	30 gél. 100 mg	56,98	I	100 %	1,90
15 à 20 kg : 250 mg/j ; 20 à 25 kg :	90 gél. 200 mg	315,40	I	100 %	3,50
300 mg/j ; 25 à 32,5 kg : 350 mg/j ;	30 cp. 600 mg	254,40	I	100 %	8,48
≥ 40 kg : 600 mg/j	1 fl. sol. buv. 180 mL (30 mg/mL)	107,88	I	100 %	107,88

### PROPRIÉTÉS

**Inhibiteur non nucléosidique** de la transcriptase inverse du VIH-1, inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Administration orale, biodisponibilité (50 %) augmentée par un repas riche en matières grasses, pas de modification par les **antiacides**, liaison à 99 % aux protéines plasmatiques ; métabolisme et inducteur du cytochrome CYP3A4 ; demi-vie entre 40 et 55 h ; élimination par voie fécale sous forme inchangée (16-61 %), élimination urinaire (16-34 % dont 1 % sous forme active).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux**.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité à l'**éfavirenz**.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

**Terfénadine, astémizole, cisapride, midazolam, triazolam.**

**Saquinavir** : diminution des concentrations en dessous des valeurs thérapeutiques (sauf si **ritonavir** ajouté à faibles doses).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance des enzymes hépatiques pendant les 6 premiers mois (tous les 15 j pendant 2 premiers mois).

Prendre l'**éfavirenz** au coucher.

Risque d'éruption cutanée augmenté par un antécédent d'éruption cutanée avec la **névirapine**.

Risque d'effets secondaires neurologiques.

Administration prudente en cas d'insuffisance hépatique minime à modérée ou d'insuffisance rénale.

Dosage plasmatique : résiduelles attendues entre 1 100 et 5 000 ng/mL.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Fréquents (≥ 10 %)

Troubles cutanés (18 %) : rashes maculopapuleux bénins à modérés dans les 2 premières semaines de traitement : surveillance sans augmenter les doses avant disparition complète. Signes de gravité (éruption intense, urticaire, atteinte muqueuse, signes généraux) : interruption immédiate (plus d'un tiers des cas). Réactions croisées avec la **névirapine**. Rares érythèmes polymorphes et Stevens-Johnson. Troubles neurologiques (dans les premiers jours du traitement) : sensations vertigineuses, insomnie, somnolence, troubles de la concentration et des rêves. Rares réactions aiguës de type psychotique. Nausées.

#### Rares (< 10 %)

Diarrhée, dyspepsie, fatigue, augmentation des enzymes hépatiques, augmentation de la cholestérolémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pharmacologiques : substrat du CYP3A4, inducteur modéré des CYP1A2, 2D6, inhibiteur du CYP3A4, 2C9 et 2C19.

### Médicaments affectés par l'éfavirenz

**Inhibiteurs de protéases** : voir chaque médicament.

**Clarithromycine, œstrogénostatifs** : à éviter.

**Rifabutine** : augmenter la dose à 450-600 mg/j.

**Méthadone** : diminution de 50 % des concentrations plasmatiques.

### Médicaments affectant l'éfavirenz

**Rifampicine** : augmenter les doses d'**éfavirenz** à 800 mg/j (diminution de l'aire sous la courbe de 26 %).

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (21) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (3)

### ■ Étravirine

INTELENCE					
A. : 600 mg/j en une prise au coucher	120 cp. 100 mg	505,13	I	100 %	4,21
E. (≥ 3 ans) :	60 cp. 200 mg	505,13	I	100 %	8,42
13 à 15 kg : 200 mg/j					
5 à 20 kg : 250 mg/j					
20 à 25 kg : 300 mg/j					
25 à 32,5 kg : 350 mg/j					
≥ 40 kg : 600 mg/j					

### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse du VIH-1, inefficace sur le VIH-2.

### PHARMACOCINÉTIQUE

Administration orale, biodisponibilité (50 %) augmentée par un repas riche en matières grasses ; pas de modification par les **antiacides** ; liaison à 99 % aux protéines plasmatiques ; métabolisme et inducteur du cytochrome CYP3A4 ; demi-vie entre 40 et 55 h ; élimination par voie fécale sous forme inchangée (16-61 %) ; élimination urinaire (16-34 % dont 1 % sous forme active).

### INDICATIONS

Traitement initial de l'infection par le VIH-1 en association avec d'autres **antirétroviraux**.

### CONTRE-INDICATIONS

#### Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité à l'**étravirine**.

Intolérance au galactose.

Déficience en lactase.

Malabsorption glucose, galactose.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée, nausées, céphalées.

IDM, fibillation auriculaire, angor.

Thrombocytopénie, anémie.

Neuropathie périphérique, céphalées, convulsions, syncope, vertiges.

Bronchospasme, dyspnée d'effort.

Insuffisance rénale.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'**étravirine** est métabolisée par le CYP3A4, le CYP2C9 et le CYP2C19. Les médicaments inhibiteurs des ces cytochromes peuvent induire en association avec l'**étravirine** une diminution de sa concentration plasmatique.

## ANTIVIRAUX ANTI-VIH (22) – INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (4)

### ■ Rilpivirine + emtricitabine + ténofovir disoproxil

#### ÉVIPLÉRA

A. > 18 ans : 1 cp./j avec de la nourriture	30 cp. 25/200/245 mg	756,57	I	100 %	25,22
---	----------------------	--------	---	-------	-------

#### PROPRIÉTÉS

**Rilpivirine** : inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse du VIH-1.

**Emtricitabine** et **ténofovir** : cf. *supra*.

#### PHARMACOCINÉTIQUE

##### Rilpivirine :

- concentrations plasmatiques max. après 4-5h,
- 100% de liaison aux protéines plasmatiques,
- métabolisation par le CYP450 (3A4),
- $t_{1/2}$  d'élimination = 45 h,
- élimination à 80% fécale (25% sous forme inchangée).

#### INDICATIONS

Traitement du patient adulte, infecté par VIH-1, naïf de tout traitement antirétroviral, et présentant une charge virale  $\leq 100\,000$  copies/mL d'ARN VIH-1.

Remboursement à 100% seulement si l'utilisation de l'**éfavirenz** n'est pas appropriée pour le patient.

#### CONTRE-INDICATIONS

Cf. Interactions médicamenteuses contre-indiquées.

Allaitement.

Patient < 18 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Alcool à éviter.

Déconseillé en cas d'insuffisance hépatique ou rénales sévère.

Insuffisance rénale légère à modérée : adaptation de posologie (impossible avec l'association fixe **ÉVIPLÉRA**).

Déconseillé lors de la grossesse.

Contient du lactose.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Généraux : asthénie, céphalées, vertiges, somnolence.

Hématologiques : neutropénie, anémie, thrombocytopénie.

Immunitaires : réaction allergique, syndrome de restauration immunitaire (IRIS).

Métaboliques : dyslipidémie, lipodystrophie, hyperglycémie, hypophosphatémie, rare acidose lactique.

Psychiatriques : insomnie, dépression, rêves anormaux.

Gastro-intestinales : diarrhée, nausées, vomissements.

Hépatobiliaires : augmentation d'ALAT/ASAT et de bilirubinémie.

Cutanés : rash, éruption cutanée, prurit.

Musculo-squelettique : rare ostéomalacie.

Rénaux : augmentation de créatininémie, atteinte rénale.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

##### Contre-indiqués :

- anticonvulsivants : carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne ;
- antimycobactériens : rifabutine, rifampicine ;
- inhibiteurs de la pompe à protons ;
- dexaméthasone (sauf en dose unique) ;
- millepertuis ;
- autres analogues de la cytidine (lamivudine) ;
- **adéfovir dipivoxil**.

##### Déconseillés :

- didanosine ;
- médicaments néphrotoxiques : aminosides, amphotéricine B, foscarnet, ganciclovir, pentamidine, vancomycine, cidofovir, interleukine-2 (aldesleukine) ;
- autres INNTI.

## ANTI-PNEUMOCYSTOSE (1)

## ■ Atovaquone

WELLVONE					
À prendre au moment des repas (riche en graisses) A. : 750 mg x 4/j	1 fl. 226 mL 150 mL/mL	HOP	I	65 %	

## PROPRIÉTÉS

Hydroxynaphtoquinone active sur la chaîne de transport des électrons de *Pneumocystis carinii*.

## INDICATIONS

Traitement curatif et préventif de 2<sup>e</sup> intention de la pneumocystose pulmonaire en cas d'allergie aux autres médicaments plus efficaces.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'**atovaquone**.

**Grossesse et allaitement.**

Enfant, sujets âgés et insuffisance rénale ou hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les repas au milieu d'un repas riche en graisses pour favoriser son absorption.  
Diminution de l'absorption en cas de diarrhée.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Éruptions cutanées, nausées, diarrhée, céphalées, fièvre, vomissements, insomnie.  
Rares : asthénie, prurit, candidose buccales, douleurs abdominales, constipation, vertiges, élévation des transaminases, anémie, hyperamylasémie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Métoclopramide** ou **rifampicine** : diminution des concentrations plasmatiques de l'**atovaquone**.

Risque d'inefficacité des **antivitamines K**.

## SIDA - COMPLICATIONS PULMONAIRES (3)

### Traitement des complications pulmonaires du sida

INFECTIONS	TRAITEMENT DE 1 <sup>re</sup> INTENTION	TRAITEMENT DE 2 <sup>e</sup> INTENTION
Pneumocystose pulmonaire Traitement d'attaque pendant 21 j puis prophylaxie secondaire	<b>Triméthoprim</b> (TMP) 15 mg/kg/j + <b>sulfaméthoxazole</b> (SMZ) 75 mg/kg/j soit <b>BACTRIM</b> faible : 4 ampoules IV ou 4 cp. x 3/j ou <b>BACTRIM</b> forte : 2 cp. x 3/j + <b>corticoïdes (prednisone)</b> 1 mg/kg/j si PaO <sub>2</sub> < 75 mmHg	<b>Pentamidine</b> IV : 3-4 mg/kg/j ou <b>pentamidine</b> aérosol : 300 mg/j (infection peu grave) ou <b>atovaquone</b> : 750 mg x 2/j
Pneumocystose pulmonaire Prophylaxie secondaire	<b>BACTRIM</b> faible ou forte : 1 cp./j	<b>Atovaquone</b> : 1 500 mg/j en 1 prise ou <b>dapsone</b> 100 mg/j ou <b>pentamidine</b> aérosol : 300 mg/mois
Pneumopathie à pyogènes et légionelles	Idem immunocompétent	
<i>Rhodococcus equi</i>	<b>Vancomycine</b> + <b>érythromycine</b> ou + <b>rifampicine</b>	
Nocardiose Traitement d'attaque pendant > 3 mois puis Prophylaxie secondaire	<b>TMP</b> 15 mg/kg/j + <b>SMZ</b> 75 mg/kg/j ou <b>Sulfadiazine</b> 1,5-2 g x 4/j	<b>Minocycline</b> 200-400 mg/j ou <b>amikacine</b> + <b>imipénem</b> ou + <b>ceftriaxone</b>
Tuberculose pulmonaire	Quadrithérapie standard pour 6 mois	Cf. Antibiogramme
Infections à <i>Mycobacterium avium complex</i>	<b>Clarithromycine</b> 500 mg x 2/j + <b>éthambutol</b> 15 mg/kg/j ± <b>rifabutine</b> 300 mg/j	+ <b>amikacine</b> 15 mg/kg/j
<i>Mycobacterium kansasii</i>	<b>INH</b> + <b>rifampicine</b> + <b>éthambutol</b>	
Toxoplasmose pulmonaire	Cf. Toxoplasmose cérébrale	
Cryptococcose	Cf. Cryptococcose méningée	
Histoplasmose Coccidioïdomycose Aspergillose	<b>Amphotéricine B</b> en traitement d'attaque puis <b>itraconazole</b> en prophylaxie secondaire	

## ANTI-PNEUMOCYSTOSE (2)

## ■ Pentamidine

<b>PENTACARINAT</b>					
<b>En inj. IM ou perf. IV</b> - Pneumopathie à <i>Pneumocystis carinii</i> : 4 mg/kg en perf. IV lente/j x 14 j - Trypanosomiase africaine : 4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 7 à 10 inj. - Leishmanioses cutanées diffuses africaines ou cutanéomuqueuses : 3-4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 3 à 4 inj. - Leishmaniose viscérale : 3-4 mg/kg en 1 inj. tous les 2-3 j x 10 inj. <b>En aérosol</b> 1 aérosol mensuel de 300 mg à l'aide d'un nébulisateur <i>Respigard II</i> ou <i>Fisoneb</i>		1 fl. 300 mg à diluer dans 6 mL d'eau stérile	33,73	I	65 %
					33,73

**PROPRIÉTÉS**

Diamidine aromatique, de mode d'action mal connu, efficace dans le traitement de certaines protozooses et de la pneumocystose.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Utilisation par voie parentérale ou en aérosol, demi-vie de 29 h, élimination urinaire et fécale, pas de diffusion dans le système nerveux central, passage transplacentaire, pas d'effet systémique par voie intrapulmonaire.

**INDICATIONS**

- Trypanosomiase africaine.
- Leishmaniose cutanée, cutanéomuqueuse, viscérale (en 2<sup>e</sup> intention).
- Pneumocystose pulmonaire en traitement préventif ou curatif (moins efficace que le **cotrimoxazole**).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Tuberculose pulmonaire (risque de dissémination favorisée par l'usage des aérosols).

Enfant < 8 kg.

Allergie au **PENTACARINAT**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance fréquente pendant le traitement de la pression artérielle, de la glycémie, de la fonction rénale (protéinurie, diurèse, créatinine), de la numération et des enzymes hépatiques.

Perfusion dans du sérum glucosé pendant 1 à 2 h, malade à jeun et allongé.

Perfusion de pour prévenir le risque d'hypoglycémie.

Insuffisance rénale : diminuer la dose de 30 à 50 % (risque d'accumulation).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents par voie parentérale (> 50 %) : hypotension parfois grave, malaise, rash, nausées, vomissements, hypoglycémie potentiellement mortelle à prévenir par la perfusion de sérum glucosé, apparition d'un diabète sucré, insuffisance rénale (25 %), cytolyse hépatique, neutropénie, hypocalcémie, thrombopénie, hypocalcémie, fièvre, tachycardies, goût métallique. Rares : torsades de pointes, pancréatites.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

À surveiller : **didanosine**, **foscarnet**.

## ANTI-TOXOPLASMOSE (1)

## ■ Sulfadiazine

ADIAZINE					
En 4 prises <i>per os</i> en dehors des repas	20 cp. 500 mg	3,46	I	65 %	0,17
A. : 8 à 12 cp./j					
E. : 150 mg/kg/j					

## PROPRIÉTÉS

**Sulfamides** bactériostatiques inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique utilisé pour son action sur certains protozoaires.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* ou parentéral, bonne biodisponibilité, bonne distribution tissulaire (y compris le LCR, liquides synovial, pleural et péritonéal), métabolisation hépatique, élimination urinaire, passage transplacentaire.

## INDICATIONS

- Traitement préventif et curatif de la toxoplasmose.
- Prévention de la pneumocystose pulmonaire au cours du sida.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergies aux **sulfamides**.  
Fin de **grossesse**, **allaitement**, nouveau-né.  
Insuffisances hépatiques sévères.  
Porphyries, déficit en G6PD, anémies par carence en folates.  
Exposition aux UV (photosensibilisation).  
**Méthotrexate**, **procaïne**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillés pendant la grossesse.  
Surveillance hématologiques en cas de traitement prolongé.

Associer de l'**acide folinique** en cas de traitement au long cours.

Diurèse alcaline (cristallurie).

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine :

- < 30 mL/min : 1,5 à 3 g/12 h ;
- < 10 mL/min : 1,5 à 3 g/24 h.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements, stomatite, colite pseudomembraneuse, ulcérations œsophagiennes, pancréatites (rares), ictère nucléaire du nouveau-né.

Réactions allergiques (fréquentes au cours du sida) : urticaires, érythème maculopapuleux, œdème de Quincke, fièvre, arthralgies, vascularites, hépatites immuno-allergiques, maladie sérique, dermatites exfoliatrices, syndrome de Lyell (0,2 cas/million).

Troubles hématologiques : neutropénie réversible, anémie mégaloblastique, méthémoglobinémie, thrombopénie, agranulocytose.

Troubles neurologiques : céphalées, neuropathies périphériques, dépression, convulsions, ataxie, hallucinations visuelles, acouphènes, vertiges, insomnie, surdité, tremblements.

Tubulopathie et insuffisance rénale.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Potentialisation des **antivitamines K**, **phénytoïne**, **sulfamides**, **hypoglycémiant**, **zidovudine**.

Diminution de la ciclosporinémie.

## SIDA - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (2)

### Traitements de la toxoplasmose cérébrale

	TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE	TRAITEMENTS DE 2 <sup>e</sup> INTENTION
Traitement d'attaque (4 à 6 sem.)	<b>MALOCIDE</b> 100 mg le 1 <sup>er</sup> j puis 50 à 75 mg/j + <b>Acide folinique</b> 25 mg/j + <b>ADIAZINE</b> 4 à 6 g/j en 3 à 4 prises Traitement antiépileptique	<b>MALOCIDE</b> + <b>acide folinique</b> + <b>DALACINE</b> 2,4 g/j en 4 prises <i>per os</i> ou IV
Prophylaxie secondaire (systématique)	Idem à demi-doses	Idem à demi-doses ou <b>MALOCIDE</b> 1 mg/kg/j + prophylaxie de la pneumocystose

### Traitements des cryptococcoses neuroméningées

	TRAITEMENT DE RÉFÉRENCE
Traitement d'attaque (4 à 6 sem.)	Formes graves : <b>FUNGIZONE</b> 0,7 à 1 mg/kg/j ( <i>per os</i> ou IV) ou <b>AMBISOME</b> ± <b>ANCOTIL</b> 75 à 150 mg/j (IV) puis relais par <b>TRIFLUCAN</b> 400 à 800 mg/j ( <i>per os</i> ou IV) Formes modérées : <b>TRIFLUCAN</b> 400 mg/j ( <i>per os</i> ou IV)
Prophylaxie secondaire (systématique, à vie)	<b>TRIFLUCAN</b> 200 à 400 mg/j ( <i>per os</i> )

### Critères de mauvais pronostic des cryptococcoses neuro-méningées

1. Troubles de conscience 2. Examen direct à l'encre de Chine positif 3. Élévation de la pression d'ouverture du LCR 4. Glycorrhachie $\leq 2$ mmol/L 5. Leucocytes dans le LCR $< 20/\mu\text{L}$	6. Présence de cryptocoques en dehors du système nerveux 7. Absence d'anticorps anticryptococciques 8. Titre d'antigène cryptococcique $> 1/1\ 024$ dans sérum ou LCR
--	---



## ANTI-TOXOPLASMOSE (2)

■ **Pyriméthamine**

<b>MALOCIDE</b>					
En 1 prise/j <i>per os</i> A. : 100-200 mg le 1 <sup>er</sup> j puis 50 à 100 mg/j E. : 1 mg/kg/j en 2-3 prises/sem.	20 cp. séc. 50 mg	13,76	I	65 %	0,69

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la dihydrofolate réductase active 1 000 fois plus actif sur les protozoaires sensibles que sur les cellules humaines.

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Bonne absorption *per os*, métabolisation quasi complète, excrétion de 3 % de la drogue sous forme inchangée dans les urines.

**INDICATIONS**

- Traitement curatif et préventif de la toxoplasmose au cours du sida (en association avec un **sulfamide**).
- Traitement préventif de la pneumocystose au cours du sida (en association avec la **dapsone**).
- Traitement curatif de certains accès palustre à *Plasmodium falciparum* résistants ou en cas d'allergie.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Supplémentation en **acide folinique** au cours des traitements de longue durée.  
Surveillance hebdomadaire de la numération sanguine et des plaquettes.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Anémie, neutropénie, thrombopénie par carence en **acide folique**.  
Rares : rash, vomissements, convulsions.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Déconseillées : autres médicaments myélosuppresseurs (**zidovudine**).  
Synergie avec les **sulfamides**.

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (1)

## ■ Ganciclovir

CYMÉVAN				
En perf. IV de 1 h	1 fl. 500 mg	HOP	I	
Traitement d'attaque : 5 mg/kg x 2/j				
Traitement d'entretien : 5 mg/kg x 1/j				

## PROPRIÉTÉS

Analogue de la déoxyguanosine métabolisé par les enzymes cellulaires en dérivé phosphaté actif, virustatique sur les herpesvirus et plus particulièrement sur CMV.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage *per os* (biodisponibilité 10 %), intraveineux ou intravitréen, bonne diffusion y compris le LCR, l'humeur aqueuse et la rétine, pas de métabolisation, élimination rénale (> 90 %), hémodialysable.

## INDICATIONS

- Traitement curatif et prévention secondaire des infections graves à CMV chez les immuno-déprimés.
- Prophylaxie des infections à CMV chez les greffés de moelle.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **ganciclovir** ou à l'**aciclovir** ; leucopénie < 500 polynucléaires/mm<sup>3</sup>. **Grossesse** et **allaitement** ; absence de contraception efficace.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les injections sous-cutanées et intramusculaires.  
Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine : cf. Tableau.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles hématologiques (fréquents) : neutropénie < 1 000/mm<sup>3</sup> (40 %) réversible dépendante de la dose et précoce (2<sup>e</sup> semaine de traitement), thrombopénie (20 %), anémie (2-4 %). Troubles neurologiques (5-15 %) : céphalées (10 %), convulsions (3 %), confusion (5 %). Troubles digestifs : nausées (10 %), vomissements (2 %), augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines. Complications au point d'injection : hémorragies intravitréennes, induration scléreuse, décollement rétinien. Divers : rashes (6 %), fièvre, myalgies, frissons, malaises, réactions anaphylactiques, élévation de la créatininémie (2 %).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation des troubles hématologiques et sur les épithéliums à renouvellement rapide (intestinal, cutané, génital) : **dapsone**, **pentamidine**, **pyriméthamine**, **flucytosine**, **anticancéreux** (vincristine, vinblastine, doxorubicine), **amphotéricine B**, **sulfaméthoxazole-triméthoprime**, **zidovudine**.

Augmentation du risque de convulsions : **imipénème-cilastatine**.

Risque élevé de convulsions : **imipénème-cilastatine**.  
Risque de toxicité accrue : **probenécide**, **AZT** (médullaire), **ddC** (neuropathie), **ciclosporine** (rénale).

## POSOLOGIE

## Posologie du ganciclovir au cours de l'insuffisance rénale

CLAIRANCE DE LA CRÉATININE (mL/min)	GANCICLOVIR IV		GANCICLOVIR ORAL
	DOSE D'ATTAQUE (mg/kg)	DOSE D'ENTRETIEN (mg/kg)	DOSE D'ENTRETIEN (mg)
> 80	5/12 h	5/24 h	1 000/8 h
50-80	5/12 h	2,5/24 h	500/8 h
30-50	2,5/12 h	2,5/24 h	250/6 h
10-30	2,5/24 h	2,5/24 h	250/12 h
< 10 et HD*	1,25/24 h	1,25/24 h	50 × 3/sem.

\* HD : hémodialyse, administrer 2,5 mg/kg en fin de séance.

## SIDA - COMPLICATIONS RÉTINIENNES (2)

### Traitements d'attaque des rétinites à cytomégalo­virus (≥ 21 j)

VOIE D'ADMINISTRATION	MÉDICAMENTS	SURVEILLANCE	CONTRE-INDICATIONS
Traitement de 1 <sup>re</sup> intention			
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 mg/kg × 2/j	NFS, plaquettes × 2/sem.	Neutrophiles < 500/mm <sup>3</sup> Plaquettes < 20 000/mm <sup>3</sup>
	<b>Foscarnet</b> 90 mg/kg × 2/j	Créatinine, ionogramme sanguin phosphorémie, NFS × 2/sem.	
Implant oculaire	<b>Ganciclovir</b> mise en place chirurgicale + <b>ganciclovir</b> ou <b>valganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique	
Traitement de 2 <sup>e</sup> intention			
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 mg/kg/sem. <b>Probénécide</b> 2 g <i>per os</i> 3 h avant puis 1 g à 2 h et à 8 h après la perf.	Créatinine, protéinurie, NFS, plaquettes avant chaque perf. (risque de néphrotoxicité irversible)	Protéinurie ≥ 2 + Créatinine ≥ 133 µmol/L Clairance de créatinine ≤ 55 mL/min Neutrophiles < 500/mm <sup>3</sup>
Intravitréenne	<b>Ganciclovir</b> 400 µg × 2/sem.	Surveillance ophtalmologique	
<i>Per os</i>	<b>Valganciclovir</b> 900 mg × 2/j		

### Traitements d'entretien des rétinites à cytomégalo­virus

VOIE D'ADMINISTRATION	MÉDICAMENTS	SURVEILLANCE
Intraveineuse	<b>Ganciclovir</b> 5 à 6 mg/kg/j, 5 à 7 j/sem.	NFS, plaquettes × 1/sem.
	<b>Foscarnet</b> 120 mg/kg × 1/j	Créatinine, ionogramme sanguin phosphorémie × 1/sem.
Intravitréenne	<b>Ganciclovir</b> 400 µg × 1/sem. + <b>valganciclovir</b> ou <b>ganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique
Implant oculaire	<b>Ganciclovir</b> remplacement après 6 mois + <b>valganciclovir</b> ou <b>ganciclovir</b> oral	Surveillance ophtalmologique
<i>Per os</i>	<b>Valganciclovir</b> 900 mg × 1/j	NFS, plaquettes × 1/sem.

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (2)

## ■ Foscarnet sodique

FOSCAVIR				
Traitement d'attaque : 2 perf./j	fl. 6 g	HOP	I	
Traitement d'entretien : 1 perf./j				

## PROPRIÉTÉS

Antiviral virustatique qui inhibe directement l'ADN polymérase des *Herpes viridae*.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage intravitréen ou intraveineux (biodisponibilité *per os* < 20 %), concentration plasmatique variable d'un sujet à l'autre, bonne distribution (LCR, forte fixation osseuse), pas de métabolisation, élimination rénale > 80 %, hémodialysable.

## INDICATIONS

- Traitements curatifs et prévention secondaire des infections graves à CMV chez les immunodéprimés.
- Traitements des infections à HSV et VZV résistants à l'**aciclovir** et des infections à CMV résistantes au **ganciclovir**.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : adapter la dose à la créatinine plasmatique (cf. tableau).  
Supplémentation en phosphore et en potassium.  
Perfusions lentes de 2 h avec hyperhydratation ≥ 2 L de sérum physiologique/j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles néphrologiques (diminués par l'hyperhydratation) : augmentation de la créatinémie, protéinurie, diabète insipide, néphrite interstitielle aiguë, hypo- ou hypercalcémie (30-60 %), hypokaliémie (16 %), hypomagnésémie (15 %), hyperphosphorémie (8 %).

Troubles urologiques : ulcérations du gland et du méat urinaire.

Troubles hématologiques : anémie (20-50 %), leuconéutropénie, thrombopénie.

Troubles neurologiques : fatigue (100 %), hallucinations, céphalées, maux de tête, convulsions, paresthésies.

Troubles digestifs : nausées, vomissements (20-30 %), diarrhées, douleurs abdominales, ulcérations buccales.

Divers : fièvre (25 %), rashes, dermites de contact, augmentation des transaminases.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Médicaments néphrotoxiques.

Médicaments hypo- ou hypercalcémiant.

## POSOLOGIE

## Posologies de foscarnet chez l'insuffisant rénal

CRÉATININÉMIE (μmol/L)	DOSES D'ATTAQUE (mg/kg)	INTERVALLES (h)	DOSES D'ENTRETIEN (mg/kg/j)
< 110	60	8	90-120
110-120	55	8	90-120
120-140	49	8	78-104
140-170	42	8	75-100
170-210	35	8	71-94
210-240	28	8	63-84
240-250	21	8	57-76
> 250	NR*	NR	NR

\* NR : non recommandé.

# ANTIVIRAUX ANTI-CMV (3)

## ■ Valganciclovir

ROVALCYTE					
<i>Per os</i> , au cours d'un repas A. : traitement d'attaque d'une rétinite à CMV : 900 mg x 2/j pendant 21 j A. : traitement d'entretien d'une rétinite à CMV : 900 mg x 1/j Intérêt de la sol. buv. pour l'insuffisant rénal chez qui la posologie doit être réduite	5000 mL (fl.) sol. buv. 50 mg/mL 60 cp. 450 mg	254,26	I	65 %	0,05
		1443,73	I	65 %	24,06

### PROPRIÉTÉS

Prodrogue du **ganciclovir**, dont la biodisponibilité permet une exposition similaire au **ganciclovir** intraveineux, actif *in vitro* sur de nombreux herpesvirus (HSV-1 et -2, VZV, CMV), et le virus de l'hépatite B, étudié dans le traitement des rétinites à CMV au cours de l'infection par le VIH.

### PHARMACOCINÉTIQUE

*Per os*, prodrogue rapidement métabolisée en **ganciclovir**, absorption orale augmentée par la prise d'aliments (10 fois mieux absorbé que le **ganciclovir** oral), biodisponibilité 60 %, métabolisé en **ganciclovir** puis éliminé sous cette forme par voie rénale. Cf. aussi la pharmacocinétique du **ganciclovir**.

### INDICATIONS

Traitement d'attaque et d'entretien des rétinites à cytomégalovirus au cours du sida de l'adulte : serait d'une efficacité égale au **ganciclovir** intraveineux.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement.**

Hypersensibilité au **valganciclovir**, **aciclovir** ou **ganciclovir**.

Absence de contraception efficace;

Neutropénie à polynucléaires neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>.

Thrombocytopénie < 25 000/mm<sup>3</sup>.

Hémoglobine < 8 g/dL.

Hémodialyse : préférer **ganciclovir** intraveineux.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas broyer ni casser les comprimés.

Chez l'animal : mutagène, tératogène, aspermatogénique et carcinogène.

Contraception obligatoire chez la femme en âge de procréer.

Risque d'inhibition définitive de la spermatogenèse et risque de stérilité chez la femme : nécessité d'utiliser des préservatifs pendant la durée du traitement et 90 j après l'arrêt.

Agent cancérigène possible. Insuffisance rénale : cf. Tableau.

Risque de toxicité hématologique grave : surveillance bimensuelle de l'hémogramme et des plaquettes, ou hebdomadaire si antécédent de neutropénie ou neutropénie en début de traitement.

Surveillance bimensuelle ou mensuelle de la fonction rénale.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Cf. **ganciclovir**.

Traitement d'attaque : fréquents (≥ 10 %) : diarrhées, neutropénie, fièvre, candidose buccale.

Traitement d'entretien : fréquents (≥ 20 %) : diarrhées, nausées, neutropénie, anémie, fièvre.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Cf. **ganciclovir**.

### POSOLOGIE

Clairance de la créatinine (mL/min)	Traitement d'attaque	Traitement d'entretien
≥ 60	900 mg x 2/j	900 mg x 1/j
40-59	450 mg x 2/j	450 mg x 1/j
25-39	450 mg x 1/j	225 mg x 1/j
10-24	225 mg x 1/j	125 mg x 1/j
< 10	200 mg x 3/sem. après dialyse	100 mg x 3/sem. après dialyse

## ANTIVIRAUX ANTI-CMV (4)

## ■ Cidofovir

VISTIDE					
A. : en 1 h, à vitesse constante, après une bonne hydratation Traitement d'attaque : 5 mg/kg x 1/sem. pendant 2 sem. consécutives Traitement d'entretien : 5 mg/kg toutes les 2 sem. à démarrer 2 sem. après la fin du traitement d'attaque Administrer, avec un repas, 2 g de <b>probénécide</b> 3 h avant le <b>cidofovir</b> et 1 g de <b>probénécide</b> 1 h et 8 h après la fin de la perf. (4 g au total)		5 fl. 375 mg/5 mL	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Analogue de la cytidine inhibiteur de la réplication virale du cytomégalo virus humain.

## PHARMACOCINÉTIQUE

Usage intraveineux, bonne diffusion dans l'humour aqueuse et la rétine, pas de métabolisation (nécessite une phosphorylation intracellulaire pour être actif sur l'ADN-polymérase virale), élimination rénale sous forme inchangée (> 90 %), hémodialysable.

## INDICATIONS

Traitement curatif et prévention secondaire des rétinites à CMV au cours du sida.

En cours d'étude dans la leuco-encéphalite multifocale progressive.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **cidofovir** ou au **probénécide**.

## Grossesse et allaitement

Insuffisance rénale (créatinine > 133 µmol/L, clairance < 55 mL/min ou protéinurie > 0,1 mg/dL). Co-administration de produits néphrotoxiques. Usage intravitréen.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier la NFS et la fonction rénale avant chaque injection.

Hydrater avec 1 L de sérum physiologique administré pendant 1 h juste avant le **cidofovir** puis continuer par 1 L démarré en même temps que le **cidofovir** mais perfusé pendant 1 à 3 h.

Administrer, avec un repas, 2 g de **probénécide** 3 h avant le **cidofovir** et 1 g de **probénécide** 1 h et 8 h après la fin de la perfusion (4 g au total).

Arrêt de tout médicament néphrotoxique au moins 7 j avant le début du **cidofovir**.

Interrompre les injections et intensifier l'hydratation en cas d'augmentation de la créatininémie de 44 µmol/L ou de protéinurie à 2+, soit supérieure à 100 mg/dL.

En cas d'allergie cutanée ou d'intolérance digestive du **probénécide**, administrer un **anti-histaminique**.

Prévenir le risque de diffusion sous-cutanée par une bonne voie d'abord.

Insuffisance rénale : adapter la dose à la clairance de la créatinine (cf. Encadré).

Risque de neutropénie réversible.

Risque d'uvéïte à traiter localement.

Diluer dans du sérum physiologique. Utiliser des poches de perfusion en chlorure de polyvinyle ou éthylène/propylène.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Toxicité rénale responsable d'insuffisance rénale parfois irréversible par atteinte tubulaire et prévenue par l'administration de **probénécide** qui en inhibe la réabsorption tubulaire proximale. Dépistage par mise en évidence de signes avant-coureurs : protéinurie, hypophosphorémie, augmentation de la créatininémie.

Fréquents (> 10 %) : fièvre, éruption cutanée, nausées et vomissements, neutropénie, asthénie, alopecie.

Uvéïte médicamenteuse d'évolution habituellement favorable sous **corticoïdes** locaux.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions avec le métabolisme ou la sécrétion rénale de nombreux médicaments. Liste non exhaustive : **paracétamol**, **aciclovir**, **inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, **aspirine**, **barbituriques**, **benzodiazépines**, **méthotrexate**, **furosémide**, **AINS**, **théophylline**, **AZT**, etc.

**AZT** : arrêt du traitement ou diminution de 50 %.

## VACCIN ANTITÉTANIQUE

## ■ Vaccin antitétanique

**VACCIN TÉTANIQUE PASTEUR**

Inj. SC ou IM selon le schéma vaccinal	1 ser. 0,5 mL	2,82		65 %	2,82
--	---------------	------	--	------	------

**PROPRIÉTÉS**

Anatoxine tétanique purifiée.

**INDICATIONS**

Prévention du tétanos.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

À conserver entre + 2 et + 8 °C.

Agiter avant l'emploi.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions douloureuses, érythémateuses ou nodulaires au point d'injection, abcès aseptique exceptionnel.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

**Recommandations du ministère de la Santé pour la prévention du tétanos**

SITUATION VACCINALE DU PATIENT	NATURE DE L'EXPOSITION	
	PLAIE MINIME*	PLAIE GRAVE**
Vaccination antérieure certaine et complète		
< 5 ans	Rien	Rien
5-10 ans	Rien	Vaccin (rappel)
> 10 ans	Vaccin (rappel)	Vaccin (rappel) + <b>sérum</b>
Vaccination antérieure certaine mais incomplète (au moins 1 injection)	Vaccination complète	Vaccination complète + <b>sérum</b>
Vaccination absente ou douteuse	Vaccination complète + <b>sérum</b>	Vaccination complète + <b>sérum</b> double dose

\* Plaie minime, piqûre, coupures, excoriations peu pénétrantes, non souillées, sans corps étranger, ulcère de jambe, interventions chirurgicales sur le pied, le tube digestif, l'utérus, fracture ouverte de jambe.

\*\* Plaies traumatiques étendues, pénétrantes, avec corps étrangers, souillées ou traitées après 24 h, état de choc avec forte hémorragie, délabrement ostéomusculaire, brûlures étendues, avortements septiques, accouchements septiques, gelures, ulcères nécrotiques, gangrènes.

## IMMUNOGLOBULINES ANTITÉTANIQUES

### ■ Immunoglobulines antitétaniques

<b>GAMMATÉTANOS</b>					
Inj. IM selon le schéma de prévention	1 ser. de 250 UI/2 mL	34,91	I	65 %	34,91
<b>IMMUNOGLOBULINES TETANIQUES EQUINES PASTEUR</b>					
Idem <b>GAMMATÉTANOS</b>	1 ser. 1 500 UI/1 mL	4,14	I	65 %	4,14

#### PROPRIÉTÉS

Immunoglobulines humaines antitétaniques.

#### CONTRE-INDICATIONS

Aucune.



## VACCINS COMBINÉS INFANTILES

## ■ Vaccin antidiphtérique + vaccin anticoquelucheux + vaccin antipoliomyélique + vaccin antitétanique

TÉTRAVAC ACELLULAIRE				
Primovaccination : 3 inj. IM espacées d'1 mois à l'âge de 2, 3 et 4 mois Rappel : 1 inj. 1 an après la primovaccination entre 16 et 18 mois, rappel tardif entre 11 et 13 ans	1 ser. prér. 0,5 mL			NR
INFANRIX TETRA				
Idem <b>TÉTRAVAC ACELLULAIRE</b>	1 ser. prér. 0,5 mL	14,88	65 %	14,88

**PROPRIÉTÉS**

Vaccins contenant des anatoxines diphtérique, tétanique et pertussique, et les virus poliomyélitiques atténués type 1, 2 et 3.

**INDICATIONS**

Prévention conjointe de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la poliomyélite en primovaccination et en rappel.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux vaccins tétanos, diphtérie,

coqueluche, poliomyélite et *Haemophilus Influenzae* type b.

Infection fébrile sévère.

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème au point d'injection.

Céphalée, rhinite.

Prurit, urticaire.

Réaction anaphylactique.

Convulsion, épisode d'hypotonie.

■ Vaccin antidiphtérique + vaccin anticoquelucheux + vaccin antipoliomyélique + vaccin antitétanique + vaccin *Haemophilus influenzae b*

PENTAVAC				
Primovaccination : 3 inj. IM espacées de 1 mois à l'âge de 2, 3 et 4 mois Rappel : 1 inj. 1 an après la primovaccination entre 16 et 18 mois	1 ser. prér. 0,5 mL	27,21	65 %	27,21
INFANRIX QUINTA				
Idem <b>PENTAVAC</b>	1 ser. prér. 0,5 mL	27,21	65 %	27,21

**PROPRIÉTÉS**

Vaccins contenant des anatoxines diphtérique, tétanique et pertussique, les virus poliomyélitiques atténués type 1, 2 et 3 et un polyoside d'*Haemophilus Influenzae* type b conjugué à la protéine tétanique.

**INDICATIONS**

Prévention conjointe des infections invasives à *Haemophilus Influenzae* type b, de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la poliomyélite en primovaccination et en rappel.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux vaccins tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite et *Haemophilus Influenzae* type b.

Infection fébrile sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Érythème au point d'injection.

Céphalée, rhinite.

Prurit, urticaire.

Réaction anaphylactique.

Convulsion, épisode d'hypotonie.

## VACCIN COMBINÉ DE RAPPEL CHEZ L'ADOLESCENT ET L'ADULTE

### ■ Vaccin antitétanique + vaccin antidiphtérie + vaccin antipoliomyélique

<b>REVAXIS</b>				
Inj. IM selon le schéma vaccinal chez E. > 6 ans et A. en rappel après primovaccination	1 ser. 0,5 mL + 2 aig. 10 ser. 0,5 mL + 2 aig.	<b>9,98</b> <b>HOP</b>	65 %	<b>9,98</b>

#### PROPRIÉTÉS

Vaccin combiné contre le tétanos (anatoxine), la diphtérie (faible dose d'anatoxine) et la poliomyélite (virus inactivés sérotypes 1, 2 et 3).

#### INDICATIONS

Vaccination de rappel des adolescents et des adultes contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux anatoxines tétanique, diphtérique et le virus poliomyélique, aux antibiotiques présents à l'état de trace (**néomycine, streptomycine, polymyxine B**), ou en cas de réaction sévère à une administration antérieure d'un vaccin.

Antécédent de complication neurologique après vaccination.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

Différer la vaccination en cas d'infection fébrile intercurrente.

À conserver entre + 2 et + 8 °C.

Agiter avant l'emploi.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions douloureuses, érythémateuses ou nodulaires au point d'injection, abcès aseptique exceptionnel.

Frissons, fièvre.

Diarrhée, vomissement.

Rash cutané, choc anaphylactique.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

## VACCIN ANTITYPHIQUE

## ■ Vaccin antityphoïde

TYPHÉRIX					
A. et E. > 2 ans : 1 inj. unique SC ou IM	1 ser. 0,5 mL			NR	
VACCIN TYPHIM VI					
A. et E. > 2 ans : 1 inj. unique SC ou IM	1 ser. 0,5 mL + 2 aig.			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin antigénique (polyoside capsulaire Vi purifié) dont l'efficacité contre la typhoïde (taux de protection de 60-70 %) apparaît entre 2 et 3 sem. après l'injection et persiste pendant au moins 3 ans (inefficace contre *Salmonella enterica* de sérotype A et B).

**INDICATIONS**

- Vaccination conseillée des voyageurs en zone d'endémie.
- À proposer aux sujets contacts (famille).
- Vaccination obligatoire du personnel d'analyse médical.
- Rappel à 5 ans.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et enfant < 2 ans.

Association au vaccin contre l'hépatite A.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conservation entre + 2 et + 8 °C

Efficacité non démontrée avant 2 ans et douteuse entre 2 et 5 ans.

Éviter la vaccination en période fébrile.

Revacciner par une seule dose en cas de nouvelle exposition dans un intervalle n'excédant pas 3 ans.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur modérée, rougeur, œdème au point d'injection.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Compatible avec les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite et les méningocoques.

**Principales complications de la typhoïde**

Digestives : hémorragies (10 %) ou perforations (1 à 3 % des malades hospitalisés) intestinales, hépatite, cholécystite (souvent infraclinique)

Cardiovasculaires : modifications électrocardiographiques sans symptômes, myocadite, choc  
Neuropsychiatriques (2-40 % des malades hospitalisés) : encéphalopathie, délire, état psychotique, méningite, troubles de la coordination

Respiratoires : bronchite, pneumonie

Hématologiques : anémie, coagulation intravasculaire disséminée

Autres : décès, localisations septiques secondaires, pharyngites, avortement, typhoïde néonatale, rechute (5-10 %), portage chronique

## VACCIN ANTIVARICELLEUX

## ■ Vaccin antivarielleux

<b>VARILRIX</b>				
A. : 2 doses SC à 6 à 10 sem. d'intervalle E. 12 mois à 12 ans : 1 dose SC	1 ser. 0,5 mL + fl. lyoph.	41,24	65 %	41,24
<b>VARIVAX</b>				
A. : 2 doses SC à 4 à 8 sem. d'intervalle E. 12 mois à 12 ans : 1 dose SC Pas de vaccination avant 12 mois	1 fl. lyoph. + 2 aig. + solv. 0,5 mL	41,24	65 %	41,24

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin à virus vivant atténué de la souche Oka, contre la varicelle.

**INDICATIONS**

Prévention de la varicelle chez :

- les professionnels de santé sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse), dont la sérologie est négative qui exercent les professions suivantes : contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), professions en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynécologie-obstétrique, néonatalogie, maladies infectieuses ;
- les personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, lors des situations suivantes :
  - personnes en contact étroit avec des immunodéprimés (les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d'éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 j) ;
  - adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle (dans les 3 j suivant l'exposition à un patient avec éruption).

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse et allaitement.**

Aplasie présente ou imminente : lymphocytes  $< 500/\text{mm}^3$ , neutrophiles  $< 500/\text{mm}^3$ .

Traitement immunosuppresseur intense : chimiothérapie d'induction, radiothérapie généralisée. Immunodépression cellulaire congénitale ou acquise (infection par le VIH), attente de greffe. Allergie à la **néomycine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque d'inactivation du vaccin en contact avec l'éther, l'alcool et les antiseptiques.

Vérifier l'hémogramme avant la vaccination.

**Test de grossesse chez les jeunes femmes en âge de procréer.**

Respecter un intervalle libre de chimiothérapie, 1 sem. avant et après chaque injection.

Pas d'administration de corticoïdes pendant les 15 j qui suivent la vaccination.

Après injection d'immunoglobulines antivarielles, risque d'inactivation du vaccin pendant 3 mois.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleurs et rougeurs locales de faible intensité et de courte durée.

Rash le plus souvent dû au virus sauvage (37 cas pour 100 000 injections) : exanthème varicelleux non fébrile avec moins de 50 éléments.

Transmission du virus vaccinal : 3 cas pour 15 millions de doses injectées.

Rares (incidences inférieures à celles de l'infection par le virus sauvage) : encéphalite, ataxie, érythème polymorphe, Stevens-Johnson, pneumonie, thrombopénie, épilepsie, neuropathie, zona.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Immunoglobulines antivarielles** : risque d'inactivation du virus vaccinal pendant 3 mois.

Médicaments immunosuppresseurs (corticoïdes, chimiothérapies lourdes) : risque de multiplication virale de la souche vaccinale atténuée.

## VACCIN ANTIAMARIL (1)

## ■ Vaccin antiamaril

STAMARIL				
A. et E. > 6 mois : 1 dose tous les 10 ans par voie SC	10 fl. + ser. 0,5 mL	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin viral vivant inactivé cultivé sur œuf embryonné, efficace dans les 10 j qui suivent l'injection.

Validité légale : 10 ans, jour pour jour.

**INDICATIONS**

Vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs en zone d'endémie (Afrique intertropicale et Amérique latine).

Consulter la liste mise à jour sur le site de l'OMS (<http://www.who.int/entity/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf>) ou se renseigner à l'ambassade.

Effectué uniquement dans les centres de vaccinations internationaux agréés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit immunitaire congénital ou acquis (dont immunosuppresseurs, sida sauf CD4 > 200/mm<sup>3</sup>, corticothérapie prolongée > 10 mg/j). Pas de contre-indication en cas d'hydrocortisone, de corticothérapie topique ou ≤ 10 mg par jour d'équivalent-prednisone, même s'il s'agit d'un traitement prolongé. Risque de maladie vaccinale potentiellement mortelle.

Affection aiguë ou chronique évolutive.

Allergie vraie à l'œuf. Risque d'urticaire, de bronchospasme, d'anaphylaxie).

Enfant < 6 mois.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prévenir du risque d'effets indésirables graves ou létales mais exceptionnels.

**Grossesse et allaitement** : éviter la vaccination pendant le 1<sup>er</sup> trimestre. L'allaitement doit être suspendu pendant la phase de virémie post-vaccinale ; il peut être repris deux semaines après l'administration du vaccin.

Âge > 65 ans.

Don de sang : suspendu pendant la phase de virémie post-vaccinale ; il peut être repris 4 semaines après l'administration du vaccin.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents (≥ 1/10) : céphalées, réactions locales.

Fréquents (≥ 1/100 et < 1/10) : nausée, diarrhée, vomissement ; myalgies ; fièvre, asthénie. Peu fréquents (≥ 1/1000 et < 1/100) : douleur abdominale ; arthralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqués avec les immunosuppresseurs. Compatible avec tous les autres vaccins y compris vivants atténués.

## VOYAGEURS (CONSEILS) (2)

### Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs corporels jugés efficaces en fonction des tranches d'âge et de population [1]\*

Catégorie d'âge et de population	Nombre max d'appl./j	Substance active	Concentration
De 6 mois à l'âge de la marche	1	DEET** ***	10 à 30 %
	1	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)****	20 à 30 %
	1	IR3535	20 %
De l'âge de la marche à 24 mois	2	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	10 à 30 %
	2	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	2	IR3535	20 %
De 24 mois à 12 ans	2	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	20 à 30 %
	2	Picardine	20 à 30 %
	2	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	2	IR3535	20 à 35 %
Plus de 12 ans	3	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	20 à 50 %
	3	Picardine	20 à 30 %
	3	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20 à 30 %
	3	IR3535	20 à 35 %
Femmes enceintes	3	DEET N,N-diéthyl-m-toluamide	30 %
	3	Picardine	20 %
	3	Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol (PMDRBO)	20%
	3	IR3535	20 %

\* Les recommandations d'utilisation figurant dans le tableau concernent l'usage de répulsifs cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de cette situation de risque grave, l'Afssaps précise qu'au vu des résultats des évaluations européennes en cours concernant les substances répulsives, l'usage de l'IR3535 est à privilégier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.

\*\* Le DEET a fait l'objet de la première expertise au niveau européen, une restriction d'usage est émise chez l'enfant de moins de 2 ans. Cependant, en cas de risque élevé de transmission d'une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte en respectant scrupuleusement le nombre d'applications maximum admis et les conditions pratiques d'usage chez l'enfant.

\*\*\* En cas d'exposition aux anophèles vecteurs des Plasmodium, vecteurs du paludisme, la concentration minimale efficace de DEET est de 30 %.


\*\*\*\* L'IR3535, l'icaridine et le PMDRBO sont en cours d'évaluation au niveau européen.

**VACCIN ANTIAMARIL (2)****Centres de vaccin antiamaril**

Voir le *Bulletin épidémiologique hebdomadaire* (BEH) n° 14-15/2013 sur le site du ministère de la Santé (<http://www.sante.gouv.fr/liste-des-centres-de-vaccination-habilites-a-effectuer-la-vaccination-anti-amarile.html?>).

Pays à risque de transmission de fièvre jaune et pays exigeant la vaccination anti-amaril (OMS)

<http://www.who.int/entity/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf>

**Zones d'endémie de la fièvre jaune - OMS 2013**

La vaccination contre la fièvre jaune n'est habituellement pas recommandée dans les zones où le risque de transmission est faible.

Cependant, la vaccination peut être conseillée pour une catégorie de voyageurs à haut risque car ils voyagent longtemps, s'exposent beaucoup aux piqûres de moustiques et ne peuvent lutter efficacement contre les piqûres. L'indication vaccinale repose sur le risque d'exposition au virus, les obligations légales par pays, et le risque d'effets indésirables potentiels de la vaccination.

## LIPOPEPTIDE (1)

## ■ Daptomycine

<b>CUBICIN</b>					
Infection compliquée de la peau et des tissus mous à <i>S. aureus</i> sans bactériémie : en perf. lente de 30 min : <b>4 mg/kg/j</b> en une administration pendant 7 à 14 j ou jusqu'à résolution de l'infection Insuffisance rénale : 4 mg/kg/48 h, surveiller la fonction rénale régulièrement Endocardite infectieuse du cœur droit associée à une bactériémie à <i>S. aureus</i> : en perf. lente de 30 min : <b>6 mg/kg/j</b> en une administration pour une durée maximale de 42 j	1 fl. 350 mg	HOP HOP	I I		
	1 fl. 500 mg				



**LIPOPEPTIDE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Lipopeptide cyclique agissant par liaison aux membranes bactériennes en présence d'ion  $\text{Ca}^{2+}$ .

**PHARMACOCINÉTIQUE**

Pas de métabolisation hépatique par les CYP-450. Élimination rénale à près de 80 %.

**MICROBIOLOGIE**

- Espèces sensibles avec activité démontrée : *Staphylococcus aureus* (y compris méti-R), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* subsp. *equisimilis* et *Streptococcus pyogenes*.
- Résistances naturelles : bactéries à Gram négatif en raison du mécanisme d'action.
- Résistances acquises : en cas d'infection difficile à traiter ou d'exposition prolongée à la daptomycine : certains *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis* et *Enterococcus faecium*.

**INDICATIONS**

Traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous (IcPTM).

Traitement de l'endocardite infectieuse (EI) du cœur droit due à *Staphylococcus aureus* si le germe est sensible.

Traitement d'une bactériémie à *Staphylococcus aureus* associée à une IcPTM ou une EI du cœur droit.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

En l'absence de données : grossesse, allaitement, âge  $\leq 18$  ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

S'assurer de la sensibilité du germe en cas de multirésistance notamment.

Surveillance étroite de la fonction rénale en particulier en cas d'insuffisance rénale.

Surveillance de la créatine-phosphokinase (CPK) et plus particulièrement chez les patients prenant des **statines**.

Surveillance des enzymes hépatiques.

Penser à l'associer à d'autres antibiotiques en cas d'infections polymicrobiennes pouvant comporter des bactéries à Gram négatif et/ou certaines bactéries anaérobies.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs musculaires, infections mycosiques, rash, réaction au site de perfusion, **élévation des CPK**, ALAT, ASAT et PAL.

Faible fréquence : douleurs musculaires, myosites, rhabdomyolyses.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les médicaments impliquant une augmentation de la CPK doivent être évités (**statines**, **fibrates**, **amphotéricine B** et **dexamétasone**) ; leur prise concomitante doit mener à une surveillance étroite de la CPK plasmatique.

## ACIDOSE MÉTABOLIQUE (1)

### Diagnostic positif

Il repose sur la gazométrie artérielle.

- $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mmol/L}$  : diminution des bases tampon : (soit consommation par des ions  $\text{H}^+$  en excès ; soit perte digestive ou urinaire).
- $\text{PaCO}_2 < 36 \text{ mmHg}$  : si compensation respiratoire afin de normaliser le pH.
- $\text{pH} < 7,38$  : acidose « non compensée ».
- pH normal : acidose « compensée ».

### Conduite à tenir

#### Quatre réflexes immédiats en cas d'acidose sévère

Existe-t-il :

- un état de choc ?
- une insuffisance rénale sévère ?
- une acidocétose ?
- une hyperkaliémie ?

#### Calcul du trou anionique plasmatique (TA)

$$\begin{aligned} \text{TA « Classique »} &= [\text{Na}^+ + \text{K}^+] - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] \\ &= 16 \pm 4 \text{ mmol/L.} \\ \text{TA « Simplifié »} &= [\text{Na}^+] - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] = 12 \\ &\pm 4 \text{ mmol/L.} \end{aligned}$$

- Le TA est augmenté en cas d'acidose métabolique par gain d'acide, et normal en cas d'acidose métabolique par perte de base.
- En cas d'acidose métabolique à TA normal, le calcul du trou anionique urinaire ( $\text{TA}_U = U_{\text{Na}} + U_{\text{K}} - U_{\text{Cl}}$ ) permettra de faire la différence entre une cause rénale et une cause digestive.
- Le calcul permet donc d'approcher la cause de l'acidose métabolique.

### Traitement

#### Traitement étiologique

Il sera appliqué chaque fois que possible ; lorsque l'acidose est modérée, il est parfois suffisant. Quelques exemples :

- acidocétose diabétique : réhydratation + insuline ;
- acidose lactique par biguanides : épuration extrarénale ;
- intoxication par l'éthylène glycol ou le méthanol : alcool éthylique ;
- prise en charge d'un état de choc, de convulsions, d'une diarrhée, etc.

#### Traitement symptomatique

► En cas d'acidose sévère ( $\text{pH} < 7,10$ )

- Soit épuration extrarénale (oligo-anurie, insuffisance rénale aiguë, hyperkaliémie sévère associée, ou cause toxique).
- Soit alcalinisation par **bicarbonate de sodium IV**.

La quantité de bicarbonate nécessaire est évaluée par la formule : mmoles de  $\text{HCO}_3^-$  à perfuser = espace de diffusion x correction souhaitée = [poids x 0,6] x [ $\text{HCO}_3^-$  souhaité -  $\text{HCO}_3^-$  réel]

En pratique, l'alcalinisation doit être partielle +++ (ramener les bicarbonates plasmatiques à 16 mmol/L en environ 6 h), les risques d'une correction trop rapide étant :

- une hyperventilation avec alcalose respiratoire (l'acidose du LCR se corrige plus lentement) ;
- une surcharge hydrosodée ;
- une hypoxie tissulaire (augmentation de l'affinité  $\text{Hb-O}_2$  à pH alcalin) ;
- plus rarement une hypokaliémie.

Quatre solutés de **bicarbonate de sodium IV** ( $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{Na}^+$ ) sont disponibles :

- isotonique = 14 ‰ = voie périphérique ;
- hypertonique = 30 ‰ = voie centrale ;
- semi-molaire = 42 ‰ = voie centrale ;
- molaire = 84 ‰ = voie centrale.

1 g apporte 12 mmol de  $\text{HCO}_3^-$  et 12 mmol de Na.

## ACIDOSE MÉTABOLIQUE (2)

► En cas d'acidose modérée/chronique

L'alcalinisation orale est indiquée en cas :

- d'insuffisance rénale chronique :
  - soit du **BICARBONATE DE SODIUM OFFICINAL** (2 à 8 g/j) : **EAUX DE VICHY** (500/j apportent 2 g de  $\text{HCO}_3\text{Na}$ ), poudre en préparation officinale, gélules à 1 g,
  - soit **ALCAPHOR** (trométamol + citrate de sodium et de potassium) (2 à 8 g/j *per os*), qui n'apporte pas de sel ;

- d'acidose tubulaire :

- de type I (distale) = le **citrate de potassium** a l'avantage de corriger simultanément l'acidose et l'hypokaliémie (en l'absence d'insuffisance rénale),
- de type II (proximale) = **bicarbonate de sodium**.

### Causes des acidoses métaboliques

#### Acidose métabolique avec trou anionique simplifié augmenté ( $> 16 \text{ mM/L}$ )

- Surcharge acide endogène :
  - céto-acidose (diabète, jeûne prolongé, stéatose hépatique éthylique) ;
  - acidose lactique (états de choc, intoxications, insuffisance hépatocellulaire, cancers, etc.) ;
  - rhabdomyolyses.
- Surcharge acide exogène (alcool méthylique, éthylène glycol, paraldéhyde, salicylés).
- Insuffisance rénale aiguë ou chronique terminale.

#### Acidose métabolique avec trou anionique simplifié normal ( $12 \pm 4 \text{ mM/L}$ )

- Perte digestive de bicarbonates :
  - diarrhée ;
  - fistules biliaires, duodénales et pancréatiques ;
  - urétéro-sigmoïdostomie (urines riches en  $\text{Cl}^-$  → réabsorption de  $\text{Cl}^-$  par le sigmoïde en échange de  $\text{HCO}_3^-$  !) ;
  - **colestyramine (QUESTRAM)** ;
  - $\text{MgSO}_4$  ;  $\text{CaCl}_2$ .
- Acidoses tubulaires rénales (proximale, distale).
- Rares cas de surcharge acide exogène avec apport chloré concomitant :  $\text{HCl}$  ; chlorhydrate d'arginine, de lysine, chlorure d'ammonium, **méthionine**.

## ALCALOSE MÉTABOLIQUE (1)

### Physiopathologie

Pour générer une alcalose métabolique il faut simultanément deux situations.

#### Une élévation des bicarbonates plasmatiques

- Soit par perte d'ions  $H^+$  (digestive ou rénale), ce qui entraîne une génération d'ions  $HCO_3^-$ .
- Soit par apport excessif de bicarbonates (ou de ses précurseurs).
- Soit par diminution du volume de distribution des bicarbonates (déshydratation).

#### Un défaut d'élimination des bicarbonates

- Soit par diminution du débit de filtration glomérulaire.
- Soit du fait d'une réabsorption tubulaire accrue (déficit en chlore ou en potassium, déshydratation).

### Diagnostic

Le diagnostic positif d'une alcalose métabolique est biologique :

- $HCO_3^- > 26$  mmol/L ;
- $PCO_2 > 42$  mmHg si compensation respiratoire ;
- $pH > 7,42$  (alcalose non compensée) ou normal (alcalose compensée).

### Traitement

#### Traitement étiologique

Il est suffisant dans la majorité des cas. Quelques exemples : arrêt d'une consom-

mation d'alcalins, réduction de la posologie de **diurétiques**, traitement des vomissements, exérèse d'une tumeur villositaire, etc.

#### Traitement symptomatique

Il est exclusivement réservé aux alcaloses sévères ( $pH > 7,56$ ) ou symptomatiques (troubles de vigilance, convulsions).

##### ► Apports de chlore

L'objectif est de corriger les déficits en sodium, chlore et potassium en apportant du NaCl et du KCl par voie orale ou parentérale. Lorsque le traitement est efficace, il y a bicarbonaturie et le pH urinaire s'élève (passant en règle de 5,5 à plus de 8).

##### ► Acidification (rarement indiquée)

Lorsque l'« apport de chlore » a échoué :

- soit **inhibiteur de l'anhydrase carbonique** (augmente l'excrétion urinaire de bicarbonates) : **acétazolamide (DIAMOX)** ;
- soit soluté acidifiant (chlorhydrate d'arginine, chlorhydrate d'ammonium, acide chlorhydrique dilué) ; la quantité de mmoles à perfuser en 6 à 12 h est évaluée par la formule :  $[0,6 \times \text{poids du patient}] \times [\text{bicarbonates plasmatiques} - 24]$ .

##### ► Dialyse

Une séance d'épuration extrarénale est nécessaire lorsqu'une alcalose métabolique grave symptomatique survient chez un patient porteur d'une insuffisance rénale totale ou terminale.

## ALCALOSE MÉTABOLIQUE (2)

### Causes d'alcalose métabolique

#### Excès d'apports alcalins :

- apport exagéré de bicarbonates ou de ses précurseurs ;
- **antiacides** + résines échangeuses de cations ;
- syndrome des « buveurs de lait et alcalins ».

#### Alcaloses sensibles au chlore (avec déshydratation extracellulaire et chlorurie basse) :

- vomissements ou aspiration gastrique, tumeur villositaire du côlon ;
- **diurétiques** (chlorurie variable) ;
- correction rapide d'une hypercapnie chronique.

#### Alcaloses insensibles au chlore (pas de déshydratation, chlorurie variable, hypokaliémie profonde, parfois HTA) :

- hyperaldostéronisme primaire ;
- syndrome de Cushing, syndrome de Bartter et syndrome de Gitelman ;
- **pénicillines** à fortes doses.

## DYSKALIÉMIES (1)

### Métabolisme du potassium

- Le potassium est le principal cation intracellulaire. Les cellules musculaires abritent 98 % du potassium total de l'organisme. Une pompe (Na/K-ATPase) permet de maintenir un important gradient entre milieux intra- et extracellulaires.
- Les apports de potassium sont alimentaires (environ 4 g/j), et les sorties fécales (5 %, obligatoires) et rénales (95 %, régulables). Le maintien d'une kaliémie normale (3,5 à 5 mmol/L) est possible grâce à des transferts transcellulaires de potassium à court terme, et à une régulation rénale à long terme.
- Trois facteurs stimulent l'entrée du potassium dans les cellules :
  - la stimulation  $\beta_2$ -adrénergique ;
  - l'insuline ;
  - un pH alcalin.
- Concernant la régulation rénale, après filtration glomérulaire, le potassium est totalement réabsorbé au niveau du tube contourné proximal et de l'anse de Henle. Une sécrétion distale permet son élimination urinaire. Cette sécrétion tubulaire distale est stimulée par l'hyperkaliémie, l'aldostérone, un pH alcalin, un débit urinaire élevé.

$K^+$  1 g = 25 mmol de  $K^+$   
KCl 1 g = 13 mmol de  $K^+$

### Aliments riches en potassium (en mmol/100 g)

Fruits et légumes secs : 15 à 40.  
Jambon fumé : 15.  
Pommes de terre, champignons, épinards : 12.  
Chocolat, bananes : 10.  
Poissons, crustacés, viandes : 4 à 10.  
Légumes et fruits frais : 5 à 7.  
Jus de fruits (pour 100 mL) : 4.

### Hyperkaliémie

#### Définition

$K^+$  plasmatique  $> 5$  mmol/L.

L'hyperkaliémie suppose la conjonction de 2 facteurs :

- augmentation de l'apport potassique extracellulaire, alimentaire ou intracellulaire ;
- un défaut d'excrétion rénale.

#### Principales causes d'hyperkaliémie

##### ► Fausses hyperkaliémies

Garrot serré, hémolyse *in vitro*, thrombocytose ou hyperleucocytose majeures.

##### ► Transfert extracellulaire du potassium

- Acidose métabolique ou respiratoire.
- Destruction cellulaire massive (rhabdomyolyse, lyse tumorale des chimiothérapies).
- Hypo-insulinisme.
- Paralysie périodique hyperkaliémique.
- Traitement  $\beta$ -bloquant.
- Intoxication digitale.

##### ► Défaut d'élimination rénale du potassium

- Insuffisance rénale sévère (aiguë, chronique).
- Déficit minéralocorticoïde.
- Traitement par **spironolactone, amiloride, AINS, IEC, ARA II**.

##### ► Surcharge exogène en potassium

Perfusion intraveineuse, apports oraux (dont les sels de régime).

## DYSKALIÉMIES (2)

### Hypokaliémie

#### Définition

$K^+$  plasmatique  $\leq 3,5$  mmol/L.

#### Principales causes d'hypokaliémie

► *Insuffisance des apports alimentaires (3 g/j au minimum)*

- Anorexie, régimes.

► *Transfert intracellulaire accru du  $K^+$*

- Alcalose aiguë (métabolique ou respiratoire).

- Insulinothérapie (surtout lors d'une acidocétose).

- Stimulation  $\beta_2$ -adrénergique.

- Hypothermie.

- Intoxication : **chloroquine**, **théophylline**, **baryum**.

- Vitaminothérapie B12 ou GM-CSF.

- Maladie de Westphal (autosomique dominante).

► *Pertes rénales de  $K^+$  (kaliurèse « inappropriée » supérieure à 20 mmol/24 h)*

- Causes médicamenteuses :

- **diurétiques** : **acétazolamide**, de l'anse, thiazidiques, osmotiques ;

- tubulotoxiques : **lithium**, **cisplatine**, **amphotéricine B**, **pénicilline** à forte dose, etc.

- corticothérapie.

- Causes endocriniennes (avec HTA) :

- hyperaldostérionisme (primaire ou secondaire) ;

- autres hyperminéralocorticismes ;

- hypercortisolisme endogène (syndrome de Cushing).

- Causes rénales :

- néphropathies interstitielles avec perte de sel ;

- acidoses tubulaires distales, acidocétose diabétique ;

- syndrome de Bartter, syndrome de Gitelman (maladies héréditaires touchant les cellules tubulaires rénales et mimant la prise de **diurétiques**, respectivement de l'anse et thiazidiques) ;

- polyurie (après levée d'obstacle, nécrose tubulaire, transplantation).

► *Pertes digestives de  $K^+$  (kaliurèse « appropriée » en quelques jours  $< 20$  mmol/24 h)*

- *Hautes* : vomissements, aspiration digestive. La perte d'HCl favorise une alcalose métabolique et un profond déficit chloré (chlorémie et chlorurie basses).

- *Basses* : diarrhée aiguë infectieuse, maladie des laxatifs, tumeur villositaire, VIPome, Zollinger-Ellison. Il y a souvent acidose métabolique (perte digestive de bicarbonates), et pas de déficit chloré.

► *Pertes cutanées de  $K^+$*

- Sudation extrême.

- Brûlures étendues.

► *Hémodialyse, plasmaphérèse*

## DYSKALIÉMIES (3) – HYPERKALIÉMIE

### Traitement ambulatoire

#### Conditions nécessaires

- Hyperkaliémie modérée (6 mmol/L) chronique ou non rapidement évolutive.
- ECG normal.
- Cause identifiée et contrôlable.

Il s'agit souvent en pratique d'une hyperkaliémie chez un patient porteur d'une insuffisance rénale chronique, éventuellement dialysé. Outre l'insuffisance rénale, il faut rechercher un facteur associé (erreur de régime, médicament hyperkaliémiant).

#### Éviction des aliments riches en potassium

Fruits secs, bananes, cerises, légumes, chocolat, etc.

#### Arrêt des médicaments hyperkaliémiants

**Antialdostérone\***, inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (**ARA II**)\*\*, AINS, sels de régime (sels de potassium)\*\*\*.

#### Traitement hypokaliémiant

- Correction d'une éventuelle acidose métabolique : **Eaux de Vichy** : 500 mL/j.
- **Résine hypokaliémiante (KAYEXALATE, RESIKALI).**
- **Diurétique hypokaliémiant (furosemide, bumétanide).**

### Traitement hospitalier

*Impératif dans les situations suivantes :*

- hyperkaliémie sévère ( $> 6$  mmol/L) ;
- hyperkaliémie rapidement évolutive (lyse cellulaire, insuffisance rénale aiguë) ;
- cause et évolutivité incertaines ;
- anomalies ECG.

#### Mise en condition du patient

- Hospitalisation en réanimation.
- Surveillance cardioscopique continue.
- Voie veineuse périphérique.

#### Mesures d'effet immédiat

Le but est d'obtenir une protection transitoire contre l'hyperexcitabilité myocardique (en cas d'anomalies ECG) : en l'absence de traitement digitalique, **gluconate de calcium** à 10 % : 1 amp. en IVL.

#### Mesures d'effet rapide (30 min)

Le but est de transférer le potassium en intracellulaire :

- alcalinisation : 50 ml de **bicarbonate de sodium** à 42 % en 15 min.
  - perfusion intraveineuse de 500 mL de glucose à 30 % avec 30 UI d'insuline ordinaire en 30 min ;
  - perfusion intraveineuse d'agents  $\beta_2$ -mimétiques : **salbutamol** 0,5 mg dans 100 mL en 15 min ;
- Alcalinisation et glucosé/insuline sont souvent associés, mais contre-indiqués en cas d'œdème pulmonaire car ils aggravent la surcharge. Les agents  $\beta_2$ -mimétiques ont une efficacité inconstante et variable.

#### Mesures à efficacité retardée (2 h)

**Résine hypokaliémiante : KAYEXALATE** per os : 2 c-mes. (30 g) ou en lavement : 60 g. Ces mesures ont une efficacité modérée, permettant le plus souvent de faire baisser la kaliémie de 1 à 1,5 mmol en 1 h, en attendant la mise en œuvre d'une séance d'épuration extrarénale.

#### Épuration extrarénale (EER)

Le plus souvent par hémodialyse avec un bain pauvre en potassium, qui permet de corriger complètement et rapidement la kaliémie. Une EER prolongée plus de 4 h, voire continue, est nécessaire lorsque l'hyperkaliémie est rapidement évolutive en raison d'une cause difficilement contrôlable (lyse cellulaire).

$K^+$  1 g = 25 mmol de  $K^+$   
KCl 1 g = 13 mmol de  $K^+$

\* Théoriquement contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale.

\*\* La survenue d'une hyperkaliémie avec poussée d'insuffisance rénale sous **IEC** ou **ARA II** doit faire évoquer une maladie rénovasculaire ; les **IEC** et **ARA II** ne sont pas contre-indiqués en situation d'insuffisance rénale chronique, mais motivent une surveillance biologique stricte.

\*\*\* A éviter chez l'insuffisant rénal car très riches en  $K^+$ .



## RÉSINES HYPOKALIÉMIANTES

## ■ Polystyrène sulfonate de sodium

<b>KAYEXALATE</b>					
Traitement initial : - 1 à 4 c-mes./j - ou en lavement (à garder 6 h, renouvelable) de 60 g dilués dans 100 mL de soluté glucosé à 10 % Traitement d'entretien (insuffisant rénal chronique, dialysé) : posologie variable (entre 3 c-mes./sem. et 2 c-mes./j)	30 c-mes. 15 g (boîte 450 g)	35,40	II	100 %	1,18

## ■ Polystyrène sulfonate de calcium

<b>RESIKALI</b>					
Idem <b>KAYEXALATE</b>	25 c-mes. 18 g (boîte 500 g)	31,71	II	100 %	1,27

**PROPRIÉTÉS**

Résines échangeuses de cations non résorbées, échangeant dans le tube digestif (côlon) potassium contre sodium (polystyrène de sodium) ou calcium (polystyrène de calcium). Efficacité retardée (3 à 4 h), permettant un abaissement progressif et transitoire de la kaliémie de 0,5 à 1,5 mmol/L.

**INDICATIONS**

Traitement des hyperkaliémies non menaçantes, au cours de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypercalcémie (pour le polystyrène de calcium).  
Hypokaliémie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas de traitement prolongé (insuffisant rénal chronique, dialysé), surveiller régulièrement la kaliémie, la magnésémie, la phosphorémie (et la calcémie pour le polystyrène de calcium). Un traitement préventif de la constipation est préconisé (**sorbitol per os**) afin d'éviter occlusion et hyperabsorption sodée (pour le polystyrène de sodium).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : constipation le plus souvent, avec risque de fécalome ; parfois nausées ou gastralgies.

Hypokaliémie (par surdosage).

Hypercalcémie (polystyrène de calcium, surtout en cas de traitement simultané par la **vitamine D**).

Surcharge sodée (polystyrène de sodium, surtout en cas de ralentissement du transit digestif chez l'insuffisant cardiaque).

**DYSKALIÉMIES (4) – HYPOKALIÉMIE****Traitement curatif**

Le traitement curatif d'une hypokaliémie est tout d'abord étiologique. Une supplémentation potassique est nécessaire lorsque l'hypokaliémie est sévère ( $K^+ < 2,5$  mmol/L) ou lorsqu'elle survient chez un sujet digitalisé ou porteur d'une cardiopathie. la quantité de **potassium** à apporter et la voie d'administration dépendent essentiellement de l'existence ou non de troubles du rythme, de paralysies, et de troubles digestifs.

**Limiter les risques d'accident cardiaque**

- Arrêt d'un traitement digitalique si kaliémie  $< 3$  mmol/L.
- Discuter l'arrêt de médicaments allongeant l'espace QT (risque de torsades de pointes).

**Limiter les pertes potassiques**

Il s'agit du traitement étiologique, lorsqu'une fuite rénale ou digestive peut être stoppée. Il faut notamment interrompre les médicaments hypokaliémisants. En cas d'hyperaldostéronisme secondaire, les **diurétiques épargneurs de potassium** (**spironolactone**, **SOLUDACTONE**) peuvent limiter les pertes urinaires et aider à la correction d'une hypokaliémie.

**Corriger le déficit potassique**

► *Voie orale en l'absence de troubles du rythme, de paralysie, ou de trouble digestif*

- Alimentation riche en potassium : jus d'orange, pamplemousse, banane, fruits secs, légumes, chocolat.

- Supplémentation orale en sels de potassium : **chlorure de potassium** le plus souvent, corrigeant également le déficit chloré ; **DIFFU-K**, 1 à 6 gél./j ou **KALEORID LEO LP 600**, 1 à 6 cp./j ou **KALEORID LEO LP 1000**, 1 à 4 cp./j. Prescrire en 2 à 3 prises à la fin des repas, avec un verre d'eau.

Les sels alcalins de potassium (bicarbonate, citrate, gluconate) pérennisent l'alcalose et donc l'hypokaliémie : à éviter, sauf en cas d'acidose métabolique associée.

► *Voie veineuse en cas de troubles du rythme, paralysie, trouble digestif*

Sous surveillance cardioscopique continue : **chlorure de potassium** à diluer dans un soluté salé ou glucosé :

- concentration maximale : 4 g/L sur une veine périphérique (irritation, phlébite) ;
- débit à ne jamais dépasser sur une voie centrale : 1,5 g/h ;
- jamais d'injection intraveineuse directe (mort subite).

**Traitement préventif**

Un traitement préventif est souvent utile chez les patients soumis à un traitement hypokaliémiant, par exemple corticoïde ou diurétique.

En revanche, lorsqu'un **IEC** ou un **ARA II** est associé au diurétique, la supplémentation potassique n'est généralement pas utile.

$K^+$  1 g = 25 mmol de  $K^+$   
 $KCl$  1 g = 13 mmol de  $K^+$

## POTASSIUM

### ■ Chlorure de potassium

<b>DIFFU-K</b>					
Hypokaliémie : traitement préventif : 8 à 24 mmol/j ou curatif : 24 à 96 mmol/j	40 gél. 8 mmol (600 mg)	2,77		65 %	0,07
<b>KALEORID LP</b>					
Idem <b>DIFFU-K</b>	30 cp. 8 mmol (600 mg)	2,16		65 %	0,07
	30 cp. 13,4 mmol (1 g)	2,73		65 %	0,09
<b>POTASSIUM RICHARD</b>					
Idem <b>DIFFU-K</b>	16 càs 11 mmol (fl. 250 mL)	2,82		65 %	0,18
	20 sach. 11 mmol	3,19		65 %	0,16

### ■ Gluconate de potassium

<b>GLUCONATE DE POTASSIUM H3 SANTÉ</b>					
Hypokaliémie, traitement préventif : 1 à 4 càs/j	17 càs 10 mmol (fl. 250 mL)	2,42		65 %	0,14

### ■ Tartrate de potassium

<b>NATI-K</b>					
Hypokaliémie, traitement préventif : 1 à 6 cp./j	40 cp. 4,26 mmol (500 mg)	2,52		65 %	0,06

#### PROPRIÉTÉS

Cf. Dyskaliémies.

#### INDICATIONS

Hypokaliémies : traitement curatif ou préventif (coprescription avec **diurétiques hypokaliémisants** ou **corticoïdes**).

#### CONTRE-INDICATIONS

Hyperkaliémie ; coprescription avec **IEC** ou **diurétiques épargneurs de potassium** (sauf hypokaliémie).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence (risque d'hyperkaliémie) : insuffisance rénale sévère, insuffisance surrénalienne, diabète sucré.

Comprimés : ingérer debout ou assis, avec de l'eau.

Voie veineuse : ne jamais dépasser 1,5 g/h ; jamais d'injection intraveineuse directe

(IVD) sinon risque de mort subite par arrêt cardiaque ; voie périphérique : dilution dans un soluté salé ou glucosé isotonique, avec concentration  $\leq 4$  g/L sur une veine périphérique. Préférer le **chlorure de potassium** en cas d'alcalose associée.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Voie orale : nausées, gastralgies, vomissements, diarrhée.

Voie veineuse : irritation veineuse (concentrations élevées) ; risque de mort subite (perfusion trop rapide).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association aux **diurétiques hyperkaliémisants** ou aux **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** est contre-indiquée, sauf en cas d'hypokaliémie : dans ce cas un contrôle hebdomadaire de la kaliémie est initialement souhaitable le 1<sup>er</sup> mois.

## DYSKALIÉMIES (5) – HYPOKALIÉMIE DES DIURÉTIQUES (1)

### Caractéristiques

Deux types de **diurétiques** d'usage courant sont pourvoyeurs d'hypokaliémies : les **diurétiques thiazidiques** principalement, et les **diurétiques de l'anse** à un degré moindre. Cette complication des **thiazides** ou des **diurétiques de l'anse** est rare ( $\leq 5\%$ ), précoce ( $\leq 3$  sem. de traitement) et dose-dépendante. Les hypokaliémies « tardives » (au-delà de la 3<sup>e</sup> sem. de traitement) sont liées soit à une augmentation de la posologie du **diurétique**, soit à une réduction des apports potassiques alimentaires, soit à des pertes potassiques extrarénales (diarrhée).

### Diagnostic

Lorsque la cause d'une hypokaliémie ( $K^+ < 3,5$  mmol/L) est incertaine, un ionogramme urinaire est indispensable.

**Kaliurèse basse** ( $< 20$  mmol/24 h)  
**sans déficit chloré**

Les pertes de potassium sont digestives basses (diarrhée, prise de laxatifs).

**Déficit chloré intense** (avec kaliurèse variable)

Il s'agit de vomissements.

**Fuite rénale de potassium** (kaliurèse  $> 40$  mmol/j) chez un hypertendu

Il faut évoquer de principe, outre le rôle des **diurétiques**, certaines HTA secondaires (hyperaldostérisme primaire, sténose artérielle rénale, hypercortisolisme, hyperminéralocorticisme, syndrome de Liddle).

**Fuite rénale de potassium isolée et inexpliquée**

Il s'agit d'une prise cachée de **diurétiques** ou d'une maladie tubulaire rénale (ex. : syndrome de Gitelman).

### Conduite thérapeutique

**Hypokaliémie modérée** ( $> 3$  mmol/L) liée à l'emploi de diurétiques hypokaliémisants

Le meilleur traitement est l'utilisation de la posologie minimale efficace des **diuré-**

**tiques** (par exemple 12,5 à 25 mg d'**hydrochlorothiazide** (**ESIDREX**) dans le traitement de l'HTA).

**Hypokaliémie sévère** ( $< 3$  mmol/L) ou persistante

- Supplémentation orale en **chlorure de potassium** (et en **chlorure de magnésium** en cas d'hypomagnésémie associée).
  - Alimentation riche en potassium (jus d'orange, pamplemousse, bananes, fruits secs, chocolat).
  - **Chlorure de potassium** : **DIFFU-K**, **KALEORID LEO LP 600**, ou **KALEORID LEO LP 1000**, 1 à 2 cp./j.
  - **Diurétique épargneur de potassium** : **spironolactone** (**ALDACTONE**) 75 à 300 mg/j, ou **amiloride** (**MODAMIDE**) 5 à 20 mg/j, la posologie efficace étant parfois élevée chez l'insuffisant cardiaque du fait de l'importance de l'hyperaldostérisme secondaire.
- L'**amiloride** (mieux toléré, en particulier par l'homme) est le produit de choix. Ces **diurétiques** épargnent en outre le magnésium.

### Hypokaliémies sous diurétiques + IEC/ARA II

La coprescription d'un **IEC/ARA II** limite les pertes urinaires de potassium et rend l'hypokaliémie très rare : il n'est pas utile de prescrire systématiquement une supplémentation potassique.

Si une hypokaliémie survient (souvent lors des 3 premières sem. du traitement), il faut diminuer la posologie du diurétique, ou augmenter la posologie de l'IEC. En seconde intention, une supplémentation en **chlorure de potassium** est possible : dans ce cas, la kaliémie doit être surveillée de façon hebdomadaire (du fait du risque d'hyperkaliémie), sachant qu'un nouvel état d'équilibre sera atteint en 3 sem. L'adjonction d'une faible dose d'un **diurétique « épargneur de potassium »** à l'association **IEC/ARA II - diurétique** est trop délicate à manier pour être conseillée en pratique extrahospitalière.

## DIURÉTIQUES DE L'ANSE (1)

## ■ Furosémide

<b>LASILIX FAIBLE</b>					
1 à 2 cp./j en 1 à 2 prises	30 cp. séc. 20 mg 100 cp. séc. 20 mg	2,48 HOP	II II	65 %	0,08
<b>LASILIX</b>					
1 à 6 cp./j en 1 à 2 prises	30 cp. séc. 40 mg 100 cp. séc. 40 mg	3,41 HOP	II II	65 %	0,11
0,5 à 1 mg/kg/j IM ou IV	1 amp. 20 mg 5 amp. 20 mg	1,77 HOP	II II	65 %	1,77
<b>LASILIX RETARD</b>					
1 à 2 gél./j en 1 à 2 prises	30 gél. LP 60 mg 100 gél. LP 60 mg	4,79 HOP	II II	65 %	0,16
<b>LASILIX SPÉCIAL</b>					
250 mg à 2 000 mg/j	30 cp. séc. 500 mg 100 cp. séc. 500 mg 5 amp. 250 mg	33,18 HOP HOP	II II II	65 %	1,11

## ■ Bumétanide

<b>BURINEX</b>					
0,5 à 6 mg/j	30 cp. séc. 1 mg 30 cp. séc. 5 mg	4,68 18,12	II II	65 % 65 %	0,16 0,60
OAP : 1 amp., renouvelable à la demande	5 amp. 2 mg	8,04	II	65 %	1,61

## ■ Pirétanide


<b>EURELIX</b>					
HTA : 1 gél./j	30 gél. LP 6 mg	7,69	II	65 %	0,26

## DYSKALIÉMIES (6) – HYPOKALIÉMIE DES DIURÉTIQUES (2)

### Diurétiques (indications préférentielles)

PATHOLOGIE	CHOIX DU DIURÉTIQUE
Insuffisance cardiaque Cirrhose Syndrome néphrotique	<b>Furosémide</b> <b>Diurétique épargneur de potassium</b> ± <b>furosémide</b> (doses progressives) <b>Diurétique épargneur de potassium</b> ± <b>furosémide</b> (doses progressives)
Insuffisance rénale aiguë oligoanurique	Normalisation de la volémie puis <b>furosémide</b> IV à fortes doses
Hypertension artérielle : - essentielle - hyperaldostérionisme primaire - syndrome de Liddle	Thiazidique ou <b>diurétique de l'anse</b> <b>Diurétique épargneur de potassium</b> <b>Amiloride</b> ou <b>triamtérène</b>
Hypercalcémie	Réhydratation puis <b>furosémide</b> IV et compensation de diurèse
Lithiase calcique + hypercalciurie	<b>Thiazidique</b>
Diabète insipide néphrogénique	<b>Thiazidique</b>
Hyperhydratation intracellulaire sévère	<b>Furosémide</b> + soluté salé hypertonique
Glaucome aigu	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i> /IV
Mal des montagnes	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i>
Alcalose de reventilation	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i>

### Mode d'action des différents types de diurétiques



Site I, tube proximal : inhibiteur de l'anhydrase carbonique.

Site II, branche ascendante de l'anse de Henle : « diurétiques de l'anse ».

Site III, segment cortical de dilution et segment initial du tube distal : thiazides et dérivés.

Site IV, tube distal terminal et collecteur cortical : diurétiques antikaliurétiques (spironolactone, amiloride, triamtérène).

## DÉSHYDRATATION EXTRACELLULAIRE (1)

### Rappel physiopathologique

La perte d'eau et de sel, iso-osmotique au plasma, aboutit à une déshydratation extracellulaire pure.

### Diagnostic positif

- Essentiellement **clinique** :
  - perte de poids ;
  - soif ;
  - tachycardie ;
  - hypotension artérielle : orthostatique, puis permanente, voire collapsus ou choc ;
  - veines plates (jugulaires externes) ;
  - pli cutané et peau sèche (sauf pertes sudorales) ;
- Quelques signes biologiques évocateurs :
  - hémococoncentration (élévation de l'hématocrite et des protéides) ;
  - élévation de l'urée et de la créatinine ;
  - élévation de l'uricémie ;
  - alcalose métabolique « de contraction ».

### Diagnostic étiologique

**Pertes hydrosodées extrarénales (digestives/cutanées) :**

**la réponse rénale est « appropriée »**

- Réabsorption maximale d'eau et de sel (diurèse < 400 mL/j et natriurèse < 20 mmol/L).
- Élimination maximale des déchets : urines concentrées, riches en urée (urinaire/plasmatisque > 10) et en créatinine (urinaire/plasmatisque > 30).

**Pertes hydrosodées rénales : la réponse rénale est « inappropriée »**

- Urine abondante et natriurèse > 30 mmol/L.
- Urée urinaire/plasmatisque < 10 et créatinine urinaire/plasmatisque < 20.

### Traitement symptomatique

Apports hydrosodés isotoniques équivalents à la perte de poids.

#### Voie d'administration

- *Orale, en l'absence de vomissements et de signes de gravité*
- Alimentation riche en sel, bouillons salés.

– Sachets ou gélules de NaCl à 1 g en plus de l'alimentation normale.

➤ *Veineuse, en cas de vomissements ou signes de gravité (hypotension)*

Soluté salé isotonique (NaCl à 9 ‰) ou **bicarbonate de sodium** à 14 ‰ en cas d'acidose métabolique associée.

➤ *Sous-cutanée, en cas de réduction du capital veineux (sans apports potassiques)*

#### Quantité d'eau et de sel à apporter

Perte de poids (1 L d'eau par kg perdu), avec 9 g de NaCl/L. Lorsque le poids antérieur n'est pas connu, le déficit extracellulaire peut être estimé à 20 % x poids x (Hte/Hte normale - 1).

#### Rapidité de correction

Elle dépend de l'importance initiale du déficit, de la persistance ou non de la cause, et de la réponse au remplissage (efficacité clinique et biologique, tolérance cardiaque).

#### Surveillance


- Pression artérielle et fréquence cardiaque.
- Poids, diurèse, téguments.
- Pression veineuse centrale parfois.
- Biologie : régression de l'hémococoncentration et de l'insuffisance rénale fonctionnelle.
- Surveillance de la cause de la DEC.

#### Traitement étiologique


- Pertes digestives : vomissements, diarrhée, aspiration digestive, fistule ; 3<sup>e</sup> secteur (occlusion, pancréatite, péritonite).
- Pertes rénales : **diurétiques**, insuffisance surrénalienne, levée d'obstacle, néphropathie avec « perte de sel » (atteintes interstitielles aiguës ou chroniques, polykystose, néphronophtise), polyurie osmotique (diabète décompensé), hypercalcémie etc.
- Pertes cutanées : brûlures, coup de chaleur, mucoviscidose.

## DÉSHYDRATATION EXTRACELLULAIRE (2)


### Mouvements de l'eau entre les compartiments - Rôle des forces osmotiques



**Équilibre osmotique entre les compartiments.  
Pas de passage apparent de l'eau entre eux.**



La chute du Na entraîne une baisse de la pression osmotique du compartiment extracellulaire et par suite une hyperhydratation cellulaire. Mais la natrémie peut apparaître normale si la réduction volumétrique du compartiment est parallèle à la diminution du capital sodé du milieu intérieur.



Phénomènes inverses.

PO : pression osmotique



## HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE (1)

### Diagnostic

Une hyponatrémie ( $< 135$  mmol/L) traduit le plus souvent une hyposmolalité plasmatique efficace, qui a pour conséquence un transfert d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire : hyperhydratation intracellulaire. Les signes cliniques sont digestifs (nausées, vomissements, anorexie, dégoût de l'eau) et neuro-psychiques (céphalées, asthénie, troubles de la vigilance, confusion, délire, crampes musculaires, hypertonie extrapyramidale, signe de Babinski, myoclonies, fasciculations). Les complications les plus redoutables sont coma profond et crises convulsives.

### Hyponatrémies sans hyperhydratation intracellulaire

Les causes sont les suivantes (le traitement est étiologique).

#### Secteur intracellulaire normal ou « fausse hyponatrémie »

- Hyperprotidémie majeure ( $> 90$  g/L) : myélome, Waldenström.
- Hyperlipidémie majeure ( $> 30$  g/L) : syndrome de Zieve, diabète déséquilibré, syndrome néphrotique, etc.

#### Déshydratation intracellulaire (cas très rares)

- Hyperosmolaires (mannitol, glycérol, dextrans, produits de contraste).
- Résorption de glycolle, résections endoscopiques de prostate.
- Intoxications : méthanol, éthanol, trichloroéthane, bière.
- Élévation très rapide de l'urée ou de la glycémie.

### Hyponatrémies traduisant une hyperhydratation intracellulaire

#### Hyponatrémie avec hyperhydratation extracellulaire

C'est une hyperhydratation globale car intracellulaire (hyponatrémie) + extracellulaire (prise de poids, œdèmes) : rétention hydrosodée, avec excès relatif d'eau.

##### ► Traitement étiologique

C'est le traitement d'une insuffisance cardiaque droite et/ou globale, d'une cirrhose

décompensée, d'un syndrome néphrotique ou d'une insuffisance rénale avancée.

##### ► Traitement symptomatique

Déplétion hydrosodée avec des pertes hydriques supérieures aux pertes sodées :

- régime restreint en sel (2 g/j) et en eau (500 mL/j) ;
- **diurétiques de l'anse** (furosémide, bumétanide) ou **antialdostérone** (spironolactone) ;
- **diurétiques** intraveineux avec une perfusion de sérum salé hypertonique dans les formes sévères ;
- en cas d'insuffisance rénale terminale, discuter l'ultrafiltration.

#### Hyponatrémie avec déshydratation extracellulaire

C'est une hyperhydratation intracellulaire (hyponatrémie) + déshydratation extracellulaire : déplétion hydrosodée avec pertes sodées  $>$  pertes hydriques.

##### ► Traitement étiologique

Limiter les pertes hydrosodées cutanées, digestives ou rénales ; un exemple : accident des **diurétiques** (cf. *infra*).

##### ► Traitement symptomatique

- Correction de la déshydratation extracellulaire.
- Correction du déficit sodé relatif (secteur intracellulaire) :
  - en cas de troubles neuropsychiques : sérum salé hypertonique IVSE ;
  - en cas de patient peu symptomatique : suppléments sodés alimentaires (NaCl 10 à 20 g/j).

#### Accident des diurétiques

**Contexte** : thiazidiques à forte dose, régime désodé strict, apports hydriques libres.

**Physiopathologie** : (1) perte hydrique sodée sous thiazidiques, avec déshydratation ; (2) soif importante mais apports hydriques exclusifs ; (3) capacité de dilution de l'urine limitée (**thiazidique**, insuffisance rénale fonctionnelle, élévation de l'ADH).

**Présentation clinique** : hyponatrémie + déshydratation extracellulaire.

**Prévention** : **thiazidiques** à doses appropriées (12,5 à 25 mg d'**hydrochlorothiazide** au maximum), pas de régime sans sel strict, boissons 1 500 mL/j au plus.

## HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE (2)

### Hyponatrémie avec secteur extracellulaire normal

C'est une rétention hydrique pure ou « hyponatrémie de dilution ». Malgré une discrète prise de poids, il n'y a pas d'œdèmes ; la natriurèse est adaptée aux apports sodés alimentaires.

#### ► Traitement étiologique

- Limiter des apports hydriques excessifs (potomanie, perfusions hypotoniques massives).
- Ophothérapie en cas d'opsiurie endocrinienne (hypothyroïdie, insuffisance cortico-surrénalienne).
- Cause d'une sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) : infection, néoplasie, etc.

#### ► Traitement symptomatique

- Obtenir une déplétion hydrique pure (apportant moins d'eau alimentaire qu'il n'en est perdu au quotidien par voie cutanée, respiratoire et rénale).
- Restriction hydrique (500 mL/j) et apports sodés normaux.
- Lédermicine ou **lithium** (action anti-ADH) en dernier recours en cas d'hyponatrémie symptomatique persistante malgré la restriction hydrique.

### Vitesse et seuil de correction d'une hyponatrémie

#### Vitesse de correction

La natrémie devra être corrigée d'autant plus lentement qu'elle est chronique.

#### ► Hyponatrémie chronique

L'adaptation des neurones à l'hyponatrémie les rend en effet très sensibles à la moindre déshydratation, exposant au risque de myélinolyse centro-pontine. Cet accident neurologique effroyable survient électivement en cas de correction trop rapide d'une hyponatrémie chronique.

La règle est donc de ne pas augmenter la natrémie de plus de 0,5 mmol/L/h.

Ceci suppose une surveillance régulière du ionogramme en milieu hospitalier dans les cas où un traitement parentéral a été décidé.

#### ► Hyponatrémie aiguë symptomatique

Dans les hyponatrémies aiguës symptomatiques, la vitesse de correction de l'hyponatrémie peut être plus élevée, en particulier en cas de coma ou convulsions, sans toutefois dépasser 2 mmol/L/h le 1<sup>er</sup> j, et 1 mmol/L/h les j suivants.

#### Seuil de correction

Chez l'alcoolique ou le patient dénutri, il ne faut jamais s'acharner à corriger complètement la natrémie, du fait du risque de myélinolyse centro-pontine. On peut se contenter d'un seuil plus bas (par exemple 125 à 130 mmol/L) pour lequel il n'y a en règle pas de trouble clinique.

HYPONATRÉMIE SANS HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE		HYPONATRÉMIE TRADUISANT UNE HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE		
Secteur intracellulaire normal ou fausse hyponatrémie	Hyperhydratation intracellulaire	Hyponatrémie avec hyperhydratation extracellulaire	Hyponatrémie avec déshydratation extracellulaire	Hyponatrémie secteur extracellulaire normal
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hyperprotéinémie majeure</li> <li>– Hyperlipidémie majeure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hyperosmolarité</li> <li>– Glycocolle</li> <li>– Intoxications (éthanol, méthanol, bière, trichloroéthane)</li> <li>– Élévation rapide de la glycémie ou de l'urée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Insuffisance cardiaque droite ou globale</li> <li>– Cirrhose décompensée</li> <li>– Syndrome néphrotique</li> <li>– Insuffisance rénale avancée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Diurétiques thiazidiques</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Potomanie</li> <li>– Perfusion hypotoniques</li> <li>– Hypothyroïdie</li> <li>– Insuffisance surrénale</li> <li>– SIADH</li> </ul>

## INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (1)

### Diagnostic

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est définie par une diminution rapide (quelques heures à quelques jours) du débit de filtration glomérulaire (DFG), se traduisant en pratique par une élévation de la créatininémie.

Les deux meilleurs arguments en faveur du caractère aigu d'une insuffisance rénale sont :

- créatininémie récente normale ;
  - reins de taille normale (ils sont petits en cas d'insuffisance rénale chronique, sauf en cas de polykystose, amylose, diabète, obstruction, thrombose veineuse rénale).
- L'hypocalcémie vraie, l'anémie normochrome normocytaire arégénérative et l'HTA chronique au fond d'œil plaident plutôt en faveur de la chronicité.

Il faut préciser rapidement :

- les caractéristiques de la diurèse : anurie ( $< 100$  mL/j en l'absence de globe vésical), oligurie ( $< 400$  mL/j), ou diurèse conservée ;
- les éléments de gravité justifiant un traitement symptomatique immédiat : hyperkaliémie, acidose métabolique sévère, œdème aigu pulmonaire, PA diastolique  $> 120$  mmHg ;
- la cause de l'IRA : par obstacle (urinaire ou vasculaire), fonctionnelle, parenchymateuse.

### Traitement symptomatique quelle que soit la cause

#### Potassium

Hyperkaliémie menaçante et œdème pulmonaire doivent être traités en urgence, en attendant qu'une séance d'épuration extrarénale puisse être réalisée.

#### Apports hydriques

Ils sont en moyenne « diurèse + 500 mL/j », et les apports en sel sont adaptés à la natriurèse des 24 h. Ces valeurs seront revues au jour le jour : à la baisse (si possible) en cas de surcharge, à la hausse en cas de déshydratation.

### Alimentation

Elle sera selon les cas orale, par sonde nasogastrique ou parentérale, apportant en moyenne tous les jours 35 kcal/kg et 0,8 g/kg de protides, avec une supplémentation en **vitamines B1 et B6**.

La prévention des gastrites aiguës de stress repose sur l'alimentation et les **inhibiteurs de la pompe à protons**.

### Épuration extrarénale

Certains éléments cliniques ou biologiques plaident pour une épuration extrarénale immédiate.

#### ► Éléments cliniques

- Surcharge hydrosodée (œdème pulmonaire, épanchement péricardique compressif).
- Encéphalopathie.
- Hémorragie digestive.
- Toxique dialysable.

#### ► Éléments biologiques

- Kaliémie  $> 7$  mmol/L ou hyperkaliémie rapidement progressive.
- Urée  $> 35$  mmol/L.
- Acidose métabolique sévère (réserve alcaline  $< 8$  mmol/L, pH  $< 7,2$ )

#### ► Rythme des séances

Le rythme des épurations dépend de l'état d'hydratation, de l'existence ou non d'une diurèse, et des valeurs de l'urée et de la créatinine : il est habituel d'effectuer une séance de dialyse dès que l'urée est  $\geq 35$  mmol/L.

#### ► Technique

L'hémodialyse est la technique la plus employée, et nécessite la mise en place d'une voie d'abord vasculaire centrale temporaire, idéalement fémorale ou jugulaire.

Hémofiltration continue et hémodiafiltration continue (qui combine ultrafiltration et dialyse) sont mieux tolérées au plan hémodynamique, d'où leur intérêt dans les cas les plus difficiles.

La dialyse péritonéale est rarement utilisée en situation d'insuffisance rénale aiguë.

## INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (2)

### IRA par obstacle urinaire

Un obstacle (complet ou incomplet) à l'écoulement urinaire doit être recherché, que la diurèse soit conservée ou non. Outre le contexte, l'examen clinique, une échographie rénale est systématiquement programmée à la recherche d'une dilatation des cavités pyélocalicielles. La sensibilité de cet examen n'est ici que de 85 % (parfois négatif si obstruction récente, fibrose rétropéritonéale, déshydratation associée).

**Les causes les plus fréquentes sont les tumeurs prostatiques, les néoplasies (pélviennes ou rétropéritonéales) et les lithiases.**

Le drainage de l'urine retenue en amont de l'obstacle doit être rapide, et peut faire appel à plusieurs techniques. Dans la plupart des cas, le traitement étiologique est effectué dans un second temps, « à froid ».

#### Globe vésical

- Soit sondage urétral (contre-indiqué en cas de prostatite ou d'orchépididymite).
- Soit cathétérisme sus-pubien (sous anesthésie locale, après contrôle de l'hémostasie, à éviter en cas de suspicion de cancer vésical).

#### Obstruction du haut appareil

- Soit montée de sonde(s) endo-urétérale(s) sous anesthésie générale, avec antibioprophylaxie.
- Soit néphrostomie percutanée écho-guidée (uni- ou bilatérale).

Un « **syndrome de levée d'obstacle** » est fréquent après un obstacle complet prolongé impliquant :

- dépistage : surveillance horaire de la diurèse ;
- compensation totale des pertes urinaires au cours des premières 24 h avec 50 % de soluté salé intraveineux isotonique et 50 % de glucosé à 5 %. La compensation sera progressivement réduite pour ne pas entretenir la polyurie. Après levée d'une obstruction complète, une récupération complète est prévisible si le traitement est précoce (< 3 j), tandis qu'une insuffisance rénale chronique séquellaire de gravité variable est quasi constante si la prise en charge est tardive (> 3 sem.).

### IRA par obstruction vasculaire

#### Obstruction artérielle rénale

- Sur rein unique le plus souvent, elle survient du fait d'une thrombose, d'une dissection, ou d'une embolie d'origine cardiaque. Ce diagnostic doit être envisagé chez les patients âgés, athéromateux, et porteurs d'une cardiopathie emboligène.
- Le Doppler artériel ou la scintigraphie confirment l'absence de flux artériel rénal.

**Radiologie interventionnelle ou chirurgie doivent être discutées.**

#### Thrombose bilatérale des veines rénales

- Origine rare d'IRA, dont la cause quasi exclusive chez l'adulte est le syndrome néphrotique par glomérulonéphrite extra-membraneuse.
- Hématurie, lombalgies, fièvre, embolie pulmonaire sont possibles. Doppler, scanner ou IRM sont les meilleurs examens diagnostiques actuels.

**Le traitement repose sur une anticoagulation efficace prolongée.**

## INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (3)

### IRA fonctionnelle

#### Diagnostic

L'insuffisance rénale fonctionnelle est due à une baisse du flux sanguin rénal, ou « hypoperfusion » rénale.

La cause fonctionnelle d'une insuffisance rénale sera suspectée devant :

- un contexte d'hypoperfusion rénale ;
- des urines, typiquement pauvres en sel et concentrées en déchets (urée, créatinine).

- Cette réponse tubulaire rénale est « adaptée » à la situation d'hypoperfusion, car les tubules sont anatomiquement et fonctionnellement normaux ; à l'inverse, en cas de lésions tubulaires organiques, il existe une fuite sodée inappropriée et un défaut d'excrétion des déchets.
- Le diagnostic de certitude est en fait rétrospectif : retour à la fonction rénale antérieure après rétablissement d'une perfusion rénale normale. En cas de traite-

ment tardif, des lésions organiques du parenchyme rénal (nécrose tubulaire) peuvent se constituer.

#### Traitement

► En cas de déshydratation, collapsus ou choc de type hypovolémique

- Interrompre les **antihypertenseurs** et les médicaments perturbant l'hémodynamique intrarénale (**IEC**, **ARA II** et **AINS** en particulier).
- Rétablir une volémie normale : expansion volémique rapide par **soluté cristalloïde** (soluté salé isotonique), **colloïde** (macromolécules), ou **dérivés du sang** (choc hémorragique) sous surveillance clinique voire hémodynamique (pression veineuse centrale).

► En cas d'incompétence myocardique

- Drogues tonicardiaques ou **antiarythmiques**. L'expansion volémique est logique en cas d'insuffisance cardiaque droite, mais contre-indiquée en cas d'insuffisance cardiaque gauche.

#### Principales causes d'hypoperfusion rénale

Déshydratation extracellulaire (pertes hydrosodées rénales, digestives, cutanées), collapsus ou choc de type hypovolémique.

Insuffisance cardiaque (droite ou globale), tamponnade.

Hypovolémie efficace (certains syndromes néphrotiques, syndrome hépatorénal).

Certains médicaments (**IEC**, **ARA II**, **AINS**), en cas de sténose bilatérale des artères rénales, déshydratation, ou néphroangiosclérose associée(s).

#### Indices biologiques d'insuffisance rénale fonctionnelle

Na urinaire (mmol/L) < 20

Fe\* Na (U/P Na + U/P créat) < 1 %

Na/K (urinaire) < 1

Créatinine (urinaire/plasmatique) > 40

Urée (urinaire/plasmatique) > 10

En pratique, ces indices urinaires ne sont interprétables qu'en l'absence de traitement diurétique (ce qui est rare), et en l'absence d'insuffisance rénale chronique organique sous-jacente.

### IRA parenchymateuse

Les causes d'IRA parenchymateuse sont très nombreuses (cf. Encadré).

#### Nécrose tubulaire

- Dans 90 % des cas, l'IRA parenchymateuse est une **nécrose tubulaire aiguë** : la cause en est facilement identifiée, et la biopsie rénale n'est pas utile.
- La réparation des lésions épithéliales tubulaires et la reprise progressive des fonctions

\* Fe : Fraction d'excrétion.

rénales demandent en moyenne 3 sem., durant lesquelles plusieurs séances d'épuration extrarénale seront nécessaires.

- En cas d'anurie initiale, il est intéressant de tenter de « relancer la diurèse » après normalisation de la volémie grâce à l'emploi de **diurétiques de l'anse** à fortes doses et/ou **dopamine** à faibles doses (3 µg/kg/min) : le débit de filtration glomérulaire ne change pas, mais la réanimation est plus facile et la fréquence des dialyses moindre.

## INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (4)

### Autres IRA parenchymateuses

- Leur diagnostic est souvent difficile à établir.
- L'anamnèse, l'examen clinique, et certains examens complémentaires (biologie,

imagerie) donnent parfois une orientation étiologique précise ; le plus souvent, une biopsie rénale est utile afin de porter un diagnostic exact et d'apprécier l'étendue des lésions.

### Principales causes d'IRA parenchymateuse

#### Nécrose tubulaire

- État de choc.
- Pigments (myoglobine, hémoglobine).
- Produits tubulotoxiques (**iode, aminosides**, etc.).

#### Obstruction tubulaire

- Myélome.
- Médicaments
- Syndrome de lyse tumorale.

#### Interstitielle

- Immunoallergique.
- Sarcoidose.
- Infection.

#### Vasculaire

- Embolies de cholestérol.
- HTA maligne.

#### Glomérulovasculaire

- Glomérulonéphrite rapidement progressive.
- Glomérulonéphrite aiguë.
- Microangiopathie thrombotique (SHU).

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (1)

### Généralités

L'insuffisance rénale chronique (IRC) est définie par une réduction permanente du débit de filtration glomérulaire, estimée en pratique clinique par la réduction de la clairance de la créatinine. L'IRC peut résulter de diverses atteintes du parenchyme rénal, affectant initialement les structures glomérulaires, vasculaires, ou tubulo-interstitielles.

Lorsqu'elle est constituée, l'IRC débutante progresse en règle inexorablement et indépendamment de la maladie causale vers l'insuffisance rénale modérée, puis avancée, préterminale et enfin « terminale », qui nécessitera la mise en œuvre d'un traitement de suppléance : dialyse et/ou transplantation rénale.

Le premier objectif thérapeutique est de prolonger la survie rénale, tout en faisant, le moment venu, les préparatifs au traitement de suppléance.

Le second objectif est d'amener le patient au stade terminal de la maladie rénale dans le meilleur état possible : une bonne qualité de vie, peu de symptômes urémiques, un état nutritionnel satisfaisant, un équilibre hydroélectrolytique et un bilan phosphocalcique contrôlés, et un athérome limité.

### Mesure de la fonction rénale [1]

La fonction rénale ne peut pas être évaluée à partir de la seule mesure de la créatininémie ; une créatininémie « normale » d'après les normes du laboratoire ne signifie pas toujours que la fonction rénale est

normale. Le calcul de la clairance de la créatinine à partir des urines de 24 h est souvent erroné et doit être abandonné.

La fonction rénale est définie par le débit de filtration glomérulaire (DFG), exprimé par un volume d'ultrafiltrat glomérulaire formé par unité du temps et rapporté à la surface corporelle.

La **mesure** du DFG (clairance de l'inuline, du iothexol ou de l'EDTA par exemple) est complexe, coûteuse et d'indication rare.

L'**estimation** du DFG est simple et repose sur la formule de Gault et Cockcroft et la formule MDRD. À partir d'un simple dosage sanguin (la créatininémie), et de quelques variables cliniques et anthropométriques, la formule MDRD donne une estimation plus précise du DFG que la formule de Gault et Cockcroft, en particulier chez le sujet obèse et chez le sujet âgé.

L'estimation du DFG permet de classer les maladies rénales chroniques en 5 stades (à chaque stade correspond un projet thérapeutique spécifique) et d'adapter les posologies médicamenteuses.

Les sujets jeunes sans néphropathie ont un DFG > 90 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>. Quel que soit l'âge, le DFG doit être > 70 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> en l'absence de néphropathie.

### Formules d'estimation du DFG

#### ► Formule de Gault et Cockcroft

Cette formule, basée sur la créatininémie, le poids, l'âge et le sexe, doit être idéalement « corrigée » par la surface corporelle (c'est-à-dire rapportée à une surface corporelle de 1,73 m<sup>2</sup>) :

#### Formule de Gault et Cockcroft

$$\text{DFG (mL/min/1,73 m}^2\text{)} = \frac{K \times \text{poids (kg)} \times [140 - \text{âge (années)}]}{\text{Créatininémie (}\mu\text{mol/L)}} \times \frac{1,73}{[\text{poids (kg)} \times \text{taille (cm)/3 600}]^{0,5}}$$

avec K = 1,23 (homme) ou 1,04 (femme)

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (2)

### ► Formule MDRD

(Modification of the Diet in Renal Disease)

Les formules MDRD ont été établies grâce aux patients inclus dans l'étude MDRD, après confrontation avec une mesure du DFG par clairance du iothalamate. L'équation originale comprenait 6 variables ;

l'équation actuellement utilisée, appelée « MDRD simplifiée », en contient 4 : créatininémie, âge, sexe et race. La valeur calculée est directement rapportée à la surface corporelle, bien que celle-ci ne soit pas mesurée :

### Formule MDRD

$$\text{DFG (mL/kg/1,73 m}^2\text{)} = K \times 186,3 \times [\text{Créatininémie (mg/L)/10}]^{-1,154} \times [\text{Âge (années)}]^{-0,203}$$

avec K = 1 (homme) ou 0,742 (femme)  
peau noire : multiplier par 1,212

### Classification des maladies rénales chroniques

On parle de néphropathie chronique en cas d'existence depuis au moins 3 mois :

- soit d'une anomalie des marqueurs biologiques rénaux (protéinurie, anomalie du sédiment urinaire, troubles hydroélectrolytiques d'origine rénale), ou d'une anomalie morphologique cliniquement significative ;
- soit d'un DFG inférieur à 60 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, avec ou sans marqueurs de lésions rénales associés.

L'estimation du DFG permet :

- de classer la sévérité d'une néphropathie chronique (insuffisance rénale débutive, modérée, sévère, terminale pour des DFG respectivement inférieures à 90, 60, 30 et 15 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>) ;
- d'adapter la posologie des médicaments à élimination rénale de façon à en éviter la toxicité ;

– de définir un projet thérapeutique adapté.

Stade	Description	DFG (mL/min)
1	Maladie rénale chronique à fonction rénale normale	> 90
2	IRC légère	60-89
3	IRC modérée	30-59
4	IRC sévère	15-29
5	IRC terminale	< 15
5D	Dialysé	
5T	Transplanté	

### Actions à entreprendre en fonction du stade de l'IRC

- Diagnostic étiologique
- Prévention et traitement des complications, comorbidités et pathologies associées : HTA, anémie, troubles phosphocalciques, acidose métabolique, troubles nutritionnels
- Préservation du capital veineux pour éventuel abord vasculaire
- Vaccination antivirale B
- Information et préparation au traitement de suppléance (hémodialyse, dialyse péritonéale) et à la transplantation rénale
- Débuter si nécessaire le traitement de suppléance



Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Stade 5



## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (3)

### Ralentir la progression [2]

La diminution annuelle de la filtration glomérulaire est très lente ( $-1$  à  $-3$  mL/min/an), modérée, ou rapide ( $-6$  à  $-2$  mL/min/an) avec comme facteurs de risque le sexe masculin, la race noire, l'existence et la sévérité d'une hypertension artérielle, une protéinurie de débit élevé, une néphropathie initiale de type glomérulaire.

### Traitement étiologique

Le traitement de la cause de l'insuffisance rénale chronique permet souvent de ralentir ou stopper la dégradation de la fonction rénale ; une amélioration est parfois notée. Les principaux exemples sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

TYPE D'INSUFFISANCE RÉNALE	ÉTIOLOGIE	TRAITEMENT
UROPATHIES	Obstruction urinaire	Chirurgie, drainage, sondage
	Maladie lithiasique	Hyperdiurèse, régime et traitement médicamenteux
	Tuberculose rénale	Antibiothérapie
NÉPHROPATHIES VASCULAIRES	Insuffisance rénale ischémique	Revascularisation artérielle rénale
	Néphroangiosclérose	Contrôle tensionnel strict
NÉPHROPATHIES TUBULO-INTERSTITIELLES	Abus d'analgésiques	Arrêt de l'intoxication
	Uratique	<b>Allopurinol</b>
	Hypokaliémique	KCl
	Hypercalcémique	Étiologique
NÉPHROPATHIES GLOMÉRULAIRES	Maladie de Berger	<b>Corticoïdes</b> (« Locatelli »)
	Glomérulonéphrite extramembraneuse primitive	<b>Corticoïdes + chlorambucil</b> (« Ponticelli »)
	Diabète	Équilibre glycémique
	Vascularite primitive, lupus	<b>Corticoïdes ± cyclophosphamide</b>
	Amylose AL	Chimiothérapie
MALADIES HÉRÉDITAIRES	Fabry	$\alpha$ -galactosidase A recombinante
	Néphropathie familiale hyperuricémique	<b>Allopurinol</b>
	Cystinose	Cystéamine

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (4)

### Néphroprotection pharmacologique : réduction de la pression artérielle et de la protéinurie

L'HTA touche la grande majorité des insuffisants rénaux et contribue à l'aggravation des lésions rénales ; inversement, sa normalisation permet de ralentir la dégradation de la fonction rénale.

Au cours des maladies rénales chroniques, l'existence d'une protéinurie est un marqueur de progression de l'insuffisance rénale : plus son débit est élevé, plus le déclin annuel de la filtration glomérulaire est rapide et plus le risque d'insuffisance terminale est fort. Au-delà de son rôle de marqueur, de nombreux arguments expérimentaux indiquent que la protéinurie est aussi un acteur de la progression des néphropathies.

### Seuil d'intervention et cible thérapeutique

#### ► À quel seuil de protéinurie intervenir ?

Les études d'observation suggèrent qu'il y a un bénéfice rénal à intervenir dès le stade de microalbuminurie permanente de débit élevé au cours des néphropathies diabétiques, et dès que la protéinurie est  $> 0,5$  g/j dans les néphropathies non diabétiques.

#### ► Jusqu'où aller ?

Là encore, des études d'observation suggèrent le bénéfice rénal de l'obtention d'une microalbuminurie normale chez le diabétique, et d'une protéinurie réduite de 60 % de sa valeur initiale ou  $< 0,5$  g/j en valeur absolue dans les néphropathies non diabétiques. Les traitements antipro-

téinuriques ont une efficacité progressive, et leur efficacité maximale n'est observée que tardivement (environ 6 mois).

### Traitements antiprotéinuriques

Le traitement étiologique d'une néphropathie peut faire disparaître la protéinurie. À défaut, réduire de façon globale le débit de protéinurie.

- Le contrôle de la pression artérielle est la première étape du traitement antiprotéinurique et néphroprotecteur. Dans tous les cas, la PA doit être  $< 140/90$  mmHg ; un contrôle plus agressif est recommandé chez le diabétique (PA  $\leq 130/80$  mmHg), et en cas de néphropathie non diabétique avec protéinurie  $> 1$  g/j (PA  $\leq 125/75$  mmHg).

- Les IEC et les sartans (ARA II) ont la meilleure efficacité antiprotéinurique et néphroprotectrice ; leur association est synergique sur ces deux paramètres au cours des néphropathies non diabétiques. Leur effet antiprotéinurique est potentialisé par les inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques (vérapamil, diltiazem), par le régime sans sel et/ou par l'adjonction d'un diurétique (thiazidiques de préférence, diurétiques de l'anse si la filtration glomérulaire est  $< 30$  mL/min) ; les antialdostérones sont en revanche déconseillés du fait du risque d'hyperkaliémie.

- D'autres interventions pourraient réduire la protéinurie : certaines sont peu discutables car utiles (perte de poids chez l'obèse, usage de statines, interruption du tabagisme), d'autres sont à évaluer lors d'essais contrôlés (régime très limité en protéides).

### Utilisation des IEC/ARA II dans l'insuffisance rénale : règles de prudence

- Écarter la possibilité d'une sténose bilatérale des artères rénales.
  - Prescription initiale :
    - à doses faibles en cas de lésions vasculaires intrarénales (néphroangiosclérose, diabète) ;
    - chez un patient cliniquement non déshydraté ;
    - les diurétiques éventuels seront prescrits dans un second temps.
  - Le premier mois :
    - vérifier l'absence d'insuffisance rénale aiguë ;
- J3 : diurèse, kaliémie et créatininémie,

J30 : kaliémie et créatininémie ;  
– vérifier l'efficacité : pression artérielle  $\pm$  protéinurie à J30, et décider ou non d'une majoration progressive de la posologie.

- Prévenir le patient :
  - interrompre le traitement en cas de déshydratation aiguë (diarrhée, vomissements) et consulter ;
  - en cas de coprescription de diurétiques : contact médical en cas de perte de poids excessive ou de vertiges orthostatiques ;
  - éviction formelle des AINS.

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (5)

### Limitation des apports protidiques

Les apports limités en protides pourraient réduire l'hyperpression intraglomérulaire et ralentir la dégradation de la fonction rénale : 1 g/kg/j lorsque l'insuffisance rénale est débutante, puis 0,8 g/kg/j lorsque l'IRC est modérée, sans jamais descendre au-dessous de 0,7 g/kg/j lorsque l'IRC est sévère. La mesure de l'excrétion urinaire d'urée permet de vérifier la compliance au régime.

### Acutisation

L'aggravation brutale d'une IRC doit faire rechercher systématiquement plusieurs

causes (cf. Encadré). Le diagnostic de poussée évolutive de la néphropathie est toujours un diagnostic d'élimination. L'hospitalisation est souvent nécessaire ; l'anamnèse, les données cliniques et quelques examens simples d'imagerie (échographie rénale, cliché d'abdomen sans préparation) ou de biologie identifient le plus souvent la cause de l'aggravation. Un traitement précoce permet en règle un retour rapide à la fonction rénale antérieure, comme par exemple la réhydratation après un épisode de diarrhée ou de vomissements sévères.

#### Principales causes d'acutisation d'une IRC

- Obstacle sur les voies excrétrices :
  - rétention aiguë ou chronique d'urine vésicale ;
  - migration lithiasique.
- Hypoperfusion rénale :
  - déshydratation extracellulaire ou collapsus de toute cause, anémie sévère ;
  - infarctus rénal, thrombose des veines rénales ;
  - poussée d'insuffisance cardiaque ;
  - épanchement péricardique compressif.
- HTA maligne.
- Médicaments :
  - **IEC/ARA II**, en cas de déshydratation aiguë ou sténose bilatérale des artères rénales ;
  - **AINS, iode, aminosides** ;
  - tous produits inducteurs d'immunoallergie aiguë, de rhabdomyolyse (**hypolipémiants**), ou d'hémolyse.
- Toute infection, urinaire ou non.

#### CONSENSUS

[1] Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte, *Anaes*, 2002

[2] Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte, *Anaes*, 2004

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (6) – TROUBLES HYDROÉLECTROLYTIQUES

### Troubles hydroélectrolytiques

#### Apports hydrosodés

Dans la plupart des cas, l'IRC avancée s'accompagne d'une polyurie, avec polydipsie et nycturie. **Les apports hydriques sont libres et le patient pourra boire selon sa soif, de façon à compenser les pertes hydriques urinaires, soit en moyenne 1,5 à 3 L/j.** Au stade ultime cependant, les reins sont incapables d'excréter une charge d'eau importante, et une hyponatrémie peut apparaître : une restriction hydrique modérée est alors indiquée.

Le « bilan sodé » est très longtemps normal au cours de l'IRC : **la majorité des patients consomment sans inconvénient 6 à 10 g de sel/j.** Un régime désodé abusif peut induire une déshydratation globale et une aggravation fonctionnelle de l'insuffisance rénale : en situation d'IRC avancée, les reins sont le plus souvent incapables de réduire l'excrétion urinaire de sel au-dessous de 2 à 3 g/j. L'insuffisance des apports sodés est particulièrement dangereuse chez les patients porteurs d'une « néphropathie avec perte urinaire de sel » (certaines néphropathies tubulo-interstitielles), pour qui les besoins sodés alimentaires varient parfois de 12 à 20 g/j.

Les indications à un régime sans sel (2 g/j) sont rares :

- HTA sévère et résistante au traitement pharmacologique ;
- survenue d'un syndrome œdémateux, qui s'explique d'ailleurs rarement par la seule insuffisance rénale (insuffisance cardiaque droite ou globale, cirrhose hépatique, facteur compressif doivent être recherchés).

#### Hyperkaliémie

La kaliémie est longtemps normale au cours de l'IRC car les néphrons sains augmentent leur fraction d'excrétion du potassium. De plus, les **diurétiques de l'anse** (furosémide, bumétanide) couramment employés dans l'IRC augmentent significativement la kaliurèse. L'hyperkaliémie due à la seule insuffisance rénale est en règle tardive (clairance de la créatinine  $\leq 15$  mL/min), modérée ( $K^+ = 5$  à 6 mmol/L), et non rapidement évolutive. Son traitement est ambulatoire (cf. Hyperkaliémie).

#### Acidose métabolique

L'acidose métabolique est parfois précoce (fuite urinaire de bicarbonates par tubulopathie proximale), mais volontiers tardive (toute IRC avancée, diminution de l'excrétion tubulaire distale d'ammoniac et rétention d'acides).

**Tant que le taux plasmatique de bicarbonate est supérieur à 22 mmol/L, aucune mesure thérapeutique n'est nécessaire ;** en deçà, une correction au moins partielle de l'acidose est souhaitable.

En moyenne, 2 à 4 g de **bicarbonate de sodium/j** permettent de maintenir la réserve alcaline entre 20 et 25 mmol/L.

## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (7) – TROUBLES OSTÉO-ARTICULAIRES

### Ostéodystrophie rénale

#### Mécanismes

La rétention de phosphates est précoce au cours de l'IRC, mais l'apparition d'une hyperphosphorémie est tardive (DFG < 30 mL/min) car longtemps contenue par une élévation réactionnelle de la PTH. Le prix à payer est un hyperparathyroïdisme secondaire avec « turnover » osseux élevé et **ostéite fibreuse** parfois compliquée de douleurs osseuses, déminéralisation et fractures. Le freinage excessif du « turnover » osseux (PTH excessivement freinée) peut induire une **ostéopathie adynamique**. L'existence d'un déficit en calcitriol (synthétisé par le rein), et une balance calcique négative peuvent induire un ralentissement de la minéralisation osseuse avec lésions d'**ostéomalacie**. Ces remaniements de la structure osseuse sont parfois associés chez l'insuffisant rénal : on parle alors d'**ostéodystrophie mixte**.

#### Traitement

##### ► Objectifs

Dès que la clairance de la créatinine est inférieure à 60 mL/min, une surveillance régulière de la calcémie et de la phosphorémie est utile, avec un dosage annuel de la PTH et du stock vitaminique D (25 OH D3). Les objectifs intermédiaires sont une calcémie et un stock vitaminique D normaux, une phosphorémie < 1,5 mmol/L (stades 3 et 4) ou < 1,8 mmol/L (stade 5) et une PTH élevée par nécessité, mais pas excessivement (normale 70 à 110 pg/mL au stade 4, 150 à 300 pg/mL au stade 5).

L'objectif final est de prévenir l'ostéodystrophie rénale ; une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire n'est pas exclue mais reste à prouver.

##### ► Moyens thérapeutiques

- Le **carbonate de calcium** normalise la calcémie en augmentant la ration calcique absorbée par l'intestin malgré le déficit en calcitriol et corrige l'hyperphosphorémie en chélatant les phosphates alimentaires dans la lumière digestive. Il est prescrit en dehors des repas si la correction de la calcémie prime, ou le plus souvent à la fin des repas

riches en phosphore (midi et soir) si la baisse de la phosphorémie prime.

- Les chélateurs digestifs du phosphore non calciques (**sevelamer** et **carbonate de lanthanum**) peuvent être utilisés isolément ou en association au **carbonate de calcium**.

- Les **dérivés 1-alpha-hydroxylés de la vitamine D** (**alfacalcidol** ou **calcitriol**) réduisent, en se liant à leur récepteur, la synthèse de PTH par les cellules parathyroïdiennes ; ils sont indiqués lorsque les taux de PTH mesurés sont excessivement élevés ou lorsque la calcémie reste basse malgré l'usage de **carbonate de calcium**.

- La **vitamine D** augmente l'absorption intestinale du calcium et des phosphates : la phosphorémie doit impérativement être normale avant le début du traitement, sous peine de voir apparaître des dépôts phosphocalciques tissulaires. Il faut surveiller régulièrement l'absence d'hypercalcémie et veiller à ce qu'un certain degré d'hyperparathyroïdie persiste, un freinage trop poussé de la PTH (< 2N) pouvant occasionner une ostéopathie adynamique.

- Le **cinacalcet**, premier agent calcimimétique disponible, réduit la sécrétion de PTH, et diminue la calcémie, la phosphorémie et le produit phosphocalcique. Son usage est réservé au traitement des hyperparathyroïdismes sévères du dialysé.

#### Crises de goutte

L'hyperuricémie est le plus souvent asymptomatique au cours de l'IRC. Dans 20 % des cas, elle entraîne une goutte dite « secondaire ». La **COLCHICINE** peut être utilisée à faibles doses (2 mg/j initialement) et pour une brève période, sachant qu'elle induit presque toujours une diarrhée chez le malade urémique.

Après 2 accès goutteux, un **hypo-uricémiant**, **allopurinol** (**ZYLORIC**) assure généralement la prévention des récédives ; sa posologie doit être considérablement réduite lorsque l'IRC est avancée (100 mg/j) ou terminale (50 mg/j). **L'allopurinol n'a aucune indication en prévention primaire des accidents goutteux chez l'insuffisant rénal.**

## CHÉLATEURS DU PHOSPHORE (1)

## ■ Carbonate de calcium

<b>CALTRATE</b>				
1 à 2 cp./j	60 cp. 600 mg	6,97	65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>				
1 à 1,5 g/j	60 cp. 500 mg	6,97	65 %	0,12
	60 cp. 750 mg	10,41	65 %	0,17
	30 cp. 1 000 mg	6,97	65 %	0,23
<b>CALPRIMUM</b>				
2 à 3 cp./j	60 cp. 500 mg	6,97	65 %	0,12

**PROPRIÉTÉS**

Le **carbonate de calcium** est utilisé dans le traitement de l'ostéodystrophie rénale :

- il diminue la phosphorémie par complexation digestive, lorsqu'il est administré à la fin des repas ;
- il augmente la calcémie, par baisse de la phosphorémie et par absorption digestive passive, principalement lorsqu'il est administré en dehors des repas

Il est utilisé à titre préventif pour freiner la sécrétion de parathormone lorsque celle-ci est élevée (PTH > 3 N).

**INDICATIONS**

Traitement de l'ostéodystrophie rénale : hyperphosphorémie et hypocalcémie des insuffisants rénaux chroniques.

Prévention de l'ostéodystrophie rénale (calcémie et phosphorémie normale, mais PTH > 3N).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypercalcémie (> 2,6 mmol/L), hypercalciurie (> 1 mmol/10 kg/j), lithiase urinaire calcique, néphrocalcinose

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la calcémie : arrêt de l'apport calcique en cas d'hypercalcémie ; surveillance renforcée (initialement hebdomadaire) en cas de coprescription de **vitamine D** ou d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : accélération du transit, plus rarement nausées, constipation.

Surdosage : hypercalcémie aiguë.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association nécessitant des précautions d'emploi :

- **digitaliques** (risque de toxicité accrue en cas d'hypercalcémie) ;
- tétracyclines orales (risque d'absorption diminuée : respecter un intervalle de 3 h entre les deux principes) ;
- polystyrène de calcium (risque d'hypercalcémie) : réduire la dose de carbonate de calcium.

**INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (8) – ANÉMIE****Mécanismes**

Une anémie normochrome normocytaire arégénérative apparaît progressivement dans la plupart des néphropathies chroniques évoluées. Elle est due à un déficit de synthèse rénale d'érythropoïétine ; une hémolyse modérée (due aux toxines urémiques) et plusieurs carences (martiale, folique, en vitamine B12) peuvent y contribuer.

Les conséquences de l'anémie sont invalidantes : asthénie physique et psychique, capacité d'effort limitée, dyspnée, baisse de la libido, etc. Les mécanismes adaptatifs cardiaques (augmentation du débit, hypertrophie ventriculaire gauche) sont à long terme délétères, et chez certains patients, une insuffisance coronarienne en partie fonctionnelle peut apparaître en dessous d'un certain seuil d'hémoglobine.

**Objectif thérapeutique**

Maintenir l'hémoglobinémie entre 11 et 12 g/dL.

**Rechercher une cause d'anémie associée**

Une cause d'anémie associée peut réclamer un traitement autonome : carence martiale par perte sanguine occulte (le plus souvent digestive), une carence en vitamines B9 ou B12, une maladie inflammatoire chronique, une hypothyroïdie, une myélodysplasie.

**Supplémentation martiale**

Elle est indiquée si la ferritinémie est inférieure à 150  $\mu\text{mol/L}$  ou le coefficient de saturation inférieur à 20 % : en moyenne 100 mg de **fer ferreux/j**, *per os*, en dehors des repas. Cette mesure permet de combattre, alors même que le stock martial est jugé normal la « carence martiale fonctionnelle » qui nuit chez l'insuffisant rénal à une érythropoïèse efficace.

**Érythropoïétine recombinante**

Si une anémie  $< 11$  g/dL persiste après 6 sem. de supplémentation martiale, la prescription d'**érythropoïétine humaine recombinante** (r-HuEPO) ou d'un stimulant de l'érythropoïèse (**darbépoïétine alfa**) est justifiée. Avant le stade de dialyse, l'**érythropoïétine** est administrée par injections sous-cutanées. L'élévation de l'hémoglobine ne doit pas dépasser 1 à 2 g/dL/mois sous peine de complications sévères (HTA, encéphalopathie, convulsions).

Dès que l'hémoglobinémie-cible est atteinte, une posologie d'entretien est prescrite, faisant appel à des doses plus faibles d'**érythropoïétine**, voire une seule injection hebdomadaire.

Durant tout le traitement, la poursuite de la supplémentation martiale est utile. Cette stratégie thérapeutique permet de réserver la transfusion de culots globulaires aux cas où une correction rapide de l'anémie est indispensable (angor fonctionnel, hémoglobine  $< 8$  g/dL chez un insuffisant coronarien).

## CHÉLATEURS DU PHOSPHORE (2)

## ■ Sevelamer hydrochloride

<b>RENAGEL</b>					
Hyperphosphorémie : 800 à 1 600 mg x 3/j durant les repas	180 cp. 800 mg	191,63	I	65 %	1,06

**PROPRIÉTÉS**

Composé polymérique chélateur digestif du phosphore. Pas d'absorption systémique.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hyperphosphorémie du dialysé.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypophosphorémie ; hypersensibilité au **sevelamer**.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la phosphorémie. Prudence chez les patients atteints de troubles digestifs. Ne pas ouvrir les capsules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (diarrhée, dyspepsie, vomissements, flatulences). Céphalées. Hypotension. Douleurs neuromusculaires. Baisse de l'absorption des vitamines D, E, K et de l'acide folique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les autres médicaments doivent être pris 1 h avant ou 3 h après le **sevelamer**.

## ■ Carbonate de lanthanum

<b>FOSRENOL</b>					
Hyperphosphorémie : augmentation progressive jusqu'à 1 500-3 000 mg (fin de repas)	90 cp. croq. 250 mg	128,87	I	65 %	1,43
	90 cp. croq. 500 mg	170,69	I	65 %	1,90
	90 cp. croq. 750 mg	224,98	I	65 %	2,50
	90 cp. 1 000 mg	237,56	I	65 %	2,64

**PROPRIÉTÉS**

Chélateur digestif du phosphore.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hyperphosphorémie lors des maladies rénales chroniques stade 5 (DFG < 15 mL/min) chez l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypophosphorémie ; hypersensibilité au lanthanum.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la phosphorémie. Prudence chez les patients atteints de troubles digestifs.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (diarrhée, dyspepsie, vomissements). Céphalées. Hypotension. Douleurs neuromusculaires. Baisse de l'absorption des vitamines D, E, K et de l'acide folique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les autres médicaments doivent être pris 1 h avant ou 3 h après.



## INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (9) – PRÉPARATION À LA DIALYSE

### Vaccination anti-hépatite B

L'hépatite B est une menace endémique dans les centres de dialyse et de néphrologie. La vaccination antivirale B doit être précoce car son succès décroît avec l'âge et le degré d'IRC. Un protocole « renforcé » est recommandé lorsque l'IRC est avancée : 4 injections en primovaccination (M1, M2, M3, M6) et un rappel à M12. Un titrage des anticorps anti-HBs vérifie qu'un taux protecteur est apparu ( $> 50$  mUI/mL) et déterminera par la suite le moment des rappels.

### Création d'un abord pour dialyse

Selon la technique d'épuration extrarénale choisie il s'agira d'un abord vasculaire pour hémodialyse (type fistule arté-

rioveineuse), ou de la mise en place d'un cathéter de dialyse péritonéale. Dans les deux cas, l'intervention chirurgicale est effectuée lorsque la clairance de la créatinine est comprise entre 10 et 15 mL/min, de façon à ce que, au moins, quelques semaines de maturation se soient écoulées avant que le montage soit utilisé.

### Quand débiter la dialyse ?

Le traitement de suppléance doit débiter avant l'apparition d'une dénutrition ou d'une profonde altération de l'état général. À ce moment, la clairance de la créatinine est volontiers située entre 5 et 10 mL/min. Une attitude excessivement « attentiste » n'est pas justifiée car elle compromet la qualité de vie et expose à des complications sévères.

#### Indications formelles à débiter la dialyse

##### Indications de principe

DFG estimé :

- $\leq 5$  mL/min chez un patient non diabétique ;
- $\leq 10$  mL/min chez un patient diabétique.

##### Indications de nécessité

Trouble(s) clinique(s) ou biologique(s) sévère(s), imputable(s) à l'IRC, non contrôlé(s) par le traitement conservateur mais corrigé(s) par la dialyse :

- asthénie marquée ;
- encéphalopathie ;
- dénutrition, vomissements fréquents ;
- surcharge hydrosodée réfractaire ;
- HTA réfractaire ;
- hyperkaliémie ou acidose incontrôlables ;
- neuropathie urémique clinique ;
- péricardite.

## CÉDÈMES RÉFRACTAIRES

### Définition

Les œdèmes généralisés de l'insuffisance cardiaque congestive, de la cirrhose, du syndrome néphrotique et de l'insuffisance rénale avancée répondent en règle favorablement à l'association régime pauvre en sel et **diurétiques**.

Certains patients cependant résistent à ce traitement (stabilité du poids et persistance des œdèmes) et ont des œdèmes réfractaires.

### Causes et conduite à tenir

Trois principaux facteurs peuvent expliquer une rétention hydrosodée persistante.

#### Non-respect du régime hyposodé

À poids stable, une natriurèse des 24 h supérieure à 100 mmol indique que les apports sodés sont excessifs.

#### Posologie ou galénique du diurétique inadaptée

La courbe dose-réponse des **diurétiques de l'anse** indique clairement qu'en deçà d'une certaine concentration tubulaire de produit, il n'y a pas de natriurèse.

Si un patient ne répond pas à 40 mg de **furosémide**, il faut plutôt augmenter la dose unitaire (60 à 80 mg en une prise)

plutôt que multiplier les prises dans la journée.

Les insuffisants rénaux ont souvent besoin de fortes doses de **diurétiques de l'anse**, en prenant soin d'éviter les formes « retard » qui ne permettent jamais dans ce cas d'obtenir un pic de concentration tubulaire efficace du produit.

#### Absorption orale diminuée

La diminution de la perfusion intestinale (bas débit) et des œdèmes muqueux des grandes insuffisances cardiaques altèrent parfois l'absorption digestive du **furosémide**.

Deux paradés existent :

– débiter le traitement par voie veineuse ;

– utiliser le **bumétanide (BURINEX)**, qui offre une meilleure biodisponibilité.

#### En cas de persistance des œdèmes malgré les mesures précédentes

L'hospitalisation est indispensable, permettant :

– un meilleur contrôle du régime désodé ;

– l'utilisation de **diurétiques** par voie veineuse ;

– une combinaison de **diurétiques** ;

– une ou plusieurs séances d'hémofiltration.

## SYNDROME NÉPHROTIQUE (1)

Chez l'adulte, un syndrome néphrotique est défini par l'association d'une protéinurie  $> 3$  g/24 h et d'une hypoalbuminémie  $< 30$  g/L. Le diagnostic est donc purement biologique. La traduction clinique principale est un syndrome œdémateux (non obligatoire).

### Traitement symptomatique

#### Œdèmes

- Repos au lit sans excès : diminue la sécrétion de rénine mais favorise les thromboses vasculaires.
- Restriction sodée : 2 g de NaCl/j, qui sera associée à une restriction hydrique modérée en cas d'hyponatrémie (1 000 mL/j).
- **Diurétiques**. En première intention, si la fonction rénale est normale, les **antialdos-térone**, **spironolactone** (**ALDACTONE**, 1 à 3 mg/kg/j) ou les **thiazides**, **hydrochloro-thiazide** (**ESIDREX**, 12,5 à 25 mg/j) sont utilisables en monothérapie. En cas d'insuffisance rénale, il faut utiliser un **diurétique de l'anse** (**furosémide**, **LASILIX**, 40 à 500 mg/j *per os*, selon la fonction rénale). L'instauration d'une association de plusieurs **diurétiques** (afin de bloquer différents sites de réabsorption du sodium) n'est concevable qu'en milieu hospitalier, sous surveillance stricte de la kaliémie.
- Les perfusions d'**albumine** ont des indications très limitées (coût prohibitif, efficacité modeste, possible induction de lésions tubulaires) : anasarque avec résistance aux **diurétiques** ; œdèmes avec hypovolémie efficace (**ALBUMINE HUMAINE BAXTER**) : 100 mL x 2/j pendant 3 j. En fin de perfusion, une injection IV de **furosémide** est souvent associée.
- L'ultrafiltration par circuit extracorporel est réservée aux syndromes œdémateux majeurs après échec des mesures précédentes.

#### Fuite protéique

- Les apports protidiques alimentaires quotidiens sont de (0,8 à 1 g/kg + protéinurie des 24 h).
- Les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** et/ou les **sartans** (**ARA II**) sont parfois utilisés dans les syndromes néphrotiques persistants afin de diminuer la protéinurie ( $\sim 30$  % en moyenne) et pourraient jouer un rôle néphroprotecteur :
  - **IEC** : **énalapril** (**RENITEC**) 2,5 à 20 mg/j ; **ramipril** (**TRIATEC**) 1,25 à 10 mg/j ;
  - et **sartans** (**ARA II**) : **irbésartan** (**APROVEL**) 75 à 300 mg/j ; **losartan** (**COZAAR**) 50 à 100 mg/j sont parfois associés en milieu spécialisé pour une action synergique sur la protéinurie.

#### Prévention des thromboses vasculaires

- Éviter l'hémoconcentration par hypovolémie iatrogène (**diurétiques** à trop fortes doses) ; pas d'immobilisation stricte.
- Anticoagulation efficace si l'albuminémie est  $< 20$  g/L : risque thrombogène fort. **Héparine de bas poids moléculaire** ou **héparine non fractionnée** si insuffisance rénale (rémission rapide probable) ou **antivitamines K** (syndrome néphrotique prolongé probable). La posologie d'**AVK** sera d'autant plus faible que l'albuminémie est basse (car la fraction libre active est élevée).

#### Hypercholestérolémie

- Réduire les apports en cholestérol et acides gras saturés alimentaires.
- Prescrire une **statine** si le cholestérol total est supérieur à 7 mmol/L.

#### Prévention des infections

- Éradication des foyers infectieux ORL, stomatologiques ; hygiène cutanée stricte.
- Pas d'antibioprophylaxie, mais traitement précoce de toute infection.
- Vaccins : pas de vaccins vivants en cas de traitement immunosuppresseur ; les autres vaccins sont autorisés mais moins efficaces.

## SYNDROME NÉPHROTIQUE (2)

### Diagnostic

La biopsie rénale est indispensable chez l'adulte. Quatre exceptions : forte suspicion de néphropathie diabétique ; amylose (AA ou AL) histologiquement prouvée en un autre site ; syndrome néphrotique héréditaire ou médicamenteux probable.

Une fois le diagnostic histologique établi, la recherche d'une cause est systématique : seule la négativité de l'enquête permettra de conclure à une néphropathie glomérulaire primitive. Chez l'enfant, l'impasse histologique est licite lorsque la suspicion de syndrome néphrotique idiopathique est forte.

### Néphropathies glomérulaires primitives

**Syndrome néphrotique idiopathique (néphrose lipoïdique, lésions glomérulaires minimes, hyalinose segmentaire et focale primitive)**

#### ► Chez l'adulte

Corticothérapie orale, **prednisone (CORTANCYL)** : 1 mg/kg/j jusqu'à 15 j après la rémission (80 % des cas) puis décroissance sur 8 mois ; les rechutes sont rares. En l'absence de réponse après 12 sem., on parle de corticorésistance (20 %) : diminution progressive de la posologie des **stéroïdes**, et introduction d'un **immunosuppresseur** : **cyclophosphamide** pendant 8 sem. et, en cas de nouvel échec, **ciclosporine** (5 mg/kg/j) pendant 1 à 2 ans.

#### ► Chez l'enfant

Corticothérapie orale (60 mg/m<sup>2</sup>/j) pendant 4 sem., puis posologie alternée (/48 h) pendant 1 mois puis décroissance des doses pendant 2 à 3 mois.

La rémission est rapide et fréquente (90 %), mais rechutes et corticodépendance nécessitent parfois l'usage d'un **immunosuppresseur** (**ciclosporine**) à visée d'épargne cortisonique. Moins de 5 % des enfants corticodépendants auront encore des poussées à l'âge adulte. En l'absence de rémission après 4 sem. (10 % des cas), une 5<sup>e</sup> sem. de traitement est proposée, comportant 3 bolus de **méthylprednisolone** : en cas d'échec (corticorésistance), biopsie rénale ± autre traitement.

**Glomérulonéphrite extramembraneuse primitive**

Traitement symptomatique du syndrome néphrotique en attendant une rémission spontanée (30 % des cas) ; traitement immunosuppresseur en cas de syndrome néphrotique intense persistant plus de 6 à 12 mois, ou d'insuffisance rénale organique débutante, selon le protocole de Ponticelli : **prednisone** et **chlorambucil** ou **cyclophosphamide** (cures mensuelles alternées pendant 6 mois).

**Glomérulonéphrite membranoproliférative idiopathique**

Traitement non codifié chez l'adulte ; corticothérapie utilisée avec succès dans certaines études chez l'enfant.

### Autres causes

Le syndrome néphrotique est un événement rare au cours de la maladie de Berger ; dans ce cas, le traitement n'est pas codifié, mais peut faire appel à des **stéroïdes** ± **immunosuppresseurs**.

Un syndrome néphrotique est possible au cours des syndromes néphritiques aigus (SNA) et des syndromes de glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP).

### Néphropathies glomérulaires secondaires

Le traitement du syndrome néphrotique est ici celui de sa cause. Quelques exemples :

- traitement d'une poussée lupique ;
- traitement d'une amylose AL, d'un myélome, d'un lymphome, d'une leucémie lymphoïde chronique, d'un cancer solide ;
- traitement d'une infection : foyer infectieux profond, endocardite, infection virale (VHB, VHC, VIH), d'une syphilis, d'une infection parasitaire (paludisme, filariose, bilharziose) ;
- interruption d'un traitement médicamenteux (**D-pénicillamine**, **AINS**, etc.) ;
- prise en charge d'un diabète, d'une drépanocytose, d'une toxémie gravidique, d'une HTA maligne (parfois compliqués de syndrome néphrotique).

## TRANSPLANTATION RÉNALE (1)

La transplantation rénale doit être envisagée chez tout patient insuffisant rénal avancé, dialysé ou non, pourvu qu'il soit motivé, et que le bénéfice attendu soit supérieur aux risques induits par l'intervention et les traitements immunosuppresseurs. Comparativement à l'hémodialyse et à la dialyse péritonéale, la transplantation rénale prolonge la survie des patients, est moins contraignante et plus économique.

### Contre-indications

- Absolues  
Cancer métastatique  
Pathologie psychiatrique rendant la prise des **immunosuppresseurs** incertaine  
Juste avant la greffe : cross match positif
- Relatives  
Risque > bénéfice (grand âge, comorbidité lourde)
- Temporaires  
Infection évolutive  
Antécédent de cancer < 5 ans

### Préparation du receveur

- Information complète et loyale du patient : avantages et risques de la transplantation rénale dans son cas.
- Détermination du risque de récurrence de la néphropathie initiale sur le greffon.
- Étude complète du dossier médical, guidant la prescription d'examen complémentaires (cf. Tableau).

En fonction des résultats, le transplantateur peut :

- autoriser la transplantation ;
- déconseiller la transplantation ;
- préconiser un traitement préalable.

À titre d'exemples : néphrectomie d'un ou des rein(s) propre(s) (polykystose importante, infection chronique) ; correction d'une uropathie ; cure d'un anévrisme aortique ; revascularisation coronaire ; traitement d'une hépatite virale chronique.

### Examens complémentaires

Immunologie	Phénotypage érythrocytaire, RAI, groupage HLA, anticorps anti-HLA
Cœur	Coronaropathie ? Insuffisance cardiaque ? Valvulopathie ? ECG, échographie cardiaque ± scintigraphie myocardique ± coronarographie si > 50 ans
Aorte et axes vasculaires	Anévrisme aortique ? Athérome ? Axes iliaques (avant anastomoses) ? Échographie et Doppler vasculaire ± scanner iliaque sans iode
Appareil urinaire	Diurèse résiduelle ? Uropathie malformative (conditionne l'anastomose urétérale) ? - Cystographie sus-pubienne (hommes) ou rétrograde (femmes) - Échographie rénale et vésicale, ECBU - PSA
Infections	Antécédents de tuberculose ? Risque parasitaire ? Hépatite virale chronique ? - Éradication des foyers infectieux chroniques ORL/stomatologiques - Sérologies VIH, VHB, VHC, CMV, EBV, HHV8, HTLV, toxoplasmose, TPHA-VDRL
Tube digestif	Ulcère ? Diverticulose ? Discuter FOGD et colonoscopie
Consultations	ORL, stomatologie, gynécologie (systématiques) ; psychiatrie (si antécédents)

## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (1)

## ■ Azathioprine

<b>IMUREL</b>					
Transplantation : 5 mg/kg/j puis 1 à 4 mg/kg/j (entretien), 1 à 3 prises	50 cp. pell. 25 mg 100 cp. pell. 50 mg	10,30 29,81 HOP	I I I	100 % 100 %	0,21 0,30
Autres indications : 1 à 2,5 mg/kg/j	1 fl. 50 mg				

**PROPRIÉTÉS**

Analogues des bases puriques à action cytotoxique et antiproliférative (agit sur les immunodépresseurs par action sur les cellules hématopoïétiques et les lymphocytes T).

Résorption digestive complète, transformation en mercaptopurine, dégradation par la xanthine-oxydase, puis élimination urinaire (métabolite peu mais myélotoxique).

Demi-vie = 5 h.

**INDICATIONS**

Prévention du rejet des organes transplantés (en association avec d'autres immunosuppresseurs).

Maladies auto-immunes et inflammatoires (en particulier les formes corticorésistantes ou corticodépendantes afin de réduire la posologie des corticoïdes) : lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde sévère, myasthénie, hépatite auto-immune, purpura thrombopénique idiopathique, anémie hémolytique acquise auto-immune, sclérodermie, pemphigus, dermatomyosite, polymyosite, périartérite noueuse, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter le contact prolongé des comprimés avec la peau.

Éviter l'exposition solaire.

Surveiller l'hélogramme de façon hebdomadaire les 2 premiers mois, puis tous les 3 mois : diminuer ou arrêter en cas de leucopénie  $< 2\,500/\text{mm}^3$  ou de thrombopénie  $< 100\,000/\text{mm}^3$ , en particulier en cas d'insuffi-

sance hépatique ou rénale (utiliser une faible posologie initiale).

Le dosage sanguin des 6TCN (6-thioguanines nucléotides) permet de mieux adapter la posologie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Leucopénie dose-dépendante, réversible en 1 à 2 sem. (thrombopénie et anémie plus rares).

Sensibilité aux infections, fréquence accrue des cancers cutanés (en cas d'exposition solaire) et des tumeurs malignes.

Alopécie réversible.

Hépatite cholestatique.

Rarement : troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), hypersensibilité (fièvre et frissons, vertiges, éruption cutanée, arthralgies, pancréatite, pneumopathie, troubles du rythme).

Pas d'altération de la fertilité.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibiteurs de l'uricosynthèse (**allopurinol** et **tisopurine**) : risque d'aplasie médullaire imposant une réduction de posologie (75 %) et une surveillance hématologique accrue.

Curarisants : antagonisme (curares non dépolarisants) ou agonisme (curares dépolarisants).

Cytostatiques : effets additifs sur l'hématopoïèse.

Vaccins vivants atténués.

**Surveillance d'un patient sous IMUREL**

- NFS hebdomadaire pendant 2 mois puis
- NFS tous les 3 mois minimum.
- Diminution ou arrêt du traitement si leucopénie  $< 2\,500/\text{mm}^3$  ou thrombopénie  $< 130\,000/\text{mm}^3$ .
- Diminuer la posologie en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

## TRANSPLANTATION RÉNALE (2)

### Choix du donneur

#### Rein de cadavre

- Le receveur est inscrit sur la liste d'attente du centre de transplantation qui le suit ; l'inscription est confirmée par l'Agence de biomédecine. Le patient doit être contactable à tout moment.

#### Conditions de prélèvement du donneur

- Certificat de mort encéphalique établi par deux médecins (dont un réanimateur) n'appartenant pas à l'équipe de prélèvement.
- Sérologies VHB, VHC et VIH négatives.
- Donneur non inscrit au registre de refus du prélèvement d'organes.
- Prélèvement (multi-organes en règle) par une équipe spécialisée dans un établissement agréé.
- Conservation du rein dans un soluté spécial réfrigéré à 4 °C (ischémie froide, 36 h max.)
- Détermination des groupes sanguin et tissulaire, transmis à l'EFG qui identifie les receveurs les plus compatibles.
- Choix du receveur qui est contacté par son néphrologue :
  - en l'absence de contre-indication temporaire ;
  - si le *cross-match* est négatif.

#### Donneur vivant apparenté

La transplantation peut être planifiée et il n'y a pas de délai d'attente.

Le donneur est le plus souvent un frère ou une sœur (HLA identique dans 25 % des cas, HLA semi-identique dans 50 % des cas) ou le père ou la mère (HLA semi-identique).

#### Conditions de prélèvement du donneur

- Motivation spontanée et sincère du donneur.
- Présence de deux reins, absence de néphropathie.
- DFG mesuré > 80 mL/min.
- Consentement confirmé devant le juge du tribunal de grande instance.

### La greffe

En fosse iliaque (droite le plus souvent) : anastomoses vasculaires sur les vaisseaux iliaques ; anastomose urétéro-vésicale avec montage antireflux et sonde JJ de protection transitoire ; anastomose urétéro-urétérale possible (sauf si reflux), avec ablation du rein propre sus-jacent si la diurèse résiduelle est importante (sinon, simple ligature).

### Traitement immunosuppresseur préventif du rejet

Indispensable, poursuivi à vie, utilisant une association d'**immunosuppresseurs** (fortes doses initialement puis doses d'entretien). Les associations sont variables et souvent protocolaires. La plus classique est la triple immunosuppression :

- **corticoïdes** : méthylprednisolone IV (**SOLUMÉDROL**) les premiers j puis prednisone (**CORTANCYL**) *per os*, 1 mg/kg les 10 premiers j puis dégression progressive jusqu'à 0,15 à 0,25 mg/kg/j ;
  - antimétabolite : soit mycophénolate mofétil (**CELLCEPT**), soit azathioprine (**IMUREL**) ;
  - inhibiteur de la calcineurine : soit ciclosporine (**SANDIMMUN** ou **NÉORAL**), soit tacrolimus (**PROGRAF**). Ce dernier serait efficace dans la prévention des rejets résistants ou récidivants sous ciclosporine, mais serait plus néphrotoxique à long terme.
- En induction de greffe, des anticorps monoclonaux antirécepteurs à l'IL2 sont régulièrement utilisés : basiliximab (**SIMU-LECT**), daclizumab (**ZENAPAX**) ; les anticorps polyclonaux antilymphocytaires (**THYMoglobuline**, **ATG**, **LYMPHOGLOBULINE**) sont réservés aux patients à haut risque immunologique de rejet.

## IMMUNOSUPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (2)

## ■ Ciclosporine

<b>SANDIMMUN</b>					
5 mg/kg ; 2 à 15 mg/kg/j en 2 prises	50 caps. 25 mg	57,64	I	100 %	1,15
	50 caps. 50 mg	110,96	I	100 %	2,22
	50 caps. 100 mg	216,46	I	100 %	4,33
	1 fl. 50 mL (100 mg/mL)	216,46	I	100 %	216,46
2 à 5 mg/kg/j en perf. continue sur 24 h	10 amp. 50 mg	HOP	I		
	10 amp. 250 mg	HOP	I		
<b>NÉORAL</b>					
5 mg/kg ; 2 à 15 mg/kg/j en 2 prises	60 caps. 10 mg	26,77	I	100 %	0,45
	60 caps. 25 mg	61,90	I	100 %	1,03
	60 caps. 50 mg	119,50	I	100 %	1,99
	60 caps. 100 mg	232,93	I	100 %	3,88
	30 fl. 50 mL (100 mg/mL)	195,85	I	100 %	6,53



## TRANSPLANTATION RÉNALE (3)

### Insuffisance rénale aiguë immédiate

- Tubulopathie transitoire (+++), favorisée par une ischémie prolongée du greffon : impose la poursuite temporaire de la dialyse.
- Hypovolémie.
- Complication chirurgicale, dépistée par l'échographie + Doppler : urinaire (obstacle, fuite) ou vasculaire (thrombose artérielle ou veineuse).
- Rejet hyperaigu : dû à la présence d'anticorps anti-HLA ayant échappé au *cross-match*. Immédiat (rein violet après déclampage), il nécessite la détransplantation ; retardé (< J15, anurie fébrile, pas de vascularisation rénale décelable en échodoppler ou scintigraphie, du fait de lésions vasculaires intenses visibles sur l'artériographie et/ou l'histologie) : lourde immunosuppression (Ig IV, anticorps antilymphocytaires, échanges plasmatiques) mais résultats décevants.

### Insuffisance rénale retardée

Il faut évoquer les causes précédentes, mais aussi les deux cas suivants :

- Le rejet aigu : dû à l'infiltration du greffon par les lymphocytes du receveur, il survient dans les premiers mois, révélé par une élévation de la créatininémie ( $\pm$  gros rein douloureux, fièvre et réduction de diurèse). Le diagnostic repose sur l'histologie rénale et l'élimination des autres causes d'insuffisance rénale aiguë. Le traitement par **méthylprednisolone IV** (3 j de suite) puis corticothérapie orale renforcée est généralement efficace.

En cas de corticorésistance et dans les formes sévères, les anticorps antilymphocytaires sont associés aux **stéroïdes**.

- La néphrotoxicité de la **ciclosporine** ou du **tacrolimus**.

### Insuffisance rénale progressive tardive

- Rejet chronique : la biopsie rénale révèle une fibrose interstitielle et une endartérite fibreuse. L'évolution est à terme défavorable, conduisant à la reprise des dialyses.
- Toxicité de la **ciclosporine** ou du **tacrolimus**.
- Conséquences rénales de l'HTA du transplanté.
- Récidive de la néphropathie initiale.

### Infections

Citons ici les infections opportunistes qui bénéficient volontiers d'un traitement préventif durant les 3 premiers mois après la greffe :

- pneumocystose (et infections urinaires) : **BACTRIM FORTE**, 1 cp./j ;
- herpès et infection à CMV : **ZOVIRAX** ;
- candidose : **FUNGIZONE** *per os*.

### Autres

Toxicité des **immunosuppresseurs**.

- HTA : 60 % des transplantés.
- Athérome accéléré et ses conséquences cardiovasculaires.
- Complications métaboliques : diabète, ostéoporose, goutte, polyglobulie.
- Tumeurs (40 % après 20 ans de greffe) : cancers cutanés +++ (éviter l'exposition solaire), lymphomes, tumeurs solides.

## RÉSINES HYPOKALIÉMIANTES

## ■ Polystyrène sulfonate de sodium

<b>KAYEXALATE</b>					
Traitement initial : - 1 à 4 c-mes./j - ou en lavement (à garder 6 h, renouvelable) de 60 g dilués dans 100 mL de soluté glucosé à 10 % Traitement d'entretien (insuffisant rénal chronique, dialysé) : posologie variable (entre 3 c-mes./sem. et 2 c-mes./j)	30 c-mes. 15 g (boîte 450 g)	35,40	II	100 %	1,18

## ■ Polystyrène sulfonate de calcium

<b>RESIKALI</b>					
Idem <b>KAYEXALATE</b>	25 c-mes. 18 g (boîte 500 g)	31,71	II	100 %	1,27

**PROPRIÉTÉS**

Résines échangeuses de cations non résorbées, échangeant dans le tube digestif (côlon) potassium contre sodium (polystyrène de sodium) ou calcium (polystyrène de calcium). Efficacité retardée (3 à 4 h), permettant un abaissement progressif et transitoire de la kaliémie de 0,5 à 1,5 mmol/L.

**INDICATIONS**

Traitement des hyperkaliémies non menaçantes, au cours de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypercalcémie (pour le polystyrène de calcium).  
Hypokaliémie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas de traitement prolongé (insuffisant rénal chronique, dialysé), surveiller régulièrement la kaliémie, la magnésémie, la phosphorémie (et la calcémie pour le polystyrène de calcium).  
Un traitement préventif de la constipation est préconisé (**sorbitol per os**) afin d'éviter occlusion et hyperabsorption sodée (pour le polystyrène de sodium).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : constipation le plus souvent, avec risque de fécalome ; parfois nausées ou gastralgies.  
Hypokaliémie (par surdosage).  
Hypercalcémie (polystyrène de calcium, surtout en cas de traitement simultané par la **vitamine D**).  
Surcharge sodée (polystyrène de sodium, surtout en cas de ralentissement du transit digestif chez l'insuffisant cardiaque).

## POTASSIUM

### ■ Chlorure de potassium

<b>DIFFU-K</b>					
Hypokaliémie : traitement préventif : 8 à 24 mmol/j ou curatif : 24 à 96 mmol/j	40 gél. 8 mmol (600 mg)	2,77		65 %	0,07
<b>KALEORID LP</b>					
Idem <b>DIFFU-K</b>	30 cp. 8 mmol (600 mg)	2,16		65 %	0,07
	30 cp. 13,4 mmol (1 g)	2,73		65 %	0,09
<b>POTASSIUM RICHARD</b>					
Idem <b>DIFFU-K</b>	16 càs 11 mmol (fl. 250 mL)	2,82		65 %	0,18
	20 sach. 11 mmol	3,19		65 %	0,16

### ■ Gluconate de potassium

<b>GLUCONATE DE POTASSIUM H3 SANTÉ</b>					
Hypokaliémie, traitement préventif : 1 à 4 càs/j	17 càs 10 mmol (fl. 250 mL)	2,42		65 %	0,14

### ■ Tartrate de potassium

<b>NATI-K</b>					
Hypokaliémie, traitement préventif : 1 à 6 cp./j	40 cp. 4,26 mmol (500 mg)	2,52		65 %	0,06

#### PROPRIÉTÉS

Cf. Dyskaliémies.

#### INDICATIONS

Hypokaliémies : traitement curatif ou préventif (coprescription avec **diurétiques hypokaliémisants** ou **corticoïdes**).

#### CONTRE-INDICATIONS

Hyperkaliémie ; coprescription avec **IEC** ou **diurétiques épargneurs de potassium** (sauf hypokaliémie).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence (risque d'hyperkaliémie) : insuffisance rénale sévère, insuffisance surrénalienne, diabète sucré.

Comprimés : ingérer debout ou assis, avec de l'eau.

Voie veineuse : ne jamais dépasser 1,5 g/h ; jamais d'injection intraveineuse directe

(IVD) sinon risque de mort subite par arrêt cardiaque ; voie périphérique : dilution dans un soluté salé ou glucosé isotonique, avec concentration  $\leq 4$  g/L sur une veine périphérique. Préférer le **chlorure de potassium** en cas d'alcalose associée.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Voie orale : nausées, gastralgies, vomissements, diarrhée.

Voie veineuse : irritation veineuse (concentrations élevées) ; risque de mort subite (perfusion trop rapide).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association aux **diurétiques hyperkaliémisants** ou aux **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** est contre-indiquée, sauf en cas d'hypokaliémie : dans ce cas un contrôle hebdomadaire de la kaliémie est initialement souhaitable le 1<sup>er</sup> mois.

## DIURÉTIQUES DE L'ANSE (1)

## ■ Furosémide

<b>LASILIX FAIBLE</b>					
1 à 2 cp./j en 1 à 2 prises	30 cp. séc. 20 mg 100 cp. séc. 20 mg	2,48 HOP	II II	65 %	0,08
<b>LASILIX</b>					
1 à 6 cp./j en 1 à 2 prises	30 cp. séc. 40 mg 100 cp. séc. 40 mg	3,41 HOP	II II	65 %	0,11
0,5 à 1 mg/kg/j IM ou IV	1 amp. 20 mg 5 amp. 20 mg	1,77 HOP	II II	65 %	1,77
<b>LASILIX RETARD</b>					
1 à 2 gél./j en 1 à 2 prises	30 gél. LP 60 mg 100 gél. LP 60 mg	4,79 HOP	II II	65 %	0,16
<b>LASILIX SPÉCIAL</b>					
250 mg à 2 000 mg/j	30 cp. séc. 500 mg 100 cp. séc. 500 mg 5 amp. 250 mg	33,18 HOP HOP	II II II	65 %	1,11

## ■ Bumétanide

<b>BURINEX</b>					
0,5 à 6 mg/j	30 cp. séc. 1 mg 30 cp. séc. 5 mg	4,68 18,12	II II	65 % 65 %	0,16 0,60
OAP : 1 amp., renouvelable à la demande	5 amp. 2 mg	8,04	II	65 %	1,61

## ■ Pirétanide


<b>EURELIX</b>					
HTA : 1 gél./j	30 gél. LP 6 mg	7,69	II	65 %	0,26

## DYSKALIÉMIES (6) – HYPOKALIÉMIE DES DIURÉTIQUES (2)

### Diurétiques (indications préférentielles)

PATHOLOGIE	CHOIX DU DIURÉTIQUE
Insuffisance cardiaque Cirrhose Syndrome néphrotique	<b>Furosémide</b> <b>Diurétique épargneur de potassium</b> ± <b>furosémide</b> (doses progressives) <b>Diurétique épargneur de potassium</b> ± <b>furosémide</b> (doses progressives)
Insuffisance rénale aiguë oligoanurique	Normalisation de la volémie puis <b>furosémide</b> IV à fortes doses
Hypertension artérielle : - essentielle - hyperaldostérionisme primaire - syndrome de Liddle	Thiazidique ou <b>diurétique de l'anse</b> <b>Diurétique épargneur de potassium</b> <b>Amiloride</b> ou <b>triamtèrene</b>
Hypercalcémie	Réhydratation puis <b>furosémide</b> IV et compensation de diurèse
Lithiase calcique + hypercalciurie	<b>Thiazidique</b>
Diabète insipide néphrogénique	<b>Thiazidique</b>
Hyperhydratation intracellulaire sévère	<b>Furosémide</b> + soluté salé hypertonique
Glaucome aigu	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i> /IV
Mal des montagnes	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i>
Alcalose de reventilation	<b>Acétazolamide</b> <i>per os</i>

### Mode d'action des différents types de diurétiques



Site I, tube proximal : inhibiteur de l'anhydrase carbonique.

Site II, branche ascendante de l'anse de Henle : « diurétiques de l'anse ».

Site III, segment cortical de dilution et segment initial du tube distal : thiazides et dérivés.

Site IV, tube distal terminal et collecteur cortical : diurétiques antikaliurétiques (spironolactone, amiloride, triamtèrene).

**DIURÉTIQUES DE L'ANSE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Sulfamides diurétiques inhibant au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle la réabsorption du NaCl ; accessoirement, ils augmentent l'excrétion urinaire de potassium, du magnésium, et du calcium. Les **diurétiques de l'anse** ont une puissance dose-dépendante, et sont les seuls **diurétiques** couramment utilisables en situation d'insuffisance rénale avancée (Cl créatinine < 50 mL/min), moyennant l'utilisation de fortes doses.

Après administration orale, la résorption digestive du **bumétanide** (95 %) est meilleure que celle du **furosémide** (60 %) ; l'action débute rapidement (30 min) et est brève (6 à 8 h) ; les formes retard ont une action moins intense et plus prolongée : leur galénique est particulièrement adaptée au traitement de l'HTA, mais ne convient pas en cas d'insuffisance rénale (le pic de concentration tubulaire nécessaire à l'action diurétique est rarement obtenu).

Après injection parentérale, l'action natriurétique débute en 5 min et dure moins de 2 h ; elle est précédée d'un effet vasodilatateur veineux, utile en cas d'œdème pulmonaire. L'élimination des **diurétiques de l'anse** se fait par voie urinaire essentiellement et digestive accessoirement.

**INDICATIONS**

Voie orale : hypertension artérielle ; syndromes œdémateux d'origine rénale ou hépatique ou cardiaque ; insuffisance cardiaque congestive. Voie parentérale : œdème aigu du poumon ; rétentions hydrosodées sévères d'origine cardiaque, rénale ou hépatique ; hypercalcémies sévères.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux **sulfamides**.

Encéphalopathie hépatique.

Insuffisance rénale par obstruction urinaire.

Déshydratation extracellulaire, hypovolémie.

**Grossesse** : pour **bumétanide** et **pirétanide** ; **furosémide** utilisable dans des circonstances exceptionnelles.

**Allaitement** : déconseillé (passage dans le lait maternel et réduction de la lactation).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance rénale aiguë : écarter la possibilité d'une cause obstructive.

Surveillance biologique régulière (kaliémie, natrémie, créatininémie) en début de traitement.

Prudence particulière en cas de cirrhose (risque

d'encéphalopathie hépatique), de coprescription de **digitaliques**, produits hypokaliémisants ou anti-arythmiques (en particulier chez les sujets cirrhotiques, insuffisants cardiaques ou dénutris : risque de troubles du rythme sévères et de torsades de pointes).

**Diabète** : risque de déséquilibre glycémique faible lorsque les posologies habituelles sont employées.

Interrompre 24 h avant un examen iodé.

**Grossesse** : les **diurétiques** sont contre-indiqués dans le traitement des œdèmes et de l'HTA gravidiques (risque de majoration de l'ischémie fœtoplacentaire) ; le **furosémide** reste utilisable en cas de syndrome œdémateux lié à une affection rénale, cardiaque ou hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Déshydratation extracellulaire puis globale (avec hypernatrémie) en cas de surdosage (interrompre, réhydrater). L'hyponatrémie est rare : elle ne s'observe qu'en cas de régime désodé strict avec apports hydriques libres chez des patients ayant une forte activation du système rénine-aldostérone (insuffisance cardiaque sévère, cirrhose, certains syndromes néphrotiques).

Hypokaliémie : rare lorsque les doses employées sont modérées.

Risque d'encéphalopathie hépatique chez le cirrhotique.

Élévation (inconstante et modérée) de la glycémie, des lipides plasmatiques et de l'uricémie (± crises de goutte) ne devant pas faire interrompre le traitement.

Rarement : allergie cutanée, photosensibilisation, leucopénie, thrombopénie, insuffisance rénale immunoallergique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations déconseillées : **lithium** (risque de surdosage) ; médicaments entraînant des torsades de pointes.

Associations à manier avec prudence : **AINS**, **IEC**, **ARA II**, **produits de contraste iodés**, **aminosides injectables** (risque d'insuffisance rénale aiguë) ; **corticostéroïdes**, **diurétiques**, **laxatifs** stimulants (risque d'hypokaliémie), **metformine** (risque d'acidose lactique), **anti-dépresseurs tricycliques** et **antipsychotiques** (risque d'hypotension orthostatique).

**Phénytoïne** : diminution de l'activité du **diurétique** (50 %).

**Antiacides** (diminution de l'absorption du **furosémide**) : respecter un intervalle de 2 h entre les prises.

## DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES

## ■ Hydrochlorothiazide

ESIDREX					
HTA : 1/2 à 1 cp./j	30 cp. séc. 25 mg	2,78	II	65 %	0,09
	90 cp. séc. 25 mg	7,22	II	65 %	0,08

## ■ Indapamide

FLUDEX					
HTA : 1 cp. le matin Poso. max. : 2,5 mg/j	30 cp. LP 1,5 mg	6,09	II	65 %	0,20
	90 cp. LP 1,5 mg	17,02	II	65 %	0,19
	100 cp. LP 1,5 mg	HOP	II		
	30 cp. 2,5 mg	12,28	II	65 %	0,41
	100 cp. 2,5 mg	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Sulfamides diurétiques inhibant la réabsorption tubulaire de NaCl au niveau du segment cortical de dilution. Par ailleurs, augmentent l'excrétion urinaire de potassium et de magnésium ; réduisent la calciurie ; réduisent la diurèse en cas de diabète insipide néphrogénique. Résorption digestive (50 à 80 %) ; délai d'action de 2 h, persistant 12 à 72 h selon les produits. Élimination urinaire sous forme inchangée. Passage transplacentaire et dans le lait maternel.

## INDICATIONS

Hypertension artérielle.  
Syndromes oedémateux d'origine rénale, hépatique, cardiaque.  
Hypercalciuries idiopathiques.  
Diabète insipide néphrogénique singulier.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux **sulfamides**.  
Encéphalopathie hépatique.  
**Grossesse** : contre-indiqué.  
**Allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Inefficaces en cas d'insuffisance rénale chronique avancée (Cl créatinine < 50 mL/min). Surveillance biologique régulière (kaliémie, natrémie, créatininémie) en début de traitement.  
Prudence particulière en cas de cirrhose (risque d'encéphalopathie hépatique), ou de coprescription de **digitaliques**, produits hypokaliémisants ou antiarythmiques (en particulier chez les sujets cirrhotiques, insuffisants cardiaques

ou dénutris : risque de troubles du rythme sévères et de torsades de pointes).  
Risque de déséquilibre diabétique faible lorsque les posologies habituelles sont employées. Interrompre 24 h avant un examen iodé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hyponatrémie + déshydratation extracellulaire.  
Hypokaliémie : risque faible (< 5 %) avec les doses actuellement préconisées dans le traitement de l'HTA.  
Risque d'encéphalopathie hépatique chez le cirrhotique.  
Élévation (inconstante et modérée) de la glycémie, des lipides plasmatiques et de l'uricémie (± crises de goutte) ne devant pas faire interrompre le traitement.  
Hypercalcémie : rare, doit faire rechercher une hyperparathyroïdie associée.  
Nausées, constipation, céphalées, paresthésies, flou visuel.  
Rarement : allergie cutanée, photosensibilisation, leucopénie, thrombopénie, agranulocytose, anémie hémolytique, aplasie médullaire, insuffisance rénale immunoallergique, pancréatite aiguë.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **lithium** (risque de surdosage) ; médicaments entraînant des torsades de pointes.  
Associations à manier avec prudence : **AINS**, **IEC**, **ARA II**, **produits de contraste iodés** (risque d'insuffisance rénale aiguë) ; **corticostéroïdes**, **diurétiques**, **laxatifs** stimulants (risque d'hypokaliémie), **metformine** (risque d'acidose lactique), **antidépresseurs tricycliques** et **antipsychotiques** (risque d'hypotension orthostatique), **calcium** (risque d'hypercalcémie).

## DIURÉTIQUES ANTIALDOSTÉRONE (1)

## ■ Spironolactone

<b>ALDACTONE</b>					
Per os : 1 à 3 mg/kg/j en 2 prises	30 cp. séc. 25 mg	6,59	II	65 %	0,22
	90 cp. séc. 25 mg	18,53	II	65 %	0,21
	100 cp. séc. 25 mg	HOP	II		
	30 cp. séc. 50 mg	8,68	II	65 %	0,29
	90 cp. séc. 50 mg	14,15	II	65 %	0,16
	100 cp. séc. 50 mg	HOP	II		
	30 cp. séc. 75 mg	12,51	II	65 %	0,42
	90 cp. séc. 75 mg	19,01	II	65 %	0,21
	100 cp. séc. 75 mg	HOP	II		
<b>SPIROCTAN</b>					
Idem <b>ALDACTONE</b>	30 gél. 50 mg	5,12	II	65 %	0,17
	30 gél. 75 mg	6,76	II	65 %	0,23

## ■ Canrénoate de potassium

<b>SOLUDACTONE</b>					
IVL ou perf. : 200 à 800 mg/j	5 inj. 100 mg	HOP	I		
	5 inj. 200 mg	HOP	I		

## ■ Éplérénone

<b>INSPIRA</b>					
Réservé au traitement de l'insuffisance cardiaque post-infarctus et de l'hypertension artérielle 50 mg/j en 1 prise Posologie à atteindre progressivement en 4 sem. en fonction de la kaliémie Débuter p. ex. à 25 mg 1 j/2	30 cp. 25 mg	74,35	I	65 %	2,48
	90 cp. 25 mg	210,36	I	65 %	2,34
	30 cp. 50 mg	74,35	I	65 %	2,48
	90 cp. 50 mg	210,36	I	65 %	2,34



**DIURÉTIQUES ANTIALDOSTÉRONE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Diurétiques épargneurs de potassium** agissant par antagonisme compétitif des récepteurs tubulaires de l'aldostérone. Action antiminéralocorticoïde maximale après 48 à 72 h de traitement, et effets natriurétique et antihypertenseur modérés mais prolongés (24 à 48 h). Résorption digestive lente, suivie d'une biotransformation en de nombreux métabolites, puis d'une élimination prolongée mixte (urinaire et fécale). Propriétés antiandrogéniques. Faibles inducteurs enzymatiques.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hyperaldostéronisme primaire par hyperplasie bilatérale des surrénales.  
Hypertension artérielle essentielle.  
Hypokaliémies modérées liées à un traitement diurétique (de l'anse, thiazidique).  
œdèmes avec hyperaldostéronisme secondaire : syndrome néphrotique, cirrhose décompensée, rétention hydrosodée de l'insuffisance cardiaque, œdèmes cycliques idiopathiques.  
Traitement adjuvant au cours de la myasthénie.

L'**éplérénone** est réservée au traitement de l'insuffisance cardiaque post-infarctus et de l'hypertension artérielle.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance rénale sévère ou aiguë. Hyperkaliémie. Association au **potassium** ou à d'autres produits hyperkaliémisants (sauf hypokaliémie). Insuffisance hépatique terminale. Hypersensibilité connue à la **spironolactone**. Troubles graves de la conduction auriculoventriculaire (pour la forme).

**Grossesse** : contre-indiqué.

**Allaitement** : déconseillé (passage dans le lait maternel, réduction de la lactation).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la kaliémie (notamment en début de traitement) et des fonctions rénales et hépatiques (notamment chez les diabétiques, sujets âgés ou traités par un **diurétique** puissant).

Éviter chez les cirrhotiques avec natrémie < 130 mmol/L et chez les sujets susceptibles de présenter une acidose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hyperkaliémie (principalement en cas de surdosage, d'insuffisance rénale ou de diabète déséquilibré). Risque de déshydratation faible. Effets endocriniens chez l'homme (gynécomastie dose-dépendante le plus souvent réversible, impuissance), et chez la femme (troubles des règles). Nausées, vomissements, diarrhée. Réactions cutanées allergiques. Somnolence, céphalées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées du fait du risque d'hyperkaliémie (sauf en cas d'hypokaliémie chronique, si un contrôle hebdomadaire de la kaliémie dans le premier mois est possible) : **potassium**, **diurétiques hyperkaliémisants** (**amiloride**, **triamtérène**), IEC et ARA II.

Association déconseillée : **lithium**.

Associations à utiliser avec précautions : **AINS**, **produits de contraste iodés**, **biganides**, **diurétiques hypokaliémisants**, **antidépresseurs tricycliques**, **antipsychotiques**.

## DIURÉTIQUES HYPERKALIÉMIANTS (1) – AMILORIDE ET TRIAMTÉRÈNE

### ■ Amiloride

<b>MODAMIDE</b>					
1 à 6 cp./j en 1 à 2 prises	30 cp. 5 mg	3,07	II	65 %	0,10

### ■ Triamtérène + diurétique thiazidique

<b>ISOBAR</b>					
HTA : 1/2 à 1 cp./j	30 cp. séc. 150 mg triamtérène + 5 mg méthylclothiazide	6,29	II	65 %	0,21
<b>PRESTOLE</b>					
HTA : 1 à 2 gél./j	30 gél. 50 mg triamtérène + 25 mg hydrochlorothiazide	6,06	II	65 %	0,20

## DIURÉTIQUES HYPERKALIÉMIANTS (2) – ASSOCIATIONS DE DIURÉTIQUES

### ■ Furosémide + amiloride

<b>LOGIRÈNE</b>					
HTA, syndromes œdémateux : 1 à 6 cp./j	30 cp. séc. <b>spironolactone</b> 50 mg + <b>furosémide</b> 20 mg	6,49	I	65 %	0,22

### ■ Hydrochlorothiazide + amiloride

<b>MODURETIC</b>					
HTA, syndromes œdémateux : 1/2 à 1 cp./j	30 cp. séc. <b>amiloride</b> 5 mg + <b>hydrochlorothiazide</b> 50 mg	3,98	I	65 %	0,13

### ■ Altizide + spironolactone

<b>ALDACTAZINE</b>					
HTA, syndromes œdémateux : 1 à 2 cp./j	30 cp. séc. <b>altizide</b> 15 mg + <b>spironolactone</b> 25 mg	5,89	II	65 %	0,20
	90 cp. séc. <b>altizide</b> 15 mg + <b>spironolactone</b> 25 mg	16,45	II	65 %	0,18
	100 cp. séc. <b>altizide</b> 15 mg + <b>spironolactone</b> 25 mg	HOP	II		
<b>SPIROCTAZINE</b>					
Idem <b>ALDACTAZINE</b>	30 cp. séc.	5,57	II	65 %	0,19

## DIURÉTIQUES HYPERKALIÉMIANTS (3) – ASSOCIATIONS DE DIURÉTIQUES – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

**Diurétiques épargneurs de potassium**, à effets antihypertenseur et natriurétique modérés. Leur activité est comparable à celle de la **spironolactone** mais leur action se situe au niveau du tube distal des tubules rénaux (canal sodium épithélial) et est indépendante de l'aldostérone. Après administration orale, l'action apparaît en 3 à 6 h et persiste 12 à 24 h, passage transplacentaire et dans le lait maternel.

### INDICATIONS

Complément des **diurétiques hypokaliémants**. Hypertension artérielle secondaire à un syndrome de Liddle (mutations activatrices du canal sodium épithélial).

Hypertension artérielle par hyperaldostéronisme primaire (en particulier hyperplasie bilatérale des surrénales chez l'homme).

Ascite et œdèmes des cirrhotiques. Insuffisance cardiaque congestive.

### CONTRE-INDICATIONS

Hyperkaliémie, association au **potassium**.

Insuffisance rénale, insuffisance hépatocellulaire avancée.

Hypersensibilité connue aux différents produits.

**Triamterène** : carence en folates.

**Grossesse** : contre-indiqué.

**Allaitement** : éviter (passage dans le lait maternel, réduction de la lactation).

Éviter chez l'enfant.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter chez les cirrhotiques avec natrémie  $\leq 125$  mmol/L et chez les sujets susceptibles de présenter une acidose.

Surveillance régulière de la kaliémie, des fonctions rénale et hépatique (notamment chez les diabétiques, les sujets âgés ou traités par un **diurétique** puissant), et de la NFS en cas d'utilisation prolongée du **triamterène**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Hyperkaliémie (principalement en cas de surdosage, d'insuffisance rénale ou de diabète déséquilibré).

Risque de déshydratation faible (sauf surdosage).

Encéphalopathie chez les cirrhotiques.

Troubles digestifs (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation), réactions cutanées allergiques.

**Triamterène** : possibilité d'anémie mégaloblastique par carence en folates et de lithiase urinaire médicamenteuse.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées du fait du risque d'hyperkaliémie (sauf en cas d'hypokaliémie chronique, si un contrôle hebdomadaire de la kaliémie dans le premier mois est possible) : **potassium**, **diurétiques hyperkaliémants** (antialdostérone) et IEC.

Association déconseillée : **lithium**.

Associations à utiliser avec précautions : **AINS**, **produits de contraste iodés**, **biguanides**, **diurétiques hypokaliémants**, **antidépresseurs tricycliques**, **antipsychotiques**.

### Associations de diurétiques

Les associations de diurétiques (**diurétique de l'anse** ou **thiazidique** + **diurétique épargneur de potassium**) offrent deux avantages : (1) une action complémentaire (sur 2 sites tubulaires différents) qui rend l'action salidiurétique plus efficace ; (2) des effets opposés sur la kaliémie, qui ne dispensent toutefois pas d'une surveillance prolongée (au long cours, quelques hypokaliémies ont pu être observées).

## CHÉLATEURS DU PHOSPHORE (1)

## ■ Carbonate de calcium

<b>CALTRATE</b>				
1 à 2 cp./j	60 cp. 600 mg	6,97	65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>				
1 à 1,5 g/j	60 cp. 500 mg	6,97	65 %	0,12
	60 cp. 750 mg	10,41	65 %	0,17
	30 cp. 1 000 mg	6,97	65 %	0,23
<b>CALPRIMUM</b>				
2 à 3 cp./j	60 cp. 500 mg	6,97	65 %	0,12

**PROPRIÉTÉS**

Le **carbonate de calcium** est utilisé dans le traitement de l'ostéodystrophie rénale :

- il diminue la phosphorémie par complexation digestive, lorsqu'il est administré à la fin des repas ;
- il augmente la calcémie, par baisse de la phosphorémie et par absorption digestive passive, principalement lorsqu'il est administré en dehors des repas

Il est utilisé à titre préventif pour freiner la sécrétion de parathormone lorsque celle-ci est élevée (PTH > 3 N).

**INDICATIONS**

Traitement de l'ostéodystrophie rénale : hyperphosphorémie et hypocalcémie des insuffisants rénaux chroniques.

Prévention de l'ostéodystrophie rénale (calcémie et phosphorémie normale, mais PTH > 3N).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypercalcémie (> 2,6 mmol/L), hypercalciurie (> 1 mmol/10 kg/j), lithiase urinaire calcique, néphrocalcinose

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la calcémie : arrêt de l'apport calcique en cas d'hypercalcémie ; surveillance renforcée (initialement hebdomadaire) en cas de coprescription de **vitamine D** ou d'immobilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : accélération du transit, plus rarement nausées, constipation.

Surdosage : hypercalcémie aiguë.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association nécessitant des précautions d'emploi :

- **digitaliques** (risque de toxicité accrue en cas d'hypercalcémie) ;
- tétracyclines orales (risque d'absorption diminuée : respecter un intervalle de 3 h entre les deux principes) ;
- polystyrène de calcium (risque d'hypercalcémie) : réduire la dose de carbonate de calcium.

**INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (8) – ANÉMIE****Mécanismes**

Une anémie normochrome normocytaire arégénérative apparaît progressivement dans la plupart des néphropathies chroniques évoluées. Elle est due à un déficit de synthèse rénale d'érythropoïétine ; une hémolyse modérée (due aux toxines urémiques) et plusieurs carences (martiale, folique, en vitamine B12) peuvent y contribuer.

Les conséquences de l'anémie sont invalidantes : asthénie physique et psychique, capacité d'effort limitée, dyspnée, baisse de la libido, etc. Les mécanismes adaptatifs cardiaques (augmentation du débit, hypertrophie ventriculaire gauche) sont à long terme délétères, et chez certains patients, une insuffisance coronarienne en partie fonctionnelle peut apparaître en dessous d'un certain seuil d'hémoglobine.

**Objectif thérapeutique**

Maintenir l'hémoglobinémie entre 11 et 12 g/dL.

**Rechercher une cause d'anémie associée**

Une cause d'anémie associée peut réclamer un traitement autonome : carence martiale par perte sanguine occulte (le plus souvent digestive), une carence en vitamines B9 ou B12, une maladie inflammatoire chronique, une hypothyroïdie, une myélodysplasie.

**Supplémentation martiale**

Elle est indiquée si la ferritinémie est inférieure à 150  $\mu\text{mol/L}$  ou le coefficient de saturation inférieur à 20 % : en moyenne 100 mg de **fer ferreux/j**, *per os*, en dehors des repas. Cette mesure permet de combattre, alors même que le stock martial est jugé normal la « carence martiale fonctionnelle » qui nuit chez l'insuffisant rénal à une érythropoïèse efficace.

**Érythropoïétine recombinante**

Si une anémie  $< 11$  g/dL persiste après 6 sem. de supplémentation martiale, la prescription d'**érythropoïétine humaine recombinante** (r-HuEPO) ou d'un stimulant de l'érythropoïèse (**darbépoïétine alfa**) est justifiée. Avant le stade de dialyse, l'**érythropoïétine** est administrée par injections sous-cutanées. L'élévation de l'hémoglobine ne doit pas dépasser 1 à 2 g/dL/mois sous peine de complications sévères (HTA, encéphalopathie, convulsions).

Dès que l'hémoglobinémie-cible est atteinte, une posologie d'entretien est prescrite, faisant appel à des doses plus faibles d'**érythropoïétine**, voire une seule injection hebdomadaire.

Durant tout le traitement, la poursuite de la supplémentation martiale est utile. Cette stratégie thérapeutique permet de réserver la transfusion de culots globulaires aux cas où une correction rapide de l'anémie est indispensable (angor fonctionnel, hémoglobine  $< 8$  g/dL chez un insuffisant coronarien).

## CHÉLATEURS DU PHOSPHORE (2)

## ■ Sevelamer hydrochloride

<b>RENAGEL</b>					
Hyperphosphorémie : 800 à 1 600 mg x 3/j durant les repas	180 cp. 800 mg	191,63	I	65 %	1,06

**PROPRIÉTÉS**

Composé polymérique chélateur digestif du phosphore. Pas d'absorption systémique.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hyperphosphorémie du dialysé.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypophosphorémie ; hypersensibilité au **sevelamer**.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la phosphorémie. Prudence chez les patients atteints de troubles digestifs. Ne pas ouvrir les capsules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (diarrhée, dyspepsie, vomissements, flatulences). Céphalées. Hypotension. Douleurs neuromusculaires. Baisse de l'absorption des vitamines D, E, K et de l'acide folique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les autres médicaments doivent être pris 1 h avant ou 3 h après le **sevelamer**.

## ■ Carbonate de lanthanum

<b>FOSRENOL</b>					
Hyperphosphorémie : augmentation progressive jusqu'à 1 500-3 000 mg (fin de repas)	90 cp. croq. 250 mg	128,87	I	65 %	1,43
	90 cp. croq. 500 mg	170,69	I	65 %	1,90
	90 cp. croq. 750 mg	224,98	I	65 %	2,50
	90 cp. 1 000 mg	237,56	I	65 %	2,64

**PROPRIÉTÉS**

Chélateur digestif du phosphore.

**INDICATIONS**

Traitement de l'hyperphosphorémie lors des maladies rénales chroniques stade 5 (DFG < 15 mL/min) chez l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypophosphorémie ; hypersensibilité au lanthanum.

**Grossesse et allaitement** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la phosphorémie. Prudence chez les patients atteints de troubles digestifs.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs (diarrhée, dyspepsie, vomissements). Céphalées. Hypotension. Douleurs neuromusculaires. Baisse de l'absorption des vitamines D, E, K et de l'acide folique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les autres médicaments doivent être pris 1 h avant ou 3 h après.

## AGENTS STIMULANT L'ÉRYTHROPOÏÈSE (ASE) (1)

## ■ Époïétine bêta

<b>NÉORECORMON</b>					
Utilisation restreinte Conservation : + 2 à + 8 °C Insuffisance rénale : - avant dialyse : 50 UI/kg x 2/sem. par voie sous-cutanée pendant 4 sem. puis adapter - en dialyse : 30 à 50 UI/kg/sem. puis adapter Cancérologie : dose initiale recommandée à 30 000 UI/sem. - 150 UI/kg x 3/sem. SC initialement puis adapter Transfusion autologue programmée - 600 UI/kg x 2/sem. IV pendant 3 sem.	1 ser. prérempl. 500 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 500 UI	25,23	I	65 %	4,21
	1 ser. prérempl. 2 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 2 000 UI	91,08	I	65 %	15,18
	1 ser. prérempl. 3 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 3 000 UI	134,47	I	65 %	22,41
	1 ser. prérempl. 4 000 UI	HOP	I	65 %	
	6 ser. prérempl. 4 000 UI	177,84	I	65 %	29,64
	1 ser. prérempl. 5 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 5 000 UI	219,93	I	65 %	36,66
	1 ser. prérempl. 6 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 6 000 UI	261,83	I	65 %	43,64
	1 ser. prérempl. 10 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 10 000 UI	429,43	I	65 %	71,57
	1 ser. prérempl. 20 000 UI	HOP	I		
	6 ser. prérempl. 20 000 UI	829,45	I	65 %	138,24
	1 ser. prérempl. 30 000 UI	HOP	I		
	4 ser. prérempl. 30 000 UI	829,45	I	65 %	207,36
	1 fl. + 1 amp. 50 000 UI	HOP	I		



## AGENTS STIMULANT L'ÉRYTHROPOÏÈSE (ASE) (2)

## ■ Époïétine alpha

<b>EPREX</b>					
Utilisation restreinte Conservation : + 2 à + 8 °C à l'abri de la lumière Insuffisance rénale : la voie SC est déconseillée (risque d'apparition d'autoanticorps) Cancérologie : idem <b>époïétine bêta</b> Alternativement, <b>EPREX</b> peut être administré à la dose de 450 UI/kg x 1/sem., soit ≈ 40 000 UI/sem. en 1 inj. hebdomadaire Puis adapter la posologie jusqu'à 300 UI x 3/sem. si l'augmentation de l'hémoglobine est < 1 g/dL	6 inj. 1 000 UI/0,5 mL	47,07	I	65 %	7,85
	6 inj. 2 000 UI/0,5 mL	89,85	I	65 %	14,98
	6 inj. 3 000 UI/0,3 mL	132,63	I	65 %	22,11
	6 inj. 4 000 UI/0,4 mL	175,40	I	65 %	29,23
	6 inj. 5 000 UI/0,5 mL	216,99	I	65 %	36,17
	6 inj. 6 000 UI/0,6 mL	258,28	I	65 %	43,05
	6 ser. 8 000 UI/0,8 mL	340,91	I	65 %	56,82
	6 ser. 10 000 UI/1 mL	423,52	I	65 %	70,59
	1 ser. 20 000 UI/0,5 mL	146,89	I	65 %	146,89
	1 ser. 30 000 UI/0,75 mL	216,99	I	65 %	216,99
	1 ser. 40 000 UI/1 mL	285,82	I	65 %	285,82
<b>BINOCRIT</b>					
Idem <b>EPREX</b> Les dosages de 1 000 à 10 000 UI existent aussi en conditionnement de 6 ser.	1 ser. 1000 UI/0,5 mL	7,52	I	65 %	7,52
	1 ser. 2000 UI/1 mL	14,50	I	65 %	14,50
	1 ser. 3000 UI/0,3 mL	21,47	I	65 %	21,47
	1 ser. 4000 UI/0,4 mL	28,45	I	65 %	28,45
	1 ser. 5000 UI/0,5 mL	34,97	I	65 %	34,97
	1 ser. 6000 UI/0,6 mL	41,10	I	65 %	41,10
	1 ser. 8000 UI/0,8 mL	53,36	I	65 %	53,36
	1 ser. 10000 UI/1 mL	65,63	I	65 %	65,63
	1 ser. 20000 UI/0,5 mL	126,96	I	65 %	126,96
	1 ser. 30000 UI/0,75 mL	188,10	I	65 %	188,10
	1 ser. 40000 UI/1 mL	247,32	I	65 %	247,32

## ■ Darbepoïétine

<b>ARANESP</b>					
Utilisation restreinte Conservation : + 2 à + 8 °C à l'abri de la lumière. Ne pas secouer Indications : idem <b>époïétine alpha</b> Insuffisance rénale : 0,45 µg/kg/sem (IV ou SC) puis titrer la dose pour limiter l'augmentation de l'Hb (< 1 g/dL en 15 j) et atteindre l'Hb cible (11 à 12 g/dL) Cancérologie : 2,25 µg/kg/sem en 1 inj. SC ou 6,75 µg/kg/3 sem. En pratique, on prescrit souvent 500 µg/3 sem. ou 150 à 300 µg/sem.	1 ser. 10 µg (0,4 mL)	17,92	I	65 %	17,92
	1 ser. 20 µg (0,5 mL)	34,83	I	65 %	34,83
	1 stylo SC 20 µg (0,5 mL)	34,83	I	65 %	34,83
	1 ser. 30 µg (0,3 mL)	50,11	I	65 %	50,11
	1 stylo SC 40 µg (0,4 mL)	65,37	I	65 %	65,37
	1 ser. 40 µg (0,4 mL)	65,37	I	65 %	65,37
	1 ser. 50 µg (0,5 mL)	80,63	I	65 %	80,63
	1 ser. 60 µg (0,3 mL)	95,89	I	65 %	95,89
	1 stylo SC 60 µg (0,3 mL)	95,89	I	65 %	95,89
	1 stylo SC 80 µg (0,4 mL)	126,44	I	65 %	126,44
	1 ser. 100 µg (0,5 mL)	156,97	I	65 %	156,97
	1 stylo SC 100 µg (0,5 mL)	156,97	I	65 %	156,97
	1 ser. 130 µg (0,65 mL)	202,09	I	65 %	202,09
	1 ser. 150 µg (0,3 mL)	231,56	I	65 %	231,56
	1 stylo SC 150 µg (0,3 mL)	231,56	I	65 %	231,56
	1 ser. 300 µg (0,6 mL)	452,71	I	65 %	452,71
	1 stylo SC 300 µg (0,6 mL)	452,71	I	65 %	452,71
	1 ser. 500 µg (1 mL)	734,56	I	65 %	734,56
	1 stylo SC 500 µg (1 mL)	734,56	I	65 %	734,56

**AGENTS STIMULANT L'ÉRYTHROPOÏÈSE (ASE) (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Époétine alpha** et **époétine bêta** : hormones glycoprotéiques recombinantes d'origine humaine (r-HuEPO) stimulant la croissance des précurseurs érythroblastiques.

**Darbepoétine** : protéine stimulant la croissance des précurseurs érythroblastiques. Demi-vie 3 fois supérieure à l'érythropoétine humaine recombinante.

**INDICATIONS**

Néphrologie : anémie des insuffisants rénaux chroniques, dialysés ou non.

Cancérologie : anémie symptomatique des patients atteints de tumeurs malignes non myéloïdes et traités par chimiothérapie.

Hématologie : transfusion autologue programmée.

Hors AMM : anémie hémolytique induite par la **ribavirine** lors du traitement de l'hépatite C.

**CONTRE-INDICATIONS**

HTA non équilibrée, allergie au produit.

**Grossesse** : innocuité non établie.

**Allaitement** : éviter.

Les **ASE** sont un des produits dopants détectables dans le sang.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Efficacité nulle ou réduite en cas de : carence martiale, syndrome inflammatoire (infection), hyperparathyroïdisme majeur ou surcharge aluminique.

Corriger toute carence martiale avant le début du traitement ; une supplémentation martiale

systématique en cours de traitement permet d'éviter une « carence fonctionnelle » et de prescrire des doses moindres.

Éviter une correction trop rapide de l'anémie ( $\geq 2$  g/dL/mois d'hémoglobine) ; ne pas dépasser 12 g/dL d'hémoglobine.

Préférer la voie SC à la voie IV (utilisable en ambulatoire avant le stade de dialyse, plus économique).

Prudence en cas : d'hypertension artérielle (surveillance pour renforcer si besoin le traitement antihypertenseur), d'antécédents convulsifs.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

HTA (apparition ou majoration, de façon dose-dépendante) : rarement sévère ; très rarement HTA maligne avec encéphalopathie et convulsions.

Syndrome pseudo-grippal (céphalées, vertiges, arthralgies) disparaissant après les premières semaines.

Réactions allergiques cutanées.

Douleurs locales (après injection SC).

Hyperviscosité (correction excessive de l'anémie) : moindre efficacité de la dialyse, risque de thrombose de l'accès vasculaire.

Augmentation (modérée) de la kaliémie et de la phosphorémie.

Rares cas d'érythroblastopénie par anticorps anti-EPO principalement décrits avec une formulation ancienne de l'**EPREX** chez des insuffisants rénaux traités par voie sous-cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne pas mélanger à d'autres produits.

## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (1)

## ■ Azathioprine

<b>IMUREL</b>					
Transplantation : 5 mg/kg/j puis 1 à 4 mg/kg/j (entretien), 1 à 3 prises	50 cp. pell. 25 mg 100 cp. pell. 50 mg	10,30 29,81 HOP	I I I	100 % 100 %	0,21 0,30
Autres indications : 1 à 2,5 mg/kg/j	1 fl. 50 mg				

**PROPRIÉTÉS**

Analogues des bases puriques à action cytotoxique et antiproliférative (agit sur les immunodépresseurs par action sur les cellules hématopoïétiques et les lymphocytes T).

Résorption digestive complète, transformation en mercaptopurine, dégradation par la xanthine-oxydase, puis élimination urinaire (métabolite peu mais myélotoxique).

Demi-vie = 5 h.

**INDICATIONS**

Prévention du rejet des organes transplantés (en association avec d'autres immunosuppresseurs).

Maladies auto-immunes et inflammatoires (en particulier les formes corticorésistantes ou corticodépendantes afin de réduire la posologie des corticoïdes) : lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde sévère, myasthénie, hépatite auto-immune, purpura thrombopénique idiopathique, anémie hémolytique acquise auto-immune, sclérodermie, pemphigus, dermatomyosite, polymyosite, périartérite noueuse, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Hypersensibilité connue au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter le contact prolongé des comprimés avec la peau.

Éviter l'exposition solaire.

Surveiller l'hélogramme de façon hebdomadaire les 2 premiers mois, puis tous les 3 mois : diminuer ou arrêter en cas de leucopénie < 2 500/mm<sup>3</sup> ou de thrombopénie < 100 000/mm<sup>3</sup>, en particulier en cas d'insuffi-

sance hépatique ou rénale (utiliser une faible posologie initiale).

Le dosage sanguin des 6TCN (6-thioguanines nucléotides) permet de mieux adapter la posologie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Leucopénie dose-dépendante, réversible en 1 à 2 sem. (thrombopénie et anémie plus rares). Sensibilité aux infections, fréquence accrue des cancers cutanés (en cas d'exposition solaire) et des tumeurs malignes.

Alopécie réversible.

Hépatite cholestatique.

Rarement : troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), hypersensibilité (fièvre et frissons, vertiges, éruption cutanée, arthralgies, pancréatite, pneumopathie, troubles du rythme).

Pas d'altération de la fertilité.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibiteurs de l'uricosynthèse (**allopurinol** et **tisopurine**) : risque d'aplasie médullaire imposant une réduction de posologie (75 %) et une surveillance hématologique accrue.

Curarissants : antagonisme (curares non dépolarisants) ou agonisme (curares dépolarisants).

Cytostatiques : effets additifs sur l'hématopoïèse.

Vaccins vivants atténués.

**Surveillance d'un patient sous IMUREL**

- NFS hebdomadaire pendant 2 mois puis
- NFS tous les 3 mois minimum.
- Diminution ou arrêt du traitement si leucopénie < 2 500/mm<sup>3</sup> ou thrombopénie < 130 000/mm<sup>3</sup>.
- Diminuer la posologie en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

## TRANSPLANTATION RÉNALE (2)

### Choix du donneur

#### Rein de cadavre

- Le receveur est inscrit sur la liste d'attente du centre de transplantation qui le suit ; l'inscription est confirmée par l'Agence de biomédecine. Le patient doit être contactable à tout moment.

#### Conditions de prélèvement du donneur

- Certificat de mort encéphalique établi par deux médecins (dont un réanimateur) n'appartenant pas à l'équipe de prélèvement.
- Sérologies VHB, VHC et VIH négatives.
- Donneur non inscrit au registre de refus du prélèvement d'organes.
- Prélèvement (multi-organes en règle) par une équipe spécialisée dans un établissement agréé.
- Conservation du rein dans un soluté spécial réfrigéré à 4 °C (ischémie froide, 36 h max.)
- Détermination des groupes sanguin et tissulaire, transmis à l'EFG qui identifie les receveurs les plus compatibles.
- Choix du receveur qui est contacté par son néphrologue :
  - en l'absence de contre-indication temporaire ;
  - si le *cross-match* est négatif.

#### Donneur vivant apparenté

La transplantation peut être planifiée et il n'y a pas de délai d'attente.

Le donneur est le plus souvent un frère ou une sœur (HLA identique dans 25 % des cas, HLA semi-identique dans 50 % des cas) ou le père ou la mère (HLA semi-identique).

#### Conditions de prélèvement du donneur

- Motivation spontanée et sincère du donneur.
- Présence de deux reins, absence de néphropathie.
- DFG mesuré > 80 mL/min.
- Consentement confirmé devant le juge du tribunal de grande instance.

### La greffe

En fosse iliaque (droite le plus souvent) : anastomoses vasculaires sur les vaisseaux iliaques ; anastomose urétéro-vésicale avec montage antireflux et sonde JJ de protection transitoire ; anastomose urétéro-urétérale possible (sauf si reflux), avec ablation du rein propre sus-jacent si la diurèse résiduelle est importante (sinon, simple ligature).

### Traitement immunosuppresseur préventif du rejet

Indispensable, poursuivi à vie, utilisant une association d'**immunosuppresseurs** (fortes doses initialement puis doses d'entretien). Les associations sont variables et souvent protocolaires. La plus classique est la triple immunosuppression :

- **corticoïdes** : méthylprednisolone IV (**SOLUMÉDROL**) les premiers j puis prednisone (**CORTANCYL**) *per os*, 1 mg/kg les 10 premiers j puis dégression progressive jusqu'à 0,15 à 0,25 mg/kg/j ;
  - antimétabolite : soit mycophénolate mofétil (**CELLCEPT**), soit azathioprine (**IMUREL**) ;
  - inhibiteur de la calcineurine : soit ciclosporine (**SANDIMMUN** ou **NÉORAL**), soit tacrolimus (**PROGRAF**). Ce dernier serait efficace dans la prévention des rejets résistants ou récidivants sous ciclosporine, mais serait plus néphrotoxique à long terme.
- En induction de greffe, des anticorps monoclonaux antirécepteurs à l'IL2 sont régulièrement utilisés : basiliximab (**SIMU-LECT**), daclizumab (**ZENAPAX**) ; les anticorps polyclonaux antilymphocytaires (**THYMOGLOBULINE**, **ATG**, **LYMPHOGLOBULINE**) sont réservés aux patients à haut risque immunologique de rejet.

## IMMUNOSUPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (2)

## ■ Ciclosporine

<b>SANDIMMUN</b>					
5 mg/kg ; 2 à 15 mg/kg/j en 2 prises	50 caps. 25 mg	57,64	I	100 %	1,15
	50 caps. 50 mg	110,96	I	100 %	2,22
	50 caps. 100 mg	216,46	I	100 %	4,33
	1 fl. 50 mL (100 mg/mL)	216,46	I	100 %	216,46
2 à 5 mg/kg/j en perf. continue sur 24 h	10 amp. 50 mg	HOP	I		
	10 amp. 250 mg	HOP	I		
<b>NÉORAL</b>					
5 mg/kg ; 2 à 15 mg/kg/j en 2 prises	60 caps. 10 mg	26,77	I	100 %	0,45
	60 caps. 25 mg	61,90	I	100 %	1,03
	60 caps. 50 mg	119,50	I	100 %	1,99
	60 caps. 100 mg	232,93	I	100 %	3,88
	30 fl. 50 mL (100 mg/mL)	195,85	I	100 %	6,53

## TRANSPLANTATION RÉNALE (3)

### Insuffisance rénale aiguë immédiate

- Tubulopathie transitoire (+++), favorisée par une ischémie prolongée du greffon : impose la poursuite temporaire de la dialyse.
- Hypovolémie.
- Complication chirurgicale, dépistée par l'échographie + Doppler : urinaire (obstacle, fuite) ou vasculaire (thrombose artérielle ou veineuse).
- Rejet hyperaigu : dû à la présence d'anticorps anti-HLA ayant échappé au *cross-match*. Immédiat (rein violet après déclampage), il nécessite la détransplantation ; retardé (< J15, anurie fébrile, pas de vascularisation rénale décelable en échodoppler ou scintigraphie, du fait de lésions vasculaires intenses visibles sur l'artériographie et/ou l'histologie) : lourde immunosuppression (Ig IV, anticorps antilymphocytaires, échanges plasmatiques) mais résultats décevants.

### Insuffisance rénale retardée

Il faut évoquer les causes précédentes, mais aussi les deux cas suivants :

- Le rejet aigu : dû à l'infiltration du greffon par les lymphocytes du receveur, il survient dans les premiers mois, révélé par une élévation de la créatininémie ( $\pm$  gros rein douloureux, fièvre et réduction de diurèse). Le diagnostic repose sur l'histologie rénale et l'élimination des autres causes d'insuffisance rénale aiguë. Le traitement par **méthylprednisolone IV** (3 j de suite) puis corticothérapie orale renforcée est généralement efficace.

En cas de corticorésistance et dans les formes sévères, les anticorps antilymphocytaires sont associés aux **stéroïdes**.

- La néphrotoxicité de la **ciclosporine** ou du **tacrolimus**.

### Insuffisance rénale progressive tardive

- Rejet chronique : la biopsie rénale révèle une fibrose interstitielle et une endartérite fibreuse. L'évolution est à terme défavorable, conduisant à la reprise des dialyses.
- Toxicité de la **ciclosporine** ou du **tacrolimus**.
- Conséquences rénales de l'HTA du transplanté.
- Récidive de la néphropathie initiale.

### Infections

Citons ici les infections opportunistes qui bénéficient volontiers d'un traitement préventif durant les 3 premiers mois après la greffe :

- pneumocystose (et infections urinaires) : **BACTRIM FORTE**, 1 cp./j ;
- herpès et infection à CMV : **ZOVIRAX** ;
- candidose : **FUNGIZONE** per os.

### Autres

Toxicité des **immunosuppresseurs**.

- HTA : 60 % des transplantés.
- Athérome accéléré et ses conséquences cardiovasculaires.
- Complications métaboliques : diabète, ostéoporose, goutte, polyglobulie.
- Tumeurs (40 % après 20 ans de greffe) : cancers cutanés +++ (éviter l'exposition solaire), lymphomes, tumeurs solides.

**IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Immunosuppresseur inhibiteur de la calcineurine. Peptide interagissant avec la ciclophiline ; le complexe inhibe l'activité de la calcineurine, induisant un arrêt réversible et sélectif de la production d'IL2 par les lymphocytes CD4. Les fonctions phagocytaires et l'hématopoïèse sont préservées. Biodisponibilité après absorption digestive d'environ 30 %, forte fixation aux lipides plasmatiques, métabolisation hépatique, puis élimination biliaire (demi-vie de 8 à 14 h). Ayant permis d'améliorer considérablement les résultats des allogreffes d'organes et de moelle osseuse (inhibition des réactions immunitaires allogéniques : rejet de la greffe, réaction du greffon contre l'hôte) et également certaines pathologies auto-immunes.

**INDICATIONS**

Transplantation d'organes (en association aux corticoïdes et à l'azathioprine, dans la prévention du rejet).

Grefe de moelle osseuse (prévention ± traitement du rejet, et de la réaction du greffon contre l'hôte).

Utilisable dans le traitement des psoriasis, dermatite atopique, polyarthrite rhumatoïde, uvéites (formes graves et résistantes) ; aplasie médullaire (si allogreffe impossible) ; syndrome néphrotique idiopathique corticodépendant ou corticorésistant.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : éviter si possible.

**Allaitement** : déconseillé.

Hypersensibilité connue à la **ciclosporine**.

Affection maligne récente ou évolutive.

Infection évolutive.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière du taux de **ciclosporine** (80 à 250 ng/mL dans le sang total) pour adaptation posologique.

Surveiller la fonction rénale et hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Insuffisance rénale aiguë tubulaire (après transplantation rénale, précoce, dose-dépendante,

réversible) ou vasculaire (syndrome hémolytique et urémique) ; insuffisance rénale chronique progressive (après plusieurs années, fibrose interstitielle).

Hépatites cholestatiques, hypertension artérielle, infections opportunistes, pseudolymphomes, tumeurs cutanées.

Hypertrichose, acné, alopecie, hypertrophie gingivale, œdème facial, troubles digestifs (anorexie, nausées, vomissements, diarrhée), neurologiques (convulsions, encéphalopathies, paresthésies ou dysesthésies des extrémités, tremblements), ostéo-articulaires (goutte, algodystrophie).

Hyperkaliémie, hyperuricémie, dyslipémie.

Réactions allergiques (excipient des formes injectables).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Risque d'hyperkaliémie : **diurétiques épargneurs de potassium**.

Risque de rhabdomyolyse en association à certaines **statines**.

Risque de sous-dosage : **anticonvulsivants, antituberculeux**.

Risque de surdosage : jus de pamplemousse, **amiodarone, antagonistes calciques** (sauf **amlodipine**), **antifongiques, macrolides** et apparentés (sauf **spiramycine**), inhibiteurs protéasiques.

Risque accru de néphrotoxicité : **tacrolimus, aminosides, amphotéricine B, ganciclovir**.

Éviter les vaccins à virus vivants atténués.

Déconseillées : **érythromycine, nifédipine, melphalan** à forte dose.

Précautions : **amiodarone, antagonistes calciques** (sauf **amlodipine**), **colchicine**, inducteurs enzymatiques, inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase, **fluconazole, kétoconazole, itraconazole**, macrolides et apparentés (sauf **spiramycine**), **méthotrexate, octréotide**.

À prendre en compte : **cimétidine**, aminosides, **amphotéricine B IV**, œstrogénostatifs et œstrogènes, corticoïdes, diurétiques, **triméthoprime, norfloxacin**e, vaccins à virus vivants atténués.

## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (4)

■ **Mycophénolate mofétil**

<b>CELLCEPT</b>					
Transplantés rénaux : 1 g x 2/j dans les 3 j suivant la greffe	50 cp. 500 mg 100 gél. 250 mg	78,24 78,24	I I	100 % 100 %	1,56 0,78
Transplantés cardiaques : 1,5 g x 2/j dans les 5 j suivant la greffe	32 doses 1 g/5 mL (pour susp. buv.) 4 fl. 500 mg inj. IV	197,27 HOP	I I	100 %	6,16

■ **Acide mycophénolique**

<b>MYFORTIC</b>					
Transplantés rénaux : 720 mg x 2/j débuté dans les 3 j suivant la greffe	120 cp. 180 mg 120 cp. 360 mg	153,40 298,38	I I	100 % 100 %	1,28 2,49

**PROPRIÉTÉS**

Immunosuppresseur, inhibiteur de l'inosine monophosphate déshydrogénase : la synthèse des purines, effet cytostatique plus marqué sur les lymphocytes B et T.

Lié à 97 % à l'albumine plasmatique, transformé en MPA (forme active, seule dosable, non dialysée), puis en MPAG (inactif, éliminé dans l'urine à 90 %).

**INDICATIONS**

Prévention du rejet aigu d'organe après allo-greffe rénale ou cardiaque, en association avec la **ciclosporine** et les corticoïdes.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **mycophénolate mofétil** ou à l'acide mycophénolique.

Déficits héréditaires rares de l'hypoxanthine guanine-phosphoribosyl transférase (HGPRT) tels que le syndrome de Lesch-Nyhan et le syndrome de Kelley-Seegmiller.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire la dose de 50 % chez les sujets âgés. Si le débit de filtration glomérulaire est < 25 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, la dose maximale sera de 1 g/j.

Envisager l'interruption en cas de neutropénie. Limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV.

Surveiller l'apparition d'une neutropénie : numération globulaire hebdomadaire le 1<sup>er</sup> mois × 2/mois au cours des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> mois, puis × 1/mois la 1<sup>re</sup> année.

Contacteur le médecin en cas d'infection, ecchymose ou saignement.

Éviter les vaccins vivants atténués.

Prudence en cas d'affection évolutive du tube digestif et du cycle entérohépatique, car l'efficacité de **CELLCEPT** pourrait être diminuée.

**Grossesse** : tératogénicité chez l'animal, pas de données humaines disponibles.

**Allaitement** : passage dans le lait chez l'animal, pas de données humaines disponibles.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Dominés par les troubles digestifs : gastralgies, nausées.

Leucopénie, infections (en association avec la ciclosporine et les corticoïdes).

Risque accru de lymphome et d'autres tumeurs malignes (cutanées).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Aciclovir** et **ganciclovir** : augmentation de la concentration des 2 produits.

**Antiacides** : diminution de l'absorption du **mycophénolate mofétil**.

**Colestyramine** : diminution de la concentration de **mycophénolate mofétil**.



## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (5)

## ■ Tacrolimus

<b>PROGRAF</b>					
Transplantés rénaux : A. 0,2-0,3 mg/kg/j PO en 2 prises 12 h après la greffe E. : 0,3 mg/kg/j en 2 prises PO Traitement du rejet : augmentation de la posologie du <b>tacrolimus</b> et des corticoïdes <b>PROGRAF</b> injectable Si voie orale impossible : 0,01-0,05 mg/kg/24 h IVSE	50 gél. 0,5 mg	62,20	I	100 %	1,24
	50 gél. 1 mg	110,45	I	100 %	2,21
	50 gél. 5 mg	499,20	I	100 %	9,98
	10 amp. 5 mg/mL	HOP	I		
<b>MODIGRAF</b>					
Idem <b>PROGRAF</b>	50 sach. 0,2 mg	69,83	I	100 %	1,40
	50 sach. 1 mg	326,81	I	100 %	6,54

## PROPRIÉTÉS

Le **tacrolimus** est un immunosuppresseur très puissant qui inhibe la formation des lymphocytes cytotoxiques lesquels sont principalement responsables du rejet du greffon. Il supprime l'activation des lymphocytes T et la prolifération T-dépendante des lymphocytes B.

## INDICATIONS

Prévention du rejet aigu d'organe après allo-greffe rénale, hépatique ou cardiaque.

Traitement du rejet de l'allogreffe résistant à un traitement par d'autres traitements immunosuppresseurs.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **tacrolimus**.

Galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose, déficit en lactates.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV. Surveiller PA, ECG, bilan neurologique et visuel, glycémie à jeun, NFS, hémostase, fonction rénale et hépatique.

Surveiller la concentration plasmatique du

**tacrolimus** en cas de diarrhée pour adapter la posologie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Anémie, leucopénie, coagulopathie. Hyperglycémie, diabète, hyper ou hypokaliémie, hypocalcémie, hyponatrémie. Anxiété, confusion, dépression, convulsion, AVC.

Troubles neurosensoriels.

Insuffisance cardiaque, dyspnée.

Diarrhée, pancréatite, ascite.

Insuffisance rénale.

Rash, prurit, syndrome de Lyell.

Leucopénie, infections (en association avec la **ciclosporine** et les **corticoïdes**).

Risque accru de lymphome et d'autres tumeurs malignes (cutanées).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inhibiteurs du CYP3A4 : **antifongiques** (**kétoconazole**, **fluconazole**, **voriconazole**), **érythromycine**, **clarithromycine**, **josamycine**, **inhibiteur de la protéase du VIH**, **nifédipine**, **nicardipine**.

Inducteurs du CYP3A4 : **rifampicine**, **phénytoïne**, **millepertuis**.

Contraceptifs stéroïdiens : diminution de leur clairance par le **tacrolimus**.

## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (6)

## ■ Sirolimus

RAPAMUNE					
Transplantés rénaux :	30 cp. 0,5 mg	68,85	I	100 %	2,30
Dose de charge à J1 (3 à 15 mg) puis 1 à 5 mg/j <i>per os</i> : obtenir une concentration sérique de 3 à 10 ng/mL	30 cp. 1 mg	129,39	I	100 %	4,31
	30 cp. 2 mg	252,03	I	100 %	8,40
	30 mL sol. 1 mg/mL	252,03	I	100 %	8,40

## PROPRIÉTÉS

Le **sirolimus** est un inhibiteur de mTOR. Il bloque la transduction du signal lymphocytaire en aval de l'IL2. Sa demi-vie est très prolongée (57 h). Outre son action immunosuppressive, il s'agit d'un agent antiprolifératif et antiangiogénique. Un éventuel bénéfice antitumoral est en cours d'étude.

## INDICATIONS

Prévention du rejet aigu d'organe après allogreffe rénale.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **sirolimus**.

**Grossesse et allaitement** : éviter.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter en cas de reprise retardée de fonction rénale et en cas de tubulopathie aiguë (inhibe la tubulogénèse réparative), et autour d'une intervention chirurgicale (retarde nettement la cicatrisation).

Réduire les doses de 30 % en cas d'insuffisance hépatique.

Surveiller la concentration plasmatique.

Limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Dyslipémie (50 %).

Troubles digestifs (env. 30 %) : diarrhée, constipation, douleurs, nausées, vomissements.

Anémie (23 à 37 %), thrombocytopénie (13 à 30 %).

Aphtes, acné, rash cutané.

Retard de cicatrisation.

Pneumopathie interstitielle.

Insuffisance rénale.

Arthralgies.

Céphalées.

Tremblements.

Risque accru d'infections (notamment urinaires).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Inhibiteurs du CYP3A4 : **antifongiques (kétoconazole, fluconazole, voriconazole)**, **érythromycine, clarithromycine, josamycine, inhibiteur de la protéase du VIH, nifédipine, nicardipine**.

Inducteurs du CYP3A4 : **rifampicine, phénytoïne, millepertuis**.

Contraceptifs stéroïdiens : diminution de leur clairance par le **sirolimus**.

## IMMUNOSUPPRESSEURS (TRANSPLANTATION) (7)

## ■ Évérolimus

<b>CERTICAN</b>					
Transplantés rénaux :	60 cp. 0,1 mg	47,60	I	100 %	0,79
A. : 0,75 mg x 2/j à débiter dès que possible après la transplantation	60 cp. 0,25 mg	112,55	I	100 %	1,88
À administrer en même temps que la ciclosporine	60 cp. disp. 0,25 mg	112,55	I	100 %	1,88
À prendre avec un verre d'eau et ne pas écraser	60 cp. 0,5 mg	219,48	I	100 %	3,66
	60 cp. 0,75 mg	324,01	I	100 %	5,40

**PROPRIÉTÉS**

L'**évérolimus** est un inhibiteur du signal de prolifération qui prévient le rejet d'allogreffes. Il exerce son effet immunosuppresseur en inhibant la prolifération et l'expansion clonale des cellules T activées par des interleukines spécifiques de la cellule T comme l'IL2 et l'IL15. L'**évérolimus** inhibe également la fonction mTOR qui joue un rôle dans le métabolisme, la croissance et la prolifération cellulaire. L'effet de l'**évérolimus** ne se limite pas aux cellules T : il inhibe, de manière générale, la prolifération stimulée par facteur de croissance des cellules tant hématopoïétiques que non hématopoïétiques, telles que, par exemple, les cellules musculaires lisses vasculaires. L'**évérolimus** est métabolisé par l'isoenzyme CYP3A4 dans le foie.

**INDICATIONS**

Prévention du rejet d'organe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré recevant une allogreffe rénale ou cardiaque. L'**évérolimus** doit être utilisé en association avec de la **ciclosporine** sous forme de microémulsion et des corticoïdes.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**évérolimus** et au **sirolimus**.  
**Grossesse et allaitement.**  
 Absence de contraception féminine orale efficace.

Intolérance au galactose.

Déficit en lactase.

Malabsorption glucose, galactose.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance des concentrations résiduelles dans le sang en cas d'insuffisance hépatique sévère.

Éviter l'exposition au soleil et UV.

Infections opportunistes plus fréquentes (pneumocystose).

Surveillance de la fonction rénale, de la cholestérolémie et de la triglycéridémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Infections virales, bactériennes, fongiques.

Leucopénie, anémie, troubles de la coagulation, syndrome hémolytique et urémique, purpura thrombopénique.

Épanchement péricardique, pleural, pneumopathie.

Douleurs abdominales, diarrhée, nausée, vomissements, élévation des transaminases.

Œdème de Quincke, éruption cutanée.

Tumeur maligne, lymphome, syndrome lymphoprolifératif, cancer cutané.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association d'**évérolimus** et d'inhibiteurs (par ex. **kétoconazole**, **itraconazole**, **voriconazole**, **clarithromycine**, **télithromycine**, **ritonavir**) ou inducteurs (par ex. **rifampicine**, **rifabutine**) puissants du CYP3A4 n'est pas recommandée.

## ANTICORPS MONOCLONAL (TRANSPLANTATION)

■ **Basiliximab**

<b>SIMULECT</b>					
Transplantés rénaux : A. : 1 dose de 20 mg IV 2 h avant la greffe, 2 <sup>e</sup> dose 4 j après la greffe E. < 35 kg : 1 dose de 10 mg 2 h avant, 2 <sup>e</sup> dose de 10 mg 4 j après la greffe	1 mg pdre + solv.	HOP HOP	I I		
	1 mg pdre + solv.				

**PROPRIÉTÉS**

Le **basiliximab** est un anticorps monoclonal dirigé contre la chaîne  $\alpha$  du récepteur de l'IL2 (récepteur exprimé à la surface des lymphocytes T en réponse à une stimulation antigénique) ; il se lie spécifiquement à CD25 à la surface des lymphocytes T, ce qui empêche la liaison de l'IL2, signal de prolifération des lymphocytes T au cours de la réponse immunitaire impliquée dans le rejet de l'allogreffe.

**INDICATIONS**

Prévention du rejet aigu d'organe après allo-greffe rénale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **basiliximab**.

**Grossesse et allaitement** : éviter.

Absence de contraception féminine orale efficace.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réservé à la greffe rénale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, nausées, diarrhée.

Infection urinaire, infections respiratoires hautes.

Œdèmes des membres inférieurs.

Hypertension artérielle, anémie, céphalées.

Hyperkaliémie, hypercholestérolémie, élévation de la créatinine.

Prise de poids.

Réactions d'hypersensibilité : éruption cutanée, urticaire, bronchospasme, œdème pulmonaire, insuffisance respiratoire et cardiaque, syndrome d'extravasation capillaire.

Lymphome, syndrome lymphoprolifératif.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

## HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE

L'hypertension intracrânienne (HTIC) :

- est une urgence diagnostique et thérapeutique ;
- impose un transfert en urgence en milieu neurochirurgical ;
- est une contre-indication à la ponction lombaire.

### Mise en condition

- Libération des voies aériennes supérieures et ventilation optimale
- Voie veineuse périphérique, scope.
- **TDM cérébrale en urgence** (si besoin contacter le service de neurochirurgie de garde).

### Traitement médical

#### Mesures générales

- Position demi-assise.
- Classiquement, oxygénothérapie nasale à fort débit (6 L/min).
- Intubation et ventilation assistée si coma profond ou irrégularités respiratoires, notamment en hyperventilation pouvant contribuer à la diminution de la pression intracrânienne (PCO<sub>2</sub> entre 20 et 30 mmHg).
- Limitation des apports hydriques (500 à 1 000 mL/24 h), en évitant le sérum glucosé.
- Traitement antipyrétique si besoin.

#### Traitement antioédémateux

Son indication varie selon l'étiologie de l'HTIC.

#### ► Corticoïdes

Utilisés surtout dans les tumeurs cérébrales (primitives ou secondaires) et les abcès du cerveau. On les évite dans les AVC mais on peut les utiliser dans les HTIC secondaires à un traumatisme crânien ou tumorales.

Ex. : **prednisolone (SOLUMÉDROL)** 120 à 500 mg/j en IV lente.

#### ► Antioédémateux hyperosmolaires

Pour les HTIC sévères dues à un AVC ou un traumatisme crânien, en cas de signes d'engorgement.

**Mannitol (MANNITOL)** 20 % : 0,25 à 1 g/kg à passer en 20 min.

*Attention aux contre-indications et aux effets secondaires : risque d'œdème aigu du poumon chez l'insuffisant cardiaque et troubles hydro-électrolytiques.*

#### Autres traitements médicamenteux

Les **barbituriques** à fortes doses sont utilisés en cas de résistance aux traitements classiques, chez un patient intubé et ventilé en unité de soins intensifs.

#### Traitement chirurgical

Dépend de l'étiologie.

- Hémicraniectomie décompressive dans les cas d'AVC sylviens malins ou craniectomie sous-occipitale dans certains AVC cérébelleux.
- Dérivation ventriculo-externe parfois dans les AVC cérébelleux, avec surveillance continue de la pression intracrânienne.

## HÉMATOME EXTRADURAL

Collection de sang entre le crâne et la dure-mère, siègeant le plus souvent en temporopariétal.

C'est une urgence extrême neurochirurgicale. Le pronostic vital immédiat est en jeu.

Le diagnostic est évoqué sur la clinique (valeur de l'intervalle libre après un traumatisme crânien) et confirmé par le scanner cérébral. On complètera systématiquement par un scanner de la charnière cervico-occipitale.

### Conduite à tenir immédiate

#### Mise en condition

- Voie veineuse de bon calibre.
- Libération des voies aériennes supérieures, intubation et ventilation assistée si nécessaire.
- Laisser à jeun car patient « chirurgical ».

#### Mesures associées

Traitement de l'HTIC : position proclive, restriction hydrique et parfois **MANNITOL**.

### Surveillance

Tous les 1/4 h pendant les premières heures :

- pouls, pression artérielle ;
- conscience, score de Glasgow ;
- pupilles ;
- examen neurologique rapide.

### Traitement neurochirurgical

Il doit être réalisé en urgence, d'autant plus que l'intervalle libre a été court. Le délai de prise en charge conditionne le pronostic.

#### En neurochirurgie

Après transfert en SAMU. Réalisation d'un volet osseux centré sur le trait de fracture, évacuation de l'hématome, hémostase de l'artère méningée moyenne. Puis exploration, nettoyage de la dure-mère, repositionnement du volet et drainage.

#### Aux urgences

Par un chirurgien généraliste si le délai de transfert est trop important. Réalisation d'un trou de trépan, sous anesthésie générale, permettant l'évacuation de l'hématome par aspiration. Le patient est ensuite transféré en neurochirurgie.

## HÉMATOME SOUS-DURAL

Il s'agit d'un épanchement de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde, d'origine veineuse, suite à la rupture d'une veine cortico-durale.

Les indications du traitement d'un hématome sous-dural dépendent :

- de son caractère aigu ou chronique ;
- du retentissement clinique de l'hématome s'il s'agit d'un hématome sous-dural chronique ;
- du terrain sur lequel il survient (sujet jeune ou âgé).

### Dans tous les cas

Il s'agit d'une urgence neurochirurgicale.

- Contacter le service de neurochirurgie de garde.
- Laisser à jeun, bilan préopératoire.
- Traitement symptomatique : Il est identique à celui de l'hématome extradural : réanimation du patient et traitement de l'HTIC.

### Hématome sous-dural aigu

Urgence neurochirurgicale extrême.

Le plus souvent chez le sujet jeune, après un traumatisme crânien violent (accident de la voie publique).

Évacuation neurochirurgicale en urgence.

### Hématome sous-dural chronique

Sa prise en charge est différente car :

- il survient le plus souvent chez le sujet âgé ou chez l'alcoolique chronique ;

- son installation est le plus souvent progressive, l'intervalle libre pouvant être très long (jusqu'à plusieurs mois) ;
- le traitement dépend du retentissement clinique et scanographique de l'hématome.

### Évacuation en urgence

#### ► Indications

Retentissement important de l'hématome :

- clinique : hypertension intracrânienne, déficit focal, troubles de la vigilance ;
- scanographique : effet de masse important.

#### ► Modalités

En service de neurochirurgie, par 1 ou 2 trous de trépan.

### Traitement médical

#### ► Indications

Hématome de petite taille ayant un retentissement clinique discret et n'entraînant pas d'effet de masse au scanner cérébral.

#### ► Modalités

**Surveillance** hospitalière en service de neurologie ou de neurochirurgie.

**Hydrocortisone** 20 à 30 mg/j. La durée du traitement dépend de la réponse clinique surveillée par les scanners itératifs.

**Hydratation abondante**, 2 à 3 L/j avec régime normosodé.

### Complications

- Récidives postopératoires fréquentes.
- Crises comitiales rares. Pas de traitement préventif.

## HÉMORRAGIE MÉNINGÉE PAR RUPTURE D'ANÉVRISME (1)

### Principes

Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique nécessitant un transfert immédiat en milieu neurochirurgical.

Toute suspicion d'hémorragie méningée doit faire pratiquer un scanner cérébral sans injection en urgence, la ponction lombaire n'étant indiquée que s'il est normal.

À court terme, le traitement visera à éviter deux complications majeures : la récidive du saignement et le spasme.

L'échelle de la WFNS (cf. Tableau) est utilisée pour évaluer la gravité de l'hémorragie et le pronostic à moyen et long terme. Ainsi un patient admis sans trouble de la conscience a un taux de survie de 87 % et de 28 % s'il est dans le coma.

### Échelle clinique de l'hémorragie sous-arachnoïdienne de la WFNS (World Federation of Neurological Surgeons)

GRADE	SYMPTOMATOLOGIE
I	Glasgow à 15 et absence de déficit moteur
II	Glasgow entre 14 et 13 et absence de déficit moteur
III	Glasgow entre 14 et 13 et existence d'un déficit moteur
IV	Glasgow entre 12 et 7 et absence ou existence d'un déficit moteur
V	Glasgow entre 6 et 3 et absence ou existence d'un déficit moteur

### Mise en condition

#### Hospitalisation en urgence

Dans un service de réanimation, par transport médicalisé, dans un centre spécialisé multidisciplinaire avec services de neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle.

#### Repos strict

Au lit, avec le minimum de stimulation (lumineuse ou sonore). Voie veineuse périphérique. Monitoring suivant la gravité, de la pression artérielle par cathétérisme, du débit cardiaque, de la pression intracrânienne.

#### Bilan biologique préopératoire

#### Bilan vasculaire

Angioscanner multibarettes cérébral, au décours du scanner sans injection.

Si cet examen est négatif, il faut réaliser une artériographie cérébrale des 4 axes qui reste l'examen de référence. En cas de négativité (vasospasme ou hématome), l'examen doit être renouvelé après 8 j.

#### Exclusion de l'anévrisme

C'est une urgence, à réaliser au plus tard dans les premières 72 h par voie microchirurgicale ou endovasculaire afin de prévenir un saignement précoce. Le choix de la thérapeutique est pris après décision multidisciplinaire (neuroréanimateur, neuroradiologue interventionnel et neurochirurgien).

#### Neuroradiologie interventionnelle

C'est l'exclusion de l'anévrisme par voie endovasculaire, en respectant l'artère porteuse et en remplissant le sac anévrismal de petites spires ou « coils ». Technique la plus fréquemment utilisée.



## INHIBITEUR CALCIQUE SÉLECTIF DU CANAL CALCIQUE LENT

## ■ Nimodipine

<b>NIMOTOP</b>					
360 mg/j <i>per os</i> en 6 prises 1 à 2 mg/h IVSE à adapter à la PA	90 cp. 30 mg 1 fl. sol. perf. 10 mg/50 mL	47,19 HOP	I I	65 %	0,52

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur calcique sélectif du canal calcique lent, ayant un effet vasodilatateur supérieur aux autres inhibiteurs calciques.

Absorption rapide, effet de premier passage hépatique, fixation aux protéines plasmatiques, demi-vie de 2 h, élimination biliaire.

**INDICATIONS**

Prévention et traitement du vasospasme des artères cérébrales secondaire à une hémorragie méningée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non démontrée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utiliser avec prudence la forme injectable en cas d'insuffisance hépatique, d'insuffisance cardiaque ou de troubles de conduction.

Utiliser avec prudence en cas d'œdème cérébral ou d'HTIC.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, rougeur du visage, troubles digestifs, diminution modérée de la tension artérielle, élévation transitoire des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée : **disulfirame** (soluté injectable contenant de l'alcool).

Associations déconseillées : autres **inhibiteurs calciques**, **méthyldopa**, **dantrolène** injectable.

## HÉMORRAGIE MÉNINGÉE PAR RUPTURE D'ANÉVRISME (2)

### Traitement chirurgical

Il permet d'exclure l'anévrisme par pose d'un clip sur son collet. Cela afin de prévenir des complications (nouveau saignement, spasme) dont le pronostic est toujours grave. Il peut aussi s'associer à l'évacuation d'un hématome, dans ce cas le patient est plus rapidement opéré.

Contre-indications opératoires :

- âge > 70 ans ;
- forme très grave.

### Traitement médical

#### Prévention de l'ischémie cérébrale

##### ► Contrôle de la pression artérielle

Objectif de pression artérielle moyenne (PAM) à 100 mmHg. L'introduction d'un **antihypertenseur** doit être progressive.

##### ► Contrôle de la volémie et des électrolytes (natrémie)

Sérum physiologique 30 à 50 mL/kg/j si pas d'insuffisance cardiaque et correction des déséquilibres sodés (hypo ou hypernatrémie).

##### ► Traitement du vasospasme

Survient entre le 4<sup>e</sup> et le 14<sup>e</sup> j. Responsable d'une ischémie cérébrale. On le recherche par Doppler transcrânien.

La **nimodipine** a fait la preuve de son efficacité dans la prévention et le traitement du spasme artériel secondaire à une hémorragie méningée

**Inhibiteur calcique, nimodipine (NIMOTOP)** : 60 mg *per os* toutes les 4 h pendant 3 sem. en absence de vasospasme et 6 sem. en cas de vasospasme. À instituer dès que possible. La forme IV n'est pas recommandée car risque d'hypotension systémique.

#### Mesures générales préventives

##### ► Antalgiques

**Paracétamol (PERFALGAN)** 2 g x 3/j IV. Si besoin **morphiniques** avec posologie croissante.

##### ► Contrôle de la glycémie

Maintenir une glycémie entre 6 et 10 mmol/L.

##### ► Contrôle de la température

#### Paracétamol.

##### ► Mesures gastro-intestinales

Prévention de l'ulcère de stress : **antiémétiques, métoclopramide (PRIMPÉRAN)** 10 mg x 2/j en IV. Antiulcéreux : **oméprazole (MOPRAL)** 40 mg x 2/j en IV.

##### ► Mesures anticomitiales

En cas de crise : **benzodiazépine, clonazépam (RIVOTRIL)**.

Pas de traitement préventif systématique.

##### ► Prévention thromboembolique

Compressions pneumatiques intermittentes des mollets.

##### ► Lutte contre les facteurs d'HTIC

- **Laxatifs.**
- **Antitussifs** si besoin.

#### Surveillance

Elle est indispensable, doit être rapprochée, médicale et paramédicale.

- Pouls, pression artérielle, conscience, pupilles toutes les 2 h.
- Examen neurologique par un médecin 2 fois/j, recherchant un déficit focal.

La surveillance est aussi paraclinique : scanner cérébral à la moindre aggravation de l'examen neurologique, à la recherche d'un spasme artériel, d'une récurrence hémorragique ou d'une hydrocéphalie.

#### Traitement des complications

- Hématome : évacuation neurochirurgicale en urgence.
- Hydrocéphalie dans les premières 48 h : dérivation ventriculaire externe.
- Complications cardiovasculaires : défaillance cardiaque gauche, troubles du rythme.
- État de mal épileptique : cf. Épilepsie.

## SCORE DE GLASGOW

Largement utilisé en pratique courante, un patient comateux et d'en assurer la surveillance, c'est un moyen simple et rapide d'évaluer la vigilance.

### Score de Glasgow

Ouverture des yeux (E) :	Spontanée	4	
	Stimulation verbale	3	
	Stimulation douloureuse	2	
	Absente	1	
Réponse motrice (M) :	Sur ordre	6	TOTAL : Score 15 => normal Score 7 => coma grave Score 3 => mort cérébrale
	À la douleur, orientée	5	
	À la douleur, retrait	4	
	À la douleur, flexion anormale	3	
	À la douleur, extension	2	
	Absente	1	
Réponse verbale (V) :	Appropriée	5	
	Confuse	4	
	Incohérente	3	
	Incompréhensible	2	
	Absente	1	

## ISCHÉMIE CÉRÉBRALE AIGÜE (1)

Le but du traitement est, à la phase aiguë, au mieux de lever l'occlusion artérielle et dans tous les cas de limiter l'extension des lésions.

### Hospitalisation en urgence

Tout patient suspect d'AVC doit être hospitalisé en urgence par le SAMU, le SMUR, les pompiers [1]. Au mieux, en unité de soins intensifs de neurologie vasculaire (USINV), parfois en réanimation [2]. L'heure de début doit être demandée ++, le score NIHSS est évalué par le médecin urgentiste en préhospitalier et transmis au neurologue.

Si le déficit a regressé (AIT), le risque de récurrence est évalué par le score ABCD<sup>2</sup> :

- âge > 60 ans : 1 point,
- pression artérielle (**B** pour *Blood pressure*) > 140 mmHg de systolique et/ou ≥ 90 mmHg de diastolique, initialement 1 point,
- clinique : hémiparésie 2 points, trouble du langage sans hémiparésie 1 point,
- durée des symptômes : < 10 min 0 point, de 10 à 59 min 1 point, ≥ 60 min 2 points.
- diabète : 1 point,
- total : 0 à 7 points.

Risque d'infarctus cérébral dans la semaine :

- 35 % si score de 6 points,
- 16,3 % si score de 5 points,
- 2,2 % si score ≤ 4.

Les patients à haut risque, les AIT récidivants ou survenant sous **antiagréments plaquettaires** sont orientés vers les USINV en priorité.

Le patient est attendu, examiné avec nouvelle évaluation du score NIHSS [3], prélevé (hémogramme, glycémie, ionogramme, hémostase, D-dimères, troponine, hémocultures si fièvre ou valve cardiaque). Un ECG est réalisé. Une voie veineuse périphérique est posée sur le membre sain.

Il doit bénéficier sans attendre si possible d'une IRM cérébrale (étude du parenchyme) et ARM du polygone de Willis (étude des vaisseaux) sinon d'un scanner cérébral sans injection qui élimine une hémorragie. L'IRM permet de voir de façon plus précocement l'infarctus. Si l'IRM ne montre pas d'ischémie aiguë, il s'agit d'un AIT.

En cas d'AIT, d'accident ischémique constitué (AIC) mineur, d'accident fluctuant ou évolutif, les vaisseaux doivent être examinés dans les 48 h par écho-Doppler des troncs supra-aortiques et transcrânien, ARM des troncs supra-aortiques ou angio-scanner.

## ISCHÉMIE CÉRÉBRALE AIGÜE (2)

### Mesures thérapeutiques spécifiques

#### Reperméabiliser l'artère occluse

##### ► *Thrombolyse par voie intraveineuse*

Réservé aux patients hospitalisés en USINV. Effet favorable démontré pour le traitement de l'infarctus cérébral de moins de 4 h 30. Elle doit être réalisée le plus tôt possible.

##### *Modalités*

**Altéplase (ACTILYSE)** 0,9 mg/kg (max : 90 mg) ; 10% de la dose en 1 min, puis 90 % de la dose en IVSE sur 60 min. Sur 2<sup>e</sup> voie veineuse et si < 270<sup>e</sup> min après l'installation des troubles.

Surveillance des constantes et score NIHSS/15 min pendant 2 h puis /30 min pendant 6 h puis /h pendant 16 h.

Pas d'antithrombotique dans les 24 h qui suivent le traitement.

##### *Contre-indications*

Cf. Contre-indications générales. Mais aussi, si déficit neurologique mineur (NIHSS < 4) ou sévère (NIHSS > 25), regression des symptômes, handicap neurologique préexistant (dépendant, non ambulatoire), dissection intracrânienne, si infarctus étendu de masse > 1/3 territoire de l'artère cérébrale moyenne, ponction lombaire de moins d'une semaine, femmes enceintes et post-partum (< 14 j).

Elle peut être envisagée au-dessus de 80 ans en ne dépassant pas 3 h de délai. Si âge < 18 ans, l'indication se fait au cas par cas.

La pression artérielle doit être contrôlée : PAS < 185 mmHg et PAD < 110 mmHg (cf. Prise en charge de l'HTA).

##### ► *Thrombolyse par voie intra-artérielle*

Au cas par cas, après concertation neurologue vasculaire/neuroradiologue interventionnel. Délai jusqu'à 6 h pour une occlusion de l'artère cérébrale moyenne voire au-delà pour une occlusion du tronc basilaire (hors AMM).

### Prévenir les récurrences ischémiques précoces

##### ► *Traitements antiagrégants plaquettaires*

À débiter le plus précocement, en l'absence de contre-indication. Retardée de 24 h si thrombolyse.

**Aspirine** 160 à 300 mg/j *per os* ou IVD. Par exemple : **aspirine (ASPEGIC)** 250 mg.

Si contre-indication à l'**aspirine** (allergie, ulcère gastroduodénal évolutif) : **clopidogrel (PLAVIX)** 4 cp. à l'arrivée puis 1 cp./j.

L'association **aspirine** et **clopidogrel** est proposée dans les cas de récurrence ischémique sous **aspirine** dans les sténoses athéromateuses serrées non accessibles à l'endartériectomie ou en cas d'angioplastie cérébrale en urgence avec mise en place de stent.

## ISCHÉMIE CÉRÉBRALE AIGÜE (3)

### ► Traitements anticoagulants

À doses curatives.

**HBPM** : dosage de l'activité anti-Xa si insuffisance rénale ou sujet âgé (cible de 0,5, à 1) ou **héparine standard** IVSE, si contre-indication aux **HBPM**, les premiers jours puis relais par **héparine calcique (CALCIPARINE)** SC en 2 à 3 inj./j pour obtenir un TCA entre 1,5 à 2 fois le témoin.

– Retardées de 24 h si thrombolyse IV.

– Surveillance clinique, NFS et hémostase (TCA, activité anti-Xa) et clairance de la créatinine si > 75 ans.

– Contre-indications : troubles de conscience, NIHSS > 15, infarctus massif, hémorragie sur le scanner, endocardite infectieuse et myxome de l'oreillette gauche. Contre-indications générales des anticoagulants.

– Indications : **en cas d'AIT ou d'AIC minime, avec à chaque fois évaluation du risque de transformation hémorragique.**

• Fibrillation auriculaire, le délai d'introduction du traitement anticoagulant est variable :

– dès le 1<sup>er</sup> j si AIT ou AIC avec lésion ischémique peu étendue et sans composante hémorragique. Relais par **AVK (COUMADINE)** à partir de J7 avec INR cible entre 2 et 3 ;

– si AIC étendu avec saignement minime ou absent, associer **aspirine** et **HBPM** pré-

ventif et scanner de contrôle à J7. Si la clinique est stable et s'il n'y a pas de transformation hémorragique : relais par **AVK** ; – plus tardivement si transformation hémorragique ou hématome intra-infarctus ; retarder alors de plusieurs semaines jusqu'à disparition du saignement en proposant initialement uniquement **HBPM** à dose préventive.

• Cardiopathies à haut risque embolique (prothèse valvulaire mécanique, thrombus intracardiaque, valvulopathie mitrale rhumatismale). Traitement à débiter ou rééquilibrer dès que possible.

• Sténoses athéromateuses serrées (dissection ou athérome) avec retentissement hémodynamique intracrânien.

• Thromboses veineuses cérébrales (même en cas de lésions hémorragiques).

### Traitement neurochirurgical

Hémicraniectomie décompressive dans les 24-48 h d'un infarctus sylvien malin, après discussion collégiale, chez un sujet présentant un score de NIHSS > 16, des troubles de la vigilance dès les premières heures et volume de l'infarctus > 145 cm<sup>3</sup> en diffusion à l'IRM.

Dérivation ventriculaire externe ou craniectomie sous occipitale décompressive pour les infarctus cérébelleux oedémateux et compressifs du cervelet.

## ISCHÉMIE CÉRÉBRALE AIGÜE (4)

### Mesures thérapeutiques générales

#### Surveillance

Médicale par le score NIHSS et infirmière : pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire, et saturimètre ( $O_2$  capillaire) en continu. Température et glycémie capillaire/6 h, diurèse/j à adapter ensuite.

#### Mesures neuroprotectrices

- Lutte contre l'hypoperfusion cérébrale ; position à plat jusqu'à la réalisation de l'écho-Doppler cervical sauf si encombrement respiratoire ou troubles de la vigilance importants. Respect de l'HTA.
- Lutte contre l'hypertension intracrânienne ; surélever la tête de  $30^\circ$  par rapport au plan du lit, restriction hydrique, traitement symptomatique des vomissements. Exceptionnellement, mannitol. Pas de corticoïde. **Traitement antiépileptique d'action rapide si crise d'épilepsie.**
- Lutte contre l'hypoxie ; oxygène si saturation en  $O_2$ .
- Lutte contre l'hyperthermie ; paracétamol si température  $> 38^\circ C$ .
- Lutte contre l'hyperglycémie ; perfusion avec sérum physiologique et insulinothérapie si glycémie  $\geq 10$  mmol/L.

#### Prise en charge de l'hypertension artérielle

Pour la thrombolyse, la pression doit être contrôlée (PAS  $< 185$  mmHg ou PAD  $< 110$  mmHg) ; on utilise la voie IVSE : nicardipine (LOXEN) en débutant par 1 mg/h et en augmentant si nécessaire ou urapidil (EUPRESSYL), labétalol (TRANDATE). Si pas de thrombolyse, respect de l'HTA afin de favoriser la perfusion cérébrale. Ne rajouter un traitement que si la PA est

très élevée : PAS  $> 220$  mmHg ou PAD  $> 120$  mmHg. La baisse de la PA doit alors être toujours progressive et modérée (PAS  $> 140$  mmHg).

#### Prévention et détection précoce des complications

##### ► Troubles de la déglutition

À rechercher systématiquement avant toute alimentation. Si AIT, ou AIC modéré, alimentation normale. Si AIC sylvien ou syndrome de Wallenberg, à jeun 24 à 48 h puis sonde nasogastrique.

##### ► Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire

Si patient alité ou hémiparétique. **Bas antithrombotique, héparine de bas poids moléculaire (HBPM)** à dose préventive pour haut risque, ex: **daltéparine sodique (FRAGMINE)** 5 000 UI/j en SC et mobilisation précoce. Retardée de 24 h après thrombolyse.

##### ► Troubles du rythme cardiaque AC/FA

- FC  $< 120$ /min et bonne tolérance : surveillance simple ;
- FC  $> 120$ /min et/ou mauvaise tolérance : ralentir la fréquence cardiaque par **digoxine** 1/2 à 1 amp. IVL puis **digoxine** 1/2 à 1 cp./j selon la fonction rénale associé à un traitement de l'insuffisance cardiaque ;
- réduction spontanée de la FA ou FA  $< 6$  h prouvée : dose de charge d'**amiodarone**.

##### ► Rétention aiguë d'urine et infection urinaire

##### ► Escarres de décubitus

#### Rééducation

Dès que possible, motrice et orthophonique [3].

### CONSENSUS

[1] Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce, HAS, 2009

[2] Accident vasculaire cérébral adulte et l'enfant : prise en charge par réanimateur, SRLF, 2010

[3] Accident vasculaire cérébral : méthodes de rééducation de la fonction motrice chez l'adulte, HAS, 2012

**ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE RÉCENT (1)**

Définition : un accident ischémique transitoire (AIT) est un épisode bref de dysfonctionnement neurologique dû à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'une heure sans preuve d'infarctus aigu à l'imagerie.

On parle d'AIT récent lorsqu'il date de moins d'une semaine.

Le pronostic immédiat est donc spontanément favorable. Le traitement aura comme objectif de prévenir la survenue d'un accident ischémique constitué (risque de récurrence de 2,5 à 5 % à 48 heures et de 5 à 10 % à 1 mois).

**Hospitalisation**

Au mieux en USINV si AIT récidivants ou survenant sous antiaggrégants plaquettaires et/ou score ABCD<sup>2</sup> > 6 (cf. Ischémie cérébrale aiguë).

**Réalisation d'une imagerie cérébrale**

Si possible IRM cérébrale avec séquence de diffusion et ARM du polygone de Willis ou scanner cérébral sans injection. L'IRM ne montre pas d'ischémie aiguë, elle élimine une hémorragie, un diagnostic différentiel. Elle doit être réalisée dans un second temps s'il n'y a eu qu'un scanner.

Il faut réaliser l'imagerie au mieux dans les 12 h [1].

**Premier bilan étiologique****Recherche d'une sténose athéromateuse des vaisseaux du cou**

Réalisation en urgence d'un écho-Doppler des troncs supra-aortiques et d'un Doppler transcrânien si possible. Peut être complété par une ARM ou un angiogramme (intérêt pour les sténoses vertébro-basilaires). En cas de suspicion de dissection, IRM cervicale avec coupes axiales.

**Cardiaque**

Recherche d'une arythmie par fibrillation auriculaire à l'interrogatoire, à l'auscultation et sur l'ECG. Recherche de signes d'infarctus.

Échographie cardiaque en urgence si suspicion de thrombose d'une valve mécanique, d'endocardite, de dissection aortique. Sinon différée éventuellement associée à une échographie par voie transœsophagienne.

**Autres**

Hémogramme, plaquettes, CRP, glycémie, bilan lipidique, TP et TCA, CPK.

Selon l'orientation étiologique (sujet jeune) : ponction lombaire, protéines C et S, bilan immunologique.



## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

## ■ Clopidogrel

<b>PLAVIX</b>					
Initiation : dose de charge de 1 cp. à 300 mg dans le cadre d'un événement aigu	30 cp. 75 mg 50 cp. 75 mg 30 cp. 300 mg	33,84 HOP HOP	I I I	65 %	1,13
Entretien : 1 cp./j à 75 mg					

## ■ Dipyridamole + acide acétylsalicylique

<b>ASASANTINE LP</b>					
2 gél./j	60 gél. 200 mg/25 mg	14,56	II	65 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire et de la libération de certains facteurs plaquettaires, entraînant un allongement du temps de saignement dès le 2<sup>e</sup> j.

Résorption rapide, élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Prévention secondaire des accidents ischémiques cérébraux (**PLAVIX** et **ASASANTINE LP**).

Prévention des accidents ischémiques majeurs, notamment coronariens, chez les patients présentant une artérite des membres inférieurs (stade de claudication intermittente) pour le **PLAVIX**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Syndromes hémorragiques, ulcère évolutif.

Troubles de l'hémostase avec allongement du temps de saignement.

Insuffisance hépatique sévère et hypersensibilité à la molécule pour le **PLAVIX**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**PLAVIX** : pas d'effets secondaires hématologiques, donc pas de surveillance biologique.

**ASASANTINE LP** : éviter chez l'asthmatique et le BPCO.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Dipyridamole** et **clopidogrel** : cf. Cardiologie.

**Dipyridamole + acide acétylsalicylique** : céphalées, douleurs épigastriques, nausées, diarrhées, saignements.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations déconseillées : tout médicament anticoagulant, **AINS**, **méthotrexate** > 15 mg/sem. et **uricosuriques** pour l'**ASASANTINE LP**.

Les inhibiteurs de la pompe à protons et en particulier l'oméprazole pourraient diminuer l'efficacité du **clopidogrel**.

**ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE RÉCENT (2)****Traitement en urgence****Aspirine**

Si pas de contre-indication : 160 à 300 mg. En cas d'impossibilité de réalisation de l'imagerie dans l'immédiat, de façon exceptionnelle, il est possible de prescrire l'aspirine sans imagerie [1] car le bénéfice attendu est supérieur au risque d'aggraver une éventuelle hémorragie.

**► Indications**

- AIT sur sténose athéromateuse non chirurgicale.
- AIT sur dissection artérielle.
- AIT sur foramen ovale perméable.

**Endartériectomie**

Si l'AIT est lié à une sténose athéromateuse  $\geq 70\%$  de la bifurcation carotide,

l'endartériectomie carotidienne est à envisager rapidement (dans les 15 j).

**Traitement anticoagulant****► Modalités**

**HBPM** ou **héparine sodique (HÉPARINE CHOAY)** 400 UI/kg/j IVSE (TCA entre 2 et 2,5 fois le témoin).

Relais ensuite par **antivitamines K** ou nouvel anticoagulant (cf. Prévention secondaire).

**► Indications**

- AIT sur fibrillation auriculaire.
- AIT sur thrombus sur valve mécanique ou intracardiaque.
- AIT lié à un thrombus intraluminal.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge initiale d'un accident ischémique transitoire récent, HAS, 2007

## ACCIDENT ISCHÉMIQUE CÉRÉBRAL - PRÉVENTION SECONDAIRE (1)

Après un accident ischémique cérébral, qu'il soit constitué ou transitoire, il faut mettre en route un traitement préventif des récurrences dès la fin de la phase aiguë. Ce traitement s'inscrit dans la prévention vasculaire globale [1].

Le choix du traitement dépend de la cause de l'AVC mais aussi du terrain sur lequel il survient, en mesurant les bénéfices par rapport aux effets secondaires.

### Traitement des facteurs de risque

- Traitement d'une hypertension artérielle principalement (premier facteur de risque des AIC). L'objectif est une pression artérielle < 140/90 mmHg (130/80 mmHg si diabète ou insuffisance rénale). À moduler si sténose carotidienne > 70 % ou occlusion d'une artère cervicale ou intracrânienne. S'assurer du contrôle de la pression artérielle par auto-mesure ou MAPA. On peut choisir des **diurétiques thiazidiques** ou une association de **diurétiques thiazidiques et inhibiteurs de l'enzyme de conversion** ou **ARA II**.

- Sevrage tabagique et en alcool.
- Réduction pondérale si obésité.
- Activité physique régulière.
- Arrêt de la pilule oestroprogestative (contraception par progestatif seule possible) et du traitement hormonal substitutif.
- Traitement par **statine** ; par exemple **l'atorvastatine** si AIT ou AIC non cardioembolique et LDL-cholestérol  $\geq 1$  g/L. Traitement systématique si diabétique, ATCD coronarien ou artériopathie des membres inférieurs. La cible de LDL-cholestérol recommandée est < 1 g/L.
- Équilibre d'un diabète (objectif HbA1c < 6,5 %).
- Recherche et traitement d'un syndrome d'apnées du sommeil.

### Traitements antithrombotiques

#### Traitement par antiagrégants plaquettaires

##### ► *Aspirine*

Proposée en première intention dans les accidents ischémiques cérébraux liés à

l'athérosclérose. Les doses recommandées se situent entre 75 mg et 160 mg/j. Ex. : **KARDÉGIC** 160 mg 1 sach./j.

Recommandé en cas de foramen ovale perméable isolé.

##### ► *Clopidogrel (PLAVIX)*

Utilisé dans les mêmes indications que l'**aspirine**, mais généralement en 2<sup>e</sup> intention (allergie ou récurrence d'un AVC).

#### Traitement anticoagulant

##### ► *Indications*

- En cas de persistance d'une cardiopathie emboligène (FA non valvulaire paroxystique ou chronique, thrombus intracardiaque, prothèse valvulaire, rétrécissement mitral rhumatismal).
- En cas de thrombophlébite cérébrale, sans oublier le traitement étiologique et des complications (épilepsie, HTIC). Habituellement de 6 mois à 1 an.
- Surveillance régulière de l'INR, à adapter en fonction de la cardiopathie en cause.

##### ► *Antivitamines K*

pour toutes les indications.

##### ► *Nouveaux anticoagulants [2]*

Pour la prévention des AVC en cas de fibrillation non valvulaire :

- si INR cible non obtenu malgré une bonne observance ;
  - si **AVK** non toléré ;
  - si surveillance biologique mal acceptée.
- Ils présentent moins de risque d'hémorragie intracrânienne que les **AVK** mais n'ont pas de marqueur biologique ni antidote en cas de surdosage. La fonction rénale doit être évaluée et la posologie éventuellement adaptée.

- **Inhibiteur direct de la thrombine, dabigatran éxétilate (PRADAXA)** à 300 mg/j en 2 prises quotidiennes. On utilisera une dose inférieure : 220 mg/j en 2 prises si âge > 75 ans, antécédents d'hémorragies, ou 75 mg/j si clairance de la créatinine à 30 mL/min.

- **Inhibiteur direct du facteur Xa, rivaroxaban (XARELTO)** 15 à 20 mg/j en une prise quotidienne ou **apixaban (ELIQUIS)** 5 à 10 mg/j en 2 prises.

## ACCIDENT ISCHÉMIQUE CÉRÉBRAL - PRÉVENTION SECONDAIRE (2)

### Endartériectomie

#### Indications actuelles

- Sténose symptomatique de la carotide interne extracrânienne > 70 % (critères NASCET) et si taux de morbidité de la chirurgie est < 6 %.
- Sténose symptomatique de la carotide interne extracrânienne entre 50 et 69 % : peut être recommandée chez un homme, si âge > 75 ans et si taux de morbidité de la chirurgie < 3 %.
- Sténose de l'artère vertébrale extracrânienne : si récurrence AIT ou AIC malgré traitement médical maximal.

#### Contre-indications

- Contre-indication générale à l'anesthésie.
- Accident ischémique constitué récent (prise de contraste au scanner cérébral).

### Angioplastie carotidienne ou vertébrale avec stent [3]

Nécessité d'associer **clopidogrel** et **aspirine** avant et au moins 1 mois après le stenting.

Après avis pluridisciplinaire en cas de :

- comorbidité majeure contre-indiquant la chirurgie ;
- sténose haut située non accessible ;
- sténose post-radique ;
- resténose après chirurgie carotidienne ;
- alternative à la chirurgie de l'artère vertébrale extracrânienne ;
- sténose de l'artère intracrânienne avec récurrence d'AIT ou d'AIC malgré traitement médical maximal.

### Cas particuliers

#### Traitement étiologique

S'il existe une maladie générale sous-jacente : corticothérapie en cas de vasculite cérébrale, saignées en cas de maladie de Vaquez, etc.

#### Autre indication des anticoagulants

Foramen ovale avec anévrisme du septum interauriculaire > 10 mm ou foramen ovale de grande taille ; le choix entre les **antiagrégants plaquettaires** et les **AVK** peut se discuter.

### CONSENSUS

[1] Actes et prestations sur l'accident vasculaire cérébral (AVC), HAS, 2012

[2] Fibrillation auriculaire non valvulaire : quelle place pour les anticoagulants oraux non antivitamine K ?, HAS, 2013

[3] Prévention vasculaire après un infarctus cérébral ou un accident ischémique transitoire, HAS, 2008

## ÉPILEPSIE (1)

Il faut bien distinguer le traitement de la crise et le traitement de fond d'une épilepsie, dont les indications sont à discuter, visant à supprimer les crises et permettre une vie normale du patient.

Les contre-indications et les effets secondaires des médicaments, la situation psychologique et sociale du patient ainsi que le respect de certaines règles de prescription seront autant d'éléments à prendre en compte pour y parvenir.

### Traitement de la crise convulsive

#### Mise en condition

- Protection des chocs pendant la chute ou la phase clonique, mise en position latérale de sécurité pendant la phase d'obnubilation post-critique.
- Libération des voies aériennes supérieures (aspiration, canule de Guédel).

#### Benzodiazépine

**Clonazépam (RIVOTRIL)** 1/2 amp. à 2 mg en IV lente, renouvelable 5 min plus tard. À faire si 2<sup>e</sup> épisode critique afin d'empêcher la récurrence ou si la crise > 3 min. Si malgré les 2 IV la crise se poursuit, il faut appeler le 15. À l'opposé, pas de traitement si la crise est isolée.

#### Traitement d'un facteur déclenchant

Dans le cas particulier d'une crise survenant dans le cadre d'une rupture de traitement chez un épileptique connu, ne pas faire d'injection de **benzodiazépine** si la crise est passée et ne récidive pas, mais reprendre le traitement antérieur en associant une **benzodiazépine** le temps que le traitement de fond soit à nouveau efficace ; par ex. : **clobazam (URBANYL)** 5 mg 1 cp. x 3/j pendant 8 j puis diminution et arrêt très progressif sur 10 j.

### Traitement de fond

Ne doit être débuté que lorsque le diagnostic d'épilepsie est certain et documenté (clinique, EEG, IRM). Le traitement « d'épreuve » doit être évité.

Le but est de contrôler les crises et d'avoir le minimum d'effets indésirables. Le choix thérapeutique dépend d'une évaluation précise du type de crise et si possible du syndrome épileptique.

Devant une 1<sup>re</sup> crise, la mise en route d'un traitement de fond n'est pas systématique.

- S'il s'agit d'une crise « situationnelle », on ne traite pas.
- Si elle s'inscrit dans un syndrome épileptique bien défini ou si elle traduit une lésion hautement épileptogène de l'encéphale, on traitera d'emblée.
- Dans les autres cas, si le bilan paraclinique est négatif on peut attendre la survenue d'une 2<sup>e</sup> crise en l'expliquant au patient.

#### Principes

- Toujours débiter par une monothérapie dont le choix dépend du type de l'épilepsie, du profil d'activité de la molécule, des effets secondaires attendus.
- Instituer le traitement progressivement pour optimiser la tolérance, en particulier cognitive, d'autant que le sujet est âgé.
- Limiter le nombre de prises (au mieux 2/j).
- En cas d'échec du médicament utilisé : on augmente très progressivement les doses jusqu'à la dose maximale tolérée, puis on essaye un autre médicament, toujours en monothérapie.
- Après échec de toutes les monothérapies : on propose une bithérapie en prenant garde aux interactions médicamenteuses. Association à discuter au cas par cas en fonction du type d'épilepsie, de la tolérance et des contre-indications des médicaments.

## ANTIÉPILEPTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES (1)

## ■ Diazépam

<b>VALIUM ROCHE</b>					
Voie IV lente ou IM : 10 à 20 mg Voie intrarectale : 0,5 mg/kg chez l'enfant Progressivement : 10 à 20 mg/j	6 amp. 10 mg/2 mL	3,16	I	65 %	0,53
	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	100 cp. séc. 2 mg	HOP	I		
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	100 cp. séc. 10 mg	HOP	I		
	600 gtttes - fl. 20 mL (3 gtttes = 1 mg)	3,05	I	65 %	0,01

## ■ Clonazépam

<b>RIVOTRIL</b>					
Voie IV lente ou IM : 1 à 2 mg Progressivement : 0,1 mg/kg/j	6 amp. 1 mL = 1 mg	4,71	I	65 %	0,78
	28 cp. quadriséc. 2 mg	2,16	I	65 %	0,08
	500 gtttes 0,25 %	2,25	I	65 %	0,00
	(1 gttte = 0,1 mg)				

Prescription réservée aux neurologues

## ■ Clobazam

<b>URBANYL</b>					
5 à 10 mg x 3/j en association avec le traitement de fond	30 gél. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
	30 cp. séc. 10 mg	3,71	I	65 %	0,12
	30 cp. séc. 20 mg	5,15	I	65 %	0,17

## ■ Midazolam

<b>BUCCOLAM</b>					
Assimilé aux stupéfiants	4 ser. 0,5 mL sol. bucc. 2,5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 1 mL sol. bucc. 5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 1,5 mL sol. bucc. 7,5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 2 mL sol. bucc. 10 mg	86,11	I	65 %	21,53

## ÉPILEPSIE (2)

### Épilepsies généralisées idiopathiques

#### Épilepsies-absences de l'enfant

**Acide valproïque (DÉPAKINE)** 15 mg/kg/j en 2 prises *per os* puis augmenter jusqu'à 30 mg/kg/j progressivement s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 15 j ou **lamotrigine (LAMICTAL)**.

**L'éthosuximide (ZARONTIN)** 20 à 30 mg/kg/j en 2 prises peut être utilisé si les absences sont isolées et les effets secondaires surveillés.

L'efficacité ou non du traitement est jugée au bout de 2 mois à pleines doses. Le plus souvent (80 % des cas) l'efficacité du traitement est bonne, sans récurrence. En cas d'échec de deux monothérapies : **lamotrigine + acide valproïque** ou **éthosuximide + acide valproïque**.

L'arrêt du traitement se fait à l'adolescence, progressivement, si absence de crise depuis plus de 18 mois et si l'EEG est normal. Puis surveillance régulière de l'EEG.

#### Épilepsie myoclonique juvénile bénigne

**Acide valproïque** ou **lamotrigine**, s'il s'agit d'une jeune fille, l'arrêt du traitement entraîne dans 90 % des cas une récurrence obligeant à maintenir le traitement très longtemps.

#### Épilepsie avec crise généralisée tonico-clonique du réveil

**Lamotrigine** si jeune fille.

En cas d'échec, association de 2 molécules : au choix suivant le patient, l'âge, le sexe : **acide valproïque**, **lamotrigine** ou **lévétiracétam**.

### Épilepsie partielle

En première intention : **oxcarbazépine (TRI-LEPTAL)** 600 à 2 400 mg/j en 2 prises, souvent bien toléré ; surveiller éventuel SIADH ; ou **carbamazépine (TÉGRÉTOL)** 600 à 1 200 mg/j en 2 prises ; surveillance cutanée et biologique (NFS et bilan hépatique). Peuvent aussi être proposées la **lamotrigine**, le **lévétiracétam (KEPPRA)**. Moins fréquemment, **gabapentine (NEURONTIN)**.

En 2<sup>e</sup> intention on choisira une monothérapie dans ces médicaments, le **topiramate (EPITOMAX)** ou encore le **valproate de sodium** ou la **phénytoïne (DI-HYDAN)**.

Bithérapie en cas d'échec ; nombreuses associations possibles souvent entre un **antiépi-**

**leptique** classique et une nouvelle molécule (**lacosamide**, **eslicarbazépine**, **zonisamide**).

### Éducation et prise en charge sociale du patient

Elle est indispensable pour une bonne observance du traitement.

- Explication du traitement :
  - traitement de fond, au long cours ;
  - à prendre régulièrement, pas d'arrêt intempestif ;
  - pas d'associations médicamenteuses sans avis médical.
- Éviter les facteurs favorisants :
  - alcool ;
  - fatigue, conseiller un rythme de vie régulier ;
  - lumière intermittente (ordinateurs, boîtes de nuit).

### Activités dangereuses

Alpinisme, plongée, parachutisme.

Les autres sports sont cependant possibles.

### Activités légalement interdites

- Contre-indication relative à la conduite de tous les véhicules, interdiction formelle de la conduite de poids lourds (permis C) et de véhicules collectifs (permis D), compatibilité temporaire pour les véhicules légers (commission d'aptitude).
- Armée.

### Arrêt d'un traitement de fond

Il n'est pas systématique mais peut être proposé en l'absence de crise depuis au moins 2 ans.

Il doit être prudent, extrêmement progressif (plusieurs mois) après information éclairée du patient et jamais contre son gré.

Une surveillance EEG permet souvent de prévoir les récurrences (le plus souvent la première année).

En cas de récurrence des crises, le traitement est généralement repris à la dose minimale efficace, *a priori* définitivement.

Certains syndromes épileptiques se prêtent mal à l'arrêt du traitement : épilepsie myoclonique juvénile, épilepsies partielles dont l'équilibration a été difficile, épilepsies sur lésions cérébrales.

## ANTIÉPILEPTIQUES (2) – BENZODIAZÉPINES (2)

## PROPRIÉTÉS

**Benzodiazépines** : effet anticonvulsivant, anxiolytique, et myorelaxant. Action rapide par voie intrarectale et intraveineuse, demi-vie de 32 à 38 h, élimination urinaire. Non inducteur enzymatique.

## INDICATIONS

Épilepsie et état de mal épileptique sous toutes ses formes. Douleurs de désafférentation.

Crises d'angoisse aiguës, delirium tremens.

**BUCCOLAM** : traitement des crises convulsives aiguës prolongées chez les nourrissons (de 3 à 6 mois).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit. Insuffisance respiratoire, myasthénie, syndrome d'apnées du sommeil. Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Voie injectable : nécessite un matériel de réanimation respiratoire à proximité.

Utilisation prudente : sujets âgés, conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines, insuffisance hépatique ou rénale.

À éviter en cas d'antécédent d'alcoolisme ou de toxicomanie.

**Grossesse** : 1<sup>er</sup> trimestre : risque tératogène faible. 3<sup>e</sup> trimestre : risque de détresse respira-

toire du nouveau-né. **Allaitement** : à éviter, passage dans le lait.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Dose-dépendants : somnolence, difficultés de concentration, hypotonie, confusion mentale, sensations ébrieuses et parfois réactions paradoxales (excitation, irritabilité).

Syndrome de sevrage : anxiété, insomnie, tremblements, crampes. Risque de tolérance et dépendance.

Possibles hypersécrétions bronchiques (**clonazépam**), ou allergiques (rares).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool déconseillé.

À associer avec précaution :

- **carbamazépine** (avec **clonazépam**) ;
- **cimétidine**, **inhibiteurs de la pompe à protons** ;
- **phénytoïne** (avec **diazépam** et **midazolam**) ;
- inhibiteurs puissants du CYP3A4 (avec **midazolam**) : **antifongiques azolés**, **macrolides**, **inhibiteurs de protéases**, **inhibiteurs calciques**, **atorvastatine**, etc.
- inducteurs puissants du CYP3A4 (avec **midazolam**) : **rifampicine**, millepertuis, jus de pamplemousse, etc.

À prendre en compte (avec tous) : **opiacés**, **buprénorphine**, **antipsychotiques**, autres **benzodiazépines**, **barbituriques**, **antidépresseurs sédatifs**, **antihistaminiques H1** (1<sup>re</sup> génération), **antihypertenseurs centraux**, **baclofène**.



## ÉPILEPSIE (3)

### Antiépileptiques génériques

Ils peuvent être prescrits en lieu et place du médicament princeps notamment lorsque l'on débute le traitement.

Cependant, des précautions particulières doivent être prises (surveillance clinique, dosages plasmatiques) lors de la SUBSTITUTION d'un médicament princeps par son générique en raison de biodisponibilités parfois différentes.

### Épilepsies pharmaco-résistantes

Elles concernent par définition les patients (20 à 30 % des épilepsies partielles) qui continuent à faire des crises malgré un traitement médical maximal, en particulier plusieurs bithérapies après au moins 2 ans de traitement bien conduit (trithérapies à éviter car effets secondaires importants). Importance de l'évaluation en centre spécialisé.

L'ensemble des prises en charge de ces patients a fait l'objet de recommandations [1].

### En cas d'échec du traitement médical

Se poser la question du traitement chirurgical. Réalisé par des équipes neurochirurgicales spécialisées, son indication repose sur trois conditions :

- épilepsie sévère, pharmaco-résistante ;
- foyer cortical unique dont la localisation est connue (nécessitant bilan clinique, EEG, vidéo-EEG, IRM, PET-scan) ;
- foyer réséquable sans risque de séquelles importantes.

### Autres traitements

Régime cétogène (surtout chez l'enfant), stimulation du nerf vague.

Prise en charge à 100 %.

La Ligue française contre l'épilepsie (LFCE) regroupe des professionnels de l'épilepsie ([www.lfce-epilepsies.org](http://www.lfce-epilepsies.org)).

Le Bureau français de l'épilepsie (BFE) regroupe des associations de patients et des professionnels de l'épilepsie. 236, rue de Tolbiac, 75013 Paris. Tél : 01 45 80 66 64. E-mail : [secretaire.general@bfe.asso.fr](mailto:secretaire.general@bfe.asso.fr). Site internet : <http://www.bfe.asso.fr>.

### Classification des principales épilepsies

#### Épilepsies généralisées

- *Idiopathiques*
  - Épilepsie généralisée tonico-clonique
  - Épilepsie-absence de l'enfant
  - Épilepsie myoclonique juvénile
- *Symptomatiques ou cryptogéniques*
  - Syndrome de West
  - Syndrome de Lennox-Gastaut
  - Épilepsie myoclonique progressive
  - Autres encéphalopathies épileptiques

#### Épilepsies partielles

- *Idiopathiques*
  - Épilepsie à paroxysme rolandique de l'enfant
  - Épilepsie à paroxysme occipital de l'enfant
- *Symptomatiques ou cryptogéniques*

Épilepsies diverses (motrices, sensitives, sensorielles, végétatives, psychiques, etc.) d'origine tumorale, vasculaire, traumatique, etc.

## ANTIÉPILEPTIQUES (3) – VALPROATE

## ■ Acide valproïque sel de sodium

<b>DÉPAKINE</b>					
20 à 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises Relais du traitement <i>per os</i> : 20 à 30 mg/kg/j État de mal épileptique : bolus IV de 15 mg/kg en 5 min puis relais 1 mg/kg/h à adapter progressivement pour atteindre un taux sérique d'acide valproïque de 75 mg/L	40 cp. 200 mg	3,92	II	65 %	0,10
	40 cp. 500 mg	8,65	II	65 %	0,22
	8 000 mL sol. buv.	5,46	II	65 %	0,00
	200 mg/mL				
	150 mL sirop	8,39	II	65 %	0,06
	57,64 mg/mL				
	4 fl. 400 mg	HOP	II		
<b>DÉPAKINE CHRONO</b>					
20 à 30 mg/kg/j en 2 prises	30 cp. séc. 500 mg	10,37	II	65 %	0,35
	90 cp. séc. 500 mg	HOP	II		
<b>MICROPARKINE LP</b>					
Granulés <i>per os</i> Poso. initiale : 10-15 mg/kg puis 20-30 mg/kg	50 sach. 100 mg	4,00	II	65 %	0,08
	30 sach. 250 mg	8,84	II	65 %	0,29
	30 sach. 500 mg	17,12	II	65 %	0,57
	30 sach. 750 mg	25,42	II	65 %	0,85
	30 sach. 1 000 mg	33,44	II	65 %	1,11
<b>DÉPAKOTE</b>					
20 à 30 mg/kg en 2-3 prises	30 cp. 250 mg	6,87	II	65 %	0,23
	90 cp. 250 mg	HOP	II		
	90 cp. 500 mg	37,61	II	65 %	0,42

**PROPRIÉTÉS**

GABA-ergique. Résorption complète, fixation aux protéines (90 %), demi-vie de 15 à 17 h, catabolisme hépatique, élimination urinaire. Non inducteur enzymatique.

**INDICATIONS**

Épilepsie généralisée convulsivante ou non, épilepsie partielle, syndromes de West et de Lennox-Gastaut, état de mal épileptique (forme IV). Tics de l'enfant, hoquets irréductibles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hépatite aiguë ou chronique, antécédents familiaux d'hépatite sévère, notamment médicamenteuse.

Allergie au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique (transaminases, TP) initial puis mensuel (6 mois).

Adaptation de la posologie à la fonction rénale.

**Grossesse** : toutes les mesures doivent être prises pour éviter une grossesse sous **valproate**. Sa prescription est déconseillée chez une femme en âge de procréer sans contraception efficace.

**Allaitement** : possible avec contraception efficace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hépatotoxicité : élévation transitoire des transaminases (30 %), mais quelques cas d'hépatites cytolytiques mortelles. Vérifier régulièrement le bilan hépatique les 6 premiers mois.

Céphalées, tremblement d'attitude, prise de poids, alopecie transitoire, aménorrhée, troubles digestifs transitoires.

États confusionnels, encéphalopathie, hyperammonémie : notamment chez le sujet âgé, réversible lors de la diminution des doses ou à l'arrêt du traitement.

Effet tératogène : syndrome malformatif (9-15 %), spina bifida (2-3 %), autres malformations, diminutions du QI (quotient intellectuel), troubles envahissants du développement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée : **méfloquine**.

À associer avec précaution : **imipraminiques**, **phénytoïne**, **barbituriques**, **carbamazépine**, **lamotrigine**.

## ÉPILEPSIE (4)

### État de mal épileptique (EME) tonico-clonique généralisé

Il s'agit d'une urgence thérapeutique.

#### Réanimation du patient

##### ► Mise en condition

• Libération des voies aériennes supérieures :

- position latérale de sécurité ;
- ablation des prothèses dentaires ;
- canule de Guédel, aspiration ;
- si besoin : intubation oro-trachéale et ventilation assistée.

• Voie veineuse périphérique : en restriction hydrique modérée pour éviter l'œdème cérébral.

##### ► Bilan complémentaire

• Biologique : ionogramme, urée, créatinine, calcémie, glycémie, alcoolémie, recherche de toxiques, NFS, dosage des **antiépileptiques** si nécessaire.

• Radio de thorax, ECG.

##### ► Hospitalisation en unité de soins intensifs

Pour ventilation assistée (détresse respiratoire due à l'état de mal lui-même ou à la dépression respiratoire engendrée par les **antiépileptiques**) et pour surveillance continue.

#### Traitement anticomitial [2]

Attention : matériel d'intubation à proximité.

Le schéma thérapeutique est fonction de la durée des convulsions au moment de la prise en charge.

##### ► Traitement de 1<sup>re</sup> intention

• Si convulsions présentes depuis 5 min et jusqu'à 30 min :

– **Benzodiazépine**, **clonazépam (RIVOTRIL)** 0,015 mg/kg en IVL. Posologie à diminuer de moitié si âge > 80 ans. En cas d'absence d'abord veineux : **midazolam** 0,2 mg/kg IM.

– Si efficacité : hospitalisation, bilan, et traitement. Réanimation uniquement si troubles de la vigilance ou défaillance vitale associée. Traitement par **benzodiazépines** quelques jours *per os* ou IV discontinu.

– Si récurrence faire traitement indiqué ci-après.

• Si convulsions présentes depuis plus de 30 min ou durée inconnue :

– **Clonazépam (RIVOTRIL)** 0,015 mg/kg en IVL + soit **phénytoïne** ou **fosphénytoïne** 20 mg/kg en équivalent **phénytoïne** sans dépasser respectivement 50 et 150 mg/min (efficacité visible 30 min après), soit **phénobarbital** 15 mg/kg sans dépasser 100 mg/min (efficacité visible à la fin de la perfusion). Le choix des molécules se fait en fonction des contre-indications cardiaques pour la **phénytoïne** et des troubles de la vigilance pour le **phénobarbital**. L'**acide valproïque (DÉPAKINE)** 15 mg/kg IV lente (5 min) avec un relais de 1 à 4 mg/kg/h n'est indiqué que s'il y a une contre-indication aux deux produits précédents ou en cas d'EME myoclonique.

– Si succès : transfert en réanimation, surveillance, **benzodiazépines** IV discontinuées quelques jours et introduction ou adaptation d'un traitement de fond.

– Sinon traitement de 2<sup>e</sup> intention.

##### ► Traitement de 2<sup>e</sup> intention

• Inversion du traitement antiépileptique (**fosphénytoïne** ou **phénobarbital**) si EME depuis moins de 1 h, en absence de lésion cérébrale aiguë, de troubles notables des constantes vitales.

• Sinon (EME réfractaire) ; **thiopental (PEN-THOTAL)** 2 à 7 mg/kg en dose de charge puis 3 à 5 mg/kg/h, **midazolam (HYPNOVEL)** 0,1 à 0,3 mg/kg puis 0,05 mg/kg/h ou **propofol** associé à la ventilation mécanique. Surveillance EEG pour décider de la durée du traitement, sevrage progressif des **anesthésiques**.

#### Surveillance rapprochée

• Infirmière (pouls, PA, conscience toutes les 2 h) et médicale (examen neurologique et respiratoire).

• Scope.

• Gaz du sang, ionogramme, créatinine, glycémie, calcémie.

• Dosage des anticomitiaux à la 12<sup>e</sup> h puis par 24 h.

• EEG.

#### Traitement étiologique

Il est primordial. Il faut rechercher un trouble métabolique, faire un scanner cérébral, et/ou une IRM et si besoin une ponction lombaire.

## ANTIÉPILEPTIQUES (4) – ANTIGLUTAMATERGIQUE (1)

## ■ Lamotrigine

LAMICTAL					
Adulte et E. > 12 ans : 200 à 400 mg en 2 prises/j à atteindre progressivement par paliers de 25 à 50 mg tous les 15 j NB : Diminuer la dose quotidienne de moitié si association avec le <b>valproate</b> E. de 2 à 12 ans : 5 à 15 mg/kg si association avec le <b>valproate</b> E. de 2 à 12 ans en monothérapie : 0,3 à 15 mg/kg/j	30 cp. 2 mg	6,00	I	65 %	0,20
	30 cp. 5 mg	5,41	I	65 %	0,18
	30 cp. 25 mg	9,48	I	65 %	0,32
	30 cp. 50 mg	15,30	I	65 %	0,51
	30 cp. 100 mg	26,91	I	65 %	0,90
	30 cp. 200 mg	47,88	I	65 %	1,60

## PROPRIÉTÉS

Action probable au niveau des canaux calcium-dépendants et sodiques. Inhibe la libération des neuromédiateurs excitateurs, notamment le glutamate.

Absorption rapide et complète, liaison à 55 % aux protéines, demi-vie de 29 h, élimination urinaire.

## INDICATIONS

– Adultes et adolescents > 13 ans : épilepsies généralisées primaires ou secondaires et partielles en monothérapie ou en association, syndrome de Lennox Gastaut.

– Enfant de 2 à 12 ans : en monothérapie dans le traitement du petit mal épileptique (absences typiques) et en association dans les épilepsies partielles et généralisées

– Prévention des épisodes dépressifs chez les patients > 18 ans souffrant de troubles bipolaires de type I.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la substance active ou à l'un des excipients.

**Grossesse** : prescription possible quel que soit le terme. La concentration plasmatique peut diminuer en fin de grossesse.

**Allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence chez les insuffisants rénaux.

Le **valproate de sodium** diminue le métabolisme de la **lamotrigine** et augmente de façon importante le risque d'effets secondaires cutanés graves (syndrome de Lyell, etc.).

L'association au **valproate de sodium** doit être réservée aux situations cliniques qui l'imposent, lorsque le bénéfice attendu l'emporte sur le risque.

Il est indispensable de respecter les posologies initiales préconisées, d'augmenter progressivement les doses, de renforcer la surveillance cutanée et d'arrêter le traitement si besoin.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Éruptions cutanées fréquentes (10 %) avec risque plus rare de syndrome de Lyell, de Stevens-Johnson, œdème de Quincke, favorisés par des posologies trop élevées, une augmentation trop rapide des doses, l'association au **valproate**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les inducteurs enzymatiques augmentent le catabolisme de la **lamotrigine**, le **valproate** le diminue.

La contraception œstroprogestative peut réduire l'efficacité de la **lamotrigine**.

## Posologie initiale et progression à respecter

	1 <sup>re</sup> ET 2 <sup>e</sup> SEMAINES	3 <sup>e</sup> ET 4 <sup>e</sup> SEMAINES	POSOLOGIE D'ENTRETIEN
Sans <b>valproate</b>	50 mg/j en 1 prise	100 mg/j en 2 prises	200 à 400 mg/j (2 prises)
Avec <b>valproate</b>	25 mg 1 j/2	25 mg/j en 1 prise	100 à 200 mg/j (1-2 prises)

## ÉPILEPSIE ET GROSSESSE (1)

### Principes

#### En cas de désir de grossesse

La grossesse sous traitement antiépileptique est tout à fait possible, mais il faut la prévoir. L'épilepsie doit être stabilisée. Elle doit être programmée et la prise en charge doit être pluridisciplinaire, en collaboration avec le médecin traitant, le neurologue et le gynéco-obstétricien.

Avant d'envisager une grossesse chez une patiente traitée par **antiépileptique**, il faut avoir à l'esprit que :

- les crises comitiales survenant en cours de grossesse représentent un risque vital pour la mère et le fœtus ;
- tous les médicaments antiépileptiques sont potentiellement tératogènes (environ 6-8 % de malformations pour les **antiépileptiques** classiques, à comparer aux 2-3 % de la population générale).

**Il faut utiliser par conséquent si possible une monothérapie et atteindre la dose minimale efficace.**

Le **valproate** est à éviter. La **carbamazépine** est déconseillée en cas d'antécédent de spina bifida.

La surveillance du développement fœtal pendant la grossesse sera renforcée : dosage de l' $\alpha$ -foetoprotéine, échographies plus fréquentes et si besoin amniocentèse. L'allaitement est à éviter pour les nouveaux **antiépileptiques**.

#### Désir de grossesse ou femme vue au 1<sup>er</sup> trimestre

On ne change pas le traitement (surtout s'il est bien équilibré). C'est la solution la plus logique et la plus simple. On essaie si possible de baisser les posologies.

On doit éviter de débiter une grossesse sous **valproate de sodium**. Il faudra introduire un nouveau traitement avant la conception.

L'**acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** périconceptionnel n'est plus recommandé chez les femmes prenant un traitement antiépileptique, y compris ceux qui sont responsables d'anomalie du tube neural (**valproate** et **carbamazépine**). On préconise 0,4 mg/j comme dans la population générale et 5 mg/j en cas d'ATCD personnel ou familial de spina bifida à prendre 2 mois avant la conception et 2 mois après.

Pour les **nouveaux antiépileptiques (EPI-TOMAX, KEPPRA, VIMPAT, ZEBINIX, ZONEGRAN, TROBALT)** le recul et les données cliniques sont insuffisants. Le désir d'une grossesse est l'occasion de peser de nouveau l'indication de chaque **antiépileptique** et de sa dose journalière.

#### Femme vue en cours de grossesse (2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> trimestre)

Ne pas changer le traitement en cours.

#### Mesures associées

- **Vitamine K : VITAMINE K1 ROCHE** 10 mg/j *per os* les 15 derniers j de la grossesse. Pour le nouveau-né : 0,5 à 1 mg IM ou IVL à la naissance (pour le **phénobarbital**, la **phénytoïne** et la **carbamazépine**).
- **Vitamine D : STÉROGYL** IV gtt/j à partir du 5<sup>e</sup> mois à la mère (pour le **phénobarbital** et la **phénytoïne**).

#### Surveillance

On surveille :

- l'absence de crise comitiale clinique ou infraclinique (EEG) ;
- l'observance du traitement ;
- le déroulement de la grossesse et le développement fœtal.

Les principales complications des traitements antiépileptiques au cours de la grossesse et la conduite à tenir sont résumées dans le tableau suivant.

### CONSENSUS

[1] Épilepsies graves, HAS, 2007

[2] Prise en charge de l'état de mal tonico-clonique généralisé : stratégies thérapeutiques, SRLF, 2008

## ANTIÉPILEPTIQUES (5) – ANTIGLUTAMATERGIQUE (2)

## ■ Topiramate

EPITOMAX					
A. : 200 à 600 mg/j en 2 prises	28 gél. 15 mg	11,60	I	65 %	0,41
E. : 5 à 9 mg/kg/j en 2 prises	28 gél. 25 mg	8,00	I	65 %	0,29
Atteindre progressivement les doses minimales efficaces	28 gél. 50 mg	10,51	I	65 %	0,38
Migraine : 20 à 100 mg/j en 2 prises	28 cp. 50 mg	10,51	I	65 %	0,38
	28 cp. 100 mg	20,46	I	65 %	0,73
	28 cp. 200 mg	39,31	II	65 %	1,40

## PROPRIÉTÉS

Nouvel antiépileptique classé comme monosaccharide sulfamate-substitué. Le **topiramate** diminue la fréquence à laquelle les potentiels d'action sont générés lorsque les neurones sont soumis à une dépolarisation soutenue, augmente la fréquence d'activation des récepteurs GABA-A par le GABA, antagonise faiblement l'activité excitatrice du glutamate sur les récepteurs AMPA.

En outre, le **topiramate** inhibe certaines enzymes de l'anhydrase carbonique.

Le  $T_{max}$  est atteint en 3,7 h. La demi-vie d'élimination est de 21 h, avec une élimination essentiellement rénale et un faible métabolisme hépatique (20 %).

## INDICATIONS

En association aux autres **antiépileptiques** lorsque ceux-ci sont insuffisamment efficaces chez l'enfant > 2 ans et l'adulte :

- épilepsies généralisées tonico-cloniques
- épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire.

L'efficacité du **topiramate** n'a pas été démontrée dans les absences.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Hypersensibilité aux **sulfamides**.

**Grossesse et allaitement** : pas de données cliniques suffisantes à l'heure actuelle. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour tous les **antiépileptiques** :

- risque de somnolence nécessitant des précautions en cas de conduite ou d'utilisation de machines ;

– risque de rebond à l'arrêt brutal du traitement.

Particularités du **topiramate** :

- adapter les doses à la fonction rénale. Le **topiramate** est éliminé par hémodialyse ;
- en raison du risque de fausses routes, les cp. ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans ;
- en raison de son activité inhibitrice de l'anhydrase carbonique, le risque de calculs rénaux est augmenté chez les patients prédisposés ;
- une perte de poids ou l'absence de prise de poids chez des enfants en période de croissance a été observée. Il convient donc de surveiller la courbe de poids chez l'enfant.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Étourdissements, ataxie, troubles de l'équilibre, ralentissement psychomoteur, troubles du langage, somnolence, difficultés de mémorisation, confusion mentale, troubles de l'humeur.

Diplopie, nystagmus.

Fatigue, perte de poids, asthénie, anorexie.

Des cas isolés d'événements thromboemboliques ont été décrits sans que la relation directe avec la prise du **topiramate** soit établie. Chez l'enfant : perte de poids ou absence de prise de poids, lymphocytose et plus rarement leucopénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les taux plasmatiques des autres **antiépileptiques** ne sont pas modifiés sauf occasionnellement chez certains patients traités par la **phénytoïne** dont les taux plasmatiques peuvent augmenter.

La **phénytoïne** et la **carbamazépine** diminuent les taux plasmatiques du **topiramate**.

Risque de diminution de l'efficacité contraceptive des **contraceptifs oraux** par diminution des concentrations en œstrogènes.

## ÉPILEPSIE ET GROSSESSE (2)

TRAITEMENT	COMPLICATIONS	CONDUITE À TENIR
<b>Acide valproïque DÉPAKINE</b> À ÉVITER	Malformations : 9-15 % dont anomalies de fermeture du tube neural (2-3 %), fente labiale, dysmorphie, malformation urogénitale, diminution du QI, trouble envahissant du développement Risque de syndrome hémorragique chez le nouveau-né (non par déficit en vitamine K, contrairement aux inhibiteurs enzymatiques)	Surveillance échographique, dosage de l' $\alpha$ -foetoprotéine, parfois amniocentèse. TCA, plaquettes, fibrinogène : - chez la mère avant l'accouchement, - à la naissance, chez le nouveau-né.
<b>Phénobarbital GARDÉNAL</b>	Risque de diminution des taux en fin de grossesse Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né Syndrome de sevrage à la naissance	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance Allaitement conseillé, ou <b>phénobarbital</b> à petites doses chez le nouveau-né.
<b>Phénytoïne DIHYDAN</b>	Risque faible, en cas d'administration au 1 <sup>er</sup> trimestre, d'un syndrome particulier dont ni la fréquence ni la réalité ne sont prouvées : anomalie craniofaciale, hypoplasie des phalanges distales, RCIU, retard psychomoteur Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	Éviter la <b>phénytoïne</b> au 1 <sup>er</sup> trimestre. Doses minimales efficaces si ce traitement est indispensable (voir <b>phénobarbital</b> ).
<b>Carbamazépine TÉGRÉTOL</b>	Possible augmentation des anomalies de fermeture du tube neural À éviter si ATCD de spina bifida Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance
<b>Oxcarbazépine TRILEPTAL</b>	Taux de malformation faible et risque de diminution du taux en cours de grossesse Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance
<b>Lamotrigine LAMICTAL</b>	Risque malformatif faible Risque de diminution du taux en fin de grossesse	Surveillance clinique particulièrement en fin de grossesse car baisse des taux sériques En post-partum : nécessité de diminuer la posologie si elle a été augmentée en fin de grossesse Allaitement déconseillé
<b>Topiramate ÉPITOMAX</b>	Fentes labiales et malformations cardiovasculaires	
<b>Lévétiracétam KEPPRA</b>	Peu de complications décrites	Surveillance clinique car risque de baisse de la concentration plasmatique au 3 <sup>e</sup> trimestre Allaitement contre-indiqué
<b>Zonisamide ZONEGRAN</b>	Fentes labiales et malformations cardiovasculaires et anomalies du tube neural	Si allaitement le débiter 1 mois après l'arrêt du <b>zonisamide</b>

## MÉNINGITES PURULENTES DE L'ADULTE (1)

Il s'agit d'une urgence thérapeutique absolue.

### Règles générales

Hospitalisation immédiate.

### Cas particulier du purpura fulminans [1]

En dehors du milieu hospitalier, tout malade présentant des signes infectieux avec à l'examen clinique, pratiqué chez un sujet totalement dénudé, la présence d'un purpura ne s'effaçant pas à la vitropression et comportant au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre  $\geq 3$  mm, doit immédiatement recevoir une 1<sup>re</sup> dose d'un traitement antibiotique approprié aux infections à méningocoques (ceftriaxone 50 à 100 mg/kg ou céfotaxime chez le nourrisson et l'enfant et 1 à 2 g chez l'adulte), si possible par voie IV sinon IM, et quel que soit son état hémodynamique. Intervention d'un SMUR justifiée sous réserve que son délai d'intervention soit  $< 20$  min, sinon transfert le plus rapide possible en ayant prévenu les urgences de l'hôpital.

### Antibiothérapie

Précoce, dès la suspicion du diagnostic, après la ponction lombaire.  
Probabiliste en fonction du germe suspecté.

Par voie intraveineuse, bactéricide, à fortes doses et bonne diffusion dans le LCR.  
Adaptée secondairement au germe et à l'antibiogramme et à la CMI des antibiotiques dans le LCR.

### Traitement de la porte d'entrée

À ne pas oublier, notamment pour les méningites à pneumocoques : réparation d'une brèche ostéoméningée, drainage d'une sinusite, etc.

### Mesures générales

- Voie veineuse périphérique : assurer une bonne hémodynamique et une bonne ventilation.
  - Surveillance et traitement d'une hyponatrémie (SIADH), de la fièvre, de l'hyperglycémie ( $> 1,5$  g/L).
  - Prévention des complications de décu-bitus.
  - Injection de **dexaméthasone** IV chez l'adulte : 10 mg/6 h pendant 4 j, chez l'enfant : 0,15 mg/kg /6 h pendant 4 j. Avant ou de façon concomitante à la première injection d'antibiotique si :
    - diagnostic de méningite à pneumocoque ou à méningocoque chez l'adulte ou de méningite à pneumocoque ou à *H. Influenzae* chez l'enfant et le nourrisson de 3 à 12 mois;
    - diagnostic présumé de méningite bactérienne sans certitude microbiologique mais décision de traitement probabiliste par **antibiotique** chez l'adulte et le nourrisson de 3 à 12 mois car : imagerie cérébrale qui retarde la PL, LCR trouble, examen direct négatif mais autres examens biologiques LCR et sang permettent de retenir le diagnostic de méningite bactérienne.
- Traitement contre-indiqué si le patient est immunodéprimé.



**MÉNINGITES PURULENTES DE L'ADULTE (2)****Traitement spécifique [2]****En première intention**► *Si l'examen direct est positif*

- Si cocci Gram+ (suspicion de pneumocoque) : **céfotaxime (CLAFORAN)** 300 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h, ou **ceftriaxone** 100 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions. En cas d'allergie aux **bêta-lactamines**, association **vancomycine** 15 mg/kg sur 1 h en dose de charge puis 60 mg/kg/j en administration continue + **fosfomycine** 100 à 200 mg/kg/j IV  $\pm$  **rifampicine** 10 mg/kg/12 h.

- Si cocci Gram- (suspicion de méningocoque) : **céfotaxime (CLAFORAN)** 200 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h, ou **ceftriaxone** 75 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions. En cas d'allergie aux **bêta-lactamines** : **rifampicine** 10 mg/kg/12 h.

- Si bacille Gram+ (suspicion de listériose) : **amoxicilline** 200 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue + **gentamicine** 3 à 5 mg/kg/j en 1 perfusion quotidienne de 30 min. En cas d'allergie aux **bêta-lactamines**, monothérapie par **triméthoprime-sulfaméthoxazole** : 6-8 et 30-40 mg/kg/j respectivement.

- Si bacille Gram- (suspicion d'*H. influenzae* ou d'*E. coli* si moins de 3 mois) : **céfotaxime (CLAFORAN)** 200 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h, ou **ceftriaxone** 75 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions. Chez l'enfant de moins de 3 mois, on rajoute **gentamicine** 3 à 5 mg/kg/j en 1 perfusion quotidienne.

► *Si l'examen direct est négatif*

- Sans arguments en faveur d'une listériose : **céfotaxime (CLAFORAN)** 300 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h, ou **ceftriaxone** 100 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions. Chez l'enfant de moins de 3 mois, on rajoute **gentamicine** 3 à 5 mg/kg/j en 1 perfusion quotidienne.

- Avec arguments pour une listériose (terrain, apparition progressive de la symptomatologie, atteinte rhombencéphalique) : **céfotaxime (CLAFORAN)** 300 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h, ou **ceftriaxone** 100 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions + **amoxicilline** 200 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue + **gentamicine** 3 à 5 mg/kg/j en 1 perfusion quotidienne.

## MÉNINGITES PURULENTES DE L'ADULTE (3)

### Adaptation secondaire au germe [2]

#### ► Méningocoque

- Si CMI amoxicilline < 0,1 mg/L : amoxicilline (**CLAMOXYL**) 200 mg/kg/j.
- Si CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/L : céfotaxime (**CLAFORAN**) 200 mg/kg/j soit en 4 perfusions, soit en perfusion continue, ou ceftriaxone (**ROCÉPHINE**) 75 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions.

Durée du traitement : 4 à 7 j.

#### ► Pneumocoque

- Si CMI amoxicilline < 0,1 mg/L : de préférence amoxicilline 200 mg/kg/j ou maintien céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération en diminuant la dose de céfotaxime à 200 mg/kg/j, de ceftriaxone à 75 mg/kg/j (si CMI de la céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération < 0,5 mg/L).
- Si CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/L : céfotaxime 300 mg/kg/j (ou 200 mg/kg/j si CMI céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération < 0,5 mg/L), ou ceftriaxone 100 mg/kg/j IV en 1 ou 2 perfusions (ou 75 mg/kg/j si CMI céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération < 0,5 mg/L).

Durée du traitement : 10 à 14 j.

L'adjonction de **vancomycine** n'est actuellement plus justifiée mais n'est pas contre-indiquée chez l'enfant [2].

#### ► *Haemophilus influenzae*

**Céfotaxime** 200 mg/kg/j ou **ceftriaxone** pendant 7 j.

#### ► *Listeria monocytogenes*

**Amoxicilline** 200 mg/kg/j pendant 21 j + **aminoside**, **gentamicine** 3 à 5 mg/kg /j les 7 premiers j.

#### ► Bacille Gram négatif

**Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération ± aminoside** pendant 48 h pour le nourrisson < 3 mois à adapter au germe, pendant 3 à 4 sem.

#### ► *Staphylocoque* (pendant 3-4 sem.)

- *S. aureus* méti-S : **céfotaxime** + **fosfomycine**.
- *S. aureus* méti-R : **vancomycine**.
- *S. epidermidis* : **vancomycine**.

### Traitement des complications neurologiques

- HTIC sévère : traitement par **mannitol** en bolus unique. Dérivation ventriculaire en cas d'hydrocéphalie aiguë.
- Évacuation chirurgicale d'un abcès ou d'un empyème sous-dural.
- **Anticoagulants** en cas de thrombophlébite cérébrale.
- **Antiépileptiques** en cas de convulsions.

### CONSENSUS

[1] Conduite à tenir immédiate en cas de suspicion clinique de purpura fulminans, *CSHPP*, 2006

[2] Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l'exclusion du nouveau-né), *SPILF*, 2008

## MÉNINGITES À LIQUIDE CLAIR

### Méningites bactériennes décapitées

Il faut y penser. Même traitement que pour les méningites purulentes.

### Encéphalite herpétique

#### Urgence diagnostique et thérapeutique

Toute confusion fébrile chez un adulte jeune doit faire évoquer le diagnostic. Traitement urgent : les séquelles dépendent de la précocité de la mise en route du traitement.

### Hospitalisation en unité de soins intensifs

- Préserver les fonctions vitales.
- Lutte contre l'œdème cérébral (cf. HTIC).

### Antiviral

Dès la suspicion du diagnostic, sans attendre les résultats définitifs de la ponction lombaire : **aciclovir (ZOVIRAX)** 10 mg/kg/ 8 h en IV lente pendant 3 sem.

### Anticomitiaux systématiques

**Clonazépam (RIVOTRIL)**  $\pm$  1/2 à 1 amp. en cas de crise.

**Oxcarbazépine** ou **gabapentine** par exemple

### Traitement spécifique des autres causes de méningites à liquide clair

#### Listériose neuroméningée

Attention : *Listeria monocytogenes* est résistant aux **céphalosporines** et aux **fluoroquinolones**.

**Amoxicilline (CLAMOXYL)** IV 200 mg/kg/j pendant 21 j associée à **gentamicine** IV 3 à 5 mg/kg/j les 7 premiers j.

#### Méningite tuberculeuse

- **Isoniazide** + **rifampicine** + **éthambutol** + **pyrazinamide** pendant 2 mois, puis **isoniazide** + **rifampicine** pendant 10 mois.

- Corticothérapie : **prednisone** 1 mg/kg/j à discuter au début dans les formes graves.

### Maladie de Lyme

- **Amoxicilline (CLAMOXYL)** 3 g/j *per os* pendant 21 j dans les formes mineures.
- **Ceftriaxone (ROCEPHINE)** 2 g/j IV ou IM pendant 21 à 28 j dans les formes sévères.

### Leptospirose

Si le traitement est précoce : **doxycycline** 200 mg/j.

Sinon **amoxicilline** 100 mg/kg/j IV ou **ceftriaxone** 1 g/j ; durée 7 à 10 j.

### Syphilis secondaire et tertiaire

- **Pénicilline G** 20 MUI/j IV ou IM pendant 3 sem.
- Corticothérapie brève au début du traitement en prévention de la réaction d'Herxheimer.

### Brucellose

**Doxycycline (VIBRAMYCINE N)** 200 mg/j en 2 prises + **rifampicine (RIFADINE)** 15 mg/kg/j en 1 prise le matin pendant 6 sem.

### Méningoencéphalites parasitaires

- Accès pernicieux palustre : toujours y penser. **Quinine** IV 25 mg/kg/j répartis en 3 perfusions à passer en 4 h ou IVSE. Durée du traitement : 7 j.
- Méningite à cryptocoque : **amphotéricine B** IV puis relais par **fluconazole (TRIFLUCAN)** *per os* 400-800 mg/j 6 sem. puis 200 à 400 mg/j (cf. Cryptococcose).

### Méningites virales bénignes

L'évolution est favorable en 2-3 j. Le traitement est purement symptomatique. Il s'agit d'un diagnostic d'élimination.

## MÉNINGITES PURULENTES DE L'ENFANT

Les particularités du traitement viennent du fait que la fréquence des germes en cause dépend de l'âge de survenue de la méningite.

Dans tous les cas, il s'agit d'une urgence thérapeutique, l'antibiothérapie devant être mise en route précocement, dès la suspicion du diagnostic.

### Antibiothérapie de 1<sup>re</sup> intention

#### Âge < 3 mois

Les germes les plus fréquents sont : streptocoque B, *Listeria monocytogenes* et entérobactéries. On associe systématiquement :

**amoxicilline (CLAMOXYL)** 200 mg/kg/j IV  
+ **céfotaxime (CLAFORAN)** 200 mg/kg/j  
+ **gentamicine (GENTALLINE)** 3 mg/kg/j.  
Contrôle du LCR 24 h après. Traitement pendant 15 j à 3 sem.

#### Entre 3 mois et 6 ans

Les germes les plus fréquents sont : pneumocoque, *H. influenzae* et méningocoque. On préfère les **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** en raison de l'existence de souches de pneumocoques résistantes à la **pénicilline**.

#### Âge > 6 ans

Le germe le plus fréquent est le méningocoque. Comme chez l'adulte jeune, on utilise en 1<sup>re</sup> intention : **céfotaxime** 200 mg/kg/j en 4-6 IVL ou **ceftriaxone**.

### Adaptation secondaire au germe

Comme chez l'adulte.

- Méningocoque : **céfotaxime** pendant 4 à 7 j.
- Pneumocoque : **amoxicilline**, ou **céfotaxime** pendant 10 à 14 j.
- *H. influenzae* : **céfotaxime** pendant 7 j.

### Corticothérapie [1]

Injection de **dexaméthasone** IV 0,15 mg/kg/6 h pendant 4 j.

Avant ou de façon concomitante à la première injection d'antibiotique si :

- diagnostic de méningite à pneumocoque ou à *H. Influenzae* chez l'enfant et le nourrisson de 3 à 12 mois;
- diagnostic présumé de méningite bactérienne sans certitude microbiologique mais décision de traitement probabiliste par antibiotique chez le nourrisson de 3 à 12 mois car : imagerie cérébrale qui retarde la PL, LCR trouble, examen direct négatif mais autres examens biologiques (LCR et sang) permettent de retenir le diagnostic de méningite bactérienne.

Traitement contre-indiqué si le patient est immunodéprimé.

Semble en effet diminuer les risques de séquelles, notamment auditives, si administrée précocement.

### Prophylaxie

Elle est particulièrement importante dans les établissements scolaires.

## CONSENSUS

[1] Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l'exclusion du nouveau-né), *SPLF*, 2008

## MÉNINGITES

### Prophylaxie

La prophylaxie s'adresse aux sujets en contact avec le malade 10 j avant l'hospitalisation.

Dans les établissements scolaires elle s'applique à toute la classe si sont apparus 2 cas en moins de 6 mois, tout l'établissement si sont apparus au moins 3 cas dans 2 classes différentes en moins de 6 mois.

### Méningite à méningocoque

#### Mesures générales

Maladie à déclaration obligatoire, isolement du malade.

#### Vaccination antiméningococcique

Pas de vaccin pour le groupe B.

**Vaccin tétravalent A/C/Y/W135 (MENGEVAX)** si contact avec cas de méningite à méningocoque Y ou W135.

### VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE POLYOSIDIQUE A + C.

**Vaccin antiméningococcique C conjugué (MENINGITEC, NEISVAC).**

La vaccination doit être recommandée dans un délai maximum de 10 j après le début de l'hospitalisation du malade parallèlement à la chimioprophylaxie. Réservée aux sujets-contacts de l'entourage proche du malade et les contacts d'une collectivité éventuellement fréquentée par le malade.

L'immunité apparaît à partir du 10<sup>e</sup> j et dure environ 4 ans.

#### Chimioprophylaxie

Si possible, dans les 24 à 48 h suivant le diagnostic.

Pour les sujets-contacts.

Les modalités sont les suivantes :

En première intention : <b>rifampicine (RIFADINE)</b>	Adulte Autorisée chez la femme enceinte	1 200 mg/j en 2 prises <i>per os</i>	Pendant 2 j
	Nourrisson et enfant (de 1 mois à 15 ans)	20 mg/kg/j en 2 prises <i>per os</i>	Pendant 2 j
	NN (< 1 mois)	10 mg/kg/j en 2 prises <i>per os</i>	Pendant 2 j
Si allergie ou contre-indication		6 MUI/j en 2 prises <i>per os</i>	Pendant 5 j
		150 000 MUI/j en 2 prises <i>per os</i>	Pendant 5 j
<b>Ceftriaxone</b> injectable <b>(ROCEPHINE)</b>	Adulte Nourrisson et enfant NN	250 mg 125 mg Avis spécialisé	Dose unique Dose unique
<b>Ciprofloxacine (CIFLOX)</b>	Adulte Autorisée chez la femme enceinte	500 mg	Dose unique

### Méningite à pneumocoques

Vaccination des sujets à risques : splénectomie, drépanocytose homozygote, brèche ostéoméningée, bronchite chronique.

**PNEUMO 23** : 1 injection SC ou IM à renouveler tous les 5 ans.

### Méningite à *Haemophilus influenzae*

• Vaccination systématique chez le nourrisson.

• Traitement des sujets-contacts non vaccinés, enfants et adultes, dans les collectivités abritant des enfants de moins de 2 ans et dans les familles où il y a des enfants de moins de 4 ans : par **rifampicine (RIFADINE)** 20 mg/kg/j pendant 4 j (dès l'âge de 1 mois).

## MIGRAINE (1)

On distingue deux types de migraines :

- *sans aura*, les plus fréquentes, qui se manifestent par une céphalée spontanément résolutive (80 à 90 % des migraines) ;
- et *avec aura*, caractérisées par des symptômes neurologiques précédant la céphalée qui peut parfois manquer.

### Traitement de la crise

Le traitement de la crise migraineuse doit se faire dès l'apparition des premiers symptômes.

Quatre types de médicaments peuvent être utilisés : les **antalgiques**, les **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, les **dérivés de l'ergot de seigle** peu utilisés actuellement, et les **agonistes des récepteurs sérotoninergiques 5HT<sub>1</sub>**.

Le choix se fera en fonction de la présence ou non de vomissements, de l'efficacité antérieure, des contre-indications, de la tolérance et du coût du médicament.

### Traitements médicamenteux

#### • Antalgiques :

– **paracétamol (DOLIPRANE)** 500 mg 2 cp. renouvelable jusqu'à 6/j, possible pendant la grossesse

– ou **paracétamol + codéine (EFFERALGAN CODÉINÉ)** 500 mg 2 cp. efferv. renouvelable jusqu'à 6/j.

Prévenir le patient du risque de surdosage en paracétamol.

#### • Anti-inflammatoires, à débiter dès l'apparition de l'aura migraineuse :

– **aspirine (ASPÉGIC)** 1 g *per os* renouvelable 1 fois ;

– ou **aspirine + métoclopramide (MIGPRIV)** 900 mg/10 mg renouvelable 1 fois ;

– ou **kétoprofène, BI-PROFÉNID** cp. à 150 mg : 1/2 à 1 cp. à renouveler si efficacité partielle 12 h plus tard au moins. Max. 2 cp./j (AMM).

• **Agonistes sérotoninergiques 5HT<sub>1</sub>** : à utiliser en cas d'échec des médicaments précédents lors de crises antérieures, après l'aura migraineuse et dès le début des céphalées en absence d'aura. On utilisera par exemple :

– **élétriptan (RELPAK)** : 1 cp. de 40 mg si efficacité partielle 2 h plus tard au minimum. Si l'amélioration n'est que partielle lors de plusieurs crises, on peut proposer la prise de 2 cp. à 40 mg d'emblée sans renouvellement ultérieur possible ;

– **almotriptan (ALMOGRAN)** : 1 cp. de 12,5 mg à renouveler si efficacité partielle 2 h plus tard (sans dépasser 2 cp./24 h).

Avant de conclure à l'inefficacité d'un **triptan**, il est recommandé de le tester sur au moins 3 crises. Un patient non répondeur à un **triptan** peut répondre à un autre. La prise précoce de **triptan** au stade de céphalée légère est plus efficace que si l'on attend le stade de céphalée modérée à sévère. Éventuellement, en cas d'efficacité partielle de l'**AINS** et du **triptan**, pris individuellement, l'association peut être proposée.

#### • Dérivés de l'ergot de seigle, en cas de contre-indication des **triptans** :

– **ergotamine + caféine (GYNERGÈNE CAFÉINÉ)** 2 cp. à 1 mg renouvelables 30 min plus tard (max. 4 mg/j et 10 mg/sem.) ;

– ou **dihydroergotamine (DIERGOSPRAY)** 1 pulv. dans chaque narine (max. 4 pulv./j).

### Mesures associées

• Repos au lit, dans le noir et au calme.

• **Antémétiques**, par exemple **métoclopramide (PRIMPÉRAN)** 1 à 2 sup./24 h.

• **Anxiolytiques.**

### Traitement de fond

**Indication** : plus de 3 crises/mois, ou retentissement sur la vie professionnelle ou sociale du patient.

Certains médicaments ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement de fond de la migraine. Ils doivent être utilisés en monothérapie, choisis en fonction de leurs contre-indications et des effets secondaires. Ils ont tous une efficacité d'environ 70 %.

En cas de désir de grossesse, on essaiera de diminuer le traitement de fond ou de ne pas en instituer.

## ANTIMIGRAINEUX (1) – DÉRIVÉS DE L'ERGOT DE SEIGLE (TRAITEMENT DE LA CRISE)

### ■ Dihydroergotamine pernasale

<b>DIERGOSPRAY</b>					
1 pulv. dans chaque narine (jusqu'à 4 pulv./j)	1 fl. 4 mg/mL	5,17	II	30 %	5,17

### ■ Dihydroergotamine injectable

<b>DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM</b>					
1 inj. IV/IM/SC à renouveler 1 fois si néc. après 30 min	2 amp. 1 mL (1 mg/mL)	5,17	II	30 %	2,59

### ■ Ergotamine tartrate

<b>GYNERGÈNE CAFÉINÉ</b>					
2 cp. renouvelable 1 fois	20 cp. 1 mg	3,27	I	30 %	0,16

#### PROPRIÉTÉS

Vasoconstricteur artériel ayant des effets identiques à ceux de l'ergotamine : antagoniste sérotoninergique 5HT<sub>2</sub>, mais à fortes doses effet agoniste partiel b-adrénergique et effet sérotoninergique.

Parfois associé à un stimulant du système nerveux central (**caféine**) : **GYNERGÈNE CAFÉINÉ**.

En général bonne résorption par voie nasale ou injectable, mais plus faible par voie orale (effet de premier passage hépatique important). Élimination biphasique par voie biliaire et fécale.

#### INDICATIONS

Traitement de la crise migraineuse.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Maladies cardiovasculaires quels qu'en soient le siège ou la cause : artériopathies oblitérantes, insuffisance coronarienne, syndrome de Raynaud, HTA, artérite cérébrale, thyrotoxicose.

**Grossesse et allaitement**, enfants de moins de 10 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doses maximales : 4 mg/j et 10 mg/sem. La survenue de paresthésies (fourmillements, etc.), de phénomènes douloureux ou de vasoconstriction des extrémités, même aux doses usuelles, impose l'arrêt du traitement (risque d'ergotisme aigu).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : épigastralgies, nausées. Voie parentérale : paresthésies des extrémités, précordialgies.

Pour le **tartrate d'ergotamine** : possibilité de dépendance avec céphalées de rebond si utilisation pendant plus de 2 j/sem. ou au-delà des doses préconisées.

*Ergotisme* : cf. Ergotisme aigu.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **sumatriptan**, **macrolides** (sauf **spiramycine**) car risque d'ergotisme.

Associations déconseillées : **bromocriptine**, **méthylergométrine**.

## MIGRAINE (2)

### Correction des facteurs déclenchants

Ces facteurs sont : psychologiques, alimentaires (alcool, chocolat, fromage), sensoriels (bruit, lumière), climatiques, sommeil prolongé, tabac, efforts physiques violents, etc.

### Traitement médicamenteux

L'efficacité est jugée après 3 mois de traitement après examen de l'agenda des crises remis au patient lors de la 1<sup>re</sup> consultation. Si le médicament est efficace (réduction de la fréquence des crises d'au moins 50 %), on maintient le même traitement encore 3 à 6 mois puis on réduit progressivement jusqu'à arrêt si possible ou, si impossible, on réduit alors les doses jusqu'à la dose minimale efficace. Sinon on propose un autre traitement.

#### • $\beta$ -bloquants :

– **propranolol (AVLOCARDYL)** 40 à 120 mg/j en l'absence de contre-indication : généralement bien toléré, il est volontiers prescrit chez les patients(es) « neurotoniques » ;  
– autres  $\beta$ -bloquants : **SELOKEN (AMM)** pour la dose 200 mg LP. Commencer par 1/4 ou 1/2 cp

• **Amitriptyline** : **LAROXYL** cp. à 25 mg x 1/j ou IV à XX gtt/j, notamment si la migraine est associée à un syndrome dépressif.

• **Topiramate** : **EPITOMAX** gél. à 25 et 50 mg et cp. à 50 mg. Débuter par 25 mg le soir pendant 1 sem. puis augmenter progressivement si besoin jusqu'à 100 mg/24 h en 2 prises. Prévenir le patient des effets indésirables et en particulier l'amaigrissement.

• **Aspirine** : dose variable (300 à 500 mg/j) dans le traitement des migraines avec aura fréquentes.

Plus rarement on proposera :

• **Valproate de sodium (DÉPAKINE)** : pas

d'AMM. Posologie entre 500 et 1 000 mg/j.

• **Pizotifène** : **SANMIGRAN** cp. à 0,5 mg 2 à 3 cp. en une prise le soir. Risque de prise de poids.

• **Oxérotone** : **NOCERTONE** cp. à 60 mg 2 à 3 cp./j en une prise le soir. Risque de somnolence, diarrhée.

• **Inhibiteur calcique** : **flunarizine (SIBÉLIUM)** 1 cp. le soir au coucher. En cas d'échec des autres traitements. Pas plus de 6 mois car risque de syndrome extrapyramidal.

• **AINS** : pas d'AMM.

• **Inhibiteur calcique** : **vérapamil (ISOPTINE)** cp. à 40 mg et gél. à 120 mg. 240 à 320 mg/j hors AMM.

### Autres traitements

• Relaxation, biofeedback et gestion du stress. Intéressant en particulier chez l'enfant et pendant la grossesse.

• Acupuncture.

### Cas particulier : migraine cataméniale

Attention : ce traitement ne s'adresse qu'aux migraines cataméniales **pures** (crise survenant exclusivement dans les 48 h précédant les règles) et si le traitement de la crise n'est pas efficace. Ce traitement est **limité à la période menstruelle** ; de J-2 à J+5 après les règles ou hémorragie de privation.

• **17- $\beta$ -estradiol (OESTRODOSE)** percutané, 1,5 mg/j pendant les règles (hors AMM).

• Certains **triptans** peuvent être utilisés de façon préventive et séquentielle : **frovatripran** 2,5 mg x 2/j, **naratriptan** 1 mg x 2/j, **zolmitriptan** 2,5 mg x 2/j (pas d'AMM spécifique).

• Pour les patientes ayant une contraception orale la prévention des crises menstruelles peut être réalisée par l'utilisation d'un œstroprogestatif en continu ou par celle d'un progestatif pur.



## ANTIMIGRAINEUX (2) – DÉRIVÉS DES TRICYCLIQUES

## ■ Pizotifène

SANMIGRAN					
Atteindre progressivement 2 à 3 cp./j (max. : 6 cp./j)	50 cp. 0,5 mg	6,44	II	30 %	0,13
	100 cp. 0,5 mg	11,29	II	30 %	0,11

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé des tricycliques. Antisérotoninergique, antihistaminique et faiblement anticholinergique. Léger effet antidépresseur.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la migraine.

**CONTRE-INDICATIONS**

Glaucome par fermeture de l'angle et rétention urinaire liée à des troubles uréthroprostatiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : à éviter au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** : déconseillé.

Risque de somnolence chez les conducteurs de véhicules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence, prise de poids. Rarement nausées, vertiges, douleurs musculaires.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations à éviter : **atropine** et autres substances atropiniques ; autres déprimeurs du SNC (**barbituriques, benzodiazépines, clonidine, hypnotiques**, etc.).

Alcool : majoration de l'effet sédatif.

## ■ Oxérotone

NOCERTONE					
1 à 2 cp. x 2/j	30 cp. séc. 60 mg	5,35	II	30 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Activité antisérotoninergique, antihistaminique et antiémétique.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la migraine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prise d'alcool fortement déconseillée.

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

Risque de somnolence chez les conducteurs de véhicules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence en début de traitement.

Rares diarrhées cédant à l'arrêt du traitement.

## MIGRAINE (3)

### Contraception orale et migraine

Il faut être prudent pour la prescription d'une pilule œstrogénique chez les femmes présentant des migraines avec auras fréquentes, particulièrement lorsqu'il existe un tabagisme associé. Il faut dans ce cas privilégier une contraception orale purement progestative ou un autre moyen contraceptif.

Il faut arrêter la pilule en cas de céphalées

inhabituelles, de migraines plus intenses ou plus fréquentes, ou d'apparition d'auras ou encore d'auras plus fréquentes.

### Grossesse et allaitement

Le problème du traitement de fond se pose rarement pendant la grossesse car le plus souvent la migraine s'améliore. On privilégiera avant tout les méthodes non médicamenteuses.

### Possibilités d'utilisation des antimigraineux pendant la grossesse et l'allaitement

Traitement	Grossesse	Allaitement
<b>Traitement de crise</b>		
<b>Paracétamol</b>	Possible	Possible
<b>Aspirine et AINS</b>	Possibles jusqu'au 6 <sup>e</sup> mois et interdits après 24 SA	Déconseillés
<b>Codéine</b>	À éviter	Contre-indiquée
<b>Ergotés</b>	Contre-indiqués	Contre-indiqués
<b>Triptans</b>	À éviter. Pas d'effet tératogène rapporté.	À éviter dans les 24 h suivant la prise
<b>Traitement de fond</b>		
<b>Bêtabloquant</b>	Possible. À arrêter 1 mois avant l'accouchement, progressivement.	Déconseillés
<b>Amitriptyline</b>	Risque tératogène faible. À arrêter 1 mois avant l'accouchement, progressivement.	Déconseillée
<b>Pizotifène</b>	Peu ou pas de données	Déconseillé
<b>Oxétorone</b>	Déconseillé	Déconseillée
<b>Flunarizine</b>	Déconseillé	Déconseillée
<b>Valproate de sodium</b>	Tératogénicité possible	Déconseillé
<b>Topiramate</b>	Déconseillé	Déconseillé

ANTIMIGRAINEUX (3) – AGONISTES SÉROTONINERGIQUES 5HT<sub>1</sub> (1)

## ■ Sumatriptan

<b>IMIGRANE</b>					
1 inj. SC par crise Max. 2 inj. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 1 h entre 2 inj. 1 cp. 50 mg par crise Max. 300 mg par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 2 h entre 2 prises 1 pulv. dans 1 seule narine par crise Max. 2 pulv. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 2 h entre 2 pulv.	2 ser. 6 mg		I	NR	
	2 ser. 6 mg + injecteur		I	NR	
	6 cp. 50 mg	20,02	I	65 %	3,34
	2 amp. 10 mg/0,1 mL pulv. nas.	10,53	I	65 %	5,27
	6 amp. 20 mg/0,1 mL pulv. nas.	28,97		65 %	4,83
<b>IMUJECT</b>					
1 inj. SC par crise Max. 2 inj. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 1 h entre 2 inj.	2 ser. 6 mg	50,89	I	65 %	25,45
	2 ser. 6 mg + injecteur	53,34	I	65 %	8,89

## PROPRIÉTÉS

Agoniste sélectif des récepteurs 5HT<sub>1</sub>-like à la sérotonine principalement localisés au niveau des vaisseaux sanguins crâniens.

Biodisponibilité de 96 %, demi-vie de 2 h, métabolites inactifs excrétés par voie urinaire.

## INDICATIONS

**IMIGRANE** : traitement de la crise migraineuse avec ou sans aura ; liste I, remboursement 65 %. La forme **IMIGRANE** spray 10 mg/0,1 mL est indiquée chez l'adolescent de 12 à 17 ans.

**IMUJECT** : traitement de la crise de l'algie vasculaire de la face ; médicament d'exception.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **sumatriptan** ou aux **sulfamides**.

Antécédent d'infarctus du myocarde, angor d'effort ou de repos, HTA non contrôlée, infarctus cérébral.

Enfant de moins de 15 ans et adulte de plus de 65 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : déconseillé.

Injection sous-cutanée stricte.

Risque de déclenchement de crise convulsive chez les patients aux antécédents d'épilepsie.

En présence de facteurs de risque cardiovasculaire, l'évaluation du rapport bénéfice/risque doit être faite et une surveillance doit être assurée (ECG). Noter que des douleurs thoraciques transitoires, intenses, peuvent survenir quelques minutes après injection de **sumatriptan**. Dans l'expérience actuelle, elles ne sont qu'exceptionnellement liées à un spasme coronaire.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs transitoires et réactions locales au point d'injection.

Réactions allergiques de tout type.

Symptômes transitoires suivant l'injection pouvant intéresser n'importe quelle partie du corps (notamment la poitrine) : douleur, chaleur, oppression, pesanteur, fourmillements.

Vertiges, somnolence, nausées, élévation transitoire de la tension artérielle.

Quelques rares cas de spasmes coronaires ont pu être observés.

Convulsions.

Élévation rare, transitoire des transaminases.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **IMAO**, **dérivés de l'ergot de seigle**, autres traitements vasoconstricteurs, **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine** (fluvoxamine, fluoxétine, paroxétine, citalopram).

## MIGRAINE (4)

### État de mal migraineux

**Définition :** crise migraineuse persistante ou se répétant quotidiennement au-delà de 72 h malgré le traitement.

L'intrication avec un abus médicamenteux (**paracétamol, triptans, dérivés de l'ergot de seigle**) et/ou un syndrome anxiodépressif est fréquent.

### Diagnostic différentiel

Toute céphalée inhabituelle, même chez un migraineux connu, nécessite d'éliminer les urgences thérapeutiques : hémorragie méningée, méningite, maladie de Horton, hypertension intracrânienne, dissection artérielle.

Donc, bilan minimum : clinique, NFS, VS, fond d'œil et au moindre doute scanner cérébral et ponction lombaire.

### Mise en condition

- Hospitalisation en service de neurologie.
- Repos au lit, en chambre seule, au calme, dans le noir.
- Rassurer et calmer le patient.
- Arrêt des **antimigraineux** utilisés, et notamment des **dérivés de l'ergot de seigle**.

### Traitement médicamenteux

► **Agoniste sérotoninergique 5HT<sub>1</sub>**  
**Sumatriptan (IMIGRANE)** 1 amp. SC renouvelable 1 fois si échec (respecter un intervalle d'au moins 1 h) en l'absence de prise de dérivés ergotés depuis > 24 h.

► *Si échec ou contre-indication*

• **Amitriptyline (LAROXYL)** IV ; atteindre rapidement la dose efficace (jusqu'à 150 mg/j).

• **Clorazépate dipotassique (TRANXÈNE)** 1 amp. à 50 mg x 3/j si agitation. Rééquilibration hydroélectrolytique.

• **Métoclopramide (PRIMPÉRAN)** 1 amp. à 10 mg x 3/j si vomissements.

Sevrage des médicaments pris de façon abusive.

• Au décours :

- discuter ou réévaluer le traitement de fond de la migraine ;
- éducation du patient sur l'utilisation des **antimigraineux**, notamment des **antalgiques** et des **triptans**.

### Ergotisme aigu

#### C'est une urgence thérapeutique.

Il est secondaire à un surdosage en dérivés de l'ergot de seigle : vomissements, engourdissements, somnolence, paresthésies, douleurs et cyanose des extrémités, pouls périphérique diminué ou aboli, hypotension ou hypertension. Risque d'ischémie aiguë des membres par vasoconstriction périphérique.

### Traitement préventif

Il repose sur l'éducation du patient à qui l'on prescrit des **dérivés de l'ergot de seigle**. Il est indispensable que le patient :

- respecte les doses prescrites ;
- connaisse les effets secondaires et sache arrêter le traitement en cas d'apparition des premiers signes de surdosage : paresthésies, douleurs des extrémités ;
- ne fasse pas d'association médicamenteuse sans avis médical.

### Traitement curatif

- Hospitalisation en urgence.
- Arrêt de tous les **dérivés de l'ergot de seigle**.

• Contre-indication du **sumatriptan**.

Réchauffement des membres en ischémie pour lutter contre le vasospasme périphérique.

► **Héparinothérapie**

À doses efficaces afin d'obtenir un TCA entre 1,5 et 2,5 fois le témoin.

► **Vasodilatateurs**

- **Naftidrofuryl (PRAXILÈNE)** 400 mg x 2/j IV.
- Ou parfois **papavérine (ALBATRAN)**, **nitroprussiate de sodium** ou **prazosine**.

► **Corticothérapie**

Pour certains, en intraveineux (par exemple **SOLUMÉDROL** 120 mg/j IVL jusqu'à disparition des symptômes).

## ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE (AVF)

Le diagnostic de l'algie vasculaire de la face (AVF) est clinique, reposant sur l'interrogatoire. Il est fréquemment fait tardivement, le patient souffrant depuis plusieurs années. Il existe une forme épisodique avec crises pendant 3 à 12 sem., une ou plusieurs fois/an avec rémissions de quelques mois jusqu'à plusieurs années et une forme chronique avec crises récurrentes pendant un an sans rémission ou rémissions inférieures à 1 mois.

L'examen clinique est le plus souvent normal. L'IRM cérébrale et l'angiographie par résonance magnétique sont normales

### Traitement de la crise

- **Sumatriptan** sous-cutané (**IMIJECT**) solution injectable SC à 6 mg/0,5 mL en ne dépassant pas 2 amp./j. Problème de l'abus médicamenteux chez les patients ayant 7 à 8 crises /j.

- Oxygène 7 L/min, au masque, pendant 15 min. Pas d'effet indésirable ni contre-indication. Proposé si échec ou contre-indication au **sumatriptan**, ou en association avec celui-ci, lorsqu'existent plus de 2 crises/j. Prise en charge à 100 %.

- Rarement on pourra utiliser **sumatriptan** 20 mg par voie nasale ou **dihydroergotamine** spray si échec ou contre-indication du **sumatriptan** sous-cutané.

### Traitement de fond

Il vise à diminuer la fréquence des crises lors des épisodes douloureux et au long cours en cas d'AVF chronique. Il n'est pas indispensable chez les patients ayant des épisodes de courte durée avec peu de crises et répondant bien au **sumatriptan** sous-cutané.

- **Vérapamil** (**ISOPTINE**) gél. à 120 mg x 3 à 4/j : traitement de première intention, que l'AVF soit épisodique ou chronique. Pas

d'AMM. Surveillance ECG (BAV) et tensionnelle. Rarement posologie plus élevée nécessaire (720 mg/j). Dans la forme épisodique, on prévoit un traitement d'une durée équivalente aux accès précédents puis diminution sur une quinzaine de jours.

- **Indométacine** (**INDOCID**) gél. à 25 mg, sup. à 50 et 100 mg (150 à 200 mg/j) efficace en quelques jours, sinon arrêter. Essayer de diminuer à la posologie minimale efficace. Pour les formes épisodiques et chroniques en cas d'échec du **vérapamil**.

- **Lithium** (**TÉRALITHE**) cp. à 250 mg ou LP à 400 mg (en moyenne 900 mg/j) : si échec ou contre-indication du **vérapamil** et de l'**indométacine**. Réservé à la forme chronique. Pas d'AMM. Augmentation progressive des doses, surveillance des lithémies entre 0,6 et 1 mEq/L puis diminution des doses jusqu'à la dose minimale efficace, en surveillant les effets secondaires (tremblements, somnolence, nystagmus, ataxie, hypothyroïdie).

- **Prednisone** parfois, dans les formes très sévères (0,5 à 1 mg/kg pendant 15 j. puis diminution rapide sur 1 semaine), uniquement dans la forme épisodique.

- **Antiépileptiques** si échec des traitements dans l'AVF chronique : **topiramate** (**EPITOMAX**), **valproate de sodium** (**DÉPAKINE**). Hors AMM.

### Traitement chirurgical

Dans les centres spécialisés. Alcoolisation du ganglion sphéno-palatinal, thermocoagulation du ganglion de Gasser, *gamma knife* (radiochirurgie) sur le nerf trijumeau, décompression microvasculaire du nerf trijumeau, neurostimulation de l'hypothalamus postérieur par implantation d'électrode.

Association : [www.afcavf.org](http://www.afcavf.org)

## NÉURALGIE DU TRIJUMEAU

### Traitement médicamenteux

#### En première intention

- **Carbamazépine (TÉGRÉTOL)** : atteindre progressivement la dose minimale efficace (qui peut être très élevée : entre 600 et 1 800 mg/j). Possible problèmes de tolérance.
- **Oxcarbazépine (TRILEPTAL)** environ 1 200 mg/j. Pas d'AMM mais mieux toléré que la carbamazépine.

#### Autres traitements médicamenteux

##### En 2<sup>e</sup> intention :

- **Prégabaline (LYRICA)** : 150 à 300 mg/j en 2 prises.
- **Lamotrigine (LAMICTAL)** : titration lente. Pas d'AMM, seul ou associé à la carbamazépine.
- **Baclofène (LIORÉVAL)** 1 cp. à 10 mg x 3/j 30 min, avant chaque repas, jusqu'à 80 mg/j, parfois efficace en association avec la carbamazépine. Pas d'AMM.
- **Amitriptyline (LAROXYL)** en gouttes : le temps d'adapter la posologie efficace, puis relais en comprimés (en général 25 à 75 mg/j).

##### En 3<sup>e</sup> intention :

- **Gabapentine (NEURONTIN)** 600 à 2 000 mg/j, pas d'AMM.
- **Clonazépam (RIVOTRIL)** à la phase aiguë, par exemple 5 gttes matin, midi et soir, puis adapter en fonction de la tolérance et de l'efficacité du produit. Prescription limitée au neurologue.
- **Phénytoïne (DI-HYDAN)** cp. à 100 mg : atteindre progressivement la dose efficace, en général de 3 cp./j. Mauvaise tolérance au long cours. À n'utiliser qu'en cas d'échec des autres traitements. AMM.

### Traitement chirurgical

Il est en fait rapidement proposé car les traitements médicamenteux sont souvent insuffisamment efficaces ou présentent rapidement un échappement.

#### Modalités thérapeutiques

- **Radiochirurgie (gamma-knife)** : pas d'anesthésie générale, intéressant pour les personnes âgées. Le problème est le délai d'obtention de l'effet antalgique entre 6 sem. et 2 mois.
- **Décompression vasculaire microchirurgicale du trijumeau** : à proposer si visualisation d'un conflit vasculonerveux à l'angio-IRM. Indiquée si bon état général, patient jeune car intervention plus lourde (craniectomie de la fosse postérieure).
- **Thermocoagulation du ganglion de Gasser** : nécessité de courtes anesthésies générales répétées. Contre-indiquée si atteinte du V1. L'effet secondaire le plus fréquent est une analgésie sans perte de la sensibilité tactile dans le territoire du trijumeau homolatéral. Il existe hélas un risque de rechute.
- **Microcompression par ballonnet du ganglion de Gasser**. Intéressant pour le V1.

#### Indications

##### ► Névralgie essentielle

- **Sujet âgé** : radiochirurgie proposée en 1<sup>re</sup> intention.
- **Sujet jeune** : décompression vasculaire microchirurgicale du trijumeau ou radiochirurgie. En cas d'échec geste percutané (thermocoagulation ou micro-compression).
- **État de mal névralgique** : décompression vasculaire microchirurgicale du trijumeau ou geste percutané.

##### ► Névralgie secondaire

SEP : radiochirurgie ou geste percutané.

## CÉPHALÉES DE TENSION

Parfois appelées « céphalées psychogènes », c'est l'une des causes les plus fréquentes de céphalées. Il faut différencier les céphalées de tension épisodiques (moins de 15 j/mois) et les céphalées de tension chroniques (plus de 15 j/mois depuis au moins 3 mois). Il faut les reconnaître et les traiter efficacement. Le caractère chronique entraînant souvent une escalade thérapeutique pouvant être nocive pour le patient.

### Céphalées tensives épisodiques

L'éducation du patient est primordiale afin d'éviter le passage aux céphalées chroniques.

Le plus souvent, **paracétamol**, **aspirine** ou **AINS**.

### Céphalées tensives chroniques

Le traitement est plus difficile.

#### Lutte contre les abus de médicaments

##### Traitement de fond

Surtout lorsqu'il existe une composante anxieuse ou dépressive, on peut proposer un traitement au long cours.

**Tricycliques** : par exemple **LAROXYL** V à XV gtttes/j de façon progressive, puis poursuivre le **LAROXYL** à pleines doses pendant au moins 3 mois puis, en fonction de la réponse clinique (agenda), diminuer progressivement les doses (sur plusieurs mois).

- **Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine** si intolérance aux **tricycliques** ou excès pondéral.

#### Soutien psychologique

Indispensable, il faut l'adapter à chaque patient, le but étant d'expliquer le symptôme au patient, de le rassurer sur le caractère bénin de l'affection. Il est parfois suffisant...

Selon les cas on peut avoir recours à :

- une psychothérapie de soutien ;
- des séances de relaxation, de yoga ;
- une psychothérapie d'inspiration analytique pour certains.
- un aménagement de périodes de détente, une activité régulière.

## CÉPHALÉES CHRONIQUES QUOTIDIENNES

### Définition [1]

Céphalées présentes plus de 15 j/mois, évoluant depuis plus de 3 mois, ayant une durée quotidienne > 4 h sans traitement. Un agenda des céphalées permet souvent de porter le diagnostic.

L'analyse des céphalées permet de retrouver très souvent un abus d'antalgiques lié à des migraines ou des céphalées de tension, plus rarement il s'agit de migraines chroniques sans abus médicamenteux. C'est un diagnostic d'interrogatoire.

En cas de doute à l'examen clinique, l'imagerie permet d'éliminer une céphalée symptomatique.

### Pathologies intriquées

- Abus en antalgiques : très fréquent.
  - **Antalgiques** (paracétamol), **aspirine** et **AINS** : plus de 15 j/mois.

– **Triptans**, **dérivés ergotés**, **opioïdes** et **antalgiques associant plusieurs principes actifs** : plus de 10 j/mois.

- Symptômes anxieux, dépressifs et musculo-squelettiques.

### Traitement médicamenteux

- Sevrage médicamenteux : immédiat si hospitalisation, progressif (10 %) par semaine si sevrage ambulatoire.
- **Amitriptyline** : IV si hospitalisation (25 à 100 mg/j) ou en gouttes si ambulatoire.

### Psychothérapie

Soutien, relaxation, cognitivo-comportementale ou d'inspiration analytique.

Importance de l'agenda dans le suivi et la prévention primaire de ces céphalées.

### CONSENSUS

[1] Céphalées chroniques quotidiennes. Diagnostic, rôle de l'abus médicamenteux, prise en charge, *Anaes*, 2004



## TREMBLEMENT ESSENTIEL DE L'ADULTE

C'est une cause fréquente de tremblement chez le sujet âgé, à différencier des tremblements de repos des syndromes parkinsoniens et du tremblement cinétique du syndrome cérébelleux.

Il existe le plus souvent un caractère familial et est majoré par les émotions et la fatigue, il est souvent amélioré par la prise modérée d'alcool.

Les médicaments les plus utilisés dans ce type de tremblements sont les  **$\beta$ -bloquants**.

### **$\beta$ -bloquants**

**Propranolol (AVLOCARDYL)** 80 à 240 mg/j.  
Après avoir éliminé les contre-indications.

En surveillant le pouls et l'ECG.

On gardera la dose minimale efficace.

### **Autres traitements**

- **Primidone (MYSOLINE)** cp. à 250 mg 3 à 6 cp./j.
- **Clonazépam RIVOTRIL** II à X gttes/j efficace sur la composante d'action du tremblement (mais échappement...). Prescription maintenant limitée au neurologue.
- Des injections de **toxine botulinique** ont été proposées dans le tremblement du chef.
- Stimulation cérébrale du VIM du thalamus dans les formes invalidantes.

## MOUVEMENTS CHORÉIQUES

La conduite à tenir est surtout la recherche et le traitement (s'il existe) de l'étiologie.

### Traitement symptomatique

Il fait appel aux **antipsychotiques** qui sont généralement très efficaces à fortes doses.

Par exemple :

- **DOGMATIL** cp. à 200 mg : 4 cp./j ;
- **HALDOL** 2 % 100 gttes/j ;
- **tétrabénazine (XENAZINE)** cp. séc. 25 mg : 2 à 3 cp./j. 1/2 dose si sujet âgé. Réservé à la maladie de Huntington et à l'hémibalisme.

Il n'est cependant pas toujours utile et doit être réservé aux formes invalidantes.

### Traitement étiologique

#### Chorée de Huntington

Il n'y a malheureusement pas de traitement spécifique pour cette maladie évo-

luant inéluctablement vers une démence. Il faut traiter une dépression souvent associée et le soutien familial est indispensable.

#### Chorée de Sydenham

Devenue exceptionnelle ; les mouvements choréiques disparaissent spontanément en 2 à 6 mois. Il faut traiter l'infection streptococcique comme lors d'un RAA.

#### Autres causes nécessitant un traitement étiologique

- Lupus érythémateux disséminé.
- Hypoglycémie, hypocalcémie, hyperthyroïdie.
- Polyglobulie.
- Intoxication au CO.
- Médicaments : **L-dopa, antipsychotiques, phénytoïne.**

## PARALYSIE FACIALE A FRIGORE (1)

C'est une paralysie faciale périphérique idiopathique, fréquente, dont le problème est plus d'éliminer un diagnostic différentiel que son traitement puisqu'elle guérit spontanément sans séquelles en 1 à 2 mois dans 75 % des cas.

### Diagnostic

Le diagnostic est essentiellement clinique. Il repose sur l'interrogatoire et l'examen neurologique. Il s'agit d'un diagnostic d'élimination.

### Mode d'installation

La paralysie faciale s'installe rapidement (en quelques heures, volontiers la nuit) souvent accompagnée ou précédée d'une douleur mastoïdienne.

### Il s'agit bien d'une paralysie faciale périphérique

Atteinte du nerf facial inférieur (attraction de la commissure labiale du côté sain, effacement du sillon nasogénien, impossibilité de gonfler les joues, signe du peaucier de Babinski).

ET atteinte du nerf facial supérieur (effacement des rides du front, élargissement de la fente palpébrale avec signe de Charles Bell ou signe des cils de Souques dans les formes frustes).

### Il s'agit bien d'une paralysie faciale périphérique isolée

Absence d'atteinte des autres paires crâniennes, notamment absence d'atteinte

sensitive (trijumeau), sensibilité cornéenne respectée, absence de troubles oculomoteurs, de troubles de déglutition, de signes auditifs.

Absence d'atteinte des voies longues (pas de syndrome pyramidal, ni cérébelleux, ni sensitif).

Absence de signes généraux, de céphalée, de fièvre.

### Élimination des diagnostics différentiels

– Zona du ganglion géniculé (éruption dans la zone de Ramsay-Hunt, adénopathie prétragienne, fébricule).

– Infection VIH (une sérologie doit être proposée systématiquement chez le sujet à risque).

– Autres infections virales (oreillons, grippe, rubéole, mononucléose infectieuse, etc.).

– Multinévrite : diabète, angéites, sarcoïdose, lèpre.

– Polyradiculonévrite : syndrome de Guillain-Barré, maladie de Lyme, polyradiculonévrite chronique.

– Méningite dite « basilaire » : tuberculeuse, listérienne, etc.

– Lésion du nerf facial dans la protubérance : tumeur, accident vasculaire, sclérose en plaques.

– Lésion du nerf facial dans le rocher : fracture du rocher, otite moyenne aiguë ou chronique.

– Lésion du nerf facial dans la parotide : tumeur parotidienne, syndrome de Heerfordt.

### L'électromyogramme dans les paralysies faciales a frigore

Pas d'intérêt, ni d'indication à la phase aiguë.

Il peut avoir un intérêt pronostique en l'absence de récupération clinique rapide :

- il objective la réinnervation éventuelle ou au contraire l'absence de récupération ;
- il objective des signes d'hémispasme facial débutant : activité tonique des muscles de la face, présence de syncinésies.

## PARALYSIE FACIALE A FRIGORE (2)

### Traitement

Il s'agit essentiellement d'un traitement préventif ophtalmologique, indispensable pour protéger la cornée qui n'est plus recouverte par la paupière du côté atteint. Prendre systématiquement l'avis d'un ophtalmologiste. Le traitement doit être poursuivi tant que la fermeture palpébrale n'est pas complète.

### Traitement symptomatique

► Pendant la journée

- **LARMES ARTIFICIELLES** 1 gtt x 4 à 8/j.
- **Cyanocobalamine (VITAMINE B12 ALLERGAN)** 1 gtt x 4/j.
- Lunettes de soleil.

► Pendant la nuit

- Occlusion des paupières.
- **Rétinol VITAMINE A DULCIS** pommade ophtalmique 1 application au coucher.

### Rééducation

Elle doit être douce, une kinésithérapie intensive favorise chez certains l'apparition d'un hémispasme faciale :

- massages doux de l'hémiface atteinte ;

- mouvements actifs de la face plusieurs fois/j devant un miroir.

### Traitement spécifique

Il n'en existe pas. Le nerf facial est le siège d'une inflammation dont la cause est inconnue.

Rappelons que la paralysie régresse spontanément dans 75 % des cas sans séquelles. Le traitement par **corticoïdes** n'a jamais fait la preuve de son efficacité ni sur la durée, ni sur la régression des symptômes.

Pour certains, l'emploi des **corticoïdes** à fortes doses permettrait une régression plus rapide des symptômes. On utilise alors la **prednisolone (SOLUPRED)** per os 1 mg/kg/j pendant 8 j puis diminution progressive sur 3 sem.

### Traitement chirurgical

Il est exceptionnel mais doit être discuté en cas d'absence totale de récupération au bout de 3 sem. Il faut bien sûr avoir éliminé toute cause de paralysie faciale périphérique symptomatique.

Il consiste en une décompression du nerf facial œdématié dans le canal de Fallope.

## MALADIE DE PARKINSON (1)

Les symptômes de la maladie de Parkinson sont dus à une baisse de dopamine et à un déséquilibre acétylcholine/dopamine au niveau du striatum. Le traitement vise donc à rétablir cet équilibre.

Quatre types de médicaments sont utilisés :

- un précurseur de la dopamine : la **L-dopa** ;
- les **agonistes dopaminergiques** ;
- les **anticholinergiques** ;
- un **inhibiteur de la monoamine-oxydase B (IMAO B)**.

Devant un syndrome parkinsonien, le diagnostic de maladie de Parkinson requiert une bonne réactivité à la dopathérapie.

Le choix du médicament à utiliser sera fonction de l'invalidité provoquée par la maladie, de l'âge du patient et, parfois, fonction du symptôme prédominant (tremblement, akinésie ou hypertonie).

Aucun médicament n'étant capable, à l'heure actuelle, de freiner la dégénérescence neuronale, une adaptation du traitement sera souvent nécessaire à plus ou moins long terme.

### Traitement médicamenteux [1]

#### Forme paucisymptomatique

Il n'y a pas d'indication à introduire un traitement médicamenteux en l'absence de retentissement moteur. Cela sera expliqué au patient.

Lorsque la gêne est minime : on peut proposer en fonction du symptôme et de l'âge un **anticholinergique** ou un **agoniste dopaminergique mineur** dont l'efficacité est faible et la place n'est pas bien codifiée. Les effets secondaires doivent être expliqués au patient.

#### ► Tremblements prédominants

**Anticholinergique, trihexyphénidyle (ARTANE)** : atteindre progressivement la dose minimale efficace en débutant par 2 mg/j et en augmentant de 2 mg tous les 3-4 j.

Attention au risque de confusion mentale chez le sujet âgé.

#### ► Akinésie prédominante

**Amantadine (MANTADIX)** : atteindre progressivement la dose de 200 à 400 mg/j (augmenter d'une capsule tous les 4 j). Souvent peu efficace.

• **Piribédil (TRIVASTAL)** : atteindre progressivement une dose de 150 à 200 mg/j (cp. à 20 et 50 mg LP).

#### Forme peu invalidante (forme de début)

Le plus souvent, les traitements précédents ne sont pas suffisamment efficaces. Le consensus actuel est de débiter le traitement par un **agoniste dopaminergique**, un **IMAO B** ou la **rotigotine** chez le sujet jeune pour retarder l'apparition des fluctuations et des dyskinésies, et par la **lévodopa** chez le sujet âgé, pour limiter les effets secondaires.

#### ► Chez le sujet jeune

**Agoniste dopaminergique non ergoté.**  
Ex : **ropinirole (REQUIP)** 0,25 mg x 3/j puis augmentation de 0,25 mg par prise/sem. jusqu'à 1 mg x 3/j (puis augmenter jusqu'à la dose efficace : 3 à 9 mg/j). On doit prévenir le patient des éventuels effets secondaires ; accès de somnolence et troubles du contrôle des impulsions avec achats et comportements alimentaires compulsifs, jeux pathologiques et hypersexualité. On peut aussi proposer le **pramipexole (SIFROL)** qui a les mêmes effets secondaires ou la **rotigotine (NEUPRO)** qui se présente sous forme de dispositif transdermique.  
Ou **IMAO B (AZILECT)**.

#### ► Chez le sujet âgé

Par ex. : **L-dopa + carbidopa (SINEMET)** 100 mg 1/2 cp. x 2/j puis atteindre très progressivement la dose de 300 ou 400 mg/j (associer systématiquement au début de la **dompéridone MOTILUM 2** cp. x 3/j).

## ANTIPARKINSONIENS (1) – AGONISTE DOPAMINERGIQUE MINEUR

### ■ Amantadine

<b>MANTADIX</b>					
100 à 400 mg en 2 ou 3 prises	50 caps. 100 mg	5,50	I	15 %	0,11

#### PROPRIÉTÉS

Utilisé comme agoniste dopaminergique.  
Résorption rapide, élimination urinaire, demi-vie de 20 h doublée en cas d'insuffisance rénale sévère.

#### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.  
Traitement de l'hyperprolactinémie.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les effets secondaires sont dose-dépendants.  
Utiliser avec prudence en cas d'antécédents de troubles psychiques, de convulsions, d'insuffisance cardiaque ou d'œdèmes.  
Adapter la posologie à la clairance de la créatinine :

- < 50 mL/min : 100 mg/j ;
- < 30 mL/min : 200 mg x 2/sem. ;
- < 20 mL/min : 100 mg x 3/sem. ;
- < 10 mL/min : 200 mg/100 mg en alternance tous les 7 j.

Ne pas prescrire au sujet déjà grippé : risque de résurgence virale.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles neuropsychiques : insomnies fréquentes, difficultés de concentration, plus rarement agitation hypomaniaque, asthénie, état dépressif, confusion mentale, hallucinations, céphalées, vertiges, dysarthrie, myalgies.

Troubles digestifs, sécheresse buccale.

Autres : œdèmes des membres inférieurs avec livedo reticularis, dyspnée, toux, hypotension orthostatique, allergies, bouffées de chaleur.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Anticholinergiques** : majoration du risque de troubles psychiques.

## MALADIE DE PARKINSON (2)

### Forme invalidante

C'est l'indication de la dopathérapie. On l'utilise en monothérapie ou associée à un **agoniste dopaminergique majeur** ou un **IMAO B**.

#### ► Dopathérapie

**L-dopa** + inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique (**carbidopa** pour le **SINEMET** et **bensérázide** pour le **MODOPAR**), par exemple : **MODOPAR** 1 gél. à 125 mg x 2/j en dehors des repas puis augmenter de 1 gél./sem. jusqu'à la dose optimale (3 à 6 gél./j en général).

Chez le sujet âgé ou s'il existe des contre-indications relatives, on débutera à demi-dose.

On associera systématiquement au début un **antagoniste dopaminergique** périphérique, ex : **dompéridone (MOTILUM)** 1 à 2 cp. x 3/j.

#### ► Agoniste dopaminergique majeur

- **Ropinirole (REQUIP)** : atteindre progressivement la dose de 3 à 9 mg/j en 3 prises. Prévenir des éventuels effets secondaires.

- **Pramipexole (SIFROL)** : atteindre progressivement 1/2 cp. à 0,7 mg x 3/j puis adaptation de la posologie au maximum 1,5 cp. à 0,7 mg x 3/j. Prévenir des éventuels effets secondaires.

- **Rotigotine (NEUPRO)** : dispositif transdermique de 2 à 8 mg /j max, de façon très progressive.

- Plus rarement :

- **bromocriptine (PARLODEL)** : atteindre progressivement la dose de 10 à 40 mg/j en 3 ou 4 prises ;

- **lisuride (DOPERGINE ou AROLAC)** : atteindre la dose efficace par paliers de 0,1 mg/sem. (la dose optimale varie de 0,8 à 1,2 mg pour l'association précoce avec la **L-dopa** et de 1 à 5 mg pour l'association tardive).

#### ► Inhibiteur de la monoamine-oxydase B

- **Rasagiline (AZILECT)** 1 mg/j en une prise.

- **Sélégiline (DÉPRÉNYL)** : **IMAO B** sélectif, on évite aujourd'hui sa prescription en raison de possibles risques cardiovasculaires notamment lorsqu'il est associé à la **L-dopa**.

### Traitement chirurgical [1]

En pleine évolution, les techniques chirurgicales de traitement de la maladie de Parkinson restent réservées à des indications exceptionnelles, très invalidantes (stades III à V de Hoehn et Yahr), et en l'absence de contre-indication (âge < 75 ans, absence de troubles cognitifs, de séquelles vasculaires cérébrales). Elles sont effectuées dans un centre spécialisé :

- stimulation à haute fréquence du ou des noyau(x) sous-thalamique(s). Agit sur l'akinésie, la rigidité, le tremblement, la dystonie du *off*. Elle permet une réduction du traitement dopaminergique et donc des dyskinésies dopa-induites ;
- stimulation chronique à haute fréquence du noyau ventral intermédiaire du thalamus indiquée dans les formes avec tremblement unilatéral de grande amplitude résistant à tout traitement médical ;
- stimulation du *globus pallidus* interne si dyskinésies importantes. Rarement pallidotomie (destruction stéréotaxique de la partie ventrale du pallidum) ;
- transplantation de tissu nerveux fœtal contenant des neurones dopaminergiques, encore à l'étude actuellement.

### Adaptation du traitement

#### Suivi de la maladie

##### ► Évolution habituelle

En règle générale, l'efficacité de la **L-dopa** est bonne pendant 5 à 10 ans (lune de miel) puis l'évolution naturelle de la maladie se fait vers un épuisement de son efficacité et/ou l'apparition de fluctuation d'activité.

C'est pourquoi un suivi bi-annuel au moins par un spécialiste est préconisé afin d'adapter le traitement.

##### ► Adaptation du traitement, surveillance de l'efficacité des changements apportés

L'adaptation du traitement doit se faire avec l'aide du patient qui note, en fonction des heures, l'état de sa maladie (« on », « off », « intermédiaire », « dyskinésies »).

L'établissement de scores moteurs (UPDRS) par le neurologue permet de surveiller l'efficacité du traitement.

## ANTIPARKINSONIENS (2) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES ERGOTÉS (1)

### ■ Bromocriptine

<b>PARLODEL</b>					
En 3 prises, atteindre progressivement par paliers de 25 mg tous les 2 j : 10-40 mg/j en monothérapie 10-25 mg/j associé à la <b>lévodopa</b>	20 cp. séc. 2,5 mg	4,17	I	65 %	0,21
	30 gél. 5 mg	9,24	I	65 %	0,31
	30 gél. 10 mg	16,33	I	65 %	0,54
<b>BROMO-KIN</b>					
Idem <b>PARLODEL</b>	30 cp. séc. 2,5 mg	5,89	I	65 %	0,20
	100 cp. 2,5 mg	HOP	I		
	30 gél. 5 mg	9,03	I	65 %	0,30
	30 gél. 10 mg	15,96	I	65 %	0,53

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique, dérivé de l'ergot de seigle, freinant la sécrétion de prolactine et de façon inconstante celle de GH, ayant une action antiparkinsonienne par stimulation des récepteurs D2 dopaminergiques et antagonisme des récepteurs D1.

Résorption intestinale rapide, effet de premier passage hépatique (90 %), demi-vie de 3 h, élimination biliaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.

Hyperprolactinémie.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'ergot de seigle ou à ses analogues.

Insuffisance coronarienne.

Troubles psychiques sévères et/ou antécédents psychiatriques graves.

**Grossesse** : si HTA gravidique ou du post-partum.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Augmenter les doses très progressivement pour éviter les effets secondaires, notamment

les troubles psychiques et l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques : surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, somnolence, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles.

Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermite ocre, exceptionnellement œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses > 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **macrolides** (sauf **spiramycine**), **méthylergométrine**, **dérivés de l'ergot de seigle** et autres vasoconstricteurs, **antipsychotiques** et produits apparentés, **sympathomimétiques**.

Association à utiliser avec précaution : **griséofulvine**.



## MALADIE DE PARKINSON (3)

### Diminution/fragmentation des doses

C'est généralement la première étape de l'adaptation thérapeutique lorsque apparaissent des fluctuations isolées.

En général, 3 à 6 prises/j sont nécessaires (parfois plus !).

### Diminution de l'efficacité de la L-dopa

#### ► Augmentation des doses de L-dopa

L'épuisement de l'efficacité de la **L-dopa** se traduit par l'apparition de périodes « off » de plus en plus nombreuses et longues durant la journée. La première étape consiste à augmenter les doses de **L-dopa** jusqu'à 750 mg/j (voire plus) en fragmentant les prises.

En cas d'échec, une association est nécessaire.

#### ► Association avec la L-dopa

On choisit :

- un **agoniste dopaminergique**, un **IMAO B** si c'est le syndrome akinéto-hypertonique qui domine ;
- un **anticholinergique** si c'est le tremblement qui domine et s'il n'y a pas de contre-indication.

### Dyskinésies et fluctuations d'activité

C'est le stade le plus difficile, où l'aide d'un neurologue et parfois d'une courte hospitalisation est nécessaire. La disparition des dyskinésies est hélas souvent accompagnée d'une diminution des performances motrices.

Les différentes mesures pour y parvenir sont :

- diminution et/ou fractionnement des doses ;
- rapprochement des prises ;
- ajout d'un **agoniste**, de la **rasagiline** ;
- utilisation de formes à libération prolongée ;
- diminution de l'apport de protides lors des prises de **L-dopa** ;
- utilisation de la forme dispersible du **MODOPAR** ;
- utilisation d'un inhibiteur de la recapture de la **dopamine (COMTAN)** ou de **lévodopa + carbidopa + inhibiteur de la COMT (STALEVO)**.

### Effet on/off

#### ► Rôle de l'apomorphine

En cas d'échec des mesures précédentes, dans les cas très difficiles à équilibrer, on peut avoir recours à l'**apomorphine (APO-KINON)** :

- en auto-injection sous-cutanée lors des périodes de blocage (1 à 2 mg/inj. en général) ;
- pour certains en injection continue sous-cutanée par pompe, à n'envisager qu'en milieu spécialisé lorsque toutes les autres ressources thérapeutiques sont épuisées et qu'il existe une contre-indication chirurgicale ;
- à éviter si troubles cognitifs.

#### ► Alternative à l'apomorphine

Administration par sonde duodénale de **lévodopa-carbidopa (DUODOPA)**.

## ANTIPARKINSONIENS (3) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES ERGOTÉS (2)

### ■ Lisuride

<b>DOPERGINE</b>						
Atteindre progressivement 1 à 2 mg/j en 3-4 prises (paliers de 0,1 mg/sem.)	30 cp. séc. 0,2 mg	9,01	I	65 %	0,30	
	30 cp. séc. 0,5 mg	17,89	I	65 %	0,60	
<b>AROLAC</b>						
Idem <b>DOPERGINE</b>	20 cp. séc. 0,2 mg	6,51	I	65 %	0,33	

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique, dérivé de l'ergot de seigle, ayant une action antiparkinsonienne par stimulation des récepteurs D2 dopaminergiques.

Résorption digestive rapide, effet de premier passage hépatique, demi-vie de 3 h, élimination biliaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.

Hyperprolactinémie.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'ergot de seigle ou à ses analogues.

Insuffisance coronarienne.

Troubles psychiques sévères et/ou antécédents psychiatriques graves.

**Grossesse** : si HTA gravidique ou du post-partum.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Augmenter les doses très progressivement pour éviter les effets secondaires, notamment

les troubles psychiques et l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques, surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, **somnolence**, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles, jeu pathologique. Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermite ocre. Exceptionnellement : œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **macrolides** (sauf **spiramycine**), **méthylergométrine**, **dérivés de l'ergot de seigle** et autres vasoconstricteurs, **antipsychotiques** et produits apparentés, **sympathomimétiques**.

Association à utiliser avec précaution : **griséofulvine**.

Atteindre progressivement les doses efficaces par palier de 1/2 cp. à 0,2 mg par semaine

semaine	1	2	3	4	5	6	7	8
matin	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1
midi	-	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1
après-midi	-	-	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1
soir	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1

**MALADIE DE PARKINSON (4)****Traitement des troubles liés à la dysautonomie [1]**

Ils sont dus à la maladie, aggravés par les traitements dopaminergiques, d'autres affections ou traitements intercurrents.

**Troubles digestifs**

- Nausées, vomissements : généralement transitoires. **Antémétique, dompéridone (MOTILIUM)** 1 à 2 cp. x 3/j.

NB : Une imprégnation par la **dompéridone** est souvent nécessaire pendant quelques jours (2 ou 3 j) avant l'introduction d'un traitement par **L-dopa** ou utilisation de l'**apomorphine**.

- Troubles de la déglutition : adaptation optimale du traitement, puis de l'alimentation. Recours aux sondes de gastrostomie si pneumopathies secondaires.
- Constipation : régime riche en fibres, hydratation suffisante, exercice physique, **laxatifs**, parfois lavements doux.
- Stase salivaire : adaptation du traitement, **anticholinergique** en spray, voire infiltration de **toxine botulinique** dans les glandes salivaires (hors AMM).

**Hypotension orthostatique**

Mesures simples : hydratation, augmentation des apports sodés, apprentissage du lever, bas de contention, diminution du traitement spécifique antiparkinsonien.

En cas d'hypotension symptomatique : **sympathomimétiques, midodrine (GUTRON)**, débiter à 3 cp./j et augmenter si besoin jusqu'à 12 cp./j en 3 ou 4 prises (dernière prise à 17 h).

En dernier recours mais souvent efficace, **fludrocortisone** : 10 à 30 µg/j (hors AMM).

**Troubles urinaires**

Nécessité de faire la part éventuelle des affections associées (prostate et statique périnéale). Intérêt d'un bilan urodynamique (rechercher une dysnergie vésico-sphinctérienne).

Il faut prévenir les infections urinaires (hydratation, hygiène locale, traitement de la constipation). Utiliser avec précaution (demi-doses) les médicaments anticholinergiques (**DITROPAN**), grands pourvoyeurs de confusion mentale. Éventuellement **alphabloquants** (hors AMM).

## ANTIPARKINSONIENS (4) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (1)

### ■ Ropinirol

REQUIP					
0,25 mg x 3/j puis atteindre progressivement 3 à 9 mg/j en 3 prises	21 cp. 0,25 mg	4,12	I	65 %	0,20
	21 cp. 0,5 mg	5,95	I	65 %	0,28
	21 cp. 1 mg	9,05	I	65 %	0,43
	21 cp. 2 mg	14,13	I	65 %	0,67
	21 cp. 5 mg	28,40	I	65 %	1,35
ADARTREL					
Débuter à 0,25 mg le soir pdt 48 h puis 0,50 mg pdt 1 sem. Augmentation progressive si nécessaire de 0,5 mg/sem. Max. 2 mg/j cp. à prendre au plus tard 3 h avant le coucher	12 cp. 0,25 mg		I	NR	
	28 cp. 0,5 mg		I	NR	
	28 cp. 2 mg		I	NR	
REQUIP LP					
2 mg/j en 1 prise la 1 <sup>re</sup> sem. puis 4 mg/j si besoin en augmentant de 2 mg/sem. jusqu'à 8 mg/j Max. 24 mg/j	28 cp. 2 mg	14,26	I	65 %	0,51
	28 cp. 4 mg	26,01	I	65 %	0,93
	28 cp. 8 mg	48,28	I	65 %	1,72

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique non ergoté des récepteurs D2/D3 qui stimule des récepteurs dopaminergiques du striatum.

Inhibition de la sécrétion de prolactine.

Biodisponibilité de 50 %, liaison faible aux protéines de 10 à 40 %, métabolisme cytochrome P450 dépendant, élimination urinaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson : de première intention chez le sujet en monothérapie ou en association à la **lévodopa** dans les formes évoluées.

**ADARTREL** : traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos modéré à très sévère. Seules les formes très sévères sont remboursées à 65 % (existence de troubles importants du sommeil et/ou retentissement important sur la vie familiale, sociale et/ou professionnelle).

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

Insuffisance hépatique.

### PROPRIÉTÉS

Somolence et accès de sommeil d'apparition soudaine ; prévenir le patient, attention à la conduite automobile.

Troubles neuropsychiatriques.

Troubles du contrôle des impulsions (jeu pathologique, hypersexualité).

Hypotension orthostatique à rechercher.

L'arrêt du traitement doit être progressif en raison d'un risque d'apparition de syndrome malin des neuroleptiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : hallucinations, jeu pathologique, hypersexualité, confusion, OMI.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Œstrogènes** à forte dose, **antipsychotiques**.

## MALADIE DE PARKINSON (5)

### Traitement des troubles thymiques et cognitifs

#### Dépression

Fréquente ; nécessite soit au début de la maladie l'adaptation du traitement dopaminergique, soit à un stade plus tardif un anti-dépresseur tel l'**ATHYMIL** ou de petites doses de **tricycliques** (**ANAFRANIL**) et éventuellement une prise en charge spécialisée.

#### Troubles comportementaux induits par le traitement dopaminergique

À toujours rechercher. Ils se traduisent par des troubles de type compulsif ou addictif : jeu pathologique, achats compulsifs, hypersexualité, *punding* (comportement répétitif sans but). Diminution ou changement d'**agoniste dopaminergique**. Si échec : **L-dopa**. En l'absence d'efficacité : **clozapine** (hors AMM).

#### Hallucinations et délires

Il faut, dans un 1<sup>er</sup> temps, éliminer une cause sous-jacente sans rapport avec la maladie de Parkinson. Ces symptômes sont favorisés par tous les traitements antiparkinsoniens. Il faut arrêter les **anticholinergiques**, l'**amantadine**, diminuer les traitements dopaminergiques (privilégier la L-dopothérapie par rapport aux **agonistes**). Si nécessaire, traitement par **clozapine**, **LEPONEX** (hors AMM), cp. à 25 mg 1/2 cp. à J1 puis 1 cp. à J2 puis augmentation de 1/2 cp. à J9 puis 1/2 cp. à J16, soit 50 mg en 1 prise le soir. Des doses supérieures sont rarement nécessaires. Surveillance de la NFS hebdomadaire pendant 18 sem. puis mensuelle (risque d'agranulocytose). On associe de la **rivastigmine**.

#### Troubles cognitifs

Arrêt des **anticholinergiques**, traitement par **rivastigmine** (AMM), réadaptation cognitive.

#### Troubles du sommeil

Fragmentation du sommeil (syndrome des jambes sans repos, blocages nocturnes,

troubles urinaires) : **L-dopa** forme retard ou dispersible, **agonistes** en milieu de nuit. Somnolence diurne et au maximum attaques de sommeil : réduire ou changer les **agonistes**.

#### Douleurs

Fréquentes : liées à des problèmes articulaires ou périarticulaires et à des fluctuations motrices (dystonies). Amélioration avec optimisation du traitement antiparkinsonien et traitements antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant.

#### Rééducation fonctionnelle

##### Kinésithérapie

Elle est fondamentale, dès le premier stade de la maladie, afin de préserver le plus longtemps possible l'autonomie du patient, son confort de vie, et éviter les chutes.

Elle repose sur plusieurs principes :

- kinésithérapie active pour rééducation de la marche, du lever, de la posture, etc. ;
- prévention des chutes : chaussures adaptées, déambulateurs, fauteuils adaptés, etc. ;
- apprentissage de mouvements d'assouplissement que le patient peut faire seul chez lui lors des périodes « off ».

#### Ergothérapie

Afin d'améliorer le milieu de vie.

#### Orthophonie

Travail de la dysarthrie et des troubles de la déglutition.

#### Soutien psychologique

Il est au mieux assuré par l'action concertée :

- de la famille ;
- d'un médecin généraliste et spécialiste ;
- des associations de malades.

France Parkinson : 37 bis, rue La Fontaine  
75016 Paris, tél. 01 45 20 22 20. Site  
internet : <http://www.franceparkinson.fr>

La prise en charge à 100 %, l'information du patient et de sa famille, un éventuel reclassement professionnel sont également indispensables.

## ANTIPARKINSONIENS (5) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (2)

### ■ Pramipexole

<b>SIFROL</b>					
Formes non LP :	30 cp. séc. 0,18 mg	6,40	I	65 %	0,21
<b>Parkinson en monothérapie ou associé à L-dopa</b>	100 cp. séc. 0,18 mg	20,01	I	65 %	0,20
Posologie initiale :	30 cp. séc. 0,7 mg	23,89	I	65 %	0,80
Semaine 1 (S1) : 0,088 mg x 3/j	100 cp. séc. 0,7 mg	72,66	I	65 %	0,73
S2 : 0,18 mg x 3/j					
S3 : 0,35 mg x 3/j					
Posologie d'entretien : 0,088 à 1,1 mg x3/j					
<b>Syndrome des jambes sans repos :</b>					
Posologie initiale : 0,088 mg x 1/j					
Posologie d'entretien : 0,088 mg à 0,54 mg x 1/j					
À prendre 2 à 3 heures avant le coucher					
Formes LP :	10 cp. LP 0,26 mg	4,27	I	65 %	0,43
<b>Parkinson en monothérapie ou associé à L-dopa</b>	30 cp. LP 0,26 mg	11,36	I	65 %	0,38
Posologie initiale :	10 cp. LP 0,52 mg	7,75	I	65 %	0,78
S1 : 0,26 mg x 1/j	30 cp. LP 0,52 mg	22,18	I	65 %	0,74
S2 : 0,52 mg x 1/j	10 cp. LP 1,05 mg	14,94	I	65 %	1,49
S3 : 1,05 mg x 1/j	30 cp. LP 1,05 mg	42,26	I	65 %	1,41
Posologie d'entretien : 0,26 à 1,05 mg x1/j	30 cp. LP 2,1 mg	73,78	I	65 %	2,46
Posologie maximale : 3,15 mg x 1/j					

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique non ergoté des récepteurs D2/D3 qui stimule des récepteurs dopaminergiques du striatum. Diminution de la sécrétion de prolactine.

Biodisponibilité de 90 %, liaison plasmatique aux protéines faible de 20 %, élimination rénale.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson : de première intention en monothérapie ou en association à la **lévodopa** à un stade de fluctuations.

Syndrome des jambes sans repos très sévère.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminuer les doses si insuffisance rénale.

Somolence et accès de sommeil d'apparition soudaine; prévenir le patient, attention à la conduite automobile.

Troubles neuropsychiatriques, hallucinations

Troubles du contrôle des impulsions (jeu pathologique, hypersexualité).

Hypotension orthostatique à rechercher.

Pas d'arrêt brutal (risque de syndrome malin des neuroleptiques).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques : surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, somnolence, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles.

Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermatite ocre, exceptionnellement œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses > 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

Aggravation paradoxale du syndrome des jambes sans repos

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Cimétidine** : diminue la clairance rénale du pramipexole.

## MALADIE DE PARKINSON (6)

**Antipsychotiques : à rechercher et arrêter devant tout syndrome parkinsonien**

- Antipsychotiques classiques : **phénothiazines, butyrophérones.**
- Benzamides : **DOGMATIL, TIAPRIDAL.**
- Antiémétiques : **PRIMPÉRAN, VOGALÈNE.**
- Antivertigineux : **SIBELIUM.**
- Hypnotiques et antihistaminiques H<sub>1</sub> : **THÉRALÈNE**, etc.

**Exemple de feuille « ON/OFF » à donner au patient  
afin d'assurer la surveillance du traitement**

Date :	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	nuit
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermé- diaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traitement																	
Remarques																	

MA = mouvements anormaux.

## ANTIPARKINSONIENS (6) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (3)

### ■ Rotigotine

NEUPRO					
Posologie initiale : 1 à 2 disp. /j Posologie maximale : 4 disp. /j	7 disp. transderm. 2 mg/24 h	14,78	I	65 %	2,11
	30 disp. transderm. 2 mg/24 h	57,91	I	65 %	1,93
	7 disp. transderm. 4 mg/24 h	20,94	I	65 %	2,99
	30 disp. transderm. 4 mg/24 h	81,14	I	65 %	2,70
	30 disp. transderm. 6 mg/24 h	104,37	I	65 %	3,48
	30 disp. transderm. 8 mg/24 h	127,25	I	65 %	4,24

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique (activation des récepteurs D3, D2 et D1) de type non ergoline destiné au traitement des signes et symptômes de la maladie de Parkinson et du syndrome des jambes sans repos.

### INDICATIONS

- En monothérapie (sans **lévodopa**) pour le traitement des signes et symptômes du stade précoce de la maladie de Parkinson idiopathique.
- En association avec la **lévodopa**, quand, au cours de l'évolution de la maladie, jusqu'aux stades avancés, les effets de la **lévodopa** s'atténuent ou deviennent irréguliers et que des fluctuations de l'effet thérapeutique apparaissent.
- Traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos idiopathique d'intensité modérée à sévère chez l'adulte.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué en cas :

- d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients ;
- d'imagerie par résonance magnétique ou cardioversion

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec prudence en cas d'insuffisance rénale aiguë ou d'insuffisance hépatique sévère.

Une surveillance tensionnelle (risque d'hypotension orthostatique) et ophtalmologique est recommandée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables cliniques fréquents :

- généraux : hypotension orthostatique, chutes, état de fatigue, hyperhydrose, vertiges ;
- comportementaux : troubles de la perception, somnolence ;
- nerveux : troubles de la conscience, céphalées ;
- cutanés : hypersensibilité, réactions au site d'administration, prurit, érythème ;
- gastro-intestinaux : nausées, vomissements, constipation, sécheresse buccale, dyspepsie, hoquet, perte de poids ;
- cardiovasculaires : hypertension, palpitations.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La **rotigotine** étant un agoniste de la dopamine, il est probable que les antagonistes de la dopamine, comme les **antipsychotiques (phénothiazines, butyrophénones, thioxanthènes)** ou le **métoclopramide** réduisent l'efficacité de ce médicament et leur administration concomitante doit être évitée. En raison d'effets additifs potentiels, la prudence est de rigueur chez les patients prenant des médicaments sédatifs ou d'autres dépresseurs du système nerveux central (ex : **benzodiazépines, antipsychotiques, antidépresseurs**) ou de l'alcool en association avec la **rotigotine**.

Ce médicament est susceptible de potentialiser les effets indésirables dopaminergiques de la **L-dopa** et peut provoquer et/ou exacerber une dyskinésie préexistante, comme cela a été décrit pour d'autres **agonistes de la dopamine**.



## MALADIE DE PARKINSON (7)

## Score moteur UPDRS\* : surveillance de l'efficacité thérapeutique

Parole :	sur 5 points :		
Expression faciale :	sur 5 points :		
Tremblement de repos : 1 – absent. 2 – léger et rarement présent. 3 – faible amplitude mais persistant ; ou modéré mais intermittent. 4 – modéré en amplitude mais présent la plupart du temps. 5 – amplitude marquée et présent la plupart du temps.	mb. sup.     mb. inf.	tête	mb. sup.     mb. inf.
Tremblement d'attitude : 1 – absent. 2 – léger, présent lors de l'action. 3 – modéré en amplitude, présent lors de l'action. 4 – modéré en amplitude, tant lors du maintien postural que lors de l'action. 5 – amplitude marquée, présent la plupart du temps.	mb. sup.     mb. inf.	tête	mb. sup.     mb. inf.
Rigidité : 1 – absente. 2 – minimale ou apparaissant à la manœuvre de Froment. 3 – légère à modérée. 4 – marquée, mais les mouvements peuvent être effectués aisément. 5 – sévère, les mouvements sont effectués difficilement.	mb. sup.     mb. inf.	tronc	mb. sup.     mb. inf.
Tapotement des doigts (mouvements rapides et de grande amplitude du pouce sur l'index) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements des mains (mouvements rapides de grande amplitude de fermeture et ouverture des 2 mains, alternativement) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements alternatifs rapides (mouvements de prosupination des mains, de grande amplitude, chaque main séparément) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements des pieds (taper le talon sur le sol en soulevant tout le pied, rapidement, amplitude de 7,5 cm environ) : sur 5 points.	pied gauche		pied droit
Lever d'une chaise : 1 – normal. 2 – lentement, ou plus d'un essai. 3 – s'aide des bras. 4 – tend à tomber en arrière, plus d'un essai mais peut se lever sans aide. 5 – peut à peine effectuer la tâche.	sur 5 points :		
Marche : 1 – normale. 2 – petits pas, sans festination ni propulsion. 3 – difficile mais pas d'aide ; peut avoir des festinations ou une propulsion. 4 – possible avec aide. 5 – impossible	sur 5 points :		
Posture :	sur 5 points :		
Stabilité posturale (réponse à un déplacement postural soudain, produit par une poussée sur les épaules, patient debout, yeux ouverts, prévenu) :	sur 5 points :		
Bradykinésie corporelle :	sur 5 points :		
TOTAL			

\* UPDRS = United Parkinson Disease Rate Score

## DYSTONIES FOCALES PRIMITIVES

### Injections locales de toxine botulinique A

C'est actuellement le traitement le plus efficace, il est de plus en plus prescrit en 1<sup>re</sup> intention.

#### Indications

AMM : torticollis spasmodique, blépharospasme et hémispasme facial, spasticité des membres supérieurs avec flexion du poignet et fermeture de la main (**XEOMIN** 50 et 100 U) post-AVC.

Hors AMM, les indications s'élargissent de plus en plus : dystonies laryngées (dans certaines dysphonies), dystonies oromandibulaires rendant l'alimentation difficile, diplopies, certains tremblements, certaines formes de spasticité localisée, achalasie, etc.

#### Inconvénients

Nécessité de pratiquer des injections à intervalles réguliers car échappement au bout de quelques mois par repousse axonale.

Effets indésirables locaux dus à la diffusion aux muscles voisins : diplopie, dysphagie, dysphonie, etc.

#### Modalités

Prescription hospitalière limitée aux services de neurologie, ophtalmologie ou ORL.

Doses à adapter en fonction du type de dystonie (voir page suivante).

#### Remarque

Les injections locales d'alcool sont actuellement abandonnées et remplacées par les injections de **toxine botulinique**, car elles sont moins efficaces, agissent moins longtemps et sont douloureuses pendant plusieurs jours après injection chez certains patients.

### Traitement médicamenteux

Les médicaments sont nombreux mais souvent peu ou pas efficaces.

#### Anticholinergiques

À fortes doses : **trihexyphénidyle (ARTANE)** 10 à plus de 30 mg/j. Limités par leurs effets secondaires essentiellement digestifs chez le sujet jeune (risque d'iléus paralytique).

#### Autres médicaments

**Benzodiazépines**, **clonazépam (RIVOTRIL)** en gouttes à doses progressives jusqu'à la dose efficace et tolérable.

**Carbamazépine (TÉGRETOL)** avec augmentation progressive des doses (parfois 600 à 900 mg/j).

**Lévodopa** ou **agonistes dopaminergiques** type **bromocriptine** parfois.

### Traitement chirurgical

À ne proposer qu'en cas d'échec du traitement médical, de pathologie sévère et très invalidante. Les résultats ne sont pas défavorables mais il y a un risque de séquelles paralytiques.

- Dans le **torticollis spasmodique** : radicotomie antérieure de C2-C3 du côté du splénius et neurotomie de la branche du XI destinée au sterno-cléido-mastoïdien du côté opposé.

- Dans l'**hémispasme facial** : traitement neurochirurgical en cas de mise en évidence d'une boucle vasculaire comprimant le nerf facial à l'IRM.

### Rééducation fonctionnelle

- But : soulager le spasme, soulager la douleur, renforcer les muscles qui devraient corriger l'attitude vicieuse.

- Pas de massages : ils peuvent faciliter les spasmes (certains spasmes sont en effet provoqués ou aggravés par la stimulation cutanée).

- **Balnéothérapie** : peut être profitable en permettant au patient de faire travailler les muscles dans d'autres postures que celles favorisant la dystonie.

## DÉMENCES (1)

Après avoir éliminé une cause potentiellement curable de syndrome démentiel, le traitement est principalement symptomatique, visant à préserver et optimiser les performances intellectuelles et motrices du patient.

L'évolution se fait le plus souvent vers la perte d'autonomie du patient et la grabatation. Cela nécessite une collaboration étroite entre les différents intervenants médicaux (neurologue, médecin traitant), paramédicaux (infirmière, kinésithérapeute, etc.), sociaux (assistante sociale) et la famille.

### Traitement spécifique

#### Traitement étiologique

La plupart des démences sont dues à des maladies dégénératives pour lesquelles il n'existe pas de traitement spécifique.

Il faut cependant éliminer les causes de syndromes démentiels potentiellement curables [1].

#### ► Maladie d'Alzheimer

##### Annonce du diagnostic [1]

Il est recommandé de le faire, parfois en plusieurs étapes, en coordination avec le médecin traitant. Si le patient est d'accord (s'il comprend), la famille ou une personne de son choix est informée. À un stade plus tardif, le diagnostic et son annonce gardent leur intérêt car ils permettent d'adapter la prise en charge.

##### Traitement médicamenteux spécifique

On utilise dans les formes légères à modérément sévères (MMS de 10 à 26) :

- soit le **donépézil (ARICEPT)** 10 mg 1 cp./j ;
- soit la **rivastigmine (EXELON)** 1 gél. x 2/j en moyenne 3 à 6 mg x 2/j ;
- soit la **galantamine (REMINYL)** en moyenne 16 mg/j en 2 prises ou 1 prise le matin si forme LP.

Dans les formes plus sévères (MMS de 3 à 19) : **antagoniste des récepteurs NMDA, mémantine (EBIXA)** : 20 mg/j en 1 prise.

L'intérêt de ces médicaments est modeste.

Compte tenue de la possibilité d'une amélioration sur les troubles cognitifs et les activités de la vie quotidienne, chez certains patients, leur prescription est maintenue. Elle doit être réévaluée 1 an après le début dans le cadre d'une réunion multidisciplinaire.

La bithérapie (**anticholinestérasiques et antagoniste des récepteurs NMDA**) n'est pas recommandée.

#### ► Démence vasculaire

La démence est irréversible, les troubles prédominent sur les fonctions exécutives et instrumentales ; le traitement a donc pour but la prévention de nouveaux accidents ischémiques cérébraux : **antiagrégant plaquettaire**, traitement des facteurs de risque cardiovasculaires (traitement de l'HTA, **hypolipémiant**, **antidiabétique**, sevrage tabagique), recherche et traitement d'une cardiopathie emboligène. Elle est souvent associée à la maladie d'Alzheimer (démence mixte).

#### ► Cause endocrinienne

Hypothyroïdie : traitement substitutif.

#### ► Causes métabolique ou carencielle

- Correction d'un trouble ionique.
- Supplémentation en **vitamine B12** dans la maladie de Biermer.

#### ► Causes infectieuses

- Neurosyphilis : **PÉNICILLINE G PAN-PHARMA** 10 MUI/j IV pendant 1 mois associée au début à une corticothérapie *per os* (1 mg/kg/j) afin d'éviter la réaction d'Herxheimer.
- Maladie de Lyme : **ROCÉPHINE** 1 g IM/j pendant plusieurs mois.
- Méningoencéphalite tuberculeuse : traitement antituberculeux.
- Maladie de Whipple : **BACTRIM FORTE** 1 cp./j le plus précocement possible (durée indéterminée).

#### ► Causes neurochirurgicales

- Hydrocéphalie à pression normale : dérivation ventriculaire.
- Hématome sous-dural chronique : évacuation chirurgicale.

## ANTICHOLINESTÉRASIQUES D'ACTION CENTRALE

## ■ Donépézil

<b>ARICEPT</b>					
5 mg/j pendant 6 sem. puis augmenter éventuellement à 10 mg/j selon la réponse clinique	28 cp. pell. 5 mg	58,94	I	15 %	2,11
	28 cp. orodisp. 5 mg	58,94	I	15 %	2,11
	50 cp. pell. 5 mg	HOP	I		
	50 cp. orodisp. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. pell. 10 mg	58,94	I	15 %	2,11
	28 cp. orodisp. 10 mg	58,94	I	15 %	2,11
	50 cp. pell. 10 mg	HOP	I		
	50 cp. orodisp. 10 mg	HOP	I	65 %	

## ■ Rivastigmine

<b>EXELON</b>					
Dose initiale = 1,5 mg matin et soir Puis atteindre 3 à 6 mg matin et soir par paliers de 3 mg/j tous les 15 j	28 gél. 1,5 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 1,5 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 3 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 3 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 4,5 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 4,5 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 6 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 6 mg	54,05	I	15 %	0,97
	1 fl. 50 mL sol. buv. 2 mg/mL	31,88	I	15 %	31,88
	30 disp. transderm. 4,6 mg/24 h	73,53	I	15 %	2,45
Dose initiale de 4,6 mg/j pdt 4 sem. puis 9,5 mg/j	30 disp. transderm. 9,5 mg/24 h	73,53	I	15 %	2,45

## ■ Galantamine

<b>REMINYL</b>					
Dose initiale : 8 mg/j en 2 prises pendant 4 sem. Dose d'entretien : 16 mg/j en 2 prises pendant 4 sem. Dose max. : 24 mg/j	56 cp. 4 mg	43,05	I	15 %	0,77
	56 cp. 8 mg	55,64	I	15 %	0,99
	56 cp. 12 mg	65,87	I	15 %	1,18
	1 fl. sol. buv. 100 mL (4 mg/mL)	47,54	I	15 %	47,54
<b>REMINYL LP</b>					
Idem <b>REMINYL</b>	28 gél. 8 mg	43,05	I	15 %	1,54
	28 gél. 16 mg	55,64	I	15 %	1,99
	28 gél. 24 mg	65,87	I	15 %	2,35

## PROPRIÉTÉS

Anticholinestérasique d'action centrale.

**Donépézil** : pic en 3-4 h, demi-vie de 70 h, pas d'interaction avec la nourriture, excrétion rénale.

**Rivastigmine** : absorption complète, pic en 1 h, diminution de la vitesse d'absorption avec la nourriture, demi-vie de 1 h, élimination rénale.

**Galantamine** : pic en 1 h, diminution de la vitesse d'absorption en 1 h.

## INDICATIONS

Pour les 3 produits : formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer.

Pour la **rivastigmine** : traitement symptomatique des formes légères à modérément sévères d'une démence chez les patients atteints d'une maladie de Parkinson.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), crampes.

Asthénie, anorexie, agitation et agressivité.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Théophylline** (diminution de sa clairance), **cholinomimétiques** et **anticholinergiques**, **AINS**.

## DÉMENCES (2)

## Traitement symptomatique

## Troubles psychiques

► *Syndrome dépressif*

Fréquent et parfois difficile à diagnostiquer, il est de plus difficile à traiter compte tenu du risque confusogène de la plupart des **antidépresseurs**.

On utilisera de préférence les **antidépresseurs sérotoninergiques** à petites doses, par exemple la **paroxétine (DEROXAT)** 20 mg/j.

En cas d'anxiété, il faudra éviter les **benzodiazépines** au long cours.

► *Agitation*

Éviter si possible toute thérapeutique car les médicaments sédatifs aggravent généralement l'état neurologique du patient.

Rechercher une cause somatique neurologique (AVC, hématome sous-dural, crise comitiale), ou extraneurologique.

Il faut éviter les **antipsychotiques classiques** (effets secondaires) et privilégier en cas de symptômes sévères les **neuroleptiques de dernière génération** : clozapine (**LÉPONEX**), olanzapine (**ZYPREXA**), rispéridone (**RISPERDAL**) pendant une courte durée.

## Troubles sphinctériens

- Traitement d'un adénome prostatique chez l'homme en évitant les médicaments **cholinergiques** du type **XATRAL** (confusogène).

- Dépistage et traitement d'une infection urinaire.

- **Penilex** la nuit ou en permanence, sondage itératif (chez la femme), ou sonde à demeure : à adapter au cas par cas.

## Rééducation

Kinésithérapie de la marche et de l'équilibre à domicile, x 2 ou 3/sem. Si la marche est impossible, il faut assurer une mobilisation régulière, la mise au fauteuil x 2/j.

Rééducation orthophonique à différents stades de la maladie.

Stimulation cognitive (aux stades légers et modérés de la maladie).

## Alimentation

- Assurer un apport liquidien et calorique suffisant à ces patients qui ont souvent du mal à s'alimenter seuls.

- Apports protidiques supplémentaires en cas de dénutrition **ornithine (CÉTORNAN 10 g)** 1 sach. x 2/j : favorise la cicatrisation et prévient la survenue d'escarres.

- En cas de troubles de déglutition, envisager une nutrition parentérale :

- par sonde nasogastrique ;
- par gastrostomie posée par voie chirurgicale ou endoscopique.

## Soutien aux aidants

Information sur la maladie, sa prise en charge, les associations de familles. Permet de diminuer le risque de maltraitance du patient. Structure de jour ou d'accueil temporaire pour soulager les aidants.

## DÉMENCES (3)

### Lieu du traitement

#### Maintien à domicile

Il est toujours préférable : outre l'aspect psychologique, les patients sont souvent plus autonomes s'ils sont dans des lieux qu'ils connaissent, avec des personnes familières.

Il faut prévoir des aides au domicile à adapter aux besoins de l'entourage.

- Infirmière à domicile : aide au lever, à la toilette et à la prise des médicaments, x 1 ou 2/j.
- Kinésithérapeute à domicile.
- Parfois, alimentation parentérale à domicile.
- Courte hospitalisation dans un service où est connu le patient pour soulager la famille quelques jours.
- Séjours en maison de repos x 1 à 2/an.

Le plus souvent les solutions existent, mais il faut prévoir les aides nécessaires à l'avance plutôt que d'essayer de régler les problèmes dans l'urgence. Cela nécessite un suivi social (assistante sociale) et médical (médecin traitant et correspondant neurologue) proche du patient et de sa famille.

#### Placement en institution [1]

Le placement en institution se pose forcément dans l'évolution d'un patient dément. La décision est à étudier au cas par cas avec l'aide de la famille, du médecin traitant et de l'assistante sociale.

Là encore, il ne faut pas attendre le dernier moment, les délais d'attente étant généralement de plusieurs mois.

Association France Alzheimer et maladies apparentées : 21 bd Montmartre, 75002 Paris. Tél : 01 42 97 52 41. Fax : 01 42 96 04 70, [contact@francealzheimer.org](mailto:contact@francealzheimer.org).

### CONSENSUS

- [1] Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge, HAS, 2011

## SCLÉROSE EN PLAQUES (1)

Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, paracliniques et évolutifs.

L'imagerie par examen IRM est l'examen le plus sensible (> 90 %) mais non spécifique. On utilise les critères diagnostiques de Mac Donald, révisés en 2010, de dissémination spatiale (DIS) et temporelle (DIT).

- DIS :  $\geq 1$  lésion T2 dans au moins 2 des 4 territoires suivants : sous-tentorial, juxtacortical, périventriculaire, médullaire.

- DIT : présence simultanée de lésions asymptomatiques dont certaines sont rehaussées par le gadolinium (Gd) et d'autres non ou 1 nouvelle lésion T2 et/ou 1 lésion Gd+ sur une IRM de suivi. La ponction lombaire n'est plus obligatoire ; elle est réalisée si la dissémination n'est pas démontrée.

On différencie 3 formes évolutives : SEP-RR (récurrente rémittente) dans 80-85 % des cas, SEP-SP (secondairement progressive) dans près de 50 % des cas après un délai variable de 5 à 20 ans, et SEP-PP (progressive primaire) dans 10 à 15 % des cas.

L'annonce du diagnostic est un moment essentiel. Dans l'idéal, le patient est pris en charge de façon globale, multidisciplinaire (médecin généraliste, neurologue, médecin de médecine physique, kinésithérapeute, infirmière, psychologue, etc.) dans le cadre d'un réseau.

Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif de la sclérose en plaques [1].

### Traitement de la poussée

Il faut différencier les véritables poussées de l'aggravation de symptômes préexistants (par une infection, une vaccination, un stress). Les poussées paucisymptomatiques ou très rapidement régressives peuvent ne pas être traitées.

- Hospitalisation si poussée sévère.
- Repos au lit. Arrêt de travail.

### Facteur déclenchant

À rechercher (infection urinaire, sinusite, etc.) et traiter avant la mise en route de la corticothérapie. Cela impose un bilan minimum avant les bolus (clinique, ECBU, hémogramme, etc.).

### Corticothérapie intraveineuse

Elle diminue la sévérité et la durée de la poussée. Pas d'effet préventif sur les poussées ultérieures. Pas d'effet, *a priori*, sur les séquelles à long terme.

#### ► Modalités

- **Prednisolone (SOLUMÉDROL)** 500 mg/j IV lente pendant 5 j par exemple (ou 1 g/j pendant 3 j). Le relais *per os* n'est validé par aucune étude.

En cas de poussée très grave médullaire ou visuelle (cécité), très fortes doses jusqu'à 10 g en dose totale.

#### ► Mesures associées

- Régime sans sel.
- **Oméprazole** : 20 mg/j.
- **KALEORID** : 1 cp./j.

### Échanges plasmatiques

À discuter en l'absence d'amélioration après la corticothérapie IV, dans les poussées sévères.

### Divers

- Prévention des complications de décu-bitus.
- Kinésithérapie douce.
- Arrêt de travail.

### Traitement symptomatique

#### Fatigue

Concomitante d'une poussée : traitement de la poussée.

Fatigue chronique : favoriser le fractionnement des efforts et l'adaptation du rythme de vie. On peut proposer : **amantadine** 200 mg/j (hors AMM) ou si troubles dépressifs **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine** : fluoxétine (**PROZAC**) : 1 cp. le matin.

## ANTISPASTIQUES (1)

### ■ Baclofène

<b>LIORÉSAL</b>					
Progressivement (par paliers de 5 mg) : 1/2 à 9 cp./j en 3 ou 4 prises	50 cp. 10 mg	6,80	I	30 %	0,14
<b>LIORÉSAL</b> injectable	1 amp. 0,05 mg/1 mL	HOP	I		
Voie intrathécale, sous surveillance médicale spécialisée, selon un protocole particulier	1 amp. 10 mg/5 mL	HOP	I		
	1 amp. 10 mg/20 mL	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Analogue structural du GABA agissant surtout au niveau médullaire présynaptique.

Résorption rapide, liaison aux protéines plasmatiques (30 %), demi-vie de 3 à 4 h, élimination essentiellement urinaire.

### INDICATIONS

Contractures spastiques (sclérose en plaques, affections médullaires ou cérébrales).

En cours d'étude dans le sevrage alcoolique. Hoquets rebelles.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergies, myasthénie.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser avec prudence si : épilepsie, troubles psychiatriques, antécédents ulcéreux, affection

vasculaire cérébrale, insuffisance respiratoire ou hépatique, et chez les conducteurs.

Voie intrathécale : protocole selon 3 étapes :  
 – sélection des répondeurs (dose-test de 25 mg en 1 min, augmentée par paliers de 25 mg/24 h, jusqu'à obtention d'une réponse 4 à 8 h après l'injection, ou jusqu'à 100 mg).  
 Si pas de réponse à 100 mg non-répondeur ;  
 – détermination de la dose efficace chez les répondeurs ;  
 – traitement d'entretien en perfusion continue (10 à 1 200 mg/j).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Somnolence et/ou nausées transitoires fréquentes en début de traitement.

Plus rarement hypotonie musculaire, bouche sèche, élévation des transaminases.

Confusion, hallucinations (sujet âgé surtout).

Abaissement du seuil épileptogène.

### ■ Dantrolène

<b>DANTRIUM</b>					
Progressivement, jusqu'à la dose efficace (maximum 100 à 200 mg/j)	50 gél. 25 mg	6,59	I	30 %	0,13
	30 gél. 100 mg	13,01	I	30 %	0,43
	50 gél. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. lyoph. 20 mg	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Agit directement sur les fibres musculaires striées, sans modifier la transmission neuromusculaire ni la conduction nerveuse.

Résorption digestive de 80 %, demi-vie de 8-10 h, élimination urinaire et fécale.

### INDICATIONS

Spasticité pyramidale.

### CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépatique grave, myasthénie.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Hépatites cytolytiques (cas mortels) : surveillance mensuelle du bilan hépatique.

Divers : troubles digestifs, somnolence, confusion, urines orangées, incontinence urinaire, éruptions cutanées acnéiformes.



## SCLÉROSE EN PLAQUES (2)

### Troubles de la marche

**Fampridine (FAMPYRA)** 1 cp. x 2/j, à 12 h d'intervalle pour les formes rémittentes ou progressives avec score EDSS entre 4 et 7. Le traitement est prescrit initialement pour 2 sem. et évalué par un test de marche. En l'absence d'amélioration il n'est pas poursuivi.

### Antispastiques

*Le maintien d'un certain degré de spasticité est parfois indispensable, sa disparition complète pouvant aggraver ou faire apparaître un déficit.*

À doses progressives, jusqu'à la dose efficace : **baclofène (LIORÉAL)** 1/2 à 9 cp./j en 3 prises, ou : **dantrolène (DANTRIUM)** 1 à 8 cp./j en 3 prises ou éventuellement **gabapentine** (hors AMM) : gél. à 400 mg : 1 gél. x 3/j à instituer progressivement et à augmenter si besoin jusqu'à 3 600 mg/j. NB : Dans les formes sévères quand la spasticité empêche le nursing ou la rééducation, on utilise parfois le **baclofène** en intrathécal selon un protocole particulier (cf. **Baclofène**). En cas de spasticité focale, avec retentissement fonctionnel : **toxine botulinique** efficace environ 3 mois.

**SATIVEX** : en cas d'échec des autres traitements et si amélioration clinique au cours d'un traitement initial (test). Il est efficace dans tous les types de SEP.

### Troubles sphinctériens

Le but est de favoriser une bonne vidange vésicale afin de prévenir les infections et de protéger le haut appareil urinaire. Après une échographie vésicale, un bilan urodynamique et l'avis du spécialiste, on peut utiliser les traitements suivants.

• *En absence de résidu post-mictionnel :*

Médicaments **anticholinergiques** : **trospium (CERIS)** 2 cp./j, **flavoxate (URISPASS)** 3 cp./j ou **oxybutynine (DITROPAN)** 1 à 3 cp./j pour les mictions impérieuses.

**BOTOX** en injection intradétrusorienne si les médicaments **anticholinergiques** ne sont pas efficaces.

• *Si résidu post-mictionnel :*

– Avec dysynergie vésico-sphinctérienne, **alphabloquant**, **alfuzosine (XATRAL)**.

– Avec hypoactivité vésicale et dysurie, sondages vésicaux (hétéro ou autosondages intermittents), voire parfois sonde à demeure.

**Prévention des infections urinaires** : maintien d'une diurèse supérieure à 2 L/j, aseptie stricte en cas de sondages intermittents, surveillance régulière de l'ECBU, traitement précoce de toute infection urinaire.

► **Médicaments anticholinergiques**

**Oxybutynine (DITROPAN)** 1 à 3 cp./j pour les mictions impérieuses.

### Constipation

Régime riche en fibres, **laxatifs**, lavements.

### Douleurs ou dysesthésies

• Névralgie du trijumeau.

• **Carbamazépine (TÉGRÉTOL)** 200 mg 1 à 3 cp./j à doses progressives (AMM) ou **oxcarbazépine (TRILEPTAL)** cp. à 300 mg 1 cp x 2/j puis 1 cp. le matin, 2 le soir et augmenter si besoin. **Lamotrigine (LAMICTAL)** (hors AMM), cp. à 25 et 50 mg : débiter progressivement (cf. Traitement de l'épilepsie) jusqu'à 150 mg/j et augmenter progressivement si besoin.

• Douleurs neuropathiques : **imipramine**, **amitriptyline**, **gabapentine**, **prégabaline** ou **clonazépam (RIVOTRIL)** (gouttes).

### Troubles cognitifs et anxio-dépressifs

Les troubles cognitifs concernent principalement l'attention, la fonction exécutive et la mémoire. Intérêt des tests neuropsychologiques.

Psychothérapie et/ou relaxation, en association avec un traitement antidépresseur si besoin.

### Kinésithérapie

• Rééducation motrice au domicile, au long cours, visant à préserver le maximum d'autonomie.

• Ne pas aller jusqu'à la fatigue, éviter le travail analytique (bicyclette, poulies).

### Ergothérapie

Dès qu'une gêne des membres supérieurs apparaît ou qu'il existe un retentissement sur l'autonomie quotidienne.

## ANTISPASTIQUES (2)

### ■ Tétrahydrocannabinol + cannabidiol

<b>SATIVEX</b>					
Période de titration (jusqu'à 2 sem.) Dose usuelle : 8 pulv./j Dose max. : 12 pulv./j Min. 15 min entre 2 pulv. Traitement réévalué à 4 sem.	48 pulv. bucc. (5,5 mL) 90 pulv. bucc. (10 mL)		S S	NR NR	

#### PROPRIÉTÉS

Agoniste des récepteurs CB1 et CB2 aux cannabinoïdes.

Diminue la rigidité des membres et améliore les fonctions motrices.

Pas de syndrome de sevrage, dépendance peu plausible.

Risque faible de détournement à des fins récréatives : le pic plasmatique et son temps d'apparition pour le cannabis fumé sont, respectivement, plus élevé et plus court que ceux de **SATIVEX**.

#### INDICATIONS

Spasticité modérée à sévère chez le patient adulte atteint de sclérose en plaques (SEP) :

- qui n'a pas suffisamment répondu à d'autres traitements antispastiques ;
- et pour lequel un essai initial du traitement a démontré une amélioration cliniquement significative des symptômes liés à la spasticité.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Antécédents familiaux ou personnels de troubles psychiatriques autres que la dépression.

Allaitement.

## SCLÉROSE EN PLAQUES (3)

### Traitement de fond [1]

Son but est de diminuer le nombre de poussées. On surveille son efficacité par l'examen clinique, le score EDSS (*Expanded Disability Status Scale*) qui permet d'évaluer le handicap et l'IRM.

À retenir : EDSS 3 marche parfaitement autonome, EDSS 6 : aide unilatérale nécessaire.

### SEP récurrente rémittente

#### ► Immunomodulateurs

#### Interférons bêta

Traitement de fond en première intention actuellement. Diminue d'un tiers le nombre de poussées.

- interféron  $\beta$ -1b (**BETAFERON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**) : 1 injection SC tous les 2 j dans les formes rémittentes ou secondairement progressives (EDSS < 6) ;
- interféron  $\beta$ -1a : **AVONEX** 1 inj. IM/sem. ou **REBIF** 1 injection SC x 3/sem.

#### Acétate de glatiramer

**COPAXONE** : 20 mg/j en sous-cutané si intolérance ou contre-indication(s) aux interférons. Diminue de 30 % le nombre de poussées et de 30 % à 2 ans le nombre de lésions à l'IRM. Pas d'effet sur la progression du handicap.

#### ► Immunosuppresseurs

- Utilisés pour les formes actives de SEP-RR ; soit ne répondant pas au traitement par interféron bêta, bien conduit soit pour les formes graves d'emblée (cf. Indications).
- Natalizumab (**TYSABRI**) , 300 mg/perf. Réduit de 68 % le taux de rechute, le niveau de handicap résiduel et le nombre des lésions IRM. Possibilité de perte d'efficacité par Ac anti-natalizumab et surtout

risque à long terme de leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP). Le risque doit être évalué avant le début du traitement, la sérologie JC virus prélevée et le patient informé.

– **Fingolimod (GILENYA)** per os 1 gél/j. À utiliser en 1<sup>re</sup> indication si sérologie JC virus+.

– **Mitoxantrone (ELSEP)**, 12 mg/m<sup>2</sup> (sans dépasser 20 mg/perf.) x 1/mois pendant 6 mois. Réduit le taux de rechute à 68 %, le niveau de handicap résiduel et le nombre des lésions IRM. Dose cumulative maximale autorisée : 72 mg/m<sup>2</sup>. Risque de leucémies. Utilisation très limitée.

• Autres **immunosuppresseurs** non spécifiques dont l'efficacité n'est pas prouvée :

- **azathioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j per os, plusieurs mois. Surveillance de la NFS régulière ;
- **cyclophosphamide (ENDOXAN)**. En cures brèves, par perfusion à fortes doses. Rarement utilisé.

### Événement démyélinisant isolé

En cas de critères radiologiques de dissémination spatiale et temporelle avec prise de contraste on peut proposer des traitements immunomodulateurs : interféron  $\beta$ -1a (**REBIF**), interféron  $\beta$ -1b (**AVONEX**), interféron  $\beta$ -1b (**BÉTAFÉRON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**) ou acétate de glatiramer (**COPAXONE**).

### SEP secondairement progressive

Interféron  $\beta$ -1b (**BÉTAFÉRON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**).

Mitoxantrone.

Corticoïdes IV mensuels.

### SEP progressive primaire

Pas de traitement efficace défini. Éventuellement corticoïdes IV mensuels.

## ANTISPASTIQUES (3)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### Période de titration

Jour	Nb de pulv. matin	Nb de pulv. soir	Nb total de pulv.
1	0	1	1
2	0	1	1
3	0	2	2
4	0	2	2
5	1	2	3
6	1	3	4
7	1	4	5
8	2	4	6
9	2	5	7
10	3	5	8
11	3	6	9
12	4	6	10
13	4	7	11
14	5	7	12

Conservation : au frais avant ouverture, à température ambiante après ouverture, jusqu'à 28 j.

À la 1<sup>re</sup> administration, trouble possible de la fréquence cardiaque et de la tension : traitement non recommandé en cas de pathologie cardiovasculaire.

Contraception efficace pendant traitement et 3 mois après arrêt. Traitement non recommandé pendant la grossesse (rapport bénéfice/risque à évaluer).

Ne pas conduire ou utiliser des machines en cas d'étourdissement ou somnolence.

Insuffisance rénale ou hépatique : évaluation fréquente du traitement (effet prolongé).

Varié le site buccal d'administration pour éviter les effets indésirables locaux.

**SATIVEX** peut être illégal dans un pays étranger : s'informer avant un voyage.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Étourdissements, somnolence, fatigue : fréquents lors des 4 premières sem. de traitement. Ne pas arrêter le traitement.

Anxiété, illusions, modifications de l'humeur,

idées paranoïaques : transitoires et d'intensité légère à modérée.

Désorientation, confusion, hallucinations, psychose, idées suicidaires : arrêt du traitement.

Douleur, gêne buccale, dysgueusie, ulcération buccale et glossodynie.

Chute (diminution de spasticité).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool à éviter.

Diminution des concentrations de **SATIVEX** (inducteurs du CYP3A4) : **carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **phénobarbital**, **phénytoïne**, **rifampicine**, **rifabutine**, **dexaméthasone**, millepertuis, etc.

Augmentation des concentrations de **SATIVEX** (inhibiteurs du CYP3A4) : **macrolides**, **antifongiques azolés**, **inhibiteurs de protéases du VIH**, **diltiazem**, **vérapamil**, **acide valproïque**, **cimétidine**, jus de pamplemousse, etc.

Renouveler la titration en cas de coadministration de ces médicaments.

Prudence avec les médicaments hypnotiques, les autres **antispastiques** (risque plus important de chutes), la **digoxine**.

## SCLÉROSE EN PLAQUES (4)

### Prise en charge globale

#### Soutien psychologique [1]

Il est réalisé par le thérapeute, mais également par la famille, les associations, un psychologue éventuellement.

#### Éducation

- Éducation du patient : nécessité de l'implication active du patient, information sur la maladie, ses conséquences sur la vie personnelle, familiale et socioprofessionnelle. Information sur les traitements, leurs effets secondaires possibles. Apprentissage de la fatigue et de la vie au quotidien, des injections, des sondages. Attention aux séjours dans les pays chauds.

Aucune étude prospective n'a montré que la vaccination contre l'hépatite B augmentait le risque de développer une sclérose en plaques. Cependant elle pourrait favoriser les poussées chez les patients ayant une maladie avérée. Il faut donc éviter la vaccination contre l'hépatite B chez les patients ayant une SEP. Le rapport bénéfice/risque doit être évalué pour les autres membres de la famille. Les autres vaccinations (notamment contre la grippe) sont autorisées en dehors des poussées.

- Éducation de l'entourage : informer la famille du handicap et de son évolution.

### Grossesse

Il n'y a pas de contre-indication à une grossesse mais il faut arrêter les traitements de fond.

Il semble qu'elle ne modifie pas le pronostic de la maladie : il y a classiquement moins de poussées durant la grossesse mais une recrudescence dans le post-partum.

### Adaptation professionnelle

#### Prise en charge à 100 %

#### Associations

NAFSEP : Nouvelle association française des sclérosés en plaques : 7, av. Albert Durand 31700 Blagnac. Tél. 05 34 55 77 00. <http://www.nafsep.org>.

UNISEP : regroupement de plusieurs associations : 14 rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry sur Seine. Tél. 01 43 90 39 39. Fax : 01 43 90 14 51. [contact@unisep.org](mailto:contact@unisep.org).

ARSEP : Association pour la recherche sur la sclérose en plaques : 14 rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine. Tél. 01 43 90 39 39 Fax : 01 43 90 14 51. <http://www.arsep.org>.

Score EDSS : <http://www.neurologies.net>

### CONSENSUS

[1] Sclérose en plaques, HAS, 2006

## NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES (1)

Les neuropathies périphériques regroupent les polyneuropathies (ou polynévrites), les mononévrites multiples (ou multinévrites) et les polyradiculonévrites.

La conduite à tenir est essentiellement étiologique. Il n'existe en effet pas de médicament à visée neurotrophique, et le traitement se résume donc le plus souvent à celui de la cause. Les polyvitaminothérapies souvent prescrites n'ont en fait jamais fait la preuve de leur efficacité.

On y associera un traitement symptomatique et une rééducation fonctionnelle.

Les étiologies des neuropathies diffuses sont extrêmement nombreuses (cf. Tableau), nous n'étudierons ici que les plus fréquentes.

### Traitement étiologique

#### Polynévrites

##### ► Polynévrites diabétiques

- Équilibration aussi rigoureuse que possible du diabète par insulinothérapie.
- Suppression des intoxications associées, notamment alcoolique.

Une polyvitaminothérapie est souvent instituée comme précédemment.

##### ► Polynévrite alcool-carentielle

Très fréquente, il ne faut cependant pas conclure trop vite à cette étiologie sans avoir éliminé une autre cause qui peut d'ailleurs lui être associée.

Son traitement repose sur les moyens suivants.

##### • Suppression totale et définitive de l'alcool

Elle est bien sûr essentielle : toute reprise même modérée peut entraîner une rechute.

- Vitaminothérapie : traitement d'attaque par **vitamine B1 (BÉNERVA)** 500 mg 1 amp. IM x 2/j pendant 3 sem. à 1 mois. Ce traitement est souvent associé à une supplémentation en **vitamine B6** et **PP** *per os* (250 mg/j). Traitement d'entretien par

**polyvitamines du groupe B**, par exemple **VITAMINE B1-B6** 4 cp./j.

##### ► Carence en folates

Elle peut être la cause d'une polynévrite décevante, notamment, au cours d'une grossesse.

Son traitement repose sur la supplémentation en **acide folique** : **SPÉCIAFOLDINE** 3 cp./j pendant toute la grossesse (ou jusqu'à correction de la carence).

##### ► Polynévrites toxiques et médicamenteuses

Le traitement repose sur l'arrêt de l'exposition au toxique. Pour certains, il existe des traitements spécifiques.

Polynévrites à l'arsenic, au mercure ou à l'or : **BAL**, polynévrites aux organophosphorés : **CONTRATHION**, au plomb : **chélateur (EDTA)**. Cf. Traitement du saturnisme. Neuropathie à l'**isoniazide** : vitaminothérapie (**BÉCILAN**).

##### ► Neuropathies amyloïdes familiales

Le traitement de référence est la greffe hépatique pour les neuropathies amyloïdes à mutation val30met.

La **tafamidis (VYNDAQEL)** 1 cp./j peut être donné chez les patients (mutation val30met) en attente de la greffe (délai 6-12 mois) ou en remplacement de la greffe pour les patients aux formes toutes débütantes ou pour les patients ayant une contre-indication à la greffe. Dans les autres types de mutation, pas d'indication.

##### ► Polynévrites infectieuses

Liées au VIH :

• Neuropathies liées au virus lui-même : de séroconversion (régression spontanée), polyradiculonévrites inflammatoires (cf. Syndrome de Guillain-Barré).

• Neuropathies dues aux **antirétroviraux** : arrêt du médicament responsable.

• Neuropathies infiltratives (lymphome, sarcome de Kaposi) : traitement étiologique.

• Neuropathies à CMV : atteinte pluriradiculaire avec syndrome de la queue de cheval à traiter par **ganciclovir** ou **foscarnet** (cf. VIH).

## ANTIAMYLOÏDE

## ■ Tafamidis

VYNDAQEL					
20 mg/j en 1 prise	30 caps. 20 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Stabilisateur spécifique de la transthyrétine (TTR).

La polyneuropathie amyloïde à TTR est une neuropathie dégénérative axonale à multiples facettes caractérisée par des dysfonctionnements du système nerveux sensitif, moteur et autonome. La dissociation du tétramère de TTR en monomères est l'étape limitante dans la pathogénie de la polyneuropathie amyloïde à TTR aussi connue comme polyneuropathie amyloïde familiale à TTR (TTR-FAP). Le **tafamidis** se lie de façon non spécifique aux deux sites de fixation de la thyroxine présents sur la forme native tétramérique de la TTR, empêchant sa dissociation en monomères.

**INDICATIONS**

Traitement de l'amylose à TTR chez les patients adultes présentant une polyneuropathie symp-

tomatique de stade 1 pour retarder le déficit neurologique périphérique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Transplantation hépatique.

Hypersensibilité au produit, grossesse, allaitement, âge < 18 ans.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles gastro-intestinaux : diarrhée, douleurs abdominales.

Troubles génito-urinaires : candidose, infection urinaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pas d'activité inductrice ou inhibitrice de CYP. Aucune autre étude n'a été menée.

**PRESCRIPTION**

Médicament soumis à prescription hospitalière, réalisée par un spécialiste en neurologie.

## NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES (2)

### Multinévrites

#### ► Vascularite nécrosante

Traitement par **corticoïdes** éventuellement associé à **immunosuppresseur** (cyclophosphamide).

#### ► Diabète

Équilibration optimale des glycémies par insulinothérapie.

#### ► Mononévrite multiple de la lèpre

**Antibiotiques.**

### Polyradiculonévrites

#### ► Polyradiculonévrites inflammatoires aiguës

Cf. Syndrome de Guillain-Barré.

La classification des autres polyradiculonévrites ainsi que leur traitement n'étant pas encore codifiés, nous ne donnerons que des orientations thérapeutiques. La prise en charge de ces maladies complexes ne se conçoit qu'en centre spécialisé, dans le cadre d'essais thérapeutiques.

#### ► Polyradiculonévrites chroniques inflammatoires

##### • Immunoglobulines polyvalentes (Ig) IV de 1<sup>re</sup> intention.

• En deuxième intention, corticothérapie à fortes doses (1 à 1,5 mg/kg/j de **prednisone**), mais risque non négligeable de cortico-dépendance.

• Échanges plasmatiques : à réserver aux patients ne réagissant pas ou plus aux **immunoglobulines polyvalentes** ou à la corticothérapie.

#### ► Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction

**Immunoglobulines polyvalentes IV.** Les **corticoïdes** et les échanges plasmatiques ne sont pas efficaces.

#### ► Neuropathies périphériques associées à une gammapathie monoclonale

• Gammapathie monoclonale « bénigne » ou MGUS (IgM-MGUS > IgA et IgG-MGUS) : – abstention thérapeutique si symptômes modérés ;

– **anticorps anti-CD20 (rituximab)** si IgM-MGUS avec activité anti-MAG (*Myelin-Associated Glycoprotein*).

• Gammapathie monoclonale maligne (myélome multiple, maladie de Waldenström, syndrome de POEMS, plasmocytome) :

– chimiothérapie de la maladie hémato-logique ;

– radiothérapie pour le plasmocytome solitaire.

### Traitement symptomatique

Il s'agit surtout de traiter les douleurs.

• **Prégabaline (LYRICA)** en débutant à 75 mg/j puis en augmentant progressivement à 150 mg/j en 2 prises. Au maximum 600 mg/j. Nécessité d'adapter les posologies à la fonction rénale.

• **Gabapentine (NEURONTIN)** débuter à 300 mg en une prise. Puis augmentation progressive à 900 mg/j en 3 prises. Dose maximale 3 600 mg/j à adapter. Nécessité d'adapter les posologies à la fonction rénale

• **Benzodiazépine (RIVOTRIL)** sol. buvable : adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance (sommolence fréquente).

• **Tricyclique (ANAFRANIL ou LAROXYL)** 25 mg/j *per os* ou IVL puis augmentation progressive jusqu'à la dose efficace.

• **Carbamazépine (TÉGRÉTOL LP)** 200 mg 1/2 cp. x 2/j puis augmentation jusqu'aux doses efficaces. Intéressant en cas de douleurs fulgurantes. Effets secondaires à surveiller.

### Rééducation fonctionnelle

Dans tous les cas, il faut associer kinésithérapie et physiothérapie afin d'éviter les séquelles fonctionnelles (rétractions tendineuses, déformations ou attitudes vicieuses).

### Étiologies

Les étiologies des neuropathies périphériques diffuses sont extrêmement nombreuses. La recherche de la cause de ce type de neuropathie est pourtant fondamentale, son traitement se résumant souvent au traitement étiologique.



## NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES (3)

### Principales étiologies des neuropathies périphériques diffuses

Alcooliques et carentielles	Éthylisme chronique. Carence en vitamines B1, B6, B12, folates, PP.
Métaboliques	Diabète. Hypothyroïdie. Insuffisance rénale chronique avancée. Porphyrie aiguë intermittente.
Maladies de système	Vascularites : périartérite noueuse, Wegener, Churg-Strauss, etc. Sarcoïdose, syndrome de Gougerot-Sjögren primitif, lupus, etc.
Toxiques	Arsenic. Métaux lourds : plomb, mercure, thallium, or, etc. Organophosphorés : insecticides, etc. Acrylamide : ciments. Hexacarbones : industrie des laques et des colles.
Médicaments	<b>Anticancéreux</b> : vincristine, cisplatine, paclitaxel, thalidomide. <b>Antibiotiques</b> : isoniazide ( <b>RIMIFON</b> ), <b>DISULONE</b> , métronidazole ( <b>FLAGYL</b> ) (au long cours), nitrofurantoïne ( <b>FURADANTINE</b> ). <b>Antirétroviraux</b> : ddl. Pneumologie : <b>almitrine (VECTARION)</b> . Cardiologie : <b>amlodarone (CORDARONE)</b> , <b>dihydralazine (NÉPRESSOL)</b> . Neurologie : <b>phénytoïne (DI-HYDAN)</b> . Autres : <b>vitamine B6 pyridoxine</b> (si traitement prolongé), <b>disulfirame (ESPÉRAL)</b> .
Infectieuses	Associées au VIH. Lèpre, maladie de Lyme, mononucléose infectieuse, etc.
Polyradiculonévrites	Idiopathiques : aiguë (syndrome de Guillain-Barré) ou chronique. Neuropathie motrice multifocale avec bloc de conduction.
Gammopathie monoclonale	Maligne : maladie de Waldenström, maladie de Kahler. « Bénigne » (MGUS) : à IgM (avec ou sans Ac anti-MAG), IgG ou IgA.
Neuropathie amyloïde	
Paranéoplasiques	Neuropathie sensitive subaiguë de Denny-Brown (Ac anti-Hu, associée à un cancer du poumon à petites cellules). Associées à une maladie de Hodgkin, à un cancer du poumon, etc.
Héréditaires	Maladie de Charcot-Marie-Tooth, maladie de Thévenard.

**ALCOOLISME - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (1)****Principes généraux****Généralités**

Les complications de l'alcoolisme chronique peuvent être dues :

- à une intoxication aiguë ;
- à un syndrome de sevrage ;
- à la toxicité directe de l'alcool sur le système nerveux ;
- aux carences nutritionnelles, notamment en vitamines.

Attention : une atteinte neurologique chez un alcoolique connu peut n'avoir aucun rapport avec l'alcoolisme (hématome intracranien, AVC, etc.). Inversement, une complication neurologique peut révéler un alcoolisme chronique non connu.

**Dans tous les cas**

- Sevrage total en alcool, au mieux en milieu hospitalier au début.
- Suivi et soutien psychologique du patient pour éviter les rechutes, au besoin après un séjour en postcure, en faisant appel aux foyers ou aux associations antialcooliques :

Alcooliques Anonymes : 21, rue Trousseau - 75011 Paris - tél : 01 48 06 43 68  
La Croix Bleue : 47, rue de Clichy - 75009 Paris - tél : 01 42 85 30 74

**Ivresse pathologique**

Ne pas passer à côté d'un hématome intracranien, fréquent sur ce terrain. Scanner cérébral au moindre doute (signes de localisation).

**Ivresse pathologique proprement dite****► Élimination et traitement****d'une hypoglycémie****► Surveillance rapprochée**

Hémodynamique, de la conscience, de la fréquence respiratoire et à la recherche de signes de localisation.

**► Traitement sédatif**

En cas d'agitation, sous surveillance de la tension artérielle et de la fréquence respiratoire, on a le choix entre :

- **méprobamate (ÉQUANIL)** 400 mg 1 amp. IM renouvelable x 6/24 h ;
- ou **diazépam (VALIUM)** 10 mg 1 amp. renouvelable x 2 à 4/24 h.

**Coma éthylique (cf. Complications neurologiques (3))****► Hospitalisation en soins intensifs****► Traitement symptomatique**

- Hémodynamique, respiratoire.
- Traitement d'une hypoglycémie.
- Réchauffement si hypothermie.
- Surveillance rapprochée.

**► Traitement préventif**

Cf. Sevrage alcoolique.

**Syndrome de sevrage alcoolique [1]****Traitement préventif, symptômes mineurs****► Hydratation abondante**

Par voie orale ou parentérale si besoin : au moins 2 L/j en associant des solutions sucrées (jus de fruits, glucosé 5 %) et salées (bouillons, sérum physiologique).

**► Vitaminothérapie per os**

**Vitamine B1** 500 mg/j, **vitamine B6** 250 mg/j et **vitamine PP** 250 mg/j.

**► Sédation per os**

**Diazépam (VALIUM)** 10 mg x 3/j ou **oxazépam (SÉRESTA)** à la même posologie.

NB : Autant que possible, éviter les sédatifs en cas de cirrhose.

## VITAMINOTHÉRAPIE B1 ET B6

## ■ Vitamine B1 (ou thiamine)

<b>BÉNERVA</b>					
Traitement d'attaque : 500 à 1 g/j Traitement d'entretien : 250-500 mg/j Inj. IM : même posologie sous surveillance médicale stricte	40 cp. 250 mg 10 amp. 500 mg	HOP HOP			
<b>BÉVITINE</b>					
Idem <b>BÉNERVA</b> <i>per os</i> Voie inj. IM seulement	20 cp. 250 mg 5 amp. 100 mg	2,95		NR 65 %	0,59

**PROPRIÉTÉS**

Bonne absorption digestive sauf en cas de gastrite éthylique concomitante. Élimination urinaire. Les réserves de l'organisme ne permettent de couvrir que 8 j en cas de carence d'apports.

**INDICATIONS**

Béribéri.

Alcoolisme : prévention des états carentiels, polynévrites, encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Proposée à fortes doses dans certains syndromes douloureux d'origine neurologique ou rhumatologique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Intolérance connue au produit.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Formes injectables : surveillance médicale stricte en raison des risques d'hypotension et exceptionnellement de choc anaphylactique. Douleurs au point d'injection.

## ■ Vitamine B6 (ou pyridoxine)

<b>BÉCILAN</b>					
Voie orale : 250 mg à 1 g/j IV ou IM : 100 à 750 mg/j	40 cp. 250 mg 5 amp. 250 mg	2,97		NR 65 %	0,59
<b>PYRIDOXINE</b>					
IV ou IM : 250 mg à 1 g/j	100 amp. 250 mg	HOP			
<b>VITAMINE B6 RICHARD</b>					
<i>Per os</i> : 250 à 750 mg/j	20 cp. quadriséc. 250 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Absorption rapide, élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Prophylaxie et traitement des états carentiels en **vitamine B6**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de choc anaphylactique avec les solutions injectables.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque de neuropathies sensitives en cas de surdosage (fortes doses > 2 g/j ou traitements prolongés). Réversibles en 6 mois environ après arrêt du traitement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La **vitamine B6** diminue l'action de la **lévodopa** par stimulation de la dopadécarboxylase périphérique.

## ALCOOLISME - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (2)

### Delirium tremens

Il s'agit d'une urgence thérapeutique.

#### Hospitalisation en urgence

- Attention car risque suicidaire.
- Chambre seule, au calme, faiblement éclairée la nuit, pas de contention (si possible).

#### Réhydratation parentérale

- 2/3 de sérum physiologique et 1/3 de glucosé 5 % avec ajout de KCl à adapter.
- Vitamines B1, B6 et PP dans la perfusion.

#### Traitement sédatif

**Diazépam (VALIUM)** 10 mg x 3 à 6/j *per os* ou IM.

En cas d'insuffisance hépatique, on préfère l'oxazépam (**SÉRESTA**) : 10 mg x 3 à 6/j *per os*.

La durée du traitement sédatif ne devrait pas dépasser une semaine, sauf en cas de dépendance aux **benzodiazépines**.

#### Traitement étiologique (infection, etc.)

#### Surveillance rapprochée

### Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

#### Vitaminothérapie en urgence

- Vitamine B1 500 mg à 1 g par 24 h en IM ou dans la perfusion.
- Associée systématiquement à la **vitamine B6** et **PP** 250 mg/j.

#### Hyperhydratation

2 à 3 L/j *per os* ou IV (sérum physiologique). Pas de sérum glucosé : risque d'aggraver la symptomatologie (consommation de **thiamine**).

### Autres complications neurologiques

#### Hématome sous-dural chronique

Toujours y penser devant des troubles de conscience chez un alcoolique chronique,

surtout s'il existe des signes de localisation neurologique. Scanner cérébral en urgence au moindre doute et avis neuro-chirurgical pour évacuation.

#### Neuropathie périphérique alcoolique

► *Sevrage total et définitif en alcool*

► *Corrections nutritionnelles*

- Apports vitaminiques : **vitamine B6** surtout (250 mg/j) mais aussi **B1** (500 mg/j), **PP** (250 mg/j) et **folates**.
- Apports caloriques et protidiques adaptés.

► *Traitement des douleurs*

- **Clonazépam (RIVOTRIL)** en gouttes : adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance.
- **Amitriptyline (LAROXYL)** jusqu'à des doses de 100 à 150 mg/j.

#### Atrophie cérébelleuse

Elle apparaît en général de façon aiguë ou subaiguë. L'évolution se fait spontanément vers la stabilisation voire l'amélioration.

Le sevrage total et définitif en alcool est indispensable.

Une kinésithérapie de la marche et de l'équilibre peut être bénéfique.

#### Encéphalopathie de Marchiafava-Bignami

Elle est due à une démyélinisation du corps calleux pouvant s'étendre à la substance blanche hémisphérique. L'évolution se fait vers la démence (qui peut être partiellement réversible). Il n'y a pas de traitement spécifique.

#### Myélinolyse centro-pontine

Elle est classiquement responsable d'un « locked in syndrome » après correction trop rapide d'une hyponatrémie.

Le traitement reste symptomatique, l'évolution est le plus souvent fatale à court terme.

## ALCOOLISME - COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES (3)

### Coma éthylique

Le coma éthylique est une urgence thérapeutique nécessitant l'hospitalisation en unité de soins intensifs pour prise en charge thérapeutique et bilan des complications vitales d'une intoxication alcoolique aiguë.

Complications à craindre en cas d'intoxication éthylique aiguë massive :

- hémodynamiques : collapsus vasoplogique ;
- respiratoires : dépression respiratoire, pneumopathie d'inhalation ;
- neurologiques : crises convulsives ;
- métaboliques : hypoglycémie à rechercher systématiquement, rhabdomyolyse (risques d'hyperkaliémie, d'insuffisance rénale aiguë), acidocétose ;
- digestives : hépatite aiguë, pancréatite aiguë.

Ne pas oublier toutes les autres causes de coma en rapport ou non avec l'alcool (infectieuses, médicamenteuses, toxiques, accidents vasculaires cérébraux, hématome sous-dural, etc.).

- Traitement proprement dit : en unité de soins intensifs.
- Correction d'une éventuelle hypoglycémie : 1 amp. de glucosé 30 % (systématique pour certains).
- Scope, *Dynamap*, voie veineuse périphérique.
- Assurer la liberté des voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, intubation et ventilation assistée si besoin.
- Réchauffement si hypothermie.
- Remplissage vasculaire par **macromolécules** si signes de choc : **VOLUVEN** 500 mL IV sur 30 min.
- Équilibration hydroélectrolytique, apport hydrique glucosé suffisant : par exemple 2,5 L de glucosé 5 %/j avec 2 g de NaCl/L et apports de **potassium** en fonction de la kaliémie.
- Apports systématiques de vitamines par voie parentérale : **vitamine B1** 500 mg/j dans la perfusion ; **vitamine B6** et **vitamine PP** 250 mg/j IV.
- Surveillance toutes les heures au début : pouls, température, tension artérielle, conscience, examen neurologique sommaire, diurèse, fréquence respiratoire.

### Bilan complémentaire systématique devant un coma éthylique

IMMÉDIATEMENT	BIOLOGIE	AUTRES EXAMENS
Glycémie capillaire. Traitement immédiat d'une hypoglycémie.	NFS, plaquettes, TP, TCA, ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine, bilan hépatique et enzymes musculaires, amylasémie et lipasémie. Alcoolémie, recherche de toxiques associés. Gaz du sang.	ECG. Radiographie thoracique. Scanner cérébral au moindre doute (signe de localisation neurologique).

## POLYRADICULONÉVRITE AIGÜE INFLAMMATOIRE

La polyradiculonévrite aigüe inflammatoire porte également le nom de syndrome de Guillain-Barré.

Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Le pronostic est lié à l'extension rapide du déficit moteur pouvant s'étendre aux muscles respiratoires, toucher le système nerveux autonome ou entraîner des complications de décubitus.

### Traitement symptomatique

#### Traitement des formes peu sévères

##### ► Hospitalisation en urgence

Surveillance proche d'un service de réanimation.

##### ► Surveillance rapprochée

- Testing musculaire x 2/j.
- Déglutition avant chaque repas.
- Respiration x 3/j : ampliation thoracique, toux, fréquence respiratoire.
- Au mieux surveillance de la capacité vitale pulmonaire quotidienne.

##### ► Prévention des complications de décubitus

- Prévention des escarres par massages, changements de position, matelas à eau.
- Kinésithérapie passive quotidienne.
- Régime hyperprotidique, **vitamines**.
- Anticoagulation préventive : ex,

**FRAXIPARINE** 5 000 UI SC/j.

#### Traitement des formes graves

##### ► Transfert en service de soins intensifs

Il est effectué en cas de :

- troubles de déglutition ;

- et/ou troubles respiratoires ;
- et/ou troubles tensionnels ou anomalie cardiaque.

##### ► Scope, surveillance tensionnelle continue

- **Dopamine** si chute tensionnelle.

- **Atropine** si bradycardie.

##### ► Sonde gastrique, sonde urinaire

##### ► Ventilation assistée

Intubation trachéale (au mieux par trachéotomie) et ventilation assistée dès que la capacité vitale est inférieure à 15 mL/kg.

##### ► Prévention

- **FRAXIPARINE** : 5 000 UI SC/j.

- **Oméprazole** : 20 à 40 mg/j.

### Traitement spécifique

Deux traitements sont susceptibles d'écourter la maladie dans les formes sévères. Leur mise en route doit être la plus précoce possible.

#### Veinoglobulines

**Immunoglobulines polyvalentes** : 0,4 g/kg/j pendant 5 j.

#### Plasmaphèreses

4 à 6 échanges plasmatiques à raison de 1 séance 1 j/2.

### Kinésithérapie

Elle est indispensable, aussi bien à la phase aigüe (mobilisation passive pour éviter les rétractions tendineuses), qu'au décours pour aider à la récupération fonctionnelle complète.

## SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) (1)

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot [1] est une maladie dégénérative rare du système nerveux touchant le motoneurone. L'examen de référence est l'électromyogramme. L'annonce diagnostique est essentielle et requiert un accompagnement. Le patient doit bénéficier d'une information sur les

traitements, les modalités d'accès aux ressources disponibles pour la prise en charge et l'orientation vers les organismes qui peuvent l'aider. Son pronostic est constamment péjoratif en quelques années. La prise en charge du patient doit être multidisciplinaire : médicale, psychologique et sociale au mieux à partir d'un centre SLA.

### Principaux diagnostics différentiels de la sclérose latérale amyotrophique

*Neuropathie motrice pure avec blocs de conduction*

Le diagnostic se fait sur la présence de blocs de conduction à l'électromyogramme, mais ceux-ci étant très proximaux et difficiles à mettre en évidence, il faut demander spécifiquement à les rechercher.

*Compression médullaire cervicale*

Quoique généralement accompagnée de signes sensitifs, il faut éliminer par une IRM

cervicale une myélopathie cervicarthrosique, une malformation de la charnière cervico-occipitale ou une tumeur du trou occipital pouvant donner une symptomatologie proche de la SLA.

*Amyotrophies spinales progressives*

Il s'agit également d'une atteinte de la corne antérieure mais d'évolution beaucoup plus lente et sans atteinte bulbaire.

### Traitement médical

#### Traitement spécifique

Il n'existe pas de traitement curatif de la SLA.

Le **riluzole** est le seul médicament ayant montré son efficacité sur le taux de survie. Il est légitime de le prescrire au patient même si son action reste modeste, dès que le diagnostic est suspecté.

**Riluzole (RILUTEK)** 1 cp. à 50 mg x 2/j.

#### Traitement symptomatique

- Crampes : **HEXAQUINE** 1 cp. x 3/j.
- Douleurs liées aux rétractions tendineuses ou aux points de pression : kinésithérapie, ergothérapie et traitement médicamenteux : **morphiniques** pour les algies rebelles, **prégabaline**, **gabapentine** et **tricycliques** pour les douleurs neuropathiques, **antispastiques** pour la spasticité : **baclofène (LIORÉSAL)** 1/2 cp. x 3/j jusqu'à 3 cp. x 3/j.

- Troubles anxio-dépressifs : psychothérapie, relaxation, **antidépresseurs**.
- Troubles du sommeil : éviter les **benzodiazépines**.
- Troubles salivaires : pour lutter contre la stase tricycliques, **scopolamine**, **toxine botulinique A**.
- Constipation : régime riche en fibres, **laxatifs**, microlavements.
- Troubles nutritionnels : surveillance du poids, aliments diététiques hyperprotéiques et hypercaloriques dès l'apparition d'une perte de poids. Eau gélifiée et épaississants dès l'apparition de troubles de la déglutition.
- Surinfections bronchopulmonaires : fréquentes, surtout en cas de troubles de déglutition. À traiter précocement : **AUGMENTIN** 500 mg 4 à 6 cp./j pendant 10 j, et kinésithérapie respiratoire.

## INHIBITEUR GLUTAMATERGIQUE

## ■ Riluzole

RILUTEK					
1 cp. x 2/j	56 cp. 50 mg	286,89	I	65 %	5,12

**PROPRIÉTÉS**

Mécanisme d'action incertain : le **riluzole** agit par inhibition glutamatergique.

Absorption rapide, liaison aux protéines plasmatiques (97 %), demi-vie de 9 à 15 h, élimination essentiellement urinaire.

**INDICATIONS**

Sclérose latérale amyotrophique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie.

Maladie hépatique ou transaminases > 3N avant la mise en route du traitement.

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utilisation prudente en cas d'atteinte hépatique. Contrôle des transaminases avant la

mise en route du traitement, tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois. Arrêt du traitement si transaminases > 5N.

Contrôle de l'hémogramme si syndrome fébrile à la recherche d'une neutropénie.

Pas d'étude réalisée chez l'enfant.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les plus fréquents sont l'asthénie, les nausées, l'élévation habituellement transitoire des transaminases (arrêt du traitement si ALAT > 5N). Moins fréquents : douleurs abdominales, vomissements, tachycardie, somnolence.

Neutropénie rare mais pouvant être sévère.

Prescription initiale par un neurologue hospitalier, puis renouvellement possible par tout médecin.



**SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) (2)****Rééducation fonctionnelle****Kinésithérapie motrice**

Elle vise à maintenir la trophicité musculaire et prévenir les rétractions. Elle doit être prescrite précocement dès le diagnostic de SLA établi.

Séances de mobilisation passive et active espacées par des temps de repos réguliers. Le patient ne doit pas se fatiguer.

Décomposition de la prise en charge kinésithérapeutique : membres (amplitudes articulaires) rachis, entretien orthopédique, fonction respiratoire (prévention et traitement de l'encombrement bronchique), prise en charge des troubles de déglutition et réadaptation fonctionnelle (autonomie).

**Ergothérapie**

Indispensable dès qu'une gêne fonctionnelle apparaît.

**Aides fonctionnelles**

Cannes, déambulateur, attelles pour compenser le steppage, fauteuil roulant, etc.

**Orthophonie**

Dès l'apparition de troubles de la déglutition ou la phonation. L'objectif est de maintenir une communication.

**Surveillance des fonctions vitales**

À anticiper si possible avec le patient et sa famille.

**Nutrition entérale**

Dès que les difficultés alimentaires ne sont plus compensées par les mesures diététiques. Préviennent les effets de la dénutrition, améliore le confort du patient.

**Assistance respiratoire**

À domicile ; soit non invasive, au masque nasal ou bucconasal (VNI) [2], soit à l'aide d'une trachéotomie.

Insuffisance respiratoire aiguë : intubation réalisée ou non selon l'acceptation ou le refus préalablement décidé.

**Soins palliatifs**

Élaboration de directives anticipées de soins par le patient.

**Prise en charge psychologique**

Le soutien psychologique du patient et de sa famille est indispensable. Un dialogue entre le patient, la famille et les différents intervenants thérapeutiques doit s'établir dans un climat de confiance.

**Prise en charge sociale**

- Prise en charge à 100 %.
- Infirmière à domicile.
- Demande d'une tierce personne auprès de la Cotorep.
- Court séjour en centre de rééducation fonctionnelle ; utile en début de maladie pour évaluer les possibilités de kinésithérapie et organiser le retour à domicile.

**— CONSENSUS —**

[1] Sclérose latérale amyotrophique - Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare, HAS, 2007

[2] Modalités pratiques de la ventilation non invasive en pression positive, au long cours, à domicile, dans les maladies neuromusculaires, HAS, 2006

## MYOPATHIES (1)

La conduite à tenir devant un syndrome myogène est surtout étiologique (cf. tableau). Il n'existe en effet aucun traitement spécifique de l'atrophie musculaire. Certains aspects de la prise en charge thérapeutique sont cependant à préciser.

### Dystrophies musculaires progressives

Il n'existe actuellement pas de traitement étiologique pour ces maladies.

#### Dystrophie musculaire de Duchenne

##### ► Soutien psychologique

Il est indispensable pour le patient mais aussi sa famille. Cela n'est possible que s'il existe un climat de confiance et de collaboration entre les différents thérapeutes.

##### ► Scolarité

École ordinaire le plus longtemps possible mais lorsque le déficit moteur devient trop important, il faut orienter l'enfant vers un établissement spécialisé comportant un centre de rééducation.

##### ► Rééducation fonctionnelle

Elle est fondamentale.

- Kinésithérapie active en piscine et à l'air libre, précédée d'un massage, quotidienne.
- Mobilisations passives contre les rétractions.
- Lutte contre l'équin : chaussures renforcées par des tiges latérales, orthèses en plastique maintenant le pied à angle droit.
- Lutte contre l'apparition d'une scoliose : corsets thoraco-abdominaux utilisables en position assise.
- Fauteuils roulants électriques (remboursés par la sécurité sociale) complétés par des appareillages permettant l'utilisation prolongée de la main (« feeders »).

##### ► Traitement des affections intercurrentes

Notamment des surinfections bronchiques : antibiotiques, kinésithérapie, clapping, aérosols.

- Ventilation assistée : décision à prendre avec l'aide d'un service spécialisé.

– À domicile : en pression positive (masque nasal, compression abdominale, etc.).

– Trachéotomie : le plus souvent nécessaire à la phase terminale. Prévenir la famille de cette éventualité.

- Dépistage familial : un conseil génétique est à préconiser systématiquement pour les femmes transmettrices.

#### Autres dystrophies musculaires

Heureusement moins graves, on note quelques particularités.

##### ► Myopathie facio-scapulo-humérale

Fixation chirurgicale des omoplates parfois proposée.

##### ► Myopathie oculaire

Correction chirurgicale d'un ptosis parfois.

### Myopathies inflammatoires

Ce sont les polymyosites et dermatomyosites : affections rares mais graves (70 % de mortalité en l'absence de traitement).

#### Corticothérapie : en première intention

Efficace (70 % cas) en 1 à 6 sem. : **CORTANCYL** : 1 mg/kg/j (jusqu'à 2 mg/kg/j si échec) puis diminution lente sur plusieurs années.

NB : Les myopathies à inclusion, encore plus rares, ne répondent généralement pas à la corticothérapie.

#### Immunodépresseurs : en seconde intention

- **MÉTHOTREXATE BELLON** : 0,5 à 0,7 mg/kg/sem. IM. Efficace en 4 à 6 sem.
- Si échec, **IMUREL** : 5 à 7 mg/kg/j.

#### Autres traitements

- Échanges plasmatiques si échec des traitements précédents.
- **Immunoglobulines polyvalentes** à l'étude.

## MYOPATHIES (2)

### Étiologie

Les étiologies des myopathies se divisent en 4 grands groupes :

- inflammatoires (myosites) ;
- endocriniennes ;
- toxiques ou médicamenteuses ;
- dystrophies musculaires progressives et myopathies métaboliques.

Les trois premiers bénéficient d'un traitement étiologique (corticothérapie, traitement endocrinien substitutif, arrêt d'un médicament, etc.) alors que le dernier ne comporte pas traitement spécifique. D'où l'importance de rechercher systématiquement une cause potentiellement curable devant un syndrome myogène.

### Principales étiologies des myopathies

Inflammatoires	Polymyosite. Dermatopolymyosite. Myopathie à inclusion.
Endocriniennes	Hyperthyroïdie et hypothyroïdie. Hypercortisolisme (syndrome de Cushing). Acromégalie, hyperparathyroïdie, ostéomalacie.
Toxiques	Intoxication alcoolique aiguë. Héroïne et amphétamines.
Médicamenteuses	<b>Corticoïdes, zidovudine (RÉTROVIR), colchicine, D-pénicillamine, clofibrate, cimétidine, lithium.</b>
Dystrophies musculaires	Dystrophie musculaire de Duchenne de Boulogne. Maladie de Becker. Myopathie facio-scapulo-humérale (de Landouzy-Déjerine). Myopathie des ceintures. Avec myotonie : dystrophie myotonique de Steinert, maladie de Thomsen.
Myopathies métaboliques	Glycogénoses musculaires. Myopathies lipidiques. Myopathies mitochondriales. Paralysie périodique avec dyskaliémie.

## MYASTHÉNIE (1)

Le traitement de la myasthénie comprend un traitement symptomatique par **anticholinestérasiques**, un traitement immunosuppresseur dont les indications sont à discuter au cas par cas et un traitement chirurgical : la thymectomie.

### Traitement anticholinestérasique

Traitement à mettre en route initialement par un spécialiste, à doses progressives, puis à adapter par le patient (dose et répartition) en fonction de la symptomatologie, en évitant l'apparition des effets secondaires.

On a le choix entre :

- **ambénonium (MYTELASE)** : 3 à 10 cp. à 10 mg/j en 4 à 6 prises ;
- ou **pyridostigmine (MESTINON)** : 2 à 15 cp. à 60 mg/j (ou forme retard) en 4 à 6 prises.

### Traitement chirurgical : thymectomie

Elle est quasi systématique chez le sujet jeune (< 40 ans) même en l'absence de thymome, sauf dans les formes oculaires pures.

Chez le sujet âgé, on ne la pratique en général que lors de la mise en évidence d'un thymome sur le scanner thoracique.

Son effet est favorable dans 50 % des cas en 2 mois environ.

Elle peut être encadrée par une corticothérapie ou des échanges plasmatiques.

On complète le geste par une radiothérapie locale en cas de thymome invasif.

### Traitement immunosuppresseur

À discuter en cas d'échec des **anticholinestérasiques** seuls. On utilise la corticothérapie en première intention, puis les autres immunosuppresseurs.

### Corticothérapie

#### ► Modalités

**Prednisolone (CORTANCYL)** : 1 mg/kg/j au début puis diminution progressive jusqu'à la dose minimale efficace.

#### ► Indications

- Échec des **anticholinestérasiques** seuls et de la thymectomie.
- Formes généralisées.

### Autres immunosuppresseurs

**Cyclophosphamide (ENDOXAN)** : à la dose de 2 mg/kg/j en cas d'échec des traitements précédents.

**Azathioprine (IMUREL)** : à la dose de 2 mg/kg/j. Alternative au **cyclophosphamide**, notamment chez le sujet âgé.

**Gammaglobulines** : parfois efficaces.

### Plasmaphérèses

Indiquées à la phase aiguë des formes sévères pour passer un cap, ou en préparation à la chirurgie. Elles doivent être associées aux immunosuppresseurs.

### Crise myasthénique ou crise cholinergique

- Hospitalisation en urgence à proximité ou dans une unité de soins intensifs.
- Arrêt des **anticholinestérasiques**.
- Surveillance rapprochée :
  - de la fonction respiratoire, de l'efficacité de la toux, de la déglutition ;
  - intubation et ventilation assistée au moindre doute ;
  - monitoring cardiaque.

#### ► Anticholinestérasiques

Après 72 h de sevrage si surdosage en **anticholinestérasiques**, ou en urgence si crise myasthénique : **néostigmine (PROSTIGMINE)** : 1 amp. x 2 à 5/j IVL ou IM ou *per os* (**MYTELASE** ou **MESTINON**).

## MYASTHÉNIE (2)

### Éducation du patient

Elle est essentielle, le traitement de la myasthénie ne pouvant se faire correctement qu'avec la coopération du patient.

### Informations générales

- Expliquer la maladie et son traitement au patient pour qu'il adapte les doses des **anticholinestérasiques** lui-même.
- Éviter les efforts musculaires inhabituels.
- Ne pas prendre d'autres médicaments sans avis médical, donner la liste des médicaments contre-indiqués.
- Informer le patient des risques du surdosage en **anticholinergiques** et apprendre au patient leurs effets secondaires.
- Prise en charge à 100 %.

### Myasthénie et grossesse

- Pas de contre-indication à la grossesse.
- Pas de contre-indication à la prise d'**anticholinergiques** pendant la grossesse.
- Préférer la voie péridurale en cas d'anesthésie.
- Réanimation néonatale systématique car risque de myasthénie chez le nouveau-né

(les anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine passent la barrière hémato-placentaire).

### Tests diagnostiques dans la myasthénie

#### Conditions

Sous surveillance médicale, sous scope pour certains.

Dans les myasthénies à formes frustes (oculaires pures le plus souvent).

Pour certains, après injection de 0,25 mg d'atropine IV afin d'éviter les effets secondaires muscariniques.

Le test est positif si les signes cliniques régressent ou disparaissent après injection.

#### Test au réversol

10 mg en injection IV lente.

Effet en moins d'une minute. Durée d'action de quelques minutes.

#### Test à la PROSTIGMINE

1 à 2 amp. en inj. IV lente ou IM.

Effet en 10 à 15 min et durée d'action pendant 30 min environ.

### Médicaments

Prévenir le patient que la myasthénie est une contre-indication absolue à certains médicaments et que d'autres sont à utiliser avec précaution.

### Médicaments contre-indiqués ou à utiliser avec précaution dans la myasthénie

CONTRE-INDICATION ABSOLUE	À UTILISER AVEC PRÉCAUTION
<p>En anesthésie :</p> <p><b>Curares</b> sauf l'atracurium (<b>TRACRIUM</b>).</p> <p><b>Benzodiazépines</b> : midazolam (<b>HYPNOVEL</b>).</p> <p><b>Anesthésiques généraux</b> : halothane.</p> <p><b>Myorelaxants et antispastiques</b> : dantrolène (<b>DANTRIUM</b>), baclofène (<b>LIORÉSAL</b>).</p> <p><b>Antibiotiques</b> :</p> <p><b>Aminosides, tétracyclines</b> injectables et colistine (<b>COLIMYCINE</b>).</p> <p><b>Sels de magnésium</b> : <b>MAG 2</b>, etc.</p> <p><b>Dérivés de la quinine</b> :</p> <p>- quinine (<b>QUININE</b>, <b>QUINIMAX</b>, <b>HEXAQUINE</b>, <b>QUINOFORME</b>).</p> <p>- hydroquinidine (<b>SÉRÉCOR</b>).</p> <p><b>Médicaments sulphydrés</b> :</p> <p><b>D-pénicillamine</b> (<b>TROLOVOL</b>), tiopronine (<b>ACADIONE</b>).</p>	<p><b>Benzodiazépines</b> :</p> <p>alprazolam (<b>XANAX</b>), bromazépam (<b>LEXOMIL</b>), chlordiazépoxide, clobazam (<b>URBANYL</b>), clonazépam (<b>RIVOTRIL</b>), clorazépate dipotassique (<b>TRANXÈNE</b>), clotiazépam (<b>VÉRATRAN</b>), diazépam (<b>VALIUM</b>), estazolam (<b>NUCTALON</b>), loflazépate d'éthyle (<b>VICTAN</b>), loprazolam (<b>HAVLANE</b>), lorazépam (<b>TÉMESTA</b>), lormétazépam (<b>NORDAZ</b>), oxazépam (<b>SÉRESTA</b>), prazépam (<b>LYSANXIA</b>), témazépam (<b>NORMISON</b>), tétrazépam (<b>MYOLASTAN</b>).</p> <p><b>Myorelaxants</b> :</p> <p>idrocilamide, méphénésine, méthocarbamol, thiocolchicoside (<b>COLTRAMYL</b>).</p> <p><b>Hypnotiques</b> :</p> <p>zopiclone (<b>IMOVALE</b>) et zolpidem (<b>STILNOX</b>).</p> <p><b>Autres</b> :</p> <p>oxybutynine (<b>DITROPAN</b>), phénytoïne (<b>DILANTIN</b> et <b>DI-HYDAN</b>), <math>\beta</math>-bloquants.</p>

## CRAMPES

### Principes généraux

#### Définition

Une crampe se caractérise cliniquement par une douleur aiguë pendant laquelle le muscle devient dur. Cette contraction musculaire concomitante de la douleur la différencie des myalgies ou paresthésies.

#### Clinique

Symptôme fréquent des maladies neurologiques et musculaires, la conduite à tenir consiste surtout à rechercher la cause des crampes (cf. encadré ci-dessous).

Les dystonies focales sont un diagnostic différentiel (« crampe » des écrivains notamment) et sont traitées différemment (cf. Dystonies focales).

#### Conséquences thérapeutiques

Le traitement étiologique (s'il existe) est alors le plus efficace. Le traitement symptomatique est souvent décevant.

### Traitement symptomatique

#### Traitement médicamenteux

Souvent décevant ; on peut utiliser des **dérivés de la quinine (HEXAQUINE)** 3 à 6 cp./j. À éviter les derniers mois de grossesse.

#### Mesures physiques

Réchauffement et massages sont souvent à associer utilement.

### Traitement étiologique

- Traitement d'une artérite.
- Réhydratation en cas de déshydratation.
- Correction d'une dyskaliémie.
- Traitement substitutif d'une hypothyroïdie.
- Affections neurologiques.

Il n'y a hélas généralement pas de traitement étiologique pour les maladies neuromusculaires responsables de crampes.

#### Principales étiologies des crampes

Artérite des membres inférieurs.

Troubles hydroélectrolytiques :

- restriction hydrosodée exagérée,
- hypersudation,
- diarrhée chronique,
- insuffisance surrénale lente,
- traitement par **diurétiques, corticoïdes**, etc.

Effort musculaire important.

Crampes nocturnes.

Hypothyroïdie.

Affections neurologiques :

- certaines myopathies,
- sclérose latérale amyotrophique,
- certaines neuropathies périphériques.

## SOMMEIL (PATHOLOGIES DU) (1) – NARCOLEPSIE : SYNDROME DE GÉLINEAU

Le syndrome de Gélineau fait partie des pathologies responsables d'un excès de sommeil. Il se caractérise par la tétrade : narcolepsie (sommolence diurne excessive et accès paroxystiques de sommeil), cataplexie (chute brutale du tonus musculaire survenant par accès), hallucinations hypnagogiques et parasygies du sommeil.

Outre une prédisposition génétique (HLA DR2 DQ1), le diagnostic est fait sur un enregistrement polysomnographique et le test itératif de latence d'endormissement réalisés dans certains centres spécialisés.

C'est seulement à la suite de ces examens que l'on pourra proposer un traitement adapté.

### Traitement de la narcolepsie

#### Traitement de référence

C'est le **modafinil (MODIODAL)** : à l'heure actuelle, il a remplacé les **amphétamines**.  
**MODIODAL** : 100 mg le matin pendant 8 j, puis 200 mg le matin (ou 100 mg matin et midi). Si besoin, on peut augmenter les doses jusqu'à 400 mg/j. Noter qu'il est peu actif sur la cataplexie.

**NB** : Prescription initiale hospitalière annuelle réservée aux spécialistes et/ou aux centres du sommeil. Il faut avoir établi le diagnostic sur les données d'enregistrement du sommeil. Le patient doit revoir le spécialiste 1 fois/an. Dans l'intervalle, le renouvellement est possible par tout prescripteur.

#### Autres traitements de la narcolepsie

En cas d'échec, on peut utiliser d'autres stimulants centraux. En pratique, on utilise :

- **amphétamines** et dérivés : elles ne sont pratiquement plus utilisées en France, on préfère à l'heure actuelle le **méthylphénidate (RITALINE)** : 10 mg matin et midi (mieux toléré et de demi-vie plus courte) ;
- **oxybate de sodium (XYREM)** : 4,5 g/j en 2 prises à distance des repas, prescription réservée aux neurologues et aux médecins exerçant dans les centres de sommeil ;
- **antidépresseurs stimulants** : **fluoxétine (PROZAC)** : 20 mg le matin, ou **clomipramine (ANAFRANIL)** : 10 mg matin et midi.

#### Siestes

Conseiller des siestes régulières au patient, de durée limitée (moins de 20 min) réparties dans la journée, en particulier aux heures de somnolence maximale (après le déjeuner, en fin d'après-midi).

#### Traitement de la cataplexie

À ne traiter que si le patient s'en plaint !

- **Antidépresseurs tricycliques** : **clomipramine (ANAFRANIL)** : 10 mg matin et midi (10 à 75 mg/j), ou
- **Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine** : **fluoxétine (PROZAC)** : 20 à 60 mg/j.

#### Insomnie nocturne

Symptôme fréquemment associé et contribuant à la somnolence diurne.

On peut faire appel aux **hypnotiques** usuels, par exemple **IMOVANE** : 1 cp. le soir au coucher, ou même à un produit utilisé en anesthésie : **hydroxybutyrate de sodium (gamma-OH)** : 1/2 amp. *per os* (utiliser *per os* la forme injectable) au coucher renouvelable 1 fois dans la nuit. Cette molécule semble avoir l'avantage de pouvoir également agir sur les cataplexies.

## NARCOLEPSIE

■ **Modafinil**

<b>MODIODAL</b>					
2 à 4 cp. en 2 prises (matin et midi)	30 cp. 100 mg	67,87	I	65 %	2,26

**PROPRIÉTÉS**

Effet éveillant non amphétaminique, en partie lié à une potentialisation  $\alpha_1$ -adrénergique spécifiquement au niveau cérébral.

Résorption bonne mais lente, métabolisme hépatique, élimination urinaire, demi-vie de 10 à 12 h.

**INDICATIONS**

Narcolepsie avec ou sans cataplexie.  
Hypersomnies idiopathiques.

Le diagnostic clinique doit être confirmé par un enregistrement polysomnographique, un test itératif des latences d'endormissement, réalisés dans un centre d'exploration du sommeil.

**CONTRE-INDICATIONS**

Anxiété majeure.

**Grossesse** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Insuffisance hépatique grave : diminuer la posologie de moitié.

Surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque chez les hypertendus.

■ **Oxybate de sodium**

<b>XYREM</b>					
Diluer chaque dose dans 60 mL d'eau (godet doseur) avant l'ingestion 4,5 g/j à fractionner en 2 prises de 2,25 g Augmenter par paliers de 1,5 g/j tous les 15 j Max. 9 g/j en 2 prises	180 fl. (180 mL) + 1 ser. de 10 mL graduée de 0,25 en 0,25 g	HOP	S		

**PROPRIÉTÉS**

Dépresseur du système nerveux central, réduit la somnolence diurne excessive, la cataplexie et modifie l'architecture du sommeil. Mécanisme d'action non connu.

Absorption diminuée en cas de repas riche en graisses, 1 % de liaison aux protéines plasmatiques, élimination sous forme de gaz carbonique.

**INDICATIONS**

Traitement de la narcolepsie chez les patients adultes présentant une cataplexie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Transitoires : sensation de tension interne, d'excitation, d'insomnie ou d'anorexie. Régresse à l'arrêt ou à la diminution de posologie.

Troubles digestifs, céphalées, éruptions cutanées.

Exceptionnellement : dyskinésies bucco-faciales.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Contraceptifs oraux** : risques de diminution de l'efficacité contraceptive des pilules mini- ou microdosées (car inducteur enzymatique). Utiliser de préférence les **contraceptifs normodosés** ou un autre type de contraception.

**Ciclosporine** : diminution de l'efficacité de l'immunosuppresseur.

NB : Médicament d'exception. Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes et/ou aux services spécialisés en neurologie et/ou aux centres du sommeil. Renouvellement de la prescription initiale, dans les périodes intermédiaires, par tout prescripteur.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la molécule, déficience en semi-aldéhyde succinique-déshydrogénase, traitement par **opiacés** ou **barbituriques**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prescription limitée à 28 j.

Risque d'abus médicamenteux, de dépression respiratoire et d'épilepsie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Vertiges, nausées, céphalées. Et aussi : anorexie, HTA.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool, **sédatifs**.



## SOMMEIL (PATHOLOGIES DU) (2) – SYNDROME D'APNÉES DU SOMMEIL

Il concerne 5 à 7 % de la population générale mais 15 % de la population chez les personnes de plus de 70 ans.

Facteur de risque indépendant d'accident vasculaire cérébral et cardiaque.

### Mesures générales

Perte de poids, hygiène de sommeil et de vie, éviter la position dorsale la nuit.

### Pression positive continue (PPC) avec masque nasal

Délivre une pression fixe ou variable et maintient les voies aériennes supérieures ouvertes.

Importance de la formation à la machine pour obtenir une bonne observance.

### Orthèse d'avancée mandibulaire

Si IAH (index d'apnées et d'hypopnées) entre 10 et 30/h (gouttière dentaire qui maintient le mandibule en position un peu avancée, ce qui diminue l'obstruction. Prescription de 2<sup>e</sup> intention si appareillage PPC mal supporté ou inefficace.

### Chirurgie

Vélaire, radiofréquence ou laser sur la voile. Chirurgie bimaxillaire rarement.

Ce traitement permet une amélioration de la qualité de vie des patients, une diminution de la morbidité et de la mortalité cardio et cérébrovasculaire et diminue le risque d'accidents de la route.

Association française Apnées du sommeil et orthèse : 23 rue Vernet 75008 Paris. Tél. : 01 17 47 76 51 ; contact@afaso.fr.

## SOMMEIL (PATHOLOGIES DU) (3) – SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS (SJSR)

Il concerne 8,5 % de la population.

Compulsion (besoin irrésistible de bouger les membres inférieurs) associée souvent des paresthésies.

Gêne maximale au repos (position assise ou couchée).

Gêne soulagée par le mouvement (marche, massages, étirements). Essentiellement le soir et la nuit.

Parfois il existe des mouvements anormaux des jambes pendant le sommeil. Ces troubles génèrent une insomnie, une gêne sévère au niveau des membres. Ils peuvent affecter la vie familiale, sociale et professionnelle.

### Étiologies

- Forme idiopathique : liée à un trouble du métabolisme, due à la dopamine.
- Formes secondaires ;
  - carence en fer (faire dosage de la ferritine) ;
  - maladies : insuffisance rénale chronique avec dialyses, polyarthrite rhumatoïde, neuropathies ;

- médicaments : **théophylline**, **antidépresseurs** et **antipsychotiques** ;
- surconsommation de café, de thé ;
- grossesse.

### Traitement

- Activité physique régulière, mobilisation (exercices d'extension) des jambes avant le coucher, bains chauds et froids, massages. Recharge en fer si carence martiale.
  - **Agonistes dopaminergiques** : **pramipexole (SIFROL)** et **rotigotine (NEUPRO)** 2 mg/j ont une AMM pour les formes idiopathiques très sévères. Le **ropinirole (ADARTREL)** n'est plus remboursé. Titration progressive du traitement prescrit 2 à 3 h avant le coucher.
  - **L-dopa**.
  - **Benzodiazépines** éventuellement **donazépam**. Problème d'accoutumance et prescription limitée au neurologue.
- Association française des personnes affectées par le syndrome des jambes sans repos :  
Tél : 03 88 30 37 24 ; <http://www.afsjr.fr>

## SCORE NIHSS (1)

Niveau de vigilance spontanée	Vigilance normale, réponses aisées	0
	Non vigilant, éveillable par stimulations mineures	1
	Non vigilant, stimulations répétées pour maintenir attention	2
	Non vigilant, aréactif ou réponse réflexe, motrice ou autonome	3
Réponse verbale (mois et âge)	Réponses adaptées aux 2 questions	0
	Réponse adaptée à 1 question	1
	Aucune réponse correcte	2
Exécution ordre simple (ouvrir/fermer les yeux, serrer/relâcher la main)	Exécute les 2 tâches correctement	0
	Exécute 1 tâche correctement	1
	N'exécute aucune tâche correctement	2
Oculomotricité (mouvements horizontaux)	Normale	0
	Paralysie partielle	1
	Paralysie complète ou déviation forcée	2
Champ visuel (tester les 2 yeux)	Normal	0
	Hémianopsie partielle	1
	Hémianopsie complète	2
	Double hémianopsie (incluant cécité corticale)	3
Paralysie faciale (faire montrer les dents, lever les sourcils et fermer les yeux)	Mouvement normal et symétrique	0
	Paralysie mineure (asymétrie lors sourire, sillon nasogénien effacé)	1
	Paralysie partielle (atteinte motrice faciale inférieure)	2
	Paralysie complète (absence de motricité uni ou bilatérale)	3

## SCORE NIHSS (2)

Motricité du membre supérieur D (bras tendu 90 ou 45° pendant 10 s)	Normale	0
	Chute discrète sans heurter le lit ou autre support	1
	Effort contre pesanteur possible sans atteindre 90° ou 45°	2
	Ebauche de mouvement sans effort contre pesanteur, bras tombe	3
	Aucun mouvement	4
Motricité du membre supérieur G (bras tendu 90 ou 45° pendant 10 s)	Normale	0
	Chute discrète sans heurter le lit ou autre support	1
	Effort contre pesanteur possible sans atteindre 90 ou 45°	2
	Ébauche de mouvement sans effort contre pesanteur, bras tombe	3
	Aucun mouvement	4
Motricité du membre inférieur D (jambe à 30° pendant 5 s)	Normale	0
	Chute discrète sans heurter le lit ou autre support	1
	Effort contre pesanteur possible sans atteindre 30°	2
	Ébauche de mouvement sans effort contre pesanteur, bras tombe	3
	Aucun mouvement	4
Motricité du membre inférieur G (jambe à 30° pendant 5 s)	Normale	0
	Chute discrète sans heurter le lit ou autre support	1
	Effort contre pesanteur possible sans atteindre 30°	2
	Ébauche de mouvement sans effort contre pesanteur, bras tombe	3
	Aucun mouvement	4
Ataxie des membres (épreuve doigt-nez et talon-genou)	Absente	0
	Présente sur 1 membre	1
	Présente sur 2 membres	2

## SCORE NIHSS (3)

Sensibilité	Normale	0
	Hypoesthésie minimale à modérée	1
	Hypoesthésie sévère ou anesthésie (id si pas de réponse ou coma)	2
Langage	Pas d'aphasie, langage normal	0
	Aphasie minimale à modérée	1
	Aphasie sévère	2
	Mutique, aphasie globale ou coma	3
Dysarthrie	Absente	0
	Minimale à modérée	1
	Sévère	2
	Patient intubé ou autre barrière physique	3
Extinction et négligence	Pas d'anomalie	0
	Négligence partielle (1 modalité sensorielle)	1
	Héminégligence sévère	2
Total		

Bonne reproductibilité intra et interobservateur.

Utilisé en préhospitalier et dès l'arrivée du patient. Utilisable en télémedecine.

Bonne corrélation entre le score et le volume de l'infarctus.

## HÉMORRAGIES CÉRÉBRALES (1)

### Traitement général

En USINV de préférence au moins dans les premières 24 heures car risque d'aggravation avec parfois nécessité de transfert en réanimation pour intubation (troubles de la vigilance).

Surveillance (cf. Ischémie cérébrale aiguë).

Voie veineuse : sérum physiologique.

### Traitement de l'hypertension artérielle

- Si antécédent d'HTA ou HVG à l'ECG : traitement si PAS > 180 mmHg et/ou PAD > 105 mmHg. Cibler PA à 160/100 mmHg ou PAM à 120 mmHg.

- Si pas d'HTA connue : traitement si PAS > 160 mmHg et/ou PAD > 95 mmHg. Cibler PA à 150/90 mmHg ou PAM à 110 mmHg :

- **labétolol (TRANDATE)** IV ; bolus de 5 à 20 mg toutes les 15 min puis 2 mg/min. Contre-indiqué si défaillance cardiaque ;

- **urapidil (EUPRESSYL)** IV ; bolus de 12,5 à 25 mg puis 5-40 mg/h. Contre-indiqué si ischémie coronarienne ;

- **nicardipine (LOXEN)** IVSE, pas de bolus. 5-15 mg/h. Contre-indiqué si défaillance cardiaque, ischémie coronarienne, sténose aortique sévère.

Le relais *per os* pourra se faire dans les 24 à 72 h quand le patient est stable.

### Traitement de l'hyperthermie

Antipyrétiques.

### Traitement de l'hyperglycémie

Cf. Ischémie cérébrale aiguë.

### Prévention et traitement des complications

#### Hypertension intracrânienne

Élévation de la tête de 30° par rapport au corps.

**Mannitol 20 %** : 0,25 à 1 g/kg à passer en 20 min, en cas de dégradation neurologique ou d'engagement. Le bolus peut être répété en attendant que le patient soit transféré en neurochirurgie ou en réanimation.

D'autres mesures sont envisageables en milieu réanimatoire.

Drainage chirurgical de l'hématome.

#### Crises d'épilepsie

Pas de traitement préventif, en l'absence de crise. Peut se discuter en cas d'hématome lobaire.

Traitement dès la 1<sup>re</sup> crise : **benzodiazépine** puis relais IV par **fosphénytoïne** ou **lévétiracétam**. Durée 30 j au minimum.

#### Complications thromboemboliques veineuses

**Bas de contention** et compressions pneumatiques intermittentes dès le début.

**HBPM**, à partir de la 24<sup>e</sup> heure à 1/2 dose préventive puis à dose préventive pleine au 3<sup>e</sup> j.

## HÉMORRAGIES CÉRÉBRALES (2)

### Traitement spécifique

#### Neurochirurgical

Si hématome cérébelleux de plus de 2-3 cm avec signes de compression du tronc ou HTIC par hydrocéphalie. Dans ce cas, drainage ventriculaire externe si hydrocéphalie.

À discuter si hématome supratentorial à moins de 1 cm de la surface et dégradation de la vigilance (Glasgow entre 9 et 12).

#### Correction des troubles de la coagulation

Liés à une maladie hématologique, des traitements anticoagulants ou une thrombolyse.

- Si hémorragie cérébrale (HC) sur héparinothérapie : **sulfate de protamine**, dose à adapter au temps depuis l'arrêt de l'héparine en ne dépassant pas 5 mg/min et dose totale de 50 mg.

- Si HC sur traitement anticoagulant : arrêter le traitement, et proposer :

- **vitamine K** ampoule à 10 mg : 1/2 à 1 amp. *per os* de préférence ou IVL car risque de réactions anaphylactiques ;
- **et** concentré de complexes prothrombiques : **PPSB (OCTAPLEX)** 10-30 U/kg. Le plasma frais congelé doit être évité car il nécessite de grandes quantités de liquides. L'objectif est d'obtenir un INR < 1,5.

La reprise ultérieure du traitement se discute au cas par cas. Un délai de 10 à 14 j est souhaitable.

Si HC sur traitement antiagrégant plaquettaire : pas de traitement spécifique. Reprise du traitement ultérieur à discuter au cas par cas.

#### Prévention secondaire


Traitement de l'HTA.

Sevrage en alcool.

## ÉVALUATION D'UNE DÉMENCE : MINI-MENTAL TEST

L'évaluation de la sévérité et le suivi d'un syndrome démentiel se font, en milieu spécialisé, par des tests neuropsychologiques adaptés au type de démence. Des tests simples comme le *Mini-Mental Test* (MMS) sont très utiles pour quantifier rapidement le degré de détérioration des fonctions supérieures d'un patient.

### Mini-Mental Test

Nom :	Prénom :	Examineur Date : .../.../...
.../ 5	ORIENTATION (1 point par réponse juste) :	
	– En quelle année sommes-nous ?	.../ 1
	– En quelle saison ?	.../ 1
	– En quel mois ?	.../ 1
	– Quelle est la date exacte ?	.../ 1
.../ 5	– Quel jour de la semaine sommes-nous ?	.../ 1
	– Dans quelle ville sommes-nous ?	.../ 1
	– Quel est le département ?	.../ 1
	– Dans quelle région ?	.../ 1
	– Quel est le nom de l'hôpital ?	.../ 1
.../ 3	– À quel étage sommes-nous ?	.../ 1
	APPRENTISSAGE :	
	Donner 3 noms d'objets (par exemple cigare, fleur, porte) au rythme de 1 nom par seconde. Demander au patient de répéter les 3 noms immédiatement et compter 1 point par bonne réponse.	
	Puis, répéter les 3 mots jusqu'à ce qu'ils soient appris par le patient.	.../ 3
	ATTENTION ET CALCUL :	
.../ 5	Demander au patient de compter à partir de 100 en retranchant 7 à chaque fois. Arrêter après 5 soustractions et compter le nombre de réponses correctes.	
	Si le patient ne peut effectuer cette tâche, demandez-lui d'épeler le mot « MONDE » à l'envers.	.../ 5
.../ 3	RAPPEL : Demander les 3 noms d'objets donnés auparavant et compter 1 point par réponse correcte.	.../ 3
.../ 8	LANGAGE :	
.../ 8	– Dénommer un stylo, une montre (1 point par item).	.../ 2
	– Répéter « il n'y a pas de mais, ni de si, ni de et » (1 point si la répétition est entièrement correcte).	.../ 1
	– « Prenez un papier dans la main droite, puis pliez-le en deux, puis jetez-le par terre » (1 point par item correctement exécuté).	.../ 3
	– Écrire une phrase spontanée (au moins 1 sujet, 1 verbe et sémantiquement correcte).	
	– Écrivez sur une feuille « FERMEZ LES YEUX » et faites-le exécuter par le patient.	.../ 1
.../ 1	DESSIN : Copier le dessin suivant (1 point si tous les angles sont présents).	.../ 1
		
TOTAL : .../ 30		

Démence légère si note < 23, modérée si note < 15 et sévère si note < 5.



## ANTIÉPILEPTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES (1)

## ■ Diazépam

<b>VALIUM ROCHE</b>					
Voie IV lente ou IM : 10 à 20 mg Voie intrarectale : 0,5 mg/kg chez l'enfant Progressivement : 10 à 20 mg/j	6 amp. 10 mg/2 mL	3,16	I	65 %	0,53
	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	100 cp. séc. 2 mg	HOP	I		
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	100 cp. séc. 10 mg	HOP	I		
	600 gttes - fl. 20 mL (3 gttes = 1 mg)	3,05	I	65 %	0,01

## ■ Clonazépam

<b>RIVOTRIL</b>					
Voie IV lente ou IM : 1 à 2 mg Progressivement : 0,1 mg/kg/j	6 amp. 1 mL = 1 mg	4,71	I	65 %	0,78
	28 cp. quadriséc. 2 mg	2,16	I	65 %	0,08
	500 gttes 0,25 %	2,25	I	65 %	0,00
	(1 gtte = 0,1 mg)				

Prescription réservée aux neurologues

## ■ Clobazam

<b>URBANYL</b>					
5 à 10 mg x 3/j en association avec le traitement de fond	30 gél. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
	30 cp. séc. 10 mg	3,71	I	65 %	0,12
	30 cp. séc. 20 mg	5,15	I	65 %	0,17

## ■ Midazolam

<b>BUCCOLAM</b>					
Assimilé aux stupéfiants	4 ser. 0,5 mL sol. bucc. 2,5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 1 mL sol. bucc. 5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 1,5 mL sol. bucc. 7,5 mg	86,11	I	65 %	21,53
	4 ser. 2 mL sol. bucc. 10 mg	86,11	I	65 %	21,53

## ÉPILEPSIE (2)

### Épilepsies généralisées idiopathiques

#### Épilepsies-absences de l'enfant

**Acide valproïque (DÉPAKINE)** 15 mg/kg/j en 2 prises *per os* puis augmenter jusqu'à 30 mg/kg/j progressivement s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 15 j ou **lamotrigine (LAMICTAL)**.

**L'éthosuximide (ZARONTIN)** 20 à 30 mg/kg/j en 2 prises peut être utilisé si les absences sont isolées et les effets secondaires surveillés.

L'efficacité ou non du traitement est jugée au bout de 2 mois à pleines doses. Le plus souvent (80 % des cas) l'efficacité du traitement est bonne, sans récurrence. En cas d'échec de deux monothérapies : **lamotrigine + acide valproïque** ou **éthosuximide + acide valproïque**.

L'arrêt du traitement se fait à l'adolescence, progressivement, si absence de crise depuis plus de 18 mois et si l'EEG est normal. Puis surveillance régulière de l'EEG.

#### Épilepsie myoclonique juvénile bénigne

**Acide valproïque** ou **lamotrigine**, s'il s'agit d'une jeune fille, l'arrêt du traitement entraîne dans 90 % des cas une récurrence obligeant à maintenir le traitement très longtemps.

#### Épilepsie avec crise généralisée tonico-clonique du réveil

**Lamotrigine** si jeune fille.

En cas d'échec, association de 2 molécules : au choix suivant le patient, l'âge, le sexe : **acide valproïque**, **lamotrigine** ou **lévétiracétam**.

### Épilepsie partielle

En première intention : **oxcarbazépine (TRI-LEPTAL)** 600 à 2 400 mg/j en 2 prises, souvent bien toléré ; surveiller éventuel SIADH ; ou **carbamazépine (TÉGRÉTOL)** 600 à 1 200 mg/j en 2 prises ; surveillance cutanée et biologique (NFS et bilan hépatique). Peuvent aussi être proposées la **lamotrigine**, le **lévétiracétam (KEPPRA)**. Moins fréquemment, **gabapentine (NEURONTIN)**.

En 2<sup>e</sup> intention on choisira une monothérapie dans ces médicaments, le **topiramate (EPITOMAX)** ou encore le **valproate de sodium** ou la **phénytoïne (DI-HYDAN)**.

Bithérapie en cas d'échec ; nombreuses associations possibles souvent entre un **antiépi-**

**leptique** classique et une nouvelle molécule (**lacosamide**, **eslicarbazépine**, **zonisamide**).

### Éducation et prise en charge sociale du patient

Elle est indispensable pour une bonne observance du traitement.

- Explication du traitement :
  - traitement de fond, au long cours ;
  - à prendre régulièrement, pas d'arrêt intempestif ;
  - pas d'associations médicamenteuses sans avis médical.
- Éviter les facteurs favorisants :
  - alcool ;
  - fatigue, conseiller un rythme de vie régulier ;
  - lumière intermittente (ordinateurs, boîtes de nuit).

### Activités dangereuses

Alpinisme, plongée, parachutisme.

Les autres sports sont cependant possibles.

### Activités légalement interdites

- Contre-indication relative à la conduite de tous les véhicules, interdiction formelle de la conduite de poids lourds (permis C) et de véhicules collectifs (permis D), compatibilité temporaire pour les véhicules légers (commission d'aptitude).
- Armée.

### Arrêt d'un traitement de fond

Il n'est pas systématique mais peut être proposé en l'absence de crise depuis au moins 2 ans.

Il doit être prudent, extrêmement progressif (plusieurs mois) après information éclairée du patient et jamais contre son gré.

Une surveillance EEG permet souvent de prévoir les récurrences (le plus souvent la première année).

En cas de récurrence des crises, le traitement est généralement repris à la dose minimale efficace, *a priori* définitivement.

Certains syndromes épileptiques se prêtent mal à l'arrêt du traitement : épilepsie myoclonique juvénile, épilepsies partielles dont l'équilibration a été difficile, épilepsies sur lésions cérébrales.

## ANTIÉPILEPTIQUES (2) – BENZODIAZÉPINES (2)

## PROPRIÉTÉS

**Benzodiazépines** : effet anticonvulsivant, anxiolytique, et myorelaxant. Action rapide par voie intrarectale et intraveineuse, demi-vie de 32 à 38 h, élimination urinaire. Non inducteur enzymatique.

## INDICATIONS

Épilepsie et état de mal épileptique sous toutes ses formes. Douleurs de désafférentation.

Crises d'angoisse aiguës, delirium tremens.

**BUCCOLAM** : traitement des crises convulsives aiguës prolongées chez les nourrissons (de 3 à 6 mois).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit. Insuffisance respiratoire, myasthénie, syndrome d'apnées du sommeil. Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Voie injectable : nécessite un matériel de réanimation respiratoire à proximité.

Utilisation prudente : sujets âgés, conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines, insuffisance hépatique ou rénale.

À éviter en cas d'antécédent d'alcoolisme ou de toxicomanie.

**Grossesse** : 1<sup>er</sup> trimestre : risque tératogène faible. 3<sup>e</sup> trimestre : risque de détresse respira-

toire du nouveau-né. **Allaitement** : à éviter, passage dans le lait.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Dose-dépendants : somnolence, difficultés de concentration, hypotonie, confusion mentale, sensations ébrieuses et parfois réactions paradoxales (excitation, irritabilité).

Syndrome de sevrage : anxiété, insomnie, tremblements, crampes. Risque de tolérance et dépendance.

Possibles hypersécrétions bronchiques (**clonazépam**), ou allergiques (rares).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool déconseillé.

À associer avec précaution :

- **carbamazépine** (avec **clonazépam**) ;
- **cimétidine**, **inhibiteurs de la pompe à protons** ;
- **phénytoïne** (avec **diazépam** et **midazolam**) ;
- inhibiteurs puissants du CYP3A4 (avec **midazolam**) : **antifongiques azolés**, **macrolides**, **inhibiteurs de protéases**, **inhibiteurs calciques**, **atorvastatine**, etc.
- inducteurs puissants du CYP3A4 (avec **midazolam**) : **rifampicine**, millepertuis, jus de pamplemousse, etc.

À prendre en compte (avec tous) : **opiacés**, **buprénorphine**, **antipsychotiques**, autres **benzodiazépines**, **barbituriques**, **antidépresseurs sédatifs**, **antihistaminiques H1** (1<sup>re</sup> génération), **antihypertenseurs centraux**, **baclofène**.

## ÉPILEPSIE (3)

### Antépileptiques génériques

Ils peuvent être prescrits en lieu et place du médicament princeps notamment lorsque l'on débute le traitement.

Cependant, des précautions particulières doivent être prises (surveillance clinique, dosages plasmatiques) lors de la SUBSTITUTION d'un médicament princeps par son générique en raison de biodisponibilités parfois différentes.

### Épilepsies pharmaco-résistantes

Elles concernent par définition les patients (20 à 30 % des épilepsies partielles) qui continuent à faire des crises malgré un traitement médical maximal, en particulier plusieurs bithérapies après au moins 2 ans de traitement bien conduit (trithérapies à éviter car effets secondaires importants). Importance de l'évaluation en centre spécialisé.

L'ensemble des prises en charge de ces patients a fait l'objet de recommandations [1].

### En cas d'échec du traitement médical

Se poser la question du traitement chirurgical. Réalisé par des équipes neurochirurgicales spécialisées, son indication repose sur trois conditions :

- épilepsie sévère, pharmaco-résistante ;
- foyer cortical unique dont la localisation est connue (nécessitant bilan clinique, EEG, vidéo-EEG, IRM, PET-scan) ;
- foyer réséquable sans risque de séquelles importantes.

### Autres traitements

Régime cétogène (surtout chez l'enfant), stimulation du nerf vague.

Prise en charge à 100 %.

La Ligue française contre l'épilepsie (LFCE) regroupe des professionnels de l'épilepsie ([www.lfce-epilepsies.org](http://www.lfce-epilepsies.org)).

Le Bureau français de l'épilepsie (BFE) regroupe des associations de patients et des professionnels de l'épilepsie. 236, rue de Tolbiac, 75013 Paris. Tél : 01 45 80 66 64. E-mail : [secretaire.general@bfe.asso.fr](mailto:secretaire.general@bfe.asso.fr). Site internet : <http://www.bfe.asso.fr>.

### Classification des principales épilepsies

#### Épilepsies généralisées

- *Idiopathiques*
  - Épilepsie généralisée tonico-clonique
  - Épilepsie-absence de l'enfant
  - Épilepsie myoclonique juvénile
- *Symptomatiques ou cryptogéniques*
  - Syndrome de West
  - Syndrome de Lennox-Gastaut
  - Épilepsie myoclonique progressive
  - Autres encéphalopathies épileptiques

#### Épilepsies partielles

- *Idiopathiques*
  - Épilepsie à paroxysme rolandique de l'enfant
  - Épilepsie à paroxysme occipital de l'enfant
- *Symptomatiques ou cryptogéniques*

Épilepsies diverses (motrices, sensitives, sensorielles, végétatives, psychiques, etc.) d'origine tumorale, vasculaire, traumatique, etc.

## ANTIÉPILEPTIQUES (3) – VALPROATE

## ■ Acide valproïque sel de sodium

<b>DÉPAKINE</b>					
20 à 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises Relais du traitement <i>per os</i> : 20 à 30 mg/kg/j État de mal épileptique : bolus IV de 15 mg/kg en 5 min puis relais 1 mg/kg/h à adapter progressivement pour atteindre un taux sérique d'acide valproïque de 75 mg/L	40 cp. 200 mg	3,92	II	65 %	0,10
	40 cp. 500 mg	8,65	II	65 %	0,22
	8 000 mL sol. buv.	5,46	II	65 %	0,00
	200 mg/mL				
	150 mL sirop	8,39	II	65 %	0,06
	57,64 mg/mL				
	4 fl. 400 mg	HOP	II		
<b>DÉPAKINE CHRONO</b>					
20 à 30 mg/kg/j en 2 prises	30 cp. séc. 500 mg	10,37	II	65 %	0,35
	90 cp. séc. 500 mg	HOP	II		
<b>MICROPARKINE LP</b>					
Granulés <i>per os</i> Poso. initiale : 10-15 mg/kg puis 20-30 mg/kg	50 sach. 100 mg	4,00	II	65 %	0,08
	30 sach. 250 mg	8,84	II	65 %	0,29
	30 sach. 500 mg	17,12	II	65 %	0,57
	30 sach. 750 mg	25,42	II	65 %	0,85
	30 sach. 1 000 mg	33,44	II	65 %	1,11
<b>DÉPAKOTE</b>					
20 à 30 mg/kg en 2-3 prises	30 cp. 250 mg	6,87	II	65 %	0,23
	90 cp. 250 mg	HOP	II		
	90 cp. 500 mg	37,61	II	65 %	0,42

**PROPRIÉTÉS**

GABA-ergique. Résorption complète, fixation aux protéines (90 %), demi-vie de 15 à 17 h, catabolisme hépatique, élimination urinaire. Non inducteur enzymatique.

**INDICATIONS**

Épilepsie généralisée convulsivante ou non, épilepsie partielle, syndromes de West et de Lennox-Gastaut, état de mal épileptique (forme IV). Tics de l'enfant, hoquets irréductibles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hépatite aiguë ou chronique, antécédents familiaux d'hépatite sévère, notamment médicamenteuse.

Allergie au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan hépatique (transaminases, TP) initial puis mensuel (6 mois).

Adaptation de la posologie à la fonction rénale.

**Grossesse** : toutes les mesures doivent être prises pour éviter une grossesse sous **valproate**. Sa prescription est déconseillée chez une femme en âge de procréer sans contraception efficace.

**Allaitement** : possible avec contraception efficace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hépatotoxicité : élévation transitoire des transaminases (30 %), mais quelques cas d'hépatites cytolytiques mortelles. Vérifier régulièrement le bilan hépatique les 6 premiers mois.

Céphalées, tremblement d'attitude, prise de poids, alopecie transitoire, aménorrhée, troubles digestifs transitoires.

États confusionnels, encéphalopathie, hyperammonémie : notamment chez le sujet âgé, réversible lors de la diminution des doses ou à l'arrêt du traitement.

Effet tératogène : syndrome malformatif (9-15 %), spina bifida (2-3 %), autres malformations, diminutions du QI (quotient intellectuel), troubles envahissants du développement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée : **méfloquine**.

À associer avec précaution : **imipraminiques**, **phénytoïne**, **barbituriques**, **carbamazépine**, **lamotrigine**.

## ÉPILEPSIE (4)

### État de mal épileptique (EME) tonico-clonique généralisé

Il s'agit d'une urgence thérapeutique.

#### Réanimation du patient

##### ► Mise en condition

• Libération des voies aériennes supérieures :

- position latérale de sécurité ;
- ablation des prothèses dentaires ;
- canule de Guédel, aspiration ;
- si besoin : intubation oro-trachéale et ventilation assistée.

• Voie veineuse périphérique : en restriction hydrique modérée pour éviter l'œdème cérébral.

##### ► Bilan complémentaire

• Biologique : ionogramme, urée, créatinine, calcémie, glycémie, alcoolémie, recherche de toxiques, NFS, dosage des antiépileptiques si nécessaire.

• Radio de thorax, ECG.

##### ► Hospitalisation en unité de soins intensifs

Pour ventilation assistée (détresse respiratoire due à l'état de mal lui-même ou à la dépression respiratoire engendrée par les antiépileptiques) et pour surveillance continue.

#### Traitement anticomitial [2]

Attention : matériel d'intubation à proximité.

Le schéma thérapeutique est fonction de la durée des convulsions au moment de la prise en charge.

##### ► Traitement de 1<sup>re</sup> intention

• Si convulsions présentes depuis 5 min et jusqu'à 30 min :

– **Benzodiazépine**, **clonazépam (RIVOTRIL)** 0,015 mg/kg en IVL. Posologie à diminuer de moitié si âge > 80 ans. En cas d'absence d'abord veineux : **midazolam** 0,2 mg/kg IM.

– Si efficacité : hospitalisation, bilan, et traitement. Réanimation uniquement si troubles de la vigilance ou défaillance vitale associée. Traitement par **benzodiazépines** quelques jours per os ou IV discontinuée.

– Si récurrence faire traitement indiqué ci-après.

• Si convulsions présentes depuis plus de 30 min ou durée inconnue :

– **Clonazépam (RIVOTRIL)** 0,015 mg/kg en IVL + soit **phénytoïne** ou **fosphénytoïne** 20 mg/kg en équivalent **phénytoïne** sans dépasser respectivement 50 et 150 mg/min (efficacité visible 30 min après), soit **phénobarbital** 15 mg/kg sans dépasser 100 mg/min (efficacité visible à la fin de la perfusion). Le choix des molécules se fait en fonction des contre-indications cardiaques pour la **phénytoïne** et des troubles de la vigilance pour le **phénobarbital**. L'**acide valproïque (DÉPAKINE)** 15 mg/kg IV lente (5 min) avec un relais de 1 à 4 mg/kg/h n'est indiqué que s'il y a une contre-indication aux deux produits précédents ou en cas d'EME myoclonique.

– Si succès : transfert en réanimation, surveillance, **benzodiazépines** IV discontinuées quelques jours et introduction ou adaptation d'un traitement de fond.

– Sinon traitement de 2<sup>e</sup> intention.

##### ► Traitement de 2<sup>e</sup> intention

• Inversion du traitement antiépileptique (**fosphénytoïne** ou **phénobarbital**) si EME depuis moins de 1 h, en absence de lésion cérébrale aiguë, de troubles notables des constantes vitales.

• Sinon (EME réfractaire) ; **thiopental (PEN-THOTAL)** 2 à 7 mg/kg en dose de charge puis 3 à 5 mg/kg/h, **midazolam (HYPNOVEL)** 0,1 à 0,3 mg/kg puis 0,05 mg/kg/h ou **propofol** associé à la ventilation mécanique. Surveillance EEG pour décider de la durée du traitement, sevrage progressif des anesthésiques.

#### Surveillance rapprochée

• Infirmière (pouls, PA, conscience toutes les 2 h) et médicale (examen neurologique et respiratoire).

• Scope.

• Gaz du sang, ionogramme, créatinine, glycémie, calcémie.

• Dosage des anticomitiaux à la 12<sup>e</sup> h puis par 24 h.

• EEG.

#### Traitement étiologique

Il est primordial. Il faut rechercher un trouble métabolique, faire un scanner cérébral, et/ou une IRM et si besoin une ponction lombaire.

## ANTIÉPILEPTIQUES (4) – ANTIGLUTAMATERGIQUE (1)

## ■ Lamotrigine

LAMICTAL					
Adulte et E. > 12 ans : 200 à 400 mg en 2 prises/j à atteindre progressivement par paliers de 25 à 50 mg tous les 15 j NB : Diminuer la dose quotidienne de moitié si association avec le <b>valproate</b> E. de 2 à 12 ans : 5 à 15 mg/kg si association avec le <b>valproate</b> E. de 2 à 12 ans en monothérapie : 0,3 à 15 mg/kg/j	30 cp. 2 mg	6,00	I	65 %	0,20
	30 cp. 5 mg	5,41	I	65 %	0,18
	30 cp. 25 mg	9,48	I	65 %	0,32
	30 cp. 50 mg	15,30	I	65 %	0,51
	30 cp. 100 mg	26,91	I	65 %	0,90
	30 cp. 200 mg	47,88	I	65 %	1,60

## PROPRIÉTÉS

Action probable au niveau des canaux calcium-dépendants et sodiques. Inhibe la libération des neuromédiateurs excitateurs, notamment le glutamate.

Absorption rapide et complète, liaison à 55 % aux protéines, demi-vie de 29 h, élimination urinaire.

## INDICATIONS

– Adultes et adolescents > 13 ans : épilepsies généralisées primaires ou secondaires et partielles en monothérapie ou en association, syndrome de Lennox Gastaut.

– Enfant de 2 à 12 ans : en monothérapie dans le traitement du petit mal épileptique (absences typiques) et en association dans les épilepsies partielles et généralisées

– Prévention des épisodes dépressifs chez les patients > 18 ans souffrant de troubles bipolaires de type I.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la substance active ou à l'un des excipients.

**Grossesse** : prescription possible quel que soit le terme. La concentration plasmatique peut diminuer en fin de grossesse.

**Allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence chez les insuffisants rénaux.

Le **valproate de sodium** diminue le métabolisme de la **lamotrigine** et augmente de façon importante le risque d'effets secondaires cutanés graves (syndrome de Lyell, etc.).

L'association au **valproate de sodium** doit être réservée aux situations cliniques qui l'imposent, lorsque le bénéfice attendu l'emporte sur le risque.

Il est indispensable de respecter les posologies initiales préconisées, d'augmenter progressivement les doses, de renforcer la surveillance cutanée et d'arrêter le traitement si besoin.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Éruptions cutanées fréquentes (10 %) avec risque plus rare de syndrome de Lyell, de Stevens-Johnson, œdème de Quincke, favorisés par des posologies trop élevées, une augmentation trop rapide des doses, l'association au **valproate**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les inducteurs enzymatiques augmentent le catabolisme de la **lamotrigine**, le **valproate** le diminue.

La contraception œstroprogestative peut réduire l'efficacité de la **lamotrigine**.

## Posologie initiale et progression à respecter

	1 <sup>re</sup> ET 2 <sup>e</sup> SEMAINES	3 <sup>e</sup> ET 4 <sup>e</sup> SEMAINES	POSOLOGIE D'ENTRETIEN
Sans <b>valproate</b>	50 mg/j en 1 prise	100 mg/j en 2 prises	200 à 400 mg/j (2 prises)
Avec <b>valproate</b>	25 mg 1 j/2	25 mg/j en 1 prise	100 à 200 mg/j (1-2 prises)

## ÉPILEPSIE ET GROSSESSE (1)

### Principes

#### En cas de désir de grossesse

La grossesse sous traitement antiépileptique est tout à fait possible, mais il faut la prévoir. L'épilepsie doit être stabilisée. Elle doit être programmée et la prise en charge doit être pluridisciplinaire, en collaboration avec le médecin traitant, le neurologue et le gynéco-obstétricien.

Avant d'envisager une grossesse chez une patiente traitée par **antiépileptique**, il faut avoir à l'esprit que :

- les crises comitiales survenant en cours de grossesse représentent un risque vital pour la mère et le fœtus ;
- tous les médicaments antiépileptiques sont potentiellement tératogènes (environ 6-8 % de malformations pour les **antiépileptiques** classiques, à comparer aux 2-3 % de la population générale).

**Il faut utiliser par conséquent si possible une monothérapie et atteindre la dose minimale efficace.**

Le **valproate** est à éviter. La **carbamazépine** est déconseillée en cas d'antécédent de spina bifida.

La surveillance du développement fœtal pendant la grossesse sera renforcée : dosage de l' $\alpha$ -foetoprotéine, échographies plus fréquentes et si besoin amniocentèse. L'allaitement est à éviter pour les nouveaux **antiépileptiques**.

#### Désir de grossesse ou femme vue au 1<sup>er</sup> trimestre

On ne change pas le traitement (surtout s'il est bien équilibré). C'est la solution la plus logique et la plus simple. On essaie si possible de baisser les posologies.

On doit éviter de débiter une grossesse sous **valproate de sodium**. Il faudra introduire un nouveau traitement avant la conception.

L'**acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** périconceptionnel n'est plus recommandé chez les femmes prenant un traitement antiépileptique, y compris ceux qui sont responsables d'anomalie du tube neural (**valproate** et **carbamazépine**). On préconise 0,4 mg/j comme dans la population générale et 5 mg/j en cas d'ATCD personnel ou familial de spina bifida à prendre 2 mois avant la conception et 2 mois après.

Pour les **nouveaux antiépileptiques (EPI-TOMAX, KEPPRA, VIMPAT, ZEBINIX, ZONEGRAN, TROBALT)** le recul et les données cliniques sont insuffisants. Le désir d'une grossesse est l'occasion de peser de nouveau l'indication de chaque **antiépileptique** et de sa dose journalière.

#### Femme vue en cours de grossesse (2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> trimestre)

Ne pas changer le traitement en cours.

#### Mesures associées

- **Vitamine K : VITAMINE K1 ROCHE** 10 mg/j *per os* les 15 derniers j de la grossesse. Pour le nouveau-né : 0,5 à 1 mg IM ou IVL à la naissance (pour le **phénobarbital**, la **phénytoïne** et la **carbamazépine**).
- **Vitamine D : STÉROGYL** IV gtt/j à partir du 5<sup>e</sup> mois à la mère (pour le **phénobarbital** et la **phénytoïne**).

#### Surveillance

On surveille :

- l'absence de crise comitiale clinique ou infraclinique (EEG) ;
- l'observance du traitement ;
- le déroulement de la grossesse et le développement fœtal.

Les principales complications des traitements antiépileptiques au cours de la grossesse et la conduite à tenir sont résumées dans le tableau suivant.

### CONSENSUS

[1] Épilepsies graves, HAS, 2007

[2] Prise en charge de l'état de mal tonico-clonique généralisé : stratégies thérapeutiques, SRLF, 2008



## ANTIÉPILEPTIQUES (5) – ANTIGLUTAMATERGIQUE (2)

## ■ Topiramate

EPITOMAX					
A. : 200 à 600 mg/j en 2 prises	28 gél. 15 mg	11,60	I	65 %	0,41
E. : 5 à 9 mg/kg/j en 2 prises	28 gél. 25 mg	8,00	I	65 %	0,29
Atteindre progressivement les doses minimales efficaces	28 gél. 50 mg	10,51	I	65 %	0,38
Migraine : 20 à 100 mg/j en 2 prises	28 cp. 50 mg	10,51	I	65 %	0,38
	28 cp. 100 mg	20,46	I	65 %	0,73
	28 cp. 200 mg	39,31	II	65 %	1,40

## PROPRIÉTÉS

Nouvel antiépileptique classé comme monosaccharide sulfamate-substitué. Le **topiramate** diminue la fréquence à laquelle les potentiels d'action sont générés lorsque les neurones sont soumis à une dépolarisation soutenue, augmente la fréquence d'activation des récepteurs GABA-A par le GABA, antagonise faiblement l'activité excitatrice du glutamate sur les récepteurs AMPA.

En outre, le **topiramate** inhibe certaines enzymes de l'anhydrase carbonique.

Le  $T_{max}$  est atteint en 3,7 h. La demi-vie d'élimination est de 21 h, avec une élimination essentiellement rénale et un faible métabolisme hépatique (20 %).

## INDICATIONS

En association aux autres **antiépileptiques** lorsque ceux-ci sont insuffisamment efficaces chez l'enfant > 2 ans et l'adulte :

- épilepsies généralisées tonico-cloniques
- épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire.

L'efficacité du **topiramate** n'a pas été démontrée dans les absences.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Hypersensibilité aux **sulfamides**.

**Grossesse et allaitement** : pas de données cliniques suffisantes à l'heure actuelle. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour tous les **antiépileptiques** :

- risque de somnolence nécessitant des précautions en cas de conduite ou d'utilisation de machines ;

– risque de rebond à l'arrêt brutal du traitement.

Particularités du **topiramate** :

- adapter les doses à la fonction rénale. Le **topiramate** est éliminé par hémodialyse ;
- en raison du risque de fausses routes, les cp. ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de 6 ans ;
- en raison de son activité inhibitrice de l'anhydrase carbonique, le risque de calculs rénaux est augmenté chez les patients prédisposés ;
- une perte de poids ou l'absence de prise de poids chez des enfants en période de croissance a été observée. Il convient donc de surveiller la courbe de poids chez l'enfant.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Étourdissements, ataxie, troubles de l'équilibre, ralentissement psychomoteur, troubles du langage, somnolence, difficultés de mémorisation, confusion mentale, troubles de l'humeur.

Diplopie, nystagmus.

Fatigue, perte de poids, asthénie, anorexie.

Des cas isolés d'événements thromboemboliques ont été décrits sans que la relation directe avec la prise du **topiramate** soit établie. Chez l'enfant : perte de poids ou absence de prise de poids, lymphocytose et plus rarement leucopénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les taux plasmatiques des autres **antiépileptiques** ne sont pas modifiés sauf occasionnellement chez certains patients traités par la **phénytoïne** dont les taux plasmatiques peuvent augmenter.

La **phénytoïne** et la **carbamazépine** diminuent les taux plasmatiques du **topiramate**.

Risque de diminution de l'efficacité contraceptive des **contraceptifs oraux** par diminution des concentrations en œstrogènes.

## ÉPILEPSIE ET GROSSESSE (2)

TRAITEMENT	COMPLICATIONS	CONDUITE À TENIR
<b>Acide valproïque DÉPAKINE</b> À ÉVITER	Malformations : 9-15 % dont anomalies de fermeture du tube neural (2-3 %), fente labiale, dysmorphie, malformation urogénitale, diminution du QI, trouble envahissant du développement Risque de syndrome hémorragique chez le nouveau-né (non par déficit en vitamine K, contrairement aux inhibiteurs enzymatiques)	Surveillance échographique, dosage de l' $\alpha$ -foetoprotéine, parfois amniocentèse. TCA, plaquettes, fibrinogène : - chez la mère avant l'accouchement, - à la naissance, chez le nouveau-né.
<b>Phénobarbital GARDÉNAL</b>	Risque de diminution des taux en fin de grossesse Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né Syndrome de sevrage à la naissance	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance Allaitement conseillé, ou <b>phénobarbital</b> à petites doses chez le nouveau-né.
<b>Phénytoïne DIHYDAN</b>	Risque faible, en cas d'administration au 1 <sup>er</sup> trimestre, d'un syndrome particulier dont ni la fréquence ni la réalité ne sont prouvées : anomalie craniofaciale, hypoplasie des phalanges distales, RCIU, retard psychomoteur Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	Éviter la <b>phénytoïne</b> au 1 <sup>er</sup> trimestre. Doses minimales efficaces si ce traitement est indispensable (voir <b>phénobarbital</b> ).
<b>Carbamazépine TÉGRÉTOL</b>	Possible augmentation des anomalies de fermeture du tube neural À éviter si ATCD de spina bifida Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance
<b>Oxcarbazépine TRILEPTAL</b>	Taux de malformation faible et risque de diminution du taux en cours de grossesse Risque de syndrome hémorragique du nouveau-né	<b>Vitamine K</b> : 10 mg/j <i>per os</i> chez la mère les 15 derniers j de la grossesse. Nouveau-né : 0,5-1 mg IM ou IVL à la naissance
<b>Lamotrigine LAMICTAL</b>	Risque malformatif faible Risque de diminution du taux en fin de grossesse	Surveillance clinique particulièrement en fin de grossesse car baisse des taux sériques En post-partum : nécessité de diminuer la posologie si elle a été augmentée en fin de grossesse Allaitement déconseillé
<b>Topiramate ÉPITOMAX</b>	Fentes labiales et malformations cardiovasculaires	
<b>Lévétiracétam KEPPRA</b>	Peu de complications décrites	Surveillance clinique car risque de baisse de la concentration plasmatique au 3 <sup>e</sup> trimestre Allaitement contre-indiqué
<b>Zonisamide ZONEGRAN</b>	Fentes labiales et malformations cardiovasculaires et anomalies du tube neural	Si allaitement le débiter 1 mois après l'arrêt du <b>zonisamide</b>

## ANTIÉPILEPTIQUES (6) – LÉVÉTIRACÉTAM (1)

## ■ Lévéti racétam

KEPPRA					
A. : dose initiale : 500 mg x 2/j puis augmentation par paliers de 500 mg x 2/j, jusqu'à 1 500 mg x 2/j	60 cp. séc. 250 mg	27,40	I	65 %	0,46
	60 cp. séc. 500 mg	51,49	I	65 %	0,86
	60 cp. séc. 1 000 mg	98,68	I	65 %	1,64
E. de 4 à 11 ans et adolescent (de 12 à 17 ans) de moins de 50 kg : dose initiale : 10 mg/kg x 2/j et jusqu'à 30 mg/kg/j si nécessaire					
E. à partir de 4 ans, adolescents et adultes Seringue doseuse graduée tous les 25 mg Fl. de 5 mL À diluer dans 100 mL de solvant quelle que soit la dose et à injecter en 15 min	300 mL sol. buv. 100 mg/mL	96,95	I	65 %	3,23
	10 fl. sol. à diluer pour perf. 100 mg/mL	HOP	I	65 %	
N. de 1 à 6 mois Seringue doseuse graduée tous les 5 mg Posologie initiale : 7 mg/kg x 2/j Posologie maximale : 21 mg/kg x 2/j	150 mL sol. buv. 100 mg/mL (ser. 1 mL)	50,64	I	65 %	0,34
N. de plus de 6 mois et jusqu'à 4 ans Seringue doseuse graduée tous les 10 mg Posologie initiale : 10 mg/kg x 2/j Posologie maximale : 30 mg/kg x 2/j	150 mL sol. buv. 100 mg/mL (ser. 3 mL)	50,64	I	65 %	0,34

**ANTIÉPILEPTIQUES (7) – LÉVÉTIRACÉTAM (2)****PROPRIÉTÉS**

Nouvel antiépileptique dérivé de la pyrrolidone, dont le mécanisme d'action n'est pas encore élucidé.

Le **lévétiracétam** inhibe les canaux calciques et réduit la libération de calcium des réserves intracellulaires. Il inverse également l'effet inhibiteur du zinc et des bêta-carbolines sur les canaux GABAergiques et GLYCINergiques.

La biodisponibilité après absorption orale est proche de 100 %. La  $C_{\text{max}}$  est atteinte en 1 à 3 h après la prise. La demi-vie d'élimination est de 7 h, avec une élimination essentiellement rénale (95 %).

**INDICATIONS**

*En monothérapie* dans le traitement des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire à partir de 16 ans.

*En association* dans le traitement :

- des crises partielles, avec ou sans généralisation secondaire, chez l'adulte, l'adolescent, l'enfant et le nourrisson à partir de 1 mois.
- des crises myocloniques de l'adulte et de l'adolescent dès 12 ans présentant une épilepsie myoclonique juvénile;
- des crises généralisées tonico-cloniques primaires de l'adulte et de l'adolescent dès 12 ans présentant une épilepsie généralisée idiopathique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **lévétiracétam**.

Hypersensibilité à la pyrrolidone.

**Grossesse**: pas recommandée. La contraception est conseillée chez les femmes en âge de procréer.

**Allaitement** : pas de données cliniques suffisantes à l'heure actuelle.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Comme pour tous les **antiépileptiques** :

- risque de somnolence nécessitant des précautions en cas de conduite ou d'utilisation de machines ;

– risque de rebond à l'arrêt brutal du traitement.

Particularités du **lévétiracétam** :

- adapter les doses à la fonction rénale ;
- insuffisance hépatique sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Asthénie, anxiété, dépression.

Amnésie, ataxie, diplopie, convulsions, vertiges, céphalées, hallucinations, confusion.

Anorexie, diarrhée, dyspepsie.

Leucopénie, neutropénie, pancytopenie.

Éruption cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les taux plasmatiques des autres **antiépileptiques** ne sont pas modifiés.

Les médicaments éliminés par sécrétion tubulaire active peuvent réduire la clairance du métabolite principal du **lévétiracétam**.

Pas de modification de la pharmacocinétique des **contraceptifs oraux** avec le **lévétiracétam**.

## ANTIÉPILEPTIQUES (8) – BARBITURIQUES

## ■ Phénobarbital

<b>GARDÉNAL</b>					
A. : 2 à 3 mg/kg/j	80 cp. 10 mg	3,40	II	65 %	0,04
E. : 3 à 4 mg/kg/j	30 cp. 50 mg	1,84	II	65 %	0,06
<b>GARDÉNAL</b> injectable	20 cp. 100 mg	2,47	II	65 %	0,12
Voie SC, IM ou IV lente (1 à 2 inj.) :	1 fl. 40 mg	11,17	II	65 %	11,17
A. : 10 mg/kg/j	1 fl. 200 mg	HOP	II		
E. : 20 à 40 mg/j					
N. : 10 à 20 mg/j					
<b>APAROXAL</b>					
Idem <b>GARDÉNAL</b>	20 cp. séc. 100 mg	1,95	II	65 %	0,10

## ■ Phénobarbital + caféine

<b>ALEPSAL</b>					
Idem <b>GARDÉNAL</b>	30 cp. 15 mg	2,03	II	65 %	0,07
	30 cp. 50 mg	2,04	II	65 %	0,07
	30 cp. 100 mg	2,84	II	65 %	0,09
	30 cp. 150 mg	4,44	II	65 %	0,15

## ■ Phénobarbital + caféine + aubépine + passiflore

<b>KANEURON</b>					
Idem <b>GARDÉNAL</b>	1620 gtttes (fl. 30 mL) 1 gttte = 1 mg	8,68	II	65 %	0,01

**PROPRIÉTÉS**

Barbituriques. Résorption lente, métabolisme hépatique, élimination urinaire, demi-vie de 84 à 160 h, état d'équilibre atteint après 15 à 21 j. Inducteur enzymatique.

**INDICATIONS**

*Per os* : crises généralisées d'emblée ou secondairement tonicocloniques et partielles (efficacité moindre dans le petit mal).

Injectable : état de mal épileptique (matériel de réanimation respiratoire à proximité).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie, déficit en G6PD.

Insuffisance respiratoire sévère, porphyries.

**Grossesse** : risque tératogène faible.

**Allaitement** : contre-indiqué (sauf en prévention du syndrome de sevrage).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Diminution des doses chez le sujet âgé, l'alcoolique et dans l'insuffisance hépatique.

Enfant : adjonction systématique de **vitamine D** (prévention du rachitisme) et d' **acide folique**.

**Grossesse** : risque de syndrome hémorragique chez le nouveau-né à prévenir systématiquement par adjonction de **vitamine K** à la naissance.

Inducteur enzymatique et baisse du taux plasmatique : des **antiépileptiques** (**carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **valproate**, **lamotrigine**, **topiramate**), des **antivitamines K**, des antibiotiques, de la **cimétidine**, de la **théophylline** et des **contraceptifs oraux**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence, allergies, vertiges.

Confusion mentale, troubles mnésiques surtout chez le sujet âgé. Dépression.

Carences en folates et vitamine D. Ostéomalacie, rhumatisme gardénalique, maladie de Dupuytren.

## ANTIÉPILEPTIQUES (9) – HYDANTOÏNES

## ■ Phénytoïne

<b>DI-HYDAN</b>					
A. : 2 à 6 mg/kg/j (3 cp./j). E. : 3 à 8 mg/kg/j	60 cp. 100 mg	3,42	II	65 %	0,06
<b>DILANTIN</b>					
Dose de charge IV : A. : 18 mg/kg à la vitesse de 1 mg/kg/min (max 50 mg/min ou 25 mg/min chez le sujet âgé) E. : 10 mg/kg (max 50 mg/min) Dose d'entretien IV ou IM : A. : 7 à 10 mg/kg/j E. : 5 mg/kg/j	10 fl. 250 mg	HOP	II		

## ■ Fosphénytoïne

<b>PRODILANTIN</b>					
1,5 mg <b>fosphénytoïne</b> = 1 mg d'équivalent phénytoïne (EP) On exprime toujours les doses de <b>PRODILANTIN</b> en EP Dose de charge : 15 mg d'EP/kg IV (max 150 mg d'EP/min) Entretien : 4 à 5 mg d'EP/kg/j IV ou IM	10 amp. 750 mg	HOP	II		

## PROPRIÉTÉS

Résorption digestive rapide, fixation aux protéines, métabolisme hépatique, élimination urinaire, demi-vie de 10 à 48 h, état d'équilibre atteint en 8 à 10 j.

Inducteur enzymatique.

La **fosphénytoïne** est une prodrogue de la **phénytoïne** ; ses effets antiépileptiques sont imputables à la **phénytoïne**.

Concentration maximale : 30 min après injection IM.

Élimination : idem que pour **phénytoïne**.

## INDICATIONS

Épilepsies généralisées tonico-cloniques ou partielles (sauf petit mal et crises myocloniques).

Névralgies faciales, effet antiarythmique, intoxications aux **digitaliques**.

État de mal tonico-clonique (sauf **fosphénytoïne** IM).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie ou intolérance.

Bloc sino-auriculaire (risque de BAV par voie parentérale).

Forme IM de la **fosphénytoïne** dans l'état de mal.

**Allaitement.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance de la NFS, plaquettes, gencives.

Brossage soigneux et fréquent des dents.

Adjonction systématique d'**acide folique** et **vitamine D** si utilisation au long cours.

Risque de collapsus cardiovasculaire si utilisation de fortes doses parentérales.

**Grossesse** : risque de syndrome hémorragique chez le nouveau-né : apport systématique de **vitamine K**. Effet tératogène possible.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Somnolence.

Allergies (voire syndrome de Lyell), hépatites cholestatiques. Hypertrophie gingivale (20 %).

Doses élevées : syndrome cérébello-vestibulaire, confusion mentale, polynévrite, exacerbation des crises.

Carence en **acide folique** et **vitamine D**.

Troubles digestifs, lupus induit, acné, pigmentation brune du visage.

## ANTIÉPILEPTIQUES (10) – CARBAMAZÉPINE

## ■ Carbamazépine

<b>TÉGRÉTOL</b>					
Progressivement, en 2 ou 3 prises A. : 10 à 20 mg/kg/j E. : 10 à 15 mg/kg/j <b>TÉGRÉTOL</b> suspension Mêmes doses que <b>TÉGRÉTOL</b> en 2 ou 3 prises	50 cp. séc. 200 mg	5,03	II	65 %	0,10
	30 c-mes. 100 mg (fl. de 150 mL)	4,50	II	65 %	0,15
<b>TÉGRÉTOL LP</b>					
Mêmes doses que <b>TÉGRÉTOL</b> en 2 prises	30 cp. séc. 200 mg	3,49	II	65 %	0,12
	30 cp. séc. 400 mg	5,87	II	65 %	0,20

**PROPRIÉTÉS**

Résorption lente, demi-vie de 8 à 24 h, équilibre atteint en 2 à 5 j, métabolisme hépatique, élimination urinaire.

Inducteur enzymatique.

**INDICATIONS**

Épilepsies partielles et tonico-cloniques (déconseillé dans les absences et crises myocloniques).

Prévention des rechutes des troubles de l'humeur bipolaires, certains états maniaques.

Certaines douleurs (névralgies faciales, neuropathies douloureuses diabétiques).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie, bloc auriculoventriculaire, association avec les **IMAO**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière du bilan hépatique et de la NFS.

Utilisation prudente si risque de glaucome par fermeture de l'angle, d'adénome de la prostate, d'insuffisance cardiaque.

Adapter la posologie en cas d'insuffisance hépatique, rénale.

**Grossesse** : risque de syndrome hémorragique chez le nouveau-né à prévenir par administration systématique de **vitamine K**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs, prise de poids, bouche sèche.

Dose-dépendants : somnolence, ataxie, vertiges, rarement confusion mentale ou agitation. Imposant l'arrêt : neutropénie (2 %), thrombopénie, agranulocytose, aplasie, protéinurie, éruption cutanée (risque de syndrome de Lyell).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles des inducteurs enzymatiques.

## ANTIÉPILEPTIQUES (11) – DÉRIVÉS DU CARBOXAMIDE (1)

## ■ Oxcarbazépine

TRILEPTAL					
A. : 600 à 2 400 mg/kg/j en 2 prises	50 cp. 150 mg	8,80	II	65 %	0,18
E. : 30 à 46 mg/kg/j en 2 prises	50 cp. 300 mg	17,04	II	65 %	0,34
	50 cp. 600 mg	31,92	II	65 %	0,64
	1 fl. susp. buv. 250 mL (60 mg/mL)	32,90	II	65 %	32,90

## PROPRIÉTÉS

Après administration orale, l'**oxcarbazépine** est complètement absorbée et largement transformée en son métabolite actif (DMH). Son mécanisme d'action principal serait un blocage des canaux sodiques voltage-dépendants, ayant pour effet de stabiliser les membranes hyperexcitées, d'inhiber les décharges neuronales répétitives et de diminuer la propagation des influx synaptiques.

Pour la DMH : 40 % liée aux protéines,  $T_{max}$  de 4,5 h, demi-vie de 9,3 h, métabolisme hépatique, élimination rénale. État d'équilibre atteint en 2-3 j.

## INDICATIONS

En monothérapie ou en association à un autre **antiépileptique** chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

**Grossesse et allaitement** : pas de donnée clinique pour la grossesse. L'**oxcarbazépine** et son métabolite passent dans le lait, ce qui contre-indique l'allaitement pendant le traitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour tous les **antiépileptiques** :

- risque de somnolence nécessitant des précautions en cas de conduite ou d'utilisation de machines ;
- risque de rebond à l'arrêt brutal du traitement.

Particularités pour l'**oxcarbazépine** :

- risque d'hyponatrémies (2,7 % des patients traités) nécessitant une surveillance après 2 sem. de traitement puis pendant les 3 premiers mois, notamment chez les patients présentant des antécédents d'hyponatrémie, de troubles rénaux, chez le sujet âgé ou les patients recevant des traitements hyponatrémiants. L'hyponatrémie disparaît habituellement après arrêt ou diminution du traitement ;
- adapter les posologies en cas d'insuffisance rénale (clairance < 30 mL/min) en débutant à demi-dose ;

- risques de réactions d'hypersensibilité croisée avec la **carbamazépine** ;
- bien que les essais thérapeutiques n'aient pas montré d'effet sur la conduction cardiaque, les patients présentant des troubles préexistants devront être surveillés attentivement ;
- inefficacité des **contraceptifs oraux** ; autre méthode de contraception à choisir.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hyponatrémies fréquentes (2,7 %) mais généralement asymptomatiques, favorisées par traitement hyponatrémiant associé. Contrôle avant traitement, à J15 et x 1/mois pendant 3 mois.

Réactions d'hypersensibilité dont œdèmes de Quincke, réactions d'hypersensibilité multisystémique.

Diplopie, vertiges, céphalées, somnolence, asthénie, agitation, insomnie, confusion, amnésie, troubles de l'humeur, apathie, nystagmus, tremblement.

Nausées, vomissements, constipations, diarrhées.

Élévation peu fréquente des transaminases ou phosphatases alcalines.

Acné, alopecie.

Très rares arythmies par bloc de conduction.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'**oxcarbazépine** et son métabolite sont des inhibiteurs enzymatiques, notamment le CYP2C19. Ce sont de plus des inducteurs enzymatiques de CYP3A4, CYP3A5, faiblement de l'UDP-glucuronyl transférase. Il en découle des interactions médicamenteuses multiples.

Résumé des interactions entre **oxcarbazépine** et autres **antiépileptiques** :

- avec la **carbamazépine** : diminution de 0-22 % de la **carbamazépine**, diminution de 40 % de la DMH ;
  - avec le **phénobarbital** : augmentation de 14-15 % du **phénobarbital**, diminution de 30-31 % de la DMH ;
  - avec la **phénytoïne** : augmentation de 0-40 % de la **phénytoïne**, diminution de 29-35 % de la DMH ;
  - avec le **valproate** : pas d'influence sur les taux de **valproate**, diminution de 0-18 % de la DMH.
- Autres interactions : **vérapamil**, **félodipine**, **cimétidine**, **érythromycine**, **IMAO**, **lithium**.



## ANTIÉPILEPTIQUES (12) – DÉRIVÉS DU CARBOXAMIDE (2)

## ■ Eslicarbazépine

ZEBINIX					
Initiale : 400 mg/j en 1 prise Entretien : 800 mg/j en 1 prise jusqu'à 1 200 mg/j À diviser par 2 en cas d'IR modérée	30 cp. 800 mg	93,65	I	65 %	3,12

## PROPRIÉTÉS

Le mécanisme d'action exact de l'**acétate d'eslicarbazépine** est inconnu. Des études électrophysiologiques *in vitro* indiquent néanmoins que l'**acétate d'eslicarbazépine** et ses métabolites stabilisent l'inactivation des canaux sodiques voltage-dépendants, empêchant ainsi leur retour à un état activé et maintenant de ce fait les décharges neuronales répétées.

## INDICATIONS

En association chez le patient adulte dans le traitement de l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire.

## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, patient de moins de 18 ans.
- Antécédent connu de bloc auriculoventriculaire du 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> degré, insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement par ce médicament a été associé à des effets indésirables du système nerveux central (ex. sensations vertigineuses et somnolence) pouvant augmenter le risque de survenue de blessures accidentelles.

L'**acétate d'eslicarbazépine** peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux. L'utilisation de formes contraceptives non hormonales supplémentaires est par conséquent recommandée pendant le traitement par ce médicament.

Comme avec tous les autres **antiépileptiques**, l'arrêt de ce médicament doit se faire de manière progressive afin de limiter le risque

possible de crises convulsives à l'arrêt du traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : sensations vertigineuses, somnolence.

Fréquents : céphalées, trouble de la coordination et de la marche, vertiges, tremblements, nausées, vomissements, diarrhées.

Peu fréquents : troubles cardiovasculaires tels que palpitations, bradycardie, douleurs à la poitrine, hypotension, hypertension.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Autres **antiépileptiques** :

L'utilisation concomitante de l'**acétate d'eslicarbazépine** et de l'**oxcarbazépine** n'est pas recommandée, car elle peut conduire à une surexposition aux métabolites actifs.

Une augmentation de la posologie peut également être à prévoir en cas d'association avec la **phénytoïne**.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire avec la **lamotrigine** ou le **topiramate**.

- Contraceptifs oraux : cf. Précautions d'emploi.
- Effet inducteur CYP 3A4

En raison de l'effet légèrement inducteur du **ZEBINIX**, une attention particulière sera portée en cas d'administration concomitante de substrats de ce CYP tels que **simvastatine**, **rosuvastatine** et ceux à marge thérapeutique étroite comme les **antivitamines K** ou les **digitaliques**.

- IMAO

Une interaction entre les deux médicaments est possible en raison d'une analogie structurale.

## ANTIÉPILEPTIQUES (13) – DÉRIVÉS DU CARBOXAMIDE (3)

## ■ Rufinamide

INOVELON					
Posologie fonction du poids	10 cp. 100 mg	7,54	I	65 %	0,75
Dose initiale : 100 mg x 2/j (< 30 kg) ou 200 mg x 2/j (> 30 kg)	60 cp. 200 mg	78,02	I	65 %	1,30
Puis augmentation par paliers de 100 mg x 2/j (< 30 kg) ou 200 mg x 2/j (> 30 kg), tous les 2 j, en fonction de la réponse clinique	60 cp. 400 mg	151,73	I	65 %	2,53
Dose max. :	460 mL susp. buv.	117,32	I	65 %	0,26
< 30 kg : 500 mg x 2/j (si pas de traitement associé par <b>valproate</b> ) ou 300 mg x 2/j (si traitement associé par <b>valproate</b> )	40 mg/mL + 2 ser.				
Entre 30 et 50 kg : 900 mg x 2/j					
Entre 50 et 70 kg : 1200 mg x 2/j					
≥ 70 kg : 1600 mg x 2/j					
Arrêt progressif du traitement					

## PROPRIÉTÉS

Le **rufinamide** module l'activité des canaux sodiques, en prolongeant leur état inactif.

## INDICATIONS

Traitement adjuvant des crises d'épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut chez les patients âgés de 4 ans ou plus.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé en cas de grossesse : contraception efficace non hormonale pendant traitement, pour les femmes en âge de procréer.

Diminution de l'intervalle QT.

Contient du lactose.

Arrêt progressif du traitement : diminution de 25 % de la dose tous les 2 j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquent : somnolence, céphalées, vertiges, nausée, vomissements, fatigue.

Fréquent : infection ORL, anorexie, anxiété, état de mal épileptique, ataxie et troubles de la marche (chutes).

Peu fréquent : réaction d'hypersensibilité (incluant des syndromes DRESS et de Stevens-Johnson), idées suicidaires.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Augmentation des concentrations de **rufinamide** par le **valproate** (cf. Posologie).

Diminution des concentrations des médicaments métabolisés par le CYP3A4 : **contraceptifs hormonaux**, **statines** (sauf **pravastatine** et **rosuvastatine**), **ciclosporine**, **tacrolimus**, **carbamazépine**, **amiodarone**, **inhibiteurs de protéase du VIH**, **benzodiazépines**.

Médicaments à marge thérapeutique étroite : **antivitamine K**, **digoxine**.

## ANTIÉPILEPTIQUES (14) – DÉRIVÉ DU BENZISOXAZOLE

## ■ Zonisamide

ZONEGRAN					
Adultes : 300 à 500 mg/j en 1 ou 2 prises/j après la phase d'augmentation de posologie Pas d'indication chez l'enfant et l'adolescent	14 gél. 25 mg	14,03	I	65 %	1,00
	14 gél. 50 mg	14,03	I	65 %	1,00
	56 gél. 100 mg	54,34	I	65 %	0,97

## PROPRIÉTÉS

Dérivé du benzisoxazole (qui comporte un radical sulfamide).

Structure chimique non apparentée aux autres **antiépileptiques** avec une faible activité anhydrase carbonique *in vitro*. Il agirait sur les canaux sodiques et calciques voltage-dépendants. Il aurait aussi un effet modulateur sur l'inhibition neuronale dans laquelle le GABA sert de médiateur.

Absorption quasi complète, 40 à 50 % liés aux protéines plasmatiques, demi-vie d'élimination de 60 h par voie urinaire, état d'équilibre 13 j.

## INDICATIONS

En monothérapie dans le traitement de l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire chez le patient adulte présentant une épilepsie nouvellement diagnostiquée.

En association chez le patient adulte dans le traitement de l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **zonisamide**, à l'un des excipients ou aux **sulfamides**.

**Grossesse** et **allaitement** : à éviter.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour tous les **antiépileptiques** :

- risque de somnolence nécessitant des précautions en cas de conduite ou d'utilisation de machines ;
- risque de rebond à l'arrêt brutal du traitement.

Particularités du **zonisamide** :

- éruptions cutanées graves y compris syndrome de Stevens-Johnson ;
- risque augmenté si sujet âgé de plus de 65 ans ;
- prudence si antécédents de lithiases rénales, ou si association avec médicaments favorisant leur formation tel le **topiramate**. Favoriser une bonne hydratation ;
- nécessité d'utiliser une contraception adéquate et pendant 1 mois après l'arrêt du traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : somnolence, vertiges, anorexie et perte de poids, agitation, irritabilité, diplopie. Réactions d'hypersensibilité, douleurs abdominales, troubles du transit, lithiases rénales, éruptions cutanées graves.

Très rares : rhabdomyolyse, syndrome myasthénique, pancréatite, troubles hématologiques graves, acidose métabolique.

## ANTIÉPILEPTIQUES (15) – GABA-ERGIQUES (1)

## ■ Gabapentine

<b>NEURONTIN</b>					
Adultes et enfants de plus de 12 ans : 900 à 3 600 mg/j en 3 prises	90 gél. 100 mg	9,30	I	65 %	0,10
	90 gél. 300 mg	26,90	I	65 %	0,30
Enfants de 3 à 12 ans : 25 à 35 mg/kg/j en 3 prises	90 gél. 400 mg	32,09	I	65 %	0,36
	90 cp. 600 mg	43,64	I	65 %	0,48
	90 cp. 800 mg	53,68	I	65 %	0,60

**PROPRIÉTÉS**

Structure proche du GABA, mécanisme d'action encore inconnu.

Résorption de 60 %, élimination urinaire, demi-vie de 5 à 7 h.

**INDICATIONS**

Épilepsies partielles :

– adultes et enfants de plus de 12 ans : en monothérapie de 1<sup>re</sup> ou de 2<sup>e</sup> intention ou en association ;

– enfants à partir de 3 ans : en association.

Douleurs neuropathiques périphériques de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie connue à la **gabapentine**.

**Grossesse, allaitement** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence, vertiges, ataxie, céphalées, tremblements, troubles digestifs, sensation de nez bouché, allergie cutanée, neutropénie, thrombopénie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Non efficace dans les absences (peut même les aggraver).

Adaptation des doses à la clairance de la créatinine :

– > 80 mL/min : doses entre 900 et 3 600 mg/j ;

– < 80 mL/min : doses entre 600 et 1 800 mg/j ;

– < 50 mL/min : doses entre 300 et 600 mg/j ;

– < 30 mL/min : doses entre 150 et 600 mg/j ;

– < 15 mL/min : doses entre 150 et 300 mg/j.

## ANTIÉPILEPTIQUES (16) – GABA-ERGIQUES (2)

## ■ Prégabaline

LYRICA					
Progressivement en 2 ou 3 prises A. : 150 à 600 mg/j	56 gél. 25 mg	15,32	I	65 %	0,27
	84 gél. 25 mg	22,71	I	65 %	0,27
	100 gél. 25 mg	HOP	I		
	84 gél. 50 mg	36,77	I	65 %	0,44
	100 gél. 50 mg	HOP	I		
	56 gél. 75 mg	36,53	I	65 %	0,65
	100 gél. 75 mg	HOP	I		
	84 gél. 100 mg	52,64	I	65 %	0,63
	100 gél. 100 mg	HOP	I		
	56 gél. 150 mg	52,40	I	65 %	0,94
	100 gél. 150 mg	HOP	I		
	84 gél. 200 mg	76,44	I	65 %	0,91
	100 gél. 200 mg	HOP	I		
	56 gél. 300 mg	76,44	I	65 %	1,37
	100 gél. 300 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

La **prégabaline** est un analogue de l'acide gamma-aminobutyrique. Il se lie à une sous-unité auxiliaire des canaux calciques voltage-dépendants dans le système nerveux central déplaçant fortement le 3H gabapentine.

## INDICATIONS

Épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire en association.

Autres indications : douleurs neuropathiques périphériques ou centrales de l'adulte et trouble anxieux généralisé chez l'adulte.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **prégabaline**.  
Malabsorption du glucose ou du galactose.

**Grossesse et allaitement et âge < 18 ans :** déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence si antécédents psychiatriques.  
Augmentation très progressive des doses en cas d'insuffisance rénale (clairance < 60 mL/min).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Somnolence, asthénie, ataxie et vertiges, céphalées, irritabilité, troubles mnésiques, dépression, anorexie, agressivité, diplopie, vertiges, agueusie, troubles du langage.

Tachycardie, bloc auriculo-ventriculaire, hypotension artérielle.

Rhabdomyolyse, élévation des CPK et des transaminases.

Douleurs abdominales, ulcère gastro-duodénal.  
Neutropénie, thrombopénie.

## ANTIÉPILEPTIQUES (17) – GABA-ERGIQUES (3)

## ■ Vigabatrin

<b>SABRIL</b>					
Progressivement en 1 ou 2 prises	60 cp. séc. 500 mg	46,98	I	65 %	0,78
A. : 2 à 3 g/j	60 sach. 500 mg	49,15	I	65 %	0,82
E. : 40 à 100 mg/kg/j (en institution de traitement)	(susp. buv.)				

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur sélectif de la GABA-transaminase. Résorption rapide, élimination urinaire, demi-vie de 5 à 8 h mais l'efficacité dépend de la durée de resynthèse du GABA (2 à 5 j).

**INDICATIONS**

En association dans le cadre d'épilepsies partielles résistantes avec ou sans généralisation secondaire en monothérapie ou en association quand toutes les autres associations appropriées ont échoué.

En monothérapie : spasmes infantiles (syndrome de West).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie.

Grossesse et allaitement : déconseillé.

## ■ Tiagabine

<b>GABITRIL</b>					
A. et adolescent > 12 ans :	50 cp. 5 mg	29,16	I	30 %	0,58
En association avec des médicaments inducteurs enzymatiques : 30 à 50 mg/j en débutant de 5 à 10 mg/j et en augmentant chaque sem. de 5 à 10 mg/j	50 cp. 10 mg	54,60	I	30 %	1,09
Sans association avec des inducteurs enzymatiques : 15 à 30 mg/j en débutant de 5 à 10 mg/j et en augmentant chaque sem. de 5 à 10 mg/j	50 cp. 15 mg	79,75	I	30 %	1,60

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur puissant et sélectif du captage de GABA neuronal et glial. Entraîne une augmentation de la concentration de GABA intracérébral, principal neurotransmetteur inhibiteur. Absorption rapide, liaison à 95 % aux protéines, demi-vie de 7 à 9 h.

**INDICATIONS**

Crises partielles avec ou sans généralisation secondaire, en association.

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolues : hypersensibilité à la tiagabine et insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prudence si antécédents psychiatriques. Augmentation très progressive des doses en cas d'insuffisance rénale (clairance < 60 mL/min).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles du champ visuel (1 patient/3) après des mois ou années de traitement, irréversibles, imposant un examen du champ visuel au début du traitement et tous les 6 mois.

Somnolence, asthénie, ataxie et vertiges, céphalées, irritabilité, troubles mnésiques, dépression, agressivité, diplopie.

Prise de poids, douleurs abdominales, diminution des transaminases hépatiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Phénytoïne** : diminution de 20 % des concentrations de phénytoïne sans conséquences cliniques.

Relatives : épilepsies généralisées.

Éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Cp. à prendre en fin de repas (meilleure tolérance).

Posologies initiales plus faibles en cas d'antécédent d'anxiété généralisée et de dépression.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sensation vertigineuse, asthénie et sédation.

## ANTIÉPILEPTIQUES (18) – DÉRIVÉ DU SUCCINIMIDE

## ■ Éthosuximide

ZARONTIN					
En 1 à 2 prises/j A. : 20 mg/kg/j E. : 20 à 30 mg/kg/j	40 càc 250 mg (1 fl. = 200 mL)	7,52	II	65 %	0,19

**PROPRIÉTÉS**

Agirait sur les canaux calciques T. Demi-vie de 30 h (enfant) à 60 h (adulte), équilibre atteint en 7 j, élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Uniquement dans les absences, en 2<sup>e</sup> intention après l'**acide valproïque** ou en association.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie.

**Grossesse** et **allaitement** : à éviter.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs, allergies, somnolence, céphalées, rarement vertiges, ataxie, excitation, exacerbation des crises tonico-cloniques ou partielles si associées.

Leucopénie, voire agranulocytoses rares.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Précautions avec la **carbamazépine**.

## ANTIÉPILEPTIQUES (19) – AUTRES ANTIÉPILEPTIQUES (1)

## ■ Rétigabine

TROBALT					
Posologie initiale : 100 mg x 3/j	21 cp. 50 mg	5,07	I	65 %	0,24
Posologie d'entretien : 200-400 mg x 3/j	84 cp. 50 mg	18,34	I	65 %	0,22
	63 cp. 21 x 50 mg et 42 x 100 mg	22,77	I	65 %	0,36
	21 cp. 100 mg	9,43	I	65 %	0,45
	84 cp. 100 mg	35,58	I	65 %	0,42
	84 cp. 200 mg	66,85	I	65 %	0,80
	84 cp. 300 mg	98,12	I	65 %	1,17
	84 cp. 400 mg	129,39	I	65 %	1,54

## PROPRIÉTÉS

Les canaux potassiques font partie des canaux ioniques voltage-dépendant que l'on trouve dans les cellules neuronales et sont des éléments déterminants de l'activité neuronale. Des études *in vitro* indiquent que la **rétigabine** agit essentiellement par l'ouverture des canaux potassiques neuronaux. Ceci stabilise le potentiel de repos de la membrane et contrôle l'excitabilité électrique infraliminaire dans les neurones, prévenant ainsi le déclenchement d'éventuels potentiels d'action épileptiformes.

## INDICATIONS

Traitement de deuxième intention, soit après l'échec d'au moins 2 monothérapies pour des crises d'épilepsie partielles avec ou sans généralisation secondaire chez les patients épileptiques âgés de 18 ans et plus, en association avec un autre **antiépileptique**.

À discuter au cas par cas compte tenu des effets secondaires de pigmentation cutanée et rétinienne.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (contient de l'huile de soja).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec prudence chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal sévère ou l'insuffisant hépatique

sévère : réduire les posologies de moitié (50 mg x 3/j) si possible en fonction du contexte clinique.

Examen ophtalmoscopique complet à l'initiation du traitement et tous les 6 mois afin de rechercher une pigmentation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Asthénie, état confusionnel (9 %), troubles psychotiques, hallucinations, désorientation, anxiété, sensations vertigineuses, somnolence, amnésie, éruption cutanée, troubles gastro-intestinaux, rétention urinaire à rechercher systématiquement le plus souvent dans les 8 premières sem. de traitement.

Modification pigmentaire (couleur bleu gris) des tissus oculaires, de la peau, des lèvres, des ongles et de la rétine après plusieurs années de traitement

Hématurie, augmentation des enzymes hépatiques, allongement du QT.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Autres **antiépileptiques** carbamazépine et phénytoïne peuvent réduire l'exposition à la **rétigabine**.

L'administration de **rétigabine** aux doses thérapeutiques pourrait augmenter la concentration plasmatique de la **digoxine**.



## ANTIÉPILEPTIQUES (20) – AUTRES ANTIÉPILEPTIQUES (2)

■ **Lacosamide**

<b>VIMPAT</b>					
Posologie initiale : 50-100 mg x 2/j Posologie entretien : 200 mg x 2/j	14 cp. 50 mg	12,55	I	65 %	0,90
	56 cp. 50 mg	46,51	I	65 %	0,83
	56 cp. 100 mg	88,71	I	65 %	1,58
	56 cp. 150 mg	130,92	I	65 %	2,34
	56 cp. 200 mg	173,11	I	65 %	3,09
	1 fl. 10 mg/mL (40 doses)	34,45	I	65 %	34,45

**PROPRIÉTÉS**

Des études électrophysiologiques *in vitro* ont montré que le **lacosamide** favorise de manière sélective l'inactivation lente des canaux sodiques voltage-dépendants, entraînant ainsi une stabilisation des membranes neuronales hyperexcitables.

**INDICATIONS**

En association dans le traitement des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l'adulte et l'adolescent (16-18 ans) présentant une épilepsie.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique « Liste des excipients ».

Blocs auriculoventriculaires connus du 2<sup>e</sup> ou du 3<sup>e</sup> degré.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance psychiatrique et cardiaque.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Asthénie, dépression, irritabilité, confusion, insomnie, vertiges, céphalées, éruption cutanée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **lacosamide** n'a pas d'effet inhibiteur ou inducteur des CYP2C19 et 3A4 cliniquement pertinent. Pas d'interactions médicamenteuses cliniquement significatives.

## ANTIÉPILEPTIQUES (21) – AUTRES ANTIÉPILEPTIQUES (3)

## ■ Pérampanel

FYCOMPA					
En une prise le soir, avant le coucher	7 cp. 4 mg	HOP	I		
	28 cp. 4 mg	HOP	I		
Posologie initiale : 2 mg/j	98 cp. 4 mg	HOP	I		
Posologie d'entretien : 4-8 mg/j					
Posologie maximale : 12 mg/j					

## PROPRIÉTÉS

L'activation des récepteurs AMPA par le glutamate serait responsable de l'essentiel de la transmission synaptique excitatrice rapide dans le cerveau. Le **pérampanel** est un antagoniste sélectif, non compétitif de ces récepteurs entraînant une diminution de l'excitabilité neuronale.

## INDICATIONS

En association dans le traitement des crises d'épilepsie partielles avec ou sans généralisation secondaire chez des patients épileptiques âgés de 12 ans et plus.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Des idées suicidaires ont été rapportées lors de la mise sous traitement antiépileptique, une surveillance est donc recommandée. L'arrêt du traitement doit être progressif.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables fréquents ou très fréquents :  
 – troubles généraux : nausées, douleurs dorsales, fatigue, troubles de la marche ;  
 – métabolisme et nutrition : augmentation/perde d'appétit ;  
 – psychiatrie : agressivité, colère, anxiété, désorientation ;  
 – système nerveux : vertiges, somnolence, ataxie, troubles de l'équilibre ;  
 – oculaires : diplopie, vision trouble.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Contraceptifs oraux : risque de diminution de leur efficacité, ajouter un autre type de contraception.
- Autres **antiépileptiques** : dans les études menées, la concentration de **FYCOMPA** est sensible aux propriétés inductrices des **phénytoïne**, **carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **topiramate**. Lui-même augmente la concentration d'un tiers de l'**oxcarbazépine**.
- Autres médicaments : le **pérampanel** étant métabolisé par le CYP450, il est sensible aux inducteurs (**rifampicine**, millepertuis) et aux inhibiteurs puissants (**antifongiques azolés**).

## ANTIÉPILEPTIQUES (22) – RÉCAPITULATIF (1)

## Antiépileptiques classiques

	ACTIVITÉ	POSOLOGIE	TAUX THÉRAPEUTIQUES	DEMI-VIE
<b>Clobazam</b> <b>URBANYL</b>	Épilepsies généralisées ou partielles	A. : 0,5 mg/kg/j	Pas de relation dose-effet établie	20 h
<b>Clonazépam</b> <b>RIVOTRIL</b>	Toutes épilepsies	A. : 2 mg/j E. : 0,05 mg/kg/j	0,02-0,08 mg/L	36 h
<b>Phénobarbital</b> <b>GARDÉNAL</b>	Toutes épilepsies sauf petit mal	A. : 3 mg/kg/j E. : 4 mg/kg/j	20-30 mg/L	A. : 5-7 j E. : 2 j
<b>Phénytoïne</b> <b>DI-HYDAN</b>	Toutes épilepsies sauf petit mal	A. : 3 mg/kg/j E. : 8 mg/kg/j	10-15 mg/L	36 h
<b>Carbamazépine</b> <b>TÉGRÉTOL</b>	Grand mal et épilepsie temporale	A. : 10 mg/kg/j E. : 10 à 20 mg/kg/j	2-10 mg/L	20 h
<b>Acide valproïque</b> <b>DÉPAKINE</b>	Toutes épilepsies	A. et E. : 20 à 30 mg/kg/j	60-80 mg/L	10 h
<b>Éthosuximide</b> <b>ZARONTIN</b>	Petit mal	A. et E. : 30 mg/kg/j	40-60 mg/L	45 h

## ANTIÉPILEPTIQUES (23) – RÉCAPITULATIF (2)

## Nouveaux antiépileptiques

	INDICATION	POSOLOGIE	PARTICULARITÉS
<b>Oxcarbazépine</b> <b>TRILEPTAL</b>	Épilepsies partielles	600 à 2 400 mg/j en 2 prises	En monothérapie ou en association.
<b>Gabapentine</b> <b>NEURONTIN</b>	Épilepsies partielles	1 200 à 2 400 mg/j en 3 prises	Adapter les doses à la fonction rénale. En monothérapie ou en association.
<b>Lévétiracétam</b> <b>KEPPRA</b>	En monothérapie dans le traitement des crises partielles (> 16 ans) En association dans le traitement : - des crises partielles (> 4 ans) - des crises myocloniques (> 12 ans) - des crises généralisées tonico- cloniques primaires (> 12 ans)	500 mg x 2/j à augmenter progressivement jusqu'à 1 500 mg x 2/j	Adapter les doses à la fonction rénale.
<b>Lamotrigine</b> <b>LAMICTAL</b>	Épilepsies généralisées ou partielles	200 à 400 mg en 2 prises	Augmentation progressive des doses. Association au <b>valproate</b> déconseillée. En monothérapie ou en association.
<b>Topiramate</b> <b>EPITOMAX</b>	Adulte et enfant (> 2 ans) Épilepsies généralisées et épilepsies partielles ; en monothérapie, après échec d'un traitement antérieur ou en association	200 à 600 mg/j en 2 prises	Risque de lithiase rénale.
<b>Lacosamide</b> <b>VIMPAT</b>	Épilepsies partielles	50 à 200 mg x 2/j	Prudence si antécédents cardiaques. En association
<b>Zonisamide</b> <b>ZONEGRAN</b>	Épilepsies partielles	300 à 500 mg/j	Risque de lithiase rénale.
<b>Eslicarbazépine</b> <b>ZEBINIX</b>	Épilepsies partielles	400 à 1 200 mg/j	Adapter les doses à la fonction rénale. En association
<b>Vigabatrin</b> <b>SABRIL</b>	Épilepsies partielles	A. : 2 à 4 g/j (2 prises) E. : 40 à 100 mg/kg/j (2 prises)	Prudence si antécédents psychiatriques. En monothérapie ou en association.
<b>Tiagabine</b> <b>GABITRIL</b>	Épilepsies partielles	15 à 30 mg si pas d'inducteurs enzymatiques 30 à 50 mg/j si inducteurs enzymatiques	Prudence si antécédents psychiatriques. Adapter les doses à la fonction rénale.

## ANTIDYSKINÉSIQUE

## ■ Tétrabénazine

XENAZINE					
Début progressif jusqu'à 3 cp./j max. 200 mg/j 1/2 dose chez le sujet âgé	112 cp. séc. 25 mg	194,51	II	65 %	1,74

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé synthétique de la benzylquinolizine qui entraîne une déplétion en dopamine et autres monoamines au niveau du cerveau par inhibition sélective de leur transport dans les vésicules neuronales présynaptiques. Elle réduit ainsi les mouvements anormaux hyperkinétiques.

Liaison de 80 % aux protéines. Métabolisme hépatique, élimination urinaire. Demi-vie de 5 h.

**INDICATIONS**

Mouvements anormaux liés à la maladie de Huntington.  
Hémiballisme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Grossesse et allaitement.

**IMAO** non sélectifs (risque de crise hypertensive jusqu'à 15 j après arrêt), **antiparkinso-**

**niens dopaminergiques** ou **lévodopa** et **dopaminergiques non antiparkinsoniens**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter chez le parkinsonien, patient traité pour dépression, insuffisance rénale.

Pas d'arrêt brutal (risque de syndrome malin des neuroleptiques).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Dépression, anxiété, confusion, nervosité.  
Insomnie, somnolence, troubles de la mémoire, vertiges, akathisie, syndrome parkinsonien et syndrome malin des neuroleptiques.  
Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée).

Hypotension orthostatique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cf. Contre-indications.

À prendre en compte : sédatifs dont les **antipsychotiques**, **antihypertenseurs**, **bêtabloquants** (sauf **sotalol** et **esmolol**).

## INHIBITEUR CALCIQUE SÉLECTIF DU CANAL CALCIQUE LENT

## ■ Nimodipine

<b>NIMOTOP</b>					
360 mg/j <i>per os</i> en 6 prises 1 à 2 mg/h IVSE à adapter à la PA	90 cp. 30 mg 1 fl. sol. perf. 10 mg/50 mL	47,19 HOP	I I	65 %	0,52

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur calcique sélectif du canal calcique lent, ayant un effet vasodilatateur supérieur aux autres inhibiteurs calciques.

Absorption rapide, effet de premier passage hépatique, fixation aux protéines plasmatiques, demi-vie de 2 h, élimination biliaire.

**INDICATIONS**

Prévention et traitement du vasospasme des artères cérébrales secondaire à une hémorragie méningée.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non démontrée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utiliser avec prudence la forme injectable en cas d'insuffisance hépatique, d'insuffisance cardiaque ou de troubles de conduction.

Utiliser avec prudence en cas d'œdème cérébral ou d'HTIC.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, rougeur du visage, troubles digestifs, diminution modérée de la tension artérielle, élévation transitoire des transaminases.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association contre-indiquée : **disulfirame** (soluté injectable contenant de l'alcool).

Associations déconseillées : autres **inhibiteurs calciques**, **méthyldopa**, **dantrolène** injectable.

## ANTICÉDÉMATEUX CÉRÉBRAL

## ■ Mannitol

<b>MANNITOL</b>				
Flacon à 10 % (10 g/100 mL)	1 fl. 250 mL (10 %)	HOP		
500 à 1 000 mL/24 h en IV lente	1 fl. 250 mL (20 %)	HOP		
Flacon à 20 % (20 g/100 mL)	1 fl. 500 mL (10 %)	HOP		
250 à 500 mL/24 h en IV lente	1 fl. 500 mL (20 %)	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Substances osmotiques actives, ne diffusant pas dans les espaces extracellulaires, non métabolisées et sécrétées par filtration glomérulaire sans réabsorption. Action antioedémeuse au niveau cérébral et de la chambre antérieure de l'œil, rapide et prolongée. Action diurétique (diurèse osmotique).

**INDICATIONS**

HTIC.

Traitement d'urgence des hypertonies oculaires aiguës.

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolue : hyperosmolarité plasmatique ou déshydratation intracellulaire.

Relative : insuffisance cardiaque.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Solution hypertonique 20 % à utiliser avec précaution, en perfusion sur 20 min.

Surveiller l'équilibre hydroélectrolytique en cas d'utilisation prolongée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque d'œdème du poumon en cas d'insuffisance cardiaque ou de surdosage.

## ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

## ■ Clopidogrel

<b>PLAVIX</b>					
Initiation : dose de charge de 1 cp. à 300 mg dans le cadre d'un événement aigu	30 cp. 75 mg 50 cp. 75 mg 30 cp. 300 mg	33,84 HOP HOP	I I I	65 %	1,13
Entretien : 1 cp./j à 75 mg					

## ■ Dipyridamole + acide acétylsalicylique

<b>ASASANTINE LP</b>					
2 gél./j	60 gél. 200 mg/25 mg	14,56	II	65 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire et de la libération de certains facteurs plaquettaires, entraînant un allongement du temps de saignement dès le 2<sup>e</sup> j.

Résorption rapide, élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Prévention secondaire des accidents ischémiques cérébraux (**PLAVIX** et **ASASANTINE LP**).

Prévention des accidents ischémiques majeurs, notamment coronariens, chez les patients présentant une artérite des membres inférieurs (stade de claudication intermittente) pour le **PLAVIX**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Syndromes hémorragiques, ulcère évolutif.

Troubles de l'hémostase avec allongement du temps de saignement.

Insuffisance hépatique sévère et hypersensibilité à la molécule pour le **PLAVIX**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**PLAVIX** : pas d'effets secondaires hématologiques, donc pas de surveillance biologique.

**ASASANTINE LP** : éviter chez l'asthmatique et le BPCO.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Dipyridamole** et **clopidogrel** : cf. Cardiologie.

**Dipyridamole + acide acétylsalicylique** : céphalées, douleurs épigastriques, nausées, diarrhées, saignements.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations déconseillées : tout médicament anticoagulant, **AINS**, **méthotrexate** > 15 mg/sem. et **uricosuriques** pour l'**ASASANTINE LP**.

Les inhibiteurs de la pompe à protons et en particulier l'oméprazole pourraient diminuer l'efficacité du **clopidogrel**.



## ANTIMIGRAINEUX (1) – DÉRIVÉS DE L'ERGOT DE SEIGLE (TRAITEMENT DE LA CRISE)

### ■ Dihydroergotamine pernasale

<b>DIERGOSPRAY</b>					
1 pulv. dans chaque narine (jusqu'à 4 pulv./j)	1 fl. 4 mg/mL	5,17	II	30 %	5,17

### ■ Dihydroergotamine injectable

<b>DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM</b>					
1 inj. IV/IM/SC à renouveler 1 fois si néc. après 30 min	2 amp. 1 mL (1 mg/mL)	5,17	II	30 %	2,59

### ■ Ergotamine tartrate

<b>GYNERGÈNE CAFÉINÉ</b>					
2 cp. renouvelable 1 fois	20 cp. 1 mg	3,27	I	30 %	0,16

#### PROPRIÉTÉS

Vasoconstricteur artériel ayant des effets identiques à ceux de l'ergotamine : antagoniste sérotoninergique 5HT<sub>2</sub>, mais à fortes doses effet agoniste partiel b-adrénergique et effet sérotoninergique.

Parfois associé à un stimulant du système nerveux central (**caféine**) : **GYNERGÈNE CAFÉINÉ**.

En général bonne résorption par voie nasale ou injectable, mais plus faible par voie orale (effet de premier passage hépatique important). Élimination biphasique par voie biliaire et fécale.

#### INDICATIONS

Traitement de la crise migraineuse.

#### CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Maladies cardiovasculaires quels qu'en soient le siège ou la cause : artériopathies oblitérantes, insuffisance coronarienne, syndrome de Raynaud, HTA, artérite cérébrale, thyrotoxicose.

**Grossesse et allaitement**, enfants de moins de 10 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Doses maximales : 4 mg/j et 10 mg/sem. La survenue de paresthésies (fourmillements, etc.), de phénomènes douloureux ou de vasoconstriction des extrémités, même aux doses usuelles, impose l'arrêt du traitement (risque d'ergotisme aigu).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : épigastralgies, nausées. Voie parentérale : paresthésies des extrémités, précordialgies.

Pour le **tartrate d'ergotamine** : possibilité de dépendance avec céphalées de rebond si utilisation pendant plus de 2 j/sem. ou au-delà des doses préconisées.

*Ergotisme* : cf. Ergotisme aigu.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **sumatriptan**, **macrolides** (sauf **spiramycine**) car risque d'ergotisme.

Associations déconseillées : **bromocriptine**, **méthylergométrine**.

## MIGRAINE (2)

### Correction des facteurs déclenchants

Ces facteurs sont : psychologiques, alimentaires (alcool, chocolat, fromage), sensoriels (bruit, lumière), climatiques, sommeil prolongé, tabac, efforts physiques violents, etc.

### Traitement médicamenteux

L'efficacité est jugée après 3 mois de traitement après examen de l'agenda des crises remis au patient lors de la 1<sup>re</sup> consultation. Si le médicament est efficace (réduction de la fréquence des crises d'au moins 50 %), on maintient le même traitement encore 3 à 6 mois puis on réduit progressivement jusqu'à arrêt si possible ou, si impossible, on réduit alors les doses jusqu'à la dose minimale efficace. Sinon on propose un autre traitement.

#### • $\beta$ -bloquants :

– **propranolol (AVLOCARDYL)** 40 à 120 mg/j en l'absence de contre-indication : généralement bien toléré, il est volontiers prescrit chez les patients(es) « neurotoniques » ;  
– autres  $\beta$ -bloquants : **SELOKEN (AMM)** pour la dose 200 mg LP. Commencer par 1/4 ou 1/2 cp

• **Amitriptyline** : **LAROXYL** cp. à 25 mg x 1/j ou IV à XX gtt/j, notamment si la migraine est associée à un syndrome dépressif.

• **Topiramate** : **EPITOMAX** gél. à 25 et 50 mg et cp. à 50 mg. Débuter par 25 mg le soir pendant 1 sem. puis augmenter progressivement si besoin jusqu'à 100 mg/24 h en 2 prises. Prévenir le patient des effets indésirables et en particulier l'amaigrissement.

• **Aspirine** : dose variable (300 à 500 mg/j) dans le traitement des migraines avec aura fréquentes.

Plus rarement on proposera :

• **Valproate de sodium (DÉPAKINE)** : pas

d'AMM. Posologie entre 500 et 1 000 mg/j.

• **Pizotifène** : **SANMIGRAN** cp. à 0,5 mg 2 à 3 cp. en une prise le soir. Risque de prise de poids.

• **Oxérotone** : **NOCERTONE** cp. à 60 mg 2 à 3 cp./j en une prise le soir. Risque de somnolence, diarrhée.

• **Inhibiteur calcique** : **flunarizine (SIBÉLIUM)** 1 cp. le soir au coucher. En cas d'échec des autres traitements. Pas plus de 6 mois car risque de syndrome extrapyramidal.

• **AINS** : pas d'AMM.

• **Inhibiteur calcique** : **vérapamil (ISOPTINE)** cp. à 40 mg et gél. à 120 mg. 240 à 320 mg/j hors AMM.

### Autres traitements

• Relaxation, biofeedback et gestion du stress. Intéressant en particulier chez l'enfant et pendant la grossesse.

• Acupuncture.

### Cas particulier : migraine cataméniale

Attention : ce traitement ne s'adresse qu'aux migraines cataméniales **pures** (crise survenant exclusivement dans les 48 h précédant les règles) et si le traitement de la crise n'est pas efficace. Ce traitement est **limité à la période menstruelle** ; de J-2 à J+5 après les règles ou hémorragie de privation.

• **17- $\beta$ -estradiol (OESTRODOSE)** percutané, 1,5 mg/j pendant les règles (hors AMM).

• Certains **triptans** peuvent être utilisés de façon préventive et séquentielle : **frovatripran** 2,5 mg x 2/j, **naratriptan** 1 mg x 2/j, **zolmitriptan** 2,5 mg x 2/j (pas d'AMM spécifique).

• Pour les patientes ayant une contraception orale la prévention des crises menstruelles peut être réalisée par l'utilisation d'un œstroprogestatif en continu ou par celle d'un progestatif pur.

## ANTIMIGRAINEUX (2) – DÉRIVÉS DES TRICYCLIQUES

## ■ Pizotifène

SANMIGRAN					
Atteindre progressivement 2 à 3 cp./j (max. : 6 cp./j)	50 cp. 0,5 mg	6,44	II	30 %	0,13
	100 cp. 0,5 mg	11,29	II	30 %	0,11

**PROPRIÉTÉS**

Dérivé des tricycliques. Antisérotoninergique, antihistaminique et faiblement anticholinergique. Léger effet antidépresseur.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la migraine.

**CONTRE-INDICATIONS**

Glaucome par fermeture de l'angle et rétention urinaire liée à des troubles uréthroprostatiques.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : à éviter au 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** : déconseillé.

Risque de somnolence chez les conducteurs de véhicules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence, prise de poids. Rarement nausées, vertiges, douleurs musculaires.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations à éviter : **atropine** et autres substances atropiniques ; autres dépresseurs du SNC (**barbituriques, benzodiazépines, clonidine, hypnotiques**, etc.).

Alcool : majoration de l'effet sédatif.

## ■ Oxérotone

NOCERTONE					
1 à 2 cp. x 2/j	30 cp. séc. 60 mg	5,35	II	30 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Activité antisérotoninergique, antihistaminique et antiémétique.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la migraine.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prise d'alcool fortement déconseillée.

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

Risque de somnolence chez les conducteurs de véhicules.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Somnolence en début de traitement.

Rares diarrhées cédant à l'arrêt du traitement.

## MIGRAINE (3)

### Contraception orale et migraine

Il faut être prudent pour la prescription d'une pilule œstrogénique chez les femmes présentant des migraines avec auras fréquentes, particulièrement lorsqu'il existe un tabagisme associé. Il faut dans ce cas privilégier une contraception orale purement progestative ou un autre moyen contraceptif.

Il faut arrêter la pilule en cas de céphalées

inhabituelles, de migraines plus intenses ou plus fréquentes, ou d'apparition d'auras ou encore d'auras plus fréquentes.

### Grossesse et allaitement

Le problème du traitement de fond se pose rarement pendant la grossesse car le plus souvent la migraine s'améliore. On privilégiera avant tout les méthodes non médicamenteuses.

### Possibilités d'utilisation des antimigraineux pendant la grossesse et l'allaitement

Traitement	Grossesse	Allaitement
<b>Traitement de crise</b>		
<b>Paracétamol</b>	Possible	Possible
<b>Aspirine et AINS</b>	Possibles jusqu'au 6 <sup>e</sup> mois et interdits après 24 SA	Déconseillés
<b>Codéine</b>	À éviter	Contre-indiquée
<b>Ergotés</b>	Contre-indiqués	Contre-indiqués
<b>Triptans</b>	À éviter. Pas d'effet tératogène rapporté.	À éviter dans les 24 h suivant la prise
<b>Traitement de fond</b>		
<b>Bêta-bloquant</b>	Possible. À arrêter 1 mois avant l'accouchement, progressivement.	Déconseillés
<b>Amitriptyline</b>	Risque tératogène faible. À arrêter 1 mois avant l'accouchement, progressivement.	Déconseillée
<b>Pizotifène</b>	Peu ou pas de données	Déconseillé
<b>Oxétorone</b>	Déconseillé	Déconseillée
<b>Flunarizine</b>	Déconseillé	Déconseillée
<b>Valproate de sodium</b>	Tératogénicité possible	Déconseillé
<b>Topiramate</b>	Déconseillé	Déconseillé

ANTIMIGRAINEUX (3) – AGONISTES SÉROTONINERGIQUES 5HT<sub>1</sub> (1)

## ■ Sumatriptan

<b>IMIGRANE</b>					
1 inj. SC par crise Max. 2 inj. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 1 h entre 2 inj.	2 ser. 6 mg 2 ser. 6 mg + injecteur		I I	NR NR	
1 cp. 50 mg par crise Max. 300 mg par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 2 h entre 2 prises	6 cp. 50 mg	20,02	I	65 %	3,34
1 pulv. dans 1 seule narine par crise Max. 2 pulv. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 2 h entre 2 pulv.	2 amp. 10 mg/0,1 mL pulv. nas. 6 amp. 20 mg/0,1 mL pulv. nas.	10,53 28,97	I I	65 % 65 %	5,27 4,83
<b>IMUJECT</b>					
1 inj. SC par crise Max. 2 inj. par 24 h Respecter un intervalle d'au moins 1 h entre 2 inj.	2 ser. 6 mg 2 ser. 6 mg + injecteur	50,89 53,34	I I	65 % 65 %	25,45 8,89

## PROPRIÉTÉS

Agoniste sélectif des récepteurs 5HT<sub>1</sub>-like à la sérotonine principalement localisés au niveau des vaisseaux sanguins crâniens.

Biodisponibilité de 96 %, demi-vie de 2 h, métabolites inactifs excrétés par voie urinaire.

## INDICATIONS

**IMIGRANE** : traitement de la crise migraineuse avec ou sans aura ; liste I, remboursement 65 %. La forme **IMIGRANE** spray 10 mg/0,1 mL est indiquée chez l'adolescent de 12 à 17 ans.

**IMUJECT** : traitement de la crise de l'algie vasculaire de la face ; médicament d'exception.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au **sumatriptan** ou aux **sulfamides**.

Antécédent d'infarctus du myocarde, angor d'effort ou de repos, HTA non contrôlée, infarctus cérébral.

Enfant de moins de 15 ans et adulte de plus de 65 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** et **allaitement** : déconseillé.

Injection sous-cutanée stricte.

Risque de déclenchement de crise convulsive chez les patients aux antécédents d'épilepsie.

En présence de facteurs de risque cardiovasculaire, l'évaluation du rapport bénéfice/risque doit être faite et une surveillance doit être assurée (ECG). Noter que des douleurs thoraciques transitoires, intenses, peuvent survenir quelques minutes après injection de **sumatriptan**. Dans l'expérience actuelle, elles ne sont qu'exceptionnellement liées à un spasme coronaire.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs transitoires et réactions locales au point d'injection.

Réactions allergiques de tout type.

Symptômes transitoires suivant l'injection pouvant intéresser n'importe quelle partie du corps (notamment la poitrine) : douleur, chaleur, oppression, pesanteur, fourmillements.

Vertiges, somnolence, nausées, élévation transitoire de la tension artérielle.

Quelques rares cas de spasmes coronaires ont pu être observés.

Convulsions.

Élévation rare, transitoire des transaminases.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **IMAO**, **dérivés de l'ergot de seigle**, autres traitements vasoconstricteurs, **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine** (fluvoxamine, fluoxétine, paroxétine, citalopram).

## MIGRAINE (4)

### État de mal migraineux

**Définition :** crise migraineuse persistante ou se répétant quotidiennement au-delà de 72 h malgré le traitement.

L'intrication avec un abus médicamenteux (**paracétamol, triptans, dérivés de l'ergot de seigle**) et/ou un syndrome anxiodépressif est fréquent.

### Diagnostic différentiel

Toute céphalée inhabituelle, même chez un migraineux connu, nécessite d'éliminer les urgences thérapeutiques : hémorragie méningée, méningite, maladie de Horton, hypertension intracrânienne, dissection artérielle.

Donc, bilan minimum : clinique, NFS, VS, fond d'œil et au moindre doute scanner cérébral et ponction lombaire.

### Mise en condition

- Hospitalisation en service de neurologie.
- Repos au lit, en chambre seule, au calme, dans le noir.
- Rassurer et calmer le patient.
- Arrêt des **antimigraineux** utilisés, et notamment des **dérivés de l'ergot de seigle**.

### Traitement médicamenteux

► **Agoniste sérotoninergique 5HT<sub>1</sub>**  
**Sumatriptan (IMIGRANE)** 1 amp. SC renouvelable 1 fois si échec (respecter un intervalle d'au moins 1 h) en l'absence de prise de dérivés ergotés depuis > 24 h.

► *Si échec ou contre-indication*

• **Amitriptyline (LAROXYL)** IV ; atteindre rapidement la dose efficace (jusqu'à 150 mg/j).

• **Clorazépate dipotassique (TRANXÈNE)** 1 amp. à 50 mg x 3/j si agitation. Rééquilibration hydroélectrolytique.

• **Métoclopramide (PRIMPÉRAN)** 1 amp. à 10 mg x 3/j si vomissements.

Sevrage des médicaments pris de façon abusive.

### • Au décours :

- discuter ou réévaluer le traitement de fond de la migraine ;
- éducation du patient sur l'utilisation des **antimigraineux**, notamment des **antalgiques** et des **triptans**.

### Ergotisme aigu

#### C'est une urgence thérapeutique.

Il est secondaire à un surdosage en dérivés de l'ergot de seigle : vomissements, engourdissements, somnolence, paresthésies, douleurs et cyanose des extrémités, pouls périphérique diminué ou aboli, hypotension ou hypertension. Risque d'ischémie aiguë des membres par vasoconstriction périphérique.

### Traitement préventif

Il repose sur l'éducation du patient à qui l'on prescrit des **dérivés de l'ergot de seigle**. Il est indispensable que le patient :

- respecte les doses prescrites ;
- connaisse les effets secondaires et sache arrêter le traitement en cas d'apparition des premiers signes de surdosage : paresthésies, douleurs des extrémités ;
- ne fasse pas d'association médicamenteuse sans avis médical.

### Traitement curatif

- Hospitalisation en urgence.
- Arrêt de tous les **dérivés de l'ergot de seigle**.

• Contre-indication du **sumatriptan**.

Réchauffement des membres en ischémie pour lutter contre le vasospasme périphérique.

► **Héparinothérapie**

À doses efficaces afin d'obtenir un TCA entre 1,5 et 2,5 fois le témoin.

► **Vasodilatateurs**

- **Naftidrofuryl (PRAXILÈNE)** 400 mg x 2/j IV.
- Ou parfois **papavérine (ALBATRAN)**, **nitroprussiate de sodium** ou **prazosine**.

► **Corticothérapie**

Pour certains, en intraveineux (par exemple **SOLUMÉDROL** 120 mg/j IVL jusqu'à disparition des symptômes).

ANTIMIGRAINEUX (4) – AGONISTES SÉROTONINERGIQUES 5HT<sub>1</sub> (2)

## ■ Naratriptan

<b>NARAMIG</b>					
Traitement de la crise de migraine de l'adulte à la phase céphalalgique (qu'il y ait ou non une aura) : 1 cp. Ajouter éventuellement 1 cp. après 4 h si, après amélioration partielle, les symptômes réapparaissent Ne pas dépasser 2 cp./24 h Le produit n'est pas recommandé chez l'adolescent (12 à 17 ans) et l'enfant	6 cp. 2,5 mg	23,83	I	65 %	3,97
	12 cp. 2,5 mg	45,21	I	65 %	3,77
	18 cp. 2,5 mg	HOP	I		

## ■ Zolmitriptan

<b>ZOMIG</b>					
Traitement de la crise de migraine de l'adulte à la phase céphalalgique (ne pas administrer au moment d'une aura) : 1 cp. Ajouter éventuellement 1 cp. après 2 h si, après amélioration partielle, les symptômes réapparaissent Ne pas dépasser 4 cp./24 h	6 cp. 2,5 mg	23,82	I	65 %	3,97
	12 cp. 2,5 mg	45,21	I	65 %	3,77
<b>ZOMIGORO</b>					
Idem <b>ZOMIG</b>	6 cp. orodisp. 2,5 mg	23,82	I	65 %	3,97
	12 cp. orodisp. 2,5 mg	43,17	I	65 %	3,60

## ■ Élétriptan

<b>RELPAx</b>					
1 cp. de 40 mg dès le début de la crise (mais après l'aura) Éventuellement renouvelable 1 fois si réapparition de la céphalée en respectant un délai de 2 h entre les prises	6 cp. 20 mg	24,05	I	65 %	4,01
	6 cp. 40 mg	24,05	I	65 %	4,01
	10 cp. 40 mg	37,90	I	65 %	3,79

## ■ Almotriptan

<b>ALMOGRAN</b>					
1 cp. de 12,5 mg dès le début de la crise Éventuellement renouvelable 1 fois si réapparition de la céphalée en respectant un délai de 2 h entre les prises	6 cp. 12,5 mg	23,48	I	65 %	3,91
	12 cp. 12,5 mg	44,62	I	65 %	3,72

## ■ Frovatriptan

<b>TIGREAT</b>					
1 cp. de 2,5 mg dès le début de la crise Éventuellement renouvelable 1 fois si réapparition de la céphalée en respectant un délai de 2 h entre les prises	2 cp. 2,5 mg	8,00	I	65 %	4,00
	6 cp. 2,5 mg	22,91	I	65 %	3,82
	12 cp. 2,5 mg	43,62	I	65 %	3,64
<b>ISIMIG</b>					
Idem <b>TIGREAT</b>	2 cp. 2,5 mg	8,00	I	65 %	4,00
	6 cp. 2,5 mg	22,91	I	65 %	3,82
	12 cp. 2,5 mg	43,62	I	65 %	3,64

## ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE (AVF)

Le diagnostic de l'algie vasculaire de la face (AVF) est clinique, reposant sur l'interrogatoire. Il est fréquemment fait tardivement, le patient souffrant depuis plusieurs années. Il existe une forme épisodique avec crises pendant 3 à 12 sem., une ou plusieurs fois/an avec rémissions de quelques mois jusqu'à plusieurs années et une forme chronique avec crises récurrentes pendant un an sans rémission ou rémissions inférieures à 1 mois.

L'examen clinique est le plus souvent normal. L'IRM cérébrale et l'angiographie par résonance magnétique sont normales

### Traitement de la crise

- **Sumatriptan** sous-cutané (**IMIJECT**) solution injectable SC à 6 mg/0,5 mL en ne dépassant pas 2 amp./j. Problème de l'abus médicamenteux chez les patients ayant 7 à 8 crises /j.

- Oxygène 7 L/min, au masque, pendant 15 min. Pas d'effet indésirable ni contre-indication. Proposé si échec ou contre-indication au **sumatriptan**, ou en association avec celui-ci, lorsqu'existent plus de 2 crises/j. Prise en charge à 100 %.

- Rarement on pourra utiliser **sumatriptan** 20 mg par voie nasale ou **dihydroergotamine** spray si échec ou contre-indication du **sumatriptan** sous-cutané.

### Traitement de fond

Il vise à diminuer la fréquence des crises lors des épisodes douloureux et au long cours en cas d'AVF chronique. Il n'est pas indispensable chez les patients ayant des épisodes de courte durée avec peu de crises et répondant bien au **sumatriptan** sous-cutané.

- **Vérapamil** (**ISOPTINE**) gél. à 120 mg x 3 à 4/j : traitement de première intention, que l'AVF soit épisodique ou chronique. Pas

d'AMM. Surveillance ECG (BAV) et tensionnelle. Rarement posologie plus élevée nécessaire (720 mg/j). Dans la forme épisodique, on prévoit un traitement d'une durée équivalente aux accès précédents puis diminution sur une quinzaine de jours.

- **Indométacine** (**INDOCID**) gél. à 25 mg, sup. à 50 et 100 mg (150 à 200 mg/j) efficace en quelques jours, sinon arrêter. Essayer de diminuer à la posologie minimale efficace. Pour les formes épisodiques et chroniques en cas d'échec du **vérapamil**.

- **Lithium** (**TÉRALITHE**) cp. à 250 mg ou LP à 400 mg (en moyenne 900 mg/j) : si échec ou contre-indication du **vérapamil** et de l'**indométacine**. Réservé à la forme chronique. Pas d'AMM. Augmentation progressive des doses, surveillance des lithémies entre 0,6 et 1 mEq/L puis diminution des doses jusqu'à la dose minimale efficace, en surveillant les effets secondaires (tremblements, somnolence, nystagmus, ataxie, hypothyroïdie).

- **Prednisone** parfois, dans les formes très sévères (0,5 à 1 mg/kg pendant 15 j. puis diminution rapide sur 1 semaine), uniquement dans la forme épisodique.

- **Antiépileptiques** si échec des traitements dans l'AVF chronique : **topiramate** (**EPITOMAX**), **valproate de sodium** (**DÉPAKINE**). Hors AMM.

### Traitement chirurgical

Dans les centres spécialisés. Alcoolisation du ganglion sphéno-palatine, thermocoagulation du ganglion de Gasser, *gamma knife* (radiochirurgie) sur le nerf trijumeau, décompression microvasculaire du nerf trijumeau, neurostimulation de l'hypothalamus postérieur par implantation d'électrode.

Association : [www.afcavf.org](http://www.afcavf.org)



ANTIMIGRAINEUX (5) – AGONISTES SÉROTONINERGIQUES 5HT<sub>1</sub> (3)

## ■ Rizatriptan

MAXALT					
1 cp. à 5 mg dès le début de la crise à renouveler si efficacité partielle 2 h plus tard	6 cp. 5 mg	23,82	I	65 %	3,97
	12 cp. 5 mg	43,17	I	65 %	3,60
	6 cp. 10 mg	22,91	I	65 %	3,82
	12 cp. 10 mg	43,62	I	65 %	3,63

## PROPRIÉTÉS

Les agonistes sérotoninergiques des récepteurs recombinants humains vasculaires 5HT<sub>1D</sub> alpha et 5HT<sub>1D</sub> bêta provoquent un double effet vasoconstricteur et inhibiteur de libération sur de nombreux neuropeptides (peptide lié au gène de la calcitonine, peptide vasoactif intestinal, substance P).

Le récepteur 5HT<sub>1D</sub> bêta serait spécifique de l'effet vasoconstricteur et c'est sur lui que les agonistes de la 5HT<sub>1</sub> agiraient. Ils peuvent ainsi maîtriser rapidement, en moins d'une heure, la crise de migraine. Ils traversent également la barrière hémato-méningée atteignant les centres vasodilatateurs qu'ils neutralisent et contrôlent ainsi les algies vasculaires de la face. L'absorption est rapide et complète et les concentrations plasmatiques sont maintenues pendant 4 à 6 h.

La répétition des prises n'entraîne pas d'accumulation du produit.

Plus de 60 % de la dose administrée par voie orale sont retrouvés dans les urines (principalement sous forme d'acide indole acétique) et environ 30 % dans les fèces sous forme inchangée.

## INDICATIONS

L'indication type est la crise de migraine céphalalgique en phase aiguë. Les inhibiteurs de la 5HT<sub>1</sub> sont peu actifs s'ils sont administrés au moment d'une aura. Ils n'ont pas d'action préventive mais agissent mieux s'ils sont administrés dès le début de la crise céphalalgique.

## CONTRE-INDICATIONS

Tous les états au cours desquels une vasoconstriction peut être dangereuse : antécédents d'infarctus du myocarde, spasme coronarien, artérite des membres inférieurs.

Troubles du rythme cardiaque liés à une voie

de conduction accessoire, syndrome de Wolff-Parkinson-White.

HTA non contrôlée.

Antécédents d'accidents ischémiques cérébraux.

**Grossesse, allaitement** : par mesure de précaution il n'est pas conseillé d'utiliser ces produits chez la femme enceinte ni pendant l'allaitement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

N'administrer que si le diagnostic de crise migraineuse est absolument certain.

Les autres causes de céphalées doivent en effet être dépistées car elles potentialisent les risques d'accidents ischémiques sous **agonistes sérotoninergiques HT<sub>1</sub>**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets les plus fréquents sont : nausées, vertiges ; sensation de somnolence, de chaleur, de fatigue générale, sécheresse de la bouche.

Les effets les plus sévères ont été des épisodes de tachycardie ventriculaire.

D'autres manifestations ont été notées : sensation de striction thoracique, myalgies, faiblesse musculaire, paresthésies.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées :

- vasoconstricteurs alcaloïdes de l'ergot de seigle (**ergotamine** et dérivés de l'ergotamine tel le **méthylsergide**). Il est conseillé d'attendre 24 h si le patient a absorbé ces produits, avant de lui prescrire des **agonistes de la 5HT<sub>1</sub>** ;
- **IMAO** : risque d'HTA et de vasoconstriction artérielle.

Associations déconseillées :

- **propranolol** ;
- **antidépresseurs sérotoninergiques** (**fluoxétine**, **fluvoxamine**, **paroxétine**) : risque de vasoconstriction, de spasme coronarien, de syndrome sérotoninergique (agitation, confusion, collapsus, hyper- ou hypothermie, troubles musculaires).

## ANTISPASTIQUES (1)

### ■ Baclofène

<b>LIORÉSAL</b>					
Progressivement (par paliers de 5 mg) : 1/2 à 9 cp./j en 3 ou 4 prises	50 cp. 10 mg	6,80	I	30 %	0,14
<b>LIORÉSAL</b> injectable	1 amp. 0,05 mg/1 mL	HOP	I		
Voie intrathécale, sous surveillance médicale spécialisée, selon un protocole particulier	1 amp. 10 mg/5 mL	HOP	I		
	1 amp. 10 mg/20 mL	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Analogue structural du GABA agissant surtout au niveau médullaire présynaptique.

Résorption rapide, liaison aux protéines plasmatiques (30 %), demi-vie de 3 à 4 h, élimination essentiellement urinaire.

### INDICATIONS

Contractures spastiques (sclérose en plaques, affections médullaires ou cérébrales).

En cours d'étude dans le sevrage alcoolique. Hoquets rebelles.

### CONTRE-INDICATIONS

Allergies, myasthénie.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser avec prudence si : épilepsie, troubles psychiatriques, antécédents ulcéreux, affection

vasculaire cérébrale, insuffisance respiratoire ou hépatique, et chez les conducteurs.

Voie intrathécale : protocole selon 3 étapes :  
 – sélection des répondeurs (dose-test de 25 mg en 1 min, augmentée par paliers de 25 mg/24 h, jusqu'à obtention d'une réponse 4 à 8 h après l'injection, ou jusqu'à 100 mg).  
 Si pas de réponse à 100 mg non-répondeur ;  
 – détermination de la dose efficace chez les répondeurs ;  
 – traitement d'entretien en perfusion continue (10 à 1 200 mg/j).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Somnolence et/ou nausées transitoires fréquentes en début de traitement.

Plus rarement hypotonie musculaire, bouche sèche, élévation des transaminases.

Confusion, hallucinations (sujet âgé surtout).

Abaissement du seuil épileptogène.

### ■ Dantrolène

<b>DANTRIUM</b>					
Progressivement, jusqu'à la dose efficace (maximum 100 à 200 mg/j)	50 gél. 25 mg	6,59	I	30 %	0,13
	30 gél. 100 mg	13,01	I	30 %	0,43
	50 gél. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. lyoph. 20 mg	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Agit directement sur les fibres musculaires striées, sans modifier la transmission neuromusculaire ni la conduction nerveuse.

Résorption digestive de 80 %, demi-vie de 8-10 h, élimination urinaire et fécale.

### INDICATIONS

Spasticité pyramidale.

### CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépatique grave, myasthénie.

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Hépatites cytolytiques (cas mortels) : surveillance mensuelle du bilan hépatique.

Divers : troubles digestifs, somnolence, confusion, urines orangées, incontinence urinaire, éruptions cutanées acnéiformes.

## SCLÉROSE EN PLAQUES (2)

### Troubles de la marche

**Fampridine (FAMPYRA)** 1 cp. x 2/j, à 12 h d'intervalle pour les formes rémittentes ou progressives avec score EDSS entre 4 et 7. Le traitement est prescrit initialement pour 2 sem. et évalué par un test de marche. En l'absence d'amélioration il n'est pas poursuivi.

### Antispastiques

*Le maintien d'un certain degré de spasticité est parfois indispensable, sa disparition complète pouvant aggraver ou faire apparaître un déficit.*

À doses progressives, jusqu'à la dose efficace : **baclofène (LIORÉAL)** 1/2 à 9 cp./j en 3 prises, ou : **dantrolène (DANTRIUM)** 1 à 8 cp./j en 3 prises ou éventuellement **gabapentine** (hors AMM) : gél. à 400 mg : 1 gél. x 3/j à instituer progressivement et à augmenter si besoin jusqu'à 3 600 mg/j. NB : Dans les formes sévères quand la spasticité empêche le nursing ou la rééducation, on utilise parfois le **baclofène** en intrathécal selon un protocole particulier (cf. **Baclofène**). En cas de spasticité focale, avec retentissement fonctionnel : **toxine botulinique** efficace environ 3 mois.

**SATIVEX** : en cas d'échec des autres traitements et si amélioration clinique au cours d'un traitement initial (test). Il est efficace dans tous les types de SEP.

### Troubles sphinctériens

Le but est de favoriser une bonne vidange vésicale afin de prévenir les infections et de protéger le haut appareil urinaire. Après une échographie vésicale, un bilan urodynamique et l'avis du spécialiste, on peut utiliser les traitements suivants.

• *En absence de résidu post-mictionnel :*

Médicaments **anticholinergiques** : **trospium (CERIS)** 2 cp./j, **flavoxate (URISPASS)** 3 cp./j ou **oxybutynine (DITROPAN)** 1 à 3 cp./j pour les mictions impérieuses.

**BOTOX** en injection intradétrusorienne si les médicaments **anticholinergiques** ne sont pas efficaces.

• *Si résidu post-mictionnel :*

– Avec dysynergie vésico-sphinctérienne, **alphabloquant**, **alfuzosine (XATRAL)**.

– Avec hypoactivité vésicale et dysurie, sondages vésicaux (hétéro ou autosondages intermittents), voire parfois sonde à demeure.

**Prévention des infections urinaires** : maintien d'une diurèse supérieure à 2 L/j, aseptie stricte en cas de sondages intermittents, surveillance régulière de l'ECBU, traitement précoce de toute infection urinaire.

► **Médicaments anticholinergiques**

**Oxybutynine (DITROPAN)** 1 à 3 cp./j pour les mictions impérieuses.

### Constipation

Régime riche en fibres, **laxatifs**, lavements.

### Douleurs ou dysesthésies

• Névralgie du trijumeau.

• **Carbamazépine (TÉGRÉTOL)** 200 mg 1 à 3 cp./j à doses progressives (AMM) ou **oxcarbazépine (TRILEPTAL)** cp. à 300 mg 1 cp x 2/j puis 1 cp. le matin, 2 le soir et augmenter si besoin. **Lamotrigine (LAMICTAL)** (hors AMM), cp. à 25 et 50 mg : débuter progressivement (cf. Traitement de l'épilepsie) jusqu'à 150 mg/j et augmenter progressivement si besoin.

• Douleurs neuropathiques : **imipramine**, **amitriptyline**, **gabapentine**, **prégabaline** ou **clonazépam (RIVOTRIL)** (gouttes).

### Troubles cognitifs et anxio-dépressifs

Les troubles cognitifs concernent principalement l'attention, la fonction exécutive et la mémoire. Intérêt des tests neuropsychologiques.

Psychothérapie et/ou relaxation, en association avec un traitement antidépresseur si besoin.

### Kinésithérapie

• Rééducation motrice au domicile, au long cours, visant à préserver le maximum d'autonomie.

• Ne pas aller jusqu'à la fatigue, éviter le travail analytique (bicyclette, poulies).

### Ergothérapie

Dès qu'une gêne des membres supérieurs apparaît ou qu'il existe un retentissement sur l'autonomie quotidienne.

## ANTISPASTIQUES (2)

### ■ Tétrahydrocannabinol + cannabidiol

<b>SATIVEX</b>					
Période de titration (jusqu'à 2 sem.) Dose usuelle : 8 pulv./j Dose max. : 12 pulv./j Min. 15 min entre 2 pulv. Traitement réévalué à 4 sem.	48 pulv. bucc. (5,5 mL) 90 pulv. bucc. (10 mL)		S S	NR NR	

#### PROPRIÉTÉS

Agoniste des récepteurs CB1 et CB2 aux cannabinoïdes.

Diminue la rigidité des membres et améliore les fonctions motrices.

Pas de syndrome de sevrage, dépendance peu plausible.

Risque faible de détournement à des fins récréatives : le pic plasmatique et son temps d'apparition pour le cannabis fumé sont, respectivement, plus élevé et plus court que ceux de **SATIVEX**.

#### INDICATIONS

Spasticité modérée à sévère chez le patient adulte atteint de sclérose en plaques (SEP) :

- qui n'a pas suffisamment répondu à d'autres traitements antispastiques ;
- et pour lequel un essai initial du traitement a démontré une amélioration cliniquement significative des symptômes liés à la spasticité.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Antécédents familiaux ou personnels de troubles psychiatriques autres que la dépression.

Allaitement.

## SCLÉROSE EN PLAQUES (3)

### Traitement de fond [1]

Son but est de diminuer le nombre de poussées. On surveille son efficacité par l'examen clinique, le score EDSS (*Expanded Disability Status Scale*) qui permet d'évaluer le handicap et l'IRM.

À retenir : EDSS 3 marche parfaitement autonome, EDSS 6 : aide unilatérale nécessaire.

### SEP récurrente rémittente

#### ► Immunomodulateurs

#### Interférons bêta

Traitement de fond en première intention actuellement. Diminue d'un tiers le nombre de poussées.

- interféron  $\beta$ -1b (**BETAFERON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**) : 1 injection SC tous les 2 j dans les formes rémittentes ou secondairement progressives (EDSS < 6) ;
- interféron  $\beta$ -1a : **AVONEX** 1 inj. IM/sem. ou **REBIF** 1 injection SC x 3/sem.

#### Acétate de glatiramer

**COPAXONE** : 20 mg/j en sous-cutané si intolérance ou contre-indication(s) aux interférons. Diminue de 30 % le nombre de poussées et de 30 % à 2 ans le nombre de lésions à l'IRM. Pas d'effet sur la progression du handicap.

#### ► Immunosuppresseurs

- Utilisés pour les formes actives de SEP-RR ; soit ne répondant pas au traitement par interféron bêta, bien conduit soit pour les formes graves d'emblée (cf. Indications).
- Natalizumab (**TYSABRI**) , 300 mg/perf. Réduit de 68 % le taux de rechute, le niveau de handicap résiduel et le nombre des lésions IRM. Possibilité de perte d'efficacité par Ac anti-natalizumab et surtout

risque à long terme de leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP). Le risque doit être évalué avant le début du traitement, la sérologie JC virus prélevée et le patient informé.

– **Fingolimod (GILENYA)** per os 1 gél/j. À utiliser en 1<sup>re</sup> indication si sérologie JC virus+.

– **Mitoxantrone (ELSEP)**, 12 mg/m<sup>2</sup> (sans dépasser 20 mg/perf.) x 1/mois pendant 6 mois. Réduit le taux de rechute à 68 %, le niveau de handicap résiduel et le nombre des lésions IRM. Dose cumulative maximale autorisée : 72 mg/m<sup>2</sup>. Risque de leucémies. Utilisation très limitée.

• Autres **immunosuppresseurs** non spécifiques dont l'efficacité n'est pas prouvée :

- **azathioprine (IMUREL)** 2 mg/kg/j per os, plusieurs mois. Surveillance de la NFS régulière ;
- **cyclophosphamide (ENDOXAN)**. En cures brèves, par perfusion à fortes doses. Rarement utilisé.

### Événement démyélinisant isolé

En cas de critères radiologiques de dissémination spatiale et temporelle avec prise de contraste on peut proposer des traitements immunomodulateurs : interféron  $\beta$ -1a (**REBIF**), interféron  $\beta$ -1b (**AVONEX**), interféron  $\beta$ -1b (**BÉTAFÉRON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**) ou acétate de glatiramer (**COPAXONE**).

### SEP secondairement progressive

Interféron  $\beta$ -1b (**BÉTAFÉRON**) et  $\beta$ -1b recombinant (**EXTAVIA**).

Mitoxantrone.

Corticoïdes IV mensuels.

### SEP progressive primaire

Pas de traitement efficace défini. Éventuellement corticoïdes IV mensuels.

## ANTISPASTIQUES (3)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### Période de titration

Jour	Nb de pulv. matin	Nb de pulv. soir	Nb total de pulv.
1	0	1	1
2	0	1	1
3	0	2	2
4	0	2	2
5	1	2	3
6	1	3	4
7	1	4	5
8	2	4	6
9	2	5	7
10	3	5	8
11	3	6	9
12	4	6	10
13	4	7	11
14	5	7	12

Conservation : au frais avant ouverture, à température ambiante après ouverture, jusqu'à 28 j.

À la 1<sup>re</sup> administration, trouble possible de la fréquence cardiaque et de la tension : traitement non recommandé en cas de pathologie cardiovasculaire.

Contraception efficace pendant traitement et 3 mois après arrêt. Traitement non recommandé pendant la grossesse (rapport bénéfice/risque à évaluer).

Ne pas conduire ou utiliser des machines en cas d'étourdissement ou somnolence.

Insuffisance rénale ou hépatique : évaluation fréquente du traitement (effet prolongé).

Varié le site buccal d'administration pour éviter les effets indésirables locaux.

**SATIVEX** peut être illégal dans un pays étranger : s'informer avant un voyage.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Étourdissements, somnolence, fatigue : fréquents lors des 4 premières sem. de traitement. Ne pas arrêter le traitement.

Anxiété, illusions, modifications de l'humeur,

idées paranoïaques : transitoires et d'intensité légère à modérée.

Désorientation, confusion, hallucinations, psychose, idées suicidaires : arrêt du traitement.

Douleur, gêne buccale, dysgueusie, ulcération buccale et glossodynie.

Chute (diminution de spasticité).

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool à éviter.

Diminution des concentrations de **SATIVEX** (inducteurs du CYP3A4) : **carbamazépine**, **oxcarbazépine**, **phénobarbital**, **phénytoïne**, **rifampicine**, **rifabutine**, **dexaméthasone**, millepertuis, etc.

Augmentation des concentrations de **SATIVEX** (inhibiteurs du CYP3A4) : **macrolides**, **antifongiques azolés**, **inhibiteurs de protéases du VIH**, **diltiazem**, **vérapamil**, **acide valproïque**, **cimétidine**, jus de pamplemousse, etc.

Renouveler la titration en cas de coadministration de ces médicaments.

Prudence avec les médicaments hypnotiques, les autres **antispastiques** (risque plus important de chutes), la **digoxine**.

**SEP (TRAITEMENT DE FOND) (1) – INTERFÉRON BÊTA (1)**

## ■ Interféron bêta-1b

<b>BÉTAFÉRON</b>					
Commencer à 62,5 µg en SC tous les 2 j puis augmenter progressivement jusqu'à 250 µg ou 8 MUI en SC tous les 2 j	15 ser. adapt. 250 µg/mL (8 MUI)	920,97	I	65 %	61,40

## ■ Interféron bêta-1b recombinant

<b>EXTAVIA</b>					
250 µg en SC tous les 2 j	1 inj. 250 µg/mL	762,60	I	65 %	762,60

## ■ Interféron bêta-1a

<b>AVONEX</b>					
30 µg x 1/sem. en IM	4 ser. 30 µg/0,5 mL	864,80	I	65 %	216,20
	4 stylos 30 µg/0,5 mL	864,80	I	65 %	216,20
<b>REBIF</b>					
6 MUI tous les 2 j en SC	4 cart. sol. inj. 6 MUI (22 µg/0,5 mL)	823,62	I	65 %	205,91
	4 cart. sol. inj. 12 MUI (44 µg/0,5 mL)	880,80	I	65 %	220,20
	12 inj. 6 MUI (22 µg)	823,62	I	65 %	68,64
	12 inj. 12 MUI (44 µg)	880,80	I	65 %	73,40
	6 ser. prérempl. 2,4 MUI (8,8 µg) + 6 ser. prérempl. 6 MUI (22 µg)	766,49	I	65 %	127,75

## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (2) – INTERFÉRONS BÊTA (2)

## PROPRIÉTÉS

Le mécanisme d'action des **interférons  $\beta$**  dans la sclérose en plaques n'est pas encore bien élucidé. Ils ont tous montré leur efficacité dans les formes rémittentes pures en diminuant de 30 % le nombre de poussées dans la population étudiée. Les **interférons  $\beta$ -1b** et  **$\beta$ -1b recombinant** ont leur efficacité dans les formes secondairement progressives.

## INDICATIONS

**Interférons  $\beta$ -1a,  $\beta$ -1b** et  **$\beta$ -1b recombinant** : traitement de fond de la sclérose en plaques dans les formes rémittentes pures pour des patients ambulatoires ayant eu au moins 2 poussées lors des 2 dernières années.

Traitement de fond pour les patients ayant eu un seul événement démyélinisant (ayant nécessité une corticothérapie IV) mais estimés à haut risque de récurrence, l'IRM montrant un processus inflammatoire actif (9 lésions en T2 et au mois une rehaussée par le gadolinium sur 1 <sup>re</sup>IRM et au moins 1 nouvelle lésion T2 ou une nouvelle lésion rehaussée par le gadolinium sur IRM réalisée à 3 mois).

**Interférons  $\beta$ -1b** et  **$\beta$ -1b recombinant** : traitement de fond de la sclérose en plaques dans les formes secondairement progressives mais comportant encore des poussées si l'EDSS est  $\geq 5$  (marche seule possible sur 200 m, handicap fonctionnel relativement sévère).

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie au produit.

Antécédents dépressifs sévères, insuffisance hépatique, épilepsie non contrôlée.

**Grossesse** et **allaitement** : contre-indiqué. Pas de données chez la femme, mais embryotoxique chez le singe. Arrêter le traitement en

cas de grossesse et prévenir la patiente de ces risques.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance attentive de l'apparition d'un syndrome dépressif ayant pu, dans de rares cas, entraîner une tentative de suicide.

Surveillance régulière de l'hémogramme et des transaminases.

Pour éviter les complications locales il faut éduquer le patient à changer de site à chaque injection.

Pour éviter le syndrome grippal on peut :

- soit débiter à 1/4 de dose pendant 1 sem. puis augmenter progressivement jusqu'à 8 MU/j ;

- préférer l'injection le soir au coucher, et prendre 1 g de **paracétamol** en préventif.

Après 18 à 24 mois de traitement, on peut noter l'apparition d'anticorps neutralisants associée non systématiquement à une diminution d'efficacité (5 à 8 % après 3 ans d'**AVONEX**, 23 à 41 % pour **BÉTAFÉRON** et **EXTAVIA**, 13 à 14 % pour **REBIF** 44 µg).

**BÉTAFÉRON** et **EXTAVIA** : à conserver à moins de 25 °C.

**AVONEX** : à conserver entre + 2 et + 8 °C (ou à température ambiante pendant moins d'une sem.).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions locales : fréquentes au site d'injection, diminuant généralement avec la poursuite du traitement : inflammation, douleur, nécrose, hypersensibilité.

Réaction générale : syndrome pseudo-grippal avec fièvre, sueurs, myalgies, malaise fréquent mais régressif avec la poursuite du traitement. Des allergies graves ont pu survenir (choc anaphylactique, bronchospasme).

Syndrome dépressif, anxiété, confusion.

Leucopénie, élévation des transaminases.



## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (3) – IMMUNOMODULATEUR

## ■ Acétate de glatiramère

COPAXONE					
20 mg SC x 1/j Durée de traitement à évaluer selon la clinique	28 inj. 1 mL (20 mg)	832,04	I	65 %	29,72

**PROPRIÉTÉS**

Immunomodulateur.

**INDICATIONS**

Réduction de la fréquence des poussées chez les patients ambulatoires (c'est-à-dire qui peuvent marcher seuls) atteints de sclérose en plaques évoluant par poussées de type récurrente/rémittente caractérisée dans les études cliniques par au moins 2 poussées récurrentes de troubles neurologiques au cours des 2 années précédentes. Il n'a pas été démontré d'effet bénéfique de l'**acétate de glatiramère** sur la progression du handicap.

Ce médicament est également indiqué chez les patients ayant présenté un seul événement démyélinisant et qui sont considérés à haut risque de développer une sclérose en plaques cliniquement définie.

L'**acétate de glatiramère** n'est pas indiqué dans le traitement des formes progressives d'emblée ou secondairement progressives de sclérose en plaques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au produit.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Voie sous-cutanée uniquement.

A conserver entre + 2 et + 8 °C.

Prévenir de la possibilité de réactions post-injections transitoires : vasodilatation, oppression thoracique, palpitations et dyspnée.

Surveillance clinique, neurologique et hépatique recommandées pendant le traitement. Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

A utiliser avec prudence chez les moins de 18 ans et chez le sujet âgé car aucune données ne sont disponibles chez ce type de patients.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions au site d'injection : érythème, douleur, induration, rash, douleur.

Réactions immédiates au site d'injection.

Troubles de l'état général : tachycardie, palpitations, vasodilatation, dyspnée, sueurs, frissons, douleur thoracique, oedème du visage, prise de poids.

Troubles nerveux : anxiété, nervosité, syncope, tremblements.

Troubles infectieux : herpès, candidose vaginale.

Lymphadénopathies.

Troubles visuels.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune étude d'interaction n'a été menée.

## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (4) – IMMUNOSUPPRESSEURS SÉLECTIFS (1)

### ■ Natalizumab

<b>TYSABRI</b>					
300 mg à diluer dans 100 mL d'une solution injectable de NaCl 0,9 % Perf. en IVL à un débit de 2 mL/min (environ 1h) puis rincer avec solution injectable de NaCl 1 inj./4 sem. Traitement de 6 à 24 mois	1 fl. (15 mL) sol. à diluer pour perf. 300 mg	HOP	I	65 %	

#### PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal dirigé contre les molécules d'adhésion exprimées à la surface des leucocytes (intégrines  $\alpha 4$ ). Il bloque donc la liaison de l'intégrine avec son récepteur VCAM1 et ainsi empêche la transmigration des leucocytes mononucléés à travers l'endothélium vers les tissus parenchymateux inflammatoires.

#### INDICATIONS

En monothérapie comme traitement de fond des formes très actives de SEP-RR pour les groupes suivants de patients âgés de 18 ans et plus :

- patients présentant une forme très active de la maladie malgré un traitement par **interféron  $\beta$**  (au moins 1 poussée dans l'année sous traitement et au moins 9 lésions T2 ou au moins 1 rehaussée par le gadolinium) ;
- patients ayant une SEP-RR sévère d'évolution rapide (2 poussées invalidantes ou plus dans l'année et présentant à l'IRM une ou plusieurs lésions rehaussées par le gadolinium ou augmentation nette de la charge lésionnelle en T2).

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **natalizumab**.

Sérologie JC virus positive avant le traitement  
Leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP).

Patients immunodéprimés.

Association avec **interféron  $\beta$**  ou **acétate de glatiramère**.

Cancers diagnostiqués en évolution.

Enfants et adolescents.

Grossesse et allaitement

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Nécessité d'informer le patient des risques liés au traitement et en particulier du risque de LEMP. Carte d'alerte spéciale à lui remettre. Prudence pour la manipulation et la préparation de la perfusion.

Stratification du risque de LEMP avant traitement : par la recherche d'AC anti JC virus avant la première perfusion, par la durée du traitement qui augmente le risque (si plus de 2 ans) et si traitement antérieur par immunosuppresseurs. Surveillance de signes neurologiques pouvant évoquer une LEMP au long cours.

Surveillance pendant la perfusion et une heure après d'éventuelles réactions d'hypersensibilité.

Si aggravation ou réactions pendant la perfusion, rechercher des anticorps anti-natalizumab (10 % dans des études contrôlées sur 2 ans) à contrôler 6 sem. plus tard (dans les études, 6 % des patients gardent des anticorps).

Surveillance hépatique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, sensations vertigineuses, nausées, vomissements, urticaire, arthralgies, frisson, fièvre, fatigue, infection urinaire.

Réactions d'hypersensibilité lors de la perfusion (4 % des patients sur des études contrôlées de 2 ans). Risque augmenté si le traitement a été arrêté quelques mois.

Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS) lors de l'arrêt du **TYSABRI**.  
LEMP.

## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (5) – IMMUNOSUPPRESSEURS SÉLECTIFS (2)

### ■ Fingolimod

GILENYA					
1 gél./j <i>per os</i> au cours ou en dehors des repas En cas d'oubli, le traitement est poursuivi sans modification à la prise suivante	7 gél. 0,5 mg 28 gél. 0,5 mg	HOP 1923,17	I I	65 %	68,68

### PROPRIÉTÉS

Premier représentant de la classe des modulateurs des récepteurs à la sphingosine 1-phosphate.

Le **fingolimod** est une prodrogue active après phosphorylation par la sphingosine-kinase 2. L'administration par voie orale représente un avantage important dans le traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques.

### INDICATIONS

En monothérapie comme traitement de fond des formes très actives de SEP-RR pour :

- les patients présentant une forme très active de la maladie malgré un traitement par **interféron  $\beta$**  (au moins 1 poussée dans l'année sous traitement et au moins 9 lésions T2 ou au moins 1 rehaussée par le gadolinium) ;
- les patients ayant une SEP-RR sévère d'évolution rapide (2 poussées invalidantes ou plus dans l'année et à l'IRM une ou plusieurs lésions rehaussées par le gadolinium ou augmentation nette de la charge lésionnelle en T2).

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **fingolimod**.

Grossesse, allaitement.

En cas d'infection sévère, d'infection chronique active (hépatite, tuberculose) ou d'immunodéficience connue notamment avec un risque accru d'infection opportuniste et ce même en cas d'immunodéficience provoqué par un traitement médicamenteux.

Cancers évolutifs.

Traitements par **antiarythmiques de classe Ia ou III**.

Insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le risque de survenue d'une bradycardie transitoire pouvant être associée à un BAV lors de la 1<sup>re</sup> administration de **fingolimod** justifie la

mise en place d'une surveillance médicale étroite : réalisation d'un ECG 12 dérivations avant l'administration et 6 h après, surveillance ECG continue pendant 6 h, mesure de la pression artérielle et du rythme cardiaque toutes les heures. Chez les patients ayant présenté un trouble cardiaque cliniquement significatif, la surveillance est prolongée jusqu'à résolution complète du trouble.

Par ailleurs pratiquer avant le 1<sup>er</sup> traitement et en surveillance : NFS, sérologie VZV (vacciner contre VZV si négative), bilan hépatique (tous les 3 mois), bilan ophtalmologique (initial et à 3 mois), test de grossesse.

Donner la carte patient et le carnet de liaison.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Infections liées à la lymphopénie induite par le traitement, bradycardie, BAV, dépression, céphalées, vertiges, vision trouble, oedèmes maculaires, hypertension, toux, diarrhées, eczéma, alopecie, prurit, dorsalgie et asthénie. Une élévation des transaminases hépatiques est fréquente.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les risques d'effets additifs sur le système immunitaire excluent la co-administration avec les antinéoplasiques, les immunosuppresseurs et immunomodulateurs.

En cas de traitement antérieur par immunomodulateurs pas de fenêtre thérapeutique si pas de cytopénie. Prudence si traitement antérieur par **natalizumab**.

La vaccination par un vaccin vivant atténué doit être évitée en raison du risque infectieux. Les vaccinations peuvent être moins efficaces durant le traitement.

La prudence s'impose en cas de co-administration avec des médicaments induisant une bradycardie.

Les médicaments inhibant le CYP3A4 peuvent impliquer une surexposition.

## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (6) – IMMUNOSUPPRESSEUR

## ■ Mitoxantrone

ELSEP					
12 mg/m <sup>2</sup> x 1/mois pdt 6 mois À diluer dans au moins 50 mL de sérum isotonique et perfuser en 15 min au minimum		1 fl. (10 mL) sol. à diluer pour perf. 2 mg/mL	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Antinéoplasique cytostatique. Son mode d'action principal est une intercalation entre les brins d'ADN. Son mécanisme d'action dans la SEP n'est pas complètement élucidé. **ELSEP** est un puissant agent immunosuppresseur non sélectif.

## INDICATIONS

Très restreintes.

Formes agressives de SEP-RR ou de type secondairement progressif.

L'agressivité se définit par 2 poussées l'une et l'autre avec séquelles au cours des 12 derniers mois et 1 nouvelle lésion rehaussée par le gadolinium sur une IRM datée de moins de 3 mois ou par une progression de 2 points à l'EDSS dans l'année précédente et 1 nouvelle lésion rehaussée par le gadolinium sur une nouvelle IRM datée de moins de 3 mois.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

Patient ayant déjà reçu de la **mitoxantrone** ou des **antracyclines**.

Cardiopathie. Myélodysplasies. ATCD d'hétopathie maligne.

**Grossesse** ou **allaitement**. Absence de contraception efficace.

Association avec le vaccin de la fièvre jaune. Insuffisance hépatique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant l'institution du traitement, information du patient sur les risques potentiels (leucémie aiguë myéloblastique, insuffisance cardiaque congestive, aménorrhée définitive et toxicité sur l'ADN). Il faut obtenir un consentement éclairé.

Surveillance de la fonction cardiaque (échographie avant le début du traitement puis 1 mois après l'arrêt de la perfusion puis x 1/an pendant 5 ans). Si anomalie, scintigraphie cardiaque avec mesure de la fraction d'éjection systolique.

Contraception orale jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.

NFS plaquettes avant le traitement puis avant chaque perfusion et à J10 puis 1 mois après l'arrêt de la perfusion puis x 1/an pendant 5 ans.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Leucopénie, thrombopénie, leucémies aiguës myéloïdes.

Insuffisance cardiaque congestive.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Contre-indiqué : vaccin de la fièvre jaune.

Déconseillées : **phénytoïne** et **fosphénytoïne**.

## SEP (TRAITEMENT DE FOND) (7) – ANTIMYASTHÉNIQUE

## ■ Fampridine

FAMPYRA					
10 mg x 2/j	28 cp. LP 10 mg	129,39	I	15 %	
Adapter chez le sujet âgé ou insuffisant hépatique	56 cp. LP 10 mg	252,03	I	15 %	4,50

## PROPRIÉTÉS

Ce médicament est un inhibiteur des canaux potassiques : il réduit le courant ionique à travers ces canaux, et par conséquent prolonge la repolarisation et améliore la formation du potentiel d'action dans les axones démyélinisés et donc potentiellement la conduction au niveau du SNC.

## INDICATIONS

Amélioration de la la capacité de marche des patients adultes atteints de sclérose en plaques et présentant un handicap à la marche.

## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à la **fampridine** ou à l'un des excipients.
- Épileptiques ou antécédents d'épilepsie.
- Clearance de la créatinine < 80 mL/min.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Bilan rénal avant le traitement.

Risque de convulsion pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents :

- état général : douleurs dorsales, asthénie ;
- système nerveux : étourdissement, céphalées, troubles de l'équilibre, paresthésies, tremblement ;
- système respiratoire : dyspnée, douleur laryngo-pharyngée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas utiliser avec :

- d'autres médicaments contenant de la **fampridine** (4-aminopyridine) ;
- des médicaments inhibant l'OCT2, tels que la **cimétidine**.

## ANTIPARKINSONIENS (1) – AGONISTE DOPAMINERGIQUE MINEUR

### ■ Amantadine

<b>MANTADIX</b>					
100 à 400 mg en 2 ou 3 prises	50 caps. 100 mg	5,50	I	15 %	0,11

#### PROPRIÉTÉS

Utilisé comme agoniste dopaminergique.  
Résorption rapide, élimination urinaire, demi-vie de 20 h doublée en cas d'insuffisance rénale sévère.

#### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.  
Traitement de l'hyperprolactinémie.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les effets secondaires sont dose-dépendants.  
Utiliser avec prudence en cas d'antécédents de troubles psychiques, de convulsions, d'insuffisance cardiaque ou d'œdèmes.  
Adapter la posologie à la clairance de la créatinine :

- < 50 mL/min : 100 mg/j ;
- < 30 mL/min : 200 mg x 2/sem. ;
- < 20 mL/min : 100 mg x 3/sem. ;
- < 10 mL/min : 200 mg/100 mg en alternance tous les 7 j.

Ne pas prescrire au sujet déjà grippé : risque de résurgence virale.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles neuropsychiques : insomnies fréquentes, difficultés de concentration, plus rarement agitation hypomaniaque, asthénie, état dépressif, confusion mentale, hallucinations, céphalées, vertiges, dysarthrie, myalgies.

Troubles digestifs, sécheresse buccale.

Autres : œdèmes des membres inférieurs avec livedo reticularis, dyspnée, toux, hypotension orthostatique, allergies, bouffées de chaleur.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Anticholinergiques** : majoration du risque de troubles psychiques.

## MALADIE DE PARKINSON (2)

### Forme invalidante

C'est l'indication de la dopathérapie. On l'utilise en monothérapie ou associée à un **agoniste dopaminergique majeur** ou un **IMAO B**.

#### ► Dopathérapie

**L-dopa** + inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique (**carbidopa** pour le **SINEMET** et **bensérázide** pour le **MODOPAR**), par exemple : **MODOPAR** 1 gél. à 125 mg x 2/j en dehors des repas puis augmenter de 1 gél./sem. jusqu'à la dose optimale (3 à 6 gél./j en général).

Chez le sujet âgé ou s'il existe des contre-indications relatives, on débutera à demi-dose.

On associera systématiquement au début un **antagoniste dopaminergique** périphérique, ex : **dompéridone (MOTILUM)** 1 à 2 cp. x 3/j.

#### ► Agoniste dopaminergique majeur

- **Ropinirole (REQUIP)** : atteindre progressivement la dose de 3 à 9 mg/j en 3 prises. Prévenir des éventuels effets secondaires.

- **Pramipexole (SIFROL)** : atteindre progressivement 1/2 cp. à 0,7 mg x 3/j puis adaptation de la posologie au maximum 1,5 cp. à 0,7 mg x 3/j. Prévenir des éventuels effets secondaires.

- **Rotigotine (NEUPRO)** : dispositif transdermique de 2 à 8 mg /j max, de façon très progressive.

- Plus rarement :

- **bromocriptine (PARLODEL)** : atteindre progressivement la dose de 10 à 40 mg/j en 3 ou 4 prises ;

- **lisuride (DOPERGINE ou AROLAC)** : atteindre la dose efficace par paliers de 0,1 mg/sem. (la dose optimale varie de 0,8 à 1,2 mg pour l'association précoce avec la **L-dopa** et de 1 à 5 mg pour l'association tardive).

#### ► Inhibiteur de la monoamine-oxydase B

- **Rasagiline (AZILECT)** 1 mg/j en une prise.

- **Sélégiline (DÉPRÉNYL)** : **IMAO B** sélectif, on évite aujourd'hui sa prescription en raison de possibles risques cardiovasculaires notamment lorsqu'il est associé à la **L-dopa**.

### Traitement chirurgical [1]

En pleine évolution, les techniques chirurgicales de traitement de la maladie de Parkinson restent réservées à des indications exceptionnelles, très invalidantes (stades III à V de Hoehn et Yahr), et en l'absence de contre-indication (âge < 75 ans, absence de troubles cognitifs, de séquelles vasculaires cérébrales). Elles sont effectuées dans un centre spécialisé :

- stimulation à haute fréquence du ou des noyau(x) sous-thalamique(s). Agit sur l'akinésie, la rigidité, le tremblement, la dystonie du *off*. Elle permet une réduction du traitement dopaminergique et donc des dyskinésies dopa-induites ;
- stimulation chronique à haute fréquence du noyau ventral intermédiaire du thalamus indiquée dans les formes avec tremblement unilatéral de grande amplitude résistant à tout traitement médical ;
- stimulation du *globus pallidus* interne si dyskinésies importantes. Rarement pallidotomie (destruction stéréotaxique de la partie ventrale du pallidum) ;
- transplantation de tissu nerveux fœtal contenant des neurones dopaminergiques, encore à l'étude actuellement.

### Adaptation du traitement

#### Suivi de la maladie

##### ► Évolution habituelle

En règle générale, l'efficacité de la **L-dopa** est bonne pendant 5 à 10 ans (lune de miel) puis l'évolution naturelle de la maladie se fait vers un épuisement de son efficacité et/ou l'apparition de fluctuation d'activité.

C'est pourquoi un suivi bi-annuel au moins par un spécialiste est préconisé afin d'adapter le traitement.

##### ► Adaptation du traitement, surveillance de l'efficacité des changements apportés

L'adaptation du traitement doit se faire avec l'aide du patient qui note, en fonction des heures, l'état de sa maladie (« on », « off », « intermédiaire », « dyskinésies »).

L'établissement de scores moteurs (UPDRS) par le neurologue permet de surveiller l'efficacité du traitement.

## ANTIPARKINSONIENS (2) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES ERGOTÉS (1)

### ■ Bromocriptine

<b>PARLODEL</b>					
En 3 prises, atteindre progressivement par paliers de 25 mg tous les 2 j : 10-40 mg/j en monothérapie 10-25 mg/j associé à la <b>lévodopa</b>	20 cp. séc. 2,5 mg	4,17	I	65 %	0,21
	30 gél. 5 mg	9,24	I	65 %	0,31
	30 gél. 10 mg	16,33	I	65 %	0,54
<b>BROMO-KIN</b>					
Idem <b>PARLODEL</b>	30 cp. séc. 2,5 mg	5,89	I	65 %	0,20
	100 cp. 2,5 mg	HOP	I		
	30 gél. 5 mg	9,03	I	65 %	0,30
	30 gél. 10 mg	15,96	I	65 %	0,53

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique, dérivé de l'ergot de seigle, freinant la sécrétion de prolactine et de façon inconstante celle de GH, ayant une action antiparkinsonienne par stimulation des récepteurs D2 dopaminergiques et antagonisme des récepteurs D1.

Résorption intestinale rapide, effet de premier passage hépatique (90 %), demi-vie de 3 h, élimination biliaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.

Hyperprolactinémie.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'ergot de seigle ou à ses analogues.

Insuffisance coronarienne.

Troubles psychiques sévères et/ou antécédents psychiatriques graves.

**Grossesse** : si HTA gravidique ou du post-partum.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Augmenter les doses très progressivement pour éviter les effets secondaires, notamment

les troubles psychiques et l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques : surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, somnolence, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles.

Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermite ocre, exceptionnellement œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses > 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **macrolides** (sauf **spiramycine**), **méthylergométrine**, **dérivés de l'ergot de seigle** et autres vasoconstricteurs, **antipsychotiques** et produits apparentés, **sympathomimétiques**.

Association à utiliser avec précaution : **griséofulvine**.



## MALADIE DE PARKINSON (3)

### Diminution/fragmentation des doses

C'est généralement la première étape de l'adaptation thérapeutique lorsque apparaissent des fluctuations isolées.

En général, 3 à 6 prises/j sont nécessaires (parfois plus !).

### Diminution de l'efficacité de la L-dopa

#### ► Augmentation des doses de L-dopa

L'épuisement de l'efficacité de la **L-dopa** se traduit par l'apparition de périodes « off » de plus en plus nombreuses et longues durant la journée. La première étape consiste à augmenter les doses de **L-dopa** jusqu'à 750 mg/j (voire plus) en fragmentant les prises.

En cas d'échec, une association est nécessaire.

#### ► Association avec la L-dopa

On choisit :

- un **agoniste dopaminergique**, un **IMAO B** si c'est le syndrome akinéto-hypertonique qui domine ;
- un **anticholinergique** si c'est le tremblement qui domine et s'il n'y a pas de contre-indication.

### Dyskinésies et fluctuations d'activité

C'est le stade le plus difficile, où l'aide d'un neurologue et parfois d'une courte hospitalisation est nécessaire. La disparition des dyskinésies est hélas souvent accompagnée d'une diminution des performances motrices.

Les différentes mesures pour y parvenir sont :

- diminution et/ou fractionnement des doses ;
- rapprochement des prises ;
- ajout d'un **agoniste**, de la **rasagiline** ;
- utilisation de formes à libération prolongée ;
- diminution de l'apport de protides lors des prises de **L-dopa** ;
- utilisation de la forme dispersible du **MODOPAR** ;
- utilisation d'un inhibiteur de la recapture de la **dopamine (COMTAN)** ou de **lévodopa + carbidopa + inhibiteur de la COMT (STALEVO)**.

### Effet on/off

#### ► Rôle de l'apomorphine

En cas d'échec des mesures précédentes, dans les cas très difficiles à équilibrer, on peut avoir recours à l'**apomorphine (APO-KINON)** :

- en auto-injection sous-cutanée lors des périodes de blocage (1 à 2 mg/inj. en général) ;
- pour certains en injection continue sous-cutanée par pompe, à n'envisager qu'en milieu spécialisé lorsque toutes les autres ressources thérapeutiques sont épuisées et qu'il existe une contre-indication chirurgicale ;
- à éviter si troubles cognitifs.

#### ► Alternative à l'apomorphine

Administration par sonde duodénale de **lévodopa-carbidopa (DUODOPA)**.

## ANTIPARKINSONIENS (3) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES ERGOTÉS (2)

### ■ Lisuride

<b>DOPERGINE</b>					
Atteindre progressivement 1 à 2 mg/j en 3-4 prises (paliers de 0,1 mg/sem.)	30 cp. séc. 0,2 mg	9,01	I	65 %	0,30
	30 cp. séc. 0,5 mg	17,89	I	65 %	0,60
<b>AROLAC</b>					
Idem <b>DOPERGINE</b>	20 cp. séc. 0,2 mg	6,51	I	65 %	0,33

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique, dérivé de l'ergot de seigle, ayant une action antiparkinsonienne par stimulation des récepteurs D2 dopaminergiques.

Résorption digestive rapide, effet de premier passage hépatique, demi-vie de 3 h, élimination biliaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.

Hyperprolactinémie.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'ergot de seigle ou à ses analogues.

Insuffisance coronarienne.

Troubles psychiques sévères et/ou antécédents psychiatriques graves.

**Grossesse** : si HTA gravidique ou du post-partum.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Augmenter les doses très progressivement pour éviter les effets secondaires, notamment

les troubles psychiques et l'hypotension orthostatique chez le sujet âgé.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques, surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, **somnolence**, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles, jeu pathologique. Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermite ocre. Exceptionnellement : œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **macrolides** (sauf **spiramycine**), **méthylergométrine**, **dérivés de l'ergot de seigle** et autres vasoconstricteurs, **antipsychotiques** et produits apparentés, **sympathomimétiques**.

Association à utiliser avec précaution : **griséofulvine**.

Atteindre progressivement les doses efficaces par palier de 1/2 cp. à 0,2 mg par semaine

semaine	1	2	3	4	5	6	7	8
matin	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1
midi	-	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1
après-midi	-	-	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1
soir	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1	1

**MALADIE DE PARKINSON (4)****Traitement des troubles liés à la dysautonomie [1]**

Ils sont dus à la maladie, aggravés par les traitements dopaminergiques, d'autres affections ou traitements intercurrents.

**Troubles digestifs**

- Nausées, vomissements : généralement transitoires. **Antémétique, dompéridone (MOTILIUM)** 1 à 2 cp. x 3/j.

NB : Une imprégnation par la **dompéridone** est souvent nécessaire pendant quelques jours (2 ou 3 j) avant l'introduction d'un traitement par **L-dopa** ou utilisation de l'**apomorphine**.

- Troubles de la déglutition : adaptation optimale du traitement, puis de l'alimentation. Recours aux sondes de gastrostomie si pneumopathies secondaires.
- Constipation : régime riche en fibres, hydratation suffisante, exercice physique, **laxatifs**, parfois lavements doux.
- Stase salivaire : adaptation du traitement, **anticholinergique** en spray, voire infiltration de **toxine botulinique** dans les glandes salivaires (hors AMM).

**Hypotension orthostatique**

Mesures simples : hydratation, augmentation des apports sodés, apprentissage du lever, bas de contention, diminution du traitement spécifique antiparkinsonien.

En cas d'hypotension symptomatique : **sympathomimétiques, midodrine (GUTRON)**, débiter à 3 cp./j et augmenter si besoin jusqu'à 12 cp./j en 3 ou 4 prises (dernière prise à 17 h).

En dernier recours mais souvent efficace, **fludrocortisone** : 10 à 30 µg/j (hors AMM).

**Troubles urinaires**

Nécessité de faire la part éventuelle des affections associées (prostate et statique périnéale). Intérêt d'un bilan urodynamique (rechercher une dysnergie vésico-sphinctérienne).

Il faut prévenir les infections urinaires (hydratation, hygiène locale, traitement de la constipation). Utiliser avec précaution (demi-doses) les médicaments anticholinergiques (**DITROPAN**), grands pourvoyeurs de confusion mentale. Éventuellement **alphabloquants** (hors AMM).

## ANTIPARKINSONIENS (4) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (1)

### ■ Ropinirol

REQUIP					
0,25 mg x 3/j puis atteindre progressivement 3 à 9 mg/j en 3 prises	21 cp. 0,25 mg	4,12	I	65 %	0,20
	21 cp. 0,5 mg	5,95	I	65 %	0,28
	21 cp. 1 mg	9,05	I	65 %	0,43
	21 cp. 2 mg	14,13	I	65 %	0,67
	21 cp. 5 mg	28,40	I	65 %	1,35
ADARTREL					
Débuter à 0,25 mg le soir pdt 48 h puis 0,50 mg pdt 1 sem. Augmentation progressive si nécessaire de 0,5 mg/sem. Max. 2 mg/j cp. à prendre au plus tard 3 h avant le coucher	12 cp. 0,25 mg		I	NR	
	28 cp. 0,5 mg		I	NR	
	28 cp. 2 mg		I	NR	
REQUIP LP					
2 mg/j en 1 prise la 1 <sup>re</sup> sem. puis 4 mg/j si besoin en augmentant de 2 mg/sem. jusqu'à 8 mg/j Max. 24 mg/j	28 cp. 2 mg	14,26	I	65 %	0,51
	28 cp. 4 mg	26,01	I	65 %	0,93
	28 cp. 8 mg	48,28	I	65 %	1,72

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique non ergoté des récepteurs D2/D3 qui stimule des récepteurs dopaminergiques du striatum.

Inhibition de la sécrétion de prolactine.

Biodisponibilité de 50 %, liaison faible aux protéines de 10 à 40 %, métabolisme cytochrome P450 dépendant, élimination urinaire.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson : de première intention chez le sujet en monothérapie ou en association à la **lévodopa** dans les formes évoluées.

**ADARTREL** : traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos modéré à très sévère. Seules les formes très sévères sont remboursées à 65 % (existence de troubles importants du sommeil et/ou retentissement important sur la vie familiale, sociale et/ou professionnelle).

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

Insuffisance hépatique.

### PROPRIÉTÉS

Somolence et accès de sommeil d'apparition soudaine ; prévenir le patient, attention à la conduite automobile.

Troubles neuropsychiatriques.

Troubles du contrôle des impulsions (jeu pathologique, hypersexualité).

Hypotension orthostatique à rechercher.

L'arrêt du traitement doit être progressif en raison d'un risque d'apparition de syndrome malin des neuroleptiques.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : hallucinations, jeu pathologique, hypersexualité, confusion, OMI.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Œstrogènes** à forte dose, **antipsychotiques**.

## MALADIE DE PARKINSON (5)

### Traitement des troubles thymiques et cognitifs

#### Dépression

Fréquente ; nécessite soit au début de la maladie l'adaptation du traitement dopaminergique, soit à un stade plus tardif un anti-dépresseur tel l'**ATHYMIL** ou de petites doses de **tricycliques (ANAFRANIL)** et éventuellement une prise en charge spécialisée.

#### Troubles comportementaux induits par le traitement dopaminergique

À toujours rechercher. Ils se traduisent par des troubles de type compulsif ou addictif : jeu pathologique, achats compulsifs, hypersexualité, *punding* (comportement répétitif sans but). Diminution ou changement d'**agoniste dopaminergique**. Si échec : **L-dopa**. En l'absence d'efficacité : **clozapine** (hors AMM).

#### Hallucinations et délires

Il faut, dans un 1<sup>er</sup> temps, éliminer une cause sous-jacente sans rapport avec la maladie de Parkinson. Ces symptômes sont favorisés par tous les traitements antiparkinsoniens. Il faut arrêter les **anticholinergiques**, l'**amantadine**, diminuer les traitements dopaminergiques (privilégier la L-dopothérapie par rapport aux **agonistes**). Si nécessaire, traitement par **clozapine**, **LEPONEX** (hors AMM), cp. à 25 mg 1/2 cp. à J1 puis 1 cp. à J2 puis augmentation de 1/2 cp. à J9 puis 1/2 cp. à J16, soit 50 mg en 1 prise le soir. Des doses supérieures sont rarement nécessaires. Surveillance de la NFS hebdomadaire pendant 18 sem. puis mensuelle (risque d'agranulocytose). On associe de la **rivastigmine**.

#### Troubles cognitifs

Arrêt des **anticholinergiques**, traitement par **rivastigmine** (AMM), réadaptation cognitive.

#### Troubles du sommeil

Fragmentation du sommeil (syndrome des jambes sans repos, blocages nocturnes,

troubles urinaires) : **L-dopa** forme retard ou dispersible, **agonistes** en milieu de nuit. Somnolence diurne et au maximum attaques de sommeil : réduire ou changer les **agonistes**.

#### Douleurs

Fréquentes : liées à des problèmes articulaires ou périarticulaires et à des fluctuations motrices (dystonies). Amélioration avec optimisation du traitement antiparkinsonien et traitements antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant.

#### Rééducation fonctionnelle

##### Kinésithérapie

Elle est fondamentale, dès le premier stade de la maladie, afin de préserver le plus longtemps possible l'autonomie du patient, son confort de vie, et éviter les chutes.

Elle repose sur plusieurs principes :

- kinésithérapie active pour rééducation de la marche, du lever, de la posture, etc. ;
- prévention des chutes : chaussures adaptées, déambulateurs, fauteuils adaptés, etc. ;
- apprentissage de mouvements d'assouplissement que le patient peut faire seul chez lui lors des périodes « off ».

#### Ergothérapie

Afin d'améliorer le milieu de vie.

#### Orthophonie

Travail de la dysarthrie et des troubles de la déglutition.

#### Soutien psychologique

Il est au mieux assuré par l'action concertée :

- de la famille ;
- d'un médecin généraliste et spécialiste ;
- des associations de malades.

France Parkinson : 37 bis, rue La Fontaine  
75016 Paris, tél. 01 45 20 22 20. Site  
internet : <http://www.franceparkinson.fr>

La prise en charge à 100 %, l'information du patient et de sa famille, un éventuel reclassement professionnel sont également indispensables.

## ANTIPARKINSONIENS (5) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (2)

### ■ Pramipexole

<b>SIFROL</b>					
Formes non LP :	30 cp. séc. 0,18 mg	6,40	I	65 %	0,21
<b>Parkinson en monothérapie ou associé à L-dopa</b>	100 cp. séc. 0,18 mg	20,01	I	65 %	0,20
Posologie initiale :	30 cp. séc. 0,7 mg	23,89	I	65 %	0,80
Semaine 1 (S1) : 0,088 mg x 3/j	100 cp. séc. 0,7 mg	72,66	I	65 %	0,73
S2 : 0,18 mg x 3/j					
S3 : 0,35 mg x 3/j					
Posologie d'entretien : 0,088 à 1,1 mg x3/j					
<b>Syndrome des jambes sans repos :</b>					
Posologie initiale : 0,088 mg x 1/j					
Posologie d'entretien : 0,088 mg à 0,54 mg x 1/j					
À prendre 2 à 3 heures avant le coucher					
Formes LP :	10 cp. LP 0,26 mg	4,27	I	65 %	0,43
<b>Parkinson en monothérapie ou associé à L-dopa</b>	30 cp. LP 0,26 mg	11,36	I	65 %	0,38
Posologie initiale :	10 cp. LP 0,52 mg	7,75	I	65 %	0,78
S1 : 0,26 mg x 1/j	30 cp. LP 0,52 mg	22,18	I	65 %	0,74
S2 : 0,52 mg x 1/j	10 cp. LP 1,05 mg	14,94	I	65 %	1,49
S3 : 1,05 mg x 1/j	30 cp. LP 1,05 mg	42,26	I	65 %	1,41
Posologie d'entretien : 0,26 à 1,05 mg x1/j	30 cp. LP 2,1 mg	73,78	I	65 %	2,46
Posologie maximale : 3,15 mg x 1/j					

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique non ergoté des récepteurs D2/D3 qui stimule des récepteurs dopaminergiques du striatum. Diminution de la sécrétion de prolactine.

Biodisponibilité de 90 %, liaison plasmatique aux protéines faible de 20 %, élimination rénale.

### INDICATIONS

Maladie de Parkinson : de première intention en monothérapie ou en association à la **lévodopa** à un stade de fluctuations.

Syndrome des jambes sans repos très sévère.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Diminuer les doses si insuffisance rénale.

Somolence et accès de sommeil d'apparition soudaine; prévenir le patient, attention à la conduite automobile.

Troubles neuropsychiatriques, hallucinations

Troubles du contrôle des impulsions (jeu pathologique, hypersexualité).

Hypotension orthostatique à rechercher.

Pas d'arrêt brutal (risque de syndrome malin des neuroleptiques).

### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles psychiques : surtout chez le sujet âgé avec détérioration mentale : euphorie, somnolence, excitation, insomnies, confusion mentale, hallucinations visuelles.

Troubles digestifs transitoires : anorexie, nausées, vomissements.

Plus rarement : hypotension orthostatique, bouche sèche, constipation, syndrome de Raynaud, vertiges, dermatite ocre, exceptionnellement œdème des membres inférieurs par fibrose rétropéritonéale, épanchement pleural, pneumopathies interstitielles (doses > 60 mg/j), accidents cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

Aggravation paradoxale du syndrome des jambes sans repos

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Cimétidine** : diminue la clairance rénale du pramipexole.

## MALADIE DE PARKINSON (6)

**Antipsychotiques : à rechercher et arrêter devant tout syndrome parkinsonien**

- Antipsychotiques classiques : **phénothiazines, butyrophérones.**
- Benzamides : **DOGMATIL, TIAPRIDAL.**
- Antiémétiques : **PRIMPÉRAN, VOGALÈNE.**
- Antivertigineux : **SIBELIUM.**
- Hypnotiques et antihistaminiques H<sub>1</sub> : **THÉRALÈNE**, etc.

**Exemple de feuille « ON/OFF » à donner au patient  
afin d'assurer la surveillance du traitement**

Date :	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	nuit
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermé- diaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traitement																	
Remarques																	

MA = mouvements anormaux.

## ANTIPARKINSONIENS (6) – AGONISTES DOPAMINERGIQUES NON ERGOTÉS (3)

### ■ Rotigotine

NEUPRO					
Posologie initiale : 1 à 2 disp. /j Posologie maximale : 4 disp. /j	7 disp. transderm. 2 mg/24 h	14,78	I	65 %	2,11
	30 disp. transderm. 2 mg/24 h	57,91	I	65 %	1,93
	7 disp. transderm. 4 mg/24 h	20,94	I	65 %	2,99
	30 disp. transderm. 4 mg/24 h	81,14	I	65 %	2,70
	30 disp. transderm. 6 mg/24 h	104,37	I	65 %	3,48
	30 disp. transderm. 8 mg/24 h	127,25	I	65 %	4,24

### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique (activation des récepteurs D3, D2 et D1) de type non ergoline destiné au traitement des signes et symptômes de la maladie de Parkinson et du syndrome des jambes sans repos.

### INDICATIONS

- En monothérapie (sans **lévodopa**) pour le traitement des signes et symptômes du stade précoce de la maladie de Parkinson idiopathique.
- En association avec la **lévodopa**, quand, au cours de l'évolution de la maladie, jusqu'aux stades avancés, les effets de la **lévodopa** s'atténuent ou deviennent irréguliers et que des fluctuations de l'effet thérapeutique apparaissent.
- Traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos idiopathique d'intensité modérée à sévère chez l'adulte.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament est contre-indiqué en cas :

- d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients ;
- d'imagerie par résonance magnétique ou cardioversion

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec prudence en cas d'insuffisance rénale aiguë ou d'insuffisance hépatique sévère.

Une surveillance tensionnelle (risque d'hypotension orthostatique) et ophtalmologique est recommandée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables cliniques fréquents :

- généraux : hypotension orthostatique, chutes, état de fatigue, hyperhydrose, vertiges ;
- comportementaux : troubles de la perception, somnolence ;
- nerveux : troubles de la conscience, céphalées ;
- cutanés : hypersensibilité, réactions au site d'administration, prurit, érythème ;
- gastro-intestinaux : nausées, vomissements, constipation, sécheresse buccale, dyspepsie, hoquet, perte de poids ;
- cardiovasculaires : hypertension, palpitations.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La **rotigotine** étant un agoniste de la dopamine, il est probable que les antagonistes de la dopamine, comme les **antipsychotiques (phénothiazines, butyrophénones, thioxanthènes)** ou le **métoclopramide** réduisent l'efficacité de ce médicament et leur administration concomitante doit être évitée. En raison d'effets additifs potentiels, la prudence est de rigueur chez les patients prenant des médicaments sédatifs ou d'autres dépresseurs du système nerveux central (ex : **benzodiazépines, antipsychotiques, antidépresseurs**) ou de l'alcool en association avec la **rotigotine**.

Ce médicament est susceptible de potentialiser les effets indésirables dopaminergiques de la **L-dopa** et peut provoquer et/ou exacerber une dyskinésie préexistante, comme cela a été décrit pour d'autres **agonistes de la dopamine**.



## MALADIE DE PARKINSON (7)

## Score moteur UPDRS\* : surveillance de l'efficacité thérapeutique

Parole :	sur 5 points :		
Expression faciale :	sur 5 points :		
Tremblement de repos : 1 – absent. 2 – léger et rarement présent. 3 – faible amplitude mais persistant ; ou modéré mais intermittent. 4 – modéré en amplitude mais présent la plupart du temps. 5 – amplitude marquée et présent la plupart du temps.	mb. sup.     mb. inf.	tête	mb. sup.     mb. inf.
Tremblement d'attitude : 1 – absent. 2 – léger, présent lors de l'action. 3 – modéré en amplitude, présent lors de l'action. 4 – modéré en amplitude, tant lors du maintien postural que lors de l'action. 5 – amplitude marquée, présent la plupart du temps.	mb. sup.     mb. inf.	tête	mb. sup.     mb. inf.
Rigidité : 1 – absente. 2 – minimale ou apparaissant à la manœuvre de Froment. 3 – légère à modérée. 4 – marquée, mais les mouvements peuvent être effectués aisément. 5 – sévère, les mouvements sont effectués difficilement.	mb. sup.     mb. inf.	tronc	mb. sup.     mb. inf.
Tapotement des doigts (mouvements rapides et de grande amplitude du pouce sur l'index) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements des mains (mouvements rapides de grande amplitude de fermeture et ouverture des 2 mains, alternativement) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements alternatifs rapides (mouvements de prosupination des mains, de grande amplitude, chaque main séparément) : sur 5 points.	main gauche		main droite
Mouvements des pieds (taper le talon sur le sol en soulevant tout le pied, rapidement, amplitude de 7,5 cm environ) : sur 5 points.	pied gauche		pied droit
Lever d'une chaise : 1 – normal. 2 – lentement, ou plus d'un essai. 3 – s'aide des bras. 4 – tend à tomber en arrière, plus d'un essai mais peut se lever sans aide. 5 – peut à peine effectuer la tâche.	sur 5 points :		
Marche : 1 – normale. 2 – petits pas, sans festination ni propulsion. 3 – difficile mais pas d'aide ; peut avoir des festinations ou une propulsion. 4 – possible avec aide. 5 – impossible	sur 5 points :		
Posture :	sur 5 points :		
Stabilité posturale (réponse à un déplacement postural soudain, produit par une poussée sur les épaules, patient debout, yeux ouverts, prévenu) :	sur 5 points :		
Bradykinésie corporelle :	sur 5 points :		
TOTAL			

\* UPDRS = United Parkinson Disease Rate Score

## ANTIPARKINSONIENS (7) – AGONISTE DOPAMINERGIQUE INJECTABLE

### ■ Apomorphine chlorhydrate

<b>APOKINON</b>					
Stylos injecteurs avec cartouche de 30 mg/3 mL (1, 5 ou 10 stylos) : <b>apomorphine</b> à 1 % ou amp. de sol. injectable À utiliser par paliers de 1 mg	1 stylo 30 mg/3 mL	29,62	I	65 %	29,62
	5 stylos 30 mg/3 mL	127,82	I	65 %	25,56
	10 amp. 50 mg/5 mL (1%)	117,46	I	65 %	11,75
	10 amp. 50 mg/10 mL (0,5%)	117,46	I	65 %	11,75

#### PROPRIÉTÉS

Agoniste dopaminergique le plus puissant mais de durée d'action brève (45 à 90 min), stimulant les récepteurs dopaminergiques D1 et D2. Utilisable en injection SC, par le malade lui-même grâce au stylo injecteur en cas de blocage, ou en continu par pompe dans les formes à fluctuation plus grave.

Délai d'action très court de 2 à 10 min ; demi-vie de 34 min ; élimination par voie urinaire.

#### INDICATIONS

Traitement d'appoint des fluctuations sévères au cours de la maladie de Parkinson.

#### CONTRE-INDICATIONS

Déficit intellectuel, troubles cognitifs, confusion mentale, manifestations psychotiques.

Insuffisance hépatique.

Allergie au produit (contient des sulfites).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Associer systématiquement un traitement par **dompéridone** pour éviter les nausées lors de l'utilisation : 20 mg x 3/j à débiter au moins 4 j avant le début du traitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, hypotension orthostatique.

Troubles psychiques (notamment délires à thèmes sexuels avec désinhibition).

Allergies (sulfites).

Aux points d'injection : possibilité de nodules sous-cutanés inflammatoires lors de l'utilisation en pompe, prévenus par le changement du site d'injection.

### CONSENSUS

[1] Syndromes parkinsoniens dégénératifs ou secondaires non réversibles, HAS, 2007

## ANTIPARKINSONIENS (8) – INHIBITEURS DE LA MONAMINE-OXYDASE B

### ■ Sélégiline

<b>DÉPRÉNYL</b>					
Progressivement, 10 mg/j en 2 prises	30 cp. séc. 5 mg 100 cp. séc. 5 mg	19,39 HOP	I I	65 %	0,65
<b>OTRASEL</b>					
Idem <b>DÉPRÉNYL</b>	30 lyop. oral 1,25 mg	34,05	I	65 %	1,14

### ■ Rasagiline

<b>AZILECT</b>					
1 mg/j en 1 prise	30 cp. 1 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs spécifiques de la monoamine oxydase de type B (catabolisme de la dopamine au niveau cérébral), renforçant l'action de la **lévodopa**.

Résorption rapide, forte liaison aux protéines du plasma, élimination lente par voie urinaire surtout, demi-vie de 20 à 60 h.

#### INDICATIONS

**Sélégiline** au début ou au stade avancé de la Maladie de Parkinson en association avec la **L-DOPA**.

**Rasagiline** au début ou à un stade avancé de la maladie de Parkinson avec des fluctuations motrices en association avec la **L-DOPA**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Association aux **antidépresseurs sérotoninergiques** purs ou à la **péthidine**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'association à la **lévodopa** est actuellement problématique, une surmortalité inexplicée ayant été retrouvée dans le groupe avec la **sélégiline** lors d'un essai non en aveugle.

Surveillance rapprochée des affections cardiovasculaires chez le sujet âgé.

L'adjonction de la **sélégiline** à un traitement par **lévodopa** nécessite le plus souvent une baisse de sa posologie.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Possibilité d'élévation modérée des transaminases régressant après l'arrêt du traitement, troubles du rythme supra-ventriculaires, bradycardie, BAV.

## ANTIPARKINSONIENS (9) – LÉVODOPA AVEC INHIBITEUR DE LA DOPA-DÉCARBOXYLASE (1)

### ■ Lévodopa + bensérázide

<b>MODOPAR 125 DISPERSIBLE</b>					
Augmentation progressive des doses jusqu'à la posologie individuelle adaptée	60 cp. 125 mg disp. 100 mg <b>L-dopa + 25 mg bensérázide</b>	8,81	I	65 %	0,15
<b>MODOPAR</b>					
Augmentation progressive des doses jusqu'à la posologie individuelle adaptée	60 gél. 50 mg <b>L-dopa</b> + 12,5 mg <b>bensérázide</b>	4,58	I	65 %	0,08
	60 gél. 100 mg <b>L-dopa</b> + 25 mg <b>bensérázide</b>	7,58	I	65 %	0,13
	60 gél. LP 100 mg <b>L-dopa</b> + 25 mg <b>bensérázide</b>	9,61	I	65 %	0,16
	60 gél. 200 mg <b>L-dopa</b> + 50 mg <b>bensérázide</b>	12,76	I	65 %	0,21

### ■ Lévodopa + inhibiteur de la décarboxylase (ou carbidopa)

<b>SINEMET</b>					
Augmentation progressive des doses jusqu'à la posologie individuelle adaptée	100 cp. 100 mg <b>L-dopa</b> + 10 mg <b>carbidopa</b>	10,53	I	65 %	0,11
	50 cp. 250 mg <b>L-dopa</b> + 25 mg <b>carbidopa</b>	13,64	I	65 %	0,27
<b>SINEMET LP</b>					
Augmentation progressive des doses jusqu'à la posologie individuelle adaptée	30 100 mg <b>L-dopa</b> + 25 mg <b>carbidopa</b>	4,70	I	65 %	0,16
	30 200 mg <b>L-dopa</b> + 50 mg <b>carbidopa</b>	8,25	I	65 %	0,28
<b>DUODOPA</b>					
Gel intestinal destiné à la nutrition par sonde entérale Posologie progressive en fonction du rapport bénéfice/risque Ne pas dépasser 200 mL (2 sach.)/j	7 sach. 100 mL 2 g <b>L-dopa</b> + 500 mg <b>carbidopa</b>	HOP	I	65 %	

# ANTIPARKINSONIENS (10) – LÉVODOPA AVEC INHIBITEUR DE LA DOPA-DÉCARBOXYLASE (2)

## ■ Lévodopa + inhibiteur de la décarboxylase (ou carbidopa) + inhibiteur de la COMT

<b>STALEVO</b>					
Augmentation progressive des doses jusqu'à la posologie individuelle adaptée	100 cp. 50 mg <b>L-dopa</b> + 12,5 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	93,65	I	65 %	0,94
	100 cp. 75 mg <b>L-dopa</b> + 18,75 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	96,04	I	65 %	0,96
	100 cp. 100 mg <b>L-dopa</b> + 25 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	97,33	I	65 %	0,97
	100 cp. 125 mg <b>L-dopa</b> + 31,25 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	100,21	I	65 %	1,00
	100 cp. 150 mg <b>L-dopa</b> + 37,5 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	101,99	I	65 %	1,02
	100 cp. 175 mg <b>L-dopa</b> + 43,75 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>d'entacapone</b>	104,37	I	65 %	1,04
	200 cp. 200 mg <b>L-dopa</b> + 50 mg <b>carbidopa</b> + 200 mg <b>entacapone</b>	106,76	I	65 %	0,53

**ANTIPARKINSONIENS (11) – LÉVODOPA AVEC INHIBITEUR DE LA DOPA-DÉCARBOXYLASE (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

La **lévodopa** est transformée au niveau du neurone en dopamine par la dopa-décarboxylase et compense ainsi le déficit en dopamine au niveau du striatum caractérisant la maladie de Parkinson. Le **bensérazide** est un inhibiteur de la décarboxylase périphérique, limitant ainsi les effets secondaires au niveau périphérique. La **carbidopa** modifie le métabolisme de la **lévodopa** en empêchant sa décarboxylation périphérique en dopamine.

**INDICATIONS**

Maladie de Parkinson.

Duodopa est indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson à un stade avancé avec fluctuations motrices et hyper-/dyskinésie sévères et répondant à la lévodopa, lorsque les associations disponibles d'antiparkinsoniens n'ont pas donné de résultats satisfaisants.

**CONTRE-INDICATIONS**

Infarctus du myocarde récent.

Affections cardiovasculaires décompensées (AVC aigu, arythmie ou insuffisance cardiaque sévères).

Psychoses graves.

Démences et confusion mentale.

Ulcère gastroduodénal en poussée.

Mélanome malin.

**Grossesse** : par prudence, contre-indiqué au 1<sup>er</sup> trimestre.

Duodopa est également contre-indiqué en cas de glaucome à angle fermé et d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Augmentation très progressive des doses, notamment chez le sujet âgé, par paliers, jusqu'à la dose efficace, en prises fractionnées (3 à 6/j), en dehors des repas.

Anesthésie générale : éviter les **anesthésiques** type **halothane**. Arrêter le médicament 6 à 12 h avant et le reprendre environ 24 h après.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Au début : anorexie, nausées, vomissements, hypotension orthostatique, céphalées, somnolence et plus rarement idéations paranoïdes, états psychotiques, troubles du rythme → commencer à doses faibles et augmenter très progressivement.

Fluctuations d'activité et/ou diminution de l'activité du traitement à long terme.

Mouvements anormaux involontaires tardifs : dystonies de fin de dose et/ou dyskinésies de milieu de dose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées : **IMAO non sélectifs**, **antipsychotiques**, réserpiniques, **vitamine B6**.

Associations déconseillées : **anesthésiques généraux**, **papavérine**.

Duodopa est également contre-indiqué avec les **IMAO-A** et les **adrénergiques**.

## ANTIPARKINSONIENS (12) – ANTICHOLINERGIQUES

### ■ Trihexyphénidyle

<b>ARTANE</b>					
Sol. inj. (voie IM) : 5 à 30 mg/j	5 amp. 10 mg	5,80	I	65 %	1,16
Cp. : 4 à 15 mg/j en 2 ou 3 prises	50 cp. 2 mg	2,55	I	65 %	0,05
	20 cp. 5 mg	2,55	I	65 %	0,13
Sol. buv. à 0,4 % : 2 à 6 mg/j	1200 gttes 0,1 mg	3,85	I	65 %	0,00
20 à 60 gttes/j	(fl. 30 mL)				
<b>PARKINANE LP</b>					
2 à 10 mg/j en 1 prise	50 gél. 2 mg	2,55	I	65 %	0,05
	20 gél. 5 mg	2,55	I	65 %	0,13

### ■ Tropatépine

<b>LEPTICUR</b>					
Forme inj. (voie IM) : 5 à 10 mg/j	1 amp. 10 mg	4,66	I	65 %	4,66
Per os : 5 à 30 mg/j en 2 ou 3 prises	30 cp. séc. 10 mg	4,68	I	65 %	0,16
<b>LEPTICUR PARK</b>					
5 à 30 mg/j en 2 ou 3 prises	30 cp. séc. 5 mg	3,90	I	65 %	0,13

### ■ Bipéridène

<b>AKINETON LP</b>					
4 à 8 mg/j en 1 prise	30 cp. séc. LP 4 mg	3,89	I	65 %	0,13

#### PROPRIÉTÉS

Anticholinergiques par antagonisme des effets muscariniques centraux et périphériques.  
Resorption rapide, élimination urinaire.

#### INDICATIONS

Maladie de Parkinson.  
Syndromes parkinsoniens des **antipsychotiques**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Glaucome par fermeture de l'angle.  
Obstacle uréthro-prostatique.  
Iléus paralytique, spasmes de l'œsophage.  
Cardiopathies décompensées.  
Détérioration intellectuelle, âge > 70 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation prudente chez le sujet âgé.  
Doses progressivement croissantes.  
Pas d'arrêt brutal.  
**Grossesse et allaitement** : à éviter.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Atropiniques, dose-dépendants : sécheresse buccale et oculaire, constipation, mydriase, troubles de l'accommodation, risque de glaucome par fermeture de l'angle, risque de rétention urinaire en cas d'obstacle uréthro-prostatique.

Effets centraux : notamment chez le sujet âgé : excitation, euphorie, hallucinations, confusion mentale, effet amnésiant.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations déconseillées : **lisuride (DOPERGINE)** car risque confusionnel, surveillance clinique régulière.

**Atropine** et autres substances atropiniques dont les **antidépresseurs imipraminiques**, la plupart des **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, certains **antispasmodiques**, les **antipsychotiques phénotiaziniques**, les autres **antiparkinsoniens anticholinergiques**.

## ANTIPARKINSONIENS (13) – INHIBITEURS DE LA COMT

## ■ Entacapone

COMTAN					
1 à 2 cp. à chaque prise de <b>L-dopa</b> (max 2 g/j)	60 cp. 200 mg	47,29	I	65 %	0,79
	100 cp. 200 mg	75,94	I	65 %	0,76

## ■ Tolcapone

TASMAR					
1 cp. x 3/j	100 cp. 100 mg	127,84	I	15 %	1,28

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT). Diminuent la biotransformation de la L-dopa en 3-O-méthyl-dopa en périphérie par inhibition de la COMT. Doivent être administrés en même temps que de la L-dopa dont ils augmentent la disponibilité au niveau cérébral.

$C_{max}$  en 1 h environ, effet de premier passage hépatique, biodisponibilité de 35 %, demi-vie de 30 min, élimination dans les fèces (90 %) et les urines (10 %).

## INDICATIONS

Traitement adjuvant de la maladie de Parkinson, en association avec **L-dopa + bensérazide (MODOPAR)** ou **L-dopa + carbidopa (SINEMET)**.

## CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépatique, association aux **IMAO**, antécédents de rhabdomyolyse.

**Grossesse** : absence de données. À éviter.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Rares cas de rhabdomyolyse secondaire à des dyskinésies sévères chez des patients atteints de maladie de Parkinson.

Jamais décrits avec l'**entacapone**.

La **tolcapone** doit être utilisée qu'en cas d'intolérance à l'**entacapone** et prescrite par un spécialiste en raison du risque d'hépatite fulminante. Le produit sera arrêté s'il n'y a pas d'amélioration nette 3 semaines après le début du traitement. Nécessité d'un bilan hépatique tous les 15 j pendant 1 an puis toutes les 4 sem. pendant 6 mois et toutes les 8 sem. ensuite.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée.

Augmentation isolée des transaminases.

Dyskinésies, hypotension orthostatique, hallucinations si surdosage.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Prudence avec **isoprénaline**, **épinéphrine** (ou **adrénaline**), **noradrénaline**, **dopamine**, **dobutamine**, **apomorphine**, **alphaméthyl-dopa** (médicaments métabolisés par la COMT).



## ANTIPARKINSONIENS (14) – SYMPATHOMIMÉTIQUE ALPHA-ADRÉNERGIQUE

### ■ Midodrine

#### GUTRON

3 cp./j en 3 prises puis augmenter progressivement jusqu'à 12 cp./j en 3 ou 4 prises	30 cp. 2,5 mg 90 cp. 2,5 mg	14,78 41,83	II II	65 % 65 %	0,49 0,46
--	--------------------------------	----------------	----------	--------------	--------------

#### PROPRIÉTÉS

Alpha-adrénergique périphérique, sympathomimétique.

L'effet alpha-stimulant provoque une vasoconstriction veineuse puis artérielle, ce qui prévient l'hypotension orthostatique, augmente les résistances périphériques et provoque une élévation de la pression artérielle.

#### INDICATIONS

Traitement de l'hypotension orthostatique sévère survenant notamment dans le cadre des maladies neurologiques dégénératives.

#### CONTRE-INDICATIONS

Absolues : HTA, bradycardie, rétention urinaire, cardiopathie sévère, glaucome à angle étroit, vasculopathie oblitérante sévère, thyrotoxicose, phéochromocytome, insuffisance rénale sévère, maladie de Raynaud, antécé-

dents de douleurs angineuses. Association à l'**iproniazide**.

Relative : femme enceinte.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre la dernière prise au plus tard à 18 h.

Réduire la posologie si HTA de décubitus.

Surveiller la fonction rénale.

Grossesse et allaitement : déconseillés.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Sensation de froid, fourmillements.

Mictions impérieuses.

HTA

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Guanéthidine** et apparentés : majoration de l'effet hypertenseur, mydriase.

**Iproniazide (MARSILID)** : crise hypertensive ; arrêt au moins 15 j avant d'introduire la **mido-drine**.

**TOXINE BOTULINIQUE (1)**■ **Toxine botulique de type A**

<b>BOTOX ALLERGAN</b>					
Posologie variable selon l'indication	1 fl. 50 U	HOP	I		
	1 fl. 100 U	HOP	I		
	1 fl. 200 U	HOP	I		
<b>DYSPOET</b>					
Posologie variable selon l'indication	1 fl. 300 U Speywood	HOP	I		
	1 fl. 500 U Speywood	HOP	I		
<b>XEOMIN</b>					
Voie IM Posologies variables selon l'indication Posologies max : - blépharospasme : 100 U/12 sem. - torticolis spasmodique : 300 U/10 sem. - spasticité post-AVC : 400 U/12 sem.	1 fl. 50 U	HOP	I		
	1 fl. 100 U	HOP	I		

■ **Toxine botulique de type B**

<b>NEUROBLOC</b>					
Posologie variable selon l'indication	1 fl. 0,5 mL (5 000 U/mL)	HOP	I		
	1 fl. 1 mL (5 000 U/mL)	HOP	I		
	1 fl. 2 mL (5 000 U/mL)	HOP	I		

## TOXINE BOTULINIQUE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Toxines A et B de *Clostridium botulinum*, agent responsable du botulisme. Agit en bloquant de façon irréversible le transport de l'acétylcholine vers la fente synaptique. Cet effet est annulé par la production de nouvelles jonctions neuromusculaires nécessitant de nouvelles injections tous les 3-4 mois.

Remarque : 1 U Allergan équivaut à environ 3 à 5 U Speywood.

**Attention :** les unités utilisées pour la **toxine de type B** ne sont pas comparables avec celles utilisées pour les **toxines de type A**. Les doses utilisées pour les **toxines de type A** ne doivent en aucun cas être appliquées à la **toxine de type B**.

### INDICATIONS

AMM :

- adultes et enfants > 12 ans : blépharospasme, spasme hémifacial et torticolis spasmodique et troubles de l'oculomotricité ;
- adultes : traitement de l'hyperactivité détrussorienne neurologique conduisant à une incontinence urinaire non contrôlée par un traitement cholinergique chez les patients blessés médullaires ou SEP utilisant l'auto-sondage ;
- adultes et enfants > 2 ans : traitement de la spasticité des membres supérieurs ou inférieurs.

Hors AMM : les indications s'élargissent de plus en plus : dystonies laryngées (dans certaines dysphonies), dystonies oromandibulaires rendant l'alimentation difficile, achalasie, diplopies, certains tremblements, achalasie, etc.

### CONTRE-INDICATIONS

Maladies de la jonction neuromusculaire (myasthénie et syndrome de Lambert-Eaton). Allergie, infection au point d'injection.

**Grossesse et allaitement :** contre-indiquées.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Injections IM strictes après repérage précis du muscle.

Prescription réservée aux spécialistes en neurologie, ophtalmologie ou ORL hospitaliers.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Essentiellement locaux (diffusion de la toxine) :

- blépharospasme et hémispasme : ptosis partiel et transitoire (44 %), larmoiement, sécheresse oculaire, entropion, diplopie transitoire ;
- dystonies cervicales : dysphagie transitoire (20-35 %).

Risque de formation d'anticorps antitoxine (3-5 % des cas), surtout en cas d'injection de fortes doses et/ou rapprochées. Cela peut enrayer l'effet thérapeutique ultérieur.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Curares, aminosides.**

PATHOLOGIE	LIEU D'INJECTION	DOSES	EFFICACITÉ (PATIENTS AMÉLIORÉS)
Blépharospasme	Muscle orbiculaire	12,5 à 25 U Allergan	80-90 % pendant 3-4 mois
Torticolis spasmodique	Muscle sterno-cléido-mastoïdien, splénius capitis, trapézoïde	100 à 200 U Allergan	60-80 % pendant 3 mois
Hémispasme facial	Périorbitaire	12,5 à 25 U Allergan	90 % jusqu'à 5 mois

## ANTICHOLINESTÉRASIQUES D'ACTION CENTRALE

## ■ Donépézil

<b>ARICEPT</b>					
5 mg/j pendant 6 sem. puis augmenter éventuellement à 10 mg/j selon la réponse clinique	28 cp. pell. 5 mg	58,94	I	15 %	2,11
	28 cp. orodisp. 5 mg	58,94	I	15 %	2,11
	50 cp. pell. 5 mg	HOP	I		
	50 cp. orodisp. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. pell. 10 mg	58,94	I	15 %	2,11
	28 cp. orodisp. 10 mg	58,94	I	15 %	2,11
	50 cp. pell. 10 mg	HOP	I		
	50 cp. orodisp. 10 mg	HOP	I	65 %	

## ■ Rivastigmine

<b>EXELON</b>					
Dose initiale = 1,5 mg matin et soir Puis atteindre 3 à 6 mg matin et soir par paliers de 3 mg/j tous les 15 j	28 gél. 1,5 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 1,5 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 3 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 3 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 4,5 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 4,5 mg	54,05	I	15 %	0,97
	28 gél. 6 mg	28,33	I	15 %	1,01
	56 gél. 6 mg	54,05	I	15 %	0,97
	1 fl. 50 mL sol. buv. 2 mg/mL	31,88	I	15 %	31,88
	30 disp. transderm. 4,6 mg/24 h	73,53	I	15 %	2,45
Dose initiale de 4,6 mg/j pdt 4 sem. puis 9,5 mg/j	30 disp. transderm. 9,5 mg/24 h	73,53	I	15 %	2,45

## ■ Galantamine

<b>REMINYL</b>					
Dose initiale : 8 mg/j en 2 prises pendant 4 sem. Dose d'entretien : 16 mg/j en 2 prises pendant 4 sem. Dose max. : 24 mg/j	56 cp. 4 mg	43,05	I	15 %	0,77
	56 cp. 8 mg	55,64	I	15 %	0,99
	56 cp. 12 mg	65,87	I	15 %	1,18
	1 fl. sol. buv. 100 mL (4 mg/mL)	47,54	I	15 %	47,54
<b>REMINYL LP</b>					
Idem <b>REMINYL</b>	28 gél. 8 mg	43,05	I	15 %	1,54
	28 gél. 16 mg	55,64	I	15 %	1,99
	28 gél. 24 mg	65,87	I	15 %	2,35

## PROPRIÉTÉS

Anticholinestérasique d'action centrale.

**Donépézil** : pic en 3-4 h, demi-vie de 70 h, pas d'interaction avec la nourriture, excrétion rénale.

**Rivastigmine** : absorption complète, pic en 1 h, diminution de la vitesse d'absorption avec la nourriture, demi-vie de 1 h, élimination rénale.

**Galantamine** : pic en 1 h, diminution de la vitesse d'absorption en 1 h.

## INDICATIONS

Pour les 3 produits : formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer.

Pour la **rivastigmine** : traitement symptomatique des formes légères à modérément sévères d'une démence chez les patients atteints d'une maladie de Parkinson.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), crampes.

Asthénie, anorexie, agitation et agressivité.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Théophylline** (diminution de sa clairance), **cholinomimétiques** et **anticholinergiques**, **AINS**.

## ANTAGONISTE DES RÉCEPTEURS NMDA

## ■ Mémantine

EBIXA					
La posologie doit être atteinte progressivement : 1 <sup>re</sup> sem. : 5 mg le matin 2 <sup>e</sup> sem. : 5 mg matin et soir 3 <sup>e</sup> sem. : 10 mg le matin et 5 mg le soir 4 <sup>e</sup> sem. : 10 mg matin et soir ou 20 mg en 1 prise	56 cp. 10 mg	64,82	I	15 %	1,16
	28 cp. 20 mg	64,82	I	15 %	2,32
	98 cp. 20 mg	HOP	I		
	100 press. sol. buv. 5 mg	58,34	I	15 %	0,58
	98 cp. 10 mg	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA.

Biodisponibilité de 100 % ; élimination urinaire.

## INDICATIONS

Formes modérément sévères à sévères de la maladie d'Alzheimer (MMS de 3 à 19).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au produit.

Insuffisance rénale sévère : si < 29 mL/min, ne proposer que 10 mg/j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs (diarrhée).

Asthénie, anxiété, confusion, hallucinations, céphalée, vertiges, crise convulsive.

Augmentation de la libido, cystite.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Mémantine** : augmentation des effets de la L-dopa, des agonistes dopaminergiques et des anticholinergiques.

Diminution des effets des barbituriques et des antipsychotiques.

Risque de psychose avec l'amantadine.

Augmentation des taux plasmatiques de médicaments comme la cimétidine, la ranitidine, la quinine, la quinidine et la nicotine.

Diminution des taux de l'hydrochlorothiazide  
Augmentation de l'INR chez les patients traités par anticoagulants oraux.

## VITAMINOTHÉRAPIE B1 ET B6

## ■ Vitamine B1 (ou thiamine)

<b>BÉNERVA</b>					
Traitement d'attaque : 500 à 1 g/j Traitement d'entretien : 250-500 mg/j Inj. IM : même posologie sous surveillance médicale stricte	40 cp. 250 mg 10 amp. 500 mg	HOP HOP			
<b>BÉVITINE</b>					
Idem <b>BÉNERVA</b> <i>per os</i> Voie inj. IM seulement	20 cp. 250 mg 5 amp. 100 mg	2,95		NR 65 %	0,59

**PROPRIÉTÉS**

Bonne absorption digestive sauf en cas de gastrite éthylique concomitante. Élimination urinaire. Les réserves de l'organisme ne permettent de couvrir que 8 j en cas de carence d'apports.

**INDICATIONS**

Béribéri.  
Alcoolisme : prévention des états carentiels, polynévrites, encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Proposée à fortes doses dans certains syndromes douloureux d'origine neurologique ou rhumatologique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Intolérance connue au produit.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Formes injectables : surveillance médicale stricte en raison des risques d'hypotension et exceptionnellement de choc anaphylactique. Douleurs au point d'injection.

## ■ Vitamine B6 (ou pyridoxine)

<b>BÉCILAN</b>					
Voie orale : 250 mg à 1 g/j IV ou IM : 100 à 750 mg/j	40 cp. 250 mg 5 amp. 250 mg	2,97		NR 65 %	0,59
<b>PYRIDOXINE</b>					
IV ou IM : 250 mg à 1 g/j	100 amp. 250 mg	HOP			
<b>VITAMINE B6 RICHARD</b>					
<i>Per os</i> : 250 à 750 mg/j	20 cp. quadriséc. 250 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

Absorption rapide, élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Prophylaxie et traitement des états carentiels en **vitamine B6**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de choc anaphylactique avec les solutions injectables.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque de neuropathies sensitives en cas de surdosage (fortes doses > 2 g/j ou traitements prolongés). Réversibles en 6 mois environ après arrêt du traitement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La **vitamine B6** diminue l'action de la **lévodopa** par stimulation de la dopadécarboxylase périphérique.

## IMMUNOGLOBULINES POLYVALENTES

## ■ Immunoglobulines polyvalentes

<b>TÉGÉLINE</b>					
Dans la polyradiculonévrite aiguë : 0,4 g/kg/j pendant 5 j en IV lente ou 1 g/kg/j pendant 2 j en IV lente	1 fl. 0,5 g/10 mL	HOP	I		
	1 fl. 2,5 g/50 mL	HOP	I		
	1 fl. 5 g/100 mL	HOP	I		
	1 fl. 10 g/200 mL	HOP	I		

## ■ Immunoglobulines humaines polyvalentes, pour administration extravasculaire

<b>HIZENTRA</b>					
Voie SC Posologie d'attaque : 0,2-0,5 g/kg/j Posologie cumulée : 0,4-0,8 g/kg/mois	1 fl. 1 g/5 mL (200 mg/mL)	HOP	I	100 %	
	1 fl. 2 g/10 mL (200 mg/mL)	HOP	I	100 %	
	1 fl. 4 g/20 mL (200 mg/mL)	HOP	I	100 %	
	1 fl. 10 g/50 mL (200 mg/mL)	HOP	I	100 %	

**PROPRIÉTÉS**

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine. Demi-vie d'environ 30 j, variable selon le statut immunitaire du receveur.

Conditions de prescription et de délivrance particulières. Réservées aux hôpitaux.

**INDICATIONS**

Traitement substitutif des déficits immunitaires primitifs ou secondaires (myélome, leucémie lymphoïde chronique).

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et transplantation d'organe.

Traitement modulateur des maladies auto-immunes et systémiques : purpura thrombopénique idiopathique, maladie de Kawasaki.

Polyradiculonévrite chronique.

Infections bactériennes récidivantes chez l'enfant infecté par le VIH.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux immunoglobulines homologues (notamment patient ayant un déficit en IgA avec anticorps anti-IgA).

**HIZENTRA** est contre-indiqué en cas d'hyperprolinémie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**TÉGÉLINE** : voie intraveineuse stricte.

Débit initial de 1 mL/kg/h pendant 30 min. Puis augmentation jusqu'à 4 mL/kg/h maximum.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Élévation de la créatinine, insuffisance rénale aiguë.

Réaction méningée aseptique.

Frissons, hyperthermie, céphalées, nausées, vomissements, allergie, arthralgies modérées.

Rarement : hypotension, choc anaphylactique.

Le risque de transmission d'agents infectieux connus ou inconnus est faible mais persiste malgré :

- des contrôles stricts effectués lors de la sélection des dons (interrogatoire des donneurs, tests de dépistage VIH, VHB et VHC),
- les procédés d'extraction comportant des étapes d'élimination ou d'inactivation virale (notamment contre VIH, VHB et VHC). Certains virus non enveloppés y sont cependant résistants.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Elles entravent l'efficacité des vaccins vivants atténués (attendre au moins 6 sem.).

## INHIBITEUR GLUTAMATERGIQUE

## ■ Riluzole

RILUTEK					
1 cp. x 2/j	56 cp. 50 mg	286,89	I	65 %	5,12

**PROPRIÉTÉS**

Mécanisme d'action incertain : le **riluzole** agit par inhibition glutamatergique.

Absorption rapide, liaison aux protéines plasmatiques (97 %), demi-vie de 9 à 15 h, élimination essentiellement urinaire.

**INDICATIONS**

Sclérose latérale amyotrophique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie.

Maladie hépatique ou transaminases > 3N avant la mise en route du traitement.

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utilisation prudente en cas d'atteinte hépatique. Contrôle des transaminases avant la

mise en route du traitement, tous les mois pendant 3 mois puis tous les 3 mois. Arrêt du traitement si transaminases > 5N.

Contrôle de l'hémogramme si syndrome fébrile à la recherche d'une neutropénie.

Pas d'étude réalisée chez l'enfant.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les plus fréquents sont l'asthénie, les nausées, l'élévation habituellement transitoire des transaminases (arrêt du traitement si ALAT > 5N). Moins fréquents : douleurs abdominales, vomissements, tachycardie, somnolence.

Neutropénie rare mais pouvant être sévère.

Prescription initiale par un neurologue hospitalier, puis renouvellement possible par tout médecin.



## ANTICHOLINESTÉRASIQUES D'ACTION CENTRALE

■ **Pyridostigmine bromure**

<b>MESTINON</b>					
4 à 8 cp. en 4 à 6 prises/j (1 à 2 cp. dans l'atonie intestinale)	20 cp. 60 mg	5,74		65 %	0,29
<b>MESTINON RETARD</b>					
Posologie usuelle : 1 à 3 cp. x 2/j La posologie dépend de la réponse individuelle	100 cp. 180 mg	HOP			

■ **Ambénonium chlorure**

<b>MYTELASE</b>					
3 à 10 cp. en 4 à 6 prises/j	50 cp. séc. 10 mg	6,15	I	65 %	0,12

■ **Néostigmine**

<b>PROSTIGMINE</b>					
2 à 5 amp. IM ou SC/j (1 à 2 mg dans l'atonie intestinale)	6 amp. 0,5 mg	3,16	I	65 %	0,53

**PROPRIÉTÉS**

Parasympathicomimétiques par inhibition de l'acétylcholinestérase.

Résorption digestive faible, métabolisme et élimination urinaire.

**INDICATIONS**

Myasthénie.

Atonie intestinale (syndrome d'Ogilvie).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie, asthme, maladie de Parkinson, obstruction mécanique des voies digestives ou urinaires.

**Grossesse** : innocuité non établie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éduquer le patient, lui apprendre les signes de surdosage et la conduite à tenir.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque de surdosage.

Signes muscariniques : crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, hypersalivation, augmentation des sécrétions lacrymales et bronchiques, myosis, bradycardie.

Signes nicotiniques : crampes, fasciculations, soubresauts musculaires, risque de troubles de déglutition et respiratoires avec apnée dans les formes sévères.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

À éviter : **anticholinergiques**.

À associer avec précaution : **morphiniques** et **opiacés**.

ANTICHOLINESTÉRASIQUE	DÉBUT DE L'EFFET	DURÉE D'ACTION
<b>Pyridostigmine</b> standard Forme LP	30 min 30 min	3 à 4 h 8 à 10 h
<b>Ambénonium</b>	30 min	4 à 6 h
<b>Néostigmine</b>	10 à 15 min	1 à 2 h

## QUININE (DÉRIVÉ)

## ■ Quinine + thiamine + goménol

HEXAQUINE					
2 à 6 cp./j en 3-4 prises	18 cp. (quinine 120 mg, thiamine 32 mg)		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

La **quinine** a une action curarisante et antitétanique modérée sur le muscle strié. Son action sur le muscle cardiaque aux doses préconisées est sans conséquence. Elle peut antagoniser la phytostigmine et aggraver un bloc neuromusculaire.

Absorption rapide, 70 % de liaison aux protéines plasmatiques, élimination urinaire, disparition quasi complète de la **quinine** 24 h après arrêt du traitement.

**INDICATIONS**

Proposée dans les crampes musculaires.

**CONTRE-INDICATIONS**

Myasthénie, maladie de Stokes-Adams, fibrillation auriculaire, traitement concomitant par **quinidine** ou **chloroquine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : quelques cas d'anomalies oculaires ou d'atteintes auditives ont été signalés lors de la prise de fortes doses de **quinine** durant la grossesse. Cependant peu de risques aux doses préconisées.

**Allaitement** : possible.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibilité de bourdonnements d'oreille et de manifestations cutanées à fortes doses.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Quinidine**, **chloroquine** : association contre-indiquée.

## NARCOLEPSIE

## ■ Modafinil

MODIODAL					
2 à 4 cp. en 2 prises (matin et midi)	30 cp. 100 mg	67,87	I	65 %	2,26

## PROPRIÉTÉS

Effet éveillant non amphétaminique, en partie lié à une potentialisation  $\alpha_1$ -adrénergique spécifiquement au niveau cérébral.

Résorption bonne mais lente, métabolisme hépatique, élimination urinaire, demi-vie de 10 à 12 h.

## INDICATIONS

Narcolepsie avec ou sans cataplexie.  
Hypersomnies idiopathiques.

Le diagnostic clinique doit être confirmé par un enregistrement polysomnographique, un test itératif des latences d'endormissement, réalisés dans un centre d'exploration du sommeil.

## CONTRE-INDICATIONS

Anxiété majeure.

**Grossesse** : innocuité non établie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance hépatique grave : diminuer la posologie de moitié.

Surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque chez les hypertendus.

## ■ Oxybate de sodium

XYREM					
Diluer chaque dose dans 60 mL d'eau (godet doseur) avant l'ingestion 4,5 g/j à fractionner en 2 prises de 2,25 g Augmenter par paliers de 1,5 g/j tous les 15 j Max. 9 g/j en 2 prises	180 fl. (180 mL) + 1 ser. de 10 mL graduée de 0,25 en 0,25 g	HOP	S		

## PROPRIÉTÉS

Dépresseur du système nerveux central, réduit la somnolence diurne excessive, la cataplexie et modifie l'architecture du sommeil. Mécanisme d'action non connu.

Absorption diminuée en cas de repas riche en graisses, 1 % de liaison aux protéines plasmatiques, élimination sous forme de gaz carbonique.

## INDICATIONS

Traitement de la narcolepsie chez les patients adultes présentant une cataplexie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Transitoires : sensation de tension interne, d'excitation, d'insomnie ou d'anorexie. Régresse à l'arrêt ou à la diminution de posologie.

Troubles digestifs, céphalées, éruptions cutanées.

Exceptionnellement : dyskinésies bucco-faciales.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contraceptifs oraux** : risques de diminution de l'efficacité contraceptive des pilules mini- ou microdosées (car inducteur enzymatique). Utiliser de préférence les **contraceptifs normodosés** ou un autre type de contraception.

**Ciclosporine** : diminution de l'efficacité de l'immunosuppresseur.

NB : Médicament d'exception. Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes et/ou aux services spécialisés en neurologie et/ou aux centres du sommeil. Renouvellement de la prescription initiale, dans les périodes intermédiaires, par tout prescripteur.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la molécule, déficience en semi-aldéhyde succinique-déshydrogénase, traitement par **opiacés** ou **barbituriques**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prescription limitée à 28 j.

Risque d'abus médicamenteux, de dépression respiratoire et d'épilepsie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Vertiges, nausées, céphalées. Et aussi : anorexie, HTA.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool, **sédatifs**.

## ANTIAMYLOÏDE

## ■ Tafamidis

VYNDAQEL					
20 mg/j en 1 prise	30 caps. 20 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Stabilisateur spécifique de la transthyrétine (TTR).

La polyneuropathie amyloïde à TTR est une neuropathie dégénérative axonale à multiples facettes caractérisée par des dysfonctionnements du système nerveux sensitif, moteur et autonome. La dissociation du tétramère de TTR en monomères est l'étape limitante dans la pathogénie de la polyneuropathie amyloïde à TTR aussi connue comme polyneuropathie amyloïde familiale à TTR (TTR-FAP). Le **tafamidis** se lie de façon non spécifique aux deux sites de fixation de la thyroxine présents sur la forme native tétramérique de la TTR, empêchant sa dissociation en monomères.

**INDICATIONS**

Traitement de l'amylose à TTR chez les patients adultes présentant une polyneuropathie symp-

tomatique de stade 1 pour retarder le déficit neurologique périphérique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Transplantation hépatique.

Hypersensibilité au produit, grossesse, allaitement, âge < 18 ans.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles gastro-intestinaux : diarrhée, douleurs abdominales.

Troubles génito-urinaires : candidose, infection urinaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pas d'activité inductrice ou inhibitrice de CYP. Aucune autre étude n'a été menée.

**PRESCRIPTION**

Médicament soumis à prescription hospitalière, réalisée par un spécialiste en neurologie.

## BRÛLURES OCULAIRES (1)

Les brûlures oculaires sont fréquentes ; leur pronostic est surtout mauvais en cas de brûlures chimiques.

### Brûlures chimiques

Elles sont d'autant plus graves qu'il s'agit d'une **base** ou d'un produit **concentré** (soude, potasse, ammoniacque, ciment, chaux). En effet, les bases ont un grand pouvoir de pénétration dans les tissus profonds de l'œil ; des complications graves peuvent apparaître, même tardivement. Le pronostic est étroitement lié à la rapidité de mise en œuvre du traitement. *Chaque minute compte +++.*

#### Traitement en urgence sur les lieux mêmes de l'accident

- Lavage *immédiat, abondant, et prolongé* (15 à 30 min) à l'eau du robinet, à l'eau minérale, voire à la **DIPHOTÉRINE** (molécule chélatrice polyvalente : acide et base) des globes et des culs-de-sac conjonctivaux en maintenant fermement les paupières ouvertes.

- Noter les références exactes du produit responsable (nom de marque, nom chimique, concentration, pH) ; au mieux, amener l'étiquette du flacon, ou le flacon lui-même aux urgences ophtalmologiques.

#### Traitement en urgence en milieu ophtalmologique

- Après instillation d'un collyre anesthésique, **oxybuprocaine (CÉBÉSINE)**, répéter le lavage facilité par la pose d'un blépharostat, évacuer les éventuels fragments solides de caustique en dépliant les culs-de-sac conjonctivaux, et laver les voies lacrymales.
- Dresser un bilan initial extrêmement soigneux des lésions.
- Établir un pronostic.
- Téléphoner au centre antipoison pour se renseigner sur la nature et le pH du caustique.
- **En cas de brûlure par base**, ponction évacuatrice de la chambre antérieure en

salle d'opération (si l'accident est récent, pour limiter la diffusion du toxique) et injection intracaméculaire de **corticoïdes (dexaméthasone)** dans la chambre antérieure pour diminuer l'inflammation.

### Prescription

La durée du traitement est fonction de la nature et de la gravité des lésions.

- **Antibiotiques** pour prévenir la surinfection.

Ex. : rifamycine (**RIFAMYCINE CHIBRET**) 1 gtte x 4/j.

- Cycloplégiques pour diminuer les douleurs et empêcher les synéchies.

Ex. : atropine collyre 1 % (**ATROPINE ALCON**) 1 gtte x 2/j.

- **Cicatrisants cornéens.**

Ex. : cyanocobalamine (**VITAMINE B12 ALLERGAN**) 1 gtte x 4/j et rétinol (**VITAMINE A DULCIS pommade ophtalmique**) 1 gtte x 3/j dans le cul-de-sac conjonctival inférieur.

- **Corticoïdes** selon les cas.

Ex. : **CHIBRO-CADRON** x 4/j, ou injections latérobulbaires ou sous-conjonctivales de **dexaméthasone** si la réaction inflammatoire est importante.

- Autres traitements.

- **Antalgiques** par voie générale si besoin : **DOLIPRANE** 500 mg : 2 cp. en cas de douleur sans dépasser 6 cp./j.

- Verre scléral perforé si risque de symblépharon.

- Pansement oculaire.

Le pronostic reste sombre, les complications nombreuses, en particulier en cas de brûlures par **base** : taie cornéenne (opacification secondaire de la cornée), symblépharon (fusion cicatricielle de la conjonctive à la paupière), rétraction cicatricielle des paupières.

Les collyres anesthésiques locaux doivent impérativement être réservés aux actes professionnels car leur usage répété est toxique pour l'épithélium cornéen. Ne surtout ni les prescrire ni les confier aux patients + + + +.

## BRÛLURES OCULAIRES (2)

### Brûlures par UV : coup d'arc des soudeurs, ophtalmie des neiges

Elles entraînent une kératite ponctuée superficielle (KPS) après quelques heures de latence (typiquement, la violente douleur qui réveille le patient à 3 h du matin) : photophobie, larmoiement, œil rouge, douloureux.

La **prescription** comporte :

- **Antibiotiques.**

Ex. : **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** 1 gtte x 4/j pendant 8 j.

- **Cicatrisants cornéens.**

Ex. : **VITAMINE B12 ALLERGAN** 1 gtte x 4/j et **VITAMINE A DULCIS pommade ophtalmique** le soir dans le cul-de-sac conjonctival pendant 8 j.

- **Cycloplégiques.**

Ex. : **ISOPTO-HOMATROPINE 1 % collyre** 1 gtte x 3/j, tant que la douleur persiste ; le patient peut l'arrêter de lui-même au bout de 2-3 j. Prévenir le patient de la gêne visuelle entraînée par la cycloplégie et la mydriase (éblouissement, gêne à la lecture de près, mydriase).

- **Autres traitements.**

Antalgiques par voie générale si besoin : **DOLIPRANE** 500 mg, 2 cp. x 3/j.

Il s'agit d'une pathologie souvent bénigne. La cicatrisation cornéenne se fait en 48 h.

### Brûlures par gaz lacrymogènes

Les suspensions donnent une irritation très douloureuse, mais sans gravité, des

conjonctives et de la cornée. Il s'agit aussi d'une kératite ponctuée superficielle : KPS (cf. symptômes ci-dessus).

### Prise en charge aux urgences

- 1 goutte de **CÉBÉSINE**.

- Puis lavage oculaire au sérum physiologique.

- Rinçage du visage à grande eau (eau du robinet).

### Traitement à domicile

Avant tout, quitter le plus tôt possible tous les vêtements imprégnés, et prendre une douche énergique, avec lavage des cheveux pour se débarrasser de toutes les particules qui continuent à être irritantes. Le traitement allie **antibiotiques locaux**, **cicatrisants cornéens** en collyre et pommade, **cycloplégiques**, et **antalgiques** par voie générale (même prescription que pour les brûlures par UV).

### Brûlures thermiques

Généralement, l'atteinte est limitée aux paupières, grâce au réflexe d'occlusion.

Traitement d'une brûlure de la paupière :

- nettoyage au sérum physiologique ;

- tulle gras pour favoriser la cicatrisation et empêcher la formation des croûtes qui sont source d'infection ; ex. : **JELONET** x 3/j ;

- pansement avec rondelle oculaire volontiers humide et **MICROPORE**.

## CATARACTE (1)

### Définition

La cataracte se définit comme une opacité du cristallin uni- ou bilatérale entraînant une baisse de l'acuité visuelle.

Le cristallin est une lentille transparente, biconvexe, avasculaire, située dans un plan frontal, juste en arrière de l'iris. Chez le sujet âgé, et dans certaines circonstances (traumatisme oculaire, diabète, uvéites, hyperparathyroïdie, corticoïdes, etc.), le cristallin s'opacifie : c'est la cataracte. La cataracte est l'évolution normale de tout cristallin, atteignant un « certain âge ».

### Traitement chirurgical

C'est le seul traitement curatif de la cataracte. Il consiste à extraire le cristallin cataracté, et à le remplacer par un « implant » ou cristallin artificiel. C'est l'importance de la gêne visuelle entraînée par la cataracte qui conditionne le choix du moment de l'intervention.

### Préparation préopératoire

- Consultation d'anesthésie et bilan préopératoire (biologie, radiographie pulmonaire, ECG).
- Calcul de la puissance de l'implant cristallinien (elle est fonction des rayons de courbure cornéens et de la longueur axiale du globe oculaire).

### Modes d'hospitalisation

Le plus souvent, le patient est hospitalisé pour la journée (ambulatoire). Quelquefois, il ne sort que le lendemain de l'intervention.

### Soins préopératoires

- Dilatation pupillaire 2 h avant l'intervention : **atropine collyre 1 %**, **MYDRIATICUM**, **NÉOSYNÉPHRINE FAURE**, 1 gtte de chaque toutes les 10 min.
- **AINS**, **OCUFEN 0,03 % collyre** : 1 gtte toutes les 10 min.

### Types d'anesthésie

L'anesthésie topique (par collyre) est la technique la plus utilisée.

## COLLYRE ANTI-ŒDÉMATEUX

## ■ Diméticone

OPHTASILOXANE				
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.)		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Pansement protecteur et lubrifiant de l'œil.

**INDICATIONS**


Œdème de cornée.

Prévention des symblépharons en cas de brûlures ou traumatismes oculo-palpébraux d'origine thermique, caustique ou phototraumatique.




**CATARACTE (2)**

Phakoémulsification : le noyau cristallinien est émulsifié puis aussitôt aspiré à l'intérieur même de son sac capsulaire. Sur le schéma, les 2 instruments (phakotype et micromanipulateur) sont dans l'œil.



Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin : le noyau cristallinien est extrait en bloc de son sac capsulaire.



## CHALAZION

### Définition

C'est un granulome inflammatoire dû à la rétention des sécrétions des glandes de Meibomius situées dans l'épaisseur de la paupière. Il se présente comme une tuméfaction palpébrale inflammatoire disgracieuse et susceptible de surinfection.

### Traitement

- **On essaie d'abord un traitement médical local.**
- Massage des paupières après les avoir réchauffées à l'aide d'un gant de toilette tiède et humide pendant 5 à 10 min, de façon à ramollir les sécrétions par la cha-

leur puis à les évacuer, puis application d'une pommade **antibiotique - corticoïde**.  
Ex. : **oxytétracycline + dexaméthasone (STERDEX)** 1 application dans l'œil et sur la paupière x 2/j pendant 15 j.

- **En cas d'échec : exérèse chirurgicale**, après avoir vérifié le bilan d'hémostase. Celle-ci peut se faire dans la salle de petite chirurgie. Après avoir anesthésié la paupière, on la retourne pour exposer sa face profonde, puis on effectue une petite incision au bistouri jusqu'au tarse en regard du chalazion, et on évacue à la curette son contenu.
- **Recherche d'une cause en cas de récurrences** (hétérophorie, astigmatisme, diabète).

## CONJONCTIVITES (1)

Une conjonctivite est une inflammation de la muqueuse conjonctivale qui tapisse la face postérieure des paupières et la face antérieure de la sclère.

Une conjonctivite se manifeste par :

- une hyperhémie conjonctivale ;
- sans douleur, sans baisse visuelle ;
- des sécrétions.

On distingue 3 grands types de conjonctivites : les conjonctivites infectieuses (bactériennes ou virales), les conjonctivites allergiques et les conjonctivites par sécheresse oculaire.

### Conjonctivites infectieuses

#### Mesures d'hygiène concernant les conjonctivites infectieuses

Pour toutes les conjonctivites infectieuses, les mesures d'hygiène sont essentielles pour éviter la contamination.

##### Conseils concernant le médecin

- Se laver les mains et désinfecter le matériel après chaque patient.
- Mettre des gants pour l'examen de tout patient suspect de conjonctivite infectieuse et utiliser des collyres unidoses pour la poursuite de l'examen.

##### Conseils concernant le malade

- Expliquer au patient que la conjonctivite infectieuse est très contagieuse, et qu'il doit appliquer des mesures d'hygiène stricte pour éviter de la transmettre à son entourage +++.
- Éviter de toucher ou gratter ses yeux.
- Se laver souvent les mains, en particulier après tout contact avec les yeux (après avoir mis les collyres).
- Affaires de toilette et linge de maison personnels (savon, serviettes, mouchoirs, draps, etc.).
- Consultation des proches si apparition de symptômes similaires.
- Arrêt de travail à discuter dans certains métiers (enseignants, personnel médical et paramédical, etc.).
- Interdiction de tout port de lentilles de contact pendant toute la durée de l'infection.
- Ne pas interrompre prématurément le traitement ou diminuer la posologie : mettre des gouttes au moins x 6-8/j pendant 48 h, puis x 4/j pendant suffisamment longtemps (spontanément, les patients ont tendance à arrêter leur traitement dès l'amélioration des symptômes).

### Conjonctivites bactériennes

#### ► Conjonctivites à germes banaux

Elles sont souvent bilatérales, les sécrétions sont purulentes et les yeux très collés. Les germes en cause sont les staphylocoques, les streptocoques, les entérobactéries, le pyocyanique et *Haemophilus*.

- Nettoyage des sécrétions : sérum physiologique en unidoses.

- Collyre ou **pommade antibiotique** ; ex. : **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** 1 gte x 8/j pendant 48 h puis x 4/j pour une durée totale de 10 j.

NB : Un frottement conjonctival est réalisé en

cas de résistance au traitement dans le but d'adapter l'antibiothérapie.

#### ► Conjonctivites à *Chlamydiae*

Les *Chlamydiae* sont responsables du trachome à l'état endémique en Afrique du Nord, en Asie, et sont plus fréquemment en France les agents des conjonctivites à inclusions.

Le traitement antibiotique repose sur les **tétracyclines**.

Ex. : **oxytétracycline** à 1 % : **POSICYCLINE collyre** 1 gte x 6/j et **POSICYCLINE pommade** 1 à 3 applications/j surtout le soir ; **doxycycline (VIBRAMYCINE N)** 2 cp. à midi au cours du repas pendant 15 j.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX (1) – COLLYRES (1)

## Fluoroquinolones

## ■ Norfloxacin

<b>CHIBROXINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,76	I	65 %	0,75

## ■ Ofloxacin

<b>EXOCINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,64	I	65 %	0,73
<b>MONOXX</b>					
2 gttes/œil x 4/j	20 unidoses 0,5 mL 1,5 mg	3,87	I	65 %	0,19
<b>QUINOFREE</b>					
Idem <b>MONOXX</b>	20 unidoses 0,5 mL 1,5 mg	3,87	I	65 %	0,19

## ■ Ciprofloxacin

<b>CILOXAN</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL 0,3 % collyre	5,03	I	65 %	1,01

## CONJONCTIVITES (2)

### Conjonctivites virales

Ce sont les plus fréquentes des conjonctivites infectieuses.

Souvent, il existe une adénopathie prétragienne satellite.

#### ► Conjonctivites à adénovirus

Les *adénovirus* entraînent non seulement une conjonctivite, mais aussi une atteinte cornéenne : on parle donc de kératoconjonctivites épidémiques. Elles sont extrêmement contagieuses, en général bénignes, mais peuvent laisser des séquelles cornéennes (nodules sous-épithéliaux).

- Nettoyage des sécrétions : sérum physiologique en unidoses.

- Aucun traitement antiviral n'a réellement fait ses preuves contre l'adénovirus.

- Les **antibiotiques** ne font qu'éviter une surinfection bactérienne.

Ex. : **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** 1 gte x 8/j pendant 48 h puis x 4/j ± **RIFAMYCINE CHIBRET pommade** au coucher pour une durée totale de 10 j.

- **Cicatrisants cornéens** en cas d'atteinte épithéliale.

Ex. : cyanocobalamine à 0,05 % (**VITAMINE B12 ALLERGAN collyre**) 1 gte x 4/j + **rétinol (VITAMINE A DULCIS pommade OPH)** 1 application au coucher.

- Agents mouillants : **CELLUVISC unidoses** 1 dose x 6/j.

- Les **collyres corticoïdes** sont à éviter +++ : même s'ils font rapidement diminuer la rougeur oculaire, ils prolongent la réplication virale et donc la période conta-

gieuse. Ils peuvent être nécessaires de façon différée en cas de nodules sous-épithéliaux séquellaires.

L'usage des **collyres corticoïdes** doit être strictement réservé aux ophtalmologistes, qui seuls, peuvent examiner le patient à la lampe à fente et assurer le diagnostic et la surveillance du traitement. En cas d'erreur diagnostique avec une infection herpétique, leur prescription peut faire flamber une kératoconjonctivite à herpès +++.

#### ► Conjonctivites herpétiques

L'*herpès* est responsable de kératoconjonctivites par primo-infection ou récurrence herpétique. Il peut s'associer à des vésicules herpétiques sur les paupières.

- Stade débutant : atteinte épithéliale de forme caractéristique en feuille de fougère. Le traitement repose sur l'**aciclovir (ZOVIRAX pommade OPH)** : 1 application x 5/j jusqu'à 3 j après la cicatrisation ou **valaciclovir (ZELITREX)** 1 cp. x 3/j.

- Stade stromal : atteinte sévère avec opacification, œdème cornéen. Il se complique d'endothélite et d'uvéite antérieure. Le pronostic est plus sévère, le traitement plus fort et prolongé (**ZELITREX** 2 cp. x 3/j).

### Conjonctivites du nouveau-né et du nourrisson

La conjonctivite du 3<sup>e</sup> j après la naissance évoque le gonocoque ; à partir du 5<sup>e</sup> j, il s'agit plus souvent d'une conjonctivite à inclusions.

Chez le nourrisson, il faut penser à une imperforation des voies lacrymales.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX (2) – COLLYRES (2)

### Aminosides

#### ■ Tobramycine

<b>TOBREX</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,27	I	65 %	0,65
<b>TOBRABACT</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	2,42	I	65 %	0,48

#### ■ Néomycine + polymyxine B

<b>CÉBÉMYXINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	10 mL (fl.)	2,89	I	30 %	0,29

### Autres

#### ■ Rifamycine collyre

<b>RIFAMYCINE CHIBRET</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	10 mL (fl.)	3,27	I	65 %	0,33

#### ■ Acide fusidique

<b>FUCITHALMIC</b>					
1 gtte x 2/j	3 g (tube)	3,46	I	65 %	1,15

#### ■ Azithromycine

<b>AZYTER</b>					
1 gtte x 2/j	6 unidoses (15 mg/g)	6,00	I	65 %	1,00

#### ■ Céfuroxime sodique

<b>APROKAM</b>					
1 mg (0,1 mL) en 1 fois Voie intraoculaire Cataracte : traitement postopératoire	1 fl. pdre pour sol. inj. 50 mg <b>céfuroxime</b> base	HOP	I		
	10 fl. pdre pour sol. inj. 50 mg <b>céfuroxime</b> base	HOP	I		

### Association d'antibiotique et d'anti-inflammatoire

#### ■ Gentamicine + indométacine

<b>INDOBIOTIC</b>					
1 gtte x 4/j	5 mL (fl.)	3,81	I	65 %	0,76
	20 gttes 0,01 %	3,73	I	65 %	0,19

## CONJONCTIVITES (3)

### Conjonctivites allergiques

Très fréquentes, elles surviennent sur un terrain allergique (asthme, rhume des foins, urticaire, eczéma), récidivent le plus souvent au printemps (pollens).

On retrouve souvent un prurit. À l'examen, en plus de l'hyperhémie conjonctivale, il existe une hyperplasie papillaire (surélévation centrée par un vaisseau) ou folliculaire (surélévation bordée de vaisseaux) en retournant la paupière supérieure.

#### Prise en charge

- Elles nécessitent une éviction de l'allergène s'il est identifié, avec éventuellement désensibilisation générale.
- Bilan allergologique :
- consultation chez l'allergologue ;

– bilan sanguin : HES (hyperéosinophilie sanguine), IgE totales et spécifiques ;

– prick-tests ;

– exploration dans les larmes : HES, IgE.

• **Collyre antiallergique : cromoglycate de sodium (CROMABAK)** 1 gtte x 4/j pendant 1 mois.

• **Collyre corticoïde + antibiotique, hydrocortisone + colistine + bacitracine (BACICOLINE à la bacitracine)** 1 gtte x 4/j 10 j, puis x 2/j pendant 10 j, puis arrêt.

• **Antihistaminique H<sub>1</sub>** par voie générale à associer si les signes cliniques sont importants.

Ex. : **cétirizine (XYZALL)** 1 cp. le soir pendant 1 mois.

On distingue 5 formes de conjonctivites allergiques de mécanismes, formes cliniques et pronostic différents :

Conjonctivite allergique saisonnière : CAS	Par allergie aux pollens (graminées ou arbres), au printemps ; bon pronostic
Conjonctivite allergique perannuelle : CAP	Par allergie à des allergènes présents toute l'année (moisissures, poils d'animaux, acariens) ; bon pronostic
Kératoconjonctivite vernale	Enfant < 10 ans, atteinte coméenne ; le plus souvent, guérison à la puberté
Kératoconjonctivite atopique	Adulte entre 20 et 40 ans, atteinte coméenne parfois sévère +++ ; mauvais pronostic
Kératoconjonctivite géantopapillaire (KGC)	Porteurs de lentilles de contact ou de prothèses oculaires ; bon pronostic au retrait des lentilles de contact, ou sinon modification de l'adaptation ou du produit d'entretien

### Conjonctivites par sécheresse oculaire

Ce sont des conjonctivites chroniques bilatérales. Le diagnostic est fait par le test de Schirmer.

• Larmes artificielles (**UNILARM**) 1 gtte x 4 à 8/j au long cours.

• Agents mouillants à haute viscosité, **car-mellose sodique (CELLUVISC unidoses)** 1 gtte x 2 à 8/j.

**DACRYOCYSTITE AIGÜE**

Une dacryocystite aiguë est une infection aiguë fulminante du sac lacrymal, le plus souvent à staphylocoques, survenant en cas d'obstruction des voies lacrymales. L'infection progresse en quelques heures avec une distension majeure inflammatoire du sac lacrymal. Elle impose un traitement urgent car elle peut s'étendre rapidement et entraîner une cellulite orbitaire, voire une septicémie, surtout chez les nouveau-nés et les immunodéprimés. Les germes le plus souvent en cause sont les staphylocoques.

**Traitement**

- Hospitalisation en cas d'altération de l'état général (immunodéprimé, résistance au traitement médical bien conduit).
- Prélèvement des sécrétions pour exa-

men direct, culture et antibiogramme, hémocultures.

- **Antibiotiques locaux**

Ex. : rifamycine (**RIFAMYCINE CHIBRET collyre**)  
1 gtt x 4/j.

- **Antibiothérapie orale**

Ex. : amoxicilline + acide clavulanique (**AUGMENTIN**) : 1 g x 3/j pendant 10 j.

Si allergie : pristinamycine 500 mg (**PYOSTACINE**) : 2 cp. x 3/j pendant 15 j.

L'antibiothérapie est adaptée secondairement en fonction de l'évolution clinique et de l'antibiogramme.

- Drainage transcutané lorsque le sac lacrymal est très inflammatoire et distendu.
- À distance de l'épisode aigu, exploration des voies lacrymales, qui confirme l'obstruction, et dacryocystorhinostomie (cf. Obstruction des voies lacrymales).



## DÉCOLLEMENT DE RÉTINE (1)

### Définition - clinique

Le décollement de rétine (DR) est un clivage entre l'épithélium pigmentaire et la rétine neurosensorielle, souvent à partir d'une déchirure rétinienne. Cette déchirure est favorisée par la myopie, l'aphakie ou pseudophakie (œil sans cristallin après extraction de cataracte), les traumatismes oculaires. La déchirure se manifeste par la perception d'éclairs lumineux (phosphènes) qui doivent alerter et conduire rapidement à un examen ophtalmologique.

Un voile noir amputant le champ visuel, une baisse de l'acuité visuelle sont les signes de DR constitué.

### Traitement

#### Traitement curatif : uniquement chirurgical

Il doit être réalisé rapidement pour éviter l'extension du décollement et l'apparition de rétractions fibreuses du vitré (PVR : prolifération vitréo-rétinienne). Un patient atteint de DR doit être adressé rapidement à un chirurgien du segment postérieur et avoir un bilan préopératoire. Il doit rester au calme pour éviter l'extension du soulèvement. L'intervention chirurgicale doit être réalisée dans les 7 j, si la macula est encore à plat. Elle est réalisée sous anesthésie générale ou locale.

#### ► DR simple

La chirurgie par voie externe (sans pénétrer à l'intérieur de l'œil), sur la sclère est la plus couramment pratiquée. Elle vise deux buts :

- 1. Obturer la déchirure en réappliquant les deux feuillets de rétine décollés. Ceci est réalisé le plus souvent grâce à la pose d'une indentation sclérale : matériel synthétique suturé fortement à la sclère en regard de la déchirure qui plaque le feuil-

let rétinien externe contre le feuillet rétinien interne.

- 2. Créer une cicatrice solide entre les deux feuillets pour éviter les récides, par cryoapplication transclérale en regard de la déchirure (la brûlure par le froid entraîne une fibrose cicatricielle).

#### ► DR compliqué (prolifération vitréo-rétinienne)

On a recours à la chirurgie endoculaire, très sophistiquée (véritable coelioscopie de l'œil), qui comporte une vitrectomie, et selon les cas, dissection de PVR, endolaser, injection de perfluorocarbonate liquide, de silicone, d'air ou de gaz servant à assurer un tamponnement interne de la rétine décollée.


#### Traitement préventif : photocoagulation au laser des lésions favorisant avant le stade du décollement

Lorsque le patient est vu au stade de déchirure sans décollement, on peut entourer la déchirure par photocoagulation au laser permettant ainsi d'arrêter l'évolution vers le décollement de rétine. D'où l'intérêt de l'examen systématique des sujets à risque (myope, aphake, DR controlatéral, œil traumatisé, antécédent familial de DR) une fois/an, à la recherche de déchirures rétinienne qu'il faut traiter rapidement au laser.

### Résultats

La réapplication de la rétine est obtenue dans 90 % des cas. Le liquide sous-rétinien disparaît en quelques jours après l'intervention.

Le résultat fonctionnel, c'est-à-dire la récupération visuelle, est retardé par rapport au résultat anatomique. Lorsque la macula a été soulevée, plusieurs semaines sont nécessaires avant de pouvoir évaluer l'acuité visuelle.

**DÉCOLLEMENT DE RÉTINE (2)**

Technique de chirurgie extra-oculaire : indentation par une éponge suturée à la sclère en regard de la déchirure. Le liquide sous-rétinien se résorbe dans les 24 heures après l'obturation de la déchirure.

## DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (1)

### Définition - épidémiologie

Véritable problème de santé publique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est actuellement la principale cause de baisse de vision après 65 ans dans les pays développés. Cette dégénérescence maculaire correspond au vieillissement de la région centrale de la rétine (macula). Rappelons que la macula assure la vision précise, la lecture, la reconnaissance des couleurs. L'avènement récent des **injections intravitréennes d'anticorps anti-VEGF** a bouleversé la prise en charge et le pronostic des DMLA.

### Classification

- Forme débutante = MLA (maculopathie liée à l'âge) : asymptomatique avec signes précurseurs visibles à l'examen du fond d'œil : drusens, migrations pigmentaires, altérations localisées de l'épithélium pigmentaire.
- Formes avérées = DMLA. On distingue deux types :

- forme atrophique (ou sèche) : 20 % des cas. Elle se caractérise par une atrophie progressive de la rétine centrale. Elle est inaccessible à tout traitement ;
- forme exsudative ou néovasculaire (ou humide). Elle est due au développement de néovaisseaux choroïdiens sous la rétine centrale.


La forme néovasculaire est la seule accessible au traitement.

### Clinique

Les premiers signes fonctionnels sont :

- pour la forme atrophique : difficultés à la lecture, besoin de plus d'éclairage ;
- pour la forme néovasculaire : la perception de métamorphopsies (vision de lignes déformées - ondulées, cf. Grille d'Amsler). Puis apparaissent dans les deux formes un scotome central et une baisse de la vision centrale.

Grille d'Amsler



### Diagnostic

- L'examen du fond d'œil met en évidence des drusens, des altérations de l'épithélium pigmentaire maculaire, des zones d'atrophie rétinienne. En cas de forme néovasculaire, on observe la triade : hémorragie, exsudats, décollement séreux rétinien.
- La tomographie en cohérence optique (OCT) analyse l'architecture rétinienne.
- L'angiographie en fluoresceïne permet de distinguer les formes atrophiques des formes néovasculaires. Dans ce dernier

cas, elle met en évidence la présence de néovaisseaux choroïdiens, aux parois anormalement perméables qui laissent diffuser le colorant. On distingue deux grands types de néovaisseaux choroïdiens :

- les néovaisseaux choroïdiens sous-épithéliaux ou occultes (85 %) ;
- les néovaisseaux choroïdiens pré-épithéliaux ou visibles (15 %).
- Dans certains cas, une angiographie au vert d'indocyanine précise la nature des lésions.

# MOLECULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (1) – PAR VOIE INTRAVITRÉENNE (1)

## ■ Ranibizumab

LUCENTIS					
1 IVT de 0,5 mg tous les mois	1 sol. inj. 10 mg	895,57	I	100 %	895,57

## ■ Pégaptanib

MACUGEN					
1 IVT de 0,3 mg toutes les 6 sem.	1 sol. inj. 0,3 mg	744,59	I	100 %	744,59

## PROPRIÉTÉS

Le VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*) joue un rôle majeur dans le développement des néovaisseaux choroïdiens. Il se lie aux cellules endothéliales pour stimuler l'angiogenèse et augmenter la perméabilité vasculaire.

Le **pégaptanib (MACUGEN)** se lie spécifiquement au VEGF, et empêche ainsi sa fixation sur les récepteurs endothéliaux : il inhibe la croissance des néovaisseaux anormaux, mais empêche aussi la diffusion des néovaisseaux au sein de la rétine.

Le **ranibizumab (LUCENTIS)** est un fragment d'anticorps spécifique du VEGF, auquel il se lie pour bloquer son action et ainsi inhiber l'angiogenèse.

## INDICATIONS

- Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
- Baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique.
- Baisse visuelle due à l'œdème maculaire lié à une occlusion de la veine centrale de la rétine ou de branche veineuse rétinienne.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Flacons à usage unique réservé à la voie intravitréenne.

**LUCENTIS** et **MACUGEN** doivent être administrés par un ophtalmologiste qualifié ayant l'expérience des injections intravitréennes.

La dose recommandée de **LUCENTIS** est de 0,5 mg (0,05 mL). Le traitement commence par une phase d'induction avec 1 inj./mois pendant 3 mois consécutifs, suivie d'une phase de maintien au cours de laquelle l'acuité visuelle des patients sera contrôlée une fois/mois.

La dose recommandée de **MACUGEN** est de 0,3 mg. Il doit être administré toutes les 6 sem. (9 inj./an) par injection intravitréenne dans l'œil atteint.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Administrer par voie intravitréenne stricte.

Des techniques d'injection aseptiques appropriées doivent toujours être utilisées lors de l'administration de **LUCENTIS** +++++ :

– Avant le traitement, le patient doit être informé qu'il doit s'auto-administrer un collyre antibactérien (x 4/j) pendant 3 j avant et après chaque injection).

– La procédure d'injection doit être réalisée en conditions d'asepsie, incluant la désinfection chirurgicale des mains, le port de gants stériles, l'utilisation d'un champ stérile et d'un spéculum à paupières stérile.

– La peau autour de l'œil, la paupière et la surface oculaire doivent être désinfectées et une anesthésie appropriée et un antibactérien local à large spectre doivent être administrés avant l'injection.

– L'aiguille pour injection doit être introduite 3,5-4,0 mm en arrière du limbe dans la cavité vitrée, en évitant le méridien horizontal et en visant le milieu du globe oculaire. Le volume de 0,05 mL peut alors être injecté ; un point d'injection scléral différent doit être utilisé lors des injections ultérieures.

Surveillance des patients au cours de la semaine suivant l'injection pour permettre un traitement précoce en cas d'infection. Ils doivent être informés que tout symptôme évocateur d'une ophtalmie ou de l'un des événements mentionnés ci-dessous doit être signalé sans délai.

Surveillance ophtalmologique x 1/mois pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : céphalées, hémorragie conjonctivale, douleur oculaire, corps flottant du vitré, hémorragie rétinienne, augmentation de la pression intraoculaire.

Endophtalmies.

Inflammation intraoculaires.

Décollement rhéomatogène de la rétine, déchirures de la rétine liés à la procédure d'injection. Cataractes traumatiques iatrogènes, etc.

## DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (2)

### Traitements [1] - uniquement pour la forme néovasculaire

#### Mesures hygiénodietétiques

- Arrêt du tabac +++ ; dépistage des facteurs de risque cardiovasculaires.
- Alimentation riche en fruits, légumes verts, poissons gras, noix.
- Compléments alimentaires :
  - antioxydants ;
  - acides gras de type oméga-3 ;
  - lutéine.
- Activité physique régulière.

#### Injections intravitréennes d'anti-VEGF

##### ► Indications et posologie

Ce type de traitement a révolutionné la prise en charge et le pronostic des DMLA. Dès que le diagnostic de DMLA exsudative rétrofovolaire est posé, il est recommandé d'instaurer, le plus précocement possible, un traitement par **anti-VEGF**, quel que soit le niveau d'acuité visuelle initial. Les **anticorps anti-VEGF injectés par voie intravitréenne** (par ex. **ranibizumab**, **LUCENTIS**) ont des propriétés antiangiogéniques. Elles agissent en bloquant la néovascularisation et la perméabilité des néovaisseaux. Les phénomènes exsudatifs régressent et les gains d'acuité visuelle deviennent une réalité : à 2 ans, on observe 90 % de stabilisation et 30 % d'amélioration.

En pratique, le traitement est initié par une phase d'induction, suivie d'une phase de maintien :

- phase d'induction, le plus précocement possible : 1 inj. de 0,5 mg (0,05 mL) de **LUCENTIS** par mois pendant 3 mois consécutifs ;
- phase de maintien : le rythme d'injection est adapté à la situation ophtalmologique du patient : il est indispensable de **réexaminer le patient chaque mois**, afin de le retraiter dès l'apparition d'une récurrence (l'effet du produit est transitoire).

En moyenne, un patient recevra 5 à 6 injections intravitréennes la première année.

##### ► Critères d'arrêt du traitement

*Suspension temporairement du traitement par un anti-VEGF*

Il n'y a plus de signes d'activité de la lésion néovasculaire. La lésion est considérée comme inactive si :

- absence de diffusion sur l'angiographie à la fluorescéine ou autre signe d'activité de la maladie ;
- absence d'augmentation de la taille de la lésion ;
- absence de nouvelle hémorragie ;
- absence d'exsudats ;
- absence de réapparition ou d'aggravation de signes d'activité néovasculaire en tomographie par cohérence optique ;
- absence de nouvelle augmentation de taille de la lésion ou de nouveaux signes d'activité de la maladie depuis une interruption récente de traitement ;
- absence de baisse d'acuité visuelle attribuable à l'activité néovasculaire ;
- effets indésirables du traitement.

En l'absence de ces critères, la poursuite du traitement peut être envisagée en cas de récurrences antérieures lors de la suspension du traitement.

##### *Arrêt définitif du traitement anti-VEGF*

- Réaction d'hypersensibilité suspectée ou établie : changer d'**anti-VEGF** ou à défaut photothérapie dynamique.
- Meilleure acuité visuelle corrigée inférieure à 15 lettres sur l'échelle ETDRS dans l'œil traité lors de deux visites consécutives, attribuable à la DMLA.
- Diminution de l'acuité visuelle de 30 lettres ou plus comparée à l'acuité visuelle de base et/ou à la meilleure acuité notée depuis le départ (en l'absence d'hématome sous-rétinien, de déchirure de l'épithélium pigmentaire) car cela peut traduire une inefficacité du traitement et/ou un effet indésirable.
- Signes de détérioration morphologique de la lésion malgré un traitement optimal : augmentation progressive de la taille de la lésion en angiographie à la fluorescéine, aggravation des signes d'activité en tomographie en cohérence optique.

## MOLECULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (2) – PAR VOIE INTRAVITRÉENNE (2)

### ■ Aflibercept

EYLÉA					
Injection intravitréenne 2 mg x 1/mois pendant 3 mois puis 20 mg tous les 2 mois.	100 µL (fl.) 40 mg/mL	810,12	I	100 %	8,10

#### PROPRIÉTÉS

Protéine de fusion recombinante qui se lie au VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*), inhibant la liaison à ses récepteurs à la surface des cellules endothéliales.

#### INDICATIONS

Traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**aflibercept** ou à l'un des excipients.  
Inflammation ou infection oculaire/périoculaire, avérée ou suspectée.  
Sujet à risque de décollement rétinien.

Trous maculaires de stades 3 et 4.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Glaucome, rétinopathie : utiliser avec prudence, surveillance ophtalmologique.  
Interruption de traitement pendant les 28 j précédant ou suivant une chirurgie intraoculaire.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Endophtalmie liée à l'injection intravitréenne.  
Élévation de la pression intraoculaire.  
Immunogénicité : inflammation, photophobie, douleur.  
Hémorragie intraoculaire.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune étude réalisée. Prudence.

**DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (3)****Photothérapie dynamique**

Elle est supplantée par les **injections intravitréennes d'anti-VEGF**. La photothérapie dynamique ne permet qu'exceptionnellement une amélioration de l'acuité visuelle. On l'utilise en cas de contre-indication ou de non-réponse aux anti-VEGF. Le principe est d'injecter par voie intraveineuse un colorant (la **vertéporphine**) qui sensibilise l'endothélium des lésions néovasculaires. Ce colorant est ensuite activé par un laser non thermique pour obtenir l'occlusion des lésions.

**Photocoagulation au laser**

La photocoagulation au laser a perdu de son intérêt et est réservée aux néovascularisations choroïdiennes extrafovéolaires (à distance du centre de la fovéola) : le traitement consiste à envoyer un rayon

lumineux de haute énergie, qui traverse l'œil du patient de façon à détruire les néovaisseaux sous-rétiniens avant qu'ils n'aient détruit toute la rétine. Les récurrences sont fréquentes.

**Photocoagulation périfovéolaire**

Elle est réservée aux lésions évoluées, de grande taille, avec une acuité visuelle  $< 1/10$ .

Elle permet d'effectuer un barrage efficace à l'extension des lésions, et donc de limiter la taille du scotome perçu par le patient.

**Chirurgie**

Elle est aujourd'hui réservée à l'évacuation d'un hématoème sous-rétinien maculaire et doit être réalisée très rapidement : dans les 7 j qui suivent la survenue de l'hématoème.

## MOLÉCULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (3) – PAR VOIE INTRAVEINEUSE

### ■ Vertéporfine

<b>VISUDYNE</b>					
1 <sup>re</sup> étape : perfusion IV pdt 10 min, à la dose de 6 mg/m <sup>2</sup> de surface corporelle, diluée dans 30 mL de solution pour perfusion	15 mg (fl.)	1209,96	I	100 %	80,66
2 <sup>e</sup> étape, 15 min après le début de la perfusion : activation de <b>VISUDYNE</b> par une lumière rouge non thermique (laser diode) pendant 83 s					

**VISUDYNE** ne doit être utilisée que par des ophtalmologistes expérimentés dans la prise en charge des patients ayant une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou une myopie forte.

### PROPRIÉTÉS

La thérapie photodynamique (PDT) utilise l'énergie lumineuse pour activer un photosensibilisant en présence d'oxygène.

La première étape consiste en l'injection IV d'un photosensibilisant, la **vertéporfine (VISUDYNE)**, qui se fixe dans les néovaisseaux choroïdiens.

La seconde étape consiste en l'activation de ce photosensibilisant par une lumière du proche infrarouge, peu intense, ce qui libère des radicaux libres dont la concentration prédomine au niveau de la paroi des néovaisseaux choroïdiens, provoquant une lésion de la paroi et des phénomènes de thromboses.

L'intérêt de cette technique repose sur la sélectivité du traitement des néovaisseaux sans lésion de la rétine sus-jacente.

### INDICATIONS

Dégénérescence maculaire liée à l'âge avec :

- une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire à prédominance visible ;
- une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire occulte montrant des signes d'évolution récente ou en cours de la maladie.

Néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire due à la myopie forte.

### CONTRE-INDICATIONS

Porphyrie.

Hypersensibilité connue à la **vertéporfine** ou à l'un des excipients.

Insuffisance hépatique grave.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les patients traités par **VISUDYNE** restent photosensibles pendant les 48 h qui suivent la perfusion +++. Pendant cette période, ils ne doivent pas s'exposer au soleil, ni aller chez le coiffeur, éviter les lampes halogènes de forte

intensité ou les lampes scialytiques puissantes des blocs opératoires ou des cabinets dentaires. Protection par des vêtements à manches longues, et des lunettes de soleil spéciales haute protection qui leur sont remises à l'issue de la séance. Les écrans solaires UV ne sont pas efficaces contre les réactions de photosensibilisation. La lumière intérieure ambiante est sans danger.

L'extravasation de **VISUDYNE** peut provoquer de vives douleurs, une inflammation, un œdème, la formation de vésicules ou un changement de coloration au site d'injection, en particulier si la zone affectée est exposée à la lumière. En cas d'extravasation, la perfusion doit être interrompue immédiatement.

Surveillance médicale étroite pendant la perfusion.

### EFFETS INDÉSIRABLES

- Oculaires, fréquents (1 à 10 %) : vision anormale telle que vision trouble, floue, brouillée ou flashes lumineux, diminution de l'acuité visuelle, altérations du champ visuel telles que halos gris ou noirs, scotomes et taches noirs.
- Au point d'injection, fréquents (1 à 10 %) : douleur, œdème, inflammation, extravasation.
- Systémiques : douleur liée à la perfusion principalement au niveau des lombaires, nausées, réaction de photosensibilisation, asthénie et hypercholestérolémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**VISUDYNE** précipite en solution saline : ne pas utiliser de sérum physiologique ou d'autres solutions injectables.

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments, à l'exception de ceux mentionnés en modalités de manipulation.



**DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (4)****Rééducation basse vision pour les formes évoluées**

Elle comprend l'ensemble des techniques permettant d'aider un patient mal voyant à mieux utiliser sa vision fonctionnelle résiduelle. Elle progresse grâce à la collaboration entre ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens (aides optiques, éclairages adaptés), intervenants en activité de la vie journalière, psychologues.

**Surveillance**

- Autosurveillance du patient avec la grille d'Amsler.
- Une surveillance rapprochée chez l'ophtalmologiste (acuité visuelle, fond d'œil, OCT, angiographie rétinienne) est indispensable pour le traitement précoce des récurrences fréquentes.

Le nombre de patients atteints de DMLA augmente. Les efforts de recherche thérapeutique se poursuivent tels que transplantation chirurgicale d'épithélium pigmentaire, tentatives de prothèses rétinienne, études génétiques.

**Quelques adresses utiles**

- Retina France, Association française Retinitis Pigmentosa - 16, av. de Naurouze, BP 62, 31771 Colomiers Cedex (tél. : 05 61 30 20 50).
- Association Valentin Haüy - 5, rue Duroc, 75007 Paris (tél. 01 47 34 07 90).
- APAM (Association des personnes aveugles et malvoyantes) - 3, rue Jacquier, 75014 Paris.
- ARAMAV - Chemin du Belvédère, 30000 Nîmes.
- Institut national des invalides - 6, bd des Invalides, 75007 Paris.
- Société des infirmières françaises en ophtalmologie (ISIFO) (présidente : Mme Conogan) - service d'ophtalmologie, Centre hospitalier universitaire, 5, av. Foch, 29285 Brest Cedex.
- Fédération nationale des associations des parents d'enfants déficients visuels - 28, place Saint-Georges, 75009 Paris (tél. : 01 45 26 73 45).
- Fondation pour la réadaptation des déficients visuels - BP 407, 75122 Paris Cedex 03 (tél. : 01 43 87 04 11).
- Éditions corps 16 (fournisseur de livres avec des caractères de grosse taille, spéciaux pour les déficients visuels) - 12, rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005 Paris (tél. : 01 46 33 05 11).
- Association DMLA, service d'ophtalmologie - Hôpital intercommunal de Créteil- 40, avenue de Verdun, 94010 Créteil (tél. : 01 41 78 40 12), [assodmla@chicreteil.fr](mailto:assodmla@chicreteil.fr).

**CONSENSUS**

[1] Dégénérescence maculaire liée à l'âge : prise en charge diagnostique et thérapeutique, HAS, 2012

## ECTROPION

### Définition

C'est une éversion de la paupière, le plus souvent inférieure, son bord libre perdant le contact avec le globe oculaire. On distingue l'ectropion atonique du vieillard (par relâchement des tissus), l'ectro-

pion paralytique (paralysie faciale), les ectropions cicatriciels (plaies, brûlures). Il entraîne un larmolement gênant ; il peut se compliquer d'ulcère de la cornée.

### Traitement

Il est chirurgical : il consiste à suspendre ou retendre la paupière mal positionnée.

## ENTROPION

### Définition

C'est le retournement en dedans du bord libre de la paupière. Il est responsable du frottement des cils sur la cornée avec un risque de kératite.

Il peut être congénital, spasmodique, sénile, ou cicatriciel.

### Traitement

Il est chirurgical.

## ORGELET

### Définition

C'est un furoncle centré sur le bulbe pileux d'un cil, isolé ou associé à une blépharite. Il peut s'abcéder avec œdème palpébral puis régional. Il est le plus souvent dû au staphylocoque.

### Traitement

Pommade antibiotique active sur le staphylocoque telle **rifamycine (RIFAMYCINE)** 1 appl. x 3/j sur la lésion.

Parfois, l'incision est nécessaire pour évacuer le pus.

Il faut proscrire toute manipulation intempestive sous peine de voir apparaître la redoutable staphylococcie maligne de la face.

S'il existe un œdème facial, antibiothérapie générale : **pristinamycine (PYOSTACINE)** 500 mg : 2 cp. x 2 à 3/j pendant 15 j. En cas de récidives, il faut rechercher un diabète.

## ECTROPION

### Définition

C'est une éversion de la paupière, le plus souvent inférieure, son bord libre perdant le contact avec le globe oculaire. On distingue l'ectropion atonique du vieillard (par relâchement des tissus), l'ectro-

pion paralytique (paralysie faciale), les ectropions cicatriciels (plaies, brûlures). Il entraîne un larmolement gênant ; il peut se compliquer d'ulcère de la cornée.

### Traitement

Il est chirurgical : il consiste à suspendre ou retendre la paupière mal positionnée.

## ENTROPION

### Définition

C'est le retournement en dedans du bord libre de la paupière. Il est responsable du frottement des cils sur la cornée avec un risque de kératite.

Il peut être congénital, spasmodique, sénile, ou cicatriciel.

### Traitement

Il est chirurgical.

## ORGELET

### Définition

C'est un furoncle centré sur le bulbe pileux d'un cil, isolé ou associé à une blépharite. Il peut s'abcéder avec œdème palpébral puis régional. Il est le plus souvent dû au staphylocoque.

### Traitement

Pommade antibiotique active sur le staphylocoque telle **rifamycine (RIFAMYCINE)** 1 appl. x 3/j sur la lésion.

Parfois, l'incision est nécessaire pour évacuer le pus.

Il faut proscrire toute manipulation intempestive sous peine de voir apparaître la redoutable staphylococcie maligne de la face.

S'il existe un œdème facial, antibiothérapie générale : **pristinamycine (PYOSTACINE)** 500 mg : 2 cp. x 2 à 3/j pendant 15 j. En cas de récidives, il faut rechercher un diabète.

## ECTROPION

### Définition

C'est une éversion de la paupière, le plus souvent inférieure, son bord libre perdant le contact avec le globe oculaire. On distingue l'ectropion atonique du vieillard (par relâchement des tissus), l'ectro-

pion paralytique (paralysie faciale), les ectropions cicatriciels (plaies, brûlures). Il entraîne un larmolement gênant ; il peut se compliquer d'ulcère de la cornée.

### Traitement

Il est chirurgical : il consiste à suspendre ou retendre la paupière mal positionnée.

## ENTROPION

### Définition

C'est le retournement en dedans du bord libre de la paupière. Il est responsable du frottement des cils sur la cornée avec un risque de kératite.

Il peut être congénital, spasmodique, sénile, ou cicatriciel.

### Traitement

Il est chirurgical.

## ORGELET

### Définition

C'est un furoncle centré sur le bulbe pileux d'un cil, isolé ou associé à une blépharite. Il peut s'abcéder avec œdème palpébral puis régional. Il est le plus souvent dû au staphylocoque.

### Traitement

Pommade antibiotique active sur le staphylocoque telle **rifamycine (RIFAMYCINE)** 1 appl. x 3/j sur la lésion.

Parfois, l'incision est nécessaire pour évacuer le pus.

Il faut proscrire toute manipulation intempestive sous peine de voir apparaître la redoutable staphylococcie maligne de la face.

S'il existe un œdème facial, antibiothérapie générale : **pristinamycine (PYOSTACINE)** 500 mg : 2 cp. x 2 à 3/j pendant 15 j. En cas de récidives, il faut rechercher un diabète.

## OBSTRUCTION DES VOIES LACRYMALES

### Rappel anatomoclinique

Les voies lacrymales sont formées des méats lacrymaux, des canalicules lacrymaux, du sac lacrymal, et du conduit lacrymo-nasal qui s'ouvre dans les fosses nasales au niveau du cornet inférieur. L'obstruction des voies lacrymales se produit le plus souvent au niveau de la partie distale du conduit lacrymo-nasal. Celle-ci se manifeste par un larmolement par stase des larmes, avec un risque d'infection de la conjonctive ou du sac lacrymal (dacryocystite aiguë).

### Affections congénitales

Les obstructions congénitales du conduit lacrymo-nasal concernent 5 % des nouveau-nés. Le plus souvent, ce conduit s'ouvre spontanément dans les 6 premiers mois de vie.

Ces enfants présentent un larmolement permanent, souvent compliqué de conjonctivite, de mucocèle du sac lacrymal, de dacryocystite aiguë.

#### Moyens thérapeutiques :

- Massages du sac lacrymal par compression du haut vers le bas x 3-4/j.
- **Antibiotiques locaux** en cas de surinfection conjonctivale.

Ex. : rifamycine (**RIFAMYCINE CHIBRET collyre**) x 4/j pendant 15 j.

- Sondage des voies lacrymales à réaliser de préférence sous anesthésie générale légère (réalisable sans anesthésie dans le cabinet de consultation lorsque l'enfant est jeune mais risque de spasme laryngé réflexe).


- Sondage des voies lacrymales d'emblée sous anesthésie générale suivi par la mise en place d'une intubation canaliculo-nasale en silicone, permettant d'éviter la fermeture des voies lacrymales pendant la cicatrisation, à laisser en place 6-12 sem. (enfants > 12-15 mois).

### Affections acquises

La cause la plus fréquente est une inflammation chronique des muqueuses à l'intérieur du conduit qui entraîne une fibrose.

#### Moyens thérapeutiques :

En cas d'obstruction de l'extrémité inférieure du conduit lacrymo-nasal, le traitement de choix est la dacryocystorhinostomie : cette technique anastomose le sac lacrymal avec la muqueuse nasale après fracture de l'os situé entre les 2 muqueuses. Comme chez l'enfant, une sonde en silicone peut être passée à travers l'orifice afin de prévenir la fermeture lors de la cicatrisation.



## GLAUCOMES (1)

Le terme glaucome regroupe plusieurs affections oculaires dont les manifestations cliniques sont très diverses mais dans lesquelles sont associés 3 signes principaux :

- élévation de la pression intraoculaire ;
- altérations du champ visuel ;
- anomalies de la papille optique.

### **Glaucome aigu par fermeture de l'angle (GAFA) : urgence médicale**

#### **Clinique**

Le glaucome aigu est une urgence majeure en ophtalmologie.

La crise de glaucome aigu réalise un tableau bruyant. Son diagnostic doit être fait sur quelques symptômes faciles à reconnaître et doit conduire à un traitement dont la précocité seule évitera la perte complète et définitive de l'œil.

Devant un œil rouge avec cercle périkératique, associé à des douleurs oculaires et péri-oculaires, une baisse d'acuité visuelle, une pupille en semi-mydriase aréflexique, souvent des nausées et des vomissements et un œil dur comme une bille de bois à la palpation, le diagnostic de glaucome aigu doit être absolument suspecté de façon à adresser le patient de toute urgence en unité de soins ophtalmologiques.

L'évolution non traitée de cette crise conduit rapidement à la cécité par atrophie optique.

Trop de crises de glaucome aigu sont encore étiquetées conjonctivites sans examen ophtalmologique ; lorsque le diagnostic est enfin fait quelques jours plus tard, le pronostic fonctionnel est catastrophique !

#### **Traitement**

- Hospitalisation en urgence en milieu ophtalmologique.
- Pose d'une voie veineuse et bilan biologique (ionogramme, glycémie, créatininémie) qui ne doit pas retarder la mise en route du traitement général.

##### ► *Traitement général*

Il repose sur les antiglaucomateux par voie générale :

- **Acétazolamide (DIAMOX)** : injection de 1 amp. de 500 mg en IV lente (5 min) puis relais par 1 cp. à 250 mg x 3/j + **DIFFU-K**, 1 gél. x 3/j.
- **MANNITOL** : une perfusion de 250 mL en 30 min.

##### ► *Traitement local*

- Dans l'œil atteint :
  - instillation de collyres myotiques : **ISOPTO-PILOCARPINE** dès que la tension oculaire a diminué de moitié, à raison d'une goutte par quart d'heure jusqu'à obtention du myosis, puis une goutte x 3/j ;
  - iridotomie au laser Yag ou iridectomie chirurgicale dans les 24 h dès que la cornée s'est éclaircie.
- Dans l'œil adelphe :
  - collyres myotiques d'emblée : **ISOPTO-PILOCARPINE** : 1 gte x 3/j ;
  - iridotomie au laser Yag.

## ANTI GLAUCOMATEUX PAR VOIE GÉNÉRALE

## ■ Acétazolamide

<b>DIAMOX</b>					
A. : 1/4 à 1 cp. x 3/j	24 cp. 250 mg	5,22	I	65 %	0,22
E. : 5 à 10 mg/kg/j en 3 prises					
A. : 1 à 2 g/j en IVL	1 fl. (500 mg) IV	15,18	I	65 %	0,16
E. : 5 à 10 mg/kg/j en IVL					

**PROPRIÉTÉS**

Hypotonisant oculaire : il diminue la formation d'humeur aqueuse en inhibant l'anhydrase carbonique au niveau du corps ciliaire.

Au niveau du tubule rénal, augmentation de l'élimination urinaire de sodium, de potassium, et de bicarbonates.

**INDICATIONS**

- Les formes injectables sont utilisées dans la crise aiguë de glaucome par fermeture de l'angle en traitement d'attaque ; ce n'est qu'après 30 min qu'on débute le traitement par les collyres myotiques (**ISOPTO-PILOCARPINE**).
- Le **DIAMOX** en comprimés est prescrit :
  - dans la crise de GAFA en relais au **DIAMOX** IV ;
  - dans le glaucome chronique, en cas d'hypertonie oculaire non équilibrée par les **collyres anti glaucomeux**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Antécédents de colique néphrétique, hypokaliémie non contrôlée.

## ■ Mannitol

<b>MANNITOL MACOPHARMA</b>					
Crise de GAFA chez l'adulte : 250 mL en 30 min	250 mL 10 % (fl.)	HOP			
A. : 500 mL/j	500 mL 10 % (fl.)	HOP			
	250 mL 20 % (fl.)	HOP			
	500 mL 20 % (fl.)	HOP			
	1 L 20 % (fl.)	HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Solution hypertonique entraînant une déshydratation du vitré par effet osmotique, diminuant ainsi la pression intraoculaire.

**INDICATIONS**

Hypertension intraoculaire.

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

Insuffisance surrénale grave.

**Grossesse** : effet tératogène chez l'animal.

**Allaitement** : passage dans le lait maternel ; aucun effet nocif rapporté chez le nourrisson.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prévenir l'hypokaliémie, en prescrivant systématiquement du potassium (**DIFFU-K**).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypokaliémie, hyperuricémie, lithiase rénale.

Asthénie, somnolence, troubles gastro-intestinaux, dysesthésies.

Éruptions cutanées, troubles hématologiques (thrombopénie, agranulocytose) par hypersensibilité aux **sulfamides**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation du risque d'hypokaliémie en cas d'association aux **digitaliques**, **corticoïdes**, **diurétiques** (thiazidiques et de l'anse).

En cas d'hypokaliémie, l'association à certains **antiarythmiques** (classe Ia, classe III) expose aux risques de torsades de pointe.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperosmolarité plasmatique préexistante, déshydratation intracellulaire, insuffisance cardiaque.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il est nécessaire de réchauffer le flacon au bain-marie jusqu'à dissolution des cristaux.

La solution étant hypertonique, perfuser à vitesse lente et régulière.

## GLAUCOMES (2)

### Glaucome chronique à angle ouvert

#### Évolution insidieuse sans signe fonctionnel

La gravité du glaucome chronique à angle ouvert (GCAO) vient avant tout de son insidiosité : le GCAO reste très longtemps asymptomatique. D'où l'intérêt du dépistage de l'hypertonie oculaire par la prise de tension oculaire (TO) systématique au cours de l'examen ophtalmologique (TO normale : < 21 mmHg). Lorsque des années plus tard, les premiers signes sont ressentis par le patient, les dégâts sur le nerf optique sont irréversibles.

En l'absence de traitement, l'hypertonie oculaire chronique conduit en quelques années à la cécité par destruction progressive de la papille optique, et altération du champ visuel.

Le traitement du GCAO est un traitement à vie ; il ne doit jamais être interrompu. La surveillance ophtalmologique se fait sur la pression intraoculaire, l'aspect de la papille et le champ visuel.

#### Traitement en première intention

On utilise des collyres hypotonisants

± associés entre eux, voire du **DIAMOX** per os.

#### ► Collyres hypotonisants

Caractéristique	Mécanisme d'action	Baisse de la pression intraoculaire	Posologie
<b>Analogues des prostaglandines</b> <b>latanoprost (XALATAN)</b>	Augmentation de la résorption de l'humeur aqueuse	25-30 %	1 gtte le soir
<b>β-bloquants</b> <b>timolol (TIMOPTOL)</b>	Diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse	20-25 %	1 gtte x 2/j <b>TIMOPTOL LP</b> : 1 gtte/j
<b>Agonistes α-adrénergiques sélectifs</b> <b>brimonidine (ALPHAGAN)</b>	Diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse	20-25 %	1 gtte x 2/j
<b>Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique</b> <b>dorzolamide (TRUSOPT)</b>	Diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse	15-20 %	1 gtte x 2 à 3/j
<b>Parasympathomimétiques : pilocarpine (ISOPTO-PILOCARPINE)*</b>	Augmentation de la résorption de l'humeur aqueuse	20-25 %	1 gtte x 3/j

Collyres en association :

- **COSOPT** : timolol + dorzolamide.
- **XALACOM** : latanoprost + timolol.

- **DUOTRAV** : timolol + travoprost.
- **GANFORT** : timolol + bimatoprost.
- **COMBIGAN** : timolol + brimonidine.

\* Peu utilisé



## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (1) – PARASYMPATHOMIMÉTIQUE (MYOTIQUE)

### ■ Pilocarpine

<b>ISOPTO-PILOCARPINE</b>					
1 gtte x 3/j	10 mL 0,5 % (fl.)	2,46		65 %	0,25
	10 mL 1 % (fl.)	2,46		65 %	0,25
	10 mL 2 % (fl.)	2,46		65 %	0,25

#### PROPRIÉTÉS

En entraînant un myosis qui tire sur les mailles du trabéculum, ils facilitent l'écoulement de l'humeur aqueuse.

#### INDICATIONS

Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle (GAFA) et glaucome chronique.

#### CONTRE-INDICATIONS

Uvéites antérieures (iritis, iridocyclite) dans lesquelles la pupille doit rester dilatée.  
Allergie à la **pilocarpine**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour la crise de GAFA, les **myotiques** doivent être donnés au moins 30 min après le début

des traitements hypotonisants, par voie générale (**MANNITOL**, **DIAMOX**) et dans les 2 yeux. Chez les myopes, n'utiliser les **myotiques** qu'après vérification de la périphérie rétinienne (ils peuvent entraîner un décollement de rétine).

Risque de gêne visuelle chez les utilisateurs de machine.

Lentilles de contact à éviter en raison du risque d'adsorption du conservateur sur les lentilles

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Myosis qui peut gêner la vision des patients, modification possible du champ visuel.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Possibilité de potentialisation des curarisants (prévenir l'anesthésiste).

## GLAUCOMES (3)

### ► Traitement hypotonisant oral

**Acétazolamide (DIAMOX)** cp. à 250 mg : 1/4 à 1 cp. x 3/j.

### En cas de traitement médical insuffisant

#### ► Laser

On peut réaliser un traitement au laser (trabéculorétraction) : application d'impacts laser sur le corps ciliaire pour augmenter l'écoulement de l'humeur aqueuse.

#### ► Chirurgie : sclérectomie ou trabéculotomie

Ces interventions consistent à réaliser une fistulisation entre le corps ciliaire et les espaces sous-conjonctivaux. Elles peuvent au besoin être répétées.

#### ► Cyclodestruction du corps ciliaire

Cette intervention **de dernier recours** est indiquée dans les glaucomes très évolués. Elle vise à détruire le corps ciliaire qui produit l'humeur aqueuse. On peut utiliser plusieurs techniques : le froid (cryoapplication du corps ciliaire), le laser (Yag ou diode transscléral) ; les ultrasons (*Sonocare*).

### Glaucome néovasculaire

C'est la complication la plus redoutée de la rétinopathie diabétique proliférante sévère ou d'une occlusion veineuse rétinienne ischémique qui n'ont pas été traitées

correctement par laser (cf. chapitres correspondants). Il résulte du développement de néovaisseaux dans l'angle iridocornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse. Il entraîne une augmentation majeure de la pression intraoculaire aboutissant à un œil très douloureux et non voyant.

### Glaucome congénital

#### Diagnostic

Affection redoutable, il est dû à une anomalie de développement de l'angle iridocornéen.

Suspecté devant un larmolement, une photophobie, une cornée trouble au diamètre augmenté (mégaloconée) chez le nouveau-né ou le nourrisson, le diagnostic est confirmé par la prise de tension oculaire, au besoin sous anesthésie générale.

#### Traitement

Le traitement est uniquement chirurgical ; il est impératif dès que le diagnostic est posé (trabéculotomie, trabéculotomie). Le pronostic est sombre.

Les chances de conserver une fonction visuelle utile sont d'autant plus grandes que l'enfant est opéré précocement. D'où l'extrême importance de savoir reconnaître les symptômes du GC pour adresser ces enfants le plus tôt possible à l'ophtalmologiste +++.

## HÉMORRAGIES SOUS-CONJONCTIVALES

Elles se traduisent par une hyperhémie conjonctivale localisée, sans douleur, sans baisse de l'acuité visuelle.

### Étiologie

Le plus souvent, elles sont idiopathiques. Il faut quand même rechercher un trauma-

tisme, un surdosage en AVK, un traitement par aspirine, une HTA, un diabète, un trouble de la coagulation.

### Pas de traitement

Elles régressent spontanément en 3 sem. environ, sans traitement.

## KÉRATITES (1)

### Définition

Ce sont des affections inflammatoires et/ou dégénératives de la cornée, s'accompagnant ou non d'ulcérations. Elles se traduisent par des douleurs oculaires, accompagnées de rougeur périkeratique, de larmoiement, de photophobie, de bléphasmasme, de baisse de l'acuité visuelle.

Il faut distinguer les kératites *superficielles* (absence d'ulcération de l'épithélium cornéen) des kératites *interstitielles* (atteinte du stroma sans lésion épithéliale). L'ulcération de l'épithélium cornéen est mise en évidence par la prise de fluorescéine.

En l'absence de traitement, il y a risque de perforation, de surinfection ou de taie cornéenne persistante.

### Étiologies

- Kératites infectieuses, abcès de cornée : bactérien, viral (herpès +++), fongique, amibien.
- Kératoconjonctivite sèche/neurotrophique.
- Kératoconjonctivite allergique (vernale, atopique, gigantomégalectasie).
- Kératoconjonctivite de la rosacée oculaire.
- Kératite post-traumatique (corps étranger, coup d'arc des soudeurs, ophtalmie des neiges, gaz lacrymogènes, brûlures), cf. Brûlures oculaires.

### Traitement non spécifique

- Cicatrisant cornéen.

Ex. : cyanocobalamine (**VITAMINE B12 ALLERGAN collyre**) x 4/j pendant 15 j + **rétinol (VITAMINE A DULCIS pommade ophtalmique)** 1 application au coucher pendant 15 j.

- **Collyre antibiotique** en prévention des surinfections bactériennes.

Ex. : **RIFAMYCINE** x 4/j pendant 15 j.

- ± Collyre cycloplégique si très douloureux : **ATROPINE FAURE** 1 % collyre x 2/j.
- Rondelle oculaire-micropore si très douloureux.

Les **corticoïdes** en collyre ou pommade sont formellement contre-indiqués dans toutes les kératites virales ulcérées +++. Ils entraînent un retard de cicatrisation ; ils font flamber une kératite herpétique. Corollaire : il est absolument interdit de prescrire un **collyre corticoïde** sans examen de la cornée à la lampe à fente.

### Traitement spécifique

#### Kératites infectieuses, abcès de cornée

Surinfection d'un ulcère cornéen post-traumatique ; d'un ulcère de cornée dû à un œil sec, d'une pathologie cornéenne chronique, surinfection due au port de lentilles de contact.

#### Prélèvements bactériologiques :

- Frottis conjonctival.
  - Grattage cornéen +++ sur les bords et la base de l'abcès avant le début du traitement. Il est effectué par un ophtalmologiste, directement à la lampe à fente. On effectue des prélèvements sur divers milieux, pour analyse mycologique, bactériologique, virologique et recherche d'amibes. L'ensemble des prélèvements est transporté immédiatement au laboratoire microbiologique.
  - Examen microbiologique des lentilles, de l'étui, du produit de conservation.
- Le traitement anti-infectieux est administré en urgence ; c'est le terrain, les circonstances et l'aspect clinique des lésions cornéennes qui permettent de suspecter la nature de l'agent responsable.

## CICATRISANTS CORNÉENS

## ■ Rétinol

<b>VITAMINE A FAURE</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.)	2,15		30 %	0,22
<b>VITAMINE A DULCIS</b>					
1 appl. x 2 à 4/j	10 g (tube)	5,48		30 %	0,55

## ■ Cyanocobalamine

<b>VITAMINE B12 ALLERGAN</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	5 mL (fl.) 20 unidoses 0,4 mL			NR NR	
<b>ECOVITAMINE B12</b>					
Collyre à 0,05 % 1 gtte x 3 à 4/j	10 mL (fl.)			NR	
<b>VITAMINE B12 HORUS PHARMA</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	20 unidoses 0,4 mL/0,2 mg			NR	

## ■ Acétylcystéine

<b>EURONAC</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	100 mL (fl.)	4,66		15 %	0,05
<b>GENAC</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	5 mL (fl.)	4,66		15 %	0,93

## PROPRIÉTÉS

Ils accélèrent la cicatrisation de la cornée.

## INDICATIONS

Plaies, brûlures, traumatismes cornéens ; ulcérations d'origine infectieuse en association avec des **antibiotiques locaux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'un des constituants.

La **vitamine B12** est à éviter chez les porteurs de lentilles souples (elle colore les lentilles en rose).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques rares.

**KÉRATITES (2)**► *Kératite bactérienne*

- En cas de kératite ne menaçant pas la vision : p. ex. **tobramycine (TOBREX)** 1 gtte/h ou **ciprofloxacine (CILOXAN)** 1 gtte/h.

- En cas de kératite centrale, étendue ou profonde menaçant la vision : hospitalisation, le pronostic visuel est très réservé ; collyres antibiotiques renforcés (à faire fabriquer par la pharmacie centrale de l'hôpital).

**Traitement de départ à large spectre :**

- **ticarcilline** (7 mg/mL) ;
- **gentamicine** (15 mg/mL) ;
- **vancomycine** (50 mg/mL) ;

Instillation 1 gtte de chaque produit chaque minute pendant 5 min, puis 1 gtte/5 min pendant la 1<sup>re</sup> h, puis 1 gtte/h y compris la nuit pendant 48 h.

**Adapter ensuite le traitement** en fonction de l'évolution clinique et du résultat bactériologique (identification du germe et antibiogramme).

► *Kératites virales : herpès +++ (ulcère dendritique), zona, adénovirus, maladies infectieuses (rougeole, rubéole, varicelle, grippe)*

- Herpès : **aciclovir (ZOVIRAX pommade ophtalmique)** 1 appl. x 5/j jusqu'à 3 j après

cicatrisation cornéenne ± **ZOVIRAX** ou **valaciclovir (ZELITREX)** *per os* si atteinte sévère.

- Zona : **valaciclovir (ZELITREX)** 2 cp. à 500 mg x 3/j pendant 7 j ou **aciclovir (ZOVIRAX)** 1 cp. à 800 mg x 5/j pendant 7 j associés éventuellement à **ZOVIRAX pommade ophtalmique** 1 appl. x 5/j pendant 7 j.

► *Kératite fongique (= kératomycose)*

Contexte évocateur : traumatisme oculaire par un végétal, port de lentilles de contact, corticothérapie locale.

Association de 2 **antifongiques locaux**. Ex. (si levure identifiée) : **amphotéricine B** + **fluconazole** 2 % (fabrication par la pharmacie hospitalière à partir du produit pour voie IV) et d'un **antifongique** par voie générale : **fluconazole (TRIFLUCAN)** : dose de charge 800 mg puis 400 mg/j.

► *Kératite amibienne*

Il s'agit le plus souvent de complication des lentilles de contact.

**Hexamidine (DÉSOMÉDINE)** + **PHMB** 0,02 % (polyhexaméthylènebiguanide).

## KÉRATITES (3)

### Kératites par sécheresse oculaire

Kératite sèche par impossibilité de fermer les paupières (lagophthalmie) - y penser chez les sujets comateux -, par exophtalmie importante, par ectropion important ; par diminution de sécrétion de la glande lacrymale (ex. dans le syndrome de Gougerot-Sjögren).

Piège : les signes fonctionnels sont trompeurs ; en effet un œil sec peut se révéler par un larmoiement chronique réflexe s'intensifiant au vent et au froid.

- Réduire si possible l'usage des médicaments favorisant l'œil sec tels que les **antidépresseurs**, les **anxiolytiques (TÉMESTA)**, les **diurétiques** et les **laxatifs**.
- Proscrire les collyres contenant des conservateurs (dont le plus courant est le chlorure de benzakonium) et ceux contenant des vasoconstricteurs qui aggravent la sécheresse oculaire.
- Larmes artificielles et agents mouillants : ex. **LARMABAK** 1 gtte x 6 à 8/j + **carmellose sodique (CELLUVISC unidoses)** 1 gtte x 3/j.
- **Antibiotiques** ou **antiseptiques** si surinfection bactérienne.
- Clous méatiques : très efficaces ; chaque clou est placé au niveau du point lacrymal inférieur de façon à empêcher l'évacuation trop rapide des larmes.

- Humidificateur d'atmosphère.
- Lunettes occlusives.
- Tarsorrhaphie (suture des paupières) en cas de lagophthalmie permanente ou prolongée.

### Kératites dystrophiques

- Kératite neuroparalytique par lésion du trijumeau, après zona ophtalmique, kératite métaherpétique.
- Tarsorrhaphie (suture des paupières).

### Kératoconjunctivites allergiques

Elles sont associées à une conjonctivite (cf. Conjonctivites).

### Kératite de la rosacée oculaire

- Massage des paupières à l'aide d'un gant de toilette chaud et humide pendant 5 à 10 min.
- Instillation fréquente de larmes artificielles (**LARMABAK**) 6 gttes x 6 à 8/j.
- **Doxycycline** 1 cp. 100 mg le soir pendant 3 mois (médicament photosensibilisant, se protéger du soleil).

### Kératites traumatiques

Cf. Brûlures oculaires.

### Traitement au stade des séquelles cornéennes

Séquelles avec taie ou leucome : kératoplastie (greffe de cornée).

## LENTILLES DE CONTACT (1)

Les lentilles de contact sont d'excellents moyens de correction optique.

Cependant, l'utilisateur et le médecin doivent savoir qu'en cas de non-respect des règles d'entretien et des conditions d'utilisation, la lentille peut se transformer en

véritable bombe à retardement, pouvant conduire à des complications gravissimes.

Il existe 2 types de lentilles : les *lentilles rigides perméables à l'oxygène* (LRPO) et les *lentilles souples hydrophiles* (LSH).

	LENTILLES RIGIDES PERMÉABLES À L'OXYGÈNE (LRPO)	LENTILLES SOUPLES HYDROPHILES (LSH)
Tolérance	Temps d'adaptation de 3-4 sem.	Excellente
Diamètre	9,60 mm (inférieur au diamètre cornéen qui est de 12 mm) Elles respectent donc mieux la physiologie cornéenne et palpébrale	14 mm (elles recouvrent toute la cornée et une partie de la conjonctive bulbaire)
Mode de port (durée de port de la lentille sans la retirer)	- Port journalier (posée le matin, retirée le soir) - Port permanent : réservé à des situations bien particulières	- Port journalier +++ - Port permanent : 7 j (voire 30 j)
Type de renouvellement (durée de vie de la lentille avant de la jeter définitivement)	LRPO traditionnelles : 1 à 2 ans	- LSH traditionnelles : 12 à 18 mois - LSH à renouvellement fréquent : 1 sem. à 1 mois - LSH à renouvellement journalier

### Règles d'entretien et conditions d'utilisation

#### • CE QU'IL FAUT FAIRE

- Se laver soigneusement les mains (savon non gras, non parfumé, sans lanoline), les rincer abondamment avant de manipuler les lentilles. Il faut veiller à avoir les ongles très propres et courts.
- Avant de poser les lentilles, il faut vérifier qu'elles se présentent dans le bon sens : elles doivent former un petit bol bien arrondi.
- Renouveler la solution de décontamination-conservation tous les jours. Rincer les lentilles à l'aide de sérum physiologique en unidoses avant de les poser. Déprotéiniser les lentilles traditionnelles 1 fois/sem.
- Maintenir en permanence les lentilles en milieu humide : soit sur l'œil, soit dans les liquides d'entretien. À l'air libre, elles se dessècheraient.
- Respecter les durées de port journalier. Ne jamais dormir avec des lentilles à port journalier.
- Respecter la durée de vie des lentilles, des liquides d'entretien ; changer les étuis tous les mois.
- En cas de gêne, de sensation de corps étranger dans l'œil, d'hyperhémie conjonctivale, de photophobie, de blépharospasme, de présence de sécrétions, il est absolument impératif de :
  - 1) retirer immédiatement les 2 lentilles,
  - 2) consulter rapidement un ophtalmologiste.

#### • CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne jamais utiliser ni l'eau du robinet, ni de l'eau minérale pour rincer les lentilles (risque amibien +++). Les amibes sont des parasites vivant dans l'eau. Elles ont une très grande affinité pour les lentilles et entraînent des kératites amibiennes gravissimes contre lesquelles l'arsenal thérapeutique est limité.
- Le port des lentilles de contact est déconseillé en piscine, sauna, rivière.
- Ne jamais mettre en contact les lentilles avec la salive.
- Ne pas laisser les lentilles à l'air libre du fait du risque de dessèchement.



## LENTILLES DE CONTACT (2) – ACCIDENTS

**Érosions cornéennes**

Elles peuvent évoluer à bas bruit avec les lentilles souples qui font pansement. Avec les lentilles rigides, les signes fonctionnels sont ressentis beaucoup plus précocement.

- Retrait de la lentille pendant toute la durée du traitement.
- **Collyre antiseptique (VITABACT)** ou **antibiotique (CLOXAN)** x 4/j pendant 10 j.
- Collyre cicatrisant.

Ex. : **VITAMINE B12 ALLERGAN** x 4/j pendant 10 j.

En cas d'érosion cornéenne profonde : **VITAMINE A DULCIS pommade ophtalmique** : x 2/j.

- Éventuellement collyre cycloplégique.
- Ex. : **ISOPTO-HOMATROPINE** 1 gte x 3/j pendant 48 h.
- Pansement oculaire pendant 48 h.
- Contrôle chez l'ophtalmologiste de l'intégrité de l'état cornéen avant de remettre la lentille ++.

**Complications infectieuses**

Elles se rencontrent principalement chez les porteurs de lentilles souples. Les germes le plus souvent rencontrés sont le pyocyanique, le staphylocoque, les *Serratia*, mais aussi les agents fongiques et amibiens. Ils sont à l'origine d'abcès cornéen et/ou d'ulcère surinfecté, complications graves de par l'agressivité des germes qui en sont responsables.

La survenue d'un abcès cornéen chez un porteur de lentilles de contact est une urgence médicale ++. Un traitement précoce, intensif et adapté permettra d'en limiter au maximum les séquelles, qui peuvent parfois être majeures en compromettant à moyen terme le pronostic visuel. Il est donc très important de porter un diagnostic précoce, d'isoler le germe responsable pour entreprendre une antibiothérapie intensive et adaptée.

**Traitement préventif**

Il consiste en l'éducation primordiale de l'utilisateur concernant l'hygiène et l'entretien des lentilles.

**Traitement curatif****Abcès et ulcères surinfectés :**

- infection bactérienne (gram-négative ++)
  - infection amibienne (port des lentilles en piscine, rinçage à l'eau du robinet)
  - infection fongique.
  - Retrait des 2 lentilles.
  - Hospitalisation en cas de lésion étendue, axiale, ou profonde.
  - Isolement du germe responsable par :
    - prélèvement de l'ulcère ou de l'abcès cornéen à la lampe à fente avec un scarificateur et frottis conjonctival à l'écouvillon ;
    - envoi de la lentille, du liquide de conservation et de l'étui au laboratoire pour examen direct, culture et antibiogramme.
- Cf. Abcès de cornée dans Kératites (1).

**Lentilles de contact et collyres**

- Les lentilles de contact, en particulier les souples, sont incompatibles avec les collyres contenant un conservateur (ex : chlorure de benzalkonium, bromure de benzo-dédocinum, ammonium quaternaire) ; en effet, le conservateur s'adsorbe sur la lentille, ce qui provoque des réactions d'intolérance locale. Il est toléré de retirer les lentilles avant instillation du collyre et de les remettre 15 min après. Pour éviter ce problème, utiliser des collyres sans conservateur : unidoses ou formes ABAK.
- Incompatibilité avec les **collyres  $\beta$ -bloquants** qui induisent une forte diminution de la sécrétion lacrymale.
- Incompatibilité avec la **rifamycine**, la **vitamine B12**, la fluorescéine qui colorent les lentilles de façon définitive.
- Incompatibilité avec les **collyres** et les **pommades antibiotiques** car de toute façon contre-indication formelle des lentilles de contact lors de toute infection oculaire.

**OBLITÉRATION DE L'ARTÈRE CENTRALE DE LA RÉTINE (OACR)****Définition**

C'est l'arrêt aigu de toute circulation rétinienne qui entraîne après 20 min une ischémie de toute la neurorétine, à l'exception de la couche des photorécepteurs dont l'apport en oxygène est d'origine choroïdienne. L'OACR est un accident vasculaire localisé dans le territoire de la carotide interne.

L'OACR entraîne une cécité totale, brutale, unilatérale, indolore et une abolition du réflexe photomoteur.

Le plus souvent, il s'agit d'une **embolie** à partir de plaques d'athérome carotidiennes chez un patient âgé aux multiples facteurs de risque cardiovasculaires ou d'une embolie d'origine cardiaque (valvulopathie, thrombus). Il peut s'agir aussi d'une **thrombose** locale par artérite inflammatoire dans le cadre d'une maladie de Horton. Il faut aussi rechercher une **cause locale** (p. ex. drusen de la papille) et un **trouble de la coagulation**.

**Bilan**

Il faut éliminer en urgence une maladie de Horton (patient âgé +++), une dissection carotidienne (patient jeune).

- Angiographie rétinienne à la fluorescéine pour confirmer le diagnostic (intérêt médico-légal).

- Biologie : NFS, plaquettes, **VS**, **CRP en urgence**, glycémie, ionogramme sanguin, créatininémie, protidémie, EPP, TP, TCA, fibrinémie, cholestérolémie, triglycéridémie, bilan de coagulation (plus complet si sujet jeune).

- Consultation cardiologique, ECG, échographie-Doppler des vaisseaux du cou.

- Holter ECG, Holter tensionnel ± échographie cardiaque.

- Biopsie de l'artère temporale si suspicion de maladie de Horton.

**Traitement****Traitement curatif**

- Il est fait en urgence. Il y a classiquement différents moyens, mais le plus souvent inefficaces.

Le traitement d'urgence n'a de valeur que s'il est débuté dans les heures qui suivent la baisse d'acuité visuelle.

- Hospitalisation en urgence.

- Cas particulier de la maladie de Horton à traiter en urgence par corticothérapie générale pour prévenir le risque de bilatéralisation +++ : **SOLUMÉDROL** bolus IV de 500 mg 3 j de suite + relais par **prednisone (CORTANCYL)** 1 mg/kg/j + mesures associées.

Perfusion de **vasodilatateurs**. Ex. : **pentoxifylline (TORENTAL)**.

- **Antiagrégants** si terrain cardiovasculaire.

- ± Héparinothérapie à dose curative.

- Hypotoniser le globe oculaire (perfusion de **DIAMOX**, collyres hypotonisants, ponction de chambre antérieure, massage du globe).

- Les **thrombolytiques** sont actuellement abandonnés dans cette indication (aucune efficacité prouvée, et rapport risque/bénéfice élevé).

**Traitement préventif**

- Traitement des facteurs de risque cardiovasculaires +++ : diabète, hypertension artérielle, hyperlipidémie, tabagisme.

- **Aspirine (ASPÉGIC 250 mg)** : 1 sach./j au long cours.

- Il faut considérer toute cécité brutale, unilatérale, de durée brève, totalement réversible (= cécité monoculaire transitoire) comme un signe prémonitoire capital, qui doit conduire absolument à rechercher un rétrécissement des artères carotides internes par échographie-Doppler. Une sténose significative pourra ainsi bénéficier d'une cure chirurgicale visant à éviter les récurrences et les accidents visuels et cérébraux définitifs.

**Pronostic**

- Il est en règle générale très défavorable. La récupération visuelle est souvent médiocre malgré le traitement entrepris en urgence.

- **Attention** au tableau de cécité monoculaire transitoire (amaurose durant quelques secondes à quelques minutes) : il peut devenir définitif.

- **Attention** : l'OACR se produit sur un terrain à risque d'AVC +++.

**OBLITÉRATION DE LA VEINE CENTRALE DE LA RÉTINE (OVCR)****Définition**

L'OVCR est un accident fréquent, grave, secondaire à un ralentissement brutal du courant veineux rétinien.

Ses causes sont multiples.

La gêne visuelle immédiate est moins marquée que dans l'OACR, mais la gravité des OVR est liée à l'ischémie rétinienne qui peut en résulter : cette ischémie chronique entraîne le développement de néovaisseaux iriens, pré-rétiniens et pré-papillaires conduisant à de redoutables complications telles que le glaucome néovasculaire, le décollement de rétine tractionnel et l'hémorragie intravitréenne.

Le pronostic à long terme est lié à l'œdème maculaire.

**Étiologies des occlusions veineuses rétinienne**

- Artériosclérose (HTA, dyslipidémie, tabagisme).
- Hyperviscosité plasmatique (leucémies, lymphomes, dysglobulinémies).
- Causes cardiovasculaires (ACFA, valvulopathie).
- Anomalies de l'hémostase (déficit en protéine C, protéine S, antithrombine III ; anticorps antiphospholipides ; troubles des fonctions plaquettaires).
- Modifications des parois veineuses (sarcoidose, syphilis, maladie de Behçet, lupus érythémateux disséminé, SEP).

**Bilan**

- Angiographie à la fluorescéine +++ pour confirmer le diagnostic, établir le pronostic et guider le traitement.
- Biologie : NFS, plaquettes, VS, CRP, glycémie, ionogramme sanguin, créatininémie, protidémie, électrophorèse des protéines sériques, TP, TCA, fibrinémie, cholestérolémie, triglycéridémie. Consultation cardiologique, ECG, échographie-Doppler des vaisseaux du cou, Holter ECG, Holter tensionnel ± échographie cardiaque.
- Tomographie en cohérence optique : pour quantifier l'œdème maculaire.

**Traitement****Traitement de tous les facteurs de risque cardiovasculaires +++**

• Le traitement étiologique, lorsqu'il est possible, est toujours nécessaire.

• Hémodilution : réalisée parfois en milieu hospitalier, sous surveillance de l'anesthésiste ; elle vise à diminuer la viscosité sanguine.

Elle est réservée aux OVCR datant de moins de 3 sem.

• **Troxérutine (VEINAMITOL 3 500 mg)** : 1 sach. x 2/j pendant 6 mois.

• **Antiagrégants plaquettaires (ASPÉ-GIC 250 mg)** : 1 sach./j au long cours.

**Implant intravitréen**

**UZURDEX** : implant intravitréen biodégradable libérant de la **dexaméthasone**. 1 inj. à renouveler tous les 4 à 6 mois si récidive de l'œdème.

**Injection intravitréennes d'anti-VEGIF**

Elles sont indiquées en cas d'œdème maculaire avec une baisse visuelle ( $< 6/10$ ) : **ranibizumab (LUCENTIS)**.

Elles peuvent être associées à une photocoagulation au laser, ou être administrées à des patients ayant déjà été traités par photocoagulation au laser.

**Photocoagulation au laser****► Périphérique**

Elle est guidée par les données de l'angiographie à la fluorescéine. Elle comprend toutes les zones d'ischémie rétinienne pour éviter le développement de néovaisseaux.

**► Traitement de l'œdème**

Grille maculaire au laser en cas d'œdème maculaire persistant avec acuité visuelle basse. Elle devient beaucoup moins indiquée depuis la disponibilité des injections intravitréennes.

**Pronostic**

Il est variable. Si l'acuité visuelle est peu perturbée d'emblée (formes œdémateuses), l'évolution est favorable.

Si l'acuité visuelle est d'emblée effondrée (formes ischémiques), le pronostic est beaucoup plus sombre : l'acuité visuelle reste basse, avec risque du redoutable glaucome néovasculaire.

## PLAIES ET CORPS ÉTRANGERS OCULAIRES

### Érosions cornéennes, corps étrangers superficiels

L'agent causal peut être un coup d'ongle, une branche d'arbre. Les corps étrangers sont souvent une projection de métal quand le marteau frappe sur le burin.

**Tout œil rouge doit faire suspecter la présence d'un corps étranger et impose de retourner la paupière supérieure pour le rechercher.**

Fiché dans la cornée ou sous la paupière supérieure, il faudra l'extirper en totalité à la lampe à fente (y compris la rouille), après instillation d'un collyre anesthésique cornéen.

#### Prescription

► *Antibiotique local*

Ex. : **rifamycine (RIFAMYCINE CHIBRET collyre)** x 6/j pendant 8 j.

► *Cycloplégiques*

Ils sont utilisés en cas de douleurs importantes (empêchent le spasme ciliaire).

Ex. : **ISOPTO-HOMATROPINE** x 3/j pendant 48-72 h.

► *Cicatrissants cornéens*

Ex. : **cyanocobalamine (VITAMINE B12 ALLERGAN)** x 4/j + **rétinol (VITAMINE A DULCIS pomade ophtalmique)** le soir dans le cul-de-sac conjonctival pendant 8 j.

► *Rondelles oculaires + Micropore* pendant 2-3 j

#### ATTENTION !

Il est formellement interdit de confier ou de prescrire un collyre anesthésique type **CÉBÉSINE** ou **TÉTACAÏNE** au patient car même si ce collyre le soulage après 1 ou 2 instillations, des instillations répétées sont responsables de kératites dystrophiques irréversibles. Ces collyres doivent être réservés strictement à l'examen médical +++.

### Traitement préventif

Port de lunettes de sécurité au cours des travaux à risque.

### Plaies transfixiantes et corps étrangers intraoculaires profonds

Un œil ouvert est une urgence médico-chirurgicale qu'il faudra opérer en milieu spécialisé dans un délai de 6 h, pour prévenir le risque d'infection. Toutefois, les premières mesures permettent de gagner un temps précieux.

- Hospitalisation en urgence.
- Bilan préopératoire.
- Consultation d'anesthésie.
- Mise à jeun stricte.
- Antibiotiques locaux.

Ex. : **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** : 1 gtt x 6/j.

- Pansement oculaire.
  - Voie veineuse et antibiothérapie IV synergique, à large spectre, à pénétration intraoculaire à but prophylactique.
- Ex. : **fluoroquinolones, lévofloxacin (TAVANIC)** : 1 cp. x 2/j + **pipéracilline IV** 4 g x 3/j.
- Radiographies des orbites à la recherche de corps étranger radio-opaque.

• **Gammaglobulines** et/ou vaccin antitétanique.

• Au bloc opératoire :

- bilan des lésions ;
- suture des plaies ± ablation du corps étranger intraoculaire. Le but en urgence est de fermer le globe.
- Dans un second temps (3 à 15 j plus tard) : traitement du reste des lésions : exérèse d'une cataracte traumatique, retrait d'un corps étranger.

## RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE (RD)

### Epidémiologie-physiopathologie

La RD survient dans 90 % des cas après 10-15 ans d'évolution du diabète, tant insulino- que non insulinodépendant. La RD est d'autant plus précoce et sévère que le diabète évolue depuis longtemps, que l'équilibre glycémique est mauvais, et qu'il existe une HTA associée.

### Rétinopathie diabétique

Les lésions de la RD sont dues à l'association d'obstruction et d'hyperperméabilité des capillaires rétiens. L'obstruction du lit capillaire entraîne l'apparition de vastes territoires ischémiques, qui sont responsables de la prolifération de néovaisseaux (la RD est dite proliférante). Ces néovaisseaux sont redoutables par leurs complications : hémorragies dans le vitré, DR par traction, et glaucome néovasculaire, risquant d'entraîner des cécités définitives.

### Maculopathie diabétique

L'hyperperméabilité des capillaires rétiens entraîne un œdème localisé préférentiellement à la macula, responsable de baisses de l'acuité visuelle : c'est l'œdème cystoïde.

### Traitement

Il nécessite une collaboration entre ophtalmologiste, diabétologue et généraliste.

- **Contrôle très sérieux de la glycémie**, et de la **PA** (elle doit être strictement < 130/80 mmHg). L'hémoglobine glyquée doit impérativement être maintenue en dessous de 7 %. L'insulinothérapie doit être optimisée (plusieurs inj./j).

- **Suivi ophtalmologique régulier** (au moins tous les ans), avec FO et angiographie + + +.

- **Photocoagulation au laser argon** de toutes les zones d'ischémie rétinienne afin de prévenir l'apparition ou de favoriser la régression des néovaisseaux rétiens. En cas d'ischémie étendue ou de néovaisseaux prépapillaires, photocoagulation panrétinienne épargnant la région maculaire.

- **Injections intra-vitréennes d'anticorps anti-VEGF**. Ce type de traitement a amélioré la prise en charge et le pronostic des œdèmes maculaires diabétiques et des RD proliférantes sévères. En cas d'œdème maculaire diabétique, les anticorps anti-VEGF injectés par voie intravitréenne (**ranibizumab**, **LUCENTIS**) ont des propriétés antiangiogéniques.

Les injections doivent être répétées au moins 3 fois à 1 mois d'intervalle, puis tant que l'acuité visuelle s'améliore (soit 6 à 8 la 1<sup>re</sup> année).

### Complications : chirurgie endoculaire

- Vitrectomie-endolaser en cas d'hémorragie intravitréenne massive et persistant plus de 6 mois.

- Chirurgie endoculaire longue et compliquée pour un décollement de rétine tractionnel (vitrectomie - dissection des proliférations fibrovasculaires - endolaser ± tamponnement interne par silicone).

- **Hypotonisants** locaux et généraux ± méthodes chirurgicales (cryoapplication rétinienne, destruction du corps ciliaire) pour un glaucome néovasculaire.

## SCLÉRITES - ÉPISCLÉRITES

### Définition - Étiologies

Il s'agit d'une inflammation de la sclère et de l'épisclère, souvent en fait difficiles à distinguer l'une de l'autre.

Elles peuvent être dues à une allergie +++, à une maladie générale (polyarthrite rhumatoïde, granulomatose de Wegener, polychondrite atrophante, PAN, etc.). Souvent, aucune cause n'est identifiée.

### Clinique

Elles se manifestent par des douleurs oculaires, augmentées par les mouvements du globe, associées à une rougeur violacée localisée par vasodilatation des vaisseaux épiscléraux.

### Bilan

- L'épisclérite est le plus souvent idiopathique et bénigne.

- En revanche, un bilan étiologique est nécessaire en cas de sclérite ou d'épisclérite récidivante. On adressera le patient à l'interniste.

### Traitement

**Épisclérite :** AINS (*OCUFEN 0,03 %* collyre) : 1 gtt x 4/j pendant 1 mois.

**Sclérite :**

- 1<sup>re</sup> intention : AINS *per os* (indométacine 50 mg/j).

- 2<sup>e</sup> intention :

- corticothérapie *per os* : 1 mg/kg/j pendant 8 j puis diminution progressive ;

- ± corticothérapie locale : 1 gtt/h puis diminution progressive ;

- + mesures associées (prévention gastrique, etc.).

- Atropine 1 % : 1 g x 2/j.

**Traitement étiologique** quand l'étiologie est retrouvée.

## STRABISME ET AUTRES TROUBLES VISUELS DE L'ENFANT (1)

### Strabisme

#### Définition - Épidémiologie

Le strabisme se caractérise par la déviation d'un axe oculaire par rapport à l'autre.

C'est une affection fréquente qui intéresse 4 % de la population infantile. Il apparaît en règle dans les 4 premières années de vie.

On distingue :

- Strabisme convergent : déviation des yeux en dedans.
- Strabisme divergent : déviation des yeux en dehors.
- Strabisme vertical : déviation des yeux dans le sens vertical.

Tout enfant porteur de strabisme doit être examiné par un ophtalmologiste pour deux raisons.

Le strabisme peut être associé à une anomalie oculaire organique nécessitant un traitement spécifique urgent : ainsi peut-il révéler un rétinoblastome, une cataracte congénitale, une atrophie optique, un décollement de rétine, etc.

Le strabisme non traité entraîne la redoutable amblyopie fonctionnelle (acuité visuelle anormalement basse en l'absence d'anomalie organique de l'œil) par absence de développement des centres visuels.

La déviation des axes visuels est le signe le plus évident du strabisme, mais c'est le dépistage d'une affection organique de l'œil et la lutte contre l'amblyopie qui sont les principales préoccupations.

Le dommage esthétique est un problème secondaire.

#### Traitement

##### ► Objectifs

Dès la constatation de la déviation oculaire, l'enfant doit être adressé au spécialiste pour :

- éliminer une éventuelle étiologie organique à la déviation oculaire : cataracte congénitale et rétinoblastome ++ ; c'est dire que tout enfant porteur d'un stra-

bisme doit être examiné rapidement avec examen soigneux du fond d'œil +++ ;

- détecter et traiter le plus tôt possible une amblyopie. C'est une hérésie d'attendre l'âge de 6 mois comme il est couramment admis.

Le résultat dépend de la précocité du diagnostic et du traitement +++. Le traitement de l'amblyopie donne 90 % de réussite avant 3 ans, les chances diminuant fortement quand le traitement est commencé plus tard.

##### ► Moyens

Le principe est de donner aux 2 yeux les conditions du meilleur développement fonctionnel.

##### Traitement de l'amblyopie

Le seul moyen est de pénaliser le bon œil pour obliger l'œil amblyope à travailler (pansement occlusif au début [ex. : **OPTICLUDE**] collé directement sur la peau, secteurs collés sur les lunettes, verre correcteur volontairement surcorrigé). Attention, une surveillance attentive est impérative, et progressivement, on va assouplir la gêne du bon œil au fur et à mesure que la vue du « mauvais œil » remonte.

##### Correction optique totale

Elle doit être déterminée par skiascopie obligatoirement sous cycloplégique. Ex. : **SKIACOL** 1 gte à chaque fois, 1 h et 50 min avant l'examen. Lorsqu'il existe une amétropie, il faut la corriger immédiatement, et totalement par des verres correcteurs. Il n'est jamais trop tôt pour traiter un trouble visuel (même dès l'âge de quelques mois), et les bébés supportent très bien les lunettes. L'enfant doit absolument porter ses lunettes en permanence en cas de strabisme +++.

##### Suivi orthoptique

Pour suivre la récupération visuelle et la qualité de la vision binoculaire.

##### Traitement chirurgical

Il est effectué vers 3-4 ans après préparation orthoptique optimale, si la déviation persiste. Il corrige le défaut esthétique, mais ne rétablit pas la vision binoculaire.

**STRABISME ET AUTRES TROUBLES VISUELS DE L'ENFANT (2)****Amétropies**

- Les amétropies (troubles de la réfraction nécessitant le port d'une correction optique) concernent 12 % des enfants.
- On distingue la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, l'anisotropie (différence de réfraction d'un œil à l'autre).
- Elles nécessitent une **prise en charge précoce** pour éviter l'amblyopie.

Traitement :

- Détermination de la réfraction sous cycloplégique.
- Correction optique adaptée : port de lunettes (voire lentilles de contact dans certains cas particuliers).

**Éducation et conseils**

Quand faut-il conduire un enfant chez l'ophtalmologiste ?

**Présence de signes d'appel : consultation sans attendre**

► *Strabisme*

Dès la constatation de la déviation oculaire, adresser l'enfant à l'ophtalmologiste pour :

- éliminer une pathologie organique à traiter (rétinoblastome, cataracte congénitale, etc.) ;
- détecter et traiter au plus tôt une éventuelle amblyopie. Le pronostic est fonction de la précocité du traitement.

► *Autres troubles visuels*

Pupille blanche, mégalocornée, nystagmus, suspicion de malvoyance ou tout autre signe d'appel.

**Enfant à risque : vers 9 mois-1 an**

Antécédents familiaux de porteurs de lunettes, de strabismes, de pathologies oculaires.

Prématuré, problèmes néonataux.

**Tous les enfants vers 2-3 ans**

De façon systématique, pour éliminer un trouble de la réfraction, un strabisme à petit angle ou tout autre problème.



## UVÉITES (1)

### Définition

Inflammations de l'uvée (tunique vasculaire de l'œil) :

- uvéites antérieures : iritis ou iridocyclites = inflammation de l'iris et du corps ciliaire ;
- uvéites postérieures : choroïdites = inflammation de la choroïde.

### Étiologies

L'uvéite antérieure ne représente parfois qu'un symptôme d'une maladie générale. Les causes principales sont les suivantes.

CAUSES INFECTIEUSES	MALADIES DE SYSTÈME
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Herpès oculaire</li> <li>– Toxoplasmose oculaire</li> <li>– Foyer infectieux ORL ou dentaire</li> <li>– Infection urinaire</li> <li>– Tuberculose</li> <li>– Brucellose</li> <li>– Syphilis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sarcoidose</li> <li>– Spondylarthrite ankylosante et toutes les spondylarthropathies</li> <li>– Maladie de Behçet</li> </ul>

Souvent, aucune cause n'est identifiée.

### Bilan

Lors d'une première poussée d'uvéite, en plus d'un interrogatoire qui doit faire préciser l'existence d'éventuelles manifesta-

tions dermatologiques, rhumatologiques, digestives, neurologiques ou autres, et d'un examen ophtalmologique complet, l'ophtalmologiste demande des examens complémentaires simples.

#### Examens à pratiquer devant une première poussée d'uvéite

NFS - Plaquettes - Ionogramme sanguin  
Vitesse de sédimentation - CRP  
Radiographie pulmonaire - Intradermo-réaction à la tuberculine  
TPHA - VDRL  
Bilan phosphocalcique  
Enzyme de conversion de l'angiotensine  
Typage HLA ; HLA B27 si uvéite antérieure.

En cas de récurrence, un bilan plus complet doit être pratiqué, orienté par le tableau clinique.

### Traitement symptomatique

- **Mydriatiques** (pour calmer les douleurs en mettant au repos le corps ciliaire, et pour empêcher l'iris de s'accrocher au cristallin).

- **Corticoïdes** (pour lutter contre l'inflammation) en collyres et pommades.

Ex. : **atropine collyre** à 1 % 1 gte matin et soir ; **dexaméthasone (MAXIDEX)** 1 gte x 4/j ; **dexaméthasone + oxytétracycline (STERDEX pommade)** dans l'œil au coucher.

## COLLYRES MYDRIATIQUES (1)

## ■ Tropicamide

<b>MYDRIATICUM</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	10 mL (fl.) 0,5 %	2,73	I	65 %	0,27
	1 unidose 2 mg/0,4 mL	1,90	I	65 %	1,90
	20 unidoses 2 mg/0,4 mL		I	NR	
	100 unidoses 2 mg/0,4 mL		I	NR	

## ■ Phényléphrine

<b>NÉOSYNÉPHRINE FAURE</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	5 mL 5 % (fl.)	2,92	I	65 %	0,58
	100 unidoses 0,4 mL	2,92	I	65 %	0,58

## ■ Cyclopentolate

<b>SKIACOL</b>					
1 gtte 1 h avant l'examen à renouveler 10 min plus tard dans les 2 yeux	0,5 mL (1 unidose)		I	NR	

## ■ Atropine collyre

<b>ATROPINE ALCON</b>					
1 gtte x 2/j	10 mL 0,3 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25
	10 mL 0,5 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25
	10 mL 1 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25

## ■ Homatropine

<b>ISOPTO-HOMATROPINE</b>					
1 gtte x 3/j	10 mL (fl.)		I	NR	

## UVÉITES (2)

### Traitement étiologique

Il est fondamental. Le mieux est d'hospitaliser le patient pour faire un bilan complet. Il repose avant tout sur un interrogatoire recherchant tous les antécédents oculaires et généraux du patient et sur un examen clinique complet (examen de l'interne ++). Le choix des examens complémentaires pourra ainsi être orienté. La découverte d'une cause à cette uvéite conditionne le pronostic, car cela permet de prescrire un traitement étiologique qui empêchera la survenue des récives.

- Ex. 1 : uvéite herpétique : **valaciclovir (ZELITREX)** 1 à 2 cp. x 3/j. La durée du traitement est à adapter en fonction de l'évolution clinique.

- Ex. 2 : uvéite associée au groupage HLA B27 :

- **dexaméthasone (MAXIDEX)** 1 gte/h pendant 48 h puis 8/j pendant 3 j puis diminution selon l'amélioration clinique ;
- **atropine** 1 g x 2/j ;
- **oxytétracycline + dexaméthasone (STERDEX)** le soir ;

- hypotonisants oculaires si hypertension oculaire.

- Ex. 3 : choriorétinite toxoplasmique (l'infection congénitale à *Toxoplasma gondii* est la première cause d'uvéite postérieure ; la révélation est tardive) : **azithromycine (ZITHROMAX)** 1 cp./j ou **sulfadiazine (ADIAZINE)** 2 cp. x 3/j + **pyriméthamine (MALOCIDE)** 1 cp./j + **acide folique (LEDERFOLINE)** 1 cp./j contrôle impératif de NFS-plaquettes tous les 10 j.

48 h plus tard corticothérapie par voie générale, à hautes doses : **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** bolus de 500 mg dilué dans 250 cm<sup>3</sup> de sérum physiologique à passer sur 3 h, 3 j de suite ; à relayer par **prednisone (CORTANCYL)** 1 mg/kg en prise unique matinale.

Mesures associées à la corticothérapie :

- régime sans sel ;
- **potassium : DIFFU-K** : 1 gél. x 3/j ;
- **calcium : CACIT 1000** 1/j ;
- **vitamine D : DÉDROGYL** 5 gttes/j.

Les doses de corticoïdes sont progressivement diminuées, sur plusieurs semaines, en fonction de l'amélioration clinique.

## ZONA OPHTALMIQUE

### Epidémiologie - Physiopathologie

Le zona ophtalmique est une maladie infectieuse due à la récurrence du virus varicelle-zona (VZV) qui, après être resté quiescent dans le ganglion de Gasser, touche la première branche du nerf trijumeau : le nerf ophtalmique de Willis (V1). Le zona ophtalmique représente 10 à 15 % des cas de zona ; c'est la deuxième localisation après le zona thoracique.

Le zona ophtalmique non compliqué débute par des douleurs unilatérales dans le territoire du V1, suivies d'une éruption vésiculeuse unilatérale douloureuse, au niveau du canthus interne, de l'aile du nez, et de la partie nasale de la conjonctive bulbaire, accompagnée d'adénopathie prétragienne.

Les complications oculaires sont dominées par les atteintes cornéennes (kératite ponctuée superficielle, kératite épithéliale pseudodendritique, kératite stromale, kératite neurotrophique qui est la conséquence de l'anesthésie cornéenne persistante), l'uvéite antérieure, la nécrose rétinienne aiguë, les paralysies oculomotrices. Les douleurs sont souvent durables, intenses et rebelles au traitement.

### Traitement

Il repose sur les **antiviraux**.

Débuté dans les 48 h qui suivent l'éruption, il diminue les douleurs de la phase aiguë, raccourcit la période éruptive, et diminue la fréquence des complications.

- **Valaciclovir (ZELITREX)** : 2 cp. à 500 mg x 3/j pendant 7 j, à débiter dans les 72 h qui suivent l'éruption. Son intérêt est une

biodisponibilité 3-4 fois plus élevée que l'**aciclovir**.

- **Aciclovir (ZOVIRAX pommade ophtalmique)** : 1 application x 5/j ou **ZOVIRAX** : 1 cp. à 800 mg x 5/j), souvent prescrit en cas d'atteinte cornéenne. Cependant, elle ne semble pas utile en cas de traitement général bien conduit. Dans les formes graves et chez le sujet immunodéprimé : forme IV, 10 mg/kg/8 h dilué dans du G5 % à passer sur 1 h.

- Corticothérapie locale sous couverture antivirale, **dexaméthasone (DEXAMÉTHASONE)** en injections latérobulbaires, en bolus IV ; **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** 500 mg, 3 j de suite + mesures associées lorsque la réaction inflammatoire est importante.

- Traitements symptomatiques des douleurs de la phase aiguë et post-zostériennes : **aspirine**, **paracétamol**, **lévodopa**, **cimétidine**, **antidépresseurs tricycliques**, **antipsychotiques**, **carbamazépine**.

- Traitement antiseptique des lésions cutanées : **HEXOMÉDINE solution (hexamidine)**, nettoyer les lésions cutanées 3 fois/j.

- Traitement symptomatique en cas de kératite :

- **antibiotique en collyre** pour prévenir la surinfection bactérienne (ex. **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** x 4/j) ;

- **cicatrisant cornéen** (ex. **rétinol VITAMINE A FAURE pommade ophtalmique** x 2/j) ;

- cycloplégique (ex. **ATROPINE FAURE** 1 % x 2/j) ;

- pansement oculaire.

- Traitement symptomatique en cas d'uvéite antérieure : cycloplégique, **corticoïdes**.

## SYNDROME SEC OCULAIRE

Le syndrome sec oculaire est très fréquent. Il concerne :

- 10 % des adultes dans une population tout-venant ;
- 18 % des sujets âgés ressentant une gêne douloureuse oculaire consécutive à un syndrome sec prouvé par des tests spécifiques.

Actuellement, les conditions de vie moderne font émerger un ensemble de facteurs environnementaux et de pathologies sources de sécheresse oculaire :

- utilisation d'écran : raréfaction du clignement ;
- polluants ambiants, tabac, lentilles, maquillage : déstabilisation du film lacrymal ;
- faible hygrométrie : augmentation de l'évaporation des larmes ;
- techniques de chirurgie réfractive : sécheresse oculaire suite à différentes pathologies (diabète, dysthyroïdies) ;
- médicaments régulateurs de l'humeur, du sommeil, du transit,  **$\beta$ -bloquants, rétinoides, interféron  $\gamma$**  ;
- collyres contenant des conservateurs ;
- vieillissement de la population à involution de la glande lacrymale + diminution de la fréquence du clignement + effondrement des androgènes, facteurs essentiels à la sécrétion lacrymale.

Les conservateurs exercent des propriétés détergentes au détriment des lipides contenus dans le film lacrymal et des membranes cellulaires de la surface oculaire.

Une meilleure compréhension des mécanismes a fait évoluer le concept d'œil sec : il ne s'agit plus uniquement d'un problème d'insuffisance aqueuse, car tout syndrome sec induit systématiquement une inflammation de la surface oculaire et des paupières.

D'où la définition actuelle de l'œil sec : « maladie multifactorielle des larmes et de la surface oculaire, entraînant des symptômes d'inconfort, une gêne visuelle et une instabilité lacrymale, avec un risque d'atteinte de la surface oculaire. Il s'accompagne d'une augmentation d'osmolarité du film lacrymal et d'une inflammation de l'unité fonctionnelle que constitue la surface oculaire. »

### Traitements actuels

- Le principal objectif du traitement est d'hydrater la surface oculaire grâce à des substituts lacrymaux : larmes artificielles, solutions visqueuses, produits à haute viscosité.
- Traitement d'une méibomiite associée : hygiène des paupières biquotidienne et méticuleuse : réchauffement et massage.
- Traitement d'une conjonctivite allergique associée.

• Proscrire l'usage des conservateurs ; privilégier l'usage de produits présentés en unidoses ou en flacon multidoses sans conservateur (formes ABAK).

- Traitement d'une kératite venant compliquer le syndrome sec (cf. Kératites).

## COLLYRE ANTI-ŒDÉMATEUX

## ■ Diméticone

OPHTASILOXANE				
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.)		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Pansement protecteur et lubrifiant de l'œil.

**INDICATIONS**

Œdème de cornée.

Prévention des symblépharons en cas de brûlures ou traumatismes oculo-palpébraux d'origine thermique, caustique ou phototraumatique.

## COLLYRES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (AINS) (1)

## ■ Indométacine collyre

<b>INDOCOLLYRE</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	5 mL (fl.)	4,03	I	65 %	0,81
	20 unidoses 0,35 mL	3,91	I	65 %	0,20
	50 unidoses 0,35 mL	HOP	I		

## ■ Flurbiprofène

<b>OCUFEN</b>					
Solution à 0,03 % 1 gtte x 3 à 4/j	20 unidoses 0,4 mL (0,12 mg)	3,73	II	65 %	0,19
	50 unidoses 0,4 mL (0,12 mg)	7,75	II	65 %	0,16

## ■ Diclofénac collyre

<b>VOLTARÈNE collyre</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	20 unidoses 0,3 mL 0,1 %	HOP	II	NR	
	100 unidoses 0,3 mL 0,1 %		II		

## ■ Kétorolac

<b>ACULAR collyre</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	5 mL à 0,5 % (fl.)	3,49	I	65 %	0,70

## ■ Népafénaç

<b>NEVANAC collyre</b>					
1 gtte x 3/j	5 mL (fl.)		I	NR	

## ■ Bromfénac

<b>YELLOX</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL (flacon)	5,62	I	65 %	1,12

## CATARACTE (3)

### Techniques opératoires

#### ► Extraction du cristallin

Comme la plupart des interventions chirurgicales en ophtalmologie, l'extraction du cristallin est réalisée sous microscope opératoire.

L'extraction est extracapsulaire (EEC) ; le cristallin est retiré en laissant en place la capsule postérieure, ce qui permet d'implanter en chambre postérieure.

Il existe 2 techniques d'EEC :

- la phakoémulsification. C'est la technique de référence. Elle consiste à fragmenter et à aspirer le cristallin à l'aide d'ultrasons. Cette technique permet une ouverture cornéenne très petite donc une récupération visuelle rapide ;
- l'EEC manuelle. On la réserve aux cataractes très dures et très évoluées que les ultrasons n'arrivent pas à fragmenter. On retire le cristallin par une large ouverture cornéenne que l'on suturera en fin d'intervention.

#### ► Implantation

Un implant cristallinien dont la puissance a été préalablement mesurée, puisqu'elle est adaptée à chaque patient, est introduit dans l'œil à la place du cristallin.

Dans les cas exceptionnels où l'implantation n'est pas possible, la correction de l'aphakie doit être assurée par une lentille de contact (qui agrandit l'image de 10 %, avec problèmes de manipulation et de tolérance) ou par un verre correcteur en cas d'aphakie bilatérale (qui présente l'inconvénient d'agrandir l'image de 30 % et de rétrécir le champ visuel).

### Soins postopératoires

Le patient sort sous traitement par **collyres antibiotiques et anti-inflammatoires** (ex. : **CHIBRO-CADRON** 1 gtte x 3/j, **mydriatiques** (ex. : **MYDRIATICUM** 1 gtte x 3/j), **AINS** (ex. : **OCUFEN 0,03 %** x 4/j), ainsi que muni d'une coque protectrice sur l'œil opéré, à porter la nuit pendant 3 sem. Il doit éviter les efforts, les poids lourds et de se pencher en avant.

Il sera revu en consultation à J1, à 1 sem. et à 1 mois. Il faudra prévoir une correction optique lorsque la cornée aura cicatrisé (3 sem. pour une phakoémulsification, 3 mois pour une EEC manuelle). En cas de suture cornéenne, les fils seront retirés.

### Complications

#### ► Complications précoces

- Hypertonie : **DIAMOX** et **DIFFU-K**.
- Infection (endophtalmie) +++ ; complication redoutable ; son traitement doit être réalisé en urgence : hospitalisation, antibiothérapie après identification du germe si possible (PCA : ponction de chambre antérieure). Les antibiotiques sont administrés par injections intravitréennes (répétées tous les 2 j), ainsi que par voie IV et locale (collyres renforcés). Le pronostic visuel est réservé.

#### ► Complications tardives

- Décollement de rétine.
- Opacification secondaire de la capsule postérieure.
- Endophtalmie chronique.
- œdème maculaire cystoïde (syndrome d'Irvine-Gass).



**COLLYRES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (AINS) (2) –  
PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibant la production des prostaglandines de l'œil, utilisés pour réduire ainsi l'inflammation postopératoire.

**INDICATIONS**

Prévention de l'inflammation postopératoire, après intervention sur le segment antérieur (cataracte, trabéculéctomie) ; prévention de l'œdème maculaire cystoïde survenant après extraction de cataracte.

Aide à maintenir la mydriase peropératoire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants ; kératites herpétiques.

**Grossesse** : aucun effet malformatif n'a été signalé.

Contre-indication à partir du 6<sup>e</sup> mois : au cours du troisième trimestre, les **AINS** exposent le fœtus à une hypertension artérielle pulmonaire par fermeture prématurée du canal artériel et en fin de grossesse à un allongement du temps de saignement.

**Allaitement** : innocuité non démontrée.

Lentilles de contact : à éviter en raison du risque d'adsorption du chlorure de benzalkonium sur la lentille.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utiliser avec prudence en cas d'allergie à l'**aspirine** ou aux **AINS**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Brûlures et rougeurs oculaires.

## POMMADES CORTICOÏDES À USAGE OPHTHALMOLOGIQUE

### ■ Dexaméthasone + oxytétracycline

<b>STERDEX</b>						
1 à 3 appl./j	12 unidoses 1,6 mg	2,66	I	30 %	0,22	

### ■ Dexaméthasone + néomycine + polymyxine B

<b>MAXIDROL</b>						
1 à 2 appl./j	3 g (tube)	1,94	I	30 %	0,65	

### ■ Dexaméthasone + framycétine

<b>FRAKIDEX</b>						
1 à 3 appl./j	5 g (tube)	2,04	I	30 %	0,68	

#### PROPRIÉTÉS

Action anti-inflammatoire sur le segment antérieur de l'œil et ses annexes.

#### INDICATIONS

Blépharites, chalazions, orgelets.

#### CONTRE-INDICATIONS

Formelles :

- ulcère cornéen (risque de perforation) ;
- infection oculaire d'origine virale (en particulier herpès cornéen ou zona ophtalmique : aggravation de l'infection).

Hypersensibilité à l'un des composants.

**Grossesse** : pas d'étude contrôlée chez la femme enceinte.

**Allaitement** : passage systémique présent, possibilité de passage dans le lait maternel.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Retard de cicatrisation des plaies cornéennes et sclérales.

Aggravation des infections oculaires d'origine virale (herpès, zona).

Hypertonie oculaire : risque de glaucome cortisonique.

Risque de cataracte cortisonique (sous-capsulaire postérieure) lors des traitements prolongés.

Examen au biomicroscope préalable afin d'éliminer une contre-indication au traitement.

Surveillance de la pression intraoculaire (risque d'augmentation) et du cristallin (produit cataractogène) en cas de traitement prolongé.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX (1) – COLLYRES (1)

## Fluoroquinolones

## ■ Norfloxacin

<b>CHIBROXINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,76	I	65 %	0,75

## ■ Ofloxacin

<b>EXOCINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,64	I	65 %	0,73
<b>MONOOX</b>					
2 gttes/œil x 4/j	20 unidoses 0,5 mL 1,5 mg	3,87	I	65 %	0,19
<b>QUINOFREE</b>					
Idem <b>MONOOX</b>	20 unidoses 0,5 mL 1,5 mg	3,87	I	65 %	0,19

## ■ Ciprofloxacin

<b>CILOXAN</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL 0,3 % collyre	5,03	I	65 %	1,01

## CONJONCTIVITES (2)

### Conjonctivites virales

Ce sont les plus fréquentes des conjonctivites infectieuses.

Souvent, il existe une adénopathie prétragienne satellite.

#### ► Conjonctivites à adénovirus

Les *adénovirus* entraînent non seulement une conjonctivite, mais aussi une atteinte cornéenne : on parle donc de kératoconjonctivites épidémiques. Elles sont extrêmement contagieuses, en général bénignes, mais peuvent laisser des séquelles cornéennes (nodules sous-épithéliaux).

- Nettoyage des sécrétions : sérum physiologique en unidoses.

- Aucun traitement antiviral n'a réellement fait ses preuves contre l'adénovirus.

- Les **antibiotiques** ne font qu'éviter une surinfection bactérienne.

Ex. : **RIFAMYCINE CHIBRET collyre** 1 gte x 8/j pendant 48 h puis x 4/j ± **RIFAMYCINE CHIBRET pommade** au coucher pour une durée totale de 10 j.

- **Cicatrisants cornéens** en cas d'atteinte épithéliale.

Ex. : cyanocobalamine à 0,05 % (**VITAMINE B12 ALLERGAN collyre**) 1 gte x 4/j + **rétinol (VITAMINE A DULCIS pommade OPH)** 1 application au coucher.

- Agents mouillants : **CELLUVISC unidoses** 1 dose x 6/j.

- Les **collyres corticoïdes** sont à éviter +++ : même s'ils font rapidement diminuer la rougeur oculaire, ils prolongent la réplication virale et donc la période conta-

gieuse. Ils peuvent être nécessaires de façon différée en cas de nodules sous-épithéliaux séquellaires.

L'usage des **collyres corticoïdes** doit être strictement réservé aux ophtalmologistes, qui seuls, peuvent examiner le patient à la lampe à fente et assurer le diagnostic et la surveillance du traitement. En cas d'erreur diagnostique avec une infection herpétique, leur prescription peut faire flamber une kératoconjonctivite à herpès +++.

#### ► Conjonctivites herpétiques

L'*herpès* est responsable de kératoconjonctivites par primo-infection ou récurrence herpétique. Il peut s'associer à des vésicules herpétiques sur les paupières.

- Stade débutant : atteinte épithéliale de forme caractéristique en feuille de fougère. Le traitement repose sur l'**aciclovir (ZOVIRAX pommade OPH)** : 1 application x 5/j jusqu'à 3 j après la cicatrisation ou **valaciclovir (ZELITREX)** 1 cp. x 3/j.

- Stade stromal : atteinte sévère avec opacification, œdème cornéen. Il se complique d'endothélite et d'uvéite antérieure. Le pronostic est plus sévère, le traitement plus fort et prolongé (**ZELITREX** 2 cp. x 3/j).

### Conjonctivites du nouveau-né et du nourrisson

La conjonctivite du 3<sup>e</sup> j après la naissance évoque le gonocoque ; à partir du 5<sup>e</sup> j, il s'agit plus souvent d'une conjonctivite à inclusions.

Chez le nourrisson, il faut penser à une imperforation des voies lacrymales.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX (2) – COLLYRES (2)

### Aminosides

#### ■ Tobramycine

<b>TOBREX</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	3,27	I	65 %	0,65
<b>TOBRABACT</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	5 mL (fl.)	2,42	I	65 %	0,48

#### ■ Néomycine + polymyxine B

<b>CÉBÉMYXINE</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	10 mL (fl.)	2,89	I	30 %	0,29

### Autres

#### ■ Rifamycine collyre

<b>RIFAMYCINE CHIBRET</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	10 mL (fl.)	3,27	I	65 %	0,33

#### ■ Acide fusidique

<b>FUCITHALMIC</b>					
1 gtte x 2/j	3 g (tube)	3,46	I	65 %	1,15

#### ■ Azithromycine

<b>AZYTER</b>					
1 gtte x 2/j	6 unidoses (15 mg/g)	6,00	I	65 %	1,00

#### ■ Céfuroxime sodique

<b>APROKAM</b>					
1 mg (0,1 mL) en 1 fois Voie intraoculaire Cataracte : traitement postopératoire	1 fl. pdre pour sol. inj. 50 mg <b>céfuroxime</b> base	HOP	I		
	10 fl. pdre pour sol. inj. 50 mg <b>céfuroxime</b> base	HOP	I		

### Association d'antibiotique et d'anti-inflammatoire

#### ■ Gentamicine + indométacine

<b>INDOBIOTIC</b>					
1 gtte x 4/j	5 mL (fl.)	3,81	I	65 %	0,76
	20 gttes 0,01 %	3,73	I	65 %	0,19

## CONJONCTIVITES (3)

### Conjonctivites allergiques

Très fréquentes, elles surviennent sur un terrain allergique (asthme, rhume des foins, urticaire, eczéma), récidivent le plus souvent au printemps (pollens).

On retrouve souvent un prurit. À l'examen, en plus de l'hyperhémie conjonctivale, il existe une hyperplasie papillaire (surélévation centrée par un vaisseau) ou folliculaire (surélévation bordée de vaisseaux) en retournant la paupière supérieure.

#### Prise en charge

- Elles nécessitent une éviction de l'allergène s'il est identifié, avec éventuellement désensibilisation générale.
- Bilan allergologique :
- consultation chez l'allergologue ;

– bilan sanguin : HES (hyperéosinophilie sanguine), IgE totales et spécifiques ;

– prick-tests ;

– exploration dans les larmes : HES, IgE.

• **Collyre antiallergique : cromoglycate de sodium (CROMABAK)** 1 gtte x 4/j pendant 1 mois.

• **Collyre corticoïde + antibiotique, hydrocortisone + colistine + bacitracine (BACICOLINE à la bacitracine)** 1 gtte x 4/j 10 j, puis x 2/j pendant 10 j, puis arrêt.

• **Antihistaminique H<sub>1</sub>** par voie générale à associer si les signes cliniques sont importants.

Ex. : **cétirizine (XYZALL)** 1 cp. le soir pendant 1 mois.

On distingue 5 formes de conjonctivites allergiques de mécanismes, formes cliniques et pronostic différents :

Conjonctivite allergique saisonnière : CAS	Par allergie aux pollens (graminées ou arbres), au printemps ; bon pronostic
Conjonctivite allergique perannuelle : CAP	Par allergie à des allergènes présents toute l'année (moisissures, poils d'animaux, acariens) ; bon pronostic
Kératoconjonctivite vernale	Enfant < 10 ans, atteinte coméenne ; le plus souvent, guérison à la puberté
Kératoconjonctivite atopique	Adulte entre 20 et 40 ans, atteinte coméenne parfois sévère +++ ; mauvais pronostic
Kératoconjonctivite géantopapillaire (KGC)	Porteurs de lentilles de contact ou de prothèses oculaires ; bon pronostic au retrait des lentilles de contact, ou sinon modification de l'adaptation ou du produit d'entretien

### Conjonctivites par sécheresse oculaire

Ce sont des conjonctivites chroniques bilatérales. Le diagnostic est fait par le test de Schirmer.

• Larmes artificielles (**UNILARM**) 1 gtte x 4 à 8/j au long cours.

• Agents mouillants à haute viscosité, **carmellose sodique (CELLUVISC unidoses)** 1 gtte x 2 à 8/j.

## ANTIBIOTIQUES LOCAUX (3) – POMMADES

## ■ Tobramycine

<b>TOBREX</b>					
1 à 3 appl./j dont 1 le soir	1 fl. (tube) 5 mL	3,27	I	65 %	3,27

## ■ Néomycine + polymyxine B

<b>CÉBÉMYXINE</b>					
1 à 3 appl./j dont 1 le soir	5 g (tube)	2,15	I	30 %	0,43

## ■ Rifamycine

<b>RIFAMYCINE CHIBRET</b>					
1 à 3 appl./j dont 1 le soir	5 g (tube)	2,70	I	65 %	0,54

## ■ Ciprofloxacine

<b>CILOXAN</b>					
3 appl./j	3,5 g (tube) 0,3 %	5,22	I	65 %	1,49

## PROPRIÉTÉS

Les collyres et les pommades antibiotiques ont une action antibactérienne de surface (segment antérieur de l'œil), du fait de la faible résorption intraoculaire par la cornée.

Le choix de l'antibiotique doit être adapté au germe en cause ; on s'aidera d'un prélèvement bactériologique avec antibiogramme pour confirmer l'indication thérapeutique.

## INDICATIONS

Infections bactériennes du segment antérieur de l'œil et de ses annexes : conjonctivites, kératites, ulcères cornéens, dacryocystites, blépharites, orgelets ; infections postopératoires et post-traumatiques.

Kératites virales, en association avec les antiviraux : adénovirus, herpès, zona.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie connue à l'un des constituants.  
Lentilles de contact : d'une manière générale, retirer absolument les lentilles de contact lors

de toute infection oculaire ++++. De plus, la **rifamycine** est contre-indiquée en cas de lentilles souples car elle les colore en rouge de façon irréversible. Tous les autres **collyres antibiotiques** sont contre-indiqués en raison du risque d'adsorption sur la lentille souple de certains composants du collyre (chlorure de benzalkonium ou borate de phénylmercure).

**Grossesse et allaitement** : **fluoroquinolones** déconseillées (absence d'études contrôlées).

De plus allongement du temps de saignement chez la mère et l'enfant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insister auprès du patient sur la nécessité d'instillations répétées : x 6/j pendant 48 h puis x 4/j pendant 12 j ; exemple : **rifamycine** collyre : x 6/j pendant 48 h, puis x 4/j pendant encore 12 j.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions locales allergiques, notamment avec la **néomycine**.

Possibilité de sélection de souches résistantes.

## COLLYRES ANTIALLERGIQUES (1)

## ■ Lodoxamide

<b>ALMIDE</b>					
1 à 2 gttes/œil x 2 à 4/j	5 mL (fl.) 0,1 %	4,34		30 %	0,87
	20 unidoses 0,4 mL 0,1 %	3,59		30 %	0,18

## ■ Cromoglycate de sodium

<b>CROMOPTIC</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	30 unidoses 0,35 mL 2 % 10 mL (fl.) 2 %	4,39 7,03		30 % 30 %	0,15 0,70
<b>CROMÉDIL</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	30 unidoses 0,3 mL 2 %	4,39		30 %	0,15
<b>CROMABAK</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 mL (fl.) 2 %	7,60		30 %	0,76
<b>OPHTACALM</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 unidoses 0,35 mL 2 %			NR	
<b>MULTICROM</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 unidoses 0,3 mL 2 % 10 mL (fl.) 2 %	7,16		NR 30 %	0,72
<b>CROMADOSES</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	30 unidoses 0,3 mL 2 %	4,39		30 %	0,15
<b>HUMEX CONJONCTIVITE ALLERGIQUE</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 unidoses 0,3 mL 2 %			NR	
<b>OPTICRON</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	5 mL (fl.) 2 % 10 unidoses 0,35 mL 2 % 24 unidoses 0,35 mL 2 %	3,32  3,67		30 % NR 30 %	0,66  0,15
<b>OPHTACALMFREE</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 mL (fl.) 2 %			NR	
<b>CROMOFREE</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 mL (fl.) 2 %	6,67		30 %	0,67
<b>ALLERGOCOMOD</b>					
1 gtte/cœil x 2 à 6/j	10 mL (fl.) 2 %	7,24		30 %	0,72



## COLLYRES ANTIALLERGIQUES (2)

## ■ Acide N-acétyl-aspartyl-glutamique

<b>NAABAK</b>					
1 gttte/œil x 2 à 6/j	10 mL (fl.) 4,9 %	6,75		30 %	0,68
<b>NAAXIA</b>					
1 gttte/œil x 2 à 6/j	5 mL (fl.) 4,9 %			NR	
	10 unidoses 0,4 mL 4,9 %			NR	
	36 unidoses 0,4 mL 4,9 %	5,08		30 %	0,14
	10 mL (fl.) 4,9 %	6,54		30 %	0,65

La pharmacologie des **collyres antiallergiques** est regroupée avec celle des antihistaminiques H<sub>1</sub>.

ANTIHISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (ANTI-H<sub>1</sub>) (1)

## ■ Lévocabastine

<b>LEVOPHTA</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	5 mL (fl.)	7,41	II	30 %	1,48
<b>ALLERGIFLASH</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	10 unidoses			NR	
<b>LEVOFREE</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	30 unidoses	4,39	II	30 %	0,15

## ■ Kétotifène

<b>ZALERG</b>					
Collyre à 0,25 mg/mL	5 mL (fl.)	6,15	II	30 %	1,23
1 gtte x 2/j	30 unidoses 0,4 mL	4,39	II	30 %	0,15
<b>MONOKÉTO</b>					
Collyre à 0,25 mg/mL	60 unidoses 0,4 mL	7,64	II	30 %	0,13
1 gtte x 2/j					

## ■ Olopatadine

<b>OPATANOL</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL (fl.) 0,5 mg/mL	7,03	I	30 %	1,41

**ANTI-HISTAMINIQUES H<sub>1</sub> (ANTI-H<sub>1</sub>) (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Inhibition de la dégranulation des mastocytes à l'origine de la libération des médiateurs chimiques de l'allergie (**cromoglycate de sodium, acide N-acétyl aspartyl glutamique**).

Inhibition de la migration des éosinophiles impliqués à la phase tardive de la réaction allergique (**lodoxamide**).

Action antihistaminique (**lévocabastine**).

Blocage de l'activation du complément, inhibition de la synthèse des leucotriènes par les cellules sensibilisées, **acide N-acétyl aspartyl glutamique**.

**INDICATIONS**

Affections ophtalmologiques d'origine allergique (conjonctivites, blépharites).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Par analogie avec les anti-H<sub>1</sub> par voie générale, association déconseillée avec l'alcool, car possible majoration de l'effet sédatif.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non établie du **lodoxamide** et de la **lévocabastine**.

D'une façon générale, privilégier les collyres sans conservateur (formes unidoses, **CROMABAK**, **NAABAK**, **ZALERG**) qui sont moins agressifs pour la surface cornéenne et les seuls autorisés en cas de port de lentilles de contacts.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Picotements, brûlures, larmolement, prurit.

## ANTISEPTIQUES POUR LAVAGE OCULAIRE (1) – COLLYRES

## ■ Picloxydine

<b>VITABACT</b>					
(sans benzalkonium) 1 gtte x 2 à 6/j	10 unidoses 0,4 mL 100 unidoses 0,4 mL 10 mL (fl.)	2,03		NR NR 30 %	0,20

## ■ Hexamidine

<b>DÉSOMÉDINE</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.) 10 unidoses 0,6 mL			NR NR	

## ■ Céthexonium

<b>BIOCIDAN</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.)	2,46		30 %	0,25
<b>MONOSEPT</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	30 unidoses 0,4 mL	3,86		65 %	0,13

## ■ Cétalpyridinium chlorure

<b>NOVOPTINE</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.) 10 unidoses 0,4 mL			NR NR	

## ■ Acide acétylsalicylique

<b>ANTALYRE</b>					
Antiseptique et vasoconstricteur 1 gtte x 4 à 6/j	10 unidoses 0,4 mL			NR	

## ANTISEPTIQUES POUR LAVAGE OCULAIRE (2) – SOLUTÉS (1)

### ■ Acide borique + borate de sodium

<b>DACRYOSÉRUM</b>					
Lavage oculaire 1 à 4/j	20 unidoses 5 mL	2,92		30 %	0,15
	150 mL (fl.)	3,02		30 %	0,02

### ■ Acide borique + borax

<b>DACUDOSSES</b>					
(sans conservateur) Lavage oculaire 1 à 4/j	16 unidoses 10 mL			NR	
	24 unidoses 10 mL	3,40		30 %	0,14

### ■ Acide borique + chlorobutanol + éthanol

<b>OPTREX</b>					
Lavage oculaire 1 à 4/j	190 mL (fl.) avec embout			NR	

**ANTISEPTIQUES POUR LAVAGE OCULAIRE (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Collyres : action antiseptique.

Solutés : isotoniques aux larmes, action décongestionnante et antiseptique.

**INDICATIONS**

Collyres antiseptiques : irritations conjonctivales, conjonctivites, kératites, blépharites, orgelets, chalazions.

Solutés antiseptiques : irritation des paupières, nettoyage des sécrétions dans les conjonctivites, blépharites.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'un des constituants.

Lentilles de contact : le port de lentilles souples doit être évité pendant toute la durée d'un traitement contenant un conservateur (toutes les présentations en flacon) en raison du risque d'adsorption. En revanche, les unidoses sont autorisées (pas de conservateur).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réaction allergique locale.

## COLLYRES OU GELS POUR ŒIL SEC (1) – SOLUTIONS AQUEUSES

## ■ Hydroxypropylcellulose

<b>LARMABAK</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	10 mL (fl.)	4,53		65 %	0,45
<b>UNILARM</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	20 unidoses 0,65 mL			NR	

## COLLYRES OU GELS POUR ŒIL SEC (2) – SOLUTIONS VISQUEUSES À FAIBLE VISCOSITÉ

## ■ Povidone

<b>REFRESH</b>					
1 gtte x 4 à 8/j	30 unidoses 0,4 mL	3,86		65 %	0,13
	90 unidoses 0,4 mL	9,58		65 %	0,11
<b>NUTRIVISC</b>					
Solution à 5 %	5 unidoses 0,4 mL			NR	
1 gtte x 2 à 4/j	30 unidoses 0,4 mL	3,86		65 %	0,13
Avec conservateur	10 mL (fl.)	3,08		65 %	0,31
1 gtte x 2 à 4/j					
<b>FLUIDABAK</b>					
Solution à 1,5 %	10 mL (fl.)	4,53		65 %	0,45
4 à 6 appl./j					
<b>UNIFLUID</b>					
2 gttes x 4 à 6/j	36 unidoses 6 mg/0,4 mL	4,45		65 %	0,12

## ■ Povidone + thiomersalate

<b>DULCILARMES</b>					
Avec conservateur	10 mL (fl.)	2,08		65 %	0,21
1 gtte x 2 à 4/j					

## ■ Hypromellose

<b>ARTELAC</b>					
4 à 6 appl./j	60 unidoses 0,5 mL	6,89		65 %	0,11

## ■ Carbone

<b>AQUAREST</b>					
1 gtte x 3 à 5/j	60 unidoses 6 mg	6,89		65 %	0,11

## COLLYRES OU GELS POUR ŒIL SEC (3) – SOLUTIONS VISQUEUSES À HAUTE VISCOSITÉ

### ■ Carbomère 974 P (ou carbopol 974 P)

<b>GEL-LARMES</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	30 unidoses 0,5 g	4,39		65 %	0,15
Avec conservateur	10 g (tube)	3,94		65 %	0,39
1 gtte x 2 à 4/j					
<b>LACRYVISC</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	30 unidoses 0,5 g	4,39		65 %	0,15
Avec conservateur	5 g (tube)	2,82		65 %	0,56
1 gtte x 2 à 4/j	15 g (tube)	5,24		65 %	0,35
<b>SICCAFLUID</b>					
1 à 4 appl./j	10 g (fl.) 2,5 mg/g	3,62		65 %	0,36

### ■ Carmellose sodique

<b>CELLUVISC</b>					
1 gtte x 2 à 4/j	30 unidoses 0,4 mL	3,86		65 %	0,13
	90 unidoses 0,4 mL	9,58		65 %	0,11

### ■ Carbopol 980 NF + cétrimide

<b>LACRIGEL</b>					
Avec conservateur	10 g (tube)	3,94		65 %	0,39
1 gtte x 2 à 4/j					
<b>CIVIGEL</b>					
Avec conservateur	10 g (tube) 0,2%	3,35		65 %	0,34
1 gtte x 2 à 4/j					

### ■ Carbopol 980 + cétrimide

<b>LACRIFLUID</b>					
Avec conservateur	10 g (fl.)	3,62		65 %	0,36
1 gtte x 3/j	60 unidoses 0,4 g	6,89		65 %	0,11

### ■ Carbopol 980 + benzalkonium

<b>LACRINORM</b>					
Avec conservateur	10 g (tube)	3,62		65 %	0,36
1 gtte x 2 à 4/j					

### ■ Carbomère 980

<b>LIPOSIC</b>					
3 à 5 appl./j	10 g (tube)	3,22		65 %	0,32



## COLLYRES OU GELS POUR ŒIL SEC (4) – INSERTS

## ■ Hydroxypropylcellulose

<b>LACRISERT</b>					
1 insert dans chaque œil/24 h À renouveler 1 ou 2 fois si nécessaire	60 inserts			NR	

## COLLYRES OU GELS POUR ŒIL SEC (5) – POMMADE

## ■ Rétinol

<b>VITAMINE A DULCIS</b>					
1 à 3 appl./j dont 1 le soir au coucher	10 g (tube)	5,48		30 %	0,55

**PROPRIÉTÉS**

Ils remplacent les larmes en cas de syndrome sec authentifié par le test de Schirmer ; ils préviennent ainsi les complications de la sécheresse oculaire : picotements, kératites, conjonctivites.

**INDICATIONS**

Tous les syndromes secs, quelles que soient leurs causes : syndrome de Gougerot-Sjögren, maladies systémiques, médicaments.

Les produits à base d'acide hyaluronique et les inserts sont à réserver aux syndromes secs graves.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il faut répéter les instillations, en raison du temps de rétention court de ces produits, sur-

tout avec les collyres, ce qui décourage souvent les patients. Les gels peuvent être appliqués moins souvent, mais entraînent un brouillard visuel gênant, lié à leur viscosité.

Lentilles de contact : seuls les collyres dépourvus de conservateur sont autorisés.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Brouillard visuel avec les gels.

D'une manière générale, il est recommandé d'utiliser les formes unidoses ou ABAK qui sont sans conservateur pour éviter la toxicité des conservateurs sur la surface oculaire.

## MOLECULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (1) – PAR VOIE INTRAVITRÉENNE (1)

### ■ Ranibizumab

<b>LUCENTIS</b>					
1 IVT de 0,5 mg tous les mois	1 sol. inj. 10 mg	895,57	I	100 %	895,57

### ■ Pégaptanib

<b>MACUGEN</b>					
1 IVT de 0,3 mg toutes les 6 sem.	1 sol. inj. 0,3 mg	744,59	I	100 %	744,59

#### PROPRIÉTÉS

Le VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*) joue un rôle majeur dans le développement des néovaisseaux choroïdiens. Il se lie aux cellules endothéliales pour stimuler l'angiogenèse et augmenter la perméabilité vasculaire.

Le **pégaptanib (MACUGEN)** se lie spécifiquement au VEGF, et empêche ainsi sa fixation sur les récepteurs endothéliaux : il inhibe la croissance des néovaisseaux anormaux, mais empêche aussi la diffusion des néovaisseaux au sein de la rétine.

Le **ranibizumab (LUCENTIS)** est un fragment d'anticorps spécifique du VEGF, auquel il se lie pour bloquer son action et ainsi inhiber l'angiogenèse.

#### INDICATIONS

- Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
- Baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique.
- Baisse visuelle due à l'œdème maculaire lié à une occlusion de la veine centrale de la rétine ou de branche veineuse rétinienne.

#### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Flacons à usage unique réservé à la voie intravitréenne.

**LUCENTIS** et **MACUGEN** doivent être administrés par un ophtalmologiste qualifié ayant l'expérience des injections intravitréennes.

La dose recommandée de **LUCENTIS** est de 0,5 mg (0,05 mL). Le traitement commence par une phase d'induction avec 1 inj./mois pendant 3 mois consécutifs, suivie d'une phase de maintien au cours de laquelle l'acuité visuelle des patients sera contrôlée une fois/mois.

La dose recommandée de **MACUGEN** est de 0,3 mg. Il doit être administré toutes les 6 sem. (9 inj./an) par injection intravitréenne dans l'œil atteint.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Administrer par voie intravitréenne stricte.

Des techniques d'injection aseptiques appropriées doivent toujours être utilisées lors de l'administration de **LUCENTIS** +++++ :

– Avant le traitement, le patient doit être informé qu'il doit s'auto-administrer un collyre antibactérien (x 4/j) pendant 3 j avant et après chaque injection).

– La procédure d'injection doit être réalisée en conditions d'asepsie, incluant la désinfection chirurgicale des mains, le port de gants stériles, l'utilisation d'un champ stérile et d'un spéculum à paupières stérile.

– La peau autour de l'œil, la paupière et la surface oculaire doivent être désinfectées et une anesthésie appropriée et un antibactérien local à large spectre doivent être administrés avant l'injection.

– L'aiguille pour injection doit être introduite 3,5-4,0 mm en arrière du limbe dans la cavité vitréenne, en évitant le méridien horizontal et en visant le milieu du globe oculaire. Le volume de 0,05 mL peut alors être injecté ; un point d'injection scléral différent doit être utilisé lors des injections ultérieures.

Surveillance des patients au cours de la semaine suivant l'injection pour permettre un traitement précoce en cas d'infection. Ils doivent être informés que tout symptôme évocateur d'une endophtalmie ou de l'un des événements mentionnés ci-dessous doit être signalé sans délai.

Surveillance ophtalmologique x 1/mois pendant le traitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : céphalées, hémorragie conjonctivale, douleur oculaire, corps flottant du vitré, hémorragie rétinienne, augmentation de la pression intraoculaire.

Endophtalmies.

Inflammation intraoculaires.

Décollement rhéomatogène de la rétine, déchirures de la rétine liés à la procédure d'injection. Cataractes traumatiques iatrogènes, etc.

**DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (2)****Traitements [1] - uniquement pour la forme néovasculaire****Mesures hygiénodietétiques**

- Arrêt du tabac +++ ; dépistage des facteurs de risque cardiovasculaires.
- Alimentation riche en fruits, légumes verts, poissons gras, noix.
- Compléments alimentaires :
  - antioxydants ;
  - acides gras de type oméga-3 ;
  - lutéine.
- Activité physique régulière.

**Injections intravitréennes d'anti-VEGF****► Indications et posologie**

Ce type de traitement a révolutionné la prise en charge et le pronostic des DMLA. Dès que le diagnostic de DMLA exsudative rétrofovolaire est posé, il est recommandé d'instaurer, le plus précocement possible, un traitement par **anti-VEGF**, quel que soit le niveau d'acuité visuelle initial. Les **anticorps anti-VEGF injectés par voie intravitréenne** (par ex. **ranibizumab**, **LUCENTIS**) ont des propriétés antiangiogéniques. Elles agissent en bloquant la néovascularisation et la perméabilité des néovaisseaux. Les phénomènes exsudatifs régressent et les gains d'acuité visuelle deviennent une réalité : à 2 ans, on observe 90 % de stabilisation et 30 % d'amélioration.

En pratique, le traitement est initié par une phase d'induction, suivie d'une phase de maintien :

- phase d'induction, le plus précocement possible : 1 inj. de 0,5 mg (0,05 mL) de **LUCENTIS** par mois pendant 3 mois consécutifs ;
- phase de maintien : le rythme d'injection est adapté à la situation ophtalmologique du patient : il est indispensable de **réexaminer le patient chaque mois**, afin de le retraiter dès l'apparition d'une récurrence (l'effet du produit est transitoire).

En moyenne, un patient recevra 5 à 6 injections intravitréennes la première année.

**► Critères d'arrêt du traitement*****Suspension temporairement du traitement par un anti-VEGF***

Il n'y a plus de signes d'activité de la lésion néovasculaire. La lésion est considérée comme inactive si :

- absence de diffusion sur l'angiographie à la fluorescéine ou autre signe d'activité de la maladie ;
- absence d'augmentation de la taille de la lésion ;
- absence de nouvelle hémorragie ;
- absence d'exsudats ;
- absence de réapparition ou d'aggravation de signes d'activité néovasculaire en tomographie par cohérence optique ;
- absence de nouvelle augmentation de taille de la lésion ou de nouveaux signes d'activité de la maladie depuis une interruption récente de traitement ;
- absence de baisse d'acuité visuelle attribuable à l'activité néovasculaire ;
- effets indésirables du traitement.

En l'absence de ces critères, la poursuite du traitement peut être envisagée en cas de récurrences antérieures lors de la suspension du traitement.

***Arrêt définitif du traitement anti-VEGF***

- Réaction d'hypersensibilité suspectée ou établie : changer d'**anti-VEGF** ou à défaut photothérapie dynamique.
- Meilleure acuité visuelle corrigée inférieure à 15 lettres sur l'échelle ETDRS dans l'œil traité lors de deux visites consécutives, attribuable à la DMLA.
- Diminution de l'acuité visuelle de 30 lettres ou plus comparée à l'acuité visuelle de base et/ou à la meilleure acuité notée depuis le départ (en l'absence d'hématome sous-rétinien, de déchirure de l'épithélium pigmentaire) car cela peut traduire une inefficacité du traitement et/ou un effet indésirable.
- Signes de détérioration morphologique de la lésion malgré un traitement optimal : augmentation progressive de la taille de la lésion en angiographie à la fluorescéine, aggravation des signes d'activité en tomographie en cohérence optique.

## MOLÉCULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (2) – PAR VOIE INTRAVITRÉENNE (2)

### ■ Aflibercept

EYLÉA					
Injection intravitréenne 2 mg x 1/mois pendant 3 mois puis 20 mg tous les 2 mois.	100 µL (fl.) 40 mg/mL	810,12	I	100 %	8,10

#### PROPRIÉTÉS

Protéine de fusion recombinante qui se lie au VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*), inhibant la liaison à ses récepteurs à la surface des cellules endothéliales.

#### INDICATIONS

Traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**aflibercept** ou à l'un des excipients.

Inflammation ou infection oculaire/périoculaire, avérée ou suspectée.

Sujet à risque de décollement rétinien.

Trous maculaires de stades 3 et 4.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Glaucome, rétinopathie : utiliser avec prudence, surveillance ophtalmologique.

Interruption de traitement pendant les 28 j précédant ou suivant une chirurgie intraoculaire.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Endophtalmie liée à l'injection intravitréenne.

Élévation de la pression intraoculaire.

Immunogénicité : inflammation, photophobie, douleur.

Hémorragie intraoculaire.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune étude réalisée. Prudence.

## DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA) (3)

### Photothérapie dynamique

Elle est supplantée par les **injections intravitréennes d'anti-VEGF**. La photothérapie dynamique ne permet qu'exceptionnellement une amélioration de l'acuité visuelle. On l'utilise en cas de contre-indication ou de non-réponse aux anti-VEGF. Le principe est d'injecter par voie intraveineuse un colorant (la **vertéporphine**) qui sensibilise l'endothélium des lésions néovasculaires. Ce colorant est ensuite activé par un laser non thermique pour obtenir l'occlusion des lésions.

### Photocoagulation au laser

La photocoagulation au laser a perdu de son intérêt et est réservée aux néovascularisations choroïdiennes extrafovéolaires (à distance du centre de la fovéola) : le traitement consiste à envoyer un rayon

lumineux de haute énergie, qui traverse l'œil du patient de façon à détruire les néovaisseaux sous-rétiniens avant qu'ils n'aient détruit toute la rétine. Les récurrences sont fréquentes.

### Photocoagulation périfovéolaire

Elle est réservée aux lésions évoluées, de grande taille, avec une acuité visuelle  $< 1/10$ .

Elle permet d'effectuer un barrage efficace à l'extension des lésions, et donc de limiter la taille du scotome perçu par le patient.

### Chirurgie

Elle est aujourd'hui réservée à l'évacuation d'un hématorne sous-rétinien maculaire et doit être réalisée très rapidement : dans les 7 j qui suivent la survenue de l'hématorne.

## MOLÉCULES À ACTION ANTIANGIOGÉNIQUE (3) – PAR VOIE INTRAVEINEUSE

### ■ Vertéporfine

VISUDYNE					
1 <sup>re</sup> étape : perfusion IV pdt 10 min, à la dose de 6 mg/m <sup>2</sup> de surface corporelle, diluée dans 30 mL de solution pour perfusion	15 mg (fl.)	1209,96	I	100 %	80,66
2 <sup>e</sup> étape, 15 min après le début de la perfusion : activation de <b>VISUDYNE</b> par une lumière rouge non thermique (laser diode) pendant 83 s					

**VISUDYNE ne doit être utilisée que par des ophtalmologistes expérimentés dans la prise en charge des patients ayant une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou une myopie forte.**

### PROPRIÉTÉS

La thérapie photodynamique (PDT) utilise l'énergie lumineuse pour activer un photosensibilisant en présence d'oxygène.

La première étape consiste en l'injection IV d'un photosensibilisant, la **vertéporfine (VISUDYNE)**, qui se fixe dans les néovaisseaux choroïdiens.

La seconde étape consiste en l'activation de ce photosensibilisant par une lumière du proche infrarouge, peu intense, ce qui libère des radicaux libres dont la concentration prédomine au niveau de la paroi des néovaisseaux choroïdiens, provoquant une lésion de la paroi et des phénomènes de thromboses.

L'intérêt de cette technique repose sur la sélectivité du traitement des néovaisseaux sans lésion de la rétine sus-jacente.

### INDICATIONS

Dégénérescence maculaire liée à l'âge avec :

- une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire à prédominance visible ;

- une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire occulte montrant des signes d'évolution récente ou en cours de la maladie.

Néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire due à la myopie forte.

### CONTRE-INDICATIONS

Porphyrie.

Hypersensibilité connue à la **vertéporfine** ou à l'un des excipients.

Insuffisance hépatique grave.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Les patients traités par VISUDYNE restent photosensibles pendant les 48 h qui suivent la perfusion ++++. Pendant cette période, ils ne doivent pas s'exposer au soleil, ni aller chez le coiffeur, éviter les lampes halogènes de forte**

intensité ou les lampes scialytiques puissantes des blocs opératoires ou des cabinets dentaires. Protection par des vêtements à manches longues, et des lunettes de soleil spéciales haute protection qui leur sont remises à l'issue de la séance. Les écrans solaires UV ne sont pas efficaces contre les réactions de photosensibilisation. La lumière intérieure ambiante est sans danger.

L'extravasation de **VISUDYNE** peut provoquer de vives douleurs, une inflammation, un œdème, la formation de vésicules ou un changement de coloration au site d'injection, en particulier si la zone affectée est exposée à la lumière. En cas d'extravasation, la perfusion doit être interrompue immédiatement.

Surveillance médicale étroite pendant la perfusion.

### EFFETS INDÉSIRABLES

- Oculaires, fréquents (1 à 10 %) : vision anormale telle que vision trouble, floue, brouillée ou flashes lumineux, diminution de l'acuité visuelle, altérations du champ visuel telles que halos gris ou noirs, scotomes et taches noirs.

- Au point d'injection, fréquents (1 à 10 %) : douleur, œdème, inflammation, extravasation.

- Systémiques : douleur liée à la perfusion principalement au niveau des lombaires, nausées, réaction de photosensibilisation, asthénie et hypercholestérolémie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**VISUDYNE** précipite en solution saline : ne pas utiliser de sérum physiologique ou d'autres solutions injectables.

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments, à l'exception de ceux mentionnés en modalités de manipulation.

## ANTIGLAUCOMATEUX PAR VOIE GÉNÉRALE

## ■ Acétazolamide

<b>DIAMOX</b>					
A. : 1/4 à 1 cp. x 3/j	24 cp. 250 mg	5,22	I	65 %	0,22
E. : 5 à 10 mg/kg/j en 3 prises					
A. : 1 à 2 g/j en IVL	1 fl. (500 mg) IV	15,18	I	65 %	0,16
E. : 5 à 10 mg/kg/j en IVL					

**PROPRIÉTÉS**

Hypotonisant oculaire : il diminue la formation d'humeur aqueuse en inhibant l'anhydrase carbonique au niveau du corps ciliaire.

Au niveau du tubule rénal, augmentation de l'élimination urinaire de sodium, de potassium, et de bicarbonates.

**INDICATIONS**

- Les formes injectables sont utilisées dans la crise aiguë de glaucome par fermeture de l'angle en traitement d'attaque ; ce n'est qu'après 30 min qu'on débute le traitement par les collyres myotiques (**ISOPTO-PILOCARPINE**).
- Le **DIAMOX** en comprimés est prescrit :
  - dans la crise de GAFA en relais au **DIAMOX** IV ;
  - dans le glaucome chronique, en cas d'hypertonie oculaire non équilibrée par les **collyres antiglaucmateux**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Antécédents de colique néphrétique, hypokaliémie non contrôlée.

## ■ Mannitol

<b>MANNITOL MACOPHARMA</b>					
Crise de GAFA chez l'adulte : 250 mL en 30 min	250 mL 10 % (fl.)	HOP			
A. : 500 mL/j	500 mL 10 % (fl.)	HOP			
	250 mL 20 % (fl.)	HOP			
	500 mL 20 % (fl.)	HOP			
	1 L 20 % (fl.)	HOP			

**PROPRIÉTÉS**

Solution hypertonique entraînant une déshydratation du vitré par effet osmotique, diminuant ainsi la pression intraoculaire.

**INDICATIONS**

Hypertension intraoculaire.

Insuffisance hépatique ou rénale grave.

Insuffisance surrénale grave.

**Grossesse** : effet tératogène chez l'animal.

**Allaitement** : passage dans le lait maternel ; aucun effet nocif rapporté chez le nourrisson.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prévenir l'hypokaliémie, en prescrivant systématiquement du potassium (**DIFFU-K**).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypokaliémie, hyperuricémie, lithiase rénale.

Asthénie, somnolence, troubles gastro-intestinaux, dysesthésies.

Éruptions cutanées, troubles hématologiques (thrombopénie, agranulocytose) par hypersensibilité aux **sulfamides**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Augmentation du risque d'hypokaliémie en cas d'association aux **digitaliques**, **corticoïdes**, **diurétiques** (thiazidiques et de l'anse).

En cas d'hypokaliémie, l'association à certains **antiarythmiques** (classe Ia, classe III) expose aux risques de torsades de pointe.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperosmolarité plasmatique préexistante, déshydratation intracellulaire, insuffisance cardiaque.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Il est nécessaire de réchauffer le flacon au bain-marie jusqu'à dissolution des cristaux.

La solution étant hypertonique, perfuser à vitesse lente et régulière.

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (1) – PARASYMPATHOMIMÉTIQUE (MYOTIQUE)

### ■ Pilocarpine

<b>ISOPTO-PILOCARPINE</b>				
1 gtte x 3/j	10 mL 0,5 % (fl.)	2,46	65 %	0,25
	10 mL 1 % (fl.)	2,46	65 %	0,25
	10 mL 2 % (fl.)	2,46	65 %	0,25

#### PROPRIÉTÉS

En entraînant un myosis qui tire sur les mailles du trabéculum, ils facilitent l'écoulement de l'humeur aqueuse.

#### INDICATIONS

Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle (GAFA) et glaucome chronique.

#### CONTRE-INDICATIONS

Uvéites antérieures (iritis, iridocyclite) dans lesquelles la pupille doit rester dilatée.  
Allergie à la **pilocarpine**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour la crise de GAFA, les **myotiques** doivent être donnés au moins 30 min après le début

des traitements hypotonisants, par voie générale (**MANNITOL**, **DIAMOX**) et dans les 2 yeux. Chez les myopes, n'utiliser les **myotiques** qu'après vérification de la périphérie rétinienne (ils peuvent entraîner un décollement de rétine).

Risque de gêne visuelle chez les utilisateurs de machine.

Lentilles de contact à éviter en raison du risque d'adsorption du conservateur sur les lentilles

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Myosis qui peut gêner la vision des patients, modification possible du champ visuel.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Possibilité de potentialisation des curarisants (prévenir l'anesthésiste).



## GLAUCOMES (3)

### ► Traitement hypotonisant oral

**Acétazolamide (DIAMOX)** cp. à 250 mg : 1/4 à 1 cp. x 3/j.

### En cas de traitement médical insuffisant

#### ► Laser

On peut réaliser un traitement au laser (trabéculorétraction) : application d'impacts laser sur le corps ciliaire pour augmenter l'écoulement de l'humeur aqueuse.

#### ► Chirurgie : sclérectomie ou trabéculotomie

Ces interventions consistent à réaliser une fistulisation entre le corps ciliaire et les espaces sous-conjonctivaux. Elles peuvent au besoin être répétées.

#### ► Cyclodestruction du corps ciliaire

Cette intervention **de dernier recours** est indiquée dans les glaucomes très évolués. Elle vise à détruire le corps ciliaire qui produit l'humeur aqueuse. On peut utiliser plusieurs techniques : le froid (cryoapplication du corps ciliaire), le laser (Yag ou diode transscléral) ; les ultrasons (*Sonocare*).

### Glaucome néovasculaire

C'est la complication la plus redoutée de la rétinopathie diabétique proliférante sévère ou d'une occlusion veineuse rétinienne ischémique qui n'ont pas été trai-

tées correctement par laser (cf. chapitres correspondants). Il résulte du développement de néovaisseaux dans l'angle iridocornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse. Il entraîne une augmentation majeure de la pression intraoculaire aboutissant à un œil très douloureux et non voyant.

### Glaucome congénital

#### Diagnostic

Affection redoutable, il est dû à une anomalie de développement de l'angle iridocornéen.

Suspecté devant un larmolement, une photophobie, une cornée trouble au diamètre augmenté (mégalo-cornée) chez le nouveau-né ou le nourrisson, le diagnostic est confirmé par la prise de tension oculaire, au besoin sous anesthésie générale.

#### Traitement

Le traitement est uniquement chirurgical ; il est impératif dès que le diagnostic est posé (trabéculotomie, trabéculéctomie). Le pronostic est sombre.

Les chances de conserver une fonction visuelle utile sont d'autant plus grandes que l'enfant est opéré précocement. D'où l'extrême importance de savoir reconnaître les symptômes du GC pour adresser ces enfants le plus tôt possible à l'ophtalmologiste +++.

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (2) – BÊTABLOQUANTS (1)

## ■ Timolol collyre

<b>TIMOPTOL</b>					
1 gtte x 2/j	3 mL 0,25 % (fl.)	4,53	I	65 %	1,51
	3 mL 0,50 % (fl.)	4,80	I	65 %	1,60
<b>TIMABAK</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL 0,25 % (fl.)	8,20	I	65 %	1,64
	5 mL 0,50 % (fl.)	8,78	I	65 %	1,76
<b>OPHTIM</b>					
1 gtte x 2/j	60 unidoses 0,25 mL 0,25 %	8,59	I	65 %	0,14
	60 unidoses 0,25 mL 0,50 %	9,22	I	65 %	0,15
<b>TIMOPTOL LP</b>					
1 gtte le soir, 1 fl. pour 1 mois	2,5 mL 0,25 % (fl.)	8,28	I	65 %	3,31
	2,5 mL 0,50 % (fl.)	8,92	I	65 %	3,57
<b>GELTIM LP</b>					
Solution LP : 1 gtte le soir	30 unidoses 0,4 g (1 mg/g)	8,78	I	65 %	0,29

## ■ Bétaxolol

<b>BETOPTIC</b>					
Collyre. 1 gtte x 2/j	3 mL 0,25 %	4,98	I	65 %	1,66
	3 mL 0,5 %	4,98	I	65 %	1,66
Suspension ophtalmique. 1 gtte x 2/j	60 unidoses 0,25 mL 0,25 %	9,53	I	65 %	0,16

## ■ Cartéolol

<b>CARTÉOL</b>					
1 gtte x 2/j	3 mL 1 % (fl.)	4,66	I	65 %	1,55
	3 mL 2 % (fl.)	4,95	I	65 %	1,65
<b>CARTÉOL LP</b>					
1 gtte/j le matin	30 unidoses 0,2 mL 1 %	8,78	I	65 %	0,29
	30 unidoses 0,2 mL 2 %	8,78	I	65 %	0,29
	3 mL 1 % (fl.)	7,79	I	65 %	2,60
	3 mL 2 % (fl.)	7,79	I	65 %	2,60

## ■ Lévocabunolol

<b>BÉTAGAN</b>					
1 gtte x 2/j	3 mL 0,5 % (fl.)	4,14	I	65 %	1,38
	60 unidoses 0,4 mL 0,5 %	8,78	I	65 %	0,15

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (3) – BÊTABLOQUANTS (2)

## ■ Timolol maléate

TIMOCOMOD					
1 gte/j	1 fl. 5 mL 0,25 %	7,78	I	65 %	7,78
	1 fl. 5 mL 0,5 %	8,34	I	65 %	8,34

**PROPRIÉTÉS**

Ils diminuent la pression intraoculaire en réduisant la sécrétion d'humeur aqueuse par les procès ciliaires ; ils n'ont aucun effet ni sur le diamètre pupillaire, ni sur l'accommodation.

**INDICATIONS**

Glaucome chronique à angle ouvert ; glaucome de l'aphake, hypertension intraoculaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Du fait du passage du produit dans la circulation générale, ce sont celles de tous les  **$\beta$ -bloquants**.

Asthme, insuffisance cardiaque non contrôlée, BAV de haut degré non appareillé, bradycardie < 50/min, syndrome de Raynaud.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Lentilles de contact : au cours du traitement par le **timolol**, en collyre ou en gel, le port de lentilles de contact est déconseillé en raison du risque d'intolérance des lentilles (diminution de la sécrétion lacrymale liée d'une manière générale aux  **$\beta$ -bloquants**).

Par ailleurs, la présence d'un conservateur dans les présentations en flacon contre-indique le port de lentilles souples.

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin.

**Allaitement** : déconseillé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Commencer toujours avec les collyres les moins dosés.

Respecter 12 h d'intervalle entre chaque prise.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets oculaires : brûlures légères, larmolement, hypoesthésie cornéenne (le plus souvent les  **$\beta$ -bloquants** sont bien tolérés localement).

Effets secondaires généraux : dus au passage systémique des  **$\beta$ -bloquants** par voie générale.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ce sont celles des  **$\beta$ -bloquants** par voie générale, bien que les quantités de  **$\beta$ -bloquants** passant par voie générale soient faibles.

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (4) – INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE

### ■ Dorzolamide

<b>TRUSOPT</b>					
1 gtte x 3/j Si associé à un collyre bêtabloquant : 1 gtte x 2/j	5 mL (fl.)	6,45	I	65 %	1,29

### ■ Dorzolamide + timolol

<b>COSOPT</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL (fl.) 60 unidoses 0,2 mL	8,04 17,81	I I	65 % 65 %	1,61 0,30

### ■ Brinzolamide

<b>AZOPT</b>					
1 gtte x 2/j voire x 3/j	5 mL (fl.)	12,92	I	65 %	2,58

### ■ Brinzolamide + timolol

<b>AZARGA</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL (fl.)	18,46	I	65 %	3,69

#### PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de l'anhydrase carbonique (comme le **DIAMOX**), il réduit la sécrétion de l'humeur aqueuse.

#### INDICATIONS

Glaucome chronique.

En monothérapie : si un **agent  $\beta$ -bloquant** est contre-indiqué, ou induit un effet secondaire, ou est insuffisant.

En bithérapie : en association à un **agent  $\beta$ -bloquant** si le résultat est insuffisant.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créa-

tininémie < 30 mL/min) et acidose hyperchlorémique car l'élimination du **TRUSOPT** s'effectue par voie rénale.

**Grossesse et allaitement.**

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À utiliser avec prudence chez les insuffisants hépatiques.

Lentilles de contact : contient du chlorure de benzalkonium ; attendre 15 min après instillation pour remettre les lentilles.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Réaction d'hypersensibilité (conjonctivite, œdème palpébral) conduisant à l'arrêt du traitement.

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (5) – ALPHA-2-ADRÉNERGIQUES

## ■ Brimonidine

<b>ALPHAGAN</b>					
1 gtte x 2/j	5 mL (fl.)	8,27	I	65 %	1,63

## ■ Brimonidine + timolol

<b>COMBIGAN</b>					
1 gtte x 1/j	5 mL (fl.)	18,16	I	65 %	3,63

## ■ Apraclonidine

<b>IOPIDINE</b>					
1 gtte x 3/j	5 mL (fl.) 0,5 %	14,40	I	65 %	2,88
	2 unidoses 0,25 mL	13,77	I	65 %	6,89
	1 %				

**PROPRIÉTÉS**

Ces agonistes des récepteurs  $\alpha_2$ -adrénergiques réduisent la production de l'humeur aqueuse par le corps ciliaire.

De plus la **brimonidine** a un second effet en augmentant l'écoulement d'humeur aqueuse par le corps ciliaire.

La **brimonidine**, du fait de sa sélectivité avec les récepteurs  $\alpha_2$ -agonistes, n'entraîne ni mydriase, ni vasoconstriction des microvaisseaux (comparée à la propine). La **IOPIDINE** n'est que relativement sélective.

**INDICATIONS**

Glaucome chronique à angle ouvert.

**Brimonidine :**

- en monothérapie pour réduire la pression intraoculaire (PIO) si contre-indication, ou intolérance ou effet insuffisant des  **$\beta$ -bloquants** ;
- en bithérapie, associé à un autre traitement hypotonisant si l'effet est insuffisant sur la PIO.

**IOPIDINE** : traitement à court terme du glaucome chronique chez des patients recevant déjà un traitement médical à dose maximale

en attendant le traitement chirurgical ou par laser.

**CONTRE-INDICATIONS**

Antécédents de pathologie cardiovasculaire sévère ou instable.

Hypersensibilité à l'un des composants.

Porteurs de lentilles de contact souples.

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prudence chez les utilisateurs de machines en raison du risque de somnolence.

Lentilles de contact : attendre 15 min après instillation (chlorure de benzalkonium).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Intolérance oculaire avec hyperhémie, gêne, larmolement, œdème palpébral et conjonctival conduisant à l'arrêt du traitement (fréquent).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqué avec les **antidépresseurs tricycliques**, les **IMAO** et les **sympathomimétiques systémiques**.

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (6) – ANALOGUES DE LA PROSTAGLANDINE F2-ALPHA

### ■ Latanoprost

<b>XALATAN</b>					
1 gtte le soir	80 gttes (fl. 2,5 mL)	13,84	I	65 %	0,17
	240 gttes (3 fl. 2,5 mL)	37,60	I	65 %	0,16

### ■ Travoprost

<b>TRAVATAN</b>					
1 gtte le soir	2,5 mL (fl.)	18,35	I	65 %	7,34

### ■ Bimatoprost

<b>LUMIGAN</b>					
1 gtte le soir	3 mL (fl.) 0,1 mg/mL	18,35	I	65 %	6,12
	3 mL (fl.) 0,3 mg/mL	18,35	I	65 %	6,12

## COLLYRES ANTIGLAUCOMATEUX (7) – ANALOGUES DE LA PROSTAGLANDINE F2-ALPHA EN ASSOCIATION

### ■ Latanoprost + timolol

<b>XALACOM</b>					
1 gtt le matin	2,5 mL (fl.)	17,13	I	65 %	6,85
	7,5 mL (3 fl.)	45,87	I	65 %	6,12

### ■ Bimatoprost + timolol

<b>GANFORT</b>					
1 gtt x 1/j	3 mL (fl.)	20,88	I	65 %	6,96

### ■ Travoprost + timolol

<b>DUOTRAV</b>					
1 gtt x 1/j	2,5 mL (fl.)	20,88	I	65 %	8,35

#### PROPRIÉTÉS

**Latanoprost** : analogue de la prostaglandine F<sub>2</sub>-alpha, il diminue la pression intraoculaire en augmentant l'écoulement par la voie uvéo-sclérale.

**Bimatoprost** : prostamide synthétique, apparenté à la prostaglandine F<sub>2</sub>-alpha, il améliore la résorption de l'humeur aqueuse par une double voie : par le trabéculum et par la voie uvéo-sclérale.

#### INDICATIONS

GCAO.

En monothérapie : si un **agent  $\beta$ -bloquant** est contre-indiqué, ou induit un effet secondaire, ou est insuffisant.

En bithérapie : en association à un **agent  $\beta$ -bloquant** si le résultat est insuffisant.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

À éviter en cas de facteur de risque connu d'œdème maculaire : aphakie, pseudophakie avec rupture capsulaire postérieure, uvéite.

**Grossesse et allaitement.**

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ces traitements peuvent modifier progressivement et de façon définitive la couleur des yeux en augmentant la quantité de pigment brun dans l'iris. Avant l'instauration du traitement, les patients doivent être prévenus du risque de modification de la couleur de l'œil. Essuyer soigneusement la peau après instillation pour éviter le contact du collyre avec les paupières, facteur de coloration cutanée. Lentilles de contact souples : attendre 15 min après instillation pour remettre les lentilles.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Augmentation de la pigmentation brune de l'iris, en particulier chez les patients ayant des iris de plusieurs couleurs (bleu-marron ; gris-marron ; vert-marron ; jaune-marron). Cet effet non réversible est observé chez 16 % de tous les patients traités pendant 12 mois avec **latanoprost** ; chez 1,5% des patients avec **bimatoprost**.

Hyperhémie conjonctivale, kératites ponctuées superficielles, croissance des cils, pigmentation de la peau des paupières (réversible). De rares cas d'œdème maculaire cystoïde ont été rapportés.

## CICATRISANTS CORNÉENS

## ■ Rétinol

<b>VITAMINE A FAURE</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	10 mL (fl.)	2,15		30 %	0,22
<b>VITAMINE A DULCIS</b>					
1 appl. x 2 à 4/j	10 g (tube)	5,48		30 %	0,55

## ■ Cyanocobalamine

<b>VITAMINE B12 ALLERGAN</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	5 mL (fl.) 20 unidoses 0,4 mL			NR NR	
<b>ECOVITAMINE B12</b>					
Collyre à 0,05 % 1 gtte x 3 à 4/j	10 mL (fl.)			NR	
<b>VITAMINE B12 HORUS PHARMA</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	20 unidoses 0,4 mL/0,2 mg			NR	

## ■ Acétylcystéine

<b>EURONAC</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	100 mL (fl.)	4,66		15 %	0,05
<b>GENAC</b>					
1 gtte x 4 à 6/j	5 mL (fl.)	4,66		15 %	0,93

## PROPRIÉTÉS

Ils accélèrent la cicatrisation de la cornée.

## INDICATIONS

Plaies, brûlures, traumatismes cornéens ; ulcérations d'origine infectieuse en association avec des **antibiotiques locaux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à l'un des constituants.

La **vitamine B12** est à éviter chez les porteurs de lentilles souples (elle colore les lentilles en rose).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques rares.



## COLLYRES MYDRIATIQUES (1)

## ■ Tropicamide

<b>MYDRIATICUM</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	10 mL (fl.) 0,5 %	2,73	I	65 %	0,27
	1 unidose 2 mg/0,4 mL	1,90	I	65 %	1,90
	20 unidoses 2 mg/0,4 mL		I	NR	
	100 unidoses 2 mg/0,4 mL		I	NR	

## ■ Phényléphrine

<b>NÉOSYNÉPHRINE FAURE</b>					
1 gtte x 3 à 4/j	5 mL 5 % (fl.)	2,92	I	65 %	0,58
	100 unidoses 0,4 mL	2,92	I	65 %	0,58

## ■ Cyclopentolate

<b>SKIACOL</b>					
1 gtte 1 h avant l'examen à renouveler 10 min plus tard dans les 2 yeux	0,5 mL (1 unidose)		I	NR	

## ■ Atropine collyre

<b>ATROPINE ALCON</b>					
1 gtte x 2/j	10 mL 0,3 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25
	10 mL 0,5 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25
	10 mL 1 % (fl.)	2,46	I	65 %	0,25

## ■ Homatropine

<b>ISOPTO-HOMATROPINE</b>					
1 gtte x 3/j	10 mL (fl.)		I	NR	

## UVÉITES (2)

### Traitement étiologique

Il est fondamental. Le mieux est d'hospitaliser le patient pour faire un bilan complet. Il repose avant tout sur un interrogatoire recherchant tous les antécédents oculaires et généraux du patient et sur un examen clinique complet (examen de l'interne ++). Le choix des examens complémentaires pourra ainsi être orienté. La découverte d'une cause à cette uvéite conditionne le pronostic, car cela permet de prescrire un traitement étiologique qui empêchera la survenue des récides.

- Ex. 1 : uvéite herpétique : **valaciclovir (ZELITREX)** 1 à 2 cp. x 3/j. La durée du traitement est à adapter en fonction de l'évolution clinique.

- Ex. 2 : uvéite associée au groupage HLA B27 :

- **dexaméthasone (MAXIDEX)** 1 gtte/h pendant 48 h puis 8/j pendant 3 j puis diminution selon l'amélioration clinique ;
- **atropine** 1 g x 2/j ;
- **oxytétracycline + dexaméthasone (STERDEX)** le soir ;

- hypotonisants oculaires si hypertension oculaire.

- Ex. 3 : choriorétinite toxoplasmique (l'infection congénitale à *Toxoplasma gondii* est la première cause d'uvéite postérieure ; la révélation est tardive) : **azithromycine (ZITHROMAX)** 1 cp./j ou **sulfadiazine (ADIAZINE)** 2 cp. x 3/j + **pyriméthamine (MALOCIDE)** 1 cp./j + **acide folique (LEDERFOLINE)** 1 cp./j contrôle impératif de NFS-plaquettes tous les 10 j.

48 h plus tard corticothérapie par voie générale, à hautes doses : **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** bolus de 500 mg dilué dans 250 cm<sup>3</sup> de sérum physiologique à passer sur 3 h, 3 j de suite ; à relayer par **prednisone (CORTANCYL)** 1 mg/kg en prise unique matinale.

Mesures associées à la corticothérapie :

- régime sans sel ;
- **potassium : DIFFU-K** : 1 gél. x 3/j ;
- **calcium : CACIT 1000** 1/j ;
- **vitamine D : DÉDROGYL** 5 gttes/j.

Les doses de corticoïdes sont progressivement diminuées, sur plusieurs semaines, en fonction de l'amélioration clinique.

## COLLYRES MYDRIATIQUES (2) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

Dilatateurs de la pupille par :

- un effet parasympatholytique induisant une paralysie du sphincter de l'iris (**tropicamide**, **cyclopentolate**, **homatropine** et **atropine** : mydriase passive) ;
- un effet sympathicomimétique (**phényléphrine** : mydriase active).

Le **tropicamide** et la **phényléphrine** modifient peu l'accommodation ; le **cyclopentolate**, l'**homatropine** et l'**atropine** sont cycloplégiques (paralysie du muscle ciliaire).

Durée d'action : **tropicamide**, **cyclopentolate** et **phényléphrine** : 3-4 h ; **homatropine** : 2-3 j ; **atropine** : 1 sem.

Le **MYDRIATICUM** et la **phényléphrine** sont utilisés pour leur effet dilateur pupillaire, le **SKIACOL** pour son effet cycloplégique et l'**atropine** pour ces deux effets. La **phényléphrine** potentialise l'action du **tropicamide**.

## INDICATIONS

**Tropicamide** et **phényléphrine** :

- en diagnostic : fond d'œil ; angiographie ;
- en thérapeutique : dilatation préopératoire pour cataracte et décollement de rétine avant photocoagulation au laser.

**Cyclopentolate** : skiascopie, surtout chez l'enfant.

**Atropine** :

- en diagnostic : skiascopie en cas de strabisme ou de contre-indication au **SKIACOL** ;
- en thérapeutique : uvéites antérieures (iritis et iridocyclites) afin d'éviter les synéchies entre

l'iris et le cristallin ; kératites pour réduire les douleurs.

## CONTRE-INDICATIONS

Tous : angle iridocornéen étroit, et chambre antérieure étroite +++ (risque de GAFA).

**Phényléphrine** chez le nouveau-né.

**Cyclopentolate** : chez les enfants d'âge < 1 an, si antécédent de comitialité ou atteinte du système nerveux central. Ne pas utiliser en cas de trisomie 21.

Tous : hypersensibilité à l'un des composants. Lentilles de contact : tous contre-indiqués : **MYDRIATICUM** et **atropine** du fait de la présence de chlorure de benzalkonium ; **NÉOSY-NÉPHRINE** du fait de la présence de phényléphrine.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier systématiquement la profondeur de la chambre antérieure et/ou l'ouverture de l'angle iridocornéen avant d'instiller un **collyre mydriatique**.

Comprimer les points lacrymaux pour éviter le passage systémique (surtout chez l'enfant).

## EFFETS INDÉSIRABLES

L'effet cycloplégique se traduit par une gêne à la vision de près : **MYDRIATICUM**, **NÉOSY-NÉPHRINE** et **SKIACOL** : pendant 3-4 h ; **homatropine** : pendant 2 j ; **atropine** : pendant 2 sem. Interdire la conduite automobile après instillation de ces collyres.

**Atropine** : réactions allergiques, bouche sèche, confusion chez le sujet âgé.

## COLLYRES CORTICOÏDES (1)

## ■ Dexaméthasone

<b>MAXIDEX</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	3 mL (fl.)	1,75	I	65 %	0,58

## ■ Dexaméthasone + néomycine

<b>CHIBRO-CADRON</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	5 mL (fl.)	2,73	I	30 %	0,55

## ■ Dexaméthasone + framycétine

<b>FRAKIDEX</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	5 mL (fl.)	2,38	I	30 %	0,48

## ■ Dexaméthasone + néomycine + polymyxine B

<b>MAXIDROL</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	3 mL (fl.)	2,60	I	30 %	0,87

## ■ Hydrocortisone + colistine + bacitracine

<b>BACICOLINE</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	5 mL (fl.)	2,92	I	30 %	0,58

## ■ Fluorométholone

<b>FLUCON</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	3 mL (fl.)	2,15	I	65 %	0,72

## ■ Pimexolone

<b>VEXOL</b>					
1 gtte x 3 à 8/j	5 mL (fl.)	6,16	I	65 %	1,23

**COLLYRES CORTICOÏDES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Action anti-inflammatoire sur le segment antérieur de l'œil et ses annexes.

**INDICATIONS**

Inflammations du segment antérieur de l'œil et de ses annexes (uvéites antérieures, épisclérites et sclérites, conjonctivites allergiques, kératites non infectieuses).

**CONTRE-INDICATIONS**

Formelles :

- ulcère cornéen (risque de perforation) ;
- infection oculaire d'origine virale (en particulier herpès cornéen ou zona ophtalmique : aggravation de l'infection).

Hypersensibilité à l'un des composants.

**Grossesse** : pas d'étude contrôlée chez la femme enceinte.

**Allaitement** : passage systémique présent, possibilité de passage dans le lait maternel.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Retard de cicatrisation des plaies cornéennes et sclérales.

Aggravation des infections oculaires d'origine virale (herpès, zona).

Hypertonie oculaire : risque de glaucome cortisonique (sauf **FLUCON**).

Risque de cataracte cortisonique (sous-capsulaire postérieure) lors des traitements prolongés.

Examen au biomicroscope préalable afin d'éliminer une contre-indication au traitement.

Surveillance de la pression intraoculaire (risque d'augmentation) et du cristallin (produit cataractogène) en cas de traitement prolongé.

## ANTIVIRAL ANTIHERPÉTIQUE OPHTALMIQUE

## ■ Aciclovir

ZOVIRAX					
Pommade ophtalmique 1 appl. x 5/j dans le cul-de-sac conjonctival	1 tube (4,5 g)	8,62	I	65 %	8,62

## PROPRIÉTÉS

Antiviral, actif contre le virus de l'herpès (HSV) et le virus varicelle-zona (VZV).

Pour être actif, l'**aciclovir** doit être phosphorylé en aciclovir triphosphate. Seules les cellules infectées par le virus peuvent réaliser cette phosphorylation grâce à une enzyme virale.

L'**aciclovir** triphosphate inhibe sélectivement l'ADN-polymérase virale.

La succession de ces 2 étapes permet d'inhiber la multiplication virale sans interférer avec le métabolisme cellulaire normal.

## INDICATIONS

Kératites et kératoconjunctivites herpétiques.  
Zona ophtalmique en cas d'atteinte cornéenne.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : innocuité non démontrée.

Hypersensibilité à l'**aciclovir**.

Lentilles de contact : port déconseillé en raison du risque d'adsorption du **corticoïde** et du conservateur sur la lentille.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Toxicité pour l'épithélium cornéen à long terme (kératite ponctuée superficielle).

## PRÉVENTION NUTRITIONNELLE DE LA DMLA

## ■ Vitamine/minéraux + pigments maculaires + AGPI

<b>NATUROPHTA MACULA</b>					
1 caps. marron et 1 caps. noire en 1 prise avec un repas, de préférence le midi avec un verre d'eau	30 caps. marron + 30 caps. noires			NR	
<b>NUTROF</b>					
2 caps./j à la fin d'un repas, de préférence le midi avec un verre d'eau	30 caps. 60 caps.			NR NR	
<b>PRESERVISION 3</b>					
2 caps./j avec une prise alimentaire et un verre d'eau	60 caps. 180 caps.			NR NR	
<b>VISIOPREV DUO</b>					
2 caps./j avec une prise alimentaire et un verre d'eau	60 caps.			NR	
<b>MACULA-Z</b>					
1 caps./j avec une prise alimentaire et un verre d'eau	30 caps. 120 caps.			NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Compléments alimentaires à visée oculaire. Ils associent des vitamines (E et C notamment), des minéraux (Zn et Cu), des pigments maculaires (lutéine et zéaxanthine notamment) ainsi que des acides gras polyinsaturés  $\omega_3$  (DHA et EPA, + acides docahexaénoïque et éicosapenténoïque).

**NATUROPHTA MACULA** et **VISIOPREV DUO** contiennent également les vitamines suivantes : B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub> et B<sub>12</sub>.

L'action protectrice repose sur l'apport de caroténoïdes maculaires et sur l'effet antioxydant des autres composés.

En complément d'une alimentation variée et équilibrée.

**INDICATIONS**

Prévention et protection de la DMLA en supplémentation continue.

L'intérêt serait de pallier les déficiences pouvant survenir avec l'âge ou en raison d'une alimentation insuffisante/déséquilibrée.

## CORTICOÏDE INTRAVITRÉEN

## ■ Dexaméthasone

OZURDEX				
Dexaméthasone 0,7 mg	1 implant vitréen + applicateur	1069,27	I	100 % 1069,27

**PROPRIÉTÉS**

Suppression de l'inflammation en inhibant l'expression du VEGF et par conséquent l'œdème maculaire, les dépôts de fibrine, les fuites capillaires et la migration phagocytaire de la réponse inflammatoire.

Inhibition de la sécrétion de prostaglandines, dont certaines ont été identifiées comme des médiateurs de l'œdème maculaire cystoïde.

**INDICATIONS**

œdème maculaire suite à une occlusion de la branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR).

Traitement des patients adultes présentant une inflammation du segment postérieur de l'œil de type uvéite non infectieuse.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Infection périoculaire ou oculaire active ou suspectée, incluant notamment la plupart des maladies virales de la cornée et de la conjonctive, dont la kératite épithéliale active à Herpès simplex (kératite dendritique), la vaccine, la

varicelle, les infections mycobactériennes et les mycoses.

Glaucome avancé ne pouvant être correctement maîtrisé par la seule prise de médicaments.

**Grossesse et allaitement** : non recommandé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Toute injection intravitréenne peut être associée à une endophtalmie, une inflammation intraoculaire, une augmentation de la pression intraoculaire et un décollement de la rétine. Il convient de toujours appliquer les techniques d'asepsie appropriées à l'injection. De plus, les patients doivent faire l'objet d'une surveillance après l'injection pour permettre un traitement précoce en cas d'infection ou d'augmentation de la pression intraoculaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Liés au produit : augmentation de la pression intraoculaire, cataracte, céphalées.

Liés à la procédure d'injection intravitréenne : hémorragie conjonctivale, trouble de la vision, douleur oculaire, photopsie, opacité ou corps flottants du vitré, déchirure et décollement de rétine.



## VERTIGES D'ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE (1)

Le vertige est une impression de rotation du corps dans l'espace ou de l'espace par rapport au corps.

- **Équilibre** : 3 systèmes sensoriels (vestibulaire, proprioceptif, visuel) avec de nombreuses interconnexions. Intégration des informations par un système central (tronc cérébral, cervelet, cortex).

- **Vertige** : inadéquation des informations entre les 3 systèmes sensoriels.

- Conséquences : motrices (hypotonie), oculomotrices (nystagmus) et végétatives (vagues).

- Compensation centrale : apprentissage progressif du dysfonctionnement grâce aux informations fournies par la vision et la proprioception.

- **Éliminer les déséquilibres** (origine centrale) : impression de sol instable, de mal de mer, d'ébriété sans impression rotatoire vraie.

### Examen clinique

- **Examen otologique ++** : otoscopie, acoumétrie, signe de la fistule (vertige lors de la pression sur le tragus).

- **Étude du nystagmus** : oscillations rythmiques involontaires des yeux en 2 secousses : une lente (d'origine vestibulaire), une rapide (de rappel) qui définit le côté du nystagmus.

- **Examen vestibulaire** : équilibre postural (manœuvre de Romberg), la déviation des index et la marche aveugle.

- **Examen neurologique** : autres paires crâniennes, syndrome cérébelleux, signe d'hypertension intracrânienne.

#### Syndrome vestibulaire périphérique (atteinte de l'appareil vestibulaire ou du nerf vestibulaire)

Complet et harmonieux : nystagmus horizontal-rotatoire controlatéral, hypotonie musculaire homolatérale.

**Syndrome vestibulaire central** (noyaux vestibulaires ou système nerveux central) Incomplet et dysharmonieux : vertiges moins nets, nystagmus pur (vertical, horizontal) ou multiple, absence de signes cochléaires, présence de signes neurologiques.

### Examens complémentaires

Il y a deux examens clés.

- **Audiométrie** : dépistage d'une hypoacousie.

- **Épreuves vestibulaires avec nystagmographie** : excitation d'un canal semi-circulaire par une stimulation calorique ou rotatoire puis enregistrement du nystagmus par vidéonystagmographie. On réalise d'autres examens en fonction de l'étiologie suspectée.

- Potentiels évoqués auditifs (PEA).

- TDM des rochers.

- IRM des CAI et du tronc cérébral.

- Doppler des vaisseaux du cou.

## ANTIVERTIGINEUX (1)

## ■ Acétyl-leucine

<b>TANGANIL</b>					
1-2 cp. x 2-4/j pendant 10 j à 6 sem.	30 cp. 500 mg 60 cp. 500 mg	4,80 HOP		30 %	0,16
IV 1 amp. x 2-4/j inj. IV lente pendant la crise	5 amp. 5 mL = 500 mg	3,14		30 %	0,63

**PROPRIÉTÉS**

Antivertigineux : mécanisme d'action inconnu.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## ■ Bétahistine

<b>EXTOVYL</b>					
1 gél. x 2-3/j au cours des repas	60 gél. LP 12 mg	5,70	I	30 %	0,10
<b>LECTIL</b>					
1/2 à 1 cp. x 3/j au cours des repas	45 cp. séc. 16 mg	6,98	I	30 %	0,16
1 cp. x 2-3/j au cours des repas	60 cp. 24 mg	8,73	I	30 %	0,15
<b>SERC</b>					
1-2 cp. x 3/j au cours des repas pendant au moins 1 mois puis cures discontinues	90 cp. 8 mg	8,28	I	30 %	0,09

**PROPRIÉTÉS**

Analogue de l'histamine : diminution de la pression endolymphatique par vasodilatation des capillaires de la cochlée.

**CONTRE-INDICATIONS**Ulçère gastroduodénal évolutif.  
Phéochromocytome.**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement** : déconseillé.  
Surveillance chez l'asthmatique.**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges d'origine vestibulaire.

Traitement de fond de la maladie de Ménière (acouphènes, vertiges).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Gastralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES****Antihistaminique** (antagoniste).

## VERTIGES D'ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE (2)

### Étiologies

#### Vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB)

Il représente 50 % des vertiges, surtout chez le sujet âgé ; cupulolithiases du canal semi-circulaire postérieur (CSP).

**Vertige positionnel isolé** : vertige bref (< 1 min), déclenché par un mouvement circulaire de la tête dans le plan du CSP. Reproduit par la manœuvre de Dix-Hallpike (le patient assis, jambes pendantes, est penché rapidement du côté droit, la tête reste dirigée vers celle de l'examineur : déclenchement du VPPB sinon la manœuvre est réalisée à gauche).

#### Traitement

Rassurer le patient sur le caractère bénin du vertige, faire une manœuvre libératrice de Semont-Toupet (manœuvre de Hallpike pendant 4 min puis brusquement mettre le patient en décubitus latéral du côté opposé pendant 4 min). Prévenir du risque de récurrence.

### Maladie de Ménière

- **Hydrops endolabyrinthique** : hyperpression des liquides de l'oreille interne (endolymphe), d'étiologie inconnue, débutant entre 30 et 50 ans, souvent favorisée par un stress psychologique.

- **Crise** de quelques minutes à quelques heures : triade associant acouphènes unilatéraux graves, vertige majeur avec signes végétatifs et surdité unilatérale (parfois sensation de plénitude de l'oreille).

- **Examen** : tympan normaux, nystagmus horizontal-rotatoire de direction variable, hypoacousie de perception, examen neurologique normal.

- **Bilan** :

- **audiogramme** : surdité de perception endocochléaire prédominant sur les

graves et s'améliorant lors du test osmotique ;

- **épreuves vestibulaires** : hyporéflexie homolatérale ;

- **PEA** : pas de signe rétrocochléaire.

- **Évolution** : elle se fait par crises plus ou moins espacées ; puis persistance des acouphènes, aggravation de la surdité et diminution des vertiges avec possible bilatéralisation.

#### Traitement : selon les symptômes, traitement ambulatoire ou hospitalier

- Traitement de la crise

- Repos au lit, dans la pénombre et le calme, et si nécessaire hospitalisation.

- Sédatif : **benzodiazépine, diazépam (VALIUM ROCHE)**, 1 à 2 amp. 10 mg x 1-3/j en IM ou *per os* 1 cp. x 3/j.

- **Antivertigineux** : **acétyl-leucine (TANGANIL)**, 1 amp. 500 mg x 1-4/j en IVL ou *per os* 1 cp. x 3/j.

- **Antémétique** : **métoclopramide (PRIM-PERAN)**, 1 amp. 10 mg x 1-3/j en IVL ou *per os* 1 cp. x 3/j si nausées.

- **Agent osmotique** : **MANNITOL 10 %**, 500 mL x 2/j en IVL de 2 h.

- Traitement de fond

- Prise en charge psychologique : explication de la maladie, soutien psychologique, pas d'excès d'excitant (tabac, alcool), hygiène de vie, **anxiolytique** : **benzodiazépine, bromazépam (LEXOMIL)**, 1/4-1/4-1/2 cp./j.

- **Antivertigineux** : **béthahistine (SERC)**, 1 cp. x 3/j pendant plusieurs mois.

- En cas d'échec : **diurétique thiazidique** à faibles doses : **hydrochlorothiazide (ESIDREX)**, 1 cp. 25 mg/j avec régime peu salé. Dans les formes sévères, invalidantes et résistantes :

- labyrinthectomie chimique par **aminoside**,

- chirurgie de décompression du sac endolymphatique,

- voire neurectomie vestibulaire, labyrinthectomie.

## ANTIVERTIGINEUX (2)

## ■ Flunarizine

**SIBÉLIUM**

1 cp. le soir au coucher pendant 1 mois	30 cp. séc. 10 mg	9,20	I	15 %	0,31
---	-------------------	------	---	------	------

**PROPRIÉTÉS**

Vestibulodépression.

Diminution du spasme vasculaire des artères cérébrales et augmentation de la déformabilité des globules rouges.

Antihistaminique anti-H<sub>1</sub>.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges d'origine vestibulaire.

Traitement de fond de la migraine (en 2<sup>e</sup> intention).

**CONTRE-INDICATIONS**

Maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux.

Antécédents dépressifs.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

Somnolence : diminution de la vigilance (conducteurs de machines).

Déconseillé chez les sujets âgés (révélation de syndromes extrapyramidaux).

Durée traitement < 2 mois.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sédation.

Rarement : asthénie, insomnie, syndrome extrapyramidal, dépression.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Sédation : alcool, dépresseurs du SNC.

Atropiniques.

**Gestrogènes** : galactorrhée.

## VERTIGES D'ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE (3)

### Labyrinthites

- Destruction des cellules sensorielles (vestibulaires et cochléaires).
- Étiologies : infectieuse (otite chronique le plus souvent cholestéatomateuse, parfois virale), toxique (médicamenteuse surtout les **aminosides**), traumatique (fracture du rocher, barotraumatisme, chirurgie de l'oreille).
- Syndrome vestibulaire périphérique + surdité de perception endocochléaire irréversible.

### Névrite vestibulaire

- Syndrome vestibulaire périphérique complet et harmonieux, brutal et prolongé, sans signe auditif (pas de surdité, pas d'acouphène), sans signe neurologique. Parfois précédé d'un épisode grippal.
- Épreuves vestibulaires : hypo- ou aréflexie.

### Traitement

- Traitement de la crise
  - Repos au lit, dans la pénombre et le calme.
  - Sédatif : **benzodiazépine, diazépam (VALIUM ROCHE)**, 1 à 2 amp. 10 mg x 1-3/j en IM.
  - **Antivertigineux : acétyl-leucine (TANGANIL)**, 1 amp. 500 mg x 1-4/j en IVL.
  - **Antémétique : métoclopramide (PRIM-PÉRAN)**, 1 amp. 10 mg x 1-3/j en IVL.
- Traitement antiviral (pour certains) : **aciclovir (ZOVIRAX)** 5 mg/kg/8 h puis relais *per os*, 10 j.
- Rééducation vestibulaire
  - Dès la diminution des vertiges, pour favoriser la compensation.
  - Lever du lit.
  - Arrêt des sédatifs.
  - Rééducation active (surtout chez le sujet âgé) par kinésithérapeute spécialisé.

### Neurinome de l'acoustique

- Schwannome du nerf vestibulaire.
- Vertiges peu intenses et peu fréquents car destruction progressive donc compensation centrale simultanée. Surtout surdité de perception endocochléaire.
- Diagnostic : PEA puis IRM.
- Traitement : exérèse chirurgicale, radiothérapie.

### Vertiges d'allure périphérique : étiologies

	VERTIGES BREFS	VERTIGES PROLONGÉS
Sans signe auditif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertige paroxystique positionnel bénin</li> <li>– Hypotension orthostatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Névrite vestibulaire</li> </ul>
Avec signes auditifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hypotension orthostatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maladie de Ménière</li> <li>– Labyrinthite (infectieuse, traumatique, toxique)</li> </ul>
Neurinome de l'acoustique : peut donner tous les cas de figure		

## OTITE MOYENNE AIGÜE (1)

C'est une infection des cavités de l'oreille moyenne.

Elle apparaît le plus souvent entre 6 mois et 5 ans.

La guérison est spontanée dans 70 % des cas.

Antibiothérapie : prévention des complications.

### Étiologie

- Après une rhinopharyngite virale (*rhinovirus*, *virus respiratoire syncytial*), les germes commensaux du rhinopharynx colonisent l'oreille moyenne *via* la trompe d'Eustache.

- *Haemophilus influenzae* 40 %
- *Streptococcus pneumoniae* 30 %
- *Moraxella catarrhalis* 12 %

- Avant l'âge de 3 mois, on peut retrouver des staphylocoques dorés, des streptocoques pyogènes et des *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli* et entérobactéries.

► *Suspicion de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP)*

- En faveur du **pneumocoque** : fièvre > 38,5 °C, otalgie intense, âge entre 6 et 18 mois.

- En faveur du **PSDP** : âge < 18 mois, vie en collectivité (crèche), antécédent récent d'OMA, traitement par aminopénicilline datant de moins de 3 mois, région exposée (région parisienne, Lorraine, Ouest de la France).

► *Suspicion d'Haemophilus influenzae*  
Association otite + conjonctivite (15 % des OMA, 75 % *Haemophilus influenzae*).

### Diagnostic

- Signes d'appel** : fièvre, otalgie, hypocousie, otorrhée purulente. Chez le nour-

risson, manifestations atypiques (troubles digestifs, troubles du comportement, convulsions, absence de prise de poids).

#### • Examen otoscopique :

- otite congestive : hypervascularisation et diminution de transparence du tympan, sans modification des reliefs tympaniques ;

- otite collectée : tympan rouge et infiltré avec disparition des reliefs ossiculaires, puis bombé ;

- otite perforée : otorrhée purulente ;
- myringite aiguë : otalgie violente et otoscopie révélant des phlyctènes tympaniques de couleur citrin, parfois hémattique. Elle doit être considérée et traitée comme une OMA (infection virale ou par *Mycoplasma pneumoniae*).

### Paracentèse

- Bonne contention, après nettoyage du conduit auditif externe (pas de lavage d'oreille) ± désinfection du conduit, micro-aspiration stérile souple, quadrant inférieur.

#### Indications

Évolution anormale :

- persistance (après 72 h de traitement) d'une *fièvre élevée*, d'une *forme hyperalgique* associée à un tympan très bombant (pré-perforatif), de *troubles digestifs majeurs* (risque de déshydratation chez l'enfant) ;
- *complications* (mastoiïdite, paralysie faciale, méningite) ;
- *otite trainante* (mastoiïdite subaiguë > 21 j, PSDP) et *otites récidivantes* (otite séromqueuse sous-jacente), si possible après fenêtre thérapeutique (2 paracentèses à 48 h d'intervalle).

Selon le terrain :

- nourrisson < 3 mois ;
- immunodépression.

## GOUTTES AURICULAIRES (ANESTHÉSQUES LOCAUX)

## ■ Lidocaïne + phénazone

OTIPAX					
Bain d'oreille 2-3/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	15 mL	2,65		15 %	0,18

## ■ Procaïne + tétracaïne + phénol + éphédrine

OTYLOL					
Bain d'oreille 2-3/j pendant 5-7 j A. : 4-5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL	1,88		15 %	0,19

## PROPRIÉTÉS

Anesthésiques locaux : **lidocaïne**, **procaïne**, **tétracaïne**.

Antiseptiques : **phénazone**, **phénol**.

Vasoconstricteur alphasimétrique : **éphédrine**.

## INDICATIONS

Traitement antalgique des otites moyennes aiguës congestives et des myringites en complément de l'antibiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique ++++.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Réchauffer avant utilisation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : risque de surdité de perception endocochléaire irréversible et de vertiges.

Effets systémiques en cas de passage du produit par la trompe auditive.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## OTITE MOYENNE AIGÜE (2)

### Complications

#### Paralysie faciale périphérique otogène

- Fréquente (1/200 otites), bon pronostic.
- Paracentèse avec prélèvement bactériologique.
- Pour certains, courte corticothérapie 48 h après adaptation de l'antibiotique.

#### Méningite purulente à pneumocoque

- Surtout le nourrisson < 1 an.
- Paracentèse avec prélèvement bactériologique.
- TDM de l'oreille et de l'encéphale à la recherche :
  - d'une autre complication intracrânienne,
  - d'une malformation de l'oreille interne (fistule) et moyenne.

#### Mastoïdite aiguë

- Réaction périostée : rougeur douloureuse rétro-auriculaire.
- Mastoïdite aiguë extériorisée : tuméfaction fluctuante comblant le sillon rétro-auriculaire.
- Paracentèse avec prélèvement bactériologique.
- Ponction avec prélèvement bactériologique.
- TDM de l'oreille et cérébrale avec injection.
- Hospitalisation et antibiothérapie IV simple probabiliste dirigée contre le pneu-

mocoque et le staphylocoque doré : céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (**ROCÉPHINE**) : 100 mg/kg/j adaptée secondairement à l'antibiogramme.

- Surveillance : température, signes neuro-méningés, état local.
- Chirurgie : mastoïdectomie après 24-48 h d'antibiothérapie en cas de mastoïdite aiguë extériorisée.

### Traitement

#### Antalgique-antipyrétique

Ils sont utilisés selon l'âge et l'importance de la fièvre et des douleurs.

- Acide acétylsalicylique (**ASPIRINE**) et/ou paracétamol (**DOLIPRANE**) : 15 mg/kg x 4/j.
- Bains tièdes, boissons abondantes.

#### Gouttes auriculaires antibiotiques et anesthésiques locales

Elles sont utilisées dans un but antalgique dans l'otite congestive. Elles sont contre-indiquées en cas de perforation de tympan.

**Phénazone + lidocaïne (OTIPAX)**, bain d'oreille 2-3 fois/j pendant 5 j (A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain).

#### Désinfection rhinopharyngée

- Lavage des fosses nasales au **sérum physiologique**, 4 fois/j jusqu'à amélioration de la rhinorrhée.
- Mouchage fréquent (utilisation d'un mouche-bébé chez le nourrisson).



## OTITE MOYENNE AIGUË (3)

### Antibiotiques

Par voie orale, probabiliste sur les germes suspectés, en l'absence d'allergie, pendant une durée de 8 à 10 j.

Elle est systématique, sauf dans le cas de l'otite congestive simple où le traitement local et la consultation de contrôle à 48-72 h suffisent (enfant > 6 mois sans antécédent).

#### ► Monothérapie probabiliste par voie orale

#### Antibiotique de référence

**Aminopénicilline + inhibiteur  $\beta$ -lactamases : amoxicilline + acide clavulanique**, pendant 8 j au début du repas.

- E. < 30 mois : **AUGMENTIN NOURRISSON susp. buv. 100 mg/mL** : 80 mg/kg/j en 3 prises, soit 1 dose/kg x 3/j.
- E. > 30 mois : **AUGMENTIN susp. buv. enfant 100 mg/mL** : 80 mg/kg/j en 3 prises, soit 1 dose/kg x 3/j.
- E. > 12 ans, A. : **AUGMENTIN** : 1 cp. 1 000 mg x 3/j.

#### Le choix de l'antibiotique tient compte :

1. des germes producteurs de  $\beta$ -lactamases :

- 25 % des *Haemophilus influenzae*,
  - 90 % des *Moraxella catarrhalis*,
- entraînant l'inactivité de l'amoxicilline, des **céphalosporines de 1<sup>re</sup> génération** et des **macrolides**.

2. des pneumocoques de sensibilité diminuée à la **pénicilline** (PSDP) :

> 50 % des souches en région parisienne entraînant l'inactivité des **céphalosporines de 1<sup>re</sup> génération** et des **macrolides**, et l'activité variable du **triméthoprime-sulfa-**

**méthoxazole** et de l'amoxicilline aux doses usuelles.

#### ► Autres antibiotiques

• **Céphalosporines de 2<sup>e</sup> génération orales** : **céfuroxime axétile (CÉPAZINE, ZIN-NAT)** (susp. buv. 125 mg/c-mes. de 5 mL) : 30 mg/kg/j en 2 prises :

- E. < 2 ans : 1 c-mes. matin et soir ;
- E. > 2 ans : 2 c-mes. matin et soir.

• **Céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** :

– orales : **céfixime (OROKEN)** (E. > 6 mois), **cefprozime proxétile (ORELOX)** (cuillère doseur) : 8 mg/kg/j en 2 prises, soit 1 dose/kg 2 fois/j ;

– parentérales IM : **ceftriaxone (ROCEPHINE)** : 50 mg/kg/j en IM pendant 3 j, après prélèvement bactériologique.

► En cas d'allergie à la pénicilline et en l'absence de suspicion de PSDP

• **DALACINE** 30 mg/kg/j en 3 prises pendant 5 j.

• **Macrolide + sulfamide : érythromycine** (50 mg/kg/j) + **sulfafurazole** (150 mg/kg/j), **PÉDIAZOLE** : E. > 2 mois : 1 dose/kg x 3/j.

• **Sulfamide + diaminopyrimidine : triméthoprime-sulfaméthoxazole (BACTRIM)** susp. buv., pendant le repas :

- E. < 6 ans : 1 c-mes. x 2/j ;
- E. 6-12 ans : 2 c-mes. x 2/j.

► Si enfant > 2 ans, sans antécédent sans facteur de risque de PSDP

• **Pénicilline A : amoxicilline (CLAMOXYL)**, sirop c-mes. 125, 250, 500 mg, sach. 125, 250 : 50 mg/kg/j en 3 prises.

• **Céphalosporine de 1<sup>re</sup> génération** : **céfadroxil (ORACÉFAL)** sirop c-mes. 125, 250, 500 mg : 50 mg/kg/j en 3 prises.

## OTITE MOYENNE AIGÜE (4)

### Choix de l'antibiothérapie

GERME SUSPECT	ANTIBIOTIQUE
Haemophilus influenzae (otite et conjonctivite purulente)	<b>AUGMENTIN, CIBLOR</b> <b>OROKEN</b> 8 mg/kg/j <b>ORELOX</b> 8 mg/kg/j <b>ZINNAT</b> 20-30 mg/kg/j
Pneumocoque banal (otite fébrile > 38,5 °C et douloureuse)	<b>AUGMENTIN, CIBLOR, amoxicilline</b> 100 mg/kg/j <b>ORELOX, OROKEN</b> 8 mg/kg/j <b>ZINNAT</b> 20-30 mg/kg/j <b>PÉDIAZOLE</b>
Pneumocoque à sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP), suspecté après échec de l'antibiothérapie de 1re intention ou après prélèvement bactériologique	<b>Amoxicilline</b> : 150 mg/kg/j ou <b>AUGMENTIN pédiatrique + CLAMOXYL</b> (1 dose-kg x 3/j, soit 80 mg/kg/j d' <b>amoxicilline</b> + 70 mg/kg/j d' <b>amoxicilline</b> pour obtenir une dose de 150 mg/j d' <b>amoxicilline</b> )
Uniquement après confirmation bactériologique et antibiogramme du PSDP (CMI > 2 mg/L)	<b>ROCÉPHINE</b> IM ou IV 50 à 100 mg/kg/j
Allergie à la pénicilline	<b>PÉDIAZOLE</b> <b>BACTRIM</b> 2 mL/5 kg/j <b>DALACINE</b> 30 mg/kg/j en 3 prises

### Évolution/surveillance

- Guérison spontanée dans 70 % des cas :
  - à J3 (si otite congestive ou évolution défavorable) et J8 : otoscopie de contrôle ; tympan normal ;
  - épanchement rétro-tympanique : surveillance.
- Échec du traitement :
  - paracétèse avec prélèvement bactériologique ;

- adaptation du traitement antibiotique.
- Otite trainante > 3 sem. :
  - inadéquation des traitements antibiotiques ;
  - mastoïdite subaiguë ;
  - CAT : hospitalisation pour fenêtre thérapeutique et bilan ORL et pédiatrique ;
  - otite récidivante (> 4 épisodes par hiver) : présuppose un examen normal du tympan entre chaque épisode aigu.

## OTITES MOYENNES AIGÜES À RÉPÉTITION

- Adénoïdectomie : en cas d'hypertrophie des amygdales pharyngées appréciée sur la nasofibroscopie + la radio de cavum.
- Traitement d'une otite séromuqueuse sous-jacente.
- Traitement d'un reflux gastro-œsophagien.
- Traitement d'une carence martiale.
- Éviction du tabagisme passif.
- Éviction de la vie en collectivité (crèche).
- **Antihistaminique H<sub>1</sub> : loratadine (CLARITYNE)** pendant 3 mois.
- **Vaccin antipneumococcique.**

## OTITE SÉROMUQUEUSE DE L'ENFANT (1)

### Définition

L'otite séromuqueuse (OSM) est un épanchement séreux (glue) dans la caisse du tympan.

Très fréquente entre 2 et 8 ans, mais guérison spontanée fréquente en moins de 3 mois dans 90 % des cas.

### Facteurs favorisants

- **Inflammation post-infectieuse de l'oreille moyenne** : otite moyenne aiguë, rhinopharyngite.
- **Dysfonctionnement de la trompe d'Eustache** par obstruction nasale, malformation du voile du palais, fente vélo-palatine, tumeur du cavum, trisomie 21.
- **Végétations adénoïdes** : foyer infectieux chronique favorisant l'inflammation de la trompe d'Eustache.

### Circonstances du diagnostic

- Bilan d'otites moyennes aiguës récidivantes.
- Surdit  chez l'enfant.
- Sensation de pl nitude de l'oreille.
- Examen syst matique de l'oreille.

### Diagnostic

Le diagnostic est clinique, bas  sur l'histoire clinique et l'otoscopie (tympan mat et d poli, bulles r trotympaniques, r traction tympanique d butante).

### Examens audiom triques

Ils permettent la confirmation du diagnostic et l' valuation du retentissement.

- **Imp dancem trie** : surdit  de transmission.
- **Tympanogramme** : courbe plate ( panchement r tro-tympanique) ou d calage du pic (dysfonction tubaire).
- **R flexe stap dien** : abol  ou diminu .
- **Audiom trie** (la technique est adapt e   l' ge de l'enfant) : surdit  de transmission de 20   30 dB sur les fr quences graves et conversationnelles (250-2 000 Hz).

###  volution

- La majorit  des OSM disparaissent en moins de 3 mois et les  pisodes it ratifs d'OSM disparaissent apr s l' ge de 8 ans.

- **Complications** : dans les formes prolong es ou r cidivantes :

- OMA r cidivantes ;
- perforation tympanique, parfois associ e   une otorrh e ;
- atrophie tympanique et r traction tympanique pouvant aboutir au cholest eatom  ;
- myringoscl rose.

### Traitement

-  ducation : mouchage, arr t du reniflement, suppression du tabagisme passif.
- Traitement d'un reflux gastro- sophagien.
- Enseignement des m thodes d'insufflation tubaire.
- Man uvres de Politzer et de Valsalva, gonflement d'un ballon par le nez.

### Traitement m dical en 1  intention

- Indications :
  - OMA r cidivantes et OSM persistantes ;
  - surdit  > 25-30 dB.
- M thode : cure de 15 j associant :
  - **antibiotique** r sistant aux b ta-lactamases (amoxicilline + a. clavulanique ; ou c phalosporine 3  g n ration) ;
  - **cortico ides** : b tam thasone (**C LEST NE**), 10 g tes/kg/j ;
  - traitement local : d sinfection rhinopharyng e avec s rum sal  iso ou hypertonique 3   6 fois par jour pendant 1 mois   associ    une corticoth rapie locale (enfant > 3 ans) : **mom tasone fuorate (NASONEX)** 1 pulv risation (50 µg) le matin dans chaque narine apr s les lavages de nez pendant 1 mois.
- N'ont pas fait la preuve de leur efficacit  : **mucor gulateurs, antihistaminiques type 1, anti-inflammatoires non st ro idiens.**

## OTITE SÉROMUQUEUSE DE L'ENFANT (2)

### Traitement chirurgical en 2<sup>e</sup> intention

#### ► Pose d'aérateur trans-tympanique (ATT)

- À partir de l'âge de 2-3 ans en cas d'échec après 3 mois de traitement médical bien conduit.
- D'emblée sur terrain pathologique :
  - surdité de perception préexistante ;
  - troubles du langage ;

- trisomie 21, fente vélo-palatine, tumeur du cavum ;
  - réaction tympanique non contrôlable.
  - Associée à une adénoïdectomie
- En cas d'hypertrophie importante des végétations adénoïdes appréciée sur l'examen du cavum (nasofibroscope) et pour certains sur une radiographie du cavum de profil en inspiration bouche fermée.

#### Pose d'aérateurs trans-tympaniques (« yoyo »)

- Sous anesthésie générale chez l'enfant, sous anesthésie locale chez l'adulte.
- Entre 18 mois et 6 ans.
- Intervention à réaliser pendant l'automne et l'hiver mais pas en été (guérison spontanée).
- Complications :
  - otorrhée purulente sur aérateur (staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*).

CAT : gouttes auriculaires antibiotiques non ototoxiques pendant 5 j : **OTOFA, OFLOCET auriculaire** ;

- obstruction de l'aérateur : faire un nettoyage sous microscope (parfois sous anesthésie générale) ;
- perforation tympanique résiduelle (1 à 5 %) ;
- récurrence d'OSM ;
- expulsion précoce de l'aérateur ;
- otorragie sur un granulome tympanique.
- Précautions : pour certains et selon le type d'ATT mis en place, il faut éviter l'introduction d'eau dans le conduit auditif externe.

#### BPC : Aérateurs trans-tympaniques (ATT)

- 1) Il n'y a pas lieu de mettre en place un ATT chez un malade pour lequel la symptomatologie fonctionnelle et/ou les constatations otoscopiques et/ou les données du bilan complémentaire datent de moins de 2 mois.
- 2) Il n'y a pas lieu de mettre en place des ATT utilisant un autre matériel que la silicone ou le Téflon. Il n'y a donc pas lieu, en particulier, d'utiliser un ATT en titane.
- 3) Il n'y a pas lieu de contrôler l'ATT à des intervalles courts (inférieurs à 3 ou 4 mois), après le premier contrôle qui se fait, lui, au cours du premier mois, en dehors des complications ou de cas particuliers liés au terrain (otite séreuse et appareillage), ou liés à l'état anatomique (rétraction inquiétante [fond de poche non visible]).

**OTITE EXTERNE (1)****Définition**

L'otite externe est une dermo-épidermite aiguë du conduit auditif externe (CAE) sur une peau préalablement lésée par :

- traumatisme : grattage, coton-tige, corps étranger (bouchon de cérumen surtout en cas de tentative d'extraction), lavages répétés détergents ;
- maladie dermatologique : eczéma constitutionnel ou de contact (gouttes auriculaires), psoriasis, dermatite séborrhéique ;
- humidité et macération (baignades répétées) ;
- otorrhée chronique par otite moyenne chronique.

Les germes en cause sont les saprophytes du CAE : staphylocoque doré et épidermidis, *Pseudomonas aeruginosa*, streptocoque, *Proteus*, colibacille.

**Diagnostic**

Le diagnostic est clinique.

Otalgie intense, exacerbée par la traction du pavillon et la pression du tragus. CAE inflammatoire, sténosé, avec des sécrétions purulentes.

L'apexie est de règle.

**Traitement**

- Nettoyage du CAE par le médecin.
- Au porte-coton ou à l'aspiration d'oreille.
- L'instillation d'eau est contre-indiquée.

- Gouttes auriculaires antibiostéroïdes.
- Pas de perforation tympanique : **POLY-DEXA sol. auriculaire** (1 dosette en bain d'oreille 2 fois/j) pendant 7 j.
- Sinon : **OTOFA OFLOCET auriculaire** : bain d'oreille (A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain) 2 fois/j pendant 7 j.
- Méchage-calibrage CAE par *Pop* (pansement expansif de conduit auditif externe).
- Imprégné de gouttes auriculaires : effet antalgique et meilleure diffusion de l'**antibiotique**.
- Doit être remplacé toutes les 48 h, selon l'évolution.

- **Antalgique** de classe II.

**Codéine + paracétamol, DAFALGAN CODÉINE**, 1-2 cp. x 3/j.

- Éviction des facteurs favorisants.
- Arrêts des traumatismes locaux.
- Séchage du CAE.
- Traitement de la maladie dermatologique sous-jacente.
- Pas d'antibiothérapie orale.
- Sauf en cas de complication, de fièvre ou d'échec du traitement local, et après avoir réalisé un prélèvement bactériologique par écouvillonnage du CAE : **synergistine (PYOSTACINE)**, 2 cp. 500 mg x 2/j pendant 7 j.
- Chez le diabétique ou l'immunodéprimé, au stade précoce d'otite externe, il est impératif d'associer au traitement local une antibiothérapie *per os* par **fluoroquinolone** type **ciprofloxacine (CIFLOX)**, 500 mg x 2/j pendant 2 sem.

## GOUTTES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES ET ANTIFONGIQUES

## ■ Polymyxine B + oxytétracycline + dexaméthasone + nystatine

AURICULARUM					
Poudrage : 1 insufflation tous 2-3 j Plombage (par l'ORL) : microaspiration à J15 Suspension : 1 bain d'oreille/j pendant 5-7 j renouvelable		1 fl. pdre + solv amp. de 10 mL	6,59	I	30 % 6,59

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique : polypeptide (**polymyxine**), **tétracycline (oxytétracycline)** : synergiques et actifs sur *Haemophilus influenzae*, *E. coli*, staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa* mais résistance des streptocoques notamment pneumocoque.

Anti-inflammatoire : corticoïde (**dexaméthasone**).

Antifongique (**nystatine**) actif sur les champignons levuriformes et filamenteux (*Candida*, *Aspergillus*, etc.).

## INDICATIONS

Otite externe mycosique.

Suppuration sur cavité d'évidement d'oreille.

## CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique sèche (sans otorrhée).

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Corticoïdes : infection locale virale (zona, herpès).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Surveillance par un spécialiste ORL pour pratiquer une microaspiration de l'oreille en fin de traitement et éviter l'accumulation de la poudre.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : risque de surdité de perception endocochléaire irréversible et de vertiges.

Sélection de germes résistants.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Accumulation de la poudre dans le CAE.

## MODE D'ADMINISTRATION

Poudrage : 1 insufflation de poudre/2-3 j.

Plombage (par le spécialiste ORL) : à nettoyer par microaspiration 15 j plus tard.

Suspension (1 fl. de poudre dans 10 mL **chlorure de sodium** 0,9 %) : 1 bain d'oreille x 1/j pendant 5-7 j.

## OTITE EXTERNE (2)

### Formes cliniques

#### Otite externe nécrosante (maligne)

- Otite externe traînante chez le sujet immunodéprimé, diabétique ou âgé avec des signes généraux (fièvre) et extension locorégionale de l'infection (vers la parotide, la mastoïde, le cou). Germe : *Pseudomonas aeruginosa*.

- Évolution vers l'ostéite du rocher avec paralysie des paires crâniennes et complications endocrâniennes (thrombophlébite, méningite, abcès cérébral).

#### ► Prise en charge

- Hospitalisation en urgence.
- Prélèvement bactériologique de l'otorrhée, bilan biologique, PL au moindre doute de méningite.
- TDM du rocher et cérébrale ± IRM de la base du crâne ± scintigraphie osseuse du rocher.
- Antibiothérapie double parentérale IV antipyocyanique et antistaphylococcique par **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** type **ceftazidime (FORTUM)** associée à une **fluoroquinolone** type **ciprofloxacine (CIFLOX)**. Le traitement doit être prolongé, relais *per os* en monothérapie par **fluoroquinolone** pendant 9 sem.

- Équilibration du diabète.
- Soins locaux antibiocoïdes.
- Si échec : traitement chirurgical.

#### Périchondrite de l'oreille

- Extension de l'infection vers le cartilage du pavillon.
- Prélèvement bactériologique local.
- Antibiothérapie orale pendant 8 j : **synergistine (PYOSTACINE)** puis adaptation au germe (possible *Pseudomonas aeruginosa*).

#### Otomycose : otite externe mycotique

- Traitement long, contrôle à 7 j puis tous les 15 j.
- Otite externe résistante au traitement avec une otorrhée blanchâtre épaisse. Germes : *Aspergillus fumigatus* ou *niger* (90 % des cas) ou *Candida albicans*.
- Prélèvement mycotique de l'otorrhée.
- **Antifongique** en gouttes auriculaires : **AURICULARUM suspension** : 1 bain d'oreille 2 fois par jour ou **AURICULARUM pulvérisation** : 1 pulvérisation 2 fois par semaine pendant 3 sem.
- Contrôle otoscopique à 7 j et renouvellement du traitement si nécessaire.



## GOUTTES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES NON OTOTOXIQUES

## ■ Rifamycine

OTOFA					
Bain d'oreille de 10 min x 2/j ou instillations locales : A. : 5 gttes x 3/j E. : 3 gttes x 3/j pendant 7-10 j	10 mL (fl. compte-gttes)	3,59	I	65 %	0,36

## ■ Ofloxacine

OFLOCET					
Solution auriculaire Bain d'oreille 10 min 1 dose x 2/j pendant 7-10 j	20 doses 0,5 mL (1,5 mg)	5,35	I	30 %	0,27

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques (**fluoroquinolone** et **rifamycine**) actifs en application locale sur les bactéries Gram+ et Gram- des otites externes et moyennes aiguës et chroniques. Utilisation possible en cas de perforation tympanique (non ototoxique).

## INDICATIONS

Otite externe avec tympan ou perforé.  
Otorrhée sur otite chronique, sur aérateur trans-tympanique et sur cavité d'évidement.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **rifamycine** ou aux sulfites (exci-pient).

Allergie à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Coloration des tissus (surveillance difficile) et salissant (**rifampicine**).

Durée du traitement < 10 j.

## GOUTTES ET POMMADES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES OTOTOXIQUES (1)

### Pommade auriculaire

#### ■ Chlortétracycline

<b>AURÉOMYCINE MONOT</b>					
2-3 appl./j pendant 5-7 j	15 g (tube) à 3 %		I	NR	

### Antibiotiques + corticoïdes

#### ■ Néomycine + polymyxine B + fluocinolone

<b>ANTIBIO SYNALAR</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL	2,79	I	30 %	0,28

#### ■ Néomycine + polymyxine B + dexaméthasone

<b>POLYDEXA</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL (fl. compte-gttes)	2,60	I	30 %	0,26

### Antibiotique + corticoïde + anesthésique local

#### ■ Néomycine + polymyxine B + fludrocortisone + lidocaïne

<b>PANOTILE</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	8 mL (250 gttes)	2,52	I	30 %	0,32

## GOUTTES ET POMMADES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES OTOTOXIQUES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques : aminoside (**néomycine**), polypeptide (**polymyxine B**), tétracycline (**chlortétracycline**) : actifs sur *Haemophilus influenzae*, *E. coli*, staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*, mais résistance des streptocoques notamment pneumocoque.

Anti-inflammatoire : corticoïdes (**fluocinolone acétonide, dexaméthasone, fludrocortisone**).

Anesthésique local : **lidocaïne**.

### INDICATIONS

Otitis externes à tympan fermé notamment eczéma du conduit auditif externe (**corticoïde**). Pour certains, otites moyennes aiguës congestives (**anesthésiques locaux**) à visée antalgique et en complément de l'antibiothérapie par voie générale.

### CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique ++++.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Corticoïdes : infection locale virale (zona, herpès) ou fongique.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Ne pas instiller sous pression dans le conduit auditif externe mais possibilité d'utiliser un méchage du conduit type *Pop-Oto-Wick*.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : surdité de perception endocochléaire irréversible et vertiges.

Sélection de germes résistants.

## OTITE CHRONIQUE (1)

L'otite chronique est une inflammation chronique des cavités de l'oreille moyenne (caisse du tympan et cavités mastoïdiennes).

### Tympanosclérose

Fibrose calcaire de la muqueuse des cavités de l'oreille = tympanosclérose ; du tympan = myringosclérose (plaques blanchâtres sur le tympan).

### Traitement chirurgical

Tympanoplastie et ossiculoplastie en cas de surdité invalidante ; avec des résultats médiocres. Sinon appareillage auditif.

### Otite chronique muqueuse à tympan ouvert

#### Diagnostic

Otorrhée, perforation tympanique, *non marginale* avec muqueuse de fond de caisse inflammatoire, hypoacousie de transmission.

#### Évolution

Surinfections des cavités de l'oreille moyenne (reprise de l'otorrhée) par infections rhinosinusiennes ou par l'introduc-

tion de l'eau dans l'oreille. Évolution possible vers la tympanosclérose.

#### Traitement

- 1<sup>er</sup> temps : assécher l'oreille (inflammation) :
  - local : soins locaux sous microscope : nettoyage et pour certains cautérisation chimique de la muqueuse hyperplasique, puis **gouttes auriculaires antibiotiques non ototoxiques** : **OFLOCET**, 1 dosette x 2/j pendant 7 j ;
  - régional : cure d'une sinusite chronique, d'une hypertrophie adénoïdienne, d'une déviation de cloison nasale, d'une amygdalite chronique ;
  - général : traitement d'une atopie, crénothérapie (soufre). Une antibiothérapie par voie générale adaptée au prélèvement bactériologique est parfois nécessaire.
- 2<sup>e</sup> temps : tympanoplastie : fermeture de la perforation tympanique. En cas d'échec du traitement médical avec poursuite de l'otorrhée : masto-antro-atticotomie pour éradication des lésions muqueuses.

## OTITE CHRONIQUE (2)

### Poches de rétraction tympanique et cholestéatome

Rétraction du tympan dans la caisse par destruction de la couche fibreuse du tympan.

Il s'agit de **poches de rétraction** :

- contrôlables ;
- non contrôlables, non autonettoyantes : fond non visible par accumulation de débris épidermiques. Poches atticales (*pars flaccida*). Premier stade du cholestéatome : présence dans les cavités de l'oreille moyenne d'un épithélium malpighien kératinisé, desquamant, migrateur, extensif et destructeur. Il peut être congénital ;
- rompues : cholestéatome surinfecté avec otorrhée purulente fétide ;
- évolutives (risque élevé de cholestéatome) ou stables.

### Diagnostic clinique

- Otorrhée résistante souvent fétide.
- Surdit   de transmission.
- Otoscopie bilat  rale sous microscope ou optique :
  - perforation tympanique *marginale* (cadre osseux souvent lys  ), surtout quadrant post  ro-sup  rieur (= *pars flaccida* = membrane de Schrapnell) avec issue de d  bris   pidermiques, parfois masqu  e par une cro  te ou un polype r  actionnel ;
  - masse blanch  tre visible    travers le tympan ;

– poche de r  traction non contr  lable, non autonettoyante et non r  ductible en man  uvre de Valsalva.

### Bilan

Audiom  trie et TDM de l'oreille moyenne.

###   volution

Souvent d  favorable car processus destructeur (ost  olytique).

- Paralysie faciale p  riph  rique.
- Fistule labyrinthique avec risque de labyrinthite suppur  e et de m  ningite.
- Br  che m  ning  e : risque de m  ningite, d'abc  s temporal, de thrombophl  bite du sinus lat  ral.

### Traitement chirurgical

- Traitement de la poche de r  traction par ATT ou tympanoplastie.
- Ex  r  se compl  te du cholest  atome et des l  sions ost  itiques associ  es (mastoidectomie) et pr  servation de l'audition (reconstruction des osselets = ossiculoplastie et du tympan = tympanoplastie).
- La technique d  pend du type de cholest  atome, de son extension, des possibilit  s de suivi    long terme du patient, de l'audition des 2 oreilles.
- Plusieurs temps : 1  r temps d'ex  r  se puis temps de compl  ment d'ex  r  se et de r  habilitation auditive.

**La surveillance est prolong  e.**

## SURDITÉ (1)

### Orientations diagnostiques

- Antécédents personnels et familiaux.
- Évolutivité de la surdité.
- Signes associés : otologiques, vestibulaires, neurologiques.
- Otoscopie.
- Acoumétrie (diapason) : épreuves de Rinne et de Weber.
- Examens neurologiques et vestibulaires.
- Audiométrie tonale liminaire : seuils auditifs de sons purs en conduction aérienne (ca) et osseuse (co).
- Audiométrie vocale.
- Impédancemétrie : tympanométrie (compliance tympano-ossiculaire) et réflexe stapédien.
- Potentiels évoqués auditifs (PEA) : seuils auditifs du jeune enfant et surdité de perception.

### Étiologies

#### Surdités de transmission

- Weber : latéralisé à l'oreille malade.
- Rinne acoumétrique négatif (ca < co).
- Rinne audiométrique ouvert (co normale > ca).

#### ► Pathologies de l'oreille externe

- Otite externe. Corps étranger conduit auditif externe - bouchon de cérumen.
- Malformations et tumeurs de l'oreille externe.

#### ► Pathologies de l'oreille moyenne

#### • Otospongiose (otosclérose)

- Surdité de transmission par blocage stapédo-vestibulaire (étrier-fenêtre ovale)

puis évoluant vers l'oreille interne (surdité mixte, acouphènes).

- Transmission autosomique dominante, à pénétrance incomplète et expressivité variable. Atteint la femme jeune, avec des poussées pendant les grossesses.

- Diagnostic : surdité de transmission bilatérale asymétrique prédominant sur les graves, améliorée par le bruit (paracousie de Willis) avec des tympans normaux. Tympanogramme normal ; absence de réflexe stapédien (parfois blocage incomplet = effet on-off).

- Traitement chirurgical si surdité invalidante : rétablissement de l'effet collumellaire par un piston entre l'enclume et la fenêtre ovale avec platinectomie ou platinotomie. Résultats excellents mais effet imprévisible sur les acouphènes et sur la surdité de perception.

- Otite moyenne aiguë.

- Catarrhe tubaire et otite séromuqueuse.

- Otite chronique.

- Perforation traumatique du tympan.

- Vérifier l'absence de lésion ossiculaire associée (surdité de transmission > 30 dB) et de lésion de l'oreille interne (surdité mixte).

- Étiologies : barotraumatisme (plongée, avion), blast, corps étranger, traumatisme chirurgical, ablation d'un aérateur trans-tympanique.

- Traitement chirurgical en l'absence de fermeture spontanée (3 mois) : myringoplastie (greffe de tympan).

- Hémotympan post-traumatique et traumatisme de la chaîne ossiculaire.

## SURDITÉ (2)

### Surdit  de perception

- Weber : lat ralis     l'oreille saine.
- Rinne acoum trique positif (ca > co).
- Rinne audiom trique ferm  (co anormale = ca).
- PEA et examens vestibulaires.

#### ► Surdit  endocochl aire

##### • Surdit  brusque

- M canisme non connu : atteinte de la microvascularisation de la cochl e, m canisme viral, auto-immun ou allergique ?
- Facteurs de risque : HTA, dyslipid mie, diab te, **contraceptifs oraux**.
- Baisse brutale (en moins de 24 h), unilat rale de l'audition (surdit  de perception) d'au moins 30 dB sur 3 fr quences audiom triques successives. Elle s'accompagne parfois d'acouph nes (1/3 des cas) ou de sensation vertigineuse. L'examen clinique, notamment neurologique, est normal. Examens biologiques de 1 re intention : NFS, VS, CRP, ionogramme sanguin et bilan lipidique. Bilan audio-vestibulaire. Imagerie par IRM (des conduits auditifs internes et de l'angle ponto-c r belleux) syst matique (sans urgence) pour  liminer un neurinome de l'acoustique. L'imp dancem trie est normale. Les  preuves vestibulaires sont normales. Les potentiels  voqu s auditifs (si la surdit  est < 70 dB sur les fr quences 2 000-4 000 Hz) confirment qu'il s'agit d'une surdit  endocochl aire.
-  volution : importance pronostique de la courbe audiom trique (5 types) r gres-  
sion *ad integrum*, s quelles, r cidives.

C'est une urgence th rapeutique (pronostic fonctionnel) mais aucun traitement n'a prouv  son efficacit  (aucune AMM). L'hospitalisation est de r gle pendant 1 sem. (bilan, traitement parent ral, surveillance, repos) mais la prise en charge peut  tre effectu e   domicile.

- Corticoth rapie IV : **m thylprednisolone (SOLUM DROL)** 1 mg/kg/j en 1 injection pendant 6 j ou *per os* **prednisone (CORTANCYL)** cp. 20 ou 5 mg, 1 mg/kg/j pendant 6 j.
- Repos au calme et **anxiolytique** si besoin : **bromaz pam (LEXOMIL)** cp. 4 mg, 1/4-1/4-1/2.

##### • Presbyacousie

- Surdit  de perception bilat rale et sym trique, pr dominante sur les aigus, d'apparition progressive   partir de 50 ans par vieillissement de la cochl e.
- Audiom trie vocale pour  valuer le retentissement : distorsion = diminution de l'intelligibilit .
- Traitement en cas de g ne sociale : proth se auditive amplificatrice.

##### • Traumatisme de l'oreille interne

- Fracture du rocher avec atteinte du labyrinthe : syndrome vestibulaire p riph rique et surdit  de perception s'aggravant rapidement jusqu'  la cophose.
- Barotraumatisme : surdit  pr dominant sur les 4 000 Hz, avec syndrome vestibulaire p riph rique et acouph nes. Possibilit  de fistule labyrinthique n cessitant une fermeture chirurgicale.
- Exposition chronique au bruit : bruits aigus intenses ; surtout d'origine professionnelle (maladie professionnelle). Surdit  bilat rale et sym trique pr dominant sur les aigus (4 000 Hz). Traitement :  viction du bruit (m decine du travail), proth se auditive.

##### • Labyrinthite toxique

- Atteinte bilat rale et sym trique, irr versible.
- Aminositides : toxicit  dose-d pendante (forte dose, dur e prolong e et insuffisance r nale).  galement gouttes auriculaires ototoxiques en cas de perforation du tympan.
- Autres : **cisplatine**, **quinine**, acide  tacrynique, alcool, mercure, plomb, monoxyde de carbone, etc.

##### • Labyrinthite infectieuse

-  tiologie bact rienne otitique (otite aigu  ou chronique) et post-m ningitique ou virale.
- Traitement selon l' tiologie.

##### • Otospongiose cochl aire

- **Forme cochl aire de la maladie de M ni re**

## SURDITÉ (3)

### ► *Surdité rétrocochléaire*

#### • **Neurinome de l'acoustique**

– Schwannome du nerf vestibulaire (VIII) dans le conduit auditif interne au contact du nerf facial (VII) puis dans l'angle ponto-cérébelleux au contact du nerf trijumeau (V) puis des nerfs mixtes (IX, X, XI).

– Diagnostic : signes otologiques et neurologiques unilatéraux :

- surdité de perception unilatérale parfois brutale ;

- acouphènes unilatéraux ;

- troubles de l'équilibre (syndrome vestibulaire périphérique) souvent minimes.

– Bilan diagnostique et extension :

- audiométrie tonale et impédancemétrie : surdité de perception unilatérale rétrocochléaire ;

- potentiels évoqués auditifs (PEA) du tronc cérébral ;

- explorations vestibulaires : aréflexie vestibulaire unilatérale (syndrome vestibulaire périphérique) avec compensation centrale ;

- imagerie par résonance magnétique (IRM) des conduits auditifs internes et du tronc cérébral avec injection de gadolinium.

– Traitement : exérèse chirurgicale par voie oto-neurochirurgicale (translabirintique ou suspétreuse). Risque important de paralysie faciale postopératoire.

#### • **Surdité centrale**

Atteinte du tronc cérébral (vasculaire, sclérose en plaques) ou atteinte cortico-sous-corticale.



## CORPS ÉTRANGERS DE L'OREILLE

### Symptômes

Otalgie, otorrhée purulente ou sanglante, vertige, sensation de plénitude de l'oreille, surdité.

### Diagnostic

Il est fait par l'otoscopie.

### Traitement

Tout corps étranger du conduit auditif externe (CAE) doit être extrait par un spécialiste ORL sous contrôle microscopique avec le matériel adapté.

L'extraction peut être tentée par le médecin généraliste uniquement par un lavage d'oreille en l'absence d'antécédent de pathologique tympanique.

### Extraction

En cas d'échec ou de contre-indication du lavage d'oreille, le corps étranger est extrait manuellement sous contrôle microscopique, parfois sous anesthésie générale chez l'enfant qui ne peut pas être immobilisé.

### Prévention de l'otite externe en cas d'extraction difficile

**Gouttes auriculaires antibiotiques et corticoïdes** (en l'absence de lésion tympanique) : **POLYDEXA solution auriculaire**, bain d'oreille 2 fois/j pendant 5 j (A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/j).

### Complications

Elles sont principalement dues aux tentatives d'extraction : perforation tympanique, rupture de la chaîne ossiculaire.

## BOUCHON DE CÉRUMEN

Le cérumen protège la fragile peau du conduit auditif externe ; il doit être préservé pour éviter les otites externes.

### Prévention du bouchon

Il faut interdire l'utilisation du coton-tige. Le lavage des oreilles est limité au nettoyage à l'eau du méat, hebdomadaire chez l'enfant, sans savonnage excessif du conduit auditif externe.

On peut utiliser des solutions adaptées en pulvérisation type **AUDISPRAY**.

### En cas de bouchon

Il peut être dissous par des **instillations auriculaires de céruminolytique, xylène (CÉRULYSE)** : 1 bain d'oreille x 1-2/j pendant 3 j) en l'absence de pathologie tympanique, puis extrait, soit par un lavage d'oreille, soit manuellement sous contrôle otoscopique.

## CORPS ÉTRANGERS DE L'OREILLE

### Symptômes

Otalgie, otorrhée purulente ou sanglante, vertige, sensation de plénitude de l'oreille, surdité.

### Diagnostic

Il est fait par l'otoscopie.

### Traitement

Tout corps étranger du conduit auditif externe (CAE) doit être extrait par un spécialiste ORL sous contrôle microscopique avec le matériel adapté.

L'extraction peut être tentée par le médecin généraliste uniquement par un lavage d'oreille en l'absence d'antécédent de pathologique tympanique.

### Extraction

En cas d'échec ou de contre-indication du lavage d'oreille, le corps étranger est extrait manuellement sous contrôle microscopique, parfois sous anesthésie générale chez l'enfant qui ne peut pas être immobilisé.

### Prévention de l'otite externe en cas d'extraction difficile

**Gouttes auriculaires antibiotiques et corticoïdes** (en l'absence de lésion tympanique) : **POLYDEXA solution auriculaire**, bain d'oreille 2 fois/j pendant 5 j (A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/j).

### Complications

Elles sont principalement dues aux tentatives d'extraction : perforation tympanique, rupture de la chaîne ossiculaire.

## BOUCHON DE CÉRUMEN

Le cérumen protège la fragile peau du conduit auditif externe ; il doit être préservé pour éviter les otites externes.

### Prévention du bouchon

Il faut interdire l'utilisation du coton-tige. Le lavage des oreilles est limité au nettoyage à l'eau du méat, hebdomadaire chez l'enfant, sans savonnage excessif du conduit auditif externe.

On peut utiliser des solutions adaptées en pulvérisation type **AUDISPRAY**.

### En cas de bouchon

Il peut être dissous par des **instillations auriculaires de céruminolytique, xylène (CÉRULYSE)** : 1 bain d'oreille x 1-2/j pendant 3 j) en l'absence de pathologie tympanique, puis extrait, soit par un lavage d'oreille, soit manuellement sous contrôle otoscopique.

## ÉPISTAXIS (1)

L'épistaxis est un saignement d'origine nasosinusienne, s'extériorisant par les narines (épistaxis antérieure), et/ou par le rhinopharynx (épistaxis postérieure). C'est une urgence thérapeutique fréquente, le plus souvent isolée et bénigne (épistaxis essentielle), parfois gravissime surtout dans les formes secondaires (causes locales et générales).

- 1/ Apprécier la gravité immédiate (retentissement hémodynamique).
- 2/ Assurer l'hémostase locale.
- 3/ Rechercher et traiter l'étiologie.

### Signes de gravité

- **Retentissement hémodynamique ++** : état de choc hémorragique (tachycardie, hypotension artérielle, soif, oligurie, troubles de la conscience).
- Antécédent d'épistaxis graves. Étiologie connue et à l'origine d'épistaxis graves.
- Terrain fragilisé : coronarien, sujet âgé.
- Saignement bilatéral, abondant, antérieur et postérieur, non contrôlé par les premières mesures d'hémostase.

### Hémostase locale

#### Conduite à tenir

- Rassurer le patient et le mettre au calme. Laver les taches de sang.
- Mettre en position demi-assise, les pieds surélevés (en cas de tendance syncopale, décubitus latéral). Demander au patient de respirer la bouche ouverte en crachant le sang sans le déglutir.
- **Mouchage** efficace bilatéral (évacuation des caillots).
- **Compression bidigitale des ailes du nez** (entre pouce et index) pendant 10 min **la tête penchée en avant**.
- Compresses froides humides posées sur le dos du nez. Sucrer des glaçons (vasoconstriction).

#### En cas de persistance du saignement

- **Tamponnement antérieur uni ou bilatéral**
- Évacuation des caillots par mouchage +++.

- Anesthésie locale par 5-10 pulvérisations nasales de **XYLOCAÏNE 5 % nébuliseur** ou mise en place d'un coton de **XYLOCAÏNE 5 % à la naphazoline** dans les fosses nasales pendant 2 min.

- On dispose de 3 types de tamponnement :

- **mèche grasse non résorbable** type **TULLE GRAS LUMIÈRE** ou **mèche hémostatique résorbable**, en cas de troubles de l'hémostase (**AVK**) type **SURGICEL**. Ces mèches sont mises en place avec une pince coudée de Pulitzer, d'avant en arrière, en accordéon le long du plancher de la fosse nasale.

- **tampons expansibles hémostatiques** type **ALGOSTÉRIL** et **MEROCEL**, moins douloureux lors de la mise en place et du retrait mais moins efficaces que le méchage classique ;

- **sonde à double ballonnet** (5 à 8 cm<sup>3</sup> dans le ballon du cavum et 15 à 20 cm<sup>3</sup> dans le ballon antérieur). À réserver après échecs du méchage antérieur bilatéral car nécessite une hospitalisation pour surveillance, traitement antalgique adapté (parfois nécessité de **morphiniques**) et dégonflage du ballonnet toutes les 6 h (risque de nécrose de la muqueuse).

#### ➤ Hémostatique nasal

Après retrait du tamponnement, **HUILE GOMENOLÉE** 2 à 4 gttes x 3/j pendant 7 j, précédé d'un lavage nasal au **sérum physiologique**.

➤ **Antibiothérapie en cas de méchage prolongé (> 72 h)**

**Amoxicilline (CLAMOXYL)** 1 g x 2/j pendant 7 j.

#### ➤ Mesures générales

**Antalgiques (paracétamol ± codéine)** et alimentation froide et liquide. Le tamponnement est laissé en place pendant 48 h. Il est enlevé par le médecin le matin pour permettre une meilleure surveillance. Les mèches résorbables sont laissées en place et se délitent en une semaine avec les lavages de nez.

La forme grave nécessite une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé et si besoin un transfert par Samu.

## HÉMOSTATIQUES NASAUX

## ■ Goménol

<b>HUILE GOMENOLÉE</b>					
Sol. nasale enfant à 2 % E. > 6 ans : 2-4 gttes x 3/j	22 mL 2 % (fl.)		I	NR	
Sol. nasale adulte à 5 % A. : 2-4 gttes x 3/j	22 mL 5 % (fl.)		I	NR	
<b>VASELINE GOMENOLÉE</b>					
Pom. 5 % A. et E. > 6 ans : 1 appl./j	1 tube (15 g) 5 %		I	NR	
<b>GOMENOLEO</b>					
1 ampoule par narine	10 amp. (5 mL) 2 % 10 amp. (5 mL) 5 %		I I	NR NR	

## ■ Phénazone + tanin + hamamélis

<b>HEC</b>					
1 appl. muqueuse nasale x 2/j pendant 7 j	1 tube 25 g			NR	

## ■ Acide borique

<b>HOMÉOPLASMINE</b>					
A. et E. > 3 ans : 1 appl. muqueuse nasale x 2/j pendant 7 j	1 tube 18 g 1 tube 40 g		I I	NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique, prévention des croûtes nasales.

**HEC** : hémostatique.**HOMÉOPLASMINE** : visée trophique sur la muqueuse nasale.**INDICATIONS**

Après épistaxis, méchage nasal et chirurgie endonasale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Courte durée de traitement : &lt; 7 j.

## ÉPISTAXIS (2)

### Hémostase

• **Tamponnement postérieur et antérieur bilatéral** (après échec du tamponnement antérieur isolé).

Il est fait souvent sous anesthésie générale. Il est réalisé avec des mèches grasses ou avec une sonde à ballonnet double ou simple complétée avec des mèches. Il est associé à un traitement antibiotique (amoxicilline) et antalgique.

• **Électrocoagulation sous guidage endonasal endoscopique.**

• En cas de persistance de l'épistaxis, on peut réaliser :

- une embolisation des branches de la carotide externe au cours d'une artériographie sélective (artères maxillaires internes, artères faciales) ;
- une ligature chirurgicale des artères ethmoïdales et sphéno-palatines.

### Réanimation

• **Traitement de l'état de choc hémorragique** : pose de 1 ou 2 voies veineuses de bon calibre, perfusions intraveineuses de **macromolécules** (type **VOLUVEN**), transfusions de culots globulaires isogroupes isorhéus secondairement.

• **Bilan sanguin** : groupe, Rhésus, RAI, NFS (Hb, Ht, plaquettes), hémostase (TP, TCK, fibrinogène), ionogramme sanguin, créatinémie, glycémie.

• **Traitement de l'étiologie** : correction d'une hypertension artérielle sévère, d'un trouble de l'hémostase, etc.

### Recherche et traitement de l'étiologie

#### Causes générales

• **Hypertension artérielle et artériosclérose** : étiologie la plus fréquente chez le sujet de plus de 50 ans, épistaxis postérieures récidivantes.

• **Troubles de l'hémostase** : anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires (aspirine, AINS), maladie hémorragique héréditaire (hémophilie, maladie de Willebrand, etc.), thrombopénie sévère.

• **Insuffisance rénale et hépatique.**

• **Maladies infectieuses** : fièvre typhoïde, grippe, scarlatine, maladies éruptives, pneumopathies éruptives.

#### Causes locales

• **Infections nasosinusiennes.**

• **Tumeurs nasosinusiennes** : angiofibrome nasopharyngé de l'adolescent (épistaxis parfois graves), angiofibrome de la cloison implanté sur la tache vasculaire (épistaxis minimes), cancer nasosinusal (adénocarcinome de l'ethmoïde chez le travailleur du bois, carcinome épidermoïde chez le fumeur).

• **Traumatismes externes** : traumatisme nasal avec ou sans fracture (rechercher un hématome de cloison), fractures du massif facial (artériographie en urgence en cas d'épistaxis à distance d'un traumatisme facial car suspicion de rupture d'un anévrisme carotido-caveux), traumatisme chirurgical, barotraumatisme.


• **Traumatismes internes** : corps étranger nasal (enfant entre 2 et 3 ans avec une rhinorrhée fétide homolatérale), lésions de grattage.

• **Maladie hémorragique locale** : maladie de Rendu-Osler (angiomatose hémorragique familiale autosomique dominante).

#### Épistaxis essentielle


Il s'agit d'une angiodysplasie du septum nasal antérieur au niveau de la tache vasculaire, à l'origine d'épistaxis bénignes du sujet jeune favorisées par le grattage, la toux, l'exposition solaire et lors de la grossesse (imprégnation œstrogénique). Il faut réaliser une cautérisation de la tache vasculaire en cas de récides.

## ÉPISTAXIS (3)



Épistaxis. Tamponnement antérieur bloqué.

1. la mèche est tassée d'avant en arrière ; 2. extrémité servant au blocage.



Épistaxis. Tamponnement antéropostérieur.

1. mèche antérieure ; 2. fil de rappel du mèche postérieur sortant par la bouche ; 3. mèche postérieur bloqué dans le cavum.

## RHINOPHARYNGITE DE L'ENFANT

### Définition

C'est une inflammation de la muqueuse rhinopharyngée (cavum) à partir des amygdales palatines (végétations adénoïdes lorsqu'elles sont hypertrophiées) avec participation nasale.

- Étiologie virale : *myxovirus*, *adénovirus*, *rhinovirus* avec possible surinfection bactérienne.
- Premier motif de consultation entre 6 mois et 6 ans. Maladie d'adaptation de l'enfant au milieu extérieur : immunisation contre les agents viraux et bactériens de l'air inspiré.

### Diagnostic clinique

- Rhinorrhée mucopurulente antérieure bilatérale et postérieure avec inflammation pharyngée.
- Fièvre < 39 °C bien tolérée.
- Respiration buccale bruyante avec obstruction nasale.
- Adénopathies cervicales < 2 cm douloureuses bilatérales.
- Otoscopie : myringite : inflammation modérée du ou des tympons.
- Évolution favorable spontanée en 5-6 j.

### Complications

#### Complications infectieuses loco-régionales

- Otites moyennes aiguës et séroumuqueuses.
- Laryngites sous-glottiques.
- Ethmoïdites aiguës.
- Adénophlegmons sous-angulo-maxillaires et rétropharyngés.
- Bronchites.
- Vomissements et diarrhées.

#### Complications générales

- Convulsions hyperthermiques et déshydratation chez le nourrisson.
- Troubles ventilatoires du nourrisson par obstruction nasale bilatérale avec difficultés d'alimentation.

### Traitement symptomatique de l'épisode [1]

- **Drainage rhinopharyngé** : lavages fréquents (4-6/j) des fosses nasales au **sérum physiologique (chlorure de sodium)** avec apprentissage du mouchage, sinon aspirations de nez (« mouche-bébé »).
- **Mucorégulateur** : **carbocistéine (RHINATHIOL enfant 2 %)** pendant 8-10 j : E. < 5 ans : 1 càc x 2/j, E. > 5 ans : 1 càc x 3/j.
- **Antipyrétiques** : **paracétamol (DOLIPRANE)**, 50 mg/kg/j en 3 prises, bains tièdes, découvrir l'enfant.

• **Pas d'antibiotique** sauf en cas de complication par surinfection bactérienne ; *pas de corticothérapie, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)*.

### Rhinopharyngites récidivantes et rhinopharyngites chroniques [1]

- **Définition** : plus de 3 épisodes en moins de 6 mois. Correspond à une hypertrophie des amygdales palatines (végétations adénoïdes).
- **Conséquences** :
  - retentissement sur l'état général (courbe de poids) ;
  - complications phonatoires ;
  - déformation du squelette facial (faciès adénoïdien) ;
  - complications loco-régionales à répétitions.
- **Diagnostic** : nasofibroskopie ; radiographie de profil du cavum en inspiration (d'interprétation difficile).
- **Diagnostic différentiel** : rhinopharyngites allergiques et vasomotrices.

#### Traitement :

- **Mesures hygiéno-diététiques** :
  - éviction temporaire de la crèche ;
  - arrêt du tabagisme passif ;
  - éviter les brusques variations de température ;
  - éviter les poussières ;
  - correction d'une carence martiale.
- **Adénoïdectomie** après 1 an : en cas de volumineuses végétations adénoïdes (nasofibroskopie, radio de profil du cavum en inspiration) à l'origine de troubles respiratoires obstructifs, d'otites à répétitions, d'otites séroumuqueuses récidivantes.

### CONSENSUS

[1] Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant. Recommandations de bonne pratique, *SFP et GPIIP*, 2011

## ETHMOÏDITE AIGUË DE L'ENFANT

C'est une complication d'une rhinopharyngite de l'enfant de moins de 7 ans (entre 2-4 ans).

**Les germes** en cause sont : *Haemophilus influenzae* (dont  $\beta$ -lactamases +), *staphylocoque doré*, *pneumocoque* puis *streptocoque* groupe A, *bacilles gram-négatifs* et *anaérobies*.

### Ethmoïdite aiguë non extériorisée

- Rhinopharyngite aiguë sévère et prolongée (> 6 j).
- œdème du canthus interne, douloureux à la palpation. œil normal, pas de chémosis.

• **Traitement** : celui de la rhinopharyngite (cf. Rhinopharyngite) + antibiothérapie : orale, probabiliste (*Haemophilus* dont  $\beta$ -lactamases +), **amoxicilline + acide clavulanique**, pendant 10 j :

– E. > 30 mois : **AUGMENTIN** susp. buv. 250 mg/5 mL : 50 mg/kg/j en 3-4 prises, soit 1 c-mes. 250 mg/15 kg x 3/j ;

– E. < 30 mois : **AUGMENTIN** nourrisson susp. buv. 100 mg/mL : 80 mg/kg/j en 3 prises, soit 1 dose/kg x 3/j.

• **Surveillance à 24 h** :

– évolution non favorable : hospitalisation pour TDM des sinus et antibiothérapie IV ;

– évolution favorable : rajouter **corticoïde per os**, **bétaméthasone**, **CÉLESTÈNE**, 10 gtt/kg/j en 1 prise le matin pendant 5 j.

– TDM des sinus avec injection (incidences axiales et coronales), radio de thorax ;

– bilan bactériologique : hémocultures, prélèvement du pus au méat moyen, voire ponction de la collection, ponction lombaire si doute ;

– examen ophtalmologique : signes de gravité : immobilité globe oculaire, mydriase, anesthésie cornéenne.

• **Traitements en urgence** :

– antibiothérapie intraveineuse, probabiliste (*Haemophilus* dont  $\beta$ -lactamases +, *staphylocoque doré*, *pneumocoque*) puis adaptée au germe, association : **ceftriaxone (ROCEPHINE)** 50 à 100 mg/kg/j en 1 IVL + **clindamycine (DALACINE)** 30 mg/kg/j en 3 IVL puis relais *per os* par **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** pendant 15 j ;

– en cas d'abcès et en urgence si signes de gravité : drainage chirurgical de l'abcès par voie externe ou par voie endonasale endoscopique avec prélèvement bactériologique ;

– corticothérapie après 48 h d'antibiothérapie efficace (pour certains) : **bétaméthasone (CÉLESTÈNE)**, 10 gtt/kg/j en 1 prise le matin pendant 5 j.

• **Mesures associées** :

– **antalgique-antipyrétique** : **paracétamol** ;

– aérosols antibiocorticoïdes et désinfection rhinopharyngée au **sérum physiologique pour lavage nasal** ;

– soins oculaires : **BIOCIDAN collyre** 1 gte x 4/j et pommade ophtalmique le soir.

• **Surveillance** : signes généraux, examen ophtalmologique, signes locaux, examen neurologique ++.

### Ethmoïdite aiguë extériorisée

- Extension orbito-palpébrale de l'infection.
- Bilan en urgence, en hospitalisation :

Tableaux cliniques de l'ethmoïdite aiguë extériorisée

	CELLULITE PALPÉBRALE	CELLULITE ORBITO-PALPÉBRALE	ABCÈS SOUS-PÉRIOSTÉ	ABCÈS ORBITAIRE
Cédème palpébral	+	+	+	+
Exophtalmie	Non	Réductible, axiale	Irréductible en bas, en dehors	Irréductible, axiale
Mobilité oculaire	Normale	Diminuée	Asymétrique	Très diminuée
Acuité visuelle	Normale	Normale	Normale	Diminuée
Mydriase	Non	Non	Non	Possible



## RHINITES (1)

### Rhinites aiguës infectieuses épidémiques (rhume ou coryza)

- Elles sont très fréquentes car nombreux virus, très contagieux par les gouttelettes de salive et immunité faible et provisoire.
- Facteur favorisants : le froid, l'humidité, l'obstruction nasale, l'allergie, le tabagisme.
- Diagnostic clinique devant l'association :
  - obstruction nasale bilatérale ;
  - rhinorrhée claire puis mucopurulente (même en l'absence de surinfection bactérienne) ;
  - larmoiement, éternuements ;
  - malaise général avec asthénie, céphalées, fièvre ;
  - muqueuse nasale congestive en rhinoscopie.
- Évolution vers la guérison sauf en cas de complications (otite moyenne aiguë, sinusite aiguë, laryngite, trachéite, bronchite) ; souvent persistance de la rhinorrhée et de l'obstruction nasale pendant une dizaine de jours.
- **Traitement symptomatique** :
  - Mouchages fréquents + lavages des fosses nasales au **sérum physiologique** ou à l'eau de mer isotonique (**STÉRIMAR**), 3 à 4 instillations/narine/j.
  - **Vasoconstricteurs nasaux** pendant 5 j : **oxymétazoline** (**ATURGYL**) 1 pulv. dans chaque narine x 3/j ;
  - Pas d'antibiothérapie en l'absence de complications (BPC).
  - **Antipyrétiques** : **paracétamol** (**DOLIPRANE**) 1-2 cp. à 500 mg x 3/j.

### Rhinites chroniques

#### Rhinites vasomotrices

Triade de symptômes paroxystiques : obstruction nasale, rhinorrhée bilatérale et crises d'éternuements.

- **Rhinites allergiques (60 %) [1]**
- Antécédents personnels et/ou familiaux d'allergie type asthme allergique.
- Survenue précoce lors de l'enfance.
- Unité de temps et de lieu : apparition lors de chaque exposition à un allergène ;

périodicité des symptômes (ex. : rhume des foins : rhinite saisonnière).

- Tests sanguins : phadiatop positif +++, augmentation des IgE totales (peu spécifique) et présence d'IgE spécifiques (RAST) contre un allergène connu.
- Tests cutanés et nasaux de provocation positifs.

• **Traitement de la crise** : association selon la symptomatologie :

- **antihistaminiques anti-H<sub>1</sub>** par voie orale : **cétirizine** (**ZYRTEC**) : 1 cp. 10 mg/j ou **desloratadine** (**AERIUS**) 1 cp. 5 mg/j (A. et E. > 12 ans) pendant la période d'exposition à l'allergène (3 sem. à 3 mois), actifs sur la rhinorrhée et les éternuements ;

- **corticoïdes** par voie nasale : **fuorate de mométasone** (**NASONEX**) 2 pulv. 50 µg dans chaque narine le matin ou **béclométasone** (**BÉCONASE 50 µg**) 1-2 pulv. x 3/j dans chaque narine pendant la période d'exposition à l'allergène ;

- **anticholinergique** par voie nasale **ipratropium bromure** (**ATROVENT nasal**) 2 pulv. x 2-4/j dans chaque fosse nasale ; actif sur l'obstruction nasale.

• **Traitement de fond** :

- éviction de l'allergène ;
- désensibilisation spécifique si l'allergène a été identifié ;
- **cromoglycate de sodium** (**LOMUSOL 4 %**) 1 pulv. x 5-6/j dans chaque fosse nasale pendant plusieurs mois.

#### ➤ Rhinites vasomotrices non allergiques

• **Facteurs locaux ou généraux** :

- atmosphère polluée, variations météorologiques, tabagisme, alcoolisme ;
- effort physique, facteur psychogène ;
- hormonal : grossesse, contraception orale ;
- médicaments : réserpiniques, β-bloquants.

• **Traitement**

- Éviction du facteur irritant.
- Éviction du tabagisme, y compris le tabagisme passif.
- **Corticoïdes et décongestionnant nasal** par voie nasale en cures courtes : **oxymétazoline**, **prednisolone** (**DÉTURGYLONE**) 1 pulv. x 2/j dans chaque fosse nasale pendant 5 j.
- Traitement chirurgical endonasal en cas d'échec.

## SOLUTIONS DE LAVAGE NASAL

## ■ Sérum physiologique pour lavage nasal

<b>PHYSIODOSE</b>					
1 à 6 instillations/j/narine	15 unidoses 5 mL 30 unidoses 5 mL 45 unidoses 5 mL			NR NR NR	

## ■ Eau de mer stérile hypertonique

<b>PHYSIODOSE HYPERTONIQUE</b>					
2 pulv. x 2/j/narine	100 mL (fl. pulv.)			NR	

## ■ Eau stérile isotonique + soufre

<b>SOLUTÉ PRÉ</b>					
1 à 6 pulv./j/narine	100 mL (4 fl. pulv.) 10 amp. 10 mL			NR NR	

## ■ Eau de mer stérile isotonique

<b>QUINTON spray</b>					
1 à 4 pulv./j/narine	150 mL (fl.)			NR	
<b>STÉRIMAR</b>					
1 à 4 pulv./j/narine	50 mL (fl.) 100 mL (fl.)			NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Lavage des fosses nasales.

**INDICATIONS**

Rhinites et sinusites aiguës et chroniques.  
Nettoyage des fosses nasales chez le nour-

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Instillation nasale sans pression pour éviter la contamination de l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache.

Pas de mouchage pendant 10 min après instillation mais éponger (ou mouche-bébé chez le nourrisson).

Utilisation dans les 24 h après ouverture.  
Ne pas utiliser par voie injectable.

**POSOLOGIE**

1 à 3 instillations/j de 1/2 dose dans chaque fosse nasale jusqu'à disparition de la rhinorrhée.

## RHINITES (2)

### Rhinites hypertrophiques

- Obstruction nasale isolée ou associée aux symptômes dus à une respiration buccale exclusive.
- **Rhinoscopie** : muqueuse hypertrophiée.
- **Facteurs favorisants** : tabac, alcool et surtout l'utilisation prolongée à fortes

doses de **vasoconstricteurs** en pulvérisations nasales (rhinite médicamenteuse).

- **Traitement** :
  - arrêter les **vasoconstricteurs** ;
  - cautérisation de la muqueuse, soit chimique, soit électrique (électrocoagulation) ;
  - traitement chirurgical : turbinectomie.

### Prescription des antibiotiques en pratique courante : infections ORL et respiratoires

Ces références s'appliquent aux infections de sphères ORL et respiratoires rencontrées en pratique quotidienne chez l'enfant ou l'adulte sans facteur de risque ni terrain particulier, à l'exclusion des otites, sinusites, épiglottites, bronchiolites du nourrisson, dans leurs formes aiguës. Elles concernent :

- les infections aiguës saisonnières présumées virales : rhinites, rhinopharyngites, bronchites aiguës, trachéites et laryngites lorsqu'elles sont justiciables d'une antibiothérapie ;
- les angines non récidivantes ;
- les pneumopathies aiguës chez l'adulte sain.

1. Il n'y a pas lieu d'utiliser une association **aminopénicilline - inhibiteur des  $\beta$ -lactamases**.
2. Il n'y a pas lieu d'utiliser les **fluoroquinolones** systémiques.
3. Il n'y a pas lieu d'utiliser les **céphalosporines de deuxième** et de **troisième génération**.
4. Il n'y a pas lieu d'instaurer un traitement par corticoïdes en association à l'antibiothérapie générale, sauf urgence, dans les situations où un œdème inflammatoire peut mettre une fonction vitale en danger.
5. Il n'y a pas lieu d'instaurer un traitement par **AINS** à dose anti-inflammatoire en association à l'antibiothérapie générale, sauf composante inflammatoire importante. L'**aspirine** et les **AINS** antalgiques et antipyrétiques (à faible posologie) ne sont pas concernés.

- Facteurs de risque :

1. Dans la rhinopharyngite de l'enfant : otites dans les antécédents, particulièrement lorsqu'elles ont commencé tôt dans la vie de l'enfant, otite séreuse préexistante à la rhinopharyngite.
2. Dans les pneumopathies communautaires (c'est-à-dire acquises en dehors du milieu hospitalier) :
  - soit présence d'au moins 2 parmi les facteurs de risque suivants :
    - âge supérieur à 65 ans ;
    - comorbidité associée, telle que diabète sucré mal équilibré, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, BPCO, insuffisance cardiaque congestive, hospitalisation antérieure dans l'année, vie en institution, alcoolisme, drépanocytose, etc.
  - soit présence d'un des facteurs de risque suivants :
    - immunodépression : corticothérapie prolongée par voie générale dans les 6 derniers mois, chimiothérapie anticancéreuse dans les 6 derniers mois, splénectomie, sida, etc. ;
    - étiologie à haut risque : pneumopathie postgrippale ou de déglutition, facteurs d'inhalation, pneumopathie sur obstruction.

### CONSENSUS

- [1] Recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de la rhinite allergique, *SPLF*, 2010

**SINUSITE MAXILLAIRE AIGÜÈ (1)****Définition**

C'est une infection aiguë, purulente, d'origine bactérienne des sinus maxillaires uni- ou bilatérale.

- Physiopathologie : 2 mécanismes sont possibles :

- *rhinogène* ++ : suite d'une rhinite aiguë virale (anomalies mucociliaires et œdème de la muqueuse avec obstruction de l'orifice de drainage [méats] du sinus). Sinusite souvent bilatérale, asymétrique. Les sinus peuvent être atteints symétriquement en cas de surinfection d'une polypose nasosinusienne ;

- *dentaire* : infection de l'apex du complexe prémolo-molaire supérieur. Sinusite unilatérale.

- Germes : *Haemophilus influenzae* (40 %), pneumocoque, *Moraxella catarrhalis* puis autres streptocoques et staphylocoque

doré. Germes anaérobies en cas d'origine dentaire.

**Diagnostic**

Le diagnostic est exclusivement clinique : fièvre modérée (38 °C), rhinorrhée purulente antérieure et/ou postérieure, douleur sinusienne d'allure inflammatoire, majorée par la palpation de la pommette et l'antéflexion de la tête. La rhinoscopie retrouve du pus sous le cornet moyen provenant du méat maxillaire.

- Radiographies de sinus (Blondeau, face haute, profil) indiquées seulement en cas de doute diagnostique ou en cas d'échec d'une première antibiothérapie. Le scanner des sinus est pratiqué seulement en cas de complications.

- Recherche d'un foyer infectieux dentaire : radiographie panoramique dentaire, consultation stomatologie.

## SINUSITE MAXILLAIRE AIGÜE (2)

### Traitement

- **Antalgique et antipyrétique** : antalgiques de classe I (paracétamol) ou de classe II : paracétamol + codéine (**EFFERALGAN CODÉINÉ**), 2 cp. 500 mg x 3/j.

- **Désinfection rhino-pharyngée** x 4 à 6/j par sérum physiologique pendant 10 j.

- **Décongestionnant nasal (vasoconstricteur, antibiotique et corticoïde)** par voie nasale (**DÉTURGYLE**) x 3/j pendant 5 j.

- **Antibiothérapie** : elle n'est pas indiquée d'emblée lorsque les symptômes rhinologiques sont bilatéraux, d'intensité moyenne, survenant dans un contexte épidémique et que la réévaluation des symptômes est possible en cas d'aggravation. Elle est indiquée en cas d'échec du traitement symptomatique, de suspicion de sinusite maxillaire d'origine dentaire ou de complication.

L'antibiothérapie est orale, probabiliste (active sur *Haemophilus* et pneumocoque). L'amoxicilline et les macrolides ne sont plus recommandés en 1<sup>re</sup> intention.

La durée de l'antibiothérapie est de 8 à 10 j sauf pour les céphalosporines de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> générations et les kétolides qui ont démontré leur efficacité en traitement de 5 j :

- amoxicilline + acide clavulanique (**AUGMENTIN**), 1 g x 2/j ;

- soit céphalosporine 2<sup>e</sup> génération : céfuroxime axétil (**ZINNAT**), 1 cp. 250 mg x 2/j pendant 5 j ;

- soit céphalosporine 3<sup>e</sup> génération : cefpodoxime proxétel (**ORELOX**), 200 mg x 2/j pendant 5 j ;

- synergistine : pristinamycine (**PYOSTACINE**), 2 cp. 500 mg x 2/j notamment en cas d'allergie aux bêta-lactamines ;

- les fluoroquinolones actives sur le pneumocoque sont réservées aux formes compliquées ou après échec d'une première antibiothérapie après documentation bactériologique et/ou radiologique :

lévofloxacine (**TAVANIC**), 1 cp. 500 mg/j ou moxifloxacine (**IZILOX**) 1 cp. 400 mg/j ;

- de même pour les kétolides (famille des macrolides) : tétracycline (**KETEK**) 400 mg x 2/j pendant 5 j.

- **Corticothérapie** : sous couvert d'une antibiothérapie, elle est réservée aux formes hyperallergiques : prednisolone, **SOLUPRED** cp. à 5 ou 20 mg à la dose de 1 mg/kg/j le matin pendant 5 j.

- **Traitement des foyers infectieux dentaires** : extraction, traitement canalaire.

- **Surveillance clinique.**

### Complications aiguës

Signes cliniques : douleur insomnante, céphalées invalidantes, hyperthermie persistante, œdème palpébral, exophtalmie, trouble de la motilité oculaire, syndrome méningé font suspecter une sinusite compliquée.

Formes cliniques :

- Sinusite maxillaire bloquée (empyème sinusien).

- Pansinusite (maxillo-ethmoïdo-frontale).

- Cellulite orbitaire (du stade initial de cellulite pré-septale à l'abcès orbitaire) et thrombophlébite du sinus caverneux.

- Méningite, septicémie.

- CAT : hospitalisation, scanner des sinus et antibiothérapie probabiliste par voie parentérale après prélèvement bactériologique (prélèvement local : ponction de sinus et drain de sinus, hémocultures), si nécessaire, drainage sinusien (sous anesthésie locale par rétraction muqueuse du méat ou sous anesthésie générale).

### Sinusite maxillaire aiguë chez le patient intubé

- Ponction de sinus avec prélèvement bactériologique et lavage de sinus (x 2/j).

- Changement de sonde d'intubation avec intubation orale plutôt que nasale.

- Aspirations nasales fréquentes non traumatisantes.

- Antibiothérapie adaptée.

## SINUSITE CHRONIQUE (1)

### Définition

- C'est une inflammation sinusienne persistant plus de 3 mois.
- Physiopathologie : la topographie des lésions guide le diagnostic étiologique et le traitement.
  - Les sinus antérieurs (maxillaires, frontaux et ethmoïdaux antérieurs) ont leurs orifices de drainage (ostium ou méat) très proches sous le cornet moyen ; l'atteinte d'un sinus se propage donc souvent aux sinus antérieurs adjacents.
  - Atteinte diffuse et bilatérale (pansinusite), en faveur d'une maladie de la muqueuse nasosinusienne : polypose nasosinusienne.

### Diagnostic clinique et radiologique

- Sinusites indolores en dehors des poussées de réchauffement mais sensations de pesanteur faciale sus- et inter-orbitaires

dans les sinusites frontales et orbitonasales et dans les sinusites ethmoïdales.

- Rhinorrhée chronique surtout postérieure d'où irritation pharyngée avec hémage (raclage de gorge), irritation laryngée avec dysphonie et bronchique avec toux.
- Obstruction nasale et troubles de l'odorat.
- Endoscopie nasale : muqueuse inflammatoire, pus aux méats, polypes, anomalies architecturales.
- Scanner des sinus : diagnostic positif, topographie des sinus atteints, orientation étiologique. Les radiographies de sinus (Blondeau et nez-front-plaque) sont inutilisables.

### Sinusites antérieures

Atteinte des sinus maxillaires ± ethmoïdaux antérieurs ± frontaux.

## SINUSITE CHRONIQUE (2)

### Sinusite d'origine dentaire

- Rhinorrhée fétide à prédominance unilatérale.
- Cacosmie.
- Antécédents d'infection dentaire ou de soins sur les prémolaires ou les molaires supérieures.
- Bilan : examen stomatologique et panoramique dentaire et clichés rétroalvéolaires :
  - infection apicale chronique ;
  - dépassement de pâte dentaire dans le sinus après un traitement canalair (corps étranger de tonalité calcique au sein d'une muqueuse épaissie) ;
  - infection par *Aspergillus fumigatus* sur le corps étranger (microcalcifications endosinuennes).

- Traitement de la dent causale +++++
- Antibiothérapie : voie orale, active sur staphylocoque, streptocoque, *Haemophilus*, anaérobies, type **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 2 cp. 500 mg x 2/j pendant 10 j.
- **Vasoconstricteurs + antibiotiques + corticoïdes par voie nasale : naphazoline + phényléphrine + cétimide + prednisolone (DERINOX)**, 1 pulv./narine x 3/j pendant 5 j.
- Lavage des fosses nasales x 3/j : **sérum physiologique**.
- Corticothérapie orale : **prednisolone (SOLUPRED)**, 1 mg/kg/j pendant 7 j en 1 prise.
- En cas d'échec : drainage par chirurgie endonasale sous guidage endoscopique de type méatotomie moyenne ± infundibulectomie.
- En cas de corps étranger ou aspergillose : extraction par voie endonasale endoscopique.

### Sinusite antérieure par obstruction méatale

- Exérèse chirurgicale de l'obstacle.
- Traitement médical de la sinusite.

### Pansinusite : polypose nasosinusienne

Maladie inflammatoire diffuse de la muqueuse nasale avec formation de polypes qui peuvent obstruer complètement les deux fosses nasales. Il faut rechercher un asthme associé, une intolérance à l'**aspirine** et faire une enquête allergique.

Le traitement est d'abord médical :

- cures répétées de 10 j d'**antibiotiques** et de **corticoïdes** par voie orale ;
- corticothérapie locale prolongée : **mométasone fuorate (NASONEX 50 µg)** 2 pulv./narine x 2/j ou **budésonide (RHI-NOCORT 64 µg)** 2 pulv./narine/j le matin ;
- lavage fosses nasales 3 à 6 fois/j : **PHY-SIOMER, STÉRIMAR** ou **sérum physiologique** dosettes.

Traitement chirurgical : en cas d'échec ou de récurrences fréquentes : évidemment ethmoïdo-fronto-maxillaire ± sphénoïdal par chirurgie endonasale sous guidage endoscopique.

## ANGINE NON COMPLIQUÉE (1)

### Définitions [1]

- *Amygdalite aiguë* : inflammation aiguë du pharynx prédominante sur les amygdales palatines.

- *Pharyngite* : inflammation diffuse de l'oropharynx.

50 à 90 % des angines sont d'origine virale.

25 à 40 % des angines de l'enfant et 10 à 25 % des angines de l'adulte sont d'origine streptococcique.

### Flore bactérienne buccale

- *Saprophytes* : streptocoques non hémolytiques, corynébactéries aérobies, *Neisseria saprophytes*.

- *Commensales* : staphylocoques, *Haemophilus influenzae*, pneumocoques.

### Angines

- *Angine érythémateuse* : rougeur de l'oropharynx (amygdales, piliers de l'amygdale, luette, paroi postérieure).

- *Angine érythématopultacée* (80 % des cas) : rougeur de l'oropharynx et présence de points blancs qui s'enlèvent facilement en laissant une muqueuse congestive mais saine.

### Étiologies

Il y a 2 causes principales.

- L'étiologie virale prédomine (70 %). Il s'agit des *Herpesvirus* (*herpes simplex*, *Epstein-Barr*, *cytomégalovirus*), des *adénovirus*, et des *entérovirus* (*Coxsackie A et B*).

- Toute angine érythémateuse ou érythématopultacée doit être considérée comme streptococcique et de ce fait doit faire pratiquer un test de détection rapide (TDR) à la recherche du streptocoque  $\beta$ -hémolytique du groupe A (SGA). Seuls les

patients atteints d'angine à SGA sont justifiables d'un traitement antibiotique.

La présence d'au moins trois des critères de Centor (fièvre, exsudat amygdalien, absence de toux, adénopathies cervicales antérieures) est en faveur d'une origine streptococcique.

Un TDR positif justifie la prescription d'antibiotique.

Un TDR négatif chez un sujet sans facteur de risque de RAA (rhumatisme articulaire aigu) ne justifie pas d'examen complémentaire (prélèvement, culture) ni de traitement antibiotique.

Les facteurs de risque de RAA sont l'âge (sujet de moins de 25 ans), des antécédents de rhumatisme articulaire aigu, un retour de zone d'endémie (Afrique, Antilles), des angines à répétition. La présence d'un de ces facteurs en cas de négativité du TDR nécessite un prélèvement bactériologique par écouvillon pour examen direct, culture et antibiogramme.

Les tests de diagnostic rapide mettant en évidence l'antigène de groupe du streptocoque A utilisent la méthode immunochromatographique (*IM STREP A*, *STREP-TATEST*) ou latex-agglutination (*REVEAL STREP A*), et donnent une réponse entre 5 et 10 min. Leur sensibilité approche 90 % et leur spécificité 96 %.

### Formes cliniques

- **Angine érythémateuse avec conjonctivite** : en faveur d'un adénovirus.

- **Scarlatine** (streptocoque  $\beta$ -hémolytique du groupe A avec une toxine érythrogène) : forte angine érythématopultacée avec vomissements et signes généraux marqués, puis apparition d'un exanthème dans un délai de 2 j.



**ANGINE NON COMPLIQUÉE (2)****Traitement****Antibiothérapie par voie orale [1]**

Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée, seul un TDR positif confirme l'étiologie à streptocoque du groupe A et justifie la prescription d'antibiotiques.

• Les traitements antibiotiques courts validés par l'AMM sont à privilégier.

La **pénicilline V** pendant 10 j était le traitement de référence de l'angine.

Actuellement, le traitement repose sur une **pénicilline A**, éventuellement sur une **céphalosporine** :

– **amoxicilline (CLAMOXYL)**, A. : 2 g/j en 2 prises, E. : 50 mg/kg/j en 2 prises pendant 6 j ;

– **céfuroxime axetil (ZINNAT)**, A. : 500 mg/j en 2 prises, E. : 20 mg/kg/j en 2 prises pendant 4 j ;

– **céfuroxime proxétil**, A. : 200 mg/j en 2 prises, E. : 8 mg/kg/j en 2 prises pendant 5 j.

Les **macrolides** ne sont à prescrire qu'en cas d'allergie aux **β-lactamines** (car 6 à 10 % de résistance des streptocoques A) :

– **érythromycine ÉRYTHROCINE**, A. : 2 à 3 g/j, E. : 50 mg/kg/j en 3 prises pendant 10 j ;

– **azithromycine (ZITHROMAX)**, A. : 500 mg/j en 1 prise, E. (> 3 ans) : 20 mg/kg/j en 1 prise pendant 3 j ;

– **josamycine (JOSACINE)**, A. : 500 mg/j en 2 prises, E. : 50 mg/kg/j en 2 prises pendant 5 j.

**Traitement symptomatique**

**Antipyrétiques** et **antalgiques** de classe I (type **paracétamol**) ou II (**paracétamol + codéine**). Les **antalgiques** et **antiseptiques** locaux n'ont pas démontré leur efficacité mais apportent un confort supplémentaire pour le patient.

**Prescription des antibiotiques en pratique courante : infections ORL et respiratoires**

1. Il n'y a pas lieu d'utiliser une association **aminopénicilline - inhibiteur des β-lactamases**.

2. Il n'y a pas lieu d'utiliser les **fluoroquinolones** systémiques.

3. Il n'y a pas lieu d'instaurer un traitement par **corticoïdes** en association à l'antibiothérapie générale, sauf urgence, dans les situations où un œdème inflammatoire peut mettre une fonction vitale en danger.

4. Il n'y a pas lieu d'instaurer un traitement par **AINS** à dose anti-inflammatoire en association à l'antibiothérapie générale, sauf composante inflammatoire importante. L'**aspirine** et les **AINS** antalgiques et antipyrétiques (à faible posologie) ne sont pas concernés.

## ANGINE NON COMPLIQUÉE (3)

### Prise en charge de l'angine [1]

Réaliser un **test de diagnostic rapide (TDR) du Streptocoque du groupe A (SGA)** pour les enfants de plus de 3 ans ou pour un adulte ayant un score de Mac Isaac  $\geq 2$  :

- TDR positif : antibiothérapie.
- TDR négatif : rechercher les facteurs de risque (FDR) de RAA :
  - si FDR de RAA absents, traitement symptomatique ;
  - si FDR de RAA présents et culture bactériologique positive : antibiothérapie ;
  - si FDR de RAA présents et culture bactériologique négative : traitement symptomatique.

#### Score de Mac Isaac à utiliser chez l'adulte

Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$	= 1
Absence de toux	= 1
Adénopathies cervicales sensibles	= 1
Atteinte amygdalienne	= 1
Âge : 15 à 44 ans	= 0
Âge : $> 44$ ans	= -1

#### Facteur de risque de RAA

- Antécédent personnel de RAA.
- Âge entre 5 et 25 ans associé à la notion de séjours en régions d'endémie de RAA (Afrique, DOM-TOM) ou éventuellement à certains facteurs environnementaux (conditions sociales, sanitaires et économiques, promiscuité, collectivité fermée) ou à des antécédents d'épisodes multiples d'angine à SGA.

### CONSENSUS

[1] Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant. Recommandations de bonne pratique, *SFP et GPIP*, 2011

## ANGINE COMPLIQUÉE

### Angine récidivante

L'angine est dite récidivante s'il y a plus de 3 épisodes dans l'année.

- Antibiothérapie orale pendant 10 j :
  - soit **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 50 mg/kg/j en 3 prises  
A. : 2 sach. 500 mg x 3/j ;  
E. : càc 250 mg et solution pédiatrique 1 dose/kg x 3/j ;
  - soit **céphalosporine de 2<sup>e</sup> génération : céfuroxime axetil (ZINNAT)** : cp. 250 mg, sach. 125 mg, c-mes. 125 mg en 2 prises après les repas :  
A. : 500 mg x 2/j ;  
E. : 30 mg/kg/j ;
  - soit **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération : cefpodoxime (ORELOX)**, A. : 200 mg/j en 2 prises, E. : 8 mg/kg/j en 2 prises pendant 5 j.
- Si ≥ 5 épisodes/an : amygdaléctomie.

### Complications loco-régionales [1]

#### Phlegmon péri-amygdalien

- Suppuration entre la capsule de l'amygdale et les muscles pharyngés, le plus souvent à streptocoque A et/ou anaérobies.
- Adolescents et adultes jeunes.
- Odynophagie très sévère avec hypersialorrhée, otalgie réflexe, fièvre élevée, altération de l'état général, voix couverte.
- À l'examen : bombement de la partie supérieure du pilier antérieur qui refoule l'amygdale vers la luette, trismus, adénopathies sous-digastriques.

- Hospitalisation.
- Pas d'exploration radiologique.
- Ponction de la collection ± prélèvement bactériologique.
- Drainage : soit ponctions-instillations bêta-dinées, soit incision sous anesthésie locale et lavages bêta-dinés.
- Antibiothérapie antistreptocoques et anti-anaérobies par voie intraveineuse, après prélèvements bactériologiques : **β-lactamine, pénicilline A, amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 1 g x 3/j relais oral après apyrexie stable, durée totale 10-15 j.

- Rééquilibration hydroélectrolytique par voie intraveineuse si nécessaire.
- Alimentation semi-liquide tiède.
- Bains de bouche antiseptiques après les repas : **HEXTRIL**, 1 dose x 4-6/j.
- Ponctions (1-2/j) jusqu'à vérification de l'absence de pus.
- **Antalgiques : paracétamol + codéine (EFFERALGAN CODÉINÉ)**, 2 cp. 500 mg x 3/j per os ± **morphine**. Chez l'enfant de plus de 1 an : **paracétamol (PERFALGAN)** 15 mg/kg/6 h + **phosphate de codéine (CODENFAN)** 0,5 à 1 mg/kg/6 h (sans dépasser 1 mg/kg par prise et 6 mg/kg par jour).
- En cas de récurrence : amygdaléctomie.

#### Phlegmon parapharyngé et rétropharyngé

Parapharyngé : bombement du pilier postérieur de l'amygdale.

Rétropharyngé : bombement de la paroi postérieure de l'oropharynx.

- Suppuration en arrière de l'amygdale, au contact des gros vaisseaux du cou.
- Enfant entre 3 et 10 ans.
- Au cours d'une angine, douleurs latéro-cervicales hautes avec torticolis, signes généraux sévères. À l'examen, voussure en arrière de l'amygdale.
- TDM cervicale en urgence (ou échographie endobuccale) puis traitement mécochirurgical.

#### Adénophlegmon cervical

Suppuration d'un ganglion jugulocarotidien.

#### Autres complications loco-régionales

- Otites moyennes aiguës.
- Sinusites aiguës.
- Obstruction chronique de l'oropharynx par hypertrophie amygdalienne.

### Complications générales

#### Complications post-streptococciques

- Rhumatisme articulaire aigu.
- Glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique.

#### Diffusion de l'infection

Septicémie, septico-pyohémie.

## ANGINE SPÉCIFIQUE (1)

### Angines ulcéro-nécrotiques

#### Angine de Vincent

- Association de 2 germes anaérobies fuso-spirillaires : *Fusiformis* (bacille de Vincent) et un *spirochète* du genre *Borrelia*.
- Angine unilatérale avec une ulcération douloureuse, non indurée recouverte d'une fausse membrane grisâtre.
- Diagnostic : examen direct du prélèvement de gorge.
- Traitement symptomatique (cf. Angine non compliquée) :

Antibiothérapie orale :  $\beta$ -lactamine, **pénicilline V**, **ORACILLINE**, 2 sach. 500 000 UI x 3/j pendant 10 j ou **métronidazole** si allergie.

- Complication : *Fusobacterium necrophorum* responsable du syndrome de Lemierre : angine ulcéro-nécrotique compliquée d'une thrombose de la veine jugulaire interne avec des métastases septiques le plus souvent pulmonaires. Infection grave touchant le sujet jeune en bonne santé. Traitement par antibiothérapie intraveineuse  $\pm$  anticoagulation.

#### Angine syphilitique

- Angine unilatérale : chancre induré, indolore avec adénopathie satellite.

- Prélèvement de gorge avec recherche de tréponème ; sérologie syphilitique.

#### Angine des hémopathies et des agranulocytoses

- Angine bilatérale, diffuse, nécrotico-hémorragique.

#### Angines vésiculeuses

- **Primo-infection herpétique** : lésions de l'oropharynx souvent associées avec une gingivo-stomatite et un herpès labial. Traitement symptomatique : antalgiques, **bains de bouche antiseptiques-anesthésique local**, chlorhexidine + tétracaïne (**ÉLU-DRIL**), 1 pulv. x 6/j ; gel de **XYLOCAÏNE**, 1 appl. sur les lésions douloureuses avant les repas.
- **Herpangine** à virus *Coxsackie A*.
- **Zona** pharyngien (IX) et buccal (V).
- **Fièvre typhoïde** : ulcérations de Duguet.

#### Angines pseudo-membraneuses

- Fausses membranes = enduit grisâtre et épais adhérent à la muqueuse.
- Deux étiologies principales :
  - la mononucléose infectieuse (*virus d'Epstein-Barr*) : la plus fréquente ;
  - la diphtérie (*Corynebacterium diphtérique*) : rare mais fréquence en augmentation. Le problème est de la reconnaître car elle peut engager le pronostic vital.

**ANGINE SPÉCIFIQUE (2)****Angine diphtérique**

- Diagnostic :
  - absence de vaccination et séjour en zone d'endémie (Europe de l'Est, Afrique) avec une incubation  $< 7$  j ;
  - angine peu sévère avec des signes généraux modérés ;
  - fausses membranes épaisses, adhérentes, prenant l'amygdale, le voile et la luette ;
  - adénopathies bilatérales ;
  - rhinorrhée mucopurulente.
- Complications :
  - le croup : extension locale laryngo-trachéale de la maladie ;
  - paralysies nerveuses : nerfs crâniens ;
  - myocardite.

- Hospitalisation pour prise en charge spécialisée, déclaration obligatoire.

**Mononucléose infectieuse**

- Signes généraux marqués avec forte asthénie qui peut se prolonger.
- Fausses membranes peu adhérentes et respectant la luette.
- Adénopathies multiples diffuses avec parfois splénomégalie.
- Exanthème surtout en cas de prise d'ampicilline.
- NFS : monocytose ; MNI test positif (peut être négatif en début d'évolution) ; IgM anti-VCA positives.
- Traitement symptomatique sans antibiothérapie.

## APHTES - APHTOSE

### Aphtes localisés

L'aphte est dû à une nécrose distale des tissus en rapport avec une microthrombose d'un capillaire artériel. Le mécanisme est immunoallergique. Le principe du traitement est d'éviter les facteurs déclenchants, calmer la douleur, désinfecter et attendre la cicatrisation spontanée en une dizaine de jours.

#### Traitement préventif

- Éviter les aliments déclenchant une poussée d'aphtes (noix, ananas, fromage, etc.).
- Éviter les médicaments allergisants pour le patient.
- Traiter les irritations locales d'origine mécanique (dentaire), infectieuse ou autre (tabac).

#### Traitement curatif

- Bains de bouche « composés » avant et après chaque repas pendant 10 j associant :
  - antiseptique (**ÉLUDRIL** 90 mL);
  - bicarbonate de sodium à 14 ‰ : 400 mL ;
  - antifongique (**MYCOSTATINE** susp. buvable) : 24 mL ;
  - anesthésique local (**XYLOCAÏNE** 5 %) : 24 mL ;
  - corticoïde (**CÉLESTÈNE** dispersible 20 mg) : 2 cp. dans chaque bain de bouche après les repas seulement.
- Traitement antalgique :

– Général : **paracétamol** (**DOLIPRANE** 500 mg) : 1 à 2 cp. x 3/j 30 min avant les repas.

– Local : **XYLOCAÏNE VISQUEUSE** à appliquer sur les aphtes avant le repas, en évitant les applications très postérieures entraînant une paralysie pharyngée et un risque de fausse route.

### Aphthose récidivante

Les aphthoses récidivantes sont sensibles à la corticothérapie générale et aux **immunosuppresseurs** : la **colchicine** reste le traitement de 1<sup>re</sup> intention : 1 mg/j pendant 1 an.

### Maladie de Behçet

Il s'agit d'une maladie générale grave associant une aphthose bipolaire, buccale et génitale, une hypersensibilité cutanée, une atteinte oculaire (iridocyclite) et des complications neurologiques, vasculaires (phlébites) et viscérales.

Le traitement local des aphtes s'efface devant l'impérieuse nécessité de traiter et de prévenir les manifestations générales.

- Le traitement initial reste la **colchicine**.
- On recourt le plus souvent à la corticothérapie générale à fortes doses (1 mg/kg/j) pendant au moins 1 mois, surtout dans les formes méningées et viscérales.
- L'héparinothérapie s'impose dans les formes thrombosantes.
- En cas d'échec on discutera la prise de **thalidomide**, à la dose optimale de 50 à 100 mg/j. La prise au long cours nécessite une étroite surveillance neurologique et la délivrance est exclusivement hospitalière.

## DYSPNÉE LARYNGÉE DU NOURRISSON DE MOINS DE 6 MOIS (1)

### Diagnostic

Le diagnostic positif est clinique.

### Bradypnée inspiratoire

Allongement du temps inspiratoire (fréquence respiratoire normale : adulte = 20/min, enfant = 30/min, nouveau-né = 40/min), mais possibilité d'une tachypnée chez le nourrisson et en cas d'épuisement respiratoire.

### Tirage inspiratoire

Mise en jeu des muscles respiratoires accessoires en dessous de l'obstacle :  
– dépression des parties molles des espaces intercostaux, des creux sus-claviculaires, sus-sternaux ;  
– battements des ailes du nez.

### Bruits inspiratoires laryngés

- Stridor : bruit aigu à type de sifflement = obstacle glottique et sus-glottique.

- Cornage : bruit grave à type de corne de brume = obstacle sous-glottique.

### Modifications du cri et de la toux

- Cri étouffé et toux normale = obstacle glottique et sus-glottique.
- Cri et toux rauques = obstacle sous-glottique.

### Dysphagie et hypersialorrhée : obstacle sus-glottique

#### Diagnostic de gravité

- Âge : si plus jeune, plus grave.
- Durée d'évolution : grave si > 1 h.
- État respiratoire : importance des signes de lutte (tirage et bruits laryngés), puis disparition de ces signes = épuisement respiratoire avec tachypnée superficielle > 60/min puis bradypnée extrême avec des pauses respiratoires.
- Signes d'hypercapnie : HTA, tachycardie, sueurs puis troubles de la conscience.
- Signes d'hypoxie : cyanose et troubles de la conscience.
- Syndrome septicémique.

## DYSPNÉE LARYNGÉE DU NOURRISSON DE MOINS DE 6 MOIS (2)

### Étiologies et conduite à tenir

#### Chez le nouveau-né

- Sténoses laryngées congénitales.
- Tumeurs laryngées.
- Paralysies laryngées.

#### Chez le nourrisson de moins de 6 mois

##### ► Stridor laryngé congénital essentiel (laryngomalacie)

- Anomalie laryngée la plus fréquente du nourrisson.
- Apparition dès les premiers jours de vie.
- Collapsus inspiratoire des structures laryngées supraglottiques.
- Diagnostic : laryngoscopie indirecte au naso-fibroscope sans anesthésie chez un enfant à jeun depuis 6 h.

- **Forme bénigne** : stridor isolé d'où abstention mais surveillance clinique car aggravation possible entre 3 et 6 mois. Régression spontanée après 18 mois.

CAT : traitement antireflux pendant 3 mois (à renouveler) :

– **inhibiteurs de la pompe à protons (MOPRAL, INEXIUM, OGASTORO)**

1 mg/kg/j 1 mois à renouveler selon la symptomatologie,

– **dompéridone (MOTILIUM)** une dose poids 30 min avant chaque repas,

– position proclive la nuit,

– lait épaissi.

- **Forme sévère** : association du stridor avec :

– dyspnée laryngée,

– troubles de la déglutition avec cassure de la courbe de poids.

CAT : laryngoscopie directe au tube rigide sous anesthésie générale pour résection endoscopique des replis ary-épiglottiques.

On associe un traitement antireflux gastro-œsophagien.

##### ► Angiome sous-glottique

- Association avec un angiome cutané cervico-facial dans 50 % des cas.
- Intervalle libre de 3 sem. à 1 mois après la naissance, filles > garçons.
- Poussées inflammatoires jusqu'à l'âge de 1 an puis involution spontanée après l'âge de 2 ans.
- Dyspnée laryngée sous-glottique avec cornage, cri et toux rauques.
- Diagnostic : laryngoscopie indirecte au nasofibroscope puis si nécessaire laryngoscopie directe sous anesthésie générale.

Corticothérapie : **bétaméthasone, CÉLES-TÈNE**, 10 à 20 gttes/kg/j pendant 15 j puis diminution progressive des doses.

En cas de dyspnée sévère persistante, possibilités d'intubation, de coagulation laser, voire de trachéotomie et de chirurgie d'exérèse.



## DYSPNÉE LARYNGÉE DU NOURRISSON DE PLUS DE 6 MOIS (1)

### Laryngites aiguës

#### Laryngite aiguë œdémateuse sous-glottique

- Étiologie : virale = *Myxovirus parainfluenzae*.
- Diagnostic : garçon de 1 à 3 ans ; au cours d'une rhinopharyngite, apparition progressive, souvent nocturne, d'une dyspnée laryngée avec cornage, toux et voix rauques, sans altération de l'état général.

#### ► Forme bénigne (pas de signe de gravité)

- Corticothérapie en urgence : **méthylprednisolone, SOLUMEDROL**, par voie parentérale, à la dose de 0,4 à 1 mg/kg :  
– si persistance de la dyspnée après 30 min sans signe de gravité : renouveler l'injection ;  
– si amélioration rapide (4-6 h), durable (> 2 h) : poursuite du traitement *per os* à domicile : **bétaméthasone (CÉLESTÈNE)**, susp. buv., 10 gttes/kg/j en 1 prise pendant 5 j (voie orale d'emblée en cas de forme uniquement dysphonante).
- Calmer l'enfant, pas de gestes traumatisants (décubitus forcé, examen à l'abaisse-langue), proscrire **sédatifs** et **antitussifs**.
- Humidification de l'air : vapeur d'eau ; au mieux, aérosols de **corticoïdes** : 4 mg **dexaméthasone** dans 10 mL **sérum physiologique** x 2/j.
- **Antipyrétiques**.
- Antibiothérapie (non systématique car étiologie virale) : **amoxicilline, CLAMOXYL**, 50 mg/kg/j pendant 7 j.
- Désinfection rhinopharyngée en cas de rhinite associée : **sérum physiologique**, 1 instillation x 3/j dans chaque fosse nasale.

#### ► Forme grave d'emblée ou évolution défavorable sous traitement

- Hospitalisation en urgence en réanimation pédiatrique par transport médicalisé (Samu).
- Libération des voies aériennes :  
– aérosols d'**adrénaline** au masque en 20 min sous oxygène à fort débit : 3 amp. **adrénaline** 0,1 % (1 mL = 1 mg), 7 mL **sérum physiologique**. Sous contrôle : saturation en oxygène, scope, tension artérielle ;  
– si aggravation de l'état respiratoire : intubation trachéale.
- Corticothérapie : voie parentérale intraveineuse, **méthylprednisolone (SOLUPRED)**, 1 voire 2 mg/kg/j pendant 48 h puis relais *per os* avec arrêt progressif de la corticothérapie sur 3 j.
- Antibiothérapie (suspicion infection bactérienne à *Haemophilus influenzae*) : **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)**, 100 mg/kg/j par voie intraveineuse.

#### ► Forme récidivante

- Laryngoscopie indirecte voire directe.
- Rechercher : reflux gastro-œsophagien, atonie, foyers infectieux adénoïdiens, rhinonosiens ou amygdaliens.

#### Laryngite striduleuse

- Accès de dyspnée laryngée brefs (< 1 h), souvent nocturnes, répétitifs mais sans gravité.
- Inflammation au cours d'une rhinopharyngite, d'un reflux gastro-œsophagien ou psychologique (crise d'angoisse).

#### Conduite à tenir

Rassurer les parents, humidifier la pièce (vapeur d'eau), corticothérapie orale pour certains pour prévenir les récurrences : **bétaméthasone (CÉLESTÈNE)**, X gttes/kg/j en 1 prise pendant 3-4 j.

## DYSPNÉE LARYNGÉE DU NOURRISSON DE PLUS DE 6 MOIS (2)

### Laryngo-trachéobronchite bactérienne aiguë

- Surinfection d'une trachéobronchite virale par un staphylocoque doré ou un streptocoque.

#### Conduite à tenir

Bronchoscopie (prélèvements, nettoyage), intubation, antibiothérapie, réanimation.

### Laryngite sus-glottique : épiglottite aiguë

- Infection du vestibule laryngé (carrefour aérodigestif), à *Haemophilus influenzae* type b (bacille Gram-) devenue exceptionnelle chez l'enfant depuis la vaccination anti-*Haemophilus*. Le streptocoque, et exceptionnellement le staphylocoque,

peuvent être responsables d'une épiglottite.

- Gravité car dyspnée brutale très sévère et septicémie avec localisations secondaires (méninges, poumon, articulaires).
- Diagnostic : garçon de 3 ans, triade :
  - dyspnée laryngée s'aggravant rapidement, majorée par le décubitus : l'enfant reste en position assise, penché vers l'avant, bouche ouverte. Voix étouffée, toux normale ;
  - dysphagie douloureuse (odynophagie) avec hypersialorrhée ;
  - syndrome septicémique : fièvre élevée, AEG.

► Conduite à tenir  
Cf. encadré.

#### Conduite à tenir

- Transfert en urgence par Samu en réanimation pédiatrique, en respectant la position demi-assise, sans geste local traumatisant.
- Libération des voies aériennes supérieures : intubation trachéale (en cas d'échec : intubation au bronchoscope rigide voire trachéotomie).
- Voie veineuse pour rééquilibration hydroélectrolytique, sonde gastrique d'alimentation, monitoring (scope, tension artérielle).
- Bilan bactériologique : hémocultures répétées, écouvillonnage de l'épiglotte, ponction lombaire en cas de signes méningés, recherche d'antigène soluble anti-*Haemophilus* (sang  $\pm$  LCR).
- Reste du bilan : NFS, CRP, ionogramme du sang, radio du thorax.
- Antibiothérapie : en urgence, après prélèvements bactériologiques, voie parentérale intra-veineuse, active sur *Haemophilus influenzae* producteur de  $\beta$ -lactamases, et sur le streptocoque, **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)**, 100 mg/kg/j IV en 3 inj. ; après 24 h, d'apyrexie relais *per os* pendant 10 j, adapté au germe et à l'antibiogramme, 50 mg/kg/j en 3 prises :
  - $\beta$ -lactamase + : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** ;
  - $\beta$ -lactamase - : **amoxicilline (CLAMOXYL)**.
- Aérosols, kinésithérapie respiratoire.
- **Antipyrétique** : **paracétamol (PERFALGAN)**, 60 mg/kg/j.
- Pas de corticothérapie systématique car la composante oedémateuse est mineure (micro-abcès).
- Surveillance : réanimation, laryngoscopie quotidienne pour décision d'extubation (48-72 h).

#### ► Prévention

- Primaire : vaccin anti-*Haemophilus* b (**ACT-HIB**).
- Secondaire : sujets contacts < 4 ans non vaccinés : vaccin (Hibest) + antibioprophylaxie : **rifamycine (RIFADINE)**, 20 mg/kg/j pendant 4 j en 2 prises (c-mes. 100 mg) + surveillance clinique et parentale.

#### Autres causes

- Corps étrangers du larynx : endoscopie laryngo-trachéo-bronchique au moindre doute.
- Papillomatose laryngée : tumeur bénigne pouvant être extensive, due aux *Papillomavirus*.
- Traumatisme laryngé.

## CANCERS ORL (1)

- **Anatomopathologie** : carcinome épidermoïde.
- **Facteurs de risque** :
  - *tabac* : 98 % de fumeurs (+++);
  - *alcool* : action synergique avec le tabac.
- **Maladie diffuse** de la muqueuse : 16 % de 2<sup>e</sup> localisation synchrone ou métachrone (VADS, œsophage, broncho-pulmonaire, vessie).
- **Drainage lymphatique cervical** : maladie à développement loco-régional.

### Circonstances de découverte

- **Troubles de la phonation** : dysphonie.
- **Troubles de la déglutition** : dysphagie, odynophagie (dysphagie douloureuse).
- **Troubles de la respiration** : dyspnée.
- **Autres** : angine persistante, otalgie réflexe (tumeur pharyngée homolatérale), hémorragie (hématémèse, hémoptysie), adénopathie cervicale persistante, altération de l'état général.

### Examens

#### Bilan clinique

- **Examen buccopharyngo-laryngé** : inspection et palpation ; limites de la tumeur, extension, troubles de la mobilité laryngée (schéma daté).
- **Examen des aires ganglionnaires cervicales.**
- **Examen de l'état dentaire.**
- **Recherche de signes en faveur d'une métastase** pulmonaire, hépatique, osseuse, cérébrale, etc.
- **Évaluation** de l'état général (poids) et de l'importance de la douleur, recherche des complications de l'alcoolisme et du tabagisme.

#### Bilan radiologique

- **Scanner cervical avec injection** : extension tumorale et ganglionnaire.

- **IRM cervicale** : pour certaines localisations.
- **Radio de thorax** face et profil.
- **Échographie hépatique** non systématique.
- **Panoramique dentaire** : recherche de foyers infectieux dentaires.
- **PET-scan** (en cours d'évaluation), scanner couplé à une tomographie par émission de positons permettant de localiser un cancer primitif en cas d'atteinte ganglionnaire ou de rechercher une deuxième localisation d'un cancer des VADS.

### Autres examens

- **Bilan de l'intoxication alcool-tabagique** : fibroscopie bronchique, fibroscopie digestive.

### Panendoscopie sous anesthésie générale : examen majeur

- **Bilan préopératoire, anesthésie générale**, tubes rigides de différents calibres et longueurs :
  - inspection et palpation de la cavité buccale et de l'oropharynx (base de la langue) ;
  - laryngoscopie (dite « directe ») ;
  - hypopharyngoscopie (sinus piriformes et bouche de l'œsophage) ;
  - œsophagoscopie ;
  - bronchoscopie (non systématique) ;
  - palpation des aires ganglionnaires et des possibles zones d'extension sous-cutanées (membrane thyro-hyôïdienne).
- **Examen capital** qui doit être réalisé par l'ORL qui va traiter le patient, elle permet :
  - le diagnostic positif de la tumeur : biopsies avec examen anatomopathologique ;
  - l'étude de l'extension de la tumeur : taille, atteinte et mobilité des structures cervicales. Tatouage en cas de chimiothérapie néoadjuvante. Schéma précis des lésions ± photos, classification TNM ;
  - la recherche d'une deuxième localisation simultanée et de pathologies associées.

## CANCERS ORL (2)

### Traitement carcinologique

Trois modalités thérapeutiques sont plus ou moins associées : chimiothérapie, chirurgie d'exérèse et radiothérapie. Les choix sont fonction du siège et de l'extension de la tumeur, du terrain et des habitudes de l'équipe.

#### Chimiothérapie

Elle est pratiquée en complément d'un autre traitement (soit la chirurgie, soit la radiothérapie) :

- soit *néoadjuvante* ou d'induction (avant tout autre traitement). Elle permet dans certains cas un traitement conservateur ;
- soit en *concomitant* pendant la radiothérapie pour améliorer l'efficacité de cette dernière ;
- soit en *palliatif* en cas de très volumineuse tumeur, de récurrence massive ou de métastases.

La chimiothérapie associe essentiellement 2 drogues génotoxiques : le **cisplatine (CIS-PLATYL)** 15 mg/m<sup>2</sup> et le **fluorouracile (5-FU) (FLUORO-URACIL)** 1 g/m<sup>2</sup> en perfusion intraveineuse continue pendant 5 j, répétée toutes les 3 sem.

Effets indésirables :

- **fluorouracile** : nausées, vomissements, aplasie médullaire, spasme coronarien, stomatite (mucite) et diarrhée ;
- **CDDP** : insuffisance rénale, ototoxicité, diarrhées.

#### Chirurgie

Elle doit être :

- *carcinologique* (exérèse complète de la tumeur et des ganglions cervicaux) ;
- *fonctionnelle* (conservation le plus possible de la phonation, de la déglutition, de la respiration et de la mastication).

Le type de résection tumorale dépend du siège et de l'extension de la tumeur.

L'exérèse uni- ou bilatérale des ganglions

et du tissu cellulo-grasieux cervical est systématique. Le curage ganglionnaire (ou évidement) est :

- soit sélectif lorsqu'il n'enlève que certains groupes ganglionnaires ;
- soit radical modifié lorsqu'il enlève tous les groupes ganglionnaires cervicaux ;
- soit radical lorsqu'il enlève en plus des ganglions, le muscle sterno-cléido-mastoïdien, la veine jugulaire interne et parfois le nerf spinal. Ils sont indiqués en cas d'adénopathie > 3 cm ou fixée à l'un de ces éléments.

Ses inconvénients sont : une diminution de la force de l'épaule (paralysie du trapèze), des douleurs cervicales et un œdème transitoire de la face.

#### Radiothérapie

Il s'agit surtout d'une radiothérapie externe par voie transcutanée (2 Gy/j pendant 10 min, 5 j/sem.), parfois d'une curiethérapie (cavité buccale). On irradie la zone tumorale et les aires ganglionnaires.

**Radiothérapie curatrice** (exclusive) : souvent associée à une chimiothérapie concomitante (**cisplatine** 100 mg/m<sup>2</sup> à J1, J21, J42) ou alternée, 70 Gy soit 7 sem. de traitement. Ses inconvénients sont : le délai de traitement, la fréquence des effets secondaires, les difficultés de surveillance, en cas d'échec (non-stérilisation ou récurrence) ou de 2<sup>e</sup> localisation, les risques élevés de la chirurgie après irradiation avec des difficultés de cicatrisation et l'impossibilité d'une nouvelle irradiation.

**Radiothérapie complémentaire** : 1 mois après l'exérèse chirurgicale, 50 à 65 Gy soit 5 sem. de traitement. Principales indications : exérèse chirurgicale insuffisante (limites de résection envahies), tumeur volumineuse envahissant massivement les structures de voisinage, ganglion envahi en rupture capsulaire, embolies intravasculaires néoplasiques.

## CANCERS ORL (3)

### Radio-chimiothérapie

La radiothérapie associée à une chimiothérapie concomitante ont montré une meilleure efficacité que la radiothérapie seule avant 70 ans avec un gain de 10 % de survie à 5 ans. La radiothérapie associée aux thérapies ciblées type **cétuximab (ERBITUX)** (en cours d'évaluation) semble donner les mêmes résultats avec moins de réactions générales et plus de réactions locales. **Cétuximab (ERBITUX)** : 1 inj. intraveineuse à la seringue électrique par semaine, 400 mg/m<sup>2</sup> à la première inj. puis 250 mg/m<sup>2</sup> à chaque inj. ; débuté 1 sem. avant la radiothérapie et poursuivi jusqu'à la fin de la période de radiothérapie.

### Effets secondaires et précautions

- **Brûlures muqueuses (mucite radique)** :odynophagie d'où perte de poids. Ce qui nécessite : alimentation liquide hypercalorique (**FORTIMEL**, 2-4 boîtes/j en variant l'arôme, **RENUTRYL**) parfois par sonde nasogastrique ou gastrostomie, **antalgiques** majeurs, **bains de bouche** bétadinés et **anesthésique local**.
- **Brûlures cutanées** (radiodermite aiguë) évoluant vers la sclérose cervicale (blindage), rendant la surveillance difficile. On utilise des crèmes hydratantes et/ou crèmes anti-inflammatoires (**corticoïdes**).
- **Asialie** (sclérose des glandes salivaires) : définitive et invalidante dès 60 Gy, risque de caries dentaires, de candidose, de perte du goût et donc de diminution de l'alimentation. Il faut une bonne hydratation, les **sialologues (SULFARLEM S 25**, 1 cp. x 2/j) sont peu efficaces. Prévention de l'hypo-sialie par **amisfostine (ETHYOL)**, radioprotecteur : 200 mg/m<sup>2</sup> en intraveineuse lente ; 15 à 30 min avant la séance de radiothérapie.
- **œdème laryngé** : en cas de dyspnée, corticothérapie, aérosols corticoïdes 4 fois/j et parfois trachéotomie.
- **Ostéoradionécrose mandibulaire** : favorisée par un mauvais état dentaire ou des soins dentaires. Elle nécessite **antalgiques**,

**bains de bouche** bétadinés ou bicarbonate 14 ‰ x 6/j, antibiothérapie prolongée à forte dose parfois par voie intraveineuse, oxygénothérapie hyperbare pour certains, parfois curetage chirurgical d'un séquestre osseux.

Prévention : mise en état dentaire au moins 3 sem. avant l'irradiation, gouttières fluorées portées toutes les nuits à vie, lavage doux et fréquent et surveillance des dents restantes, soins dentaires sous antibiothérapie.

### Mesures associées

- **Intoxication alcoolo-tabagique** : arrêt complet et définitif de l'intoxication (prise en charge spécialisée). Recherche et traitement des autres complications de l'intoxication.
- **Réinsertion socioprofessionnelle** : surtout en cas de chirurgie mutilante.
- **Traitement antalgique** adapté.
- **Renutrition** : adaptation de l'alimentation en fonction des troubles de la déglutition (conseils diététiques spécialisés) et apport calorique.
- **Kinésithérapie** : motrice en cas de sacrifice du nerf spinal, respiratoire en cas de fausses routes de déglutition.

### Surveillance à vie

x 2/mois pendant 6 mois, x 1/3 mois pendant 2 ans, puis x 1/6 mois.

- Récidive locale ou ganglionnaire, 2<sup>e</sup> localisation tumorale des VADS : douleur (otalgie réflexe), dysphagie, dysphonie, saignement, altération de l'état général (*courbe de poids*), inspection et palpation cavité buccale et oropharynx, laryngoscopie, palpation cervicale, état de la cicatrice.
- Métastases : signes fonctionnels, radiographie du thorax/6 mois.
- Complications du traitement : trouble de l'alimentation (*courbe de poids*, déglutition : fausses routes alimentaires ++), troubles de la phonation et de la respiration, complications de la radiothérapie.
- Intoxication alcoolo-tabagique.
- Réinsertion socioprofessionnelle.
- Retentissement psychologique.

## CANCERS ORL (4)

### Types de cancers

#### Cavité buccale (30 %)

- Fréquence des lésions précancéreuses (surveillance ++) et des 2<sup>e</sup> localisations.
- Langue mobile (30 %), plancher buccal (20 %), face interne de la joue, gencive, palais osseux.
- Résections : électrorésection (glossectomie, pelvi-glossectomie) par voie endobuccale ou trans-mandibulaire (ostéotomie mandibulaire, puis ostéosynthèse), parfois mandibulectomie non interruptrice (exérèse d'une partie de la mandibule) ou interruptrice (exérèse complète d'un segment mandibulaire). Reconstruction par des lambeaux locaux (musculo-muqueux) ou régionaux (musculocutanés de grand pectoral ou de grand dorsal) ou pis à distance et micro-anastomosés (lambeaux libres).
- Radiothérapie : possibilité d'une curiethérapie, mais risque important d'ostéoradiocécrose mandibulaire.

#### Oropharynx (25 %)

- Régions amygdaliennes (80 %), base de la langue, voile du palais, paroi pharyngée postérieure.
- Possibilité de lymphome au niveau des organes lymphoïdes (amygdales).
- Fréquence d'une otalgie réflexe révélatrice.
- Résection : électrorésection par voie endobuccale, oropharyngectomie par voie transmandibulaire (± reconstruction par un lambeau musculocutané de grand pectoral).

#### Hypopharynx (15 %)

- Sinus piriforme (90 %), bouche œsophagienne, paroi hypopharyngée postérieure, région rétro-crico-aryténoïdienne.

- Fréquence de l'extension au larynx et des adénopathies cervicales métastatiques.

- Résection : pharyngo-laryngectomie partielle et surtout totale avec trachéostomie définitive.

#### Larynx (25 %)

- Localisations :
  - glotte (49 %) = cordes vocales ;
  - sus-glottes (49 %) = margelle laryngée (épiglottes, carrefour des 3 replis, repli ary-épiglottique, aryénoïdes) et vestibule laryngé (face laryngée de l'épiglottes, bandes ventriculaires, ventricules) ;
  - sous-glottes (1 %) = jusqu'à la trachée.

- Résection :
  - laryngectomies partielles horizontales enlevant un étage complet en passant en sus-glottique ou en sus-cricoidien avec reconstruction par crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP) ou crico-hyoïdopexie (CHP) ;
  - laryngectomies partielles verticales (enlevant une partie d'un hémilarynx). Selon le type d'intervention, il existe un risque de troubles de la déglutition.

Les laryngectomies totales séparent l'axe digestif de l'axe respiratoire avec une trachéostomie (abouchement à plein canal de la trachée à la peau). Pour pallier la perte de la phonation, apprentissage précoce de la voix œsophagienne ou utilisation d'une prothèse phonatoire trachéo-œsophagienne.

#### Cavum

Association avec l'infection par le virus Epstein-Barr avec fréquence très élevée en Asie du Sud-Est, élevée en Afrique du Nord et rare en France.

Souvent révélé par des ganglions cervicaux, parfois par une obstruction nasale ou une otite séreuse unilatérale. Métastases fréquentes.

Traitement par radiothérapie et chimiothérapie.

**CORPS ÉTRANGERS DES VOIES AÉRIENNES (1)**

- Corps étrangers laryngo-trachéo-bronchiques.
- Ils sont observés surtout chez le garçon de 1 à 3 ans.
- Alimentaires dans 80 % cas (caca-huète = 50 %) donc radio-transparents et mauvaise tolérance locale.
- Inhalation principalement dans la bronche souche droite, lors d'une fausse-route de déglutition ou lors d'une inspiration brutale.

**Syndrome de pénétration**

Accès de suffocation avec quinte de toux expulsives puis tirage et cornage pendant la reprise inspiratoire, puis apnée avec cyanose.

**Si la pénétration est passée inaperçue**

- Bronchopneumopathie persistante ou récidivante, fixe, évoluant vers l'abcédation.
- Bronchite asthmatiforme.
- Dilatation localisée des bronches.

**En cas de blocage laryngé complet**

- Asphyxie par hypoventilation suraiguë.
- Arrêt cardiaque rebelle.

**Examens****Radiographies pulmonaires**

Elles sont faites seulement si l'état ventilatoire de l'enfant le permet : radiographie de thorax de face et de profil, de face en inspiration et en expiration forcée, de face en décubitus latéral droit et gauche.

- Signes directs : corps étranger radio-opaque.
- Signes indirects : atelectasie segmentaire, emphysème obstructif localisé ou étendu à un héli-champ, pneumothorax, pneumomédiastin, foyer infectieux persistant ou récidivant systématisé, évoluant vers l'abcès.

- Une radiographie normale n'élimine pas le diagnostic et doit entraîner une endoscopie en cas d'orientation clinique.

**Endoscopie trachéobronchique**

- Sous anesthésie générale : fibroscopie trachéobronchique souple première.
- Si présence d'un corps étranger : endoscopie trachéobronchique au tube rigide et extraction du corps étranger à la pince.

## CORPS ÉTRANGERS DES VOIES AÉRIENNES (2)

### Traitement

Tout enfant ayant une suspicion de corps étranger respiratoire doit être transféré à l'hôpital (par Samu en cas de mauvaise tolérance respiratoire) pour exploration et traitement endoscopique.

### Suspicion de corps étranger trachéobronchique bien toléré ou asymptomatique

- Trachéobronchoscopie rigide sous anesthésie générale à jeun (attendre plus de 6 h) : extraction à la pince et exploration de tout l'arbre respiratoire.
- Antibiothérapie : **amoxicilline, CLAMOXYL**, 50 mg/kg/j pendant 5 à 10 j en 3 prises (sach. ou c-mes. 120 mg, 250 mg, 500 mg).
- Corticothérapie à visée anti-œdémateuse : **bétaméthasone, CÉLESTÈNE**, 10 gttes/kg/j en 1 prise pendant 4 j.
- Radiographie pulmonaire de contrôle.

### Corps étranger obstructif mal toléré

- Oxygénothérapie, antibiothérapie, corticothérapie IV.
  - Extraction en urgence par endoscopie trachéobronchique rigide sous anesthésie générale.
  - Contrôle radio pulmonaire.
  - Surveillance : état respiratoire, température.
- On a la même attitude en cas :
- de corps étranger laryngé ou trachéal,
  - de pneumothorax ou pneumomédiastin,
  - de trouble ventilatoire de tout un poumon.

### Corps étranger asphyxiant

- Extraction au doigt si corps étranger pharyngo-trachéal.
- Manœuvre de Heimlich (expulsion de l'air thoracique par une pression épigastrique appliquée de bas en haut) : seulement en l'absence de toux qui est bien plus puissante ; une seule tentative possible, risque d'enclavement sous-glottique et de pneumopathie d'inhalation.
- À l'hôpital, extraction à l'aide d'un laryngoscope et d'une pince de Magill. Sinon, intubation pour repousser le corps étranger, voire trachéotomie.

### Corps étranger ancien méconnu

- Extraction sous endoscopie rigide ou souple.
- En cas d'échec, antibiothérapie et corticothérapie puis nouvelle tentative après 4 à 8 j.



## FOYERS INFECTIEUX DENTAIRES (1)

### Carie de l'émail

- Facteurs favorisants : facteurs alimentaires +++ (glucides ++, carence en vitamine D), facteurs bactériens (*Streptococcus mutans* dans la plaque dentaire), facteurs héréditaires, facteurs hormonaux, radiothérapie (hyposialie), malpositions dentaires.
- Clinique : asymptomatique, découverte lors de l'examen dentaire.
- Évolution : vers la carie de la dentine.

- Traitement : nettoyage et obturation de la cavité.
- Prévention : dépistage précoce dès l'enfance, hygiène buccale et dentaire (brossage adapté et répété), conseils alimentaires (éviter les sucres collants entre les repas), fluorothérapie **fluorure de sodium (ZYMAFLUOR)**, en 1 prise orale, 0-2 ans : 1 cp. 0,25 mg/j ou 4 gtt/j, 2-4 ans : 2 cp. 0,25 mg/j ou 8 gtt/j, 4-6 ans : 3 ans et femme enceinte après le 4<sup>e</sup> mois 1 cp. 1 mg.

### Carie de la dentine : dentinite

- Clinique : douleur provoquée (froid, acide, sucre, exploration à la sonde), brève, disparaît après l'arrêt de la stimulation, localisée à la dent (pas d'irradiation), pas de douleur à la percussion et tests de vitalité dentaire (chaud-froid) positifs.
- Clichés rétro-alvéolaires : extension à la pulpe.
- Évolution : vers la pulpite et la desmodontite.

- Traitement : nettoyage du tissu dur et obturation de la cavité.

### Pulpite aiguë

#### Clinique : « rage de dent »

- Douleur spontanée évoluant par crises de début et de fin brutale, intensité extrême, avec des irradiations (aux dents voisines et à la face).
- Douleur provoquée (changement de température, pression, acide, sucre, exploration à la sonde), prolongée (quelques minutes après l'arrêt de la stimulation) ; pas de douleur à la percussion axiale de la dent.
- Évolution vers la mortification pulpaire puis la desmodontite.

### Traitement

- Traitement local en 2 temps : en urgence, ouverture de la chambre pulpaire sous anesthésie locale, pansement antiseptique et calmant, puis pulpectomie et obturation des canaux dentaires.
- **Antalgiques : paracétamol + codéine (EFFERALGAN CODÉINE)**, 1-2 cp. x 3/j.
- Pas d'AINS.

### Desmodontite aiguë (monoarthrite dentaire aiguë)

- Inflammation aiguë du tissu de soutien de la dent (ligament alvéolo-dentaire) secondaire à la mortification pulpaire.

### Clinique

- Douleur spontanée, lancinante avec paroxysmes nocturnes, centrée sur la dent et irradiant peu. Douleur provoquée à la moindre pression ainsi qu'à l'effleurement par la langue ou des dents antagonistes : sensation de « dent longue ». Douleur à la percussion axiale, parfois mobilité dentaire. La dent est mortifiée (tests de vitalité chaud-froid négatifs, couleur brune de la dent, son mat). Pas de signes généraux, ni de trouble réflexe.
- Radio : élargissement du ligament alvéolo-dentaire.
- Évolution vers la cellulite d'origine dentaire, la desmodontite chronique, l'ankylose dentaire. Possibles complications générales.

### Traitement

- Soit extraction de la dent causale sans refermer l'alvéole, soit traitement conservateur (trépanation de la dent, nettoyage des tissus canaux nécrosés, désinfection puis 2<sup>e</sup> temps, obturation chambre pulpaire).
- Antibiotique probabiliste, voie orale, pendant 7 j : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 2 cp. 500 mg x 3/j.
- **Antalgiques : paracétamol + codéine (EFFERALGAN CODÉINE)**, 1-2 cp. x 3/j.
- **Bains de bouche antiseptiques (HEX-TRIL)**, 6 fois/j.
- Pas d'AINS.

## FLUOR DENTAIRE

### ■ Fluorure de sodium

<b>FLUOREX</b>					
F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 1 dose n° 4/j ; E. < 2 ans : 1 dose n° 1/j ; E. 2-3 ans : 1 dose n° 2/j ; E. 3-4 ans : 1 dose n° 3/j ; E. > 4 ans : 1 dose n° 4/j	120 doses n° 1 : 0,25 mg	2,03		30 %	0,02
<b>ZYMAFLUOR</b>					
F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 4 cp./j ; E. < 2 ans : 1 cp./j ; E. 2-4 ans : 2 cp./j ; E. 4-6 ans : 3 cp./j ; E. > 6 ans : 4 cp./j	200 cp. 0,25 mg	1,98		30 %	0,01
E. 2-4 ans : 1 cp./j	100 cp. 0,5 mg	1,98		30 %	0,02
E. 4-6 ans : 1 cp./j	100 cp. 0,75 mg	2,55		30 %	0,03
E. > 6 ans, F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 1 cp./j	100 cp. 1 mg	2,68		30 %	0,03

### ■ Fluorure de calcium

<b>FLUORURE DE CALCIUM CRINEX</b>					
F. enceinte > 4 <sup>e</sup> mois, allaitante E. > 4 ans : 4 cp./j ; E. 2-4 ans : 2 cp./j E. < 2 ans : 1 cp./j	200 cp. 0,25 mg	2,28		30 %	0,01

#### PROPRIÉTÉS

Renforce la dureté de l'émail.  
Inhibe la dégradation enzymatique des hydrates de carbone.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Diminution de l'absorption en cas de prise simultanée de laitages ou d'**antiacides**.

#### INDICATIONS

Prophylaxie de la carie dentaire.

## FOYERS INFECTIEUX DENTAIRES (2)

### Desmodontite chronique

- Inflammation chronique du tissu de soutien de la dent avec formation d'un tissu de granulation à l'extrémité de la dent (apex) = granulome apical, qui s'épithélialise = kyste et peut évoluer pour son propre compte après l'extraction de la dent.
- **Clinique** : absence de douleur spontanée mais ébranlement dentaire douloureux, mobilité dentaire.
- **Radio** : image radio claire péri-apico-dentaire. Si diamètre > 10 mm = kyste.

• **Traitement** : soit extraction et curetage du granulome (ou énucléation du kyste), soit traitement conservateur (dévitalisation et obturation de la chambre pulpaire puis curetage du granulome par voie vestibulaire et résection apicale).

### Cellulites d'origine dentaire

Il existe 4 stades : (1) cellulite aiguë séreuse, (2) cellulite aiguë suppurée, (3) cellulite chronique, (4) cellulite gangreneuse.

#### Formes topographiques

##### ► Cellulites pérимандibulaires

- Dents : canines, prémolaires et premières molaires.
- Extension : vers le vestibule génien au-dessus du buccinateur ou en dessous (ostéophlegmon basilaire).
- Sur les prémolaires : possible diffusion au plancher buccal, en sous-mylo-hyoïdien (risque asphyxique).

##### ► Cellulites pérимassétérides

- Dents : 2° et 3° molaires inférieures.
- Atteinte de l'angle mandibulaire et sous-angulo-mandibulaire.
- Signes généraux et trismus plus marqués. Diffusion vers le haut, dans la région inter-ptérygoïdienne : la douleur, le trismus et la dysphagie sont marqués.

##### ► Cellulites de la fosse canine (cellulites nasogéniques)

- Dents causales : canines et prémolaires supérieures.

- Tuméfaction comblant le sillon nasogénien avec œdème palpébral d'abord inférieur.

- Risque de thrombophlébite de la veine faciale puis du sinus caverneux.

#### Traitement

- Bilan bactériologique : hémocultures avec recherche anaérobie et antibiogramme, ponction de la collection.
- Bilan radiologique : clichés rétro-alvéolaires, panoramique dentaire, radio de thorax.

##### ► Traitement de la cellulite séreuse

Ambulatoire, mais sous surveillance.

- Antibiothérapie probabiliste, voie orale, pendant 10 j. **Amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 2 cp. 500 mg x 3/j.

- **Antalgiques** : paracétamol + codéine (**EFFERALGAN CODÉINÉ**), 1-2 cp. x 3/j.

- **Bains de bouche antiseptiques** : **HEX-TRIL**, 6 fois/j.

- Pas d'**AINS**.

- Traitement de la dent causale +++.

##### ► Traitement de la cellulite suppurée

Hospitalisation en service spécialisé.

- Équilibration hydroélectrolytique.

- Antibiothérapie parentérale : **PÉNICILLINE G PANPHARMA**, amp. 5 MUI x 3/j + **métronidazole (FLAGYL)** amp. 500 mg x 3/j relais *per os* après apyrexie.

- **Antalgiques** : paracétamol + codéine (**EFFERALGAN CODÉINÉ**), 1-2 cp. x 3/j ou **paracétamol (PERFALGAN)** 2 amp. 1 g x 3/j en I.V.

- Traitement de la dent causale +++ :  
– extraction de la dent causale (sous anesthésie générale si trismus),  
– drainage de la collection purulente,  
– lavage antiseptique (**BÉTADINE** et eau oxygénée) pluriquotidiens.

- **Bains de bouche antiseptiques** : **BÉTADINE** gargarisme, bain de bouche, x 6/j.

- **Anticoagulant** si cellulite nasogénienne.

##### ► Traitement de la cellulite gangreneuse

Prise en charge en réanimation :

- drainages en urgence sous AG ;
- pansements quotidiens sous AG jusqu'à amélioration.

## TRAUMATISMES DENTAIRES

- Traumatismes de la dent et du parodonte (alvéole osseuse et ligament alvéolo-dentaire).
- Ils atteignent surtout les incisives supérieures.
- Bilan radiologique : rétro-alvéolaires, occlusaux, panoramique dentaire.
- Risques évolutifs en cas de conservation de la dent : mortification pulpaire et rhizalyse.
- Importance du certificat médical initial.

### Traumatismes de la denture lactéale

- **Luxation complète** : vérifier l'absence de fragment radiculaire persistant (cliché rétro-alvéolaire) qui doit être extrait.
- **Luxation incomplète avec impaction (agression dentaire)** : extrusion spontanée mais risque d'atteinte des germes dentaires sous-jacents.
- **Luxation incomplète avec version palatine ou labiale** : selon la mobilité et la chronologie de la denture lactéale, soit réimplantation et contention (ligature en berceau ou bague orthodontique), soit extraction.

Traitement orthodontique pour éviter la fermeture de l'espace inter-dentaire en cas de perte de la dent.

### Traumatismes de la denture définitive

#### Contusion dentaire

- Inflammation aiguë du périodonte ± rupture du paquet vasculonerveux dentaire.
- Douleurs dentaires localisées spontanées et provoquées par la morsure et le froid, durant plusieurs heures. Mobilité minime de la dent. Tests de vitalité dentaire normaux.
- **Radio** : normale ou petit élargissement ligamentaire.
- **Conduite à tenir** : **antalgiques**, mettre la dent en sous-occlusion, alimentation liquide puis surveillance pendant 6 mois de la vitalité dentaire (douleurs, mobilité, couleur, tests de vitalité thermiques et électriques, radios dentaires).

- Risque de mortification pulpaire (pulpectomie et obturation canalair) puis de desmodontite chronique et de cellulite dentaire.
- En cas de rupture du paquet vasculonerveux : pulpectomie et obturation canalair.

#### Luxation dentaire partielle

- Dent mobile et douloureuse, saignant au collet ; radiographie : pas de fracture dentaire, élargissement du ligament ± fracture alvéolaire.
- **Conduite à tenir** : **antalgiques**, réduction manuelle sous anesthésie locale puis contention pendant 2 mois.
- Surveillance de la vitalité dentaire.
- Luxation verticale (axiale) : abstention thérapeutique (reposition spontanée de la dent) sinon extraction.

#### Luxation dentaire complète

- **Radio** : rechercher fragment radiculaire.
- **Conduite à tenir** : réimplantation avant la 8<sup>e</sup> h puis contention pendant 2 mois ± antibiothérapie par **amoxicilline (CLAMOXYL)** 1 g x 2/j pendant 7 j, en l'absence d'allergie :
  - < 2<sup>e</sup> h : nettoyage au sérum pénicilliné ;
  - 2-4<sup>e</sup> h : nettoyage au sérum pénicilliné, pulpectomie et obturation, toilette de l'alvéole ;
  - 4-8<sup>e</sup> h : curetage de l'alvéole, stérilisation de la dent par un **ammonium quaternaire (CETAVLON)**, pulpectomie et obturation.
- Évolution : rhizalyse en plusieurs années.

#### Fractures dentaires

- **Fracture coronaire** : pulpectomie si exposition pulpaire puis restitution par composite. Attention à la contusion dentaire associée.
- **Fracture radiculaire** :
  - 1/3 cervical : ablation de la couronne, pulpectomie puis traitement prothétique ;
  - 1/3 moyen : pulpectomie et contention ;
  - 1/3 apical : pulpectomie.

## FRACTURES DE LA MANDIBULE (1)

- Elles représentent 70 % des fractures de la face.
- Accidents de la voie publique, rixe, sport.
- Mécanismes : soit direct (fracture au point d'application du choc), soit indirect.
- Déplacement des fragments selon le mécanisme, le trait de fracture et surtout l'action des muscles masticateurs.

### Bilan clinique

- Éliminer un polytraumatisme et une fracture du massif facial supérieur (cf. Traumatismes maxillo-faciaux).
- Date et circonstances de l'accident.
- Inspection exobuccale : déformations rapidement masquées par l'œdème.
- Palpations des contours osseux : bord basilaire, angles, condyles (région prétragienne et dans le conduit auditif externe), recherche de déformation, point douloureux exquis, douleur provoquée à distance.
- Exploration de la sensibilité du nerf mentonnier (trajet intramandibulaire) : hypoesthésie héli-région labiomentonnière et bloc incisivo-canin inférieur.
- Inspection endobuccale (abaisse-langue, bon éclairage) :
  - état des muqueuses : plaie, hématome ;
  - articulé dentaire : béance antérieure ou latérale, décalage des points interincisifs médians ;
  - mouvements d'ouverture et de fermeture buccale : trismus, latéro-déviation  $\pm$  occlusion en 2 temps ;
  - mouvements de propulsion et de diduction ;
  - état des arcades alvéolodentaires : lésions dentaires +++++, déchirure de la fibromuqueuse.
- Palpation endobuccale : déformation, point douloureux exquis, mobilité dentaire ou des arcades dentaires.

### Bilan radiologique

- Panoramique dentaire dégagant les condyles (seulement chez un sujet assis).
- Défilés mandibulaires droit et gauche : branche horizontale, angle, branche montante.

- Face basse bouche ouverte : branches montantes, condyles.
- Clichés occlusaux et rétroalvéolaires : arcades dentaires.
- En cas de fracture complexe (fractures comminutives ou avec perte de substance) ou en cas de suspicion de fracture des condyles non visible sur les radiographies standards : TDM de la face en coupes osseuses.

### Complications

#### Complications immédiates

- Polytraumatisme (cf. Traumatismes maxillo-faciaux).
- Asphyxie : chute de la langue en arrière dans les fractures parasymphysaires bilatérales, corps étranger (dent luxée, caillot).
- Hémorragie : artère faciale, artère dentaire.
- Traumatismes dentaires +++.
- Section du nerf dentaire inférieur.

#### Complications secondaires

- Abscess péricardibulaire par inoculation septique du foyer de fracture. Risque de fistulisation et d'ostéite.
- Ostéite mandibulaire.
- Retard de consolidation ( $> 2$  mois).

#### Séquelles

- Pseudarthrose (absence de consolidation  $> 6$  mois) : foyer de fracture mobile mais non douloureux.
- Cal vicieux (consolidation en mauvaise position) : risque de trouble de l'articulé dentaire.
- Syndrome algo-dysfonctionnel temporo-mandibulaire (en cas de fracture région condylienne ou de cal vicieux).
- Ankylose temporo-mandibulaire (en cas de fracture région condylienne non rééduquée) : constriction permanente des mâchoires avec risque d'atrophie héli-mandibulaire chez l'enfant par atteinte des cartilages de croissance.
- Séquelles dentaires.
- Séquelles esthétiques.

## FRACTURES DE LA MANDIBULE (2)

### Traitement

Mesures d'urgence (cf. Traumatismes maxillo-faciaux) : canule de Guédel ou traction de la langue en cas de chute de la langue en arrière, lésions dentaires.

But des méthodes de traitement des fractures : rétablir l'anatomie des contours maxillo-faciaux et surtout l'articulé dentaire.

#### Traitement orthopédique : blocage intermaxillaire

- Réduction manuelle ou progressive par traction élastique (rétablissement de l'articulé).
- Contention par blocage intermaxillaire (arcs ou ligatures d'Ivy) pendant 4 à 6 sem. associé à :
  - mise en état bucco-dentaire ;
  - alimentation liquide ;
  - hygiène buccale rigoureuse ;
  - coupe-fils (type pince de Bebee) toujours disponible ;
  - surveillance hebdomadaire ;
  - rééducation active dès le déblocage.

#### Traitement chirurgical

- Abord du foyer de fracture (par voie endobuccale le plus souvent).
- Réduction.
- Contention par ostéosynthèse par des mini- ou micro-plaques ± blocage intermaxillaire antalgique pendant quelques jours.

#### Traitement fonctionnel ou mécanothérapie

Kinésithérapie de l'articulation temporo-mandibulaire pour certaines fractures de la région condylienne : mobilisation passive (traction élastique) puis active (mouvements de propulsion et de diduction).

### Mesures associées

**Antalgiques, antibiotiques** (en cas de fracture ouverte) type **AUGMENTIN**, **bains de bouche antiseptiques**.

Vérifier vaccination antitétanique.

#### Contrôle panoramique dentaire

À J8, J15 et J30.

### Formes anatomocliniques

#### Fractures de portion dentée

Symphyse, branche horizontale, angle (en avant de la dent de sagesse).

- Diagnostic : fracture ouverte, hypoesthésie labiomentonnière, lésions dentaires.
- Traitement :
  - fracture non déplacée : blocage intermaxillaire (BIM) ou abstention chez l'édenté ;
  - fracture déplacée bien réduite : BIM ou ostéosynthèse ;
  - fracture déplacée mal réduite + oséosynthèse.

#### Fractures de la région non dentée

Angle (en arrière dent de sagesse), branche montante, région condylienne.

- Diagnostic : latéro-déviation avec contact molaire prématuré du côté de la fracture, béance controlatérale.
- Région condylienne : impact mentonnier, douleur prétragienne, otorragie (fracture associée du tympanal).
- Traitement : branche montante et sous-condylienne basse (extra-articulaire) non déplacée : BIM puis rééducation active ; sous-condylienne basse déplacée : ostéosynthèse ; intra-articulaire (sous-condylienne haute, condylienne) : mécanothérapie et kinésithérapie active en propulsion, pour certains : ostéosynthèse (vis trans-condylienne).

## TRAUMATOLOGIE MAXILLO-FACIALE (1)

### Délai de consolidation = 1 mois

#### Mesures immédiates : CAB [1]

« C » = *Circulation*

- Réanimation selon le pouls et la tension (au moins 100 compressions/min).
- Contrôle des hémorragies (tamponnement, ligatures).

Bilan clinique du polytraumatisé

- Lésions neurochirurgicales et rachidiennes.

- Lésions viscérales et orthopédiques.

- Lésions ophtalmologiques.

« A » = *Airway* : libération des voies aériennes supérieures

Désencombrement de la bouche et du pharynx (caillot, dent, prothèse, chute de la langue), décubitus latéral (en respectant l'axe rachidien), canule de Mayo ou traction sur la langue, voire intubation trachéale.

« B » = *Breathing* : respiration

Vérification de la ventilation spontanée sinon ventilation assistée au masque ou intubation.

### Bilan clinique maxillo-facial

#### Anamnèse

#### Inspection exofaciale et endobuccale

- Déformations (mais œdème précoce).
- Ecchymose en lunette bipalpébrale = fracture de la base du crâne.
- Plaies cutanées avec risque d'atteinte du nerf facial, du canal de Sténon et risques hémorragiques.
- Épistaxis et fuite de LCR (rhinorrhée claire) : test à la compresse et recherche de glucose.
- Troubles de l'ouverture buccale, troubles de l'articulé dentaire, lésions dentaires.
- Plaies endobuccales avec danger hémorragique ; plaie de la fibromuqueuse palatine en faveur d'une disjonction sagittale ; plaie gingivale en faveur d'une fracture mandibulaire ou maxillaire supérieure.

#### Palpation exofaciale et endobuccale

- Palpation des reliefs osseux : cadres orbitaires, arcades zygomatiques, voûte frontale, arête nasale, arc mandibulaire.
- Mobilité anormale des maxillaires : disjonction cranio-faciale.

#### Reste de l'examen clinique

- Diplopie spontanée, mobilité oculaire extrinsèque et intrinsèque (réflexes photomoteurs), diminution de l'acuité visuelle.
- Déficit neurologique : paralysie faciale périphérique, paralysie dans l'un des territoires du trijumeau (sus-orbitaire, sous-orbitaire, labiomentonier, lingual).
- Bilan dentaire : douleurs, mobilité, test de vitalité.

#### Bilan radiologique maxillo-facial

- Incidences standards :
  - massif facial de face (tiers moyen et inférieur) : Blondeau (nez-menton-plaque), Waters ;
  - mandibule : panoramique dentaire dégageant les condyles (seulement chez un sujet assis), défilés mandibulaires droit et gauche, face basse bouche ouverte, clichés rétroalvéolaires.
- Incidences spécifiques :
  - os propres du nez de profil ;
  - incidence Hirtz : arcade zygomatique ;
  - TDM massif facial coupes axiales et coronales : fractures complexes, fractures orbitaires et base du crâne, doute sur les clichés standards, fracture du condyle.

#### Fracture du tiers latéral de la face

##### Fracture de l'arcade zygomatique

- Choc direct sur l'arcade.
- Limitation douloureuse ouverture et fermeture buccale (incarcération du muscle temporal).
- Ecchymose péri-orbitaire homolatérale, embarras avec point douloureux exquis.
- **RX** : incidence de Hirtz latéralisée sur l'arcade ou incidence du plus grand contour : fracture enfoncement en « W ».
- **Traitement** : réduction chirurgicale par voie endobuccale en transcutanée.

## TRAUMATOLOGIE MAXILLO-FACIALE (2)

### Fracture maxillo-malaire

- Choc direct ou irradiation d'une fracture complexe.

- Ecchymose péri-orbitaire unilatérale, hémorragie sous-conjonctivale externe, épistaxis unilatérale, emphysème sous-cutané palpébral (ouverture du sinus maxillaire), enfoncement de la pommette, ressaut douloureux du rebord orbitaire inférieur, point douloureux exquis à la jonction fronto-malaire, arcade zygomatique et cintre maxillo-malaire (à l'examen endobuccal) avec ecchymose vestibulaire supérieure.

- **Complications :**

- hypoesthésie territoire du nerf sous-orbitaire ;

- fracture du plancher de l'orbite avec énophtalmie et faux-ptosis palpébral supérieur, limitation des mouvements oculaires surtout vers le haut avec possible diplopie par incarceration ou contusion du muscle droit inférieur : faire test de Lancaster.

- **RX :** Blondeau : opacité du sinus maxillaire (hémosinus), traits de fracture et déplacement du malaire en bas, en arrière et en rotation interne.

- **TDM de la face ++ :** surtout en cas de suspicion de fracture du plancher de l'orbite.

- **Traitement :** réduction orthopédique et ostéosynthèse si la réduction est instable. Abord du plancher de l'orbite pour désin-

carcérer des parties molles péri-orbitaires et réfection du plancher.

- **Forme clinique :** fracture « blow-out » du plancher de l'orbite (fracture isolée du plancher de l'orbite sans atteinte du cadre orbitaire survenue par hyperpression sur le plancher lors du coup direct sur le globe oculaire). Urgence chirurgicale en cas de fracture en trappe avec incarceration.

### Fractures du tiers médian de la face

#### Fracture des os propres du nez

- Choc direct sur le nez, craquement, douleur syncopale, épistaxis traumatique (plaie de la muqueuse nasale), obstruction nasale.

- œdème et ecchymose sous-orbitaire bilatérale, plaie muqueuse nasale.

- Douleur exquise sur la pyramide nasale.

- **Complications :**

- hématome sous-périchondral de la cloison nasale (surtout chez l'enfant) à rechercher en rhinoscopie antérieure : risque de nécrose du cartilage la cloison. Drainage en urgence puis méchage fosse nasale ;
- trait de refend vers la base du crâne avec risque de brèche méningée, de troubles de l'olfaction ;

- fracture ouverte.

- **RX :** os propres du nez de profil, Blondeau.

- **Traitement :** réduction sous anesthésie générale puis contention par un plâtre pendant 10 j. Indications : gêne esthétique ou obstruction nasale. Délai : de 3 j à 2 sem. après le traumatisme.



**TRAUMATOLOGIE MAXILLO-FACIALE (3)****Disjonction orbito-naso-ethmoïdo-frontale (DONEF)**

- Choc naso-frontal, épistaxis, obstruction nasale.
- Télécantus (élargissement distance inter-orbitaire), méplat naso-frontal masqué par l'œdème, ecchymose en lunette, hémorragie conjonctivale bilatérale.
- **Complications :**
  - brèche dure-mérienne ethmoïdale avec rhinorrhée claire, pneumocéphalie : risque de méningite, abcès du cerveau ;
  - anosmie (fracture de la lame criblée de l'ethmoïde) ;
  - épistaxis très abondante par rupture des troncs artériels : artériographie avec embolisation en cas d'échec des tamponnements ;
  - complications orbitaires : plaie du globe oculaire (urgence ophtalmologique), plaie des voies lacrymales (larmoiement, explo-

ration par cathétérisme), ophtalmoplégie par compression nerveuse, chute de l'acuité visuelle par section physiologique du nerf optique (décompression en urgence) ;

– embarrure frontale.

- **RX :** TDM de la face et du crâne.
- **Traitement :** réduction et ostéosynthèse par voie externe ± neurochirurgicale.

**Disjonctions horizontales de la face**

- Intérêt de la TDM faciale en coupes axiales et coronales.
- Association fréquente des disjonctions entre elles, complètes ou incomplètes, ou association aux autres fractures de la face.
- **Complications :** idem DONEF pour Lefort II-III.
- **Traitement** chirurgical après bilan complet : réduction et ostéosynthèse par voie externe et endobuccale ± neurochirurgicale.

**CONSENSUS**

[1] Lignes directrices en matière de réanimation cardiorespiratoire et de soins d'urgence cardiovasculaire, AHA, 2010

**LITHIASSE SALIVAIRE - LITHIASSE SOUS-MANDIBULAIRE (1)****Circonstances de découverte****Asymptomatique**

Grande latence, d'où découverte lors d'un examen du plancher de la bouche ou lors d'une radiographie (panoramique dentaire, profil de la mandibule).

**Accidents mécaniques**

Rythmés par les repas, se répétant pendant plusieurs jours : **hernie salivaire** et **colique salivaire**.

**Accidents infectieux**

Succèdent aux accidents mécaniques :

- whartonite (sialodochite du canal de Wharton) ;
- périwhartonite (abcès péricanalaire du plancher buccal, cellulite sus-mylohyoïdienne) ;
- sous-mandibulite.

**Diagnostic positif**

- Aspect de l'ostium du Wharton et de la salive.

- Palpation bidigitale d'un calcul du plancher buccal ou déclenchement d'une douleur exquise.

- Radiographies en incidence occlusale :

- incidence occlusale mordue antérieure : explore les 2/3 antérieurs du canal de Wharton ;

- incidence occlusale mordue postérieure : explore le 1/3 antérieur du canal et la glande ;

- échographie de la glande sous-mandibulaire qui objective l'augmentation de volume de la glande, la dilatation intraparenchymateuse des canaux, et la position du calcul.

- Sialographie au **LIPIODOL** de la glande sous-mandibulaire : si doute diagnostique avec des clichés occlusaux normaux ou pour évaluer le caractère fonctionnel de la glande en cas de manifestations chroniques ou répétées.

- IRM des glandes salivaires ou sialo-IRM qui tend à remplacer la classique sialographie.

## LITHIASSE SALIVAIRE - LITHIASSE SOUS-MANDIBULAIRE (2)

### Traitement

**Traitement médical symptomatique des accidents mécaniques (coliques et hernies salivaires)**

- **Spasmodolytique** pendant la crise non atropinique : **SPASFON** 1 cp. x 3/j.
- **Antalgique** : **paracétamol**, **EFFERALGAN**, 1 à 2 cp. 500 mg x 3/j.
- **Sialologue** (après sédation des douleurs) pendant 10 j : **TEINTURE DE JABORANDI** XX gtt x 3/j pendant les repas ou jus de citron ou **SULFARLEM S 25**, 1 cp. x 3/j.
- Les **corticoïdes** à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/j pendant 3 à 4 j, sous couvert d'une antibiothérapie probabiliste, peuvent faciliter l'expulsion du calcul en diminuant l'inflammation du canal de Wharton.

### Traitement médical des accidents infectieux

- Antibiotique probabiliste (antistreptocoque, staphylocoque et anaérobie), voie orale, pendant 10 j : **pénicilline du groupe A**, **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** 1 g x 2 à 3/j selon l'importance de l'infection.
- **Antalgique** : **paracétamol (EFFERALGAN)** 1 à 2 cp. 500 mg x 3/j.
- **Bains de bouche antiseptique** : **HEX-TRIL**, 6 fois/j.
- Pas d'**anti-inflammatoire**.

### Traitement chirurgical étiologique systématique

Ablation du calcul systématique après des accidents itératifs mécaniques ou infectieux (attendre 6 sem. après guérison de l'épisode inflammatoire).

- Exérèse par voie endobuccale : taille du canal de Wharton sous anesthésie locale. Indications : calcul des 2/3 antérieurs du canal (calcul palpable).

Risques : lésion du nerf lingual (sensibilité langue).

Contrôle radiologique : clichés occlusaux.

- Exérèse par voie externe cutanée : sous-mandibulectomie avec exérèse du canal de Wharton (examen histologique).

Indications : calcul du tiers postérieur du canal de Wharton ou intraparenchymateux (bassinets), sous-mandibulite chronique ou aiguë avec glande non fonctionnelle lors de la sialographie.

Risques : lésion du rameau mentonnier du nerf facial, lésions du nerf lingual, hématome.

## TUMÉFACTION PAROTIDIENNE (1)

La parotide est la plus volumineuse des glandes salivaires. Le canal de Sténon est son canal excréteur ; il débouche dans la joue en regard de la 2<sup>e</sup> molaire supérieure. La glande est traversée par le nerf facial qui se ramifie au sein de la glande et définit un lobe superficiel et un lobe profond.

### Tuméfaction nodulaire de la parotide

- Une parotide normale n'est pas palpable.
- Toute tuméfaction nodulaire de la parotide nécessite son exérèse par parotidectomie pour diagnostic anatomopathologique PAS DE BIOPSIE.
- La tumeur la plus fréquente est une tumeur bénigne, l'adénome pléomorphe, dont le risque évolutif est l'augmentation progressive de volume et la cancérisation.

### Classification des tumeurs

- Tumeurs épithéliales bénignes (80 %) :
- adénome pléomorphe (tumeur mixte) : 80 % ;
  - cystadénolymphome (15 %) ;
  - adénome monomorphe, adénome oxyphile : 5 %.
- Tumeurs malignes (20 %) :
- tumeur à cellules acineuses ;
  - carcinomes :
    - carcinome adénoïde kystique (cylindrome),
    - adénocarcinomes,
    - carcinomes muco-épidermoïdes (bas et haut grade),
    - carcinomes épidermoïdes,
    - carcinome pléomorphe.

Le diagnostic est clinique.

- Les examens d'imagerie de la région parotidienne (échographie, TDM ou IRM) ne sont utiles que dans les formes atypiques à visée préopératoire.

- La cytoponction ne doit pas empêcher la parotidectomie avec analyse histologique.
- Radio de thorax si tumeur maligne.

### Signes cliniques de malignité

- Paralysie faciale périphérique.
- Croissance tumorale rapide (mais le carcinome adénoïde kystique peut croître très lentement).
- Tumeur douloureuse.
- Infiltration, diminution de la mobilité tumorale.
- Adénopathie cervicale métastatique.
- Métastases surtout pulmonaires.

**Seule la parotidectomie avec examen histologique affirmera le diagnostic.**

### Principes du traitement

Le traitement est chirurgical.

- Parotidectomie exploratrice :
  - patient prévenu du risque de paralysie faciale ;
  - sous anesthésie générale ;
  - repérage premier du nerf facial puis dissection complète du nerf dans la glande ;
  - examen histologique extemporané de la parotide et poursuite du traitement selon le résultat.

Il ne faut pas faire d'énucléation de la tumeur, ni de parotidectomie sans repérage du nerf facial et sans examen histologique extemporané.

### Complications

- Paralysie faciale périphérique.
- Syndrome de Frey : hypersudation, rougeur et chaleur cutanée lors de stimulations gustatives apparaissant 4 à 6 mois après l'intervention.
- Esthétiques : dépression rétromandibulaire.

## TUMÉFACTION PAROTIDIENNE (2)

### Formes anatomocliniques

#### ► Tumeurs bénignes (80 %)

- Adénome pléomorphe (tumeur mixte) :  
– 80 % des tumeurs parotidiennes ; se voit à tout âge ;  
– composante épithéliale et mésenchymateuse ;  
– module régulier, ferme, mobile, d'évolution lente (pouvant évoluer par poussées), non douloureux, sans paralysie faciale, le plus souvent asymptomatique.

- Parotidectomie totale (superficielle et profonde) conservatrice du nerf facial.

#### Deux risques évolutifs :

- récidive : risque de paralysie faciale ++ ;
- dégénérescence maligne (3-5 %) : en cas de tumeur évoluant depuis de nombreuses années et en cas de récidive.

- **Cystadénolymphome (tumeur de Warthin)** (10 %).

- Homme, 60 ans. Tumeur molle à la partie inférieure du lobe superficiel. Elle évolue lentement et par poussées inflammatoires.
- Elle ne récidive pas et ne se cancérisse pas.
- Conduite à tenir : parotidectomie superficielle (en cas de tumeur superficielle) conservatrice du nerf facial.

#### ► Tumeurs malignes (20 %)

Elles nécessitent une parotidectomie totale non conservatrice du nerf facial si la tumeur est au contact du nerf. Un curage ganglionnaire cervical est systématique en cas de carcinome et de tumeur muco-épidermoïde de haut grade et en cas de ganglions cervicaux.

La radiothérapie externe est peu efficace. Le pronostic est médiocre.

### Parotidite aiguë

#### Parotidite aiguë suppurée

- Glande rapidement douloureuse et oedématisée, repoussant l'oreille en arrière. La peau peut être inflammatoire en regard. Une fluctuation de la glande signe la collection. Orifice du Sténon inflammatoire, salive purulente. Trismus et fièvre élevée.
- Facteurs de risque :  
– diminution sécrétion salivaire (déshydratation, arrêt de l'alimentation orale,

hyposalie médicamenteuse [**atropinique, antipsychotique**] ;

- âges extrêmes (nourrisson, sujet âgé) ;
- mauvais état dentaire ;
- suite d'intervention surtout digestive sans antibioprophylaxie ;
- immunodépression.

– Antibiothérapie (anti-bacilles Gram- et anti-staphylocoques, adapté secondairement au germe) : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 1 g x 3/j pendant 3 sem. par voie orale sauf en cas de forme sévère.

– **Sialogues** : **SULFARLEM S 25**, 1 cp. x 2/j pendant 1 mois.

– **Antalgiques.**

– **Bains de bouche** : **BÉTADINE** (gargarisme) : 4 fois/j.

– Traitement des facteurs de risque.

– Drainage chirurgical en cas d'abcédation.

### Parotidite ourlienne

#### Parotidite chronique

#### Lithiase parotidienne

#### Parotidite chronique spécifique

Tuberculose, maladie des griffes du chat, syphilis, actinomycose.

#### Hypertrophie parotidienne diffuse

##### ► Sialadénose

Hypertrophie parotidienne d'origine :

- médicamenteuse : surtout les **antipsychotiques** ;
- hormonale : ménopause, diabète, hypothyroïdie ;
- métabolique : malnutrition, gros mangeurs de pain, cirrhose.

► **Lésions lympho-épithéliales bénignes, syndrome de Gougerot-Sjögren**

- Parotidomégalie auto-immune : connectivite ou sida.

- Association avec une atteinte des glandes lacrymales : syndrome de Gougerot-Sjögren.

##### ► **Sarcoïdose**

Syndrome de Heerford : parotidomégalie + paralysie faciale périphérique + uvéite + fièvre.

##### ► **Hémopathies malignes**

## ANTIVERTIGINEUX (1)

## ■ Acétyl-leucine

<b>TANGANIL</b>					
1-2 cp. x 2-4/j pendant 10 j à 6 sem.	30 cp. 500 mg 60 cp. 500 mg	4,80 HOP		30 %	0,16
IV 1 amp. x 2-4/j inj. IV lente pendant la crise	5 amp. 5 mL = 500 mg	3,14		30 %	0,63

**PROPRIÉTÉS**

Antivertigineux : mécanisme d'action inconnu.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## ■ Bétahistine

<b>EXTOVYL</b>					
1 gél. x 2-3/j au cours des repas	60 gél. LP 12 mg	5,70	I	30 %	0,10
<b>LECTIL</b>					
1/2 à 1 cp. x 3/j au cours des repas	45 cp. séc. 16 mg	6,98	I	30 %	0,16
1 cp. x 2-3/j au cours des repas	60 cp. 24 mg	8,73	I	30 %	0,15
<b>SERC</b>					
1-2 cp. x 3/j au cours des repas pendant au moins 1 mois puis cures discontinues	90 cp. 8 mg	8,28	I	30 %	0,09

**PROPRIÉTÉS**

Analogue de l'histamine : diminution de la pression endolymphatique par vasodilatation des capillaires de la cochlée.

**CONTRE-INDICATIONS**Ulçère gastroduodénal évolutif.  
Phéochromocytome.**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI****Grossesse et allaitement** : déconseillé.  
Surveillance chez l'asthmatique.**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges d'origine vestibulaire.

Traitement de fond de la maladie de Ménière (acouphènes, vertiges).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Gastralgies.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES****Antihistaminique** (antagoniste).

## VERTIGES D'ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE (2)

### Étiologies

#### Vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB)

Il représente 50 % des vertiges, surtout chez le sujet âgé ; cupulolithiases du canal semi-circulaire postérieur (CSP).

**Vertige positionnel isolé** : vertige bref (< 1 min), déclenché par un mouvement circulaire de la tête dans le plan du CSP. Reproduit par la manœuvre de Dix-Hallpike (le patient assis, jambes pendantes, est penché rapidement du côté droit, la tête reste dirigée vers celle de l'examineur : déclenchement du VPPB sinon la manœuvre est réalisée à gauche).

#### Traitement

Rassurer le patient sur le caractère bénin du vertige, faire une manœuvre libératrice de Semont-Toupet (manœuvre de Hallpike pendant 4 min puis brusquement mettre le patient en décubitus latéral du côté opposé pendant 4 min). Prévenir du risque de récurrence.

### Maladie de Ménière

- **Hydrops endolabyrinthique** : hyperpression des liquides de l'oreille interne (endolymphe), d'étiologie inconnue, débutant entre 30 et 50 ans, souvent favorisée par un stress psychologique.

- **Crise** de quelques minutes à quelques heures : triade associant acouphènes unilatéraux graves, vertige majeur avec signes végétatifs et surdité unilatérale (parfois sensation de plénitude de l'oreille).

- **Examen** : tympans normaux, nystagmus horizontal-rotatoire de direction variable, hypoacousie de perception, examen neurologique normal.

- **Bilan** :

- **audiogramme** : surdité de perception endocochléaire prédominant sur les

graves et s'améliorant lors du test osmotique ;

- **épreuves vestibulaires** : hyporéflexie homolatérale ;

- **PEA** : pas de signe rétrocochléaire.

- **Évolution** : elle se fait par crises plus ou moins espacées ; puis persistance des acouphènes, aggravation de la surdité et diminution des vertiges avec possible bilatéralisation.

#### Traitement : selon les symptômes, traitement ambulatoire ou hospitalier

- Traitement de la crise

- Repos au lit, dans la pénombre et le calme, et si nécessaire hospitalisation.

- **Sédatif** : **benzodiazépine**, **diazépam (VALIUM ROCHE)**, 1 à 2 amp. 10 mg x 1-3/j en IM ou *per os* 1 cp. x 3/j.

- **Antivertigineux** : **acétyl-leucine (TANGANIL)**, 1 amp. 500 mg x 1-4/j en IVL ou *per os* 1 cp. x 3/j.

- **Antémétique** : **métoclopramide (PRIM-PERAN)**, 1 amp. 10 mg x 1-3/j en IVL ou *per os* 1 cp. x 3/j si nausées.

- **Agent osmotique** : **MANNITOL 10 %**, 500 mL x 2/j en IVL de 2 h.

- Traitement de fond

- Prise en charge psychologique : explication de la maladie, soutien psychologique, pas d'excès d'excitant (tabac, alcool), hygiène de vie, **anxiolytique** : **benzodiazépine**, **bromazépam (LEXOMIL)**, 1/4-1/4-1/2 cp./j.

- **Antivertigineux** : **béthahistine (SERC)**, 1 cp. x 3/j pendant plusieurs mois.

- En cas d'échec : **diurétique thiazidique** à faibles doses : **hydrochlorothiazide (ESIDREX)**, 1 cp. 25 mg/j avec régime peu salé. Dans les formes sévères, invalidantes et résistantes :

- **labyrinthectomie chimique par aminoside**,

- **chirurgie de décompression du sac endolymphatique**,

- **voire neurectomie vestibulaire, labyrinthectomie**.

## ANTIVERTIGINEUX (2)

## ■ Flunarizine

**SIBÉLIUM**

1 cp. le soir au coucher pendant 1 mois	30 cp. séc. 10 mg	9,20	I	15 %	0,31
---	-------------------	------	---	------	------

**PROPRIÉTÉS**

Vestibulodépression.

Diminution du spasme vasculaire des artères cérébrales et augmentation de la déformabilité des globules rouges.

Antihistaminique anti-H<sub>1</sub>.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges d'origine vestibulaire.

Traitement de fond de la migraine (en 2<sup>e</sup> intention).

**CONTRE-INDICATIONS**

Maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux.

Antécédents dépressifs.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

Somnolence : diminution de la vigilance (conducteurs de machines).

Déconseillé chez les sujets âgés (révélation de syndromes extrapyramidaux).

Durée traitement < 2 mois.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sédation.

Rarement : asthénie, insomnie, syndrome extrapyramidal, dépression.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Sédation : alcool, dépresseurs du SNC.

Atropiniques.

**Gestrogènes** : galactorrhée.



## VERTIGES D'ORIGINE PÉRIPHÉRIQUE (3)

### Labyrinthites

- Destruction des cellules sensorielles (vestibulaires et cochléaires).
- Étiologies : infectieuse (otite chronique le plus souvent cholestéatomateuse, parfois virale), toxique (médicamenteuse surtout les **aminosides**), traumatique (fracture du rocher, barotraumatisme, chirurgie de l'oreille).
- Syndrome vestibulaire périphérique + surdité de perception endocochléaire irréversible.

### Névrite vestibulaire

- Syndrome vestibulaire périphérique complet et harmonieux, brutal et prolongé, sans signe auditif (pas de surdité, pas d'acouphène), sans signe neurologique. Parfois précédé d'un épisode grippal.
- Épreuves vestibulaires : hypo- ou aréflexie.

### Traitement

- Traitement de la crise
  - Repos au lit, dans la pénombre et le calme.
  - Sédatif : **benzodiazépine, diazépam (VALIUM ROCHE)**, 1 à 2 amp. 10 mg x 1-3/j en IM.
  - **Antivertigineux : acétyl-leucine (TANGANIL)**, 1 amp. 500 mg x 1-4/j en IVL.
  - **Antémétique : métoclopramide (PRIM-PÉRAN)**, 1 amp. 10 mg x 1-3/j en IVL.
- Traitement antiviral (pour certains) : **aciclovir (ZOVIRAX)** 5 mg/kg/8 h puis relais *per os*, 10 j.
- Rééducation vestibulaire
  - Dès la diminution des vertiges, pour favoriser la compensation.
  - Lever du lit.
  - Arrêt des sédatifs.
  - Rééducation active (surtout chez le sujet âgé) par kinésithérapeute spécialisé.

### Neurinome de l'acoustique

- Schwannome du nerf vestibulaire.
- Vertiges peu intenses et peu fréquents car destruction progressive donc compensation centrale simultanée. Surtout surdité de perception endocochléaire.
- Diagnostic : PEA puis IRM.
- Traitement : exérèse chirurgicale, radiothérapie.

### Vertiges d'allure périphérique : étiologies

	VERTIGES BREFS	VERTIGES PROLONGÉS
Sans signe auditif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertige paroxystique positionnel bénin</li> <li>– Hypotension orthostatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Névrite vestibulaire</li> </ul>
Avec signes auditifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hypotension orthostatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maladie de Ménière</li> <li>– Labyrinthite (infectieuse, traumatique, toxique)</li> </ul>
Neurinome de l'acoustique : peut donner tous les cas de figure		

## ANTIVERTIGINEUX (3)

## ■ Méclozine

AGYRAX					
1 à 3 cp./j avant les repas	15 cp. séc. 25 mg	2,70	I	30 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Antihistaminique anti-H<sub>1</sub>, antivertigineux.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des vertiges.

**CONTRE-INDICATIONS**

Glaucome à angle fermé.  
Obstacle cervico-prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : 1<sup>er</sup> trim.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Anticholinergique : sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, rétention d'urine, confusion.

Somnolence : troubles de la vigilance (conducteurs de machines).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Dépresseur du SNC, alcool.  
Atropiniques.

## GOUTTES AURICULAIRES (ANESTHÉSQUES LOCAUX)

## ■ Lidocaïne + phénazone

OTIPAX					
Bain d'oreille 2-3/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	15 mL	2,65		15 %	0,18

## ■ Procaïne + tétracaïne + phénol + éphédrine

OTYLOL					
Bain d'oreille 2-3/j pendant 5-7 j A. : 4-5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL	1,88		15 %	0,19

## PROPRIÉTÉS

Anesthésiques locaux : **lidocaïne**, **procaïne**, **tétracaïne**.

Antiseptiques : **phénazone**, **phénol**.

Vasoconstricteur alphasimétrique : **éphédrine**.

## INDICATIONS

Traitement antalgique des otites moyennes aiguës congestives et des myringites en complément de l'antibiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique ++++.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Réchauffer avant utilisation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : risque de surdité de perception endocochléaire irréversible et de vertiges.

Effets systémiques en cas de passage du produit par la trompe auditive.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## GOUTTES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES NON OTOTOXIQUES

## ■ Rifamycine

OTOFA					
Bain d'oreille de 10 min x 2/j ou instillations locales : A. : 5 gttes x 3/j E. : 3 gttes x 3/j pendant 7-10 j	10 mL (fl. compte-gttes)	3,59	I	65 %	0,36

## ■ Ofloxacine

OFLOCET					
Solution auriculaire Bain d'oreille 10 min 1 dose x 2/j pendant 7-10 j	20 doses 0,5 mL (1,5 mg)	5,35	I	30 %	0,27

## PROPRIÉTÉS

Antibiotiques (**fluoroquinolone** et **rifamycine**) actifs en application locale sur les bactéries Gram+ et Gram- des otites externes et moyennes aiguës et chroniques. Utilisation possible en cas de perforation tympanique (non ototoxique).

## INDICATIONS

Otite externe avec tympan ou perforé.  
Otorrhée sur otite chronique, sur aérateur trans-tympanique et sur cavité d'évidement.

## CONTRE-INDICATIONS

Allergie à la **rifamycine** ou aux sulfites (exci-pient).

Allergie à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Coloration des tissus (surveillance difficile) et salissant (**rifampicine**).

Durée du traitement < 10 j.

## GOUTTES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES ET ANTIFONGIQUES

## ■ Polymyxine B + oxytétracycline + dexaméthasone + nystatine

AURICULARUM					
Poudrage : 1 insufflation tous 2-3 j Plombage (par l'ORL) : microaspiration à J15 Suspension : 1 bain d'oreille/j pendant 5-7 j renouvelable		1 fl. pdre + solv amp. de 10 mL	6,59	I	30 % 6,59

## PROPRIÉTÉS

Antibiotique : polypeptide (**polymyxine**), **tétracycline (oxytétracycline)** : synergiques et actifs sur *Haemophilus influenzae*, *E. coli*, staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa* mais résistance des streptocoques notamment pneumocoque.

Anti-inflammatoire : corticoïde (**dexaméthasone**).

Antifongique (**nystatine**) actif sur les champignons levuriformes et filamenteux (*Candida*, *Aspergillus*, etc.).

## INDICATIONS

Otite externe mycosique.

Suppuration sur cavité d'évidement d'oreille.

## CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique sèche (sans otorrhée).

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Corticoïdes : infection locale virale (zona, herpès).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Surveillance par un spécialiste ORL pour pratiquer une microaspiration de l'oreille en fin de traitement et éviter l'accumulation de la poudre.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : risque de surdité de perception endocochléaire irréversible et de vertiges.

Sélection de germes résistants.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Accumulation de la poudre dans le CAE.

## MODE D'ADMINISTRATION

Poudrage : 1 insufflation de poudre/2-3 j.

Plombage (par le spécialiste ORL) : à nettoyer par microaspiration 15 j plus tard.

Suspension (1 fl. de poudre dans 10 mL **chlorure de sodium** 0,9 %) : 1 bain d'oreille x 1/j pendant 5-7 j.

## GOUTTES ET POMMADES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES OTOTOXIQUES (1)

### Pommade auriculaire

#### ■ Chlortétracycline

<b>AURÉOMYCINE MONOT</b>					
2-3 appl./j pendant 5-7 j	15 g (tube) à 3 %		I	NR	

### Antibiotiques + corticoïdes

#### ■ Néomycine + polymyxine B + fluocinolone

<b>ANTIBIO SYNALAR</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL	2,79	I	30 %	0,28

#### ■ Néomycine + polymyxine B + dexaméthasone

<b>POLYDEXA</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	10 mL (fl. compte-gttes)	2,60	I	30 %	0,26

### Antibiotique + corticoïde + anesthésique local

#### ■ Néomycine + polymyxine B + fludrocortisone + lidocaïne

<b>PANOTILE</b>					
Bain d'oreille x 2/j pendant 5-7 j A. : 5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	8 mL (250 gttes)	2,52	I	30 %	0,32

## GOUTTES ET POMMADES AURICULAIRES ANTIBIOTIQUES OTOTOXIQUES (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Antibiotiques : aminoside (**néomycine**), polypeptide (**polymyxine B**), tétracycline (**chlortétracycline**) : actifs sur *Haemophilus influenzae*, *E. coli*, staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*, mais résistance des streptocoques notamment pneumocoque.

Anti-inflammatoire : corticoïdes (**fluocinolone acétonide, dexaméthasone, fludrocortisone**).

Anesthésique local : **lidocaïne**.

### INDICATIONS

Otitis externes à tympan fermé notamment eczéma du conduit auditif externe (**corticoïde**).  
Pour certains, otites moyennes aiguës congestives (**anesthésiques locaux**) à visée antalgique et en complément de l'antibiothérapie par voie générale.

### CONTRE-INDICATIONS

Perforation tympanique ++++.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Corticoïdes : infection locale virale (zona, herpès) ou fongique.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

Durée du traitement toujours < 7 j.

Ne pas instiller sous pression dans le conduit auditif externe mais possibilité d'utiliser un méchage du conduit type *Pop-Oto-Wick*.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : surdité de perception endocochléaire irréversible et vertiges.

Sélection de germes résistants.

**GOUTTES AURICULAIRES (CÉRUMINOLYTIQUES)**■ **Xylène**

<b>CÉRULYSE</b>				
Bain d'oreille x 3/j pendant 3 j A. : 4-5 gttes/bain, E. : 1-3 gttes/bain	1 fl. 10 mL sol. à 5 %		NR	

**PROPRIÉTÉS**

Céruminolytique.

**INDICATIONS**

Bouchons de cérumen simples ou épidermiques du conduit auditif externe.

**CONTRE-INDICATIONS**

Perforation tympanique ++++.

Hypersensibilité à l'un des constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Vérifier l'état du tympan avant traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ototoxicité (en cas d'ouverture tympanique) : risque de surdité de perception endocochléaire irréversible et de vertiges.



## HÉMOSTATIQUES NASAUX

## ■ Goménol

<b>HUILE GOMENOLÉE</b>					
Sol. nasale enfant à 2 % E. > 6 ans : 2-4 gttes x 3/j	22 mL 2 % (fl.)		I	NR	
Sol. nasale adulte à 5 % A. : 2-4 gttes x 3/j	22 mL 5 % (fl.)		I	NR	
<b>VASELINE GOMENOLÉE</b>					
Pom. 5 % A. et E. > 6 ans : 1 appl./j	1 tube (15 g) 5 %		I	NR	
<b>GOMENOLEO</b>					
1 ampoule par narine	10 amp. (5 mL) 2 % 10 amp. (5 mL) 5 %		I I	NR NR	

## ■ Phénazone + tanin + hamamélis

<b>HEC</b>					
1 appl. muqueuse nasale x 2/j pendant 7 j	1 tube 25 g			NR	

## ■ Acide borique

<b>HOMÉOPLASMINE</b>					
A. et E. > 3 ans : 1 appl. muqueuse nasale x 2/j pendant 7 j	1 tube 18 g 1 tube 40 g		I I	NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique, prévention des croûtes nasales.

**HEC** : hémostatique.**HOMÉOPLASMINE** : visée trophique sur la muqueuse nasale.**INDICATIONS**

Après épistaxis, méchage nasal et chirurgie endonasale.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Courte durée de traitement : &lt; 7 j.

## SOLUTIONS DE LAVAGE NASAL

## ■ Sérum physiologique pour lavage nasal

<b>PHYSIODOSE</b>					
1 à 6 instillations/j/narine	15 unidoses 5 mL 30 unidoses 5 mL 45 unidoses 5 mL			NR NR NR	

## ■ Eau de mer stérile hypertonique

<b>PHYSIODOSE HYPERTONIQUE</b>					
2 pulv. x 2/j/narine	100 mL (fl. pulv.)			NR	

## ■ Eau stérile isotonique + soufre

<b>SOLUTÉ PRÉ</b>					
1 à 6 pulv./j/narine	100 mL (4 fl. pulv.) 10 amp. 10 mL			NR NR	

## ■ Eau de mer stérile isotonique

<b>QUINTON spray</b>					
1 à 4 pulv./j/narine	150 mL (fl.)			NR	
<b>STÉRIMAR</b>					
1 à 4 pulv./j/narine	50 mL (fl.) 100 mL (fl.)			NR NR	

**PROPRIÉTÉS**

Lavage des fosses nasales.

**INDICATIONS**

Rhinites et sinusites aiguës et chroniques.  
Nettoyage des fosses nasales chez le nour-

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Instillation nasale sans pression pour éviter la contamination de l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache.

Pas de mouchage pendant 10 min après instillation mais éponger (ou mouche-bébé chez le nourrisson).

Utilisation dans les 24 h après ouverture.  
Ne pas utiliser par voie injectable.

**POSOLOGIE**

1 à 3 instillations/j de 1/2 dose dans chaque fosse nasale jusqu'à disparition de la rhinorrhée.

## ANTIALLERGIQUES PAR VOIE NASALE (1)

### Corticoïdes par voie nasale

#### ■ Béclométasone

<b>BÉCONASE</b>					
Suspension nasale A. : 1-2 pulv. x 3-4/j/narine E. > 3 ans : 1 pulv. x 2-4/j/narine	200 pulv. 50 µg	7,40	I	30 %	0,04
<b>RINOCLENIL</b>					
Suspension nasale 100 µg/dose A. : 1 pulv. x 1-2/j/narine E > 3 ans : 1-2 pulv. x 1-2/j/narine	1 fl. 120 doses	8,19	I	30 %	8,19

#### ■ Triamcinolone

<b>NASACORT</b>					
A. : 2 pulv. le matin puis 1 pulv./j E. > 6 ans : 1 pulv. le matin < 3 mois	120 pulv. 55 µg	9,64	I	30 %	0,08

#### ■ Tixocortol

<b>PIVALONE</b>					
Suspension nasale 1 % 1-2 pulv. x 2-4/j/narine	100 pulv. 1 mg	3,59	II	30 %	0,04

#### ■ Budésonide

<b>RHINOCORT</b>					
A. et E. > 6 ans : 1 à 2 pulv. x 2/narine/j	120 pulv. 64 µg	9,54	I	30 %	0,08

## ANTIALLERGIQUES PAR VOIE NASALE (2)

## ■ Fluticasone

<b>FLIXONASE</b>					
2 pulv./narine/j le matin, puis 1 pulv./narine/j	120 pulv. 50 µg	8,73	I	30 %	0,07
<b>AVAMYS</b>					
A. : 2 pulv./narine/j en 1 fois E. > 6 ans : 1 pulv./narine/j	120 pulv. 27,5 µg	8,73	I	30 %	0,07
<b>FIXORINOX</b>					
Idem <b>FLIXONASE</b>	120 pulv. 50 µg	6,68	I	30 %	0,06

## ■ Mométasone fuorate

<b>NASONEX</b>					
A. et E. > 3 ans : 2 pulv./narine/j le matin, puis 1 pulv./narine/j	120 pulv. 50 µg	9,64	I	30 %	0,08

**PROPRIÉTÉS**

Corticostéroïdes d'action locale antiallergique et anti-inflammatoire sans effet glucocorticoïde systémique.

**INDICATIONS**

Rhinites vasomotrices d'origine allergique.  
Sinusites chroniques allergiques et polyposse nasosinusienne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Enfant d'âge < 3 ans (**NASONEX**) et < 6 ans pour les autres **corticoïdes par voie nasale**.  
Hypersensibilité à l'un des constituants.

Épistaxis, infection locale ou bronchopulmonaire virale, bactérienne ou fongique importante et non traitée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Instillations après lavage du nez ou mouchage. Association avec antibiothérapie par voie générale en cas d'infection bactérienne sévère. Traitement prolongé (observance thérapeutique) à dose minimale efficace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Intolérance locale : picotements, éternuements, assèchement de la muqueuse nasale.  
Allergie : œdème cutanéomuqueux facial.

## ANTIALLERGIQUES PAR VOIE NASALE (3)

### Antihistaminique H1 par voie nasale

#### ■ Céthexonium + phényltoloxamine

<b>BIOCIDAN</b>					
Sol. nasale 1-6 pulv./j/narine	15 mL (fl. pulv.)		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antiseptique ammonium quaternaire : **céthexonium**.

Antihistaminique H<sub>1</sub> : **phényltoloxamine**.

#### INDICATIONS

Rhinites chroniques vasomotrices allergiques.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Somnolence : vigilance.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Effets atropiniques.

### Inhibiteur de la dégranulation des mastocytes de la muqueuse nasale

#### ■ Cromoglycate disodique

<b>LOMUSOL</b>					
1 pulv. x 2-4/j/narine	100 pulv. (fl. 15 mL à 4 %)	6,75	II	15 %	0,07

#### PROPRIÉTÉS

Inhibition de la libération des médiateurs chimiques de l'inflammation par les mastocytes de la muqueuse nasale.

#### INDICATIONS

Rhinites et sinusites chroniques d'origine allergique.

#### CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : déconseillé pendant le 1<sup>er</sup> trim.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Irritation locale transitoire.

## ANTISEPTIQUES SOUFRÉS

### ■ Sulfure de sodium + levure

<b>ACTISOUFRE</b>					
1 amp./narine x 2/j pdt 1-3 mois 1/2-2 amp./j bain de bouche pdt 1-3 mois 1 pulv. x 3/j <i>per os</i> ou /narine	18 amp. 10 mL			NR	
	30 amp. 10 mL			NR	
	1 fl. press. 100 mL			NR	

### ■ Thiosulfate sodium + magnésium

<b>DÉSINTEX</b>					
1 amp. à boire avant repas x 2/j 1 cp. x 2/j au cours des repas	14 amp. 5 mL			NR	
	60 cp.			NR	

### ■ Soufre + rétinol

<b>SOLACY</b>					
Forme adulte 1 gél. x 3/j pdt 15 j Forme pédiatrique 6 mois-30 mois : 1 cp./j pdt 3 mois 30 mois-5 ans : 2 cp./j pdt 3 mois > 5 ans : 3 cp./j pdt 3 mois	45 gél.			NR	
	90 gél.			NR	
	60 cp. pour susp. buv.			NR	

#### PROPRIÉTÉS

Action trophique et antiseptique sur la muqueuse respiratoire.

#### INDICATIONS

Rhinites et pharyngites aiguës et chroniques.

#### CONTRE-INDICATIONS

Intolérance au soufre.  
Régime hyposodé (pour **ACTISOUFRE**).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Gastralgies.

## DÉCONGESTIONNANTS NASAUX EN INHALATIONS

## ■ Huiles essentielles

<b>AROMASOL</b>					
Sol. inh. et aérosol A. et E. > 12 ans : 1 pulv. x 3/j, inhalation : 50 gttes à diluer dans l'eau tiède x 3/j	45 mL			NR	

## ■ Eucalyptol + thym + terpinéol + pin + romarin

<b>CALYPTOL INHALANT</b>					
1 amp. dans un bol d'eau chaude x 2-3/j pdt 5-7 j	10 amp. 5 mL			NR	

## ■ Eucalyptol + menthol + gaïacol

<b>ESSENCE ALGÉRIENNE</b>					
A. et E. > 12 ans : qq gttes dans un verre d'eau chaude x 3-4/j pdt 5-7 j	20 mL			NR	

## ■ Goménol

<b>GOMENOL liquide pour inhalation</b>					
Qq gttes dans un bol d'eau chaude x 3-4/j pdt 5-7 j	50 mL (tube)			NR	

## ■ Lavande + thymol + thym + romarin

<b>PÉRUBORE inhalation</b>					
A. et E. > 12 ans : 1 caps. dans un bol d'eau chaude x 3/j pdt 5 j max	15 caps.			NR	

## ■ Camphre + menthol

<b>VICKS INHALER</b>					
A. et E. > 12 ans : 1 inhalation x 3/j	100 mL (tube)			NR	

## PROPRIÉTÉS

Décongestionnant et antiseptique des voies aériennes supérieures.

## INDICATIONS

Inflammations aiguës rhinopharyngées.

## CONTRE-INDICATIONS

Enfant d'âge < 3 ans.  
Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Convulsions de l'enfant.

## MODE D'ADMINISTRATION

Inhalations répétées 3-4 fois/j.  
La dose prescrite dans un bol d'eau chaude mais non bouillante, à inhaler sous un torchon ou avec un masque à inhalation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Irritation locale.  
Convulsion chez l'enfant.

## DÉCONGESTIONNANTS NASAUX PAR VOIE ORALE (1)

### Vasoconstricteur nasal + antihistaminiques H<sub>1</sub>

#### ■ Pholcodine + chlorphénamine + biclotymol

<b>HEXAPNEUMINE</b>					
A. : 1-6 c-mes./j	13 c-mes. (sirop)		I	NR	
E. : en fonction du poids	40 c-mes. (sirop)		I	NR	
- 30-50 kg : 1-6 c-mes./j					
- 15-30 kg : 1/2 -3 c-mes./j					

### Vasoconstricteur + AINS

#### ■ Pseudoéphédrine + ibuprofène

<b>RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE</b>					
A. et E. > 15 ans :	20 cp. 30 mg		I	NR	
1 cp. x 2/j pdt 5 j	(ibuprofène 200 mg)				

### Antihistaminique H<sub>1</sub> + antipyrétique, antalgique

#### ■ Phéniramine + paracétamol + acide ascorbique

<b>FERVEX</b>					
A. et E. > 15 ans : 1 sach. x 2-3/j	8 sach. 25 mg		I	NR	
	(paracétamol : 500 mg)				
<b>FERVEX</b> sans sucre	8 sach. 25 mg		I	NR	
A. et E. > 15 ans : 1 sach. x 2-3/j	(paracétamol : 500 mg)				
<b>FERVEX ENFANT</b>					
E. 6-10 ans : 1 sach. x 2/j	8 sach. 10 mg		I	NR	
E. 10-12 ans : 1 sach. x 3/j	(paracétamol : 280 mg)				
E. 12-15 ans : 1 sach. x 4/j					

### Vasoconstricteur + antipyrétique + antihistaminique H<sub>1</sub>

#### ■ Pseudoéphédrine + paracétamol + diphenhydramine

<b>ACTIFED JOUR et NUIT</b>					
A., E. > 15 ans : 1 cp. blanc jusqu'à x 3/j (4 h d'intervalle, 8 si insuffisance rénale sévère), 1 cp. bleu le soir au coucher si nécessaire 4 j max.	16 cp. (paracétamol 500 mg)		I	NR	

#### ■ Pseudoéphédrine + paracétamol + triprolidine

<b>ACTIFED RHUME</b>					
1 cp. jusqu'à x 3/j (6 h d'intervalle min.)	15 cp. séc. 50 mg (paracétamol 500 mg)		I	NR	



## DÉCONGESTIONNANTS NASAUX PAR VOIE ORALE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

- Alpha-sympathomimétique (**pseudoéphédrine**) : vasoconstricteur des muqueuses rhinopharyngées et tubaires diminuant la rhinorrhée et l'obstruction nasale.
- Antihistaminique anti-H<sub>1</sub> (**phéniramine**) : antiallergique.
- Antalgique-antipyrétique (**paracétamol, ibuprofène**).
- Antiseptique (**biclotymol**).

### INDICATIONS

Traitement symptomatique des rhinites et sinusites aiguës infectieuses et des poussées aiguës de rhinites chroniques vasomotrices allergiques ou non allergiques.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants, association aux **IMAO non sélectifs**.

Pour les **anti-H<sub>1</sub>** : glaucome à angle fermé, risque de rétention aiguë d'urine par obstacle cervico-prostatique.

Pour le **paracétamol** : insuffisance hépatocellulaire.

Pour l'**ibuprofène** : **grossesse** et **allaitement**, ulcère gastroduodénal en évolution, insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatocellulaire sévère.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Déconseillé en cas de : **grossesse** (1<sup>er</sup> trimestre), **allaitement**, angor, HTA, hyperthyroïdie, troubles psychiques, épilepsie, antécédent de convulsion fébrile, obstacle cervico-prostatique.

Pour les anti-H<sub>1</sub> : troubles de la vigilance.

Pour **paracétamol, ibuprofène** : cf. Analgésie. Traitement de courte durée < 7 j.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Sécheresse de bouche, insomnie, anxiété, céphalées, sueurs, troubles digestifs.

Arrêt en cas de : tachycardie, palpitations, troubles du rythme, angor, excitation.

Pour les anti-H<sub>1</sub> : somnolence, réaction paradoxale d'excitation, effets anticholinergiques.

Pour **paracétamol** et **ibuprofène** : se référer au chapitre Rhumatologie.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **IMAO non sélectifs** (crise HTA).

Associations déconseillées : **anesthésiques volatils halogénés, bromocriptine, guanéthidine, réserpinique, digitaliques**.

Pour les **anti-H<sub>1</sub>** : autres **anticholinergiques**, alcool, dépresseurs du SNC.

## DÉCONGESTIONNANTS NASAUX EN PULVÉRISATIONS NATALES (1)

## Vasoconstricteur simple

## ■ Oxymétazoline

<b>ATURGYL</b>					
1 pulv. x 3/j/narine pdt 5-7 j	15 mL fl. pulv.	2,15	II	15 %	0,14

## Vasoconstricteurs + antiseptiques

## ■ Phényléphrine + benzalkonium

<b>HUMOXAL</b>					
A. : 1-2 pulv. 2-5/j/narine pdt 5-7 j E. > 12 ans : 1 pulv. 2-4/j/narine pdt 5-7 j	15 mL fl. nébulisateur		II	NR	

## ■ Éphédrine + acide benzoïque

<b>RHINAMIDE</b>					
A. : 2 pulv. 2-5/j/narine pdt 5-7 j E. > 3 ans : 2 pulv. x 1-2/j/narine pdt 5-7 j	20 mL fl. nébulisateur		II	NR	

## ■ Éphédrine + thiosulfate de sodium

<b>RHINO-SULFURYL</b>					
A. et E. > 30 mois : 1 pulv. 3-5/j/narine pdt 5-7 j	24 mL fl. pulv.		II	NR	

## Vasoconstricteurs + corticoïde

## ■ Naphazoline + prednisolone

<b>DÉRINOX</b>					
1 pulv. x 3/j/narine pdt 5-7 j Aérosol de 5 mL : x 1/j/narine pdt 5-7 j	15 mL fl. pulv.		II	NR	

## ■ Oxymétazoline + prednisolone

<b>DÉTURGYLONE</b>					
A. et E. > 7 ans : 1 pulv. x 3/j/narine pdt 5-7 j	10 mL fl. pulv.		I	NR	

## Vasoconstricteur + antiseptique + mucolytique

## ■ Tuaminoheptane + benzalkonium + N-acétyl cystéine

<b>RHINOFLUIMUCIL</b>					
A. : 2 pulv. x 3-4/j/narine pdt 5-7 j E. > 3 ans : 1 pulv. x 1-2/j/narine pdt 5-7 j	10 mL fl. pulv.		II	NR	

**DÉCONGESTIONNANTS Nasaux EN PULVÉRISATIONS NasaLES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Vasoconstricteur  $\alpha$ -sympathomimétique de la muqueuse nasale : **éphédrine, oxymétazoline, naphazoline, tuaminoheptane**.

Antiseptique : **thiosulfate de sodium, cétrimide, benzalkonium**.

Corticoïde antiallergique : **prednisolone**.

Mucolytique : **acétylcystéine**.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique par voie locale de l'obstruction nasale au cours des affections rhinopharyngées aiguës (rhinites, sinusites, rhinopharyngites) ou des poussées aiguës de rhinites vasomotrices allergiques (intérêt de l'association de corticoïdes) ou non allergiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants (en particulier les **aminosides**).

Association aux **IMAO non sélectifs**.

Glaucome par fermeture de l'angle.

Enfant < 3 ans (pour **éphédrine** et **tuaminoheptane**), enfant < 7 ans pour les autres vasoconstricteurs, enfant < 12 ans pour **naphazoline**.

Utilisation prolongée > 7 j.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Déconseillés en cas d'angor, HTA, hyperthyroïdie.

Respirer par la bouche (et non par le nez) pendant la pulvérisation et pendant la minute qui suit.

Ne pas utiliser pendant plus de 7 j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sécheresse nasale, brûlure rétropharyngée (pour l'**acétylcystéine**).

Usage prolongé > 10 j : effet rebond après traitement pouvant évoluer vers une rhinite iatrogène hypertrophique surtout en cas de reprise du traitement.

Effets systémiques sympathomimétiques (sauf **tuaminoheptane**) : insomnie, céphalées, palpitations, HTA.

Allergie locale aux produits associés (**anesthésiques, antiseptiques** et antibiotiques).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées : **IMAO non sélectifs** (crise HTA).

Associations déconseillées : **anesthésiques volatils halogénés, bromocriptine, guanéthidine, réserpiniques, digitaliques**.

## ANTI-INFECTIEUX LOCAUX PAR VOIE NASALE (1)

## Antiseptiques

## ■ Hexamidine

<b>DÉSOMÉDINE</b>					
4-6 pulv./j	10 mL (fl. pulv)			NR	

## ■ Benzalkonium + camphre + niaouli + géranium

<b>EUVANOL spray</b>					
A. : 1 pulv. x 4-6/j/narine E. > 30 mois : 1 pulv. x 2-3/j	15 mL (fl. pulv.)			NR	

## ■ Ritiométan

<b>NÉCYRANE</b>					
A. : 1-2 pulv. x 3/j/narine E. : 1 pulv. x 3/j/narine	10 mL (fl.)			NR	

## ■ Goménol

<b>HUILE GOMENOLÉE</b>					
A. : 2-4 gttes x 3/j E. > 6 ans : 2-4 gttes x 3/j	22 mL à 5 % (fl.) 22 mL à 2 % (fl.)		I I	NR NR	
<b>VASELINE GOMENOLÉE</b>					
A. et E. > 6 ans : 1 appl./j	1 tube 15 g à 5 %		I	NR	
<b>GOMENOLEO</b>					
1 ampoule par narine	10 amp. 5 mL 2 % 10 amp. 5 mL 5 %		I I	NR NR	

## ■ Benzalkonium

<b>HUMEX FOURNIER</b>					
Sol. nasale 1 pulv. x 4/j/narine	15 mL (fl. pulv)		I	NR	

## ■ Benzododécinium + polysorbate 80

<b>PRORHINEL RHUME</b>					
E. : 2 pulv. x 3/j/narine 1 lavage 1/2 amp./narine x 1-3/j	20 amp. 5 mL 10 amp. 10 mL		I I	NR NR	

## ■ Benzododécinium

<b>RHINÉDRINE</b>					
A. : 2 pulv. x 3-4/j E. > 30 mois : 1 pulv. x 3-4/j	13 mL (fl. pulv.)		I	NR	

## ANTI-INFECTIEUX LOCAUX PAR VOIE NASALE (2)

## Associations diverses

## ■ Chlorobutanol + menthol

BALSAMORHINOL				
A. : 3-4 gttes x 4-5/j/narine E. > 3 ans : 1-2 gttes x 4/j/narine	20 mL (fl. compte-gttes)		I	NR

**PROPRIÉTÉS**

Antiseptique (**hexamidine, chlorobutanol, benzalkonium, ritométan, benzododécinium**).

Mucolytique : **polysorbate**.

Recommandations Afssaps : les antibiotiques locaux (fusafungine, bacitracine, gramicidine et tyrothricine) sont retirés de la vente depuis le 30 septembre 2005 du fait de leur inefficacité et du risque d'apparition de bactéries résistantes.

**INDICATIONS**

Infection rhinopharyngée d'allure bactérienne.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

**Corticoïdes** : enfant < 3 ans, infection virale

(herpès, zona) ou fongique non traitée, épistaxis.

**Huile soufrée, goménol** : convulsion.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Chlorhexidine** : incompatible avec les **antiseptiques anioniques**.

Durée du traitement < 7 j.

Ne pas se moucher violemment au cours des 10 min après le lavage des fosses nasales.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Allergie.

Sélection de germes résistants.

**ANTISEPTIQUES BUCCAUX (1) – COLLUTOIRES (1)****Antibactériens : antiseptiques et antibiotiques**■ **Hexétidine**

<b>COLLU-HEXTRIL</b>					
1-2 pulv. buccales x 3/j	40 mL 0,2 % (fl. pulv.)			NR	

■ **Chlorhexidine**

<b>COLLUNOVAR</b>					
1-2 pulv. buccales x 3-4/j Badigeonnage sur les amygdales ou les gencives avec le produit pur	40 mL (fl. pulv.) 25 mL (fl.)			NR NR	

■ **Biclotymol**

<b>HEXASPRAY</b>					
1-2 pulv. buccales x 3/j	30 g (fl. pulv.)			NR	

**Antibactériens (antiseptiques ou antibiotiques) + anesthésiques locaux**■ **Hexétidine + acide propionique + chlorobutanol**

<b>ANGISPRAY</b>					
A. : 4-6 pulv./j ; E. 6-15 ans : 2-3 pulv./j	40 mL (fl. pulv.)			NR	

■ **Hexétidine + choline + chlorobutanol**

<b>GIVALEX</b>					
A. : 4-6 pulv./j E. > 6 ans : 2-3 pulv./j	50 mL (fl. pulv.)			NR	

■ **Chlorhexidine + tétracaïne**

<b>DRILL</b>					
A. : 1-6 pulv./j E. > 12 ans : 1-3 pulv./j	40 mL (fl. pulv.)			NR	

<b>ÉLUDRIL</b>					
A. : 3-5 pulv./j E. (6-12 ans) : 2-3 pulv./j	55 mL (fl. pulv.)			NR	

## ANTISEPTIQUES BUCCAUX (2) – COLLUTOIRES (2)

## ■ Hexamidine + tétracaïne

<b>DOLI MAL DE GORGE HEXAMIDINE/TETRACAINE</b>					
A. : 3-6 pulv./j E. 6-15 ans : 1 pulv. x 2-3/j		30 g (fl. pulv.)		NR	
<b>ERGIX MAL DE GORGE</b>					
A. : 6 pulv./j max. E. > 12 ans : 3 pulv./j max.		30 mL (fl. pulv.)		NR	

## ■ Hexamidine + lidocaïne

<b>COLLUDOL</b>					
A. : 1-2 pulv. x 3/j E. > 6 ans : 1 pulv. x 1-3/j		30 mL (fl. pulv.)		NR	

## ■ Benzalkonium + lidocaïne

<b>HUMEX MAL DE GORGE</b>					
A. : 1 pulv. x 4-6/j E. > 6 ans : 1 pulv. x 2-3/j		35 mL (fl. pulv.)		NR	

## ■ Amylmétacrésol + alcool dichlorobenzylrique + lidocaïne

<b>STREPSILSPRAY</b>					
A. : 2 pulv. x 1-6/j E. > 12 ans : 2 pulv. x 1-4/j		20 mL (fl. pulv.)		NR	

## PROPRIÉTÉS

Antiseptiques (**hexétidine**, **acide propionique**, **chlorhexidine**, **hexamidine**, **benzalkonium**, **amylmétacrésol**, **alcool dichlorobenzylrique**, **cétylpyridinium**).

Antibiotiques (**biclotymol**).

Anesthésiques locaux (**chlorobutanol**, **lidocaïne**, **tétracaïne**, **choline**).

Agent physiologique de défense de l'organisme : **lysozyme**.

## INDICATIONS

Traitement local d'appoint antibactérien et symptomatique des inflammations buccales et oropharyngées infectieuses : gingivites, stomatites, aphtes, pharyngites, traumatismes buccaux.

## CONTRE-INDICATIONS

Enfant < 3 ans (risque de laryngospasme).  
Hypersensibilité à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Traitement d'appoint devant être associé à une antibiothérapie si nécessaire. Durée de traitement < 5 j.

**Anesthésiques locaux** : risques de fausses routes alimentaires surtout chez l'enfant < 12 ans ; ne pas utiliser avant les repas et les boissons.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration brune réversible de la langue et des dents (**chlorhexidine**).

**ANTISEPTIQUES BUCCAUX (3) – PASTILLES ET COMPRIMÉS À SUCER****Antibactériens : antiseptiques et antibiotiques**■ **Biclotymol**

<b>HUMEX MAL DE GORGE</b>					
Orange, miel-citron, menthe sans sucre ou fruits rouges sans sucre 4 à 6/j	24 pastilles 20 mg			NR	
<b>SOLUTRICINE MAUX DE GORGE BICLOTYMOL</b>					
Menthe ou orange 4 à 6/j	24 pastilles 20 mg			NR	

**Antibactériens (antiseptiques et antibiotiques) + anesthésiques locaux**■ **Chlorhexidine + tétracaïne**

<b>APHTORAL</b>					
+ acide ascorbique A. : 4 cp./j E. > 6 ans : 3 cp./j	24 cp. à sucer			NR	
<b>DRILL</b>					
Avec sucre : sans arôme, citron-menthe Sans sucre : sans arôme, anis-menthe, pamplemousse, sureau-litchi, miel-rosat A. : 4 past./j E. > 6 ans : 2-3 past./j	24 past.			NR	
<b>CANTALÈNE</b>					
+ lysozyme A. : 6 cp./j E. > 6 ans : 3 cp./j	24 cp. à sucer			NR	

■ **Cétylpyridinium + lidocaïne + acide ascorbique**

<b>CODOTUSSYL</b>					
+ ascorbate sodique, sans sucre A. : 6 past./j E. > 6 ans : 4 past./j	24 past.			NR	

■ **Amylmétacrésol + alcool dichlorobenzyle + lidocaïne**

<b>STREPSIL LIDOCAÏNE</b>					
A. : 8 past./j max. E. > 6 ans : 4 past./j max.	12 past. 24 past. 36 past.			NR NR NR	



## ANTISEPTIQUES BUCCAUX (4) – BAINS DE BOUCHE - GARGARISMES (1)

### Antiseptiques

#### ■ Polyvidone iodée

<b>BÉTADINE</b>					
1-2 càc dans un verre d'eau x 4-6/j	125 mL (fl.)			NR	
<b>PREDYL</b>					
4 doses/j	200 mL (fl.)			NR	

#### ■ Chlorhexidine

<b>PREXIDINE</b>					
1-3 bains de bouche/j pur ou dilué de moitié	200 mL 0,12 % (fl.)	3,10		15 %	0,02
<b>PAROEX</b>					
1 càs (15 mL) x 1-3/j	100 mL 0,12 % (fl.) 300 mL 0,12 % (fl.) 500 mL 0,12 % (fl.)	4,04		NR 15 % NR	0,01
<b>ELUDRILPÉRIO</b>					
2 doses/j	200 mL 0,2 % (fl.)	3,10		15 %	0,02

#### ■ Benzoate + salicylate + bicarbonate + borate + thymol + eucalyptol

<b>GLYCO-THYMOLINE 55</b>					
Bains de bouche : diluer au quart x 3/j Appl. locale : diluer de moitié	250 mL (fl.)			NR	

#### ■ Hexétidine

<b>HEXTRIL</b>					
Pur ou dilué de moitié : 1 dose 15 mL x 2-3/j	1 fl. 200 mL 0,1 % 2 fl. 400 mL 0,1 %			NR NR	
<b>HEXTRIL MENTHE</b>					
Idem <b>HEXTRIL</b>	13 gobelets (200 mL) 0,1 % 26 gobelets (400 mL) 0,1 %			NR NR	

## ANTISEPTIQUES BUCCAUX (5) – BAINS DE BOUCHE - GARGARISMES (2)

### Antiseptiques + anesthésiques buccaux

#### ■ Cétalpyridinium + chlorobutanol

<b>ALODONT</b>					
A. : 1 dose 15 mL pure x 3/j.	200 mL (fl. dose 15 mL)			NR	
E. 7-12 ans : 1 dose diluée de moitié x 3/j					

#### ■ Hexétidine + chlorobutanol + choline

<b>GIVALEX</b>					
2 càc/1/2 verre d'eau tiède x 2-4/j	125 mL (fl.)			NR	

#### ■ Chlorhexidine + chlorobutanol

<b>ELUDRILPRO</b>					
10-15 mL x 2/j	200 mL (fl.) 0,5 % 500 mL (fl.) 0,5 %			NR NR	
<b>BUCCOSOIN</b>					
Idem <b>ELUDRILPRO</b>	200 mL (fl.) 0,5 %			NR	
<b>ELUDRIL</b>					
Idem <b>ELUDRILPRO</b>	90 mL (fl.) 0,5 %	2,30		15 %	0,03

## ANTISEPTIQUES BUCCAUX (6) – GELS BUCCAUX

### ■ Cétalkonium + choline

<b>PANSORAL</b>					
1 appl. locale x 4/j	15 g (tube)			NR	

### ■ Minocycline

<b>PAROCLINE</b>					
Parodontose Appl. dans les poches parodontales toutes les 2 sem., pendant 4-6 sem max.	3 ser. gel dentaire 2% (10 mg)	HOP	I		

### ■ Hexétidine

<b>HEXTRIL</b>					
3-4 appl./j	10 g (tube) 0,5%			NR	

## ANTISEPTIQUES BUCCAUX (7) – ANTIFONGIQUES BUCCAUX

## ■ Miconazole

DAKTARIN					
1 c-mes. x 4/j à distance des repas, à avaler ensuite	1 tube de 40 g à 2 %	5,28	I	65 %	5,28
LORAMYC					
1 cp. buccal/j (7 à 14 j)	14 cp. 50 mg	71,02	I	65 %	5,07

## ■ Amphotéricine B

FUNGIZONE					
A. : 1-2 càc x 2/j pendant 15 j-3 sem. E. : 1 càc/10 kg/j en 2 prises	40 mL (fl.) 10 %. 8 càc susp. buvable	5,65	I	65 %	0,14

## ■ Nystatine

MYCOSTATINE					
E. : 10-40 doses/j N. : 5-30 doses/j en 3 prises pendant 3 sem.	24 doses 100 000 UI	2,01	I	65 %	0,08

## PROPRIÉTÉS

Antiseptiques à large spectre :

- **bactéricides** sur toutes les bactéries en 5 min et **antifongique** sur *Candida* et dermatophytes : **polyvidone iodée**, **chlorhexidine**, **hexétidine**, **cétalkonium** (ammonium quaternaire), **cétylpyridinium** ;
- **bactériostatique** : **minocycline**
- **fongicide** (levures, dermatophytes, pityriasis versicolor) : **miconazole** ;
- **anticandidosiques** : **amphotéricine B**, **nystatine**.

**Anesthésique de contact et antalgique** : **chlorobutanol**.

**Anti-inflammatoire et antalgiques** : **choline**, **acide salicylique**.

## INDICATIONS

Prévention et traitement des infections localisées de la muqueuse de la cavité buccale et de l'oropharynx (après prélèvement bactériologique et mycologique).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
E. < 3 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réévaluation nécessaire à 5 j en cas de persistance des symptômes et/ou de fièvre.

Déconseillé chez E. < 6 ans.

Laisser en bouche 2 min mais ne pas avaler (sauf anticandidosique).

Déconseillé en cas d'exploration de la thyroïde par l'iode radioactif (**iode**).

Présence éventuelle d'alcool à prendre en compte en cas de grossesse, d'allaitement et chez l'enfant.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration brune réversible de la langue et des dents (**chlorhexidine**).

Surcharge iodée avec possible dysfonctionnement thyroïdien en cas de traitement prolongé (**iode**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Iode** : antiseptiques mercuriels (formation de composés caustiques).

**Miconazole** : **sulfamides** **hypoglycémiantes**, **AVK**, **phénytoïne**.

**Minocycline** : **rétinoïdes** (voie générale), **AVK**.

## ANTALGIQUES ET ANTI-INFLAMMATOIRES BUCCAUX (1)

### Gels et crèmes buccaux

#### ■ Lidocaïne

<b>AFTAGEL</b>					
+ zinc 1 appl. x 3/j	15 mL (tube) gel			NR	
<b>DYNEXAN</b>					
0,5 g de cr. x 4/j	10 g (tube) cr. 2 %		II	30 %	
<b>DYNEXANGIVAL</b>					
0,2 g de cr. (un pois) x 4-6/j	10 g (tube) cr. 1 %			NR	

#### ■ Rhubarbe + acide salicylique

<b>PYRALVEX</b>					
2-4 appl./j	15 g (tube)			NR	

#### ■ Bêta-aescine anhydre

<b>FLOGENCYL</b>					
5 appl./j	20 g (tube) gel			NR	

### Solutions gingivales

#### ■ Amyléine

<b>DENTOBAUME</b>					
+ lévomenthol Placer un tampon imprégné de sol. au contact de la gencive ou de la dent douloureuse	4 mL (fl.)			NR	
<b>DOLODENT</b>					
2-3 appl./j	27 g (fl. pompe)			NR	

#### ■ Rhubarbe + acide salicylique

<b>PYRALVEX</b>					
2-4 appl./j	10 mL (fl.)			NR	

## ANTALGIQUES ET ANTI-INFLAMMATOIRES BUCCAUX (2)

## Comprimés à sucer

## ■ Bétaméthasone

<b>BUCCOBET</b>				
5 à 10 cp./j	50 cp. à sucer 0,1 mg		I	NR

## ■ Tétracaine

<b>SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TÉTRACAÏNE</b>				
6 cp./j	24 cp. à sucer 0,2 mg			NR

**PROPRIÉTÉS**

Anesthésiques locaux : **amyléine**, **lidocaïne**, **tétracaine**.

Anti-inflammatoire : **aescine**, **rhubarbe**, **acide salicylique**, **bétaméthasone**.

Protecteur cutané et des muqueuses : **zinc**.

**INDICATIONS**

Parodontopathies, aphtes, gingivites, lésions inflammatoires locales sauf :

**DENTOBAUME**: douleurs aiguës gingivo-dentaires (urgence en attente de visite chez une spécialiste).

**DOLODENT**: douleurs liées à la poussée dentaire.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Lésions buccales virales : **BUCCOBET**.

E. < 30 mois : **FLOGENCYL** (menthol).

E. < 6 ans : **BUCCOBET**, **PYRALVEX**, **DYNEXAN**, **DYNEXANGIVAL**.

E. < 10 ans : **DENTOBAUME**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas avaler.

**PYRALVEX** : présence d'alcool à prendre en compte (30 % dans le gel, 60 % V/V dans la sol.)

Réévaluation de la conduite à tenir en cas de persistance des symptômes à 5 j (**SOLUTRICINE**, **DYNEXAN**, **DYNEXANGIVAL**) ou 10 j (**BUCCOBET**) max.

**Anesthésiques locaux** : risques de fausses routes alimentaires surtout chez l'enfant < 12 ans ; ne pas utiliser avant les repas et les boissons.

**DYNEXAN**, **DYNEXANGIVAL**, **AFTAGEL**, **DENTOBAUME** : allaitement déconseillé, prudence en cas d'antécédent d'épilepsie (dérivés terpéniques).

## FLUOR DENTAIRE

### ■ Fluorure de sodium

<b>FLUOREX</b>					
F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 1 dose n° 4/j ; E. < 2 ans : 1 dose n° 1/j ; E. 2-3 ans : 1 dose n° 2/j ; E. 3-4 ans : 1 dose n° 3/j ; E. > 4 ans : 1 dose n° 4/j	120 doses n° 1 : 0,25 mg	2,03		30 %	0,02
<b>ZYMAFLUOR</b>					
F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 4 cp./j ; E. < 2 ans : 1 cp./j ; E. 2-4 ans : 2 cp./j ; E. 4-6 ans : 3 cp./j ; E. > 6 ans : 4 cp./j	200 cp. 0,25 mg	1,98		30 %	0,01
E. 2-4 ans : 1 cp./j	100 cp. 0,5 mg	1,98		30 %	0,02
E. 4-6 ans : 1 cp./j	100 cp. 0,75 mg	2,55		30 %	0,03
E. > 6 ans, F. enceinte > 5 <sup>e</sup> mois, allaitante : 1 cp./j	100 cp. 1 mg	2,68		30 %	0,03

### ■ Fluorure de calcium

<b>FLUORURE DE CALCIUM CRINEX</b>					
F. enceinte > 4 <sup>e</sup> mois, allaitante E. > 4 ans : 4 cp./j ; E. 2-4 ans : 2 cp./j E. < 2 ans : 1 cp./j	200 cp. 0,25 mg	2,28		30 %	0,01

#### PROPRIÉTÉS

Renforce la dureté de l'émail.  
Inhibe la dégradation enzymatique des hydrates de carbone.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Diminution de l'absorption en cas de prise simultanée de laitages ou d'**antiacides**.

#### INDICATIONS

Prophylaxie de la carie dentaire.

## SIALOLOGUES

## ■ Substitut salivaire

<b>ARTISIAL</b>					
1 pulv. x 6-8/j	100 mL (fl. pulv.)	4,68		15 %	0,05

## ■ Anétholtrithione

<b>SULFARLEM</b>					
<b>SULFARLEM</b> Avant les repas : A. : 2 cp. x 3/j, E. 10-15 ans : 1 cp. x 3/j, E. 6-10 ans : 1 cp. x 2/j	60 cp. 12,5 mg	1,99		15 %	0,03
<b>SULFARLEM S 25</b> Avant les repas : 1 cp. x 3/j Prévention de l'hyposialie médicamenteuse : cure continue ou discontinue 5 j/mois Sinon : traitement à vie	60 cp. 25 mg	2,84		15 %	0,05

## ■ PROPRIÉTÉS

Substitut salivaire : **ARTISIAL**.

Sialologue et stimulateur sécrétion biliaire :  
**anétholtrithione**.

## ■ INDICATIONS

Prévention et traitement des hyposialies pathologiques et iatrogènes : irradiation cervicale, médicamenteuse (**antipsychotique**, **antidé-**

**presseur**, **IMAO**, **antiparkinsonien**, **tranquillisant**).

Troubles dyspeptiques : **SULFARLEM**.

## ■ CONTRE-INDICATIONS

Obstruction des voies biliaires (**anétholtrithione**).

**Grossesse et allaitement** : **SULFARLEM**.

## ■ EFFETS INDÉSIRABLES

Ramollissement des selles et urines foncées (**anétholtrithione**).



## FIÈVRE CHEZ L'ENFANT (1)

La fièvre est définie par une température centrale supérieure ou égale à 38 °C. Il existe différentes méthodes de mesure de la température. La voie rectale reste la méthode de référence. En dépistage, on utilisera plutôt la voie axillaire chez le nourrisson et la voie tympanique chez l'enfant.

### Conduite à tenir

#### Avant 3 mois

Il s'agit le plus souvent d'une infection virale, mais cela doit rester un diagnostic d'élimination et il faut toujours de principe **éliminer une infection bactérienne sévère** (méningite, septicémie, ostéoarthrite, pneumopathie, pyélonéphrite, etc.) en réalisant un examen clinique complet et un bilan infectieux avec PL.

#### ► Avant 1 mois

- Hospitalisation **systématique** en cas de fièvre (risque d'infection materno-fœtale +++).
- Débuter une triple antibiothérapie : **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)** : 200 mg/kg/j en 3 inj. IVD ; **aminopénicilline, amoxicilline (CLAMOXYL)** 200 mg/kg/j en 3 inj. IVDL ; **aminoside, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL 30 min. Si l'analyse du LCR est normale, on peut passer à une dose non méningée de 100 mg/kg/j en 3 fois pour les 2 premiers antibiotiques. Réévaluation du bilan infectieux à H24-H48 et adaptation du traitement selon les résultats sanguins et bactériologiques.

#### ► Entre 1 et 3 mois

- En cas de mauvaise tolérance de la fièvre, hospitaliser et débuter après bilan infectieux complet une antibiothérapie (en l'absence d'orientation et en l'absence de méningite) par **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCÉPHINE)** :

50 mg/kg/j en 1 inj. IVD ± **aminoside, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL 30 min.

- Si le nourrisson n'a pas d'antécédent pathologique, un examen clinique rassurant (pas d'infection évidente, comportement normal) et un bilan biologique négatif, il pourra être renvoyé à domicile à condition d'être bien surveillé et d'être systématiquement revu après 24 h avec le résultat des cultures.

#### Chez le nourrisson > 3 mois et l'enfant

##### ► Si la fièvre est mal tolérée

- Rechercher une infection bactérienne sévère.
- Hospitalisation + bilan complémentaire :

- NFS, hémoculture, CRP ± procalcitonine, fibrinogène, ECBU ;
- bilan adapté au contexte clinique : radio de thorax, PL, goutte épaisse.

Débuter une antibiothérapie par **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 50 mg/kg/j en 1 inj. IVD ± **aminoside, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL 30 min

##### ► Si la fièvre est bien tolérée

- Antibiothérapie adaptée au foyer clinique objectivé (angine, otite, etc.) ou aux examens orientés par le contexte (radio de thorax, ECBU, etc.).
- En l'absence d'étiologie évidente avec état général conservé, la fièvre est probablement d'origine virale : pas d'antibiothérapie ; l'enfant sera revu 48 ou 72 h plus tard en cas de persistance de la fièvre (la réalisation d'un bilan biologique sera alors systématique).

Le traitement symptomatique de la fièvre a comme seul objectif d'améliorer le confort de l'enfant. Il n'a en effet jamais été prouvé qu'il diminuait l'incidence des complications.

## ANTIPYRÉTIQUES (1)

## ■ Paracétamol

<b>DOLIPRANE</b>				
Fièvre, douleur : 60 mg/kg/24 h en 4 à 6 prises	12 sach. 100 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 150 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 200 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 300 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 500 mg	1,95	65 %	0,16
	8 sach. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
	10 sup. séc. 100 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 150 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 200 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 300 mg	2,02	65 %	0,20
	8 sup. 1 000 mg	2,17	65 %	0,27
	16 cp. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	16 cp. efferv. 500 mg	2,02	65 %	0,13
	100 cp. 500 mg	HOP		
	8 cp. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
	8 cp. efferv. séc. 1 000 mg	2,02	65 %	0,26
	100 cp. 1 000 mg	HOP		
	100 cp. efferv. séc. 1 000 mg	HOP		
	16 gél. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	100 gél. 500 mg	HOP		
Susp. buv. (2,4 %) : dose poids/prise	8 gél. 1 000 mg	1,90	NR	0,24
	1 fl. 100 mL	2,08	65 %	2,08
<b>EFFERALGAN</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	16 cp. efferv. séc. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	16 cp. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	8 cp. efferv. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
<b>DOLKO</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	12 sach. 500 mg	1,95	65 %	0,16
	18 fl. 90 mL	2,08	65 %	0,12
	16 cp. séc. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	8 cp. séc. 1 000 mg	1,90	65 %	0,24
<b>PARALYOC</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	10 lyoph. 250 mg	2,13	65 %	0,21
	16 lyoph. 500 mg	2,75	65 %	0,17
<b>DAFALGAN PEDIATRIQUE</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	1 fl. 90 mL sol. buv. 3 %	2,08	65 %	2,08

## PROPRIÉTÉS

Antalgique périphérique et antipyrétique. Résorption digestive rapide et complète (action per os en 30 min). Liaison faible aux protéines plasmatiques, métabolisme hépatique puis élimination essentiellement urinaire sous forme active (< 5 %) et sous forme de dérivés conjugués inactifs (1/2 vie = 2 h).

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs d'intensité modérée.

## CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépato-cellulaire.  
Allergie au **paracétamol** (exceptionnelle).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser les doses maximales. Espacer les prises de 8 h minimum en cas d'insuffisance rénale sévère.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques (exceptionnelles) : rash cutané, urticaire.

Thrombopénies (exceptionnelles).

Surdosage (dose > 150 mg/kg en 1 prise) : cytolysé hépatique apparaissant dans les premières 24 h avec risque de nécrose irréversible massive et mort par encéphalopathie hépatique. Traitement : lavage gastrique précoce (2 premières heures ; inefficace si forme sirop), administration de **N-acétylcystéine** par voie orale ou en perfusion IV lente, traitement symptomatique. Surveillance de la paracétamolémie et des transaminases.

## FIÈVRE CHEZ L'ENFANT (2)

### Mesures physiques [1]

- Découvrir l'enfant, ne pas surchauffer la pièce.

- Augmenter les apports hydriques.

Le refroidissement externe souvent préconisé ne se justifie qu'en cas d'hyperthermie majeure engageant le pronostic vital, notamment chez un nourrisson déshydraté et surcouvert donc ne pouvant assurer sa thermorégulation. Dans les autres cas il est inutile car il ne modifie pas le point de contrôle hypothalamique de la température corporelle.

### Traitements médicamenteux [1]

Les traitements médicamenteux abaissent le point de contrôle hypothalamique de la température corporelle.

**Antipyrétique, paracétamol (DOLIPRANE) :** 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises *per os* ou 80 mg/kg/j en 4 prises rectales.

**Antipyrétique, acétylsalicylate de lysine (ASPÉGIC) :** 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises *per os*.

**Antipyrétique, ibuprofène (ADVILMED) :** 20 à 30 mg/kg/j (dose poids/6 h *per os* de la suspension buvable).

- En première intention, utilisation d'une monothérapie (plutôt le **paracétamol** car moins d'effets secondaires). L'adjonction d'un autre médicament reste possible (**ASPÉGIC** ou **ADVILMED**) en alternance si le **paracétamol** ne suffit pas. Une bithérapie d'emblée ne se justifie pas. L'**aspirine** est de moins en moins utilisée dans cette indication du fait du risque de syndrome de Reye décrit avec cette molécule dans certaines viroses de l'enfant, notamment en

cas de varicelle ou de grippe au cours desquelles elle est même contre-indiquée.

- En cas de troubles digestifs, la voie veineuse est utilisable : **antipyrétique, paracétamol (PERFALGAN) :** 60 mg/kg/j par voie IV en 4 injections IVL 15 min (demi-dose chez le nourrisson de moins de 1 an ou 10 kg).

Ne pas utiliser les **AINS** :

- avant 3 mois
- en cas d'atteinte cutanée (varicelle +++ ) ou des tissus mous car risque de fasciite nécrosante
- en cas de risque hémorragique (geste invasif ou intervention chirurgicale potentiels)
- en cas d'insuffisance hépatique ou rénale
- en cas d'antécédent d'asthme
- en cas de diarrhée (risque d'insuffisance rénale)

### Critères d'hospitalisation

- Âge
- Troubles hémodynamiques, troubles de conscience, détresse respiratoire.
- Fièvre mal tolérée (comportement inhabituel).
- Purpura.
- Infection bactérienne sévère confirmée.
- Incapacité de surveillance à domicile.

### Complications de la fièvre

- Convulsions hyperthermiques.
- Déshydratation aiguë.
- Rarement, syndrome d'hyperthermie majeure, avec collapsus, atteinte multiviscérale (notamment cérébrale) chez un nourrisson en général surcouvert.

### CONSENSUS

- [1] Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant, *Afssaps*, 2005

## CONVULSIONS FÉBRILES (1)

Elles surviennent entre 6 mois et 5 ans chez 3 à 5 % des enfants. Dans 90 % des cas, la fièvre est d'origine virale, mais une étiologie bactérienne doit toujours être recherchée.

### Traitement d'urgence

Si l'enfant convulse encore (durée > 5 min)

**Benzodiazépine, diazépam (VALIUM)** : 0,5 mg/kg en intrarectal sans dépasser 10 mg, renouvelable 1 fois ; ou mieux si voie veineuse déjà mise en place **benzodiazépine, clonazépam (RIVOTRIL)** : 0,02 à 0,04 mg/kg (maximum 1 mg) IV sur 2 min. En cas d'échec, cf. État de mal convulsif (épilepsie de l'enfant) .

### Prise en charge optimale de la fièvre

- Mesures physiques.
- Traitement médicamenteux (cf. Fièvre chez l'enfant).

Ex. : **antipyrétique, paracétamol (DAFALGAN)** : 15 mg/kg/6 h (dose poids x 4/j de la suspension pédiatrique). Certains préconisent la poursuite du traitement antipyrétique systématique pendant 48 h.

### Traitement étiologique urgent

En cas de forte suspicion de méningite, débuter après examen direct de la PL (ou d'emblée si liquide trouble à la PL) une antibiothérapie par **céfotaxime (CLAFORAN)** : 300 mg/kg/j en 4 IVDL ± **vancomycine** : 60 mg/kg/j en 4 IVL sur 1 h (à poursuivre jusqu'aux résultats de la culture). En cas de suspicion de méningo-encéphalite herpétique (troubles persistants de la conscience, crise partielle brachio-faciale, même si PL négative), débuter en urgence : **antiviral, aciclovir (ZOVIRAX)** : 1 500 mg/m<sup>2</sup>/j en 3 inj. IVL sur 1 h (à poursuivre jusqu'au résultat de la PCR HSV sur le LCR).

En cas de suspicion de neuroludisme (convulsion fébrile au retour d'une zone

d'endémie de paludisme), débuter en urgence : **quinine base** : 8 mg/kg en IVL sur 4 h x 3/j (cf. Paludisme de l'enfant).

### Prise en charge

#### Convulsions fébriles simples

Tous les critères suivants sont présents (90 % des cas). L'évolution est favorable : développement psychomoteur normal, risque d'épilepsie ultérieure très faible (comparable à celui de la population générale) mais risque de récurrence (30 % dans l'année).

- Âge 1 à 5 ans.
- Pas d'antécédent neurologique.
- Crise tonico-clonique généralisée.
- Durée < 15 min.
- Examen neurologique post-critique normal.
- Crise unique sur 24 h.

#### ► Examens complémentaires

Selon l'examen clinique, on réalisera : NFS, CRP, hémoculture, Rx thorax, ECBU, PL au moindre doute surtout avant 18 mois.

Hospitalisation non indispensable si l'examen clinique est normal ou retrouve un point d'appel ORL (otite, angine), la biologie rassurante. En pratique, le plus souvent, hospitalisation lors du premier épisode en raison de l'inquiétude des parents.

#### ► Traitement au long cours

Aucun, en dehors du traitement antipyrétique bien conduit en cas de fièvre. Si le contexte familial le permet, prescrire aux parents : **benzodiazépine, diazépam (VALIUM)** 0,5 mg/kg intrarectal (sans dépasser 10 mg) en cas de crise d'une durée supérieure à 5 min. en leur montrant comment procéder. Un traitement de fond ne se discute que si les crises sont très rapprochées, avec une intolérance familiale importante (cf. Traitement des convulsions fébriles complexes).

## CONVULSIONS FÉBRILES (2)

### Convulsions fébriles complexes

L'un de ces critères est présent (4 % des cas) :

- Âge < 1 an.
- Durée > 15 min.
- Crise focale.
- Déficit post-critique.
- Antécédents neurologiques.
- Crises répétées sur 24 h.

#### ► Bilan

Hospitalisation systématique ; transfert par Smur si convulsions persistantes, troubles de conscience, signes de localisation, ou défaillance respiratoire/hémodynamique.

Selon l'examen clinique, on réalisera : NFS, CRP, RX thorax, ECBU.

Éliminer une méningite et/ou une encéphalite (herpès ++) par : PL, EEG, TDM cérébrale.

Évoquer la possibilité d'une convulsion d'étiologie sans rapport avec la fièvre (cf. Épilepsie de l'enfant).

#### ► Risques

- État de mal fébrile.
- Épilepsie ultérieure, notamment avant 1 an où existe un risque d'évolution vers une forme sévère d'épilepsie : épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (= syndrome de Dravet) ou épilepsie partielle temporale, justifiant l'instauration d'un traitement de fond.

#### ► Traitement de fond

**Antiépileptique, valproate de sodium (DÉPAKINE)** : atteindre en 10 j progressivement 30 mg/kg/j (2 prises *per os* avant 1 an, 3 prises après 1 an, sauf **MICROPAKINE LP** : toujours en 2 prises) ; dosage des NFS, plaquettes et transaminases avant traitement + surveillance transaminases et fonction hépatique pendant les premiers mois de traitement ; si convulsions sous **DÉPAKINE**, doser la dépakinémie pour rechercher un éventuel sous-dosage (taux thérapeutiques 50 à 100 mg/L).

**Benzodiazépine, diazépam (VALIUM)** intraréctal : 0,5 mg/kg, sans dépasser 10 mg, si convulsion > 5 min. (démonstration à faire aux parents).

Traitement antipyrétique en cas de fièvre.

## ÉPILEPSIE DE L'ENFANT ET DU NOURRISSON (1)

### Diagnostic différentiel

#### Ne pas confondre les convulsions du nourrisson avec :

- les myoclonies du sommeil, physiologiques, s'arrêtant au réveil ;
- les trémulations qui s'arrêtent lorsqu'on immobilise le segment de membre ;
- les malaises d'origine vagale ;
- les spasmes du sanglot ;
- les dystonies liées au **PRIMPÉRAN** (qui devraient disparaître suite à la contre-indication du **PRIMPÉRAN** avant 18 ans début 2012).

#### Traitement de la crise et de l'état de mal convulsif [1]

##### Bilan étiologique

Il est mené parallèlement au traitement, permettant d'instaurer un éventuel traitement étiologique dès que possible. La vérification de la glycémie capillaire est une urgence.

##### Réanimation symptomatique

- Liberté des voies aériennes, oxygénothérapie, voire intubation et ventilation assistée.
- Maintien de la température corporelle.
- Maintien de l'hémodynamique.

##### Anticonvulsivants

On parle d'état de mal après 30 min de convulsions ininterrompues ou répétées sans reprise de conscience entre les épisodes, mais l'escalade thérapeutique progressive commence dès le début de la crise.

L'inefficacité d'un médicament amène à débiter le traitement suivant et ce, jusqu'à cessation des convulsions :

- **Benzodiazépine, diazépam (VALIUM)** : 0,5 mg/kg intrarectal (sans dépasser 10 mg) renouvelable 1 fois.
- Remplacer, dès que l'enfant a une voie d'abord, par **benzodiazépine, clonazépam**

(**RIVOTRIL**) : 0,02 à 0,04 mg/kg (maximum 1 mg) IV sur 2 min, sous surveillance respiratoire (risque d'apnées)

- Puis (vers M15), renouveler **RIVOTRIL** : 0,02 à 0,04 mg/kg (maximum 1 mg) associé à **antiépileptique, phénytoïne (DILANTIN)** : dose de charge 20 mg/kg (maximum 1 g) en IVL dans sérum physiologique sur 20 min, ou **phénobarbital (GARDÉNAL)** : dose de charge de 15 à 20 mg/kg en IVL sur 20 min.

- Puis (vers M40) administrer l'autre **antiépileptique** que celui choisi précédemment (**GARDÉNAL** ou **DILANTIN**).

- Si le malade convulse toujours (vers M60), il doit être pris en charge en réanimation, et intubé après séquence rapide d'anesthésie par **antiépileptique, thiopental (PENTHOTAL)** : 2 mg/kg en bolus puis 3 à 5 mg/kg/h en IV ; ou **midazolam (HYPNOVEL)** : 0,15 à 0,5 mg/kg en bolus puis 0,12 à 1,4 mg/kg/h en IV.

Chez un malade déjà suivi pour épilepsie, le traitement de l'état de mal pourra être mené différemment en fonction des antécédents et des traitements déjà reçus (dosage des médicaments en cours). Le **phénobarbital** est contre-indiqué en cas de syndrome de Dravet.

##### Traitement de relais

Au décours, les posologies de relais des médicaments utilisés sont :

- **RIVOTRIL** 0,2 à 0,4 mg/kg/j en IV continue ;
- **GARDÉNAL** *per os* ou IV, 48 h après la dose de charge : 5 mg/kg/j ;
- **DILANTIN** 5 mg/kg toutes les 6 à 8 h, à adapter aux résultats de dilantinémie (objectif 15 à 20 mg/L, toxique > 25 mg/L). Un relais *per os* à distance peut être fait par **antiépileptiques, phénytoïne (DI-HYDAM)** : 3 à 8 mg/kg/j en 2 ou 3 prises, difficile à équilibrer chez l'enfant.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal épileptiques de l'adulte et de l'enfant (nouveau-né exclu), *SFMU*, 2008

## ANTIÉPILEPTIQUES - POSOLOGIES INFANTILES (1)

## ■ Phénobarbital

<b>GARDÉNAL</b>					
Crise convulsive : 10 à 20 mg/kg selon l'âge en IV sur 20 min	1 fl. 40 mg 1 fl. 200 mg	11,17 HOP	II	65 %	11,17
Relais <i>per os</i> à H48	80 cp. 10 mg	3,40	II	65 %	0,04
< 3 ans : 5 mg/kg/j en 2 prises	30 cp. 50 mg	1,84	II	65 %	0,06
> 3 ans : 3 mg/kg/j en 1 prise	20 cp. 100 mg	2,47	II	65 %	0,12
<b>APAROXAL</b>					
Idem <b>GARDÉNAL (pédiatrie)</b>	20 cp. séc. 100 mg	1,95	II	65 %	0,10
<b>KANEURON</b>					
3 à 4 mg/kg/j au coucher	1 fl. 5,4 % (1 620 gttes)	8,68	II	65 %	
<b>ALEPSAL</b>					
< 20 kg : 5 mg/kg/j	30 cp. 15 mg	2,03	II	65 %	0,07
20 à 30 kg : 3 à 4 mg/kg/j	30 cp. 50 mg	2,04	II	65 %	0,07
> 30 kg : 2 à 3 mg/kg/j	30 cp. 100 mg	2,84	II	65 %	0,09
	30 cp. 150 mg	4,44	II	65 %	0,15

## ■ Phénytoïne

<b>DI-HYDAN</b>					
3 à 8 mg/kg/j en 2 prises	60 cp. séc. 100 mg	3,42	II	65 %	0,06

## ■ Diazépam

<b>VALIUM ROCHE</b>					
Crise convulsive : 0,1 mg/kg IVD renouvelable jusqu'à 0,5 mg/kg (risque d'apnée) <i>Per os</i> : 0,5 à 1 mg/kg/j	6 amp. (2 mL = 10 mg)	3,16	I	65 %	0,53
	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	600 gttes - fl. 20 mL (3 gttes = 1 mg)	3,05	I	65 %	

La pharmacologie est développée dans le chapitre Neurologie.

## ÉPILEPSIE DE L'ENFANT ET DU NOURRISSON (2)

### Bilan étiologique

Le pronostic dépend de l'étiologie.

Traumatisme crânien	Hémorragie méningée Hémorragie intraparenchymateuse Syndrome de Silverman
Souffrance fœtale aiguë	Lésions anoxo-ischémiques
Processus expansif	Tumeur Absès
Infection	Méningite Méningo-encéphalite (herpès)
Hypertension artérielle	
Troubles métaboliques	Hypoglycémie Hypocalcémie Hypernatrémie (rechercher une thrombose veineuse intracrânienne) Hyponatrémie Maladies métaboliques génétiquement déterminées
Causes vasculaires	Accident vasculaire cérébral Thrombose des sinus veineux
Causes toxiques	Médicamenteuses Monoxyde de carbone Plomb Sevrage morphinique chez le nouveau-né
Secondaires à une anoxie	Corps étranger Strangulation Arrêt cardiorespiratoire
Malformations cérébrales	Rechercher la cause de décompensation (infection, sous-dosage médicamenteux)
Convulsions néonatales bénignes idiopathiques	Entre 24 h et 6 sem. de vie (le plus souvent entre J3 et J7). C'est un diagnostic d'élimination, l'évolution est bénigne, les convulsions durent en moyenne de 3 h à 3 j, le traitement peut être arrêté après 6 sem.
Convulsions fébriles idiopathiques	Infection virale (90 %). Risque d'épilepsie ultérieure très faible.

### Bilan diagnostique

#### Bilan diagnostique devant une épilepsie de l'enfant ou du nourrisson\*

*Clinique* : température, PA, glycémie capillaire, PC.

*Examens paracliniques*:

- Ionogramme sanguin, kaliémie, gaz du sang, glycémie, calcémie, lactates.
- Recherche de toxiques (sang + urines).
- NFS plaquettes, CRP.
- Fond d'œil.

- Scanner cérébral (l'ETF n'a de valeur que positive car elle explore mal la périphérie du cerveau).
- PL (avant ou après le scanner selon la clinique).
- EEG.
- IRM cérébrale à distance de la crise.
- Dosage d'antiépileptiques si l'enfant est traité.

\* Ces examens ne sont pas tous indispensables lorsque le contexte étiologique est évident. Ils doivent être effectués au moindre doute.



## DOULEUR DE L'ENFANT (1)

### Évaluation de la douleur

#### Évaluer le type de douleur

- Douleur par excès de nociception.
- Douleur par défaut d'inhibition : douleur neuropathique.

#### Évaluer son intensité

- À l'aide d'échelles d'auto-évaluation comme l'échelle visuelle analogique (EVA) à partir de 6 ans.
- À l'aide d'échelles d'hétéro-évaluation chez l'enfant avant 6 ans, adaptées à la situation (EVENDOL aux urgences, douleurs postopératoires, nouveau-né, etc.).
- Chiffrer la douleur permet d'adapter au mieux le suivi thérapeutique.

### Traitement de la douleur [1]

Le but du traitement est de soulager rapidement l'enfant douloureux en attendant l'efficacité du traitement étiologique. Il faut savoir rassurer l'enfant et prendre en charge son anxiété associée.

#### Modalités

Il existe trois paliers thérapeutiques distincts. La réévaluation régulière de la douleur résiduelle permet, en cas d'efficacité insuffisante, d'augmenter la posologie ou de passer au palier supérieur (toujours après avoir éliminé une éventuelle complication passée inaperçue).

- palier I : antalgiques périphériques (paracétamol, ac. acétylsalicylique, AINS) ;
- palier II : antalgiques centraux faibles (codéine, tramadol) ;
- palier III : antalgiques centraux forts (morphine et dérivés : fentanyl, nalbuphine)

- Utilisation de **coanalgésiques** dans les douleurs neuropathiques.
- Traitement étiologique lorsqu'il existe une étiologie curable à la douleur.
- Donner les prises systématiquement (ne pas attendre la récurrence de la douleur pour donner la prise suivante d'antalgique).

#### Médicaments

##### ► Antalgiques périphériques

- **Paracétamol** : **DOLIPRANE** (15 mg/kg/6 h *per os*) ou **PERFALGAN** (15 mg/kg/6 h en IVL 15 min, demi-dose chez le nourrisson de moins de 1 an ou 10 kg).

- **Acide acétylsalicylique (ASPÉGIC)** : 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises *per os* (50 mg/kg/j en IV).

- Dans les douleurs à composante inflammatoire, on peut utiliser chez l'enfant : **AINS**, **ibuprofène (ADVILMED)** :

- > 3 mois : 20 à 30 mg/kg/j en 3 ou 4 prises *per os* (dose poids x 4/j de la suspension buvable) ;
- entre 6 et 12 ans : cp. 100 mg, 1 cp./10 kg de poids x 3 prises *per os* /j ;
- après 12 ans : cp. 200 mg, 1 à 2 cp. x 3 prises/j.

##### ► Antalgiques centraux faibles

- **Codéine** (après 1 an) : débiter à 2 mg/kg/j de **codéine base** en 4 prises *per os*, avec maximum de 6 mg/kg/j en 6 prises.

Sous forme de **codéine seule** : **CODENFAN sirop** (après 1 an) ou associée au **paracétamol** : **CODOLIPRANE** (après 6 ans), **DAFALGAN CODÉINE** (après 3 ans ou > 15 kg).

- **Tramadol (TOPALGIC)** : 1 à 2 mg/kg x 3 ou 4 prises/j après 3 ans soit 0,4 à 0,8 gtt/kg par prise (maxi 100 mg/prise et 400 mg/j).

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l'enfant, *Afssaps*, 2009

## DOULEUR DE L'ENFANT (2)

► *Antalgiques centraux forts*

- **Nalbuphine (NUBAIN)** : 0,2 mg/kg/4 à 6 h en IVL sur 15 min ou 0,4 mg/kg/4 à 6 h en IR.

- **Morphine** : analgésique central le plus puissant préconisé aux urgences, qui a l'avantage de ne pas avoir de dose plafond ; c'est un stupéfiant (prescription selon la règle des 28 j).

*Posologie*

Dose initiale :

- *per os* : 0,5 mg/kg (20 mg maxi) en dose de charge puis 1,2 à 3 mg/kg/j en 6 prises ;

- IV : 0,5 à 1 mg/kg/j [commencer par un bolus de 0,1 mg/kg (6 mg maxi) puis réinjecter 0,025 mg/kg toutes les 10 min jusqu'à régression tolérable de la douleur (EVA < 4)]. Utilisation en IV continue ou avec PCA (continu + bolus ou bolus seuls). Augmenter par paliers de 30 à 50 % toutes les 8 h jusqu'à disparition de la douleur. Possibilité d'effectuer des bolus intraveineux (sur 5 min) correspondant à la dose horaire, avant les soins douloureux ou en cas d'exacerbation.

Surveillance : scope, douleur, fréquence respiratoire, conscience. Antidote à proximité ++ (**NARCAN**).La **morphine** est utilisée à tout âge mais n'a pas l'AMM avant 6 mois.Si un traitement au long cours est nécessaire, dès que les doses utiles sont bien définies, relais oral par dérivé à longue durée d'action : **sulfate de morphine (MOSCONTIN)** : donner la dose optimale totale de **morphine** par jour, répartie en 2 ou parfois 3 prises. Ne pas utiliser cette forme pendant la période d'équilibration.*Effets secondaires*Apnées, défaillance respiratoire en cas de surdosage : administrer **l'antidote de la morphine**, **naloxone (NARCAN)** : 10 µg/kg en IVL, renouvelable si besoin.Prurit : traiter par **anti-histaminique H<sub>1</sub>**. Globes vésicaux : nécessitent rarement le sondage.Constipation : traiter par exemple par **laxatif**, **lactulose (DUPHALAC)**.Nausées, vomissements : **antiémétique**, **métopimazine (VOGALÈNE)** IR.Chacun de ces effets indésirables peut également être traité par des petites doses de **naloxone (NARCAN)** 0,25 µg/kg/j en IV continu.► *Contre-indications*

Douleur abdominale aiguë inexplicée.

Traumatisme crânien, troubles de conscience.

Insuffisance respiratoire, insuffisance hépatocellulaire.

Troubles hémodynamiques.

► *Coanalgésiques*

Utiles dans les douleurs neuropathiques :

- pour les douleurs de fond : **amitriptyline (LAROXYL)** : 0,3 à 2 mg/kg/j (soit 0,3 à 2 gtt/kg/j *per os* en 1 à 2 prises ou bien en IV continue) ;

- pour les fulgurances : **carbamazépine (TEGRETOL)** : débiter entre 5 et 10 mg/kg/j (maxi 20 mg/kg/j) en 2 ou 3 prises (hors AMM chez l'enfant).

**Prévention de la douleur****EMLA** (lidocaïne + prilocaïne)**tube de crème ou patch**

À appliquer 1 h minimum avant prise de sang, ponction lombaire, injection, etc.

Permet une anesthésie superficielle de 4-5 mm profondeur.

**Anesthésie locale****XYLOCAÏNE** injectable 1% (suture de plaie).**XYLOCAÏNE** nébuliseur 5 % (anesthésie des voies aériennes supérieures, muqueuses buccales, cutanée).**Protoxyde d'azote (KALINOX)**

Gaz sédatif et analgésique (vigilance conservée sans réelle anesthésie) avec masque parfumé. Délai d'action d'environ 3 min avec arrêt de l'effet 5 min après l'arrêt de l'inhalation.

Indication : sutures, ponction lombaire, soins de brûlure, aide à la petite chirurgie ambulatoire, etc.

Contre-indication : pneumothorax, traumatisme crânien sévère, hypertension intracrânienne, vomissements en jet, distension gazeuse abdominale.

## TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ

Il regroupe une hyperactivité, un déficit attentionnel, une impulsivité ; chez un enfant dont les troubles durent depuis plus de 6 mois et ont commencé avant l'âge de 7 ans.

### Diagnostic différentiel

Diverses pathologies peuvent présenter un tableau d'hyperactivité en plus de leurs caractéristiques propres.

### Pathologies organiques

Hyperthyroïdie, hypoglycémie, intoxication au plomb, divers troubles neurologiques avec ou sans retard mental.

### Pathologies psychiatriques

Autisme, dépression ou manie, environnement social perturbé, comportement oppositionnel.

### Traitement

#### Approche familiale

Informations et soutien adaptés aux familles : guidance interactive.

#### Abord psychothérapique

Il vise à diminuer l'agitation motrice, améliorer le contrôle des impulsions et de la coordination motrice, améliorer les interactions sociales. Il associe prise en charge de groupe et thérapie individuelle.

#### Traitement médicamenteux

Controversé, c'est un appoint à l'abord psychothérapique, surtout en cas d'hyperactivité invalidante.

En traitement de fond, on peut dans certains cas utiliser après l'âge de 6 ans un **psychostimulant, méthylphénidate (RITALINE)** : 0,3 mg/kg/j en 2 prises à distance des repas ; puis augmenter progressivement en plusieurs semaines jusqu'à 0,5 à 1 mg/kg/j (maximum 2 mg/kg/j). Prescription réservée aux neurologues, psychiatres, pédiatres (prescription hospitalière initiale). Ce traitement est efficace dans 75 % des cas dans les 15 j ; l'amélioration des résultats scolaires semblerait toutefois de courte durée dans beaucoup de cas. Ce traitement peut être prolongé plusieurs mois ou années ; le suivi peut être optimisé avec des échelles de comportement.

### Évolution

#### Risque important

- Persistance des symptômes à l'adolescence, voire à l'âge adulte.
- Échec scolaire.
- Comportement antisocial.
- Abus des substances toxiques.

#### Facteurs de bon pronostic

- Statut économique et social élevé.
- Bon niveau intellectuel.
- Bonne acceptation de la part de l'entourage.
- Absence d'agressivité.

Plus les symptômes sont importants et durent longtemps, moins le pronostic est bon, d'où l'importance d'un traitement précoce efficace.

**SOMMEIL DE L'ENFANT (TROUBLES DU)****Insomnies****Étiologie**

- *Rechercher une cause exogène*
  - Pathologie intercurrente (asthme, allergie alimentaire, poussée dentaire, coliques, etc.).
  - Cause environnementale (bruit, etc.).
  - Erreurs de régime chez le nourrisson.
- *Rechercher une cause psychologique*
  - Peurs du coucher (obscurité, fantômes, etc.).
  - Angoisse de séparation.
  - Relation opposante avec les parents.
  - S'assurer de l'absence de maladie psychiatrique sous-jacente.

**Traitement**

Le plus souvent, des mesures éducatives simples et un soutien psychologique permettent de bien améliorer la situation (veilleuse la nuit, porte entrouverte, comportement adapté des parents, respect des rites d'endormissement, etc.). En cas d'échec, si l'insomnie est mal vécue par l'enfant, il est possible d'utiliser un traitement médicamenteux sur une courte durée, par exemple **anti-histaminique H<sub>1</sub>, niaprazine (NOPRON)** : 1 mg/kg/j (30 mg maxi) en 1 prise le soir (réserver à l'enfant de plus de 3 ans). Ne pas utiliser d'**hypnotiques** puissants, dont les effets secondaires sont trop importants.

**Parasomnies****Cauchemars**

Très fréquents entre 3 et 5 ans, survenant dans le sommeil paradoxal, ils ne nécessitent un traitement qu'en cas de troubles sous-jacents relevant d'une psychothérapie.

**Terreurs nocturnes**

Elles touchent les enfants de 3 à 6 ans : éveil brutal survenant en sommeil lent profond 1 à 3 h après l'endormissement, avec peur intense, hallucinations, impossibilité de contact, amnésie de l'épisode qui dure de quelques secondes à plusieurs minutes.

Les épisodes peu fréquents ne nécessitent pas de traitement, mais leur répétition peut faire envisager une prise en charge comportementale (relaxation, hypnose, etc.).

**Somnambulisme**

Fréquent, il débute souvent entre 4 et 8 ans. Le somnambulisme ne nécessite pas de traitement sauf dans les formes sévères avec épisodes répétés, déambulation prolongée (> 10 minutes), prise de risques faisant craindre la survenue d'un accident.

On propose alors une prise en charge comportementale (relaxation, hypnose, etc.), voire exceptionnellement après 6 ans un traitement médicamenteux par exemple **antidépresseur tricyclique, imipramine (TOFRANIL)** : 10 à 30 mg le soir au coucher.

**Somniloquie (paroles plus ou moins compréhensibles), bruxisme (grincement des dents)**

Fréquents, ils ne nécessitent habituellement pas de traitement. Chez le grand enfant (2<sup>e</sup> dentition), le bruxisme peut nécessiter une gouttière plastique la nuit pour éviter des anomalies de positionnement dentaire.

**Rythmies d'endormissement**

Elles sont fréquentes. Se poser la question d'un terrain psychiatrique si elles persistent au-delà de 3 ans.

## CARDIOPATHIES CONGÉNITALES - INSUFFISANCE CARDIAQUE (1)

### Cardiopathies

#### Anomalie de connexion des vaisseaux

- Transposition des gros vaisseaux.
- Retour veineux pulmonaire anormal total.

#### Cardiopathies obstructives droites (baisse du débit pulmonaire)

- Sténose ou atrésie pulmonaire avec ou sans CIV.
- Tétralogie de Fallot.

#### Cardiopathies obstructives gauches (baisse du débit systémique)

- Coarctation de l'aorte.
- Sténose aortique.
- Hypoplasie du cœur gauche.

#### Shunts massifs intra ou extracardiaques

- Fistules artério-veineuses périphériques.
- Tronc artériel commun.
- Artère pulmonaire gauche aberrante.

#### Traitement

La plupart des cardiopathies congénitales sont bien supportées avant la naissance ; mais la fermeture du foramen ovale et du canal artériel dans les minutes, heures ou jours suivant la naissance, impose un traitement chirurgical plus ou moins urgent. Ce traitement, curatif ou palliatif, est à envisager en centre spécialisé.

Le traitement d'attente de la chirurgie comprend :

- le traitement de l'insuffisance cardiaque (cf. Insuffisance cardiaque) ;

- dans les cardiopathies ducto-dépendantes, l'utilisation de **prostaglandines**, **alprostadil (PROSTINE VR)** : 0,025 µg/kg/min en IV continue pour maintenir le canal artériel ouvert et éviter une décompensation brutale. La **PROSTINE** maintient également l'aorte ouverte dans les coarctations de l'aorte.

- Débuter ce traitement en urgence devant une transposition des gros vaisseaux en attente d'une atrioseptomie de Rashkind (urgente +++), une cardiopathie cyanogène mal tolérée, un choc cardiogénique avec pouls fémoraux abolis chez le nouveau-né.

- Prévoir matériel pour intuber et ventiler l'enfant en raison du risque d'apnées sous **PROSTINE**.

### Insuffisance cardiaque du nourrisson

#### Étiologies

- Cardiopathies congénitales :
  - obstacles à l'éjection (palper les pouls fémoraux +++);
  - augmentation de débit, notamment persistance du canal artériel, CIV ;
  - insuffisance valvulaire mitrale ou aortique.
- Myocardiopathies métaboliques, infectieuses, toxiques, etc.
- Ischémie myocardique post-anoxique ou secondaire à une anomalie coronaire.
- Poussée d'HTA.
- Troubles du rythme ou de conduction cardiaque :
  - tachycardie supraventriculaire ;
  - TV, torsades de pointes ;
  - BAV complet.

## CARDIOPATHIES CONGÉNITALES - INSUFFISANCE CARDIAQUE (2)

### Bilan

- Radiographie de thorax.
- ECG.
- Échographie cardiaque + Doppler : permet de faire le diagnostic et d'évaluer le retentissement.
- Gaz du sang, lactates, troponine.
- Groupe Rh RAI, NFS plaquettes, ionogramme sanguin, calcémie, hémostase, transaminases.

### Traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë

#### ► Mesures générales

- Hospitalisation en unité de soins intensifs, mise en proclive.
- Oxygénothérapie nasale voire intubation + ventilation ± sédation pour diminuer la consommation en oxygène.
- Arrêt alimentaire, sonde gastrique, perfusion : glucosé 5 % + **électrolytes** : 60 mL/kg/j (restriction hydrique et restriction sodée initiale). En l'absence de signes de choc, reprendre rapidement une alimentation par gavage gastrique pour permettre un apport calorique satisfaisant.
- Lutte contre l'œdème pulmonaire
- **Diurétiques, furosémide (LASILIX)** : 1 mg/kg en IVL 15 min renouvelable.
- Médicaments tonocardiaques : en

contexte aigu, utilisation de **dobutamine** : 5 à 20 µg/kg/min en perfusion continue voire **tonocardiaque**, **milrinone (COROTROPE)** 50 µg/kg en IV sur 10 min puis 25 à 45 µg/kg/h.

#### ► Mesures spécifiques

- Ponction d'un épanchement péricardique en cas de tamponnade.
- **Prostaglandines, alprostadil (PROSTINE VR)** : en cas de suspicion de cardiopathie ducto-dépendante (cf. Traitement des cardiopathies) ; elle a en plus une action vasodilatatrice.
- Traitement d'une HTA.

#### ► En cas de gros canal artériel persistant

- Attendre la fermeture spontanée, si bien toléré.
- Cure d'**AINS, indométacine (INDOCID)** : 0,2 mg/kg à H0, ± 0,1 mg/kg à H24 et H48 si besoin (fermeture du canal par inhibition de la synthèse de prostaglandines) ; contre-indiquée en cas d'entérocolite, d'insuffisance rénale, de troubles de la coagulation, d'ictère intense.

Arrêter l'alimentation, restreindre les apports hydriques et surveiller la diurèse pendant l'administration.

- Ligature chirurgicale en cas d'échec de l'**INDOCID** et insuffisance cardiaque importante.

## CARDIOPATHIES CONGÉNITALES - INSUFFISANCE CARDIAQUE (3)

► En cas de trouble du rythme ou de conduction

Réduire le trouble en urgence si mal toléré puis demander un avis spécialisé ; faire un ionogramme sanguin (kaliémie, calcémie +++).

- Bradycardie extrême, bloc auriculo-ventriculaire : **anticholinergique, atropine (ATROPINE)** : 20 µg/kg IVD renouvelable, voire pose d'un pacemaker.

- Tachycardie supraventriculaire : **antiarythmique, adénosine triphosphate (STRIDYNE)** : 1 à 2 mg/kg IVD (20 mg maximum), voire cardioversion si très mauvaise tolérance.

- Tachycardie ventriculaire : selon l'urgence cardioversion ou **antiarythmique, lidocaïne (XYLOCAÏNE)** : 1 mg/kg IVDL.

### Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique

Restriction hydrosodée.

Médicaments utilisables après avis spécialisé :

- **LASILIX** : 1 à 2 mg/kg/j en 2 prises *per os*.

- **Tonicardiaques, digoxine (DIGOXINE)** *per os* :

#### Posologie de la digoxine chez l'enfant

- < 12 kg : 15 µg/kg puis 15 µg/kg/j en 2 ou 3 prises.
- 12 à 24 kg : 10 µg/kg puis 10 µg/kg/j en 2 ou 3 prises.
- > 24 kg : 7 µg/kg puis 7 µg/kg/j en 2 ou 3 prises.

En cas d'utilisation intraveineuse (insuffisance cardiaque aiguë, en l'absence de choc), multiplier par 0,7 les doses orales.

En cas d'inefficacité ou de suspicion de surdosage, effectuer un taux sérique à H8 d'une prise (taux thérapeutique 0,5 à 2,5 µg/L).

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion, énalapril (RENITEC)** : 0,3 à 1 mg/kg/j en 1 ou 2 prises *per os* ; posologie à atteindre progressivement, surveiller fonction rénale et kaliémie.

## MALADIE DE KAWASAKI

### Généralités

Il s'agit d'une vascularite aiguë, systémique d'origine inconnue, décrite au Japon en 1967, touchant surtout les nourrissons et les jeunes enfants

### Diagnostic

À évoquer devant toute fièvre > 5 j chez l'enfant surtout en cas d'altération de l'état général.

#### Critères diagnostiques

- Fièvre > 5 j
- Éruption cutanée non spécifique
- Conjonctivite bilatérale aseptique
- Atteinte muqueuse : chéilite, pharyngite, glossite
- Modification des extrémités : érythème palmo-plantaire, œdème des mains ou des pieds
- Adénopathies cervicales de diamètre > 15 mm

Le diagnostic est retenu en présence d'au moins 4 des 5 autres critères que la fièvre.

Il existe de nombreuses formes incomplètes ou atypiques. En l'absence d'autre pathologie pouvant expliquer les symptômes, la résolution de la fièvre et l'amélioration spectaculaire de l'état général après traitement d'épreuve par **immunoglobulines polyvalentes** peuvent être considérées comme un bon critère diagnostique. Dans ce cas, la desquamation péri-unguéal des doigts et des orteils survenant vers J10-J15 est aussi un critère diagnostique rétrospectif.

### Bilan biologique et radiologique

Aucun examen n'est spécifique de la maladie de Kawasaki.

Il existe toujours un syndrome inflammatoire important avec polynucléose neutrophile et CRP élevée.

On recherchera également une cytolysé hépatique et une augmentation des  $\gamma$ GT, une hypoalbuminémie (péjoratif), une leucocyturie aseptique, une méningite asep-

tique. Une thrombocytose importante est constante mais retardée vers J10-J15.

L'échographie abdominale peut mettre en évidence un hydrocholécyste.

L'ECG recherche des troubles du rythme.

L'échocardiographie, à réaliser une fois par semaine pendant 6 semaines, recherche une péricardite, une myocardite ou une endocardite à la phase initiale ; une dilatation ou des anévrysmes des coronaires à la phase secondaire.

### Traitement

Il permet la résolution rapide de la fièvre et des signes cliniques mais surtout prévient l'apparition des lésions cardiaques s'il est administré dans les 10 j après le début de la fièvre :

- **immunoglobulines polyvalentes (TÉGÉ-LINE)** : 2 g/kg en IVL sur au moins 6 h (risque de choc immuno-allergique) ;

- associées à **acétylsalicylate de lysine (ASPÉGIC)** à dose anti-inflammatoire (80 à 100 mg/kg/j en 4 prises) jusqu'à normalisation de la CRP puis à dose antiagrégante (5 à 10 mg/kg/j en 1 prise) pendant au moins 3 mois et plus si lésion coronaire.

En cas de persistance des symptômes après une première cure d'**immunoglobulines polyvalentes**, une deuxième dose doit être administrée, puis on peut essayer des bolus de **corticoïdes** en IV, voire des immunosuppresseurs.

### Évolution

En l'absence de traitement, des lésions coronaires surviennent dans 20 % des cas avec risque de décès par trouble du rythme, thrombose ou rupture et risque de séquelles définitives (1 fois sur 2) constituant la première cause de cardiopathie acquise en France.

Après traitement, le risque d'atteinte coronaire diminue à moins de 5 %. Un suivi échocardiographique est indispensable pendant au moins un an ou plus si atteinte coronaire.



## HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) DE L'ENFANT (1)

Mesure au repos, en position allongée, avec brassard recouvrant les 2/3 du bras. Nécessité de plusieurs mesures dans ces conditions. Se méfier des HTA transitoires (syndrome douloureux, hypercapnie, HTIC, etc.).

Définition de l'HTA (selon les percentiles [1] :

- **HTA limite** : entre le 90<sup>e</sup> et le 95<sup>e</sup> p.

- **HTA confirmée** : > 95<sup>e</sup> p.

- **HTA menaçante** : > 99<sup>e</sup> p. + 5 mmHg

En pratique, points de repère pour HTA menaçante, avec risque d'encéphalopathie hypertensive, nécessitant un traitement immédiat :

- nouveau-né : PAS > 120 mmHg, PAD > 85 mmHg ;

- 6 sem.-4 ans : PAS > 140 mmHg, PAD > 95 mmHg ;

- 4-18 ans : normes selon la taille :

- 120 cm : PAS > 150 mmHg, PAD > 105 mmHg

- 160 cm : PAS > 170 mmHg, PAD > 110 mmHg.

### Étiologies principales

#### Causes

► **Causes rénales (60 %)**

- Glomérulonéphrites aiguës et glomérulopathies chroniques.

- Syndrome hémolytique et urémique.

- Polykystose rénale, tumeur rénale ou périrénale.

- Insuffisance rénale aiguë ou chronique.

- Hypoplasies segmentaires, reins cicatriciels de pyélonéphrites.

- Sténose de l'artère rénale (15 % environ des HTA), qu'elle soit idiopathique ou intégrée dans une maladie générale (Recklinghausen, dysplasie fibromusculaire, etc.).

En rapprocher les compressions extrinsèques et les thromboses de l'artère rénale du nouveau-né.

- **Coarctation de l'aorte (15 %)**

- **Phéochromocytome (1 %)**

- **Causes endocriniennes et métaboliques**

Syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme, hyperthyroïdie, déficit en 11-hydroxylase, hypercalcémie, hypercapnie.

- **Causes toxiques et médicamenteuses**

Plomb, mercure, gouttes nasales vasoconstrictives, corticothérapie, **AINS**, érythropoïétine, réglisse, etc.

- **Idiopathique (15 à 20 %)**

Il s'agit le plus souvent dans ce cas d'un adolescent asymptomatique en surpoids avec une HTA modérée.

#### Bilan étiologique

- **HTA limite (intérêt du Holter tensionnel)**

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine, calcémie, glycémie.
- Uricémie, profil lipidique.
- T4, TSH.
- Recherche de protéinurie, hématurie, glycosurie.
- Échographie rénale.

- **HTA confirmée**

Poursuivre la recherche étiologique, selon l'orientation du bilan initial.

- Catécholamines urinaires et dérivés métoxylés, voire scanner abdominal.
- Écho-Doppler rénal, et au moindre doute angio-scanner ou angio-IRM voire artériographie.
- Échographie cardiaque (crosse de l'aorte ++).
- Aldostérone, ARP.
- Cortisol libre urinaire.
- Ponction biopsie rénale en cas de doute sur une néphropathie.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) DE L'ENFANT (2)****Complications****Chroniques**

- Retard de croissance staturo-pondérale.
- Rétinopathie hypertensive.
- Néphropathie hypertensive.
- Hypertrophie ventriculaire gauche.

**Aiguës**

- Manifestations hémorragiques (épistaxis ++).
- Cérébrales : céphalées, vertiges, bourdonnements, paresthésie, ou plus grave : convulsions, hémiplégie, paralysie faciale, amaurose, coma (encéphalopathie hypertensive).
- Insuffisance cardiaque aiguë.

**Bilan de surveillance du retentissement**

- Fond d'œil.
- Échographie cardiaque, ECG, radiographie de thorax.
- Recherche protéinurie, glycosurie.

**Traitement de la crise d'HTA****Moyens**

- **Inhibiteurs calciques, nifédipine (ADALATE)** : par voie orale : 0,25 à 0,5 mg/kg (contre-indication +++ avant 6 mois).
- **Inhibiteurs calciques, nicardipine (LOXEN)** : en IV continue 1 à 3 µg/kg/min (si urgence vitale, bolus initial de 10 à 20 µg/kg en 10 min).
- **bêtabloquants, labétalol (TRANDATE)** : en IV continue 0,25 à 3 mg/kg/h (si urgence

vitale, bolus initial de 0,3 à 1 mg/kg (maximum 20 mg) en 10 min).

**Indications**

► *HTA peu symptomatique*

**ADALATE** per os ; préférer la forme LP (couper et écraser les cp avant 6 ans) : maximum 1 mg/kg/prise et 3 mg/kg/j.

► *Insuffisance cardiaque*

**LOXEN** IV + **diurétiques, furosémide (LASILIX)** : 1 à 2 mg/kg IVL 30 min renouvelable.

► *Encéphalopathie hypertensive*

**TRANDATE** et/ou **LOXEN** en IV.

► *Sténose de l'artère rénale*

**LOXEN** IV qui permet une baisse de PA plus contrôlée qu'**ADALATE**. En effet il existe un risque de thrombose sur chute tensionnelle rapide.

► *Phéochromocytome*

Préférer un **bêtabloquant (TRANDATE)** en IV.

► *HTA par surcharge hydrosodée*

En cas de non-réponse à une restriction hydrosodée majeure et de fortes doses de **LASILIX** (jusqu'à 10 mg/kg/j), proposer une épuration extra-rénale.

► *Nouveau-né*

**LOXEN** IV pour éviter les chutes de PA brutales.

**Contre-indication de l'ADALATE à action immédiate avant 6 mois.**

**Objectif**

Obtenir une PA non menaçante en 1 h, normale en 24 à 48 h.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) DE L'ENFANT (3)****Traitement de fond****Traitement étiologique**

Chirurgical en cas de phéochromocytome, de coarctation de l'aorte. Chirurgie ou angioplastie endoluminale percutanée en cas de sténose de l'artère rénale.

**Règles hygiénodététiques**

Activité physique, correction de l'obésité, régime sans supplément de sel (2 à 3 mEq/kg/j).

**Médicaments**

- **bêtabloquants, acébutolol (SECTRAL)** : 10 à 20 mg/kg/j en 2 prises.

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion, énalapril (RENITEC)** : 0,25 à 0,75 mg/kg/j en 1 prise. Prudence en cas de sténose de l'artère rénale ou d'insuffisance rénale ; surveillance créatininémie.

- **Inhibiteurs calciques, nifédipine (ADALATE LP)** : 1 à 3 mg/kg/j en 2 ou 3 prises.

Traitement initial par monothérapie (dose d'entretien atteinte progressivement sur 3 j). Les traitements par IEC ou par **bêta-bloquants** sont les plus efficaces (70-80 % de normalisation de la PA). Associer 2 médicaments en cas d'échec d'une monothérapie à pleine dose avec bonne compliance.

**CONSENSUS**

[1] Management of high blood pressure in children and adolescents : recommendations of the European Society of Hypertension, *ESH*, 2009

## ASTHME DE L'ENFANT (1)

Dans tous les cas, **antitussifs** et **sédatifs** sont contre-indiqués.

### Évaluation de la sévérité

Reconnaître une crise sévère ou à haut risque :

#### Interrogatoire

- Antécédents de crises sévères (séjour en USI ++).
- Fortement symptomatique dans le mois précédent.
- Corticodépendance, crise survenant sous **corticoïdes** systémiques.
- Arrêt récent ou mauvaise observance du traitement de fond.

#### Examen clinique

- Difficultés pour parler.
- Polypnée intense ( $> 50/\text{min}$  avant 5 ans,  $> 40/\text{min}$  après 5 ans), tirage important.
- Tachycardie ( $> 140/\text{min}$  avant 5 ans,  $> 120/\text{min}$  après 5 ans), sueurs, HTA.
- DEP  $< 50\%$  de la normale.
- Mauvaise réponse aux **bronchodilatateurs**.

**Gaz du sang : normo- ou hypercapnie ++**

**Signes de gravité extrême imposant une hospitalisation en USI (transfert par Samu)**

- Murmure vésiculaire aboli, absence de sibilants.
- Irrégularités respiratoires, épuisement.
- Cyanose, désaturation
- Emphysème sous-cutané, pneumomédiastin, pneumothorax.
- Troubles de conscience.
- Bradycardie, hypotension.

### Traitement de la crise [1]

#### Traitement de la crise usuelle

- **Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -adrénergiques**, salbutamol (**VENTOLINE**) : 2 à 4 bouffées avec chambre d'inhalation, renouvelable 3 fois en 60 min.

- Si insuffisant, adjoindre des **corticoïdes de synthèse**, prednisone (**CORTANCYL**) : 1 à 2 mg/kg en 1 prise (60 mg maximum).
- Apprécier l'efficacité (remettre un protocole écrit de gestion de la crise aux parents avec notamment les valeurs de DEP) :
  - échec : transfert en milieu hospitalier, tout en répétant les bouffées de **VENTOLINE** ;
  - succès (DEP  $> 80\%$  des valeurs usuelles) : poursuivre à domicile **VENTOLINE spray** : 2 bouffées x 4/j, pendant 3-4 j puis décroissance sur 1 sem., **CORTANCYL** (si institué pour traiter la crise) : 1 à 2 mg/kg/j (maximum 60 mg) en 1 prise le matin pendant 5 à 7 j. Kinésithérapie respiratoire.

#### Traitement de la crise sévère

L'asthme tue.

Les effets secondaires graves des traitements de la crise d'asthme sont exceptionnels.

= NE PAS « SOUS-TRAITER »

Aux urgences, bilan ne devant pas retarder le traitement :

- Saturation, voire GDS selon clinique.
- DEP (*peak flow*) avant et après  **$\beta_2$ -adrénergiques** (après 6 ans si paramètre habituellement surveillé).
- Radio de thorax si fièvre élevée, asymétrie auscultatoire, doute diagnostique, crainte d'une complication.

- **Bronchodilatateurs**, salbutamol (**VENTOLINE**) : solution pour nébulisations : 0,1 à 0,15 mg/kg (unidoses de 1,25 mg ou 2,5 mg ou 5 mg pour 2,5 mL),  $\pm$  **ipratropium bromure (ATROVENT)** unidoses de 2 mL = 250  $\mu\text{g}$  un aérosol sur 2 (remplacer par 2 mL de sérum physiologique en alternance) si  $\text{SpO}_2 < 95\%$ . Nébuliser avec  $\text{O}_2$  6 L/min. Nébuliser 3 aérosols par heure pendant 1 à 2 heures.
- **Corticoïdes de synthèse**, prednisone (**CORTANCYL**) : 2 mg/kg en 1 prise *per os*. Réévaluation +++ (FC, FR, PA, saturation, DEP, signes de lutte, auscultation).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la crise d'asthme de l'enfant (nourrisson inclus) Recommandations pour la pratique clinique, SP2A/GRAPP, 2006

## ASTHME DE L'ENFANT (2)

► *Amélioration franche après les premiers aérosols, persistant après espacement des aérosols et 3 h de surveillance*

Retour à domicile si le contexte le permet (pas d'antécédent d'hospitalisation en USI, pas d'asthme instable sur le dernier mois, contexte social favorable) avec :

- **VENTOLINE spray** : 2 bouffées x 4/j pendant 3-4 j puis décroissance sur 7 j ;
- **CORTANCYL** 1 à 2 mg/kg/j en 1 prise matinale pendant 5 à 7 j ;
- Kinésithérapie respiratoire.
- Revoir le traitement de fond.

► *Stabilisation avec persistance de signes de lutte*

- Hospitalisation.
- Oxygénothérapie pour saturation > 94 %.
- Bonne hydratation : 2,2 L/m<sup>2</sup>/j.
- **CORTANCYL** 1 à 2 mg/kg/j en 1 prise par jour.
- Poursuivre les nébulisations de **VENTOLINE** en continu jusqu'à disparition de tout signe de gravité puis toutes les 3 à 4 h, puis adapter la fréquence à la clinique (sevrage progressif avec relais par **VENTOLINE spray**).
- Kinésithérapie respiratoire en phase sécrétante (après levée du spasme).
- Antibiothérapie en cas d'infection pulmonaire associée.

► *Aggravation (ou d'emblée, si très sévère)*

- Hospitalisation en USI (**la résistance au traitement définit l'état de mal asthmatique**).

### Bilan

- Radio de thorax.
- Gaz du sang.
- NFS, CRP.
- Ionogramme sanguin.

- Oxygénothérapie nasale.
- Arrêt alimentaire. Perfusion 2 L/m<sup>2</sup>/j (glucosé 5 % + électrolytes).

- **Corticoïdes de synthèse**, méthylprednisolone (**SOLUMÉDROL**) : 0,5 à 1 mg/kg IVD toutes les 6 h.

- Nébuliser en continu en **doublant** voire triplant les doses de **salbutamol**, soit pour une préparation à nébuliser sur 2 h : 2 mg/kg de **salbutamol** + 750 µg d'**ipratropium bromure** dans du sérum physiologique qsp 30 mL.

- Sulfate de Magnésium IV : 40 mg/kg (maximum 2g) en IVL sur 20 min.

- Si échec, débiter **salbutamol** IV : 0,5 à 3 µg/kg/min, à diminuer dès amélioration (surveiller la kaliémie, la tachycardie obligeant à refléter avant tout la sévérité de la crise et ne doit pas faire diminuer le traitement).

- Antibiothérapie si infection associée : **aminopénicilline**, amoxicilline (**CLAMOXYL**) : 100 mg/kg/j en 3 inj. IVDL et/ou **josamycine** (**JOSACINE**) : 50 mg/kg/j en 2 prises *per os*.

- Surveillance

- Scope, FC, PA, T°C.

- FR, saturation, signes de lutte.

- GDS.

- Kaliémie.

- Radiographie thoracique.

- En cas d'échec de ce traitement : intubation + ventilation assistée.

### Complications de la crise

- Risque d'arrêt cardiorespiratoire dans les crises très sévères. Les décès par asthme sont très souvent consécutifs à une maladie de fond mal contrôlée ou une crise insuffisamment traitée.

- Emphysème sous-cutané, pneumothorax, pneumomédiastin.

- Troubles de ventilation (atélectasies, emphysème obstructif).

Dans tous les cas, chercher un facteur déclenchant à la crise et réévaluer le traitement de fond.

## ASTHME DE L'ENFANT (3)

### Traitement de fond [2]

#### Thérapeutique inhalée

- > 5 ans : inhalateur de poudre ou chambre d'inhalation.
- À l'adolescence : aérosol doseur conventionnel.

Importance d'évaluation de la technique ++.

#### Contrôle de l'environnement

- Lutte contre les acariens : suppression moquette, tapis, etc., diminution de l'humidité (aération), housse antiacariens, acaricides, etc.
- Éloignement des animaux domestiques.
- Lutte contre les blattes.
- Diminution des contacts avec les pollens, les moisissures (environnement humide).
- Suppression du tabagisme passif.

#### Asthme de l'enfant (> 2 ans)

Dans tous les cas, contrôle de l'environnement (acariens, animaux, tabagisme passif, etc.) ; et réévaluation régulière des symptômes pour revoir le traitement à la hausse ou à la baisse selon l'évolution. Remplir un projet d'accueil individualisé (PAI) pour que l'enfant puisse bénéficier rapidement d'une prise en charge adaptée en cas de crise inopinée survenant à l'école.

#### ➤ Asthme intermittent

- Symptômes diurnes survenant moins d'une fois/sem.
- Symptômes nocturnes survenant moins de 2 fois/mois.
- Activité non restreinte.
- DEP > 80 % de la valeur théorique, variations circadiennes < 20 %.

**Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants, salbutamol (VENTOLINE) inhalé à la demande :** 2 bouffées en cas de crise, renouvelable à

3-4 reprises sur 1 h ; consulter si la crise ne s'améliore pas.

#### ➤ Asthme persistant léger

- Symptômes diurnes survenant plus d'une fois/sem. mais moins d'une fois/j (soit 2 à 6 symptômes/sem.).
- Symptômes nocturnes survenant plus de 2 fois/mois mais moins d'une fois/sem. (soit 2 à 3 symptômes/mois).
- Activité non restreinte.
- DEP : 60 à 80 % de la valeur théorique, variations circadiennes 20 à 30 %.

- **Corticoïdes inhalés, bécloéthasone dipropionate (BÉCOTIDE 250) :** 1 bouffée x 2/j.
- **+ Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants, salbutamol (VENTOLINE) inhalé à la demande.**
- En cas de monosensibilisation aux pollens ou aux acariens ou aux moisissures suivantes (*Alternaria*, *Cladosporium*), possibilité d'entreprendre une désensibilisation si les symptômes se maintiennent depuis plus de 2 ans. La désensibilisation est réévaluée après 6 mois et poursuivie uniquement si elle est efficace.

#### ➤ Asthme persistant modéré

- Symptômes diurnes survenant plus d'une fois/j.
- Symptômes nocturnes survenant plus d'une fois/sem.
- Activité gênée.
- DEP entre 60 et 80 % de la valeur théorique, variations circadiennes > 30 %.

- **Corticoïdes inhalés, fluticasone dipropionate (FLIXOTIDE 50),** 1 bouffée x 2/j.
- **+ Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants de longue durée d'action (AMM > 4 ans), formotérol (FORADIL) inhalés,** poudre pour inhalation : 1 dose x 2/j ; ou **inhibiteur des récepteurs des leucotriènes** (après 6 ans), **montélukast (SINGULAIR) :** 1 cp. à 4 mg avant 5 ans et 5 mg après, le soir à distance du repas.
- **+ Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants à la demande.**

### CONSENSUS

[2] Asthme de l'enfant de moins de 36 mois (en dehors des épisodes aigus), HAS, 2009

## ASTHME DE L'ENFANT (4)

### ► Asthme persistant sévère

- Symptômes diurnes quasi permanents.
- Symptômes nocturnes fréquents.
- Activité limitée.
- DEP < 60 % de la valeur théorique, variations circadiennes > 30 %.

- **Corticoïdes inhalés, BÉCOTIDE 250 ou FLIXOTIDE 50** : 2 bouffées x 2/j.
- + **Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants de longue durée d'action (AMM > 4 ans), salmétérol (SEREVENT) inhalés, spray** : 2 bouffées x 2/j (ou **DISKUS 1** dose x 2/j).
- $\pm$  **Inhibiteur des récepteurs des leucotriènes** (après 6 mois), **montélukast (SINGULAIR)** : 1 cp. à 4 mg avant 5 ans et 5 mg après, le soir à distance du repas.
- + **Bronchodilatateurs  $\beta_2$ -stimulants, salbutamol (VENTOLINE) inhalé à la demande.**
- En résumé, si les **corticoïdes** ne réduisent pas suffisamment les symptômes, plutôt que d'augmenter trop leur dose, il vaut mieux associer un **bronchodilatateur  $\beta_2$ -stimulant de longue durée d'action** et/ou un **inhibiteur des récepteurs des leucotriènes**.
- Il existe des associations fixes de **corticoïde** et de **bronchodilatateur  $\beta_2$ -stimulant de longue durée d'action** : **budésonide + formotérol (SYMBICORT TURBUHALER)** ; ou **fluticasone + salmétérol (SERETIDE SPRAY ou DISKUS)**.
- Associer des  **$\beta_2$ -stimulants de courte durée d'action aux corticoïdes inhalés** :
  - systématiquement les premières semaines ou mois de traitement puis seulement à la demande ;
  - au long cours dans les asthmes très sévères ; utiliser alors les dérivés à longue durée d'action.
- La corticothérapie orale n'est quasiment plus utilisée au long cours, mais juste en traitement d'appoint lors des crises. La **théophylline**, abandonnée dans le traitement de la crise, n'est également presque plus utilisée en traitement de fond.

### ► Éducation des parents et des patients [3]

Il faut essayer de dépister les décompensations sur de petits signes avant la crise, afin de prévenir sa survenue. Un DEP

### Asthme du nourrisson

- **Traitement de fond : mesures générales**
  - Lutte contre le tabagisme passif.
  - Retrait éventuel de la crèche collective.
  - Éviction des allergènes.
  - Traitement d'une carence martiale, d'un reflux gastro-œsophagien, etc.

### ► Asthme bénin :

- Traitement au coup par coup par **VENTOLINE** (spray + chambre d'inhalation).

### ► Asthme modéré : 1 crise par mois plus épisodes de toux nocturne

- **Béclométasone dipropionate (BÉCOTIDE 250)**, 1 bouffée x 2/j (avec chambre d'inhalation).
- Association à **VENTOLINE** dans les périodes de bronchospasme important.

### ► Asthme sévère : crises > 1 fois/mois et/ou manifestations intercrises plusieurs fois/sem.

- **BÉCOTIDE** : 500 à 1 000  $\mu\text{g/j}$  avec chambre d'inhalation.
- Si **BÉCOTIDE** insuffisamment efficace : nébulisation de **corticoïdes inhalés**, **budésonide (PULMICORT)** : 0,5 à 1 mg x 2/j, administré avec un générateur d'aérosol à air comprimé.
- **VENTOLINE** à la demande, en chambre d'inhalation ou en nébulisation également.

Après 3 mois de stabilisation, essai de diminution avec recherche de la posologie minimale efficace (on peut souvent réduire le traitement pendant la période estivale du fait de la fréquence des viroses comme facteur déclenchant des crises).

### Asthme d'effort

Inhalation 10 à 15 min avant l'effort : 2 bouffées de **VENTOLINE**.

On peut aussi utiliser, après 6 ans, **montélukast (SINGULAIR)** : 5 mg/j.

### CONSENSUS

- [3] Éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique, *Anaes*, 2002

**OTITES DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (1)**

(Cf. chapitre ORL)

**Principaux germes :**

- *Haemophilus influenzae* (30 à 40 %).
- *Streptococcus pneumoniae* (25 à 40 %).
- *Moraxella catarrhalis* (10 à 15 %).
- Streptocoque A, staphylocoque, etc. (< 5 %).
- *Pseudomonas aeruginosa* (chez le nouveau-né uniquement).

**Distinction de 3 stades**

- Otite congestive.
- Otite suppurée collectée.
- Otite suppurée avec otorrhée spontanée.

**Particularités cliniques selon le germe**

- *Haemophilus* : fièvre modérée, conjonctivite.
- Pneumocoque : fièvre élevée, otalgie intense.

**Principaux diagnostics différentiels**

- Otite séreuse (tympa mat, épanchement souvent translucide rétrotympanique).

• Myringite aiguë (virale ++, phlyctène translucide ou hémorragique sur le tympan).

- Otite externe (otalgie ++, CAE inflammatoire, tympan normal).

**Complications**

- Mastoïdite.
- Paralysie faciale.
- Labyrinthite.
- Méningite.
- Abscess cérébral.
- Thrombophlébite du sinus latéral.
- Otite séroumuqueuse.

**Facteurs favorisants des otites à répétition**

- Vie en collectivité (crèche).
- Hypertrophie des végétations.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Immunodépression.
- Tabagisme passif.
- Carence martiale.

**Facteurs de risque de pneumocoque de sensibilité diminuée à pénicilline (PSDP)**

- Vie en collectivité (crèche).
- Otite récente.
- Traitement antibiotique récent.
- Âge < 24 mois.



## OTITES DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (2)

### Traitement [1]

- **Antalgiques, antipyrétiques** (paracétamol, ibuprofène, codéine).
- Gouttes auriculaires antalgiques (**OTIPAX, PANOTILE**) : 3 instillations/j ; dans les otites congestives, en l'absence de perforation tympanique.
- Désinfection rhinopharyngée (sérum physiologique) si besoin.
- Antibiotiques (durée 8 à 10 j avant 2 ans, 5 jours après 2 ans) ; systématiques avant 2 ans, seulement si forme hyperalgique, très fébrile ou prolongée après 2 ans.

### Otite de découverte récente non traitée

#### ► En première intention

**Amoxicilline (CLAMOXYL)** : 80-90 mg/kg/j en 2 ou 3 prises *per os*.

Sauf si conjonctivite purulente associée à l'otite : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j en 3 prises (dose poids x 3/j) *per os*.

#### ► En cas d'allergie à l'amoxicilline

**Cefpodoxime proxétile (ORELOX)** : 8 mg/kg/j en 2 prises (dose poids x 2/j) *per os*.

#### ► En cas d'allergie à l'amoxicilline et aux céphalosporines

**Cotrimoxazole (BACTRIM)** 30 mg/kg/j en 3 prises *per os*.

**Érythromycine sulfafurazole (PÉDIAZOLE)** 50 mg/kg/j en 3 prises *per os*.

#### ► En cas d'intolérance alimentaire associée

Possibilité de traitement par une injection unique (IM ou IV) de **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** 50 mg/kg.

Dans tous les cas, en cas d'évolution favorable, le contrôle otoscopique en fin de traitement n'est pas indispensable.

**En l'absence d'amélioration clinique (fièvre, aspect local du tympan) à 48-72 h de traitement ; ou en cas de réapparition des symptômes dans les 4 j suivant la fin du traitement**

- Prélèvement bactériologique ++ (paracentèse).

• Si **amoxicilline (CLAMOXYL)** prescrit en première intention : traiter par **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j en 3 prises (dose poids x 3/j) *per os* ou **cefepodoxime proxétile (ORELOX)** : 8 mg/kg/j en 2 prises (dose poids x 2/j) *per os*.

• Si **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** prescrit en première intention ou si 2ème échec : traiter par **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j en 3 prises (dose poids x 3/j) + **amoxicilline (CLAMOXYL)** : 70 mg/kg/j en 3 prises *per os* en attendant les résultats de la paracentèse ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** 50 mg/kg/j en 1 inj./j (IM ou IV) pendant 3 j.

• Réévaluation après 48 à 72 h du changement de traitement.

### Indication de paracentèse

- Otite hyperalgique malgré traitement.
- Échec de l'antibiothérapie probabiliste.
- Âge
- Immunodépression.
- Complications (méningite, mastoïdite, etc.)

### CONSENSUS

[1] Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Recommandations de bonne pratique, *SFP et GPII*, 2011

## BRONCHO-ALVÉOLITE DU NOURRISSON (1)

### Virus responsables

- VRS dans 75 % des cas.
- Adénovirus, métapneumovirus, *Myxovirus parainfluenzae* I-III et *influenzae*, rhinovirus, etc.

Concerne l'enfant de 0 à 2 ans ; trois formes cliniques sont possibles : forme bronchiolaire avec frein expiratoire et sibilants, forme alvéolaire avec crépitations (pure ou associée à des symptômes bronchiolaires) et forme neurologique apnéisante. Ces deux dernières formes sont rencontrées principalement dans les deux premiers mois de vie.

Devant un tableau atypique ou traînant, penser aux diagnostics différentiels : insuffisance cardiaque, corps étranger, coqueluche, etc.

### Évaluation de la gravité [1]

#### Signes de gravité extrême

- Polypnée inefficace, abolition du murmure vésiculaire, disparition des sibilants.
- Irrégularités respiratoires.
- Signes d'hypercapnie (sueurs, HTA, tachycardie, troubles de conscience).

De tels signes imposent un traitement urgent avec transfert par Samu en unité de réanimation.

#### Critères d'hospitalisation

- Âge.
- Polypnée > 60 min, signes de lutte importants, toux inefficace, signes d'épuisement.
- Troubles hémodynamiques associés.
- Difficultés alimentaires, intolérance digestive.
- Pathologie sous-jacente (cardiopathie, etc.).
- Hypoxie, cyanose, pâleur.
- Anxiété, agitation, troubles de conscience.
- Impossibilité de surveillance correcte à domicile.

### Traitement

#### Traitement hospitalier

#### Bilan à effectuer dans les formes sévères

Il est inutile dans les formes typiques, de sévérité modérée, en période épidémique :

- radiographie de thorax ;
- gaz du sang ;
- CRP si suspicion de surinfection ;
- recherche de VRS dans les sécrétions nasales si doute diagnostique.

Le traitement est symptomatique, destiné à passer le cap de la dyspnée aiguë.

- Installation en proclive.
- Oxygénothérapie nasale pour obtenir une saturation en  $O_2$  > 94 %.
- Dans les formes peu sévères, alimentation épaissie et fractionnée au biberon. Si l'intensité de la dyspnée gêne l'alimentation, gavage gastrique ou duodénal, voire perfusion (glucosé à 5 % + électrolytes) 90 à 120 mL/kg/j selon l'âge. En cas d'alimentation orale, associer systématiquement un traitement antireflux pendant quelques jours (aggravation réciproque du reflux gastro-œsophagien et de la bronchiolite).
- Kinésithérapie respiratoire (1 ou 2 séances/j).
- Désobstructions rhinopharyngées au sérum physiologique.
- La prescription d'aérosols de **bronchodilatateurs** n'est pas systématique et même non recommandée en cas de premier épisode ; elle ne ralentit pas l'évolution de la bronchiolite mais peut permettre de passer un cap difficile. Plus l'enfant est jeune (< 6 mois), moins le **salbutamol** a de chances d'être efficace. Des bronchospasmes paradoxaux sont possibles avant 3 mois. Utiliser **bronchodilatateurs**, **salbutamol** (**VENTOLINE**) : solution pour aérosol ; unidose de 2,5 mL = 1,25 mg (50 à 150 µg/kg soit 0,1 à 0,3 mL/kg) diluée dans du sérum physiologique qsp 3 mL, à nébuliser avec 6 L d' $O_2$  :
  - effectuer 3 aérosols sur 1 h ;
  - si efficace, poursuivre par 1 aérosol toutes les 3-4 h ;
  - en cas d'inefficacité : arrêt des **bronchodilatateurs**.

## BRONCHO-ALVÉOLITE DU NOURRISSON (2)

• Antibiothérapie : indiquée en cas de surinfection bactérienne probable : otite moyenne aiguë, fièvre > 39 °C persistante avec syndrome inflammatoire biologique : **aminopénicilline**, **amoxicilline** + **acide clavulanique** (**AUGMENTIN**) : (80 mg/kg/j) suspension buvable nourrissons : dose-poids 3 fois/j *per os* pendant 8 j.

Une atélectasie pulmonaire radiologique, très fréquente notamment au niveau du lobe supérieur droit, n'est pas une indication à l'antibiothérapie.

• Traitement antipyrétique.

• La corticothérapie n'est indiquée qu'en cas de suspicion d'asthme du nourrisson (au-delà de 3 bronchiolites, terrain atopique familial et personnel) : **corticoïde de synthèse**, **bétaméthasone** (**CÉLESTÈNE**) 10 à 15 gtt/kg/j en 1 prise.

• **Surveillance** : scope, saturation O<sub>2</sub>, FC, PA, FR, signes de lutte, auscultation pulmonaire, etc.

### Traitement ambulatoire

Dans les formes moins sévères :

- kinésithérapie respiratoire ;
- désobstruction rhinopharyngée au sérum physiologique ;
- traitement antireflux ;
- traitement antipyrétique ;
- traitement antibiotique si surinfection bactérienne probable ;
- éventuellement traitement bronchodilatateur, **salbutamol** (**VENTOLINE**) : spray avec chambre d'inhalation : 2 bouffées x 3 à 4/j pendant 3-4 j puis décroissance sur 7 j. Ce traitement est principalement indiqué dans les formes récidivantes ou si atopie personnelle ou familiale évoquant un asthme du nourrisson.

### Traitement prophylactique [2]

Il est réservé aux nourrissons de moins de 2 ans à risques de forme sévère de bron-

chiolite, c'est-à-dire les anciens prématurés atteints de dysplasie broncho-pulmonaire et les nourrissons porteurs d'une cardiopathie congénitale avec retentissement hémodynamique : anticorps monoclonal humanisé : **palivizumab** (**SYNAGIS**) : 15 mg/kg en IM tous les mois pendant la période de circulation du virus (de septembre à février).

### Évolution

Spontanément favorable le plus souvent en quelques jours. Les différents traitements proposés permettent un meilleur confort mais ne ralentissent pas l'évolution.

### Complications aiguës

- Apnées chez le nourrisson avant 6 sem. (scope cardiorespiratoire systématique).
- Atélectasies (fréquentes).
- Pneumothorax (rare).

### Complications chroniques

- Récidives et évolution vers une maladie asthmatique (éventuel rôle propre du VRS + rôle du terrain atopique).
- Troubles de ventilation, bronchectasies, syndrome de Mac-Leod.
- Bronchiolite oblitérante (rare) : reprise évolutive sévère après une rémission de quelques semaines.
- VRS persistant avec atteinte chronique sur terrain de déficit immunitaire.

Devant des bronchiolites récidivantes, penser à :

- l'asthme du nourrisson (bilan allergique) ;
- un reflux gastro-œsophagien (clinique, pH-métrie) ;
- un corps étranger (fibroscopie) ;
- une compression trachéale (arc vasculaire, etc.) (TOGD, fibroscopie) ;
- une mucoviscidose (test de la sueur) ;
- un déficit immunitaire (IgG, A, M, etc.).

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson, *Anaes*, 2000
- [2] SYNAGIS Avis de la commission de transparence, *HAS*, 2007

## PNEUMOPATHIES DE L'ENFANT (1)

### Germes responsables

- *Mycoplasma pneumoniae* : 15 %.
- *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque) : 30 %.
- Virus (VRS, adénovirus, influenza, parainfluenza, etc.) : 50 %.
- *Chlamydia pneumoniae* (après 5 ans) : 1 %.
- *Haemophilus influenzae* (avant 5 ans) : < 5 %.
- Staphylocoque (nourrisson 3 à 12 mois ++): 1 %.
- *Moraxella* : 1 %.
- Streptocoques A (surtout après la varicelle) : 1 %.

### Évaluation de la gravité

#### Indications de l'hospitalisation :

- terrain à risque (immunodéprimé, etc.) ;
- altération de l'état général ;
- signes septiques (troubles hémodynamiques, frissons, etc.) ;
- détresse respiratoire (FR > 60/min, saturation diminuée (< 95 %) ;
- association à une pleurésie ;
- âge ;
- troubles digestifs importants ;
- échec d'un traitement ambulatoire bien conduit.

### Traitement

#### Traitement ambulatoire

##### ► Antibiothérapie

- Probabiliste, dirigée avant tout contre le pneumocoque, plus sévère que le mycoplasme : **aminopénicilline, amoxicilline (CLAMOXYL)** : 100 mg/kg/j en 2 ou 3 prises (1 g x 3 maximum).
- Ou **aminopénicilline, amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j en 2 ou 3 prises (avant 3 ans si mal vacciné car possibilité d'*Haemophilus*).

- Durée de l'antibiothérapie : 10 j.

##### ► Évaluation à 48 h de traitement

Si l'enfant est toujours fébrile, on suspecte avant tout une infection à mycoplasme (garder néanmoins en mémoire l'hypothèse d'un pneumocoque résistant). Remplacer la  $\beta$ -lactamine par un **macrolide, clarithromycine (ZECLAR)** : 15 mg/kg/j en 2 prises *per os* pendant 10 j.

Il n'y a pas d'indication à une bithérapie d'emblée en ambulatoire, le meilleur critère d'efficacité étant l'apyrexie, obtenue en 24 à 48 h pour le pneumocoque, en 2 à 4 j pour les autres germes.

##### ► Mesures adjuvantes

Traitement antipyrétique, kinésithérapie respiratoire en cas d'encombrement.

#### Traitement hospitalier

##### ► Mesures générales

- Arrêt transitoire de l'alimentation si troubles digestifs, altération de l'état général ou dyspnée intense.
- Perfusion glucosé 5 % + électrolytes ; restriction hydrique en cas d'alvéolite extensive.
- Oxygénothérapie nasale, voire intubation et ventilation assistée si nécessaire.
- Maintien d'une bonne hémodynamique.
- Traitement antipyrétique.
- Kinésithérapie respiratoire.

#### Bilan

- Radio de thorax
- NFS, CRP, fibrinogène, hémocultures
- Virologie des sécrétions nasopharyngées, recherche de mycoplasme et *Chlamydia* par PCR dans les expectorations
- En cas d'épanchement pleural : ponction pleurale systématique
- Prélèvements pulmonaires protégés (lavage broncho-alvéolaire) si tableau très sévère ou si immunodépression sous-jacente.

## PNEUMOPATHIES DE L'ENFANT (2)

### ► Antibiothérapie par voie veineuse

Lorsque l'enfant nécessite une hospitalisation, l'antibiothérapie est débutée par voie parentérale. Initialement probabiliste, elle est adaptée secondairement à l'évolution clinique et aux éventuels résultats bactériologiques (hémocultures, antigènes solubles, ponction pleurale, lavage broncho-alvéolaire). Elle est urgente en cas de déficit immunitaire, de drépanocytose.

#### • Grand enfant

**Aminopénicilline, amoxicilline (CLAMOXYL)** : 100 mg/kg/j en 3 ou 4 inj. IVD + **amino-side, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min. Relais *per os* à l'apyrexie (durée totale 10 j).

Un **macrolide** peut être adjoind d'emblée ou en cas de fièvre persistante à 48 h, selon la sévérité du tableau et les éléments évocateurs de mycoplasme : **clarithromycine (ZECLAR)** : 15 mg/kg/j en 2 prises *per os* pendant 10 j.

En cas de pneumocoque résistant à la **pénicilline**, utilisation de **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)** à 200 mg/kg/j en 4 inj. IVL, associé si le niveau de résistance est élevé d'un **antibiotique glycopeptidique, vancomycine** : 60 mg/kg/j en 4 inj. IVL sur 1 h ou d'un antibiotique, **rifampicine (RIFADINE)** : 30 mg/kg/j en 2 inj. IVL sur 1 h.

#### • Avant 3 ans

*Haemophilus* plus fréquent : **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCEPHINE)** : 50 mg/kg/j en 1 inj. IVD + **amino-sides, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min.

Durée du traitement : 10 j. Relais *per os* dès que possible.

#### • Suspicion de staphylococcie pulmonaire

**Antibiotique glycopeptidique, vancomycine** : 60 mg/kg/j en 4 inj. IVL 1 h + **pénicilline M, oxacilline (BRISTOPEN)** 100 mg/kg/j en 4 inj. IVD + **amino-side, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min. La **vancomycine** ou l'**oxacilline** sont arrêtées dès réception de l'antibiogramme selon que le staphylocoque est sensible ou résistant à la méticilline.

Ce traitement sera relayé *per os* après apyrexie, pour une durée totale de 3 à 6 sem., par exemple par **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j en 3 prises *per os*.

Surveiller l'apparition d'éventuelles complications fréquentes avec ce germe : abcès pulmonaire, bulles extensives, pyopneumothorax.

#### • Suspicion d'infection à Chlamydia

**Macrolide, clarithromycine (ZECLAR)** : 15 mg/kg/j en 2 prises *per os*.

#### • Pneumopathie + pleurésie purulente

La ponction pleurale permet la plupart du temps le diagnostic étiologique, dominé par deux germes : pneumocoque (à traiter par **CLAFORAN**, + **RIFADINE** ou **VANCOMYCINE**) et staphylocoque doré (à traiter par **oxacilline** ou **vancomycine** selon sa sensibilité). Par ailleurs, une réduction de l'inoculum bactérien est recommandée, par drainage pleural, voire, si l'évolution est traînante, par pleuroscopie. L'apyrexie est longue à obtenir et l'antibiothérapie doit être prolongée plusieurs semaines.

#### • Enfant immunodéprimé

Traitement urgent. L'antibiothérapie probabiliste doit couvrir les germes opportunistes, variables selon le type d'immuno-dépression. Ce traitement s'envisage en milieu spécialisé.

## MUCOVISCIDOSE (1)

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies autosomiques récessives. Son incidence en France est de 1/2 500 naissances (avec fréquence des hétérozygotes dans la population de 1/50). Le gène de la mucoviscidose est situé sur le bras long du chromosome 7. Ce gène code pour une protéine transmembranaire CFTR, qui en cas de mutation ( $\Delta F$  508 dans 70 % des cas) entraîne un dysfonctionnement des canaux Na et Cl, conduisant à une hyperviscosité du mucus et à une hyperexcrétion de chlore.

### Diagnostic positif

#### Après 2-3 mois

Test de la sueur  $> 60$  mEq/L à 2 reprises (nécessite 100 mg de sueur minimum, poids  $> 4$  kg, attention aux faux positifs).

#### Avant 2-3 mois

Trypsine immunoréactive (sur papier buvard) dès J5 de vie.

Quand les tests de dépistage sont positifs ou douteux, ou en cas de forte présomption clinique avec un test de la sueur normal, rechercher une mutation du gène de la mucoviscidose par biologie moléculaire.

#### Diagnostic anténatal

Il consiste à rechercher une mutation du gène CFTR ( $\Delta F$  508 ou orientation par la mutation du cas index familial ++) (plus de 700 mutations décrites) par analyse en biologie moléculaire (biopsie de trophoblaste dès 10-11 SA, liquide amniotique à 17-18 SA).

Il est proposé en cas d'antécédents de mucoviscidose dans la fratrie, en cas

d'anomalies digestives échographiques anténatales (ex. : hyperéchogénicité digestive).

Le traitement, purement symptomatique, nécessite une prise en charge multidisciplinaire : équipe hospitalière, médecin traitant, kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue.

#### Dépistage néonatal

Il est réalisé systématiquement en France depuis 2002, en même temps que le Guthrie, par dosage de la trypsine immunoréactive plus ou moins génotypage si le dosage est élevé.

#### Surveillance systématique

- Surveillance clinique mensuelle à trimes-trielle (fonction de l'âge et de la sévérité de la maladie).
- Radiographie de thorax au moins 1 fois/an ; scanner thoracique si besoin.
- EFR à la demande.
- Examen cytbactériologique des crachats (ECBC) régulièrement, pour recherche de colonisation à *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, etc.
- Bilan biologique au moins 1 fois/an : bilan nutritionnel, bilan inflammatoire, sérologies aspergillaires, etc.
- Échographie abdominale tous les 3 ou 4 ans.
- Échographie cardiaque tous les 3 ou 4 ans.

#### Règles générales

- Suivi dans un centre de référence ++.
- Vaccinations habituelles + antigrippale.
- Éviter le tabagisme actif ou passif.
- Éviter les collectivités dans la petite enfance.
- Hydratation suffisante.

## MUCOVISCIDOSE (2)

### Traitement de l'atteinte respiratoire

#### Kinésithérapie respiratoire

Elle doit être systématique, dès le diagnostic. Quotidienne, voire pluriquotidienne en période d'exacerbation, elle permet le drainage des sécrétions bronchiques.

#### Traitement des surinfections pulmonaires [1]

À envisager souvent dès la survenue de signes d'exacerbation (modification de l'expectoration, de la toux, de la tolérance à l'effort).

- Antibiothérapie guidée par les derniers ECBC réalisés tous les 3 mois.
- Germes fréquents : *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.

#### ► Avant colonisation par pyocyanique

Cure de 2 à 4 sem. *per os* ou IV selon la gravité : utilisation selon le cas de **pénicillines M**, **céphalosporines de 1<sup>re</sup>** ou **2<sup>e</sup> génération**, **macrolides**, **BACTRIM**, **acide fusidique**, **rifampicine**, **vancomycine**.

#### ► Après colonisation par pyocyanique

- Cures intraveineuses de 2 à 3 sem. associant un **aminoside** et une  $\beta$ -lactamine (**céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération**, **uréidopénicillines**, **carboxypénicillines**, **carbapénèmes**). Pour éviter l'hospitalisation, on utilise dans certaines circonstances les **fluoroquinolones** *per os*.

- Certains préconisent des cures systématiques 3 à 4 fois/an ou une cure au moment de la surinfection par pyocyanique.

- Certains utilisent des aérosols d'antibiotiques biquotidiens pour espacer les cures intraveineuses (**aminoside**, **COLIMYCINE**, **ceftazidime**).

#### Traitement bronchodilatateur

Il est utilisé à la demande.

#### Reste à définir

- La place du traitement anti-inflammatoire (**corticoïdes** ou **AINS**).
- La place des aérosols de **désoxyribonucléase** humaine recombinante (**PULMOZYME**) ; jamais avant 5 ans.
- La place des aérosols de **mucohydrolitiques**.

#### Traitement des complications

- Suppurations majeures localisées : discuter la lobectomie.
- Troubles de ventilation : corticothérapie, broncho-aspiration.
- Pneumothorax : drainage si volumineux ou mal supporté.
- Hémoptysies massives : artériographie, embolisation (les hémoptysies mineures sont fréquentes).
- Insuffisance respiratoire : oxygénothérapie nasale à domicile, ventilation au masque lors des décompensations, en ultime recours transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire.

**MUCOVISCIDOSE (3)****Traitement de l'atteinte digestive [2]****Apports nutritionnels**

► Régime hypercalorique normolipidique  
130 % des apports recommandés pour l'âge, à équilibrer avec la diététicienne au cas par cas (utilité des suppléments nutritionnels type **FORTIMEL**).

► Apports de sodium  
(en cas de forte chaleur)

4 à 5 mEq/kg/j (transpiration abondante).

► Supplémentations vitaminiques liposolubles

**Vitamine A** : 5 000 à 10 000 U/j.

**Vitamine D** : 800 U/j.

**Vitamine E** : 10 à 20 mg/kg/j.

**Vitamine K** : 10 mg/trimestre (nourrisson).

► Insuffisance pancréatique exocrine (85 %)

**Extraits pancréatiques** avant les repas, **enzymes pancréatiques (CRÉON)** : 2 000 à 10 000 U/kg/j de lipase (max. 250 000 UI/j), réparties en 3 prises. Dose individuelle à trouver pour un bon confort digestif.

► En cas de mauvais état nutritionnel

Utilisation ponctuelle ou au long cours :

- de nutrition entérale (par sonde gastrique ou gastrostomie), souvent nocturne ;
- de nutrition parentérale sur cathéter implantable.

**Iléus méconial (10 %)**

Lavement diagnostique et thérapeutique avec un **produit de contraste triiodé hydrosoluble (GASTROGRAFINE)** ; chirurgie en cas d'échec.

**Diabète sucré (15 %)**

Il est généralement maîtrisé par de faibles doses d'insuline.

**Divers**

- Constipation à traiter par **laxatifs, lactulose (DUPHALAC)**, voire lavements intestinaux.
- Prolapsus rectal du nourrisson (20 %), généralement corrigé par simple régulation du transit.
- Traitement d'un reflux gastro-œsophagien.
- Chirurgie d'une lithiase si elle se complique de cholécystite, d'ictère.
- Traitement symptomatique d'une cirrhose, d'une hypertension portale : prescription d'**acide ursodésoxycholique** en cas d'anomalie biologique hépatique.

**Évolution**

Le pronostic dépend de l'atteinte respiratoire qui est inéluctable. Avec la prise en charge actuelle, la médiane de survie est d'environ 35 ans.

Le pronostic des transplantations pulmonaires reste sombre : taux de survie : 60-80 % à 1 an, 50 % à 5 ans.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge du patient atteint de mucoviscidose - Pneumologie et infectiologie, SFP, 2002

[2] Prise en charge du patient atteint de mucoviscidose - Observance, nutrition, gastro-entérologie et métabolisme, SFP, 2002



## TUBERCULOSE DE L'ENFANT (1)

### Suspicion de tuberculose : conduite à tenir [1]

#### Bilan minimal

- Examen clinique complet.
  - IDR à tuberculine 5 UI (**TUBERTEST**) = 0,1 mL (lecture à 72 h : mesure du diamètre de l'induration et non de l'érythème).
  - Radio de thorax face et profil.
  - Recherche de bacilles (direct + culture) sur tubages gastriques le matin au réveil (3 j de suite).
- Le test Quantiféron n'a pas fait la preuve de son intérêt avant l'âge de 5 ans et *a fortiori* 2 ans.

#### Lecture de IDR tuberculine

- IDR *négative* si diamètre de l'induration < 5 mm ; n'exclut pas une tuberculose (phase précoce, patient immunodéprimé, etc.).
- IDR *positive* si diamètre de l'induration :
- > 5 mm chez l'enfant immunodéprimé ou chez l'enfant < 2 ans non vacciné en population à risque ;
  - > 10 mm chez l'enfant non vacciné ou chez l'enfant vacciné mais en population à risque ;
  - > 15 mm chez l'enfant vacciné et en dehors d'une population à risque.

« Virage tuberculinique » : augmentation > 10 mm de l'IDR par rapport à IDR antérieure.

#### Différents tableaux

- *Primo-infection latente* (75 % des cas)  
IDR positive ou virage tuberculinique avec clinique, radiologie standard et bactériologie (BK tubages) normales.

Dans les valeurs limites de l'IDR, on pourra s'aider, surtout après l'âge de 2 ans, du dosage du Quantiféron.

#### ► Tuberculose maladie

En cas d'anomalie clinique, radiologique et/ou de bactériologie positive.

La positivité isolée de la PCR et/ou du scanner (adénopathies infracentrimétriques) ne conduit pas au diagnostic de PIT patente.

Un bilan complémentaire s'impose :

- endoscopie bronchique (prélèvements bactériologiques, recherche d'une obstruction) ;
- scanner thoracique pour préciser l'atteinte médiastinale et pulmonaire ;
- ponction lombaire au moindre signe neurologique ;
- en cas de doute diagnostique, recherche du BK par PCR, biopsie d'une lésion ;
- recherche d'autres localisations orientée par la clinique (os, intestin, etc.).

### Traitement de la tuberculose

#### Médicaments utilisés

Administrés en 1 prise *per os* le matin à jeun :

- **antituberculeux, isoniazide (RIMIFON)** : 10 à 15 mg/kg/j avant 2 ans, 5 à 10 mg/kg/j après 2 ans ;
- **antituberculeux, rifampicine (RIFADINE)** : 10 à 15 mg/kg/j avant 2 ans, 10 mg/kg/j après 2 ans ;
- **antituberculeux, éthambutol (MYAMBU-TOL)** : 20 mg/kg/j ;
- **antituberculeux, pyrazinamide (PIRI-LÈNE)** : 20 à 30 mg/kg/j.

## TUBERCULOSE DE L'ENFANT (2)

### Traitement

#### ► *Primo-infection latente*

**Isoniazide + rifampicine** pendant 3 mois.

#### ► *Tuberculose congénitale*

• Chez un nouveau-né de mère tuberculeuse, le traitement est instauré systématiquement, par une double ou une quadruple antibiothérapie (selon le risque de contamination estimé) : **isoniazide + rifampicine ± éthambutol ± pyrazinamide** pendant 2 mois puis si l'IDR se positive ou si des signes cliniques ou radiologiques sont apparus, **isoniazide + rifampicine** pendant 4 à 12 mois (selon les atteintes).

• En cas de négativité de l'IDR à 3 mois : on peut arrêter le traitement et vacciner l'enfant.

#### ► *Contage chez le nouveau-né et le nourrisson < 2 ans*

En raison de la fréquence des formes disséminées, mise en route d'une bithérapie préventive par **isoniazide + rifampicine** systématique d'emblée quels que soient les résultats du bilan (arrêter à 2 mois en cas de négativité persistante de l'IDR et de la radio) ; vacciner alors par le BCG si non fait.

#### ► *Contage chez l'enfant > 2 ans*

Rechercher PIT latente ou patente par IDR, radio de thorax ± Quantiféron ou BK tubages si doute radiologique. Pas de traitement si ce bilan est négatif, mais le contrôler après 2 mois.

#### ► *Tuberculose ganglionnaire ou pulmonaire*

• **Isoniazide + rifampicine + éthambutol + pyrazinamide** pendant 2 mois, puis

• **isoniazide + rifampicine** pendant 4 mois (durée totale 6 mois).

• Corticothérapie en cas de trouble ventilatoire radiologique ou réduction du calibre bronchique > 50 %, ou en cas de miliaire avec détresse respiratoire : **corticoïdes de synthèse**, **prednisone (CORTANCYL)** : 1 à 2 mg/kg/j pendant 2 à 4 sem., puis dégression sur 2 à 4 sem.

Contre-indication : adénopathie latéro-trachéale compressive avec muqueuse fragile (risque d'asphyxie par fistulisation).

#### ► *Pleurésie sérofibrineuse*

Même schéma, mais durée totale 9 à 12 mois :

- corticothérapie systématique ;
- kinésithérapie respiratoire.

#### ► *Méningite tuberculeuse*

#### Bilan

- Fond d'œil
- Scanner ou IRM cérébrale
- ± EEG.

Même schéma thérapeutique, mais durée totale 9 à 12 mois ; corticothérapie jusqu'à normalisation du LCR.

#### ► *Tuberculose intestinale*

Même schéma, mais durée totale 12 à 18 mois.

### Surveillance du traitement

- Clinique 1 fois par mois (compliance thérapeutique ++).
- Radio de thorax au moins à 1, 3, 6, 9 mois.
- Biologie : NFS, transaminases, fonction rénale, uricémie (J0, vers J15 et 1 mois).
- Examen ophtalmologique (si **éthambutol**).

## TUBERCULOSE DE L'ENFANT (3)

### Évolution

Favorable si l'observance thérapeutique est bonne. Le taux de rechute d'une tuberculose pulmonaire traitée est < 2,5 %.

### Prévention [2]

- Déclaration obligatoire des tuberculoses patentes et latentes.
- Critères de notification :
  - tuberculose maladie. Cas confirmé : maladie due à une mycobactérie du complexe *tuberculosis* prouvée par la culture. Cas probable : 1) signes cliniques et/ou radiologiques compatibles avec une tuberculose, et 2) décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard ;
  - infection tuberculeuse (primo-infection) chez un enfant de moins de 15 ans : IDR positive (**TUBERTEST**) sans signe clinique ni paraclinique, induration > 15 mm si vaccination antérieure par BCG, ou augmentation de 10 mm par rapport à une IDR datant de moins de 2 ans, ou IDR

> 10 mm si pas de vaccination antérieure par le BCG ou IDR phlycténulaire.

- Recherche du sujet contaminant et de sujets atteints dans l'entourage (radio du thorax, IDR à 5 UI de tuberculine).

- La levée de l'obligation vaccinale par le BCG a été annoncée le 11 juillet 2007 ; mais il reste fortement recommandé dès le premier mois de vie pour les enfants à risque, c'est-à-dire pour ceux provenant ou dont les parents sont originaires d'un pays de forte endémie et pour tous les enfants des régions à haut risque que sont l'Île-de-France et la Guyane.

Il est possible dès la naissance. Il est nécessaire de contrôler la négativité de la réaction tuberculinique avant vaccination à partir de 3 mois.

Modalités : intradermique strict : 0,05 mL < 1 an ou 0,1 mL > 1 an.

Pas de contrôle tuberculinique systématique après le BCG.

Contre-indications en cas de déficit de l'immunité cellulaire congénital ou acquis (sida).

### CONSENSUS

[1] Prévention et prise en charge de la tuberculose en France, *CSHPF*, 2003

[2] Enquête au cours d'un cas de tuberculose, *CSHPF*, 2006

## ANÉMIE SIDÉROPÉNIQUE DU NOURRISSON

Anémie microcytaire arégénérative avec fer sérique bas, ferritine basse, coefficient de saturation bas, CTF augmentée.

**Penser aux diagnostics différentiels fréquents :**

- $\alpha$  et  $\beta$ -thalassémies hétérozygotes ;
- anémie inflammatoire ;
- intoxication au plomb.

### Diagnostic étiologique

#### Cause anténatale

- Carence maternelle importante.
- Prématurité, hypotrophie.
- Grossesse gémellaire.
- Hémorragie fœto-maternelle.

#### Besoins accrus

- Polyglobulie des cardiopathies cyano-gènes.

#### Insuffisance d'apport

- Régime lacté exclusif prolongé.
- Pica, géophagie.
- Diarrhée chronique, malabsorption.

#### Spoliation sanguine (rare chez l'enfant)

- œsophagite, diverticule de Meckel.
- Ankylostomiose.
- Prélèvements sanguins répétés (prématuré ++, hypotrophe).

Le diagnostic repose sur [1] :

- en première intention : le dosage de l'hémoglobine, le volume globulaire moyen (VGM) et la ferritinémie ;
- en deuxième intention : le fer sérique, le coefficient de saturation, la capacité totale de fixation de la transferrine (CTF) ;
- et éventuellement les récepteurs solubles de la transferrine.

### Traitement

- Apport de fer par l'intermédiaire de **sels ferreux** (sauf sulfates ferreux chez l'enfant). L'absorption est mauvaise (20 % de la dose) ; la **vitamine C** augmente l'absorption.

Ex. : **sel ferreux, férédétate de sodium (FERROSTRANE)** : 5 à 10 mg/kg/j en 2 prises en dehors des repas (1 càc de sirop contient 34 mg de  $\text{Fe}^{2+}$ ).

Prévenir les parents de la coloration noire des selles et de la possibilité de troubles digestifs. Traitement à poursuivre 2 mois minimum.

- On l'associe souvent à des **folates, acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** : 1/2 cp./j pendant 1 mois.

### Surveillance

- Crise réticulocytaire maximale vers J10.
- Normalisation de l'hémoglobine à 1 mois environ.
- Normalisation de la ferritine 2 mois après l'arrêt du traitement.

### Prévention

- Traitement maternel de la mère pendant la grossesse (++) 3<sup>e</sup> trimestre).
- Laits 2<sup>e</sup> âge supplémentés en fer à poursuivre jusqu'à l'âge de 1 an puis laits de croissance après 1 an.
- Diversification dès 5 mois.
- Chez les prématurés, hypotrophes, jumeaux : supplémentation préventive, par ex. : **sel ferreux, férédétate de sodium (FERROSTRANE)** sirop : 5 à 10 mg/kg/j de  $\text{Fe}^{2+}$ , associé à des **folates, acide folique (SPÉCIAFOLDINE)** : 1/2 cp./j.

### CONSENSUS

[1] Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule. Fiche de bon usage, HAS, 2011

## CONSTIPATION DE L'ENFANT (1)

Émission difficile et/ou douloureuse de selles trop dures et/ou trop rares :  
 – < 1 selle /j si allaitement maternel  
 – < 3 selles /semaine sinon

### Étiologies

#### Constipations secondaires

- *Obstacle mécanique*
- Sténose ou malposition anale.
- Sténose post-chirurgicale, post-maladie inflammatoire, post-radique, etc.
- Occlusion intestinale (arrêt des matières accompagné d'autres symptômes d'occlusion).
- Iléus méconial (penser à la **mucoviscidose**, maladie de Hirschprung) ou simple bouchon méconial transitoire.

#### ► *Prolapsus rectal, fissure anale*

À la fois causes et conséquences de la constipation (installation d'un cercle vicieux). Proscrire l'utilisation du thermomètre rectal, source lui-même de fissure.

#### ► *Atteinte neuromusculaire*

- Atteinte de l'innervation extrinsèque (traumatisme médullaire, malformation, tumeur, encéphalopathie, etc.).
- Hypotonie musculaire (myopathie, Prune Belly, etc.).
- Atteinte de l'innervation intrinsèque : **maladie de Hirschprung**, pseudo-obstruction intestinale.

#### ► *Troubles métaboliques*

Hypercalcémie, hypokaliémie, hypothyroïdie, etc.

#### ► *Étiologie toxique ou médicamenteuse*

- Saturnisme.
- **Morphiniques, anticholinergiques, anti-diarrhéiques, anticonvulsivants, antipsychotiques**, etc.

#### ► *Certaines formes de maladie coélique*

#### Constipations essentielles

- De loin les plus fréquentes.
- Favorisées par :
  - erreurs de régime (lait en poudre trop concentré, régime pauvre en fibres, apports hydriques insuffisants) ;
  - causes psychologiques.
- En rapprocher :
  - la constipation au lait de mère, d'étiologie inconnue ;
  - l'encoprésie, où le facteur psychologique est prépondérant, dans laquelle la constipation s'accompagne de souillures fécales.

#### Bilan étiologique

Pas de bilan systématique, mais seulement orienté par la clinique, **réservé aux constipations rebelles**.

Une constipation secondaire doit être recherchée en cas de météorisme important, de vomissements, de retentissement nutritionnel, de constipation sévère ou résistante au traitement.

#### Bilan usuel (orienté par la clinique ++)

- ASP.
- Ionogramme sanguin, calcémie.
- Lavement opaque.
- Manométrie anorectale, voire biopsie rectale (recherche de maladie de Hirschprung).
- T3, T4, TSH.
- Test de la sueur (ou trypsine immuno-réactive chez le nouveau-né et le nourrisson).

## CONSTIPATION DE L'ENFANT (2)

### Traitement

#### Traitement étiologique (si cause retrouvée)

##### ► Maladie de Hirschprung

Traitement chirurgical : résection de la zone aganglionnaire + rétablissement de la continuité (anastomose colon-canal anal).

La zone aganglionnaire est plus ou moins étendue, remontant parfois à l'ensemble du côlon, voire au grêle.

Ce traitement radical est effectué à quelques semaines ou mois de vie ; une colostomie est parfois nécessaire en attendant ce geste (chirurgie en deux temps).

#### Traitement symptomatique

Pour toutes les constipations d'étiologie non curable. Dans les constipations fonctionnelles, les règles hygiénodietétiques sont souvent suffisantes, des traitements médicamenteux pouvant parfois y être associés.

##### ► Règles hygiénodietétiques

- Correction d'éventuelles erreurs diététiques.
- S'efforcer d'aller à la selle chaque jour.
- Régime riche en fruits et légumes en évitant les aliments constipants (riz, carottes, etc.) ; augmenter l'apport de fibres.
- Augmenter les boissons ; pour les nourrissons : biberons à l'eau d'*Hépar* (1 fois sur 2).
- Activité physique régulière.
- Mettre des graisses non cuites dans les aliments.

##### ► Lubrifiants

#### Laxatifs, huile de paraffine (*LANSOÏL*) :

- < 2 ans : 1/2 càc x 1 à 2/j ;
- > 2 ans : 1 à 3 càc/j, réparties dans la journée.

##### ► Ramollissants du bol fécal

#### Laxatifs osmotiques, lactulose (*DUPHALAC*) :

- < 1 an : 5 mL/j ;

- 1 à 6 ans : 5 à 10 mL/j ;

- > 6 ans : 10 à 15 mL/j.

#### Laxatifs osmotiques, polyéthylène glycol (*FORLAX* 4 g et 10 g) :

- 6 mois à 1 an : 1 sach. à 4 g/j ;
- 1 à 4 ans : 1 à 2 sach. à 4 g/j ;
- 4 à 8 ans : 2 à 4 sach. à 4 g/j ;
- > 8 ans : 1 à 2 sach. à 10 g/j.

##### ► Prokinétiques

- **Modificateurs du péristaltisme, trimébutine (*DÉBRIDAT* enfant et nourrisson) :** 1 mL/kg/j ou dose poids de la suspension en 2 ou 3 prises *per os*, agit sur les douleurs intestinales.

##### ► Action locale

Utilisation ponctuelle, jamais comme traitement de fond : suppositoires de **glycérine**, voire **MICROLAX** enfant ou nourrisson. Éviter la répétition des petits moyens mécaniques (thermomètre, suppositoire, microlavement) qui favorisent l'irritation anale.

#### Traitement de la fissure anale

- Complication de la constipation, et facteur aggravant de cette dernière.
- Règles hygiénodietétiques + traitement médical efficace + **topique anal antalgique** et cicatrisant, **TITANOREÏNE** *pommade* : plusieurs applications/j.

#### Traitement de l'encoprésie

- Traitement de la stase digestive par lavements évacuateurs (eau + sérum physiologique + **NORMACOL**) répétés.
- Puis facilitation du transit par règles hygiénodietétiques + traitement médical de la constipation (proscrire les **laxatifs irritants**).
- Parallèlement, rééducation de la défécation (régularisation du rythme, rééducation de la sensation de besoin, etc.) et prise en charge des facteurs psychologiques.

## DIARRHÉE AIGUË - DÉSHYDRATATION (1)

### Germes donnant des gastro-entérites

- Rotavirus (+++).
- Autres virus : calcivirus, adénovirus, astrovirus, coronavirus.
- *Escherichia coli*.
- Shigelles, salmonelles, *Yersinia*, *Campylobacter*.
- Vibron cholérique (formes importées).
- Parasites (giardia, amibes, etc.).

### Évaluation de la sévérité

Critères d'hospitalisation :

- perte de poids > 10 % du poids du corps ;
- polypnée, troubles hémodynamiques, oligurie ;
- altération de l'état général, signes septiques ;
- vomissements ou refus du biberon empêchant la réhydratation orale ;
- mauvaise surveillance parentale sur une diarrhée sévère ;
- âge < 3 mois et/ou poids < 5 kg ;
- terrain particulier (mucoviscidose, déficit immunitaire, etc.).

### Examens complémentaires

Non systématiques, ils sont indiqués dans les formes sévères. Le bilan effectué varie selon la clinique :

- ionogramme sanguin, fonction rénale (systématique dès qu'une réhydratation parentérale est décidée) ;
- virologie des selles ;
- coproculture (si selles glairo-sanglantes ou signes septiques) ;
- NFS, CRP, hémoculture (formes septiques) ;
- urines : ionogramme, glycosurie et osmolarité (doute sur une autre cause de déshydratation) ;
- ASP et/ou échographie (doute diagnostique lorsque vomissements importants : IIA, etc.) ;
- ECG (si dyskaliémie).

### Traitement

#### Traitement d'un état de choc

Sérum physiologique : 20 mL/kg sur 10 à 20 min, renouvelable jusqu'à disparition des signes de choc.

#### Traitement d'une acidose importante

La simple réhydratation suffit en général à corriger l'acidose. Si pH < 7 persistant : **bicarbonates** à 14 ou 42 %<sub>o</sub> ; quantité à passer (en mEq) =  $1/3 \times \text{poids} \times \Delta \text{bicarbonatémie}$ .

Ne pas chercher à normaliser la bicarbonatémie, mais se fixer environ 15 mmol/L comme objectif. Une hypokaliémie contre-indique la perfusion de **bicarbonates**.

#### Réhydratation orale [1]

Une réhydratation orale doit toujours être essayée. Les risques de convulsion par variation brutale de la natrémie sont en effet bien moindres.

Par **solutés de réhydratation orale** (**ADIA-RIL**, **NOVALAC HYDRANOVA**, **PICOLITE**, **VIA-TOL**) : diluer 1 sach. dans 200 mL d'eau. Ces solutés doivent être préférés à toute autre forme d'apport hydrique car ils sont riches en sel.

- Proposer au biberon des petites quantités fractionnées (environ 20-50 mL initialement) de manière répétée (environ toutes les 15 min), éventuellement après **antiémétisant** (**MOTILIUM**, **VOGALÈNE**) *per os* ou IR.

Si la tolérance digestive est bonne, augmenter peu à peu les quantités pour permettre à l'enfant de boire à volonté.

L'échec d'une réhydratation orale *bien conduite* impose l'hospitalisation pour repos digestif et réhydratation intra-veineuse pendant 4 à 6 heures.

Après reprise de l'alimentation, le soluté de réhydratation est poursuivi entre les repas (meilleure absorption lorsqu'il est administré seul).

## SOLUTÉS DE RÉHYDRATATION ORALE

## ■ Solutés de réhydratation orale

<b>ADIARIL</b>					
Énergie 105 kcal/L, osmolarité 250 mOsm/L, glucose 13,3 g/L, saccharose 12,5 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 20 mmol/L, citrate 10 mmol/L	10 sach. 7 g	6,20		60 %	0,62
<b>PICOLITE</b>					
Énergie 360 kcal/L, osmolarité 233 mOsmol/L, glucides 90 g/L, saccharose 20 g/L, dextrine-maltose 70 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 22,3 mmol/L, Cl <sup>-</sup> 62,3 mmol/L, citrates 9,3 mmol/L	10 sach. 20 g	6,20		60 %	0,62
<b>NOVALAC HYDRANOVA</b>					
Énergie 108 kcal/L, osmolarité 245 mOsmol/L, glucose 25,5 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 20 mmol/L, Cl <sup>-</sup> 61 mmol/L, citrates 10 mmol/L	10 sach. 6,5 g	6,20		60 %	0,62
<b>VIATOL</b>					
Énergie 80 kcal/L, osmolarité < 270 mOsm/L, glucose 20 g/L, Na <sup>+</sup> 50 mmol/L, K <sup>+</sup> 25 mmol/L, citrates 12,5 mmol/L, bicarbonates 30 mmol/L	10 sach. 5,25 g	6,20		60 %	0,62

**PROPRIÉTÉS**

Solutés de réhydratation orale ayant un apport équilibré en glucose et en électrolytes permettant de compenser les pertes digestives causées par une diarrhée aiguë.

**INDICATIONS**

Prévention et correction des déshydratations au cours des diarrhées aiguës de l'enfant.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Une fois la solution reconstituée (1 sach. pour 200 mL d'eau), conservation possible au réfrigérateur pendant 24 h.

Pour une meilleure absorption, administrer entre les repas. Les quantités administrées sont régulées par la soif du nourrisson.

L'efficacité du traitement doit être surveillée rigoureusement (poids, état d'hydratation, etc.). Reprendre l'alimentation dès que possible. Administrer exclusivement ces solutés plus de 3 j entraîne rapidement une dénutrition importante.

Les vomissements chez l'enfant diarrhéique ne sont pas une contre-indication à la réhydratation orale. Celle-ci doit être particulièrement fractionnée. L'apport de glucose fait rapidement cesser des vomissements entretenus par une cétose de jeûne.



## DIARRHÉE AIGUË - DÉSHYDRATATION (2)

### Réhydratation intraveineuse

- Indication : déshydratation sévère ou réhydratation orale impossible (vomissements, refus du biberon). Elle doit être relayée dès que possible par une réhydratation orale.

- Modalités : perfusion = B46 (G5 + 3 g/L de NaCl + 1,5 g/L de KCl) sur la base de 150 mL/kg/j chez le nourrisson et de 2,5 L/m<sup>2</sup> chez l'enfant. Les apports hydriques et les électrolytes sont à adapter au ionogramme sanguin et au volume des pertes.

- Cas particulier de l'hyponatrémie menaçante (< 120 mEq/L avec symptômes neurologiques : coma, convulsions) : cette part symptomatique doit impérativement être corrigée rapidement ; quantité de Na à apporter :

nb de mEq =  $\frac{2}{3} \times \text{poids} \times (125 - \text{natrémie})$ .

À perfuser sous forme de NaCl 5,85 % (1 mL = 1 mEq) sur environ 30 min.

Par la suite, l'hyponatrémie (tout comme l'hypernatrémie) doit être corrigée lentement, au plus de 0,5 à 1 mmol/L par heure.

### Antibiothérapie [2]

► Indications d'emblée

- Fièvre importante avec état septique ou syndrome inflammatoire important.
- Diarrhée glairo-sanglante profuse.

**Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 50 mg/kg/j en 1 inj. IVD pendant 3 à 5 j (adaptation au résultat de la coproculture).

► Indications (en fonction des résultats de la coproculture)

- Diarrhée virale : pas d'antibiotiques.
- Salmonelle : **ROCÉPHINE** 5 j si âge

< 6 mois, hémoculture positive, si fièvre > 48 h, si *S. typhi* ou *paratyphi* A, B ou C.

- Shigelle : antibiothérapie systématique, par exemple **ROCÉPHINE** 50 mg/kg/j en 1 inj. IVD pendant 5 j.

- *Campylobacter* : antibiothérapie si forme prolongée ou âge < 6 mois, par **macrolide**, **érythromycine** **ÉRYTHROCINE** 50 mg/kg/j en 2 prises orales pendant 5 à 7 j.

### Renutrition [1]

► Âge < 3 mois

- Continuer l'allaitement au sein.

- En cas d'allaitement artificiel, après 4-6 h de solution de réhydratation, réalimenter avec une formule sans lactose hypoallergénique (**DIARIGOZ**) voire une formule à base d'hydrolysats de protéines (**ALFARÉ**), systématiquement avant 1 mois. Le lait habituel est réintroduit sur 3 ou 4 j après 1 sem. de selles normales.

► Enfant > 3 mois

Le lait habituel est le plus souvent repris d'emblée ou, en cas de forme sévère ou prolongée, remplacé par une formule sans lactose (**DIARGAL**, **OLAC**, **AL 110**) à poursuivre quelques jours après normalisation des selles. Éviter les aliments riches en fibres et les graisses cuites, les crudités, les fruits crus. Utiliser les aliments constipants : riz, carottes, compotes de pommes, coings, bananes.

### Autres médicaments [2]

Les pansements digestifs ne raccourcissent pas l'évolution, les ralentisseurs du transit sont contre-indiqués ++ (risque d'iléus, voire perforation).

**Antidiarrhéique antisécrétoire, racécadotril (TIORFAN)**, 1 à 2 sachets à 10 ou 30 mg x 3/j selon le poids.

Association éventuelle avec *Lactobacillus acidophilus* (**LACTÉOL**) ou argiles (**SMECTA**).

**DIARRHÉE AIGÜE - DÉSHYDRATATION (3)****Surveillance**

FC, PA, température, diurèse ( $N > 1 \text{ mL/kg/h}$ ), poids toutes les 6 h, état d'hydratation, selles (fréquence, aspect), périmètre crânien, ionogramme sanguin, fonction rénale (si  $> 10 \%$  de déshydratation, anomalie initiale biologique, collapsus, oligoanurie).

**Complications****► Neurologiques**

À rechercher devant coma, convulsions :

- Hématome sous-dural (très rare).
- Thrombose veineuse cérébrale dans les déshydratations hypernatrémiques : il s'agit plus souvent de thromboses de petites veines intracérébrales que des sinus.
- Œdème cérébral (réhydratation trop rapide).

**► Rénales**

- Insuffisance rénale organique par nécrose tubulaire aiguë.
- Thrombose des veines rénales.
- Syndrome hémolytique et urémique, dans les diarrhées à *E. coli* ou à shigelle : toute diurèse ne reprenant pas dans les premières heures de réhydratation impose l'hospitalisation en réanimation.

**► Digestives**

- Intolérance aux protéines du lait de vache secondaire (acquise) : si persistance de la diarrhée plus d'une semaine, ou récurrence de la diarrhée ++ dès reprise du lait antérieur au régime, utiliser une formule à base d'hydrolysat de protéines (**ALFARÉ, PEPTI-JUNIOR, PRÉGOMINE, PREGESTIMIL**). Prévention en systématique avant 1 mois de vie.
- Diarrhée grave rebelle : diarrhée se pérennisant, nécessitant une alimentation parentérale.

**— CONSENSUS —**

[1] Traitement nutritionnel des diarrhées aiguës du nourrisson et du jeune enfant, *Comité nutritionnel de la SFP*, 2002

[2] Traitement médicamenteux des diarrhées aiguës infectieuses du nourrisson et du jeune enfant, *GFGHNP*, 2002

## MALADIE CŒLIAQUE (1)

### Clinique

À évoquer chez le nourrisson ou l'enfant devant un ou plusieurs des signes suivants : diarrhée chronique, cassure staturo-pondérale, pâleur, amyotrophie, ballonnement abdominal, cheveux fins cassants, apathie voire stagnation des acquisitions psychomotrices.

À rechercher chez les enfants atteints de maladie auto-immune, notamment le diabète de type I, chez qui la maladie cœliaque est plus fréquente.

### Bilan diagnostique

#### Bilan de malabsorption

- Protidémie, albuminémie, cholestérolémie, calcémie.
- NFS, hémostase, fer sérique, folates.
- Âge osseux.
- Vitamines A, D, E, K.
- Stéatorrhée.

#### Bilan immunologique [1]

Recherche d'anticorps (IgG et IgA) anti-transglutaminase qui sont les plus spécifiques.

Les Ac antigliadine sont non spécifiques (Crohn, parasitoses intestinales, sujet sain, etc.).

Le niveau des Ac est proportionnel à l'intensité d'exposition au gluten, permettant ainsi de surveiller par leur décroissance l'observance du régime sans gluten.

Les IgA ont une bonne corrélation avec l'existence d'une entéropathie.

Nécessité de réaliser un dosage pondéral des IgA pour éliminer un déficit en IgA avant d'interpréter les résultats.

### Biopsie du grêle

Elle doit montrer une atrophie villositaire totale ou subtotale (non spécifique).

L'évolution sous régime confirmera le diagnostic.

### Traitement

#### Régime sans gluten.

Exclusion complète de tous les aliments contenant une des 3 céréales suivantes : blé, orge, seigle.

L'avoine, jadis incriminée, semble actuellement pour de nombreux auteurs être non pathogène, permettant ainsi son introduction dans l'alimentation

Sont ainsi interdits : pain, biscottes, pâtes-séries, pâtes, charcuterie sauf jambon, chocolat, préparations culinaires du commerce (sauf celles spécifiées sans gluten), médicaments glutinisés, etc.\* (cf. Maladie cœliaque de l'adulte et **aliments sans gluten**).

Un régime pauvre en lactose est en général associé les 15 premiers jours du traitement.

#### Supplémentations

- Régime riche en protides.
- Compensation des carences (**vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vitamine B12, calcium, fer, acide folique**).

\* Une liste plus exhaustive est décrite au chapitre Gastro-entérologie - Hépatologie.

## MALADIE CŒLIAQUE (2)

### Évolution

- En quelques jours à quelques semaines, normalisation du comportement, de l'appétit, des selles, de la stéatorrhée.
- En quelques mois, rattrapage staturo-pondéral, négativation des anticorps (surveillance de l'observance thérapeutique +++).
- La muqueuse intestinale se normalise en 1 à 2 ans, cette normalisation pouvant être contrôlée par biopsie, ce qui est de moins en moins réalisé.

### Durée du régime et épreuve de rechute

La durée du traitement reste débattue. Initialement conseillé à vie, il est à poursuivre idéalement au moins jusqu'à la fin de la puberté, pour permettre une croissance optimale, mais les contraintes du régime font qu'il est difficile de le maintenir de manière stricte sur un très long terme.

La réintroduction du gluten n'est plus réalisée à visée diagnostique ; la régression des symptômes, la récupération pondérale et la normalisation des paramètres biologiques de malabsorption sous régime sans gluten confortent souvent le diagnostic histologique initial.

Cette réintroduction est de plus en plus

souvent réalisée après au moins 5 ans de régime strict, à visée pronostique, car une certaine tolérance au gluten peut survenir. Elle peut, selon les cas, entraîner :

- une rechute clinique (40 % des cas) : le régime sans gluten doit alors être repris à vie ;
- une rechute histologique (50 % des cas) : pas de rechute clinique ou biologique mais réapparition d'une atrophie villositaire plus ou moins importante à la biopsie du grêle si elle est réalisée (environ 1 an après réintroduction) ; on conseille généralement de reprendre le régime, mais son caractère strict est moins important qu'initialement ;
- pas de rechute clinique, biologique ou histologique (10 % des cas) ;
- le risque d'apparition d'un cancer épithélial ou d'un lymphome est mal connu chez l'enfant mais semble exceptionnel.

### Prévention

- Encourager l'allaitement maternel.
- Ne pas introduire le gluten avant l'âge de 5 mois, ni après l'âge de 7 mois.

### Complications malignes : exceptionnelles chez l'enfant

- Lymphome du grêle.
- Adénocarcinome du grêle.
- Carcinome épidermoïde.

### CONSENSUS

- [1] Quelles recherches d'anticorps prescrire dans la maladie cœliaque - Fiche de bon usage, HAS, 2007

**ALLERGIES ALIMENTAIRES (ENFANT) (1)**

Les allergènes alimentaires peuvent être responsables de manifestations digestives, mais également respiratoires, cutanées, anaphylactiques.

**Bilan diagnostique**

- interrogatoire ;
- tests cutanés (*prick tests*) ;
- IgE spécifiques (orientés par clinique et tests cutanés) ;
- test de provocation orale (TPO) : réalisé en milieu hospitalier après disparition des symptômes sous régime d'exclusion, guidé par la décroissance des IgE spécifiques ; contre-indiqué en cas de manifestations cliniques de type immédiat (choc anaphylactique, etc.).

Il ne faut pas confondre sensibilisation cutanée (*prick test*) et allergie réelle ; en effet, devant des *prick tests* positifs, il faudra rechercher une positivité des IgE spécifiques associés en l'absence de laquelle pourra se discuter une éventuelle réintroduction de l'allergène incriminé.

**Traitement****Régime d'exclusion**

Le seul traitement est l'éviction complète du ou des aliments incriminés. Pour certains aliments (œuf, arachide, etc.), détermination d'un **seuil** de tolérance après test de provocation orale en milieu hospitalier permettant, en cas de seuil élevé, une alimentation en collectivité scolaire.

Dans l'allergie aux protéines du lait de vache, remplacement du lait par une formule à base d'hydrolysat de protéines (**ALFARÉ**) ; voire par une formule à base d'acides aminés synthétiques (**NEOCATE**) ou par un lait d'origine végétale (**MODILAC Riz**) en cas de symptômes persistants sous hydrolysat de protéines.

**Causes d'échec du régime d'exclusion****► Polyallergie**

Rechercher d'autres aliments responsables des symptômes.

**► Éviction incomplète**

- Se méfier des formes cachées de l'aliment (beaucoup de préparations culinaires contiennent du lait, de l'arachide, de l'œuf par exemple).

- Chez l'enfant allaité, penser que le lait de mère véhicule des traces de protéines alimentaires (œuf, lait de vache, etc.). Il faut alors imposer le régime d'exclusion à la mère pour permettre une éviction vraiment complète chez l'enfant.

Prescription d'une trousse d'urgence comprenant au minimum un **anti-histaminique** oral, un **corticoïde oral** et selon les cas de l'**adrénaline** injectable en sous-cutané sous forme de stylo injecteur **ANAPEN**.

Rédaction d'un projet d'accueil individualisé (PAI) avec prescription d'une trousse d'urgence + éventuels paniers repas, si enfant en collectivité.

**ALLERGIES ALIMENTAIRES (ENFANT) (2)****Évolution**

Acquisition avec le temps d'une tolérance à certains aliments, permettant leur réintroduction : l'épreuve de réintroduction doit être effectuée à l'hôpital sous surveillance stricte en raison du risque de manifestations allergiques aiguës.

**► Lait**

À 1 an, 60 % des enfants ont acquis une tolérance, 87 % à 3 ans. La première réintroduction est donc tentée vers 1 an. En cas d'échec, réintroductions itératives tous les 6 mois environ jusqu'à acquisition de la tolérance.

**► Autres aliments**

œuf, poisson sont réintroduits souvent après l'âge de 3-4 ans, en fonction de l'âge au diagnostic et du type de symptomatologie.

D'autres allergies persistent toute la vie, imposant dans certains cas l'éviction définitive (arachide, crustacés).

**Prévention****► Allaitement maternel**

Il diminue l'incidence des allergies alimentaires.

**► Hydrolysats**

Rôle préventif avant 6 mois des hydrolysats poussés ou partiels (laits hypoallergéniques). Ces derniers sont souvent prescrits en complément de l'allaitement maternel ou en cas d'atopie familiale marquée.

**► Diversification**

Ne doit pas être trop précoce (surtout en cas d'atopie familiale) : la débiter vers 5-6 mois de vie. De même, retarder l'introduction d'œuf, poissons en cas d'atopie familiale ou personnelle suspectée vers 9-10 mois, mais pas après 1 an : notion récente de « fenêtre » d'introduction idéale (ni trop tôt, ni trop tard).

## VOMISSEMENTS DU NOURRISSON (1)

C'est un symptôme très fréquent, aux étiologies multiples, la plupart du temps bénignes ; certaines causes sévères sont toutefois à écarter. Il est donc important de trouver l'étiologie des vomissements.

L'interrogatoire et l'examen clinique permettent souvent une orientation diagnostique et une évaluation du retentissement.

Tout vomissement vert (bilieux) du nouveau-né doit faire évoquer une occlusion.

### Étiologies

#### Causes digestives

- Occlusion : malformation digestive, volvulus, invagination intestinale aiguë, hernie étranglée, iléus méconial du nouveau-né, maladie de Hirschprung, etc.
- Sténose du pylore.
- Appendicite aiguë, péritonite (iléus réflexe).
- Gastro-entérite aiguë.
- Allergie alimentaire.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Pathologie hépato-biliaire ou pancréatique.
- Erreur diététique, *forcing* alimentaire.

#### Causes extradigestives

- Infectieuses : toute infection (surtout méningée ; mais aussi ORL, pulmonaire, urinaire).

- Neurologiques (HTIC) : infections, hématomas intracrâniens, hémorragies, tumeurs.
- Troubles métaboliques : hyponatrémie, hypercalcémie, acidocétose diabétique, maladies innées du métabolisme, hyperplasie congénitale des surrénales.
- Toxiques (vitamines D, A, etc.) ou médicamenteuses.
- Vomissements psychologiques : diagnostic d'élimination.
- Penser à la pérennisation de vomissements par l'acétonémie du jeûne (bandelette urinaire).

#### Bilan

- Bilan du retentissement : ionogramme sanguin (vomissements importants), bilan nutritionnel (vomissements chroniques).
- Bilan étiologique (non systématique) : dépend de la ou des causes suspectées cliniquement.

### Traitement

#### Traitement symptomatique

- **Antiémétisant, dompéridone (MOTILIUM)** : suspension : 1 mL/kg/j en 3 prises (1 dose poids/prise) ou **métopimazine (VOGALÈNE)** : suspension : 1 mL/kg/j en 3 prises (1 dose poids/prise) (ou par voie rectale, suppositoire sécable à 5 mg : 1/2 à 1 sup. x 2 à 3/j).
- En cas de déshydratation, essayer des **solutés de réhydratation** en petites quantités répétées, voire en gavage, ou bien perfuser (cf. Déshydratation).

## ANTIÉMÉTIQUES

■ **Dompéridone**

<b>MOTILIUM</b>					
Vomissements, reflux gastro-œsophagien : 0,25 mg/kg x 3/j	40 cp. 10 mg	3,65	II	30 %	0,09
	200 fl. 200 mL (1 mg/mL)	2,97	II	30 %	0,01
<b>PÉRIDYS</b>					
Idem <b>MOTILIUM</b>	40 cp. 10 mg	3,65	II	30 %	0,09
	160 fl. 200 mL (1 g/mL)	2,97	II	30 %	0,02

■ **Métopimazine**

<b>VOGALÈNE</b>					
En 3 prises : < 6 ans : 1 mg/kg/j 6-12 ans : 1,5-3 sup./j >12 ans : 3 à 6 sup./j 6-12 ans : 1-2 lyocs/j 0,5 mg/kg/j	10 sup. séc. 10 mg	2,13	II	30 %	0,21
	16 lyocs 7,5 mg	2,13	II	30 %	0,13
	1200 gttes sol. buv.	3,40	II	30 %	0,00

**PROPRIÉTÉS**

Antipsychotiques antiémétiques, sans effet anticholinergique. La **dompéridone** passe très faiblement la barrière hémato-encéphalique alors que le **métoclopramide** peut être considéré comme un véritable antipsychotique. Ces molécules renforcent le péristaltisme du tube digestif supérieur :

- augmentation du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage ;
- inhibition de la relaxation du fundus gastrique et stimulation de l'activité motrice ;
- élargissement du pylore au moment de son ouverture ;
- augmentation de la fréquence, de l'amplitude et de la durée des contractions duodénales.

La **dompéridone** normalise les contractions anarchiques de la maladie des spasmes étagés de l'œsophage. Elle ne modifie pas les fonctions sécrétoires.

**INDICATIONS**

Nausées, vomissements.  
Reflux gastro-œsophagien, œsophagite.

**CONTRE-INDICATIONS**

Dyskinésies tardives aux **antipsychotiques**.  
Hémorragie, obstruction ou perforation gastro-intestinale.  
Prolactinome (**dompéridone**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire la posologie chez l'insuffisant rénal ou hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles extrapyramidaux (rares).  
Gynécomasties, galactorrhée, aménorrhée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Métopimazine** : risque de potentialisation des **antihypertenseurs** et des dépresseurs du système nerveux central : **hypnotiques**, **sédatifs**, **analgésiques**, **anesthésiques**.



## VOMISSEMENTS DU NOURRISSON (2)

### Traitement étiologique

► *Traitement d'une infection, d'une gastro-entérite, d'une hypertension intracrânienne, correction d'un trouble métabolique, etc.*

► *Sténose du pylore*

• **Clinique** : après intervalle libre (8 j-8 sem.), vomissements per- ou post-prandiaux précoces, appétit conservé, stagnation ou perte pondérale.

#### Bilan

- ASP à jeun (stase gastrique).
- Échographie du pylore (hypertrophie).
- TOGD si doute diagnostique.

• **Traitement** :

- chirurgical : pylorotomie extramucuse ;  
- reprise de l'alimentation possible dès J1 (pas d'ouverture du tube digestif).

► *Invagination intestinale aiguë*

• **Clinique** (++) **2 mois-2 ans** : vomissements, douleurs abdominales (accès de pleurs brefs répétés ± pâleur), selles sanglantes, refus de boire. Palpation du boudin d'invagination parfois. Rechercher au TR le boudin ou du sang.

Attention aux formes neurologiques trompeuses : hypotonie, troubles de conscience, voire convulsions.

#### Bilan

- ASP debout/couché.
- Échographie abdominale.
- Lavement opaque en cas de suspicion sur les examens précédents.

• **Traitement**

Le lavement opaque confirme le diagnostic et réduit l'invagination le plus souvent. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d'échec de la réduction par le lavement, ou d'emblée en cas d'abdomen chirurgical aigu (invagination vue tardivement). Il peut être nécessaire dans un second temps en cas d'invagination récidivante ou d'invagination secondaire à une pathologie abdominale comme un diverticule de Meckel (notamment après 2 ans).

► *Allergie alimentaire*

Le **traitement** consiste en l'éviction du ou des aliments concernés. L'allergie alimentaire est souvent transitoire, et disparaît généralement vers 1 à 2 ans. La réintroduction doit se faire en milieu hospitalier (risque de choc anaphylactique).

## VOMISSEMENTS DU NOURRISSON (3)

### ► Reflux gastro-œsophagien [1]

#### • Bilan

Diagnostic : clinique  $\pm$  pHmétrie sur 24 h  $\pm$  TOGD (recherche plicature gastrique).

Complications :

- œsophagite (fibroscopie) ;
- malaises (ROC-Holter, fibroscopie) ;
- atteinte respiratoire (radio de thorax, pHmétrie  $\pm$  TOGD  $\pm$  manométrie).

#### • Traitement

– Règles hygiénodététiques : fractionner les repas, éviter le tabagisme passif, épaissir les biberons par **GUMILK**, habituellement à 2 % soit 1 mes. = 2 g pour 10 mL de lait chauffé à 60 °C (accélère le transit) ou **GÉLOPECTOSE**, habituellement à 3 %, soit 1 càc 1/2 pour 100 mL de lait chauffé à 60 °C (ralentit le transit).

– Modificateur du tonus sphinctérien de l'œsophage : **dompéridone (MOTILUM)** : suspension : 1 mg/kg/j en 4 prises (1 dose poids  $\times$  4/j).

– **Protecteur de la muqueuse œsophagienne**, alginate et bicarbonate de sodium (**GAVICON**) : 1 à 2 mL/kg/j de la suspension nourrissons (pipette graduée en mL), à répartir après chaque repas.

À ce traitement de 1<sup>re</sup> intention, on ajoute en cas d'œsophagite un **antisécrétoire**,

**oméprazole (MOPRAL)** ou **ésoméprazole (INEXIUM)** : 1 mg/kg/j en 1 prise *per os* le matin pendant 4 à 6 sem.

Le traitement est surveillé sur la clinique, la courbe de poids, la radio de thorax  $\pm$  la pHmétrie sous traitement. L'amélioration spontanée de la majorité des reflux à l'acquisition de la station assise puis debout permet en général d'arrêter le traitement entre 6 et 18 mois.

L'échec du traitement de 1<sup>re</sup> intention bien conduit (clinique, pHmétrie sous traitement) peut conduire à utiliser exceptionnellement, après manométrie œsophagienne : **bétanéchol (URÉCHOLINE)** : 8 à 10 mg/m<sup>2</sup>/j en 3 prises, disponible en pharmacie centrale des hôpitaux.

Le traitement chirurgical consiste à créer un manchonnement de l'œsophage par fundopexie circulaire (intervention de Nissen). Son efficacité est d'environ 95 % mais il peut lâcher secondairement. Il est indiqué en cas de reflux avec retentissement important, si le traitement médical est un échec ou si le reflux persiste à 2 ou 3 ans. Il est également indiqué en cas de volumineuse hernie hiatale et sur terrain à haut risque (encéphalopathies, etc.).

### CONSENSUS

[1] Reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique en pédiatrie, SFP, 2010

## CRYPTORCHIDIE (1)

### Clinique

Examen en décubitus dorsal, en tailleur ou debout.

Rechercher hernie inguinale, hypospadias ou micropénis associés.

### Définition

Anomalie de position du testicule situé spontanément et en permanence en dehors du scrotum, dont l'abaissement manuel est soit impossible, soit suivi d'une réascension immédiate à sa position antérieure. Elle correspond à une insuffisance de migration à un niveau variable sur son trajet.

La cryptorchidie est à différencier :

- du testicule oscillant, complètement et facilement abaissable par traction, qui ne nécessite aucune thérapeutique ;
- de l'ectopie testiculaire : testicule situé en dehors de son trajet de migration normal. (sillon inguino-crural, racine de la verge, etc.).

Distinction des cryptorchidies :

- hautes (complètes) = intra-abdominales ;
- basses (incomplètes) = inguinales.

Dans la cryptorchidie, le testicule n'est pas palpable dans 30 % des cas (intrapariétal ou abdominal) ; mais 10 % des testicules non palpables sont en fait une anorchidie (absence de testicule), à rechercher par imagerie et, en cas de bilatéralité, dosage de FSH, LH, hormone antimüllérienne, caryotype, dosage de testostérone et DHT avant et après test à l'hCG.

### Évolution

Le plus souvent, la cryptorchidie simple disparaît spontanément ; sa fréquence est de :

- 20 % chez le prématuré ;

- 4 % à terme ;
- 1,5 % à 3 mois ;
- 0,8 % à 1 an.

La cryptorchidie persistante expose à un risque de :

- stérilité ;
- insuffisance endocrine leydigienne ;
- dégénérescence maligne du testicule.

### Conduite à tenir

#### Cryptorchidie simple

Elle est unilatérale dans 80 % des cas (souvent droite), bilatérale dans 20 %. Surveillance simple

Traiter si elle persiste à l'âge de 2 ans.

► *En première intention pour certains*

Traitement médical : **gonadotrophines humaines, hCG (GONADOTROPHINE CHORIONIQUE «ENDO»)** 1 500 UI par voie IM x 3/sem. jusqu'à un total de 10 injections, en cas de testicules inguinaux hauts (souvent inutile car inefficace en cas de testicules intra-abdominaux)

Efficacité :

- 40 % (cryptorchidies inguinales) ;
- 15 % (cryptorchidies abdominales).

► *En cas d'échec ou en 1<sup>re</sup> intention en cas de testicule intra-abdominal*

Traitement chirurgical (après bilan hormonal préalable) : à visée exploratrice + orchidopexie (abaissement chirurgical et fixation).

► *Évolution*

- Risque de stérilité, principalement en cas de chirurgie difficile, de position haute du testicule, de chirurgie tardive (effectuée à 8-10 ans : 45 % de stérilités).
- Risque de cancer testiculaire x 4 à 5 (testicule ectopique), x 1,6 (testicule controlatéral), non diminué par l'orchidopexie si elle est tardive (orchidopexie permettant toutefois la surveillance clinique du testicule).

## GONADOTROPHINES HUMAINES

## ■ Gonadotrophine hCG (activité LH)

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO					
Cryptorchidie : test à l'hCG : < 1 an : 500 UI IM/48 h x 3 > 1 an : 1 500 UI IM/48 h x 6 Hypogonadisme hypogonadotrophique : 1 000 UI IM x 2 à 3/sem.	3 amp. 1 500 UI	5,68	I	65 %	1,89
	1 amp. 5 000 UI	5,95	I	65 %	5,95

**PROPRIÉTÉS**

Les effets de l'hCG d'origine placentaire sont ceux de la LH, à savoir :

- déclenchement de l'ovulation (après stimulation suffisante par les gonadotrophines à action FSH) ;
- différenciation des cellules de Leydig chez l'homme et stimulation de la sécrétion d'androgènes par ces cellules.

**INDICATIONS**

Cryptorchidie chez l'enfant.

Hypogonadisme hypogonadotrophique chez l'homme.

Certaines stérilités de la femme (associée avec HMG).

**CONTRE-INDICATIONS**

Tumeurs hypophysaires.

Tumeurs gonadiques.

Dystrophies ovariennes.

Jeunes filles avant 18 ans.

**Grossesse** en cours.

LH élevée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance de l'apparition de signes de maturation sexuelle, qui font arrêter le traitement dans l'indication cryptorchidie.

En association avec l'HMG, surveillance des signes d'hyperstimulation ovarienne (estradiol plasmatique, œstrogènes urinaires).

Positivité des tests de contrôle antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Manifestations allergiques.

Possibilité de rétention hydrosodée à doses supratherapeutiques.

En association avec l'HMG, risque de grossesses multiples, d'hyperstimulation ovarienne avec kystes ovariens bilatéraux, voire rupture de kystes.

Parfois sensibilité testiculaire, érections, rarement augmentation du volume de la verge (disparition de ces symptômes à l'arrêt du traitement).

**CRYPTORCHIDIE (2)****Testicule oscillant**

Pas de traitement, résolution spontanée souvent en période pubertaire.

**Ectopie testiculaire vraie**

Chirurgie d'emblée.

**Cryptorchidie unilatérale + hernie inguinale**

Chirurgie d'emblée.

**Cryptorchidie uni- ou bilatérale + hypospadias et/ou micropénis**

► *Bilan étiologique précoce (avant toute chirurgie si possible, en service spécialisé)*

Rechercher :

– syndrome polymalformatif ;

– dysgénésies gonadiques ;

– insuffisance gonadotrope.

► *Examens à effectuer*

Pour distinguer une cryptorchidie bilatérale haute d'une anorchidie bilatérale :

– Caryotype.

– Test à l'hCG avec dosage sanguin (testostérone, dihydrotestostérone et delta 4 androstènedione de base (J0) et 24 h après la dernière injection).

– FSH, LH (voire test au LH-RH 12 ans).

– Hormone antimüllérienne (AMH).

– Échographie pelvienne.

– Génitographie.

► *Chirurgie dans un second temps*

## INFECTIONS URINAIRES DE L'ENFANT (1)

### Définition

Signes fonctionnels urinaires (parfois fièvre isolée chez le nourrisson) et ECBU positif : leucocyturie  $\geq 10\,000/\text{mL}$  et bactériurie  $\geq 100\,000/\text{mL}$  monomicrobien. Y penser devant ictère prolongé ou stagnation pondérale chez le nouveau-né.

Mode de contamination : voie ascendante +++, voie hématogène.

### Germes incriminés (en ville)

- *Escherichia coli* (75-80 %).
- *Proteus* (10 %) (garçon ++, rechercher lithiase).
- *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Pseudomonas* (4 %).
- *Staphylococcus*, *Streptococcus* *Enterococcus* (5 %).

### Bilan initial

ECBU : obtenu par poche urinaire ou mieux par sondage urétral chez le nourrisson.

NFS, CRP, hémoculture si fièvre et systématique < 3 mois + échographie rénale si pyélonéphrite.

### Traitement [1]

Différencier cystite (pollakiurie, brûlures mictionnelles, douleur abdominale, dysurie, hématurie macroscopique) et pyélonéphrite (idem + fièvre, frissons, douleurs lombaires, syndrome inflammatoire).

Cas particuliers :

- nourrisson < 1 mois : traitement antibiotique IV même en l'absence de fièvre ou de syndrome inflammatoire après confirmation par 2<sup>e</sup> ECBU ;
- bactériurie asymptomatique latente chez un enfant en bonne santé = colonisation simple ne nécessitant aucun traitement, ni examen invasif.

### Pyélonéphrite aiguë

#### ► Mesures générales

- Hospitalisation si âge < 3 mois, si signes cliniques d'infection sévère (frissons, marbrures), ou si CG+ au direct.
- Bonne hydratation orale ou IV.

#### • Antipyrétiques.

#### ► Antibiothérapie IV

- Direct ECBU positif à bacilles Gram- : **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 50 mg/kg/j en 1 inj.

IVD ou IM et **aminoside ± gentamycine (GENTALLINE)** : 3 mg/kg/j en 1 inj. IM ou IV sur 30 min.

- Direct ECBU positif à cocci Gram+ (suspicion de streptocoque D) : **aminopénicillines, amoxicilline (CLAMOXYL)** : 100 mg/kg/j (4 g maxi) en 3 ou 4 inj. IVD et **GENTALLINE** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 inj. IM ou IV sur 30 min.

L'antibiothérapie sera secondairement adaptée au germe et à son antibiogramme.

Durée du traitement : arrêt de l'**aminoside** après 2 j ; arrêt de **ceftriaxone** ou  $\beta$ -lactamine IV après 2 à 4 j avec relais *per os* adapté à l'antibiogramme pour une durée de 10 à 14 j au total.

Chez l'enfant de **moins de 1 mois**, associer une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)** : 100 mg/kg/j en 3 inj. IVD pendant 10 j IV et **GENTALLINE** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 inj. IM ou IV sur 30 min pendant 5 j.

En cas d'allergie aux  $\beta$ -lactamines, il est possible si la fonction rénale est normale, de traiter uniquement par **GENTALLINE** IV ou IM en attendant le résultat de l'antibiogramme.

Le traitement peut être effectué à domicile dès l'apyrexie obtenue ; les injections de **ROCÉPHINE** sont effectuées en IVD (laisser un cathlon obturé) ou en IM après 1 mois de vie. En fin de traitement, en cas d'anomalie à l'échographie ou de deuxième épisode de pyélonéphrite, relais par une antibioprophylaxie orale en 1 prise quotidienne (jusqu'au résultat de la cystographie rétrograde). L'antibioprophylaxie sera poursuivie jusqu'à l'intervention chirurgicale ou jusqu'à l'acquisition de la propreté en cas de reflux vésico-urétéral grade IV ou V à la cystographie.

#### ► Surveillance

L'ECBU à H48 et en fin de traitement n'est pas nécessaire.

Prévoir échographie rénale et cystographie rétrograde (voir dans le bilan).

En cas d'infection sévère ou d'infections répétées, recherche de cicatrices à distance par scintigraphie rénale au DMSA.

**INFECTIONS URINAIRES DE L'ENFANT (2)****Cystite**

- Traitement ambulatoire.
- Boissons fréquentes ; mictions fréquentes et complètes.
- Antibiothérapie orale : durée du traitement : 3 à 5 j.

Si BG - au direct : **sulfamides, sulfaméthoxazole + triméthoprim** (**BACTRIM**) suspension : 40 mg/kg/j de **sulfaméthoxazole** en 2 prises *per os* ou **céfixime** (**OROKEN**) 8 mg/kg/j soit dose poids x 2/j *per os* (AMM 6 mois) ; à adapter aux résultats de l'ECBU.

Si Cocci + en chaînette au direct : **amoxicilline** (**CLAMOXYL**) : 100 mg/kg/j en 3 prises.

Si Cocci + en amas au direct : **amoxicilline** (**AUGMENTIN**) : 80 mg/kg/j en 3 prises.

- Rechercher et traiter un facteur favorisant local : mauvaise hygiène, corps étranger vaginal, oxyurose, vulvo-vaginite, phimosis, constipation.
- Rechercher un facteur favorisant général : pathologie neurologique, dyssynergie vésico-sphinctérienne ou immaturité vésicale (impériosités mictionnelles, épisodes de culotte mouillée).

**Recherche d'un facteur favorisant****Indications du bilan**

- Pyélonéphrite.
- Infection urinaire basse du garçon.
- Cystites récidivantes chez la fille.
- Suspicion clinique d'anomalie rénale (HTA, etc.).

**Interrogatoire**

Rechercher une instabilité vésicale, une constipation, une mauvaise hygiène, etc.

**Examen clinique**

Rechercher des troubles neurologiques.

**Bilan**

- Échographie rénale.
- Cystographie rétrograde.

L'échographie rénale doit être effectuée en urgence quand la pyélonéphrite s'accompagne d'anurie, d'insuffisance rénale aiguë, de douleurs de type colique néphrétique ou bien si persistance d'une fièvre sous traitement.

Le bilan peut être complété par :

- UIV (si dilatation échographique des cavités pyélo-calvicelles, si suspicion d'un double système) ;
- bilan urodynamique (vessie neurologique).

## INFECTIONS URINAIRES DE L'ENFANT (3)

### Principaux facteurs favorisants

#### ► Reflux vésico-urétéral (RVU) +++

Retrouvé dans 30 % des infections urinaires. Disparaît le plus souvent avec l'âge et la croissance : vers 4 ans disparition 60 % RVU grade I-II et 40 % RVU grade III-IV découvert durant 1<sup>re</sup> année de vie. Lié le plus souvent à une immaturité transitoire de la jonction urétéro-vésicale ou parfois permanente d'origine malformative.

#### ► Instabilité vésicale

#### ► Uropathies obstructives

- Syndrome de jonction pyélo-urétérale.
- Méga-urètre obstructif (syndrome de la jonction urétéro-vésicale).
- Valves de l'urètre postérieur.

#### ► Antibiothérapie prophylactique

- En attendant le bilan morphologique (en relais de l'antibiothérapie initiale) ou l'intervention chirurgicale.
- Uropathie ou reflux sans indication chirurgicale.

• En cas d'infections urinaires basses répétées (plus de 4 par an) : cures de 6 mois. Avant 6 sem. de vie : **céphalosporine de 1<sup>re</sup> génération, céfador (ALFATIL)** : 10 mg/kg/j en 1 prise le matin.

Après 6 sem. de vie : **BACTRIM** 5 à 10 mg/kg/j en 1 prise *per os* le matin avant 2 ans et le soir après 2 ans.

#### ► Surveillance

- ECBU en cas de fièvre inexplicée.
- Dans les reflux vésico-urétéraux non opérés. Contrôle de la cystographie rétrograde environ tous les ans (selon la tolérance familiale du traitement au long cours).

Le reflux disparaît le plus souvent spontanément dans les premières années de vie (fonction du grade du reflux), permettant d'arrêter le traitement prophylactique.

L'indication chirurgicale se discute secondairement en cas d'infections répétées malgré la prophylaxie ou si le reflux ne disparaît pas spontanément, voire se majore.

### Traitement chirurgical

- Chirurgie d'un reflux de haut grade avec retentissement rénal : allongement du trajet sous-muqueux du (des) urètre(s) par intervention de Leadbetter-Politano (nouvel orifice urétéral) ou intervention de Cohen (allongement du trajet sous-muqueux urétéral). Permet de corriger le reflux dans 95 % des cas.
- Résection de valves de l'urètre postérieur.
- Cure d'un syndrome de jonction en cas d'obstruction importante (évaluée par scintigraphie Mag 3 Lasilix).

### CONSENSUS

- [1] Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l'enfant, *Afssaps*, 2007



## ÉNURÉSIE (1)

Elle est définie par l'absence de contrôle mictionnel nocturne après l'âge de 5 ans (acquisition normale de la propreté nocturne vers 3 ans). Il s'agit de mictions normales mais inconscientes et incontrôlées. L'évolution est souvent spontanément favorable, mais l'énurésie peut persister à l'adolescence. Distinction entre l'énurésie primaire et secondaire (perte de la propreté acquise antérieurement pendant au moins 6 mois). Penser à éliminer devant **une énurésie secondaire récente** la polyurie révélatrice d'un **diabète, une infection urinaire (Iabstix ++)**. L'énurésie touche surtout le garçon avec ATCD familiaux fréquents.

### Diagnostic différentiel

- Anomalie neurologique : atteinte de la commande nerveuse vésicale (miction par regorgement), comitialité.
- Malformation urologique (abouchement urétéral ectopique).
- Infection urinaire, urétrite, oxyurose.
- Polyurie (diabète insipide, diabète sucré, etc.).
- Immaturité vésicale, dyssynergie vésico-sphinctérienne.

Pas d'examen complémentaire systématique devant une énurésie simple isolée : diagnostic clinique et anamnestique.

## ÉNURÉSIE (2)

### Traitement [1]

Il associe mesures éducatives (systématiques) et traitement médicamenteux (éventuel).

#### Traitement éducatif

##### ► Information des parents

- Bannir les mesures répressives, corriger un laxisme excessif.
- Déculpabiliser : expliquer le caractère incontrôlé, inconscient de l'énurésie.
- Ne pas mettre de couches.

##### ► Information de l'enfant

- Déculpabiliser l'enfant, bien lui expliquer sa pathologie et sa bénignité.
- L'impliquer dans le traitement (tenue d'un carnet où l'enfant note les nuits « sèches » : soleil, et « mouillées » : nuage), valoriser tous les progrès obtenus.

##### ► Mesures physiques

- Diminuer les boissons le soir.
- Miction complète avant d'aller se coucher.
- Parfois, réveil 2-3 h après le coucher pour uriner.
- Gymnastique mictionnelle : apprendre à l'enfant à pousser et à se retenir (mictions régulières et complètes).
- Tenue d'un calendrier mictionnel nocturne (calendrier « Nuage-Soleil »).

##### ► Pipistop

Appareil à louer en pharmacie, il réveille l'enfant dès l'émission des premières gouttes

d'urine. Utilisable après 7 ans (l'enfant doit pouvoir s'en servir seul), il permet de nets progrès en quelques semaines.

##### ► Psychothérapie

Seulement en cas de troubles du comportement associés ou de perte de l'estime de soi suite à des moqueries à l'école.

#### Traitement médicamenteux

Utiliser un des trois médicaments suivants :

– **antispasmodique anticholinergique, oxybutynine (DITROPAN)** : 1 cp. x 2 ou 3/j, uniquement dans les énurésies associées à une immaturité vésicale ;

– **analogue de l'ADH, desmopressine (MINIRIN MELT)** : 120 µg (lyophilisats à 60, 120 et 240 µg) le soir au coucher (puis adapter la posologie à l'effet obtenu : 120 à 240 µg) par cure de 3 mois renouvelable une fois si récidive à l'arrêt. Ne pas prendre de boisson dans les 8 h suivant la prise de **MINIRIN** ;

– **antidépresseur tricyclique, imipramine (TOFRANIL)** : débiter à 1 cp. 10 mg/j avec 1 à 3 cp. à 10 mg le soir entre 6 et 12 ans, 2 à 5 cp. après 12 ans (augmentation progressive). Utilisation temporaire (cure de 3 mois). En cas d'échec, arrêt au bout d'un mois. De moins en moins utilisé.

#### Traitement préventif

Ne pas chercher à obtenir la propreté trop tôt (avant 24 mois).

### CONSENSUS

[1] Évaluation des systèmes d'alarme dans le traitement de l'énurésie nocturne primaire monosymptomatique, *Anaes*, 2003

## DIABÈTE DE L'ENFANT (1)

### Insulinothérapie

Objectifs glycémiques : les plus proches de la normale (en évitant les hypoglycémies,  $HbA1c \leq 7\%$ ).

#### Doses d'insuline

- Doses initiales sous-cutanées : 0,8 à 1,5 U/kg/j en fonction de l'intensité des signes révélateurs, à adapter en fonction des besoins initiaux.
- Diminution des besoins d'insuline : autour de 0,4 à 0,8 U/kg/j, parfois moins les premières semaines, mois, voire années (« lune de miel »).
- Puis les besoins augmentent avec la diminution de l'insulinosécrétion endogène, pour atteindre :
  - avant la puberté : 0,7 à 1,2 U/kg/j ;
  - pendant la puberté : 1 à 1,5 U/kg/j (parfois plus).

#### Schémas d'injections

Sous-cutané à la seringue ou au stylo (plus confortable). Il existe une contradiction entre la *précision* du traitement qui demande de mieux répartir le nombre d'injections et le *confort* qui s'accommode à moins de 3 ou 4 inj./j. Un meilleur contrôle du diabète et la diminution du risque d'hypoglycémie nécessitent cependant des techniques de multi-injections. Selon le type d'insuline, injection 30 min avant le repas si insuline ordinaire ou immédiatement préprandiale si **insuline ultrarapide** (analogue type **HUMALOG** ou **NOVORAPID**).

► *Schéma à 2 injections (répartition indicative)*

- Injection avant le **petit-déjeuner** (2/3 de la dose quotidienne répartis en 1/3 **rapide** ou **ultrarapide** et 2/3 **intermédiaire** ou **analogue lent** de l'insuline type **LEVEMIR**).
- Injection avant le **dîner** (1/3 de la dose quotidienne répartis en 1/3 **rapide** ou

**ultrarapide** et 2/3 **intermédiaire** ou **analogue lent** de l'insuline type **LEVEMIR**).

► *Schéma à 3 injections (répartition indicative)*

- Injection avant le petit-déjeuner : **insuline rapide** ou **ultrarapide** (30 % de la dose totale quot.).
- Injection avant le déjeuner : **insuline rapide** ou **ultrarapide** (15 % de la dose totale quot.).
- Injection avant le dîner : mélange **rapide** ou **ultrarapide** (20 % de la dose quot.) + **analogue lent** (35 % de la dose quot.).

► *Schéma à 4 ou 5 injections par jour*

Un **analogue ultrarapide** de l'insuline (**API-DRA**, **HUMALOG** ou **NOVORAPID**) est injecté 10 min avant les repas (matin, midi et soir  $\pm$  goûter), qui n'ont pas besoin d'être pris à heure régulière.

Un **analogue lent** de l'insuline (**LANTUS**) est injecté à un moment quelconque de la journée, mais toujours le même, plutôt au repas du soir ou au coucher.

On peut utiliser un autre **analogue lent** de l'insuline (**LEVEMIR**), mais ce dernier ayant une durée d'action inférieure à 24 h, on est souvent amené à faire 2 injections à 12 h d'intervalle (une le matin et une le soir) ; ce schéma à 5 injections est parfois nécessaire lorsque les besoins de base en insuline sont très différents le jour et la nuit.

#### Pompe à insuline

Elle permet de délivrer en continu 24 h sur 24 de l'**insuline rapide** ou un **analogue ultrarapide**, à des débits éventuellement variables pendant le jour et la nuit et des bolus préprandiaux juste avant les repas. L'insuline à la pompe est utilisée par les équipes spécialisées chez certains enfants (jeune nourrisson ++, parfois l'adolescent, devant des difficultés d'équilibration majeures).

## DIABÈTE DE L'ENFANT (2)

### Lieu d'injection

Sous-cutanée stricte, dans les bras ou le ventre le matin et les cuisses ou les fesses le soir (sans alterner car vitesse de résorption différente). Déplacer le point d'injection pour éviter les lipodystrophies. Utiliser des aiguilles courtes ++ chez l'enfant (5 mm ou 8 mm surtout).

### Régime alimentaire

#### Ration quotidienne

1 000 kcal + 100 kcal par année d'âge avec répartition des glucides 55 %, lipides 30-35 %, protéides 10-15 % de la ration calorique quotidienne, à répartir harmonieusement entre les 3 repas sans modifier au quotidien cette répartition ; éviter les sucres à index glycémique élevé (sucres rapides). Donner des sucres lents à chaque repas.

#### En cas de schéma à 2 injections

petit-déjeuner, éventuelle collation vers 10 h (sucres lents), déjeuner vers 12 h, goûter sans sucres lents vers 16 h (laitage, fruit), dîner. Parfois, collation vers 22 h.

#### En cas de schéma à 3 injections

Trois repas d'horaires plus libres : petit-déjeuner (20 % des glucides quotidiens), déjeuner (35 % des glucides), dîner (45 % des glucides). Modulation possible des doses d'insuline en fonction de la richesse glucidique des repas (insulinothérapie fonctionnelle).

### Surveillance [1]

#### Surveillance de l'équilibre glycémique

► *Carnet d'autosurveillance des glycémies capillaires*

• 7 h (petit-déjeuner), 12 h (déjeuner), 16 h, 19 h (dîner). En cas d'**insuline ultra-rapide** faire de temps en temps glycémie capillaire vers 10 h ou 22 h.

• Objectif :

- au réveil = 0,8 à 1,2 g/L ;
- post-prandial = 1,4 à 1,8 g/L.

► *Autosurveillance des urines*

► *Hémoglobine glyquée*

Elle reflète l'équilibre glycémique durant les 2 mois précédents, permet l'adaptation des doses globales, permet de dépister les injections sautées, les régimes non suivis, les carnets falsifiés, etc.

< 6 % : hypoglycémies trop fréquentes  
6 à 7 % : bon équilibre  
7 à 8 % : à surveiller  
8 à 9 % : médiocre  
> 9 % : mauvais  
> 13 % : risque de décompensation aiguë.

#### Surveillance des complications chroniques du diabète

Rares à l'âge pédiatrique. Surveillance par un bilan annuel (microalbuminurie, bilan lipidique, phosphocalcique, bilan thyroïdien, autres marqueurs d'auto-immunité, âge osseux, etc.).

Microangiopathie rétinienne : angiographie rétinienne (à partir de 5 ans d'évolution, puis /2 à 5 ans, adapté à l'âge).

Microangiopathie rénale : dosage de microalbuminurie nocturne annuelle.

Clinique : étude ROT, sensibilité, etc.

## DIABÈTE DE L'ENFANT (3)

### Ordonnance de l'enfant diabétique (cf. Diabète sucré de l'adulte)

- Stylo autopiqueur : par ex. **ACCU-CHEK SOFTCLIX**, **BD OPTIMUS**, etc.
- Lecteur de glycémie : cf. Diabète sucré de l'adulte.
- Lancettes pour stylo autopiqueur, par ex. **ACCU-CHEK SOFTCLIX**.
- Bandelettes pour détermination de la glycémie.
- Bandelettes pour recherche de glucose et corps cétoniques dans les urines : **KÉTO-DIASTIX**, **KÉTO-DIABUR TEST 5000**.
- **GLUCAGEN** (2 flacons) + 2 seringues IM pédiatriques.
- Si seringues à insuline (100 U/mL) : **B-D MICROFINE**, **PLASTIPAK** (30, 50 ou 100 unités selon les doses d'insuline).
- Si stylo injecteur d'insuline : **NOVOPEN 3**, **ERGOPEN**, **HUMAPEN**, **FLEXPEN**, **NOVOLET**.
- Pour stylo : aiguilles **B-D MICROFINE**.
- Insuline (100 UI/mL) (flacon et cartouche) : cf. Diabète sucré.
- Coton, alcool à 70°.

### Objectifs du traitement

- Éviter les hypoglycémies sévères.
- Réduire les hyperglycémies, les épisodes de décompensation acido-cétoniques.
- Obtenir un bon équilibre glycémique (HbA1c).
- Prévenir et retarder l'apparition des complications.
- Assurer un développement saturo-pondéral et pubertaire normal.
- Éviter les conséquences psychologiques (angoisses, rejet) du diabète chez le jeune diabétique et dans sa famille.

### Acidocétose diabétique

Inaugurale, ou secondaire à une pathologie intercurrente (hyperglycémie sans adaptation des doses) voire à un arrêt de l'insuline.

### Évaluation rapide

Perte de poids, déshydratation, état de conscience, acidose (**pH < 7,35**).  
Signes de gravité : acidose sévère (pH < 7), déshydratation sévère, troubles hémodynamiques, coma, âge < 5 ans.

### Pose de 2 voies d'abord veineux + poche à urines

#### Bilan initial (en urgence ++)

Gaz du sang, glycémie, ionogramme sanguin, fonction rénale, calcémie, phosphorémie, ECG.

### Réhydratation initiale + insulinothérapie

- En cas de collapsus : **solutés de remplissage**, type cristalloïdes (**NaCl 0,9 %**) : 20 mL/kg (500 mL max.) en moins de 20 min.

#### ► H0-H2

Débuter simultanément (arrêt alimentation et boissons) :

- sérum salé à 0,9 % + KCl 1,5 g/L (après ECG, kaliémie et 1<sup>re</sup> miction) : 8 mL/kg/h si âge < 5 ans, si Na corrigée < 138 mmol/L et 10 mL/kg/h dans les autres cas (sans dépasser 500 mL/h) ;
- insuline ordinaire (**ACTRAPID**) en IV continu (diluer 0,5 mL = 50 unités dans 49,5 mL sérum salé à 0,9 %) : 0,1 U/kg/h si pH < 7,25 et 0,05 U/kg/h si pH entre 7,25 et 7,35 ou si âge < 5 ans ou insulinothérapie dans les 8 h précédentes.

#### ► H2-H24

Dès la 3<sup>e</sup> h ou plus tôt si glycémie < 10 mM.

Perfusion IV 3 L/m<sup>2</sup>/j de soluté glucosé B27 puis B45 (dès que glycémie < 12 mmol/L) supplémenté en NaCl 2 g/L et KCl 1,5 g/L.

(Surface cutanée (m<sup>2</sup>) = 4 x Poids + 7/Poids + 90)

Insuline ordinaire (**ACTRAPID**) en IV continu à poursuivre en adaptant le débit de 20 % de la dose en cours selon la glycémie capillaire horaire.

**DIABÈTE DE L'ENFANT (4)****Surveillance**

- Scope, FC, PA, glycémie capillaire horaire (à débiter dès 30 min d'insulinothérapie), diurèse (poche urine), bandelette urinaire, conscience, recherche de céphalées, examen neurologique, ECG.
- Ionogramme sanguin, GDS veineux, glycémie, fonction rénale, calcémie, phosphorémie à H0, H2, H6-8, H12, H24.
- Glycosurie et cétonurie sur chaque miction avec iono. urinaire sur 1<sup>re</sup> miction.
- Natrémie corrigée =  $\text{Na} + (\text{glycémie (mmol/L)} - 5)/3$ .
- Kaliémie corrigée = kaliémie mesurée -  $6 \times (7,40 - \text{pH mesuré})$ .
- Glycémie  $5,5 \text{ mmol} = 1 \text{ g/L}$ .

**Objectifs**

Réhydratation progressive, correction progressive de l'acidose, de la natrémie, chute de la glycémie de  $5 \text{ mmol/L}$  maximum par heure avec maintien de la glycémie aux alentours de  $1,8$  à  $2 \text{ g/L}$  entre H12 et H24. Adaptation de l'insulinothérapie (20 % du

débit) en fonction des glycémies capillaires horaires.

**Relais par insuline sous-cutanée**

Dès que le malade peut s'alimenter sans problème.

**Complications**

- Hypokaliémie.
- Hypoglycémie.
- Œdème cérébral.

**Hypoglycémies****► Mineures**

Absorption immédiate de sucres rapides (1 sucre/20 kg ou 1/2 jus fruits) puis sucre lent (pain ou biscuits ou repas selon l'heure).

**► Avec coma ou convulsions**

Injection IM de **glucagon GLUCAGEN** (1/2 amp. si  $< 5$  ans, 1 amp. si  $> 5$  ans) ; si absence d'amélioration, injection de  $0,5 \text{ g/kg}$  de glucose IVD, sous forme de glucosé 30 % ; puis perfusion continue de G10 + électrolytes ; dans tous les cas, recherche du facteur déclenchant et adaptation des doses d'insuline.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent, HAS, 2006

## HYPOTHYROÏDIE DE L'ENFANT

### À révélation néonatale = congénitale

Dépistage systématique néonatal (buvard vers J3 de vie) :

- TSH > 50 mU/mL : convocation de l'enfant en urgence.
- TSH entre 30 et 50 mU/mL : confirmation par contrôle 2<sup>e</sup> buvard.
- TSH < 30 mU/mL : négatif (taux normal).

### Étiologies

- Anomalies du développement de la glande :
  - athyréose : 20-25 % ;
  - ectopie : 70 % ;
  - glande dysplasique en position normale : 10 %.
- Anomalies de l'hormonosynthèse.
- Hypothyroïdie, acquise (souvent transitoire) par :
  - surcharge iodée (maternelle ou néonatale) ;
  - traitement maternel par **antithyroïdien de synthèse** ;
  - thyroïdite maternelle (Hashimoto).
- Exceptionnellement :
  - résistance périphérique aux **hormones thyroïdiennes** ;
  - déficit en TSH (non détecté par le dépistage).

### Bilan nouveau-né (en milieu spécialisé)

- T3 libre, T4 libre, TSH.
- Iodémie, iodurie, thyroglobulinémie.
- Ac antithyroïdiens (anti-TPO, anti-TG).
- Échographie thyroïdienne.
- Scintigraphie thyroïdienne (± test au perchlorate).
- Radiographie osseuse (genou).

### Bilan chez la mère

- T3 libre, T4 libre, TSH, iodémie.
- Ac antithyroïdiens (anti-TPO, anti-TG)

### Traitement

**Hormones thyroïdiennes, lévothyroxine sodique (L-THYROXINE) per os** : 5 à 7 µg/kg/j en une prise, à adapter au taux de TSH (conservation au réfrigérateur).  
Arrêt de la **vitamine D** pendant les 6 premiers mois (risque hypercalcémie).

Diminution progressive avec l'âge des posologies. Passage au cp. **LÉVOTHYROX** possible vers 3-4 ans.

### Surveillance

T3 libre, T4 libre, TSH, à J15, J30 puis à 2, 4, 6, 9, 12, 16, 18, 24 mois, puis tous les 6 mois. Obtenir la normalisation de T4 avant la fin du 1<sup>er</sup> mois et TSH dans les 3 mois puis maintenir une TSH normale, et T4 libre normale haute.

### Évolution

- Arrêt du traitement souvent possible après quelques mois en cas d'hypothyroïdie transitoire (surcharge iodée, Hashimoto maternel), traitement à vie ++ dans les autres cas.
- Développement somatique normal, surveiller la croissance et l'âge osseux régulièrement.
- Développement psychomoteur le plus souvent normal si le traitement est débuté précocement. Parfois léger retard en cas d'hypothyroïdie initialement profonde.

### À révélation tardive

#### Étiologies

- Thyroïdite de Hashimoto.
- Irradiation cervicale.
- Carence en iode.
- Insuffisance thyroérotrope : lésion tumorale, chirurgicale ou radique de l'hypophyse et/ou de l'hypothalamus.
- Forme congénitale de découverte tardive.

#### Bilan

- T3 libre, T4 libre, TSH.
- Anticorps antithyroïdiens (anti-TPO, anti-TG).
- Échographie thyroïdienne.
- ± test au TRH.
- ± scintigraphie thyroïdienne.

### Traitement

**Hormones thyroïdiennes, lévothyroxine sodique (L-THYROXINE)** : 3 à 5 µg/kg/j en 1 prise per os.

Si l'origine est hypophysaire, en cas d'insuffisance corticotrope associée, il faut toujours débiter les **corticoïdes** 48 h avant la **L-THYROXINE**.

## INSUFFISANCE SURRÉNALE DE L'ENFANT (1)

### Diagnostic

- Cortisolémie, ACTH (insuf. glucocorticoïde).
- Aldostérone, rénine plasmatique (insuf. minéralocorticoïde).
- 17-hydroxyprogestérone, SDHA,  $\Delta 4$ -androstènedione.
- Ionogramme sanguin et urinaire (natriurèse), pH sanguin, glycémie.

Les dosages hormonaux pourront être faits de base ou après test au **SYNACTHÈNE**. Dosage de base suffisant en période néonatale dans le bloc en 21-hydroxylase. Confirmation en biologie moléculaire ultérieurement en cas de bloc enzymatique.

### Étiologies

#### ► Hyperplasie congénitale des surrénales

- Par déficit enzymatique de la stéroïdogénèse, principalement bloc en 21-hydroxylase (rarement en 11- $\beta$  ou 3- $\beta$ -ol-déshydrogénase) :

#### – formes néonatales :

Filles : ambiguïté sexuelle, syndrome de perte de sel.

Garçons : syndrome de perte de sel (vers J7-J10 de vie).

Le « syndrome de perte de sel » associe un tableau de déshydratation avec perte de poids, une natriurèse inadaptée ( $> 20$  mEq/L) alors que la natrémie est  $< 133$  mEq/L et souvent une hyperkaliémie.

Le dépistage néonatal est devenu systématique vers J4-J5 lors du test de Guthrie (dosage de 17 OHP sur papier buvard).

– formes à révélation tardive : accélération de la croissance staturale, apparition d'une pilosité précoce (hyperandrogénie), plus ou moins perte de sel.

- Diagnostic : élévation (de base et/ou sous test au **SYNACTHÈNE**) de 17-hydroxyprogestérone (17 OHP).

$\Delta 4$ -androstènedione, sulfate de DHA, testostérone précisant le degré d'hyperandrogénie et le type de bloc.

#### ► Autres insuffisances surrénales congénitales génétiquement déterminées

Hypoplasie congénitale des surrénales, syndrome des 3A (Addison + alacrymie

+ achalasie), adrénoleucodystrophie, etc. (en rapprocher certaines insuffisances minéralocorticoïdes isolées).

#### ► Secondaires

Tuberculose, auto-immune, médicamenteuse (**kétoconazole**, **mitotane** (ou **op'DDD**), etc.).

#### ► De survenue aiguë

Chirurgie, thrombose, hémorragie surrénale bilatérale (sepsis, troubles de l'hémostase, etc.).

#### ► Insuffisance antéhypophysaire

#### ► Arrêt de corticothérapie prolongée

#### ► Idiopathique

### Traitement de l'insuffisance surrénale aiguë

Urgence thérapeutique (pronostic vital immédiat lié à l'hyperkaliémie).

Pose de 2 voies d'abord veineuses ; hospitalisation.

#### Traitement d'urgence

- Hypoglycémie sévère : 0,5 g/kg de glucose IVD sous forme de glucosé 30 % puis relais par G10 % + NaCl.

- Collapsus : **solutés de remplissage (NaCl 0,9 %)** : 20 mL/kg en moins 20 min.

- Hyperkaliémie menaçante :

**Calcium, chlorure de calcium** à 10 % : 0,5 mL/kg IVD si trouble du rythme cardiaque (QRS élargis, etc.).

**Solutés alcalinisants, bicarbonate de sodium** à 4,2 % : 3 mL/kg IVD (si acidose pH  $< 7,10$ ).

**Résines hypokaliémiantes, polystyrène sulfonate de sodium (KAYEXALATE)** : 1 g/kg *per os* ou en lavement.

**$\beta_2$ -mimétiques, salbutamol** : aérosol 1 gtte/2 kg (min 6 gttes, max. 20 gttes) ou dose de charge IV 5  $\mu$ g/kg IVL en 20 min.

#### Prélèvements à réaliser en urgence

17 OHP, cortisol, SDHA,  $\Delta 4$ -androstènedione, testostérone, aldostérone, ACTH, rénine, ionogrammes sanguin et urinaire, glycémie, GDS veineux.

Ils doivent être faits si possible avant tout traitement si possible mais sans retarder la mise en route de celui-ci.



## GLUCOCORTICOÏDES (PÉDIATRIE)

## ■ Hydrocortisone

<b>HYDROCORTISONE ROUSSEL</b>					
Insuf. surrénale : 10 à 20 mg/m <sup>2</sup> /j	25 cp. 10 mg	3,24	I	65 %	0,13
<b>HYDROCORTISONE UPJOHN</b>					
Voie IV = hémisuccinate d'hydrocortisone 5 mg/kg puis 2 mg/kg/6 h Voie IM = acétate d'hydrocortisone 3 à 5 mg/kg/12 ou 24 h	1 fl. 100 mg = 2 mL	2,82	I	65 %	2,82

**PROPRIÉTÉS**

Hormones physiologiques ayant une action glucocorticoïde prédominante et une action minéralocorticoïde modérée (inférieure à celle de l'aldostérone).

Résorption digestive rapide (pic en 1 h), biotransformation hépatique et rénale, élimination urinaire sous forme de glucuronides conjugués principalement.

**INDICATIONS**

Insuffisance surrénale aiguë.  
Insuffisance surrénale chronique (d'origine surrénalienne ou hypophysaire).  
Hyperplasie congénitale des surrénales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune dans ces indications.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le régime doit être normosodé.  
Ne jamais interrompre brutalement (risque d'insuffisance surrénale aiguë).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun à dose physiologique substitutive.

Ralentissement de la croissance en cas de surdosage, puis autres signes d'hypercorticisme (obésité facio-tronculaire, amyotrophie, vergetures, HTA, hypokaliémie, hyperglycémie). Diminuer la posologie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Se méfier de l'hypokaliémie liée à un surdosage en cas de coprescription avec **macrolides**, **antiarythmiques** donnant des torsades de pointes, **digitaliques**.

Prudence si autres médicaments hypokaliémisants (**diurétiques**, **amphotéricine B**).

Catabolisme augmenté par les inducteurs enzymatiques (**barbituriques**, **primidone**, **rifampicine**, **phénytoïne**).

## INSUFFISANCE SURRÉNALE DE L'ENFANT (2)

### Réhydratation

Sous forme de glucosé 5 % le plus souvent ou glucosé 10 % (si hypoglycémie persistante avec glucosé 5 %) avec NaCl **sans KCl**.  
Volume :

- nouveau-né avec déshydratation sévère : 180 mL/kg/j ;
- nouveau-né avec déshydratation modérée ou nourrisson : 150 mL/kg/j ;
- enfant plus grand : 2,5 à 3 L/m<sup>2</sup>/j.

Apport de NaCl : chlorure de sodium : 10 à 15 mEq/kg/j chez le nouveau-né (dont la moitié en 6 h) et sans dépasser 24 g/j de NaCl chez le grand enfant.

Pas de chlorure de potassium.

- En cas d'acidose : bicarbonate de sodium :  $1/3 \times \text{poids} \times \text{base déficit}$  sur 1 h.
- En cas d'hyponatémie menaçante, passer NaCl à 5,85 % (1 mL = 1 mEq) sur 30 min. à 1 h : quantité à passer (en mEq) pour augmenter la natrémie à  $125 = 2/3 \times \text{poids} \times (125 - \text{natrémie})$ .

La natrémie ne doit pas remonter de plus de 1 mEq par heure (risque d'œdème cérébral).

### Traitement hormonal substitutif

- **Hormones glucocorticoïdes, hémisuccinate d'hydrocortisone (HYDROCORTISONE UPJOHN)** IV ou IM : 2 à 4 mg/kg/6 h (selon la gravité).
- **Hormones minéralocorticoïdes, désoxycortone (SYNCORTYL)** IM : 2,5 mg toutes les 12-24 h.

### Surveillance

- Scope respiratoire, poids, pouls, PA, diurèse, glycémies capillaires, ECG.
- Ionogramme sanguin, glycémie, calcémie.
- Ionogramme urinaire.

### Évolution

Dès que l'état digestif le permet, relais *per os* (possibilité d'effectuer une étape intermédiaire par voie IM avec **acétate d'hydrocortisone**). Puis diminution progressive des doses jusqu'aux doses d'entretien.

Diminution simultanée de la réhydratation et des apports sodés.

### Traitement de l'insuffisance surrénale lente

#### Traitement étiologique éventuel

##### Régime

Normosodé, voire supplémentation sodée avant 2 ans (régime désodé contre-indiqué).

##### Opothérapie substitutive à vie

- **Hormones glucocorticoïdes, hydrocortisone (HYDROCORTISONE ROUSSEL)** : 15 à 20 mg/m<sup>2</sup>/j en 2 prises *per os*.
- **Hormones minéralocorticoïdes, fluodrocortisone (ADIXONE)** : en cas de déficit minéralocorticoïde, 25 à 100 µg/j en 2 prises.

##### En cas de stress, de maladie intercurrente

Doubler voire tripler les doses d'**hydrocortisone**.

En cas de difficultés alimentaires :

- **acétate d'hydrocortisone** IM : 3 à 5 mg/kg, renouvelable toutes les 12 h ou **hémisuccinate d'hydrocortisone** 2 mg/kg/6 h IVD ;
- **SYNCORTYL** IM : 2 à 4 mg en 1 injection IM/j.

##### Hospitalisation au moindre doute de décompensation

##### En cas de chirurgie

La veille, doubler les doses. Puis le jour de l'intervention :

- **SYNCORTYL** : 2 à 5 mg IM avant l'intervention, 1 à 2 mg IM le lendemain puis relais *per os* ;
  - **hémisuccinate d'hydrocortisone** : avant, pendant l'intervention puis 2 mg/kg/6 h IVD jusqu'à relais *per os* (environ 24 h). Garder des doses doubles d'**hydrocortisone** pendant 1 sem.
- Pendant l'intervention, perfuser avec glucosé 10 % + 8 mEq/kg/j de NaCl.

##### Port d'une carte d'insuffisant surrénalien [1]

Le risque encouru par ces patients est en effet celui d'une décompensation aiguë dont le traitement est une urgence vitale.

### CONSENSUS

[1] Insuffisance surrénale – Carte de soins et d'urgence. Informations et conseils, DGS, 2007

## RACHITISME CARENTIEL (1)

Devenu rare grâce à la prévention, il est suspecté devant une hypocalcémie, devant des signes osseux, au cours d'un bilan de malabsorption.

### Bilan diagnostique

- Radiographies : poignet de face, thorax.
- Calcémie, phosphorémie, phosphatases alcalines.
- Calciurie, phosphaturie, créatininurie.
- PTH, 25 (OH) D3, 1,25 (OH)<sub>2</sub> D3.

### Trois stades du rachitisme

#### Stade précoce

Hypocalcémie, phosphorémie normale, lésions radiologiques discrètes.

#### Stade floride (plus avancé)

Présence de déformations métaphysaires. Calcémie normale, phosphorémie basse, PTH augmentée, phosphatases alcalines augmentées, calciurie basse.

#### Stade sévère (carence prolongée)

Déminéralisation osseuse, déformation des membres, calcémie basse, phosphorémie basse, PTH augmentée, phosphatases alcalines augmentées, calciurie basse.

### Traitement

#### Rachitisme sans hypocalcémie symptomatique

**Calcium, gluconate de calcium (CALCIUM-SANDOZ)** : 1 g/m<sup>2</sup>/j de calcium-élément *per os* en 2 ou 3 prises pendant 15 j à 2 mois selon l'intensité de la déminéralisation.

**Vitamine D, cholécalférol (VITAMINE D3 BON)** : 1 amp. buv. à 200 000 UI *per os* en dose unique. Elle est administrée 48 h après le début du calcium pour éviter une aggravation de l'hypocalcémie car elle est initialement hypocalcémiant.

#### Rachitisme avec hypocalcémie symptomatique ou < 1,75 mmol/L

##### ► Traitement initial

- Perfusion de **calcium, gluconate de calcium (GLUCONATE DE CALCIUM LAVOISIER 10 %)** : 1 g/m<sup>2</sup>/j de calcium-élément en IV continu ; diluer au 1/5<sup>e</sup> (10 mL dans 40 mL de glucosé 5 %).

- Associer 1,25 (OH)<sub>2</sub> D3, dérivé hydroxylé de la **vitamine D, calcitriol (ROCALTROL)** : 1 µg = 4 capsules 2 fois/j *per os*.

##### ► Dès que calcémie > 2 mmol/L

- **Vitamine D, cholécalférol (VITAMINE D3 BON)** : 1 amp. buv. à 200 000 UI *per os*.

- Arrêt du **ROCALTROL** 24 h après la vitamine D mère.

Après traitement reprendre une prophylaxie normale.

## CALCIUM (1)

### ■ Calcium

<b>CACIT</b>					
Calcithérapie à forte dose : 500 à 1 200 mg/j (calcium-élément)	60 cp. efferv. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	30 cp. efferv. 1 g	6,97		65 %	0,23
<b>CALCIUM SANDOZ</b>					
Idem <b>CACIT</b>	20 cp. efferv. 500 mg	2,88		65 %	0,14
	30 sach. sol. buv. 500 mg	3,90		65 %	0,13
<b>CALCIFORTE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 amp. buv. 500 mg	5,15		65 %	0,17
<b>CALCIDOSE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 sach. pdre 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	60 cp. 750 mg	10,41		65 %	0,17
	30 cp. 1 000 mg	6,97		65 %	0,23
<b>CALPEROS</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. à sucer 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALTRATE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>DENSICAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. à sucer 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>OSTRAM</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 sach. 0,6 g	3,90		65 %	0,13
	30 sach. 1,2 g	6,97		65 %	0,23

## RACHITISME CARENTIEL (2)

### Surveillance

Elle permet de vérifier la vitaminosensibilité.

- À 1 mois, normalisation de : phosphorémie, calciurie, phosphatases alcalines.
- Normalisation radiologique sur plusieurs mois :
  - densification de la ligne métaphyso-épiphyse ;
  - minéralisation épiphysaire puis épaississement cortical ;
  - correction de la déformation après plusieurs années.

### En cas d'échec du traitement

Se méfier d'un rachitisme vitaminorésistant :

- *Malabsorption*
- Mucoviscidose, cholestase, maladie cœliaque, etc.
- Administrer alors la **vitamine D3** par voie intramusculaire.
- *Trouble du métabolisme de la vitamine D*
- Insuffisance rénale chronique (défaut de 1-hydroxylation).
- Traitement par **phénobarbital** ou **phénytoïne**.
- Rachitisme héréditaire pseudo-carentiel.

- *Trouble du métabolisme du phosphore*
- Traitement par hydroxyde d'alumine.
- Hypophosphorémie d'origine génétique ou carentielle.
- *Tubulopathie*

### Prophylaxie

Par **vitamine D2** ou **D3** mère (jamais de dérivés hydroxylés).

#### Chez la femme enceinte

**Vitamine D, ergocalciférol (UVESTÉROL D)** : dose n° 1 (= 1 000 UI) *per os* par jour, pendant le dernier trimestre de grossesse si ce dernier se déroule en hiver.

#### Chez tous les enfants

##### de la naissance à 18 mois

**Vitamine D, ergocalciférol (UVESTÉROL D)** : dose n° 1 (= 1 000 UI) *per os* par jour ; chez les prématurés, les enfants noirs : dose n° 2 (= 1 500 UI) par jour.

#### En cas de doute sur l'observance

**Vitamine D, cholécalciférol (VITAMINE D3 BON)** : 1 amp. buvable à 200 000 UI *per os*, tous les 6 mois, jusqu'à 18 mois (à poursuivre jusqu'à 5 ans pendant le semestre d'hiver).

À consigner impérativement dans le carnet de santé en rouge, pour éviter les surdosages par fortes doses répétées.

## RETARD DE CROISSANCE (1)

### Étiologie

#### Retard de croissance idiopathique

Retard statural harmonieux, isolé, avec bilan hormonal normal. Souvent associé à un retard pubertaire, avec dans ce cas un pronostic final favorable.

#### Retard de croissance intra-utérin

Rattrapage le plus souvent durant les 2 premières années de vie mais 10-15 % gardent un retard de croissance, quelle que soit la cause du RCIU.

#### Petite taille familiale (constitutionnelle)

Retard statural modéré avec vitesse de croissance conservée. Notion de petite taille familiale fréquente dans les ATCD.

#### Maladies chroniques

- Carence nutritionnelle (carence d'apport, maladie cœliaque, maladie de Crohn).
- Respiratoire (mucoviscidose, asthme sévère sous **corticoïdes**, etc.).
- Insuffisance rénale chronique.
- Cardiopathie sévère.
- Autres : certaines maladies hépatiques, maladies métaboliques, drépanocytose, thalassémie, sida.

#### Pathologies endocriniennes

- Hypothyroïdie (centrale ou périphérique).
- Hypercorticisme [endogène (= maladie de Cushing) ou corticothérapie].
- Déficit en hormone de croissance (GH) :
  - congénitaux (origine malformative, génétique, etc.) ;

- acquis (tumeur cérébrale, histiocytose, sarcoïdose, post-radiothérapie, post-infectieux, post-traumatique, etc.) ;
- idiopathiques (souvent partiels et transitoires).

- Pseudohypoparathyroïdie.
- Puberté précoce : après la phase précoce d'accélération de la croissance staturale, elle entraîne une soudure prématurée des cartilages de conjugaison aboutissant à une petite taille définitive.

#### Retard pubertaire

- Retard pubertaire simple (garçon ++, rare fille).
- Hypogonadisme périphérique (hypergonadotrope).
- Hypogonadisme central (hypogonadotrope).

#### Anomalies chromosomiques

- Syndrome de Turner.
- Trisomies 21, 18, 15, etc.

#### Dysplasies osseuses constitutionnelles

#### Syndromes dysmorphiques

Syndromes de Noonan, de Willi-Prader, de Silver Russel, etc.

#### Nanisme psycho-social

#### Quand explorer un retard statural ?

- Taille  $< -2$  DS.
  - Ralentissement vitesse de croissance  $< -1$  DS.
  - Discordance entre taille enfant et taille cible génétique.
  - Retard important de l'âge osseux.
- Calcul de la taille cible génétique :
- garçon :  $[T \text{ père} + T \text{ mère (cm)} + 13]/2$  ;
  - fille :  $[T \text{ père} + T \text{ mère (cm)} - 13]/2$ .

## RETARD DE CROISSANCE (2)

### Bilan étiologique

- Mesuration de naissance ; taille des parents.
- Antécédents, analyse des courbes de croissance.
- Examen clinique complet, stade pubertaire.
- NFS, plaquettes, VS, ionogramme sanguin, urée, créatinine, calcémie, phosphorémie.
- Anticorps anti-endomysium, anti-transglutaminase.
- T3I, T4I, TSH.
- IGF-1.
- Cortisol libre urinaire.
- Tests de stimulation de la sécrétion de GH (ornithine, arginine, insuline, glucagon  $\beta$ -xolol, etc.).
- RX poignet G (âge osseux).
- Caryotype chez la fille.
- ± IRM cérébrale (++) si cassure croissance, si déficit GH).
- Radio de squelette (orientation selon la clinique).

Devant une cassure de vitesse de croissance, faire imagerie cérébrale (IRM, voire scanner) sans attendre les explorations hormonales pour éliminer une tumeur.

### Traitement

#### Traitement étiologique

Si étiologie curable : maladie chronique, hypothyroïdie, hypercorticisme, tumeur cérébrale, etc.

### Traitement par GH [1]

#### ► Indications

- Déficit en GH : pic de GH < 10 ng/mL (ou 20 mUI/L) sur 2 tests de stimulation différents (déficit partiel entre 5 et 10, déficit complet < 5 ng/mL ou 10 mUI/L).
- Syndrome de Turner.
- Retard de croissance intra-utérin.
- Insuffisance rénale chronique.
- Syndrome de Willy Prader.
- D'autres indications dans le cadre d'essais thérapeutiques.

Peu d'efficacité du traitement par GH dans les petites tailles familiales.

#### ► Modalités

- **Hormone somatotrope biosynthétique (GH)** : posologie variable selon les indications (0,035 à 0,05 mg/kg/jr), répartie en 6 à 7 injections hebdomadaires SC le soir.
- Distribution en officine sur prescription hospitalière (ordonnance de médicament d'exception).
- Surveillance/3 mois initialement puis /6 mois.
- Arrêt du traitement quand vitesse de croissance < 3 cm/an, âge osseux de 15 ans chez le garçon, 13 ans chez la fille.

### CONSENSUS

- [1] L'hormone de croissance chez l'enfant non déficitaire, évaluation du service rendu à la collectivité, HAS, 2011

## TROUBLES DE LA PUBERTÉ (1)

### Retard pubertaire

Absence de caractères sexuels secondaires après 13 ans chez la fille (pas de développement mammaire), et 14 ans et demi chez le garçon (testicules  $\leq 25$  mm).

#### Bilan

- Courbe de croissance.
- Âge osseux.
- Estradiol ou testostérone (selon le sexe), prolactine, T4, TSH.
- FSH et LH de base et après stimulation par LH-RH.
- Échographie pelvienne (fille).
- Caryotype.
- IRM cérébrale (si origine centrale).

#### Étiologies

##### ► Origine périphérique

##### • Chez la fille :

- anomalies chromosomiques : syndrome de Turner, trisomie 21, etc. ;
- pseudo-hermaphrodisme masculin (caryotype masculin avec phénotype féminin) : déficit en 5- $\alpha$ -réductase, insensibilité aux androgènes ;
- résistance aux gonadotrophines ;
- lésion ovarienne (auto-immune, infectieuse, post-radiothérapie, etc.) ;
- dysgénésie gonadique.

##### • Chez le garçon :

- anomalies chromosomiques : Klinefelter, 45 X/XY, anomalies de l'Y, etc. ;
- anorchidie bilatérale ;
- hypoplasie des cellules de Leydig ;
- atrophie testiculaire (infectieuse, auto-immune, traumatique, médicamenteuse).

##### ► Origine centrale

• Déficit en gonadotrophines dans le cadre d'un hypopituitarisme, le plus souvent tumoral mais parfois lié à une histiocytose, une sarcoïdose, une radiothérapie, etc.

• Déficit en gonadotrophines isolé (syndrome de Kallmann-de Morsier, etc.).

##### • Étiologie fonctionnelle :

- syndromes polymalformatifs (Prader-Willi, Laurence Moon-Biedel) ;
- maladies chroniques générales ;
- toxicomanie ;
- stress, sport de haut niveau.

##### ► Retard pubertaire simple

Reste un diagnostic d'élimination malgré sa grande fréquence.

#### Traitement

Associe traitement étiologique éventuel et traitement hormonal : œstrogène ou testostérone selon le sexe.

### Puberté précoce

Apparition précoce des caractères sexuels secondaires :

- avant 8 ans chez la fille (développement mammaire  $\pm$  pilosité pubienne et/ou axillaire) ;
- avant 10 ans chez le garçon (testicules  $> 30$  mm  $\pm$  pilosité pubienne et/ou axillaire).

Distinction entre :

- puberté précoce centrale ;
- puberté précoce périphérique ;
- pseudo-puberté précoce (puberté dissociée).



## ANALOGUES DE LA LH-RH (PÉDIATRIE)

## ■ Leuproréline

<b>ENANTONE LP</b>					
Puberté précoce : 1/2 fl. < 20 kg 1 fl. > 20 kg 1 inj. SC ou IM/mois 1 inj. SC ou IM/3 mois	1 fl. 3,75 mg + disp.	137,17	I	65 %	137,17
	1 fl. 11,25 mg + disp.	376,15	I	65 %	376,15

## ■ Triptoréline

<b>DÉCAPEPTYL</b>					
Puberté précoce : 1/2 fl. IM < 20 kg 1 fl. IM > 20 kg	1 fl. 2 mL = 3 mg LP	134,44	I	65 %	134,44

**PROPRIÉTÉS**

Peptides de synthèse, analogues de la LH-RH naturelle. Action initiale de stimulation de la sécrétion des hormones gonadotropes (élévation des taux sanguins de FSH et LH). L'administration continue prolongée entraîne en 2 à 4 sem. une inhibition de cette sécrétion aboutissant à un hypogonadisme. Ce dernier persiste pendant toute la durée du traitement sans phénomène d'échappement, il est réversible en 4 sem. à l'arrêt du traitement.

Après injection IM : phase de libération rapide pendant 1 ou 2 j à partir des microsphères, puis stabilisation de la libération pendant environ 1 mois.

**INDICATIONS**

Puberté précoce.

**CONTRE-INDICATIONS**

Sensibilité particulière à l'alcool benzylique (**leuproréline**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conservation à moins de 25 °C.

Possibilité de survenue de petites métrorragies dans 30 % des cas ; associer pendant le premier mois de traitement **cyprotérone** 100 mg/j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Petites hémorragies vaginales (30 %).

Possibilité de réaction locale au point d'injection.

La tolérance du traitement dans cette indication est excellente.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudence en cas d'association avec des médicaments hyperprolactinémisants.

## TROUBLES DE LA PUBERTÉ (2)

### Développement isolé d'un caractère pubertaire

- Développement mammaire isolé (prématuré télarche) : fréquent avant 2 ans ; absence d'imprégnation des organes génitaux internes, absence d'avance de l'âge osseux et absence d'accélération staturale ; pas de traitement ; régresse le plus souvent ou reste stable parfois ; surveiller l'absence de survenue d'autres signes pubertaires et d'accélération de la vitesse de croissance.
- Pilosité pubienne isolée (prématuré pubarche) ; éliminer toujours un bloc surrénalien par un test au **SYNACTHÈNE** (forme non classique d'un bloc 21-hydroxylase ++); pas de traitement, surveiller l'absence d'apparition d'autres signes pubertaires.

### Bilan

- Âge osseux.
- Échographie pelvienne (fille).
- Testostérone ou estradiol (selon le sexe).
- 17 OHP
- Test à la LH-RH.
- IRM cérébrale (si puberté précoce centrale).

### Puberté précoce centrale

#### ► Étiologies

- Tumeur intracrânienne.
- Kyste arachnoïdien, hydrocéphalie.
- Secondaire à méningite, irradiation, traumatisme crânien.
- Idiopathique (20 % chez le garçon, 80 % chez la fille).

#### ► Traitement

- Traitement étiologique si possible.
- Traitement freinateur selon certains critères à discuter au cas par cas (âge < 9 ans, avance AO de plus de 2 ans, pronostic de taille finale mauvais, etc.) : **analogues de la GnRH, leuproréline (ENANTONE**

**LP 3,75 mg)** : IM ou SC x 1/mois ou **ENANTONE LP 11,25 mg SC** tous les 3 mois :

- poids < 20 kg : 1/2 flacon/injection ;
- poids > 20 kg : 1 flacon/injection pour ces 2 formes.

#### ► Surveillance

- Dès le troisième mois :
  - ralentissement de la vitesse de croissance ;
  - arrêt d'évolution des signes pubertaires, arrêt des règles ;
  - diminution de l'estradiol (fille) ou de la testostérone (garçon).
- Test à la LH-RH (non systématique) après la quatrième injection ; freinage correct si pic de LH < 5.
- Arrêt du traitement quand l'âge osseux est aux alentours de 13 ans chez le garçon et 11 ans chez la fille. La puberté reprend alors son évolution normale.

### Puberté précoce périphérique (plus rare)

#### ► Étiologie

- Chez la fille :
  - tumeur ovarienne ou surrénale ; kyste ovarien ;
  - prise d'**œstrogènes** (pommade, comprimé, etc.) ;
  - syndrome de Mac Cune Albright ;
  - hyperplasie congénitale des surrénales (virilisation).
- Chez le garçon :
  - sécrétion tumorale de hCG ;
  - tumeur testiculaire ou surrénale ;
  - testotoxicose familiale ;
  - hyperplasie congénitale des surrénales.

#### ► Traitement

- Traitement étiologique principalement (étiologie souvent tumorale).
- En cas de bloc surrénalien, traitement freinateur par : **hormones surrénaliennes, hormones glucocorticoïdes (HYDROCORTISONE ROUSSEL)** : 15 à 20 mg/m<sup>2</sup>/j en 2 prises.

#### ► Surveillance

- Courbe de croissance, évolutivité puberté.

## SATURNISME

Intoxication par le plomb due à l'ingestion d'écaillures de peinture (goût sucré) ou plâtre (pica) ou poussières de plomb dans logements anciens mal entretenus (< 1948). Enfants à risque ++ avant 6 ans, car absorption digestive du plomb et toxicité cérébrale plus importante que l'adulte.

### Étiologie

Il ne faut pas oublier de penser à un saturnisme devant :

- une anémie microcytaire (pâleur, asthénie) ;
- des douleurs abdominales, chroniques, une constipation ;
- des troubles du comportement, une encéphalopathie ;
- une tubulopathie ;
- une hypertension artérielle.

### Bilan du retentissement

- hématologie : bilan martial, électrophorèse de l'hémoglobine, etc. ;
- rénal : ionogramme sanguin, fonction rénale, ionogramme et osmolalité urinaires, recherche de glycosurie, protéinurie ;
- neurologique : EEG, IRM cérébrale, etc. ;
- digestif : ASP.

Distinction de 5 classes selon l'importance de la plombémie mesurée (CDC 1991) :

- < 100 µg/L : classe I ;
- 100-149 µg/L : classe IIA ;
- 150-249 µg/L : classe IIB ;
- 250-449 µg/L : classe III ;
- 450-700 µg/L : classe IV ;
- > 700 µg/L : classe V.

### Traitement [1]

#### Traitement symptomatique

- Si encéphalopathie : restriction hydrique à 500 mL/m<sup>2</sup>/j, lutte contre œdème cérébral, traitement anticonvulsivant.
- Si plomb dans la lumière digestive à l'ASP : lavements évacuateurs.
- Traiter l'anémie : traitement martial (doit

être interrompu pendant les cures de chélation).

#### Traitement préventif

- Déclaration obligatoire.
- Enquête visant à identifier et éliminer la source de contamination par le plomb.
- Recherche systématique de saturnisme dans la fratrie.

#### Traitement étiologique

Il dépend de la plombémie dont le dosage devra être vérifié.

##### ► Classes I, II, III

Pas de traitement étiologique, mais suivi de la plombémie tous les 3 mois. Si plombémie > 250 µg/L, envisager traitement (cf. classe IV) si elle reste élevée avec anémie persistante.

##### ► Classe IV

Traitement *per os* par **DMSA** 30 mg/kg/j (ou 1 000 mg/m<sup>2</sup>/j) en 3 prises pendant 5 j : 3 cures à 10-15 j d'intervalle.

##### ► Classe V

Hospitalisation en urgence pour hyperhydratation IV 3 L/m<sup>2</sup>/j et traitement chélateur du plomb.

Si plombémie entre 700 et 1 000 µg/L : **chélateur du plomb, calcium édétate de sodium (EDTA) (CALCIUM ÉDÉTATE DE SODIUM)** : 1 500 mg/m<sup>2</sup>/j en IV continu, pendant 5 j + **DMSA** 30 mg/kg/j (ou 1 000 mg/m<sup>2</sup>/j) en 3 prises pendant 5 j : 5 cures. Si plombémie > 1 000 µg/L et/ou troubles neurologiques : **chélateur du plomb, dimercaprol (BAL)** : 450 mg/m<sup>2</sup>/j en 4 à 6 inj. IM jusqu'à l'obtention d'une plombémie < 700 µg/L, associé à **calcium édétate de sodium (EDTA) (CALCIUM ÉDÉTATE DE SODIUM)** : 1 500 mg/m<sup>2</sup>/j en IV continu, dilué dans 250 mL/m<sup>2</sup> de glucosé 5 % : plus de 5 cures sont nécessaires dans ce cas.

#### Évolution

- Évolution favorable des atteintes hémalogique, digestive et rénale.
- Séquelles possibles en cas d'encéphalopathie : épilepsie, cécité, retard des acquisitions.

### CONSENSUS

[1] Intoxication au plomb de l'enfant et de la femme enceinte – Prévention et prise en charge médico-sociale, *SFP*, 2003

## DYSPNÉE LARYNGÉE AIGUË (1)

### Évaluation de la gravité

- Signes d'hypercapnie (sueurs, tachycardie, HTA, troubles de conscience, etc.) ou d'hypoxie (cyanose, saturation O<sub>2</sub>).
- Polypnée superficielle inefficace (épuisement).
- Irrégularités respiratoires.

Ces signes d'alarme imposent un rétablissement urgent de la liberté des voies aériennes, si besoin par intubation, souvent difficile, à effectuer si possible en présence d'un ORL (trachéotomie en urgence si besoin).

### Diagnostic étiologique

*Endoscopie laryngée systématique* si âge < 6 mois.

#### Chez le nouveau-né et le nourrisson avant 6 mois

- Laryngomalacie (= stridor laryngé congénital).
- Angiome sous-glottique.
- Paralyse laryngée.
- Malformation congénitale (sténose, diaphragme, etc.).
- Kyste laryngé.
- Sténose laryngée acquise (post-intubation).
- Exceptionnellement laryngite aiguë (nourrisson en période automno-hivernale).

#### Chez le nourrisson après 6 mois

- *En l'absence de contexte fébrile*
  - Œdème laryngé allergique.
  - Corps étranger laryngé.
  - Brûlure caustique.
  - Traumatisme laryngé.
- *En cas de fièvre*
  - Laryngite aiguë sous-glottique.
  - Laryngite striduleuse.

- Amygdalite volumineuse.
- Phlegmon péripharyngé.
- Épiglottite, devenue exceptionnelle depuis la vaccination généralisée contre l'*Haemophilus b*, à évoquer devant une fièvre à 39-40 °C, début brutal avec dysphagie, hypersalivation, adénopathies cervicales, absence de vaccination par HIB.

### Traitement

Il est fonction de l'étiologie.

#### Épiglottite (*Haemophilus b*) = urgence +++

Devant toute suspicion diagnostique :

- Hospitalisation.
  - Ne pas coucher l'enfant : le laisser au calme dans les bras de ses parents, proscirre abaisse-langue (risque d'arrêt cardio-respiratoire en cas d'obstruction respiratoire par l'épiglotte).
  - Voie d'abord veineuse.
  - Intubation : quasiment systématique (l'enfant étant en général en grande détresse), si possible par un ORL.
  - Antibiothérapie par voie veineuse **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (CLAFORAN)** : 100 mg/kg/j en 3 inj. IVDL.
  - Traitement antipyrétique : **antipyrétiques, paracétamol (PERFALGAN)** : 60 mg/kg/j en 4 inj. IVL de 15 min.
  - Les **corticoïdes** ne sont pas efficaces.
- Une fois le malade intubé, l'évolution est toujours favorable en quelques jours (sauf complications de réanimation), permettant l'extubation.

L'antibiothérapie est poursuivie 10 j avec possibilité de relais oral par : **aminopénicillines, amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN, CIBLOR)** : 80 mg/kg/j *per os* en 3 prises.

## DYSPNÉE LARYNGÉE AIGÜE (2)

### Laryngite aiguë sous-glottique

Dans tous les cas évoquer la possibilité d'un corps étranger, même en contexte fébrile, et le rechercher au moins à l'interrogatoire.

#### ► Traitement initial

- Oxygénothérapie selon Sat. O<sub>2</sub>.
- **Corticoïdes de synthèse**, méthylprednisolone (**SOLUMÉDROL**) : 1 à 2 mg/kg IM ou IVD relayée par bétaméthasone (**CÉLESTÈNE**) : 10 à 15 gtt/kg/j *per os* en 1 à 2 prises pendant 3 à 5 j.
- Effectuer un aérosol d'**adrénaline** : de 1 à 3 mL = 1 à 3 mg + 3 mL sérum physiologique, à nébuliser avec 6 L/min d'oxygène, sous surveillance continue de la fréquence cardiaque (risque de tachycardie). Certains adjoignent des **corticoïdes de synthèse** dans l'aérosol : utiliser la forme nébulisable, **budésonide (PULMICORT)** : 1 mg par nébulisation.
- Antibiothérapie inutile car l'étiologie est quasiment toujours virale. N'associer une antibiothérapie qu'en cas de surinfection avérée (otite, pneumopathie, etc.).

#### ► Si l'amélioration est franche, si la dyspnée ne récidive pas

Retour à domicile (après surveillance minimale 2 h).

#### ► Si l'amélioration est modérée ou si la dyspnée récidive

Hospitaliser et poursuivre les **corticoïdes** *per os* et les aérosols toutes les 2 à 3 h, à espacer dès que les symptômes diminuent, pour ne laisser que les **corticoïdes** *per os*.

► *Si ce traitement est insuffisamment efficace, la dyspnée menaçante*

Transfert en réanimation pour éventuelle intubation.

### Corps étranger des voies aériennes

#### ► En cas d'asphyxie

- Manœuvre de Heimlich chez l'enfant ou de Mofenson chez le nourrisson.
- Sous laryngoscope : extraction d'un corps étranger supraglottique ou intubation repoussant le corps étranger dans la bronche souche droite, permettant de ventiler sur le poumon gauche en attendant l'extraction.
- Trachéotomie ou ponction de trachée (1 ou 2 cathlons 12 ou 14), sur lesquels on peut adapter un cob de sonde d'intubation n° 3.

#### ► En l'absence d'asphyxie

Ne pas mobiliser l'enfant, le laisser demi-assis +++.

**Corticoïde de synthèse**, méthylprednisolone (**SOLUMÉDROL**) : 1 à 2 mg/kg IM ou IVD et transport par SAMU dans un centre d'endoscopie. La trachéobronchoscopie rigide sous anesthésie générale permet la confirmation du diagnostic et l'extraction du corps étranger.

#### ► Cas particulier du corps étranger ancien bronchique (intérêt de la radio de thorax en inspiration et expiration)

L'extraction est précédée de 10 j de traitement par :

- **aminopénicilline**, amoxicilline + **acide clavulanique (AUGMENTIN)** : 80 mg/kg/j *per os* en 3 prises ;
  - **corticoïde de synthèse**, bétaméthasone (**CÉLESTÈNE**) : 10 à 15 gtt/kg/j *per os* en 1 prise le matin.
- Il faut surveiller l'absence de trouble de ventilation à distance.

## VIH DE L'ENFANT (1)

### Enfant né de mère VIH positive

#### Risque de contamination de l'enfant

- Mère non traitée par AZT : risque = 20 %.
- Mère traitée par AZT (ou autre antirétroviral) : risque < 1 %.
- Risque moindre pour le virus VIH 2.
- Risque majoré par CD4 < 200/mm<sup>3</sup>, ARN viral > 4 log/mL, symptômes cliniques.

#### Prise en charge de l'enfant

##### ► Pas d'allaitement maternel

Majorer le risque de transmission de 10 % environ.

##### ► Traitement préventif

**Antirétroviral** : zidovudine ou AZT (**RÉTRO-VIR**), débuté à H6 de vie : 2 mg/kg/6 h *per os* ; à poursuivre pendant 6 semaines.

##### ► Surveillance

Bilan avant J5, à 1 mois, 3 mois puis tous les 6 mois jusqu'à 24 mois, comportant examen en centre spécialisé, NFS, CD4 et CD8, transaminases, lipase, et recherche du virus VIH.

• Avant 15 mois, les examens permettant de dépister la contamination sont les suivants.

- Ag P24 : sensibilité 20 % (nouveau-né), 40 % (après 3 mois), positivité péjorative.
- Recherche du VIH par PCR : sensibilité 50 % (nouveau-né), > 90 % (après 3 mois).
- Recherche de virus dans culture lymphocytaire : sensibilité 50 % (nouveau-né), > 90 % (après 3 mois).

Ces examens sont effectués vers J5 et à 1 mois, 3 mois.

En cas de négativité du bilan à 3 mois, on peut affirmer qu'il n'a pas été contaminé même si la surveillance est poursuivie jusqu'à 2 ans.

• À partir de 15 mois, sérologie VIH (devient interprétable car les anticorps maternels transmis ont disparu). Deux prélèvements positifs sont exigés pour affirmer l'infection par VIH.

### Suivi de l'enfant VIH+ [1]

#### Surveillance systématique

Surveillance de l'état immunitaire, l'immunodépression pouvant apparaître avant 6 mois (forme à évolution rapide) ou après plusieurs années (forme à évolution lente) :

- Taux de lymphocytes CD4, Ag P24, ARN VIH plasmatique (charge virale) tous les 3 mois jusqu'à 18-24 mois, puis 3 fois par an.
- NFS, bilan hépatique, protéinurie.
- Sérologies CMV et toxoplasmose, fond d'œil.
- Radio de thorax 1 fois par an.

#### Vaccinations

- *Diphtérie, tétanos, polio injectable, coqueluche, Haemophilus, hépatite B, grippe, pneumocoque* sont sans risque et doivent être effectués (efficacité dépendante de l'intensité du déficit immunitaire). Penser à l'hépatite B dès la naissance (souvent associée au VIH dans populations à risque).
- *ROR, fièvre jaune* : jamais d'accident décrit mais problème théorique car virus vivant ; ne les effectuer qu'en l'absence de déficit immunitaire profond.
- *BCG, polio orale* : contre-indication absolue (vaccins à micro-organisme persistant). La vaccination par le BCG (dont les accidents post-vaccinaux liés au VIH sont rares) peut éventuellement être mise en balance dans des populations à haut risque de contag tuberculeux.

## VIH DE L'ENFANT (2)

### Traitement antirétroviral

Actuellement par trithérapie antirétrovirale. Doit être envisagé en milieu spécialisé.

### Prévention primaire

La prévention primaire des infections opportunistes doit être débutée dès que l'immunodépression est sévère :

- < 1 an : CD4 < 1 500/mm<sup>3</sup>
- 1 à 2 ans : CD4 < 750/mm<sup>3</sup>
- 2 à 6 ans : CD4 < 500/mm<sup>3</sup>
- > 6 ans : CD4 < 200/mm<sup>3</sup>

#### ► *Pneumocystis carinii*, toxoplasme

**Sulfamides, triméthoprime + sulfaméthoxazole (BACTRIM)** : 25 mg/kg/j de sulfaméthoxazole *per os* en 1 prise.

#### ► *Candida*

La prévention primaire n'est pas systématique en raison du risque de résistances, mais discutée au cas par cas : **antifongique imidazolé, kétoconazole (NIZORAL)** : 3 à 5 mg/kg/j *per os* en 1 prise.

#### ► Infections bactériennes

La prévention primaire est indiquée en cas d'antécédents d'infection ORL ou bronchiques répétées, en cas de pneumopathie interstitielle lymphoïde. Le **BACTRIM** (cf. ci-dessus) assure cette prévention. En cas d'échec, possibilité d'utiliser des **immunoglobulines humaines polyvalentes** : 400 mg/kg IVL toutes les 3 sem.

### Traitement des infections opportunistes

#### ► Conduite à tenir devant une fièvre

- Si CD4 récents normaux : même attitude que pour enfant non immunodéprimé mais antibiothérapie plus facile.

- Si CD4 < seuil d'immunodépression sévère.

#### Bilan systématique

- NFS, CRP, fibrine, ionogramme sanguin, bilan hépatique, hémoculture standard et sur isolator antigénémie, virémie et virurie CMV.
- ECBU, radio de thorax.
- Fond d'œil.

#### ► Fièvre + troubles neurologiques

- Penser aux bactéries, aux champignons, au CMV, à la toxoplasmose.

#### Bilan supplémentaire

Scanner cérébral avec injection, fond d'œil, PL (standard, Sabouraud, encre de Chine, PCR toxoplasme et virus du groupe herpès).

#### • Traitement :

- $\beta$ -lactamine, **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 100 mg/kg/j en 2 inj. IVDL ;
- **aminoside, gentamycine (GENTALLINE)** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min ;
- **antifongique triazolé, fluconazole (TRI-FLUCAN)** : 8 mg/kg/j en 1 inj. IV sur 30 min ;
- au moindre doute sur un CMV : **antiviral, ganciclovir (CYMÉVAN)** : 10 mg/kg/j en 2 inj. IVL sur 1 h. En cas de doute sur un HSV : **antiviral, aciclovir (ZOVIRAX)** : 1 500 mg/m<sup>2</sup>/j en 3 inj. IVL sur 1 h ;
- en cas d'abcès au scanner évoquant une toxoplasmose : **antiparasitaire, pyriméthamine (MALOCIDE)** : 0,5 à 1 mg/kg/j en 1 prise *per os* et **sulfamide, sulfadiazine (ADIAZINE)** : 0,1 g/kg/j en 4 à 6 prises *per os* (0,15 kg/j chez le nourrisson). Traitement 3 à 6 mois puis traitement d'entretien à vie.

## VIH DE L'ENFANT (3)

### ► Fièvre + troubles respiratoires

- Penser aux bactéries (staphylocoque, streptocoque, bacilles Gram-), à la pneumocystose, au CMV, à la tuberculose.

#### Bilan spécifique

Lavage broncho-alvéolaire - brosse, d'emblée si sévère ou en cas d'échec du traitement.

### • Traitement initial :

- $\beta$ -lactamine, **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 50 à 100 mg/kg/j en 1 à 2 IVD ;
- **aminoside, gentamycine (GENTALLINE)** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min ;
- en cas de doute sur le suivi de la prophylaxie ou si pneumopathie sévère : **sulfamides, triméthoprim + sulfaméthoxazole (BACTRIM)** : 100 mg/kg/j de sulfaméthoxazole en 2 inj. IVL d'1 h ;
- en cas de pneumopathie sévère : **antifongique triazolé, fluconazole (TRIFLUCAN)** : 8 mg/kg/j en 1 inj. IV sur 30 min ;

- en cas de pneumopathie sévère : **antiviral, ganciclovir (CYMÉVAN)** : 10 mg/kg/j en 2 inj. IVL sur 1 h en attendant l'adaptation aux résultats bactériologiques.

### ► Fièvre + troubles digestifs

- Penser à la candidose œsophagienne, aux cryptosporidies, et dans les atteintes hépatiques au CMV, aux mycobactéries atypiques.

#### Bilan spécifique

- Coproculture, parasitologie des selles avec recherche de cryptosporidies.
- Amylasémie, lipasémie.
- Échographie foie, rate, pancréas.
- Endoscopie avec biopsies selon l'évolution et le bilan initial.

- Traitement symptomatique de la diarrhée

### ► Fièvre isolée

Après bilan usuel, traitement d'épreuve par **ROCÉPHINE** et **GENTALLINE**.

## CONSENSUS

[1] Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, Groupe d'experts (Rapport Yen), 2010



## MÉNINGITE PURULENTE DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (1)

### Germes responsables

Chez l'enfant et le nourrisson après la période néonatale, les germes en cause sont :

- *Neisseria meningitidis* (méningocoque) ;
- *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque) : augmentation régulière des souches de sensibilité diminuée aux  $\beta$ -lactamines ( $> 40\%$ ) ;
- *Haemophilus influenzae b* (quasi-disparition depuis la vaccination) ;
- plus rarement : streptocoque D, staphylocoque, entérobactéries, listéria.

### Clinique

- Syndrome méningé fébrile.
- Geignement, somnolence.
- Hypotonie axiale, bombement de fontanelle ( $< 1$  an).
- Complication : convulsion, troubles de conscience, coma, signe de localisation.
- Rechercher des signes de gravité : purpura ++, parfois très discret initialement, puis ecchymotique et extensif (méningocoque), troubles hémodynamiques, coma profond.

### Bilan

- Ponction lombaire.
- Antigènes solubles sang/urines/LCR.
- Hémoculture.
- NFS plaquettes, CRP, procalcitonine, ionogramme sanguin.
- Hémostase (purpura).

Réaliser un **scanner cérébral avant** la ponction lombaire uniquement en cas de signes d'HTIC majeure, de signes de localisation, de coma, d'HTIC ancienne (clinique, courbe du périmètre crânien ++), sans retarder la mise en route du traitement (à débiter avant le scanner).

### Traitement [1]

#### Mesures générales

- Perfusion périphérique : 80 mL/kg/j (glucosé 5 % + électrolytes, au minimum 3 g/L de NaCl pour ne pas abaisser l'osmolarité plasmatique).

- En cas de collapsus : cristalloïdes (**NaCl 0,9 %**) : 20 mL/kg en moins de 20 min, oxygénothérapie nasale, passage en réanimation ; traitement inotrope (**noradrénaline**) si pas d'amélioration.
- Arrêt de l'alimentation, prévention de l'ulcère de stress par **antiulcéreux**, **ranitidine (RANIPLEX)** : 10 à 15 mg/kg/j dans la perfusion.

#### Antibiothérapie : en urgence ++

En cas de doute entre méningite virale et méningite bactérienne, traiter par antibiotiques 48 h en attendant le résultat des cultures et des bilans. Mettre en place un traitement par **ZOVIRAX** au moindre doute (cf. Convulsions).

- Germe identifié au direct et/ou Ag solubles + et/ou éléments d'orientation :
  - pneumocoque : **céfotaxime (CLAFORAN)** : 300 mg/kg/j (12 g maxi) en 4 IVDL ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 100 mg/kg/j (4 g maxi) en 1 ou 2 IVDL + **vancomycine** : 40 à 60 mg/kg/j en 4 IVL 1 h ou en IV continu après dose de charge de 15 mg/kg ;
  - méningocoque : **céfotaxime (CLAFORAN)** : 200 mg/kg/j en 4 IVDL ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 75 mg/kg/j en 1 à 2 IVDL ;
  - *Haemophilus* : **céfotaxime (CLAFORAN)** : 200 mg/kg/j en 4 IVDL ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 75 mg/kg/j en 1 ou 2 IVDL.
  - Listériose : **amoxicilline (CLAMOXYL)** : 200 mg/kg/j en 4 IVDL, et **gentamycine (GENTALLINE)** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 IVL,
  - *E. coli* : **céfotaxime (CLAFORAN)** : 200 mg/kg/j en 4 IVDL ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : 75 mg/kg/j en 1 ou 2 IVDL ; + **gentamycine (GENTALLINE)** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 IVL, si âge  $< 3$  mois.
- Germe non identifié au direct et absence d'élément d'orientation ou de signe de gravité : **céfotaxime (CLAFORAN)** ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)** : aux mêmes doses ;  $\pm$  **gentamycine (GENTALLINE)** : 3 à 5 mg/kg/j en 1 IVL, si âge  $< 3$  mois ;  $\pm$  **amoxicilline (CLAMOXYL)** : 200 mg/kg/j en 4 IVDL, si risque de listériose.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l'exclusion du nouveau-né), *SPILF*, 2008

## MÉNINGITE PURULENTE DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (2)

### Adaptation aux résultats de l'antibiogramme ++

► *Haemophilus*

**ROCÉPHINE** seule 7 j.

► *Meningococcus*

**ROCÉPHINE** seule 4 à 7 j.

► *Pneumococcus*

• CMI de la **céphalosporine** < 0,5 mg/L : poursuivre **ROCÉPHINE** seule 10 j.

• CMI de la **céphalosporine** > 0,5 mg/L et évolution clinique et microbiologique favorable : poursuivre **ROCÉPHINE** + **vancomycine** 10 à 14 j.

• CMI de la **céphalosporine** > 0,5 mg/L et évolution clinique ou microbiologique défavorable : modifier antibiothérapie selon résultat de l'antibiogramme : **imipénème** (**TIENAM**) ± **rifampicine** (**RIFADINE**) ± **fosfomycine** (**FOSFOCINE** injectable).

### Corticothérapie

À proposer systématiquement dans les méningites à *Haemophilus* (réduit les séquelles auditives), et pour certains dans celles à pneumocoque (réduirait la mortalité et les séquelles auditives).

**Corticoïdes de synthèse, dexaméthasone (PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMÉTHASONE MYLAN)** : 0,15 mg/kg/6 h en IVD pendant 4 j, à débiter juste avant la 1<sup>re</sup> injection d'antibiotiques ou à défaut au décours, et à poursuivre 2 à 4 j.

### Traitement anticonvulsivant

**Antipépileptiques, diazépam (VALIUM)** :

0,5 mg/kg intrarectal en cas de convulsion, renouvelable (voir gestion des crises convulsives en cas de convulsions prolongées ou répétées).

### Traitement antipyrétique

En cas de fièvre : **antipyrétique, paracétamol (PERFALGAN)** : 15 mg/kg/6 h en IVL 15 min (7,5 mg/kg/6 h si poids < 10 kg).

### Surveillance

- Scope.
- FC, PA, T °C, saturation, diurèse, poids.
- NFS, CRP, ionogramme sanguin (recherche SIADH).
- Périmètre crânien quotidien.

- PL de contrôle vers 36 h de traitement pour pneumocoque et *Haemophilus* (on attend un LCR stérile, une glycorachie normale).

### Évolution

#### Complications aiguës

- Convulsions.
- Sécrétion inappropriée d'ADH.
- Signes neurologiques focaux (recherche d'empyème, d'abcès cérébral, de thrombophlébite cérébrale).
- Foyer bactérien persistant (LCR ou à distance). Adapter l'antibiothérapie à l'antibiogramme, à la 2<sup>e</sup> PL, au dosage d'antibiotiques dans le LCR.
- Hydrocéphalie aiguë, notamment en cas de ventriculite (diagnostic scannographique).
- Décès.

#### Complications chroniques

- Comitialité (10 % des cas).
- Retard psychomoteur (5 à 10 % des cas).
- Hypoacousie :
  - *Haemophilus* : 5 % ;
  - méningocoque : 10 % ;
  - pneumocoque : 10 %.

### Prophylaxie [2]

#### Méningocoque

- Déclaration à la DDASS.
- Traitement des sujets contact des 10 j précédents (famille, même crèche, même maternelle, même classe dans le primaire) : cf. Figure ci-après.

**Rifampicine (RIFADINE)** pendant 2 j : 5 mg/kg x 2/j avant 1 mois, 10 mg/kg x 2/j entre 1 mois et 12 ans, 600 mg x 2/j après 12 ans et adulte.

En cas de contre-indication à la **rifampicine** : **spiramycine (ROVAMYCINE)** pendant 5 j : enfant 75 000 U/kg x 2/j et adulte 3 MU x 2/j. Prophylaxie à donner au malade en fin de traitement curatif si traitement par amoxicilline.

#### *Haemophilus*

Traiter les enfants < 4 ans, enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés par **rifampicine (RIFADINE)** pendant 4 j : 10 mg/kg x 1/j avant 1 mois, 20 mg/kg x 1/j entre 1 mois et 4 ans. Ne pas traiter les adultes.

### CONSENSUS

[2] Instruction relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque, DGS, 2011

**MÉNINGITE PURULENTE DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (3)****Prophylaxie des méningites à méningocoque\***

\* D'après G. Fatéy et C. Lafaix. BEH 1990, n°7, Infections à méningocoques, Maladies infectieuses. E. Pilly, APPIT 1994.

**PALUDISME DE L'ENFANT (1)****Prophylaxie****Mesures générales**

- Vêtements amples (surtout le soir et en début de nuit).
- Moustiquaire imprégnée d'insecticides (pyréthrinoides).
- Climatisation, treillis antimoustiques aux fenêtres.
- Insectifuges en bombes (adaptés à l'enfant car risque de passage transcutané), diffuseurs, etc.

**Chimioprophylaxie**

Voir le tableau ci-après.

Cf. aussi Paludisme au chapitre Maladies infectieuses.

**► Pays du groupe I**

**Antipaludéen, chloroquine (NIVAQUINE) :** 1,5 mg/kg (max. = 100 mg) x 1/j ou 5 mg/kg (max. 300 mg) x 2/sem., de la veille du départ à 4 sem. après le retour.

**► Pays du groupe II**

**Antipaludéen, chloroquine (NIVAQUINE)** (idem) + **proguanil (PALUDRINE) :** 3 mg/kg

(max. 200 mg) x 1/j de la veille du départ à 4 sem. après le retour.

**► Pays du groupe III**

Chez le nourrisson : idem groupe II.

Chez les enfants > 1 an et > 11 kg : **antipaludéen, atovaquone-proguanil (MALA-RONE) :** 31,25 à 250 mg x 1/j (selon le poids) de la veille du départ à 7 j après le retour.

Chez les enfants > 3 ans et > 15 kg : **antipaludéens, méfloquine (LARIAM) :** 5 mg/kg (max. 250 mg) x 1/sem., de 10 j avant le départ à 4 sem. après le retour ; incompatible avec **antiépileptiques, valproate de sodium (DÉPAKINE) ;** 10 à 15 % d'effets secondaires (principalement neurologiques). En zone de résistance à la **méfloquine** (Asie du Sud-Est), on peut proposer au-delà de 12 ans de la **doxycycline**, 2 mg/kg/j (maximum 100 mg/j) de la veille du départ à 4 sem. du retour.

Un traitement présomptif (**MALARONE** ou **RIAMET**), en cas de suspicion de crise pendant le voyage et d'impossibilité de consulter un médecin, est envisageable chez l'adulte mais déconseillé chez l'enfant.

## PALUDISME DE L'ENFANT (2)

## Chimio prophylaxie antipaludique chez l'enfant en 2011

MÉDICAMENT	PRÉSENTATION	POSOLOGIE	COMMENTAIRES, DURÉE, INDICATIONS
<b>NIVAQUINE</b> (chloroquine)	Sirop à 25 mg = 5 mL Cp. séc. à 100 mg	<b>1,5 mg/kg/j</b> < 8,5 kg : 12,5 mg/j = 8,5 à 16 kg : 25 mg/j = 16 à 33 kg : 50 mg/j = 33 à 45 kg : 75 mg/j	Attention aux intoxications accidentelles Séjour + 4 sem. après <b>Pays du groupe 1</b> (et 2 en association avec le <b>proguanil</b> )
<b>PALUDRINE</b> (proguanil)	Cp. séc. à 100 mg	<b>3 mg/kg/j</b> 9-16 kg : 50 mg/j = 16 à 33 kg : 100 mg/j = 33 à 45 kg : 150 mg/j	Uniquement en association avec la <b>chloroquine</b> Séjour + 4 sem. après <b>Pays du groupe 2</b>
<b>LARIAM</b> (méfloquine)	Cp. séc. à 250 mg	<b>5 mg/kg/sem.</b> 15-19 kg : 1/4 cp./sem. > 19 à 30 kg : 1/2 cp./sem. > 30 à 45 kg : 3/4 cp./sem.	Contre-indications : convulsions, troubles neuropsychiatriques Déconseillé : pratique de la plongée 10 j avant + séjour + 3 sem. après <b>Pays du groupe 3</b>
<b>MALARONE</b> ENFANTS (atovaquone- proguanil)	Cp. à 62,5/25 mg	5 à < 7 kg : 1/2 cp./j (hors AMM) 7 à < 11 kg : 3/4 cp./j (hors AMM) 11 à < 21 kg : 1 cp./j 21 à < 31 kg : 2 cp./j 31 à 40 kg : 3 cp./j	Prendre avec un repas ou une boisson lactée Séjour + 7 j après Durée : 3 mois consécutifs max. <b>Pays du groupe 2 et 3</b>
<b>MALARONE</b> (atovaquone- proguanil)	Cp. à 250 mg/100 mg	<b>1 cp./j</b> Poids > 40 kg	
<b>DOXYPALU</b> (doxycycline) <b>GRANUDOXY-Gé</b> (doxycycline)	Cp. à 50 mg Cp. à 100 mg Cp. séc. à 100 mg	< 40 kg : 50 mg/j = 40 kg : 100 mg/j	Contre-indication : âge < 8 ans Prendre au dîner Séjour + 4 sem. après <b>Pays du groupe 3</b>

**PALUDISME DE L'ENFANT (3)****Traitement de l'accès simple [1]****Bilan**

- NFS plaquettes, hémostase.
- Frottis sanguin, goutte épaisse, test de diagnostic rapide (antigénémie palustre).
- Ionogramme sanguin, bilan hépatique, glycémie, GDS, Lactates

**Traitement**

► **Accès palustre à *Plasmodium falciparum* en zone de chloroquinosensibilité (zone I) ou accès palustre à *P. vivax*, ovale ou *malariae***  
**Antipaludéen, chloroquine (NIVAQUINE) :** 10 mg/kg à J1, J2 (maximum 500 mg) ; 5 mg/kg à J3, J4 et J5 en 1 prise/j *per os*.

► **Accès à *P. falciparum* en zone de chloroquinorésistance (zones II ou III)**

En première intention :

– **antipaludéen, méfloquine (LARIAM)** (contre-indiqué avant 3 ans et 15 kg) en 2 ou 3 prises séparées de 6 à 12 h : 15 mg/kg (max. 750 mg) à H0 ; 10 mg/kg à H12 ; ou 8 mg/kg à H0, H6-H8, et H12-H16 ;

– ou **antipaludéen, atovaquone-proguanil (MALARONE) :** 2 cp à 65 mg à 4 cp. à 250 mg selon le poids x 1/j ; 3 j de suite ;

– ou **antipaludéen, artéméter-luméfantine (RIAMET)** (contre-indiqué avant 5 kg) : 6 prises à H0, H8-H12, H24, H36, H48, H60 ; 1 à 4 cp à 120 mg selon le poids par prise ; contre-indiqué si QT long

congénital, médicaments allongeant le QT.

Sont utilisables également en deuxième intention :

– **antipaludéen, halofantrine (HALFAN) :** 8 mg/kg *per os* en 3 prises séparées de 6 h à renouveler à J7 chez le sujet non immun (faire un ECG avant et après traitement : risque d'allongement du QT avec troubles du rythme ; contre-indiqué si QT allongé, médicaments allongeant le QT ou **hypokaliémiants**) ;

– ou **antipaludéen, sels de quinine (QUINI-MAX) :** 24 mg/kg/j en 3 prises *per os* pendant 5 à 7 j (prévenir de la nécessité de poursuivre malgré les acouphènes systématiques).

► *En cas de vomissements profus empêchant le traitement oral*

*ou en cas d'évolution inquiétante*  
**Quinine IV** (cf. Accès pernicieux).

**Évolution**

- Guérison clinique en 3 ou 4 j ; en cas de persistance de la fièvre penser à une autre infection tropicale associée (salmonellose, etc.).
- Guérison parasitologique dans les 6 j (on parle de résistance si la goutte épaisse reste positive à J7).
- Après le traitement, pas de nécessité de reprendre une prophylaxie, contrôle NFS et parasitémie à J3, J7 et J28 (risque de rechute).

## PALUDISME DE L'ENFANT (4)

### Traitement de l'accès pernicieux

On distingue trois tableaux pour lesquels un traitement par **quinine IV** s'impose :

- l'accès sévère (1 ou plusieurs critères) : état de choc, hémorragies, OAP, ictère, anémie < 6 g/dL, insuffisance rénale, hypoglycémie, acidose métabolique, coma, convulsion, hémoglobinurie ;
- le neuropaludisme s'il existe un coma avec absence de réaction adaptée à la douleur ou des convulsions itératives ;
- un accès simple nécessitant un traitement par **quinine IV** en cas de vomissements majeurs empêchant l'absorption orale.

L'accès pernicieux pallustre est à évoquer devant tout enfant fébrile au retour d'une zone d'endémie, présentant des **convulsions ou des troubles de conscience**. Ne pas attendre la confirmation diagnostique pour débiter une perfusion de **quinine IV**.

#### Bilan

- Frottis sanguin, goutte épaisse, parasitémie.
- Ionogramme sanguin, bilan hépatique, GDS.
- NFS plaquettes, hémostase.
- Groupe Rh RAI.
- ECG.
- PL (si plaquettes > 50 000/mm<sup>3</sup>).

### Mesures symptomatiques

- Hospitalisation en unité de soins intensifs.
- Monitoring cardiaque, tensionnel, saturation, surveillance glycémies capillaires.
- Perfusion 80 mL/kg/j de glucosé 5 % ou 10 %, tête surélevée.
- Transfusions selon résultats de la NFS (culots globulaires, plaquettes).
- Maintenir une bonne hémodynamique (remplissage, inotropes).
- **Anticonvulsivants** si besoin (penser aux convulsions par hypoglycémie).

### Antipaludéen

**QUINIMAX** 8 mg/kg en IVL sur 4 h x 3/j diluée dans du sérum glucosé isotonique avec relais *per os* dès que possible (mêmes doses) pendant 7 j. Dose de charge non recommandée chez l'enfant. En cas d'insuffisance rénale, première dose de 8 mg/kg, doses suivantes réduites de 30 à 40 %, à adapter à la quinémie.

#### Contenu en quinine base

Les nouvelles formes galéniques de **QUINIMAX** ont un contenu directement exprimé en quinine base totale pour éviter les erreurs de prescription.

Prescription détaillée, claire, avec vérification des doses ++ (risque mortel d'un surdosage).

Contrôler le taux d'Hb et de plaquettes, la glycémie et la parasitémie.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge et prévention du paludisme d'importation à *Plasmodium falciparum* : recommandations pour la pratique clinique, *SPILF*, 2007

## INFECTIONS MATERNO-FŒTALES

### Principaux germes responsables

- Streptocoques du groupe B : 40 %.
- *Escherichia coli* K1 : 40 %.
- *Listeria monocytogenes* : 1 à 2 %.
- Streptocoques non B : 7 %.
- Autres BG- ou CG+ : 10 %.

### Éléments évocateurs d'infection materno-fœtale [1]

#### Éléments obstétricaux

- Infection cervico-vaginale ou urinaire récente.
- Syndrome pseudo-grippal récent (listériose).
- Portage vaginal de Streptocoque B
- Souffrance fœtale aiguë inexpliquée.
- Prématurité inexpliquée.
- Rupture de la poche des eaux > 12 h.
- Fièvre, frissons pendant ou après l'accouchement.
- Liquide amniotique teinté.

#### Clinique

- Détresse respiratoire, apnées.
- Geignement, hypotonie.
- Troubles hémodynamiques, teint gris.
- Hypothermie/hyperthermie.
- Ballonnement abdominal, vomissements.
- Hyperglycémie.
- Hépatosplénomégalie.
- Ictère, éruption cutanée, purpura.

#### Bilan

- NFS plaquettes, CRP, fibrine, hémostase.
- Hémocultures.
- Prélèvements périphériques (oreilles, ombligo, anus, aisselles).
- Prélèvement du liquide gastrique.
- Première aspiration trachéale (si intubation).
- Radio de thorax.
- PL : systématique (avant antibiothérapie ou secondairement selon l'état clinique).
- PL normale du nouveau-né : protéines < 2 g/L et éléments < 30/mm<sup>3</sup>.
- Antigènes solubles sang/LCR/urines pour strepto B/ *E. coli* K1.

### Traitement [1]

#### Antibiothérapie

Débutée en cas de présomption d'infection, en attendant le résultat des cultures bactériologiques, elle doit être systématique en cas de fièvre maternelle, de détresse respiratoire inexpliquée, de liquide gastrique positif à l'examen direct, et au moindre doute.

Elle associe :

- céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération, céfotaxime (**CLAFORAN**) : 100 mg/kg/j en 2 ou 3 inj. ;
- aminopénicilline, amoxicilline (**CLAMOXYL**) : 100 mg/kg/j en 2 ou 3 inj. ;
- aminoside, gentamycine (**GENTALLINE**) : 3 à 5 mg/kg/j en 1 à 2 inj.

En cas de méningite : doubler les doses de **CLAFORAN** et **CLAMOXYL**.

En cas de cocci ou bacille à Gram+ au direct des prélèvements bactériologiques, le **CLAFORAN** n'est pas nécessaire.

- Après résultat des cultures, adaptation de l'antibiothérapie (ou arrêt si bilan négatif) :

- strepto B, *Listeria*, strepto D : **CLAMOXYL** seul ;
- *E. coli* K1 : **CLAFORAN** seul.

- Durée de l'antibiothérapie = 10 j (15 à 21 j dans les méningites). Arrêt de l'aminoside à la négativation du syndrome inflammatoire.

#### Mesures associées

- Oxygénothérapie, voire intubation-ventilation.
- Maintien de l'hémodynamique, remplissage : sérum physiologique : 10 à 20 mL/kg en 30 min.
- Pas d'alimentation en phase aiguë, perfusion.
- Monitoring cardiorespiratoire, PA, saturation, température, diurèse.
- Surveillance poids, périmètre crânien, NFS plaquettes, CRP.

### CONSENSUS

- [1] Diagnostic et traitement curatif de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né, *Anaes*, 2002



## ALIMENTATION DU NOURRISSON (1)

### Alimentation lactée

#### Quel lait donner ?

##### ► *Allaitement maternel*

Le lait maternel est parfaitement adapté à la physiologie du nouveau-né (besoins nutritionnels et capacité de digestion) et présente des avantages, notamment immunitaires, que le lait artificiel n'a pas.

– Déroutement de la tétée : nettoyage du mamelon avec de l'eau minérale, un seul sein (en alternant) ou les deux par tétée, durée 15-20 min au calme.

– Il est contre-indiqué dans certaines pathologies maternelles : psychose grave, VIH, tuberculose évolutive, prise de médicaments toxiques pour l'enfant, abcès du sein.

– Éviter pour la mère : les excitants (alcool, thé, café, drogues, etc.), les aliments acides trop fréquents (agrumes, tomates, etc.), les aliments donnant un goût au lait (chou, ail, etc.).

Si le lait maternel ne suffit pas à l'enfant, il peut être complété par un lait artificiel, habituellement un lait hypoallergénique (++) si terrain atopique familial).

##### ► *Allaitement mixte*

Compléter chaque tétée par du lait artificiel (suspicion d'insuffisance de lait maternel) ou alterner tétée et biberon (convenance maternelle).

##### ► *Allaitement artificiel*

Proposer un lait 1<sup>er</sup> âge jusqu'à 4 mois (révolus), puis un lait 2<sup>e</sup> âge à partir du 5<sup>e</sup> mois. En cas de prématurité ou d'hypotrophie, proposer un aliment lacté de régime pour nouveau-nés de faible poids de naissance.

Tous les laits en poudre se reconstituent à raison d'une mesure rase de lait pour 30 mL d'eau (minérale ou bouillie).

Respecter si possible un minimum de 2 h et maximum 5 h entre chaque repas (sein ou biberon), en laissant l'enfant s'adapter à son propre rythme.

#### Quelle quantité donner ?

• Durant le premier mois :

- 1<sup>re</sup> sem. : J1 : 6 x 10-20 mL puis augmenter chaque jour de 10 mL chaque repas (6 x /j) jusqu'à J8 ;
- 2<sup>e</sup> sem. : 6 x 70-80 mL ;
- 3<sup>e</sup> sem. : 6 x 80-90 mL ;
- 4<sup>e</sup> sem. : 6 x 90-100 mL.

Répartition en général entre 6 ou 7 repas par jour.

• Durant le deuxième mois : 6 x 120 mL.

• Vers 3-4 mois : 5 x 150 mL.

• Quand l'enfant grandit, les besoins en fonction du poids diminuent (120 mL/kg/j à 6 mois, 100 mL/kg/j à 1 an, 80 mL/kg/j à 2 ans).

Ne pas oublier que ces quantités sont indicatives et que l'enfant régule sa soif.

On peut chez le petit nourrisson s'aider de la méthode de calcul suivante : diviser le poids (en g) par 10 + 200 mL, à diviser par le nombre de repas quotidiens.

#### Quel nombre de repas ?

De manière indicative :

- 6 ou 7 repas chez le nouveau-né eutro- phique à terme, 7 ou 8 repas chez le nouveau-né hypotrophe ou prématuré ;
- 5 repas à partir de 2 mois ;
- 4 repas à partir de 4 mois.

##### ► *Farines*

Adjointes au biberon, elles peuvent être utilisées à partir de 2 mois, en utilisant des farines sans gluten avant 6 mois. Elles ne sont pas indispensables avec les laits artificiels actuels.

## LAITS ARTIFICIELS (1)

LAITS	BLÉDINA	GALLIA	GUIGOZ	MEAD JOHNSON
Laits pour nourrisson (0-4 mois)	Blédilait 1 Blédilait Relais 1	Gallia 1 Gallia Calisma 1	Guigoz 1 Guigoz Evolia Relais 1 Guigoz Expert 1	Enfamil 1 Enfamil Nutribaby 1
Laits de suite (5-12 mois)	Blédilait 2 Blédilait Relais 2	Gallia 2 Gallia Calisma 2	Guigoz 2 Guigoz Evolia Relais 2 Guigoz Expert 2	Enfamil 2 Enfamil Nutribaby 2
Laits HA (atopie familiale)	Blédilait HA	Gallia HA 1 et 2	Guigoz Expert HA 1 et 2	Enfamil HA
Laits très épaissis (RGO)		Gallia AR 1 et 2	Guigoz Expert AR Guigoz Confort 1 et 2	Enfamil AR 1 et 2
Laits enrichis en ferments lactiques (coliques, constip.)		Gallia Lactobifidus 1 et 2 Gallia Action-coliques	Guigoz bAa 1 et 2 Guigoz Expert AC Guigoz Transit 1 et 2	Enfalac
Laits épaissis et riches en ferments lactiques	Blédilait Premium 1 et 2	Galliagest Premium 1 et 2	Guigoz Formule épaissie 1 et 2	
Laits sans ou appauvris en lactose (intolérance lactose/diarrhée 3-12 mois)		Diargal	Diarigoz (HA + appauvri en lactose), utilisable entre 1 et 3 mois	O-lac
Laits sans PLV et sans lactose (IPLV/diarrhée < 3 mois/ mucoviscidose)		Galliagène Progress		Pregestimil Nutramigen
Laits pour nv-né faible poids (jusqu'à 3 kg)	PréBlédilait	PréGallia	PréGuigoz Expert AGPI-CL	
Lait de soja (intolérance au lactose/coliques-douleurs)		Gallia Soja	Guigoz Soja 1 et 2	Prosobee soja 1 et 2
Lait de croissance (1-3 ans)	Blédilait Croissance	Gallia Croissance Galliagest Croissance Gallia Junior	Guigoz Croissance	

## LAITS ARTIFICIELS (2)

LAITS*	MILUPA	NESTLÉ	NUTRICIA	SODILAC
Laits pour nourrisson (0-4 mois)	Aptamil 1 Milumel 1	Nidal 1 bifidus	Nutricia 1	Modilac 1 SMA Classic 1
Laits de suite (5-12 mois)	Aptamil 2 Milumel 2	Nidal 2 bifidus Nestlé Baby	Nutricia 2	Modilac 2 SMA Classic 2
Laits HA (atopie familiale)	Milumel HA	Nidal HA 1 et 2	Nutricia HA	Modilac HA
Laits épaissis (RGO)	Milumel AR 1 et 2	Nidal AR 1 et 2	Nutricia AR 1 et 2 Nutrilon AR 1 et 2	Modilac confort 1
Laits enrichis en ferments lactiques (coliques, constip.)		Pergalon 1 et 2		Modilac transit
Laits épaissis et riches en ferments lactiques		Nidal confort bifidus 1 et 2	Nutricia confort 1 et 2	
Laits sans ou appauvris en lactose (intolérance lactose/diarrhée 3-10 mois)	HN 25 (appauvri) à HN RL (sans)	AL-110		Modilac sans lactose
Laits sans PLV et sans lactose (IPLV/diarrhée avant l'âge de 3 mois/ mucoviscidose)	Prégomine LactoPrégomine	Alfaré	Peptijunior	
Laits pour prématurés (jusqu'à 3 kg)	PréAptamil	PréNidal AGPI-CL		PréModilac PréModilac AGPI-CL
Laits de soja (intolérance lactose/coliques-douleurs)			Nutricia soja 1 et 2	Modilac soja 1 et 2
Laits de croissance (1-3 ans)	Milupa croissance	Nestlé croissance	Nutricia Croissance	

\* Laits de régime disponibles à la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) pour les enfants présentant des allergies aux hydrolysats de protéines de lait de vache et/ou polyallergies alimentaires (NEO-CATE) et pour ceux présentant une maladie métabolique nécessitant l'éviction de certains acides aminés (laboratoire SHS International).

HA : hypoallergénique ; AR : antirégurgitation ; PLV : protéine de lait de vache.

## ALIMENTATION DU NOURRISSON (2)

### Diversification [1]

Débuter celle-ci au 5<sup>e</sup> mois (soit 4 mois révolus). Introduire les nouveaux aliments un par un et par petites quantités au début pour familiariser l'enfant au goût du nouvel aliment.

L'alimentation à la cuillère peut débuter rapidement après le début de la diversification, en maintenant un apport de 500 mL minimum de lait par jour.

Le risque allergique d'une introduction précoce de protéines végétales ou animales chez des nourrissons à haut risque d'allergie (atopie familiale importante) est soulevé par de nombreux auteurs et justifie de repousser la diversification après 6 mois, et même après 9 mois pour le poisson et l'œuf, mais pas après un an car les dernières études montrent qu'une introduction trop tardive est aussi délétère qu'une introduction trop précoce (notion de « fenêtre » d'introduction idéale).

#### ► Fruits

Jus de fruits (ampoules buvables vers 4 mois).

Introduction de fruits cuits vers 5 mois (petits pots, compote), de fruits frais vers 9 mois.

Éviter les fruits allergisants avant 1 an (fraises, kiwis, fruits exotiques).

#### ► Légumes

Vers 5 mois, ils peuvent être au début mélangés au biberon, puis administrés à la cuillère sous forme de purée (légumes frais cuits ou surgelés en galets ou petits pots), en commençant par 2-3 càc.

#### ► Protéines animales

– Initialement volailles puis bœuf puis jambon, elles sont introduites vers le

6<sup>e</sup> mois, bien cuites et hachées, en commençant par 10 g puis rapidement 30 g (au déjeuner). Porc (sauf jambon) et mouton vers 1 an.

– Puis sont introduits rapidement les poissons. Plus tard, introduction de l'œuf (le jaune vers 9 mois, puis le blanc vers 10 mois, max. x 2 /sem.).

– Introduction des petits-suisseurs, fromages blancs vers 5-6 mois en diminuant la ration lactée du biberon du repas correspondant. Introduction du fromage vers 9 mois (éviter fromage au lait cru avant 3 ans : risque de SHU ++).

– Introduction du gluten vers 6 mois sous forme de farines avec gluten ou biscuits pour nourrisson vers 8 mois.

À partir de 1 an, passage au lait de croissance (enrichi en fer) ou au lait de vache classique.

À partir de 1 an, l'alimentation est assez proche de celle de l'adulte, mais moins grasse et adaptée à la dentition de l'enfant.

### Supplémentations vitaminiques [2]

Sont administrés systématiquement en 1 prise quotidienne :

– **vitamine D, ergocalciférol (UVESTÉROL)** : 1 dose/j, dose n° 2 chez l'enfant à peau noire ou **ZYMAD** : 4 gttes/j ;

– la supplémentation en **fluor** n'est plus systématique mais réservée aux enfants à haut risque carieux après bilan dentaire personnalisé.

– **vitamine K** (si allaitement maternel exclusif) : 1 amp. (2 mg) x 1/sem., à arrêter dès le passage au lait artificiel.

### CONSENSUS

[1] Alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge. Réalisation pratique, SFP, 2006

[2] Utilisation du fluor dans la prévention de la carie dentaire avant 18 ans, Affsaps, 2008

**ALIMENTATION DU NOURRISSON (3)****Exemples de régimes (propositions à adapter aux besoins de l'enfant)****Avant 2 mois**

Lait 1<sup>er</sup> âge ou lait de mère : 6 ou 7 x 100-120 mL.

**Vitamine D.****De 2 à 4 mois**

Lait 1<sup>er</sup> âge ou lait de mère : 5 x 120-150 mL (4 x 180 mL vers 4 mois).

**Vitamine D.**

Matinée : jus de fruits (10 mL puis 20 mL à 4 mois) : non indispensable.

**De 5 à 6 mois**

4 repas quotidiens (3 repas lactés + 1 repas diversifié).

- Matin : 210 mL lait 2<sup>e</sup> âge.
- Midi : quelques càc de légumes + 210 mL lait 2<sup>e</sup> âge au début ; puis 60 g de légumes + 120 mL lait 2<sup>e</sup> âge.
- Goûter : quelques càc de fruits (petit pot) + 210 mL lait 2<sup>e</sup> âge au début, puis 60 g de fruits (petit pot) + 120 mL lait 2<sup>e</sup> âge.
- Soir : 180 mL lait 2<sup>e</sup> âge avec ou sans quelques cuillères de légumes.

**Vitamine D,** jus de fruits 10 mL puis 20 mL.

Matinée : jus de fruits (50 mL).

**De 6 à 9 mois**

4 repas (2 repas lactés + 2 repas diversifiés).

- Matin : 240 mL lait 2<sup>e</sup> âge (farines avec gluten) sous forme de biberon ou bouillie épaisse.

• Midi : légumes (60 g puis 120 g) + 15 g de viande ou poisson + 60 g de fruits (petit pot).

- Goûter : quelques càc de fruits + 210 mL lait 2<sup>e</sup> âge ; puis 120 g de fruits + 150 mL lait 2<sup>e</sup> âge ou laitage (petit-suisse, yaourt).
- Soir : 200 mL de soupe de légumes + 60 g de fruit ou laitage (petit-suisse, yaourt).

**Vitamine D.**

Matinée : jus de fruits (50 mL).

Au goûter : petit gâteau vers 8 mois.

**De 9 à 12 mois**

4 repas (2 repas lactés + 2 repas diversifiés).

- Matin : 240 mL lait 2<sup>e</sup> âge (farines avec gluten) sous forme de biberon ou bouillie épaisse.
- Midi : légumes + 30 g de viande, poisson ou œuf.
- Goûter : 120 g de fruits + 200 mL lait 2<sup>e</sup> âge (ou équivalent de laitage).
- Soir : 200 mL de soupe ou purée de légumes + fromage râpé + 60 g de fruit (pot ou frais écrasé) ou laitage.

**Vitamine D.**

Matinée : jus de fruits (50-100 mL).

**Entre 1 et 3 ans**

500 mL de produits laitiers (250 mL de lait = 2 yaourts = 3 petits-suisse = 45 g fromage).

Privilégier les laits de croissance (riches en fer).

30 à 50 g/j de protéines non lactées (viande, poisson ou œuf).

## ICTÈRE DU NOUVEAU-NÉ (1)

- Visible cliniquement si bilirubine  $> 70 \mu\text{mol/L}$  mais intensité de l'ictère difficile à apprécier par la simple vue. C'est pourquoi un dépistage systématique par bilirubinémie transcutanée (Biliflash ou BiliChek) est recommandé pour tous les nourrissons dans toutes les maternités afin de déterminer les nourrissons à mettre sous photothérapie.

- Suspecter un ictère pathologique si l'ictère est précoce ( $< \text{H}24$ ), prolongé plus de 10 j, associé à une anémie ou une hépatosplénomégalie, à des selles décolorées. L'ictère physiologique ne dépasse pas  $280 \mu\text{mol/L}$ .

### Étiologies

#### Ictères à bilirubine libre

##### ► Avec hémolyse

- Iso-immunisation ABO ou Rh, plus rarement dans les autres groupes.
- Accident transfusionnel.
- Infections : bactéries, CMV, toxoplasmose, rubéole, herpès, etc.
- Hémolyses constitutionnelles : déficit en G6PD, en pyruvate kinase, sphérocytose, etc.

##### ► Sans hémolyse

- Ictère physiologique (= immaturité de la glycuco-conjugaison), augmenté par prématurité, diabète maternel, polyglobulie, résorption d'hématomes, jeûne, etc.

- Ictère au lait de mère.
- Hypothyroïdie.
- Obstruction digestive (sténose du pylore, etc.).
- Maladie de Gilbert.
- Résorption d'un céphalématome.

#### Ictères à bilirubine mixte ou conjuguée

- Obstacles sur les voies biliaires : toujours évoquer et éliminer une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques devant un ictère à bilirubine conjuguée car le pronostic dépend de l'âge de la prise en charge chirurgicale : bien meilleur avant 6 sem.
- Maladies génétiques et métaboliques : syndrome d'Alagille, mucoviscidose, déficit en alpha-1-antitrypsine.
- Hépatites infectieuses bactériennes ou virales (*E. coli*, CMV, toxoplasmose, etc.).
- Nutrition parentérale prolongée.

#### Bilan initial

##### ► Chez la mère

Groupe sanguin, test de Coombs indirect.

##### ► Chez l'enfant

- Bilirubine libre et conjuguée.
- Groupe sanguin, test de Coombs direct.
- NFS plaquettes, réticulocytes.
- Albuminémie.

+ éventuellement bilan orienté par le contexte.

## ICTÈRE DU NOUVEAU-NÉ (2)

### Traitement des ictères à bilirubine libre [1]

Il vise à éviter l'ictère nucléaire (destruction des noyaux gris centraux par toxicité de la bilirubine non liée). Le traitement symptomatique intéresse donc les ictères à bilirubine libre.

#### Ictères peu sévères

Ils sont traités par photothérapie seule.

##### ► Critères pour débuter un traitement

Poids	Chiffre max. de bilirubine en $\mu\text{mol/L}$		
	À H24	À H48	Après H72
1 500 g	120	145	145
1 500 g à 2 000 g	120	180	196
2 000 g à 2 500 g	120	188	240
> 2 500 g	136	222	274

Schématiquement :

- dès que la bilirubine en  $\mu\text{mol/L}$  > 10 % du poids du corps ou > 280  $\mu\text{mol/L}$  ;
- quasi systématique pour les ictères avant H24.

##### ► Modalités

- Lampe UV 460 nm.
- Photothérapie classique (lampe au dessus uniquement) ou intensive (lampe au dessus et au dessous ou tunnel)
- Enfant nu, yeux protégés, apports hydriques augmentés de 10 à 20 %.
- Initialement exposition continue puis discontinue lorsque l'ictère s'améliore.
- Arrêter lorsqu'apparaît de la bilirubine conjuguée (risque de syndrome du bébé bronze avec coloration cutanée verdâtre).

#### Ictères plus sévères

Dosage bilirubine non liée (BNL), qui reflète directement la fraction toxique de

la bilirubine ; et/ou calcul du rapport molaire bilirubine ( $\mu\text{mol/L}$ ) sur albumine ( $\text{g/L} \times 14,49$ ).

- Si BNL > 1  $\text{mg/L}$
- Ou si bilirubine > 10 % du poids du corps avant H24.
- Ou si bilirubine > 15 % du poids du corps après H24.
- Ou si bilirubine > 350  $\mu\text{mol/L}$ .
- Ou si rapport bilirubine sur albumine > 0,7.

En plus de la photothérapie intensive et du remplissage, albumine humaine à 20 % : 1 à 1,5 g/kg en 2 à 3 h (dilution courante : 1/2 albumine 20 % + 1/2 glucosé 5 %), à renouveler si besoin, surtout si albuminémie < 30 g/L.

En cas de persistance d'une hyperbilirubinémie menaçante, discuter (avec un médecin spécialiste du centre de transfusion) une **exsanguino-transfusion** de 2 masses sanguines (160 mL/kg), sur cathéter veineux ombilical.

L'exsanguino-transfusion est le traitement de choix des hémolyses sévères ; mais est devenue exceptionnelle depuis la photothérapie intensive.

#### Traitement étiologique

En cas d'étiologie ou de facteur favorisant curable, toujours associer un traitement de celui-ci.

Dans l'ictère au lait de mère, le traitement envisageable est le chauffage du lait (organisation pratique difficile). En pratique, on choisit souvent de négliger cet ictère, qui n'est jamais sévère, et de poursuivre l'allaitement maternel.

#### Évolution

L'ictère régresse en général en quelques jours, permettant d'arrêter la photothérapie. La guérison se fait sans séquelles. La prise en charge précoce et énergique des ictères sévères a en effet quasiment fait disparaître l'ictère nucléaire.

### CONSENSUS

[1] Ictère en maternité : dépistage, prise en charge et traitement, *SFP*, 2009

## PHÉNYLCÉTONURIE

### Dépistage néonatal

Il est systématique (couverture > 99 %). C'est le **test de Guthrie** : quelques gouttes de sang prélevées au talon sont mises sur papier buvard pour dosage de la phénylalanine (Phe). Le prélèvement est réalisé entre J4 et J10, avant la prise du biberon. Il doit être décalé en cas d'antibiothérapie détruisant le bacille *Subtilis* utilisé pour le test (faux négatifs).

**Si Phe > 4 mg/dL** : régime normoprotidique (500 mg/j de Phe) puis bilan de confirmation :

- taux sanguins de Phe et tyrosine ;
- activité de la phénylalanine-hydroxylase ;
- dosages sanguin et urinaire des pteridines (cofacteurs de la Phe-hydroxylase), leur déficit (< 1 % des phénylcétonuries) aboutit à une forme sévère résistante au régime de la maladie ;
- épreuve de charge en Phe en cas de doute.

Noter qu'il existe des hyperphénylalaninémies transitoires néonatales par immaturité enzymatique ; fréquentes chez le prématuré, elles disparaissent spontanément.

### Traitement en milieu spécialisé

#### Objectif

Diminuer le taux sanguin de Phe jusqu'à un seuil non toxique tout en évitant la carence. Le régime est adapté aux dosages sanguins de la Phe (initialement x 2/sem., progressivement espacés à x 1/15 j ou/mois).

Objectif :  $3 < \text{Phe} < 8 \text{ mg/dL}$

#### Régime élaboré avec une diététicienne

Contient en moyenne 300 mg/j de Phe la 1<sup>re</sup> année, avec de grosses variations au cours du temps et d'un individu à l'autre.

#### ► Initialement

- Alimentation exclusive avec un hydrolysat pauvre en Phe (**LOFENALAC MEAD JOHNSON**) : 1 mes./60 mL d'eau (contient 12,5 mg de Phe/100 mL reconstitués).

- Quand le taux souhaité est obtenu, associer **LOFENALAC MEAD JOHNSON** et lait 1<sup>er</sup> âge standard (60 mg de Phe/100 mL) pour maintenir un taux équilibré.

#### ► Diversification

- Aliments riches en Phe (interdits ou mesurés précisément) :

- lait (160 mg de Phe/100 mL) et tous ses dérivés ;

- viandes, œufs, poissons ;

- aliments à base de céréales, légumes secs, fruits secs ;

- chocolat, etc.

- Aliments moyennement riches en Phe (à mesurer) : fruits, légumes, etc.

- Aliments pauvres en Phe :

- huiles ;

- produits sucrés ;

- farines de maïs et de tapioca, etc.

#### ► Durée du régime

Débuté le plus tôt possible, il doit être poursuivi de manière très stricte pendant le développement neurologique (jusque vers 6 à 10 ans). Il sera repris chez la femme adulte avant et pendant les grossesses.

### Évolution

Évaluation régulière des développements staturo-pondéral, neurologique, psychomoteur.

Le développement risque d'être imparfait si le régime est débuté après 4 mois ou s'il existe déjà des signes neurologiques avant traitement. Dans les autres cas, il est conditionné par le strict respect du régime. Penser qu'il existe un dépistage anténatal par biologie moléculaire pour les grossesses futures.



## MORT SUBITE DU NOURRISSON

### Définition

Une « Mort inattendue du nourrisson » (environ 600 MIN par an) est définie comme le décès soudain d'un enfant de moins de 1 an, alors que rien dans son histoire ne le laissait prévoir. On parle de « Mort subite du nourrisson » (environ 250 MSN par an) en l'absence de cause retrouvée malgré une démarche diagnostique complète (avec autopsie).

### Recherche d'une étiologie

- Dans 60 % des cas : étiologie du décès trouvée :
  - Infection.
  - Malformation cardiaque, ORL, cérébrale, etc.
  - RGO avec inhalation.
  - Trouble ionique.
  - Maladie métabolique.
  - Intoxication (monoxyde de carbone, etc.).
  - Occlusion digestive (invagination intestinale aiguë).
  - Saignement intracrânien (maltraitance).
- Dans 40 % des cas : absence d'anomalie (MSN).

### Conduite à tenir [1]

- Amener l'enfant au centre hospitalier de référence pour prélèvements à visée diagnostique et autopsie.

- Déculpabiliser les parents et/ou la personne gardant l'enfant ; prendre en charge leur détresse.
- Hospitaliser un éventuel jumeau survivant.
- Savoir évoquer la possibilité d'un infanticide : rechercher un contexte de maltraitance. L'autopsie est rendue indispensable par cette éventualité. Le certificat de décès doit mentionner l'obstacle médico-légal en cas de forte présomption avec refus d'autopsie de la part de la famille, qu'il faut toujours chercher à convaincre pour éviter le traumatisme d'une enquête judiciaire inutile.

#### Bilan minimal

- Radio du thorax, radios du squelette.
- NFS plaquettes, réticulocytès, hémoculture.
- Bactériologie du pharynx, trachée, PL.
- Ponction péricardique et pleurale.
- Recueil de sang et d'urine pour étude métabolique.

### Prévention

- Coucher les nourrissons sur le dos +++ sur un matelas ferme.
- Ne pas trop les couvrir, ne pas trop chauffer la chambre (18-20 °C), notamment lorsqu'ils sont fébriles.
- Proscrire les couettes, oreillers, tour de lit, etc. dans lesquels les nourrissons peuvent s'enfouir.
- Éviter le partage du lit avec son enfant (*co-sleeping*) ; le tabagisme passif.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans), HAS, 2007

## MALAISES DU NOURRISSON (1)

Les malaises du nourrisson sont définis comme la survenue inopinée et brutale d'un accident inquiétant associant des troubles du tonus (hypotonie et/ou hypertonie) et des troubles de la coloration (accès de pâleur, épisode de cyanose), voire une apnée ou une perte de connaissance. Ces malaises posent souvent un problème diagnostique, étiologique et pronostique.

Le risque de récurrence à plus ou moins long terme impose un certain nombre d'investigations complémentaires à la recherche d'une étiologie.

L'interrogatoire précisera les circonstances de survenue et décrira le malaise, les antécédents, les traitements en cours, etc. Il évaluera également la fiabilité du récit et le contexte psycho-social.

L'examen clinique devra être complet (T °C, périmètre crânien, recherche de sévices, etc.).

### Critères de gravité

- Âge < 3 mois.
- Mesures de secourisme ou de réanimation nécessaires.
- Troubles de conscience.
- Détresse respiratoire.
- Acidose métabolique à l'arrivée.

### Étiologies

#### ► Digestives

- Reflux gastro-œsophagien ++ (œsophagite).
- Fausses-routes (RGO, parfois vomissement isolé). Des anomalies neurologiques touchant la déglutition favorisent ce genre de malaises.
- Autres : invagination intestinale, volvulus, intolérance aux protéines du lait de vache.

#### ► Cardiovasculaires

- Hyperréactivité vagale ++ (souvent liée à un RGO ++).
- Trouble du rythme ou de conduction cardiaque.

- Défaillance cardiaque aiguë (myocardite, myocardiopathie métabolique, cardiopathie malformative, etc.).

- État de choc.

- Poussée d'HTA.

#### ► Respiratoires

- Apnée lors d'infections ORL et respiratoire (VRS ++, adénovirus, coqueluche, etc.).

- Apnée obstructive : malformative (principalement dans les dysfonctionnements néonataux du tronc cérébral), inflammatoire, etc. Une compression trachéale congénitale ou acquise peut provoquer ce type de malaises.

- Apnée centrale (intox. médicamenteuse, syndrome d'Ondine, etc.).

- Corps étranger dans les voies aériennes.

- Pneumothorax.

#### ► Infectieuses

- Infections ORL, respiratoire (VRS ++, coqueluche).

- Septicémie (état de choc).

#### ► Neurologiques

- Convulsion hyperthermique.
- Convulsion d'autre origine (métabolique, toxique, etc.).
- Hématome sous-dural ou intraparenchymateux, hémorragie méningée.
- Méningite, encéphalite.
- Hypertension intracrânienne (tumeur, hydrocéphalie).

#### ► Accidentelles

- Asphyxie, inhalation de corps étranger.
- Intoxication (CO, médicaments).
- Sévices.

#### ► Métaboliques

- Déshydratation.
- Hypoglycémie.
- Hypocalcémie.
- Maladie métabolique héréditaire.
- Acidocétose diabétique.

#### ► Autres

- Spasme du sanglot.

- Étiologie non retrouvée dans certains cas

## MALAISES DU NOURRISSON (2)

**Bilan**

Il n'existe pas de « bilan type » de malaise. Les examens complémentaires seront guidés par l'interrogatoire et l'examen clinique, le bilan devant être large si l'étiologie ne semble pas évidente, le malaise semble grave ou se répète.

**En 1<sup>re</sup> intention**

- NFS plaquettes, CRP.
- Ionogramme sanguin, glycémie, calcémie.
- Transaminases, CPK, lactacidémie.
- Radio de thorax.
- ECG
- BU et ECBU

Selon l'orientation ou si malaise récidivant :

- Bilan métabolique sanguin (Guthrie, ammoniémie) et urinaire (congeler la première miction après le malaise).
- Recherche de RGO (pHmétrie, TOGD), d'œsophagite (fibroscopie).
- Neurologique : PL, EEG, scanner ou IRM.
- Cardiaque : échographie, ROC-Holter.
- Recherche de toxiques (CO, médicaments).

Il faut rassurer les parents et hospitaliser l'enfant pour bilan et surveillance scopique pendant au moins 24 heures. Si le malaise remonte à plus de 48 heures et que l'examen est parfait, on pourra réaliser le bilan en externe.

**Traitement****Traitement symptomatique si nécessaire**

- Assurer une oxygénation correcte (oxygénation, ventilation si besoin).
- Assurer une bonne hémodynamique (remplissage, inotropes si besoin).
- Correction d'une acidose sévère par bicarbonates à 4,2 % : 2 mL/kg IVL en 15 min si cette acidose ne régresse pas

après stabilisation de l'oxygénation et de l'hémodynamique.

- Traitement des convulsions.

**Traitement étiologique adapté au résultat du bilan****Malaise vagal**

Il représente environ 1/4 des étiologies de malaises du nourrisson.

**Bilan**

- Enregistrement Holter cardiaque.
- Réflexe occulo-cardiaque.
- Recherche d'un RGO (clinique, pHmétrie, TOGD, etc.).

**Traitement**

► *Traitement étiologique +++ (RGO, etc.)*

► *Traitement vagolytique*

Le **diphémanil méthylsulfate (PRANTAL)** a été retiré du marché en 2008 en raison du risque d'allongement du QT.

Chez le prématuré avec immaturité du tronc cérébral, possibilité de traitement par **sulfate d'atropine** (0,01 mg/kg/j en 4 prises).

Chez le nourrisson ayant eu au moins un malaise sévère d'étiologie vagale présu- mée et dont le ROC (réflexe oculocar- diaque) Holter est positif ou chez le nour- risson avec antécédent de mort subite dans la fratrie et ROC Holter positif on peut discuter un traitement par **disopyra- mide (RHYTHMODAN)** : 10 mg/kg/j en 2 prises.

Arrêt du traitement vers 12 mois avec contrôle du ROC Holter après arrêt.

Après 1 an : indications de traitement encore plus rares ; traitement si malaises récidivants inquiétants avec ROC Holter positif.

## DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (1)

Le développement psychomoteur est lié à la maturation du système nerveux et à la stimulation affective. Il implique un parallélisme des progrès sur les plans neuromusculaire et psychologique. Un développement psychomoteur harmonieux nécessite une intelligence normale, des fonctions motrices et sensorielles efficaces, une stimulation et un niveau affectif suffisants.

Lors de tout examen pédiatrique (au calme, en dehors de période de faim ou sommeil), les éléments du développement psychomoteur à analyser sont :

- **Motricité** : active et passive, fine et grossière, tonus, gesticulation spontanée.
- **Adaptativité** : préhension, mobilité manuelle.
- **Langage** : mimique, voix, compréhension des ordres simples.
- **Vision, audition, contrôle sphinctérien.**
- **Adaptation sociale** : réactions spontanées ou provoquées.

Il est variable selon les enfants. En cas de prématurité, il est classique d'évaluer les performances en fonction de l'âge corrigé de l'enfant (ex. : chez un prématuré né à 33 SA : 6 mois d'âge réel = 4 mois d'âge corrigé ; calcul par rapport au terme de 41 SA).

Après l'âge de 1 an, il faut tenir compte des variations de la normale.

Il faut être très prudent et savoir réexaminer l'enfant à plusieurs semaines d'intervalle avant de parler de retard. Ce retard peut être global ou partiel selon les acquisitions et relève alors d'une évaluation pluridisciplinaire.

### Nouveau-né (à terme)

- Tonus : hypertonie périphérique (quadri-flexion) et hypotonie axiale.

- Gesticulation spontanée globale et symétrique.
- Réflexes archaïques présents (suction, *grasping*, marche automatique, Moro, points cardinaux, etc.).
- Orientation vers la lumière.
- Rythme sommeil 21 h/24 h.

### Nourrisson (1 mois-2 ans) [1]

#### Tonus

Tenue de tête stable : 2-4 mois.

Redressement en ventral sur les avant-bras : 3-4 mois.

Retournement en position ventrale/dorsale : 6-7 mois.

Station assise avec appui : 5-7 mois.

Station assise sans appui : 8-9 mois.

Rampe, marche à 4 pattes : 9-10 mois.

Station debout avec appui : 9-10 mois.

Station debout sans appui : 11-12 mois.

Marche : 12-18 mois.

Court, monte avec aide les escaliers : 18 mois.

#### Préhension et gesticulation spontanée

Début préhension : 3 mois.

Tenue du biberon : 6 mois.

Joue avec ses mains : 3-4 mois.

Porte les objets à la bouche : 7-8 mois.

Passage d'objet d'une main à l'autre : 6 mois.

Préhension pouce-index : 9 mois.

Pointe les objets avec l'index : 9-10 mois.

Lâche volontairement les objets : 12 mois.

Empile 3 cubes : 15-18 mois.

#### Langage

Gazouillis, vocalises : 2-3 mois.

Dit « papa, maman » : 9 mois.

Jargon 3-5 mots : 9-15 mois.

10 à 20 mots : 18 mois.

50 mots, 1<sup>re</sup> phrases : 2 ans.

## DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DU NOURRISSON ET DE L'ENFANT (2)

### Vision/Oculomotricité

Poursuite oculaire brève possible dès la naissance.

Suit transitoirement des yeux : 1 mois.

Suivi oculaire 180° : 2-3 mois.

### Rythme

• Sommeil : 18 h vers 2 mois ; 16-18 h vers 4 mois ; 14-15 h vers 9 mois ; 13-15 h vers 1 an.

• Repas : 6-7 repas à 1 mois ; 5 repas de 2-4 mois ; 4 repas après 4-5 mois.

### Adaptation affective et sociale

1<sup>ers</sup> mois : satisfaction des besoins digestifs et importance des contacts physiques.

Sourire réponse : 2 mois.

Réagit à son nom : 7-8 mois.

Angoisse de la séparation maternelle, peur de l'étranger : 8-9 mois.

« Au revoir », « bravo » : 10-11 mois.

Répond aux ordres, identifie les objets : 18 mois.

### Enfant de 2 à 6 ans [1]

#### Motricité

Monte et descend les escaliers, coup de pied dans un ballon : 24 mois.

Tricycle : 2-3 ans.

Saute sur un pied : 4 ans.

Saute à la corde : 5 ans.

#### Langage et compréhension

100 mots, phrases courtes, « non », opposition : 2 ans.

« je », 300 mots : 3 ans.

### Graphisme

Traits vertical et horizontal : 24-30 mois.

Rond, croix, triangle : 24-30 mois.

Carré : 4 ans.

### Propreté

Diurne : 18 mois-3 ans.

Nocturne : 2-5 ans.

Il faudra s'inquiéter et réévaluer l'enfant devant :

- asymétrie de gesticulation,
- absence de réaction au bruit précoce,
- absence de suivi oculaire à 1 mois,
- absence de tenue de la tête à 2 mois ou de redressement à 5 mois,
- absence de station assise seule à 10 mois,
- absence du réflexe de parachute à 10-12 mois,
- absence de marche autonome à 18 mois,
- enfant silencieux, stagnation du langage,
- enfant qui se met debout sans se mettre assis (hypertonie).

### Enfant après 6 ans [2]

À cet âge, il s'agit surtout de dépister les troubles pouvant gêner les apprentissages de la lecture ou de l'écriture (dyslexie, dyspraxie, déficit visuel ou auditif) et les troubles psychiatriques pouvant gêner l'insertion sociale (anxiété, hyperactivité, opposition, dépression).

### CONSENSUS

[1] Propositions portant sur le dépistage individuel chez l'enfant de 28 jours à 6 ans, destinées aux médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI et médecins scolaires, HAS, 2005

[2] Propositions portant sur le dépistage individuel chez l'enfant de 7 à 18 ans, destinées aux médecins généralistes, pédiatres et médecins scolaires, HAS, 2005

## SÉVICES À ENFANTS (1)

### Différents types de sévices

#### Syndrome des enfants battus [1]

Rechercher des ecchymoses, des fractures multiples d'âge différent, un hématome sous-dural, voire des plaies, des brûlures, etc.

#### Sévices sexuels [2]

À évoquer notamment devant toute tentative de suicide.

#### Carences

Il peut s'agir d'une carence nutritionnelle (cassure staturo-pondérale), d'une carence affective, d'une carence de soins pouvant aboutir à des accidents (manque de surveillance).

#### Syndrome de Münchhausen par procuration

C'est le plus souvent la mère qui simule par des gestes iatrogènes volontaires une pathologie chez son enfant (saignement, injections d'insuline, etc.).

### Conduite à tenir [3]

#### En cas de danger immédiat

Hospitalisation impérative :

- soit avec l'accord des parents ;

– soit par l'intermédiaire du procureur de la République (dérogation légale au secret professionnel) qui peut faire une ordonnance de placement provisoire (OPP).

L'hospitalisation permet :

- de faire le bilan et le traitement des lésions ;
- de conforter le diagnostic par les entretiens avec les parents, par l'observation de l'enfant en l'absence et en présence de la famille ;
- d'évaluer le danger encouru par l'enfant ;
- la conjonction de ces divers éléments permet d'élaborer un projet thérapeutique, de décider d'un signalement adapté.

#### En l'absence de danger immédiat

L'hospitalisation est souvent utile pour préciser les divers éléments précités. Elle n'est toutefois pas toujours indispensable et le médecin de famille peut alerter les structures administratives en faisant un signalement à la cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP).

## SÉVICES À ENFANTS (2)

### Rôle des diverses structures

#### Cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes

Depuis le loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, elle constitue l'interlocuteur privilégié et l'interface entre les différents acteurs du système : services propres au département (protection maternelle et infantile [PMI], aide sociale à l'enfance [ASE]) ; professionnels de la petite enfance (hôpitaux, médecins libéraux, éducation nationale) ; et les structures judiciaires (procureur de la République, juge des enfants). Elle effectue une enquête sociale, évalue le danger encouru par l'enfant, organise l'aide à la famille. Elle décide des suites à donner au dossier : classement sans suite, assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée à l'ASE, saisie des structures judiciaires.

### Procureur de la République

Il saisit la brigade des mineurs pour un complément d'enquête ; il décide de classer le dossier sans suite ou bien de saisir le juge des enfants, voire le juge d'instruction (mesures répressives en cas de délit grave).

### Juge des enfants

Le jugement peut aboutir soit à une mesure éducative, soit au placement de l'enfant (souvent temporaire), au maximum à une déchéance de l'autorité parentale.

### Évolution à long terme

- Possibilité de séquelles physiques.
- Grande fréquence des séquelles psychologiques (difficultés intellectuelles, troubles de la personnalité).
- Récidives.

### CONSENSUS

[1] Bébé secoué : une forme mal connue de maltraitance aux conséquences irréparables, HAS, 2011

[2] Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, HAS, 2011

[3] Maltraitance : dépistage. Conduite à tenir aux urgences (en dehors des maltraitances sexuelles), SFMU, 2005

## BOITERIE DE L'ENFANT

Toute boiterie chez l'enfant doit faire éliminer en urgence une infection ostéoarticulaire (ostéoarthrite aiguë ou ostéomyélite aiguë) ou une fracture.

Distinction de 2 situations en pratique : boiterie récente ou boiterie ancienne (souvent depuis l'âge de la marche).

### Interrogatoire

- Ancienneté et mode de révélation de la boiterie.
- Notion de traumatisme récent.
- Fièvre associée.
- Évolutivité de la douleur, réponse aux antalgiques.

### Examen clinique

Rechercher :

- limitation de la mobilité articulaire, douleur provoquée ;
- esquisse de l'appui à la marche ou refus de poser le pied au sol ;
- anomalie de la statique vertébrale, examen neurologique complet (dépistage maladie neurologique débutante) ;
- ongle incarné, écharde, ampoule, etc.

### Examens complémentaires [1]

- NFS, CRP, vitesse de sédimentation.
- Hémoculture (si fièvre), prélèvement bactériologique si infection loco-régionale.
- Radiographie (orientation par la clinique) : bassin face + profil de Lovenstein, membres inférieurs (comparatifs).

± échographie de hanche si absence de lésion osseuse.

± scintigraphie osseuse selon la clinique et l'évolution.

± ponction-lavage de la hanche si épanchement fébrile.

### Étiologies

- 1<sup>re</sup> situation : boiterie d'installation récente :

- ostéomyélite aiguë ;
- ostéoarthrite aiguë ;
- rhume de hanche (synovite aiguë transitoire) entre 3 et 10 ans ;
- abcès de la fesse ;
- arthrite inflammatoire (réactionnelle, AC juvénile) ;
- fracture, fissure ;
- entorse, tendinite ;
- verrue plantaire, ongle incarné, chaus-sures inadaptées ;
- injection IM fessière récente ;
- ostéochondrite ;
- épiphysiolyse entre 10 et 15 ans ;
- ostéome ostéoïde ;
- tumeur maligne osseuse, métastase osseuse.

- 2<sup>e</sup> situation : boiterie ancienne :

- dysplasie de hanche méconnue ;
- inégalité de longueur de membre ;
- maladie neuro-musculaire : encéphalopathie, pathologie médullaire (-), infirmité motrice cérébrale, myasthénie, myopathie (- -).

### Traitement

- Traitement médicamenteux antalgique.
- Immobilisation et/ou mise en décharge (avis orthopédique).
- Antibiothérapie probabiliste IV antistaphylococcique si suspicion d'infection. On utilise le plus souvent une bithérapie type **céphalosporine de 2<sup>e</sup> génération, cefamandole (KEFANDOL)** : 100 mg/kg/j en 3 inj. IVD + **aminosides, gentamicine (GENTALLINE)** : 5 mg/kg/j en 1 inj. IVL sur 30 min.
- Toujours penser au **contrôle radiologique** de la hanche **4 à 6 sem. plus tard** en cas de suspicion de rhume de hanche pour éliminer une ostéochondrite de hanche débutante.

### CONSENSUS

- [1] La boiterie : un symptôme fréquent chez l'enfant, *SOFOT*, 2005



## VACCINATIONS (1)

## Calendrier vaccinal [1]

**À la naissance** : Hépatite B + Ig spécifiques si nouveau-né de mère HbS + (voir plus bas).

**À la naissance ou à 1 mois** : BCG si enfant à risque (voir plus bas).

**2<sup>e</sup> mois** : 1<sup>er</sup> DTCaP\* + *Haemophilus* + hépatite B + pneumocoque.

**3<sup>e</sup> mois** : 2<sup>e</sup> DTCaP + *Haemophilus* ± pneumocoque (si immunodéprimé).

**4<sup>e</sup> mois** : 3<sup>e</sup> DTCaP + *Haemophilus* + hépatite B + pneumocoque.

**Dès 9 mois** : ROR si collectivité.

**À partir de 12 mois** : ROR + rappel pneumocoque.

**Entre 12 et 24 mois** : méningocoque C

**Vers 16/18 mois** : 1<sup>er</sup> rappel DTCaP + *Haemophilus* + hépatite B.

**Avant 24 mois** : 2<sup>e</sup> ROR.

**À 6 ans** : 2<sup>e</sup> rappel DTP.

**Avant 6 ans** : BCG si non encore fait et enfant à risque.

**Entre 11/13 ans** : 3<sup>e</sup> rappel DTCaP ± rattrapage ROR ou hépatite B.

**À 14 ans** : HPV chez les filles uniquement.

**Entre 16/18 ans** : 4<sup>e</sup> rappel dTP ± rattrapage rubéole (filles).

Puis dTP/10 ans à partir de 20 ans + 1 rappel Ca chez les futurs parents à l'occasion d'un rappel décennal + grippe tous les ans à partir de 65 ans.

En pratique le nombre de vaccins est surtout important pendant les 2 premières années avec pas moins de 14 injections pour les seuls vaccins recommandés. Le remboursement d'un vaccin hexavalent incluant l'hépatite B avec la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et l'*Haemophilus* (INFANRIX-HEXA) ; a permis de diminuer le

nombre d'injection à 11 avant 2 ans, et surtout d'augmenter le taux de couverture vaccinale contre l'hépatite B en France malgré les doutes non fondés sur la relation vaccin hépatite B/sclérose en plaques. Afin d'améliorer la tolérance des vaccins, les vaccins coqueluche à germe entier ont été remplacés par des vaccins acellulaires (Ca) et il faut faire à partir de 16 ans les rappels DTP avec un vaccin contenant une plus faible dose d'anatoxine diphtérique (dTP). L'avancement de la deuxième dose de ROR avant 2 ans et le rattrapage des enfants et adolescents n'ayant pas été vaccinés ou n'ayant reçu qu'une dose de ROR n'a pas permis l'éradication de la rougeole en France à l'horizon 2010 comme espéré par l'OMS en raison d'un taux de couverture vaccinale insuffisant. En attendant un bon taux de couverture vaccinale contre le méningocoque C chez les nourrissons, un rattrapage est conseillé jusqu'à 24 ans. Le vaccin contre le HPV (GARDASIL ou CERVARIX) prévenant le cancer du col de l'utérus est également possible en rattrapage jusqu'à 23 ans dans la première année qui suit le début des rapports sexuels. Enfin, afin de s'adapter à l'émergence de nouveau sérotypes, le vaccin anti-pneumococcique à 7 valences (PREVENAR) a été remplacé par un vaccin identique mais avec 13 valences (PREVENAR 13).

En plus de ces recommandations pour toute la population, il existe des recommandations spécifiques pour certaines catégories de personnes, par exemple vaccination annuelle contre la grippe pour tous le personnel de santé [1].

## CONSENSUS

[1] Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales, HCSP, 2014

\* Ca : composants coquelucheux acellulaires

## VACCINATIONS (2)

### Cas particuliers

- **Prématurité** : vacciner normalement dès le 2<sup>e</sup> mois de vie (sans tenir compte de l'âge corrigé) ; BCG à différer si absence de risque de contagage majeur ; vaccin antigripal > 6 mois si séquelles pulmonaires ; 3<sup>e</sup> dose de pneumocoque à 3 mois.
- Si retard vaccinal : ne pas tout recommencer mais reprendre le schéma vaccinal là où il a été interrompu, en complétant par le nombre d'injections requises en fonction de l'âge.
- Vaccins à différer en cas de : maladie en poussée, tuberculose, cardiopathie décompensée, poussée allergique.

### Voie d'administration

Intramusculaire :

- < 18 à 24 mois : face antérieure ou antérolatérale de la cuisse à 45° ;
- > 18 à 24 mois : deltoïde.

Éviter le quadrant supéro-externe de la fesse car risque de lésion du sciatique.

Vaccins recommandés par voie IM = diphtérie, tétanos, coqueluche, *Haemophilus*, hépatite B.

ROR : SC ou IM.

BCG : intradermique.

### Vaccination BCG

- La levée de l'obligation vaccinale par le BCG a été annoncée le 11 juillet 2007 ; mais il reste fortement recommandé dès le 1<sup>er</sup> mois de vie pour les enfants à risque, c'est-à-dire pour ceux provenant ou dont les parents sont originaires d'un pays de forte endémie et pour tous les enfants des

régions à haut risque que sont l'Île-de-France et la Guyane.

- Il est possible dès la naissance. Il est nécessaire de contrôler la négativité de la réaction tuberculinique avant vaccination à partir de 3 mois.
- Modalités : intradermique strict : 0,05 mL < 1 an ou 0,1 mL > 1 an.
- Contre-indications en cas de déficit de l'immunité cellulaire congénital ou acquis (sida).

### Vaccination hépatite B

- Réalisable à tout âge. Utilisation avant 15 ans du **VACCIN GenHevac B PASTEUR** ou **ENERIX B ENFANT ET NOURRISSON**, injections à J0, puis 1 mois, puis 6 à 12 mois après. L'injection de rappel tous les 5 ans n'est plus nécessaire actuellement. Un schéma à 2 doses (J0, M6) a été validé chez l'adolescent à partir de 12 ans.
- Indications :
  - nouveau-né de mère HBs+ : injection d'immunoglobulines anti- HB s avant H24 et début concomitant de la vaccination (site d'injection séparé) ;
  - risque de contamination par l'entourage proche : vaccination dès que possible sans contre-indication ;
  - pas de risque particulier : la vaccination peut être proposée chez le nourrisson et l'adolescent. La contre-indiquer en cas d'antécédents familiaux de sclérose en plaques.

### Vaccinations obligatoires en France

- Diphtérie/tétanos/poliomyélite : seules les 3 premières doses dans la 1<sup>re</sup> année et le 1<sup>er</sup> rappel avant 18 mois sont obligatoires.

## VACCINATION (1)

## ■ Vaccin antipneumococcique polyvalent

<b>PREVENAR 13</b>					
Prévention des infections à pneumocoques : E. 2-6 mois : 3 inj. à 1 mois d'intervalle et 4 <sup>e</sup> dose entre 12 et 15 mois E. non vaccinés 7-11 mois : 2 inj. à 1 mois d'intervalle et 3 <sup>e</sup> dose à 2 ans E. non vaccinés 12 mois - 5 ans : 2 inj. à 2 mois d'intervalle	1 susp. inj. 1 fl. 0,5 mL + 1 ser. + 2 aig.	57,34	I	65 %	57,34

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin polysidique conjugué préparé à partir d'antigènes purifiés de 13 sérotypes de pneumocoques.

**INDICATIONS**

Prévention des infections à *Streptococcus pneumoniae* (septicémie, méningite, pneumonie, bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F chez les nourrissons et les jeunes enfants de 2 mois à 2 ans et chez les enfants non vaccinés de 2 à 5 ans.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au vaccin pneumococcique.  
Hypersensibilité à l'anatoxine diphtérique.  
Maladie fébrile aiguë.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver entre + 2 °C et + 8 °C.  
Risque de réaction anaphylactique après administration du vaccin.

Injection intramusculaire contre-indiquée si thrombopénie ou trouble de la coagulation. L'utilisation du **PREVENAR** ne se substitue pas à celle des vaccins polysaccharidiques 23-valents chez les enfants de plus de 24 mois avec un risque élevé d'infections à *Streptococcus pneumoniae* (immunodépression, drépanocytose).  
Traitement antipyrétique prophylactique recommandé.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions locales fréquentes : rougeur, douleur, induration au point d'injection (disparaît en 24-48 h).  
Fièvre, convulsions fébriles.  
Rash, urticaire, érythème polymorphe.  
Réaction d'hypersensibilité, œdème facial, œdème de Quincke, dyspnée, bronchospasme, choc anaphylactique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le vaccin peut être effectué (à des sites d'injection différents) en même temps que d'autres vaccins pédiatriques.

## VACCINATIONS (3)

### Contre-indications et tolérance

Il faut éviter d'effectuer tout vaccin en période d'infection et le décaler quelques semaines après.

Une réaction anaphylactique à un vaccin contre-indique la poursuite de ce dernier.

- **Diphtérie** : aucune contre-indication, réaction locale fréquente.

- **Tétanos** : aucune contre-indication, tolérance excellente.

- **Poliomyélite** : aucune contre-indication, tolérance excellente pour le vaccin polio injectable.

Le vaccin buvable n'est plus utilisé en France (exceptionnel risque de paralysie liée au virus vaccinal).

- **Coqueluche** : contre-indiqué en cas d'encéphalopathie évolutive, de convulsions, de réaction majeure lors d'une injection précédente (fièvre > 40 °C, choc, convulsion).

Réactions locales fréquentes, parfois générales (fièvre 24 h après l'injection, choc, convulsion fébrile).

- **Haemophilus** : aucune contre-indication, tolérance excellente.

- **BCG** : contre-indiqué si déficit de l'immunité cellulaire congénital ou acquis. Tolérance : assez fréquentes BCGites localisées ou rarement adénites satellites.

- **Rougeole** : contre-indications = déficit immunitaire du sujet ou de son entourage, grossesse, **immunoglobulines** 3 mois avant l'injection, allergie à la **néomycine**. Possibilité de réaction (fièvre, éruption) 5 à 12 j après l'injection.

- **Rubéole** : contre-indications identiques à celles de la rougeole.

Possibilité d'arthralgies 15 j après l'injection.

- **Oreillons** : contre-indications identiques à celles de la rougeole.

Possibilité de parotidite, rarement de méningite lymphocytaire 10 à 20 j après l'injection.

- **Hépatite B** : contre-indications = rapport bénéfice/risque à évaluer en cas de sclérose en plaques.

Possibilité de réaction locale, rarement générale (fièvre, arthralgies, éruption, vomissements, augmentation des transaminases) ; exceptionnellement, poussée de neuropathie inflammatoire, sans qu'aucun lien certain de causalité n'ait pu être établi. Aucun cas de sclérose en plaques n'a été décrit avant l'âge de 5 ans.

- Contre-indication :

- définitive : vaccins vivants et déficits immunitaires congénitaux ou acquis ;

- temporaire : vaccins vivants et chimiothérapie, pathologie maligne, grossesse, poussée d'atopie, vaccins tués ou antitoxines et corticothérapie.

### Nouveaux vaccins

Ces dernières années, plusieurs vaccins ont obtenu une AMM en France ; mais, en l'absence de recommandation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), ils ne sont pas remboursés, et donc peu utilisés ; contrairement aux États-Unis et à d'autres pays européens où ils sont réalisés systématiquement :

- vaccin contre la varicelle : **VARILRIX** ou **VARIVAX** ;

- vaccin contre le rotavirus : **ROTATEQ** ou **ROTARIX** ;

Le vaccin contre la varicelle n'est pas recommandé car un taux de couverture vaccinale trop faible, comme celui de la vaccination ROR entraînerait un décalage de la maladie vers l'âge adulte et donc une augmentation du nombre de complications. Même si les sociétés pédiatriques françaises et européennes se sont prononcées en faveur de la vaccination généralisée contre le *Rotavirus*, les autorités françaises ne l'ont toujours pas recommandée [2].

### CONSENSUS

[2] Avis du CSHPF relatif à la vaccination antirotavirus chez les nourrissons de moins de 6 mois, CSHPF, 2006

## VACCINATION (2)

## ■ Vaccin antirotavirus

<b>ROTARIX</b>					
Prévention des gastro-entérites aiguës à <i>Rotavirus</i> Schéma vaccinal en 2 doses orales : 1 <sup>re</sup> dose à partir de 6 sem., 2 <sup>e</sup> dose 4 sem. plus tard Début vaccination avant 16 sem., fin du schéma avant 24 sem.	1 dose 5 mL susp. buv. (appl. prérempli.)		I	NR	
<b>ROTATEQ</b>					
Prévention des gastro-entérites à <i>Rotavirus</i> Schéma en 3 doses orales : 1 <sup>re</sup> dose à partir de 6 sem., au plus tard à 12 sem. Intervalle entre les doses : 4 sem. Fin du schéma avant 26 sem.	1 tube unidosé 2 mL (sol. buv.)		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin vivant atténué oral (*Rotavirus* humain souche RIX 4414 pour le **ROTARIX** et sérotypes *Rotavirus* G1, G2, G3, G4, P1 pour le **ROTATEQ**).

**INDICATIONS**

Prévention des gastro-entérites aiguës à *Rotavirus* chez les nourrissons à partir de 6 sem.  
La vaccination systématique n'était pas recommandée 2010. Depuis cette date (et à la date de publication de cet ouvrage), aucune nouvelle recommandation officielle n'a été publiée [2].

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **vaccin antirotavirus**.  
Antécédent d'invagination intestinale aiguë ou maladie congénitale intestinale exposant à cette pathologie.

Immunodépression, infection asymptomatique par le VIH.  
Maladie fébrile aiguë.  
Vomissement, diarrhée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Injection intraveineuse contre-indiquée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Infections respiratoires supérieures.  
Fièvre, asthénie.  
Irritabilité, somnolence.  
Nausées, diarrhée, douleurs abdominales, régurgitations.  
Dermatite, éruption cutanée.interactions médicamenteuses.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le vaccin peut être administré en même temps que d'autres vaccins pédiatriques.

## VACCINATIONS (4)

Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents en 2014

Vaccins contre :	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	15 ans	17 ans
Diphthérie (D), Tétanos (T) Polymyéélite inactivée (Polio)		DT Polio	DT Polio	DT Polio			DT Polio	DT Polio		
Coqueluche acellulaire (Ca)		Ca	Ca	Ca			Ca	Ca <sup>1</sup>		
<i>Haemophilus influenzae</i> b (Hib)		Hib	Hib	Hib						
Hépatite B (Hep B)		Hep B	Hep B	Hep B						
Pneumocoque (Pn conj)		Pn <sup>2</sup> conj	Pn <sup>2</sup> conj	Pn <sup>2</sup> conj						
Méningocoque C (vaccin conjugué)					1 dose					
Rougeole (R) Oreillons (O) Rubéole (R)					1 <sup>re</sup> dose	2 <sup>e</sup> dose				
Papillomavirus humains (HPV)								Vaccin quadrivalent (11/13 ans) et vaccin bivalent (11/14 ans) ; 2 doses (0, 6 mois)		
Hépatite B						3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois <sup>3</sup>				
Méningocoque C (vaccin conjugué)								1 dose jusqu'à 24 ans <sup>4</sup>		
Papillomavirus humains									3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeune fille de 14 ou 15 à 19 ans révolus) selon le vaccin utilisé	
ROR								2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure		

Nota bene : les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée. Encadrés rouges : co-administration possible.

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le schéma vaccinal ce qui imposerait des injections répétées. Il suffit de reprendre ce schéma au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l'âge de la personne.

Rattrapage

## VACCINATIONS (5)

Vaccins contre :	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11 ans	14 ans	16 ans	17 ans		
BCG		1 dose recommandée <b>dès la naissance</b> si enfant à risque élevé de tuberculose <sup>5</sup>											
Grippe					1 dose annuelle si personne à risque <sup>6</sup> , à partir de l'âge de 6 mois								
Hépatite A					2 doses selon le schéma 0, 6 mois si exposition à des risques particuliers <sup>7</sup> , à partir d'un an								
Hépatite B	Nouveau-né de mère Ag HBs positif <sup>8</sup> 3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois									3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois si risques <sup>9</sup>			
Méningocoque B (si risque particulier <sup>10</sup> )		<b>Entre 2 et 5 mois</b> , 3 doses espacées d'un mois et rappel entre 12 et 23 mois. <b>Entre 6 et 11 mois</b> , 2 doses espacées de 2 mois et rappel entre 12 et 24 mois. <b>Entre 12 et 23 mois</b> , 2 doses espacées de 2 mois et rappel 12 à 23 mois plus tard. <b>Entre 2 et 10 ans</b> , 2 doses espacées de 2 mois											
Méningocoque C (vaccin conjugué)		2 doses (plus rappel au cours de la 2 <sup>e</sup> année de vie), au contact d'un cas <sup>11</sup>											
Méningocoque ACYW (vaccin conjugué)					1 dose au contact d'un cas <sup>12</sup> (à partir de l'âge d'un ou 2 ans selon l'AMM du vaccin utilisé)								
Pneumocoque		Prématurés et enfants à risque <sup>13</sup> : 1 dose de Pn conj à 2, 3 et 4 mois et rappel à 11 mois				Si à risque, entre 24 et 59 mois <sup>14</sup> : 1 dose de Pneumo 23 (si non vaccinés antérieurement : 2 doses de Pn conj puis 1 dose de Pneumo 23)			Si risque à partir de 5 ans <sup>15</sup> : 1 dose de Pn conj suivie d'une dose de Pneumo 23 8 semaines après				
Varicelle					2 doses <sup>16</sup> selon un schéma dépendant du vaccin utilisé, chez des enfants au contact de personnes à risque ou candidats à une greffe							2 doses chez adolescents <sup>17</sup> de 12 à 18 ans sans antécédent et sérologie négative (sérologie facultative)	

Populations particulières et à risque

Nota bene : Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le schéma vaccinal ce qui imposera des injections répétées. Il suffit de reprendre ce schéma au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l'âge de la personne.

## VACCINATIONS (6)

- [1] dTcaPolio : vaccin combine diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d'anatoxine diphtérique (d) et d'antigènes coquelucheux (ca).
- [2] Pn conj : vaccin pneumococcique conjugué 13-valent.
- [3] Ce schéma vaccinal à 2 doses n'est possible qu'avec les vaccins **ENGRIX B** 10 µg n'est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
- [4] Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique des nourrissons à 12 mois et en attendant son impact optimal, par la création d'une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le même schéma vaccinal à une dose est aussi recommandée jusqu'à l'âge de 24 ans révolus.
- [5] Les enfants à risque élevé de tuberculose répondent à l'un des critères suivants : nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays ; devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays ; ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ; résidant en Ile-de-France, en Guyane ou à Mayotte ; dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de forte endémie.
- [6] Sont concernés : **a** les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ; **b** les enfants à partir de l'âge de 6 mois s'ils sont atteints des pathologies spécifiques suivantes : - affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 (asthme et BPCO) ; - insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause ; y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ; - maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ; - dysplasies broncho-pulmonaires ; - mucoviscidose ; - cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ; - insuffisances cardiaques graves ; - valvulopathies graves ; - troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ; - maladies des coronaires ; - antécédents d'accident vasculaire cérébral ; - formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ; - paralysies et tétanologies avec atteinte diaphragmatique ; - néphropathies chroniques graves ; - syndromes néphrotiques ; - drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassémie drépanocytose ; - diabètes de type 1 et de type 2 ; - déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques et transplantation d'organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines, personnes infectées par le VIH quel que soit leur âge et leur statut immunovirologique ; - maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; **c** l'entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque de grippe grave ; **d** les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> ; **e** les enfants et adolescents séjournant dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit leur âge.
- [7] Sont concernés : **a** les jeunes de plus d'un an séjournant dans des structures collectives pour l'enfance et la jeunesse handicapée ; **b** les enfants atteints de mucoviscidose ou de pathologie hépatobiliaire chronique susceptibles d'évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues aux virus de l'hépatite B et de l'hépatite C) ; **c** les enfants des familles dont l'un au moins des membres est originaire d'un pays de haute endémie et susceptibles d'y séjourner ; **d** les personnes dans l'entourage familial d'un patient atteint d'hépatite A.
- [8] A la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif : vaccination dans les 24 heures qui suivent la naissance avec un vaccin autre que **HBVAXPRO** 5 µg et immunoglobulines anti-HBs administrées simultanément en des points différents. Deuxième et troisième doses respectivement à l'âge de 1 et 6 mois. Schéma en 4 doses (0-1-2-6 mois) pour les prématurés < 32 semaines ou de moins de 2 kg. L'efficacité de cette prévention doit être évaluée à partir de l'âge de 9 mois par une recherche d'antigène HBs et anticorps anti-HBs, préférentiellement un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.
- [9] Sont exposés à un risque particulier les adolescents : **a** accueillis dans les services et institutions pour l'enfance et la jeunesse handicapées ; **b** accueillis dans les institutions psychiatriques ; **c** ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ; **d** voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou forte endémie (après évaluation des risques) ; **e** usagers de drogues par voie parentérale ; **f** susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou de médicaments dérivés du sang (hémoïdies, dialysés, insuffisants renaux, etc.) ; **g** candidats à une greffe d'organe, de tissus ou de cellules ; **h** entourage d'une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou porteur chronique de l'antigène HBs (famille vivant sous le même toit) ; **i** partenaires sexuels d'une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou porteur chronique de l'antigène HBs.



## VACCINATIONS (7)

- [10] Pour les personnes aspléniques ou ayant un déficit en fraction terminale du complément ou en properdine ou recevant un traitement anti-C5A, et celles ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
- [11] La vaccination est recommandée pour les personnes non vaccinées contacts d'un cas d'infection invasive à méningocoque C. Pour les enfants, adolescents et adultes ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques, cf. rapport du HCSP du 12 juillet 2012 : <http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clef=322>.
- [12] La vaccination est recommandée, avec une dose du vaccin tétravalent conjugué, pour les personnes (à partir de l'âge d'un ou 2 ans selon l'AMM du vaccin utilisé) au contact d'un cas d'infection invasive à méningocoque de sérotype A, Y ou W. Pour celles ayant un déficit en complément ou en properdine, recevant un traitement anti-C5A ou aspléniques, et celles ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques, cf. rapport du HCSP du 12 juillet 2012 : <http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clef=322>.
- [13] Une dose complémentaire de vaccin pneumococcique conjugué est recommandée à l'âge de 3 mois (avec un rappel à l'âge de 11 mois) pour les prématurés et les nourissons à haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque. C'est-à-dire les enfants : a. Immunodéprimés (aspléniques ou hypospléniques incluant les drépanocytoses majeures ; atteints de déficits immunitaires héréditaires ; infectés par le VIH, quel que soit le statut immunologique ; sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne ; transplantés ou en attente de transplantation d'organe solide ; greffes de cellules souches hématopoïétiques ; traités par immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique ; atteints de syndrome néphrotique) ; b. non immunodéprimés porteurs d'une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'IIP (cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque) ; insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème ; asthme sévère sous traitement continu ; insuffisance rénale ; hépatopathie chronique d'origine alcoolique ou non ; diabète non équilibré par le simple régime ; patients présentant une brèche ostéo-méningée, un implant cochléaire ou candidats à une implantation cochléaire.
- [14] Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois (cf. ci-dessus note n° 13) non préalablement vaccinés avec le vaccin conjugué 13-valent, la vaccination pneumococcique est recommandée selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué 13-valent à 2 mois d'intervalle suivies d'une dose de vaccin polysidique 23-valent au moins 2 mois après la 2<sup>e</sup> dose du vaccin conjugué Pn13. **Pour ceux préalablement vaccinés avant l'âge de 24 mois avec le vaccin conjugué 13-valent** : une dose de vaccin polysidique 23-valent.
- [15] **Pour les enfants âgés de 5 ans et plus et les adolescents immunodéprimés** (cf. ci-dessus note n° 13) atteints de syndrome néphrotique, porteurs d'une brèche ostéo-méningée, d'un implant cochléaire ou candidats à cette implantation non vaccinés antérieurement : une dose de vaccin conjugué 13-valent suivie 8 semaines plus tard d'une dose de vaccin polysidique 23-valent. **Pour ceux qui ont été vaccinés** depuis plus de 3 ans avec le vaccin polysidique 23-valent : une dose de vaccin conjugué 13-valent suivie, 8 semaines plus tard, d'une dose de vaccin polysidique 23-valent. **Pour certaines personnes immunodéprimées**, le schéma vaccinal est précisé dans le rapport sur la vaccination des immunodéprimés. **Les personnes ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques** devraient recevoir un schéma vaccinal de primo-vaccination en trois doses par le vaccin conjugué 13-valent suivie d'une dose de vaccin polysidique 23-valent. **Pour les enfants âgés de plus de 5 ans et les adolescents** présentant un risque élevé d'IIP13 en dehors d'une immunodépression, d'une brèche ostéo-méningée ou d'un implant cochléaire, une dose de vaccin polysidique 23-valent.
- [16] Le schéma vaccinal est de deux doses espacées de quatre à huit semaines ou de six à dix semaines selon le vaccin utilisé, quel que soit l'âge ; recommande chez les enfants sans antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées ou candidats receveurs d'une greffe d'organe et en post-exposition dans les 3 jours suivant l'exposition à un cas de varicelle chez les adolescents de plus de 12 ans non immunisés.
- [17] La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. Toute grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes ayant l'intention de débiter une grossesse de différer leur projet.

## ANTIPYRÉTIQUES (1)

## ■ Paracétamol

<b>DOLIPRANE</b>				
Fièvre, douleur : 60 mg/kg/24 h en 4 à 6 prises	12 sach. 100 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 150 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 200 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 300 mg	2,13	65 %	0,18
	12 sach. 500 mg	1,95	65 %	0,16
	8 sach. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
	10 sup. séc. 100 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 150 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 200 mg	2,02	65 %	0,20
	10 sup. 300 mg	2,02	65 %	0,20
	8 sup. 1 000 mg	2,17	65 %	0,27
	16 cp. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	16 cp. efferv. 500 mg	2,02	65 %	0,13
	100 cp. 500 mg	HOP		
	8 cp. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
	8 cp. efferv. séc. 1 000 mg	2,02	65 %	0,26
	100 cp. 1 000 mg	HOP		
	100 cp. efferv. séc. 1 000 mg	HOP		
	16 gél. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	100 gél. 500 mg	HOP		
Susp. buv. (2,4 %) : dose poids/prise	8 gél. 1 000 mg	1,90	NR	0,24
	1 fl. 100 mL	2,08	65 %	2,08
<b>EFFERALGAN</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	16 cp. efferv. séc. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	16 cp. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	8 cp. efferv. 1 000 mg	2,02	65 %	0,25
<b>DOLKO</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	12 sach. 500 mg	1,95	65 %	0,16
	18 fl. 90 mL	2,08	65 %	0,12
	16 cp. séc. 500 mg	1,95	65 %	0,12
	8 cp. séc. 1 000 mg	1,90	65 %	0,24
<b>PARALYOC</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	10 lyoph. 250 mg	2,13	65 %	0,21
	16 lyoph. 500 mg	2,75	65 %	0,17
<b>DAFALGAN PEDIATRIQUE</b>				
Idem <b>DOLIPRANE (pédiatrie)</b>	1 fl. 90 mL sol. buv. 3 %	2,08	65 %	2,08

## PROPRIÉTÉS

Antalgique périphérique et antipyrétique. Résorption digestive rapide et complète (action per os en 30 min). Liaison faible aux protéines plasmatiques, métabolisme hépatique puis élimination essentiellement urinaire sous forme active (< 5 %) et sous forme de dérivés conjugués inactifs (1/2 vie = 2 h).

## INDICATIONS

Traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs d'intensité modérée.

## CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance hépato-cellulaire.  
Allergie au **paracétamol** (exceptionnelle).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas dépasser les doses maximales. Espacer les prises de 8 h minimum en cas d'insuffisance rénale sévère.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions allergiques (exceptionnelles) : rash cutané, urticaire.

Thrombopénies (exceptionnelles).

Surdosage (dose > 150 mg/kg en 1 prise) : cytolysé hépatique apparaissant dans les premières 24 h avec risque de nécrose irréversible massive et mort par encéphalopathie hépatique. Traitement : lavage gastrique précoce (2 premières heures ; inefficace si forme sirop), administration de **N-acétylcystéine** par voie orale ou en perfusion IV lente, traitement symptomatique. Surveillance de la paracétamolémie et des transaminases.

## FIÈVRE CHEZ L'ENFANT (2)

### Mesures physiques [1]

- Découvrir l'enfant, ne pas surchauffer la pièce.

- Augmenter les apports hydriques.

Le refroidissement externe souvent préconisé ne se justifie qu'en cas d'hyperthermie majeure engageant le pronostic vital, notamment chez un nourrisson déshydraté et surcouvert donc ne pouvant assurer sa thermorégulation. Dans les autres cas il est inutile car il ne modifie pas le point de contrôle hypothalamique de la température corporelle.

### Traitements médicamenteux [1]

Les traitements médicamenteux abaissent le point de contrôle hypothalamique de la température corporelle.

**Antipyrétique, paracétamol (DOLIPRANE) :** 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises *per os* ou 80 mg/kg/j en 4 prises rectales.

**Antipyrétique, acétylsalicylate de lysine (ASPÉGIC) :** 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises *per os*.

**Antipyrétique, ibuprofène (ADVILMED) :** 20 à 30 mg/kg/j (dose poids/6 h *per os* de la suspension buvable).

- En première intention, utilisation d'une monothérapie (plutôt le **paracétamol** car moins d'effets secondaires). L'adjonction d'un autre médicament reste possible (**ASPÉGIC** ou **ADVILMED**) en alternance si le **paracétamol** ne suffit pas. Une bithérapie d'emblée ne se justifie pas. L'**aspirine** est de moins en moins utilisée dans cette indication du fait du risque de syndrome de Reye décrit avec cette molécule dans certaines viroses de l'enfant, notamment en

cas de varicelle ou de grippe au cours desquelles elle est même contre-indiquée.

- En cas de troubles digestifs, la voie veineuse est utilisable : **antipyrétique, paracétamol (PERFALGAN) :** 60 mg/kg/j par voie IV en 4 injections IVL 15 min (demi-dose chez le nourrisson de moins de 1 an ou 10 kg).

Ne pas utiliser les **AINS** :

- avant 3 mois
- en cas d'atteinte cutanée (varicelle +++ ) ou des tissus mous car risque de fasciite nécrosante
- en cas de risque hémorragique (geste invasif ou intervention chirurgicale potentiels)
- en cas d'insuffisance hépatique ou rénale
- en cas d'antécédent d'asthme
- en cas de diarrhée (risque d'insuffisance rénale)

### Critères d'hospitalisation

- Âge
- Troubles hémodynamiques, troubles de conscience, détresse respiratoire.
- Fièvre mal tolérée (comportement inhabituel).
- Purpura.
- Infection bactérienne sévère confirmée.
- Incapacité de surveillance à domicile.

### Complications de la fièvre

- Convulsions hyperthermiques.
- Déshydratation aiguë.
- Rarement, syndrome d'hyperthermie majeure, avec collapsus, atteinte multiviscérale (notamment cérébrale) chez un nourrisson en général surcouvert.

### CONSENSUS

[1] Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant, *Afssaps*, 2005

## ANTIPYRÉTIQUES (2)

■ **Ibuprofène**

<b>ADVILMED</b>					
7,5 mg/dose-kg E et N. : 20 à 30 mg/kg/j en 3 prises, soit 1 dose-kg x 3 à 4/j 20 à 30 mg/kg/j en 3 prises, soit 1 cp./10 kg/prise x 2 à 3/j	1 fl. 200 mL gradué en kg	3,53		65 %	3,53
	30 cp. 100 mg	2,39		65 %	0,08
<b>ANTARÈNE</b>					
10 mg/dose-kg Idem <b>ADVILMED</b>	1 fl. 150 mL gradué en kg	2,24		65 %	2,24
	20 cp. 100 mg	2,28		65 %	0,11

La pharmacologie est développée en Rhumatologie dans Antalgiques dérivés des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

■ **Acétylsalicylate de lysine**

<b>ASPÉGIC</b>					
Fièvre, douleurs : 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises Maximum 100 mg/kg/j pour indication anti-inflammatoire (sans sodium)	20 sach. N. 100 mg 20 sach. E. 250 mg	2,20 2,28		65 % 65 %	0,11 0,11

**PROPRIÉTÉS**

Dérivés salicylés ayant un effet antalgique périphérique, antipyrétique, antiagrégant plaquettaire à faibles doses, anti-inflammatoire à fortes doses. Résorption digestive rapide (taux sanguin max. en 2 à 4 h), liaison importante aux protéines plasmatiques. Élimination urinaire (demi-vie 3 à 9 h) accrue par alcalinisation.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des états fébriles et douloureux.

Maladies inflammatoires (fortes doses : maximum 100 mg/kg/j).

Antiagrégant plaquettaire à faibles doses.

À réserver en 2<sup>e</sup> intention du fait du risque rare mais potentiellement grave de survenue d'un syndrome de Reye.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie aux **salicylés** ou aux autres **AINS**.

Ulcère gastroduodénal évolutif, gastrite, autres lésions organiques susceptibles de saigner.

Maladies hémorragiques constitutionnelles ou acquises.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Utiliser avec prudence en cas d'asthme, d'antécédents d'ulcère ou d'hémorragie digestive, en cas d'insuffisance rénale.

Ne pas administrer dans la semaine précédant une chirurgie, même mineure.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions allergiques : choc anaphylactique, œdème de Quincke, asthme, urticaire (réaction croisée possible avec **AINS**).

Troubles digestifs : gastralgies, ulcérations gastro-duodénales, hémorragies digestives patentes ou occultes (hématomèse ou méléna). Hémostase perturbée pendant 4 à 8 j après traitement ; possibilité de saignements.

Surdosage (fréquent chez l'enfant) :

– modéré : bourdonnements d'oreille, céphalées, vertiges, nausées ;

– à sévère : fièvre, hyperventilation avec alcalose respiratoire, acidose métabolique, coma, collapsus, insuffisance respiratoire, hypoglycémie.

Traitement : lavage gastrique puis charbon activé, traitement symptomatique, hyperdiurèse alcaline, voire dialyse.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées : **méthotrexate** > 15 mg/sem. (potentialisé de façon majeure), **anticoagulants oraux** (si **salicylés** forte dose).

Associations déconseillées : **antivitamines K**, **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, **héparine**, **ticlopidine**.

Associations à surveiller : **corticoïdes**, **diurétiques**, **IEC**.

## ANTIÉPILEPTIQUES - POSOLOGIES INFANTILES (1)

## ■ Phénobarbital

<b>GARDÉNAL</b>					
Crise convulsive : 10 à 20 mg/kg selon l'âge en IV sur 20 min	1 fl. 40 mg 1 fl. 200 mg	11,17 HOP	II	65 %	11,17
Relais <i>per os</i> à H48	80 cp. 10 mg	3,40	II	65 %	0,04
< 3 ans : 5 mg/kg/j en 2 prises	30 cp. 50 mg	1,84	II	65 %	0,06
> 3 ans : 3 mg/kg/j en 1 prise	20 cp. 100 mg	2,47	II	65 %	0,12
<b>APAROXAL</b>					
Idem <b>GARDÉNAL (pédiatrie)</b>	20 cp. séc. 100 mg	1,95	II	65 %	0,10
<b>KANEURON</b>					
3 à 4 mg/kg/j au coucher	1 fl. 5,4 % (1 620 gttes)	8,68	II	65 %	
<b>ALEPSAL</b>					
< 20 kg : 5 mg/kg/j	30 cp. 15 mg	2,03	II	65 %	0,07
20 à 30 kg : 3 à 4 mg/kg/j	30 cp. 50 mg	2,04	II	65 %	0,07
> 30 kg : 2 à 3 mg/kg/j	30 cp. 100 mg	2,84	II	65 %	0,09
	30 cp. 150 mg	4,44	II	65 %	0,15

## ■ Phénytoïne

<b>DI-HYDAN</b>					
3 à 8 mg/kg/j en 2 prises	60 cp. séc. 100 mg	3,42	II	65 %	0,06

## ■ Diazépam

<b>VALIUM ROCHE</b>					
Crise convulsive : 0,1 mg/kg IVD renouvelable jusqu'à 0,5 mg/kg (risque d'apnée) <i>Per os</i> : 0,5 à 1 mg/kg/j	6 amp. (2 mL = 10 mg)	3,16	I	65 %	0,53
	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	600 gttes - fl. 20 mL (3 gttes = 1 mg)	3,05	I	65 %	

La pharmacologie est développée dans le chapitre Neurologie.

## ÉPILEPSIE DE L'ENFANT ET DU NOURRISSON (2)

### Bilan étiologique

Le pronostic dépend de l'étiologie.

Traumatisme crânien	Hémorragie méningée Hémorragie intraparenchymateuse Syndrome de Silverman
Souffrance fœtale aiguë	Lésions anoxo-ischémiques
Processus expansif	Tumeur Absès
Infection	Méningite Méningo-encéphalite (herpès)
Hypertension artérielle	
Troubles métaboliques	Hypoglycémie Hypocalcémie Hypernatrémie (rechercher une thrombose veineuse intracrânienne) Hyponatrémie Maladies métaboliques génétiquement déterminées
Causes vasculaires	Accident vasculaire cérébral Thrombose des sinus veineux
Causes toxiques	Médicamenteuses Monoxyde de carbone Plomb Sevrage morphinique chez le nouveau-né
Secondaires à une anoxie	Corps étranger Strangulation Arrêt cardiorespiratoire
Malformations cérébrales	Rechercher la cause de décompensation (infection, sous-dosage médicamenteux)
Convulsions néonatales bénignes idiopathiques	Entre 24 h et 6 sem. de vie (le plus souvent entre J3 et J7). C'est un diagnostic d'élimination, l'évolution est bénigne, les convulsions durent en moyenne de 3 h à 3 j, le traitement peut être arrêté après 6 sem.
Convulsions fébriles idiopathiques	Infection virale (90 %). Risque d'épilepsie ultérieure très faible.

### Bilan diagnostique

#### Bilan diagnostique devant une épilepsie de l'enfant ou du nourrisson\*

*Clinique* : température, PA, glycémie capillaire, PC.

*Examens paracliniques*:

- Ionogramme sanguin, kaliémie, gaz du sang, glycémie, calcémie, lactates.
- Recherche de toxiques (sang + urines).
- NFS plaquettes, CRP.
- Fond d'œil.

- Scanner cérébral (l'ETF n'a de valeur que positive car elle explore mal la périphérie du cerveau).
- PL (avant ou après le scanner selon la clinique).
- EEG.
- IRM cérébrale à distance de la crise.
- Dosage d'antiépileptiques si l'enfant est traité.

\* Ces examens ne sont pas tous indispensables lorsque le contexte étiologique est évident. Ils doivent être effectués au moindre doute.

## ANTIÉPILEPTIQUES - POSOLOGIES INFANTILES (2)

## ■ Clonazépam

<b>RIVOTRIL</b>					
Crise convulsive : charge 2 à 0,04 mg/kg IVD puis 0,2 à 0,5 mg/kg/j IV continu	6 amp. 1 mL = 1 mg	4,71	I	65 %	0,39
Per os (épilepsie) : 0,1 mg/kg/j à atteindre progressivement	28 cp. quadriséc. 2 mg	2,16	I	65 %	0,08
	500 gttes 0,25 % (1 gtte = 0,1 mg)	2,25	I	65 %	

## ■ Valproate de sodium

<b>DÉPAKINE</b>					
Relais temporaire de la voie orale : bolus 15 mg/kg en 5 min puis relais par perf. continue à un débit de 1 mg/kg/h à adapter pour atteindre un taux sérique autour de 75 mg/mL	4 fl. 400 mg	HOP	II		
Per os : épilepsie : 30 mg/kg/j	40 cp. 200 mg	3,92	II	65 %	0,10
2 à 3 prises quotidiennes	40 cp. 500 mg	8,65	II	65 %	0,22
Éviter les cp. avant 6 ans, préférer le sirop ou la sol. buv.	40 mL sol. buv. 200 mg/mL	5,46	II	65 %	0,14
	150 mL sirop	8,39	II	65 %	0,06
	57,64 mg/mL				
<b>DÉPAKINE CHRONO 500 mg</b> idem 2 prises (libération prolongée)	30 cp. séc. 500 mg	12,82	II	65 %	0,43
<b>MICROPARKINE LP</b>					
E et N : per os, 30 mg/kg/j	30 sach. 100 mg	4,00	II	65 %	0,13
	30 sach. 250 mg	8,84	II	65 %	0,29
	30 sach. 500 mg	17,12	II	65 %	0,57
	30 sach. 750 mg	25,42	II	65 %	0,85

La pharmacologie est développée dans le chapitre Neurologie.

## SELS FERREUX (1)

## Fer seul oral (sel ferreux)

## ■ Ascorbate ferreux

<b>ASCOFER</b>					
A. : 100 à 200 mg/j en 1 à 2 prises, jusqu'à reconstitution du stock en fer (3 mois) E. et N. : 6 à 10 mg/kg/j	30 gél. 33 mg	3,29		65 %	0,11

## ■ Ferédétate de sodium

<b>FERROSTRANE</b>					
Idem <b>ASCOFER</b>	25 càc 34 mg (fl. 125 mL)	2,62	II	65 %	0,10

## ■ Fumarate ferreux

<b>FUMAFER</b>					
Idem <b>ASCOFER</b>	50 cp. 66 mg 100 cp. 66 mg 50 doses 33 mg	HOP 2,78		65 % NR	0,03

## ■ Succinate ferreux + acide succinique

<b>INOFER</b>					
Idem <b>ASCOFER</b>	100 cp. séc. 100 mg	6,31		65 %	0,06

## ■ Sulfate ferreux

<b>TARDYFERON</b>					
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 80 mg	3,56		65 %	0,12

## Fer et vitamine C oral (sulfate)

## ■ Sulfate ferreux + acide ascorbique

<b>FERO-GRAD VITAMINÉ C 500</b>					
Idem <b>ASCOFER</b>	30 cp. 105 mg + ac. ascorbique 500 mg	3,16		65 %	0,11



## SELS FERREUX (2)

## Fer injectable

## ■ Fer

VENOFER				
Quantité de fer (mg) = poids (kg) x 2,4 x [Hb <sub>cible</sub> - Hb <sub>actuelle</sub> ] (g/100 mL) Ne pas dépasser 300 mg/inj. en IV lente (90 min)	5 fl. 5 mL (20 mg/mL)	HOP		

## PROPRIÉTÉS

Le fer administré sous forme de **sels ferreux** par voie orale est absorbé dans le duodénum et le jéjunum, le fer ferreux entre dans la formation de l'hémoglobine. 10 à 20 % du fer ingéré est absorbé. Cette absorption intéresse l'ion ferreux.

## INDICATIONS

Carence martiale.

**VENOFER** : lorsqu'un traitement par fer oral est insuffisant ou mal toléré :

- carence martiale liée aux maladies inflammatoires chroniques sévères de l'intestin ;
- anémie de l'insuffisant rénal chronique hémodialysé ;
- anémies aiguës en postopératoire immédiat ;
- en préopératoire chez les patients anémiés inclus dans un programme de don de sang autologue en association avec l'**EPO**.

## CONTRE-INDICATIONS

Surcharge martiale normale ou hypersidérémique : thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Après administration par voie orale, les **sels ferreux** sont à l'origine d'une irritation du tube digestif à l'initiation du traitement. Les doses utiles peuvent être atteintes par paliers.

Nausées, épigastralgies, diarrhée ou au contraire constipation. Ces effets sont rares. Selles noires (avertir le patient).

La voie IV peut entraîner exceptionnellement une réaction anaphylactique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Fer oral :

- absorption diminuée par l'alimentation ;
- absorption augmentée par la prise concomitante d'**acide ascorbique**.

Absorption de fer oral réduite si administré de façon concomitante à une forme injectable et risque de lipothymie avec **VENOFER** (association déconseillée, délai de 5 j à respecter après la dernière inj. pour l'administration de fer oral.)

## GONADOTROPHINES HUMAINES

## ■ Gonadotrophine hCG (activité LH)

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO					
Cryptorchidie : test à l'hCG : < 1 an : 500 UI IM/48 h x 3 > 1 an : 1 500 UI IM/48 h x 6 Hypogonadisme hypogonadotrophique : 1 000 UI IM x 2 à 3/sem.	3 amp. 1 500 UI	5,68	I	65 %	1,89
	1 amp. 5 000 UI	5,95	I	65 %	5,95

**PROPRIÉTÉS**

Les effets de l'hCG d'origine placentaire sont ceux de la LH, à savoir :

- déclenchement de l'ovulation (après stimulation suffisante par les gonadotrophines à action FSH) ;
- différenciation des cellules de Leydig chez l'homme et stimulation de la sécrétion d'androgènes par ces cellules.

**INDICATIONS**

Cryptorchidie chez l'enfant.

Hypogonadisme hypogonadotrophique chez l'homme.

Certaines stérilités de la femme (associée avec HMG).

**CONTRE-INDICATIONS**

Tumeurs hypophysaires.

Tumeurs gonadiques.

Dystrophies ovariennes.

Jeunes filles avant 18 ans.

**Grossesse** en cours.

LH élevée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance de l'apparition de signes de maturation sexuelle, qui font arrêter le traitement dans l'indication cryptorchidie.

En association avec l'HMG, surveillance des signes d'hyperstimulation ovarienne (estradiol plasmatique, œstrogènes urinaires).

Positivité des tests de contrôle antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Manifestations allergiques.

Possibilité de rétention hydrosodée à doses supratherapeutiques.

En association avec l'HMG, risque de grossesses multiples, d'hyperstimulation ovarienne avec kystes ovariens bilatéraux, voire rupture de kystes.

Parfois sensibilité testiculaire, érections, rarement augmentation du volume de la verge (disparition de ces symptômes à l'arrêt du traitement).

## HORMONES THYROÏDIENNES (PÉDIATRIE)

## ■ Lévothyroxine sodique (L-T4)

<b>L THYROXINE SERB</b>					
Hypothyroïdie de l'enfant : 5 à 6 µg/kg/j en une prise chez le nouveau-né, 3 à 5 µg/kg/j chez le plus grand	450 gttes (1 gtte = 5 µg) soluté buvable 15 mL conserver à + 4°C	4,77	II	65 %	0,01
<b>LÉVOTHYROX</b>					
Hypothyroïdie de l'enfant > 6 ans : 100 µg/m <sup>2</sup> /j	30 cp. séc. 25 µg	1,34	II	65 %	0,04
	30 cp. séc. 50 µg	1,79	II	65 %	0,06
	30 cp. séc. 75 µg	2,28	II	65 %	0,08
	30 cp. séc. 100 µg	2,74	II	65 %	0,09
	30 cp. séc. 125 µg	3,20	II	65 %	0,11
	30 cp. séc. 150 µg	3,68	II	65 %	0,12
	30 cp. séc. 175 µg	4,14	II	65 %	0,15
	30 cp. séc. 200 µg	4,62	II	65 %	0,16

**PROPRIÉTÉS**

Hormone thyroïdienne iodée : rôle nécessaire à la croissance, au développement du SNC, augmente le métabolisme de base et la consommation tissulaire d'oxygène, accélère le rythme cardiaque.

La lévothyroxine a une demi-vie longue (6 à 8 j). L'état d'équilibre est atteint après 4 à 6 sem. Elle est métabolisée en L-T3 active.

**INDICATIONS**

Hypothyroïdies d'origine haute ou basse, complètes ou incomplètes.

Circonstances dans lesquelles on désire freiner la TSH.

**CONTRE-INDICATIONS**

Absolues : cardiopathie décompensée, hyperthyroïdie.

Relatives : trouble du rythme cardiaque, insuffisance coronarienne.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Associer un traitement substitutif préalable par **hydrocortisone** en cas d'insuffisance surrénale associée.

En cas d'antécédents cardiovasculaires, s'assurer du contrôle de la cardiopathie, instaurer

éventuellement le traitement à doses progressives.

Utiliser avec prudence en cas d'hypertension artérielle, tuberculose, diabète, anorexie et dénutrition.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aggravation possible des cardiopathies ischémiques et des troubles du rythme cardiaque.

Risque de décompensation d'une insuffisance surrénale non traitée (coexistence fréquente dans les hypothyroïdies centrales).

Possibilité d'hypercalcémie-hypercalciurie chez l'enfant (avant 6 mois : pas de **vitamine D** ou faible dose 400 U/j).

Surdosage : signes d'hyperthyroïdie pouvant aller jusqu'à la thyrotoxicose : insomnie, irritabilité, céphalées, fièvre, tachycardie, sueurs, amaigrissement, diarrhée : arrêt du traitement pendant quelques jours puis diminuer la posologie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation des **antivitamines K**.

Potentialisation mutuelle avec les **antidépresseurs tricycliques**.

Action réduite par la **colestyramine** et les **inducteurs enzymatiques**.

## GLUCOCORTICOÏDES (PÉDIATRIE)

## ■ Hydrocortisone

<b>HYDROCORTISONE ROUSSEL</b>					
Insuf. surrénale : 10 à 20 mg/m <sup>2</sup> /j	25 cp. 10 mg	3,24	I	65 %	0,13
<b>HYDROCORTISONE UPJOHN</b>					
Voie IV = hémisuccinate d'hydrocortisone 5 mg/kg puis 2 mg/kg/6 h Voie IM = acétate d'hydrocortisone 3 à 5 mg/kg/12 ou 24 h	1 fl. 100 mg = 2 mL	2,82	I	65 %	2,82

**PROPRIÉTÉS**

Hormones physiologiques ayant une action glucocorticoïde prédominante et une action minéralocorticoïde modérée (inférieure à celle de l'aldostérone).

Résorption digestive rapide (pic en 1 h), biotransformation hépatique et rénale, élimination urinaire sous forme de glucuronides conjugués principalement.

**INDICATIONS**

Insuffisance surrénale aiguë.  
Insuffisance surrénale chronique (d'origine surrénalienne ou hypophysaire).  
Hyperplasie congénitale des surrénales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune dans ces indications.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le régime doit être normosodé.  
Ne jamais interrompre brutalement (risque d'insuffisance surrénale aiguë).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun à dose physiologique substitutive.

Ralentissement de la croissance en cas de surdosage, puis autres signes d'hypercorticisme (obésité facio-tronculaire, amyotrophie, vergetures, HTA, hypokaliémie, hyperglycémie). Diminuer la posologie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Se méfier de l'hypokaliémie liée à un surdosage en cas de coprescription avec **macrolides**, **antiarythmiques** donnant des torsades de pointes, **digitaliques**.

Prudence si autres médicaments hypokaliémisants (**diurétiques**, **amphotéricine B**).

Catabolisme augmenté par les inducteurs enzymatiques (**barbituriques**, **primidone**, **rifampicine**, **phénytoïne**).

## MINÉRALOCORTICOÏDES (PÉDIATRIE)

## ■ Fludrocortisone

ADIXONE					
Insuffisance surrénale lente : 50 à 200 µg/j en 2 ou 3 prises	30 cp. séc. 50 µg	56,13	I	65 %	1,87
	60 cp. séc. 50 µg	107,95	I	65 %	1,80
	90 cp. séc. 50 µg	159,77	I	65 %	1,78
	120 cp. séc. 50 µg	210,61	I	65 %	1,76

## ■ Désoxycortone

SYNCORTYL					
Insuffisance surrénale : 1 à 5 mg (voire 10 mg) IM toutes les 12 h	4 amp. 10 mg	8,46	I	65 %	2,12

## PROPRIÉTÉS

Hormone ayant une action minéralocorticoïde identique à celle de l'aldostérone : rétention de sodium, élimination de potassium, par action au niveau du tube distal du néphron.

La **désoxycortone** n'est pas résorbable par voie orale.

## INDICATIONS

Insuffisance surrénale lente ayant une composante d'insuffisance minéralocorticoïde (associer un traitement par **hydrocortisone**).

Insuffisance surrénale aiguë.

Hyperplasie congénitale des surrénales par déficit enzymatique lorsqu'il existe un bloc entravant la synthèse des minéralocorticoïdes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypertension artérielle.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Associer un régime normosodé.

La posologie doit être ajustée en fonction de la

tension artérielle, de la kaliémie, de la natrémie et de l'activité de la rénine plasmatique.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Pas d'effet indésirable aux doses physiologiques.

Surdosage : hypokaliémie, rétention hydrosodée, hypertension artérielle.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Se méfier de l'hypokaliémie liée à un surdosage en cas de coprescription avec **macrolides**, **antiarythmiques** donnant des torsades de pointes, **digitaliques**.

Prudence si autres médicaments hypokaliémisants (**diurétiques**, **amphotéricine B**).

Catabolisme augmenté par les **inducteurs enzymatiques** (**barbituriques**, **primidone**, **rifampicine**, **phénytoïne**).

## SOLUTÉS DE RÉHYDRATATION ORALE

## ■ Solutés de réhydratation orale

<b>ADIARIL</b>					
Énergie 105 kcal/L, osmolarité 250 mOsm/L, glucose 13,3 g/L, saccharose 12,5 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 20 mmol/L, citrate 10 mmol/L	10 sach. 7 g	6,20		60 %	0,62
<b>PICOLITE</b>					
Énergie 360 kcal/L, osmolarité 233 mOsmol/L, glucides 90 g/L, saccharose 20 g/L, dextrine-maltose 70 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 22,3 mmol/L, Cl <sup>-</sup> 62,3 mmol/L, citrates 9,3 mmol/L	10 sach. 20 g	6,20		60 %	0,62
<b>NOVALAC HYDRANOVA</b>					
Énergie 108 kcal/L, osmolarité 245 mOsmol/L, glucose 25,5 g/L, Na <sup>+</sup> 60 mmol/L, K <sup>+</sup> 20 mmol/L, Cl <sup>-</sup> 61 mmol/L, citrates 10 mmol/L	10 sach. 6,5 g	6,20		60 %	0,62
<b>VIATOL</b>					
Énergie 80 kcal/L, osmolarité < 270 mOsm/L, glucose 20 g/L, Na <sup>+</sup> 50 mmol/L, K <sup>+</sup> 25 mmol/L, citrates 12,5 mmol/L, bicarbonates 30 mmol/L	10 sach. 5,25 g	6,20		60 %	0,62

**PROPRIÉTÉS**

Solutés de réhydratation orale ayant un apport équilibré en glucose et en électrolytes permettant de compenser les pertes digestives causées par une diarrhée aiguë.

**INDICATIONS**

Prévention et correction des déshydratations au cours des diarrhées aiguës de l'enfant.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Une fois la solution reconstituée (1 sach. pour 200 mL d'eau), conservation possible au réfrigérateur pendant 24 h.

Pour une meilleure absorption, administrer entre les repas. Les quantités administrées sont régulées par la soif du nourrisson.

L'efficacité du traitement doit être surveillée rigoureusement (poids, état d'hydratation, etc.). Reprendre l'alimentation dès que possible. Administrer exclusivement ces solutés plus de 3 j entraîne rapidement une dénutrition importante.

Les vomissements chez l'enfant diarrhéique ne sont pas une contre-indication à la réhydratation orale. Celle-ci doit être particulièrement fractionnée. L'apport de glucose fait rapidement cesser des vomissements entretenus par une cétose de jeûne.

## ANTIÉMÉTIQUES

■ **Dompéridone**

<b>MOTILIUM</b>					
Vomissements, reflux gastro-œsophagien : 0,25 mg/kg x 3/j	40 cp. 10 mg	3,65	II	30 %	0,09
	200 fl. 200 mL (1 mg/mL)	2,97	II	30 %	0,01
<b>PÉRIDYS</b>					
Idem <b>MOTILIUM</b>	40 cp. 10 mg	3,65	II	30 %	0,09
	160 fl. 200 mL (1 g/mL)	2,97	II	30 %	0,02

■ **Métopimazine**

<b>VOGALÈNE</b>					
En 3 prises : < 6 ans : 1 mg/kg/j 6-12 ans : 1,5-3 sup./j >12 ans : 3 à 6 sup./j 6-12 ans : 1-2 lyocs/j 0,5 mg/kg/j	10 sup. séc. 10 mg	2,13	II	30 %	0,21
	16 lyocs 7,5 mg	2,13	II	30 %	0,13
	1200 gttes sol. buv.	3,40	II	30 %	0,00

**PROPRIÉTÉS**

Antipsychotiques antiémétiques, sans effet anticholinergique. La **dompéridone** passe très faiblement la barrière hémato-encéphalique alors que le **métoclopramide** peut être considéré comme un véritable antipsychotique. Ces molécules renforcent le péristaltisme du tube digestif supérieur :

- augmentation du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage ;
- inhibition de la relaxation du fundus gastrique et stimulation de l'activité motrice ;
- élargissement du pylore au moment de son ouverture ;
- augmentation de la fréquence, de l'amplitude et de la durée des contractions duodénales.

La **dompéridone** normalise les contractions anarchiques de la maladie des spasmes étagés de l'œsophage. Elle ne modifie pas les fonctions sécrétoires.

**INDICATIONS**

Nausées, vomissements.  
Reflux gastro-œsophagien, œsophagite.

**CONTRE-INDICATIONS**

Dyskinésies tardives aux **antipsychotiques**.  
Hémorragie, obstruction ou perforation gastro-intestinale.  
Prolactinome (**dompéridone**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire la posologie chez l'insuffisant rénal ou hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles extrapyramidaux (rares).  
Gynécomasties, galactorrhée, aménorrhée.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Métopimazine** : risque de potentialisation des **antihypertenseurs** et des dépresseurs du système nerveux central : **hypnotiques**, **sédatifs**, **analgésiques**, **anesthésiques**.

## CALCIUM (1)

### ■ Calcium

<b>CACIT</b>					
Calcithérapie à forte dose : 500 à 1 200 mg/j (calcium-élément)	60 cp. efferv. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	30 cp. efferv. 1 g	6,97		65 %	0,23
<b>CALCIUM SANDOZ</b>					
Idem <b>CACIT</b>	20 cp. efferv. 500 mg	2,88		65 %	0,14
	30 sach. sol. buv. 500 mg	3,90		65 %	0,13
<b>CALCIFORTE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 amp. buv. 500 mg	5,15		65 %	0,17
<b>CALCIDOSE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 sach. pdre 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	60 cp. 750 mg	10,41		65 %	0,17
	30 cp. 1 000 mg	6,97		65 %	0,23
<b>CALPEROS</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. à sucer 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALTRATE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>DENSICAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. à sucer 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>OSTRAM</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 sach. 0,6 g	3,90		65 %	0,13
	30 sach. 1,2 g	6,97		65 %	0,23



## RACHITISME CARENTIEL (2)

### Surveillance

Elle permet de vérifier la vitaminosensibilité.

- À 1 mois, normalisation de : phosphorémie, calciurie, phosphatases alcalines.
- Normalisation radiologique sur plusieurs mois :
  - densification de la ligne métaphyso-épiphyse ;
  - minéralisation épiphysaire puis épaississement cortical ;
  - correction de la déformation après plusieurs années.

### En cas d'échec du traitement

Se méfier d'un rachitisme vitaminorésistant :

- *Malabsorption*
- Mucoviscidose, cholestase, maladie cœliaque, etc.
- Administrer alors la **vitamine D3** par voie intramusculaire.
- *Trouble du métabolisme de la vitamine D*
- Insuffisance rénale chronique (défaut de 1-hydroxylation).
- Traitement par **phénobarbital** ou **phénytoïne**.
- Rachitisme héréditaire pseudo-carentiel.

- *Trouble du métabolisme du phosphore*
- Traitement par hydroxyde d'alumine.
- Hypophosphorémie d'origine génétique ou carentielle.
- *Tubulopathie*

### Prophylaxie

Par **vitamine D2** ou **D3** mère (jamais de dérivés hydroxylés).

#### Chez la femme enceinte

**Vitamine D, ergocalciférol (UVESTÉROL D)** : dose n° 1 (= 1 000 UI) *per os* par jour, pendant le dernier trimestre de grossesse si ce dernier se déroule en hiver.

#### Chez tous les enfants

##### de la naissance à 18 mois

**Vitamine D, ergocalciférol (UVESTÉROL D)** : dose n° 1 (= 1 000 UI) *per os* par jour ; chez les prématurés, les enfants noirs : dose n° 2 (= 1 500 UI) par jour.

#### En cas de doute sur l'observance

**Vitamine D, cholécalciférol (VITAMINE D3 BON)** : 1 amp. buvable à 200 000 UI *per os*, tous les 6 mois, jusqu'à 18 mois (à poursuivre jusqu'à 5 ans pendant le semestre d'hiver).

À consigner impérativement dans le carnet de santé en rouge, pour éviter les surdosages par fortes doses répétées.

**CALCIUM (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Apport calcique.

**INDICATIONS**

Carences calciques en période de croissance, de grossesse et d'allaitement.

Traitement d'appoint des ostéoporoses.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Hypercalcémie, hypercalciuries avec lithiase calcique, calcifications tissulaires (néphrocalcinoses).

Immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie : le traitement calcique ne doit être utilisé qu'à la reprise de la mobilisation.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'insuffisance rénale contrôler régulièrement la calcémie et la calciurie et éviter l'administration de fortes doses.

En cas de traitement de longue durée et/ou d'insuffisance rénale, il est nécessaire de contrôler la calciurie et de réduire ou d'interrompre momentanément le traitement si celle-ci dépasse 7,5 mmol/24 h (300 mg/24 h), chez l'adulte.

En cas de traitement associé à base de **digitaliques**, **tétracyclines**, **vitamine D**, **fluorure de sodium** (cf. Interactions).

En raison de la présence d'aspartam dans certains produits, l'administration devra alors être évitée en cas de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, flatulence, éructations, nausées ; une sensation de bouche sèche a été signalée au moment de la prise des comprimés.

Hypercalciurie, hypercalcémie en cas de traitement prolongé à fortes doses, ou d'association à la **vitamine D**.

Risque d'hypophosphatémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Digitaliques** : l'administration orale de **calcium**, surtout si elle est associée à la **vitamine D**, risquant d'augmenter la toxicité des **digitaliques**, nécessite une stricte surveillance clinique et électrocardiographique.

**Tétracyclines** par voie orale : il est recommandé de décaler d'au moins 3 h la prise de **calcium** (interférence possible de l'absorption des **tétracyclines**).

**Vitamine D** à fortes doses : un contrôle hebdomadaire de la calciurie et de la calcémie est indispensable en raison du risque d'hypercalcémie.

En cas de traitement à base de **fluorure de sodium** ou par **biphosphonates**, il est conseillé de prendre le **calcium** à distance de ces produits (respecter un délai minimal de 2 h avant de prendre du **calcium**).

**Diurétiques thiazidiques** : risque d'hypercalcémie par suite de la réduction de l'élimination urinaire du calcium.

## ANALOGUES DE LA LH-RH (PÉDIATRIE)

## ■ Leuproréline

<b>ENANTONE LP</b>					
Puberté précoce : 1/2 fl. < 20 kg 1 fl. > 20 kg 1 inj. SC ou IM/mois 1 inj. SC ou IM/3 mois	1 fl. 3,75 mg + disp.	137,17	I	65 %	137,17
	1 fl. 11,25 mg + disp.	376,15	I	65 %	376,15

## ■ Triptoréline

<b>DÉCAPEPTYL</b>					
Puberté précoce : 1/2 fl. IM < 20 kg 1 fl. IM > 20 kg	1 fl. 2 mL = 3 mg LP	134,44	I	65 %	134,44

**PROPRIÉTÉS**

Peptides de synthèse, analogues de la LH-RH naturelle. Action initiale de stimulation de la sécrétion des hormones gonadotropes (élévation des taux sanguins de FSH et LH). L'administration continue prolongée entraîne en 2 à 4 sem. une inhibition de cette sécrétion aboutissant à un hypogonadisme. Ce dernier persiste pendant toute la durée du traitement sans phénomène d'échappement, il est réversible en 4 sem. à l'arrêt du traitement.

Après injection IM : phase de libération rapide pendant 1 ou 2 j à partir des microsphères, puis stabilisation de la libération pendant environ 1 mois.

**INDICATIONS**

Puberté précoce.

**CONTRE-INDICATIONS**

Sensibilité particulière à l'alcool benzylique (**leuproréline**).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conservation à moins de 25 °C.

Possibilité de survenue de petites métrorragies dans 30 % des cas ; associer pendant le premier mois de traitement **cyprotérone** 100 mg/j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Petites hémorragies vaginales (30 %).

Possibilité de réaction locale au point d'injection.

La tolérance du traitement dans cette indication est excellente.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Prudence en cas d'association avec des médicaments hyperprolactinémisants.

## CHÉLATEURS DU PLOMB

## ■ EDTA calcique (ou calcium édétate de sodium)

CALCIUM ÉDÉTATE DE SODIUM					
Saturnisme classes IV et V : 1 000 mg/m <sup>2</sup> /j en IV pdt 5 j	10 amp. 500 mg		II	NR	

## PROPRIÉTÉS

Chélateur des métaux lourds (plomb, cuivre, fer, cobalt, métaux radioactifs) éliminé par filtration glomérulaire (72 % en 24 h) sous forme de composé stable avec ces métaux.

## INDICATIONS

Intoxications saturnines.  
Intoxications par les métaux lourds (chrome, fer, cobalt, cuivre, métaux radioactifs, etc.).

## CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance rénale.

## ■ Dimercaprol

BAL					
Saturnisme classe V : 300 mg/m <sup>2</sup> /j en 4 inj. IM pdt 5 j	12 amp. 200 mg		II	NR	

## PROPRIÉTÉS

Chélateur des métaux qui inhibent le système pyruvate oxydase (or, arsenic, mercure, etc.).  
Excrétion urinaire complète en moins de 24 h sous forme de composé stable avec ces métaux.

## INDICATIONS

Intoxications par l'arsenic, le mercure, les sels d'or.  
Traitement adjuvant des saturnismes graves, en association à l'EDTA.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : tératogène à fortes doses chez l'animal (utilisation chez la femme enceinte à discuter selon risque propre de l'intoxication).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : effet tératogène non exclu (utilisation chez la femme enceinte à discuter selon risque propre de l'intoxication).  
Injection IV lente (irritation veineuse).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Perfusion trop rapide : céphalées, vomissements, fièvre.  
Hypotension transitoire.  
Congestion nasale.  
Risque de majoration brutale d'une hypertension intracrânienne en cas d'encéphalopathie saturnine (associer le **dimercaprol** à l'**EDTA**).  
Surdosage : insuffisance rénale aiguë par tubulopathie aiguë.

Ne pas dépasser 50 mg lors de la 1<sup>re</sup> injection (tester la sensibilité individuelle).  
Associer une hyperhydratation.  
Absence d'intérêt en cas d'anurie.  
Toxicité augmentée en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.  
Injection IM stricte.  
Risque d'hémolyse en cas de déficit en G6PD.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Tachycardie, HTA, céphalées, vomissements, sensations de brûlures du visage, hypersialorrhée, rhinorrhée, hypersudation.  
Douleurs au point d'injection.  
Surdosage : HTA, coma, convulsions.

## VACCINS ANTIMÉNINGOCOCCIQUES

### Vaccins polysidiques non conjugués

#### ■ Vaccin antiméningococcique A C

<b>VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE POLYSIDIQUE A + C</b>					
A et E. : 1 inj. unique SC ou IM	1 ser. de 0,5 mL solv. + 1 fl. de lyoph. (dose)			NR	

#### ■ Vaccin antiméningococcique A C Y W-135

<b>MENCEVAX</b>					
A et E. > 2 ans : 1 inj. unique SC	1 fl. pdre + fl. solv.	HOP	I		
<b>MENVÉO</b>					
A et E. > 11 ans : 1 inj. unique IM uniquement	1 fl. pdre + ser.		I	NR	

### Vaccins polysidiques conjugués

#### ■ Vaccin antiméningococcique C

<b>MENINGITEC</b>					
A et E. : 1 inj. unique SC ou IM	1 ser. 0,5 mL solv. + 1 fl. de lyoph. (dose)		I	NR	
<b>MENJUGATEKIT</b>					
A et E. : 1 inj. unique SC ou IM	1 pdre + ser.	23,59	I	65 %	23,59
<b>NEISVAC</b>					
A et E. : 1 inj. unique SC ou IM	1 susp. inj. 0,5 mL	23,59	I	65 %	23,59

#### ■ Vaccin antiméningococcique A C Y W-135

<b>NIMENRIX</b>					
A et E. : 1 inj. unique IM seulement	1 fl. pdr. + 1 ser. de 0,5 mL solv.	HOP	I		

#### PROPRIÉTÉS

Vaccins antigéniques (polysidiques) préparés à partir de méningocoques des sérogroupes correspondants. La conjugaison des antigènes avec une protéine induit une réponse immunitaire thymodépendante. Efficace 10 j après l'injection et persistant pendant 4 ans en moyenne.

#### INDICATIONS

Prévention du risque de méningite à méningocoques des sérogroupes correspondants dans les zones d'hyperendémie ou en cas d'épidémie. Obligatoire pour le pèlerinage à La Mecque.

#### CONTRE-INDICATIONS

Infection sévère aiguë, maladie fébrile sévère aiguë : différer l'injection.

**NIMENRIX** : nourisson < 1 an.

**Vaccins polysidiques non conjugués** : nourisson < 2 ans.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation entre + 2 et + 8 °C.

Ne pas vacciner avant 18 mois (6 mois en cas de contact avec un méningocoque du groupe A).

Inefficace contre les autres germes responsables de méningite en particulier contre le méningocoque B.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Rougeur au point d'injection, fièvre.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Compatible avec la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite (injectable), la typhoïde.

## LAITS ARTIFICIELS (1)

LAITS	BLÉDINA	GALLIA	GUIGOZ	MEAD JOHNSON
Laits pour nourrisson (0-4 mois)	Blédilait 1 Blédilait Relais 1	Gallia 1 Gallia Calisma 1	Guigoz 1 Guigoz Evolia Relais 1 Guigoz Expert 1	Enfamil 1 Enfamil Nutribaby 1
Laits de suite (5-12 mois)	Blédilait 2 Blédilait Relais 2	Gallia 2 Gallia Calisma 2	Guigoz 2 Guigoz Evolia Relais 2 Guigoz Expert 2	Enfamil 2 Enfamil Nutribaby 2
Laits HA (atopie familiale)	Blédilait HA	Gallia HA 1 et 2	Guigoz Expert HA 1 et 2	Enfamil HA
Laits très épaissis (RGO)		Gallia AR 1 et 2	Guigoz Expert AR Guigoz Confort 1 et 2	Enfamil AR 1 et 2
Laits enrichis en ferments lactiques (coliques, constip.)		Gallia Lactobifidus 1 et 2 Gallia Action-coliques	Guigoz bAa 1 et 2 Guigoz Expert AC Guigoz Transit 1 et 2	Enfalac
Laits épaissis et riches en ferments lactiques	Blédilait Premium 1 et 2	Galliagest Premium 1 et 2	Guigoz Formule épaissie 1 et 2	
Laits sans ou appauvris en lactose (intolérance lactose/diarrhée 3-12 mois)		Diargal	Diarigoz (HA + appauvri en lactose), utilisable entre 1 et 3 mois	O-lac
Laits sans PLV et sans lactose (IPLV/diarrhée < 3 mois/ mucoviscidose)		Galliagène Progress		Pregestimil Nutramigen
Laits pour nv-né faible poids (jusqu'à 3 kg)	PréBlédilait	PréGallia	PréGuigoz Expert AGPI-CL	
Lait de soja (intolérance au lactose/coliques-douleurs)		Gallia Soja	Guigoz Soja 1 et 2	Prosobee soja 1 et 2
Lait de croissance (1-3 ans)	Blédilait Croissance	Gallia Croissance Galliagest Croissance Gallia Junior	Guigoz Croissance	

## LAITS ARTIFICIELS (2)

LAITS*	MILUPA	NESTLÉ	NUTRICIA	SODILAC
Laits pour nourrisson (0-4 mois)	Aptamil 1 Milumel 1	Nidal 1 bifidus	Nutricia 1	Modilac 1 SMA Classic 1
Laits de suite (5-12 mois)	Aptamil 2 Milumel 2	Nidal 2 bifidus Nestlé Baby	Nutricia 2	Modilac 2 SMA Classic 2
Laits HA (atopie familiale)	Milumel HA	Nidal HA 1 et 2	Nutricia HA	Modilac HA
Laits épaissis (RGO)	Milumel AR 1 et 2	Nidal AR 1 et 2	Nutricia AR 1 et 2 Nutrilon AR 1 et 2	Modilac confort 1
Laits enrichis en ferments lactiques (coliques, constip.)		Pergalon 1 et 2		Modilac transit
Laits épaissis et riches en ferments lactiques		Nidal confort bifidus 1 et 2	Nutricia confort 1 et 2	
Laits sans ou appauvris en lactose (intolérance lactose/diarrhée 3-10 mois)	HN 25 (appauvri) à HN RL (sans)	AL-110		Modilac sans lactose
Laits sans PLV et sans lactose (IPLV/diarrhée avant l'âge de 3 mois/ mucoviscidose)	Prégomine LactoPrégomine	Alfaré	Peptijunior	
Laits pour prématurés (jusqu'à 3 kg)	PréAptamil	PréNidal AGPI-CL		PréModilac PréModilac AGPI-CL
Laits de soja (intolérance lactose/coliques-douleurs)			Nutricia soja 1 et 2	Modilac soja 1 et 2
Laits de croissance (1-3 ans)	Milupa croissance	Nestlé croissance	Nutricia Croissance	

\* Laits de régime disponibles à la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) pour les enfants présentant des allergies aux hydrolysats de protéines de lait de vache et/ou polyallergies alimentaires (NEO-CATE) et pour ceux présentant une maladie métabolique nécessitant l'éviction de certains acides aminés (laboratoire SHS International).

HA : hypoallergénique ; AR : antirégurgitation ; PLV : protéine de lait de vache.

## PSYCHOSTIMULANT

## ■ Méthylphénidate

<b>RITALINE</b>					
Syndrome hyperkinétique : 0,3 à 0,5 mg/kg/j (max. 1 mg/kg/j) en 2 prises à distance des repas : posologie à atteindre progressivement	30 cp. 10 mg	6,76	S	65 %	0,23
	28 gél. LP 10 mg	17,46	S	65 %	0,62
	28 gél. LP 20 mg	25,87	S	65 %	0,92
	28 gél. LP 30 mg	32,66	S	65 %	1,17
	28 gél. LP 40 mg	40,77	S	65 %	1,46
<b>CONCERTA LP</b>					
Syndrome hyperkinétique : 1 prise/j le matin Dose initiale de 18 mg puis augmentation par paliers toutes les sem. Poso. max. : 54 mg/j	28 cp. 18 mg	37,20	S	65 %	1,33
	28 cp. 36 mg	49,07	S	65 %	1,75
	28 cp. 54 mg	56,70	S	65 %	2,03

## PROPRIÉTÉS

Stimulant du système nerveux central ; augmente la concentration des monoamines dans les fentes synaptiques. Absorption rapide, à peu près complète ; biodisponibilité de 30 % (1<sup>er</sup> passage hépatique) ; demi-vie d'élimination 2 h ; excrétion à 90 % dans les urines sous forme de métabolites.

## INDICATIONS

Syndrome hyperkinétique non amélioré par l'abord psychothérapique.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au **méthylphénidate**.  
Manifestations d'anxiété ou psychotiques.  
Hyperthyroïdie.  
Affections cardiovasculaires sévères.  
Glaucome.  
Antécédents personnels ou familiaux de tics moteurs, maladie de Gilles de la Tourette.  
Âge < 6 ans.  
Fille en âge de procréer.  
Traitement par **IMAO** non sélectifs.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prescription réservée aux neurologues, psychiatres, pédiatres ; règle des 28 j ; renouvellement non restreint ; prescription hospitalière initiale et annuelle.  
Prudence en cas d'épilepsie.  
Surveiller la tension artérielle.  
Respecter des périodes d'arrêt du traitement (pendant les vacances).  
Risque de dépendance psychique.

Positivité des contrôles antidopage.  
Éviter l'absorption d'alcool.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nervosité, insomnies (diminuer les doses, donner le matin).  
Diminution passagère de l'appétit.  
Plus rarement : céphalées, somnolence, vertiges, dyskinésies, troubles de l'accommodation, exacerbation de tics.  
Douleurs abdominales, nausées, vomissements, sécheresse buccale.  
Possibilité de ralentissement de la croissance sans retentissement sur la taille finale.  
Augmentation des transaminases, rarement hépatite sévère.  
Occasionnellement : palpitations, tachycardie, HTA.  
Hypersensibilité (éruption, prurit, arthralgies, etc.).  
Risque carcinogène chez l'animal, non constaté chez l'homme.  
Potentiel tératogène non exclu.  
Surdosage : vomissements, tremblements, hyperréflexie, convulsions, agitation, confusion, hallucinations, céphalées, HTA, tachycardie, réactions vasomotrices, mydriase. Traitement symptomatique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**IMAO** non sélectifs contre-indiqués.  
Déconseillés : **vasopresseurs**, alcool, **guanéthidine**.  
Diminuer la posologie d'**anticonvulsivants**, de **phénylbutazone**, de **tricycliques**.  
Arrêter le traitement avant une anesthésie par **halogénés**.



## VACCINATION (1)

## ■ Vaccin antipneumococcique polyvalent

<b>PREVENAR 13</b>					
Prévention des infections à pneumocoques : E. 2-6 mois : 3 inj. à 1 mois d'intervalle et 4 <sup>e</sup> dose entre 12 et 15 mois E. non vaccinés 7-11 mois : 2 inj. à 1 mois d'intervalle et 3 <sup>e</sup> dose à 2 ans E. non vaccinés 12 mois - 5 ans : 2 inj. à 2 mois d'intervalle	1 susp. inj. 1 fl. 0,5 mL + 1 ser. + 2 aig.	57,34	I	65 %	57,34

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin polysidique conjugué préparé à partir d'antigènes purifiés de 13 sérotypes de pneumocoques.

**INDICATIONS**

Prévention des infections à *Streptococcus pneumoniae* (septicémie, méningite, pneumonie, bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F chez les nourrissons et les jeunes enfants de 2 mois à 2 ans et chez les enfants non vaccinés de 2 à 5 ans.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au vaccin pneumococcique.  
Hypersensibilité à l'anatoxine diphtérique.  
Maladie fébrile aiguë.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver entre + 2 °C et + 8 °C.  
Risque de réaction anaphylactique après administration du vaccin.

Injection intramusculaire contre-indiquée si thrombopénie ou trouble de la coagulation. L'utilisation du **PREVENAR** ne se substitue pas à celle des vaccins polysaccharidiques 23-valents chez les enfants de plus de 24 mois avec un risque élevé d'infections à *Streptococcus pneumoniae* (immunodépression, drépanocytose).

Traitement antipyrétique prophylactique recommandé.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réactions locales fréquentes : rougeur, douleur, induration au point d'injection (disparaît en 24-48 h).

Fièvre, convulsions fébriles.

Rash, urticaire, érythème polymorphe.

Réaction d'hypersensibilité, œdème facial, œdème de Quincke, dyspnée, bronchospasme, choc anaphylactique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le vaccin peut être effectué (à des sites d'injection différents) en même temps que d'autres vaccins pédiatriques.

## VACCINATIONS (3)

### Contre-indications et tolérance

Il faut éviter d'effectuer tout vaccin en période d'infection et le décaler quelques semaines après.

Une réaction anaphylactique à un vaccin contre-indique la poursuite de ce dernier.

- **Diphtérie** : aucune contre-indication, réaction locale fréquente.

- **Tétanos** : aucune contre-indication, tolérance excellente.

- **Poliomyélite** : aucune contre-indication, tolérance excellente pour le vaccin polio injectable.

Le vaccin buvable n'est plus utilisé en France (exceptionnel risque de paralysie liée au virus vaccinal).

- **Coqueluche** : contre-indiqué en cas d'encéphalopathie évolutive, de convulsions, de réaction majeure lors d'une injection précédente (fièvre > 40 °C, choc, convulsion).

Réactions locales fréquentes, parfois générales (fièvre 24 h après l'injection, choc, convulsion fébrile).

- **Haemophilus** : aucune contre-indication, tolérance excellente.

- **BCG** : contre-indiqué si déficit de l'immunité cellulaire congénital ou acquis. Tolérance : assez fréquentes BCGites localisées ou rarement adénites satellites.

- **Rougeole** : contre-indications = déficit immunitaire du sujet ou de son entourage, grossesse, **immunoglobulines** 3 mois avant l'injection, allergie à la **néomycine**. Possibilité de réaction (fièvre, éruption) 5 à 12 j après l'injection.

- **Rubéole** : contre-indications identiques à celles de la rougeole.

Possibilité d'arthralgies 15 j après l'injection.

- **Oreillons** : contre-indications identiques à celles de la rougeole.

Possibilité de parotidite, rarement de méningite lymphocytaire 10 à 20 j après l'injection.

- **Hépatite B** : contre-indications = rapport bénéfice/risque à évaluer en cas de sclérose en plaques.

Possibilité de réaction locale, rarement générale (fièvre, arthralgies, éruption, vomissements, augmentation des transaminases) ; exceptionnellement, poussée de neuropathie inflammatoire, sans qu'aucun lien certain de causalité n'ait pu être établi. Aucun cas de sclérose en plaques n'a été décrit avant l'âge de 5 ans.

- Contre-indication :

- définitive : vaccins vivants et déficits immunitaires congénitaux ou acquis ;

- temporaire : vaccins vivants et chimiothérapie, pathologie maligne, grossesse, poussée d'atopie, vaccins tués ou antitoxines et corticothérapie.

### Nouveaux vaccins

Ces dernières années, plusieurs vaccins ont obtenu une AMM en France ; mais, en l'absence de recommandation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF), ils ne sont pas remboursés, et donc peu utilisés ; contrairement aux États-Unis et à d'autres pays européens où ils sont réalisés systématiquement :

- vaccin contre la varicelle : **VARILRIX** ou **VARIVAX** ;

- vaccin contre le rotavirus : **ROTATEQ** ou **ROTARIX** ;

Le vaccin contre la varicelle n'est pas recommandé car un taux de couverture vaccinale trop faible, comme celui de la vaccination ROR entraînerait un décalage de la maladie vers l'âge adulte et donc une augmentation du nombre de complications. Même si les sociétés pédiatriques françaises et européennes se sont prononcées en faveur de la vaccination généralisée contre le *Rotavirus*, les autorités françaises ne l'ont toujours pas recommandée [2].

### CONSENSUS

[2] Avis du CSHPF relatif à la vaccination antirotavirus chez les nourrissons de moins de 6 mois, CSHPF, 2006

## VACCINATION (2)

## ■ Vaccin antirotavirus

<b>ROTARIX</b>					
Prévention des gastro-entérites aiguës à <i>Rotavirus</i> Schéma vaccinal en 2 doses orales : 1 <sup>re</sup> dose à partir de 6 sem., 2 <sup>e</sup> dose 4 sem. plus tard Début vaccination avant 16 sem., fin du schéma avant 24 sem.	1 dose 5 mL susp. buv. (appl. prérépl.)		I	NR	
<b>ROTATEQ</b>					
Prévention des gastro-entérites à <i>Rotavirus</i> Schéma en 3 doses orales : 1 <sup>re</sup> dose à partir de 6 sem., au plus tard à 12 sem. Intervalle entre les doses : 4 sem. Fin du schéma avant 26 sem.	1 tube unidosé 2 mL (sol. buv.)		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin vivant atténué oral (*Rotavirus* humain souche RIX 4414 pour le **ROTARIX** et sérotypes *Rotavirus* G1, G2, G3, G4, P1 pour le **ROTATEQ**).

**INDICATIONS**

Prévention des gastro-entérites aiguës à *Rotavirus* chez les nourrissons à partir de 6 sem.  
La vaccination systématique n'était pas recommandée 2010. Depuis cette date (et à la date de publication de cet ouvrage), aucune nouvelle recommandation officielle n'a été publiée [2].

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **vaccin antirotavirus**.  
Antécédent d'invagination intestinale aiguë ou maladie congénitale intestinale exposant à cette pathologie.

Immunodépression, infection asymptomatique par le VIH.  
Maladie fébrile aiguë.  
Vomissement, diarrhée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Injection intraveineuse contre-indiquée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Infections respiratoires supérieures.  
Fièvre, asthénie.  
Irritabilité, somnolence.  
Nausées, diarrhée, douleurs abdominales, régurgitations.  
Dermatite, éruption cutanée.interactions médicamenteuses.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le vaccin peut être administré en même temps que d'autres vaccins pédiatriques.

**ASTHME (1) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (1)****Recommandations GINA (*Global Initiative for Asthma Revised*) 2011 [1]**

Les recommandations GINA antérieures ont individualisé quatre niveaux de sévérité de l'asthme (intermittent, persistant léger, persistant modéré et persistant sévère) en fonction de l'importance des symptômes diurnes et nocturnes, la fonction respiratoire, et la consommation de **β2-mimétiques de courte durée d'action** (CDA).

Cette classification (*cf.* Encadré) était adaptée pour l'évaluation initiale d'un malade asthmatique non traité mais n'intégrait pas la réponse aux traitements. La classification de la sévérité ne permettait donc pas de guider le prescripteur dans l'adaptation du schéma thérapeutique. Elle reste utile pour l'évaluation initiale de la sévérité et la caractérisation des sujets asthmatiques dans le cadre d'essais thérapeutiques.

**Classification clinique de la sévérité de l'asthme avant traitement [1]****Asthme intermittent**

- Symptômes < 1 fois/sem.
- Exacerbations de courte durée
- Symptômes nocturnes < 2 fois/mois
- VEMS ou DEP ≥ 80 % de la théorique
- Variabilité du VEMS ou du DEP < 20 %

**Asthme persistant léger**

- Symptômes > 1 fois/sem. mais < 1 fois/jour
- Exacerbations pouvant avoir un retentissement sur l'activité et le sommeil
- Symptômes nocturnes > 2 fois/mois
- VEMS ou DEP ≥ 80 % de la théorique
- Variabilité du VEMS ou du DEP entre 20 et 30 %

**Asthme persistant modéré**

- Symptômes quotidiens
- Exacerbations pouvant avoir un retentissement sur l'activité et le sommeil
- Symptômes nocturnes > 1 fois/sem.
- Utilisation quotidienne de **β2-mimétique de courte durée d'action**
- VEMS ou DEP entre 60 et 80 % de la théorique
- Variabilité du VEMS ou du DEP > 30 %

**Asthme persistant sévère**

- Symptômes quotidiens
- Exacerbations fréquentes
- Symptômes nocturnes fréquents
- Limitation de l'activité physique
- VEMS ou DEP < 60 % de la théorique
- Variabilité du VEMS ou du DEP > 30 %

Pour répondre à un besoin d'outil simple permettant de guider le prescripteur dans l'adaptation du schéma thérapeutique

d'un patient asthmatique traité, une évaluation du contrôle de l'asthme a été proposée (Tableau ci-après).

**Objectif du traitement = contrôle de l'asthme**

Le contrôle de l'asthme est évalué sur une semaine et permet de définir 3 groupes :

- contrôle satisfaisant ;
- contrôle insuffisant ;
- non contrôlé.

## CORTICOÏDES INHALÉS (1)

## ■ Béclométasone

<b>MIFLASONE</b>					
Pdre pour inhalation buccale	60 gél. pdre 100 µg	3,14	I	65 %	0,05
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal.	60 gél. pdre 200 µg	5,73	I	65 %	0,10
x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	60 gél. pdre 400 µg	12,06	I	65 %	0,20
<b>ECOBEC</b>					
Inhalation buccale	200 doses 250 µg	20,86	I	65 %	0,10
Traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant					
Formes légères à modérées :					
A. 1-2 inhal x 2/j					
E. 1 inhal. x 1-2/j					
Formes sévères :					
A. 4 inhal. x 2/j					
E. 2 inhal. x 2/j					
<b>BÉCOTIDE</b>					
Idem <b>ECOBEC</b>	200 doses 250 µg	21,05	I	65 %	0,11
<b>QVAR AUTOHALER</b>					
Flacon pressurisé pour inhalation buccale	200 doses 100 µg	31,27	I	65 %	0,16
Formes légères à modérées					
A. et E. (à partir de 4 ans) : 1-2 inhal. x2/j					
Formes sévères					
A. et E. (à partir de 4 ans) : 4 inhal. x2/j					
<b>QVARSPRAY</b>					
Idem <b>QVAR AUTOHALER</b>	100 doses 100 µg	11,71	I	65 %	0,12

## ASTHME (2) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (2)

### Évaluation du contrôle de l'asthme sur 4 sem. [1]

	Contrôle total (tous les critères suivants)	Contrôle partiel (> 1 critère)	Non contrôlé
Symptômes diurnes	Aucun (≤ 2/sem.)	> 2/sem.	3 critères ou plus du contrôle partiel lors d'une même sem.
Limitation des activités	Aucune	Présence	
Symptômes nocturnes/réveils	Aucun	Présence	
Utilisation de <b>β2- mimétiques de courte durée d'action</b>	Aucun (≤ 2/sem.)	> 2/sem.	
Fonction respiratoire (VEMS ou DEP)	Normale	< 80 % de la théorique ou de la meilleure valeur	
Évaluation du risque futur	Mauvais suivi, fréquence des exacerbations de l'année passée, admission en réanimation, faible VEMS, tabagisme, doses des médicaments		

#### Prise en charge [1]

Les médicaments de l'asthme sont de deux types : les traitements de fond et les traitements bronchodilatateurs d'action rapide.

- Les traitements de fond sont pris quotidiennement et au long cours afin d'obtenir le contrôle de l'asthme principalement grâce à leurs effets anti-inflammatoires.
- Les traitements bronchodilatateurs d'action rapide sont utilisés à la demande afin de soulager rapidement les symptômes en

entraînant une réversibilité de la bronchoconstriction.

La voie inhalée doit toujours être préférée aux autres voies d'administration dans l'asthme, du fait de sa plus grande efficacité et innocuité.

Doivent toujours être recherchés et traités : rhinite saisonnière ou non (présente dans près de 80 % des cas d'asthme) et reflux gastro-œsophagien. Leur traitement est nécessaire pour obtenir un bon contrôle de l'asthme.

## CORTICOÏDES INHALÉS (2)

## ■ Budésonide

<b>PULMICORT TURBUHALER</b>					
Inhalateur/pdre	200 bouf. 100 µg	18,41	I	65 %	0,09
Asthme, traitement de fond : 1 inhal./j à 4 inhal. à 200 µg x 2/j ou 1 à 3 inhal. à 400 µg x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	200 bouf. 200 µg	31,22	I	65 %	0,16
	100 bouf. 400 µg	31,22	I	65 %	0,31
<b>NOVOPULMON NOVOLIZER</b>					
Aérosol-doseur	200 doses 200 µg	22,02	I	65 %	0,11
Asthme, traitement de fond : 1 bouf./j à 4 bouf. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	200 doses 200 µg + inhalateur	27,98	I	65 %	0,14
	100 doses 400 µg	22,02	I	65 %	0,22
	100 doses 400 µg + inhalateur	27,65	I	65 %	0,28
	200 doses 400 µg + inhalateur	43,76	I	65 %	0,22
<b>MIFLONIL</b>					
Inhalateur/pdre	60 gél. pdre 200 µg	8,59	I	65 %	0,14
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 bouf./j	60 gél. pdre 400 µg	16,65	I	65 %	0,28
<b>PULMICORT</b>					
Traitement continu de l'asthme persistant de l'enfant 0,5 à 2 mg/j en 2 aérosols	20 bouf. susp. p. inhal. 0,5 mg/2 mL	26,98	I	65 %	1,35
	20 bouf. susp. p. inhal. 1 mg/2 mL	37,26	I	65 %	1,86

## ■ Fluticasone

<b>FLIXOTIDE</b>					
Aérosol-doseur	120 bouf. 50 µg	9,64	I	65 %	0,08
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 bouf. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	120 bouf. 125 µg	17,95	I	65 %	0,15
	120 bouf. 250 µg	34,23	I	65 %	0,29
<b>FLIXOTIDE DISKUS</b>					
Inhalateur/pdre	60 doses 100 µg	9,64	I	65 %	0,16
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)					
Inhalateur/pdre	60 doses 250 µg	17,95	I	65 %	0,30
Asthme sévère : 1 à 2 inhal. x 2/j	60 doses 500 µg	34,23	I	65 %	0,57

## ■ Ciclesonide

<b>ALVESCO</b>					
Fl. pressurisé pour inhalation buccale	60 doses 80 µg	17,62	I	65 %	0,29
Asthme persistant, traitement de fond A. et E. > 12 ans : 1 dose de 80 ou 160 µg x 1/j le matin ou le soir	60 doses 160 µg	29,82	I	65 %	0,50

## ■ Mométasone

<b>ASMANEX TWISTHALER</b>					
A. et E. > 12 ans, posologie initiale : 200 µg x 2/j ou 400 µg x 1/j	30 doses 200 µg	9,69	I	65 %	0,32
	60 doses 200 µg	18,84	I	65 %	0,31
	30 doses 400 µg	18,84	I	65 %	0,63
	60 doses 400 µg	36,47	I	65 %	0,61

## ASTHME (3) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (3)

### Traitement de fond [1]

#### ► Corticothérapie inhalée

La corticothérapie inhalée, par son effet anti-inflammatoire, est le traitement de

fond actuel le plus efficace dans le contrôle de l'asthme persistant.

Les équivalences de dose estimées de **corticoïdes inhalés** sont résumées dans le Tableau ci-dessous [1].

### Équivalences des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés chez l'adulte\* [1]

Molécule	Faible dose (µg)	Dose moyenne (µg)	Forte dose (µg)
<b>Béclométasone dipropionate</b>	200-500	> 500-1 000	> 1 000-2 000
<b>Budésonide</b>	200-400	> 400-800	> 800-1 600
<b>Cicléronide</b>	80-160	> 160-320	> 320-1 280
<b>Flunisolide</b>	500-1 000	> 1 000-2 000	> 2 000
<b>Fluticasone</b>	100-250	> 250-500	> 500-1 000
<b>Mométasone furoate</b>	200-400	> 400-800	> 800-1 200
<b>Triamcinolone acétonide</b>	400-1 000	> 1 000-2 000	> 2 000

La plupart du bénéfice de la corticothérapie inhalée est obtenue pour de faibles doses, équivalente à 400 µg de **budésonide** par jour.

En cas de contrôle insuffisant de l'asthme avec des corticostéroïdes inhalés seuls, il est préférable d'y associer une autre classe thérapeutique plutôt que d'augmenter la corticothérapie inhalée.

#### ► β<sub>2</sub>-mimétiques de longue durée d'action

Les **β<sub>2</sub> de longue durée d'action (LDA)** : **formotérol** ou **salmétérol**, ne doivent pas être utilisés en monothérapie dans le traitement de fond de l'asthme.

Par rapport à la corticothérapie inhalée seule, l'**association de β<sub>2</sub> de LDA à la corticothérapie inhalée** améliore les scores de symptômes, la fonction respiratoire, et réduit le recours aux **β<sub>2</sub> de CDA**, le

nombre d'exacerbations et la dose de corticothérapie nécessaire au contrôle de l'asthme.

La plus grande efficacité de l'**association de la corticothérapie inhalée et des β<sub>2</sub> de LDA** a entraîné le développement de traitements combinés : **formotérol + budésonide (SYMBICORT)** ou **salmétérol + fluticasone (SERETIDE)**.

Le **formotérol** est un **β<sub>2</sub> de LDA** qui possède une action rapide lui permettant d'être utilisé en cas de crise en remplacement des **β<sub>2</sub> de CDA**. L'association **formotérol et budésonide SYMBICORT 200** peut être utilisée en traitement de fond et de crise. Cette nouvelle stratégie a montré qu'elle permettait de réduire le nombre d'exacerbations et qu'elle améliorait le contrôle de l'asthme pour des doses relativement faibles de traitement.

\* Les comparaisons sont fondées sur les données d'efficacité des différents corticoïdes.



**CORTICOÏDES INHALÉS (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Corticoïdes** associant une action locale puissante (sur l'inflammation bronchique) à une très faible activité systémique (métabolisation hépatique en dérivés inactifs) pour des doses  $< 2\ 000\ \mu\text{g/j}$ .

**INDICATIONS**

Traitement de fond de l'asthme.  
Toux spasmodique, BPCO spastique.

**MISES EN GARDE**

Prudence et surveillance rapprochée en cas de tuberculose ou infection mycotique pulmonaire évolutive, ou ulcère digestif non traité.

**Grossesse** 1<sup>er</sup> trimestre et **allaitement** : n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Éducation** : vérifier l'utilisation correcte du système d'inhalation; éventuellement, s'aider d'une chambre d'inhalation pour les sprays. Prévenir le patient que ce n'est pas un traitement de la crise d'asthme ! L'effet des **corticoïdes inhalés** nécessite un délai de quelques jours et est maximal après quelques mois.  
Prévention des candidoses : rincer la bouche, gargariser, puis avaler un verre d'eau après chaque prise. Préférer 2 prises/j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Uniquement locaux, réversibles à l'arrêt : irritation pharyngée, raucité de la voix, candidose oropharyngée (5 à 10 %; prévenue par des mesures d'hygiène buccale simples).  
Rare : réaction paradoxale (toux, bronchospasme) liée aux excipients (gaz propulseur).

**Mode d'emploi des aérosols-doseurs**

- Retirer le capuchon, agiter l'aérosol-doseur.
- Puis inspirer lentement (4 s) et profondément en déclenchant la pulvérisation (au début de l'inspiration).
- Retenir la respiration pendant 5 à 10 s (poumons « remplis »), puis reprendre sa respiration normale.
- Attendre 30 à 60 s avant la bouffée suivante.

50 % des patients ne savent pas les utiliser.

Il y a 3 possibilités qui suppriment le problème de la coordination « mains-poumons », mais qui doivent être expliquées au patient :

- aérosol-doseur à autodéclenchement, type *Autohaler* (nécessité d'un débit inspiratoire minimal) ;
- système d'inhalation de poudre, type *Turbuhaler*, *Diskus* ou *Clickhaler* ;
- utilisation du spray avec une chambre d'inhalation, type *Nebuhaler*, *Aérosopic*, *Volumatic*, *Aérochambre*. Dans ce cas, la bouffée est pulvérisée dedans, et l'inspiration profonde doit être faite dans les 5 s suivant le déclenchement.

**ASTHME (4) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (4)****► Théophylline**

La **théophylline** peut améliorer le contrôle des sujets non contrôlés par une corticothérapie inhalée seule. Cependant, son efficacité est inférieure à celle des  **$\beta 2$  de LDA**.

Les limitations principales à l'utilisation de la **théophylline** sont liées à sa marge thérapeutique étroite et à la fréquence de ses effets secondaires.

**► Antileucotriènes**

Les **antileucotriènes** (**montélukast**, **SINGULAIR**) sont moins efficaces que la corticothérapie inhalée sur le contrôle de l'asthme. En association avec la corticothérapie inhalée, ils sont moins efficaces que les  **$\beta 2$  de LDA**.

Les **antileucotriènes** sont très bien tolérés et les effets secondaires sont limités.

**► Anti-IgE**

Les **anti-IgE** (**omalizumab**, **XOLAIR**) sont indiqués chez les patients présentant un asthme allergique persistant sévère avec élévation des IgE totales (entre 30 et 700 UI/mL) en cas de contrôle insuffisant de l'asthme malgré une corticothérapie inhalée à forte dose associée à un  **$\beta 2$  de LDA**.

**► Corticothérapie systémique**

La **corticothérapie orale** au long cours est parfois nécessaire chez des patients présentant un asthme sévère non contrôlé. Mais leur utilisation est limitée par le risque élevé d'effets secondaires systé-

miques (ostéoporose, hypertension artérielle, diabète, insuffisance surrénale, obésité, cataracte, glaucome, fragilité cutanée et myopathie cortisonique).

**Traitement de la crise d'asthme**

(patient à éduquer pour la conduite à tenir)

Les  **$\beta 2$  de courte durée d'action** sont le traitement de choix pour soulager les symptômes d'asthme et pour prévenir l'asthme induit par l'exercice.

**• En cas de gêne respiratoire :**

– prendre son spray de **salbutamol (VENTOLINE 100  $\mu$ g)** : 2 bouffées à 1 min d'intervalle.

– à renouveler si besoin à 15 min, et à 30 min.

**• Si non amélioré après ces 6 bouffées : contacter en urgence un médecin :**

– recherche de signes de gravité (cf. Asthme aigu grave) ;

– injection sous-cutanée de **terbutaline (BRICANYL injectable)** : 1 amp. (0,5 mg), et/ou **salbutamol (VENTOLINE)**, 6 bouffées dans une chambre d'inhalation, et **prednisolone (SOLUPRED)** : 60 mg.

• Si évolution favorable et pas de signe de gravité initiale : cure courte de corticoïdes oraux, **prednisolone (SOLUPRED)** : 0,5 à 1 mg/kg/j pendant 3 à 10 j (arrêt brutal en fin de traitement).

• Sinon (cf. Asthme aigu grave). Appeler le Samu pour transfert dans un service d'urgences ou de soins intensifs.

## ASSOCIATIONS DE CORTICOÏDES INHALÉS ET DE $\beta_2$ DE LONGUE DURÉE D'ACTION

### ■ Budésonide + formotérol

<b>SYMBICORT TURBUHALER</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal. x 2/j (en fonction du palier de sévérité)	120 doses : 100 µg budésonide + 6 µg formotérol	39,48	I	65 %	0,33
	120 doses : 200 µg budésonide + 6 µg formotérol	45,33	I	65 %	0,38
	60 doses : 400 µg budésonide + 12 µg formotérol	44,50	I	65 %	0,74
<b>INNOVAIR</b>					
Idem <b>SYMBICORT TURBUHALER</b>	120 doses : 100 µg budésonide+ 6 µg formotérol	41,08	I	65 %	0,34
<b>FORMODUAL</b>					
Asthme persistant, traitement de fond, en seconde intention A. 1 à 2 inhal. x 2/j	120 doses : 100 µg budésonide + 6 µg formotérol	41,08	I	65 %	0,34

### ■ Salmétérol + fluticasone

<b>SERETIDE DISKUS</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 à 2 inhal. x 2/j (en fonction du palier de sévérité)	60 doses : 100 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	37,85	I	65 %	0,63
	60 doses : 250 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	43,70	I	65 %	0,73
	60 doses : 500 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	58,24	I	65 %	0,97

Pour la pharmacologie de ces associations, se référer aux pharmacologies respectives des **corticoïdes inhalés** et des **bronchodilatateurs de longue durée d'action**.

## ASTHME (5) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (5)

### Prise en charge pratique [1]

L'adaptation du traitement dépend du contrôle de l'asthme évalué par 6 items (cf. Tableau supra) permettant de déterminer 3 situations : contrôle satisfaisant, contrôle insuffisant et asthme non contrôlé.

Les recommandations GINA 2011 proposent un choix thérapeutique présenté dans le tableau ci-dessous.

### ► Initiation du traitement

Il est nécessaire d'évaluer la sévérité de l'asthme selon la classification (cf. Encadré « Classification clinique de la sévérité de l'asthme avant traitement ») :

- asthme intermittent = palier 1 ;
- asthme persistant léger ou modéré = palier 2 ;
- asthme persistant sévère = palier 3.

### Proposition de prise en charge de l'asthme (GINA 2011) [1]

Palier 1	Palier 2	Palier 3	Palier 4	Palier 5
Éducation et contrôle de l'environnement et des facteurs de risque (tabac ++)				
Traitement de la crise : <b>B2-mimétiques de courte durée d'action</b>				
	Options de traitement de fond :			
	Sélectionner un traitement	Sélectionner un traitement	Ajouter un ou plusieurs traitements	Ajouter un ou plusieurs traitements
Traitement recommandé	<b>CSI*</b> faible dose	<b>CSI</b> faible dose + <b>B2 LDA</b>	<b>CSI</b> dose moyenne ou élevée + <b>B2 LDA</b>	<b>Corticostéroïdes per os</b> <b>Anti-IgE</b>
Alternative thérapeutique	<b>Antileucotriènes</b>	<b>CSI</b> moyenne ou forte dose ou <b>CSI</b> faible dose + <b>antileucotriènes</b> ou <b>CSI</b> faible dose + <b>théophylline</b>	<b>Antileucotriènes</b> ou <b>théophylline</b>	

**CSI : budésonide (PULMICORT TURBUHALER)**  
1 bouffée x 2 /j ou fluticasone (FLIXOTIDE)  
1 bouffée x 2 /j.

Association **CSI + β2 LDA : budésonide + formotérol (SYMBICORT TURBUHALER)**  
1 bouffée x 2 /j, ou fluticasone + salmétérol (SERETIDE DISKUS) 1 bouffée x 2 /j.

**Antileucotriènes : montélukast (SINGULAIR)**  
1 cp. de 10 mg/j.

### ► Adaptation du traitement de fond en fonction du contrôle de l'asthme [1]

L'adaptation du traitement dépend du contrôle de l'asthme et du traitement en cours (cf. Tableau supra).

#### • Contrôle satisfaisant :

- Maintien du traitement.
- Si l'asthme est parfaitement contrôlé pendant une période d'au moins 3 mois, il faut

essayer de diminuer le traitement de fond afin de rechercher le traitement minimum permettant de maintenir un contrôle parfait.

#### • Contrôle insuffisant :

Il est possible :

- soit de majorer le traitement de fond d'un palier ;
- soit de le maintenir au même niveau en fonction de l'efficacité attendue des autres options thérapeutiques, du rapport bénéfice/risque et du retentissement du contrôle partiel sur la qualité de vie du patient.

#### • Asthme non contrôlé :

Si l'asthme n'est pas contrôlé, le traitement doit être augmenté d'un palier jusqu'à ce que le contrôle soit obtenu.

\* Corticostéroïdes inhalés

## ANTILEUCOTRIÈNE

## ■ Montélukast

<b>SINGULAIR</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 cp./j (A. : 10 mg ; E. 6-14 ans : 5 mg) au coucher	28 cp. à croquer 5 mg	27,87	I	65 %	1,00
	50 cp. à croquer 5 mg	HOP	I		
	28 cp. 10 mg	27,87	I	65 %	1,00
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	28 sach. glé. 4 mg	27,87	I	65 %	1,00

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste des récepteurs des leucotriènes (substances pro-inflammatoires bronchoconstrictrices); inhibition de la bronchoconstriction induite par l'effort. L'effet bronchodilatateur est observé 2 h après la prise orale.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de l'asthme léger à modéré, *en adjonction* aux **corticoïdes inhalés** lorsque ceux-ci ne permettent qu'un contrôle insuffisant de l'asthme.

Traitement préventif de l'asthme d'effort.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**MISES EN GARDE**

Prévenir le patient qu'il ne s'agit pas d'un traitement de la crise d'asthme !

**Grossesse** et **allaitement** : n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Enfant : prendre à distance du repas (2 h).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Bénins et rares : douleurs abdominales, céphalées.

## ASTHME (6) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (6)

### ► Principes de la réduction de palier en cas de parfait contrôle de l'asthme [1]

L'objectif est de trouver le traitement minimal permettant le contrôle de l'asthme.

Patients contrôlés par une corticothérapie inhalée à dose élevée : réduire les doses de 50 %/3 mois.

Patient contrôlé avec une association d'une corticothérapie inhalée et d'un  $\beta_2$  de LDA :

– réduire la dose de corticothérapie inhalée de 50 % et maintenir le  $\beta_2$  de LDA ;

– une fois atteinte une faible dose de corticothérapie inhalée : arrêt du  $\beta_2$  de LDA ou association d'une corticothérapie inhalée et d'un  $\beta_2$  de LDA en une prise par jour.

Conditions d'arrêt d'un traitement de fond : contrôle pendant 1 an avec la plus petite dose du traitement de fond.

### Asthme et allergologie

1) Il n'y a pas lieu de répéter des tests d'hyperréactivité bronchique non spécifique dans l'asthme, hormis le cas particulier des asthmes professionnels.

2) Il n'y a pas lieu de pratiquer un bilan allergologique initial systématique dans l'asthme, sauf chez l'enfant.

3) Il n'y a pas lieu de pratiquer des tests microbiens ou utilisant des extraits non standardisés dans l'exploration de l'asthme à composante allergique.

4) Il n'y a pas lieu de pratiquer des tests cutanés à lecture semi-retardée ou retardée dans l'exploration de l'asthme à composante allergique.

5) Il n'y a pas lieu de pratiquer de manière systématique, devant des tests allergologiques positifs, une immunothérapie spécifique de désensibilisation dans l'asthme.

6) Il n'y a pas lieu d'utiliser l'immunothérapie spécifique, sauf chez une minorité de patients soigneusement sélectionnés, quand les conditions suivantes sont réunies :

– il existe un facteur allergique déclenchant confirmé par la confrontation de l'histoire clinique et des tests allergologiques ;

– l'éviction ou l'évitement de cet allergène s'avère impossible ;

– un traitement médicamenteux est en cours, au palier thérapeutique correspondant à la sévérité de la maladie (l'immunothérapie spécifique peut être associée mais ne doit pas être substituée à ce traitement) ;

– ce traitement adapté ne permet pas une maîtrise suffisante de la maladie.

7) Il n'y a pas lieu de pratiquer des tests allergologiques pour suivre l'efficacité d'une immunothérapie spécifique dans l'asthme.

8) Il n'y a pas lieu d'instituer une corticothérapie orale au long cours chez un asthmatique, sauf en cas d'échec de l'association de la corticothérapie inhalée à fortes doses et des  $\beta_2$ -mimétiques de longue durée d'action et à condition de l'associer à ceux-ci.

### Critères de prise en charge à 100 % dans l'asthme

Les critères gazométriques ( $\text{PaO}_2 < 55$  mmHg) et spirométriques ( $\text{VEMS} < 50$  % des valeurs théoriques) utilisés pour les insuffisances respiratoires graves sont (heureusement !) rarement présents dans le cas de la maladie asthmatique.

Les critères sont donc :

1) cliniques : permanence de la dyspnée, répétition des crises dyspnéiques paroxystiques, et/ou

2) spirographiques : persistance d'un syndrome obstructif sous traitement, et/ou

3) thérapeutiques : nécessité de la prise prolongée pluri-quotidienne de médicaments bronchodilatateurs.

### CONSENSUS

[1] Global Strategy for Asthma Management and Prevention, GINA, 2011

## ANTICORPS ANTI-IgE

### ■ Omalizumab

<b>XOLAIR</b>					
Asthme allergique persistant sévère non contrôlé : dose adaptée au poids et au dosage d'IgE totales	1 ser. 75 mg/0,5 mL	226,14	I	65 %	226,14
	1 ser. 150 mg/1 mL	441,85	I	65 %	441,85

#### PROPRIÉTÉS

L'**omalizumab** est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe de manière sélective aux immunoglobulines E (IgE) humaines. Il empêche la fixation des IgE aux récepteurs de haute affinité FcεpRI, réduisant ainsi la quantité d'IgE circulantes pouvant déclencher la chaîne de réactions allergiques.

#### INDICATIONS

Traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l'asthme chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans) atteints d'asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané positif ou une réactivité *in vitro* à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un traitement quotidien par un **corticoïde inhalé** à forte dose et un **bêta2-agoniste inhalé à longue durée d'action**, présentent une réduction de la fonction pulmonaire (VEMS < 80 % de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de l'asthme.

Le traitement par **omalizumab** ne doit être envisagé que chez les patients présentant un asthme dont la dépendance aux IgE a été établie sur des critères probants.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dose et fréquence d'administration adaptées et déterminées en fonction du taux initial d'IgE (UI/mL), mesuré avant le début du traitement, et du poids corporel (kg).

Les injections SC seront faites dans la région deltoïde du bras. En cas d'impossibilité, elles pourront être réalisées dans la cuisse.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Lors des essais cliniques, les événements indésirables le plus fréquemment rapportés ont été des réactions au point d'injection, notamment une douleur, un gonflement, un érythème et un prurit au point d'injection, ainsi que des maux de tête. La plupart de ces réactions ont été d'intensité légère ou modérée.

## ASTHME (7) – AIGU GRAVE

Il est responsable de 1 500 à 2 000 décès par an en France.

**Toute crise d'asthme** doit jusqu'à preuve du contraire être considérée comme potentiellement grave.

Se méfier particulièrement en cas :

- d'antécédent d'asthme aigu grave,
- d'asthme instable dans les jours précédents.

### Reconnaissance des signes cliniques de gravité (un seul suffit à alerter)

- DEP (*peak-flow*) < 150 L/min +++++.
- Dyspnée majeure avec parole impossible.
- Tirage inspiratoire.
- Fréquence respiratoire > 30/min.
- Pouls > 120/min.
- Sueurs profuses.
- Pouls paradoxal > 20 mmHg.
- Agitation.

### Signes de menace vitale

- Cyanose.
- Silence auscultatoire.
- Pausés respiratoires, épuisement.
- Insuffisance cardiaque droite, état de choc, bradycardie.
- Confusion, torpeur ou coma.

### Gazométrie artérielle systématique

- Normocapnie ( $\text{PaCO}_2$  entre 38 et 42 mmHg) ou hypercapnie ( $\text{PaCO}_2$  > 42 mmHg).
- Hypoxémie.
- pH acide.

### Prise en charge thérapeutique

#### Hospitalisation systématique en unité de soins intensifs (surveillance rapprochée)

- Oxygène nasal : 3 à 4 L/min, quelle que soit la  $\text{PaCO}_2$  !
- Nébulisation (par masque nasal avec 6 à 8 L/min d' $\text{O}_2$ ) de  $\beta_2$ -stimulants, **terbutaline** (**BRICANYL 5 mg/2 mL**) : 2 dosettes (soit 10 mg), ou **salbutamol** (**VENTOLINE**

5 mg/mL) : 1 mL (soit 5 mg) à diluer dans 4 mL de sérum physiologique. À répéter « autant que nécessaire » au cours de la première heure, puis toutes les 4 h après amélioration.

À noter : si le nébulisateur n'est pas disponible (ex. : à domicile), faire inhaler (à travers une chambre d'inhalation grand volume) 2 bouffées de **VENTOLINE** aérosol-doseur, renouvelées 10 à 20 fois !

- $\pm$  Mélangé avec atropinique, **ipratropium bromure** (**ATROVENT** adulte solution pour inhalation) : 1 dosette (soit 0,5 mg), toutes les 8 h.

- **Corticoïdes** systématiques, **méthylprednisolone** (**SOLUMÉDROL**) : 60 mg IV x 2 à 4/j (puis en fonction de l'évolution, avec relais *per os* après 1 à 3 j, généralement).

- Hydratation intraveineuse : 3 à 4 L de G5 %/j, avec adjonction de **potassium**, 2 à 3 g/L.

- En cas de signes infectieux, antibiothérapie : **bêta lactamine**, type **amoxicilline** (en l'absence d'allergie) : 1 g x 2/j ou **macrolide**, **érythromycine** : 1 g x 2/j.

- Surveillance des constantes cliniques et du DEP +++++.

Dans un second temps : kinésithérapie respiratoire (drainage des sécrétions) et (ré)introduction du traitement de fond, avec éducation du patient.

Inutiles voire dangereux dans ce cadre :

- **théophylline**,
- sédatifs,
- solutés alcalinisants,
- utiliser des solutés injectables dans les aérosols.

### Extrême recours = ventilation assistée

C'est une ventilation très « à risque », à envisager devant des signes de menace vitale, après échec du traitement médical (très fortes doses de  $\beta_2$ -stimulants en aérosol, parfois associées à la voie intraveineuse).



## BPCO : EXACERBATIONS (1)

### Définition

L'exacerbation de BPCO est la majoration ou l'apparition d'un ou plusieurs symptômes de la maladie : toux, expectoration ou dyspnée.

### Causes les plus fréquentes

- Surinfection bronchique +++ le plus souvent (virale, pneumocoque, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, etc.).
  - Voire pneumopathie.
  - Insuffisance cardiaque gauche.
  - Embolie pulmonaire.
  - Pneumothorax.
  - Erreurs thérapeutiques ( $O_2$  haut débit, **sédatifs**,  **$\beta$ -bloquants**, **diurétiques**, etc.).
  - Fracture de côtes.
  - Anémie, troubles métaboliques, etc.
- Le plus souvent, il n'est pas retrouvé de facteur déclenchant.

### Recherche immédiate des critères de gravité

- Terrain : patient sous OLD, VEMS < 1 L ou 35 %, comorbidités (cardiopathie, éthy-lisme chronique, diabète, etc.).
- Cliniquement :
  - **respiratoire** : dyspnée de repos, cyanose,  $SpO_2$  < 90 %, FR > 25/min, mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, toux inefficace ;
  - **cardiovasculaire** : FC > 110/min, troubles du rythme, hypotension, marbrures, œdème des membres inférieurs ;
  - **neurologique** : agitation, confusion, obnubilation, coma, astérisis.
- Gaz du sang (à interpréter en fonction des gaz du sang de base) :  $PaCO_2$  > 45 mmHg et/ou  $PaO_2$  < 55 mmHg.

### Prise en charge

En l'absence de tous ces signes, la prise en charge d'une exacerbation peu sévère peut être assurée au domicile, avec une surveillance par le patient lui-même et son entourage (informé des signes d'alerte), et une *réévaluation médicale dans les 48 à 72 h*.

#### Principes généraux

- Les **bronchodilatateurs** doivent être systématiquement prescrits au cours des exacerbations :  **$\beta_2$ -stimulants** et **anticholinergiques** ont une efficacité équivalente.
- Les **corticoïdes systémiques** ne doivent pas être prescrits systématiquement et sont proposés en cas de réversibilité documentée.
- Les **antitussifs** et les **neurosédatifs** sont contre-indiqués.
- Kinésithérapie respiratoire.
- L'antibiothérapie n'est pas systématique et doit être réservée aux situations où il existe des signes évocateurs d'infection (purulence des expectorations ++ ou pour les malades les plus sévères).

### Exacerbations sans critère de gravité

- **Bronchodilatateurs** inhalés :  **$\beta_2$ -stimulants** et/ou **anticholinergiques**, avec chambre d'inhalation type *Volumatic*, par ex. **BRONCHODUAL**, 3 à 4 bouffées/j. Utiliser la forme d'inhalation à laquelle le patient est habitué (en augmentant les doses).
- **Antibiothérapie** non systématique. En 1<sup>re</sup> intention : **pénicillines du groupe A** ± **inhibiteur des  $\beta$ -lactamases**, amoxicilline + acide clavulanique (**AUGMENTIN**), 1 g x 3/j *per os*, 7 à 10 j.

## BPCO : EXACERBATIONS (2)

### Hospitalisation en cas de gravité initiale ou en l'absence d'amélioration à 48 h

- **Oxygénothérapie** débutée à faible débit (0,5 à 1 L/min), avec surveillance gazométrique ; objectif = SaO<sub>2</sub> entre 90 et 94 %.
- **Bronchodilatateurs en nébulisation** (par masque sous air, sous surveillance) : **terbutaline (BRICANYL)** 5 mg/2 mL, 1 dosette x 4 à 6/j et **ipratropium bromure (ATROVENT, solution pour inhalation)**, 1 dosette x 2 à 3/j.
- **Corticoïdes oraux** : **prednisolone (SOLUPRED)**, 0,5 à 1 mg/kg/j, 5 à 10 j.
- **Antibiothérapie** (cf. *infra*) : en cas de ter-

rain particulièrement fragile et de forte probabilité d'infection, on peut proposer **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 1 g x 3/j *per os*.

- **Kinésithérapie respiratoire** biquotidienne.
- **Rééquilibration hydroélectrolytique** et hydratation par perfusion intraveineuse.
- Prévention de maladie thrombo-embolique : **énoxaparine (LOVENOX)** SC.
- Le cas échéant : traitement de la cause (drainage d'un pneumothorax, etc.).

### Indications et choix de l'antibithérapie [1]

Stade clinique de gravité de la BPCO (en dehors de toute exacerbation)		Indications à l'antibiothérapie	Choix de l'antibiothérapie
En l'absence d'EFR connus	Résultats EFR connus		
Absence de dyspnée	VEMS > 50%	Pas d'antibiotique	
Dyspnée d'effort	VEMS < 50%	Antibiothérapie seulement si expectoration franchement purulente verdâtre	<b>Amoxicilline</b> ou <b>céfuroxime axetil</b> ou <b>macrolide</b> ou <b>pristinamycine</b>
Dyspnée au moindre effort ou de repos	VEMS < 30%	Antibiothérapie systématique + recherche des autres causes d'exacerbation de la dyspnée	<b>Amoxicilline/acide clavulanique</b> ou <b>C3G (céfotaxime ou ceftriaxone)</b> ou <b>FQAP</b> (lévofloxacine)*

### CONSENSUS

[1] Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l'adulte, *SPILF, Afssaps et SPLF*, 2010

\* Les fluoroquinolones anti-pneumococciques (FQAP) ne doivent pas être prescrites si le patient a déjà pris ce traitement dans les 3 derniers mois, quelle que soit la cause. Attention au risque accru de tendinopathie.

## BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (1)

### Définition

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Cette obstruction est causée par l'association, variable selon les patients, d'une diminution du calibre des bronchioles du fait de modifications anatomiques (remodelage) et d'une destruction des alvéoles pulmonaires (emphysème).

Sauf précision contraire, le terme de BPCO admet implicitement son origine tabagique.

### Épidémiologie en France

En France, la prévalence est estimée entre 4 et 5 % (2 à 4 millions de sujets atteints de BPCO).

Augmentation importante du nombre de BPCO chez la femme ces dernières années (tabagisme).

La BPCO est une maladie longtemps silencieuse : 2/3 des BPCO non diagnostiquées. L'évolution de la BPCO se fait vers le handicap : 20 000 patients en ALD pour une insuffisance respiratoire secondaire à une BPCO.

Le nombre de décès par BPCO est estimé à 15 000 à 20 000 par an.

### Facteurs de risque

Facteur de risque principal = **TABAC** (90 % des cas de BPCO).

Facteurs exogènes : tabac ++ (20 % des fumeurs vont développer une BPCO), polluants professionnels.

Facteurs endogènes : déficit en  $\alpha_1$ -antitrypsine, hyperréactivité bronchique, sexe féminin.

### Évaluation minimale initiale

- **Interrogatoire et examen clinique** : symptômes de bronchite chronique (toux et expectoration chronique au moins 3 mois/an et depuis au moins 2 années consécutives, sans autre cause identifiée), quantification de la dyspnée, mesure du DEP +++.

- **Épreuves fonctionnelles respiratoires** avec test de réversibilité aux **bronchodilatateurs** (si positif : évoque un asthme).

Le diagnostic de BPCO repose sur :

- la mise en évidence d'un trouble ventilatoire obstructif :  $VEMS/CVF < 70 \%$ .

- non ou partiellement réversible après **bronchodilatateur**.

- Gaz du sang artériel.

- **Radiographie de thorax**  $\pm$  TDM thoracique.

- Devant toute manifestation respiratoire d'apparition récente chez un patient fumeur, il est nécessaire de réaliser une fibroscopie bronchique (recherche de cancer).

### Classification de la BPCO en stades de sévérité

Stade	Caractéristiques	
I : léger	VEMS/CVF 70 %	VEMS $\geq 80 \%$ de la valeur prédite
II : modéré		$50 \% \leq VEMS < 80 \%$ de la valeur prédite
III : sévère		$30 \% \leq VEMS$
IV : très sévère		VEMS $< 30 \%$ de la valeur prédite ou VEMS $< 50 \%$ de la valeur prédite AVEC insuffisance respiratoire chronique grave

## BRONCHODILATEURS (1) – THÉOPHYLLINE ET DÉRIVÉS (1)

## ■ Théophylline

<b>DILATRANE LP</b>					
Asthme, traitement de fond (en association aux <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 8 à 12 mg/kg/j en 2 prises (car libération prolongée)	30 gél. 50 mg	1,95	II	30 %	0,07
	30 gél. 100 mg	2,41	II	30 %	0,08
	30 gél. 200 mg	2,73	II	30 %	0,09
	30 gél. 300 mg	3,07	II	30 %	0,10
<b>DILATRANE</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b> en 3 prises	40 c-mes. 50 mg	3,59	II	65 %	0,09
<b>EUPHYLLINE LA</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 gél. 50 mg	2,16	II	30 %	0,07
	30 gél. 100 mg	2,25	II	30 %	0,08
	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 gél. 300 mg	3,19	II	30 %	0,11
	30 gél. 400 mg	3,54	II	30 %	0,12
<b>THÉOSTAT LP</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 cp. séc. 100 mg	2,28	II	30 %	0,08
	30 cp. séc. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 cp. séc. 300 mg	3,40	II	30 %	0,11
	100 cp. séc. 300 mg	HOP			
<b>XANTHIUM LP</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 gél. 300 mg	2,95	II	30 %	0,10
	30 gél. 400 mg	3,44	II	30 %	0,11
<b>TEDRALAN</b>					
7 à 12 mg/kg/j en 2 prises	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08

## ■ Bamifylline

<b>TRENTADIL</b>					
Asthme, traitement de fond (en association aux <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 2 à 3 cp. x 2/j	20 cp. 300 mg	3,42	II	30 %	0,17

**BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (2)****Facteurs pronostiques de mortalité**

- Clinique : sévérité de la dyspnée, toux et expectoration, sédentarité.
- Poursuite de l'intoxication tabagique.
- Fréquence et sévérité des exacerbations.
- Fonction respiratoire : VEMS.
- Performance à l'exercice : test de marche de 6 min.
- État nutritionnel : IMC.
- Hypertension pulmonaire.
- Comorbidités : cardiovasculaires, cancer bronchique, anémie, dépression.
- Thérapeutique : indication OLD, **corticoïdes oraux** au long cours.

**Prise en charge thérapeutique [1]****Objectifs du traitement**

- Limiter le handicap : améliorer la qualité de vie et la tolérance à l'exercice.
- Réduire la fréquence et l'intensité des exacerbations.
- Prévenir et contrôler les symptômes respiratoires (dyspnée).

**Prévention et réduction des facteurs de risque**

(cf. Sevrage tabagique)

Dans tous les cas, effet bénéfique de l'AR-RÊT DU TABAC : conseils répétés, prise en charge spécialisée multidisciplinaire, substituts nicotiniques.

Limitation du tabagisme passif.

Mesures de protection individuelle et collective contre les polluants professionnels.

**BPCO = Stades I, II, III****Bronchodilatateurs**

Au cours de la BPCO à l'état stable, la prescription de **bronchodilatateurs** inhalés, associés ou non à une corticothérapie

inhalée (selon la valeur du VEMS, le nombre d'exacerbations et le traitement antérieur) est recommandée afin d'améliorer les symptômes et la qualité de vie et de réduire la fréquence des exacerbations. Il convient de s'assurer que la technique d'inhalation est correcte à chaque consultation.

Au choix :

- **Anticholinergiques** inhalés :
  - de courte durée d'action (CDA < 8 h), **ipratropium bromure (ATROVENT)** : 2 bouffées x 3/j ;
  - de longue durée d'action (LDA > 24 h), **tiotropium (SPIRIVA)** : 1 gél./j.
- **Bêta-2-agonistes** inhalés :
  - de courte durée d'action (4 à 6 h), **salbutamol (VENTOLINE)** : 2 bouffées x 3 à 4/j, surtout si symptômes discontinus ;
  - de longue durée d'action (12 h), **formotérol (FORADIL)**, 1 gél. x 2/j ; **salmétérol (SEREVENT)**, 2 à 4 bouffées/j.
- Association des deux (**BRONCHODUAL**) **β2 CDA + anticholinergique CDA** : 2 bouffées x 3 à 4 /j.

Il n'existe pas de preuve de l'avantage d'une classe par rapport à l'autre, le choix de la classe dépend de la réponse individuelle sur les symptômes et les effets secondaires [1].

En cas d'efficacité insuffisante, il peut être justifié de changer de classe de **bronchodilatateur** ou de prescrire des associations, et de vérifier que les conditions d'utilisation sont correctes.

L'association de 2 classes de **bronchodilatateurs** peut améliorer la réponse fonctionnelle (VEMS) sans pour autant avoir démontré de bénéfice sur la symptomatologie ou les exacerbations.

## BRONCHODILATEURS (2) – THÉOPHYLLINE ET DÉRIVÉS (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Bronchodilatateur (par relaxation du muscle lisse bronchique) inhibiteur de la phosphodiestérase ; la bronchodilatation est inférieure à celle des  $\beta_2$ -stimulants (en partie en raison de la limitation des doses).

Action anti-inflammatoire à des doses inférieures aux doses « bronchodilatatrices ».

Action stimulante centrale (et analeptique respiratoire), sauf pour la **bamifylline**.

Absorption irrégulière par voie rectale ; métabolisation hépatique puis excrétion urinaire ; délai d'action > 1 h, demi-vie de 5 h (10 h pour formes LP).

### INDICATIONS

Traitement symptomatique continu (utilisé « en 3<sup>e</sup> ligne ») de l'asthme (si **corticoïdes inhalés** seuls insuffisants, éventuellement associés à des  $\beta_2$ -mimétiques inhalés de longue durée d'action), et des BPCO spastiques.

**Remarque :** la **théophylline** n'a pas d'indication en 1<sup>re</sup> intention dans la crise d'asthme ! (c'est pourquoi les formes injectables n'ont pas été mentionnées ici).

### CONTRE-INDICATIONS

Intolérance à la **théophylline**.

Surtout : interactions médicamenteuses.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La marge thérapeutique des théophyllines est étroite (taux efficace proche du taux toxique), imposant une posologie adaptée à chaque cas (terrain, survenue d'effets indésirables) et un **contrôle des taux sériques** : commencer à 8 à 10 mg/kg/j (poids idéal, chez l'obèse) ; diminuer de 50 % si insuffisance hépatique.

Théophyllinémie efficace : 10 à 15 mg/L.  
Théophyllinémie toxique : 20 mg/L.

Utiliser avec prudence en cas de coronaropathie, insuffisance cardiaque, hyperthyroïdie, comitialité, fièvre, ulcère gastroduodénal, fin de grossesse, âge avancé.

Préférer les formes à libération prolongée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Variables, aux doses thérapeutiques : nervosité, excitabilité, pesanteur gastrique, céphalées.

À plus forte dose : tachycardie, nausées, vomissements, diarrhée, insomnie, tremblements (peuvent révéler un surdosage !)

Surdosage : agitation, confusion mentale, convulsions, hyperthermie, troubles du rythme cardiaque, hypotension.  
Prise en charge en réanimation !

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **énoxacine** et **troléandomycine** (risque de surdosage en **théophylline**).

Associations déconseillées : **érythromycine** et **viloxazine** (risque de surdosage en **théophylline**).

Associations augmentant la théophyllinémie : **allopurinol**, **cimétidine**, **fluoroquinolone**, **fluconazole**, **fluvoxamine**, **mexilétine**, **ticlopidine**, **clarithromycine**, **josamycine**, **roxithromycine**.  
Les inducteurs enzymatiques (**phénobarbital**, **carbamazépine**, **phénytoïne**, **rifampicine**) diminuent la théophyllinémie.

Le tabagisme et l'alcool diminuent la demi-vie d'élimination de la **théophylline**.

## BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (3)

### Corticothérapie inhalée : non systématique

Aucun **corticostéroïde inhalé (CSI)** pris isolément n'a obtenu l'AMM dans le traitement de la BPCO. Seules les associations fixes avec un **bronchodilatateur** ont obtenu l'AMM.

Les **CSI** ne semblent pas ralentir l'évolution de la BPCO, mais permettent de réduire la fréquence des exacerbations chez les sujets les plus sévères.

Les indications des **CSI en association avec un  $\beta_2$  LDA** reconnues sont :

- les patients atteints de BPCO sévère = stade III et IV ;
- les patients présentant des exacerbations répétées malgré une prise en charge optimale.

Les **corticoïdes** par voie générale ne doivent pas être prescrits au long cours, en raison de l'importance des effets secondaires. Il n'y a pas de relation entre la réponse à une corticothérapie orale de courte durée et la réponse à long terme à la corticothérapie inhalée.

### Autres

- Éradication des foyers infectieux susceptibles de favoriser les infections pulmo-

naires : recherche et traitement des foyers infectieux ORL et des foyers stomatologiques.

- Prise en charge psychosociale et nutritionnelle.

- Vaccination antigrippale tous les ans, et antipneumococcique (**PNEUMO 23**) tous les 5 ans.

- Les **antitussifs** sont contre-indiqués car ils peuvent majorer l'encombrement.

- Les  **$\beta$ -bloquants cardiosélectifs** peuvent être utilisés dans la BPCO.

- Éviter les psychotropes, surtout **benzodiazépines** et **barbituriques**.

### Indications de chirurgie = rare

Dans de rares cas d'emphysème, une résection de bulle ou une réduction de volume pulmonaire peut être discutée afin d'améliorer la mécanique ventilatoire.

À un stade très avancé, peut se discuter la transplantation pulmonaire.

### Surveillance

Épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR), radio de thorax (RP),  $\pm$  gaz du sang (GDS) tous les 6 mois à 2 ans, en fonction de la sévérité.

### Trautement de la BPCO en fonction du stade de sévérité

I : léger	II : modéré	III : sévère	IV : très sévère
Réduction des facteurs de risque : sevrage tabagique, vaccination antigrippale			
		Un ou plusieurs <b>bronchodilatateurs de longue durée d'action</b> Réhabilitation respiratoire	
		<b>CSI</b> en association fixe si exacerbations répétées (VEMS < 60 % pour <b>salmétérol/fluticasone</b> )	
		Oxygénothérapie si IRC Traitements chirurgicaux	

## BRONCHODILATEURS (3) – BÊTA-2-STIMULANTS D'ACTION BRÈVE (1)

### ■ Salbutamol

<b>VENTOLINE</b>					
Crise d'asthme : 2 bouf. à répéter 15 min après si besoin Asthme d'effort : 2 bouf. 15 min avant l'effort Crise d'asthme résistant au « spray » à domicile : 1 amp. SC ou IM Crise d'asthme sévère (ou décompensation de BPCO) : nébuliser 1 unidose avec un générateur d'aérosol ; répéter selon les besoins	200 bouf. 100 µg    6 amp. (mL) 0,5 mg  20 unidoses 1,25 mg/2,5 mL 60 unidoses 2,5 mg/2,5 mL 60 unidoses 5 mg/2,5 mL	5,06   2,47  3,86 14,84 21,87	I   I  I I I	65 %   65 %  65 % 65 % 65 %	0,03   0,41  0,19 0,25 0,36
<b>VENTILASTIN NOVOLIZER</b>					
Idem <b>VENTOLINE</b>	200 doses pdre 100 µg pour inh.	9,39	I	65 %	0,05
<b>ASMASAL CLICKHALER</b>					
Idem <b>VENTOLINE 100 µg</b>	200 doses 90 µg	10,84	I	65 %	0,06
<b>SALBUMOL FORT</b>					
Asthme aigu grave : perfusion IV continue 0,5 à 1 mg/h en réanimation sous scope	5 amp. 5 mg/5 mL	HOP	I		
<b>AIROMIR AUTOHALER</b>					
Idem <b>VENTOLINE 100 µg</b>	200 bouf. 100 µg	9,79	I	65 %	0,05

### ■ Terbutaline

<b>BRICANYL</b>					
Asthme aigu grave (ou décompensation de BPCO) : nébuliser 1 unidose avec un générateur d'aérosol ; répéter selon les besoins Crise d'asthme résistant au « spray », à domicile : 1 amp. SC Asthme aigu grave : perfusion IV continue 0,5 à 1 mg/h en réanimation sous scope	50 inhal. 5 mg/2 mL   8 amp. 1 mL (0,5 mg)	20,55   2,98	I   I	65 %   65 %	0,41   0,37
<b>BRICANYL TURBUHALER</b>					
Avec système d'inhal. <i>Turbuhaler</i> Crise d'asthme : 1 inhalation, à répéter 15 min après si besoin Asthme d'effort : 1 inhalation 15 min avant l'effort	100 doses 500 µg	5,61	I	65 %	0,06



**BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (4)****Insuffisance respiratoire chronique**

Prise en charge à 100 % de l'IRC.

L'insuffisance respiratoire chronique grave donne lieu à l'exonération du ticket modérateur. Outre la gravité clinique, elle est définie par :

- une hypoxémie,  $\text{PaO}_2 < 70$  mmHg, au repos, à l'état stable, constatée sur 2 gaz du sang artériels à au moins 3 semaines d'intervalle ;
- IRC grave :  $\text{PaO}_2 \leq 55$  mmHg ou  $< 60$  mmHg avec des signes d'insuffisance ventriculaire droite ou une polyglobulie.

**Oxygénothérapie de longue durée (OLD)****Indications**

Les indications de l'OLD reposent sur la mesure de la  $\text{PaO}_2$ , au repos, à l'état stable, vérifiée sur 2 gaz du sang espacés d'au moins 3 sem., sous traitement médical optimal :

- $\text{PaO}_2 \leq 55$  mmHg ;
- ou  $\text{PaO}_2$  entre 55 et 59 mmHg s'il existe :
  - HTAP (PAPm  $> 25$  mmHg) ;
  - signes cliniques de cœur pulmonaire chronique ;
  - désaturations nocturnes sans rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil ( $\text{SpO}_2 < 90$  % plus de 30 % du temps) ;
  - polyglobulie.

L'hypercapnie n'est ni une indication ni une contre-indication à l'OLD.

**Modalités**

- Au moins 15 h/j (absence de bénéfice en cas de durée inférieure). L'OLD augmente la survie chez les patients au stade de l'IRC grave.

- Sources d'oxygène : oxygène liquide ou extracteur d'oxygène.

- Voie d'administration nasale le plus souvent (lunettes).

- Adaptation du débit d' $\text{O}_2$  :

- débit minimal permettant d'obtenir une  $\text{PaO}_2$  entre 65 et 70 mmHg ;
- augmentation du débit d' $\text{O}_2$  à l'effort en cas de désaturation à l'effort.

- Nécessité d'un suivi à domicile (prestataire).

Dans le cas général, il n'y a pas d'indication d'oxygénothérapie nocturne ou de déambulation en dehors du cadre de l'OLD.

Le tabagisme actif contre-indique classiquement l'OLD (risque de combustion).

**Ventilation mécanique à domicile**

L'objectif est de limiter l'hypoventilation alvéolaire (et donc l'hypercapnie).

Il existe deux types principaux de ventilation mécanique (utilisation d'un ventilateur) différant par leur interface avec le malade :

- la ventilation non invasive (VNI) administrée à l'aide d'un masque facial ou nasal ;
- la ventilation invasive par trachéotomie.

**Indications de la VNI :**

- En situation d'échec de l'OLD, la VNI peut être proposée en présence :

- de  $\text{PaCO}_2 > 55$  mmHg ;
- et d'instabilité clinique avec une fréquence élevée d'hospitalisations pour décompensations.

- En cas de syndrome d'apnée obstructif du sommeil associé, la VNI est le traitement de référence.

**BRONCHODILATEURS (4) – BÊTA-2-STIMULANTS  
D'ACTION BRÈVE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Agonistes spécifiques des récepteurs  $\beta_2$ -adrénergiques des muscles lisses, donc bronchodilatateurs ; très peu d'effet sur les récepteurs  $\beta_1$ -cardiaques.

Voie inhalée : action dès la première minute, maximale à 15 min, et persistant pendant 6 à 8 h. Passage systémique infime.

Voie SC : délai < 20 min, durée 6 h.

**INDICATIONS**

Voie inhalée : traitement de la crise d'asthme ; traitement de fond de l'asthme (si **corticoïdes inhalés** seuls insuffisants : 3 prises/j), des BPCO spastiques ; prévention de l'asthme d'effort.

Nébulisation : traitement de choix de la crise d'asthme sévère ; décompensation de BPCO.

Voie SC : crise d'asthme résistant au spray, à domicile.

Perfusion IV : asthme aigu grave (en réanimation !).

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune si indication formelle !

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Formes injectables : éviter en cas d'infarctus myocardique en phase aiguë, angor instable ; prudence en cas de cardiopathie obstructive, coronaropathie, hyperthyroïdie, HTA, diabète.

Voie inhalée : consulter si plus de 10 à 15 bouffées par jour (= asthme instable) ; vérifier la prise correcte des sprays (mode d'emploi : cf. **Corticoïdes inhalés**) ; traiter toute surinfection bronchique.

Sportifs : réaction positive au contrôle antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnels par voie inhalée : tremblements, palpitations, tachycardie sinusale, nausées, nervosité, vertiges.

Voie parentérale : hyperglycémie, hypokaliémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Voie parentérale : ne pas associer avec l'**halothane** ; incompatibilité avec d'autres spécialités, ou solutés alcalins.

**BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (5)****Réhabilitation respiratoire****Indications**

Il est recommandé de proposer une réhabilitation respiratoire à tout patient atteint d'une BPCO et présentant une incapacité ou un handicap respiratoire évaluable notamment chez ceux qui présentent :

- une dyspnée ou une intolérance à l'exercice ;
- une réduction de leurs activités sociales en rapport avec leur état de santé.

Elle est indiquée chez les patients stables ou au décours d'un exacerbation.

**Contre-indications**

- Contre-indication cardiovasculaire à l'exercice.
- Instabilité de l'état respiratoire (acidose respiratoire non compensée).
- Affection interférant avec le processus de réhabilitation.

L'oxygénothérapie n'est pas une contre-indication.

**Bilan préalable**

- Évaluation tabagisme, échelle de qualité de vie.
- EFR complètes.
- GDS.
- PI max, PE max.
- Mesure de la force du quadriceps et de la préhension.
- Stade NYHA.
- Test de marche des 6 min.
- Explorations fonctionnelles à l'exercice.

**Composantes de la réhabilitation respiratoire**

- Traitements physiques.
- Éducation thérapeutique.
- Prise en charge psychologique.
- Sevrage tabagique.
- Suivi nutritionnel.

**CONSENSUS**

- [1] Recommandation pour la pratique clinique - Prise en charge de la BPCO, SPLF, 2009

## BRONCHITES AIGÜES INFECTIEUSES

### Rappel

- Prédominance hivernale.
  - Il s'agit d'une inflammation aiguë des bronches le plus souvent d'origine virale.
  - Toux sèche, rauque, faisant souvent suite à une infection rhinopharyngée, puis devenant grasse, productive.
- Elle s'accompagne souvent d'une fébricule (38 °C), de douleurs (rétrosternales liées à l'inflammation bronchique, voire pariétales, secondaires à la toux incessante).

### Agents responsables

#### Viraux dans la plupart des cas

Myxovirus (*influenzae* ou *para-influenzae*), rhinovirus, VRS, adénovirus, etc.

#### Parfois bactériens

- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Chlamydia pneumoniae*
- Plus rarement pyogènes, tels que *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*

### Diagnostic = Clinique

Aucun examen paraclinique n'est nécessaire !

La radiographie de thorax, si elle est réalisée, est normale.

### Évolution

Le plus souvent favorable en 10-15 j. L'évolution peut se faire vers la surinfection bronchique (*Streptococcus pneumoniae* et *Haemophilus influenzae* le plus souvent).

### Conduite à tenir chez l'adulte sain

Aucun examen paraclinique n'est nécessaire !

#### Traitement symptomatique

- **Antalgiques** simples, type **paracétamol**.
- **Antitussifs** si toux sèche gênante.
- L'arrêt du tabac doit être proposé systématiquement.
- Les **fluidifiants bronchiques** n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.

Aucune antibiothérapie n'est justifiée chez le sujet sain.

En cas de surinfection bronchique, une antibiothérapie peut être proposée : **aminopénicilline** type **amoxicilline (CLAMOXYL)**, 1 gél. (500 mg) x 3/j, ou **macrolide** type **azithromycine (ZITHROMAX 250)**, 2 cp. le 1<sup>er</sup> j, puis 1 cp./j, pendant 4 j.

Chez le sujet BPCO, une antibiothérapie est à discuter en première intention en fonction de la sévérité de la pathologie respiratoire sous-jacente : **amoxicilline + acide clavulanique (AUGMENTIN)**, 1 g x 3/j.

## PNEUMOPATHIES AIGÜES COMMUNAUTAIRES (1)

Ce sont les pneumonies acquises en dehors de l'hôpital.

Elles constituent la première cause de décès par maladie infectieuse en France (30/100 000 habitants).

### Diagnostic

Le diagnostic repose sur trois éléments :

- signes fonctionnels respiratoires ;
- fièvre ;
- image radiologique.

### Microbiologie

**90 % sont liées à un des 6 agents infectieux suivants (parfois associés !)**

- *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque),
- *Haemophilus influenzae*,
- *Mycoplasma pneumoniae*,
- *Chlamydia pneumoniae*,
- *Legionella pneumophila*,
- *Myxovirus influenza A* (grippe).

**D'autres germes sont fréquents sur des terrains particuliers**

- Vieillards, personnes en institution, tare majeure, diabète : *Staphylococcus aureus*, entérobactéries.
- Éthyliques : *Klebsiella pneumoniae*, anaérobies.

**Problème grandissant des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline (CMI > 0,1 mg/L)**

- Nécessité d'antibiogramme systématique pour tout pneumocoque retrouvé.
- Facteurs de risque : hospitalisation ou prise de  **$\beta$ -lactamines** dans les 3 derniers mois, pneumonie dans l'année passée.

Ni les éléments cliniques, ni les éléments radiologiques, ne permettent de prédire avec suffisamment de pertinence l'agent infectieux responsable.

Le traitement antibiotique est donc instauré de façon empirique, fondé sur les probabilités liées à l'épidémiologie et au terrain.

### Signes de gravité [1]

#### Signes cliniques

*Détresse vitale*

- Fréquence respiratoire > 30/min.
- Tirage, cyanose.
- Pouls > 125/min.
- Pression artérielle systolique
- Température 40°C.
- Autres signes de choc (marbrures, anurie, etc.).
- Troubles de conscience (coma ou agitation).

*Diffusion de l'infection*

Méningite, arthrite, purpura, etc.

#### Signes biologiques

- Hypoxémie (PaO<sub>2</sub>)
- Hypercapnie (PaCO<sub>2</sub>) > 50 mmHg.
- Leucocytes 3 000 ou > 30 000/mm<sup>3</sup>
- Hyponatrémie
- Hématocrite
- Urée > 7 mmol/L, créatinine > 130  $\mu$ mol/L.
- CIVD.

#### Signes radiologiques

- Atteinte 2 lobes, *a fortiori* bilatérale.
- Extension rapide.
- Complications : pleurésie, abcès.

### Facteurs de risque de mortalité [1]

Âge > 65 ans.

Patient en institution.

Hospitalisation dans l'année, ATCD de pneumonie.

Immunodépression :

- infection à VIH ;
- splénectomie ;
- corticothérapie au long cours, immuno-suppresseurs, chimiothérapie.

Pathologies chroniques :

- insuffisance cardiaque, hépatique, rénale ou respiratoire ;
- maladie cérébrovasculaire (AVC) ;
- diabète mal équilibré.

Conditions de prise en charge difficile :

- observance incertaine ou impossible (vomissements) ;
- conditions socioéconomiques défavorables (SDF), isolement.

## PNEUMOPATHIES AIGÜES COMMUNAUTAIRES (2)

### Bilan paraclinique

#### Pneumonie sans critère de gravité

- Radio de thorax (face + profil) systématique.

#### Pneumonie avec critère de gravité

- Radio de thorax (face + profil) ± TDM thoracique.
- Gazométrie artérielle.
- Bactériologie : hémocultures, antigénurie légionnelle et pneumocoque ± ECBC.
- Numération + formule sanguine + plaquettes, hémostase.
- Ionogramme sanguin, urée, créatinine, glycémie, CRP.
- En cas d'épanchement pleural : ponction pleurale.
- Devant des troubles de conscience :

ponction lombaire (méningite à pneumocoque).

- En cas de suspicion d'un germe atypique : sérologies (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* ou *psitaci*, *Legionella pneumophila*) à répéter 3 sem. plus tard = diagnostic rétrospectif.

### Stratégie thérapeutique [1]

#### Indications à l'hospitalisation [2]

*Pneumonie grave* = hospitalisation en réanimation ou en soins intensifs pneumologiques.

*Pneumonie sans critères de gravité* : la prise en charge des pneumopathies aiguës sans critère de gravité peut être ambulatoire ou nécessiter l'hospitalisation selon ses facteurs de risque.

Un algorithme de prise en charge a été proposé :

Âge	Facteurs de risque de mortalité		
	0	1	2
< 65 ans	Ambulatoire	Ambulatoire possible	Hospitalisation
≥ 65 ans	Ambulatoire	Hospitalisation	Hospitalisation

### Prise en charge

#### ► Principes

Aucun examen ne doit retarder la prise en charge thérapeutique et l'antibiothérapie.

Traitement antibiotique probabiliste, adapté secondairement à l'antibiogramme.

Réévaluation systématique de l'efficacité à 48-72 h.

## VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE

## ■ Vaccin pneumococcique polyvalent

<b>PNEUMO 23</b>				
Prévention des infections à pneumocoques : 1 inj. SC ou IM tous les 5 ans	1 ser. 0,5 mL	13,56	65 %	13,56

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir d'antigènes purifiés des 23 sérotypes (principaux en pathologie humaine) de pneumocoques.

L'immunité acquise vis-à-vis de ces sérotypes apparaît dès le 10<sup>e</sup>-15<sup>e</sup> j après l'injection, et dure 5 ans.

**INDICATIONS**

Prévention des infections à pneumocoques, en particulier respiratoires, chez les sujets « à risque » (après l'âge de 2 ans), notamment les patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive ou d'insuffisance respiratoire chronique, splénectomisés ou aspléniques (ou patients devant subir une splénectomie), drépanocytaires, etc.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Forte réaction après une injection antérieure.  
Injection antérieure ou infection à pneumocoque datant de moins de 5 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver entre + 2 °C et + 8 °C.

Respecter le délai de 5 ans avant de revacciner (risque de réactions sévères, type « phénomène d'Arthus », en cas de revaccination précoce).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibilités de réactions d'hypersensibilité.

Réactions locales fréquentes : rougeur, douleur, induration au point d'injection (disparaît en 24-48 h) ; plus rarement associées à une fièvre à 38 °C (voire myalgies, asthénie, frissons, céphalées) pendant 24 h.

Réactions majorées en cas de revaccination trop précoce.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les traitements immunosuppresseurs peuvent diminuer ou même annuler la réponse immunitaire.

Le vaccin peut être effectué (à des sites d'injection différents) en même temps que le vaccin antigrippal.

## PNEUMOPATHIES AIGÜES COMMUNAUTAIRES (3)

### ► Antibiothérapie

**Pneumopathie aiguë communautaire de l'adulte, en ambulatoire, sans signes de gravité**

Monothérapie par voie orale.

	1 <sup>er</sup> choix	Échec à 48 h
<b>Sujet présumé sain, sans signes de gravité</b>		
Suspicion de pneumocoque	<b>Amoxicilline (CLAMOXYL)</b> 1 g x 3/j pendant 10 j	<b>Macrolide ou FQAP*</b> (lévofloxacine) ou <b>pristinamycine (PYOSTACINE)</b> 2 à 3 g/j ou <b>télithromycine (KETEK)</b>
Doute entre pneumocoque et bactéries «atypiques»	<b>Amoxicilline</b> ou <b>pristinamycine</b> ou <b>télithromycine</b>	ou <b>FQAP (lévofloxacine)</b> ou <b>pristinamycine</b> ou <b>télithromycine</b>
Suspicion de bactéries «atypiques»	<b>Macrolide (spiramycine: ROVAMYCINE</b> 6 à 9 MUI/j en 3 prises)	<b>Amoxicilline</b> ou <b>FQAP (lévofloxacine)</b> ou <b>pristinamycine</b> ou <b>télithromycine</b>
<b>Sujet avec comorbidité(s) ou sujet âgé ambulatoire (hors institution) sans signe de gravité</b>	<b>Amoxicilline + acide clavulanique</b> ou <b>FQAP (lévofloxacine)</b> ou <b>ceftriaxone</b>	Hospitalisation

**Pneumopathies aiguës communautaires non graves hospitalisées**

	1 <sup>er</sup> choix	Échec à 48 h
<b>Arguments en faveur du pneumocoque (fortement suspecté ou documenté)</b>		
Sujet jeune, sujet âgé ou sujet avec comorbidité(s)	<b>Amoxicilline</b>	Réévaluation
<b>Pas d'argument en faveur du pneumocoque</b>		
Sujet jeune	<b>Amoxicilline</b> ou <b>pristinamycine</b> ou <b>télithromycine</b>	Association à un <b>macrolide</b> ou substitution par <b>FQAP (lévofloxacine)</b> Réévaluation
Sujet âgé Sujet avec comorbidités	<b>Amoxicilline + acide clavulanique</b> ou <b>céfotaxime</b> ou <b>ceftriaxone</b> ou <b>FQAP (lévofloxacine)</b>	Association à un <b>macrolide</b> ou substitution par <b>FQAP (lévofloxacine)</b> Réévaluation

\* FQAP : fluoroquinolone anti-pneumococcique.



## PNEUMOPATHIES AIGÜES COMMUNAUTAIRES (4)

### *Pneumopathies aiguës communautaires graves (soins intensifs ou réanimation)*

<p>Sujet jeune Sujet âgé Sujet avec comorbidité(s)</p>	<p><b>C3G : céfotaxime IV : (CLAFORAN)</b> 3 à 12 g/j ou <b>ceftriaxone IV : (ROCÉPHINE)</b> 2 g/j + <b>macrolide IV : spiramycine (ROVAMYCINE)</b> 1,5 MUI x 3/j ou <b>FQAP IV : lévofloxacine (TAVANIC)</b> 500 à 1000 mg/j en 1 à 2 prises</p>
<p>Facteurs de risque de <i>Pseudomonas</i> : – bronchectasies – mucoviscidose ATCD d'infections à <i>Pseudomonas</i></p>	<p><math>\beta</math>-lactamine anti-<i>Pseudomonas</i> : – <b>pipéracilline + tazobactam</b> – ou <b>céfépime</b> – ou carbapénème + <b>aminoside (amikacine: 15 mg/kg/j)</b> maximum 7 j + <b>macrolide IV</b> ou <b>FQAP IV</b></p>

### Remarques

- Pneumocoque : 30 % de résistance aux **macrolides**, résistance naturelle aux **fluoroquinolones** (sauf 3<sup>e</sup> génération) et aux **aminosides** ! Action inconstante des **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération** orales.
- Pneumocoque de sensibilité diminuée : **amoxicilline** augmentée à 150 mg/kg/j, ou **ceftriaxone (ROCÉPHINE)**, 2 g/j.
- Si allergie aux  **$\beta$ -lactamines** (et en l'absence de signe de gravité) : **pristinamycine (PYOSTACINE)**, 1 g x 2 à 3/j, actif sur le pneumocoque et les « atypiques ».

### Cas particuliers

- Abcès du poumon : hospitaliser, recherches de BK, **AUGMENTIN** intraveineux initialement, traitement de 6 sem. au total.
- Pleurésie : hospitaliser pour ponction ; si purulent : drainage puis kinésithérapie (cf. Pleurésie).
- Patient VIH+ ou immunodéprimé : hospitaliser pour fibroscopie avec lavage bronchiolo-alvéolaire (examen bactériologique standard, BK, mycologique et para-

sitologique) pour éliminer une infection opportuniste.

- Si suspicion de pneumocystose grave, débuter en urgence **BACTRIM**, 3 amp. (perf.) x 4/j.
- Devant toute pneumopathie traînante et/ou excavée, penser à la tuberculose : recherches de BK + isolement.

### Mesures associées

- Kinésithérapie respiratoire.
- **Antalgiques** si besoin ; éviter les **antipyrétiques** dans les premières 48 h (efficacité jugée sur l'apyrexie !).
- Oxygène si hypoxémie (objectif : SpO<sub>2</sub> > 92 %).
- Réhydratation (boire > 2 L/j), intraveineuse dans les formes graves.
- **Antitussifs** contre-indiqués (risque d'encombrement).
- Arrêt du tabac.

### Prévention

Vaccination antipneumococcique (**PNEUMO 23**) des sujets à risque, tous les 5 ans.  
Vaccination grippale annuelle des sujets à risque.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge des infections respiratoires basses - Révision de la IV<sup>e</sup> conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse, *SPILF*, 2000  
[2] Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires basses de l'adulte et de l'enfant, *Afssaps*, 2005

## TUBERCULOSE (1)

### Principes du traitement

La notion de traitement correctement conduit et suivi est, avec la négativation durable des examens bactériologiques, le critère de guérison essentiel (quasi 100 % des cas dans ces conditions).

Le traitement ne peut être institué qu'après les **recherches bactériologiques répétées**, comprenant systématiquement, quel que soit le prélèvement (crachats, tubages gastriques, LCR, urines, etc.), un **examen direct** (recherche de BAAR), une **mise en culture** (milieu de Lowenstein ± autre milieu de culture plus rapide), et un **antibiogramme**.

Le traitement doit toujours associer plusieurs **antituberculeux** : 3 ou 4 initialement (et au moins pendant les 2 premiers mois), jusqu'aux résultats de l'antibiogramme, pour tenir compte d'une éventuelle résistance primaire ; 2 ensuite pour éviter l'apparition d'une résistance secondaire.

Utiliser les **antituberculeux** les plus actifs (bactéricides) sur les trois populations de BK à éliminer (intramacrophagiques, intracellulaires, et dans les cavernes).

Administrer le traitement :

- en **1 seule prise quotidienne à jeun le matin**,
- **sans discontinuer**,
- pendant un minimum de **6 mois**.

### Tuberculose pulmonaire commune

#### Bilan pré-thérapeutique

- Bilan hépatique complet (± sérologies des hépatites B et C), NFS, VS.
- Bilan rénal (urée, créatinine), uricémie.
- Si utilisation de l'**éthambutol** : examen ophtalmologique (champ visuel, vision des couleurs).
- Sérologie VIH (avec l'accord du patient).

#### Traitement médicamenteux

Le schéma thérapeutique recommandé actuellement est une **quadrithérapie** de 6 mois [1] :

- **Isoniazide (RIMIFON)** 3 à 5 mg/kg/j pendant 6 mois.
  - **Rifampicine (RIFADINE)** 10 mg/kg/j pendant 6 mois.
  - **Pyrazinamide (PIRILÈNE)** 20 à 30 mg/kg/j pendant 2 mois.
  - **Éthambutol (DEXAMBUTOL)** 15 à 20 mg/kg/j pendant 2 mois.
- Le schéma classique de 9 mois (**isoniazide + rifampicine** pendant 9 mois, avec **éthambutol** pendant 3 mois) est de moins en moins employé car : 1) il n'utilise pas le **PIRILÈNE** (anti-BK bactéricide majeur) et 2) il présente un risque accru d'inobservance lié à la durée plus longue du traitement. Reste utile dans certains cas (grossesse ou insuffisance hépatique) (cf. Schéma d'adaptation des doses).

#### Mesures associées

- Déclaration obligatoire à l'ARS (Agence régionale de santé).
- Demande de prise en charge à 100 %.
- Si patient bacillifère (BAAR+ à l'examen direct) : isolement (chambre seule, port de masque pour les visites et les soignants) pendant la phase de contagiosité (15 j).
- Arrêt de travail, en fonction de l'état clinique (en moyenne 2 mois).
- Recherche des sujets-contacts, qui doivent être examinés, avoir une IDR à la tuberculine, et une radiographie de thorax (éventuellement répétée après 3 mois).
- Risque d'inefficacité de la contraception orale, conseiller une contraception mécanique.
- En cas de corticothérapie au long cours, il est recommandé d'augmenter les doses de corticoïdes de 30 à 50 % du fait de l'induction enzymatique [1].

#### Informations/conseils au patient

- Prise du traitement tous les jours, le matin à jeun, 30 min avant le petit-déjeuner.
- Pas d'autre prise médicamenteuse sans avis médical ; ne pas boire d'alcool.
- Couleur orangée des urines, des larmes.
- Consulter en cas de signes digestifs, ictère, éruption cutanée, paresthésies, etc.

## ANTITUBERCULEUX (1) – ANTIBIOTIQUES (1)

## ■ Isoniazide

RIMIFON					
Tuberculose chez l'adulte : 4-5 mg/kg/j en 1 prise le matin à jeun (en général : 2 cp./j) ou perf. IV ou IM (enfant : 10 mg/kg/j)	200 cp. 50 mg	43,02	I	65 %	0,22
	100 cp. 150 mg	49,57	I	65 %	0,50
	6 amp. 500 mg/5 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antituberculeux majeur, bactéricide, avec très bonne diffusion tissulaire, pénétration intracellulaire ; catabolisation hépatique par N-acétylation (génétiquement déterminée) ; dose idéale = 3 mg/kg chez acétylateurs lents (le plus fréquent en Europe), 6 mg/kg chez acétylateurs rapides ; taux sérique efficace : 1 à 2 µg/mL à la 3<sup>e</sup> h.

## INDICATIONS

Tuberculose (en association avec d'autres **anti-tuberculeux**) ; chimioprophylaxie primaire ou secondaire de la tuberculose ; traitement des infections à mycobactéries atypiques sensibles (*M. kansasii*).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'**isoniazide** (rare).  
Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : éviter au 1<sup>er</sup> trimestre (sauf nécessité) ; adjoindre de la **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD)**.

**Allaitement** : éviter (passage important dans le lait maternel).

Prise unique quotidienne le matin, à jeun (attendre 30 min pour déjeuner).

Insuffisance rénale : réduire les doses initiales de moitié (adapter à l'isoniazidémie).

Surveillance régulière (x 1/sem. le 1<sup>er</sup> mois, puis x 1/mois) des transaminases : si > 3N, diminuer de moitié la dose ; si > 6N, arrêt.

Prudence en cas d'antécédents convulsifs ou psychiatriques.

Ne pas boire d'alcool.

Chez l'éthylique, la femme enceinte, les insuffisants rénaux, patients dénutris, infectés par le VIH ou ayant une neuropathie existante, adjoindre : **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD, 50 mg/j)** en prévention des neuropathies.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, épigastralgies.

Hépatotoxicité : élévation fréquente des transaminases ; hépatite cytolytique plus rare, généralement aiguë (avec ou sans ictère, réversible à l'arrêt), pouvant être sévère ; favorisée par la **rifampicine** (inducteur enzymatique), le **pyrazinamide**, l'alcoolisme.

Neuropathies (par carence en vit. B6) périphériques, annoncées par des paresthésies distales, favorisées par la dénutrition, l'alcoolisme (et acétylateurs lents) ; troubles psychiques (insomnie, euphorie, excitation, accès maniaques, délires aigus, surtout en association avec le **disulfirame**, l'**éthionamide**, ou le **niridazole**) ; plus rarement, convulsions, névrite optique.

Réactions d'hypersensibilité (très rares) : fièvre, éruption cutanée, acné, éosinophilie.

Exceptionnels : algodystrophie (syndrome épaule-main), syndrome lupique, myalgies, arthralgies, anorexie.

Surdosage : vomissements, vertiges, hallucinations, troubles visuels, voire coma convulsif, hyperglycémie avec acidocétose. Nécessite réanimation, traitement symptomatique, **pyridoxine** à fortes doses.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indiqué** : **niridazole**.

**Déconseillé** : **phénytoïne** et **carbamazépine**, dont les taux sériques sont augmentés (adapter la posologie) ; **disulfirame** ; **anesthésiques** volatils halogénés (augmentent l'hépatotoxicité de l'**isoniazide**).

Utiliser avec précaution : corticoïdes (augmentation de leur efficacité, et diminution des taux sériques d'**isoniazide**) ; **kétoconazole** (dont le taux plasmatique est diminué) ; **griséofulvine**, **rifampicine**, **pyrazinamide**, et tout médicament hépatotoxique ou inducteur enzymatique (**barbiturique**).

**Topiques gastro-intestinaux** : intervalle de 2 h entre les prises.

## TUBERCULOSE (2)

### Surveillance

- Clinique et radiologique : consultation à J15, J30, M2, M3, M6 (puis après traitement : M9, M12).
- Transaminases : J4 et J8 (surtout si facteurs de risque hépatiques), J15, J30, puis 1 fois/mois ; et en urgence si signes digestifs ou ictère.
- Uricémie : si suspicion de goutte (constamment élevée, elle peut aider à surveiller l'observance).
- Radiographie de thorax : J15, J30, M2, M4, M6 (puis après traitement : M9, M12).
- Examen ophtalmologique si **éthambutol** (cf. Traitement médicamenteux) : J15, J30, M2.
- Dosages sériques des antibiotiques : uniquement en cas d'adaptation à une insuffisance (rénale ou hépatique), ou si l'on suspecte une inobservance, une malabsorption digestive, ou une interaction médicamenteuse.

### Adaptation du schéma thérapeutique [1]

#### Chez l'éthylique

- Adjoindre de la **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD, 50 mg/j)** en prévention des neuropathies.

#### Chez l'insuffisant hépatique

- **Pyrazinamide** contre-indiqué.
- Schéma de 9 mois (en débutant l'**isoniazide** à 3 mg/kg/j et la **rifampicine** à 5 mg/kg/j, à adapter aux taux sériques) ou de 6 mois en remplaçant la **pyrazinamide** par de la **streptomycine**.

#### Chez l'insuffisant rénal

- Adapter la dose d'**isoniazide** et de **pyrazinamide** aux taux sériques et à la clairance de la créatinine.
- Si clairance créatinine < 100 mL/min : donner 15 mg/kg/j.
- Si clairance créatinine < 70 mL/min : donner 10 mg/kg/j (+ dosages sériques).
- Si clairance créatinine < 30 mL/min : espacer les prises de **rifampicine**.

#### Chez la femme enceinte

- **Pyrazinamide** (et **streptomycine, fluoroquinolone**) contre-indiquée. Schéma de

9 mois sans **pyrazinamide** : **isoniazide** + **rifampicine** pendant 9 mois, et **éthambutol** pendant les 3 premiers mois ; **VITAMINE B6** 15 à 50 mg/j.

- En fin de grossesse : injection de **VITAMINE K1** (ainsi qu'au nouveau-né).

#### Chez le sujet VIH+

- Traitement standard (quadrithérapie : **isoniazide** + **rifampicine** + **pyrazinamide** + **éthambutol**), avec la même durée de traitement (6 mois).
- Risque accru de résistance aux **antituberculeux** et d'allergies médicamenteuses.

#### En cas de BK résistant

- Au moins 3 médicaments actifs en début de traitement, traitement d'au moins 12 mois après négativation des cultures.
- Prise en charge en milieu spécialisé, isolement (suspicion de résistance secondaire) ; le traitement est souvent prolongé, et peut faire appel à des **antituberculeux** de 2<sup>e</sup> ligne (**amikacine, ofloxacine, clofazimine, éthionamide, moxifloxacine, acide para-aminosalicylique, cyclosérine, capréomycine**, etc.).
- Le choix des antibiotiques sera adapté à l'antibiogramme.

#### Pleurésie tuberculeuse

- Même traitement médicamenteux.
- Évacuation de l'épanchement (après biopsie pleurale, permettant de faire le diagnostic).
- Kinésithérapie pleurale prolongée (3 à 6 mois).

#### Tuberculose sous anti-TNF

Traitement standard et arrêt de l'**anti-TNF**.

#### Chez l'enfant

Schéma de 9 mois : **isoniazide** + **rifampicine** 9 mois et **pyrazinamide** 3 mois sans **éthambutol**.

## ANTITUBERCULEUX (2) – ANTIBIOTIQUES (2)

## ■ Rifampicine

<b>RIFADINE</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 10 mg/kg/j en une prise le matin à jeun (en général 2 gél./j) ou perf. IV lente (1 h 30) dans 250 mL G5 %	8 gél. 300 mg	5,87	I	65 %	0,73
	30 gél. 300 mg	17,08	I	65 %	0,57
	60 gél. 300 mg	HOP	I		
	24 c-mes. 100 mg (susp. buv. 120 mL)	6,89	I	65 %	0,29
	1 amp. pour perf. 600 mg	6,98	I	65 %	6,98
<b>RIMACTAN</b>					
Idem <b>RIFADINE</b>	30 gél. 300 mg	14,74	I	65 %	0,49

## PROPRIÉTÉS

Antituberculeux majeur (< 1 % de résistance primaire), activité bactéricide intra- et extracellulaire (également antilépreux, antimycobactéries atypiques, et bactéricide sur cocci Gram+ et cocci Gram-, *Listeria monocytogenes*, *Brucella*, *Legionella pneumophila*, *Chlamydia trachomatis*, entre autres) ; excellente diffusion tissulaire (surtout poumons, foie, reins) ; désacétylation hépatique, auto-induction enzymatique.

## INDICATIONS

Tuberculose (en association avec d'autres **anti-tuberculeux**) ; chimioprophylaxie antituberculeuse (+ **isoniazide**) ; autres infections à mycobactéries atypiques sensibles ; lèpre (polythérapie) ; brucellose ; infections sévères (polythérapie) à bactéries sensibles (dont légionellose) ; prophylaxie des méningites à méningocoque.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **rifamycine** ; porphyrie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** (dernières semaines) : **VITAMINE K1** chez la mère en fin de grossesse et l'enfant à la naissance (prévention de syndrome hémorragique) ; **allaitement** : éviter.

Pas de prise discontinue (risque d'hypersensibilité).

Insuffisance hépatique : débiter à 5 mg/kg/j (max. 900 mg/j), avec rifampicinémie.

Insuffisance rénale avec clairance < 30 mL/min : espacer les prises.

Surveiller : bilan hépatique et NFS-plaquettes (à J8, J30, puis x 1/mois).

La forme buvable contient du sucre (2 g/c-mes.) et des sulfites (risque d'allergie).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration rouge des urines (= observance !), crachats, larmes, lentilles de contact.

Nausées, vomissements, troubles gastro-intestinaux ; perturbation du cycle menstruel.

Manifestations allergiques (surtout si prise discontinue) : fièvre, prurit, urticaire, syndrome grippal, dyspnée asthmatiforme, collapsus, thrombopénie (rares cas de purpura : arrêt du traitement), éosinophilie, leucopénie, anémie hémolytique.

Hépatotoxicité faible en monothérapie, mais augmentation de l'hépatotoxicité de l'**isoniazide**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

C'est un inducteur enzymatique !

*Contre-indiqué* : **didanosine**.

*Déconseillée* : contraception orale (diminution de son efficacité).

Associer avec précaution (en raison de l'induction enzymatique, diminuant l'efficacité) : anticoagulants oraux, **inhibiteurs calciques**, **quinidiques** et **disopyramide**, **digitoxine**, **ciclosporine**, **gluco-** et **minéralocorticoïdes**, **fluconazole**, **itraconazole**, **kétoconazole**, hormones thyroïdiennes, **méthadone**, **phénytoïne**, **terbinafine**, **théophylline**, **tolbutamide** (**sulfamides hypoglycémisants**), **bêtabloquants** à biotransformation hépatique principale (**alprénolol**, **métoprolol**, **propranolol**).

Augmentation de l'hépatotoxicité de l'**isoniazide** : surveillance clinico-biologique.

**TUBERCULOSE (3)****Traitement des atteintes extrapulmonaires [1]**

- En cas d'atteinte pleurale, péricardique, ganglionnaire ou osseuse : traitement standard de 6 mois.
- En cas d'atteinte méningée : traitement standard pour une durée prolongée de 9 à 12 mois.
- En cas de péricardite, d'atteinte neuro-méningée, de miliaire hypoxémiant et de tuberculome cérébral : une corticothérapie associée au traitement antituberculeux est recommandée.

**Traitements de la primo-infection tuberculeuse (PIT) : chimioprophylaxie secondaire**

PIT latente :

- **isoniazide** (5 mg/kg/j) pendant 6 à 9 mois ;

– ou **isoniazide** (5 mg/kg/j) et **rifampicine** (10 mg/kg/j) pendant 3 mois.

PIT patente : traitement identique à celui de la tuberculose maladie.

**Traitement préventif des sujets contacts : chimioprophylaxie primaire**

Indications : traitement préventif des sujets fragiles en contact avec un sujet tuberculeux bacillifère (nourrissons, jeunes enfants, immunodéprimés).

Schéma : **isoniazide** 3 à 5 mg/kg/jour pendant 6 mois.

## ANTITUBERCULEUX (3) – ANTIBIOTIQUES (3)

## ■ Rifabutine

ANSATIPINE					
Tuberculose multirésistante : 3 à 4 gél. x 1/j	30 gél. 150 mg	104,05	I	65 %	3,47
Prévention des infections à <i>Mycobacterium avium complex</i> (MAC) chez les patients VIH+ (CD4 < 100/mm <sup>3</sup> ) : 2 gél. x 1/j					

## PROPRIÉTÉS

Antimycobactérien bactériostatique, actif sur le BK même multirésistant (1/3 des souches résistant à la **rifampicine** sont sensibles à la **rifabutine**) et les mycobactéries atypiques (*M. fortuitum*, *M. xenopi*, *M. kansasii*, *M. avium intracellulare*) ; diffusion ubiquitaire (sauf cerveau) ; pénétration intracellulaire ; élimination principalement urinaire ; demi-vie = 40 h.

## INDICATIONS

Tuberculose multirésistante, en particulier à la **rifampicine** (en association avec d'autres **antituberculeux**) ; prévention des infections à *Mycobacterium avium complex* (MAC) chez les patients VIH+ avec CD4 < 100/mm<sup>3</sup>.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **rifamycine**.  
Insuffisance rénale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : éviter par précaution (médicament nouveau).

Avant d'instituer un traitement préventif des infections à MAC chez le patient VIH+, éliminer une infection à mycobactérie évolutive.

Insuffisance hépatique sévère : réduire la dose.  
Surveillance régulière : NFS-plaquettes, bilan hépatique.

Si association à la **clarithromycine** (ou autres

**macrolides**) ou au **fluconazole** : réduire la dose à 300 mg/j, et surveiller l'apparition éventuelle d'uvéite.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration rouge des urines (= observance), crachats, larmes, lentilles de contact.

Myalgies, arthralgies, rash cutané, fièvre.

Modification du goût (3 %).

Neutropénie (2 %) nécessitant l'arrêt ; thrombopénie, anémie.

Surtout en association avec d'autres **antituberculeux** : troubles digestifs (nausées, vomissements, dyspepsie) ; troubles hépatiques (augmentation des transaminases, ictère).

Exceptionnel : uvéite réversible, parfois sévère, lors d'utilisation de fortes doses, en association avec la **clarithromycine** ou autres **macrolides** ± **fluconazole**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

C'est un inducteur enzymatique (cependant beaucoup plus faiblement que la **rifampicine**) : donc il accélère le métabolisme des médicaments par le foie.

Déconseillée : contraception orale (envisager une autre méthode de contraception).

Associer avec précaution : **anticoagulants** oraux, **ciclosporine**, **digitoxine**, **corticoïdes** ; le **fluconazole** et la **clarithromycine** (ils augmentent les taux sériques de **rifabutine**).

## TUBERCULOSE (4)

### Conduite à tenir en cas d'élévation des transaminases sous traitement [1]

- *Transaminases : absence de modifications, surveillance rapprochée.*
- *Transaminases entre 3 et 6N : arrêt définitif du **pyrazinamide** et prolongation du traitement de 3 mois pour obtenir un schéma de 9 mois (**isoniazide**, **rifampicine**, **éthambutol**).*
- *Transaminases > 6N :*
  - arrêt du traitement antituberculeux > 48 h ;
  - arrêt définitif du **pyrazinamide**, reprise à demi-dose de l'**isoniazide** après correction des transaminases ;
  - surveillance ++.
- *Hépatite ou insuffisance hépato-cellulaire sévère :*
  - arrêt d'**isoniazide**, **rifampicine** et **pyrazinamide** ;
  - reprise progressive de l'**isoniazide** et de la **rifampicine** ;
  - contre-indication définitive au **pyrazinamide**.

### Intradermoréaction à la tuberculine - Circulaire du 11/10/2004 [2]

« Seul test tuberculinique mesurable validé ».

#### Technique

Réalisée par un médecin.

Injection intradermique stricte (peau d'orange).

Face antérieure de l'avant-bras.

5 U de tuberculine, soit 0,1 mL (l'IDR à 10 U n'est plus recommandée).

Mesure de l'induration palpable (en mm) entre la 48<sup>e</sup> et la 72<sup>e</sup> h.

#### Interprétations (> 15 ans) en tenant compte du statut vaccinal du sujet

- IDR
- IDR entre 5 et 9 mm : positive. « Réaction due au BCG ou à une tuberculose mais non en faveur d'une infection récente. »;
- IDR entre 10 et 14 mm : positive. « Tuberculose probable. Le contexte aide à définir l'ancienneté. »;
- IDR ≥ 15 mm : positive. « Tuberculose probablement récente. »

#### Remarques

De manière générale chez l'adulte, la primo-vaccination par le BCG est suffisamment ancienne pour ne pas interférer dans l'interprétation de l'IDR.

Plus l'IDR est positive, plus elle est en faveur d'une infection récente.

#### Faux négatifs

Phase « ante-allergique » dans les 12 sem. suivant le contact.

Infections virales ou bactériennes concomitantes.

Miliaire tuberculeuse.

Anergie (diminution de la réaction d'hypersensibilité retardée) : sarcoïdose, hémopathies malignes, cancer, dénutrition, chimiothérapie, corticothérapie au long cours.

#### Faux positifs

Erreur technique.

IDR rapprochée dans le temps.



## ANTITUBERCULEUX (4) – ANTIBIOTIQUES (4)

## ■ Pyrazinamide

<b>PIRILÈNE</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 30 mg/kg/j en 1 prise le matin à jeun (max. 2 g/j) soit en général 3 à 4 cp./j	60 cp. séc. 500 mg	13,04	I	65 %	0,22

**PROPRIÉTÉS**

Antituberculeux bactéricide, surtout sur les BK intracellulaires (car milieu acide : macrophages), inactif sur les mycobactéries atypiques et *M. bovis* ; bonne diffusion tissulaire (et LCR) et pénétration intracellulaire ; métabolisation hépatique en dérivé actif, élimination urinaire ; demi-vie = 9 h.

**INDICATIONS**

Tuberculose sous toutes ses formes (en association avec d'autres **antituberculeux**).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement** (aucune donnée !).  
Insuffisance hépatique.  
Hyperuricémie non contrôlée.  
Insuffisance rénale.  
Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique minimal : bilan hépatique, uricémie, bilan rénal.  
Surveillance des transaminases (surtout si éthylisme ou antécédent d'hépatite) à J8, J15, J21, J30, J45, J60 et si apparition de troubles diges-

tifs ou subictère ; si transaminases > 3N, arrêt immédiat du **PIRILÈNE**.

Surveillance mensuelle de la fonction rénale.  
Ne pas dépasser 2 mois de traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hépatite cytolytique : élévation des transaminases fréquente ; rares cas d'hépatites sévères voire fulminantes (surtout en association avec l'**isoniazide**) ; l'apparition de signes digestifs (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales), d'asthénie marquée, de fièvre, ou *a fortiori* de subictère, doit alerter : faire en urgence bilan hépatique avec TP.  
Hyperuricémie très fréquente (> 50 % des cas, attestant de l'observance) [voir aussi : Précautions d'emploi] ; arthralgies dans 1 % des cas, répondant à un traitement symptomatique (**aspirine**) ; si arthralgie persistante ou goutteuse malgré uricosurique : arrêt du **PIRILÈNE**.  
Rare : rash, érythème, photosensibilisation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associer avec précaution : **isoniazide** (addition de la toxicité hépatique), ainsi que tout autre médicament hépatotoxique, **éthionamide**.

## TUBERCULOSE (5)

### Recommandations concernant le BCG : avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (2007)

**Suspension, chez l'enfant et l'adolescent, de l'obligation vaccinale par le vaccin BCG.**

**Vaccination BCG fortement recommandée chez les enfants à risque élevé de tuberculose, qui répondent au moins à l'un des critères suivants :**

- enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse\* ;
- enfant dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays ;
- enfant devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays ;
- enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
- enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
- enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME, etc.) ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de forte endémie.

**Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être vacciné sauf contre-indication.**

**Cette vaccination est réalisée par un(e) médecin, un(e) sage-femme ou par un(e) infirmier(e) sur prescription médicale.**

**Réalisation de la vaccination :**

- chez les enfants à risque élevé de tuberculose (définis ci-dessus), la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si possible à la naissance ou au cours du premier mois de vie, sans nécessité d'IDR à la tuberculine préalable ;
- chez des enfants appartenant à l'une des catégories à risque élevée définies ci-dessus et non vaccinés, la vaccination doit être réalisée jusqu'à l'âge de 15 ans ;
- l'IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de l'âge de 3 mois afin de rechercher une infection liée à une contamination après la naissance ;
- le BCG est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire. Chez les enfants nés de mère infectée par le VIH, la vaccination doit être reportée jusqu'à obtention de la preuve de l'absence d'infection de l'enfant par le VIH ;
- en dehors des professionnels soumis à l'obligation vaccinale, la vaccination BCG n'est pas recommandée après l'âge de 15 ans.

### Tests IGRA (test de détection de l'interféron $\gamma$ : *Interferon Gamma Release Assay* ou Quantiféron [3])

Sauf cas particuliers, les tests immunologiques, IDR ou tests IGRA, ne doivent être uti-

lisés que pour le seul diagnostic de l'infection tuberculeuse latente et uniquement dans l'objectif de la traiter. La sensibilité est de l'ordre de 89 % et la spécificité de 97 %.

Il est recommandé d'utiliser les tests IGRA dans les situations suivantes :

1. pour le diagnostic de l'ITL (infection tuberculeuse latente) :
  - enquêtes autour d'un cas,
  - dépistage avant mise en route d'un traitement par anti-TNF $\alpha$  ou chez les patients infectés par le VIH,
  - personnels de santé avant l'embauche ;
2. pour le diagnostic de tuberculose maladie ;
- aide dans des cas difficiles (notamment les tuberculoses extra-pulmonaires).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la tuberculose, *SPLF*, 2004

[2] Circulaire DGS/SD5C n° 2004-373 du 11/10/2004 relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques, *DGS*, 2004

[3] Tuberculose et tests de détection de l'interféron gamma, *HSCP*, 2011

\* Continent africain dans son ensemble, continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-Orient, pays d'Amérique centrale et du Sud, pays d'Europe centrale et de l'Est y compris les pays de l'ex-URSS, Union Européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

## PNEUMOCONIOSES (1)

Ce sont des maladies respiratoires en rapport avec l'accumulation dans le parenchyme pulmonaire de particules inhalées ( $< 5 \mu\text{m}$ ), souvent fibrogènes.

Il s'agit surtout de silice, amiante, fer, souvent mixte.

### Généralités

#### Pas de traitement curatif spécifique !

Le traitement est uniquement symptomatique : oxygénothérapie en cas d'insuffisance respiratoire, prévention des complications (arrêt du tabac, vaccinations antigrippale et antipneumococcique, traitement précoce des surinfections, etc.).

Intérêt de la PRÉVENTION +++ :

- collective : contrôle de l'air ( $< 1 \text{ fibre/cm}^3$ ), interdiction de flocage, protection des zones contaminées, réglementation des déchets ;
- individuelle : port d'un masque protecteur, etc.

### Signes cliniques tardifs

Intérêt du DÉPISTAGE radiologique annuel ( $\pm$  EFR) chez les sujets exposés.

### Remarques

La recherche par un laboratoire spécialisé (« LEPI ») de particules dans le lavage bronchiolo-alvéolaire est utile au diagnostic, mais non nécessaire pour la reconnaissance (et réparation) de la maladie si l'exposition est évidente.

Le diagnostic est radiologique chez un

sujet exposé ; les épreuves fonctionnelles respiratoires servent à évaluer le handicap.

Le développement de ces pneumoconioses est souvent très lent, et peut survenir des années après l'exposition ; les tableaux de maladies professionnelles fixent cependant des « délais de prise en charge » théoriques (délai au-delà duquel la maladie ne serait plus considérée, *a priori*, comme liée à l'exposition, jugée trop ancienne) ; il est de 15 ans pour la silicose, 20 ans pour l'asbestose et 40 ans pour le mésothéliome.

### Silicose

Elle est liée à l'inhalation de dioxyde de silice.

C'est la plus fréquente des pneumoconioses en France.

Exposition à la silice chez les mineurs, dans les entreprises de sablage, chez les prothésistes dentaires.

#### Complications :

- tuberculose\*,
- mycobactérie atypique (*M. kansasii*),
- greffe aspergillaire,
- pneumothorax,
- nécrose aseptique d'une masse pseudotumorale,
- suppuration bronchique chronique,
- BPCO,
- hémoptysie,
- association à une sclérodémie (syndrome d'Erasmus),
- association à une polyarthrite rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet),
- insuffisance respiratoire chronique.

\* Complications ouvrant droit à réparation

## PNEUMOCONIOSES (2)

### Asbestose

C'est une fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de fibres d'amiante.

Métiers où l'exposition est la plus forte : construction navale, calorifugeage (électriciens et plombiers), plaquettes de frein, produits du ciment, industrie du textile.

D'autres pathologies sont liées à cette exposition (cf. Tableau : Cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) :

- plaques pleurales calcifiées ou non ;
- pleurésie exsudative bénigne (faire une thoracoscopie avec biopsies pour éliminer un mésothéliome I) ;
- mésothéliome malin ;
- cancer bronchopulmonaire (ouvrant droit à réparation même si tabagisme associé).

L'amiante est un puissant cofacteur carcinogène du tabac, responsable de cancers bronchopulmonaires.

### Béryllose

- C'est une granulomatose due à l'exposition au béryllium, reconnue comme maladie professionnelle.
- Le tableau, dans sa forme chronique, est proche de celui de la sarcoïdose.

- Elle est retrouvée chez les prothésistes dentaires et dans l'industrie de l'électronique et des céramiques.

### Réparation

Les pneumoconioses sont des maladies professionnelles indemnisables, c'est-à-dire ouvrant droit à réparation.

### Principe

Il y a présomption d'origine (surtout si les délais maximaux de prise en charge sont respectés).

En cas de maladie bien caractérisée, elle peut être reconnue même si les « délais de prise en charge » sont dépassés (et idem pour la durée minimale d'exposition I).

Seuls les salariés sont indemnisés.

### Types d'indemnisation

- Indemnité de changement d'emploi (si anomalie radiologique isolée).
- Soins gratuits (si en rapport avec l'affection).
- Rente, dont le taux est fixé en fonction de l'IPP (incapacité partielle permanente), si atteinte fonctionnelle.
- ITT (incapacité temporaire totale) lors des complications reconnues dans les tableaux.

### En pratique

1) Le médecin qui diagnostique la pneumoconiose doit faire un certificat médical descriptif en 3 exemplaires.

2) C'est au patient de faire la déclaration (accompagnée du certificat médical) auprès de son centre de Sécurité sociale, en détaillant l'exposition professionnelle.

3) Le médecin-conseil de ce centre constituera un dossier, pourra prendre l'avis d'un « médecin agréé en matière de pneumoconiose » ou transmettre le dossier au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) qui imposera son avis pour les cas les plus litigieux.

4) À l'issue de cette expertise, la maladie est reconnue et un taux d'IPP est proposé.

À noter qu'une enquête administrative est également menée pour retrouver l'employeur et confirmer l'exposition.

Une collaboration étroite avec le médecin du travail est nécessaire dans l'intérêt du patient (établissement du calendrier professionnel, aménagement du poste ou reclassement professionnel).

## MALADIES PROFESSIONNELLES LIÉES À UNE EXPOSITION À L'AMIANTE (1)

**Stratégie de surveillance médicale des personnes exposées ou ayant été exposées à l'amiante (extrait de la conférence de consensus de janvier 1999) [1]**

### Expositions fortes

Il est recommandé que l'organisation des bilans périodiques débute 10 ans après le début de l'exposition.

Le premier de ces bilans comporte :

- un examen clinique ;
- un scanner thoracique ;
- des EFR comportant une spirométrie et une courbe débit-volume.

Ces bilans doivent être répétés tous les 6 ans.

Dans l'intervalle doivent être organisés tous les 2 ans des bilans comportant :

- un examen clinique ;
- une radiographie thoracique.

### Expositions intermédiaires

Il est recommandé que l'organisation des bilans périodiques débute 20 ans après le début de l'exposition.

Le premier de ces bilans comporte :

- un examen clinique ;
- une radiographie thoracique, suivie, en cas d'anomalies et si nécessaire, d'un scanner thoracique ;

– des EFR comportant une spirométrie et une courbe débit-volume.

Puis tous les 2 ans et à 4 reprises, doit être entrepris un bilan comportant :

- un examen clinique ;
- une radiographie thoracique.

30 ans après le début de l'exposition, doit être entrepris un bilan comportant :

- un examen clinique ;
- un scanner thoracique ;
- des EFR comportant une spirométrie et une courbe débit-volume.

Ce bilan sera répété tous les 10 ans et, dans l'intervalle, doivent être réalisés tous les 2 ans des bilans comportant :

- un examen clinique ;
- une radiographie thoracique.

### Cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

Désignation de la maladie	Délai de prise charge	Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer bronchopulmonaire primitif	40 ans (sous réserve d'une exposition de 10 ans)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.</li> <li>– Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.</li> <li>– Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.</li> <li>– Travaux de retrait d'amiante.</li> <li>– Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants contenant de l'amiante.</li> <li>– Travaux de construction et de réparation navale.</li> <li>– Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.</li> <li>– Fabrication de matériels de friction.</li> <li>– Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</li> </ul>

### CONSENSUS

[1] Élaboration d'une stratégie de surveillance médicale clinique des personnes exposées à l'amiante, Ministère du Travail, 1999

## MALADIES PROFESSIONNELLES LIÉES À UNE EXPOSITION À L'AMIANTE (2)

### Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante \*

Désignation des maladies	Délai de prise charge	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E)
A - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.	35 ans (Sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)	Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante notamment : • extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.  Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrications suivantes : • amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
B - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : • Pleurésie exsudative  • Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique  • Épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus, soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atelectasie par enroulement. Ces anomalies constatées en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par un examen tomodensitométrique	35 ans (Sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) 40 ans  35 ans (Sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : • amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante ; déflocage.
C - Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.	35 ans (Sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
D - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.	40 ans	Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
E - Autres tumeurs pleurales primitives.	40 ans (Sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	

\* Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la cessation de l'exposition à l'amiante et la première constatation médicale de la maladie (cependant, même s'il n'est pas respecté, il faut faire une déclaration). La liste des travaux (colonne de droite) est indicative et reste donc ouverte (une déclaration doit être faite même si l'exposition à l'amiante s'est produite lors d'un travail ou d'un métier non mentionné ici).

## PNEUMOTHORAX (1)

Le diagnostic est clinico-radiologique, sur un cliché de thorax en inspiration.

La radio de thorax en expiration forcée peut être dangereuse (aggravation de la compression médiastinale, risque de rupture de bride) et ne doit donc être demandée que dans un 2<sup>e</sup> temps, si le pneumothorax n'est pas visible en inspiration. Son intérêt est limité.

### Circonstances de survenue

#### Pneumothorax spontané

- « Idiopathique bénin » : sujet jeune, longiligne ; souvent bien toléré.
- Ou sur poumon pathologique (tuberculose, pneumocystose, BPCO-emphysème, asthme aigu grave, histiocytose X, etc.) : drainage obligatoire.

Le tabac est un facteur de risque majeur (x 20) de survenue de pneumothorax.

#### Pneumothorax provoqué

- Traumatique : plaie du thorax, fracture de côte.
- Iatrogène : ponction pleurale (pneumothorax bénin le plus souvent), biopsie pleurale, biopsie pulmonaire trans-bronchique ou sous scanner, cathéter sous-clavier, ventilation assistée (surtout si PEEP : drainer en urgence !).

### Recherche des signes de gravité

#### Signes cliniques = tamponnade gazeuse

- 1) Détresse respiratoire : fréquence respiratoire > 25/min, dyspnée intense, cyanose, impossibilité de parler.
- 2) Signes cardiovasculaires : turgescence jugulaire, pouls paradoxal, fréquence cardiaque > 120/min, hypotension artérielle (PAS < 90 mmHg).
- 3) Signes neurologiques : troubles de la vigilance.

### Signes radiologiques

- Pneumothorax compressif avec déviation médiastinale.
- Bride (risque d'hémorragie) ou hémopneumothorax.
- Pneumothorax bilatéral.
- Poumon pathologique sous-jacent ou pneumothorax sur poumon unique.

L'existence d'un hémothorax associé est toujours un signe de gravité (risque de choc hémorragique).

### Conduite à tenir

Plusieurs situations se présentent.

#### Pneumothorax « suffocant »

Avec signes de compression (phénomène de soupape).

- « Décompression » à l'aiguille (IM) en extrême urgence : ponction 2<sup>e</sup> espace intercostal, ligne médioclaviculaire ; on laisse l'aiguille en place, faisant communiquer la cavité pleurale avec l'air ambiant (but : ramener la surpression pleurale à la pression atmosphérique) jusqu'à la mise en place d'un drain.
- Oxygène 6-8 L/min, avec contrôle des gaz du sang.
- Perfusion « garde-veine » et éventuel remplissage vasculaire (surtout si hémothorax associé).

#### Pneumothorax complet, ≥ 3 cm de la paroi, et/ou mal toléré, et/ou sur poumon pathologique

- La pose d'un drain est indiquée.
- O<sub>2</sub> en fonction de la tolérance.
- Voie d'abord veineuse.

## PNEUMOTHORAX (2)

**Pneumothorax idiopathique récent (< 48 h), complet bien toléré, < 3 cm de la paroi (< 20 % du volume hémithoracique), sur poumon sain, sans signe de gravité clinique ou radiologique**

Plusieurs possibilités :

- Surveillance simple sans drainage le plus souvent :
  - repos strict,
  - arrêt du tabac,
  - **antitussif** type **codéine (NÉO-CODION)** : 1 càs x 3-4/j,
  - **antalgiques** type **paracétamol (DOLIPRANE)**, jusqu'à 6 cp./j,
  - surveillance radiologique quotidienne (le poumon revient à la paroi en quelques jours).
- Drainage par drain classique ou *Pleurocath* (drain de 2-3 mm de calibre, à poser dans le 2<sup>e</sup> espace intercostal, ligne médio-claviculaire).
- Exsufflation à l'aiguille (peu utilisée en France).

### Dans certains cas

Si le patient est bien inséré socialement, entouré, et a un premier pneumothorax minime, parfaitement bien toléré, la mise au repos est possible à domicile :

- bien informer le patient du risque d'aggravation : rappeler un médecin d'urgence

en cas de dyspnée ou de nouvelle douleur ;

- le revoir avec un cliché de thorax à 24 h, 72 h, puis en fonction de l'évolution (ex. : J5, J10).

Dans tous les autres cas, une hospitalisation est nécessaire.

En l'absence d'anomalie radiologique parenchymateuse, chez un sujet jeune, aucun bilan n'est nécessaire après un 1<sup>er</sup> pneumothorax.

En cas de récurrence, on pourra réaliser un scanner thoracique en coupes fines (recherche d'emphysème) et des EFR.

### Indications chirurgicales = symphyse pleurale

La symphyse pleurale (accolement des 2 feuillets) est le plus souvent réalisée par abrasion pleurale sous vidéothoracoscopie (efficacité > 95 %). Elle peut être réalisée d'emblée ou après drainage en fonction de la tolérance et de la facilité d'accès à une prise en charge chirurgicale.

Indications indiscutables :

- récurrence contralatérale d'un pneumothorax spontané,
- 3<sup>e</sup> épisode homolatéral (2<sup>e</sup> récurrence),
- persistance d'un bullage > 5 j.

Indications à discuter :

- après le 2<sup>e</sup> épisode homolatéral (1<sup>re</sup> récurrence),
- profession ou activité à risque.



## PNEUMOTHORAX (3)

### Mesures associées

#### Informier le patient

Risque de récurrence dans 1/3 des cas, homolatéral (le plus souvent) ou contralatéral, surtout dans les 2 ans qui suivent. Augmentation du risque en cas de tabagisme actif.

#### Conseils

- Arrêt définitif du tabac : consultation antitabac, **substituts nicotiniques**.

- Éviter : instruments à vent, et autres efforts à glotte fermée.

- Voyages en avion déconseillés le 1<sup>er</sup> mois.

- « Contre-indication » des activités où la survenue d'un pneumothorax aurait des conséquences dramatiques : plongée sous-marine avec bouteilles, très haute montagne, parachutisme.

### Drainage d'un pneumothorax

Prélever en urgence : NFS-plaquettes, groupage sanguin, hémostase.

Conditions d'asepsie, anesthésie locale à la **XYLOCAINE** 1 % (longer le bord supérieur de la côte inférieure).

Mise en place d'un drain dans le 5<sup>e</sup> espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure (ou 2<sup>e</sup> espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire), dirigé vers le haut.

À relier au système d'aspiration (- 20 à - 30 cm d'eau) → douleur pleurale (épaule) et quintes de toux fréquentes ; surveiller le bullage, traire le drain toutes les 8 h (pour s'assurer qu'il n'est pas bouché).

Radio de thorax de contrôle (immédiatement puis au moins 1/j).

La fin du bullage (le plus souvent en quelques minutes) traduit le retour du poumon à la paroi (à confirmer par la radio).

24 h après l'arrêt du bullage, clamber le drain.

Puis attendre encore 12 à 24 h : si le poumon ne s'est pas redécollé, retirer le drain (si récurrence après clampage, remettre en aspiration, etc.).

Rarement, le bullage persiste plusieurs jours (= persistance d'une brèche) : envisager la chirurgie après 5 j de bullage persistant.

## ÉPANCHEMENT PLEURAL LIQUIDIEN (1)

### Rappel

L'épanchement pleural liquidien est défini par la présence de liquide dans la grande cavité pleurale.

La présence d'un épanchement pleural est toujours pathologique.

Le diagnostic repose sur l'analyse des caractéristiques macroscopiques et microscopiques du liquide pleural.

Diagnostic clinique = « trépied pleurétique » :

- auscultation : diminution ou abolition du murmure vésiculaire;
- percussion : matité liquidienne, déclive;
- palpation : diminution ou abolition des vibrations vocales.

### Examens complémentaires

Radiographie de thorax face + profil :

- opacité liquidienne, dense, homogène, déclive ;
- disparition du cul-de-sac pleural, ligne de Damoiseau.

Une ponction pleurale exploratrice doit être réalisée devant tout épanchement (lorsque la quantité de liquide le permet).

• *Analyse macroscopique* :

- purulent : pleurésie purulente ;

– sang : hémithorax ;

– clair, jaune citrin : exsudat ou transsudat ;

– séro-hématique : exsudat le plus souvent ;

– aspect blanc lactescent : chylothorax (TG > 5 g/L).

• *Biochimie* : protides, LDH, glucose, pH.

• *Cytologie* : numération et formule, recherche de cellules anormales.

• *Bactériologie standard*.

• *Recherche de BK* : examen direct et mise en culture.

Autres examens selon le contexte :

– biologie : NFS, ionogramme, urée, créatinine, LDH, protides, VS, CRP, hémocultures si fièvre ;

– TDM thoracique/fibroscopie bronchique selon les étiologies ;

– biopsie pleurale : à l'aiguille au lit du malade ou vidéothoroscopie ;

– IDR à la tuberculine ;

– bilan immunologique : anticorps anti-nucléaires, facteur rhumatoïde.

### Pleurésies à liquide clair

En cas de pleurésie à liquide clair ou séro-hématique, il est nécessaire de déterminer s'il s'agit d'un exsudat ou d'un transsudat.

**Critères de Light (1972) : la présence d'au moins un seul critère définit un exsudat**

Critère	EXSUDAT	TRANSSUDAT
Protides pleural/sérique	> 0,5	≤ 0,5
LDH pleural/sérique	> 0,6	≤ 0,6
LDH (UI/L)	> 200	≤ 200

## ÉPANCHEMENT PLEURAL LIQUIDIEN (2)

### Diagnostic étiologique

#### ► Transsudats

- Insuffisance cardiaque gauche.
- Syndrome néphrotique.
- Insuffisance hépatocellulaire.
- Syndrome de Demons-Meigs secondaire à une tumeur bénigne de l'ovaire.
- Autres : péricardite chronique constrictive, myxoœdème.

#### ► Exsudats

- Pleurésie tuberculeuse : à prédominance lymphocytaire, glycopleurie basse.
- Pleurésies parapneumoniques : liquide stérile, riche en PNN altérés. Risque d'évolution défavorable : pH < 7,2, LDH > 1 000 UI/L, glycopleurie basse.
- Pleurésies néoplasiques : pleurésies métastatiques, mésothéliome pleural, hémopathies malignes.
- Pleurésie bénigne liée à l'amiante.
- Embolie pulmonaire : épanchement de faible abondance, séro-hématique.
- Collagénoses : polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé.
- Causes digestives : pancréatite, épanchement réactionnel en regard d'un foyer sous-phrénique, rupture œsophagienne.
- Syndrome de Dressler.
- Iatrogènes : lupus induit, radiothérapie.
- Pleurésie virale : diagnostic d'exclusion.

En cas d'exsudat, l'examen clé est alors la **biopsie pleurale** (à l'aveugle), à la recherche principalement d'une tuberculose ou d'une néoplasie (surtout après 45 ans) ; en cas de négativité, on pourra alors discuter une **vidéothoroscopie** avec biopsies multiples dirigées.

### Pleurésies purulentes

Elles sont le plus souvent la complication d'une pneumopathie bactérienne, sur un terrain particulier (éthylisme, mauvais état bucco-dentaire, diabète, cancer, etc.).

En plus du syndrome d'épanchement liquidien, il existe un syndrome infectieux ( $T^{\circ} > 39^{\circ} C$ , frissons, altération franche de l'état général) associé à une douleur basithoracique et à de la toux.

La ponction pleurale ramène un liquide purulent, parfois un liquide louche exsudatif avec polynucléaires neutrophiles altérés.

Une fibroscopie bronchique et un scanner thoracique doivent être réalisés afin d'éliminer une pathologie pulmonaire sous-jacente, en particulier un cancer bronchique.

### Chylothorax

Il s'agit d'une pleurésie contenant des chylomicrons. Le chylothorax est le plus souvent secondaire à un obstacle ou une lésion des voies lymphatiques (tumeur médiastinale, plaie du canal thoracique, lymphangioléiomyomatose).

La ponction pleurale retrouve un liquide d'aspect laiteux avec des triglycérides > 5 g/L.

## ÉPANCHEMENT PLEURAL LIQUIDIEN (3)

### Principes du traitement

En cas de mauvaise tolérance : oxygénothérapie, remplissage vasculaire, évacuation en urgence (ponction puis drainage).

#### Exsudats

Traitement étiologique : le traitement est en premier lieu celui de la pathologie responsable.

Traitement spécifique :

- évacuation la plus complète possible de l'épanchement pleural (ponction, drainage) ;
- kinésithérapie pleurale prolongée.

En cas d'épanchement récidivant, en particulier d'origine néoplasique, il est possible de réaliser une symphyse pleurale :

- talcage sous vidéo-thoroscopie ;
- talcage par l'orifice du drain au lit du malade (efficacité inconstante).

#### Transsudats

Le traitement est principalement étiologique. Il est parfois nécessaire de réaliser des ponctions pleurales évacuatrices itératives en cas de mauvaise tolérance respi-

ratoire. Il n'y a pas en général d'indication au drainage thoracique.

#### Pleurésie purulente

Il s'agit d'une urgence thérapeutique.

Traitement antibiotique probabiliste, efficace sur les germes anaérobies, secondairement adapté à l'antibiogramme : **amoxicilline + acide clavulanique, AUGMENTIN** 1 g x 3/j pour une durée de 4 à 6 sem.

Drainage thoracique parfois associé à des lavages de la cavité pleurale (sérum physiologique + **BÉTADINE**) ou à une fibrinolyse intrapleurale en de pleurésie enkystée (**urokinase**).

Kinésithérapie pleurale prolongée, elle vise à réduire les séquelles fibreuses pleurales.

Rechercher des foyers infectieux (dents ++) et les éradiquer.

#### Chylothorax

Ponctions pleurales répétées.

Régime pauvre en graisse ne contenant que des triglycérides à chaîne moyenne, voire nutrition parentérale.

Parfois traitement chirurgical : ligature ou suture du canal thoracique.

### Ponction pleurale

- Prémédication éventuelle (en l'absence de contre-indication) par **ATROPINE** 0,5 mg IM ( $\pm$  **VALIUM** 1/2 amp. en sublingual).
- Malade assis (dos vertical) au bord du lit, les bras appuyés en avant sur sa tablette de lit, haut située ; on se place dans son dos.
- Désinfection ; gants stériles.
- Anesthésie locale si l'on souhaite faire une évacuation du liquide, ou si l'on doit ponctionner avec un gros trocart : **XYLOCAÏNE** 1 % à injecter tout le long du trajet de la ponction.
- Ponction avec seringue de 20 mL adaptée à une aiguille **IM longue** ; en **pleine matité** (percussion !), souvent 1 espace sous la pointe de l'omoplate, **perpendiculairement** à la paroi, au ras du **bord supérieur de la côte inférieure** de l'espace intercostal :
  - en maintenant constamment une **dépression** dans la seringue (tirer sur le piston juste après le passage de la peau), on arrête de progresser dès que le liquide afflue dans la seringue (= on a franchi la plèvre pariétale) ;
  - on aspire alors dans la seringue 20 mL de liquide (ponction exploratrice), puis on retire l'ensemble seringue-aiguille d'un geste sec, et on « noie » les plans de la paroi en la « masant » ; puis pansement simple.
- **Ponction évacuatrice** : on adapte, entre l'aiguille et la seringue, un robinet à 3 voies relié à une tubulure, branchée elle-même à un bocal d'aspiration ; celle-ci doit être douce (- 20 à - 30 cm d'eau).

Ne pas retirer plus de 1 à 1,5 L à chaque ponction ; arrêter en cas de douleur vive, de dyspnée, de quinte de toux, de malaise.

- Faire **TOUJOURS** une **radio de thorax** de contrôle après la ponction !

## CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (1)

### Rappel épidémiologique

2<sup>e</sup> cause de cancer chez l'homme et 4<sup>e</sup> chez la femme en France.

Augmentation avec l'âge (âge médian 60-65 ans) avec prédominance masculine (sex ratio 6/1), mais augmentation nette de l'incidence chez la femme.

1<sup>re</sup> cause de mortalité par cancer en France (27 000/an) et dans le monde, incidence proche de la mortalité (28 000 nouveaux cas par an en France).

Survie à 5 ans tous stades confondus : 10 %.

### Facteurs de risque

#### Tabac = facteur de risque principal

Carcinogène puissant (> 40 substances cancérogènes) et facteur potentialisant les autres carcinogènes (association tabac-amiante ++).

Risque majeur en cas de tabagisme actif (risque multiplié par 5 à 100 en fonction de la consommation) et en cas de tabagisme passif (x 1,3).

90 % des cas sont des fumeurs.

La durée du tabagisme augmente plus le risque relatif que le nombre de cigarettes/j ; il n'existe pas de seuil en dessous duquel fumer n'augmenterait pas le risque de cancer bronchique (risque augmenté même par le tabagisme passif) ; après sevrage, le risque diminue au bout de 5 ans, sans rejoindre celui des non-fumeurs !

Tous les types histologiques de cancer bronchique sont concernés.

#### Autres facteurs de risque (exposition professionnelle ++)

- Amiante : risque relatif x 10 ; synergie avec le tabac : risque relatif 100 (cf. Pneumoconioses).
- Autre exposition professionnelle : radiations ionisantes (minerais radioactifs), fer, chrome, arsenic, bischlorométhyléther, nickel, etc.

### Éléments intervenant dans la décision thérapeutique

#### 2 types histologiques

- Cancer bronchique non à petites cellules : 80 % (CBNPC) :
  - épidermoïde (30-40 %),
  - adénocarcinome (30-40 %) : en augmentation, surtout chez les femmes,
  - grandes cellules/indifférencié (5-10 %).
- Cancer bronchique à petites cellules : 20 % (CBPC).

#### Stade de la maladie

- Extension métastatique.
- Classification TNM (pour les « non à petites cellules »).

#### État général

Échelle de performance, comorbidités.

Score OMS (PS : *Performance Status*) :

- 0 : activité normale ;
- 1 : patient ambulatoire ;
- 2 : alitement < 50 % du temps ;
- 3 : alitement > 50 % du temps ;
- 4 : patient confiné au lit.

### Examens complémentaires

#### Diagnostic histologique

- Fibroscopie bronchique avec biopsies bronchiques (une fibroscopie bronchique normale n'élimine pas le diagnostic de cancer bronchique).
- En cas de négativité : ponction-biopsie transpariétale sous TDM, biopsie d'une lésion à distance, médiastinoscopie ou vidéothoracoscopie.

#### Bilan d'extension

- TDM abdominale et surrénales ± échographie abdominale.
- TDM cérébrale parfois ± IRM cérébrale.
- Scintigraphie osseuse si douleurs osseuses.
- Tomographie par émission de positons (TEP).
- Biopsie ostéo-médullaire en cas de CBPC localisé au thorax.

Les marqueurs sériques ne doivent pas être dosés pour le diagnostic de cancer du poumon.

## CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (2) – NON À PETITES CELLULES (1)

### Rappel

Ce cancer est très peu chimiosensible.

Le seul traitement curatif est la **résection chirurgicale** ; mais seuls 15 % des cas sont opérables (sur le plan fonctionnel et carcinologique).

### Bilan d'extension [1]

Il doit dater de moins de 6 semaines avant d'initier le traitement.

#### Tumeur accessible à un traitement locorégional

- TDM thoracique avec injection.
- Fibroscopie souple avec biopsies des éperons adjacents.
- IRM thoracique si tumeur de l'apex.
- ETO si doute sur une atteinte atriale.
- PET-scan : exploration médiastinale en cas de cas d'hypermétabolisme ganglionnaire médiastinal, de tumeur centrale.
- TDM cérébrale avec injection ou IRM systématique.
- Confirmation anatomopathologique de toute métastase susceptible de modifier le traitement.

#### Tumeur non accessible à un traitement locorégional

- PET-scan NON indiqué.
- Si signes d'appel en fonction de l'incidence thérapeutique attendue.

#### CBNPC non épidermoïde localement avancé ou métastatique

Envoi du prélèvement en génétique moléculaire pour recherche de la mutation EGFR (indication d'**inhibiteur de tyrosine-kinase**) et biomarqueurs émergents (mutations KRAS, BRAF, HER2, PI3KCA, translocation EML4-ALK).

### Stades TNM

#### Tumeur primitive (T)

- Tx : Tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions bronchiques, non visible en imagerie et en fibroscopie.

- T0 : Absence de tumeur.
- Tis : Carcinome *in situ*.
- T1 : Tumeur :
  - T1a : Tumeur de 2 cm ou moins dans sa plus grande dimension,
  - T1b : Tumeur de plus de 2 cm sans dépasser 3 cm dans sa plus grande dimension.
- T2 : Tumeur de plus de 3 cm sans dépasser 7 cm dans sa plus grande dimension ou présentant une des caractéristiques suivantes :
  - envahissement de la bronche souche à plus de 2 cm de la carène ;
  - envahissement de la plèvre viscérale ;
  - atélectasie ou pneumopathie obstructive étendue à la région hilare, ne concernant pas la totalité du poumon.
- T2a : Tumeur de plus de 3 cm sans dépasser 5 cm dans sa plus grande dimension.
- T2b : Tumeur de plus de 5 cm sans dépasser 7 cm dans sa plus grande dimension.
- T3 : Tumeur de plus de 7 cm ; ou envahissant directement une des structures suivantes :
  - la paroi thoracique (y compris la tumeur de Pancoast) ;
  - le diaphragme ;
  - le nerf phrénique ;
  - la plèvre médiastinale, pleurale ou pariétale ou le péricarde ;
  - une tumeur dans la bronche souche à moins de 2 cm de la carène sans l'envahir ;
  - ou associée à une atélectasie ou d'une pneumopathie obstructive du poumon entier ;
  - ou présence d'un nodule tumoral distinct dans le même lobe.
- T4 : Tumeur quelle que soit sa taille envahissant :
  - médiastin, cœur, gros vaisseaux ;
  - trachée, nerf laryngé récurrent, œsophage, corps vertébral, carène ;
  - présence d'un nodule tumoral distinct dans un autre lobe du poumon atteint.

## CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (3) – NON À PETITES CELLULES (2)

### Ganglions (N)

- Nx : Ganglions régionaux non évaluable.
- N0 : Absence de ganglions métastatiques régionaux.
- N1 : Métastase dans les ganglions lymphatiques intrapulmonaires, péribronchiques et/ou hilaires ipsilatéraux, y compris par envahissement direct.
- N2 : Métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux ipsilatéraux et/ou sous-carénaux.
- N3 : Métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux contralatéraux, hilaires contralatéraux, scalènes ou sous-claviculaires ipsilatéraux ou contralatéraux.

### Métastases (M)

- Mx : La présence de métastase ne peut être établie.
- M0 : Absence de métastases à distance.
- M1 : Présence de métastases à distance:
  - M1a : Nodule(s) tumoral distinct dans un lobe contralatéral ; tumeur avec nodules pleuraux ou épanchement pleural (ou péricardique) malin ;
  - M1b : métastase à distance.

### Stades

À partir des sous-groupes TNM, sont définis des stades permettant d'orienter la prise en charge des CBNPC :

STADE	TNM
0	Tis
IA IB	T1a,b N0 M0 T2a N0 M0
IIA	T1a,b N1 M0 T2a N1 M0 T2b N0 M0
IIB	T2b N1 M0 T3 N0 M0
IIIA	T3 N1-2 M0 T1-2 N2 M0 T4 N0-1 M0
IIIB	T4 N2 M0 T1-4 N3 M0
IV	Quels que soient T et N, M1

### Pronostic (sous traitement)

La survie moyenne à 5 ans dépend du stade :

- 65 % pour IA ;
- 55 % pour IB et IIA ;
- 40 % pour IIB ;
- 25 % pour IIIA.

## CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (4) – NON À PETITES CELLULES (3)

### Bilan d'opérabilité

#### Sur le plan carcinologique

Le bilan d'extension de la maladie (*cf. supra*) permet la classification TNM ou en stades I à IV.

#### Sur le plan respiratoire

Principe : il faut que le VEMS postopératoire « prévisible » soit > 1 L ou 30 % de la valeur théorique.

On réalise donc des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) préopératoires (avec scintigraphie pulmonaire et quantification de la vascularisation droite/gauche, gazométrie artérielle).

Lorsque la fonction respiratoire est limite, il est proposé de réévaluer le patient après une prise en charge pneumologique complète (arrêt du tabac, réadaptation à l'effort, kinésithérapie, prise en charge de la dénutrition).

#### Sur le plan cardiovasculaire

En fonction des antécédents et de l'examen clinique : ECG (d'effort), échographie cardiaque, Doppler des vaisseaux du cou, etc.

### Formes opérables

- Stade IA : exérèse chirurgicale seule.
- Stades IB et II : chirurgie et chimiothérapie adjuvante.
- Stade IIIa opérable : chimiothérapie néo-adjuvante + chirurgie + chimiothérapie adjuvante.

### Formes inopérables

Elles concernent la plupart des cas !

#### Stades IIIA non opérable et IIIB (localisé au thorax mais inopérable)

Association radiothérapie (65 Gy) + polychimiothérapie à base de **cisplatine**.

#### Stade IV (métastatique)

Chimiothérapie avec évaluation après 3 cycles (améliore la survie de quelques semaines et la qualité de vie).

Soins palliatifs si mauvais *performance status* (OMS 4).

Une irradiation « palliative » est à envisager dans certains cas : irradiation encéphalique devant des métastases cérébrales, irradiation à visée antalgique devant des localisations osseuses symptomatiques.

### Mesures associées

Arrêt du tabac : réduit les risques d'un 2<sup>e</sup> cancer et diminue la morbidité de l'intervention chirurgicale.

### CONSENSUS

[1] Cancer du poumon - Bilan initial, SPLF et INCa, 2011



**CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (5) – À PETITES CELLULES****Rappel**

Cancer très « agressif », à temps de doublement rapide ; **survie spontanée < 3 mois !** Fréquence des syndromes paranéoplasiques, surtout biologiques (syndrome de Schwartz-Bartter entraînant une hyponatrémie) et neurologiques (neuropathie sensitive de Denny-Brown, pseudo-myasthénie de Lambert-Eaton). Le traitement de référence des CBPC est la chimiothérapie. Sauf exception, il n'existe pas d'indication à un traitement chirurgical.

**Bilan d'extension**

Le but est de différencier les formes « apparemment » localisées au thorax (incluables dans un même champ d'irradiation) et les formes métastatiques ; la classification TNM n'est pas adaptée à ce type de cancer bronchique.

**Locorégional**

- TDM thoracique.
- Fibroscopie souple.

**À distance : réalisé en cas de traitement locorégional envisageable**

- TDM abdominale.
- TDM ou IRM cérébrale.

La biopsie ostéo-médullaire ne sera faite qu'en cas de perturbation non expliquée de l'hémogramme.

**Stades**

La classification des CBPC ne comprend que 2 stades correspondant à 2 prises en charge distinctes :

- stade localisé au thorax : tumeur limitée à un hémithorax pouvant être associée à une atteinte du médiastin ou des ganglions sus-claviculaires (homo ou controlatéraux) ;
- stade disséminé : dans tous les autres cas (atteinte métastatique, adénopathie

extrathoracique à l'exclusion des aires ganglionnaires sus-claviculaires, lymphangite carcinomateuse, atteinte bilatérale).

**Prise en charge****Stade localisé au thorax**

- Chimiothérapie.
- Associée à la radiothérapie sur le lit tumoral et le médiastin : diminution de 25 % du risque de rechute locale.

**Stade disséminé**

Chimiothérapie seule.

En cas de rémission complète, une radiothérapie cérébrale prophylactique est réalisée permettant de diminuer le risque de métastases cérébrales.

Produits souvent utilisés en chimiothérapie du cancer à petites cellules :

**Cisplatine (CISPLATYL)**  
**Cyclophosphamide (ENDOXAN)**  
**Doxorubicine (ADRIBLASTINE)**  
**Étoposide (ÉTOPOSIDE TEVA)**

**En cas de rechutes**

- Survenue > 3 mois après l'arrêt du traitement initial : reprendre même chimiothérapie.
- Survenue ≤ 3 mois après l'arrêt du traitement initial : changer la chimiothérapie (vinorelbine, gemcitabine).

**Pronostic sous traitement**

- Pronostic beaucoup plus péjoratif que celui du CBNPC, à cause de rechutes quasi inéluctables même après rémission complète.
- Apparition d'une chimiorésistance.
- Forme localisée au thorax :
  - réponse complète fréquente : 70 % ;
  - survie moyenne à 5 ans : 15 % (médiane de survie 18 mois).
- Forme disséminée :
  - réponse complète plus rare : 30 % ;
  - survie moyenne à 5 ans : < 5 % (médiane 9 mois).

## CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF (6) – CHIMIOTHÉRAPIE

Ces protocoles classiques ne sont donnés qu'à titre d'exemple ; d'autres protocoles sont aussi utilisés.

La dose est modulée en fonction de la surface corporelle (en m<sup>2</sup>), calculée à partir du poids et de la taille.

Ces produits cytotoxiques doivent être perfusés par le biais d'un cathéter central (le plus souvent, veine jugulaire interne ou sous-clavière).

### Cancer non à petites cellules

À J1 :

- mitomycine C (**AMÉTYCINE**), 6 mg/m<sup>2</sup> ;
- vinorelbine (**NAVELBINE**), 25 mg/m<sup>2</sup> ;
- cisplatine (**CISPLATYL**), 80 mg/m<sup>2</sup> ;
- sous couverture antiémétique par **SOLUMÉDROL** 120 mg matin et soir, et **ZOPHREN** ou **KYTRIL**, 1 amp. en perfusion avant le cisplatine ;
- une hyperhydratation intraveineuse (3 L/24 h) est débutée la veille du J1 et poursuivie jusqu'au lendemain matin (donc hospitalisation durant 2 nuits).

À J15 :

**Vinorelbine (NAVELBINE)**, 25 mg/m<sup>2</sup> (en perfusion sur 1 h en hospitalisation de jour).

### Cancer à petites cellules

À J1 :

- cisplatine (**CISPLATYL**), 100 mg/m<sup>2</sup> ;
- cyclophosphamide (**ENDOXYAN**), 1 000 mg/m<sup>2</sup> ;
- doxorubicine (**ADRIPLASTINE**), 45 mg/m<sup>2</sup> ;
- étoposide (**ÉTOPOSIDE TEVA**), 150 mg/m<sup>2</sup> ;
- sous couverture antiémétique par **SOLUMÉDROL** 120 mg matin et soir (J1 et J2), et **ZOPHREN** ou **KYTRIL**, 1 amp. en perfusion avant le cisplatine ;
- une hyperhydratation intraveineuse (4 L/24 h) est débutée la veille du J1 et poursuivie jusqu'au lendemain matin du J2 (donc hospitalisation durant 3 nuits).

À J2 :

**Étoposide (ÉTOPOSIDE TEVA)**, 150 mg/m<sup>2</sup>.

### SUIVI EN VILLE DANS L'INTERCURE

#### Toxicité hématologique

- Prélever une NFS : à J10 (« nadir » = jour où la toxicité hématologique est maximale), ou en urgence en cas de fièvre (38,5°C ou 38°C à 2 reprises en quelques heures).
- Si polynucléaires neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup> : hospitaliser pour isolement et traitement antibiotique parentéral.
- Si thrombopénie avec signes hémorragiques : hospitaliser pour transfusion de plaquettes.
- Si anémie < 7 g/dL : hospitaliser pour transfusion érythrocytaire.
- Prélever une NFS la veille de chaque cure (à reporter si neutrophiles < 500/mm<sup>3</sup>).

#### Toxicité digestive

En prévention : prescription systématique, à la sortie de l'hôpital, d'antiémétiques, type **PRIMPÉRAN** 1 cp. x 3/j, ou **antagonistes de la sérotonine** type **ZOPHREN** 8 mg, 1 cp. x 2/j, pendant 2 à 5 j.

#### Autres toxicités à surveiller (cisplatine)

- Rénale : taux de créatinine avant chaque cure.
- Neurologique : paresthésies.
- Alopécie : le patient doit en être averti !

## HÉMOPTYSIE

### Définition

C'est le rejet de sang par la bouche, provenant des voies aériennes sous-glottiques (donc après un effort de toux +++).

### Étiologie

#### Causes fréquentes (sang rouge)

- Dilatation des bronches (DDB) diffuse ou localisée (surinfectée, le plus souvent).
- Tuberculose active.
- Cancer bronchopulmonaire.

#### Causes cardiovasculaires

- Embolie pulmonaire (sang noirâtre).
- Rétrécissement mitral (ou insuffisance cardiaque gauche).

#### Chez un ancien tuberculeux, évoquer

- Rechute tuberculeuse ; dilatation des bronches séquellaire ; greffe aspergillaire dans une cavité résiduelle (aspergillome) ; broncholithe ; cancer sur cicatrice.

#### Causes rares

- Tumeurs bronchiques bénignes ; malformations vasculaires (angiomes, séquestration pulmonaire) ; hémorragie intra-alvéolaire (vascularites).

Diagnostic « d'élimination » (après contrôle fibroscopique)

- Bronchite aiguë, pneumopathie aiguë.

### Évaluation rapide de la gravité

#### Abondance du saignement

- Faible = stries sanglantes (crachats hémoptoïques).
- Moyenne = 1/2 à 1 verre (100 mL).
- Grande  $\geq 200$  mL (ou  $> 500$  mL/24 h).

#### Signes de détresse respiratoire

Dyspnée, FR  $> 30$ /min, cyanose, tirage.

#### Signes de déglobulisation (rares !)

Pouls  $> 110$ /min, collapsus, pâleur.

Le réel risque vital est l'asphyxie par inondation alvéolaire, plutôt que la spoliation sanguine.

### Hospitalisation (surveillance +++ car risque de récurrence massive)

#### Examens à faire en urgence

- NFS-plaquettes, hémostase, groupe sanguin et RAI.
- Gazométrie artérielle, ECG.

- Radio de thorax  $\pm$  TDM thoracique (voire angio-TDM en cas de doute sur une embolie pulmonaire).

- Fibroscopie bronchique permettant de localiser l'origine du saignement et d'orienter le diagnostic.

#### Traitement symptomatique (hémoptysie massive ou récidivante)

- Aspiration pharyngo-trachéale répétée.
- Oxygène par sonde de gros calibre, 4-6 L/min, avec surveillance SaO<sub>2</sub> (saturo-mètre).

- Voie d'abord veineuse (bon calibre, pour éventuel remplissage vasculaire par macromolécules, voire transfusion) avec perfusion de G5 % « garde-veine ».

- **Vasoconstricteurs** type **GLYPRESSINE** 1 mg IV/4 h ; prudence chez le coronarien, surveillance PA ++.

- Surveillance : hémoptysie (crachoir), pouls, PA, diurèse, fréquence respiratoire, examen clinique ; gazométrie, radiographie, ionogramme.

- La fibroscopie bronchique en période hémorragique (avec chariot d'urgence à proximité !) a plusieurs intérêts : 1) localisation du saignement (permet de guider l'artériographie ou, en cas de besoin, une intubation sélective du côté sain) ; 2) désobstruction/aspiration ; 3) visualisation éventuelle de la cause (tumeur, etc.) ; 4) aide à l'hémostase (injection locale de **vasoconstricteurs** : **adrénaline** diluée) ; 5) recherche BK et cytotologique dans le produit d'aspiration bronchique.

- En cas d'asphyxie : intubation sélective (guidée par fibroscopie) du côté sain, ou sonde de Carlens (double lumière) par anesthésiste entraîné.

- Artériographie bronchique avec embolisation de l'artère responsable du saignement (dans un centre spécialisé).

- En cas d'hémoptysie non contrôlée, il est nécessaire de réaliser une thoracotomie d'hémostase.

#### Traitement étiologique

Antibiothérapie d'une surinfection de DDB, d'une tuberculose ; chirurgie d'un cancer.

## SARCOÏDOSE (1)

C'est une granulomatose systémique d'étiologie inconnue, comportant une atteinte médiastino-pulmonaire dans 90 % des cas.

Le diagnostic repose sur l'histologie (**granulome tuberculoïde** sans nécrose caséuse) et l'élimination des autres causes de granulome (en particulier BK !); les biopsies bronchiques sont positives dans 70 % des cas.

Deux tiers des cas sont asymptomatiques (surtout type I), découverts sur une radiographie systématique.

Incidence 10 à 20 pour 100 000 avec un sex ratio à 1, la sarcoïdose est plus fréquente chez les patients de race noire, avec des formes plus sévères.

### Types radiologiques

- Type 0 (10 % des cas) : radiographie normale.
- Type I (50 % des cas) : adénopathies hilaires et/ou médiastinales isolées (souvent « BBS » = basses, bilatérales, symétriques).
- Type II (25 % des cas) : infiltration parenchymateuse associée aux adénopathies.
- Type III (10 % des cas) : infiltration parenchymateuse sans adénopathie ni fibrose.
- Type IV (10 % des cas) : signes radiologiques de fibrose.

### Pronostic

La plupart des cas guérissent spontanément dans les 2 ans, sans séquelle.

Le tableau clinique s'étend de la forme

asymptomatique (surveillance) aux formes graves (urgence thérapeutique) voire mortelles.

- Type I : 80 % de guérison spontanée (et 100 % pour les syndromes de Löfgren) ; 10 % évoluent vers un type II.
- Type II : 60 % de guérison spontanée ; 10 % évoluent vers un type IV.
- Type III : 30 % de guérison spontanée ; 10 % évoluent vers un type IV.
- Type IV : pas de guérison, par définition ; peut se compliquer d'**insuffisance respiratoire chronique** ; des cavités apicales peuvent être le siège d'une greffe aspergillaire (**aspergillome**).

Le pronostic de la sarcoïdose est souvent lié aux formes extrapulmonaires (cardiaque, rénale, système nerveux central, ophtalmologique).

### Bilan

Diagnostic :

- radio de thorax, TDM thoracique ;
- fibroscopie bronchique avec lavage bronchiolo-alvéolaire et biopsies bronchiques ;
- ± biopsie des glandes salivaires accessoires.

Déterminer la sévérité :

- EFR (DLCO), gaz du sang artériel, ECG ;
- biologie : NFS, bilan hépatique, fonction rénale, calcémie et calciurie des 24 h ;
- examen neurologique complet ;
- examen ophtalmologique complet.

Exclusion des diagnostics alternatifs : IDR (tuberculose) et exposition professionnelle (bérylliose).

## SARCOÏDOSE (2)

### Indications thérapeutiques

Il n'y a pas de consensus dans l'attitude thérapeutique.

Les formes à traiter sont les formes avec mauvais pronostic spontané ou associées à des atteintes extra-pulmonaires mettant en jeu le pronostic fonctionnel d'un organe ou entraînant un risque vital.

Aucun traitement ne doit être instauré sans une preuve histologique.

Le traitement est basé sur la corticothérapie dont les indications reconnues sont :

- en cas de localisation grave : neurologique centrale, myocardique, ophtalmologique, néphrite interstitielle cutanée mutilante ;
- en cas d'hypercalcémie menaçante ;
- en cas de signes généraux marqués (fièvre, amaigrissement) ;
- en cas d'atteinte pulmonaire avec retentissement fonctionnel (DLCO < 70 %, syndrome obstructif, effet shunt aux gaz du sang).

Dans tous les autres cas, il s'agit d'une abstention thérapeutique avec une surveillance étroite.

### Modalités de la corticothérapie

- **Prednisone (CORTANCYL)**, 0,5 mg/kg/j en dose d'attaque pendant 3 mois, puis **décroissance progressive** tous les 3 mois, jusqu'à une dose minimale effective, à poursuivre pour une durée totale de traitement de **18 mois** au moins.
- En cas de rechute lors de la dégression, reprendre la posologie antérieure ; la guérison définitive n'est affirmée qu'au bout d'un an de suivi après la fin du traitement.
- **Mesures associées** : pas d'exposition au soleil ; régime pauvre en calcium ; **biphosphonates** ; contre-indication de la vitamine D ; prophylaxie antituberculeuse si IDR + chez un sujet non vacciné (Africains ++).
- Alternatives thérapeutiques aux **corticoïdes** :
  - **immunosuppresseurs** : méthotrexate (5 à 10 mg/sem. en IM), azathioprine (**IMUREL**), cyclophosphamide (**ENDOXAN ASTA**) ;
  - autres : **anti-TNF**, thalidomide, ou **anti-paludéens de synthèse (PLAQUENIL)**, 400 mg/j *per os* en moyenne.

## TOUX (1)

La toux est un **phénomène de défense** réflexe, répondant à la stimulation de récepteurs périphériques (situés sur les muqueuses des voies respiratoires, du nez aux bronchioles, mais également sur la plèvre, le péricarde ou même le conduit auditif externe). Elle est destinée, avant tout, à **libérer les voies aériennes** (d'une agression extrinsèque, tel qu'un corps étranger, ou de sécrétions endogènes).

La toux doit être respectée dans la plupart des cas !

### Démarche diagnostique

Il faut préciser : l'ancienneté, l'horaire (surtout diurne/nocturne), les circonstances déclenchantes (position, exposition à un allergène, effort, etc.), les signes d'accompagnement (pyrosis, etc.), et surtout son caractère productif (et dans ce cas, le type d'expectoration) ou non (toux sèche).

Une toux chronique est définie par une toux persistant plus de 3 sem.

Critères de gravité devant une toux aiguë : dyspnée, douleur thoracique, hémoptysie, immunodéprimé, insuffisant respiratoire sévère. La présence d'un critère de gravité

impose des explorations complémentaires en urgence en milieu hospitalier.

Dans la plupart des cas, la toux peut être facilement rattachée à un **contexte pathologique**, aigu (trachéo-bronchite) ou chronique connu (bronchite chronique).

Dans tous les autres cas, l'examen clé (en plus de l'examen clinique) est la **radiographie de thorax**.

Si celle-ci est normale, et en l'absence de contexte devant orienter les investigations (pyrosis : reflux gastro-œsophagien, à confirmer par gastroscopie ± pHmétrie ; tabac : bronchite chronique, mais ne pas oublier le cancer, justifiant une fibroscopie bronchique ; expectoration mousseuse, survenue à l'effort : insuffisance cardiaque ; toux médicamenteuse : inhibiteurs de l'enzyme de conversion, etc.), celles-ci devront s'orienter dans deux directions principales :

- une **cause ORL** : radiographie des sinus et examen ORL (sinusite, rhinite) ;
- l'**asthme** (toux « équivalent-asthmatique ») : faire une spirométrie ; le plus souvent normale, justifiant un test de provocation bronchique non spécifique (métacholine).

## ANTITUSSIFS (1) – OPIACÉS (1)

## ■ Codéine

<b>NÉO-CODION</b>					
Toux sèche : 1 cp. ou 1 càs x 2 à 4/j	20 cp. 15 mg 12 càs 15 mg (1 fl. 180 mL)	2,82		NR 30 %	0,24

## ■ Codéthyline ou éthylmorphine

<b>TUSSIPAX</b>					
Adulte et enfant > 15 ans : 1 cp. x 3/j	15 cp. 10 mg + 10 mg de <b>codéine</b>	2,55		30 %	0,17

## ■ Dextrométhorphan

<b>ATUXANE</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : 2 à 3 c-mes. x 2 à 4/j	25 c-mes. 10 mg (1 fl. 125 mL)			NR	
<b>DRILL</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : existe sans sucre : 2 c-mes. x 3 à 4/j	30 c-mes. 15 mg (1 fl. 125 mL)			NR	
<b>TUXIUM</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : 1 caps. x 2 à 4/j	12 caps. 30 mg	2,50		30 %	0,21
<b>TUSSIDANE</b>					
3 à 4 c-mes./j espacées d'au moins 4 h 0,5-1 cp. x 3 à 4/j	25 c-mes. 1,5 mg/mL (1 fl. 125 mL)	2,52		30 %	0,10
	50 c-mes. 1,5 mg/mL (1 fl. 250 mL)	3,06		30 %	0,06
	12 cp. 30 mg	2,46		30 %	0,21
<b>NODEX</b>					
1 dose à renouveler toutes les 4 h, max. 4/j	10 unidoses 10 mL			NR	

## ■ Pholcodine

<b>BIOCALYPTOL</b>					
A. : 15 mL (1 godet doseur) x 1 à 4/j E. 35-50 kg : 5 mL (2 graduations) x 1 à 6/j E. 20-35 kg : 2,5 mL (1 graduation) x 1 à 6/j E. 20-35 kg : 2,5 mL (1 graduation) x 2 à 3/j	1 fl. 200 mL (avec godet-doseur)	3,32		30 %	0,08

## TOUX (2)

### Traitement

Celui-ci sera avant tout **étiologique** +++, par exemple : antibiotiques en cas d'infection ; traitement d'une insuffisance cardiaque ; traitement antireflux ; traitement anti-inflammatoire inhalé pour un asthme ou dans le cadre d'une hyperréactivité bronchique post-infectieuse ; par exemple : **budésonide (PULMICORT TURBUHALER 200 µg)** : 2 bouffées x 2/j.

En cas de toux productive, la kinésithérapie respiratoire est un élément essentiel du traitement.

Les **antitussifs** ne doivent être prescrits qu'en cas de toux **sèche, non productive**, invalidante, et de toute façon « en appoint » pour une **courte durée**.

Les **antitussifs** sont contre-indiqués en cas de toux productive, et chez les personnes âgées et les insuffisants respiratoires chroniques.

### Encombrement respiratoire

Il est lié à l'incapacité par le malade d'avoir une toux efficace, c'est-à-dire permettant l'expectoration. Certaines circonstances favorisent sa survenue : personnes âgées, maladie neuromusculaire, période postopératoire, prise de sédatifs, décubitus prolongé, etc.

Les **antitussifs** sont donc formellement contre-indiqués, de même que les mucomodificateurs, les deux risquant d'aggraver l'encombrement respiratoire !

Le traitement consiste donc en une **kinésithérapie** respiratoire.



## SEVRAGE TABAGIQUE (1)

### Epidémiologie

En France, la consommation régulière de tabac concerne un tiers de la population adulte. Elle est en cause dans la survenue d'un cas de cancer sur trois et son poids dans la morbidité pulmonaire, cardiaque et vasculaire est considérable. Sa diminution dans la population constitue de loin le plus important de tous les facteurs susceptibles d'agir favorablement sur la morbidité et la mortalité prématurée. Le tabac est actuellement responsable en France de 60 000 décès prématurés par an, tuant un fumeur sur deux. Les projections tenant compte de l'évolution de la consommation ces dernières années, notamment dans la population féminine, prévoient 165 000 décès prématurés directement imputables au tabac en 2025 (450 morts par jour). L'arrêt de la consommation de tabac constitue donc dans notre pays un problème de santé publique prioritaire.

### Dépendance à la nicotine (évaluation)

L'arrêt de l'intoxication tabagique est bénéfique à tout âge et ce bénéfice augmente avec la durée de l'abstinence. Toutefois, si un fumeur sur trois a essayé d'arrêter de fumer pendant l'année écoulée, rares sont ceux qui réussissent à maintenir une abstinence durable. L'un des obstacles majeurs à cet arrêt durable est le développement d'une dépendance à la nicotine.

### Critères de dépendance à une substance

- Tolérance : augmentation de la consommation pour maintenir un effet constant

(ou effet diminué en cas de consommation stable).

- Sevrage en cas d'arrêt de la consommation (dépendance qualifiée de « physique »).
- Consommation souvent plus importante ou plus prolongée que prévue.
- Désir ou efforts infructueux pour contrôler la consommation.
- Importance du temps consacré à rechercher, à consommer et à récupérer des effets de la substance.
- Réduction des activités sociales à cause de la consommation.
- Poursuite de la consommation en dépit de la conscience de ses conséquences néfastes.
- Cette définition s'applique à la nicotine pour définir la dépendance nicotinique.
- Le tabagisme peut être défini comme un comportement renforcé par une dépendance pharmacologique dont la nicotine est responsable.

Le questionnaire de dépendance de Fagerström est l'outil le plus utilisé pour mesurer l'intensité de la dépendance à la nicotine. Il est confirmé, en centre spécialisé, par le dosage du CO expiré, de la cotinine urinaire.

### Évaluation de la part des dépendances

- Dépendance physique ou pharmacologique, liée à la nicotine (test de Fagerström).
  - Dépendance psychique (caractère plaisant, stimulant ou anxiolytique du tabac).
  - Dépendance comportementale (rite, réflexes, habitude : dépendance gestuelle).
- Le but est d'apporter une aide appropriée à chaque cas.

## FLUIDIFIANTS BRONCHIQUES

### ■ Acétylcystéine

<b>MUCOMYST</b>				
Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique : 1 sach. ou 1 c-mes. x 3/j	30 sach. 200 mg 24 c-mes. 200 mg			NR NR

### ■ Carbocistéine ou carbocystéine

<b>RHINATHIOL</b>				
Avec ou sans sucre Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique : A. : 1 gobelet-doseur x 3/j E. : 1 c-mes. (100 mg) x 2/j	16 gobelets-doseurs (fl. sirop adulte 5 % 250 mL) 25 c-mes. (fl. sirop enfant 2 % 125 mL)			NR NR
<b>BRONCHOKOD</b>				
Sans sucre Idem <b>RHINATHIOL</b> ou A. : 1 sach. x 3/j	16 càs 750 mg (fl. sirop ou sol. buv. adulte 5 % 250 mL) 25 c-mes. 100 mg (fl. sirop ou sol. buv. enfant 2 % 125 mL) 15 sach. 750 mg 10 mL sol. buv. caramel-vanille			NR NR NR

### ■ Diacétylcystéine

<b>MUCOTHIOIOL</b>				
1 cp. x 3/j	20 cp. 200 mg			NR

### ■ Érdostéine

<b>VECTRINE</b>				
Idem <b>MUCOMYST</b> : 1 cp. ou 1 sach. x 2/j	20 cp. 300 mg 20 sach. 300 mg			NR NR

#### PROPRIÉTÉS

Action mucorégulatrice ou mucolytique : rupture des liaisons entre glycoprotéines. Diminuent la viscosité du mucus, favorisant l'expectoration des sécrétions bronchiques.

#### INDICATIONS

Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique au cours d'affections bronchiques (surtout aiguës).

#### CONTRE-INDICATIONS

Ulcère gastroduodénal évolutif (**acétylcystéine**, **carbocistéine**, **létostéine**).

Voies inhalée ou intratrachéale contre-indiquées en cas de bronchospasme.

**Érdostéine** : insuffisance rénale ou hépatique.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

**Diabète** : utiliser les formes « sans sucre ».

Formes locales : à diluer dans du sérum physiologique.

S'assurer d'un drainage bronchique efficace par la toux et/ou la kinésithérapie.

Ne pas associer avec des **antitussifs** ni avec des substances asséchant les sécrétions (**atropiniques**).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Gastralgies, nausées/vomissements, diarrhée : réduire la dose.

Risque d'inondation bronchique chez le malade incapable d'expectorer, indiquant une aspiration bronchique en urgence.

Exceptionnels : céphalées, vertiges, somnolence, réactions allergiques.

Voie locale : toux, bronchospasme.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aérosols : ne pas mélanger avec d'autres produits (sauf  **$\beta_2$ -stimulants**).

## SEVRAGE TABAGIQUE (2)

### Conduite du traitement général

Deux tiers des fumeurs cherchent à arrêter.

La plupart réussissent sans recourir au système de soins. Pour les autres, il n'existe aucune « méthode miracle ».

La prise en charge doit être globale en tenant compte de la part des diverses dépendances commençant par une aide à la maturation de la décision d'arrêt.

### Conseil minimal d'aide à l'arrêt du tabac

Il consiste à demander systématiquement à chaque patient s'il est fumeur et s'il a envisagé d'arrêter de fumer. Les résultats des études contrôlées en médecine générale ont montré que poser deux questions : « Est-ce que vous fumez ? » puis « Voulez-vous arrêter de fumer ? » et offrir une brochure à ceux qui répondaient « oui » à la seconde question doublait le taux de succès de l'arrêt à long terme par rapport à l'arrêt spontané dans le groupe témoin.

### Arrêt brutal, total et définitif

*Choix du jour J.*

**À un moment propice (départ en vacances p. ex.)**

► *Soutien psycho-comportemental*

► *Conseils divers*

- Prévenir l'entourage, éviter au début les tentations (contacts avec les fumeurs) ; si conjoint fumeur : arrêter ensemble.
- Jeter cigarettes-briquets-cendriers.
- Activités physiques quotidiennes.
- Éviter les excitants (café, thé, alcool), boire beaucoup d'eau.
- « Petits moyens » : à chaque envie de fumer, boire un grand verre d'eau, se détendre, exercices respiratoires.

► *Soutien psychologique*

- Par le médecin (être disponible), la famille.
- Traitement des états anxio-dépressifs.

### Conseils diététiques

En association avec le sport, la marche, ils vont limiter la prise de poids (3 kg en moyenne) : éviter les sucreries, le grignotage, privilégier les fruits et légumes.

### Traitements médicamenteux

#### Substituts nicotiniques s'il existe une dépendance pharmacologique

- Si  $> 10$  cigarettes/j et/ou critères de dépendance (Fagerström  $\geq 5$  ; ou 1<sup>re</sup> cigarette fumée  $< 30$  min après le lever).
  - Ils ont fait la preuve de leur efficacité (doublent le taux de sevrage) et leur sécurité d'emploi est admise dans les conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire en cas de sevrage tabagique réel. Les risques cardiovasculaires attachés à leur utilisation semblent faibles, en particulier en comparaison avec les bénéfices attendus d'un sevrage.
  - Il existe plusieurs modes d'administration : nicotine perlinguale (cp., gomme à mâcher), percutanée (dispositif transdermique qui assure une meilleure compliance) ou en inhalation. En cas de dépendance forte, il faut recourir soit à la gomme 4 mg, soit à la voie percutanée. Une stratégie associant un traitement à libération prolongée (patches adaptés à la dépendance) et des traitements permettant une délivrance rapide de nicotine (gommes, cp., inhalateur) semble plus proche des fluctuations de nicotémie du fumeur (délivrance de nicotine en continue dans la journée avec pics de nicotémie se rapprochant de ce qui se passe en cas de consommation de tabac).
- Ex. **NICORETTE** gommes 4 mg : 6 à 10 gommes/j.

## SUBSTITUTS NICOTINIQUES (1)

## ■ Nicotine

<b>NICOPATCH</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : application d'un dispositif adhésif transdermique (= pch.) chaque matin, à doses décroissantes (cf. Précautions d'emploi)	7 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
<b>NICORETTESKIN</b>				
Idem <b>NICOPATCH</b> (retirer au coucher)	7 pch. 10 mg (9 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 10 mg (9 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 15 mg (13,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 15 mg (13,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 25 mg (22,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 25 mg (22,5 cm <sup>2</sup> )			NR
<b>NICORETTE SANS SUCRE</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : mâcher une gomme chaque fois qu'est ressenti le besoin de fumer 8 à 12/j sans dépasser 30/j pour les gommes à 2 mg et 15/j pour celles à 4 mg	30 gom. 2 mg			NR
	30 gom. fruits 2 mg			NR
	30 gom. menthe cannelle			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	105 gom. 2 mg			NR
	105 gom. fruits 2 mg			NR
	105 gom. menthe cannelle			NR
	2 mg			
	105 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	105 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	210 gom. 2 mg			NR
	210 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	210 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe fraîche			NR
	4 mg			
	30 gom. menthe glaciale			NR
	4 mg			
	105 gom. 4 mg			NR
	105 gom. menthe fraîche			NR
	4 mg			
	105 gom. menthe glaciale			NR
	4 mg			
<b>NICORETTE INHALEUR</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : inhaler une cartouche à la façon d'une cigarette, 20 min. chaque fois qu'est ressenti le besoin de fumer	6 cart. + inhal. buccale			NR
	42 cart. + inhal. buccale			NR

## SEVRAGE TABAGIQUE (3)

### Inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des catécholamines (noradrénaline et dopamine)

Le **bupropion (ZYBAN LP)** est un antidépresseur approuvé par la FDA mais ne possède pas d'AMM en France pour le traitement de la dépression. Son mécanisme d'action présente des analogies avec celui des dérivés amphétaminiques, ce dont témoignait sa DCI initiale : **amfébutamone**. Il agirait aussi sur la dépendance psychique. Son efficacité ne semble pas supérieure à celle des **substituts nicotiniques** et son rapport bénéfice/risque paraît moins favorable. On attirera notamment l'attention du prescripteur sur le risque de crise convulsive dont l'incidence est de 0,1 %. Des insomnies sont possibles.

Ce traitement peut être associé à des **substituts nicotiniques**.

Ex. **ZYBAN LP** cp. 150 mg : 1 cp. par jour une semaine avant le début du sevrage, puis 2 cp./j à partir du 7<sup>e</sup> j, en 2 prises quotidiennes espacées d'au moins 8 h. Traitement à maintenir pour une durée totale de 7 à 9 sem.

La **varénicline (CHAMPIX)** est un traitement oral du sevrage tabagique qui doit être débuter 1 à 2 sem. avant le sevrage tabagique. L'association de **CHAMPIX** avec des substituts nicotiniques est déconseillée.

Ex : **CHAMPIX** de J1 à J3, 0,5 mg une fois par jour puis de J4 à J7, 0,5 mg 2 fois par jour et de J8 à la fin du traitement, 1 mg 2 fois par jour pour un total de 12 sem. (pour les patients qui ont réussi à arrêter de fumer à la fin des 12 sem., une cure supplémentaire de 12 sem. à 1 mg x 2/jour peut être proposée).

Il est recommandé d'utiliser :

- en 1<sup>re</sup> intention : **substituts nicotiniques** ;
- en 2<sup>e</sup> intention : **varénicline** ;
- en 3<sup>e</sup> intention : **bupropion**.

### Cigarette électronique

Ces « cigarettes » génèrent de la vapeur, qui imite la fumée des cigarettes habituelles. Certaines contiennent de la nicotine. Elles favoriseraient le sevrage tabagique.

### Autres approches thérapeutiques

Elles sont complémentaires des mesures générales (éducation du patient, soutien psychologique) et d'un éventuel traitement médicamenteux.

- Les thérapies comportementales ont démontré une certaine efficacité dans quelques études contrôlées, mais sont encore trop difficiles d'accès.
- Les autres méthodes (acupuncture, homéopathie, etc.) ne sont pas correctement évaluées mais l'acupuncture semble peu ou pas efficace.

### Suivi régulier et prolongé

- Accompagnement par le biais de consultations successives (J8, J15, J30 puis 1/mois).
- Un échec (reprise du tabac) n'est pas de mauvais pronostic pour l'avenir : la motivation sera renforcée à la prochaine tentative.
- Succès définitif probable si sevrage > 1 an.
- Cas difficiles : orienter vers un Centre d'aide au sevrage tabagique.

### Consultations d'aide au sevrage tabagique (AP-HP Paris-banlieue)

La liste la plus à jour est disponible à : <http://www.splf.org/gp/dossier-les-bonnesadresses/consult-antitabac.html>.

## SUBSTITUTS NICOTINIQUES (2)

## ■ Nicotine

<b>NICOTINELL</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : application d'un dispositif adhésif transdermique (= pch.) chaque matin, à doses décroissantes (cf. Précautions d'emploi) Gomme sans sucre Idem <b>NICORETTE SANS SUCRE</b>	7 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	36 gom. fruit 2 mg			NR
	36 gom. menthe 2 mg			NR
	96 gom. fruit 2 mg			NR
	96 gom. menthe 2 mg			NR
	204 gom. fruit 2 mg			NR
	204 gom. menthe 2 mg			NR
	36 gom. menthe 4 mg			NR
	96 gom. menthe 4 mg			NR
	204 gom. menthe 4 mg			NR
	36 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	144 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
<b>NIQUITIN</b>				
Idem <b>NICOPATCH</b> (retirer au coucher) Phase initiale de traitement : 1 cp. à sucer toutes les 1 à 2 h Suivi : 1 cp. à sucer toutes les 2 à 4 h Sevrage : 1 cp. à sucer toutes les 4 à 8 h	7 pch. 7 mg/24 h (7 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg/24 h (7 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg/24 h (15 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg/24 h (15 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg/24 h (22 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg/24 h (22 cm <sup>2</sup> )			NR
	24 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	36 cp. sans sucre 2 mg			NR
	96 cp. sans sucre 2 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	24 cp. à sucer menthe 4 mg			NR
	36 cp. sans sucre 4 mg			NR
	96 cp. sans sucre 4 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 4 mg			NR

## SEVRAGE TABAGIQUE (4)

## Évaluation de la motivation

- Je viens à la consultation spontanément, par décision personnelle ..... 2
- Je viens à la consultation sur avis médical ..... 1
- Je viens à la consultation sur avis de ma famille ..... 1
- J'ai déjà arrêté de fumer pendant plus d'une semaine ..... 1
- Actuellement, mon activité professionnelle est sans problème ..... 1
- Actuellement, tout va bien sur le plan familial ..... 1
- Je veux me libérer de cet esclavage .. 2
- Je fais du sport ou j'ai l'intention d'en faire ..... 1
- Je veux être en meilleure forme physique ..... 1
- Je veux préserver mon aspect physique ..... 1
- Je suis enceinte ou ma conjointe est enceinte ..... 1
- J'ai des enfants en bas âge ..... 2
- J'ai bon moral actuellement ..... 2
- J'ai l'habitude de réussir ce que j'entreprends ..... 1
- Je suis plutôt d'un tempérament calme, détendu ..... 1
- Mon poids est habituellement stable ..... 1
- Je veux accéder à une qualité de vie meilleure ..... 2

## Note sur 20

- 16 points et +** Très grandes chances  
**12 à 16** Grandes chances  
**6 à 12** Chances réelles, mais des difficultés à prévoir  
**6 et -** Est-ce le moment ?

## Test de Fagerström

Quelle est votre dépendance  
par rapport à la nicotine ?

- Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?
- moins de 15 ..... = 0
  - de 16 à 25 ..... = 1
  - plus de 25 ..... = 2
- Quel taux de nicotine y a-t-il dans vos cigarettes ?
- moins de 0,6 mg ..... = 0
  - de 0,6 à 1 mg ..... = 1
  - plus de 1 mg ..... = 2
- Inhalez-vous la fumée ?
- jamais ..... = 0
  - parfois ..... = 1
  - toujours ..... = 2
- Fumez-vous plus le matin que l'après-midi ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0
- À quel moment fumez-vous votre première cigarette ?
- immédiatement au lever ..... = 2
  - après le petit-déjeuner ..... = 1
  - plus tard ..... = 0
- Quelle cigarette trouvez-vous la meilleure ? (la plus indispensable ?)
- la première ..... = 1
  - une autre ..... = 0
- Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0
- Fumez-vous, même si une maladie vous oblige à rester au lit ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0

## Total :

- 0 à 3 points** ..... Peu ou pas dépendant  
**4 à 6 points** ..... Dépendant  
**7 à 9 points** ..... Fortement dépendant  
**Plus de 10 points** ..... Très fortement dépendant

## Évolution du profil du tabagique


Situez-vous sur l'échelle en faisant une croix.

Besoin du geste		Score (0-10)
Pas de besoin	Besoin impérieux permanent	
Fumer est un plaisir		
Minimum	Maximum	
Fumer vous aide		
Minimum	Maximum	
Fumer est un réflexe		
Minimum	Maximum	


## ANNEXES (PNEUMOLOGIE) (1)

## Débit expiratoire de pointe

Enfants âgés de 5 à 18 ans



Adultes sains





## ANNEXES (PNEUMOLOGIE) (2)

### Échelles de conditions de vie

ÉCHELLE DE KARNOFSKY		ÉCHELLE DE L'OMS ET DE L'ECOG	
Ambulatoires			
100 %	Activité normale, sans difficulté ni plainte.	0	Activité normale.
90 %	Activité normale. minimes symptômes de maladie.	1	Symptômes mais presque totalement ambulatoire.
80 %	Activité normale, mais avec effort. Quelques symptômes de maladie.		
70 %	Capable de vivre seul. Incapable d'avoir une activité normale ou de faire un travail actif.	2	Parfois alité, mais besoin d'être alité moins de 50 % de la journée.
60 %	Capable de vivre seul, mais nécessite de temps en temps une aide.		
Non ambulatoires			
50 %	Nécessite une aide importante et des soins médicaux fréquents.	3	Besoin d'être alité plus de 50 % de la journée.
40 %	Handicapé. Nécessite soins spéciaux et assistance.		
30 %	Grabataire. Hospitalisation indiquée mais mort non imminente.	4	Incapable de se lever.
20 %	Très malade. Hospitalisation indispensable. « Nursing ».		
10 %	Moribond.		
0 %	Décédé.	5	Décédé.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (1)

### Définition

L'hypertension pulmonaire est un état de la pression artérielle pulmonaire hémodynamique et physiopathologique moyenne (PAPm)  $\geq 25$  mmHg au repos caractérisé par une élévation persistante mesurée par cathétérisme.

Définition	Critères hémodynamiques	Groupes
Hypertension pulmonaire	PAPm $\geq 25$ mmHg	Tous les groupes
Hypertension pulmonaire précapillaire	PAPm $\geq 25$ mmHg PAPO $\leq 15$ mmHg Débit cardiaque normal ou diminué	1. HTAP 1'. Maladie veino-occlusive et hémangiomatose capillaire pulmonaire 3. Hypertension pulmonaire des maladies respiratoires et/ou hypoxémie chronique 4. Hypertension pulmonaire post-embolique chronique 5. Hypertension pulmonaire de mécanisme multifactoriel ou incertain
Hypertension pulmonaire post-capillaire	PAPm $\geq 25$ mmHg PAPO $> 15$ mmHg Débit cardiaque normal ou diminué	2. Hypertension pulmonaire des cardiopathies gauches
PAPO : pression artérielle pulmonaire d'occlusion		

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ne constitue donc qu'un sous-groupe (groupe 1) des hypertensions pulmonaires. L'HTAP est caractérisée par l'obstruction progressive des petites artérioles pulmonaires, conduisant à l'insuffisance cardiaque droite et au décès. Il n'existe pas de traitement curatif de la maladie à ce jour en dehors de la transplantation pulmonaire.

## INHIBITEURS DE LA PHOSPHODIESTÉRASE DE TYPE 5

## ■ Sildénafil

REVATIO					
20 mg X 3/j	90 cp. 20 mg 1 fl. pdre pour susp. buv. 10 mg/mL	HOP HOP	I I	100 % 100 %	

## ■ Tadalafil

ADCIRCA					
2 cp./j Insuffisance rénale ou hépatique : 1 cp./j	28 cp. 20 mg 56 cp. 20 mg	HOP HOP	I I		

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (PDE-5) actifs par voie orale.

**INDICATIONS**

HTAP idiopathique, familiale ou associée à une connectivite, de classe fonctionnelle III de la NYHA.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C).
- Antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde.
- Hypotension sévère (pression artérielle < 90/50 mmHg) à l'initiation.
- Perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artérielle (NOIAN).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La gestion des effets indésirables en regard du rapport bénéfices/risques guide la thérapeu-

tique de façon individuelle, en fonction du contexte pathologique et de la réponse du patient. Il existe des risques de priapisme et d'hypotension.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

- Bouffées vasomotrices.
- Céphalées.
- Myalgies.
- Hypotension.
- Troubles digestifs.
- Neuropathie optique ischémique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqué avec les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP3A4.

Adaptation posologique avec les inhibiteurs/inducteurs légers.

**Dérivés nitrés** et donneurs de monoxyde d'azote.

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (2)****Classification [1]**

1. Hypertension artérielle pulmonaire
  - 1.1 Idiopathique
  - 1.2 Héritable (mutation de *BMPR2* principalement)
  - 1.3 Induite par des médicaments et des toxiques
  - 1.4 Associée : connectivites, VIH, hypertension portale, cardiopathie congénitale, schistosomiase, anémie hémolytique chronique
  - 1.5 Hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né
- 1'. Maladie pulmonaire veino-occlusive et/ou hémangiomatose capillaire pulmonaire
2. Hypertension pulmonaire due aux cardiopathies gauches
  - 2.1 Dysfonction systolique
  - 2.2 Dysfonction diastolique
  - 2.3 Valvulopathie
3. Hypertension pulmonaire due aux maladies respiratoires et/ou à une hypoxie
  - 3.1 BPCO
  - 3.2 Maladie pulmonaire interstitielle
  - 3.3 Autres maladies pulmonaires restrictives et/ou obstructives

- 3.4 Troubles ventilatoires du sommeil
- 3.5 Syndrome d'hypoventilation alvéolaire
- 3.6 Exposition chronique à la haute altitude
- 3.7 Anomalies du développement
4. Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique
5. Hypertension pulmonaire de mécanisme non clair ou multifactoriel
  - 5.1 Troubles hématologiques : troubles myéloprolifératifs, splénectomie
  - 5.2 Troubles systémiques : sarcoïdose, histiocytose pulmonaire, lymphangioléiomyomatose, neurofibromatose, vascularites
  - 5.3 Troubles métaboliques : glycogénoses, maladie de Gaucher, troubles thyroïdiens
  - 5.4 Autres : obstruction tumorale, médiastinite fibrosante, insuffisance rénale chronique dialysée

**Signes cliniques**

- Dyspnée d'effort associée ou non à des signes d'insuffisance cardiaque droite.
- Douleurs thoraciques, hépatalgies d'effort.
- Palpitations, lipothymies ou syncopes à l'effort.

**CONSENSUS**

[1] Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension, ESC, 2009

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ENDOTHÉLINE

■ **Ambisentan**

<b>VOLIBRIS</b>					
1 cp./j à 5 ou 10 mg en fonction du contexte	30 cp. 5 mg 30 cp. 10 mg	HOP HOP	I I		

**PROPRIÉTÉS**

L'**ambisentan** est un antagoniste sélectif des récepteurs de type A de l'endothéline (ET<sub>A</sub>), actif par voie orale.

**INDICATIONS**

Traitement de l'HTAP idiopathique ou associée à une connectivite de classe fonctionnelle II ou III NYHA.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**ambisentan**, grossesse, allaitement, absence de contraception efficace chez la femme en âge de procréer, insuffisance hépatique sévère et les transaminases hépa-

tiques ALAT/ASAT > 3N avant l'initiation du traitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une NFS mensuelle doit être réalisée en raison de l'apparition fréquente d'anémies.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

oedèmes périphériques et rétention hydrique, anémie, céphalées et bouffées vasomotrices. Tératogénicité.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association avec la **ciclosporine A** pose des problèmes de surexposition et l'initiation d'un traitement concomitant avec la **rifampicine** doit être étroitement surveillée.

■ **Bosentan**

<b>TRACLEER</b>					
62,5 mg x 2/j pendant 4 sem. puis 125 mg x 2/j	56 cp. 32 mg 56 cp. 62,5 mg 56 cp. 125 mg	HOP HOP HOP	I I I		

**PROPRIÉTÉS**

Le **bosentan** est un antagoniste mixte des récepteurs de type A et de type B de l'endothéline (ET<sub>A</sub> et ET<sub>B</sub>), actif par voie orale.

**INDICATIONS**

Traitement de l'HTAP idiopathique, familiale, associée à une connectivite, à une cardiopathie congénitale de type *shunt* gauche-droite avec syndrome d'Eisenmenger, de classe fonctionnelle III de la NYHA

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique modérée à sévère correspondant à la classe B ou C de la classification de Child-Pugh et des transaminases hépatiques ALAT ou ASAT > 3N.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une surveillance étroite du bilan hépatique doit être mise en place avant même l'instauration du traitement, tout au long de la 1<sup>re</sup> sem., tous les 15 j pendant 2 mois puis 1 fois/mois. Contraception efficace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, bouffées de chaleur, cytolyses hépatiques, myalgies et oedèmes des membres inférieurs.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **bosentan** est un inducteur des CYP 2C9, 3A4 et 2C19, et en est également le substrat. L'association avec des inhibiteurs/inducteurs de ces CYP doit être faite avec précaution. L'association avec le glibenclamide, le **fluconazole** et la **ciclosporine A** est contre-indiquée.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (3)

### Bilan paraclinique

#### Examen d'orientation

L'échographie cardiaque transthoracique permet de rechercher des signes évocateurs d'HTAP. La mesure de la vitesse du flux d'insuffisance tricuspide permet notamment d'estimer la pression artérielle pulmonaire systolique. La sensibilité et la spécificité restent cependant moyennes, et le diagnostic d'HTAP ne peut être affirmé sur cet examen.

#### Diagnostic positif

- Le diagnostic d'HTAP repose sur la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit (PAPm  $\geq$  25 mmHg et PAPO  $\leq$  15 mmHg) avec mesure du débit cardiaque.
- Un test de vasoréactivité en aigu est réalisé par inhalation de monoxyde d'azote (NO). Lors de ce test, une réduction de la PAPm  $\geq$  10 mmHg pour obtenir une PAPm  $\leq$  40 mmHg avec un débit cardiaque augmenté ou inchangé définit une réponse en aigu. Cette réponse en aigu est prédictive de la réponse au long cours au traitement par **inhibiteurs calciques** (uniquement un faible pourcentage des patients atteints d'HTAP).

#### Bilan afin d'éliminer une autre cause d'hypertension pulmonaire

- Recherche d'une pathologie cardiaque (groupe 2) : échographie cardiaque (parfois cathétérisme cardiaque gauche et coronarographie).
- Recherche de maladie respiratoire ou hypoxémie chronique (groupe 3) : GDS, EFR + DLCO, TDM thoracique.
- Recherche de maladie thromboembolique (groupe 4) : scintigraphie pulmonaire ventilation/perfusion (une scintigraphie normale élimine le diagnostic de maladie thromboembolique chronique).

#### Bilan étiologique d'une HTAP (groupe 1)

- Recherche d'une hypertension portale : écho-Doppler porte, sérologies VHC et VHB.
- Recherche de connectivites : facteurs antinucléaires.
- Sérologie VIH.

#### Paramètres d'évaluation de la sévérité d'une HTAP

- Classe fonctionnelle NYHA.
- Test de marche des 6 minutes.
- Cathétérisme droit : en particulier baisse du débit cardiaque.
- Échographie cardiaque : épanchement péricardique, signes de dysfonction cardiaque droite majeure.
- BNP ou NT-proBNP.

### Prise en charge de l'HTAP

#### Mesures générales

- La grossesse doit être formellement contre-indiquée. Une contraception doit être proposée aux femmes en âge de procréer.
- Vaccinations anti-grippale et anti-pneumococcique.
- Oxygénothérapie chez les patients hypoxémiques.
- Éviter les activités physiques excessives responsables de symptômes.
- Soutien psychologique et social.

#### Traitement conventionnel

- Traitement diurétique indiqué en cas de signes d'insuffisance cardiaque droite ou de rétention hydrosodée.
- Traitement anticoagulant oral (objectif INR 1,5-2,5) en cas d'HTAP idiopathique, HTAP héritable, et HTAP liée à la prise d'anorexigène. Il peut être envisagé chez les patients ayant une HTAP associée en l'absence de contre-indication.
- La **digoxine** peut s'envisager chez les patients ayant une HTAP développant une tachyarythmie atriale afin de ralentir la fréquence.

## ANALOGUES DES PROTACYCLINES

## ■ Époprosténol

<b>FLOLAN</b>					
IV continue 24 h/24	1 inj. 0,5 mg pdre + solv.	HOP	I		
	1 inj. 1,5 mg pdre + solv.	HOP	I		

## ■ Iloprost

<b>VENTAVIS</b>					
Sol. pour inhalation par nébuliseur 6-9 x/j	30 amp. 1 mL (10 µg/mL)	HOP	I		
	30 amp. 2 mL (10 µg/mL)	HOP	I		

## ■ Tréprostinil

<b>REMODYLIN</b>					
SC/IV continue	1 fl. 20 mL (1 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (2,5 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (5 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (10 mg/mL) pour perf.	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Ces analogues de la prostacycline agissent sur une des « voies pharmacologiques » impliquées dans l'HTAP. Ceux-ci minimisent l'épaississement des parois vasculaires pulmonaires et impliquent une vasodilatation. **REMODYLIN** présente une demi-vie bien plus longue (2-4 h) que celle de **FLOLAN** (2-7 min).

## INDICATIONS

Traitement de l'HTAP de classe fonctionnelle III ou IV NYHA dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité respectivement à l'époprosténol, l'iloprost ou au tréprostinil.

Insuffisance cardiaque congestive, insuffisance mitrale, maladie coronarienne, infarctus du myocarde < 6 mois, arythmies, tout contexte pathologique majorant les risques hémorragiques et suspicion de maladie veino-occlusive.

**FLOLAN** : œdème pulmonaire lors de la titration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**FLOLAN** et **REMODYLIN** : la présence du dispositif d'injection en continu justifie une attention toute particulière vis-à-vis du risque infectieux et de la douleur locale.

**VENTAVIS** : risque de bronchospasme lors de l'administration.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**FLOLAN** : douleurs, photosensibilité, tachycardie, flushs, douleur de la mâchoire, céphalées, troubles digestifs, syndrome pseudo-grippal, vertiges, anxiété et asthénie.

**VENTAVIS** : toux, céphalées, douleur de la mâchoire, hypotension, nausées et rash cutané.

**REMODYLIN** : douleurs/réactions au site d'injection, éruptions cutanées, rashs, douleurs à la mâchoire, œdèmes, céphalées et troubles digestifs.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les **diurétiques**, **antihypertenseurs** ou **vasodilatateurs** qui majorent le risque d'hypotension et les **AINS**, **antiagrégants plaquettaires** et **anticoagulants** qui majorent le risque de saignement.

## HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (4)

### Traitement médicamenteux spécifique de l'HTAP du groupe 1

La prise en charge des patients atteints d'HTAP impose une évaluation dans un **centre de compétence ou de référence**.

Aucun traitement spécifique ne doit être envisagé en l'absence de confirmation de l'HTAP par cathétérisme cardiaque droit.

Les traitements spécifiques sont recommandés uniquement pour les patients présentant une HTAP du groupe 1 (cf. Classification).

- Chez de rares patients (< 10 % des HTAP idiopathiques), il existe une réponse vasodilatatrice en aigu. Chez ces patients, les traitements par **inhibiteur calcique** à forte dose doivent être initiés, permettant d'améliorer très significativement la survie de ces « répondeurs ».

- En l'absence de réponse en aigu au NO, les **inhibiteurs calciques** sont délétoires et ne doivent pas être utilisés. Il existe alors une indication aux traitements spécifiques de l'HTAP. Ces traitements ciblant la dysfonction endothéliale ont une action vasodilatatrice et antiroliférative comportent 3 classes médicamenteuses :

- **prostacyclines et leurs dérivés** : **époprosténol** intraveineux continu, **tréprostinil** sous-cutané ou **iloprost** inhalé ;

- **antagonistes des récepteurs de l'endothéline (ARE)** : **bosentan** et **ambrisentan** (traitements oraux) ;

- **inhibiteurs des phosphodiésterases de type 5 (IPDE5)** : **sildénafil** et **tadalafil** (traitements oraux).

- Les recommandations actuelles ERS/ESC [1] proposent de déterminer la stratégie thérapeutique en fonction de la classe fonctionnelle NYHA :

- pour les patients en classe fonctionnelle NYHA II, les traitements par voie orale (**ARE** ou **IPDE5**) sont privilégiés ;

- pour les patients en classe fonctionnelle NYHA III, les 3 classes thérapeutiques peuvent être proposées ;

- pour les patients les plus sévères en

classe fonctionnelle NYHA IV, le traitement de référence est l'**époprosténol** administré en intraveineux continu du fait de sa 1/2 vie très courte.

- Après l'initiation d'un traitement spécifique, une réévaluation à 4 mois est nécessaire, elle comprend : classe fonctionnelle NYHA, test de marche de 6 minutes, et cathétérisme cardiaque. En l'absence d'amélioration clinique, fonctionnelle ou hémodynamique satisfaisante, il est proposé d'associer les différents traitements (**traitement combiné séquentiel**).

- La stratégie actuelle de prise en charge actuelle s'oriente de plus en plus vers des **traitements combinés d'emblée**.

- En l'absence d'amélioration, l'indication d'une transplantation (bipulmonaire ou cardiopulmonaire) doit être discutée.

### Prise en charge des autres formes d'hypertension pulmonaire (hors HTAP)

Dans les autres formes d'hypertension pulmonaire, le traitement repose sur le traitement étiologique.

- Groupe 2, HTP liée à une cardiopathie gauche : traitement de la cardiopathie gauche.

- Groupe 3, HTP liée aux maladies respiratoires chroniques ou à l'hypoxémie : oxygénothérapie, traitement de la pathologie pulmonaire.

- Groupe 4, HTP liée à une maladie thromboembolique chronique : l'indication d'un geste chirurgical par thromboendartériectomie doit systématiquement être discutée avec une équipe médicale et chirurgicale ayant l'expérience de cette pathologie.

- HTP groupe 1', maladie veino-occlusive pulmonaire et/ou hémangiomatose capillaire pulmonaire : il s'agit d'une forme particulière d'HTAP touchant préférentiellement les veines pulmonaires, qui se caractérise par un mauvais pronostic et un risque d'œdème pulmonaire avec les traitements spécifiques de l'HTAP. Le traitement de référence reste la transplantation pulmonaire.



## CORTICOÏDES INHALÉS (1)

## ■ Béclométasone

<b>MIFLASONE</b>					
Pdre pour inhalation buccale	60 gél. pdre 100 µg	3,14	I	65 %	0,05
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal.	60 gél. pdre 200 µg	5,73	I	65 %	0,10
x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	60 gél. pdre 400 µg	12,06	I	65 %	0,20
<b>ECOBEC</b>					
Inhalation buccale	200 doses 250 µg	20,86	I	65 %	0,10
Traitement continu anti-inflammatoire de l'asthme persistant					
Formes légères à modérées :					
A. 1-2 inhal x 2/j					
E. 1 inhal. x 1-2/j					
Formes sévères :					
A. 4 inhal. x 2/j					
E. 2 inhal. x 2/j					
<b>BÉCOTIDE</b>					
Idem <b>ECOBEC</b>	200 doses 250 µg	21,05	I	65 %	0,11
<b>QVAR AUTOHALER</b>					
Flacon pressurisé pour inhalation buccale	200 doses 100 µg	31,27	I	65 %	0,16
Formes légères à modérées					
A. et E. (à partir de 4 ans) : 1-2 inhal. x2/j					
Formes sévères					
A. et E. (à partir de 4 ans) : 4 inhal. x2/j					
<b>QVARSPRAY</b>					
Idem <b>QVAR AUTOHALER</b>	100 doses 100 µg	11,71	I	65 %	0,12

## ASTHME (2) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (2)

### Évaluation du contrôle de l'asthme sur 4 sem. [1]

	Contrôle total (tous les critères suivants)	Contrôle partiel (> 1 critère)	Non contrôlé
Symptômes diurnes	Aucun (≤ 2/sem.)	> 2/sem.	3 critères ou plus du contrôle partiel lors d'une même sem.
Limitation des activités	Aucune	Présence	
Symptômes nocturnes/réveils	Aucun	Présence	
Utilisation de <b>β2- mimétiques de courte durée d'action</b>	Aucun (≤ 2/sem.)	> 2/sem.	
Fonction respiratoire (VEMS ou DEP)	Normale	< 80 % de la théorique ou de la meilleure valeur	
Évaluation du risque futur	Mauvais suivi, fréquence des exacerbations de l'année passée, admission en réanimation, faible VEMS, tabagisme, doses des médicaments		

### Prise en charge [1]

Les médicaments de l'asthme sont de deux types : les traitements de fond et les traitements bronchodilatateurs d'action rapide.

- Les traitements de fond sont pris quotidiennement et au long cours afin d'obtenir le contrôle de l'asthme principalement grâce à leurs effets anti-inflammatoires.
- Les traitements bronchodilatateurs d'action rapide sont utilisés à la demande afin de soulager rapidement les symptômes en

entraînant une réversibilité de la bronchoconstriction.

La voie inhalée doit toujours être préférée aux autres voies d'administration dans l'asthme, du fait de sa plus grande efficacité et innocuité.

Doivent toujours être recherchés et traités : rhinite saisonnière ou non (présente dans près de 80 % des cas d'asthme) et reflux gastro-œsophagien. Leur traitement est nécessaire pour obtenir un bon contrôle de l'asthme.

## CORTICOÏDES INHALÉS (2)

## ■ Budésonide

<b>PULMICORT TURBUHALER</b>					
Inhalateur/pdre	200 bouf. 100 µg	18,41	I	65 %	0,09
Asthme, traitement de fond : 1 inhal./j à 4 inhal. à 200 µg x 2/j ou 1 à 3 inhal. à 400 µg x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	200 bouf. 200 µg	31,22	I	65 %	0,16
	100 bouf. 400 µg	31,22	I	65 %	0,31
<b>NOVOPULMON NOVOLIZER</b>					
Aérosol-doseur	200 doses 200 µg	22,02	I	65 %	0,11
Asthme, traitement de fond : 1 bouf./j à 4 bouf. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	200 doses 200 µg + inhalateur	27,98	I	65 %	0,14
	100 doses 400 µg	22,02	I	65 %	0,22
	100 doses 400 µg + inhalateur	27,65	I	65 %	0,28
	200 doses 400 µg + inhalateur	43,76	I	65 %	0,22
<b>MIFLONIL</b>					
Inhalateur/pdre	60 gél. pdre 200 µg	8,59	I	65 %	0,14
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 bouf./j	60 gél. pdre 400 µg	16,65	I	65 %	0,28
<b>PULMICORT</b>					
Traitement continu de l'asthme persistant de l'enfant 0,5 à 2 mg/j en 2 aérosols	20 bouf. susp. p. inhal. 0,5 mg/2 mL	26,98	I	65 %	1,35
	20 bouf. susp. p. inhal. 1 mg/2 mL	37,26	I	65 %	1,86

## ■ Fluticasone

<b>FLIXOTIDE</b>					
Aérosol-doseur	120 bouf. 50 µg	9,64	I	65 %	0,08
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 bouf. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)	120 bouf. 125 µg	17,95	I	65 %	0,15
	120 bouf. 250 µg	34,23	I	65 %	0,29
<b>FLIXOTIDE DISKUS</b>					
Inhalateur/pdre	60 doses 100 µg	9,64	I	65 %	0,16
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal. x 2/j (en fonction du stade de la maladie)					
Inhalateur/pdre	60 doses 250 µg	17,95	I	65 %	0,30
Asthme sévère : 1 à 2 inhal. x 2/j	60 doses 500 µg	34,23	I	65 %	0,57

## ■ Ciclesonide

<b>ALVESCO</b>					
Fl. pressurisé pour inhalation buccale	60 doses 80 µg	17,62	I	65 %	0,29
Asthme persistant, traitement de fond A. et E. > 12 ans : 1 dose de 80 ou 160 µg x 1/j le matin ou le soir	60 doses 160 µg	29,82	I	65 %	0,50

## ■ Mométasone

<b>ASMANEX TWISTHALER</b>					
A. et E. > 12 ans, posologie initiale : 200 µg x 2/j ou 400 µg x 1/j	30 doses 200 µg	9,69	I	65 %	0,32
	60 doses 200 µg	18,84	I	65 %	0,31
	30 doses 400 µg	18,84	I	65 %	0,63
	60 doses 400 µg	36,47	I	65 %	0,61

## ASTHME (3) – CHRONIQUE DE L'ADULTE (3)

### Traitement de fond [1]

#### ► Corticothérapie inhalée

La corticothérapie inhalée, par son effet anti-inflammatoire, est le traitement de

fond actuel le plus efficace dans le contrôle de l'asthme persistant.

Les équivalences de dose estimées de **corticoïdes inhalés** sont résumées dans le Tableau ci-dessous [1].

### Équivalences des doses quotidiennes de corticoïdes inhalés chez l'adulte\* [1]

Molécule	Faible dose (µg)	Dose moyenne (µg)	Forte dose (µg)
<b>Béclométasone dipropionate</b>	200-500	> 500-1 000	> 1 000-2 000
<b>Budésonide</b>	200-400	> 400-800	> 800-1 600
<b>Cicléronide</b>	80-160	> 160-320	> 320-1 280
<b>Flunisolide</b>	500-1 000	> 1 000-2 000	> 2 000
<b>Fluticasone</b>	100-250	> 250-500	> 500-1 000
<b>Mométasone furoate</b>	200-400	> 400-800	> 800-1 200
<b>Triamcinolone acétonide</b>	400-1 000	> 1 000-2 000	> 2 000

La plupart du bénéfice de la corticothérapie inhalée est obtenue pour de faibles doses, équivalente à 400 µg de **budésonide** par jour.

En cas de contrôle insuffisant de l'asthme avec des corticostéroïdes inhalés seuls, il est préférable d'y associer une autre classe thérapeutique plutôt que d'augmenter la corticothérapie inhalée.

#### ► β<sub>2</sub>-mimétiques de longue durée d'action

Les **β<sub>2</sub> de longue durée d'action (LDA)** : **formotérol** ou **salmétérol**, ne doivent pas être utilisés en monothérapie dans le traitement de fond de l'asthme.

Par rapport à la corticothérapie inhalée seule, l'**association de β<sub>2</sub> de LDA à la corticothérapie inhalée** améliore les scores de symptômes, la fonction respiratoire, et réduit le recours aux **β<sub>2</sub> de CDA**, le

nombre d'exacerbations et la dose de corticothérapie nécessaire au contrôle de l'asthme.

La plus grande efficacité de l'**association de la corticothérapie inhalée et des β<sub>2</sub> de LDA** a entraîné le développement de traitements combinés : **formotérol + budésonide (SYMBICORT)** ou **salmétérol + fluticasone (SERETIDE)**.

Le **formotérol** est un **β<sub>2</sub> de LDA** qui possède une action rapide lui permettant d'être utilisé en cas de crise en remplacement des **β<sub>2</sub> de CDA**. L'association **formotérol et budésonide SYMBICORT 200** peut être utilisée en traitement de fond et de crise. Cette nouvelle stratégie a montré qu'elle permettait de réduire le nombre d'exacerbations et qu'elle améliorait le contrôle de l'asthme pour des doses relativement faibles de traitement.

\* Les comparaisons sont fondées sur les données d'efficacité des différents corticoïdes.

**CORTICOÏDES INHALÉS (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

**Corticoïdes** associant une action locale puissante (sur l'inflammation bronchique) à une très faible activité systémique (métabolisation hépatique en dérivés inactifs) pour des doses  $< 2\,000\ \mu\text{g/j}$ .

**INDICATIONS**

Traitement de fond de l'asthme.  
Toux spasmodique, BPCO spastique.

**MISES EN GARDE**

Prudence et surveillance rapprochée en cas de tuberculose ou infection mycotique pulmonaire évolutive, ou ulcère digestif non traité.

**Grossesse** 1<sup>er</sup> trimestre et **allaitement** : n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Éducation** : vérifier l'utilisation correcte du système d'inhalation; éventuellement, s'aider d'une chambre d'inhalation pour les sprays. Prévenir le patient que ce n'est pas un traitement de la crise d'asthme ! L'effet des **corticoïdes inhalés** nécessite un délai de quelques jours et est maximal après quelques mois.  
Prévention des candidoses : rincer la bouche, gargariser, puis avaler un verre d'eau après chaque prise. Préférer 2 prises/j.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Uniquement locaux, réversibles à l'arrêt : irritation pharyngée, raucité de la voix, candidose oropharyngée (5 à 10 %; prévenue par des mesures d'hygiène buccale simples).  
Rare : réaction paradoxale (toux, bronchospasme) liée aux excipients (gaz propulseur).

**Mode d'emploi des aérosols-doseurs**

- Retirer le capuchon, agiter l'aérosol-doseur.
- Puis inspirer lentement (4 s) et profondément en déclenchant la pulvérisation (au début de l'inspiration).
- Retenir la respiration pendant 5 à 10 s (poumons « remplis »), puis reprendre sa respiration normale.
- Attendre 30 à 60 s avant la bouffée suivante.

50 % des patients ne savent pas les utiliser.

Il y a 3 possibilités qui suppriment le problème de la coordination « mains-poumons », mais qui doivent être expliquées au patient :

- aérosol-doseur à autodéclenchement, type *Autohaler* (nécessité d'un débit inspiratoire minimal) ;
- système d'inhalation de poudre, type *Turbuhaler*, *Diskus* ou *Clickhaler* ;
- utilisation du spray avec une chambre d'inhalation, type *Nebuhaler*, *Aérosopic*, *Volumatic*, *Aérochambre*. Dans ce cas, la bouffée est pulvérisée dedans, et l'inspiration profonde doit être faite dans les 5 s suivant le déclenchement.

## ASSOCIATIONS DE CORTICOÏDES INHALÉS ET DE $\beta_2$ DE LONGUE DURÉE D'ACTION

### ■ Budésonide + formotérol

<b>SYMBICORT TURBUHALER</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 à 4 inhal. x 2/j (en fonction du palier de sévérité)	120 doses : 100 µg budésonide + 6 µg formotérol	39,48	I	65 %	0,33
	120 doses : 200 µg budésonide + 6 µg formotérol	45,33	I	65 %	0,38
	60 doses : 400 µg budésonide + 12 µg formotérol	44,50	I	65 %	0,74
<b>INNOVAIR</b>					
Idem <b>SYMBICORT TURBUHALER</b>	120 doses : 100 µg budésonide+ 6 µg formotérol	41,08	I	65 %	0,34
<b>FORMODUAL</b>					
Asthme persistant, traitement de fond, en seconde intention A. 1 à 2 inhal. x 2/j	120 doses : 100 µg budésonide + 6 µg formotérol	41,08	I	65 %	0,34

### ■ Salmétérol + fluticasone

<b>SERETIDE DISKUS</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 à 2 inhal. x 2/j (en fonction du palier de sévérité)	60 doses : 100 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	37,85	I	65 %	0,63
	60 doses : 250 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	43,70	I	65 %	0,73
	60 doses : 500 µg salmétérol+ 50 µg fluticasone	58,24	I	65 %	0,97

Pour la pharmacologie de ces associations, se référer aux pharmacologies respectives des **corticoïdes inhalés** et des **bronchodilatateurs de longue durée d'action**.

## ANTILEUCOTRIÈNE

## ■ Montélukast

<b>SINGULAIR</b>					
Asthme, traitement de fond : 1 cp./j (A. : 10 mg ; E. 6-14 ans : 5 mg) au coucher	28 cp. à croquer 5 mg	27,87	I	65 %	1,00
	50 cp. à croquer 5 mg	HOP	I		
	28 cp. 10 mg	27,87	I	65 %	1,00
	50 cp. 10 mg	HOP	I		
	28 sach. glé. 4 mg	27,87	I	65 %	1,00

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste des récepteurs des leucotriènes (substances pro-inflammatoires bronchoconstrictrices); inhibition de la bronchoconstriction induite par l'effort. L'effet bronchodilatateur est observé 2 h après la prise orale.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de l'asthme léger à modéré, *en adjonction* aux **corticoïdes inhalés** lorsque ceux-ci ne permettent qu'un contrôle insuffisant de l'asthme.

Traitement préventif de l'asthme d'effort.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des composants.

**MISES EN GARDE**

Prévenir le patient qu'il ne s'agit pas d'un traitement de la crise d'asthme !

**Grossesse** et **allaitement** : n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Enfant : prendre à distance du repas (2 h).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Bénins et rares : douleurs abdominales, céphalées.

## ANTICORPS ANTI-IgE

### ■ Omalizumab

<b>XOLAIR</b>					
Asthme allergique persistant sévère non contrôlé : dose adaptée au poids et au dosage d'IgE totales	1 ser. 75 mg/0,5 mL	226,14	I	65 %	226,14
	1 ser. 150 mg/1 mL	441,85	I	65 %	441,85

#### PROPRIÉTÉS

L'**omalizumab** est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe de manière sélective aux immunoglobulines E (IgE) humaines. Il empêche la fixation des IgE aux récepteurs de haute affinité FcεpRI, réduisant ainsi la quantité d'IgE circulantes pouvant déclencher la chaîne de réactions allergiques.

#### INDICATIONS

Traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l'asthme chez les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans) atteints d'asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané positif ou une réactivité *in vitro* à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un traitement quotidien par un **corticoïde inhalé** à forte dose et un **bêta2-agoniste inhalé à longue durée d'action**, présentent une réduction de la fonction pulmonaire (VEMS < 80 % de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de l'asthme.

Le traitement par **omalizumab** ne doit être envisagé que chez les patients présentant un asthme dont la dépendance aux IgE a été établie sur des critères probants.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dose et fréquence d'administration adaptées et déterminées en fonction du taux initial d'IgE (UI/mL), mesuré avant le début du traitement, et du poids corporel (kg).

Les injections SC seront faites dans la région deltoïde du bras. En cas d'impossibilité, elles pourront être réalisées dans la cuisse.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Lors des essais cliniques, les événements indésirables le plus fréquemment rapportés ont été des réactions au point d'injection, notamment une douleur, un gonflement, un érythème et un prurit au point d'injection, ainsi que des maux de tête. La plupart de ces réactions ont été d'intensité légère ou modérée.



## BRONCHODILATEURS (1) – THÉOPHYLLINE ET DÉRIVÉS (1)

### ■ Théophylline

<b>DILATRANE LP</b>					
Asthme, traitement de fond (en association aux <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 8 à 12 mg/kg/j en 2 prises (car libération prolongée)	30 gél. 50 mg	1,95	II	30 %	0,07
	30 gél. 100 mg	2,41	II	30 %	0,08
	30 gél. 200 mg	2,73	II	30 %	0,09
	30 gél. 300 mg	3,07	II	30 %	0,10
<b>DILATRANE</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b> en 3 prises	40 c-mes. 50 mg	3,59	II	65 %	0,09
<b>EUPHYLLINE LA</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 gél. 50 mg	2,16	II	30 %	0,07
	30 gél. 100 mg	2,25	II	30 %	0,08
	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 gél. 300 mg	3,19	II	30 %	0,11
	30 gél. 400 mg	3,54	II	30 %	0,12
<b>THÉOSTAT LP</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 cp. séc. 100 mg	2,28	II	30 %	0,08
	30 cp. séc. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 cp. séc. 300 mg	3,40	II	30 %	0,11
	100 cp. séc. 300 mg	HOP			
<b>XANTHIUM LP</b>					
Idem <b>DILATRANE LP</b>	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08
	30 gél. 300 mg	2,95	II	30 %	0,10
	30 gél. 400 mg	3,44	II	30 %	0,11
<b>TEDRALAN</b>					
7 à 12 mg/kg/j en 2 prises	30 gél. 200 mg	2,34	II	30 %	0,08

### ■ Bamifylline

<b>TRENTADIL</b>					
Asthme, traitement de fond (en association aux <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 2 à 3 cp. x 2/j	20 cp. 300 mg	3,42	II	30 %	0,17

## BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (2)

### Facteurs pronostiques de mortalité

- Clinique : sévérité de la dyspnée, toux et expectoration, sédentarité.
- Poursuite de l'intoxication tabagique.
- Fréquence et sévérité des exacerbations.
- Fonction respiratoire : VEMS.
- Performance à l'exercice : test de marche de 6 min.
- État nutritionnel : IMC.
- Hypertension pulmonaire.
- Comorbidités : cardiovasculaires, cancer bronchique, anémie, dépression.
- Thérapeutique : indication OLD, **corticoïdes oraux** au long cours.

### Prise en charge thérapeutique [1]

#### Objectifs du traitement

- Limiter le handicap : améliorer la qualité de vie et la tolérance à l'exercice.
- Réduire la fréquence et l'intensité des exacerbations.
- Prévenir et contrôler les symptômes respiratoires (dyspnée).

#### Prévention et réduction des facteurs de risque

(cf. Sevrage tabagique)

Dans tous les cas, effet bénéfique de l'AR-RÊT DU TABAC : conseils répétés, prise en charge spécialisée multidisciplinaire, substituts nicotiniques.

Limitation du tabagisme passif.

Mesures de protection individuelle et collective contre les polluants professionnels.

### BPCO = Stades I, II, III

#### Bronchodilatateurs

Au cours de la BPCO à l'état stable, la prescription de **bronchodilatateurs** inhalés, associés ou non à une corticothérapie

inhalée (selon la valeur du VEMS, le nombre d'exacerbations et le traitement antérieur) est recommandée afin d'améliorer les symptômes et la qualité de vie et de réduire la fréquence des exacerbations. Il convient de s'assurer que la technique d'inhalation est correcte à chaque consultation.

Au choix :

- **Anticholinergiques** inhalés :
  - de courte durée d'action (CDA < 8 h), **ipratropium bromure (ATROVENT)** : 2 bouffées x 3/j ;
  - de longue durée d'action (LDA > 24 h), **tiotropium (SPIRIVA)** : 1 gél./j.
- **Bêta-2-agonistes** inhalés :
  - de courte durée d'action (4 à 6 h), **salbutamol (VENTOLINE)** : 2 bouffées x 3 à 4/j, surtout si symptômes discontinus ;
  - de longue durée d'action (12 h), **formotérol (FORADIL)**, 1 gél. x 2/j ; **salmétérol (SEREVENT)**, 2 à 4 bouffées/j.
- Association des deux (**BRONCHODUAL**) **β2 CDA + anticholinergique CDA** : 2 bouffées x 3 à 4 /j.

Il n'existe pas de preuve de l'avantage d'une classe par rapport à l'autre, le choix de la classe dépend de la réponse individuelle sur les symptômes et les effets secondaires [1].

En cas d'efficacité insuffisante, il peut être justifié de changer de classe de **bronchodilatateur** ou de prescrire des associations, et de vérifier que les conditions d'utilisation sont correctes.

L'association de 2 classes de **bronchodilatateurs** peut améliorer la réponse fonctionnelle (VEMS) sans pour autant avoir démontré de bénéfice sur la symptomatologie ou les exacerbations.

## BRONCHODILATEURS (2) – THÉOPHYLLINE ET DÉRIVÉS (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Bronchodilatateur (par relaxation du muscle lisse bronchique) inhibiteur de la phosphodiestérase ; la bronchodilatation est inférieure à celle des  $\beta_2$ -stimulants (en partie en raison de la limitation des doses).

Action anti-inflammatoire à des doses inférieures aux doses « bronchodilatatrices ».

Action stimulante centrale (et analeptique respiratoire), sauf pour la **bamifylline**.

Absorption irrégulière par voie rectale ; métabolisation hépatique puis excrétion urinaire ; délai d'action > 1 h, demi-vie de 5 h (10 h pour formes LP).

### INDICATIONS

Traitement symptomatique continu (utilisé « en 3<sup>e</sup> ligne ») de l'asthme (si **corticoïdes inhalés** seuls insuffisants, éventuellement associés à des  $\beta_2$ -mimétiques inhalés de longue durée d'action), et des BPCO spastiques.

**Remarque :** la **théophylline** n'a pas d'indication en 1<sup>re</sup> intention dans la crise d'asthme ! (c'est pourquoi les formes injectables n'ont pas été mentionnées ici).

### CONTRE-INDICATIONS

Intolérance à la **théophylline**.

Surtout : interactions médicamenteuses.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La marge thérapeutique des théophyllines est étroite (taux efficace proche du taux toxique), imposant une posologie adaptée à chaque cas (terrain, survenue d'effets indésirables) et un **contrôle des taux sériques** : commencer à 8 à 10 mg/kg/j (poids idéal, chez l'obèse) ; diminuer de 50 % si insuffisance hépatique.

Théophyllinémie efficace : 10 à 15 mg/L.  
Théophyllinémie toxique : 20 mg/L.

Utiliser avec prudence en cas de coronaropathie, insuffisance cardiaque, hyperthyroïdie, comitialité, fièvre, ulcère gastroduodénal, fin de grossesse, âge avancé.

Préférer les formes à libération prolongée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Variables, aux doses thérapeutiques : nervosité, excitabilité, pesanteur gastrique, céphalées.

À plus forte dose : tachycardie, nausées, vomissements, diarrhée, insomnie, tremblements (peuvent révéler un surdosage !)

Surdosage : agitation, confusion mentale, convulsions, hyperthermie, troubles du rythme cardiaque, hypotension.  
Prise en charge en réanimation !

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **énoxacine** et **troléandomycine** (risque de surdosage en **théophylline**).

Associations déconseillées : **érythromycine** et **viloxazine** (risque de surdosage en **théophylline**).

Associations augmentant la théophyllinémie : **allopurinol**, **cimétidine**, **fluoroquinolone**, **fluconazole**, **fluvoxamine**, **mexilétine**, **ticlopidine**, **clarithromycine**, **josamycine**, **roxithromycine**.  
Les inducteurs enzymatiques (**phénobarbital**, **carbamazépine**, **phénytoïne**, **rifampicine**) diminuent la théophyllinémie.

Le tabagisme et l'alcool diminuent la demi-vie d'élimination de la **théophylline**.

## BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (3)

### Corticothérapie inhalée : non systématique

Aucun **corticostéroïde inhalé (CSI)** pris isolément n'a obtenu l'AMM dans le traitement de la BPCO. Seules les associations fixes avec un **bronchodilatateur** ont obtenu l'AMM.

Les **CSI** ne semblent pas ralentir l'évolution de la BPCO, mais permettent de réduire la fréquence des exacerbations chez les sujets les plus sévères.

Les indications des **CSI en association avec un  $\beta_2$  LDA** reconnues sont :

- les patients atteints de BPCO sévère = stade III et IV ;
- les patients présentant des exacerbations répétées malgré une prise en charge optimale.

Les **corticoïdes** par voie générale ne doivent pas être prescrits au long cours, en raison de l'importance des effets secondaires. Il n'y a pas de relation entre la réponse à une corticothérapie orale de courte durée et la réponse à long terme à la corticothérapie inhalée.

### Autres

- Éradication des foyers infectieux susceptibles de favoriser les infections pulmo-

naires : recherche et traitement des foyers infectieux ORL et des foyers stomatologiques.

- Prise en charge psychosociale et nutritionnelle.

- Vaccination antigrippale tous les ans, et antipneumococcique (**PNEUMO 23**) tous les 5 ans.

- Les **antitussifs** sont contre-indiqués car ils peuvent majorer l'encombrement.

- Les  **$\beta$ -bloquants cardiosélectifs** peuvent être utilisés dans la BPCO.

- Éviter les psychotropes, surtout **benzodiazépines** et **barbituriques**.

### Indications de chirurgie = rare

Dans de rares cas d'emphysème, une résection de bulle ou une réduction de volume pulmonaire peut être discutée afin d'améliorer la mécanique ventilatoire.

À un stade très avancé, peut se discuter la transplantation pulmonaire.

### Surveillance

Épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR), radio de thorax (RP),  $\pm$  gaz du sang (GDS) tous les 6 mois à 2 ans, en fonction de la sévérité.

### Trautement de la BPCO en fonction du stade de sévérité

I : léger	II : modéré	III : sévère	IV : très sévère
Réduction des facteurs de risque : sevrage tabagique, vaccination antigrippale			
	Un ou plusieurs <b>bronchodilatateurs de longue durée d'action</b> Réhabilitation respiratoire		
		<b>CSI</b> en association fixe si exacerbations répétées (VEMS < 60 % pour <b>salmétérol/fluticasone</b> )	
			Oxygénothérapie si IRC Traitements chirurgicaux

## BRONCHODILATEURS (3) – BÊTA-2-STIMULANTS D'ACTION BRÈVE (1)

### ■ Salbutamol

<b>VENTOLINE</b>					
Crise d'asthme : 2 bouf. à répéter 15 min après si besoin Asthme d'effort : 2 bouf. 15 min avant l'effort Crise d'asthme résistant au « spray » à domicile : 1 amp. SC ou IM Crise d'asthme sévère (ou décompensation de BPCO) : nébuliser 1 unidose avec un générateur d'aérosol ; répéter selon les besoins	200 bouf. 100 µg    6 amp. (mL) 0,5 mg  20 unidoses 1,25 mg/2,5 mL 60 unidoses 2,5 mg/2,5 mL 60 unidoses 5 mg/2,5 mL	5,06   2,47  3,86 14,84 21,87	I   I  I I I	65 %   65 %  65 % 65 % 65 %	0,03   0,41  0,19 0,25 0,36
<b>VENTILASTIN NOVOLIZER</b>					
Idem <b>VENTOLINE</b>	200 doses pdre 100 µg pour inh.	9,39	I	65 %	0,05
<b>ASMASAL CLICKHALER</b>					
Idem <b>VENTOLINE 100 µg</b>	200 doses 90 µg	10,84	I	65 %	0,06
<b>SALBUMOL FORT</b>					
Asthme aigu grave : perfusion IV continue 0,5 à 1 mg/h en réanimation sous scope	5 amp. 5 mg/5 mL	HOP	I		
<b>AIROMIR AUTOHALER</b>					
Idem <b>VENTOLINE 100 µg</b>	200 bouf. 100 µg	9,79	I	65 %	0,05

### ■ Terbutaline

<b>BRICANYL</b>					
Asthme aigu grave (ou décompensation de BPCO) : nébuliser 1 unidose avec un générateur d'aérosol ; répéter selon les besoins Crise d'asthme résistant au « spray », à domicile : 1 amp. SC Asthme aigu grave : perfusion IV continue 0,5 à 1 mg/h en réanimation sous scope	50 inhal. 5 mg/2 mL   8 amp. 1 mL (0,5 mg)	20,55   2,98	I   I	65 %   65 %	0,41   0,37
<b>BRICANYL TURBUHALER</b>					
Avec système d'inhal. <i>Turbuhaler</i> Crise d'asthme : 1 inhalation, à répéter 15 min après si besoin Asthme d'effort : 1 inhalation 15 min avant l'effort	100 doses 500 µg	5,61	I	65 %	0,06

## BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (4)

### Insuffisance respiratoire chronique

Prise en charge à 100 % de l'IRC.

L'insuffisance respiratoire chronique grave donne lieu à l'exonération du ticket modérateur. Outre la gravité clinique, elle est définie par :

- une hypoxémie,  $\text{PaO}_2 < 70$  mmHg, au repos, à l'état stable, constatée sur 2 gaz du sang artériels à au moins 3 semaines d'intervalle ;
- IRC grave :  $\text{PaO}_2 \leq 55$  mmHg ou  $< 60$  mmHg avec des signes d'insuffisance ventriculaire droite ou une polyglobulie.

### Oxygénothérapie de longue durée (OLD)

#### Indications

Les indications de l'OLD reposent sur la mesure de la  $\text{PaO}_2$ , au repos, à l'état stable, vérifiée sur 2 gaz du sang espacés d'au moins 3 sem., sous traitement médical optimal :

- $\text{PaO}_2 \leq 55$  mmHg ;
- ou  $\text{PaO}_2$  entre 55 et 59 mmHg s'il existe :
  - HTAP (PAPm  $> 25$  mmHg) ;
  - signes cliniques de cœur pulmonaire chronique ;
  - désaturations nocturnes sans rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil ( $\text{SpO}_2 < 90$  % plus de 30 % du temps) ;
  - polyglobulie.

L'hypercapnie n'est ni une indication ni une contre-indication à l'OLD.

#### Modalités

- Au moins 15 h/j (absence de bénéfice en cas de durée inférieure). L'OLD augmente la survie chez les patients au stade de l'IRC grave.

- Sources d'oxygène : oxygène liquide ou extracteur d'oxygène.

- Voie d'administration nasale le plus souvent (lunettes).

- Adaptation du débit d' $\text{O}_2$  :

- débit minimal permettant d'obtenir une  $\text{PaO}_2$  entre 65 et 70 mmHg ;
- augmentation du débit d' $\text{O}_2$  à l'effort en cas de désaturation à l'effort.

- Nécessité d'un suivi à domicile (prestataire).

Dans le cas général, il n'y a pas d'indication d'oxygénothérapie nocturne ou de déambulation en dehors du cadre de l'OLD.

Le tabagisme actif contre-indique classiquement l'OLD (risque de combustion).

### Ventilation mécanique à domicile

L'objectif est de limiter l'hypoventilation alvéolaire (et donc l'hypercapnie).

Il existe deux types principaux de ventilation mécanique (utilisation d'un ventilateur) différant par leur interface avec le malade :

- la ventilation non invasive (VNI) administrée à l'aide d'un masque facial ou nasal ;
- la ventilation invasive par trachéotomie.

#### Indications de la VNI :

- En situation d'échec de l'OLD, la VNI peut être proposée en présence :

- de  $\text{PaCO}_2 > 55$  mmHg ;
- et d'instabilité clinique avec une fréquence élevée d'hospitalisations pour décompensations.

- En cas de syndrome d'apnée obstructif du sommeil associé, la VNI est le traitement de référence.

**BRONCHODILATEURS (4) – BÊTA-2-STIMULANTS  
D'ACTION BRÈVE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Agonistes spécifiques des récepteurs  $\beta_2$ -adrénergiques des muscles lisses, donc bronchodilatateurs ; très peu d'effet sur les récepteurs  $\beta_1$ -cardiaques.

Voie inhalée : action dès la première minute, maximale à 15 min, et persistant pendant 6 à 8 h. Passage systémique infime.

Voie SC : délai < 20 min, durée 6 h.

**INDICATIONS**

Voie inhalée : traitement de la crise d'asthme ; traitement de fond de l'asthme (si **corticoïdes inhalés** seuls insuffisants : 3 prises/j), des BPCO spastiques ; prévention de l'asthme d'effort.

Nébulisation : traitement de choix de la crise d'asthme sévère ; décompensation de BPCO.

Voie SC : crise d'asthme résistant au spray, à domicile.

Perfusion IV : asthme aigu grave (en réanimation !).

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune si indication formelle !

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Formes injectables : éviter en cas d'infarctus myocardique en phase aiguë, angor instable ; prudence en cas de cardiopathie obstructive, coronaropathie, hyperthyroïdie, HTA, diabète.

Voie inhalée : consulter si plus de 10 à 15 bouffées par jour (= asthme instable) ; vérifier la prise correcte des sprays (mode d'emploi : cf. **Corticoïdes inhalés**) ; traiter toute surinfection bronchique.

Sportifs : réaction positive au contrôle antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Exceptionnels par voie inhalée : tremblements, palpitations, tachycardie sinusale, nausées, nervosité, vertiges.

Voie parentérale : hyperglycémie, hypokaliémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Voie parentérale : ne pas associer avec l'**halothane** ; incompatibilité avec d'autres spécialités, ou solutés alcalins.

**BRONCHOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (5)****Réhabilitation respiratoire****Indications**

Il est recommandé de proposer une réhabilitation respiratoire à tout patient atteint d'une BPCO et présentant une incapacité ou un handicap respiratoire évaluable notamment chez ceux qui présentent :

- une dyspnée ou une intolérance à l'exercice ;
- une réduction de leurs activités sociales en rapport avec leur état de santé.

Elle est indiquée chez les patients stables ou au décours d'une exacerbation.

**Contre-indications**

- Contre-indication cardiovasculaire à l'exercice.
- Instabilité de l'état respiratoire (acidose respiratoire non compensée).
- Affection interférant avec le processus de réhabilitation.

L'oxygénothérapie n'est pas une contre-indication.

**Bilan préalable**

- Évaluation tabagisme, échelle de qualité de vie.
- EFR complètes.
- GDS.
- PI max, PE max.
- Mesure de la force du quadriceps et de la préhension.
- Stade NYHA.
- Test de marche des 6 min.
- Explorations fonctionnelles à l'exercice.

**Composantes de la réhabilitation respiratoire**

- Traitements physiques.
- Éducation thérapeutique.
- Prise en charge psychologique.
- Sevrage tabagique.
- Suivi nutritionnel.

**CONSENSUS**

- [1] Recommandation pour la pratique clinique - Prise en charge de la BPCO, SPLF, 2009



## BRONCHODILATEURS (5) – BÊTA-2-STIMULANTS DE LONGUE DURÉE D'ACTION (1)

### ■ Formotérol

<b>FORADIL</b>					
Inhalateur + pdré	30 gél. 12 µg	14,27	I	65 %	0,48
Asthme, traitement de fond (en association avec <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 1 gél. à inhaler x 2/j	60 gél. 12 µg	26,68	I	65 %	0,44
Prévention de l'asthme d'effort : 1 gél. à inhaler 30 min avant l'effort					
<b>FORMOAIR</b>					
Fl. pressurisé	100 doses 12 µg	38,01	I	65 %	0,38
Asthme, traitement de fond (en association avec corticoïdes inhalés), BPCO spastiques : 1 bouf. x 2/j					
<b>ASMELOX NOVOZIZER</b>					
Idem <b>FORMOAIR</b>	60 doses 12 µg	23,11	I	65 %	0,39
<b>ATIMOS</b>					
Idem <b>FORMOAIR</b>	100 doses 12 µg	38,01	I	65 %	0,38

### ■ Salmétérol

<b>SEREVENT</b>					
Asthme, traitement de fond (en association avec <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO spastiques : 2 à 4 bouf. (ou 1 à 2 doses à inhaler) x 2/j	120 bouf. 25 µg	21,72	I	65 %	0,18
Prévention de l'asthme d'effort : 2 bouf. (ou 1 dose) 30 à 60 min avant l'effort					
<b>SEREVENT DISKUS</b>					
50 à 100 mg matin et soir	60 doses 50 µg	21,72	I	65 %	0,40

### ■ Bambutérol

<b>OXÉOL</b>					
Idem <b>FORADIL</b> : 1 (à 2) cp./j en 1 prise le soir (max. 20 mg/j)	30 cp. séc. 10 mg	7,35	I	65 %	0,25
	30 cp. séc. 20 mg	13,46	I	65 %	0,45

### ■ Terbutaline

<b>BRICANYL LP</b>					
Idem <b>FORADIL</b> : 1 cp. x 2/j (repas)	30 cp. 5 mg	3,80	I	30 %	0,13

## BRONCHODILATEURS (6) – BÊTA-2-STIMULANTS DE LONGUE DURÉE D'ACTION (2)

### ■ Indacatérol

<b>ONBREZ BREEZHALER</b>					
1 gél. à inhaler/j	10 gél. 150 µg		I	NR	
	30 gél. 150 µg	34,68	I	65 %	1,16
	10 gél. 300 µg		I	NR	
	30 gél. 300 µg	34,68	I	65 %	1,16
<b>OSLIF BREEZHALER</b>					
1 gél. à inhaler/j	10 gél. 150 µg	HOP	I		
	10 gél. 300 µg	HOP	I		
	30 gél. 150 µg	34,68	I	65 %	1,16
	30 gél. 300 µg	34,68	I	65 %	1,16

### PROPRIÉTÉS

Agonistes spécifiques des récepteurs  $\beta_2$ -adrénergiques des muscles lisses, donc bronchodilatateurs ; très peu d'effet sur les récepteurs  $\beta_1$ -cardiaques.

Voie inhalée : action en 5 min (**FORADIL**, **ONBREZ** et **OSLIF**) à 15 min (**SEREVENT**), persistant pendant au moins 12 h. Passage systémique très faible.

Voie orale : action en 1 à 3 h, persistant 12 h (**bambutérol** : 24 h).

### INDICATIONS

Traitement symptomatique continu de l'asthme (en association avec **corticoïdes inhalés**) quand il nécessite des  **$\beta_2$ -stimulants** quotidiens, ou asthme nocturne. BPCO spastique. Prévention de l'asthme d'effort.

**NE TRAITENT PAS LA CRISE D'ASTHME !**

### CONTRE-INDICATIONS

Aucune si indication formelle.

**Grossesse** et **allaitement (bambutérol)**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence si cardiopathie obstructive, coronaropathie, hyperthyroïdie, HTA, diabète.

Voie inhalée : vérifier la prise correcte des sprays (cf. **Corticoïdes inhalés** ; pour **FORADIL** : percer la gélule dans l'inhalateur puis inhaler) ; traiter toute surinfection bronchique.

Sportifs : réaction positive au contrôle antidopage.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Exceptionnels par voie inhalée (et rares par voie orale) : tremblements, palpitations, tachycardie sinuale, nausées, nervosité, vertiges, céphalées, hyperglycémie, hypokaliémie, crampes musculaires.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Halothane**, **digitaliques** : troubles du rythme ventriculaire.

## BRONCHODILATEURS (7) – ANTICHOLINERGIQUES

## ■ Ipratropium bromure

ATROVENT					
Arérosol-doseur.	200 doses 20 µg (fl. press. + embout)		I	NR	
Asthme, traitement de fond (en association à <b>corticoïdes inhalés</b> ), BPCO : 2 bouff. x 3 à 4/j					
Asthme aigu grave, BPCO décompensée (associer <b>β<sub>2</sub>-stimulants</b> ) : nébuliser 1 unidose avec générateur d'aérosol x 3/j max.	10 unidoses (2 mL) 0,25 mg (enf.)	6,94	I	65 %	0,69
	10 unidoses (2 mL) 0,5 mg	5,35	I	65 %	0,53
	30 unidoses (2 mL) 0,25 mg (enf.)	20,88	I	65 %	0,70
	30 unidoses (2 mL) 0,5 mg	13,35	I	65 %	0,45

## PROPRIÉTÉS

Bronchospasmolytiques anticholinergiques agissant sur les récepteurs muscariniques bronchiques ; passage systémique infime.

Effet bronchodilatateur moindre que celui des **β<sub>2</sub>-stimulants**, plus retardé (max. après 30 min), mais plus prolongé (6 à 10 h).

## INDICATIONS

Traitement symptomatique continu de l'asthme (en association aux **corticoïdes inhalés**), des BPCO spastiques.

Crise d'asthme, en complément des **β<sub>2</sub>-mimé-**

tiques ou en cas de contre-indication de ceux-ci.

## CONTRE-INDICATIONS

Nébulisation : glaucome à angle fermé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** 1<sup>er</sup> trimestre et **allaitement** : déconseillé.

Traiter toute surinfection bronchique.

Vérifier la prise correcte des sprays.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : bouche sèche, irritation pharyngée (atténués par le rinçage de la bouche).

## ■ Tiotropium bromure

SPIRIVA					
BPCO : 1 gél. à inhaler/j	30 gél. 18 µg	36,47	I	65 %	1,22

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste spécifique des récepteurs muscariniques (« anticholinergique ») de longue durée d'action.

## INDICATIONS

Traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive.

## CONTRE-INDICATIONS

Antécédent d'hypersensibilité (allergie) au **bromure de tiotropium**, à l'**atropine** ou à ses dérivés (ipratropium ou oxitropium), ou au lactose (excipient).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Bouche sèche, irritation pharyngée (atténués par le rinçage de la bouche), constipation.

Rares : dysurie, rétention aiguë d'urine.

## BRONCHODILATEURS (8) – ASSOCIATION DE BÊTA-2-STIMULANT ET D'ANTICHOLINERGIQUE

### ■ Fénotérol + ipratropium bromure

<b>BRONCHODUAL</b>					
50 µg <b>salbutamol</b> + 20 µg <b>ipratropium</b> Crise d'asthme : 1 à 2 bouf. Prévention de l'asthme d'effort : 1 à 2 bouf. 15 à 30 min avant l'exercice BPCO : 2 bouf. x 2 à 4/j	200 bouf.	9,23	I	65 %	0,05

Pour la pharmacologie de cette association, se référer aux pharmacologies respectives des **bêta-2-stimulants d'action brève** et des **anticholinergiques**.

## ANTI-INFLAMMATOIRE BRONCHIQUE

## ■ Fenspiride

<b>PNEUMOREL</b>				
Toux/expectoration liées à une bronchopneumopathie : 1 cp. x 2 à 3/j 1 à 2 càs x 3/j	30 cp. 80 mg	HOP	II	NR
	100 cp. 80 mg		II	
	10 càs à 30 mg (fl. 150 mL)		II	NR

**PROPRIÉTÉS**

Antibronchoconstricteur et anti-inflammatoire (réduction de la production du mucus et de l'œdème) par plusieurs mécanismes (anti-H<sub>1</sub>, spasmolytique, diminution de la production de facteurs pro-inflammatoires).

Demi-vie : 12 h.

**INDICATIONS**

Traitement des signes fonctionnels (toux, expectoration) au cours des bronchopneumopathies (aiguës ou chroniques).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse et allaitement.**

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : nausées, épigastralgies.

Somnolence.

Rare : tachycardie (diminuer la dose).

Peu utilisé dans la BPCO, en partie en raison de ses effets sédatifs.

## VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE

## ■ Vaccin pneumococcique polyvalent

<b>PNEUMO 23</b>				
Prévention des infections à pneumocoques : 1 inj. SC ou IM tous les 5 ans	1 ser. 0,5 mL	13,56	65 %	13,56

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir d'antigènes purifiés des 23 sérotypes (principaux en pathologie humaine) de pneumocoques.

L'immunité acquise vis-à-vis de ces sérotypes apparaît dès le 10<sup>e</sup>-15<sup>e</sup> j après l'injection, et dure 5 ans.

**INDICATIONS**

Prévention des infections à pneumocoques, en particulier respiratoires, chez les sujets « à risque » (après l'âge de 2 ans), notamment les patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive ou d'insuffisance respiratoire chronique, splénectomisés ou aspléniques (ou patients devant subir une splénectomie), drépanocytaires, etc.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse.**

Forte réaction après une injection antérieure.  
Injection antérieure ou infection à pneumocoque datant de moins de 5 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver entre + 2 °C et + 8 °C.

Respecter le délai de 5 ans avant de revacciner (risque de réactions sévères, type « phénomène d'Arthus », en cas de revaccination précoce).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibilités de réactions d'hypersensibilité.

Réactions locales fréquentes : rougeur, douleur, induration au point d'injection (disparaît en 24-48 h) ; plus rarement associées à une fièvre à 38 °C (voire myalgies, asthénie, frissons, céphalées) pendant 24 h.

Réactions majorées en cas de revaccination trop précoce.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les traitements immunosuppresseurs peuvent diminuer ou même annuler la réponse immunitaire.

Le vaccin peut être effectué (à des sites d'injection différents) en même temps que le vaccin antigrippal.

## ANTITUBERCULEUX (1) – ANTIBIOTIQUES (1)

## ■ Isoniazide

RIMIFON					
Tuberculose chez l'adulte : 4-5 mg/kg/j en 1 prise le matin à jeun (en général : 2 cp./j) ou perf. IV ou IM (enfant : 10 mg/kg/j)	200 cp. 50 mg	43,02	I	65 %	0,22
	100 cp. 150 mg	49,57	I	65 %	0,50
	6 amp. 500 mg/5 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Antituberculeux majeur, bactéricide, avec très bonne diffusion tissulaire, pénétration intracellulaire ; catabolisation hépatique par N-acétylation (génétiquement déterminée) ; dose idéale = 3 mg/kg chez acétylateurs lents (le plus fréquent en Europe), 6 mg/kg chez acétylateurs rapides ; taux sérique efficace : 1 à 2 µg/mL à la 3<sup>e</sup> h.

## INDICATIONS

Tuberculose (en association avec d'autres **anti-tuberculeux**) ; chimioprophylaxie primaire ou secondaire de la tuberculose ; traitement des infections à mycobactéries atypiques sensibles (*M. kansasii*).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'**isoniazide** (rare).  
Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : éviter au 1<sup>er</sup> trimestre (sauf nécessité) ; adjoindre de la **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD)**.

**Allaitement** : éviter (passage important dans le lait maternel).

Prise unique quotidienne le matin, à jeun (attendre 30 min pour déjeuner).

Insuffisance rénale : réduire les doses initiales de moitié (adapter à l'isoniazidémie).

Surveillance régulière (x 1/sem. le 1<sup>er</sup> mois, puis x 1/mois) des transaminases : si > 3N, diminuer de moitié la dose ; si > 6N, arrêt.

Prudence en cas d'antécédents convulsifs ou psychiatriques.

Ne pas boire d'alcool.

Chez l'éthylique, la femme enceinte, les insuffisants rénaux, patients dénutris, infectés par le VIH ou ayant une neuropathie existante, adjoindre : **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD, 50 mg/j)** en prévention des neuropathies.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, épigastralgies.

Hépatotoxicité : élévation fréquente des transaminases ; hépatite cytolytique plus rare, généralement aiguë (avec ou sans ictère, réversible à l'arrêt), pouvant être sévère ; favorisée par la **rifampicine** (inducteur enzymatique), le **pyrazinamide**, l'alcoolisme.

Neuropathies (par carence en vit. B6) périphériques, annoncées par des paresthésies distales, favorisées par la dénutrition, l'alcoolisme (et acétylateurs lents) ; troubles psychiques (insomnie, euphorie, excitation, accès maniaques, délires aigus, surtout en association avec le **disulfirame**, l'**éthionamide**, ou le **niridazole**) ; plus rarement, convulsions, névrite optique.

Réactions d'hypersensibilité (très rares) : fièvre, éruption cutanée, acné, éosinophilie.

Exceptionnels : algodystrophie (syndrome épaule-main), syndrome lupique, myalgies, arthralgies, anorexie.

Surdosage : vomissements, vertiges, hallucinations, troubles visuels, voire coma convulsif, hyperglycémie avec acidocétose. Nécessite réanimation, traitement symptomatique, **pyridoxine** à fortes doses.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indiqué** : **niridazole**.

**Déconseillé** : **phénytoïne** et **carbamazépine**, dont les taux sériques sont augmentés (adapter la posologie) ; **disulfirame** ; **anesthésiques** volatils halogénés (augmentent l'hépatotoxicité de l'**isoniazide**).

Utiliser avec précaution : corticoïdes (augmentation de leur efficacité, et diminution des taux sériques d'**isoniazide**) ; **kétoconazole** (dont le taux plasmatique est diminué) ; **griséofulvine**, **rifampicine**, **pyrazinamide**, et tout médicament hépatotoxique ou inducteur enzymatique (**barbiturique**).

**Topiques gastro-intestinaux** : intervalle de 2 h entre les prises.

## TUBERCULOSE (2)

### Surveillance

- Clinique et radiologique : consultation à J15, J30, M2, M3, M6 (puis après traitement : M9, M12).
- Transaminases : J4 et J8 (surtout si facteurs de risque hépatiques), J15, J30, puis 1 fois/mois ; et en urgence si signes digestifs ou ictère.
- Uricémie : si suspicion de goutte (constamment élevée, elle peut aider à surveiller l'observance).
- Radiographie de thorax : J15, J30, M2, M4, M6 (puis après traitement : M9, M12).
- Examen ophtalmologique si **éthambutol** (cf. Traitement médicamenteux) : J15, J30, M2.
- Dosages sériques des antibiotiques : uniquement en cas d'adaptation à une insuffisance (rénale ou hépatique), ou si l'on suspecte une inobservance, une malabsorption digestive, ou une interaction médicamenteuse.

### Adaptation du schéma thérapeutique [1]

#### Chez l'éthylique

- Adjoindre de la **pyridoxine (VITAMINE B6 RICHARD, 50 mg/j)** en prévention des neuropathies.

#### Chez l'insuffisant hépatique

- **Pyrazinamide** contre-indiqué.
- Schéma de 9 mois (en débutant l'**isoniazide** à 3 mg/kg/j et la **rifampicine** à 5 mg/kg/j, à adapter aux taux sériques) ou de 6 mois en remplaçant la **pyrazinamide** par de la **streptomycine**.

#### Chez l'insuffisant rénal

- Adapter la dose d'**isoniazide** et de **pyrazinamide** aux taux sériques et à la clairance de la créatinine.
- Si clairance créatinine < 100 mL/min : donner 15 mg/kg/j.
- Si clairance créatinine < 70 mL/min : donner 10 mg/kg/j (+ dosages sériques).
- Si clairance créatinine < 30 mL/min : espacer les prises de **rifampicine**.

#### Chez la femme enceinte

- **Pyrazinamide** (et **streptomycine, fluoroquinolone**) contre-indiquée. Schéma de

9 mois sans **pyrazinamide** : **isoniazide** + **rifampicine** pendant 9 mois, et **éthambutol** pendant les 3 premiers mois ; **VITAMINE B6** 15 à 50 mg/j.

- En fin de grossesse : injection de **VITAMINE K1** (ainsi qu'au nouveau-né).

#### Chez le sujet VIH+

- Traitement standard (quadrithérapie : **isoniazide** + **rifampicine** + **pyrazinamide** + **éthambutol**), avec la même durée de traitement (6 mois).
- Risque accru de résistance aux **antituberculeux** et d'allergies médicamenteuses.

#### En cas de BK résistant

- Au moins 3 médicaments actifs en début de traitement, traitement d'au moins 12 mois après négativation des cultures.
- Prise en charge en milieu spécialisé, isolement (suspicion de résistance secondaire) ; le traitement est souvent prolongé, et peut faire appel à des **antituberculeux** de 2<sup>e</sup> ligne (**amikacine, ofloxacine, clofazimine, éthionamide, moxifloxacine, acide para-aminosalicylique, cyclosérine, capréomycine**, etc.).
- Le choix des antibiotiques sera adapté à l'antibiogramme.

#### Pleurésie tuberculeuse

- Même traitement médicamenteux.
- Évacuation de l'épanchement (après biopsie pleurale, permettant de faire le diagnostic).
- Kinésithérapie pleurale prolongée (3 à 6 mois).

#### Tuberculose sous anti-TNF

Traitement standard et arrêt de l'**anti-TNF**.

#### Chez l'enfant

Schéma de 9 mois : **isoniazide** + **rifampicine** 9 mois et **pyrazinamide** 3 mois sans **éthambutol**.



## ANTITUBERCULEUX (2) – ANTIBIOTIQUES (2)

## ■ Rifampicine

<b>RIFADINE</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 10 mg/kg/j en une prise le matin à jeun (en général 2 gél./j) ou perf. IV lente (1 h 30) dans 250 mL G5 %	8 gél. 300 mg	5,87	I	65 %	0,73
	30 gél. 300 mg	17,08	I	65 %	0,57
	60 gél. 300 mg	HOP	I		
	24 c-mes. 100 mg (susp. buv. 120 mL)	6,89	I	65 %	0,29
	1 amp. pour perf. 600 mg	6,98	I	65 %	6,98
<b>RIMACTAN</b>					
Idem <b>RIFADINE</b>	30 gél. 300 mg	14,74	I	65 %	0,49

## PROPRIÉTÉS

Antituberculeux majeur (< 1 % de résistance primaire), activité bactéricide intra- et extracellulaire (également antilépreux, antimycobactéries atypiques, et bactéricide sur cocci Gram+ et cocci Gram-, *Listeria monocytogenes*, *Brucella*, *Legionella pneumophila*, *Chlamydia trachomatis*, entre autres) ; excellente diffusion tissulaire (surtout poumons, foie, reins) ; désacétylation hépatique, auto-induction enzymatique.

## INDICATIONS

Tuberculose (en association avec d'autres **anti-tuberculeux**) ; chimioprophylaxie antituberculeuse (+ **isoniazide**) ; autres infections à mycobactéries atypiques sensibles ; lèpre (polythérapie) ; brucellose ; infections sévères (polythérapie) à bactéries sensibles (dont légionellose) ; prophylaxie des méningites à méningocoque.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **rifamycine** ; porphyrie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** (dernières semaines) : **VITAMINE K1** chez la mère en fin de grossesse et l'enfant à la naissance (prévention de syndrome hémorragique) ; **allaitement** : éviter.

Pas de prise discontinuée (risque d'hypersensibilité).

Insuffisance hépatique : débiter à 5 mg/kg/j (max. 900 mg/j), avec rifampicinémie.

Insuffisance rénale avec clairance < 30 mL/min : espacer les prises.

Surveiller : bilan hépatique et NFS-plaquettes (à J8, J30, puis x 1/mois).

La forme buvable contient du sucre (2 g/c-mes.) et des sulfites (risque d'allergie).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration rouge des urines (= observance !), crachats, larmes, lentilles de contact.

Nausées, vomissements, troubles gastro-intestinaux ; perturbation du cycle menstruel.

Manifestations allergiques (surtout si prise discontinuée) : fièvre, prurit, urticaire, syndrome grippal, dyspnée asthmatiforme, collapsus, thrombopénie (rares cas de purpura : arrêt du traitement), éosinophilie, leucopénie, anémie hémolytique.

Hépatotoxicité faible en monothérapie, mais augmentation de l'hépatotoxicité de l'**isoniazide**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

C'est un inducteur enzymatique !

*Contre-indiqué* : **didanosine**.

*Déconseillée* : contraception orale (diminution de son efficacité).

Associer avec précaution (en raison de l'induction enzymatique, diminuant l'efficacité) : anticoagulants oraux, **inhibiteurs calciques**, **quinidiques** et **disopyramide**, **digitoxine**, **ciclosporine**, **gluco-** et **minéralocorticoïdes**, **fluconazole**, **itraconazole**, **kétoconazole**, hormones thyroïdiennes, **méthadone**, **phénytoïne**, **terbinafine**, **théophylline**, **tolbutamide** (**sulfamides hypoglycémisants**), **bêtabloquants** à biotransformation hépatique principale (**alprénolol**, **métoprolol**, **propranolol**).

Augmentation de l'hépatotoxicité de l'**isoniazide** : surveillance clinico-biologique.

**TUBERCULOSE (3)****Traitement des atteintes extrapulmonaires [1]**

- En cas d'atteinte pleurale, péricardique, ganglionnaire ou osseuse : traitement standard de 6 mois.
- En cas d'atteinte méningée : traitement standard pour une durée prolongée de 9 à 12 mois.
- En cas de péricardite, d'atteinte neuro-méningée, de miliaire hypoxémiant et de tuberculome cérébral : une corticothérapie associée au traitement antituberculeux est recommandée.

**Traitements de la primo-infection tuberculeuse (PIT) : chimioprophylaxie secondaire**

PIT latente :

- **isoniazide** (5 mg/kg/j) pendant 6 à 9 mois ;

– ou **isoniazide** (5 mg/kg/j) et **rifampicine** (10 mg/kg/j) pendant 3 mois.

PIT patente : traitement identique à celui de la tuberculose maladie.

**Traitement préventif des sujets contacts : chimioprophylaxie primaire**

Indications : traitement préventif des sujets fragiles en contact avec un sujet tuberculeux bacillifère (nourrissons, jeunes enfants, immunodéprimés).

Schéma : **isoniazide** 3 à 5 mg/kg/jour pendant 6 mois.

## ANTITUBERCULEUX (3) – ANTIBIOTIQUES (3)

## ■ Rifabutine

ANSATIPINE					
Tuberculose multirésistante : 3 à 4 gél. x 1/j	30 gél. 150 mg	104,05	I	65 %	3,47
Prévention des infections à <i>Mycobacterium avium complex</i> (MAC) chez les patients VIH+ (CD4 < 100/mm <sup>3</sup> ) : 2 gél. x 1/j					

## PROPRIÉTÉS

Antimycobactérien bactériostatique, actif sur le BK même multirésistant (1/3 des souches résistant à la **rifampicine** sont sensibles à la **rifabutine**) et les mycobactéries atypiques (*M. fortuitum*, *M. xenopi*, *M. kansasii*, *M. avium intracellulare*) ; diffusion ubiquitaire (sauf cerveau) ; pénétration intracellulaire ; élimination principalement urinaire ; demi-vie = 40 h.

## INDICATIONS

Tuberculose multirésistante, en particulier à la **rifampicine** (en association avec d'autres **antituberculeux**) ; prévention des infections à *Mycobacterium avium complex* (MAC) chez les patients VIH+ avec CD4 < 100/mm<sup>3</sup>.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **rifamycine**.  
Insuffisance rénale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : éviter par précaution (médicament nouveau).

Avant d'instituer un traitement préventif des infections à MAC chez le patient VIH+, éliminer une infection à mycobactérie évolutive.

Insuffisance hépatique sévère : réduire la dose. Surveillance régulière : NFS-plaquettes, bilan hépatique.

Si association à la **clarithromycine** (ou autres

**macrolides**) ou au **fluconazole** : réduire la dose à 300 mg/j, et surveiller l'apparition éventuelle d'uvéite.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Coloration rouge des urines (= observance), crachats, larmes, lentilles de contact.

Myalgies, arthralgies, rash cutané, fièvre.

Modification du goût (3 %).

Neutropénie (2 %) nécessitant l'arrêt ; thrombopénie, anémie.

Surtout en association avec d'autres **antituberculeux** : troubles digestifs (nausées, vomissements, dyspepsie) ; troubles hépatiques (augmentation des transaminases, ictère).

Exceptionnel : uvéite réversible, parfois sévère, lors d'utilisation de fortes doses, en association avec la **clarithromycine** ou autres **macrolides** ± **fluconazole**.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

C'est un inducteur enzymatique (cependant beaucoup plus faiblement que la **rifampicine**) : donc il accélère le métabolisme des médicaments par le foie.

Déconseillée : contraception orale (envisager une autre méthode de contraception).

Associer avec précaution : **anticoagulants** oraux, **ciclosporine**, **digitoxine**, **corticoïdes** ; le **fluconazole** et la **clarithromycine** (ils augmentent les taux sériques de **rifabutine**).

## TUBERCULOSE (4)

### Conduite à tenir en cas d'élévation des transaminases sous traitement [1]

- *Transaminases : absence de modifications, surveillance rapprochée.*
- *Transaminases entre 3 et 6N : arrêt définitif du **pyrazinamide** et prolongation du traitement de 3 mois pour obtenir un schéma de 9 mois (**isoniazide**, **rifampicine**, **éthambutol**).*
- *Transaminases > 6N :*
  - arrêt du traitement antituberculeux > 48 h ;
  - arrêt définitif du **pyrazinamide**, reprise à demi-dose de l'**isoniazide** après correction des transaminases ;
  - surveillance ++.
- *Hépatite ou insuffisance hépato-cellulaire sévère :*
  - arrêt d'**isoniazide**, **rifampicine** et **pyrazinamide** ;
  - reprise progressive de l'**isoniazide** et de la **rifampicine** ;
  - contre-indication définitive au **pyrazinamide**.

### Intradermoréaction à la tuberculine - Circulaire du 11/10/2004 [2]

« Seul test tuberculinique mesurable validé ».

#### Technique

Réalisée par un médecin.

Injection intradermique stricte (peau d'orange).

Face antérieure de l'avant-bras.

5 U de tuberculine, soit 0,1 mL (l'IDR à 10 U n'est plus recommandée).

Mesure de l'induration palpable (en mm) entre la 48<sup>e</sup> et la 72<sup>e</sup> h.

#### Interprétations (> 15 ans) en tenant compte du statut vaccinal du sujet

- IDR
- IDR entre 5 et 9 mm : positive. « Réaction due au BCG ou à une tuberculose mais non en faveur d'une infection récente. »;
- IDR entre 10 et 14 mm : positive. « Tuberculose probable. Le contexte aide à définir l'ancienneté. »;
- IDR ≥ 15 mm : positive. « Tuberculose probablement récente. »

#### Remarques

De manière générale chez l'adulte, la primo-vaccination par le BCG est suffisamment ancienne pour ne pas interférer dans l'interprétation de l'IDR.

Plus l'IDR est positive, plus elle est en faveur d'une infection récente.

#### Faux négatifs

Phase « ante-allergique » dans les 12 sem. suivant le contact.

Infections virales ou bactériennes concomitantes.

Miliaire tuberculeuse.

Anergie (diminution de la réaction d'hypersensibilité retardée) : sarcoïdose, hémopathies malignes, cancer, dénutrition, chimiothérapie, corticothérapie au long cours.

#### Faux positifs

Erreur technique.

IDR rapprochée dans le temps.

## ANTITUBERCULEUX (4) – ANTIBIOTIQUES (4)

## ■ Pyrazinamide

<b>PIRILÈNE</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 30 mg/kg/j en 1 prise le matin à jeun (max. 2 g/j) soit en général 3 à 4 cp./j	60 cp. séc. 500 mg	13,04	I	65 %	0,22

**PROPRIÉTÉS**

Antituberculeux bactéricide, surtout sur les BK intracellulaires (car milieu acide : macrophages), inactif sur les mycobactéries atypiques et *M. bovis* ; bonne diffusion tissulaire (et LCR) et pénétration intracellulaire ; métabolisation hépatique en dérivé actif, élimination urinaire ; demi-vie = 9 h.

**INDICATIONS**

Tuberculose sous toutes ses formes (en association avec d'autres **antituberculeux**).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement** (aucune donnée !).  
Insuffisance hépatique.  
Hyperuricémie non contrôlée.  
Insuffisance rénale.  
Porphyrie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan préthérapeutique minimal : bilan hépatique, uricémie, bilan rénal.  
Surveillance des transaminases (surtout si éthylisme ou antécédent d'hépatite) à J8, J15, J21, J30, J45, J60 et si apparition de troubles diges-

tifs ou subictère ; si transaminases > 3N, arrêt immédiat du **PIRILÈNE**.

Surveillance mensuelle de la fonction rénale.  
Ne pas dépasser 2 mois de traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hépatite cytolytique : élévation des transaminases fréquente ; rares cas d'hépatites sévères voire fulminantes (surtout en association avec l'**isoniazide**) ; l'apparition de signes digestifs (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales), d'asthénie marquée, de fièvre, ou *a fortiori* de subictère, doit alerter : faire en urgence bilan hépatique avec TP.  
Hyperuricémie très fréquente (> 50 % des cas, attestant de l'observance) [voir aussi : Précautions d'emploi] ; arthralgies dans 1 % des cas, répondant à un traitement symptomatique (**aspirine**) ; si arthralgie persistante ou goutteuse malgré uricosurique : arrêt du **PIRILÈNE**.  
Rare : rash, érythème, photosensibilisation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associer avec précaution : **isoniazide** (addition de la toxicité hépatique), ainsi que tout autre médicament hépatotoxique, **éthionamide**.

## TUBERCULOSE (5)

### Recommandations concernant le BCG : avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (2007)

**Suspension, chez l'enfant et l'adolescent, de l'obligation vaccinale par le vaccin BCG.**

**Vaccination BCG fortement recommandée chez les enfants à risque élevé de tuberculose, qui répondent au moins à l'un des critères suivants :**

- enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse\* ;
- enfant dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays ;
- enfant devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays ;
- enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
- enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
- enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME, etc.) ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de forte endémie.

**Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être vacciné sauf contre-indication.**

**Cette vaccination est réalisée par un(e) médecin, un(e) sage-femme ou par un(e) infirmier(e) sur prescription médicale.**

**Réalisation de la vaccination :**

- chez les enfants à risque élevé de tuberculose (définis ci-dessus), la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si possible à la naissance ou au cours du premier mois de vie, sans nécessité d'IDR à la tuberculine préalable ;
- chez des enfants appartenant à l'une des catégories à risque élevée définies ci-dessus et non vaccinés, la vaccination doit être réalisée jusqu'à l'âge de 15 ans ;
- l'IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de l'âge de 3 mois afin de rechercher une infection liée à une contamination après la naissance ;
- le BCG est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire. Chez les enfants nés de mère infectée par le VIH, la vaccination doit être reportée jusqu'à obtention de la preuve de l'absence d'infection de l'enfant par le VIH ;
- en dehors des professionnels soumis à l'obligation vaccinale, la vaccination BCG n'est pas recommandée après l'âge de 15 ans.

### Tests IGRA (test de détection de l'interféron $\gamma$ : *Interferon Gamma Release Assay*) ou Quantiféron [3]

Sauf cas particuliers, les tests immunologiques, IDR ou tests IGRA, ne doivent être uti-

lisés que pour le seul diagnostic de l'infection tuberculeuse latente et uniquement dans l'objectif de la traiter. La sensibilité est de l'ordre de 89 % et la spécificité de 97 %.

Il est recommandé d'utiliser les tests IGRA dans les situations suivantes :

1. pour le diagnostic de l'ITL (infection tuberculeuse latente) :
  - enquêtes autour d'un cas,
  - dépistage avant mise en route d'un traitement par anti-TNF $\alpha$  ou chez les patients infectés par le VIH,
  - personnels de santé avant l'embauche ;
2. pour le diagnostic de tuberculose maladie ;
- aide dans des cas difficiles (notamment les tuberculoses extra-pulmonaires).

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la tuberculose, *SPLF*, 2004

[2] Circulaire DGS/SD5C n° 2004-373 du 11/10/2004 relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques, *DGS*, 2004

[3] Tuberculose et tests de détection de l'interféron gamma, *HSCP*, 2011

\* Continent africain dans son ensemble, continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-Orient, pays d'Amérique centrale et du Sud, pays d'Europe centrale et de l'Est y compris les pays de l'ex-URSS, Union Européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

## ANTITUBERCULEUX (5) – ANTIBIOTIQUES (5)

## ■ Éthambutol

DEXAMBUTOL					
Tuberculose chez l'adulte : 20 mg/kg/j en 1 prise le matin à jeun (max. 2 g/j) soit en général 2 à 3 cp. x 1/j	50 cp. 500 mg	5,38	I	65 %	0,11

## PROPRIÉTÉS

Antituberculeux majeur, bactériostatique, actif aussi sur *M. kansasii*, *M. avium* ; excellente diffusion tissulaire et pénétration intracellulaire ; demi-vie = 4 h, élimination urinaire ; pas de passage dans le lait maternel.

## INDICATIONS

Tuberculose sous toutes ses formes (en association avec d'autres **antituberculeux**) ; infections à mycobactéries atypiques sensibles ; la posologie peut être portée à 25 mg/kg/j (durée max. : 2 mois) en cas de rechute ou de résistance du BK aux autres **antituberculeux**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'**éthambutol**.  
Névrite optique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisance rénale : diminuer les doses, à 15 mg/kg/j si clairance créatinine < 100 mL/min, et 10 mg/kg/j si clairance créatinine < 70 mL/min ; si dialyse : 5 mg/kg/j (et 7 mg/kg/j les jours de dialyse) ; surveiller les taux sériques.

Donc : bilan rénal avant traitement !

Examen ophtalmologique initial, puis à J15, J30, puis tous les mois (surtout si alcoolisme, tabagisme, diabète, lésions oculaires antérieures, traitement conjoint par l'**isoniazide**, le **disulfirame**, les **anti-inflammatoires**, les **anti-paludéens** de synthèse) : acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs, fond d'œil ; arrêt immédiat de l'**éthambutol** au moindre signe de névrite optique (les troubles régressent généralement en quelques mois) ; cette toxicité est favorisée par le surdosage et l'insuffisance rénale.

**Grossesse et allaitement** : utilisation possible.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : troubles oculaires à type de névrite optique rétrobulbaire (souvent axiale), avec baisse de l'acuité visuelle, scotome central, rétrécissement du champ visuel, et dyschromatopsie rouge/vert.

Exceptionnels : nausées, vomissements, rash cutané allergique, vertiges, confusion, hyperuricémie, leucopénie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Topiques gastro-intestinaux : espacer la prise de 2 h au moins.

## ANTITUBERCULEUX (6) – ASSOCIATIONS D'ANTIBIOTIQUES

### ■ Isoniazide + rifampicine + pyrazinamide

<b>RIFATER</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 1 cp./10 à 12 kg de poids corporel en 1 prise/j le matin, pendant les 2 premiers mois de traitement (en général : 5 cp./j)	60 cp. 50 mg <b>isoniazide</b> + 300 mg <b>pyrazinamide</b> + 120 mg <b>rifampicine</b>	24,65	I	65 %	0,41

### ■ Isoniazide + rifampicine

<b>RIFINAH</b>					
Tuberculose chez l'adulte : 1 cp./30 kg de poids corporel en 1 prise/j le matin, pendant les 4 derniers mois de traitement (en général : 2 cp./j)	30 cp. 150 mg <b>isoniazide</b> + 300 mg <b>rifampicine</b>	21,50	I	65 %	0,72

#### PROPRIÉTÉS

Voir pour chaque DCI.

#### INDICATIONS

Voir pour chaque DCI.

#### CONTRE-INDICATIONS

Voir pour chaque DCI.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Voir pour chaque DCI.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Voir pour chaque DCI.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Voir pour chaque DCI.

L'hépatotoxicité de leurs composants s'accumule, donc surveillance clinico-biologique rapprochée !

D'autres **antituberculeux** (tels l'**éthambutol**, la **streptomycine**) peuvent être associés.

Ces formes combinées permettent une administration simplifiée, et *a priori* une meilleure observance ; par ailleurs, en cas de mauvaise observance, elles évitent la sélection d'un mutant résistant.



## ANTITUBERCULEUX (7) – VACCIN BCG

## ■ BCG

<b>VACCIN BCG SSI</b>					
Prévention de la tuberculose : inj. intradermique de 0,05 mL (E. < 1 an) à 0,1 mL (E. > 1 an, A.)	1 fl. pdre + solv. + nécess. inj. (1 mL)	11,52	I	65 %	11,52

**PROPRIÉTÉS**

Vaccin préparé à partir de bacilles vivants atténués (souche de Calmette et Guérin) ; efficacité estimée à 50 % pour les formes pulmonaires et à 80 % pour les formes disséminées, surtout chez l'enfant.

**INDICATIONS**

Prévention de la tuberculose de primo-infection (cf. Propriétés) ; obligatoire avant l'entrée en collectivité (décret n° 96-775 du 05/09/96) et avant 6 ans.

**CONTRE-INDICATIONS**

Déficit de l'immunité cellulaire, comme le sida (enfants de mère VIH+ : attendre quelques mois pour connaître le statut VIH de l'enfant ; vacciner si séronégatif).

Contre-indication temporaire : dermatose évolutive.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : à éviter (vaccin vivant).

Vérifier (sauf chez le nouveau-né) la négativité des réactions tuberculiniques.

Conserver à l'obscurité et au froid (+ 4 à

+ 8 °C) ; ne pas conserver > 4 h après reconstitution.

Technique : injection intradermique stricte (donnant une papule « en peau d'orange ») de 0,1 mL de vaccin reconstitué (demi-dose = 0,05 mL chez l'enfant < 1 an), à la face externe du tiers moyen du bras gauche.

Contrôler les tests tuberculiniques 3 à 12 mois plus tard ; si positifs, recontrôler à 11 ans ; si négatifs (5-10 % des cas) : revacciner une fois par voie intradermique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Suites normales : un nodule apparaît après 2 à 4 sem., pouvant s'ulcérer (puis il s'assèche, laissant une cicatrice indélébile, dans 90 % des cas) : pansements secs.

Dans 10 % des cas : adénite (disparaît en 1 mois ; ne pas ponctionner), rarement suppurée.

Très rare : ostéite.

Exceptionnel : BCGite généralisée (terrain : immunodépression majeure) → traitement anti-BK.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cette vaccination peut être associée à toute autre vaccination.

Le dépistage et le traitement efficace, bien suivi, des patients contagieux atteints de tuberculose-maladie constituent l'arme majeure contre la dissémination de la maladie.

## ANTITUSSIFS (1) – OPIACÉS (1)

## ■ Codéine

<b>NÉO-CODION</b>					
Toux sèche : 1 cp. ou 1 càs x 2 à 4/j	20 cp. 15 mg 12 càs 15 mg (1 fl. 180 mL)	2,82		NR 30 %	0,24

## ■ Codéthyline ou éthylmorphine

<b>TUSSIPAX</b>					
Adulte et enfant > 15 ans : 1 cp. x 3/j	15 cp. 10 mg + 10 mg de <b>codéine</b>	2,55		30 %	0,17

## ■ Dextrométhorphan

<b>ATUXANE</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : 2 à 3 c-mes. x 2 à 4/j	25 c-mes. 10 mg (1 fl. 125 mL)			NR	
<b>DRILL</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : existe sans sucre : 2 c-mes. x 3 à 4/j	30 c-mes. 15 mg (1 fl. 125 mL)			NR	
<b>TUXIUM</b>					
Idem <b>NÉO-CODION</b> : 1 caps. x 2 à 4/j	12 caps. 30 mg	2,50		30 %	0,21
<b>TUSSIDANE</b>					
3 à 4 c-mes./j espacées d'au moins 4 h 0,5-1 cp. x 3 à 4/j	25 c-mes. 1,5 mg/mL (1 fl. 125 mL)	2,52		30 %	0,10
	50 c-mes. 1,5 mg/mL (1 fl. 250 mL)	3,06		30 %	0,06
	12 cp. 30 mg	2,46		30 %	0,21
<b>NODEX</b>					
1 dose à renouveler toutes les 4 h, max. 4/j	10 unidoses 10 mL			NR	

## ■ Pholcodine

<b>BIOCALYPTOL</b>					
A. : 15 mL (1 godet doseur) x 1 à 4/j E. 35-50 kg : 5 mL (2 graduations) x 1 à 6/j E. 20-35 kg : 2,5 mL (1 graduation) x 1 à 6/j E. 20-35 kg : 2,5 mL (1 graduation) x 2 à 3/j	1 fl. 200 mL (avec godet-doseur)	3,32		30 %	0,08

## TOUX (2)

### Traitement

Celui-ci sera avant tout **étiologique** +++, par exemple : antibiotiques en cas d'infection ; traitement d'une insuffisance cardiaque ; traitement antireflux ; traitement anti-inflammatoire inhalé pour un asthme ou dans le cadre d'une hyperréactivité bronchique post-infectieuse ; par exemple : **budésonide (PULMICORT TURBUHALER 200 µg)** : 2 bouffées x 2/j.

En cas de toux productive, la kinésithérapie respiratoire est un élément essentiel du traitement.

Les **antitussifs** ne doivent être prescrits qu'en cas de toux **sèche, non productive**, invalidante, et de toute façon « en appoint » pour une **courte durée**.

Les **antitussifs** sont contre-indiqués en cas de toux productive, et chez les personnes âgées et les insuffisants respiratoires chroniques.

### Encombrement respiratoire

Il est lié à l'incapacité par le malade d'avoir une toux efficace, c'est-à-dire permettant l'expectoration. Certaines circonstances favorisent sa survenue : personnes âgées, maladie neuromusculaire, période postopératoire, prise de sédatifs, décubitus prolongé, etc.

Les **antitussifs** sont donc formellement contre-indiqués, de même que les mucomodificateurs, les deux risquant d'aggraver l'encombrement respiratoire !

Le traitement consiste donc en une **kinésithérapie** respiratoire.

**ANTITUSSIFS (2) – OPIACÉS (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antitussifs opiacés (action dépressive sur les centres respiratoires et de la toux). Demi-vie d'environ 3 h.

Le **dextrométhorphan** est moins puissant que la **codéine** et la **codéthyline** : non dépresseur respiratoire à dose thérapeutique (60 à 120 mg/j, en espaçant les prises d'au moins 4 h), moindre risque de somnolence.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des toux sèches non productives gênantes.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Allaitement** : risque d'hypotonie ou de pause respiratoire pour l'enfant.

**Grossesse** : éviter, surtout en fin de grossesse (risque de dépression respiratoire ou syndrome de sevrage chez le nouveau-né).

Insuffisance respiratoire.

Toux de l'asthmatique ou toux productive.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Avant de prescrire un **antitussif**, rechercher les causes de la toux qui requièrent un traitement spécifique.

Respecter les toux productives.

Pas de traitement prolongé au-delà de quelques jours (risque de dépendance, surtout à forte dose).

Ne pas boire d'alcool.

Prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines (somnolence) ou en cas d'hypertension intracrânienne (pourrait être majorée).

Diabète : préférer les spécialités sans sucre.

Sujets âgés ou insuffisance hépatique : réduire la posologie initiale de moitié.

Réaction positive au contrôle antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, somnolence, vertiges, nausées, vomissements.

Rares : risque de bronchospasme, réactions cutanées allergiques, dépression respiratoire.

À doses supra-thérapeutiques : risque de dépendance et de syndrome de sevrage à l'arrêt.

Surdosage (intoxication opioïde) : myosis, bradypnée (risque d'arrêt respiratoire), cyanose, somnolence, rash, vomissements, prurit, ataxie → assistance respiratoire, **naloxone**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**IMAO** : association contre-indiquée avec le **dextrométhorphan**.

Déconseillé : alcool (majoration de l'effet sédatif).

Prendre en compte (majoration de la dépression centrale) : **analgésiques morphiniques** ou autres dépresseurs du SNC.

NOTE : Les spécialités associant un ou plusieurs autres principes actifs n'ont pas été citées ici. Seules les formes adultes ont été citées (ne pas donner aux enfants < 15 ans).

## ANTITUSSIFS (3) – ANTIHISTAMINIQUES

## ■ Alimémazine

THÉRALÈNE					
Toux sèche : 1 à 2 cp. x 1 à 4/j ou 5 à 10 gtttes x 1 à 4/j ou 1 càs x 1 à 6/j E. : 0,5 à 1 mg/kg/j en 2 à 4 prises	50 cp. séc. 5 mg	1,99	II	15 %	0,04
	1200 gtttes 1 mL (fl. 30 mL)	2,20	II	15 %	0,00
	15 gobelets doseurs 2,5 mg (fl. sirop 150 mL)			NR	

## ■ Oxomémazine

TOPEXIL					
Toux sèche : A. : 10 mL x 1 à 4/j E. : 1 mL/kg de poids	30 càc 33 mg/mL (fl. sirop 150 mL avec gobelet dos.)			NR	

## PROPRIÉTÉS

Antihistaminiques  $H_1$  (récepteurs centraux et périphériques), ayant une action antitussive, antisérotinergique, sédative, et faiblement anticholinergique. Demi-vie = 4 h.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique des toux sèches gênantes non productives, en particulier nocturnes ou allergiques/irritatives.

## CONTRE-INDICATIONS

Liées à l'effet anticholinergique : risque de glaucome par fermeture de l'angle, ou de rétention aiguë d'urine (troubles uréthro-prostatiques).

Insuffisance respiratoire.

Toux productive.

**Grossesse** (1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> trimestre) et **allaitement** : à éviter.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant de prescrire un **antitussif**, rechercher les causes de la toux qui requièrent un traitement spécifique.

Respecter les toux productives.

Pas de traitement prolongé au-delà de quelques jours (réexaminer la situation clinique).

Ne pas boire d'alcool.

Prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machine (sommolence).

Diabète : tenir compte de la présence de saccharose dans la solution buvable et le sirop.

Sujets âgés : réduire la posologie initiale de moitié.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Sommolence diurne.

Effets atropiniques : augmentation de la viscosité des sécrétions bronchiques, sécheresse buccale, troubles de l'accommodation (risque de glaucome aigu), constipation, rétention urinaire, confusion mentale ou excitation chez le sujet âgé.

Rares : allergies cutanées, photosensibilisation, leucopénie.

Rarement, après administration prolongée de fortes doses : syndromes parkinsoniens.

Exceptionnel : agranulocytose.

Surdosage : coma ou excitation, convulsions, mydriase, parfois rougeur des téguments (face), hyperthermie, → **anticonvulsivants**, assistance respiratoire.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Déconseillé : alcool (majoration de l'effet sédatif).

Prendre en compte (majoration de la dépression centrale) : **analgésiques morphiniques**, ou autres déprimeurs du SNC, **hypnotiques**.

Prendre en compte (addition des effets atropiniques) : autres **anticholinergiques**.

NOTE : Les spécialités associant un ou plusieurs autres principes actifs ne sont pas citées ici. Seules les formes adultes sont citées.

## ANTITUSSIFS (4) – NON OPIACÉ ET NON ANTIHISTAMINIQUE

### ■ Oxéladine

<b>PAXÉLADINE</b>				
Toux sèche : E. 15-20 kg : 2,5 mL x 3 ou 4/j E. 20-30 kg : 5 mL x 2 à 3/j E. 30-50 kg : 5 mL x 3 à 5/j A. : 5 mL x 5/j max	1 fl. 125 mL	2,92	15 %	0,19

#### PROPRIÉTÉS

Antitussif d'action centrale, non opiacé non antihistaminique, non dépresseur respiratoire à doses thérapeutiques.

#### INDICATIONS

Traitement symptomatique des toux sèches non productives gênantes.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : 1<sup>er</sup> trimestre.

**Clobutinol** : épilepsie, antécédents convulsifs.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet **antitussif** peut être utilisé en cas d'insuffisance respiratoire.

Avant de prescrire un **antitussif**, rechercher les causes de la toux qui requièrent un traitement spécifique.

Respecter les toux productives.

NOTE : Les spécialités associant un ou plusieurs autres principes actifs ne sont pas citées ici. Seules les formes adultes sont citées.

## FLUIDIFIANTS BRONCHIQUES

### ■ Acétylcystéine

<b>MUCOMYST</b>				
Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique : 1 sach. ou 1 c-mes. x 3/j	30 sach. 200 mg 24 c-mes. 200 mg			NR NR

### ■ Carbocistéine ou carbocystéine

<b>RHINATHIOL</b>				
Avec ou sans sucre Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique : A. : 1 gobelet-doseur x 3/j E. : 1 c-mes. (100 mg) x 2/j	16 gobelets-doseurs (fl. sirop adulte 5 % 250 mL) 25 c-mes. (fl. sirop enfant 2 % 125 mL)			NR NR
<b>BRONCHOKOD</b>				
Sans sucre Idem <b>RHINATHIOL</b> ou A. : 1 sach. x 3/j	16 càs 750 mg (fl. sirop ou sol. buv. adulte 5 % 250 mL) 25 c-mes. 100 mg (fl. sirop ou sol. buv. enfant 2 % 125 mL) 15 sach. 750 mg 10 mL sol. buv. caramel-vanille			NR NR NR

### ■ Diacétylcystéine

<b>MUCOTHIOI</b>				
1 cp. x 3/j	20 cp. 200 mg			NR

### ■ Érdostéine

<b>VECTRINE</b>				
Idem <b>MUCOMYST</b> : 1 cp. ou 1 sach. x 2/j	20 cp. 300 mg 20 sach. 300 mg			NR NR

#### PROPRIÉTÉS

Action mucorégulatrice ou mucolytique : rupture des liaisons entre glycoprotéines. Diminuent la viscosité du mucus, favorisant l'expectoration des sécrétions bronchiques.

#### INDICATIONS

Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique au cours d'affections bronchiques (surtout aiguës).

#### CONTRE-INDICATIONS

Ulcère gastroduodénal évolutif (**acétylcystéine**, **carbocistéine**, **létostéine**).

Voies inhalée ou intratrachéale contre-indiquées en cas de bronchospasme.

**Érdostéine** : insuffisance rénale ou hépatique.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

**Diabète** : utiliser les formes « sans sucre ».

Formes locales : à diluer dans du sérum physiologique.

S'assurer d'un drainage bronchique efficace par la toux et/ou la kinésithérapie.

Ne pas associer avec des **antitussifs** ni avec des substances asséchant les sécrétions (**atropiniques**).

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Gastralgies, nausées/vomissements, diarrhée : réduire la dose.

Risque d'inondation bronchique chez le malade incapable d'expectorer, indiquant une aspiration bronchique en urgence.

Exceptionnels : céphalées, vertiges, somnolence, réactions allergiques.

Voie locale : toux, bronchospasme.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aérosols : ne pas mélanger avec d'autres produits (sauf  **$\beta_2$ -stimulants**).

## SUBSTITUTS NICOTINIQUES (1)

## ■ Nicotine

<b>NICOPATCH</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : application d'un dispositif adhésif transdermique (= pch.) chaque matin, à doses décroissantes (cf. Précautions d'emploi)	7 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
<b>NICORETTESKIN</b>				
Idem <b>NICOPATCH</b> (retirer au coucher)	7 pch. 10 mg (9 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 10 mg (9 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 15 mg (13,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 15 mg (13,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 25 mg (22,5 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 25 mg (22,5 cm <sup>2</sup> )			NR
<b>NICORETTE SANS SUCRE</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : mâcher une gomme chaque fois qu'est ressenti le besoin de fumer 8 à 12/j sans dépasser 30/j pour les gommes à 2 mg et 15/j pour celles à 4 mg	30 gom. 2 mg			NR
	30 gom. fruits 2 mg			NR
	30 gom. menthe cannelle			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	105 gom. 2 mg			NR
	105 gom. fruits 2 mg			NR
	105 gom. menthe cannelle			NR
	2 mg			
	105 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	105 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	210 gom. 2 mg			NR
	210 gom. menthe fraîche			NR
	2 mg			
	210 gom. menthe glaciale			NR
	2 mg			
	30 gom. menthe fraîche			NR
	4 mg			
	30 gom. menthe glaciale			NR
	4 mg			
	105 gom. 4 mg			NR
	105 gom. menthe fraîche			NR
	4 mg			
	105 gom. menthe glaciale			NR
	4 mg			
<b>NICORETTE INHALEUR</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : inhaler une cartouche à la façon d'une cigarette, 20 min. chaque fois qu'est ressenti le besoin de fumer	6 cart. + inhal. buccale			NR
	42 cart. + inhal. buccale			NR



## SEVRAGE TABAGIQUE (3)

### Inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des catécholamines (noradrénaline et dopamine)

Le **bupropion (ZYBAN LP)** est un antidépresseur approuvé par la FDA mais ne possède pas d'AMM en France pour le traitement de la dépression. Son mécanisme d'action présente des analogies avec celui des dérivés amphétaminiques, ce dont témoignait sa DCI initiale : **amfébutamone**. Il agirait aussi sur la dépendance psychique. Son efficacité ne semble pas supérieure à celle des **substituts nicotiniques** et son rapport bénéfice/risque paraît moins favorable. On attirera notamment l'attention du prescripteur sur le risque de crise convulsive dont l'incidence est de 0,1 %. Des insomnies sont possibles.

Ce traitement peut être associé à des **substituts nicotiniques**.

Ex. **ZYBAN LP** cp. 150 mg : 1 cp. par jour une semaine avant le début du sevrage, puis 2 cp./j à partir du 7<sup>e</sup> j, en 2 prises quotidiennes espacées d'au moins 8 h. Traitement à maintenir pour une durée totale de 7 à 9 sem.

La **varénicline (CHAMPIX)** est un traitement oral du sevrage tabagique qui doit être débuter 1 à 2 sem. avant le sevrage tabagique. L'association de **CHAMPIX** avec des substituts nicotiniques est déconseillée.

Ex : **CHAMPIX** de J1 à J3, 0,5 mg une fois par jour puis de J4 à J7, 0,5 mg 2 fois par jour et de J8 à la fin du traitement, 1 mg 2 fois par jour pour un total de 12 sem. (pour les patients qui ont réussi à arrêter de fumer à la fin des 12 sem., une cure supplémentaire de 12 sem. à 1 mg x 2/jour peut être proposée).

Il est recommandé d'utiliser :

- en 1<sup>re</sup> intention : **substituts nicotiniques** ;
- en 2<sup>e</sup> intention : **varénicline** ;
- en 3<sup>e</sup> intention : **bupropion**.

### Cigarette électronique

Ces « cigarettes » génèrent de la vapeur, qui imite la fumée des cigarettes habituelles. Certaines contiennent de la nicotine. Elles favoriseraient le sevrage tabagique.

### Autres approches thérapeutiques

Elles sont complémentaires des mesures générales (éducation du patient, soutien psychologique) et d'un éventuel traitement médicamenteux.

- Les thérapies comportementales ont démontré une certaine efficacité dans quelques études contrôlées, mais sont encore trop difficiles d'accès.
- Les autres méthodes (acupuncture, homéopathie, etc.) ne sont pas correctement évaluées mais l'acupuncture semble peu ou pas efficace.

### Suivi régulier et prolongé

- Accompagnement par le biais de consultations successives (J8, J15, J30 puis 1/mois).
- Un échec (reprise du tabac) n'est pas de mauvais pronostic pour l'avenir : la motivation sera renforcée à la prochaine tentative.
- Succès définitif probable si sevrage > 1 an.
- Cas difficiles : orienter vers un Centre d'aide au sevrage tabagique.

### Consultations d'aide au sevrage tabagique (AP-HP Paris-banlieue)

La liste la plus à jour est disponible à : <http://www.splf.org/gp/dossier-les-bonnesadresses/consult-antitabac.html>.

## SUBSTITUTS NICOTINIQUES (2)

## ■ Nicotine

<b>NICOTINELL</b>				
Traitement de la dépendance nicotinique au cours du sevrage tabagique : application d'un dispositif adhésif transdermique (= pch.) chaque matin, à doses décroissantes (cf. Précautions d'emploi) Gomme sans sucre Idem <b>NICORETTE SANS SUCRE</b>	7 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg (10 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg (20 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg (30 cm <sup>2</sup> )			NR
	36 gom. fruit 2 mg			NR
	36 gom. menthe 2 mg			NR
	96 gom. fruit 2 mg			NR
	96 gom. menthe 2 mg			NR
	204 gom. fruit 2 mg			NR
	204 gom. menthe 2 mg			NR
	36 gom. menthe 4 mg			NR
	96 gom. menthe 4 mg			NR
	204 gom. menthe 4 mg			NR
	36 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	144 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
<b>NIQUITIN</b>				
Idem <b>NICOPATCH</b> (retirer au coucher) Phase initiale de traitement : 1 cp. à sucer toutes les 1 à 2 h Suivi : 1 cp. à sucer toutes les 2 à 4 h Sevrage : 1 cp. à sucer toutes les 4 à 8 h	7 pch. 7 mg/24 h (7 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 7 mg/24 h (7 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 14 mg/24 h (15 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 14 mg/24 h (15 cm <sup>2</sup> )			NR
	7 pch. 21 mg/24 h (22 cm <sup>2</sup> )			NR
	28 pch. 21 mg/24 h (22 cm <sup>2</sup> )			NR
	24 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	36 cp. sans sucre 2 mg			NR
	96 cp. sans sucre 2 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 2 mg			NR
	24 cp. à sucer menthe 4 mg			NR
	36 cp. sans sucre 4 mg			NR
	96 cp. sans sucre 4 mg			NR
	96 cp. à sucer menthe 4 mg			NR

## SEVRAGE TABAGIQUE (4)

## Évaluation de la motivation

- Je viens à la consultation spontanément, par décision personnelle ..... 2
- Je viens à la consultation sur avis médical ..... 1
- Je viens à la consultation sur avis de ma famille ..... 1
- J'ai déjà arrêté de fumer pendant plus d'une semaine ..... 1
- Actuellement, mon activité professionnelle est sans problème ..... 1
- Actuellement, tout va bien sur le plan familial ..... 1
- Je veux me libérer de cet esclavage .. 2
- Je fais du sport ou j'ai l'intention d'en faire ..... 1
- Je veux être en meilleure forme physique ..... 1
- Je veux préserver mon aspect physique ..... 1
- Je suis enceinte ou ma conjointe est enceinte ..... 1
- J'ai des enfants en bas âge ..... 2
- J'ai bon moral actuellement ..... 2
- J'ai l'habitude de réussir ce que j'entreprends ..... 1
- Je suis plutôt d'un tempérament calme, détendu ..... 1
- Mon poids est habituellement stable ..... 1
- Je veux accéder à une qualité de vie meilleure ..... 2

## Note sur 20

- 16 points et +** Très grandes chances  
**12 à 16** Grandes chances  
**6 à 12** Chances réelles, mais des difficultés à prévoir  
**6 et -** Est-ce le moment ?

## Test de Fagerström

Quelle est votre dépendance  
par rapport à la nicotine ?

- Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?
- moins de 15 ..... = 0
  - de 16 à 25 ..... = 1
  - plus de 25 ..... = 2
- Quel taux de nicotine y a-t-il dans vos cigarettes ?
- moins de 0,6 mg ..... = 0
  - de 0,6 à 1 mg ..... = 1
  - plus de 1 mg ..... = 2
- Inhalez-vous la fumée ?
- jamais ..... = 0
  - parfois ..... = 1
  - toujours ..... = 2
- Fumez-vous plus le matin que l'après-midi ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0
- À quel moment fumez-vous votre première cigarette ?
- immédiatement au lever ..... = 2
  - après le petit-déjeuner ..... = 1
  - plus tard ..... = 0
- Quelle cigarette trouvez-vous la meilleure ? (la plus indispensable ?)
- la première ..... = 1
  - une autre ..... = 0
- Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0
- Fumez-vous, même si une maladie vous oblige à rester au lit ?
- oui ..... = 1
  - non ..... = 0

## Total :

- 0 à 3 points** ..... Peu ou pas dépendant  
**4 à 6 points** ..... Dépendant  
**7 à 9 points** ..... Fortement dépendant  
**Plus de 10 points** ..... Très fortement dépendant

## Évolution du profil du tabagique

Situez-vous sur l'échelle en faisant une croix.

Besoin du geste		Score (0-10)
Pas de besoin	_____	Besoin impérieux permanent
Fumer est un plaisir		
Minimum	_____	Maximum
Fumer vous aide		
Minimum	_____	Maximum
Fumer est un réflexe		
Minimum	_____	Maximum

**SUBSTITUTS NICOTINIQUES (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Délivrance de nicotine visant à éviter les symptômes de « manque » lors du sevrage tabagique (irritabilité, agressivité, difficultés de concentration). Patch : absorption systémique transcutanée, débutant 1 h après l'application, atteignant un plateau après 8-10 h. gomme, cp. ou inhaleur : absorption immédiate par la muqueuse buccale.

**INDICATIONS**

Traitement de la dépendance nicotinique (évaluée par exemple par le test de Fagerström ; cf. Sevrage tabagique), lors du sevrage tabagique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** ; enfants.

Infarctus du myocarde en phase aiguë, angor instable, AVC récent, arythmie sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Arrêt complet du tabac !

Doit s'insérer dans une stratégie globale d'arrêt du tabac.

Prudence si maladie cardiovasculaire.

Patch : appliquer le matin sur peau glabre (bras, tronc), laisser 16 à 24 h ; patch à 30 cm<sup>2</sup> si fume > 20 cigarettes/j (ou 20 cm<sup>2</sup> si < 20 cigarettes/j) pendant 1 mois, puis diminuer de 10 cm<sup>2</sup> tous les mois (durée totale = 3 mois).

Gommes, cp. ou inhaleur : respectivement mâcher lentement (30 min), sucer ou inhaler « à la manière d'une cigarette » chaque fois qu'est ressenti le besoin de fumer (en moyenne 10/j ; maximum 30/j, ou 15/j à 4 mg ou 12/j pour la forme inhaleur), puis diminution progressive.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, insomnie (dans ce cas : retirer le patch au coucher), irritabilité, anxiété, vertiges, nausées, douleurs abdominales, troubles du transit ; gommes : irritation pharyngée ; patchs : prurit, érythème léger (changer le site d'application chaque jour) ; plus rares : rash cutané localisé (retirer le patch), somnolence.

## AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE (1)

## ■ Chlorhydrate de bupropion

ZYBAN LP				
Sevrage tabagique : 1 cp./j pendant 6 jours, puis 1 cp x 2/j pendant 6 à 8 sem.	60 cp. 150 mg		I	NR

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des cathécolamines (noradrénaline et dopamine), classé comme **antidépresseur**. (La dépendance psychique au tabac serait médiée par la voie dopaminergique, et la dépendance physique (responsable des symptômes de manque) impliquerait le système noradrénergique.)

Demi-vie 20 h, état d'équilibre en 5 à 8 j, métabolisation hépatique, élimination urinaire (métabolites).

## INDICATIONS

Aide au sevrage tabagique, accompagné d'un soutien de la motivation, chez les patients présentant une dépendance à la nicotine.

Débuter le traitement avant l'arrêt effectif du tabac, et décider d'une date précise d'arrêt au cours de la 2<sup>e</sup> sem. ; la posologie initiale est de 150 mg/j pendant les 6 premiers j, puis de 300 mg/j en 2 prises quotidiennes espacées d'au moins 8 h.

Le soutien psychologique et l'accompagnement du fumeur vers l'arrêt font partie intégrante de la prise en charge médicale. Il existe de plus des livrets d'information destinés au patient.

Peut être utilisé en association avec des **substituts nicotiniques** (ce qui augmente le taux de succès), sous surveillance (PA).

## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité connue au bupropion ou un des excipients.
- Trouble convulsif évolutif ou antécédent convulsif ; ou tumeur du SNC connue.
- Sevrage alcoolique ou des **benzodiazépines** en cours.
- Boulimie, anorexie mentale (ou antécédent) ou trouble bipolaire.
- Insuffisance hépatique sévère.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

Sujets < 18 ans : déconseillé.

Utilisation de **psychostimulants** ou **anorexigènes** : déconseillé.

- Ne pas boire d'alcool.
- Prudence en cas de facteurs de risque abaissant le seuil épileptogène (antécédent de traumatisme crânien, diabète traité), et chez les conducteurs et utilisateurs de machines.
- Sujet âgé, insuffisance rénale, insuffisance hépatique légère à modérée : réduire la posologie à 1 cp./j.
- Ne pas poursuivre si inefficace après 7 sem.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Nausées, vomissements, sécheresse buccale, trouble du goût, douleur abdominale, constipation ; fièvre, sueurs.

Insomnie, tremblements, troubles de la concentration, céphalées, vertiges, dépression, agitation, anxiété, confusion.

Tachycardie, élévation de la PA (parfois sévère). Convulsions (incidence 1/1 000) : arrêter le traitement.

Réactions d'hypersensibilité (éruption cutanée, prurit, dyspnée, douleur thoracique, etc.) : arrêter le traitement.

Surdosage : hallucinations, somnolence, voire coma : réanimation, traitement symptomatique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Contre-indiqués : **IMAO**.

Déconseillés : **psychostimulants** ou **anorexigènes**.

À utiliser avec précaution : médicaments abaissant le seuil épileptogène (**corticoïdes**, **antipsychotiques**, **antidépresseurs**, **antipaludéens**, **tramadol**, **théophylline**, **quinolones**, **antihistaminiques**, **sédatifs**), inducteurs enzymatiques (**barbituriques**, **carbamazépine**, **phénytoïne**) ou inhibiteurs enzymatiques (**valproate**), **lévodopa**, **insuline** et **hypoglycémifiants**, **β-bloquants**, **propafénone**, **flécaïnide**.

## AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE (2)

## ■ Varénicline tartrate

<b>CHAMPIX</b>					
Sevrage tabagique : 0,5 mg/j de J1 à J3, 0,5 mg x 2/j de J4 à J7, 1 mg x 2/j de J8 à la fin du traitement	56 cp. 0,5 mg		I	NR	
	28 cp. 1 mg		I	NR	
	56 cp. 1 mg		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

L'efficacité de **CHAMPIX** dans le sevrage tabagique est le résultat d'une activité agoniste partielle de la **varénicline** au niveau du récepteur nicotinique  $\alpha 4\beta 2$  où sa liaison produit un effet suffisant pour soulager les symptômes de besoin impérieux et de manque (activité agoniste), tout en entraînant simultanément une réduction des effets de récompense et de renforcement du tabagisme en empêchant la liaison de la nicotine aux récepteurs  $\alpha 4\beta 2$  (activité antagoniste).

## INDICATIONS

Aide au sevrage tabagique, accompagné d'un soutien de la motivation, chez les patients présentant une dépendance à la nicotine.

Le patient doit fixer une date pour arrêter de fumer. L'administration de **CHAMPIX** doit débuter 1 à 2 sem. avant cette date.

**CHAMPIX** s'administre par voie orale. La dose recommandée est de 1 mg de **varénicline** x 2/j après une semaine d'augmentation posologique comme suit :

- de J1 à J3, 0,5 mg x 1/j ;
- puis de J4 à J7, 0,5 mg x 2/j ;
- et de J8 à la fin du traitement 1 mg x 2/j.

Les patients doivent être traités par **CHAMPIX** durant 12 sem. Pour les patients qui ont réussi à arrêter de fumer à la fin des 12 sem., une cure supplémentaire de traitement de 12 sem. par **CHAMPIX** à 1 mg x 2/j peut être envisagée. Pour les patients qui ne parviennent pas à arrêter de fumer au cours du traitement initial ou qui rechutent après le traitement, aucune donnée n'est disponible sur l'efficacité d'une cure supplémentaire de traitement de 12 sem.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Insuffisant rénal : aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez l'insuffisant rénal léger à modéré. Chez l'insuffisant rénal sévère (clairance de la créatinine estimée < 30 mL/min), la dose recommandée de **CHAMPIX** est de 1 mg x 1/j.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez l'insuffisant hépatique et chez le sujet âgé.

**CHAMPIX** ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent en dessous de 18 ans en raison d'une insuffisance de données concernant la sécurité et l'efficacité.

Grossesse et allaitement : déconseillé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Chez les patients traités avec la dose recommandée de 1 mg deux fois par jour après la période d'augmentation posologique initiale, l'événement indésirable le plus fréquemment rapporté a été la nausée (28,6 %).

Les taux d'arrêt du traitement pour les événements indésirables les plus fréquents chez les patients traités par la **varénicline** ont été les suivants : nausées (2,7 %), céphalées (0,6 %), insomnie (1,3 %) et rêves anormaux (0,2 %).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Déconseillés :

- **produits de substitution nicotinique (PSN)** : lorsque la **varénicline** et un **PSN** transdermique ont été administrés de façon concomitante, une diminution de la pression artérielle a été observée. L'incidence des nausées, des céphalées, des vomissements, des sensations vertigineuses, de la dyspepsie et de la fatigue a été plus élevée avec l'association qu'avec le **PSN** administré seul ;
- **cimétidine** en cas d'insuffisance rénale sévère.

## INHIBITEURS DE LA PHOSPHODIESTÉRASE DE TYPE 5

## ■ Sildénafil

REVATIO					
20 mg X 3/j	90 cp. 20 mg 1 fl. pdre pour susp. buv. 10 mg/mL	HOP HOP	I I	100 % 100 %	

## ■ Tadalafil

ADCIRCA					
2 cp./j Insuffisance rénale ou hépatique : 1 cp./j	28 cp. 20 mg 56 cp. 20 mg	HOP HOP	I I		

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (PDE-5) actifs par voie orale.

**INDICATIONS**

HTAP idiopathique, familiale ou associée à une connectivite, de classe fonctionnelle III de la NYHA.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C).
- Antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde.
- Hypotension sévère (pression artérielle < 90/50 mmHg) à l'initiation.
- Perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artérielle (NOIAN).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

La gestion des effets indésirables en regard du rapport bénéfices/risques guide la thérapeu-

tique de façon individuelle, en fonction du contexte pathologique et de la réponse du patient. Il existe des risques de priapisme et d'hypotension.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

- Bouffées vasomotrices.
- Céphalées.
- Myalgies.
- Hypotension.
- Troubles digestifs.
- Neuropathie optique ischémique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqué avec les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP3A4.

Adaptation posologique avec les inhibiteurs/inducteurs légers.

**Dérivés nitrés** et donneurs de monoxyde d'azote.

## ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ENDOTHÉLINE

■ **Ambisentan**

<b>VOLIBRIS</b>					
1 cp./j à 5 ou 10 mg en fonction du contexte	30 cp. 5 mg 30 cp. 10 mg	HOP HOP	I I		

**PROPRIÉTÉS**

L'**ambisentan** est un antagoniste sélectif des récepteurs de type A de l'endothéline (ET<sub>A</sub>), actif par voie orale.

**INDICATIONS**

Traitement de l'HTAP idiopathique ou associée à une connectivite de classe fonctionnelle II ou III NYHA.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'**ambisentan**, grossesse, allaitement, absence de contraception efficace chez la femme en âge de procréer, insuffisance hépatique sévère et les transaminases hépa-

tiques ALAT/ASAT > 3N avant l'initiation du traitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une NFS mensuelle doit être réalisée en raison de l'apparition fréquente d'anémies.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

oedèmes périphériques et rétention hydrique, anémie, céphalées et bouffées vasomotrices. Tératogénicité.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association avec la **ciclosporine A** pose des problèmes de surexposition et l'initiation d'un traitement concomitant avec la **rifampicine** doit être étroitement surveillée.

■ **Bosentan**

<b>TRACLEER</b>					
62,5 mg x 2/j pendant 4 sem. puis 125 mg x 2/j	56 cp. 32 mg 56 cp. 62,5 mg 56 cp. 125 mg	HOP HOP HOP	I I I		

**PROPRIÉTÉS**

Le **bosentan** est un antagoniste mixte des récepteurs de type A et de type B de l'endothéline (ET<sub>A</sub>) et ET<sub>B</sub>), actif par voie orale.

**INDICATIONS**

Traitement de l'HTAP idiopathique, familiale, associée à une connectivite, à une cardiopathie congénitale de type *shunt* gauche-droite avec syndrome d'Eisenmenger, de classe fonctionnelle III de la NYHA

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique modérée à sévère correspondant à la classe B ou C de la classification de Child-Pugh et des transaminases hépatiques ALAT ou ASAT > 3N.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Une surveillance étroite du bilan hépatique doit être mise en place avant même l'instauration du traitement, tout au long de la 1<sup>re</sup> sem., tous les 15 j pendant 2 mois puis 1 fois/mois. Contraception efficace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, bouffées de chaleur, cytolyses hépatiques, myalgies et oedèmes des membres inférieurs.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **bosentan** est un inducteur des CYP 2C9, 3A4 et 2C19, et en est également le substrat. L'association avec des inhibiteurs/inducteurs de ces CYP doit être faite avec précaution. L'association avec le glibenclamide, le **fluconazole** et la **ciclosporine A** est contre-indiquée.



## ANALOGUES DES PROTACYCLINES

## ■ Époprosténol

<b>FLOLAN</b>					
IV continue 24 h/24	1 inj. 0,5 mg pdre + solv.	HOP	I		
	1 inj. 1,5 mg pdre + solv.	HOP	I		

## ■ Iloprost

<b>VENTAVIS</b>					
Sol. pour inhalation par nébuliseur 6-9 x/j	30 amp. 1 mL (10 µg/mL)	HOP	I		
	30 amp. 2 mL (10 µg/mL)	HOP	I		

## ■ Tréprostinil

<b>REMODYLIN</b>					
SC/IV continue	1 fl. 20 mL (1 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (2,5 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (5 mg/mL) pour perf.	HOP	I		
	1 fl. 20 mL (10 mg/mL) pour perf.	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Ces analogues de la prostacycline agissent sur une des « voies pharmacologiques » impliquées dans l'HTAP. Ceux-ci minimisent l'épaississement des parois vasculaires pulmonaires et impliquent une vasodilatation. **REMODYLIN** présente une demi-vie bien plus longue (2-4 h) que celle de **FLOLAN** (2-7 min).

## INDICATIONS

Traitement de l'HTAP de classe fonctionnelle III ou IV NYHA dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité respectivement à l'époprosténol, l'iloprost ou au tréprostinil.

Insuffisance cardiaque congestive, insuffisance mitrale, maladie coronarienne, infarctus du myocarde < 6 mois, arythmies, tout contexte pathologique majorant les risques hémorragiques et suspicion de maladie veino-occlusive.

**FLOLAN** : œdème pulmonaire lors de la titration.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**FLOLAN** et **REMODYLIN** : la présence du dispositif d'injection en continu justifie une attention toute particulière vis-à-vis du risque infectieux et de la douleur locale.

**VENTAVIS** : risque de bronchospasme lors de l'administration.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**FLOLAN** : douleurs, photosensibilité, tachycardie, flushs, douleur de la mâchoire, céphalées, troubles digestifs, syndrome pseudo-grippal, vertiges, anxiété et asthénie.

**VENTAVIS** : toux, céphalées, douleur de la mâchoire, hypotension, nausées et rash cutané.

**REMODYLIN** : douleurs/réactions au site d'injection, éruptions cutanées, rashs, douleurs à la mâchoire, œdèmes, céphalées et troubles digestifs.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avec les **diurétiques**, **antihypertenseurs** ou **vasodilatateurs** qui majorent le risque d'hypotension et les **AINS**, **antiagrégants plaquettaires** et **anticoagulants** qui majorent le risque de saignement.

**TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (1)****Définition**

Le trouble anxiété généralisée (TAG) est caractérisé par la présence d'une anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas uniquement ni même de façon préférentielle dans une situation déterminée (anxiété flottante). Le sujet souffrant d'un TAG se fait habituellement des soucis et s'attend à des malheurs divers (attente anxieuse). Cet état s'accompagne de symptômes multiples et variables : irritabilité, tension musculaire, agitation fébrile, incapacité à se détendre, tachycardie, tremblements.

En l'absence de critères diagnostiques plus performants validés, **les critères du DSM-IV** sont recommandés pour diagnostiquer le TAG en pratique courante :

- Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au moins 6 mois concernant un certain nombre d'événements ou d'activités (tel le travail ou les performances scolaires).
- La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
- L'anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins certains symptômes présents la plupart du temps durant les six derniers mois). Un seul de ces items est requis chez l'enfant :
  - agitation ou sensation d'être survolté ou à bout,
  - fatigabilité,
  - difficulté de concentration ou de mémoire,
  - irritabilité,
  - tension musculaire,
  - perturbation du sommeil (difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité et non satisfaisant).
- L'objet de l'anxiété et des soucis n'est pas limité aux manifestations d'un trouble de l'axe 1, p. ex., l'anxiété ou la préoccupation n'est pas celle d'avoir une attaque de panique (comme dans le trouble panique), d'être gêné en public (comme dans la phobie sociale), d'être contaminé (comme dans le trouble obsessionnel compulsif), d'être loin de son domicile ou de ses proches (comme dans le trouble anxiété de séparation), de prendre du

poids (comme dans l'anorexie mentale), d'avoir de multiples plaintes somatiques (comme dans le trouble somatisation) ou d'avoir une maladie grave (comme dans l'hypocondrie), et l'anxiété et les préoccupations ne surviennent pas exclusivement au cours d'un état de stress post-traumatique.

- L'anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
- La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex., une substance donnant lieu à abus, un médicament) ou d'une affection médicale générale (p. ex., hyperthyroïdie) et ne survient pas exclusivement au cours d'un trouble de l'humeur, d'un trouble psychotique ou d'un trouble envahissant du développement.

**Évolution et complication**

Il est recommandé de rechercher l'association au TAG d'un autre trouble psychiatrique tel que dépression sous toutes ses formes, autres troubles anxieux, abus/dépendance à l'alcool/drogues psychoactives, retrouvés chez 2/3 des patients en population générale et 3/4 des patients en soins primaires, et/ou des traits de personnalité pathologique évitante et/ou dépendante. Avant de diagnostiquer un trouble anxieux généralisé, il est nécessaire d'éliminer la prise de substances ou les affections médicales qui peuvent produire des symptômes prolongés.

La survenue d'autres troubles anxieux est courante au cours de l'évolution de l'anxiété généralisée. Les complications du TAG sont celles habituellement observées dans les troubles anxieux : dépression secondaire, abus et/ou dépendance aux **benzodiazépines**. L'alcoolisme peut être considéré comme un facteur déclenchant, aggravant et comme une conséquence de l'anxiété. Chez l'alcoolique, il est indispensable de réévaluer le TAG après obtention de l'abstinence ou d'une tempérance avant d'envisager un traitement complémentaire.

## ANXIOLYTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (1)

### ■ Clobazam

<b>URBANYL</b>					
Anxiété généralisée : 10 à 60 mg/j en 2 à 3 prises	30 gél. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
Crise d'angoisse aiguë : 10 à 20 mg en 1 fois	30 cp. séc. 10 mg	3,73	I	65 %	0,12
Prévention et traitement du delirium tremens : 10 à 60 mg/j	30 cp. séc. 20 mg	5,15	I	65 %	0,17
Sevrage alcoolique : 10 à 60 mg pendant 3 à 6 sem.					
Formes chroniques de l'épilepsie, en association avec le traitement de base : 0,5 mg/kg/j					

### ■ Clonazépam

<b>RIVOTRIL</b>					
Toutes les formes d'épilepsie rebelle	28 cp. 2 mg	2,16	I	65 %	0,08
Posologie à adapter selon l'âge, le poids, et la sensibilité individuelle : 0,05 à 0,1 mg/kg/j	20 mL sol. buv. (2,5 mg/mL)	2,25	I	65 %	0,11
État de mal convulsif : 1 amp. en IV lente à renouveler x 4 à 6/24 h	6 amp. 1 mL = 1 mg	4,71	I	65 %	0,79

### ■ Clorazépate dipotassique

<b>TRANXÈNE</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse aiguë, prévention du delirium tremens, sevrage alcoolique	30 gél. 5 mg	2,60	I	65 %	0,09
Posologie à adapter : 5 à 150 mg/j	50 gél. 5 mg	HOP	I		
Voie IV lente ou IM (agitation, agressivité, crise d'angoisse, prémédication) : 20 à 200 mg/24 h	30 gél. 10 mg	3,76	I	65 %	0,13
	50 gél. 10 mg	HOP	I		
	28 gél. 20 mg	5,73	I	65 %	0,20
	50 gél. 20 mg	HOP	I		
	5 inj. 20 mg/2 mL	18,80	I	65 %	3,76
	20 inj. 20 mg/2 mL	HOP	I		
	5 inj. 50 mg/2,5 mL	18,80	I	65 %	3,76
	20 inj. 50 mg/2,5 mL	HOP	I		

## TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (2)

### Principes de traitement

L'évolution du TAG est souvent fluctuante et chronique, rythmée par les événements de vie, et TAG requiert le plus souvent *une prise en charge prolongée*.

- Cette prise en charge ne doit pas se limiter à une chimiothérapie au long cours. Les patients anxieux chroniques doivent bénéficier d'un soutien psychothérapique. Les psychothérapies structurées, en particulier les thérapies cognitivo-comportementales, devraient être privilégiées.
- Des mesures hygiéno-diététiques sont recommandées : arrêt de la consommation d'alcool et de tabac, diminution de la consommation de café, pratique régulière d'une activité physique.

### Traitements pharmacologiques

En dépit de leur efficacité démontrée, le TAG n'est plus l'indication privilégiée des **benzodiazépines (BZD)** que l'on réserve pour les manifestations aiguës. La chimiothérapie fait désormais appel en 1<sup>re</sup> intention aux **antidépresseurs [1]**.

La **paroxétine**, l'**escitalopram**, la **venlafaxine**, la **buspirone**, la **prégabaline** ont l'AMM dans l'indication de TAG. Les **benzodiazépines** ou l'**hydroxyzine** ne doivent pas être prescrites dans le traitement de fond ; en revanche, elles peuvent être utilisées pour des périodes courtes d'exacerbation anxieuse : le patient prenant des **benzodiazépines** au long cours doit faire l'objet d'une information et d'une prise en charge spécifiques.

### Antidépresseurs

Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont : **paroxétine (DEROXAT)**, **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** et **escitalopram (SEROPLEX) [2]**.

Le délai d'action des **antidépresseurs** est de 1 à 3 sem. La réponse complète est obtenue après plusieurs sem. de traitement. La durée du traitement doit être d'au moins 6 mois (accord professionnel). La **paroxétine (DEROXAT)** est un **inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine (ISRS)**. Ses effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, l'asthénie, l'insomnie, la somnolence et les troubles sexuels.

L'**escitalopram (SEROPLEX)** est un **ISRS**. À des doses de 10 et 20 mg/j, il s'est montré efficace dans les 4 études contrôlées *versus* placebo. Un effet durable est apparu dès la 1<sup>re</sup> sem. Ses effets indésirables les plus fréquents sont l'insomnie ou la somnolence, des sensations vertigineuses, le bâillements, l'hypersudation, les troubles de la libido, les nausées et une prise pondérale. La **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** est un **inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)**. Elle est efficace dans le contrôle des signes psychiques d'anxiété du TAG dans les traitements de 28 sem. Son effet anxiolytique débute entre la 1<sup>re</sup> et la 3<sup>e</sup> semaine de traitement. Ses effets indésirables les plus fréquents sont les étourdissements en début de traitement, les nausées plus étalées dans le temps, la sécheresse de la bouche, l'asthénie, l'insomnie, la somnolence et les troubles sexuels.

Ex. 1 : **EFFEXOR LP** 37,5 et 75 mg (cp.) : 37,5 mg le premier jour puis 75 mg/j en une seule prise. La posologie peut être augmentée après 2 sem. de traitement par paliers de 37,5 mg/sem. jusqu'à 150 voire 225 mg/j.

Ex. 2 : **DEROXAT** 20 mg (cp.) : 1 cp./j. Cette posologie pourra être augmentée par paliers de 10 mg/j, en fonction de la réponse thérapeutique jusqu'à 50 mg/j.

Ex. 3 : **SEROPLEX** 5 mg (cp.) : 1 cp./j au cours de la 1<sup>re</sup> sem. de traitement, avant une augmentation à 10 mg/j. En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg/j. L'efficacité maximale est atteinte après environ 3 mois de traitement. Le traitement devra être poursuivi plusieurs mois.

La **paroxétine (DEROXAT)**, la **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** et l'**escitalopram (SEROPLEX)** sont les traitements de 1<sup>re</sup> intention ; s'il n'y a pas d'amélioration après 6 sem., augmenter les doses puis au bout de 12 sem. choisir l'autre traitement. En cas d'échec des traitements de 1<sup>re</sup> intention, la **clomipramine** peut être proposée (hors AMM). L'**imipramine (TOFRANIL)** est également efficace sur les signes psychiques de l'anxiété du TAG. Elle ne possède pas d'AMM dans cette indication.

## ANXIOLYTIQUES (2) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (2)

## ■ Chlordiazépoxide + bromure de clidinium

LIBRAX					
Manifestations anxieuses accompagnées de troubles fonctionnels digestifs à composante spasmodique Association : le bromure de clidinium est un <b>antispasmodique anticholinergique</b> contre-indiqué en cas de risque de glaucome par fermeture de l'angle ou de rétention urinaire par obstacle prostatique (cf. Gastro-entérologie) 2 à 4 cp./j	30 cp. 5 mg + 2,5 mg		I	NR	

## ■ Diazépam

VALIUM ROCHE					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos Posologie à adapter : 5 à 25 mg/j en 2 à 3 prises Voie IV lente ou IM (agitation, agressivité, crise d'angoisse, état de mal convulsif) Posologie variable, en moyenne : 0,1 à 0,2 mg/kg par inj. à renouveler jusqu'à 4 fois/24 h	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	600 gttes - fl. 20 mL (3 gttes = 1 mg)	2,92	I	65 %	0,01
	6 amp. (2 mL = 10 mg)	3,16	I	65 %	0,53

## TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (3)

Quelle que soit la molécule prescrite, la durée de traitement du TAG est de 6 mois au moins. Une réévaluation est recommandée 1 à 2 sem. après la 1<sup>re</sup> consultation, puis toutes les 6 sem.

### Prégabaline (LYRICA)

La posologie varie de 150 à 600 mg/j, en 2 ou 3 prises. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée régulièrement. Le traitement peut être instauré à la dose de 150 mg/j. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg/j après une sem. Après un délai supplémentaire d'une sem., la dose peut être augmentée à 450 mg/j. La dose maximale de 600 mg/j peut être atteinte après un délai supplémentaire d'une sem.

### Traitement médicamenteux des manifestations aiguës

Il repose sur les **benzodiazépines** ou l'**hydroxyzine**, en association avec le traitement de fond. Les **benzodiazépines** seront prescrites avec prudence en cas de trouble addictif associé et en cas de dépendance ou de syndrome de sevrage antérieur aux **benzodiazépines**, et pour une durée limitée.

### Benzdiazépines

Le traitement médicamenteux repose sur les benzodiazépines ou l'**hydroxyzine**, en association avec le traitement de fond. Les **benzodiazépines** seront prescrites avec prudence en cas de trouble addictif associé et en cas de dépendance ou de syndrome de sevrage antérieur aux **benzodiazépines**, et pour une durée limitée. Le choix d'une **benzodiazépine** est affaire de cas particuliers et d'habitudes de prescription. Aucune molécule n'apparaît supérieure aux autres. L'activité anxiolytique dépend pour une large part de la dose utilisée.

Les doses recommandées sont très variables d'un individu à l'autre. On propose des doses allant de 5 à 60 mg de **diazépam (VALIUM)**. Le choix du produit peut s'appuyer sur des paramètres pharmacocinétiques. On oppose les molécules

à demi-vie longue et à métabolite actif (**diazépam**, **chlordiazépoxyde**, **clorazépate dipotassique**, etc.) aux produits à demi-vie courte (**oxazépam**, **lorazépam**, etc.) préférés chez le sujet âgé. Les produits à demi-vie longue exposeraient moins au développement d'accidents de sevrage lors de l'arrêt des traitements.

Exemple de schéma thérapeutique : **benzodiazépine**, **diazépam (VALIUM 5 mg)** : 1 cp. matin et soir. Après une semaine, maintenir ou augmenter de 1 à 2 cp. selon la tolérance et l'efficacité.

### ► Surveillance du traitement

#### En début de traitement

- On surveillera principalement la tolérance et l'efficacité.

Un effet sédatif s'observe lors des premières prises et s'atténue en 3-4 j. Au-delà de ce délai, la somnolence indique un surdosage et implique une révision des posologies.

- On recherche également les effets indésirables classiques des **benzodiazépines** : amnésie antérograde, désinhibition paradoxale avec irritabilité et impulsivité.

- Dans le TAG, le délai d'action des **benzodiazépines** est habituellement de 2 à 5 j ; la réponse thérapeutique après une sem. serait le meilleur facteur prédictif de l'efficacité des **benzodiazépines**. Un patient non amélioré après quelques sem. de traitement incite à une révision du diagnostic, ou à un changement de molécule ou de classe médicamenteuse.

#### Après plusieurs semaines de traitement

- On élimine principalement l'existence d'une surconsommation par autopréscription qui fait craindre le développement d'une tolérance et d'une dépendance. Enfin au moment de la diminution progressive des doses, par paliers d'une sem., et de l'arrêt des traitements, on dépistera la survenue de symptômes anxieux qui peuvent traduire des phénomènes de rebond ou de sevrage.

- Le syndrome de sevrage survient en moyenne après 1 sem. pour les **BZD à demi-vie courte** ou après 3 sem. pour les **BZD à demi-vie longue**.

## ANXIOLYTIQUES (3) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (3)

## ■ Loflazépate d'éthyle

<b>VICTAN</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos (non indiquée dans l'épilepsie ou les contractures musculaires) Posologie moyenne : 1 à 3 mg/j	30 cp. séc. 2 mg	3,42	I	65 %	0,11

## ■ Nordazépam

<b>NORDAZ</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos Posologie moyenne : 7,5 à 15 mg/j	30 cp. 7,5 mg	2,78	I	65 %	0,09
	30 cp. 15 mg	4,32	I	65 %	0,14

## ■ Prazépam

<b>LYSANXIA</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos Posologie moyenne de 20 à 40 mg/j	40 cp. séc. 10 mg	3,18	I	65 %	0,08
	20 cp. séc. 40 mg		I	NR	
	600 gttes 0,5 mg	2,89	I	65 %	0,00

## TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (4)

### ► Règles d'utilisation

Le risque de dépendance des **BZD** impose des règles de prescription de ces produits et une limitation de leur emploi. Le renouvellement de la délivrance d'un **hypnotique** et/ou **anxiolytique** n'est possible qu'à l'intérieur de la durée de prescription limitée à 2, 4 ou 12 sem. selon le cas et seulement si le prescripteur a précisé le nombre de renouvellements ou la durée de traitement. Il ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (arrêté du 7 octobre 1991). Lorsqu'un médicament contient un ou plusieurs **hypnotiques** et **anxiolytiques** et qu'il comporte l'indication « insomnie » sur son AMM, il est soumis à la réglementation la plus stricte (art. R.5132-21 du CSP). Ne peuvent être prescrits pour une durée > 12 sem. : **alprazolam**, **bromazépam**, **clobazam**, **clotiazépam**, **diazépam**, **éthyl loflazépate**, **lorazépam**, **nordazépam**, **oxazépam**, **prazépam**. Ne peuvent être prescrits pour une durée > 4 sem. : **clorazépate dipotassique**, **estazolam**, **loprazolam**, **lormétazépam**, **nitrazépam**, **témazépam**, **zopiclone**, **zolpidem**.

Cette limitation de la durée de prescription est le plus souvent compatible avec la prise en charge des patients avec un trouble anxieux généralisé. Ainsi les **BZD** sont souvent indiquées pour des cures de courte durée, en particulier au début d'un traitement par **antidépresseur** ou en situation de « crise » (recrudescence anxieuse aiguë).

Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée régulièrement surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne devrait pas excéder **8 à 12 sem.** pour la majorité des patients, y compris la période de réduction de la posologie. Seulement 10 à

30 % des patients justifieraient d'un traitement prolongé par les **BZD**. On utilisera alors les posologies minimales efficaces, en réévaluant régulièrement la nécessité de maintenir le traitement et en évitant les renouvellements systématiques d'ordonnance.

### Alternatives thérapeutiques

En cas d'inefficacité des **antidépresseurs**, de la **prégabaline**, de mauvaise tolérance aux **benzodiazépines**, ou d'un risque élevé d'abus ou de dépendance, on pourra faire appel aux **anxiolytiques non benzodiazépines**.

- La **buspirone** (**BUSPIRONE MYLAN**), agoniste 5HT<sub>1A</sub>, est efficace dans le trouble anxieux généralisé (AMM dans le TAG). Les doses recommandées sont de l'ordre de 15 à 30 mg/j. Son effet anxiolytique concerne surtout les signes psychiques d'anxiété. Les patients rapportent l'inconstance de cet effet. Le délai d'action de la **buspirone** peut atteindre 3 sem. Ses effets indésirables sont les sensations vertigineuses mais un effet sédatif inférieur à celui des **benzodiazépines**. L'arrêt de la **buspirone** n'entraîne pas de syndrome de sevrage ou de dépendance. Ex. : **buspirone** (**BUSPIRONE MYLAN** 10 mg) : 1 à 3 cp./j. Ce produit induit une anxiolyse progressive et n'entraîne pas de pharmacodépendance. La **buspirone** n'est pas un traitement du syndrome de sevrage des **BZD**. Les autres molécules ont plus rarement leur place dans le traitement de l'anxiété chronique : **hydroxyzine** (**ATARAX**).

- Les **bêta-bloquants** (indication AMM : manifestations fonctionnelles cardiaques à type de tachycardie et de palpitations au cours de situations émotionnelles transitoires) sont parfois prescrits lorsque les signes somatiques de l'anxiété sont au-devant de la scène clinique.

### CONSENSUS

[1] Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves, HAS, 2007

[2] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006



## ANXIOLYTIQUES (4) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE COURTE

## ■ Alprazolam

<b>XANAX</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie à adapter : 0,5 à 4 mg/j en 2 à 3 prises	30 cp. séc. 0,25 mg	2,19	I	65 %	0,07
	100 cp. 0,25 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 0,5 mg	3,04	I	65 %	0,10
	100 cp. 0,5 mg	HOP	I		
	100 cp. 1 mg	HOP	I		

## ■ Bromazépam

<b>LEXOMIL</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie moyenne : 1/2 à 2,5 cp./j en 2 à 3 prises	30 cp. quadriséc. 6 mg	2,80	I	65 %	0,09
	100 cp. quadriséc. 6 mg	HOP	I		
<b>QUIETILINE</b>					
Idem <b>LEXOMIL</b>	30 cp. quadriséc. 6 mg	2,80	I	65 %	0,09

## ■ Clotiazépam

<b>VÉRATRAN</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie moyenne : 10 à 30 mg/j en 2 à 3 prises	30 cp. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
	30 cp. séc. 10 mg	3,05	I	65 %	0,10

## ■ Lorazépam

<b>TÉMESTA</b>					
Idem <b>VÉRATRAN</b> Posologie moyenne : 2 à 5 mg/j 2 à 3 prises	30 cp. séc. 1 mg	1,92	I	65 %	0,06
	30 cp. séc. 2,5 mg	3,38	I	65 %	0,11

## ■ Oxazépam

<b>SÉRESTA</b>					
Anxiété réactionnelle, anxiété généralisée, crise d'angoisse Posologie moyenne : 20 à 60 mg/j en 3 à 4 prises Prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Dans les premiers jours des posologies de l'ordre de 200 à 300 mg/j peuvent être justifiées Diminuer les doses après 24 à 48 h, dose moyenne : 150 mg/j en 3 à 4 prises	30 cp. 10 mg	2,04	I	65 %	0,07
	100 cp. 10 mg	HOP	I		
	20 cp. séc. 50 mg	2,87	I	65 %	0,14
	100 cp. 50 mg	HOP	I		

**TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (5)****Traitement psychologique**

Il fait appel à diverses techniques :

- psychothérapie de soutien toujours indiquée : écoute, réassurance, éducation ;

- psychothérapies cognitives et comportementales et techniques de relaxation.

L'association psychothérapie et traitement médicamenteux n'est pas recommandée systématiquement, néanmoins elle peut constituer une alternative en cas d'échec des traitements utilisés seuls.

**Psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC)**

Elles sont aussi efficaces que les traitements médicamenteux dont elles représentent une alternative, souvent utilisées en association avec les traitements médicamenteux. Les TCC visent à clarifier les circonstances de survenue des troubles, identifier les pensées irrationnelles afin de les évaluer et de les modifier par la réorganisation des attitudes inadaptées. Elles associent la relaxation musculaire appliquée, des expositions répétées à des situations évitées et une restructuration cognitive des interprétations catastrophiques sur les soucis surévalués. Tout en étant

soutenu par le thérapeute, le patient est responsabilisé et actif. Les TCC produisent un effet thérapeutique significatif avec maintien du gain thérapeutique 6 mois après la thérapie. Cet effet est plus fréquent en thérapie individuelle *versus* en thérapie de groupe. Un livret du type *Stresspac* ou une cassette audio contenant le programme de TCC peuvent être également proposés comme alternative. Sous TCC, une réduction significative de la consommation de psychotropes est observée.

**Psychothérapie analytique**

Elle a pour but d'aider les patients à identifier les conflits inconscients sous-jacents aux conduites générant l'anxiété et à préciser les traumatismes précoces des premières expériences interpersonnelles. En dépit de la quasi-absence d'études randomisées comparatives de la psychothérapie analytique dans le TAG, l'expérience clinique suggère que certains patients ayant une anxiété handicapante peuvent être significativement améliorés par la psychothérapie analytique en particulier lorsqu'il existe des troubles de la personnalité.

**Anxiolytiques**

- Il n'y a pas lieu de prescrire deux anxiolytiques.
- Il n'y a pas lieu de prescrire les anxiolytiques sans tenir compte des durées de prescription maximale réglementaires : 12 sem. pour l'ensemble des molécules anxiolytiques.
- Il n'y a pas lieu d'initier une prescription d'anxiolytiques sans respecter les posologies recommandées et sans débiter par la posologie la plus faible.
- Il n'y a pas lieu de reconduire systématiquement, sans réévaluation, une prescription d'anxiolytique.

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (1)

### Définition

Le **trouble panique** ou **anxiété épisodique paroxystique** est caractérisé par la récurrence d'attaques d'anxiété sévère. Les attaques de panique ne surviennent pas exclusivement dans des situations particulières, ce qui les différencie des attaques d'anxiété liées aux phobies.

### Critères diagnostiques (DSM-IV-TR)

#### Attaque de panique

Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intenses, dans laquelle au minimum quatre des symptômes suivants sont survenus de façon brutale et ont atteint leur acmé en moins de 10 min. :

- palpitations, battement de cœur ou accélération du rythme cardiaque ;
- transpiration ;
- tremblements ou secousses musculaires ;
- sensations de « souffle coupé » ou impression d'étouffement ;
- sensation d'étranglement ;
- douleur ou gêne thoracique ;
- nausée ou gêne abdominale ;
- sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement ;
- déréalisation, « sentiment d'irréalité », ou dépersonnalisation, « être détaché de soi » ;
- peur de perdre le contrôle ou de devenir fou ;
- peur de mourir ;
- paresthésies « sensations d'engourdissement ou de picotements » ;
- frissons ou bouffées de chaleur.

La prévalence du trouble panique serait comprise entre 1,5 et 2,5 % de la population générale.

#### Trouble panique sans agoraphobie

À la fois (1) et (2) :

- (1) attaques de panique récurrentes et inattendues ;
- (2) au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois « ou plus » de l'un « ou plus » des symptômes suivants :
  - crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique,

– préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences,

– changement de comportement important en relation avec les attaques.

Absence de l'agoraphobie.

Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

Les systèmes nosologiques actuels exigent, pour porter le diagnostic de ce trouble, la survenue de plusieurs attaques et, entre les attaques, l'existence d'une crainte persistante d'avoir d'autres crises de panique (anxiété anticipatoire).

#### Trouble panique avec agoraphobie

À la fois (1) et (2) :

- (1) attaques de panique récurrentes et inattendues ;
- (2) au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois « ou plus » de l'un « ou plus » des symptômes suivants :
  - crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique ;
  - préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences ;
  - changement de comportement important en relation avec les attaques.

Présence d'agoraphobie.

Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

**ANXIOLYTIQUES (6) – BENZODIAZÉPINES – PHARMACOLOGIE (2)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle. Ils peuvent s'atténuer au cours du temps, ce qui traduit le développement d'une tolérance lors d'une administration prolongée.

**Effets principaux**

Asthénie, sensation ébrieuse, somnolence, baisse de vigilance (sujet âgé, début de traitement, conducteurs de véhicules), hypotonie musculaire (risque de chute chez le sujet âgé), amnésie antérograde, dépression respiratoire (cf. Interactions médicamenteuses), phénomènes de rebond anxieux à l'arrêt du traitement (à distinguer du syndrome de sevrage, cf. *infra*).

**Effets indésirables plus rares**

Réactions paradoxales avec irritabilité, agressivité, euphorie, sensations ébrieuses, déambulations, actes automatiques amnésiques, déshinhibition et passage à l'acte suicidaire.

**Effets exceptionnels**

Éruptions cutanées, modifications de la libido.

**Dépendance**

Le problème principal avec les **BZD** est le risque de développement d'une dépendance avec ou sans tolérance. Ce risque est accru en cas de prescription de doses élevées, d'emploi prolongé (> 3 mois), d'escalade des doses, du recours à des **BZD** à demi-vie courte, d'antécédents de dépendance.

Le syndrome de sevrage se manifeste après une diminution des doses ou un arrêt trop brutal de la prescription. Il survient en quelques jours lors de l'arrêt de **BZD** à demi-vie brève, en 1 à 3 sem. lors de l'interruption de **BZD** à demi-vie longue. Les signes de sevrage asso-

cient à des degrés divers et selon la gravité : anxiété, insomnie, vertiges, anorexie, agitation, tremblements, myoclonies, courbatures, douleurs, sueurs profuses, hypersensibilité sensorielle, saveur métallique dans la bouche, signes psychotiques, convulsions, hyperthermie. Le syndrome de sevrage ne doit pas être confondu avec des phénomènes de rebond, une rechute anxieuse, ou un sevrage alcoolique.

Le traitement du syndrome de sevrage est symptomatique. Il consiste à réintroduire des **BZD** et à les diminuer très progressivement. Le traitement préventif repose sur le respect des règles de prescription des **BZD** (arrêté du 7 octobre 1991).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pharmacodynamiques.

L'association à des déprimeurs du système nerveux central peut entraîner une dépression respiratoire. Celle-ci sera d'autant plus marquée lors de l'emploi de fortes doses, par voie rapide. On évitera donc l'association des **BZD** aux : **antidépresseurs sédatifs**, **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **barbituriques**, autres **anxiolytiques** ou **hypnotiques**, **antihypertenseurs centraux**, **dérivés opiacés**, **antipsychotiques**, alcool. L'association à la **clozapine (LÉPONEX)** pourrait entraîner un collapsus avec arrêt cardiorespiratoire.

**INTOXICATION**

Les **BZD** sont classiquement ingérées lors des intoxications médicamenteuses volontaires. Le risque léthal reste faible lorsque les **BZD** sont prises seules.

Le traitement du surdosage est symptomatique : charbon activé, surveillance clinique. Le **flumazénil (ANEXATE)** est utilisé dans les formes graves ou comme test diagnostique. Le lavage gastrique n'est pas recommandé en cas d'intoxication pure aux **BZD**.

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (2)

### Agoraphobie sans antécédent de trouble panique

- Présence d'agoraphobie liée à la peur de développer des symptômes de type panique.
- N'a jamais répondu aux critères de trouble panique.
- Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.
- Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

### Bilan préthérapeutique

Le trouble panique est fréquemment associé à d'autres pathologies somatiques ou psychiatriques qui peuvent en modifier le pronostic et la thérapeutique. La question du diagnostic différentiel se pose principalement pour les affections somatiques (maladies cardiovasculaires – trouble du rythme, angor, infarctus du myocarde ; endocriniennes – hypoglycémies, phéochromocytome ; neurologiques – épilepsie temporale, accident vasculaire transitoire ; pulmonaires – embolie pulmonaire, asthme, etc.) qui peuvent mimer des épisodes anxieux paroxystiques. On recherchera ainsi l'association à un trouble anxieux généralisé, des phobies sociales, des troubles obsessionnels compulsifs, un trouble de la personnalité. De nombreuses substances peuvent également déclencher lors des prises ou du sevrage des attaques de panique chez des sujets prédisposés ou paniqueurs connus. C'est le cas par exemple de la caféine, du cannabis, de l'alcool, etc.

### Évolution

Très variable, l'évolution du trouble panique serait favorable dans la majorité des cas.

Un tiers des patients présenterait cependant une évolution péjorative avec un retentissement social et familial non négligeable.

Les complications possibles du trouble sont les suivantes : la constitution d'agoraphobies, l'apparition de conduites addictives (abus et dépendance à l'alcool, dépendance aux **benzodiazépines**), des dépressions majeures secondaires, une mortalité cardiovasculaire accrue, le suicide.

### Traitements

#### Moyens pharmacologiques et psychothérapeutiques

Le traitement de l'attaque de panique est une indication privilégiée des **benzodiazépines**. Les **antidépresseurs** constituent le traitement de fond. La stratégie thérapeutique à moyen et long terme consiste à prévenir la récurrence des attaques de panique.

On pourra associer aux mesures thérapeutiques habituelles des conseils hygiéno-diététiques : arrêt de l'alcool, du tabac, du café, des toxiques.

#### Traitements pharmacologiques

De nombreuses **benzodiazépines** ont démontré leur capacité à prévenir la récurrence des attaques de panique. Cette indication n'est cependant pas approuvée officiellement (AMM : traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes). Les **antidépresseurs** constituent à l'heure actuelle la chimiothérapie de 1<sup>re</sup> intention dans le trouble panique.

## ANXIOLYTIQUES NON BENZODIAZÉPINES (1)

## ■ Buspirone

<b>BUSPIRONE MYLAN</b>					
Anxiété réactionnelle, trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse : 10 à 40 mg/j Anxiété généralisée : 10 à 60 mg/j en 2 à 3 prises Traitement d'appoint de l'anxiété au cours des névroses : 10 à 40 mg/j	20 cp. séc. 10 mg	6,36	I	65 %	0,32

## ■ Hydroxyzine

<b>ATARAX</b>					
Anxiété : 50 à 300 mg/j en 2 à 3 prises Traitement symptomatique des manifestations allergiques diverses : 50 à 100 mg/j	30 cp. séc. 25 mg 40 càc 10 mg (sirop 200 mL)	2,93 2,70	I I	65 % 65 %	0,10 0,07

## ■ Étifoxine

<b>STRÉSAM</b>					
Manifestations psychosomatiques de l'anxiété : 3 à 4 gél./j	60 gél. 50 mg	5,83	I	15 %	0,10

## ■ Prégabaline

<b>LYRICA</b>					
Troubles anxieux généralisés de l'adulte : Semaine 1 (S1) : 150 mg/j en 2 à 3 prises S2 : 300 mg/j si bonne tolérance en 2 à 3 prises Posologie d'entretien : 150 à 600 mg/j en 2 à 3 prises Posologies à adapter chez l'insuffisant rénal Contre-indiqué chez les patients de moins de 18 ans	56 gél. 25 mg 84 gél. 25 mg 100 gél. 25 mg 84 gél. 50 mg 100 gél. 50 mg 56 gél. 75 mg 100 gél. 75 mg 84 gél. 100 mg 100 gél. 100 mg 56 gél. 150 mg 100 gél. 150 mg 84 gél. 200 mg 100 gél. 200 mg 56 gél. 300 mg 100 gél. 300 mg	15,32 22,71 HOP 36,77 HOP 36,53 HOP 52,64 HOP 52,40 HOP 76,44 HOP 76,44 HOP	I I I I I I I I I I I I I I I I	NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR	0,27 0,27  0,44  0,65  0,63  0,94  0,91  1,37

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (3)

### ► Antidépresseurs

Les **antidépresseurs** efficaces dans le trouble panique réduisent la fréquence de survenue des crises et les conduites d'évitement. Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont les **antidépresseurs imipraminiques tricycliques** : **clomipramine (ANAFRANIL)** et les **inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine (ISRS)** : **citalopram (SEROPRAM)**, **escitalopram (SEROPLEX)** et **paroxétine (DEROXAT)** [1].

Les posologies d'**antidépresseurs** recommandées sont généralement identiques à celles qui le sont dans le traitement de la dépression. Toutefois, l'instauration des posologies sera plus progressive (débuter à 50 voire 25 % de la dose efficace), de façon à éviter une aggravation de la symptomatologie anxieuse en début de traitement.

On peut recommander en première intention l'utilisation d'un **ISRS**, en raison d'une meilleure tolérance :

- **citalopram (SEROPRAM)** 20 mg), ou **paroxétine (DEROXAT)** : 1/2 cp./j la 1<sup>re</sup> sem. puis 1 cp./j ; augmenter si nécessaire de 1/2 cp./j par paliers d'une sem. jusqu'à 3 cp./j ;

- **escitalopram (SEROPLEX)** 5, 10, 15, 20 mg) : 1 cp./j de 5 mg la 1<sup>re</sup> sem. puis augmentation progressive de la posologie jusqu'à 20 mg/j si besoin.

L'augmentation des posologies peut être plus lente en fonction de la tolérance clinique.

En seconde intention : **antidépresseur tricyclique** : **clomipramine (ANAFRANIL)** 10, 25, 75 mg) – AMM : prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie. Dose initiale 10 mg en une prise pour atteindre 75 mg en 10 j.

La réponse clinique complète est attendue après 6 à 8 sem. de traitement, comme dans les épisodes dépressifs. Le traitement

est poursuivi plusieurs sem. après la disparition des attaques de panique. Il est d'au moins 6 mois, parfois compris entre 12 et 18 mois, et sera diminué très progressivement. En cas de rechute on réintroduira le traitement, parfois poursuivi pendant plusieurs années à la dose minimale efficace.

### ► Benzodiazépines

Certaines **benzodiazépines** (AMM : traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes) ont démontré leur efficacité dans la prévention des attaques de panique. C'est le cas de l'**alprazolam (XANAX)**, du **lorazépam (TÉMESTA)**, du **diazépam (VALIUM)**, de l'**oxazépam (SÉRESTA)**.

L'effet antipanique des **benzodiazépines** est observé plus rapidement qu'avec les **antidépresseurs**. Le recours à des posologies parfois élevées est nécessaire (**XANAX** : 3 à 10 mg).

Exemple de schéma thérapeutique : **alprazolam (XANAX)** 0,5 mg) : 1 cp. x 3/j pendant 1 sem. puis 2 cp. x 3/j.

Les **benzodiazépines** peuvent être utilisées au début du traitement, à dose efficace en association avec les **antidépresseurs**. Elles seront interrompues après 2 à 3 sem. et l'**antidépresseur** sera alors poursuivi en monothérapie. Le risque de dépendance, les recommandations d'usage justifient en effet un emploi limité dans le temps des **benzodiazépines**.

Les **benzodiazépines** constituent également un traitement d'appoint dans l'anxiété anticipatoire et/ou l'anxiété chronique associée au trouble panique.

### ► β-bloquants (*propranolol*)

(AMM dans les manifestations fonctionnelles cardiaques à type de tachycardie et de palpitations au cours de situations émotionnelles transitoires)

Ils peuvent être également associés aux **antidépresseurs** pour traiter les symptômes somatiques du trouble panique.

**ANXIOLYTIQUES NON BENZODIAZÉPINES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'**hydroxyzine (ATARAX)** est un antihistaminique  $H_1$  et un anticholinergique.

La **buspirone** est un agoniste partiel 5HT<sub>1A</sub> pré- et post-synaptique et un antagoniste D<sub>2</sub> présynaptique.

L'**étifoxine (STRÉSAM)** agit sur le canal chlore du complexe GABA.

L'ensemble de ces molécules ont surtout des propriétés anxiolytiques et sédatives. Aucun de ces produits n'est anticonvulsivant.

La **prégabaline** est un analogue de l'acide gamma-aminobutyrique.

**INDICATIONS**

Anxiété réactionnelle et trouble anxieux généralisé pour la **buspirone** et la **prégabaline** en particulier.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : **buspirone** déconseillée ; **étifoxine** à éviter par prudence. Si un traitement doit être instauré, et s'il est poursuivi jusqu'à l'accouchement, tenir compte d'un risque possible de sédation néonatale. **Hydroxyzine** : envisageable. Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, tenir compte d'un risque possible, chez le nouveau-né, de sédation et de signes atopiques (tachycardie, etc.).

**Allaitement** : toutes les molécules sont déconseillées.

La **buspirone** est contre-indiquée avec les **IMAO**, et dans l'insuffisance hépatique grave.

L'**hydroxyzine** sera utilisée avec prudence en cas de glaucome à angle étroit et d'adénome prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : éviter l'**hydroxyzine** lors du premier trimestre.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Neuropsychiques** : tous les produits peuvent induire une somnolence diurne en début de traitement (conducteurs de machines).

Céphalées, vertiges, ataxie, troubles de l'accommodation, voire une excitation paradoxale plus rarement.

Syndrome confusionnel chez le sujet âgé avec l'**hydroxyzine**.

**Autres effets indésirables** non spécifiques et transitoires : nausées, douleurs abdominales, diarrhée, etc.

**Pharmacodépendance**

Elle peut être observée avec l'**hydroxyzine**. La **buspirone** n'entraîne pas de dépendance.

**Syndrome de sevrage** possible avec la **prégabaline**



**TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (4)****Traitements psychologiques**

Les méthodes utilisées combinent à des degrés divers les techniques de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : information sur le trouble, analyse fonctionnelle, entraînement à l'hyperventilation provoquée et du contrôle respiratoire, relaxation progressive ; restructuration cognitive des pensées automatiques et des scénarii de catastrophe, pensées alternatives réalistes, exposition aux manifestations physiques d'une attaque de panique, exposition en imagination. Elles permettraient de réduire, sinon d'abolir, les attaques de panique. La durée optimale des TCC est de 12 à 25 séances de 45 min environ. Des programmes de TCC plus courts peuvent être proposés, accompagnés de programme de gestion de l'anxiété par soi-même [2].

**Prise en charge au long cours**

Les traitements pharmacologiques et psychologiques sont complémentaires dans la prise en charge du trouble panique. Les stratégies thérapeutiques sont définies selon la nature du trouble, les souhaits des patients et les habitudes du thérapeute. La prise en charge cognitivo-comportementale et le traitement médicamenteux montrent une efficacité équivalente.

En cas de traitement pharmacologique, les **ISRS** sont le traitement de 1<sup>re</sup> intention, avec en cas de résistance prescription de la **clomipramine** ou potentialisation par la **bupirone** ou en associant une **benzodiazépine**.

En cas d'échec des traitements initiaux après 12 sem. on peut proposer d'associer la TCC aux traitements médicamenteux. Le suivi doit se poursuivre après la fin du traitement en raison du risque de rechute ou de récurrence.

**CONSENSUS**

[1] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006

[2] Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves, *HAS*, 2007

## TROUBLES PHOBiques (NÉVROSE PHOBIQUE) (1)

### Cadre nosologique

Les troubles phobiques représentent un ensemble de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée par certains objets ou certaines situations sans dangerosité actuelle. Typiquement ces situations ou objets sont évités avec appréhension par le sujet phobique. On définit habituellement trois types de phobies :

- les **agoraphobies** avec ou sans trouble panique ;
- les **phobies sociales** ;
- les **phobies simples ou spécifiques**.

### Principes généraux du traitement

Le traitement des phobies repose sur la chimiothérapie et sur les **thérapies cognitives et comportementales**.

Les indications de ces traitements, employés seuls ou en association, varient selon le type de phobies, la sévérité du trouble, l'existence de complications (alcoolisation, dépression, dépendance aux **anxiolytiques**) ou de pathologies associées.

À l'exception des formes très invalidantes ou compliquées, qui justifient une hospitalisation, les traitements seront habituellement **ambulatoires**.

### Résumé du traitement des phobies

DIAGNOSTIC	MÉDICAMENTS	PSYCHOTHÉRAPIES
Agoraphobie avec attaque de panique	<b>ISRS</b> : <b>paroxétine (DEROXAT)</b> <b>citalopram (SEROGRAM)</b> <b>escitalopram (SEROPLEX)</b> ou <b>tricycliques</b> : <b>clomipramine (ANAFRANIL)</b> Au début en association avec <b>BZD</b>	Désensibilisation systématique (en imagerie mentale) Exposition <i>in vivo</i> Inhibition réciproque
Agoraphobie simple	En l'absence de trouble panique associé, les <b>antidépresseurs</b> seraient d'autant plus efficaces que le niveau d'anxiété d'évitement est élevé. L'AMM est formulée: trouble panique avec ou sans agoraphobie. <b>Aucun</b> médicament ne possède d'AMM pour l'agoraphobie isolée.	Désensibilisation systématique (en imagerie mentale) Exposition <i>in vivo</i> Inhibition réciproque
Phobies sociales	<b>ISRS</b> : <b>paroxétine (DEROXAT)</b> <b>escitalopram (SEROPLEX)</b> ou <b>IRSNA</b> : <b>venlafaxine LP (EFFEXOR LP)</b>	Désensibilisation systématique (en imagerie mentale) Exposition <i>in vivo</i> Inhibition réciproque Affirmation de soi
Phobies spécifiques	Pas de traitement médicamenteux spécifique	Désensibilisation systématique (en imagerie mentale) Exposition <i>in vivo</i> Inhibition réciproque

## TROUBLES PHOBiques (NÉVROSE PHOBIQUE) (2)

### Agoraphobie

Le sujet a peur de se trouver dans des situations (foule, grands magasins, avion, être seul à son domicile) où il est difficile de s'échapper. Les conduites d'évitement sont parfois au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes éprouvent peu d'anxiété. Les situations phobogènes peuvent être très nombreuses, très invalidantes et le malade est véritablement cloîtré à son domicile. Les agoraphobies sont généralement les types de phobies les plus graves. Elles peuvent survenir isolément ou associées à des attaques de panique.

#### Traitements médicamenteux

**Aucun** médicament en possède d'AMM pour l'agoraphobie isolée. Les psychotropes proposés pour les agoraphobies s'appuient sur leur efficacité « antipanique », mais les **antidépresseurs** constituent les molécules de référence. Ils ont montré leur efficacité chez les agoraphobes, particulièrement chez les patients qui font des attaques de panique. En l'absence de trouble panique associé, les **antidépresseurs** seraient d'autant plus efficaces que le niveau d'anxiété d'évitement est élevé. Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication (agoraphobie avec attaques de panique) sont les **ISRS** : **paroxétine (DEROXAT)**, **citalopram (SEROGRAM)**, **escitalopram (SEROPLEX)** et les **antidépresseurs imipraminiques** : **domipramine (ANAFRANIL)** [1].

La sensibilité particulière des agoraphobes aux effets indésirables impose une augmentation progressive des doses sur 1 ou 2 sem. Les posologies conseillées varient entre 75 et 225 mg/j d'**ANAFRANIL** ou 20 à 60 mg de **DEROXAT**.

Ex. 1 : **antidépresseur imipraminique, domipramine (ANAFRANIL 75 mg)** : 1 à 3 cp. en 1 prise le soir.

Ex. 2 : **antidépresseur sérotoninergique (ISRS), paroxétine (DEROXAT 20 mg)** : 1 à 3 cp. en 2 prises.

Ex. 3 : **antidépresseur sérotoninergique (ISRS), escitalopram (SEROPLEX 10 mg)** : 1/2 cp./j au cours de la 1<sup>re</sup> sem. de traitement, avant une augmentation à 10 mg/j. En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg/j.

L'efficacité maximale est atteinte après environ 3 mois de traitement. Le traitement devra être poursuivi plusieurs mois. Les **benzodiazépines**, pour certaines d'entre elles, s'avèrent efficaces pour le traitement préventif des attaques de panique, bien que cette indication ne soit pas officiellement reconnue. Les **benzodiazépines** peuvent être utilisées comme traitement d'appoint lors des crises d'angoisse aiguë ou dans le traitement de l'anxiété anticipatoire et/ou généralisée associée au trouble agoraphobique.

Ex. : **benzodiazépine, alprazolam (XANAX 0,5 mg)** : 1 cp. x 3/j.

#### Traitements psychothérapiques

Les traitements psychologiques de l'agoraphobie reposent sur l'exposition *in vivo* aux stimuli anxiogènes. Parfois initiée spontanément par le patient, elle se réalise au mieux dans des programmes comportementaux : désensibilisation systématique *in vivo*, exposition graduée, implosion ou immersion (*flooding*). L'exposition progressive, autogérée avec l'entourage du patient ou des groupes de malades, serait à long terme la technique la plus efficace.

#### Stratégies thérapeutiques au long cours

Deux approches de l'agoraphobie :

- la première qui fait des attaques de panique le « *primum movens* » de l'agoraphobie et qui donc justifie l'emploi en première intention des psychotropes ;
- la seconde qui considère que l'élément spécifique du trouble est l'évitement et qui préconise donc en premier lieu des thérapies cognitives et comportementales.

Certaines agoraphobies, peu étendues et peu extensives, peuvent être traitées simplement par des thérapies comportementales et cognitives. On n'observe pas toujours de rechute à l'interruption du traitement. La plupart des agoraphobies sont cependant chroniques et nécessitent une prise en charge au long cours qui associe pharmacothérapie et psychothérapie. Il est habituel de démarrer le traitement par des **antidépresseurs**, et d'associer ensuite la psychothérapie.

## TROUBLES PHOBQUES (NÉVROSE PHOBIQUE) (3)

### Phobies sociales

Les situations redoutées dans ce type de phobie sont les situations sociales ou de performance dans lesquelles le sujet craint d'être dévisagé ou d'être exposé à l'observation et au jugement d'autrui. Le phobique social craint d'agir de façon embarrassante ou de montrer des symptômes anxieux (tremblement des mains, rougissement, etc.). On reconnaît deux formes de phobies sociales : **localisée** et **généralisée**.

- Les *phobies sociales localisées* impliquent des situations sociales spécifiques : parler en public, manger en présence d'autrui, etc.
- Les *phobies sociales généralisées* (anxiété sociale généralisée) concernent la plupart des situations sociales, et s'accompagnent fréquemment d'une perte de l'estime de soi ou d'une peur d'être critiqué. Elles sont très invalidantes et aboutissent parfois à un isolement social presque total. La distinction entre des phobies sociales envahissantes et une personnalité évitante ou une agoraphobie sévère n'est pas toujours aisée.

### Traitement

Le traitement recommandé en 1<sup>re</sup> intention dans la phobie sociale est soit la psychothérapie cognitivo-comportementale soit les **antidépresseurs**. L'action des **antidépresseurs** est plus rapide que celle des TCC. Parmi les **antidépresseurs**, les **ISRS** et la **venlafaxine** sont les médicaments de première intention du fait de leur facilité d'emploi et de leur faible risque d'effets indésirables [1].

#### ► En 1<sup>re</sup> intention : **antidépresseurs**

Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont les **ISRS** : la **paroxétine** (**DEROXAT**), l'**escitalopram** (**SEROPLEX**) et les **IRSNA** : la **venlafaxine LP** (**EFFEXOR LP**). Ils doivent être réservés aux formes sévères avec retentissement important dans la vie professionnelle ou personnelle [1].

Ex. 1 : **paroxétine** (**DEROXAT** 20 mg) 1 cp./j, à augmenter de 1/2 cp. par paliers de 2 sem. jusqu'à posologie efficace (posologie maximale recommandée : 50 mg/j).

Ex. 2 : **escitalopram** (**SEROPLEX** 10 mg) : 1/2 cp./j au cours de la première semaine de traitement, avant une augmentation à 10 mg/j. En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg/j.

La **fluvoxamine** (**FLOXYFRAL** hors AMM) a été évaluée au cours de 4 études contrôlées versus placebo d'une durée de 12 sem., qui ont mis en évidence l'efficacité de cette molécule pour des posologies comprises entre 100 et 300 mg/j.

La **sertraline** (**ZOLOFT** hors AMM) a fait l'objet de 3 études contre placebo d'une durée maximale de 3 mois qui sont en faveur de son efficacité dans cette indication pour des posologies comprises entre 50 et 200 mg/j. La **sertraline** semble également efficace dans la phase de maintenance du traitement.

#### ► En 2<sup>e</sup> intention

#### **Bêtabloquants**

Le **propranolol** (hors AMM) peut être utilisé ponctuellement pour des situations d'anxiété de performance en particulier pour les prestations en public (effet antitrac).

Ex. : **AVLOCARDYL** 40 mg : 1/4 cp. 1 h avant l'épreuve.

#### **Benzodiazépines**

Elles peuvent être utilisées en association au traitement de fond sur de courtes durées en cas d'anxiété aiguë invalidante.

#### *Autres traitements hors AMM*

**IMAO A réversible** : **moclobémide** (**MOCLAMINE**) ; **IMAO non spécifique, irréversible** : **iproniazide** (**MARSILID**) ; **antiépileptique** : **gabapentine** (**NEURONTIN**), après avis spécialisé.

Ex. : **moclobémide** (**MOCLAMINE** 150 mg) à des doses de l'ordre de 400 à 600 mg/j : 1 à 2 cp. x 3/j.

Le traitement doit être poursuivi 6-12 mois, après rémission. Mais les données concernant la durée de traitement sont limitées. Il existe un risque de rechute à l'arrêt du traitement, dont il faut prévenir le patient et qui peut justifier un traitement à plus long terme. Cependant, ce traitement prolongé n'a pas été évalué systématiquement [1].

**TROUBLES PHOBQUES (NÉVROSE PHOBIQUE) (4)****Traitement psychothérapique**

Il repose également sur les thérapies comportementales et cognitives : techniques de désensibilisation systématique et de **relaxation**, **entraînement à l'affirmation de soi** (assertivité) et exposition *in vivo* progressive.

**Traitement chirurgical**

Le traitement chirurgical des éreutophobies (peur de rougir) par sympatetectomie n'a pas fait la preuve de son efficacité.

**Phobies spécifiques**

Ces phobies sont limitées à un stimulus déterminé : les animaux, l'orage, la vue du

sang. Elles apparaissent parfois dès l'enfance. Le retentissement est minime lorsque le stimulus est aisément évitable.

**Le traitement** est univoque et s'appuie sur la TCC – les techniques de désensibilisation systématique (en imagerie mentale), au nombre de 12 à 25 séances de 45 min environ ; exposition en thérapie virtuelle (assistée par l'ordinateur), exposition *in vivo*.

Aucun traitement médicamenteux n'a apporté la preuve de son efficacité (pas d'AMM).

**CONSENSUS**

[1] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006

## SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (1)

### Troubles du sommeil

L'insomnie, définie comme une plainte portant sur l'insuffisance du temps de sommeil ou sur sa qualité, touche entre le quart et la moitié de la population. On distingue les insomnies aiguës (occasionnelle : quelques j ; transitoire : quelques sem.), souvent réactionnelles à des facteurs de stress, et des insomnies chroniques (quelques mois à quelques années).

### Classification du DSM-IV

- Troubles primaires du sommeil
  - Dyssomnies
  - Insomnie primaire
  - Hypersomnie primaire
  - Narcolepsie
  - Trouble du sommeil lié à la respiration
  - Trouble du sommeil lié au rythme circadien
  - Dyssomnie non spécifiée
- Parasomnies
- Autres troubles du sommeil

### Classification de la CIM-10

- **Troubles du sommeil non organiques**
  - Insomnie non organique
  - Hypersomnie non organique
  - Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique
  - Inversion psychogène du rythme
  - Somnambulisme
  - Terreurs nocturnes
  - Cauchemars
  - Autres troubles du sommeil non organiques
  - Trouble du sommeil non organique, sans précision
- **Troubles du sommeil**
  - Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil [insomnies]
  - Troubles du sommeil par somnolence excessive [hypersomnies]
  - Troubles du cycle veille-sommeil
  - Irrégularité du rythme veille-sommeil
  - Syndrome de retard des phases du sommeil
  - Apnée du sommeil : centrale ou obstructive (exclusion de l'apnée du sommeil chez le nouveau-né et du syndrome de Pickwick)
  - Narcolepsie et cataplexie
  - Autres troubles du sommeil
  - Syndrome de Kleine-Levin
  - Trouble du sommeil, sans précision

### Classification internationale

(ICSD [*International Classification of Sleep Disorders*] 2<sup>e</sup> édition, 2005)

- **Insomnie**
  - Insomnie aiguë
  - Insomnie psychophysiologique
  - Mauvaise perception du sommeil
  - Insomnie idiopathique
  - Insomnie en relation avec un trouble mental
  - Mauvaise hygiène de sommeil
  - Insomnie comportementale de l'enfant
  - Insomnie due à une drogue ou à une substance
  - Insomnie en relation avec un trouble médical
  - Insomnie non spécifiée
- **Troubles du sommeil en relation avec la respiration**
  - Syndrome d'apnée centrale du sommeil
  - Syndrome d'apnée obstructive du sommeil
  - Syndrome d'hypoventilation/ hypoxie du sommeil
  - Autres troubles respiratoires en relation avec la respiration
- **Troubles du rythme circadien du sommeil**
  - Parasomnie
  - Mouvements en relation avec le sommeil
  - Symptômes isolés, apparemment normaux ou non expliqués
  - Autres troubles du sommeil
- **Troubles du sommeil associés des pathologies classées ailleurs :**
  - insomnie fatale familiale ;
  - fibromyalgie ;
  - épilepsie du sommeil ;
  - céphalées du sommeil ;
  - reflux gastro-œsophagien du sommeil ;
  - ischémie coronarienne du sommeil ;
  - transpiration, laryngospasme, choc en relation avec le sommeil.
- **Autres troubles comportementaux et psychiques fréquemment rencontrés dans le diagnostic différentiel des troubles du sommeil :**
  - troubles de l'humeur ;
  - troubles anxieux ;
  - troubles somatiques ;
  - schizophrénie et autres psychoses ;
  - troubles de la personnalité diagnostiquée d'abord dans l'enfance ou l'adolescence.

## HYPNOTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES

## ■ Estazolam

<b>NUCTALON</b>					
Insomnie occasionnelle et transitoire : 1/2 à 1 cp. le soir	20 cp. séc. 2 mg	2,57	I	30 %	0,13
Insomnie chronique (à déconseiller) : 1/2 à 1 cp. le soir					

## ■ Témozépam

<b>NORMISON</b>					
Insomnie occasionnelle et transitoire : 10 à 20 mg le soir	14 cp. 10 mg	2,30	I	65 %	0,16
Insomnie chronique (à déconseiller) : 10 à 20 mg	7 cp. 20 mg	2,11	I	65 %	0,30

## ■ Nitrazépam

<b>MOGADON</b>					
Insomnie : 2,5 à 5 mg le soir	20 cp. séc. 5 mg	1,77	I	30 %	0,09
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		

## ■ Lormétazépam

<b>NOCTAMIDE</b>					
Insomnie : 0,5 à 2 mg le soir	14 cp. séc. 1 mg	1,88	I	65 %	0,13
	14 cp. séc. 2 mg	2,44	I	65 %	0,17

## ■ Loprazolam

<b>HAVLANE</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. le soir	20 cp. séc. 1 mg	3,27	I	65 %	0,16
Insomnie chronique (à déconseiller) : 1 cp. le soir					

## SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (2)

### Insomnies

#### Insomnie aiguë (occasionnelle et transitoire)

C'est une insomnie due à une cause aiguë, transitoire et réversible :

- facteurs environnementaux (niveau sonore, climat, altitude, etc.) ;
- stress psychique ;
- stress physique (affection physique aiguë) ;
- prise aiguë de toxiques.

En cas d'insomnie d'ajustement :

- dédramatiser la situation, assurer un soutien psychologique ;
- si nécessaire, prescrire un traitement pharmacologique par sédatif, **anxiolytique** ou **hypnotique**, qui doit être le plus léger et le plus bref possible.

Le traitement repose sur la prescription d'**hypnotiques** « benzodiazépiniques ou apparentés » (**cyclopyrrolones**, **imidazopyridines**) durant une période limitée à quelques sem., au maximum, afin d'éviter les phénomènes de dépendance et de tolérance.

#### Insomnie chronique

##### ► Insomnies secondaires

- Insomnie liée à une pathologie organique, notamment neurologique (douleur neurogène, Parkinson, démences, syndrome des jambes sans repos, confusion, hypertension intracrânienne, etc.), ou psychiatrique (dépression, trouble bipolaire, trouble anxieux, trouble de l'adaptation,

état de stress post-traumatique, troubles psychotiques, etc.).

- Insomnie due à la prise de certains médicaments (**psychostimulants**, **antidépresseurs**, **AINS**, etc.).

• Insomnie due au sevrage trop brutal d'un **hypnotique** à demi-vie courte (syndrome de rebond) qui nécessite sa réintroduction puis sa diminution très progressive.

- insomnie due à une prise chronique des toxiques ou de l'alcool.

##### ► Insomnie dite psychophysiologique (insomnie persistante primaire)

C'est l'insomnie « maladie », appelée aussi insomnie psychophysiologique, elle est la forme la plus fréquente de l'insomnie.

L'insomnie est souvent apparue à un moment précis dans l'histoire du patient à l'occasion d'une circonstance pénible, mais le retour au sommeil normal ne se produit pas, même lorsque la cause initiale a disparu. Symptômes :

- difficultés d'endormissement, le sommeil devient une appréhension ;
- trouble du maintien du sommeil ;
- sommeil perçu comme non réparateur ;
- malgré l'impression de fatigue, il n'y a pas de somnolence diurne (la présence d'une somnolence est un argument contre le diagnostic d'insomnie persistante primaire) ;
- échec des tentatives de sieste en raison de la même difficulté d'endormissement ;
- discordance entre l'importance subjective du retentissement diurne et la discrétion du retentissement objectif.



## HYPNOTIQUES (2) – ANTIHISTAMINIQUES

## ■ Doxylamine

<b>DONORMYL</b>					
Insomnie : 1/2 à 2 cp. le soir	10 cp. séc. 15 mg 10 cp. efferv. 15 mg		I I	NR NR	
<b>NOCTYL</b>					
Idem <b>DONORMYL</b>	10 cp. séc. 15 mg		I	NR	
<b>LIDENE</b>					
Idem <b>DONORMYL</b>	10 cp. séc. 15 mg		I	NR	

## ■ Prométhazine

<b>PHÉNERGAN</b>					
Insomnie : 1 à 2 cp. le soir	20 cp. 25 mg	1,53	I	15 %	0,08

## HYPNOTIQUES (3) – IMIDAZOPYRIDINE

## ■ Zolpidem

<b>STILNOX</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. le soir (1/2 à 1 cp. chez le sujet de plus de 65 ans) Insomnie chronique (prescription décon- seillée) : 1/2 à 1 cp. le soir	7 cp. séc. 10 mg 14 cp. séc. 10 mg	2,30 3,23	I I	65 % 65 %	0,33 0,23

## HYPNOTIQUES (4) – CYCLOPYRROLONE

## ■ Zopiclone

<b>IMOVANE</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. à 7,5 mg le soir 1 cp. à 3,75 mg ou 1/2 cp. à 7,5 mg le soir chez les patients > 65 ans ou présentant une insuffisance rénale, hépatique ou respiratoire Insomnie chronique (prescription décon- seillée) : 1/2 à 1 cp. le soir	5 cp. 3,75 mg 14 cp. 3,75 mg 30 cp. 3,75 mg 5 cp. séc. 7,5 mg 14 cp. séc. 7,5 mg 20 cp. séc. 7,5 mg	1,80 3,04 HOP 1,88 3,19 HOP	I I I I I I	65 % 65 %  65 % 65 %	0,36 0,22  0,38 0,23

## SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (3)

### Traitement

Dans tous les cas d'insomnie, avant toute autre initiative, il convient de s'assurer que quelques règles élémentaires d'hygiène du sommeil sont réunies.

- Dormir selon les besoins, mais pas plus.
- Éviter les siestes longues (> 1 h) ou trop tardives (après 16 h).
- Adopter un horaire régulier de lever et de coucher.
- Pour les personnes âgées, retarder le coucher.
- Limiter le bruit, la lumière et une température excessive dans la chambre à coucher.
- Éviter la caféine, l'alcool et la nicotine.
- Pratiquer un exercice physique dans la journée, mais en général pas après 17 h.
- Éviter les repas trop copieux le soir.

Le traitement repose sur un abord corporel (relaxation) et des techniques comportementales (désensibilisation systématique, réduction du temps de sommeil) visant à lutter contre des comportements défavorables à l'endormissement, acquis lors de situations de stress (conditionnement négatif) [1].

L'utilisation des **hypnotiques** doit être prudente, le recours à des traitements substitutifs temporaires (**antidépresseurs** sédatifs, **anxiolytiques**) limité. Le traitement de ces insomnies chroniques est souvent long et délicat, requérant une participation active du sujet et un soutien psychologique important.

**Proposer, si nécessaire, un traitement symptomatique le plus prudent possible :**

- soit un sédatif léger (phytothérapie), bien qu'aucune étude n'apporte d'éléments permettant de les situer clairement en termes d'efficacité. Il n'a pas été prouvé pour la valériane d'efficacité supérieure à celle d'un placebo. En l'absence d'essais randomisés, l'innocuité de la mélisse, de l'oranger, du tilleul et de la verveine odorante ne peut être ni affirmée, ni infirmée [1] ;
- soit un **hypnotique non benzodiazépine**. Parmi les **antihistaminiques** H1 bénéficiant de l'AMM « insomnie transitoire, insomnie occasionnelle », sous réserve des contre-indications et précautions (effets anticholinergiques ou adrénolytiques), peuvent être utilisés chez l'adulte, mais sont à déconseiller chez le sujet âgé (effets atropiniques non négligeables) :

doxylamine (**DONORMYL** 15 mg) ; alimémarine (**THÉRALÈNE**) et prométhazine (**PHÉNERGAN**), à réévaluer si l'insomnie dure plus de 5 j.

Ex. 1 : **DONORMYL** 15 mg : 1/2 cp au coucher ; 7,5 à 15 mg/j (soit 1/2 à 1 cp./j). La posologie peut être portée à 30 mg/j (soit 2 cp./j) si nécessaire.

Ex. 2 : **THÉRALÈNE** (sol. buv. en gtttes à 4 % : fl. de 30 mL avec pipette doseuse) : 5 à 20 gtttes au coucher.

La **mélatonine** (**CIRCADIN** 2 mg cp. LP) est indiquée, en monothérapie, pour le traitement à court terme de l'insomnie primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de 55 ans ou plus. L'activité de la **mélatonine** sur les récepteurs MT1, MT2 et MT3 est réputée contribuer à ses propriétés de facilitation du sommeil, puisque ces récepteurs (principalement MT1 et MT2) sont impliqués dans la régulation des rythmes circadiens et du sommeil. En raison du rôle de la **mélatonine** sur le sommeil et la régulation des rythmes circadiens, ainsi que de la réduction de la production de **mélatonine** endogène associée à l'âge, la **mélatonine** peut efficacement améliorer la qualité du sommeil, en particulier chez les patients de plus de 55 ans qui souffrent d'insomnie primaire.

Dans les essais cliniques dans lesquels des patients présentant une insomnie primaire ont reçu 2 mg de **CIRCADIN** tous les soirs pendant 3 sem., l'architecture du sommeil n'a pas été modifiée, ni la durée du sommeil paradoxal ou phase de mouvements oculaires (PMO). **CIRCADIN** 2 mg n'a induit aucune modification du fonctionnement diurne. Dans une étude chez des patients ambulatoires, **CIRCADIN** améliore la qualité du sommeil et de la vigilance matinale chez 47 % des patients traités *versus* 27 % dans le groupe placebo. En outre, la qualité du sommeil et la vigilance matinale se sont améliorées de façon significative avec **CIRCADIN** comparé au placebo. Les variables du sommeil sont progressivement revenues aux valeurs initiales sans effet rebond, sans augmentation des effets indésirables ni des symptômes de sevrage.

## HYPNOTIQUES (5) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

Les **hypnotiques** ont des propriétés proches des **anxiolytiques**. Les **benzodiazépiniques**, les **cyclopyrrolones**, les **imidazopyridines** agissent sur les récepteurs GABAergiques. Les autres molécules sont **antihistaminiques** ou assimilées aux **antipsychotiques**.

## INDICATIONS

Les **hypnotiques** sont indiqués en cas d'insomnie aiguë (occasionnelle et transitoire). Les insomnies chroniques ne représentent pas une indication de ces produits en raison du risque de dépendance. Le risque de dépendance des **BZD** impose des règles de prescription et une limitation d'emploi. Le renouvellement de la délivrance d'un **hypnotique** et/ou **anxiolytique** n'est possible qu'à l'intérieur de la durée de prescription limitée à 2, 4 ou 12 sem. selon le cas et seulement si le prescripteur a précisé le nombre de renouvellements ou la durée de traitement. Il ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (arrêté du 7 octobre 1991). Lorsqu'un médicament contient un ou plusieurs **hypnotiques** et **anxiolytiques** et qu'il comporte l'indication « insomnie » sur son AMM, il est soumis à la réglementation la plus stricte (art. R.5132-21 du CSP). Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à 4 sem : **clorazépate dipotassique**, **estazolam**, **loprazolam**, **lormétazépam**, **nitrazépam**, **témazépam**, **zopiclone**, **zolpidem**.

## CONTRE-INDICATIONS

Elles sont identiques à celles des **BZD** : myasthénie, insuffisance respiratoire et/ou hépatique sévère, hypersensibilité.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cf. Précautions d'emploi des benzodiazépines.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Sur le sommeil

Les **BZD** entraînent une modification de l'architecture du sommeil avec une diminution du sommeil paradoxal et du sommeil lent profond.

Le **zopiclone** et le **zolpidem** semblent mieux préserver cette architecture du sommeil.

À l'arrêt du traitement on peut observer :

- un rebond de sommeil paradoxal avec des rêves désagréables pour les **BZD** ;
- un rebond d'insomnie avec les produits à demi-vie courte ou pour des posologies élevées ;
- une anxiété de sevrage avec les **benzodiazépines**.

## Sur l'état de veille

Les produits à demi-vie longue peuvent entraîner une somnolence diurne, des réveils peu agréables (sensation de « gueule de bois »), des troubles mnésiques (syndrome amnésie-auto-matisme avec le **zolpidem** : **STILNOX**).

Syndromes extrapyramidaux avec les apparentés aux **antipsychotiques**.

## Pharmacodépendance

Les **hypnotiques** avec une biodisponibilité rapide et une demi-vie courte peuvent induire des phénomènes de dépendance.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter l'utilisation d'alcool ou d'autres sédatifs.

**SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (4)**

Ex. : **CIRCADIN** 2 mg cp. LP 1 à 2 h avant le coucher et après le repas. Cette posologie peut être poursuivie pendant une période allant jusqu'à 13 sem.

- soit un **hypnotique benzodiazépine** ou **apparenté aux benzodiazépines**, adapté au profil d'insomnie du patient, pendant quelques jours, à la plus faible dose possible, choisi parmi ceux qui sont estimés induire le moins possible de retentissement sur la vigilance diurne.

Ex. : **zolpidem (STILNOX)** 1 mg : 1/2 à 1 cp. au coucher.

Le traitement doit être aussi bref que possible, de quelques jours à 4 sem., y compris la période de réduction de la posologie. La durée du traitement doit être présentée au patient :

- 2 à 5 j. en cas d'insomnie occasionnelle (comme par exemple lors d'un voyage) ;
- 2 à 3 sem. en cas d'insomnie transitoire (comme lors de la survenue d'un événement grave).

Les traitements très brefs ne nécessitent pas d'arrêt progressif. Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes préconisées. Cela impose des évaluations précises et répétées de l'état du patient.

Ex. **zopiclone (IMOVANE)** 7,5 mg : 1/2 à 1 cp. au coucher.

La prise doit avoir lieu le soir au coucher, au lit. Le dosage à 3,75 mg est plus particulièrement adapté au sujet âgé de plus de 65 ans et aux populations à risque.

Quel que soit l'**hypnotique** choisi, la plus faible dose efficace, individuelle, doit être recherchée et prescrite pour une période limitée, de quelques jours à 4 sem. maxi-

mum incluant la période de diminution de la dose.

Si la composante anxieuse est prépondérante, la prescription d'un anxiolytique selon les mêmes principes peut s'avérer suffisante pour permettre le rétablissement du sommeil.

**Hypersomnies**

L'hypersomnie correspond à une plainte portant sur un temps de sommeil trop long et/ou de mauvaise qualité. Elle touche environ 5 % de la population.

**Hypersomnies « simples »**

- Hypersomnie liée à une insuffisance de sommeil ou consécutive à la prise d'alcool ou de certains médicaments (**psychotropes, antalgiques**, etc.) dont le traitement principal est constitué par le sevrage.

- Trouble du rythme circadien (« jet lag » par franchissement rapide des fuseaux horaires, retard ou avance de phase de sommeil) pour lequel un traitement par chrono- et/ou phytothérapie sera proposé afin de rétablir le cycle veille-sommeil.

**Hypersomnies pathologiques**

Le recours à des explorations complémentaires (enregistrement polysomnographique, actimétrie, etc.), orienté en fonction du tableau clinique, permettra de rapporter l'hypersomnie à certaines pathologies :

- syndrome d'apnées du sommeil ;
- syndrome de résistance des voies aériennes supérieures nécessitant un traitement spécifique ;
- narcolepsie.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine générale, *SGTG et HAS*, 2006

## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (1)

### Définition

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC ; ex. névrose obsessionnelle) sont définis par la présence d'obsessions et/ou de compulsions qui interfèrent de manière significative avec le fonctionnement professionnel, scolaire et sont à l'origine de sentiments importants de détresse et d'une perte de temps. La prévalence sur la vie entière des TOC, longtemps considérée comme faible, est actuellement estimée à 3 % de la population générale.

### Classification

#### Catégories

##### ► Obsessions

Les obsessions sont des pensées, impulsions ou représentations récurrentes et persistantes qui, à certains moments de l'affection, sont ressenties comme intrusives et inappropriées, entraînent une anxiété ou une détresse importante. Les obsessions font irruption dans les pensées du malade et, malgré ses efforts, s'imposent à lui de façon répétitive et stéréotypée. Elles ne sont pas simplement des préoccupations excessives concernant les problèmes de sa vie réelle. Le sujet fait des efforts pour les ignorer ou les réprimer ou pour les neutraliser par d'autres pensées ou actions. Il reconnaît qu'elles proviennent de sa propre activité mentale.

- **Caractéristiques des obsessions** : leur caractère intrusif, l'égodystonie, l'attribution interne (qui les distingue des pensées imposées délirantes) et la difficulté de contrôle. La critique (prise de conscience des aspects ridicules ou absurdes), la lutte et la résistance aux obsessions sont variables selon les patients et au cours de l'évolution pour un même patient.

- **Thèmes obsessionnels les plus fréquents** : religieux, métaphysique, mort, propreté, saleté, souillure, contamination, symétrie, exactitude, ordre, perfectionnisme.

- **Obsessions les plus fréquentes** : idéatives (le patient est envahi par des idées), phobiques (le patient est envahi par la pensée d'un objet ou d'une situation qu'il craint), impulsives - phobies d'impulsion (le patient est envahi par la peur d'accomplir un acte absurde).

##### ► Compulsions

Les compulsions sont des comportements stéréotypés, répétitifs ou actes mentaux que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible. Ces comportements ou actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse, à empêcher un événement ou une situation redoutée, ou sont produits en réponse à une obsession, mais ils n'ont pas de relation réaliste avec ce qu'ils sont censés neutraliser ou empêcher ou ils sont manifestement excessifs.

Les compulsions présentent les mêmes caractéristiques que les obsessions : sentiment de contrainte, conscience variable du caractère absurde, égodystonie, résistance fluctuante.

- **Compulsions les plus fréquentes** : mentales, lavage, vérifications élémentaires.

#### Regroupements syndromiques

Ils peuvent aider au choix des stratégies thérapeutiques.

Dominance syndromique : à dominance compulsive, obsessionnelle ou mixte.

On distingue également :

- les laveurs associant des rituels de lavage avec des obsessions phobiques de contamination/souillure ;
- les vérificateurs avec des rituels de vérification et des obsessions de doute et d'indécision ;
- les obsessionnels préoccupés par le rangement et la symétrie ;
- les obsessionnels compteurs ;
- les obsessionnels impulsifs avec des obsessions impulsives et une lutte anxieuse permanente.

## INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE (ANTIDÉPRESSEURS) (1)

### ■ Paroxétine

<b>DEROXAT</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 1 à 2 1/2 cp./j	14 cp. séc. 20 mg	5,69	I	65 %	0,41
Anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois :	50 cp. 20 mg	HOP	I		
1 à 2 1/2 cp./j	30 càc 20 mg	13,27	I	65 %	0,44
Phobie sociale : 1 à 2 1/2 cp./j					
TOC : 2 à 3 cp./j					
Prévention des attaques de panique : 2 à 3 cp./j (posologie initiale : 1/2 cp./j)					
Adaptation individuelle et progressive des doses quelle que soit l'indication					
<b>DIVARIUS</b>					
Idem <b>DEROXAT</b>	14 cp. 20 mg	7,97	I	65 %	0,57
	28 cp. 20 mg	15,89	I	65 %	0,57

### ■ Fluoxétine

<b>PROZAC</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 20 à 60 mg/j	14 gél. 20 mg	5,74	I	65 %	0,41
Troubles obsessionnels compulsifs :	70 gél. 20 mg	HOP	I		
Adaptation progressive et individuelle des doses : 20 à 60 mg/j	14 mesurette 20 mg	6,04	I	65 %	0,43
	28 cp. 20 mg	10,25	I	65 %	0,37
	70 cp. 20 mg	HOP	I		

### ■ Citalopram

<b>SEROPRAM</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 1 à 3 cp./j ou 0,4 à 1,2 mL/j	28 cp. séc. 20 mg	15,06	I	65 %	0,54
Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.	1 fl. sol. buv. 40 mg/mL	25,96	I	65 %	25,96
Adaptation progressive et individuelle des doses : 1 à 1 1/2 cp./j ou 0,4 à 0,6 mL/j	15 mL (gtte = 2 mg)				
<b>SEROPRAM</b> injectable	10 amp. 20 mg/0,5 mL	HOP	I		
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 20 à 60 mg/j en 1 perf. lente dans un soluté isotonique (débit max. 20 mg/h)	10 amp. 40 mg/0,5 mL	HOP	I		

### ■ Escitalopram

<b>SEROPLEX</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 10 à 20 mg/j	14 cp. séc. 5 mg	7,46	I	65 %	0,53
Trouble panique avec ou sans agoraphobie : 5 mg/j pendant 1 sem. puis 10 mg/j	28 cp. séc. 5 mg	14,37	I	65 %	0,51
Trouble anxiété sociale : 5 à 20 mg/j	98 cp. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 10 mg	20,73	I	65 %	0,74
	98 cp. 10 mg	HOP	I		
	28 cp. 15 mg	23,32	I	65 %	0,83
	98 cp. 15 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 20 mg	29,01	I	65 %	1,04
	98 cp. 20 mg	HOP	I		
	300 gttcs 20 mg/mL (fl. 15 mL)	20,85	I	65 %	0,07

## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (2)

### Bilan préthérapeutique

Les TOC sont souvent associés à d'autres troubles psychiatriques ou somatiques qu'il convient de dépister car ces comorbidités peuvent influencer l'évolution du trouble ainsi que sa réactivité au traitement.

### Comorbidités psychiatriques

Troubles de la personnalité (évitante, dépendante, obsessionnelle, schizotypique), troubles anxieux (agoraphobie, phobie sociale, trouble panique), addictions (abus-dépendance alcoolique ou d'une substance), troubles de l'humeur (dépression majeure, dysthymie, trouble bipolaire), schizophrénie.

### Troubles organiques associés

Ils peuvent parfois intervenir dans le déclenchement de TOC ou s'accompagner de manifestations obsessionnelles-compulsives : les affections intéressant les ganglions de la base sont le plus souvent incriminées (tics chroniques ou un syndrome de Gilles de la Tourette, syndrome PANDAS post-streptococcique de l'enfant, encéphalite épidémique, chorée de Sydenham, séquelles d'intoxication oxycarbonée, nécrose bilatérale des noyaux lenticulaires), épilepsies temporales, séquelles de traumatismes crâniens, maladie de Basedow, sevrage aux **BZD** ou abus de psychostimulants.

### Traitement

Comme la plupart des troubles anxieux, et à l'exception des formes sévères ou compliquées, le traitement des TOC est ambulatoire.

Les stratégies thérapeutiques actuelles des TOC sont regroupées en stratégies **pharmacologiques** et **non pharmacologiques**. Elles ont contribué à modifier considérablement le pronostic de ces troubles réputés incurables.

Évoluant sur un mode chronique, les TOC nécessitent souvent une combinaison des différentes possibilités thérapeutiques et une prise en charge au long cours avec une équipe multidisciplinaire.

En raison du retentissement parfois majeur des TOC sur le fonctionnement psychosocial, le *maintien d'une activité professionnelle* est considéré comme une des priorités dans le traitement des TOC sévères.

### Stratégies pharmacologiques

De multiples essais cliniques, ouverts et contrôlés contre placebo, ont confirmé les propriétés anti-obsessionnelles de certains **antidépresseurs**.

Les **antidépresseurs** sont plus efficaces sur les pensées obsédantes que sur les compulsions. Les **ISRS** sont recommandés en 1<sup>re</sup> intention.

La **clomipramine (ANAFRANIL)** est recommandée en seconde intention, pour des raisons de tolérance, uniquement après 2 à 3 essais d'**IRSS** sans succès. Cependant, le praticien, dans son choix de molécule de 1<sup>re</sup> intention, devra prendre en compte la possibilité d'efficacité supérieure pour la **clomipramine** dans certaines situations, la probabilité d'effets secondaires moindres pour les **IRSS**, et l'existence éventuelle de comorbidité associée.

Le délai d'action des **antidépresseurs** est plus long (de l'ordre de 4 à 8 sem.) que dans les troubles dépressifs. De même, le temps de traitement nécessaire à l'obtention de la réponse thérapeutique maximale est plus long (10 à 12 sem.). Ainsi, le traitement doit être poursuivi au moins 3 mois avant de pouvoir conclure à une inefficacité. La durée du traitement doit être suffisamment prolongée, souvent supérieure à un an. Elle sera d'autant plus longue que le trouble est chronique et qu'il existe des rechutes à l'arrêt du traitement. La comorbidité avec un épisode dépressif majeur et l'existence d'un trouble de la personnalité sont des facteurs de risque de non-réponse au traitement antidépresseur dans le TOC.

Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont : la **fluvoxamine (FLOXYFRAN)**, la **clomipramine (ANAFRANIL)**, la **fluoxétine (PROZAC)**, la **paroxétine (DEROXAT)**, la **sertraline (ZOLOFT)** et l'**escitalopram (SEROPLEX)**.

## INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE (ANTIDÉPRESSEURS) (2)

### ■ Sertraline

<b>ZOLOFT</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) et TOC : adaptation individuelle et progressive des doses de 50 à 200 mg/j	7 gél. 25 mg	3,55	I	65 %	0,51
	30 gél. 25 mg	HOP	I		
	28 gél. 50 mg	12,29	I	65 %	0,44
	30 gél. 50 mg	HOP	I		

### ■ Fluvoxamine

<b>FLOXYFRAL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 100 à 300 mg/j TOC : posologie progressive, pouvant aller jusqu'à 300 mg/j	30 cp. séc. 50 mg	10,21	I	65 %	0,34
	15 cp. séc. 100 mg	9,23	I	65 %	0,62



## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (3)

### ► Mise en route du traitement

Les TOC justifient souvent, mais pas systématiquement, des posologies élevées d'**antidépresseurs**, la plupart du temps bien tolérées par ces malades. On utilise par exemple des doses de l'ordre de 150 mg à 250 mg d'**ANAFRANIL**, de 40 à 60 mg de **PROZAC** ou 40 à 60 mg de **DEROXAT**.

On recherche la posologie efficace en augmentant progressivement les doses avec des paliers de 15 j.

Ex. 1 : **PROZAC** (gél. 20 mg) 1 gél./j. Après 15 j à ce palier, chercher la posologie optimale en augmentant de 10 mg tous les 15 j.

Ex. 2 : **DEROXAT** (cp. 20 mg) : 1 cp. x 2/j en 1 à 2 sem. Après 15 j à ce palier, adapter la posologie en modifiant la dose d'un 1/2 cp. tous les 15 j.

### ► Poursuite et surveillance du traitement

L'effet anti-obsessionnel des **antidépresseurs** est spécifique et indépendant de l'existence d'une dépression au moment de l'initiation du traitement. Cet effet thérapeutique est continu, lent et progressif. Le traitement doit être poursuivi au moins 3 mois avant de pouvoir conclure à une inefficacité. La durée est souvent supérieure à un an. Elle sera d'autant plus longue que le trouble est chronique et

qu'il existe des rechutes à l'arrêt du traitement [1].

La surveillance porte sur les effets symptomatiques ainsi que sur la tolérance aux traitements.

Une fois le TOC stabilisé, le traitement sera poursuivi, parfois indéfiniment, avec des posologies réduites de 30 à 50 % par rapport à la posologie initiale.

Ex. : **PROZAC** 20 mg 1 à 2 gél./j ou **ANAFRANIL** 75 mg : 1 à 2 cp./j.

### ► Réponse au traitement

Environ **50 à 60 %** des patients obsessionnels sont améliorés par une monothérapie sérotoninergique. On ne connaît pas à l'heure actuelle les facteurs prédictifs du succès d'un traitement pharmacologique.

### ► Traitements associés

Des **benzodiazépines** sont parfois associées aux **antidépresseurs** dans les formes avec anxiété sévère. Les **antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)** peuvent être utilisés en 2<sup>e</sup> intention. On peut envisager également des stratégies « d'augmentation » par des **antipsychotiques atypiques**, ou par des **régulateurs de l'humeur**.

Les **antipsychotiques** sont intéressants chez les patients avec des traits de personnalité schizotypique ou des tics complexes.

**INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE  
(ANTIDÉPRESSEURS) (3) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.

**INDICATIONS**

Épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).

Troubles obsessionnels compulsifs : **fluoxétine (PROZAC)**, **paroxétine (DEROXAT)**, **sertraline (ZOLOFT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**, **fluvoxamine (FLOXYFRAL)**.

Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie : **paroxétine (DEROXAT)**, **citalopram (SEROPRAM)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

Phobie sociale : **paroxétine (DEROXAT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

Anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois : **paroxétine (DEROXAT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

État de stress post-traumatique : **paroxétine (DEROXAT)**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux différentes molécules.

Association avec les **IMAO** non sélectifs et sélectifs B, **sumatriptan** (syndrome sérotoninergique).

Enfant de moins de 15 ans (en l'absence d'étude).

**Grossesse, allaitement** : déconseillés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Association aux **IMAO** A réversibles (cf. Interactions médicamenteuses).

Insuffisant rénal et hépatique : utilisation des doses les plus faibles recommandées.

## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (4)

### Stratégies psychothérapeutiques

La prise en charge psychothérapeutique des TOC est principalement *cognitivo-comportementale*.

La *cure psychanalytique* n'offre que des résultats inconstants.

Au niveau comportemental, la technique « Exposition avec prévention de la réponse ritualisée (EPR) » a démontré son efficacité :

- **l'exposition *in vivo* (E)** qui cherche à augmenter l'habituation des sujets aux stimuli déclencheurs de la réponse obsession-malaise-compulsion ;

- **la prévention de la réponse (PR)** qui a pour objectif de diminuer la fréquence d'émission des rituels.

L'EPR est indiquée dans les formes cliniques avec une prévalence des compulsions « ouvertes » : laveurs, vérificateurs. Les TOC avec obsessions sans compulsion sont une indication en première intention des **antidépresseurs**.

Les *thérapies cognitives*, qui visent à apprendre au patient à modifier les distor-

sions cognitives spécifiques de son trouble, sont fréquemment couplées aux techniques comportementales.

70 % des malades seraient améliorés par les thérapies cognitivo-comportementales. Le pourcentage de rechute après arrêt de la thérapie est inférieur à celui observé après interruption du traitement pharmacologique.

Dans les formes chroniques et sévères, il semble légitime de combiner les approches pharmacologiques et psychothérapeutiques.

### Stratégies neurochirurgicales

Elles sont réservées à des formes sévères et résistantes de TOC. Plusieurs techniques neurochirurgicales ont fait la preuve de leur efficacité et d'une relative rareté des effets secondaires. L'électrostimulation du noyau sous-thalamique à haute fréquence (130-185 Hz) par des stimulateurs implantables (technique stéréotaxique) est actuellement à l'étude. Il s'agit d'une technique réversible, à faible morbidité et qui paraît très prometteuse [2] [3].

### CONSENSUS

[1] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006

[2] Brain stimulation treatments in psychiatry, *WFSBP*, 2010

[3] TOC résistants : prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle, *HAS*, 2004

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (1)

Le terme d'hystérie a disparu des systèmes de classification nosologiques actuels. Les troubles qui se réfèrent aux descriptions classiques de l'hystérie sont ainsi répertoriés dans plusieurs sous-catégories diagnostiques.

La notion de « conversion » sous-entend que des affects pénibles engendrés par des conflits insolubles sont transformés (convertis) en symptômes. Le diagnostic de « trouble dissociatif » ou de « trouble somatoforme » doit être porté avec prudence, particulièrement pour les troubles affectant le système nerveux central ou périphérique. Il faut éliminer toute cause organique.

### Classification

Le DSM-IV distingue :

– la *personnalité histrionique* ;

– les *troubles somatoformes* : le trouble somatisation (syndrome de Briquet), trouble somatoforme indifférencié, trouble de conversion, hypochondrie, trouble douloureux, trouble somatoforme non spécifié ;

– les *troubles dissociatifs* (*conversion psychique*) : amnésie dissociative, fugue dissociative, trouble dissociatif de l'identité, trouble de dépersonnalisation, troubles dissociatifs non spécifiés.

Certains auteurs distinguent également : la stupeur dissociative, états de transe et de possession, des troubles dissociatifs de la motricité et des organes des sens, autres troubles dissociatifs (syndrome de Ganser, personnalité multiple).

## ANTIPSYCHOTIQUES (1) – PHÉNOTHIAZINES ALIPHATIQUES

### ■ Chlorpromazine

<b>LARGACTIL</b>					
Psychoses aiguës : 100 à 600 mg/j	50 cp. séc. 25 mg	3,49	I	65 %	0,07
Psychoses chroniques : 25 à 150 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	5,74	I	65 %	0,19
État d'agitation, états maniaque	5 amp. 25 mg/5 mL	7,17	I	65 %	1,43
et hypomaniaque : 100 à 350 mg/j	1200 gttes 1 mg (fl.)	3,83	I	65 %	0,00
Syndrome confusionnel : 25 à 100 mg/j	5000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
en 2 ou 3 prises					
Manifestation d'agressivité des psychoses					
de l'adulte : 1 à 2 amp. x 3/j en IM					
Préparation à l'anesthésie					

### ■ Cyamémazine

<b>TERCIAN</b>					
États anxieux au cours des troubles	30 cp. séc. 25 mg	7,12	I	65 %	0,24
névrotiques : 25 à 100 mg/j en 2 prises	100 cp. séc. 25 mg	HOP	I		
États anxieux au cours des psychoses :	25 cp. séc. 100 mg	17,45	I	65 %	0,70
100 à 400 mg/j en 2 à 3 prises	50 cp. séc. 100 mg	HOP	I		
Mélancolie anxieuse et/ou délirante	1200 gttes 1 mg (fl.)	7,75	I	65 %	0,01
en association aux <b>antidépresseurs</b> :	4000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
100 à 300 mg/j	5 amp. 50 mg/5 mL	23,57	I	65 %	4,71
États d'agressivité chez l'adulte :					
1 à 2 amp. en IM à renouveler si besoin					

### ■ Lévomépromazine

<b>NOZINAN</b>					
États anxieux accompagnant les états	20 cp. séc. 25 mg	4,63	I	65 %	0,23
psychotiques aigus : 50 à 300 mg/j	20 cp. séc. 100 mg	12,82	I	65 %	0,64
État d'excitation psychomotrice : accès	1200 gttes 1 mg (fl.)	7,50	I	65 %	0,01
maniaque, bouffées délirantes :	5000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
50 à 200 mg/j en 2 à 3 prises	5 amp. 25 mg/1 mL	2,57	I	65 %	0,51
Mélancolie anxieuse et dépression grave :					
50 à 150 mg/j en 2 prises					
États psychotiques chroniques :					
50 à 100 mg/j en 1 ou 2 prises					

### ■ Alimémazine

<b>THÉRALÈNE</b>					
Insomnies : 5 à 20 mg au coucher	50 cp. séc. 5 mg	1,99	II	15 %	0,04
Traitement symptomatique des	1200 gttes 1 mL (fl. 30 mL)	2,20	II	15 %	0,00
manifestations allergiques diverses :	4000 gttes 1 mg	HOP	II		
rhinite, conjonctivite, urticaire :	15 gobelets doseurs			NR	
5 à 40 mg/j en 2 à 3 prises	2,5 mg				

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (2)

### Définition

La CIM-10 définit les troubles dissociatifs (conversion psychique) par « une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates, et du contrôle des mouvements volontaires ». Les troubles dissociatifs sont psychogènes dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec un événement traumatisant, des problèmes insolubles ou des relations interpersonnelles difficiles.

- *Troubles somatoformes* : présence de symptômes physiques évoquant une affection médicale, mais ne s'expliquant pas ou pas complètement par une étiologie organique précise ou un autre trouble psychiatrique, souffrance clinique, retentissement sur l'existence du sujet.

- *Trouble somatisation* : trouble caractérisé par des plaintes somatiques multiples, débutant avant 30 ans, ni produit intentionnellement ni feint, manifestation pendant plusieurs années, dans différents domaines (gastro-intestinal, neurologique, cardiovasculaire, génito-urinaire), pas de substrat organique, pas de cause psychologique décelable, demande de traitement, comportement anormal de maladie, retentissement socioprofessionnel.

- *Trouble de conversion* : un ou plusieurs symptômes de déficit touchant la motricité volontaire ou les fonctions sensitives ou sensorielles suggérant une affection médicale générale, pas de substrat lésionnel, antécédent de trouble similaire, retentissement social et professionnel, facteurs psychologiques dans déclenchement et persistance, fluctuation, variabilité ou réversibilité du symptôme, ni volontaire, ni feint, tout trouble organique écarté, parfois - personnalité particulière (histrionique ou passive - dépendante), souvent : « belle indifférence », souvent : bénéfices secondaires.

- *Trouble douloureux* : plainte douloureuse durable, une ou plusieurs localisations

anatomiques, intensité suffisante pour justifier un examen clinique, retentissement social et professionnel, pas de substrat organique, facteurs psychologiques dans déclenchement et persistance, ni volontaire, ni feint, consultations répétées, consommation d'antalgiques, isolement, associé à des facteurs psychologiques et/ou à une affection médicale générale aiguë, chronique si > 6 mois.

- *Hypochondrie* : préoccupation centrée sur la crainte ou l'idée d'être atteint d'une maladie grave, même si on ne retrouve pas d'affection médicale, fondée sur l'interprétation erronée par le sujet de symptômes physiques ; préoccupation excessive pour la santé malgré un bilan médical approprié et rassurant, plainte de symptômes physiques, attitude de revendication, explication « médicale », pas d'éléments délirants, « obsession », comportement anormal de maladie, « nomadisme médical », troubles pas mieux expliqués par un trouble anxiété généralisée, trouble panique, trouble obsessionnel, épisode dépressif majeur, trouble de la personnalité ; à noter : sensibilité excessive à la douleur et aux épreuves corporelles ; croyances dysfonctionnelles, existence d'un facteur déclenchant, anxiété, idées hypochondriaques automatiques.

- *Trouble dissociatif* : disruption des fonctions intégrées de la conscience : identité, mémoire, perception de l'environnement - amnésie dissociative, fugue dissociative, trouble dissociatif de l'identité, trouble de dépersonnalisation, trouble dissociatif non spécifié.

On invoque souvent l'intervention de motifs dans la création des symptômes hystériques : tentative de résolution d'un conflit inconscient, revendication du statut de malade, évitement d'une situation intolérable, recherche des bénéfices primaires ou secondaires, mobilisation de l'entourage. Enfin on décrit habituellement une relation particulière de l'hystérique au médecin : opiniâtreté, revendication, quête affective, suggestibilité.

## ANTIPSYCHOTIQUES (2) – PHÉNOTHIAZINES PIPÉRIDINÉES

### ■ Propériciazine

<b>NEULEPTIL</b>					
Agressivité au cours des affections psychiatriques : 10 à 60 mg/j	50 gél. 10 mg	7,32	I	65 %	0,15
Traitement d'appoint des psychoses chroniques : 50 à 200 mg/j	50 cp. séc. 25 mg 1200 gttes 0,25 mg (sol. buv.)	8,53 3,78	I	65 %	0,17 0,00
	1200 gttes 1 mg (sol. buv.)	7,01	I	65 %	0,01

### ■ Pipotiazine

<b>PIPORTIL</b>					
Psychoses chroniques : délires chroniques, schizophrénies, psychoses hallucinatoires chroniques	20 cp. séc. 10 mg	14,74	I	65 %	0,74
À visée antidéficitaire : 3 à 8 mg/j en 2 prises	400 gttes 1 mg (sol. buv. 4 %)	26,45	I	65 %	0,07
À visée antidélirante : 20 à 60 mg/j en prises					

## ANTIPSYCHOTIQUES (3) – THIOXANTHÈNES

### ■ Zuclopenthixol

<b>CLOPIXOL</b>					
États psychotiques aigus et chroniques : schizophrénies, délire chronique, psychose hallucinatoire chronique :	30 cp. 10 mg	5,22	I	65 %	0,17
20 à 200 mg/j en 2 à 3 prises	98 cp. 10 mg	HOP	I		
États d'agitation psychomotrice au cours des schizophrénies, des états maniaques :	30 cp. 25 mg	11,10	I	65 %	0,37
50 à 200 mg/j	98 cp. 25 mg	HOP	I		
Déséquilibre psychopathique grave : 50 à 150 mg/j	800 gttes (fl. 20 mL)	9,72	I	65 %	0,01

### ■ Flupentixol

<b>FLUANXOL</b>					
Traitement d'attaque des psychoses à dominante déficitaire, anxieuse et dépressive : 50 à 200 mg/j	400 gttes 1 mg (sol. buv. 4 %)	6,70	I	65 %	0,02
Traitement des psychoses chroniques : 20 à 50 mg/j en 1 prise					
États d'excitation et d'agitation psychomotrice : 100 à 200 mg/j en 2 à 3 prises					

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (3)

### Traitement

Dans le traitement des troubles somatoformes il faut distinguer :

- les « accidents hystériques » - conversion et troubles dissociatifs, qui sont souvent transitoires ;
- les manifestations symptomatiques chroniques, trouble douloureux et syndrome de Briquet, qui imposent une prise en charge au long cours.

Le traitement des troubles somatoformes est essentiellement ambulatoire. Les hospitalisations ne se justifient qu'en présence « d'accidents hystériques » qui rendent impossible la prise en charge ambulatoire (fugue dissociative, amnésie dissociative, trouble de conversion persistant avec perte d'autonomie) ou lors de la présence de complications (dépressions, tentatives de suicide).

L'hospitalisation expose à un risque de développement d'une dépendance à l'institution, source de chronicité et de iatrogénie.

### Traitement des conversions

Il s'agit d'un trouble fonctionnel psychogène. La moitié des conversions cède rapidement. On recommande habituellement de la part du médecin, une fois toute cause organique éliminée, une attitude rassurante, parfois suggestive voire persuasive. Les diagnostics différentiels des troubles de conversion sont la simulation et la pathomimie. Le trouble de conversion n'est ni volontaire, ni feint et il est important de garder une attitude thérapeutique ferme, mais non culpabilisante vis-à-vis des patients.

Si les symptômes de conversion ne cèdent pas rapidement :

#### • Stratégies pharmacologiques

Les chimiothérapies sont indiquées pour le traitement ponctuel des complications dépressives, de la dysthymie ou des troubles anxieux associés (TAG, phobies). Les prescriptions seront prudentes en rai-

son du risque accru chez ces patients d'effets indésirables, de réactions paradoxales, d'abus et de dépendance, d'utilisation à visée manipulatoire ou dans un but suicidaire.

Les traitements anxiolytiques et **antidéresseurs** : **tricycliques** (amitriptyline, **LAROXYL** 25 mg : 1 à 3 cp./j), **tétracycliques** (mirtazapine, **NORSET** : 15 mg : 1 à 3 cp./j) peuvent être bénéfiques.

#### • Stratégies psychothérapeutiques

Peu de travaux ont évalué l'intérêt des psychotropes dans les troubles hystériques. Les techniques de psychothérapie sont utilisées selon l'école : de soutien, analytique, cognitivo-comportementale (décentration, prise de conscience, réassurance, affirmation de soi), hypnose. L'hypnotisme est une indication classique de la psychanalyse. Elle s'adresse à des sujets capables d'introspection et qui souhaitent une meilleure compréhension d'eux-mêmes.

#### • Rééducation fonctionnelle

La mobilisation passive, active, le travail proprioceptif sont des éléments indispensables dans la prise en charge des troubles de conversion, prise en charge en psychomotricité et en ergothérapie avec un travail centré sur le schéma corporel.

Un traitement actif et rapide est souhaitable, car les conversions prolongées peuvent devenir résistantes au traitement, et ont tendance à se chroniciser avec également des complications secondaires au décubitus, des positions vicieuses.

Lorsque l'importance des bénéfices secondaires semble empêcher l'abandon du symptôme, il importe parfois d'isoler le malade de son milieu familial. Les techniques aversives (faradisation, torpillage) ne sont plus justifiées en raison de leur caractère agressif. Les troubles « amnésie dissociative » ou « fugue dissociative » qui ne cèdent pas spontanément peuvent être traités par l'hypnose dans un premier temps puis par la psychothérapie.



## ANTIPSYCHOTIQUES (4) – BENZAMIDES

## ■ Sulpiride

<b>DOGMATIL</b>					
Psychoses aiguës : 400 à 1 600 mg/j en 2 à 3 prises Psychoses déficitaires : 50 à 500 mg/j	30 gél. 50 mg	3,91	I	30 %	0,13
	100 gél. 50 mg	HOP	I		
	150 gél. 200 mg	HOP	I		
	12 cp. séc. 200 mg	5,19	I	65 %	0,43
	40 càc 25 mg (sol. buv.)	2,52	I	30 %	0,06
<b>SYNÉDIL</b>					
200 à 1 000 mg/j	4000 gttes (0,5 g/100 mL)	2,82	I	30 %	0,07
	30 gél. 50 mg	4,45	I	30 %	0,15
<b>SYNÉDIL FORT</b>					
Idem <b>SYNÉDIL</b>	12 cp. 200 mg	5,96	I	65 %	0,50

## ■ Amisulpride

<b>SOLIAN</b>					
Psychoses productives : schizophrénies paranoides et troubles délirants persistants : 300 à 1 000 mg/j en 2 à 3 prises Psychoses déficitaires : 50 à 150 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	11,41	I	65 %	0,38
	150 cp. séc. 100 mg	HOP	I		
	60 cp. séc. 200 mg	43,12	I	65 %	0,72
	150 cp. séc. 200 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 400 mg	43,12	I	65 %	1,44
	6 amp. 4 mL/200 mg	HOP	I		
	1 fl. 60 mL avec ser.	45,37	I	65 %	45,37

## ■ Tiapride

<b>TIAPRIDAL</b>					
États d'agitation et d'agressivité chez le sujet âgé et l'éthylrique : 200 à 400 mg : par ex. 2 à 4 amp. en IM/j Algies intenses et rebelles Mouvements choréïques : 300 à 800 mg/j	20 cp. séc. 100 mg	3,67	I	30 %	0,18
	150 cp. 100 mg	HOP	I		
	12 amp. 100 mg/ 2 mL	5,24	I	30 %	0,44
	1 fl. 30 mL sol. buv.	12,23	I	30 %	12,23
	5 mg/gtte				

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (4)

### Traitement du trouble somatisation

Il est long et parfois difficile. On a montré qu'une prise en charge psychiatrique régulière réduisait les dépenses en soins médicaux avec une diminution de la fréquence des hospitalisations. Évolution : chronique et fluctuante. Complications : interventions chirurgicales, répétition des bilans médicaux, effets secondaires des médicaments prescrits à tort, addictions.

La prise en charge au long cours est principalement psychologique. Les approches

psychologiques sont multiples et aucune technique psychothérapeutique ne s'avère supérieure à une autre dans le traitement du trouble de somatisation.

Les psychothérapies doivent toujours s'appuyer sur l'instauration d'une relation médecin-malade stable et rassurante, qui permet d'éviter la surconsommation médicale et de convaincre le patient de l'inutilité de la poursuite d'examens complémentaires.

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (1)

### Définition

L'état de stress post-traumatique (ESPT) (ancienne « névrose traumatique ») constitue une réponse différée ou prolongée à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes de détresse chez la plupart des individus. La prévalence vie entière de l'ESPT est de l'ordre de 1 %. Elle varie selon la population avec le degré d'exposition. Chez les femmes le risque est double et les traumatismes sont plus graves, par exemples lors des agressions sexuelles.

L'événement traumatisant peut être une agression, un viol, une catastrophe naturelle ou accidentelle, un accident de la circulation, un attentat, un enlèvement. Le fait d'être témoin d'un événement peut également représenter un traumatisme susceptible de se compliquer d'un ESPT. Le risque de développer un ESPT à la suite d'un événement potentiellement traumatique est d'environ 10 %.

Les principaux éléments cliniques de l'ESPT sont, outre l'existence d'un traumatisme, les signes spécifiques du syndrome de répétition, des signes anxieux et neurovégétatifs. Les formes prolongées peuvent aboutir à une modification et une réorganisation durable de la personnalité.

### Symptômes de répétition

Ils comprennent :

- des souvenirs répétés de l'événement sous forme de pensées, d'images, de perceptions ;
- des cauchemars ou rêves centrés sur les événements ;
- des impressions que l'événement se répète (flash-back, illusion, hallucinations, etc.).

Il existe généralement une peur et un évitement des stimuli associés au traumatisme ou pouvant éveiller le souvenir du traumatisme. Ces symptômes surviennent dans

un contexte de diminution de la réactivité générale aux autres stimuli, de détachement par rapport aux autres. Ils s'accompagnent fréquemment d'une hyper-réactivité neurovégétative avec une hypervigilance, des réactions de sursaut exagérées, un état de « qui-vive », une insomnie, une irritabilité. Complications possibles : syndrome dépressif avec parfois idées suicidaires, abus ou dépendance à alcool ou d'autres substances.

### Diagnostic différentiel

L'état de stress post-traumatique survient après un stress sévère et intense. La période de latence, qui sépare la survenue du traumatisme et celle du trouble, peut varier de quelques jours à quelques mois (moins de 6 mois après le traumatisme).

Ce trouble doit être distingué des troubles de l'adaptation où le facteur de stress n'est pas sévère et exceptionnel. Les réactions aiguës à un facteur de stress surviennent précocement et disparaissent rapidement en quelques heures ou quelques jours.

### Traitement

L'attitude thérapeutique dépend du moment évolutif de la névrose traumatique.

Dans les suites immédiates du traumatisme, il s'agit de limiter la constitution du trouble parfois par une approche psychothérapique précoce. Le traitement concerne l'ESPT et les comorbidités souvent associées (dépression, risque de suicide, dépendance vis-à-vis de drogues ou de l'alcool, etc.). Le soutien psychosocial est essentiel chez la plupart des patients victimes de traumatismes graves (viols, accidents, attentats, catastrophes naturelles). L'information du patient sur son trouble et sur ses droits est essentielle, et peut être facilitée par le soutien d'associations de patients ou d'aide aux victimes (assistances juridiques, psychothérapies, etc.).

## ANTIPSYCHOTIQUES (6) – DIBENZO-OXAZÉPINE

## ■ Loxapine

<b>LOXAPAC</b>					
Psychoses chroniques : 50 à 300 mg/j	30 cp. 25 mg	6,19	I	65 %	0,21
Psychoses aiguës, états d'agitation,	30 cp. 50 mg	11,92	I	65 %	0,40
états maniaques : 200 à 600 mg/j	30 cp. 100 mg	21,0	I	65 %	0,70
en 2 à 3 prises	750 gtttes sol. buv. (gttte = 1 mg)	5,12	I	65 %	0,01
	10 amp. 50 mg/2 mL	HOP	I		

## ANTIPSYCHOTIQUES (7) – APPARENTÉS AUX BUTYROPHÉNONES

## ■ Pimozide

<b>ORAP</b>					
Psychoses chroniques :	30 cp. 1 mg	2,12	I	65 %	0,07
antidéficitaire : 1 à 3 mg/j	30 cp. 4 mg	5,08	I	65 %	0,17
antiproductif : 4 à 20 mg/j					

## ■ Penfluridol

<b>SÉMAP</b>					
États psychotiques chroniques	6 cp. 20 mg	3,68	I	65 %	0,61
A. 1 à 3 cp. en 1 prise hebdomadaire					
Sujet âgé : 1 cp. en 1 prise hebdomadaire					

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (2)

Le traitement de choix est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) centrée sur le traumatisme ou la désensibilisation avec mouvements oculaires (EMDR : *Eye Movement Desensitization and Reprocessing*). La thérapie EMDR est une thérapie cognitive des troubles psychotraumatiques, fondée sur une exposition en imagination au souvenir douloureux couplée à des mouvements oculaires réguliers, et visant à une désensibilisation émotionnelle. Elle est composée de 3 éléments :

- l'exposition en imagination à des images évoquant les événements traumatiques ;
- des aspects cognitifs où le patient remplace les pensées négatives associées aux images par des pensées positives ;
- la pratique de mouvements oculaires saccadés que l'on demande au patient d'effectuer en suivant les mouvements rapides de gauche à droite de l'index du thérapeute. L'EMDR est contre-indiquée en cas de pathologie psychotique. Les méthodes cognitivo-comportementales associent l'exposition au stimulus traumatique et la désensibilisation en imagination ou *in vivo* pour déconditionner la réponse émotionnelle apprise (techniques de relaxation avec la désensibilisation systématique).

Les thérapies cognitives (restructuration cognitive) permettent au sujet d'apprendre à bloquer ses pensées et les images en rapport avec le traumatisme. La psychothérapie peut faire appel aussi à des techniques d'*immersion*. Il s'agit de faire revivre le traumatisme pour faire diminuer la charge émotionnelle associée (abréaction ou catharsis).

Les techniques d'hypnose peuvent être bénéfiques sur certains symptômes (douleurs, anxiété, cauchemars).

Le traitement psychothérapique est pro-

posé quel que soit le délai écoulé depuis le traumatisme. Ce traitement est conduit en entretiens individuels, habituellement au nombre de 15 à 20 séances, au rythme de 1 ou 2/sem [1].

En l'absence d'amélioration ou en cas d'amélioration limitée : une réévaluation du diagnostic est nécessaire ; un changement de thérapie ou une intensification de la thérapie associée à un traitement médicamenteux peuvent être proposés.

### Traitement préventif ou initial

La prévention des états de stress post-traumatique est illusoire. En psychiatrie militaire, elle peut cependant reposer sur l'information des médecins et des militaires, et sur la détection des individus vulnérables qui seront soumis à une surveillance étroite ou soustraits aux risques.

### Mesures immédiates

Le traitement initial s'inspire des méthodes militaires de la psychiatrie de l'avant. Il consiste à mettre à proximité des zones de combat des unités qui permettent :

- une mise à l'abri des combattants (ou des blessés d'un attentat) et leurs extractions rapides du contexte traumatique ;
- une sécurisation et une psychothérapie précoce qui favorise la mentalisation et la verbalisation des événements, afin d'éviter les ruminations anxieuses de la période de latence ;
- les techniques de « debriefing » - soins post-immédiats effectués le 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> j, très médiatisées, restent l'objet de controverses en raison d'études négatives en ce qui concerne leur caractère préventif sur le développement d'un ESPT, voire leur nocivité potentielle ;
- la prescription d'**anxiolytiques** type **benzodiazépines** qui atténue les réactions émotionnelles et d'anxiété parfois très intenses et limiterait la trace mnésique du traumatisme.

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (1) – DIBENZODIAZÉPINES

### ■ Clozapine

<b>LÉPONEX</b>					
Schizophrénies résistantes : 50 à 800 mg/j Délivrance particulière : spécialistes et psychiatres. Surveillance régulière de la NFS avec un carnet de contrôle	7 cp. séc. 25 mg	1,99	I	65 %	0,28
	14 cp. séc. 25 mg	3,13	I	65 %	0,22
	28 cp. séc. 25 mg	5,43	I	65 %	0,19
	14 cp. séc. 100 mg	10,37	I	65 %	0,74
	28 cp. séc. 100 mg	20,21	I	65 %	0,72

### ■ Olanzapine

<b>ZYPREXA</b>					
Schizophrénie : 10 mg/j en 1 seule prise avec adaptation posologique de 5 à 20 mg/j en fonction de l'état clinique du patient Épisode maniaque : 15 mg/j puis idem schizophrénie Trouble bipolaire : prévention des rechutes chez un patient ayant répondu au <b>ZYPREXA</b> lors d'un épisode maniaque	28 cp. 5 mg	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 7,5 mg	46,05	I	65 %	1,64
	56 cp. 7,5 mg	87,82	I	65 %	1,57
	28 cp. 10 mg	87,82	I	65 %	3,14
	56 cp. 10 mg	HOP	I		
	1 fl. inj. IV 10 mg	HOP	I		
<b>ZYPREXA VELOTAB</b>					
Idem <b>ZYPREXA</b>	28 cp. 5 mg orod.	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 10 mg orod.	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 15 mg orod.	HOP	I		
	28 cp. 20 mg orod.	HOP	I		
<b>ZYPADHERA</b>					
Traitement de maintien chez les patients adultes schizophrènes 1 inj. toutes les 2 à 4 sem.	1 inj. IM 210 mg LP	HOP	I		
	1 inj. IM 300 mg LP	HOP	I		
	1 inj. IM 405 mg LP	HOP	I		
<b>ZALASTA</b>					
Idem <b>ZYPREXA</b>	28 cp. 5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. orodisp. 5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. 7,5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. 10 mg	45,83	I	65 %	1,64
	28 cp. orodisp. 10 mg	45,83	I	65 %	1,64

### ■ Quétiapine

<b>XEROQUEL LP</b>					
Voie orale, une seule prise quotidienne Schizophrénie : 300 mg à J1, 600 mg à J2 Traitement d'entretien : 400-800 mg/j Épisode dépressif majeur : 50 mg à J1, 100 mg à J2, 200 mg à J3 et 300 mg à J4 Entretien : 200-600 mg /j Troubles bipolaires : 300-800 mg/j À adapter en fonction de la clinique, des caractéristiques du patient et du traitement associé	10 cp. 50 mg LP	10,03	I	65 %	1,00
	30 cp. 50 mg LP	29,01	I	65 %	0,97
	100 cp. 50 mg LP	HOP	I		
	30 cp. 300 mg LP	63,27	I	65 %	2,11
	60 cp. 300 mg LP	122,24	I	65 %	2,04
	100 cp. 300 mg LP	HOP	I		
	30 cp. 400 mg LP	91,87	I	65 %	3,06
	60 cp. 400 mg LP	179,43	I	65 %	2,99
	100 cp. 400 mg LP	HOP	I		

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (3)

### Traitement de l'état de stress constitué : psychothérapies

À côté de l'approche cognitive ou cognitivo-comportementale, de l'EMDR ou de l'hypnose, on peut recourir également à des traitements qui reposent sur la recherche d'une abréaction.

- Lorsque le traumatisme est récent, l'abréaction peut survenir facilement par le simple récit de l'événement.

- Quand le stress est installé depuis longtemps, l'abréaction est plus difficile à obtenir. Elle peut être provoquée par la narcoanalyse (narcose amphétaminée et avec les barbituriques) ou l'hypnose. Ces méthodes favorisent l'irruption du souvenir du traumatisme en inhibant les défenses de l'état de veille.

- Plus le traitement est entrepris tardivement, plus les techniques psychothérapeutiques « classiques » doivent prendre le pas sur les techniques abréactives, le traumatisme étant réactualisé et revécu dans le transfert.

- Les psychothérapies analytiques peuvent être également indiquées pour les formes plus anciennes ou associées à un autre trouble névrotique.

### Chimiothérapie

Elle est indiquée dans les formes chroniques durant depuis plus d'un an (dépression quasi systématiquement associée). La **paroxétine** est la seule molécule ayant une AMM dans cette indication. **DEROXAT** 20 mg, 1 à 3 cp./j. Son utilisation prolongée nécessite une réévaluation régulière [2].

Dans 3 études contrôlées randomisées

d'une durée de 5 sem. et d'une durée de 3 mois, la **fluoxétine** (40, 30 et 57 mg/j respectivement) s'est révélée plus efficace que le placebo, y compris à long terme, dans la prévention des rechutes.

Deux études contrôlées randomisées de 12 sem. sont également en faveur de l'efficacité de la **sertraline** (200 mg/j) versus placebo.

Les **imipraminiques** (**amitriptyline** 50 à 300 mg/j et **imipramine**) se sont révélés plus efficaces que le placebo. Ils sont également efficaces sur les troubles du sommeil et l'anxiété.

L'efficacité des **IMAO** n'est pas démontrée dans cette indication, mais ils réduiraient les pensées obsédantes concernant le traumatisme [2].

Donc, en cas d'échec de la paroxétine les médicaments utilisés dans l'ESPT (hors AMM) sont les autres **ISRS** (**fluoxétine**, **fluvoxamine**, **sertraline**) ou les **antidépresseurs tricycliques** (**amitriptyline**, **imipramine**) [1].

L'efficacité de l'association thérapie cognitivo-comportementale et **ISRS** peut être supérieure à celle de chaque traitement isolément. La durée initiale doit être de 12 sem. avant de changer de traitement. Si les problèmes de sommeil sont importants, un traitement **hypnotique** de courte durée peut être proposé.

La chimiothérapie symptomatique (hors AMM) peut faire également appel de façon non spécifique aux **anxiolytiques**, **benzodiazépéniques** ou non.

Aucun traitement médicamenteux n'a toutefois démontré sa capacité à réduire de façon significative et prolongée les symptômes du syndrome de répétition [2].

### CONSENSUS

[1] Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves, HAS, 2007

[2] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, Afssaps, 2006

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (1)

### Rappel nosologique

Dans les systèmes nosologiques actuels, il n'est pas fait mention des **bouffées délirantes aiguës** (BDA) classiques. La CIM-10 range cette affection sous la catégorie des **troubles psychotiques aigus et transitoires**. Les troubles psychotiques aigus doivent être considérés comme des syndromes cliniques d'étiologies variées.

Les troubles psychotiques aigus et transitoires correspondent à la survenue brusque, le plus souvent chez un sujet jeune, d'une expérience délirante comportant des hallucinations, des idées délirantes, des perturbations des perceptions et du comportement, une insomnie presque totale, un bouleversement émotionnel très intense avec une anxiété et une instabilité de l'humeur qui oscille entre la tristesse et l'euphorie.

Le pronostic à moyen et long terme est incertain. Selon la CIM-10, on attachera une grande importance à repérer :

- le **caractère aigu, voire brutal** (en moins de 48 h) de survenue du trouble ;
- la présence de **syndromes typiques** : dans la BDA classique on décrit l'aspect **polymorphe** du trouble avec un polymorphisme des mécanismes et des thèmes délirants (mystiques, persécution, mégalomanie, possession, transformation corporelle, etc.). On décrit également le caractère fluctuant et changeant des troubles. On peut rencontrer aussi un **syndrome schizophrénique** typique (troubles du cours de la pensée, idées déli-

rantes bizarres, hallucinations de conversations, symptômes négatifs, etc.) ;

- l'existence de **facteurs de stress aigus**. Ces 3 éléments permettent au clinicien d'identifier et de décrire précisément le trouble psychotique aigu.

Le DSM-IV distingue deux entités nosologiques :

- **trouble psychotique bref** : présence d'un ou des symptômes suivants : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement grossièrement désorganisé ou catatonique ; la durée des troubles est supérieure à 1 j et inférieure à un mois, avec ou sans facteurs de stress marqués, avec retour complet au niveau de fonctionnement pré-morbide ;

- **trouble schizophréniforme** : répond aux critères de la schizophrénie, durée supérieure à 1 mois et inférieure à 6 mois. Les caractéristiques du bon pronostic se manifestent par au moins deux des manifestations suivantes : survenue dans les 4 sem. par rapport au premier changement observable, confusion ou perplexité, bon fonctionnement social et professionnel pré-morbide, pas d'émoussement ou d'abrasion de l'affect. Contrairement à la Schizophrénie, une altération du fonctionnement social et des activités n'est pas requise pour porter le diagnostic de Trouble schizophréniforme. Cependant, la plupart des sujets présentent des dysfonctionnements dans divers domaines du fonctionnement quotidien (p. ex., au travail ou à l'école, dans les relations interpersonnelles et dans les soins d'hygiène).



## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (4) – DIBENZO-OXAZÉPINE

## ■ Asénapine

SYCREST					
Accès maniaque, trouble bipolaire	60 cp. subling. 5 mg		I	NR	
Posologie initiale en monothérapie : 10 mg x 2/j	100 cp. subling. 5 mg	HOP	I		
Posologie initiale en polythérapie : 5 mg x 2/j	60 cp. subling. 10 mg		I	NR	
Posologie d'entretien : 5 à 10 mg x 2/j en fonction de la réponse clinique	100 cp. subling. 10 mg	HOP	I		

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (5) – ANTIDOPAMINERGIQUE

## ■ Palipéridone

XEPLION					
Traitement d'entretien de la schizophrénie chez l'adulte stabilisé ou ayant répondu à la <b>rispéridone</b> ou la <b>palipéridone</b> : 1 inj. IM dans le deltoïde à J <sub>1</sub> =150 mg et J8 ± 2 j = 100 mg puis 1 inj. mensuelle (± 7 j) La dose d'entretien recommandée est de 75 mg à adapter en fonction de la tolé- rance et l'efficacité entre 25 et 150 mg À administrer dans le deltoïde ou le fessier Ne doit pas être utilisé si le contrôle immé- diat des symptômes est recherché	1 ser. 25 mg 1 ser. 50 mg 1 ser. 75 mg 1 ser. 100 mg 1 ser. 150 mg	111,90 218,25 280,58 342,96 509,22	I I I I I	65 % 65 % 65 % 65 % 65 %	111,90 218,25 280,58 342,96 509,22

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (2)

### Évolution et pronostic

En général les troubles psychotiques aigus guérissent complètement en quelques semaines, voire en quelques jours. Il est pratiquement impossible de prévoir l'évolution à moyen et à long terme. La question du devenir de ces malades représente un des problèmes majeurs.

Globalement les rares enquêtes anamnestiques décrivent 4 types possibles d'évolution :

- l'absence complète de récurrence ;
- la récurrence périodique sur le même mode : « psychose cycloïde » de la CIM-10 ;
- l'évolution vers une schizophrénie (15 % des cas) ;
- l'apparition d'accès périodiques de types maniaco-dépressifs.

### Facteurs pronostiques des troubles psychotiques aigus et transitoires

FACTEURS DE BON PRONOSTIC	FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC
Antécédents personnels ou familiaux de troubles dépressifs ou maniaques	Personnalité prémorbide de type schizoïde ou schizotypique
Début brutal	Début subaigu ou insidieux
Importance de la note confusionnelle	
Bonne réactivité au traitement antipsychotique	Médiocre réactivité au traitement antipsychotique

### Traitement

La BDA constitue une urgence psychiatrique, la plupart du temps prise en charge en milieu hospitalier.

L'hospitalisation permet la réalisation d'un bilan étiologique (élimination de facteurs organiques, recherche de toxiques), et sert à procurer au patient une « atmosphère psychothérapique » sécurisante.

Si l'hospitalisation en service libre ne peut être négociée, on aura recours à une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT), voire à une mise en place des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État (SPDRE) lors de troubles majeurs du comportement menaçant l'ordre public ou la sûreté des personnes.

La prise en charge thérapeutique devra être multidisciplinaire et personnalisée sans oublier d'y inclure le dépistage des comorbidités somatiques et psychiatriques [1].

## ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (1)

## ■ Zuclopenthixol décanoate

<b>CLOPIXOL ACTION PROLONGÉE</b>					
Traitement initial des psychoses aiguës, des états maniaques, et des moments féconds des psychoses chroniques : 50 à 200 mg en 1 seule inj. en IM profonde pour 72 h. À renouveler rarement 8 h après la 1 <sup>re</sup> inj. Prévoir relais <i>per os</i> après 72 h	1 amp. inj. (IM) 200 mg/mL	7,66	I	65 %	
	10 amp. inj. (IM) 200 mg/mL	HOP	I		

## ■ Zuclopenthixol acétate

<b>CLOPIXOL ACTION SEMI-PROLONGÉE</b>					
Psychoses chroniques : schizophrénies, délire paranoïde, psychose hallucinatoire chronique 1 à 2 amp. en IM profonde/3 sem.	5 amp. inj. (IM) 50 mg/mL	HOP	I		

## ■ Flupentixol décanoate

<b>FLUANXOL LP</b>					
Psychoses chroniques : - à visée antidéficitaire : 20 à 80 mg toutes les 2 à 3 sem. en IM profonde - à visée antidépressive : 80 à 300 mg en IM profonde toutes les 2 à 4 sem. Traitement de fond des troubles du comportement chez les éthyliques : 100 mg en IM toutes les 3 sem. (risque de dyskinésie tardive)	4 amp. inj. 20 mg/mL	7,50	I	65 %	1,88
	1 amp. inj. 100 mg/mL	7,66	I	65 %	7,66

## ■ Fluphénazine

<b>MODÉCATE</b>					
Psychoses délirantes chroniques : schizophrénies, troubles délirants persistants, psychose hallucinatoire chronique. 25 à 150 mg en IM profonde toutes les 3 à 4 sem.	3 amp. 25 mg/mL	6,40	I	65 %	2,13
	1 fl. 125 mg/5 mL	9,35	I	65 %	9,35

## ■ Pipotiazine

<b>PIPORTIL L4</b>					
Psychoses chroniques : 20 à 200 mg en IM profondes toutes les 3 à 4 sem.	3 amp. 25 mg/mL	12,93	I	65 %	4,31
	1 amp. 100 mg/4 mL	12,38	I	65 %	12,38
<b>PIPORTIL</b>					
États psychotiques aigu ou chronique : 5 à 20 mg/j	20 cp. 10 mg	14,74	I	65 %	0,74
	400 gtes (sol. buv. 4 %)	26,45	I	65 %	0,07

## ■ Risperidone

<b>RISPERDALCONSTA LP</b>					
Psychoses aiguës et chroniques en particulier schizophrénies en relais du traitement <i>per os</i> : 1 injection IM/2 sem. avec poursuite du <b>RISPERDAL</b> <i>per os</i> en relais pendant 3 sem.	1 ser. 25 mg/2 mL	103,35	I	65 %	103,35
	1 ser. 37,5 mg/2 mL	133,06	I	65 %	133,06
	1 ser. 50 mg/2 mL	162,80	I	65 %	162,80

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (3)

### Traitement médicamenteux

• Généralement les troubles psychotiques aigus et transitoires répondent très bien et très rapidement aux **antipsychotiques (AP)**. Les **AP** dits de seconde génération, ou les **antipsychotiques atypiques (APA)** seront utilisés en première intention avec pour objectif la réduction de la durée de l'épisode processuel. La prévention et la recherche de leurs effets indésirables (prise de poids, troubles endocriniens et sexuels, troubles métaboliques et cardiovasculaires) sera une préoccupation constante afin d'éviter la stigmatisation des patients et d'assurer une bonne observance du traitement, gage d'alliance thérapeutique pour l'avenir. Le traitement **APA** sera prescrit aux doses minimales efficaces et régulièrement réévalué afin de détecter et de gérer précocement les patients non répondeurs. En cas d'agitation et d'angoisse importante on associe temporairement un traitement sédatif.

Ex. : **rispéridone (RISPERDAL)** : 4 j à 8 mg/j en 2 prises ou **olanzapine (ZYPREXA)** : 5 à 20 mg/j en 1 prise, ou **aripiprazole (ABILIFY)** : 10 à 30 mg/j en une prise ± **clorazépate dipotassique (TRANXÈNE)** : 50 à 150 mg/j.

Les formes orales d'absorption rapide (gouttes ou comprimés dispersibles) seront préférées à l'utilisation des formes injectables, sauf cas particuliers.

En seconde intention, les **AP** conventionnels seront utilisés en étant particulièrement vigilant à minimiser les effets extrapyramidaux par la prescription de la posologie minimale efficace et le recours aux médicaments antiparkinsonniens, sans oublier les effets indésirables précités.

On peut associer aux **AP** dans certains cas des traitements par benzodiazépines à visée anxiolytique et sédatrice et des **hypnotiques (zopiclone, STILNOX 1 cp. le soir ou zopiclone, IMOVANE 1 cp. le soir)** en cas d'insomnie importante.

Les **antipsychotiques** (conventionnels et de seconde génération) restent le traitement de référence ; toutefois, en présence de troubles de l'humeur, les **thymorégulateurs**, en particulier les **anticonvulsivants**, pourraient être un appoint ou une alternative intéressante en tant que traitement symptomatique.

Il est recommandé [1] :

- d'organiser le traitement en tenant compte de la triple dimension biologique, psychologique et sociale de l'abord du malade ;
- d'avoir recours de préférence aux **APA**. Ce traitement sera prescrit à la dose minimale efficace pendant une période d'un à 2 ans afin d'éviter les rechutes ;
- de porter un diagnostic aussi précoce que possible pour favoriser la mise en œuvre le plus tôt possible du traitement, gage d'un meilleur pronostic ;
- de bien peser les indications du traitement ambulatoire ou de l'hospitalisation ;
- de ne pas recourir à la sismothérapie en première intention, mais uniquement en cas d'intolérance, de contre-indications à l'usage des **antipsychotiques**, voir d'une résistance ;
- d'utiliser des méthodes d'information systématique du patient et de sa famille à propos des symptômes, des facteurs étiologiques, du traitement et de l'évolution de la maladie. Le travail avec la famille sur les problèmes concrets de la vie quotidienne avec un jeune schizophrène doit être organisé.

## ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (2) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Le terme **antipsychotique** a remplacé celui de neuroleptique.

Delay et Denicker ont défini les **antipsychotiques** comme des molécules capables :

- d'entraîner une sédation et une réduction des états d'agitation et d'excitation ;
- d'avoir une activité antidépressive et sur les hallucinations ;
- de créer d'un état d'indifférence psychomotrice ;
- de produire des symptômes extrapyramidaux ;
- d'agir principalement au niveau sous-cortical.

On distingue actuellement des **antipsychotiques** conventionnels de première génération et des **antipsychotiques** dits de seconde génération, ou **atypiques (APA)**. Il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus pour définir les propriétés des **APA**. La notion d'atypicité correspond pas à la définition classique, en particulier parce qu'elles induisent moins d'effets extrapyramidaux par diminution des effets anti-D2 nigrostrié, par effets anti-5HT<sub>2</sub>. L'effet anti-5HT<sub>2</sub> est également responsable d'une dimi-

nution des effets secondaires au niveau hypothalamohypophysaire (moins d'aménorrhée-galactorrhée) et mésocortical (moins de symptômes négatifs secondaires).

Les **antipsychotiques** bloquent principalement les récepteurs centraux dopaminergiques (D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>).

Ils possèdent également à des degrés divers des propriétés anticholinergiques, adréno-lytiques, antisérotoninergiques 5HT<sub>2</sub>, antihistaminiques H<sub>1</sub>. Ces différents sites d'action expliquent les effets thérapeutiques variés des **antipsychotiques** et les différences d'action observées entre ces molécules.

L'**aripiprazole (ABILIFY)** est un agoniste dopaminergique partiel. Il occupe les récepteurs dopaminergiques centraux dont il diminue la disponibilité pour la dopamine endogène.

En dehors de leurs propriétés antipsychotiques, les **antipsychotiques** peuvent être utilisés en anesthésie, comme antiémétiques et contre les manifestations allergiques.

### • CLASSIFICATION

Les classifications sont établies à partir des effets thérapeutiques prédominants, des effets indésirables, de la possibilité d'utilisation en urgence.

### Classification thérapeutique des antipsychotiques

Antipsychotiques sédatifs	Antipsychotiques antiproduitifs	Antipsychotiques antidépresseurs
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LARGACTIL</b></li> <li>– <b>FLUANXOL</b></li> <li>– <b>NOZINAN</b></li> <li>– <b>NEULEPTIL</b></li> <li>– <b>TERCIAN</b></li> <li>– <b>CLOPIXOL</b></li> <li>– <b>TIAPRIDAL</b></li> <li>– <b>DIPIPÉRON</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>HALDOL</b></li> <li>– <b>PIPORTIL</b></li> <li>– <b>DROLEPTAN</b></li> <li>– <b>SÉMAP</b></li> <li>– <b>LOXAPAC</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ORAP</b></li> <li>– <b>PIPORTIL</b></li> <li>– <b>SOLIAN</b></li> <li>– <b>DOGMATIL</b></li> </ul>

### Classification des antipsychotiques en fonction de leur atypicité

ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES	ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LÉPONEX</b></li> <li>– <b>ZYPREXA</b></li> <li>– <b>RISPERDAL</b></li> <li>– <b>XEROQUEL</b></li> <li>– <b>SYCREST</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ABILIFY</b></li> </ul>

Antipsychotiques utilisés préférentiellement en situation d'urgence : **CLOPIXOL**, **LOXAPAC**, **ABILIFY**.

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (4)

### Traitements associés

Le suivi en cure ambulatoire, si la symptomatologie n'est pas trop bruyante, a l'intérêt d'éviter la stigmatisation liée à l'hospitalisation et de favoriser la conservation des liens familiaux et sociaux. On peut toutefois préférer le traitement dans un cadre hospitalier dont l'indication demeure en cas de risque de dangerosité, de comorbidité organique, de conflit aigu avec l'entourage ou d'absence de soutien familial.

L'accompagnement psychologique est indispensable tout au long de l'épisode aigu. Des entretiens réguliers permettront de rassurer le patient, de rétablir une communication et de mettre en place les éléments pour une psychothérapie ultérieure.

Les cures analytiques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans ce type de pathologie. Toutefois la référence psychanalytique dans l'approche psychopathologique fait l'objet d'un consensus. Différentes méthodes d'inspiration cognitivo-comportementale peuvent également être utilisées.

### Traitements à moyen et long terme

La prévention des rechutes est un objectif fondamental. En cas d'épisode unique, il existe un consensus pour maintenir une chimiothérapie **antipsychotique** pendant 1 à 2 ans. En cas de rechutes ou de récurrences, il existe un accord professionnel pour la prolonger.

À moyen terme et au décours de l'expérience délirante, on observe fréquemment des symptômes dépressifs. Il peut s'agir d'effets latéraux des **AP** (notion classique mais non clairement démontrée), des effets traumatisants de la prise de conscience de l'épisode aigu, voire d'un authentique épisode dépressif majeur. Dans ce cas on propose de baisser les **AP** et d'ajouter un **antidépresseur**. Ex. : **fluoxétine (PROZAC)** : 1 gél. le matin ou **miansérine (MIANSERINE ARROW)** 60 mg en 1 prise le soir.

La conduite thérapeutique au long cours est fonction du cadre diagnostique. Les troubles psychotiques aigus récidivants avec un bon fonctionnement intercritique seront traités de façon prolongée par des **AP** à visée de maintenance.

### CONSENSUS

[1] Schizophrénies débutantes : diagnostic et modalités thérapeutiques, *FFP selon la méthodologie de l'Anaes*, 2003

## SCHIZOPHRÉNIE (1)

### Cadre nosologique

#### Définitions

La schizophrénie (SCZ) représente la catégorie diagnostique la plus courante et la plus importante du groupe des troubles psychotiques chroniques et des troubles délirants persistants.

Prévalence (vie entière, population générale) : 1 %. Incidence annuelle : 0,1 à 0,3 ‰. Le *sex ratio* est de 1, avec un début plus précoce chez l'homme.

Les systèmes de classification, DSM-IV et CIM-10, proposent des critères diagnostiques de la SCZ qui sont centrés principalement sur les symptômes délirants, l'automatisme mental et les troubles de l'affect, du langage ou du comportement.

La notion de dissociation mentale constitue encore pour de nombreux cliniciens l'anomalie caractéristique de la schizophrénie. La dissociation exprime la perte de ce qui fait l'unité et l'homogénéité de la personne. Elle se manifeste dans le fonctionnement intellectuel du sujet, son affectivité et son comportement. Elle « infiltre » la symptomatologie schizophrénique et lui confère ses caractéristiques générales, décrites par H. Ey, de **bizarrie, d'étrangeté, de détachement et d'ambivalence**.

#### Formes cliniques

• La CIM-10 et le DSM-IV reconnaissent à la SCZ 5 grandes formes cliniques en fonction de l'importance respective du délire paranoïde, des signes de désorganisation, déficitaires ou des troubles psychomoteurs :

– **paranoïde** : prédominance de l'activité délirante paranoïde. Le délire paranoïde n'est pas systématisé (peu ou pas cohérent) : flou, incohérent, impénétrable, chaotique, les mécanismes sont polymorphes (hallucinations, illusions, intuitions, etc.), les thèmes souvent intriqués (mystiques, persécutions, influence, etc.). L'adhésion au délire est le plus souvent totale et peut déclencher des troubles du comportement (agitation, agressivité, stupeur, etc.) ;

– **désorganisée ou hébéphrénique** : début en règle générale insidieusement au cours ou au décours de l'adolescence. Une personnalité prémorbide schizoïde est parfois retrouvée.

La dissociation et le repli autistique prédominent. Les perturbations du fonctionnement intellectuel (troubles du contenu et du cours de la pensée, du langage, de l'attention et de la concentration), l'émoussement affectif avec retrait social sont au premier plan. Le délire est pauvre, voire absent. Le pronostic évolutif, malgré le traitement antipsychotique, est souvent défavorable et la désinsertion socioprofessionnelle est fréquente ;

– **catatonique** : présence de symptômes psychomoteurs passant parfois d'un extrême à un autre : hyperkinésie, stupeur, agitation violente, mutisme, négativisme, attitudes imposées, rigidité, flexibilité cirreuse. Les symptômes catatoniques peuvent s'observer en dehors de la SCZ (épisodes thyroïdiens dépressifs ou maniaques, tumeurs cérébrales, affections métaboliques ou toxiques). Le diagnostic de syndrome catatonique justifie donc des investigations cliniques et paracliniques approfondies à la recherche d'étiologies spécifiques. Il peut engager le pronostic vital et nécessite souvent des mesures thérapeutiques et réanimatoires adéquates (cf. Traitement) ;

– **indifférenciée** ;

– **résiduelle** : stade chronique de l'évolution de SCZ, forme stabilisée dans laquelle persistent des symptômes négatifs mais où les symptômes positifs sont absents ou très atténués.

• La CIM-10 distingue également des formes « mineures » : trouble schizophréniforme, autres troubles schizophréniques, troubles schizotypiques, schizophrénies prépsychotiques, prodromiques, pseudonévrotiques, pseudopsychopathiques (héboïdophréniques), personnalité schizotypique. Pour l'ensemble des sous-types de SCZ, on peut spécifier l'évolution : continue ; épisodique avec déficit progressif ; épisodique avec déficit stable ; épisodique rémittent ; rémission incomplète ; rémission complète. Habituellement la SCZ est une affection chronique, et qui s'associe à des périodes d'exacerbation. On dispose de peu d'enquêtes catamnétiques au long cours, mais l'affection semble se stabiliser après 20 à 30 ans d'évolution.

**ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (4) –  
PHARMACOLOGIE (3)****► Syndrome parkinsonien d'imprégnation aux antipsychotiques**

Akinésie, bradykinésie, hypertonie extrapyramidale, tremblement parkinsonien. Ils surviennent plus tardivement après 2 à 3 sem. de traitement. En fonction de la réponse thérapeutique, on peut, dans un premier temps, conseiller la réduction de la posologie de **antipsychotiques** et dans un second temps prescrire un correcteur **antiparkinsonien**, par exemple : **tropatépine**, **LEPTICUR** 1 cp. x 2/j, **bipéridène** (**AKINETON RETARD**) : 1 cp. x 2/j.

**► Syndrome hyperkinétique**

Akathasie-tasikinésie. Le syndrome d'impairance motrice et psychique est très mal toléré par les patients. Le syndrome hyperkinétique répond mal aux **antiparkinsoniens**. On peut proposer de diminuer les doses de **antipsychotiques** (il existe des akathasies de sevrage) ou d'associer des **β-bloquants** : **propranolol** (**AVLOCARDYL**) 40 mg 1/4 à 1/2 x 3/j ou des **benzodiazépines** : **diazépam** (**VALIUM**) 10 à 30 mg/j.

**► Dysckinésies tardives**

Redoutables, elles représentent à long terme le danger principal des traitements prolongés par **antipsychotiques**. Elles peuvent apparaître après quelques semaines (en particulier chez le sujet âgé) ou quelques mois voire années de traitement. De nombreux facteurs favorisent leur apparition : le sexe féminin, les troubles affectifs, la dose totale reçue de **antipsychotiques**, l'âge.

Certains schizophrènes présentent des dyskinésies tardives spontanées sans avoir jamais pris de **antipsychotiques**. Les dyskinésies tardives sont d'expressions cliniques très polymorphes. Elles sont plus fréquentes au niveau facial et axial : mouvements involontaires lents, syn-

drome bucco-linguo-facial, protrusion de la langue, rotation choréo-athétosique des membres, protrusion du bassin, dysphagies, dysphonies, difficultés respiratoires.

Les **antiparkinsoniens** ne sont pas efficaces pour corriger les dyskinésies tardives. Le traitement est préventif et consiste à arrêter les **antipsychotiques** lorsque la prescription n'est plus justifiée. S'il est nécessaire de poursuivre le traitement antipsychotique et en cas d'apparition des dyskinésies tardives, on peut conseiller les **benzodiazépines** type **clonazépam** (**RIVOTRIL**) ou **diazépam** (**VALIUM**), réduire les doses d'**antipsychotique** ou changer pour les molécules atypiques type **olanzapine**.

**Effets neurovégétatifs**

Ils sont plus fréquents avec les **antipsychotiques** sédatifs (**phénothiazines** et anticholinergiques) : hypotension orthostatique, à l'origine de chutes, effets atropiniques.

**Effets métaboliques**

Les **antipsychotiques**, en particulier **atypiques** (p. ex. **olanzapine** : **ZYPREXA**), augmentent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires : poids, cholestérolémie, glycémie. La surveillance de ces paramètres avant et après traitement est indispensable. Une prise en charge diététique précoce est souhaitable en cas de prise de poids, voire à visée préventive.

**Effets cardiovasculaires**

Hypotension orthostatique, baisse de la pression diastolique, effet anesthésique local du myocarde, tachycardie, troubles de conduction : période réfractaire plus longue, temps de conduction ventriculaire plus lent, variation de l'excitabilité du nœud sinusal, blocs AV, arythmies, aplanissement de l'onde T, prolongation du segment QT.



## SCHIZOPHRÉNIE (2)

### Éléments pronostiques

On ne dispose pas d'éléments fiables permettant de prédire un pronostic à l'échelle individuelle. On peut néanmoins dégager des éléments pronostiques généraux.

FACTEURS DE BON PRONOSTIC	FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Début tardif</li> <li>– Sexe féminin</li> <li>– Bon niveau socio-éducatif prémorbide</li> <li>– Forme paranoïde</li> <li>– Absence de lésion cérébrale associée</li> <li>– Instauration précoce d'un traitement</li> <li>– Bonne réactivité au traitement antipsychotique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Début précoce et insidieux</li> <li>– Sexe masculin</li> <li>– Troubles cognitifs prémorbides</li> <li>– Signes négatifs précoces</li> <li>– Atrophie cérébrale</li> <li>– Instauration tardive d'un traitement</li> <li>– Mauvaise réactivité au traitement antipsychotique</li> </ul>

### Traitement initial

Le traitement associe à la chimiothérapie les psychothérapies et les prises en charge institutionnelles. Le traitement des troubles schizophréniques s'appuie principalement sur les **antipsychotiques (AP)**.

Les mesures thérapeutiques proposées dans la SCZ ont pour objectif de limiter le handicap des patients et de promouvoir leur réinsertion et leur réhabilitation psychosociale.

Actifs pour réduire les épisodes psychotiques aigus, les **AP** diminuent également les risques de rechute et de récurrence lors d'administration au long cours.

### Choix des antipsychotiques

Les **AP** permettent de corriger les principaux symptômes observés lors des épisodes aigus : l'agitation, l'angoisse, les hallucinations et les productions délirantes, les troubles du cours de la pensée, le retrait autistique et l'émoussement affectif.

**À l'exception des formes d'intensité modérée, les moments féconds schizophréniques sont souvent pris en charge en milieu hospitalier.** L'hospitalisation libre ou sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT ou soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État : SPDRE) permettra ainsi d'effectuer le bilan médical à la recherche de fac-

teurs organiques (lésions cérébrales, prise de toxiques) à l'origine ou associés à l'épisode aigu. Elle permet également l'instauration d'un cadre thérapeutique rassurant.

Les **AP de seconde génération**, ou **antipsychotiques atypiques (APA)** seront utilisés en première intention avec pour objectif la réduction de la durée de l'épisode processuel. La prévention et la recherche de leurs effets indésirables (prise de poids, troubles endocriniens et sexuels, troubles métaboliques et cardiovasculaires) seront une préoccupation constante afin d'éviter la stigmatisation des patients et d'assurer une bonne observance du traitement, gage d'alliance thérapeutique pour l'avenir. Le traitement par **APA** sera prescrit aux doses minimales efficaces et sera régulièrement réévalué afin de détecter et de gérer précocement les patients non répondeurs. En seconde intention, les **AP** conventionnels seront utilisés en étant particulièrement vigilant à minimiser les effets extrapyramidaux par la prescription de la posologie minimale efficace et le recours aux médicaments antiparkinsoniens, sans oublier les effets indésirables précités [1].

Le choix du **AP** est conditionné par de nombreux paramètres qui prennent en considération la prédominance de certains symptômes cliniques, la notion de réponse ou d'échec à des traitements antérieurs, les habitudes du praticien, la tolérance du patient, la forme galénique. L'**olanzapine (ZYPREXA)** et la **rispéridone (RISPERDAL)** ont souvent une efficacité équivalente sur la symptomatologie positive, et sans doute supérieure sur la symptomatologie négative (cf. Encadré).

- La symptomatologie positive concerne la présence de signes normalement absents : idées délirantes, syndrome hallucinatoire, désorganisation de la pensée, etc.
- La symptomatologie négative concerne l'absence de signes normalement présents : apragmatisme, alogie, athymormie, etc. Cette dichotomie fait référence à l'approche anglo-saxonne de la sémiologie schizophrénique. Elle tend à supplanter la triade classique franco-germanique (délire, syndrome dissociatif, repli autistique).

**ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (5) –  
PHARMACOLOGIE (4)****INCIDENTS ET ACCIDENTS****Insuffisance hépatique**

Réduire les posologies et privilégier les **butyrophénones**. Les **phénothiazines aliphatiques** sont contre-indiquées.

**Insuffisance rénale**

Pas de contre-indication mais adaptation des posologies. Chez les hémodialysés et lors, par exemple, de phases psychotiques aiguës, on peut conseiller 10 mg d'**halopéridol (HALDOL)** en IV après la séance, à renouveler lors de la séance suivante.

**Effets endocriniens**

Prise de poids, trouble de la libido.

Dysménorrhée, aménorrhée, galactorrhée liée à l'hyperprolactinémie, surtout avec les **benzamidés (amisulpride : SOLIAN, sulpiride : DOGMATIL)**.

**Effets oculaires** : rétinites pigmentaires, dépôts cornéens.

**Effets dermatologiques** : rashes cutanés, pigmentation, réaction de photosensibilisation aux **phénothiazines (LARGACTIL)**.

**Effets digestifs** : hépatite cholestatique à la **chlorpromazine (LARGACTIL)**, hépatite cytotytique plus rare.

**Effets sanguins** : agranulocytose. Cet accident peut survenir avec tous les **antipsychotiques**, mais principalement avec la **clozapine** (0,5 à 1 % des prescriptions). Ce traitement impose une surveillance régulière et sa délivrance est conditionnée à la vérification hebdomadaire pendant 18 sem. puis mensuelle de la numération formule sanguine.

**Syndrome malin des antipsychotiques  
(neuroleptiques)**

Bien que son incidence soit réputée faible (0,5 %), il est de gravité exceptionnelle (mortalité de 20 à 30 % des cas sans traitement, de

10 % avec traitement). Il serait observé chez le sujet jeune, de sexe masculin, lors d'injections répétées d'**antipsychotiques** incisifs et lors de troubles organiques associés. Il doit être redouté et recherché systématiquement devant toute fièvre inexpliquée sous **antipsychotiques**. Les autres signes rencontrés sont : torpeur, confusion, pâleur, sueurs, rigidité extrapyramidale diffuse, instabilité tensionnelle, tachycardie. Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose, une élévation des enzymes hépatiques et des CPK.

Devant le moindre signe suspect, il est impératif d'arrêter les **antipsychotiques** et de mettre en place un traitement et une surveillance médicale.

Dans les formes graves, le malade est transféré en réanimation. On propose alors des traitements à base de **dantrolène**, de **PARLODEL**, voire des **corticoïdes**. Certains ont proposé un traitement par **nifédipine (ADALATE)**. Le syndrome malin est apparenté aux hyperthermies malignes sous anesthésie, aux catatonies létales. On discute actuellement de l'intérêt thérapeutique des sismothérapies. Le traitement symptomatique est fondamental.

Le risque de récurrence est inconnu, mais serait estimé à 50 %. Après 2 à 3 sem. d'arrêt des **antipsychotiques**, on proposera une molécule d'une classe différente ou un **antipsychotique** de famille différente à faible dose avec une surveillance étroite de la température.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association à la **lévodopa** est déconseillée en raison d'un antagonisme réciproque. Les **antipsychotiques** peuvent potentialiser les **antihypertenseurs** et les dépresseurs du SNC. L'association au **lithium** serait confusogène. La coprescription de **DÉPAMIDE** ou **DÉPAKOTE** entraîne l'équivalent d'une augmentation de 30 à 40 % des doses de **antipsychotiques**.

## SCHIZOPHRÉNIE (3)

### Choix de la posologie

C'est souvent un compromis entre la dose produisant le maximum d'efficacité et la dose induisant un minimum d'effets indésirables. Il n'existe pas de courbe dose-réponse avec les **AP**. Il est recommandé d'atteindre la posologie optimale efficace en augmentant progressivement les doses sur 3 à 7 j.

À titre d'exemple : **rispéridone (RISPERDAL)** : 4 j à 8 mg/j en 2 prises ; **olanzapine (ZYPREXA)** : 5 à 20 mg/j en 1 prise ; **aripiprazole (ABILIFY)** : 10 à 30 mg/j en une prise ; **quétiapine (XEROQUEL)** 300 mg/j à J1 et 600 mg à J2. La posologie quotidienne recommandée est de 600 mg, mais elle peut être augmentée jusqu'à 800 mg/j suivant les besoins cliniques ; **amisulpride (SOLIAN)** : 400 à 800 mg/j en 2 à 3 prises ; **halopéridol (HALDOL)** : 1 à 20 mg/j en 1 à 2 prises ; dans certains cas exceptionnels, la posologie pourra être augmentée jusqu'à 40 mg/j maximum.

À l'exception des formes aiguës avec une angoisse et une agitation importantes qui peuvent justifier l'association de traitements sédatifs (type **cymémazine : TERCIAN** ou **lévomépromazine : NOZINAN** : entre 100 à 400 mg/j), on préférera les monothérapies **AP**.

Les formes orales d'absorption rapide (**gouttes ou comprimés dispersibles**) seront préférées à l'utilisation des formes injectables, sauf cas particuliers. En cas de refus de soins ou de non-compliance, on n'hésitera pas à recourir à des formes injectables. L'utilisation des **formes retard** chez les patients non observants peut être envisagée, après évaluation préalable de leur tolérance au moyen des formes classiques.

### Surveillance

Concernant la tolérance, on surveillera principalement l'apparition d'effets indésirables de type neurologique et neurovégétatif : dystonie et dyskinésie aiguë, syndrome parkinsonien avec hypertonie extrapyramidale, bradykinésie et tremblements, hypotension orthostatique.

En cas de survenue d'épisodes dyskiné-

tiques ou dystoniques, on pourra soit réduire les doses soit associer un correcteur antiparkinsonien : **tropatépine (LEPTICUR)** 1 cp. x 2/j ou **bipéridène (AKINETON LP)** : 1 cp. x 2/j.

L'effet thérapeutique d'un **AP** ne peut être apprécié que sur 4 à 6 sem. Souvent on observe au cours des premiers jours une baisse de l'agitation, une réduction de l'angoisse et de l'insomnie qui annoncent souvent une activité antipsychotique. La réduction de l'activité délirante, l'action sur les symptômes de désorganisation apparaissent plus tardivement et plus progressivement.

Toute fièvre inexplicable doit faire évoquer en premier lieu l'apparition d'un syndrome malin aux antipsychotiques (neuroleptiques) et faire interrompre le traitement.

### Conduite à tenir en cas d'échec du traitement

En général, on estime à 60 % le taux de malades qui présentent une rémission quasi complète de la symptomatologie positive après 6 sem. de traitement **AP**. En cas de réponse thérapeutique limitée, plusieurs stratégies sont possibles. Après s'être assuré de la bonne observance du traitement, parfois en contrôlant les taux plasmatiques, on peut :

- augmenter les doses ; certains sujets tirent profit en effet de doses importantes d'**AP** (**olanzapine : ZYPREXA** 20 mg/j, **amisulpride : SOLIAN** 800 à 1 200 mg/j, **halopéridol : HALDOL** 20 à 40 mg/j) ;
- changer d'**AP** pour une molécule d'une classe différente ;
- proposer des sismothérapies.

Les sismothérapies ou ECT dans la schizophrénie sont indiquées préférentiellement dans les formes aiguës avec des symptômes affectifs (dépressifs ou maniaques) et dans les formes catatoniques. Les formes catatoniques, souvent périodiques, de schizophrénie constituent une contre-indication relative aux **AP** en raison du risque accru de syndrome malin. On utilise habituellement une **benzodiazépine** à fortes doses (ex. : **lorazépam, TEMESTA** 4 à 10 mg/j) ou le recours à l'ECT en urgence associés aux mesures réanimatoires dans les formes très sévères.

## SCHIZOPHRÉNIE (4)

Certains auteurs parlent de schizophrénie résistante après échec de deux cures successives d'AP de classes différentes pendant une durée minimale de 6 sem. pour chacun d'eux.

Dans ces formes de schizophrénie résistante, l'emploi de la **clozapine (LÉPONEX)** permet d'obtenir des résultats parfois spectaculaires. Le risque élevé d'agranulocytose impose une surveillance hebdomadaire de la NFS pendant 18 sem.

### Traitement de consolidation

Les traitements de consolidation et de maintenance ont pour objectif de réduire les risques de rechute et de récidive. Il est actuellement admis que le risque de rechute est deux fois plus élevé sous placebo que sous AP. 65 % des patients rechutent dans l'année qui suit un épisode aigu en cas d'arrêt des AP.

Dans le traitement des troubles schizophréniques on propose un traitement d'au moins 2 ans pour un 1<sup>er</sup> épisode. Lors d'un 2<sup>e</sup> épisode, on préconise un traitement antipsychotique pendant 4 à 5 ans. Après un 3<sup>e</sup> épisode, le traitement antipsychotique sera administré pour des durées prolongées voire à vie.

Tout traitement par AP au long cours s'inscrit dans une stratégie thérapeutique globale qui va au-delà d'une simple prescription symptomatique. Un certain nombre de règles de prescription doivent être respectées :

- une monothérapie antipsychotique ;
- la dose la plus faible possible, par exemple **halopéridol (HALDOL)** : 2 à 4 mg/j. Le risque de dyskinésie tardive dépend en particulier de la dose totale reçue de l'AP ;
- les cures continues sont préférables ;
- choisir l'AP qui a permis de traiter l'accès aigu ;
- les formes à action prolongée (APAP) sont réservées aux patients non compliant ou demandeurs de ce type de traitement. Ce type de conditionnement permet souvent de délivrer des doses plus faibles que lors d'administration par voie orale.

### Symptômes négatifs et traitements antipsychotiques

Sur le plan diagnostique il est difficile de différencier les symptômes négatifs primaires liés à la pathologie, des symptômes négatifs secondaires à un défaut de stimulation environnementale, à un syndrome dépressif ou à une indifférence psychomotrice liée au traitement par l'antipsychotique.

Certains auteurs ont distingué une forme déficitaire de la schizophrénie. Dans cette forme, les symptômes négatifs sont primaires. Ils apparaissent précocement, sont stables dans le temps, sont souvent associés à des anomalies cérébrales et semblent résistants aux AP. Sur le plan thérapeutique, les symptômes négatifs de la schizophrénie sont souvent moins sensibles aux AP.

Parmi les AP classiques, certains produits qualifiés de bipolaires seraient efficaces à faible dose sur la symptomatologie négative : **pimozide (ORAP)** : 1 à 3 mg/j ; **pipotiazine (PIPORTIL)** : 2 à 6 mg/j ; **amisulpride (SOLIAN)** : 50 à 300 mg/j, **aripiprazole (ABILIFY)** 2,5- 5mg/j. Seul l'**amisulpride (SOLIAN)** a démontré son efficacité sur les formes déficitaires pures, à des posologies comprises entre 50 et 300 mg/j.

Les APA seraient intéressants dans les formes négatives de schizophrénie. En bloquant sélectivement les récepteurs D2 extrastriataux et par leurs propriétés antagonistes 5HT<sub>2</sub>, ces antipsychotiques produiraient moins de syndromes extrapyramidaux et auraient un effet direct sur les symptômes négatifs primaires.

Contrairement aux antipsychotiques classiques, ils peuvent être utilisés aux doses habituelles recommandées pour les épisodes.

Ex. : **rispéridone (RISPERDAL)** : 4 mg/j pour les épisodes psychotiques aigus ; **olanzapine (ZYPREXA)** : 10 mg /j.

Les propriétés antidéficitaires de la **clozapine** sont probablement similaires bien que controversés.

## SCHIZOPHRÉNIE (5)

Face à ces symptômes négatifs de la schizophrénie, et en articulation avec les traitements chimiothérapeutiques, on proposera précocement des mesures psychothérapeutiques, sociothérapeutiques et des prises en charge institutionnelles.

Les **AP** ont fait la preuve de leur efficacité depuis 50 ans dans le traitement des schizophrénies, et en particulier sur la symptomatologie positive. Dans certaines situations cliniques (agitation, symptômes dépressifs, etc.), d'autres types de psychotropes peuvent être employés (**benzodiazépines**, **antidépresseurs**, etc.).

### Consolidation : médicaments adjoints

#### Antidépresseurs

L'emploi des **antidépresseurs** dans le traitement des troubles schizophréniques fait encore l'objet de discussion : les symptômes dépressifs qui accompagnent les phases aiguës réagissent bien au traitement **antipsychotique** seul et le recours à des **antidépresseurs** peut être parfois néfaste durant ces périodes aiguës.

L'emploi des **antidépresseurs** se justifie essentiellement lors des phases aiguës dépressives d'un trouble schizo-affectif.

Les dépressions post-psychotiques qui suivent souvent les moments féconds schizophréniques représentent une véritable complication de la maladie. Distincts des effets indésirables des **AP** ou des symptômes négatifs, ces épisodes dépressifs majeurs, en raison du risque suicidaire important qui les accompagne, justifient pleinement l'usage d'un **antidépresseur**. La cure d'**antidépresseur** chez le schizophrène est identique à celle du déprimé non schizophrène. Le risque de réactivation psychotique sous **antidépresseur**, bien qu'assez faible, n'est pas totalement

nul. En cas de majoration des signes psychotiques, on augmentera simplement les doses d'**AP**.

Les **antidépresseurs** ont également été proposés dans le traitement des symptômes négatifs de la schizophrénie en dehors de toute symptomatologie dépressive. Certains travaux ont pu ainsi montrer l'intérêt de la **fluvoxamine (FLOXYFRAL)**, de la **fluoxétine (PROZAC)** dans cette indication. Les **ISRS** sont proposés dans le traitement des troubles obsessionnels-compulsifs qui peuvent s'ajouter aux troubles schizophréniques.

#### Anxiolytiques

Les anxiolytiques, type **benzodiazépines**, peuvent être utilisés pour traiter les symptômes anxieux et les troubles du sommeil lors des phases aiguës. À très fortes doses, les **benzodiazépines** auraient des effets antipsychotiques.

Les **benzodiazépines** sont également indiquées dans le traitement des akathisies induites par les **AP (SÉRESTA ou VALIUM)**.

La prescription au long cours des **benzodiazépines** n'est pas justifiée, en raison du risque de pharmacodépendance.

#### Thymorégulateurs

Les **thymorégulateurs** sont proposés comme traitement préventif et curatif des troubles schizo-affectifs (schizophrénie dysthymique).

En présence de troubles de l'humeur, les **thymorégulateurs**, en particulier les **anticonvulsifs**, pourraient être un appoint ou une alternative intéressante en tant que traitement symptomatique.

Le **lithium**, la **carbamazépine**, l'**acide valproïque** seront associés à des **AP**.

les **thymorégulateurs anticonvulsifs** peuvent être utiles également pour réduire l'impulsivité et l'agressivité.

## SCHIZOPHRÉNIE (6)

### Psychothérapies

Il existe un consensus pour affirmer la nécessité d'un abord thérapeutique multi-dimensionnel des troubles schizophréniques.

L'association des **AP** aux psychothérapies est souvent plus efficace que le recours à l'un ou l'autre traitement seul. On propose dans la schizophrénie des psychothérapies individuelles, de groupe, et des psychothérapies familiales.

#### Psychothérapies individuelles

Les psychothérapies de soutien sont les plus couramment utilisées. Directives, elles permettent l'instauration d'une relation de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Elles visent à faire accepter au patient sa maladie, ses traitements et à l'aider dans son adaptation à la réalité.

La schizophrénie et les troubles psychotiques représentent une contre-indication classique à la psychanalyse. Pour certains patients, des aménagements techniques sont cependant possibles, à condition d'intégrer cette psychothérapie d'inspiration analytique dans un projet global.

*Thérapies cognitives* : elles sont conçues pour améliorer le fonctionnement cognitif et social, diminuer l'intensité et l'impact des idées délirantes et/ou des hallucinations sur le fonctionnement, pour améliorer l'adhésion au traitement et la prise de conscience de la maladie. Elles ont été validées par de nombreuses études contrôlées [1].

*Thérapies comportementales et psycho-éducatives* : elles permettent aux patients d'améliorer leur adaptation, leur fonctionnement social dans la vie quotidienne en

compensant les déficits liés à la maladie par un apprentissage et un entraînement, elles permettent également aux patients de s'approprier leur traitement, améliorer l'adhésion aux soins et diminuer le risque de rechute (éducation au traitement antipsychotique).

*Techniques d'affirmation de soi* : elles permettent au patient de repérer et de développer son intégration dans la société.

*Entraînement aux habiletés sociales* : les habiletés sociales sont les modes de réponses spécifiques qui caractérisent la communication verbale et non verbale et la capacité d'adaptation au contexte. Des tâches de difficulté croissante sont décomposées en micro-comportements qui sont appris ou réappris grâce à des jeux de rôle ou des exercices en milieu naturel. Ces techniques, validées au plan international, ont fait leurs preuves dans le domaine de l'adaptation sociale.

*Rééducation cognitive* : s'appuyant sur le modèle de la rééducation neuropsychologique, elle est supposée favoriser une réorganisation anatomique et/ou fonctionnelle. Elle vise à restaurer des fonctions déficitaires (attention, mémoire, etc.).

#### Psychothérapies de groupe

En dehors des groupes de parole proposés aux patients lors des hospitalisations, les psychothérapies d'inspiration cognitivo-comportementale sont en pleine expansion. Elles visent à développer les compétences relationnelles et sociales des patients. Ces thérapies de groupes sont parfois proposées sous la forme de différents modules thérapeutiques : entraînement aux habiletés sociales, entraînement à la résolution de problèmes, éducation au traitement antipsychotique, contrôle des symptômes, etc.

## SCHIZOPHRÉNIE (7)

### Psychothérapies familiales

Il est capital d'associer la famille et l'entourage à la prise en charge médicamenteuse et institutionnelle du patient et ce d'autant plus qu'ils sont en mesure de transmettre des informations qu'ils jugent capitales. Ceci favorisera l'alliance thérapeutique, déculpabilisera et soutiendra les proches dans les difficultés de vie quotidienne y compris dans les situations de crise.

Le travail avec les familles ne doit pas se limiter à une seule approche. Il doit s'intégrer à la prise en compte de l'environnement global du patient: en accord avec le patient, on informera au plus tôt les familles des modes de prise en charge et des possibles évolutions de la maladie; la participation à des groupes de parole est recommandée aux familles; des conseils sur les attitudes à avoir face à certains

symptômes, des thérapies familiales, une réflexion et une attention particulières doivent être accordées à la fratrie qui a grand besoin d'information et de soutien [1].

### Soins institutionnels et troubles schizophréniques

La schizophrénie a un retentissement social souvent très important. Des structures alternatives à l'hospitalisation psychiatrique prolongée se sont progressivement développées : hôpitaux de jour, de nuit, foyer d'hébergement, appartement thérapeutique, atelier protégé, centre d'aide par le travail, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Ces structures visent à mettre en place un dispositif sanitaire et une dynamique de réinsertion, de réadaptation et de réhabilitation psychosociales, adaptés au cas particulier de chaque patient.

### CONSENSUS

[1] Schizophrénies débutantes : diagnostic et modalités thérapeutiques, FFP selon la méthodologie de l'Anaes, 2003

## TROUBLES DÉLIRANTS PERSISTANTS (1)

### Classification

Historiquement les délires chroniques occupaient une place non négligeable dans la nosologie psychiatrique européenne. Il était ainsi classique de décrire plusieurs psychoses chroniques non schizophréniques :

- les **délires paranoïaques** passionnels (de jalousie, érotomanie, de revendication), d'interprétation systématisés, de relation des sensitifs ;
- les **délires paraphréniques** ;
- la **psychose hallucinatoire chronique**.

Actuellement dans la CIM-10, les délires chroniques sont classés dans les catégories schizophrénie (psychose hallucinatoire chronique) et troubles délirants persistants (délires paranoïaques et paraphréniques).

Le groupe des troubles délirants persistants réunit plusieurs troubles caractérisés principalement par la présence d'*idées délirantes persistantes* et qui ne peuvent être classés parmi les troubles schizophréniques, les troubles organiques ou affectifs.

Les troubles délirants persistants apparaissent ainsi comme une catégorie diagnostique très hétérogène définie principalement par rapport aux délires schizophréniques.

Certaines enquêtes ont estimé la prévalence des troubles à **25 pour 100 000**. Il s'agit donc d'une catégorie diagnostique assez rare.

Certains facteurs environnementaux favoriseraient l'émergence de ces troubles : l'immigration, un milieu social défavorisé, un handicap sensoriel. Observés à tout âge, les délires chroniques débutent plutôt tardivement, après 40 ans, et seraient un peu plus fréquents chez la femme.

### Caractères

Les troubles sont caractérisés par la présence d'une ou plusieurs idées délirantes persistant au moins trois mois (définition de la CIM-10).

Le contenu de ces idées délirantes est variable, mais non bizarre comme dans la schizophrénie, c'est-à-dire correspondant

à des situations rencontrées dans la réalité : être poursuivi, persécuté, trompé ou aimé à distance. On rencontre aussi des délires à thèmes de grandeur ou d'hypochondrie. Les hallucinations sont absentes ou discrètes, devant alors faire reconsidérer le diagnostic.

Les troubles peuvent s'accompagner d'une humeur dépressive voire d'une excitation, mais les idées délirantes restent présentes en dehors de ces troubles de l'humeur.

L'examen d'un délirant chronique aura pour objectif d'évaluer le degré d'ancienneté du trouble, l'adhésion du malade au délire, le degré de sthénicité, voire de dangerosité. La présence d'un **persécuteur désigné** signe à la fois le caractère ancien et potentiellement dangereux du trouble. Il faut rechercher la présence de facteurs organiques ou toxiques qui peuvent favoriser le délire.

### Évolution et pronostic

Du fait du caractère très hétérogène de cette catégorie de troubles, il est difficile de systématiser l'évolution et le pronostic. On peut observer la **persistance** au long cours du délire, soit sous une forme très active, soit sous une forme atténuée. L'adaptation sociale est fonction du caractère envahissant du délire. Certaines variétés de délire chronique, comme les délires **paraphréniques**, permettent le maintien d'une adaptation sociale très bonne.

Les troubles délirants persistants évoluent parfois sur un mode récurrent avec alternance de périodes de rémission symptomatique et d'exacerbation délirante, posant la question d'un lien de parenté avec les troubles maniaco-dépressifs.

### Traitement

Il n'y a pas de stratégie thérapeutique bien codifiée pour le traitement des troubles délirants persistants. Le traitement repose principalement sur les **antipsychotiques (AP)** et l'instauration d'un cadre thérapeutique visant à préserver l'insertion sociale du malade et à éviter les complications médico-légales.



## TROUBLES DÉLIRANTS PERSISTANTS (2)

### Cadre thérapeutique

C'est à l'occasion d'une majoration du délire ou de l'apparition de troubles majeurs du comportement que ces malades rencontrent les psychiatres. L'hospitalisation en début de traitement est le plus souvent indispensable.

Les délirants chroniques acceptent rarement les soins et sont fréquemment hospitalisés sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT ou soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État : SPDRE). Si le signataire de SPDT risque d'être désigné comme persécuteur, il est préférable de recourir à une SPDRE. Cette mesure de contrainte comporte en elle-même un caractère thérapeutique.

#### ► Délires paranoïaques

Ils répondent classiquement mal aux **AP** qui s'attaquent peu aux interprétations délirantes.

Les **AP** sont utilisés dans le but de réduire la sthénicité délirante.

Ex. : **rispéridone (RISPERDAL)** 4 à 8 mg/j.

Le délire des relations des sensitifs de Kretschmer caractérisé par des idées délirantes de référence, des idées de persécution centrées sur l'entourage, souvent professionnel, survient dans un contexte dépressif. Ce trouble doit être considéré comme une variété de dépression délirante avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur. Le traitement fait appel principalement aux **anti-dépresseurs** associés à des **AP** incisifs à dose moyenne.

Ex. : **citapram (SEROPRAM)** 20 mg/j et **olanzapine (ZYPREXA)** : 10 mg/j. Les formes récidivantes et périodiques peuvent bénéficier d'une prévention par les **thymorégulateurs**.

#### ► Psychose hallucinatoire chronique

Elle répondrait à des doses plus faibles de **AP** incisifs (**halopéridol** : **HALDOL** 3 à 6 mg/j ou **pimozide** : **ORAP** 2 à 6 mg/j). Il est fréquemment nécessaire d'adjoindre un **anti-dépresseur** voire un **thymorégulateur** dans les formes récurrentes.

#### ► Paraphrénies

Les paraphrénies sont un groupe très hétérogène avec des troubles affectifs, des formes délirantes majeures et des formes organiques. Elles répondent partiellement aux **AP**.

On assiste rarement à une réelle critique des idées délirantes. Après plusieurs semaines de traitement on remarque surtout une mise à distance du délire, une plus grande collaboration du patient et une meilleure acceptation des soins.

Les **AP** doivent être utilisés de manière prolongée dans les troubles délirants persistants. Il n'existe pas à l'heure actuelle de recommandation sur la durée précise de prescription. En général, compte tenu de la faible compliance au soin de ces patients, il est conseillé d'employer des **AP retard**.

On sera attentif à la survenue assez fréquente de décompensation dépressive.

### Prise en charge au long cours

Le caractère par définition persistant de ces troubles justifie la mise en place d'un suivi médico-social et d'un soutien relationnel au long cours. Les relations avec ces malades n'étant pas toujours simples, il est préférable d'inscrire ce suivi psychiatrique dans des structures institutionnelles type secteur.

Les psychothérapies structurées type psychanalyse sont contre-indiquées avec ce type de patient méfiant et interprétant.

## ALCOOLISME (1)

L'alcoolisme peut se définir comme un trouble des conduites se caractérisant par l'abus ou la dépendance à l'alcool.

### **Intoxication alcoolique aiguë**

L'état d'ivresse aiguë simple ou pathologique (excitomotrice, thymique, délirante, hallucinatoire ou convulsive) se manifeste par l'association des troubles du comportement (comportement sexuel ou agressif inapproprié), d'une labilité de l'humeur, altération du jugement et du fonctionnement social ou professionnel, d'une excitation psychomotrice ou d'une incoordination motrice avec une démarche ébrieuse, de troubles de la vigilance (nyctagmus, altération de l'attention, somnolence, coma).

### **Abus d'alcool**

Un certain nombre de cas de consommation pathologique de l'alcool ne correspondent pas au diagnostic de dépendance. Cette consommation répétée de l'alcool est caractérisée par :

- des effets indésirables significatifs ;
- des conséquences négatives répétées et qui durent au moins depuis 12 mois ;
- l'incapacité de remplir des obligations majeures dans le domaine socioprofessionnel ;
- une mise dans des situations de danger physique (conduite en état d'ivresse) ;
- des problèmes judiciaires répétés liés à cette consommation.

### **Dépendance alcoolique**

Toute conduite d'alcoolisation caractérisée par une perte de la maîtrise de sa consommation par le sujet. L'usage avec dépendance ne se définit donc ni par le rapport à des seuils de consommation, ni par l'existence de dommages induits qui néanmoins sont le plus souvent associés. La dépendance est définie par plusieurs critères :

- tolérance : augmentation de la consommation pour maintenir un effet constant (ou effet diminué en cas de consommation stable) ;

– syndrome de sevrage caractéristique en cas d'arrêt de la consommation (dépendance qualifiée de « physique »), consommation du produit pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage ;

- consommation souvent plus importante ou plus prolongée que prévue ;
- désir ou efforts infructueux pour contrôler la consommation ;
- importance du temps consacré à rechercher, à consommer et à récupérer des effets de la substance ;
- réduction des activités sociales à cause de la consommation ;
- poursuite de la consommation en dépit de la conscience de ses conséquences néfastes.

Ces critères s'appliquent à l'alcool pour définir la dépendance alcoolique. Le diagnostic de dépendance ne peut être porté qu'après 12 mois d'évolution au moins. Le mode de consommation devient compulsif avec la réduction de la variété des modes de consommation.

### **Intoxication alcoolique chronique**

La consommation régulière d'une quantité importante d'alcool entraîne des modifications cliniques (visage érythrosique, conjonctives subictériques, tremblements, myalgies, insomnies, dénutrition, etc.) et biologiques. D'autres manifestations somatiques : vomissements matinaux, crampes musculaires, hypertension modérée, tachycardie, œsophagite, toux chronique, modifications pondérales, autres complications digestives et hépatiques. Les conséquences neuropsychiatriques sont souvent graves et irréversibles : polynévrite, encéphalopathies carentielles (Gayet-Wernicke et Korsakoff par carence en vit. B1, B6, B12, PP, folates) ; démence alcoolique ; maladie de Marchiafava-Bignami (démélinisation puis la nécrose et atrophie du corps calleux) ; sclérose laminaire de Morel (lésions corticales fronto-temporales par gliose astrocytaire) ; atrophie cérébelleuse ; myélinolyse centro-pontine ; encéphalopathie portocave ; délire chronique.

## DÉSINTOXICATION ALCOOLIQUE (1)

## ■ Acamprosate

AOTAL					
Sevrage alcoolique :	60 cp. 333 mg	15,13	II	65 %	0,25
≥ 60 kg : 2 cp. matin, midi et soir	180 cp. 333 mg	42,76	II	65 %	0,24
< 60 kg : 2 cp. matin, 1 cp. midi et 1 cp. soir					

**PROPRIÉTÉS**

Stimule le système GABAergique inhibiteur et antagონise les acides aminés excitateurs (glutamate).

**INDICATIONS**

Maintien de l'abstinence chez le sujet alcoolodépendant.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et **allaitement**.

Âge < 18 ou > 65 ans.

## ■ Chlorhydrate de naltrexone

REVIA					
Alcoolodépendance psychique :	28 cp. séc. 50 mg	36,07	I	65 %	1,29
1 cp. le matin pendant 3 mois					

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste des opiacés. Pas d'effet antabuse.

**INDICATIONS**

Maintien de l'abstinence chez les patients alcoolodépendants.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **naltrexone**, insuffisance hépatocellulaire ou hépatite aiguë, dépendance aux **opiacés** (risque de syndrome de sevrage aigu), âge supérieur à 60 ans.

**Grossesse** : déconseillé.

**Allaitement** : déconseillé.

## ■ Disulfirame

ESPÉRAL					
Sevrage alcoolique : 1 cp. le matin à jeun, puis diminuer à 1/2 cp.	20 cp. séc. 500 mg	2,56	I	65 %	0,13

**PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de l'acétaldéhyde-déshydrogénase provoquant un effet antabuse (malaise, tachycardie, hypotension artérielle, nausées, vomissements).

**INDICATIONS**

Maintien de l'abstinence chez le sujet alcoolodépendant.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : contre-indiqué.

**Allaitement** : contre-indiqué.

Insuffisance hépatique grave notamment cirrhose classée Child C.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Durée recommandée de traitement : 1 an.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, prurit, troubles de la libido.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de syndrome de sevrage grave d'installation rapide (5 min) et durable (48 h) chez les sujets dépendants aux **opiacés**. Surveillance des fonctions hépatique et rénale. Durée recommandée de traitement : 3 mois.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Céphalées, nausées, vomissements, insomnies, douleurs abdominales, asthénie, somnolence, myalgie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Insuffisance hépatique ou respiratoire sévère, diabète, comitalité, insuffisance coronarienne, prise d'alcool récente (inférieure à 24 h), troubles psychiques graves, neuropathie périphérique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool (effet antabuse avec risque de collapsus cardiovasculaire, de troubles du rythme, d'angor, d'œdème cérébral ou d'hémorragie méningée), **isoniazide**, **nitro-5-imidazolés**, **phénytoïne** (troubles neuropsychiques), **warfarine** (risque hémorragique).

## ALCOOLISME (2)

**Bilan paraclinique chez l'alcoolique**

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine.
- NFS, VS, CRP.
- Bilan hépatique (ALAT/ASAT, gamma GT, phosphatases alcalines, bilirubine).
- Hémostasie (TP/TCA, facteur V).
- Électrophorèse des protéines.
- Échographie abdominale.
- Gastroskopie.
- Fond d'œil.
- TDM cérébrale, EEG, EMG.
- Tests psychométriques.

**Sevrage alcoolique**

Consécutif à un état d'ivresse aiguë ou résultant d'une demande motivée du patient, il peut nécessiter une prise en charge en milieu hospitalier afin d'isoler le sujet, de réaliser un bilan somatique et de prévenir un delirium tremens quelques jours après l'arrêt brutal de l'alcool.

**Signes cliniques du delirium tremens**

- Troubles de la conscience, désorientation temporo-spatiale, état d'agitation confuso-onirique, insomnie
- Agitation avec risque de passage à l'acte
- Tremblement intense généralisé, prédominant aux extrémités et à la langue
- Hypertonie oppositionnelle
- Délire hallucinatoire visuel et cénesthésique, le malade pouvant vivre activement des scènes d'onirisme
- Symptômes délirants majorés par l'obscurité
- Troubles végétatifs (fièvre, sueurs, vomissements, tachycardie, troubles tensionnels) et signes généraux
- Modifications biologiques (déshydratation, cétonurie, acidose métabolique, hypokaliémie
- Crises convulsives

L'évaluation est souvent défavorable avec le taux de mortalité qui peut atteindre 50 %.

**Traitement immédiat**

- **Hospitalisation** en chambre seule et éclairée.

- **Réhydratation** par 3 à 4 L de sérum glucosé à 5 % avec 4 g de NaCl/L et 2 g de KCl/L, à adapter en fonction de l'ionogramme sanguin et de l'état d'hydratation.

- **Vitaminothérapie B1** (1 g/j) en IV pendant 1 sem. Le sevrage peut favoriser l'apparition de troubles graves neurologiques ou cardiaques par carence en thiamine, en particulier en cas d'apport glucosé associé. Il est nécessaire d'administrer de la **thiamine** (500 mg/j) à tout patient débutant un sevrage. L'administration parentérale, de préférence par perf. IV, doit être préconisée pendant la 1<sup>re</sup> sem., puis relais par vitaminothérapie *per os* B1, B6, PP.

- **Traitement sédatif et préventif des épilepsies de sevrage** par **benzodiazépines**, **diazépam (VALIUM)** 10 à 60 mg/j, posologie adaptée en fonction des signes végétatifs de sevrage. En cas d'insuffisance hépatique, on préférera l'**oxazépam (SÉRESTA)**.

- **Traitement d'un éventuel facteur déclenchant** (hémorragie digestive, état infectieux, diabète, pancréatite, etc.).

- **Traitement antipsychotique** en cas d'agitation majeure ou symptomatologie non contrôlable par les **benzodiazépines**. Ex. : **tiapride (TIAPRIDAL)** 100 à 300 mg/j en 2 à 3 prises.

- **Surveillance clinique** (conscience, hydratation, diurèse, poids, température, pouls, PA) et biologique (ionogramme, protidémie, hématocrite, urée, créatinine, etc.).

**Prise en charge à long terme [1]**

La prise en charge à long terme des patients sevrés et présentant une dépendance à l'alcool repose sur une approche globale par des médecins expérimentés dans le suivi de ce type de patients dépendants, la fréquentation d'associations d'anciens buveurs, un travail psychothérapique (entretiens motivationnels, thérapie cognitivo-comportementale, médiation corporelle ou de groupe) et le recours à une chimiothérapie spécifique.

## DÉSINTOXICATION ALCOOLIQUE (2)

## ■ Nalméfène

<b>SELINCRO</b>					
À prendre chaque jour où le patient perçoit le risque de boire de l'alcool, de préférence 1 à 2 h avant une consommation d'alcool anticipée Max. 1 cp./j	7 cp. 18 mg		I	30 %	
	14 cp. 18 mg		I	30 %	
	28 cp. 18 mg		I	30 %	
	42 cp. 18 mg		I	30 %	
	98 cp. 18 mg		I	30 %	

**PROPRIÉTÉS**

- Antagoniste des récepteurs opioïdes  $\mu$  et  $\delta$ .
- Agoniste partiel des récepteurs opioïdes  $\kappa$ .

**INDICATIONS**

Réduction de la consommation d'alcool chez les patients :

- adultes dépendants à l'alcool,
- avec une consommation d'alcool à risque élevé qui persiste 2 sem. après l'évaluation initiale,
- sans symptôme physique de sevrage et ne nécessitant pas un sevrage immédiat,
- en association à un suivi psychosocial continu.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.

ATCD récent de dépendance aux opioïdes, symptômes aigus du syndrome de sevrage aux opioïdes, consommation récente d'opioïdes.

ATCD récent de syndrome de sevrage alcoolique (avec hallucinations, convulsions et *delirium tremens*).

Insuffisances hépatique et/ou rénale sévères.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Non recommandé chez la femme enceinte et pendant l'allaitement (manque de données).

Prudence chez les patients atteints de troubles psychiatriques, de troubles convulsifs, insuffisants rénaux ou hépatiques, âgés.  
Contient du lactose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents : insomnie, vertiges, céphalées, nausées.

Fréquents : diminution de l'appétit, troubles du sommeil, état confusionnel, baisse de libido, somnolence, tremblements, paresthésie, vomissements, tachycardie, etc..

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqués : **analgésiques opioïdes** (diminution de l'activité voire effet nul des opioïdes) :

– interruption de **SELINCRO** pendant la sem. qui précède une administration prévue d'**opioïdes** ;

– si administration en urgence nécessaire, augmentation de la posologie de l'**opioïde** et surveillance étroite du patient (fonction respiratoire) ;

– penser aux sirops **antitussifs** et **antidiarrhéiques** contenant des opioïdes.

Augmentation de l'exposition au **nalméfène** : **diclofénac**, **fluconazole**, **médoroxyprogesterone**, acide méfénamique.

Diminution de l'exposition au **nalméfène** : **dexaméthasone**, **phénobarbital**, **rifampicine**, **oméprazole**.

## ALCOOLISME (3)

► *Psychothérapies*

Les thérapies cognitives et comportementales permettent au sujet d'élaborer et d'utiliser des stratégies pour le maintien de l'abstinence. Compatibles entre elles ou avec d'autres approches psychothérapeutiques (par exemple de type analytique), on peut citer :

- les entretiens motivationnels cherchant à renforcer la motivation ;

- l'entraînement aux stratégies de *coping*. Cette approche comporte 3 composantes : entraînement à la prévention de la rechute, aux compétences sociales et gestion des émotions négatives. L'entraînement aux stratégies comportementales semble plus efficace que la restructuration cognitive. Le travail cognitif prolonge le travail comportemental ;

- l'exposition au stimulus avec ou sans entraînement à la gestion de l'envie de boire ;

- le renforcement communautaire pour éliminer les renforcements positifs de l'alcoolisation et accroître les renforcements positifs de l'abstinence ;

- le renforcement de l'abstinence avec renfort systématique du comportement désiré et suppression des comportements non désirés.

Il apparaît essentiel chez tout patient à un moment donné de préciser son niveau de motivation. D'autres techniques classiques de la thérapie comportementale et cognitive peuvent être proposées au sujet alcoolodépendant sévère.

► *Pharmacothérapie*

- En 1<sup>re</sup> intention, afin de maintenir l'abstinence on choisira un médicament diminuant l'appétence pour l'alcool : **naltrexone (REVIA)** 1 cp./j, **acamprosate (AOTAL)** 4 à 6 cp./j. En 2<sup>e</sup> intention, et chez un patient informé des risques encourus, on pourra avoir recours à un médicament antabuse : **disulfirame (ESPÉRAL)** 1 cp./j.

- **Baclofène** et traitement de l'alcoolodépendance : myorelaxant d'action centrale, le **baclofène** est autorisé dans le traitement de la spasticité survenant au cours d'affections neurologiques. Des études expérimentales ont suggéré que, par ses

effets neurologiques, il entraîne un effet anxiolytique et aurait un effet sur la dépendance et sur l'appétence à l'alcool. Le traitement par **baclofène (LIORÉSAL)** dans l'alcoolodépendance ne peut être envisagé qu'au cas par cas, prescrit et surveillé par des praticiens expérimentés dans la prise en charge de l'alcoolodépendance avec une adaptation posologique individuelle et une surveillance rapprochée de la réponse thérapeutique et de la survenue des effets indésirables. La posologie à atteindre progressivement est élevée : jusqu'à 16 cp./j.

Dans un objectif qui n'est pas l'obtention d'une abstinence complète, mais réduction de la consommation, le **nal-méfène (SELINCRO 18 mg)** vient d'obtenir une AMM européenne. Il est utilisé pour aider à réduire la consommation d'alcool chez les adultes présentant une dépendance à l'alcool et qui en consomment plus de 60 g/j (pour les hommes) et plus de 40 g/j (chez les femmes). C'est un modulateur des récepteurs aux opioïdes agissant sur la structure cérébrale de la récompense. Il doit être utilisé uniquement en association avec un soutien psychosocial et seulement chez les personnes ne présentant pas de symptômes physiques de sevrage et ne nécessitant pas un sevrage immédiat. Ce traitement s'adresse aux patients à haut risque de consommation d'alcool 2 sem. après la 1<sup>re</sup> évaluation. Les cp. de **SELINCRO** doivent être pris à la demande, si le patient ressent l'envie de consommer de l'alcool (de préférence 1 à 2 h avant la consommation). L'administration peut être quotidienne sans dépasser 1 cp./j. Ce schéma posologique implique une anticipation de la part du patient.

► *Traitement de la comorbidité psychiatrique*

Il est essentiel. L'emploi d'**antidépresseurs** n'est recommandé qu'en présence d'un épisode dépressif majeur persistant après sevrage.

## CONFUSION MENTALE (1)

La confusion mentale est un syndrome non spécifique, aigu, qui associe des troubles de la conscience (qui vont de l'obnubilation au coma) de la mémoire et de l'attention, témoignant d'une atteinte cérébrale diffuse, le plus souvent réversible. Elle peut se traduire au plan comportemental par une stupeur ou une agitation anxieuse. La confusion varie au cours du nyctémère et est souvent associée à un onirisme (avec parfois un délire onirique), désorientation temporo-spatiale, troubles mnésiques et à des signes physiques (déshydratation, inversion du cycle nyctémeral, céphalées, tremblements, troubles neurovégétatifs, etc.). Après avoir éliminé les principaux diagnostics différentiels (syndrome démentiel, bouffée délirante aiguë, manie agitée, mélancolie stuporeuse, épisode catatonique ou dissociatif aigu), le syndrome confusionnel doit être considéré comme ayant une cause organique jusqu'à preuve du contraire.

### Recherche d'une étiologie organique

On précisera grâce à l'interrogatoire de l'entourage les antécédents médicaux, le mode de début du trouble, l'existence d'un facteur déclenchant, d'une carence nutritionnelle ou vitaminique. On procédera à un examen clinique complet (poids, température, PA) en recherchant tout particulièrement un signe évoquant une atteinte neurologique (signe de localisation, syndrome méningé, etc.), cardiaque, respiratoire, endocrinienne ou infectieuse. On procédera à des explorations complémentaires dont les résultats orienteront vers un diagnostic étiologique.

#### Examens paracliniques à pratiquer devant une confusion mentale

- Ionogramme sanguin (hyponatrémie)
- Glycémie (hypoglycémie)
- Calcémie (hypercalcémie)
- Urée, créatinine (insuffisance rénale)
- NFS, VS
- Bilan thyroïdien
- Bilan hépatique, amylasémie
- Recherche de toxiques (sang et urines), alcoolémie
- Gaz du sang (si anomalie respiratoire)
- Hémocultures, ECBU (si fièvre)
- Ponction lombaire
- Radio de thorax
- Fond d'œil, EEG
- TDM cérébrale

**Chez le sujet âgé**, certaines étiologies seront particulièrement recherchées : surdosage ou sevrage médicamenteux (**benzodiazépines**), infarctus du myocarde, état infectieux, déshydratation, globe vésical, hématome sous- ou extradural, privation de sommeil, déprivation sensorielle (surdité), changement de repères spatiaux (déménagement), mode d'entrée dans un processus démentiel.

**Chez l'alcoolique**, le diagnostic d'ivresse ne doit être retenu qu'après élimination de toutes les autres étiologies organiques de syndrome confusionnel.

#### Principales étiologies organiques des confusions mentales

- Neurologique : AVC, traumatisme crânien, tumeur cérébrale, hématome sous- ou extradural, méningite, hémorragie méningée, épilepsie, syndrome démentiel.
- Endocrinienne et métabolique : dysthyroïdie, Addison, Cushing, troubles hydro-électrolytiques, précoma diabétique, hypoglycémie, porphyrie, encéphalopathie hépatique, pancréatite, insuffisance rénale.
- Intoxication alcoolique : encéphalopathies carentielles : B1 (encéphalopathie de Gayet-Wernicke), B6, B12, PP (pseudopellagre alcoolique), folates ; ivresse, delirium tremens, encéphalopathie hépatique.
- Toxique et médicamenteuse : intoxication par surdosage médicamenteux (psychotropes, **antiparkinsoniens**, **corticoïdes**, etc.), par usage de drogues (**opiacés**, **amphétamines**, cannabis, trichloréthylène, etc.), par accident ou intoxication professionnelle (plomb, mercure, organophosphorés, CO, etc.) ou sevrage (**opiacés**, barbituriques, **benzodiazépines**, etc.).
- Cardiorespiratoire : infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, HTA, insuffisance respiratoire, etc.
- Infectieuse.

Après avoir éliminé une étiologie organique, on peut envisager une cause psychiatrique au syndrome confusionnel (confusion psychogène) :

- bouffée délirante aiguë ;
- psychose du post-partum ;
- manie ou mélancolie confuse ;
- catatonie dans le cadre d'une mélancolie ou d'une schizophrénie ;
- mode d'entrée dans un processus schizophrénique ou dans un délire chronique ;
- état de stress post-traumatique.

## CONFUSION MENTALE (2)

### Conduite thérapeutique immédiate

- Hospitalisation en urgence dans un service adapté à l'étiologie du syndrome confusionnel.
- Nursing.
- Bilan somatique complet.
- Correction des troubles hydroélectrolytiques par réhydratation *per os* ou en IV (4 à 6 L de sérum glucosé 5 % avec 4 g/L de NaCl et 2 g/L de KCl) avec, chez l'alcoolique, vitaminothérapie B1 (1 g/j) et B6 (500 mg/j).
- Arrêt de tout traitement confusionnant.
- Si agitation, traitement symptomatique

sédatif par **antipsychotique** : chlorpromazine, **LARGACTIL** 50 mg en IM, renouvelable ou par **benzodiazépine**, **clorazépate dipotassique**, **TRANXÈNE** 20 à 100 mg *per os* x 3/j chez l'alcoolique.

### Traitement étiologique

Il a évidemment une importance capitale.

### Surveillance clinique

- Conscience, pouls, PA, température, fréquence respiratoire, hydratation, diurèse et surveillance paraclinique, nursing, prévention des escarres.
- Évolution, en règle générale, favorable en 3 à 8 j suivant l'étiologie.



## TROUBLES DE L'HUMEUR (1)

### Rappel nosologique

La nosologie et le traitement des troubles de l'humeur se sont considérablement modifiés ces 20 dernières années sous l'impulsion à la fois des enquêtes épidémiologiques, l'introduction de nouvelles procédures thérapeutiques et l'apparition de nouvelles molécules antidépresseurs ou thymorégulatrices.

Ainsi la distinction classique entre les dépressions névrotico-réactionnelles (exogène) et les dépressions endogènes a disparu au profit d'un regroupement de l'ensemble des dépressions sous la catégorie diagnostique « épisode dépressif majeur ». De même le spectre des troubles maniaco-dépresseurs, rebaptisé trouble bipolaire, s'est « officiellement » élargi dans le DSM-IV et la CIM-10 avec la reconnaissance de la distinction entre les bipolaires de type I et type II.

Les troubles de l'humeur (affectifs) sont classés dans la CIM-10 ainsi :

- **épisode dépressif majeur** (léger, moyen, sévère, avec ou sans symptômes psychotiques) ;
- **trouble dépressif récurrent** caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs en l'absence d'épisodes maniaques ou hypomaniaques ;
- **épisode maniaque** (hypomanie ou manie avec ou sans symptômes psychotiques) ;
- **trouble affectif bipolaire** :
  - trouble bipolaire type I défini par la récurrence d'épisodes dépressifs, maniaques, hypomaniaques et mixtes,

– autres troubles affectifs bipolaires incluant les troubles bipolaires de type II définis par la récurrence d'épisodes dépressifs et hypomaniaques et l'absence d'épisodes maniaques ;

- **troubles de l'humeur persistant** :

- type cyclothymie,
- type dysthymie ;
- **autres trouble affectifs** :
  - épisode dépressif récurrent bref,
  - épisode mixte isolé.

La reconnaissance de nouveaux sous-types diagnostiques a modifié les chiffres de prévalence des troubles affectifs.

Par exemple, l'enquête réalisée aux États-Unis à la fin des années 1980 avec les critères du DSM-III montrait des taux de prévalence sur la vie entière, dans une population de 18 000 sujets de l'ordre de : **1,2 %** pour le trouble bipolaire, **3 %** pour les troubles dysthymiques, **4 %** pour la dépression majeure.

Certaines enquêtes plus récentes estiment la prévalence des troubles bipolaires (type I et II) à près de **5 %**.

La prévalence globale des troubles dépressifs vie entière se situe aux alentours de **10 %**.

Classiquement les dépressions sont plus fréquentes chez les femmes. Les troubles bipolaires auraient un *sex-ratio* voisin de 1. Le rôle des facteurs génétiques apparaît plus net dans les troubles bipolaires que dans le trouble dépressif récurrent. Les troubles bipolaires débutent assez tôt, souvent entre 20 et 30 ans et les troubles dépressifs, un peu plus tardivement aux environs de 35 ans.

## ANTIDÉPRESSEURS (1) – TRICYCLIQUES (1)

### ■ Clomipramine

<b>ANAFRANIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères chez les patients hospitalisés : 75 à 200 mg/j en 1 prise le soir	60 cp. 10 mg 50 cp. 25 mg 20 cp. 75 mg 5 amp. 25 mg/2 mL	3,14 5,37 6,27 2,87	I I I I	65 % 65 % 65 % 65 %	0,05 0,11 0,31 0,57
Troubles obsessionnels compulsifs : 100 à 200 mg/j					
Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie : 75 à 150 mg/j					
Énurésie nocturne de l'enfant : 10 à 25 mg/j					

### ■ Imipramine

<b>TOFRANIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères hospitalisés : 3 à 6 cp. 25 mg/j en 2 prises	60 cp. 10 mg 100 cp. 25 mg	2,11 4,65	I I	65 % 65 %	0,04 0,05
Énurésie nocturne de l'enfant : 10 à 50 mg/j					
Algie rebelle : 75 à 150 mg/j					

### ■ Amitriptyline

<b>LAROXYL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères hospitalisés : 75 à 150 mg/j	60 cp. 25 mg 100 cp. 25 mg 20 cp. 50 mg	4,41 HOP 3,55	I I I	65 % 65 % 65 %	0,07  0,18
Algies rebelles : 75 à 150 mg/j	800 mL sol. buv. 40 mg/mL	4,63	I	65 %	0,01
Énurésie de l'enfant : 10 à 50 mg/j	12 amp. 50 mg/2 mL	5,48	I	65 %	0,46
<b>ÉLAVIL</b>					
Idem <b>LAROXYL</b>	60 cp. 25 mg	4,41	I	65 %	0,07

## TROUBLES DE L'HUMEUR (2)

### Définitions

La caractéristique essentielle du groupe des troubles affectifs est l'apparition, soit de manière isolée soit de manière récurrente, **d'un changement de l'humeur et des affects**. Ce changement de l'humeur s'accompagne habituellement d'une **modification du niveau global d'activité**. Les autres symptômes sont soit secondaires à ces changements soit compréhensibles dans le contexte de ces modifications. La survenue de ces troubles peut être en rapport avec des événements ou des situations stressantes.

Il existe différentes formes d'épisode dépressif majeur :

- selon l'intensité : léger, modéré et sévère. L'appréciation de l'intensité des symptômes relève de l'évaluation clinique et éventuellement d'échelles validées. Elle est définie en fonction de l'évaluation du nombre, de l'intensité et du retentissement des symptômes dépressifs. Un épisode léger est défini par la présence de 5 symptômes dépressifs et d'une altération limitée du fonctionnement (social, professionnel, etc.), ou d'un fonctionnement normal mais au prix d'efforts importants et inhabituels. Un épisode sévère est défini par la présence de 8 ou 9 symptômes dépressifs correspondant aux critères et d'une altération du fonctionnement nette et observable. Une intensité modérée est intermédiaire entre légère et sévère ;

- selon l'existence de caractéristiques mélancoliques, éventuellement délirantes, pour les épisodes d'intensité sévère.

Les modalités évolutives de l'épisode dépressif majeur sont les suivantes :

- une rémission complète correspond à une disparition des symptômes et à un retour à un fonctionnement normal ;

- une rémission partielle correspond à une amélioration telle que l'individu ne répond plus aux critères diagnostiques de l'épisode dépressif majeur, tout en conservant des symptômes dépressifs, nommés symptômes résiduels ;

- un épisode dépressif résistant est un épisode n'ayant pas répondu à deux traitements antidépresseurs successifs bien conduits, c'est-à-dire à posologie efficace pendant une durée de 4 à 6 sem. ;

- une rechute dépressive correspond, après amélioration, à la réapparition de symptômes dépressifs au cours du même épisode dépressif ;

- une récurrence - ou récurrence - dépressive correspond à la survenue d'un nouvel épisode dépressif, après rémission complète d'au moins 2 mois.

L'épisode dépressif majeur peut être isolé et sans lendemain ou s'intégrer soit dans le cadre d'un trouble dépressif unipolaire récurrent, soit dans celui, plus rare, d'un trouble bipolaire de l'humeur, à rechercher systématiquement.

### Types d'épisodes thymiques

1 - Épisode dépressif majeur : le tableau clinique associe une tristesse de l'humeur, une diminution globale du niveau d'activité et de l'énergie, une fatigue importante, même après un effort minime, une perte d'intérêt, une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une diminution de l'aptitude à se concentrer. On observe habituellement des troubles du sommeil, et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère. Les symptômes doivent être présents depuis au moins 2 sem.

2 - Épisode maniaque : élévation de l'humeur, euphorie, hyperactivité, réduction du besoin de sommeil, logorrhée, augmentation de l'estime de soi, etc.

Les épisodes dépressifs et maniaques peuvent être légers, moyens, sévères avec ou sans caractéristiques psychotiques.

3 - Hypomanie : c'est une forme atténuée de manie.

4 - États mixtes : leur définition est l'objet de controverses. C'est un trouble fréquent et on estime que près de 30 % des épisodes maniaques seraient en fait des états mixtes.

## ANTIDÉPRESSEURS (2) – TRICYCLIQUES (2)

### ■ Dosulépine

<b>PROTHIADEN</b>					
Épisodes dépressifs majeurs :	50 gél. 25 mg	6,00	I	65 %	0,12
75 à 150 mg/j	20 cp. 75 mg	6,51	I	65 %	0,33

### ■ Amoxapine

<b>DÉFANYL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs :	25 cp. séc. 50 mg	5,89	I	65 %	0,24
75 à 150 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	12,69	I	65 %	0,42

### ■ Trimipramine

<b>SURMONTIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs :	50 cp. séc. 25 mg	7,79	I	65 %	0,16
75 à 150 mg/j	20 cp. séc. 100 mg	12,76	I	65 %	0,64
	1200 gtttes 1 mg (sol. buv. 30 mL)	8,43	I	65 %	0,01

### ■ Doxépine

<b>QUITAXON</b>					
Épisodes dépressifs majeurs :	40 cp. séc. 10 mg	2,16	I	65 %	0,05
75 à 150 mg/j	20 cp. séc. 50 mg	4,29	I	65 %	0,21
	10 amp. 25 mg/2 mL	2,57	I	65 %	0,26

## ANTIDÉPRESSEURS (3) – IMAO

### ■ Moclobémide

<b>MOCLAMINE</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères : 3 à 6 cp./j en 3 prises	30 cp. séc. 150 mg	8,81	I	65 %	0,29

### ■ Iproniazide

<b>MARSILID</b>					
Traitement de 2 <sup>e</sup> intention dans les épisodes dépressifs majeurs Posologie initiale : 1 à 3 cp./j Posologie d'entretien : 1/2 à 1 cp./j	30 cp. 50 mg	123,44	I	65 %	4,11

## TROUBLES DE L'HUMEUR (3) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (1)

### Troubles de l'humeur - épisodes dépressifs majeurs

#### Le traitement d'un épisode dépressif répond à trois objectifs principaux :

- induire une rémission complète : c'est le **traitement d'attaque** ;
- consolider cette rémission, afin de prévenir les rechutes (réactivation du même épisode) : **traitement de consolidation** ;
- guérir les patients et réduire les récurrences (apparition d'un nouvel épisode) : **traitement de maintenance**.

Il est recommandé de ne pas traiter par **antidépresseur** [1] :

- les symptômes dépressifs ne correspondant pas aux épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés, à savoir : symptômes isolés ou en nombre insuffisant pour remplir les critères DSM ou durée des symptômes dépressifs inférieure à 15 j ;
- les épisodes dépressifs caractérisés mais d'intensité légère, sauf en cas d'échec des autres stratégies.

Les **antidépresseurs** n'ont pas d'indication dans le trouble dysthymique, le trouble cyclothymique et le trouble de l'adaptation avec humeur dépressive.

#### Durée du traitement

Le traitement d'un épisode dépressif majeur isolé comporte deux phases :

- la phase aiguë (traitement d'attaque), dont l'objectif est la rémission complète des symptômes ;
  - la phase de consolidation, dont l'objectif est de prévenir la rechute de l'épisode.
- Seul un tiers des patients atteints de dépression réagit pleinement aux antidépresseurs, mais peu de données existent sur le meilleur traitement à appliquer ensuite en cas de symptômes résistants au traitement de 1<sup>re</sup> intention.

En cas de trouble dépressif récurrent, s'ajoute une phase de maintenance, dont l'objectif est la prévention des récurrences (ou récurrences). Ce traitement de maintenance est particulièrement indiqué dans le trouble dépressif majeur unipolaire chez

les sujets ayant présenté au moins 3 épisodes dépressifs majeurs au cours des 4 dernières années :

- si ceux-ci ont été rapprochés et/ou sévères (notamment : risque suicidaire, caractéristiques psychotiques, et incapacité fonctionnelle) ;
  - surtout lorsqu'il existe des symptômes résiduels, des pathologies associées, des antécédents familiaux de dépression.
- Il est rappelé que, dans le trouble bipolaire, la prévention de nouveaux épisodes est réalisée en première intention par un traitement thymorégulateur, et non par un **antidépresseur** seul. Le plus souvent, la prescription d'un **antidépresseur** ne répond pas à l'urgence [1].

#### Cadre thérapeutique

La plupart des dépressions sont gérées en **ambulatoire**.

Les hospitalisations sont indiquées en cas : de risque suicidaire majeur (ce risque doit toujours être évalué chez un déprimé), de retentissement somatique important, de résistance au traitement, de comorbidité somatique et psychiatrique et au décours d'une tentative de suicide.

Les formes délirantes avec refus de soins peuvent conduire à procéder à une hospitalisation sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT).

#### Traitement d'attaque

Il fait appel en 1<sup>re</sup> intention à un traitement antidépresseur.

#### Choix de l'antidépresseur

Tous les **antidépresseurs** actuellement commercialisés ont obtenu l'AMM pour l'indication « épisode dépressif majeur ».

Aucune étude n'a pu réellement démontrer qu'une molécule était globalement plus efficace qu'une autre.

Le choix de l'**antidépresseur** prescrit en première intention dépendra donc des habitudes du praticien, du respect des contre-indications, du souhait du patient, des conditions socio-environnementales (activité professionnelle ou non).

### ANTIDÉPRESSEURS (4) – IRSNA

#### ■ Milnacipran

<b>IXEL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 50 à 150 mg/j en 2 prises	56 gél. 25 mg	12,50	I	65 %	0,22
	56 gél. 50 mg	22,04	I	65 %	0,39

#### ■ Venlafaxine

<b>EFFEXOR LP</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) y compris sévères chez des patients hospitalisés, anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois : 75 à 225 mg/j en 1 seule prise	30 gél. LP 37,5 mg	9,71	I	65 %	0,32
	30 gél. LP 75 mg	18,88	I	65 %	0,63

#### ■ Duloxétine

<b>CYMBALTA</b>					
Épisodes dépressifs majeurs et traitement de douleurs neuropathiques : 60-120 mg/j en 1 prise	7 gél. 30 mg	5,39	I	65 %	0,77
	28 gél. 30 mg	19,74	I	65 %	0,71
	28 gél. 60 mg	29,82	I	65 %	1,07
	100 gél. 60 mg	HOP	I		

### ANTIDÉPRESSEURS (5) – NASSA

#### ■ Mirtazapine

<b>NORSET</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés) : 15 à 45 mg/j le soir	30 cp. 15 mg	13,07	I	65 %	0,44
	1 fl. 66 mL. 15 mg/mL	33,09	I	65 %	33,09

### ANTIDÉPRESSEURS (6) – ANTIDÉPRESSEUR APPARENTÉ AUX TRICYCLIQUES

#### ■ Maprotiline

<b>LUDIOMIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères : 75 à 225 mg/j	50 cp. séc. 25 mg	5,65	I	65 %	0,11
	28 cp. séc. 75 mg	9,23	I	65 %	0,33

## TROUBLES DE L'HUMEUR (4) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (2)

### Posologie des antidépresseurs

Les posologies recommandées varient d'un produit à l'autre. Elles peuvent également différer au sein d'une même famille d'**antidépresseurs**. La **posologie optimale efficace** est la dose qui présente le meilleur rapport efficacité/tolérance.

Les **antidépresseurs tricycliques** seront augmentés progressivement par paliers de 24 à 48 h pour obtenir des doses de l'ordre de : 75 à 150 mg de **clomipramine (ANAFRANIL)** ou d'**amitriptyline (LAROXYL)**. En hospitalisation, les perfusions de **tricycliques** se feront sur 2 h avec des doses croissantes : 2 amp. à J1 puis 4 amp. à J2 puis 6 amp./à J3 de **clomipramine (ANAFRANIL)** en IV.

Les **ISRS** et les **ISRNA** : **paroxétine (DEROXAT)** 1 à 2 cp./j en 2 prises ; **sertraline (ZOLOFT)** : 1 à 3 gél. 50 mg/j ; **fluoxétine (PROZAC)** : 1 à 3 gél. 20 mg/j ; **citalopram (SEROGRAM)** 10 à 40 mg/j, **escitalopram (SEROPLEX)** 5 à 20 mg/j ; **milnacipran (IXEL)** 50 mg : 2 à 3 cp./j en 2 prises ; **venlafaxine (EFFEXOR)** 75 à 375 mg/j ; **duloxétine (CYMBALTA)** 30 à 60 mg/j.

La **mirtazapine (NORSET)** 15 mg, **antidépresseur noradrénergique et sérotoninergique spécifique (NASSA)**, est prescrite en une prise le soir ou au coucher : 1 à 3 cp. La **miansérine (MIANSERINE ARROW)** est prescrite en une prise le soir : 30 à 60 mg/j.

L'**agomélatine (VALDOXAN)** est un agoniste mélatoninergique qui resynchronise les rythmes circadiens. La posologie est de 25 mg x 1/j, au coucher et peut être augmentée à 50 mg/j. Un contrôle de la fonction hépatique doit être réalisé chez tous les patients à l'instauration du traitement, puis après environ 3 sem., 6 sem. (fin de la phase aiguë), 12 et 24 sem. (fin de la phase de maintien).

Certains symptômes dépressifs, tels que les symptômes anxieux et les troubles du sommeil, justifient parfois d'être contrôlés rapidement. On peut dans ce cas utiliser de façon temporaire et en attendant l'effet des **antidépresseurs**, des **anxiolytiques benzodiazépines** et/ou des **hypnotiques**. Ces traitements associés respecteront les règles habituelles préconisées pour les **anxiolytiques** et les **hypnotiques**.

**L'association systématique d'un anxiolytique afin de prévenir la levée de l'inhibition est souvent contestée.** De faibles doses de **benzodiazépines** pourraient entraîner chez certains patients un effet désinhibiteur favorisant le passage à l'acte suicidaire.

Dans les dépressions délirantes, il faut souvent associer à l'**antidépresseur** un **anti-psychotique**. En cas d'échec de cette association, les ECT peuvent être utilisés avec succès. Chez le sujet âgé de plus de 70 ans, la posologie initiale recommandée pour les **antidépresseurs**, en particulier **imipraminiques**, est en général la moitié de la posologie préconisée chez l'adulte, les doses étant progressivement augmentées par la suite.

La molécule choisie doit être prescrite à dose efficace tout en respectant la posologie recommandée par l'AMM.

Une des premières causes de non-réponse au traitement est l'utilisation de posologies insuffisantes. Dans les troubles dépressifs, les posologies recommandées sont similaires dans la phase de traitement d'attaque, de traitement de consolidation et, le cas échéant, de prévention des récidives. Une adaptation posologique peut être nécessaire en fonction de la réponse au traitement et de la tolérance. Avant d'augmenter la posologie, il convient de s'assurer de l'observance.

Certains **antidépresseurs**, notamment les **imipraminiques**, peuvent faire l'objet de dosages plasmatiques, qui permettent d'adapter la posologie pour un sujet donné. Ils ne doivent être réalisés qu'en cas de réponse insuffisante, d'effets indésirables marqués, ou de nécessité de vérifier l'observance.

## ANTIDÉPRESSEURS (7) – AUTRES ANTIDÉPRESSEURS

### ■ Miansérine

<b>MIANSERINE ARROW</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 30 à 90 mg/j	30 cp. 10 mg	3,65	I	65 %	0,12
	30 cp. 30 mg	6,97	I	65 %	0,23
	14 cp. 60 mg	6,31	I	65 %	0,45

### ■ Tianeptine

<b>STABLON</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 1 cp. x 3/j	28 cp. 12,5 mg 100 cp. 12,5 mg	9,48 HOP	I I	65 %	0,34

### ■ Agomélatine

<b>VALDOXAN</b>					
Épisodes dépressifs majeurs chez l'adulte : 1 cp. /j au coucher puis 2 cp./j en une seule prise en cas d'inefficacité de la posologie initiale Surveillance hépatique à l'instauration puis aux sem. 6, 12 et 24 ; arrêt si transaminases > 3N	28 cp. 25 mg 100 cp. 25 mg	41,0 HOP	I I	65 %	1,46



## TROUBLES DE L'HUMEUR (5) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (3)

### Suivi médical

#### Évaluation de l'efficacité

Les **antidépresseurs** n'exercent pas leur effet thérapeutique immédiatement et imposent le respect d'un délai d'action, habituellement de l'ordre de **2 à 3 sem.** On affirmera donc l'inefficacité d'un **antidépresseur** après 3 à 4 sem. d'un traitement bien conduit.

60 à 70 % des patients répondent à un premier **antidépresseur**. Ce chiffre s'élèverait à 80 % après essai d'un second **antidépresseur**. 20 % des dépressions résistent donc à au moins deux **antidépresseurs**. Ces **dépensions résistantes** soulèvent des questions thérapeutiques complexes, souvent réservées aux spécialistes. Différentes procédures thérapeutiques sont actuellement proposées dans ces situations : élimination des fausses résistances, changement de molécule, posologie très élevée, association d'**antidépresseurs**, adjonction de **sels de lithium**, d'extraits thyroïdiens, des **antipsychotiques atypiques**, association d'une psychothérapie structurée, photothérapie (luminothérapie), électroconvulsivothérapie.

Le seul **antipsychotique atypique** qui possède une AMM pour potentialisation du traitement antidépresseur en cas de réponse partielle est le **XEROQUEL** (quétiapine).

#### Surveillance des effets indésirables

Le type d'effets indésirables est bien évidemment dépendant de la nature de la molécule prescrite.

Pour certains effets secondaires on peut associer des correcteurs, par exemple des dérivés de l'ergot de seigle pour traiter l'hypotension orthostatique liée aux **tricycliques**.

Les nouvelles molécules généralement mieux tolérées que les **tricycliques**, présentent néanmoins des effets indésirables spécifiques qu'il faut savoir dépister et traiter (rare mais gravissime syndrome sérotoninergique par exemple).

L'effet indésirable majeur reste la **prise de poids** qui survient souvent tardivement et génère des problèmes d'observance.

Les effets indésirables sont, pour leur majorité, de survenue précoce en début de traitement ou après augmentation de la posologie, dose-dépendants, transitoires [1].

#### ► Effets somatiques

Ils sont liés aux effets pharmacologiques des différentes classes :

- effets anticholinergiques des **imipraminiques** : troubles de la vision, bouche sèche, constipation, tachycardie, rétention urinaire (effets périphériques), confusion (effets centraux) ;

- effets antihistaminiques des **imipraminiques** : somnolence ;

- effets sérotoninergiques des **ISRS** et **IRSNA** : nausées, vomissements, diarrhée, hypersudation, céphalées, agitation, insomnie, somnolence, vertiges, tremblements et asthénie.

Des effets cardiovasculaires peuvent également survenir : du fait de leurs effets « quinidine-like », anticholinergiques et antagonistes adrénergiques alpha-1, les **antidépresseurs imipraminiques** peuvent induire une hypotension orthostatique, des troubles du rythme ou des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Les **IMAO** non sélectifs engendrent une hypotension permanente et posturale. La **venlafaxine** et la **duloxétine**, pour des posologies élevées, peuvent augmenter la pression artérielle.

Autres effets : prise de poids, symptômes sexuels, syndrome sérotoninergique, hyponatrémie (sous **ISRS**), risque de saignements (sous **ISRS** et **venlafaxine**).

Il est recommandé d'instaurer une surveillance clinique, notamment en début de traitement. Les effets indésirables attendus doivent être recherchés et évalués de façon systématique à chaque consultation.

**ANTIDÉPRESSEURS (8) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

La plupart des **antidépresseurs** ont une action prédominante sur la neuromédiation noradrénergique et sérotoninergique.

Selon les molécules on décrit des profils d'action plus ou moins sélectifs sur ces divers neurotransmetteurs. Globalement on peut admettre que l'ensemble des produits tend à augmenter la concentration intrasynaptique des neuromédiateurs. Cet effet peut être obtenu soit par une inhibition de la recapture, soit par une inhibition de l'enzyme de dégradation (MAO), soit par une augmentation de la libération des neuromédiateurs. L'**agomélatine** a un mécanisme d'action inédit d'agoniste mélatoninergique et d'antagoniste des récepteurs 5HT<sub>2C</sub>.

L'augmentation de la concentration intrasynaptique ne doit pas être isolée d'un contexte plus large d'actions impliquant des effets sur d'autres médiateurs (propriétés anticholinergiques, adrénolytiques, etc.) et sur les récepteurs : désensibilisation des récepteurs  $\beta$ -adrénergiques, des récepteurs présynaptiques 5HT<sub>1A</sub>, action sur les seconds messagers.

**• CLASSIFICATION**

Les **antidépresseurs** peuvent être classés selon leurs mécanismes d'action, leurs effets sélectifs sur la neurotransmission monoaminergique, les effets secondaires ou la famille chimique. On distingue selon la sélectivité de l'activité sur les monoamines :

- les **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)** : fluoxétine, paroxétine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram ;
- les **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)** : milnacipran (**IXEL**), venlafaxine (**EFFEXOR**), duloxétine (**CYMBALTA**) ;
- les **antidépresseurs noradrénergiques et sérotoninergiques spécifiques (NASSA)**. Ils facilitent la transmission noradrénergique et sérotoninergique en bloquant les récepteurs  $\alpha_2$ -présynaptiques et les récepteurs 5HT<sub>2</sub> et 5HT<sub>3</sub> post-synaptiques : mirtazapine (**NORSET**) ;
- les molécules agissant sur les trois monoamines : les **tricycliques**, les **inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)** ;
- les autres molécules avec des mécanismes d'action différents : **miansérine**, **agomélatine**.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (6) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (4)

### ► Effets psychiques

Il est parfois difficile de distinguer les effets indésirables du traitement des symptômes de la dépression (idées suicidaires, anxiété, insomnie ou constipation par exemple). Tous les **antidépresseurs**, mais surtout les **tricycliques** et les **IRSNA** peuvent induire des virages maniaques de l'humeur, particulièrement chez les patients bipolaires. **Chez les patients bipolaires**, les **antidépresseurs** sont susceptibles d'induire la survenue de cycles rapides (au moins 4 épisodes thymiques par an), leur **utilisation en monothérapie étant alors à éviter**. La survenue de symptômes, tels que l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété, l'hyperactivité et *a fortiori* les idées suicidaires nécessite une surveillance particulière et des consultations plus fréquentes.

### Renforcement de la relation thérapeutique

Chez certains patients il faut associer à la prescription médicamenteuse un soutien psychothérapeutique, des conseils professionnels voire des mesures d'aide sociale. Toutes ces interventions facilitent l'acceptation de la maladie et de ses conséquences, améliorent l'observance et concourent à renforcer l'efficacité des traitements.

### Psychothérapie, sismothérapie et traitement d'attaque

La place et l'indication des **psychothérapies** en première intention dans le traitement d'attaque des dépressions restent imprécises. Les psychothérapies peuvent être proposées seules ou en association avec les **antidépresseurs** dans les formes de dépression modérée, avec un risque mineur de suicide, en cas de réponse antérieure à la psychothérapie et selon le souhait du patient. Les formes délirantes avec un retentissement somatique et cognitif important sont des contre-indications initiales à la psychothérapie. Les **psychothérapies cognitivo-comportementales** et **interpersonnelles** sont celles dont l'efficacité est la plus documentée dans le traitement des dépressions.

Les **sismothérapies** sont indiquées dans les formes graves de dépressions souvent résistantes avec un risque suicidaire majeur, un retentissement somatique menaçant le pronostic vital (catatonie dépressive, etc.).

Les autres techniques de stimulation cérébrale : **stimulation du nerf vague** (VNS : *Vague Nerve Stimulation*), **stimulation magnétique transcrânienne** (rTMS : *repetitive Transcranial Magnetic Stimulation*) et **stimulation cérébrale profonde** (DBS : *Deep Brain Stimulation*) sont surtout utilisées dans des protocoles de recherche et encore peu dans la routine.

## ANTIDÉPRESSEURS (9) – PHARMACOLOGIE (2)

## INDICATIONS

Tous les **antidépresseurs** sont indiqués dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs c'est-à-dire caractérisés. Certains produits sont officiellement indiqués dans les formes sévères nécessitant une hospitalisation : **clomipramine**, **imipramine**, **maprotiline**, **amitriptyline**, **iproniazide**, **moclobémide**, **venlafaxine**.

Les **antidépresseurs** sont parfois également indiqués dans le traitement des troubles anxieux. C'est principalement le cas des **antidépresseurs** sérotoninergiques : **clomipramine** (**ANAFRANIL**), et la famille des **ISRS** : **fluoxétine**, **paroxétine**, **sertraline**, **fluvoxamine**, **citalopram**, **escitalopram**.

Les **molécules tricycliques** sont aussi indiquées dans le traitement des **énurésies nocturnes**, et des **algies rebelles** (**amitriptyline** : **LAROXYL** dans les neuropathies diabétiques).

## CONTRE-INDICATIONS

Les **tricycliques** sont contre-indiqués en cas de :

- glaucome à angle étroit ;
- adénome prostatique ;
- coronaropathie non stabilisée, infarctus du myocarde récent, troubles de conduction (BAV 3<sup>e</sup> degré) et du rythme cardiaque ;
- association avec les **IMAO** (un intervalle de 2 sem. est recommandé après interruption de l'**IMAO**) ;
- l'épilepsie est une contre-indication relative.

La **maprotiline** serait le plus épileptogène des **antidépresseurs**.

Le principal risque avec les **IMAO** est celui d'accès hypertensifs brutaux lors d'interactions médicamenteuses ou alimentaires.

Les **IMAO** sont contre-indiqués en association avec les autres **IMAO**, les **ISRS**, le **sumatriptan**. L'**agomélatine** est contre-indiquée en cas de maladie du foie sous-jacente.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les interactions médicamenteuses concernent surtout les **IMAO**, les **ISRS** et l'association d'**antidépresseurs** susceptibles de générer un syndrome sérotoninergique (cf. **ISRS**).

Pour le passage des **IMAO** à un autre **antidépresseur** ou l'inverse, on recommande les schémas suivants :

- relais possible 48 h après l'arrêt des **IMAO** ;
- attendre 4 à 5 j d'interruption des **tricycliques** pour prescrire les **IMAO** ;

- arrêt de la **fluoxétine** (**PROZAC**) pendant 4 à 5 sem. puis relais possible par les **IMAO** ;
- l'association **IMAO** + **ISRS** est déconseillée ;
- l'association **IMAO** + **NASSA** est déconseillée.

Les **tricycliques** voient leurs effets latéraux se majorer en cas d'association avec les **molécules anticholinergiques**, les **antihypertenseurs** périphériques ou centraux.

L'**agomélatine** est métabolisée à 90% par le CYP1A2 et son association avec des **fluoroquinolones** et  **$\beta$ -bloquants** pose problème. Son association avec des inhibiteurs puissants du CYP1A2 (**fluvoxamine**, **ciprofloxacine**) est contre-indiquée. L'association avec des oestrogènes (inhibiteurs modérés du CYP1A2) et les inducteurs modérés du CYP1A2 comme le **propranolol**, la **grépaflaxine** ou l'**énoxacine** doit être faite avec précaution.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : la grossesse constitue une contre-indication relative aux **antidépresseurs**. Aucun effet tératogène n'a vraiment été démontré pour les **antidépresseurs**. Il est cependant prudent de conseiller d'éviter les nouveaux **antidépresseurs**, et d'employer les **antidépresseurs** plus anciens type **clomipramine** (**ANAFRANIL**). On évitera la prescription d'**antidépresseurs** le premier trimestre de grossesse et on surveillera particulièrement le nouveau-né lors de l'administration d'anticholinergiques (risque de sevrage).

**Allaitement** : il est déconseillé.

Insuffisance rénale : pas de modification de la posologie de la plupart des **antidépresseurs**, réduire la posologie des **NASSA**.

Insuffisance hépatique : réduction des posologies pour les **IMAO**.

## Prescription des antidépresseurs

1) Il n'y a pas lieu d'associer systématiquement en début de traitement un **anxiolytique**, un **hypnotique**, un **thymorégulateur**, un **antipsychotique**.

2) Il n'y a pas lieu de prescrire en première intention plus d'un **antidépresseur**.

3) Il n'y a pas lieu de poursuivre un traitement antidépresseur plus de 6 mois après l'obtention de la rémission complète de l'épisode dépressif, sauf en cas d'antécédents d'épisodes dépressifs majeurs récurrents et rapprochés.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (7) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (5)

### Traitement de consolidation

75 % des malades rechutent dans l'année qui suit un arrêt prématuré du traitement. Lors de cette phase de consolidation, il s'agira donc essentiellement de convaincre le patient, devenu asymptomatique, de l'utilité de poursuivre le traitement pendant plusieurs mois.

La posologie du traitement de consolidation est celle qui a permis d'entraîner la rémission. Il en est de même pour la posologie d'un éventuel traitement de maintenance.

La prévention des récurrences dépressives peut faire appel soit à un traitement antidépresseur au long cours soit à un **thymorégulateur**, soit aux deux. En ce qui concerne le recours aux **thymorégulateurs**, il est usuel de l'envisager après 3 épisodes dépressifs.

Le travail **psychothérapique** permettra de limiter les séquelles psychologiques de l'épisode : anxiété, attitudes phobiques, baisse de l'estime de soi, etc.

### Arrêt du traitement

#### Modalités d'arrêt

Au terme d'un traitement bien conduit, il est recommandé d'une part de diminuer les posologies progressivement de façon à prévenir la survenue d'un syndrome de sevrage et d'autre part d'augmenter la fréquence des consultations du fait du risque de réapparition des symptômes qui ont nécessité la mise en place du traitement. Le syndrome de sevrage, également appelé syndrome d'arrêt, ne signifie pas que le patient est dépendant aux **antidépresseurs**. La période de diminution des posologies sera d'autant plus prolongée que la durée de traitement aura été

longue. Elle sera généralement comprise entre 1 et 6 mois, par exemple :

- traitement < 1 an : arrêt en quelques semaines, en diminuant par exemple toutes les semaines la posologie journalière ;

- traitement > 1 an : arrêt en quelques mois, en diminuant par exemple tous les mois la posologie journalière.

#### Syndrome de sevrage (ou syndrome d'arrêt)

Le syndrome de sevrage apparaît dans les jours suivant l'arrêt, rarement au-delà d'une semaine, et dure moins d'une semaine en moyenne.

Les symptômes les plus habituels sont :

- anxiété, irritabilité, tension nerveuse ;
- cauchemars et autres troubles du sommeil ;

- sensations vertigineuses, troubles de l'équilibre et autres troubles neurosensoriels

- syndrome pseudo-grippal (rhinorrhée, myalgies, malaise, nausées, vomissements, diarrhée, frissons).

Ces symptômes ne doivent pas être confondus avec les symptômes dépressifs ou anxieux.

Les facteurs de risque de syndrome de sevrage sont : une posologie élevée, une durée de traitement prolongée, un arrêt brutal du traitement, et les caractéristiques pharmacocinétiques du médicament.

La conduite à tenir consiste à :

- rassurer le patient sur le caractère transitoire de ses symptômes ;

- réinstaurer temporairement, si nécessaire, la posologie antérieure d'**antidépresseur** ;

- puis assurer un sevrage du traitement encore plus progressif. Il est recommandé de revoir le patient à distance de la rémission complète.

**ANTIDÉPRESSEURS (10) – PHARMACOLOGIE (3)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Les **tricycliques** ont la réputation de générer de nombreux effets latéraux, principalement du fait de leur pouvoir anticholinergique. Les nouveaux **antidépresseurs**, type **IRSNA** ou **ISRS**, ne produisent pas ce type d'effets mais ils peuvent être à l'origine d'effets secondaires plus spécifiques, à ne pas négliger. En général les **antidépresseurs** sont bien tolérés, si leur indication est bien posée.

**Effets anticholinergiques**

Ils sont plus prononcés avec les **tricycliques** : sécheresse de la bouche, constipation, dysurie, rétention aiguë d'urine, trouble de l'accommodation. En cas d'intoxication aiguë ou chez des sujets prédisposés (sujet âgé) on peut avoir des signes d'encéphalopathie atropinique : sédation, confusio-onirisme, agitation, crises convulsives.

**Effets cardiovasculaires**

Ils sont également plus marqués avec les **tricycliques** et sont liés aux effets anticholinergiques, adrénolytiques et aux propriétés «quinidine-like» de certaines molécules. L'**amitriptyline** a la réputation d'être le produit le plus cardiotoxique en cas d'intoxication aiguë. Aux doses thérapeutiques les effets se résument à une tachycardie, une hypotension orthostatique. Aux doses toxiques on peut voir apparaître des troubles du rythme et de conduction.

La **venlafaxine (EFFEXOR)** à forte dose entraîne une HTA.

**Effets neuropsychiques**

Suivant le profil de la molécule :

- sédation, somnolence diurne (conducteurs de véhicules et d'engins : **amitriptyline** : **LAROXYL**, **mirtazapine** : **NORSET**, **maprotiline** : **LU DIOMIL**, **miansérine** par exemple). Cet effet disparaît après quelques jours de traitement ;
- confusion mentale avec les **tricycliques**, particulièrement chez le sujet âgé ;
- tremblement fin des extrémités surtout avec les **tricycliques**, céphalées ;

– convulsion : tous les **antidépresseurs** abaissent le seuil épileptogène. La prescription sera prudente chez l'épileptique avec une surveillance clinique et EEG régulière ;

– l'**amoxapine (DÉFANYL)** est un métabolite de la **loxapine (LOXAPAC)**. À ce titre il possède des propriétés antipsychotiques. Il peut induire des effets extrapyramidaux ;

– excitation, insomnie : elles peuvent traduire soit un surdosage, soit un début de syndrome sérotoninergique, soit un virage maniaque de l'humeur. Les psychostimulants peuvent induire une excitation. Dans ce cas on les prescrira plutôt le matin (**imipramine** : **TOFRANIL**, **IMAO**).

**Effets digestifs et hépatiques**

Ils sont non spécifiques : nausées (**IRSNA**), vomissements, constipation, douleur abdominale.

Certains produits peuvent induire des hépatites cytolytiques ou mixtes, **miansérine**, **tianeptine**, **IMAO**, **agomélatine**.

Une surveillance régulière du bilan hépatique (ALAT, ASAT principalement) peut être recommandée.

**Effets sexuels**

Ils s'observent surtout avec les **tricycliques** et les **ISRS** :

- impuissance érectile, éjaculation retardée, voire anorgasmie chez l'homme ;
- anorgasmie, absence de désir sexuel chez la femme.

**Effets divers**

Prise de poids : problème majeur avec les produits prescrits pour une période prolongée et chez des sujets jeunes. On la rencontre surtout avec les **tricycliques**, et la **miansérine**.

Amaigrissement : effet anorexigène de la **fluoxétine (PROZAC)**.

Sueurs, bouffées de chaleur avec les **tricycliques**.

Les troubles cutanés sont rares en dehors de rashes cutanés allergiques.

Agranulocytose (rare) : **miansérine**, **mirtazapine (NORSET)**.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (8) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (6)

### Information du patient

Il est indispensable d'informer les patients afin d'améliorer leurs connaissances sur leurs troubles dépressifs ou anxieux et sur les propriétés du traitement médicamenteux. Il est recommandé de prévenir le patient du risque de rechute et de lui apprendre à repérer les signes (en particulier précoces) des troubles dépressifs. L'information doit également porter sur :

- les modalités de prise des médicaments ;
- le délai avant l'apparition des effets bénéfiques du traitement ;
- la nécessité de poursuivre le traitement même après l'amélioration clinique ;
- les effets indésirables les plus fréquents du traitement ;
- les possibilités de contact avec le médecin en cas de question ou de problème, voire d'aggravation des troubles ;
- la nécessité d'un avis médical pour l'ar-

rêt du traitement ou l'introduction d'un autre médicament pendant le traitement. Il faut insister sur le fait que l'effet thérapeutique n'est pas immédiat et qu'une amélioration ne doit pas entraîner l'arrêt du traitement sans avis médical. Ces éléments, qui s'intègrent dans le cadre de l'alliance thérapeutique, sont une des clés de l'observance thérapeutique et d'une bonne efficacité thérapeutique. Dans le cadre des épisodes dépressifs caractérisés d'intensité légère, le médecin peut proposer aux patients les conseils d'hygiène de vie suivants :

- l'arrêt de l'alcool, la diminution de la consommation de caféine (chez les patients anxieux) ;
- la pratique d'une activité physique ;
- la pratique d'une méthode de relaxation ;
- la pratique d'une méthode de méditation.

## THYMORÉGULATEURS (1) – SEL DE LITHIUM

## ■ Lithium

<b>TÉRALITHE</b>					
Prévention des récides des psychoses maniaco-dépressives et des troubles schizo-affectifs : 2 à 5 cp./j en 2 prises pour une lithémie comprise entre 0,5 et 0,8 mEq/L ou 2 à 4 cp./j de <i>TÉRALITHE</i> <i>400 LP</i> en 1 prise le soir pour une lithémie entre 0,8 et 1,2 mEq/L Traitement curatif des épisodes maniaques et hypomaniaques : 2 à 5 cp./j en 2 prises pour une lithémie comprise entre 0,6 à 0,9 mEq/L	100 cp. séc. 250 mg 60 cp. séc. LP 400 mg	9,35	II	65 %	0,09
		8,36	II	65 %	0,14



## TROUBLES DE L'HUMEUR (9) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (1)

### Troubles de l'humeur - états maniaques et hypomaniaques

Les deux catégories les plus fréquentes parmi les troubles bipolaires sont les troubles bipolaires de type I et de type II.

#### Types de troubles bipolaires

- Le type I est défini par la récurrence d'épisodes dépressifs, maniaques, hypomaniaques et mixtes.
- Le type II est défini par la récurrence d'épisodes dépressifs, hypomaniaques et mixtes en l'absence d'épisodes maniaques.

#### Objectifs de la prise en charge initiale

Réduire la sévérité des symptômes des troubles psychocomportementaux, et protéger le patient, ses proches et ses biens.

#### Objectifs à long terme

Stabiliser l'humeur, prévenir les rechutes, dépister et traiter les comorbidités psychiatriques et médicales, aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter son traitement, préserver les capacités d'adaptation pour contribuer à

l'autonomie et à la qualité de vie du patient, évaluer et tenter de préserver au maximum le niveau de fonctionnement social et professionnel, et la vie affective et relationnelle.

#### Cadre thérapeutique

Classiquement les épisodes maniaques justifiaient de l'utilisation en 1<sup>re</sup> intention des **antipsychotiques**.

Actuellement on propose de plus en plus de recourir d'emblée à un traitement **thymorégulateur**.

En règle générale les états maniaques sont pris en charge en **hospitalisation**. Les formes d'intensité modérée ou qui surviennent chez des patients maniaco-dépressifs connus peuvent être traitées en ambulatoire.

Dans les formes avec des troubles majeurs du comportement, une méconnaissance des troubles et un refus de soins, le patient sera hospitalisé en SPDT ou en SPDRE.

Pour tous les patients, en raison du risque de dépenses excessives, il faut envisager une **mesure de protection des biens** (sauvegarde de justice).

## THYMORÉGULATEURS (2) – ANTICONVULSIVANTS

### ■ Carbamazépine

<b>TÉGRÉTOL</b>					
Prévention des récides dans les troubles maniaque-dépressifs : 400 à 800 mg/j en 2 à 3 prises Traitement curatif des épisodes maniaques ou hypomaniaques : 400 à 1 200 mg/j en 2 à 3 prises Troubles caractériels intercritiques dans l'épilepsie : 400 à 600 mg/j	50 cp. séc. 200 mg	5,03	II	65 %	0,10
	30 càc 100 mg (fl. de 150 mL)	4,50	II	65 %	0,15
	30 cp. séc. 200 mg	3,49	II	65 %	0,12
<b>TÉGRÉTOL LP</b> Troubles maniaque-dépressifs Traitement préventif : 400 à 800 mg/j en 2 prises Traitement curatif : 600 à 1 200 mg/j en 2 prises	30 cp. séc. 400 mg	5,87	II	65 %	0,20

### ■ Valpromide

<b>DÉPAMIDE</b>					
Prévention des rechutes des troubles maniaque-dépressifs : 2 à 4 cp./j Traitement curatif des épisodes maniaques, mixtes : 4 à 10 cp./j État d'agressivité d'origines diverses : 2 à 4 cp./j	30 cp. 300 mg 50 cp. 300 mg	6,42 HOP	II II	65 %	0,21

### ■ Divalproate de sodium

<b>DÉPAKOTE</b>					
Traitement des épisodes maniaques en cas de contre-indication ou d'intolérance au <b>lithium</b> Posologie initiale : 750 mg/j en 2 à 3 prises, à augmenter rapidement jusqu'à la dose minimale efficace : 1 000 à 2 000 mg (dose max. 2 500 mg)	30 cp. 250 mg	6,87	II	65 %	0,23
	90 cp. 250 mg	HOP	II		
	90 cp. 500 mg	37,61	II	65 %	0,42

### ■ Lamotrigine

<b>LAMICTAL</b>					
Prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs A. : 200 à 400 mg en 2 prises/j à atteindre progressivement par paliers de 25 à 50 mg tous les 15 j NB : Diminuer la dose quotidienne de moitié si association avec le <b>valproate</b>	30 cp. 2 mg	6,00	I	65 %	0,20
	30 cp. 5 mg	5,41	I	65 %	0,18
	30 cp. 25 mg	9,48	I	65 %	0,32
	30 cp. 50 mg	15,30	I	65 %	0,51
	30 cp. 100 mg	26,91	I	65 %	0,90
	30 cp. 200 mg	47,88	I	65 %	1,60

## TROUBLES DE L'HUMEUR (10) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (2)

### Traitements médicamenteux

Le traitement des troubles bipolaires lors des épisodes aigus maniaques ou mixtes, hypomaniaques, repose en 1<sup>re</sup> intention sur les **thymorégulateurs** : **lithium**, **anti-convulsivants**, **antipsychotiques atypiques**. La prescription repose sur le principe visant à privilégier une monothérapie le plus souvent possible.

#### Thymorégulateurs

Ils sont proposés **d'emblée en monothérapie** ou associés à un traitement sédatif (**benzodiazépines** ou **antipsychotiques**).

##### ► Sels de lithium

Les **sels de lithium** (**TÉRALITHE** cp. 250, 450 mg LP) sont utilisés en 1<sup>re</sup> intention (AMM : prévention des rechutes des troubles bipolaires et des états schizo-affectifs intermittents, traitement curatif des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque).

Après un bilan somatique initial (NFS, TSH, ionogramme sanguin, créatinine, protéinurie des 24 h, ECG, EEG), on prescrit par exemple du **TÉRALITHE** 250 mg en 2 à 3 prises pour obtenir des lithémies de l'ordre de 0,8 à 1 mEq/L.

La prescription initiale de lithium est sous la responsabilité du médecin spécialisé en psychiatrie. Évaluations à réaliser avant la mise sous traitement :

- poids, taille, périmètre abdominal, pression artérielle ;
- fonction rénale : clairance de la créatinine, créatinémie, urée, protéinurie, ionogramme sanguin, NFS ;
- bilan lipidique ;
- glycémie à jeun : à vérifier en cas de prise de poids ;
- bilan thyroïdien, en cas de suspicion d'hypothyroïdie : dosage de l'iodémie protéique (PBI) et/ou index de thyroxine libre, TSH plasmatique, puis T3, T4 ;
- ECG pour les patients ayant un antécédent cardiovasculaire ou un facteur de risque cardiovasculaire. Un avis spécialisé est à demander chez les sujets ayant des troubles du rythme paroxystique ou permanents chroniques ;

- pour les femmes en âge de procréer, vérification de l'absence d'une grossesse et prescription d'une contraception efficace avant la mise sous traitement ;
- établissement d'un protocole de soins avec le médecin traitant du patient pour prescrire le lithium, dosages de lithium plasmatique. Évaluations au cours du traitement. Surveiller la prise de poids ;
- maintien du taux sérique du lithium. L'intervalle pour le taux sérique du lithium sous la forme **TÉRALITHE LP** est entre 0,8 et 1,2 mEq/L. La lithémie sera vérifiée 1 sem. après la prescription puis tous les 3 mois et après chaque changement de posologie.

Les **sels de lithium** sont d'autant plus efficaces que la manie est d'intensité modérée, non délirante, pure ; lorsque le sujet a fait peu d'épisodes antérieurs et lorsqu'on observe une séquence MDI (manie - dépression - intervalle libre).

##### ► Anticonvulsivants

Les thymorégulateurs **anticonvulsivants** (**TÉGRÉTOL**, **DÉPAKOTE**, **DÉPAMIDE**, **LAMICTAL**) seront proposés en cas de résistance au lithium voire en 1<sup>re</sup> intention. Les **anticonvulsivants** seraient plus efficaces que le lithium en cas d'état mixte, chez les patients avec des cycles rapides ou des lésions neurologiques, pour les séquences DMI (dépression - manie - intervalle libre).

**Dialproate de sodium** (**DÉPAKOTE** cp. 250, 500 mg) (AMM : traitement des épisodes maniaques du trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium). La **poursuite du traitement** après l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu au **divalproate de sodium** lors de l'épisode aigu.

**Valpromide** (**DÉPAMIDE** cp. 300 mg) (AMM : traitement des épisodes maniaques du trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium). La **poursuite du traitement** après l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu au **valpromide** lors de l'épisode aigu.

**THYMORÉGULATEURS (3) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

On ne connaît pas parfaitement les mécanismes d'action des **thymorégulateurs**. On évoque :

- un effet stabilisant de membrane du lithium ;
- une modification de l'activité des protéines G dépendantes pour les **sels de lithium** ;
- une action sur les neuromédiateurs centraux, en particulier sérotoninergiques pour le **lithium** et GABAergiques pour les **anticonvulsivants**.

**INDICATIONS**

Quatre produits sont officiellement reconnus pour le traitement préventif des troubles bipolaires : les **sels de lithium**, la **carbamazépine**, le **valpromide** et l'**olanzapine (ZYPREXA)**. L'**acide valproïque (DÉPAKINE)** et le **divalproate de sodium (DÉPAKOTE)** sont utilisés hors AMM dans cette indication.

Les indications classiques sont :

- traitement préventif des accès maniaques et dépressifs ;
- traitement curatif des états maniaques et hypomaniaques. Dans les troubles bipolaires atténués (type II), on emploie préférentiellement les **anticonvulsivants**.

La **lamotrigine** est reconnue dans la prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs.

Dans les formes résistantes de dépression, les **sels de lithium** peuvent potentialiser les **anti-dépresseurs** sérotoninergiques (effet starter).

Les **sels de lithium** sont efficaces à un degré moindre dans la prévention des troubles dépressifs récurrents.

Les **thymorégulateurs** sont utilisés en association avec les **antipsychotiques** dans les troubles schizo-affectifs.

Les **thymorégulateurs** ont aussi des indications « annexes » :

- alcoolisme périodique pour le **lithium** ;
- agressivité pour la **carbamazépine (TÉGRÉ-TOL)** et le **valpromide (DÉPAMIDE)**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne seront envisagés que les effets secondaires des **sels de lithium**. Les effets secondaires des **anticonvulsivants** sont développés au chapitre Épilepsie.

**Grossesse**

Le 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse est une contre-indication aux **sels de lithium** qui favorisent la survenue de malformations cardiaques. En préventif, les **sels de lithium** doivent toujours être prescrits chez les femmes avec une contraception.

On peut réintroduire le **lithium** aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres de grossesse avec une surveillance régulière des lithémies. On conseille d'arrêter le **lithium** une semaine avant l'accouchement.

**Allaitement**

L'allaitement est contre-indiqué avec les **sels de lithium**. Ceux-ci doivent être réintroduits précocement chez la mère après l'accouchement. La période du post-partum constitue en effet une période à haut risque de rechute maniaque ou dépressive.

**Insuffisance rénale**

Le **lithium** est contre-indiqué dans les formes graves. Ailleurs, il est utilisé avec une surveillance très rapprochée des taux plasmatiques.

Le **lithium** est contre-indiqué de façon absolue en cas de bloc sino-auriculaire, en association avec les salidiurétiques, en cas de régime désodé (risque accru d'intoxication lithémique) et dans l'insuffisance cardiaque sévère.

Les dysthyroïdies ne représentent qu'une contre-indication relative. Il est en effet préférable d'adapter le traitement hormonal substitutif et de poursuivre la lithiothérapie.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (11) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (3)

**Lamotrigine (LAMICTAL** cp. 25, 50, 100, 200 mg). AMM : **prévention** des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs.

**Carbamazépine (TÉGRÉTOL** cp. 200 mg et 400 mg LP). AMM : **prévention** des rechutes dans le cadre des troubles bipolaires, notamment chez les patients présentant une résistance relative, des contre-indications ou une intolérance au **lithium**, traitement des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque.

Ex. 1 : **DÉPAKOTE** : 750 mg à J1, posologie rapidement augmentée pour obtenir des taux plasmatiques d'**acide valproïque** de l'ordre de 50 à 100 mg/mL.

Ex. 2 : **LAMICTAL** en monothérapie l'adaptation posologique est progressive : 25 mg/j les 2 premières sem., 50 mg/j les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> sem., 100 mg/j la 5<sup>e</sup> sem. Posologie cible de stabilisation : 200 mg. Des posologies dans un intervalle allant de 100 à 400 mg/j ont été utilisées dans les essais cliniques. En raison du risque de rash, la dose initiale et les augmentations de doses suivantes ne doivent pas dépasser 400 mg/j. Cette posologie doit être utilisée avec d'autres médicaments qui n'inhibent ou n'induisent pas significativement la glucuronisation de la lamotrigine. En cas de copréscription d'un inducteur ou d'un inhibiteur de glucuronisation, la posologie de **lamotrigine** doit être adaptée. Des éruptions cutanées graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell) ont été rapportées.

Ex. 3 : **TÉGRÉTOL** : traitement des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque : 600 à 1200 mg/j, soit 3 à 6 cp. 200 mg en 2 ou 3 prises/jour, soit 2 ou 3 prises par jour de susp. buv., soit 1,5 à 3 cp. LP 200 mg x 2 /j, soit 600 à 1

200 mg/j en 2 ou 3 prises (comprimés LP 400 mg).

### ► Antipsychotiques atypiques

**Olanzapine (ZYPREXA** cp. 5, 7,5, 10, 15, 20 mg ; **ZYPREXA VELOTAB** cp. orodisp. 5, 10, 15, 20 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères, **prévention** des récurrences chez les patients présentant un trouble bipolaire, ayant déjà répondu au traitement par l'**olanzapine** lors d'un épisode maniaque. Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I chez l'adolescent âgé de 13 ans ou plus pour une durée allant jusqu'à 12 sem.

**Olanzapine (ZYPREXA** 10 mg pdre pour sol. inject.). AMM : agitation et les troubles du comportement chez les patients chez les patients présentant des épisodes maniaques, lorsque le traitement par voie orale n'est pas adapté. Le traitement doit être arrêté et remplacé par l'**olanzapine** orale dès que l'état clinique du patient le permet.

**Risperidone (RISPERDAL** cp. 1, 2, 4 mg ; **RISPERDALORO** 0,5, 1, 2, 4 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

**Aripiprazole (ABILIFY** cp. 5, 10, 15 mg ; **ABILIFY** cp. orodisp. 10, 15 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I, **prévention** de récurrences d'épisodes maniaques chez l'adulte ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement par **aripiprazole**.

**Aripiprazole (ABILIFY** sol. inj. 7,5 mg/mL). AMM : traitement rapide de l'agitation et des troubles du comportement chez les patients présentant un épisode maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire de type I, lorsque le traitement par voie orale n'est pas adapté. Le traitement doit être arrêté et remplacé par l'**aripiprazole** par voie orale dès que l'état clinique du patient le permet.

## THYMORÉGULATEURS (4) – PHARMACOLOGIE (2)

## EFFETS INDÉSIRABLES

Le **lithium** est par définition prescrit pour une durée très longue voire indéfinie. Bien toléré au début de traitement, on peut voir apparaître à plus ou moins long terme, des effets secondaires parfois gênants (prise de poids, dysthyroïdie, polyuro-polydypsie, etc.) qui peuvent inciter le patient à arrêter son traitement. La surveillance et le dépistage des effets latéraux du **lithium** sera donc constante tout au long de la prescription.

## Effets neurologiques

Tremblement fin des extrémités : d'attitude et d'action, il persiste parfois toute la durée du traitement. Sa majoration récente doit faire craindre une intoxication au **lithium**. Il peut être traité en réduisant les doses de **lithium** ou en associant des  **$\beta$ -bloquants** : **AVLOCARDYL** 1/4 x 3/j.

Des syndromes extrapyramidaux ont été décrits sous **lithium** sans prise d'**antipsychotique**. Ils surviennent parfois lors des associations avec les **ISRS**. Ils disparaissent à la baisse de posologie.

L'apparition d'autres signes neurologiques doit faire craindre un début d'intoxication au **lithium** : dysarthrie, confusion, céphalées, troubles de l'équilibre, vertiges.

## Effets psychiques et cognitifs

Certains patients se plaignent d'un émoussement affectif, d'une indifférence, de baisse de la créativité artistique, de difficultés de concentration, de difficultés mnésiques après un traitement prolongé par les **sels de lithium**. Différents de ceux d'un tableau dépressif, ces symptômes sont souvent la conséquence de lithémies un peu trop élevées. Il s'agira alors de réduire la posologie afin d'obtenir des lithémies comprises entre 0,5 et 0,7 mEq/L avec du **lithium (TÉRALITHE)** 250 mg.

## Effets endocriniens

Dysthyroïdie : le **lithium** peut induire un goitre euthyroïdien, une thyrotoxicose et le plus sou-

vent une hypothyroïdie. L'arrêt du **lithium** n'est pas justifié. Il faut d'abord faire le bilan étiologique de la dysthyroïdie et ensuite proposer en association avec le **lithium** une hormonothérapie substitutive. La correction des dysthyroïdies est essentielle dans les troubles de l'humeur. L'hypothyroïdie pourrait, en effet, induire des cycles rapides ou des états mixtes.

Syndrome polyuropolydypsique. Il est lié à un diabète insipide néphrogénique. Il est souvent modéré (< 3 L/24 h). Les formes graves incitent à arrêter le **lithium** et à changer de **thymorégulateur**.

Hyperparathyroïdie : aussi rare que classique, elle fait interrompre le **lithium**. D'authentiques adénomes parathyroïdiens ont pu être révélés par les **sels de lithium**.

Prise de poids (5 à 20 kg) : c'est un des problèmes majeurs du **lithium**. Le **lithium** aurait un effet *insuline-like*. Il faut donc conseiller un régime hypocalorique.

## Effets digestifs

Ils consistent surtout en nausées, gastralgie, diarrhée, douleurs abdominales en début de traitement. Le **NEUROLITHIUM** est mieux toléré sur le plan digestif que le **TÉRALITHE**.

L'apparition récente chez un patient tolérant jusqu'alors bien son traitement doit faire suspecter une intoxication et doser la lithémie en urgence.

## Effets hépatiques

Le **valpromide (DÉPAMIDE)** et le **divalproate de sodium (DÉPAKOTE)** peuvent entraîner des hépatites aiguës cytolytiques. Surveiller de façon régulière le bilan hépatique (ALAT, ASAT, TP).

## Effets rénaux

On a décrit des insuffisances rénales chroniques par néphropathie interstitielle voire par glomérulopathie. Elles sont très rares. Elles justifient néanmoins la surveillance annuelle de la créatinine plasmatique à visée préventive.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (12) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (4)

**Quétiapine (XEROQUEL).** AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires, traitement des épisodes dépressifs majeurs dans les troubles bipolaires, **prévention** des récurrences chez les patients présentant un trouble bipolaire, ayant déjà répondu au traitement par la **quétiapine** lors d'un épisode maniaque ou dépressif.

**Azénapine (SYCREST** cp. subling. 5, 10 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires de type I chez l'adulte (non remboursable).

Ex. 1 : **olanzapine (ZYPREXA)** : épisode maniaque : la dose initiale est de 15 mg/j en une seule prise en monothérapie ou 10 mg/j en association. Prévention des récurrences dans le cadre d'un trouble bipolaire : la dose initiale recommandée est de 10 mg/j ; le traitement sera maintenu à la même dose. Si un nouvel épisode (maniaque, mixte ou dépressif) survient, le traitement par l'**olanzapine** doit être poursuivi (à la posologie optimale). Selon l'expression clinique de l'épisode, un traitement de la symptomatologie thymique sera associé.

Ex. 2 : **rispéridone (RISPERDAL)** x 1/j, en débutant par 2 mg. Si nécessaire, les adaptations posologiques se feront par paliers de 1 mg/j en respectant un délai minimum de 24 h entre chaque palier de dose. La **rispéridone** peut être administrée à doses flexibles comprises entre 1 et 6 mg/j afin d'optimiser le niveau d'efficacité et de tolérance de chaque patient. Des doses journalières > 6 mg n'ont pas été étudiées chez des patients présentant des épisodes maniaques.

Ex. 3 : **aripiprazole (ABILIFY)** : posologie initiale recommandée à 15 mg x 1/j pendant ou en dehors des repas, en monothérapie ou en association. Certains patients peu-

vent recevoir une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg. Prévention des récurrences des épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I : chez des patients traités par l'**aripiprazole** en monothérapie ou en association, le traitement sera maintenu à la même dose. La posologie quotidienne peut être adaptée ; une réduction de dose pourra être considérée en fonction de l'état clinique du patient.

Ex. 4 : **quétiapine (XEROQUEL)** : prise au moins 1 h avant un repas. La posologie quotidienne de départ est de 300 mg à J1 et 600 mg à J2. La posologie quotidienne recommandée est de 600 mg, mais elle peut être augmentée jusqu'à 800 mg suivant les besoins cliniques. La dose sera adaptée dans l'intervalle de doses efficaces allant de 400 à 800 mg/j, en fonction de la réponse clinique et de la tolérance du patient. Prévention des récurrences des épisodes maniaques, mixtes ou dépressifs dans les troubles bipolaires : les patients ayant répondu à **XEROQUEL** dans le traitement aigu des troubles bipolaires doivent continuer le traitement à la même dose, administrée au moment du coucher.

**XEROQUEL** peut être ajusté en fonction de la réponse clinique et de la tolérance individuelle du patient dans l'intervalle de dose de 300 à 800 mg/j. Il est important d'utiliser la dose minimale efficace dans le traitement de maintien.

Ex. 5 : **azénapine (SYCREST)** : posologie initiale recommandée en monothérapie de 10 mg x 2/j, matin et soir. La posologie peut être réduite à 5 mg x 2/j en fonction de l'évaluation clinique. En polythérapie, une posologie initiale de 5 mg x 2/j est recommandée. Selon la réponse clinique et la tolérance de chaque patient, la posologie peut être augmentée à 10 mg x 2/j.

**THYMORÉGULATEURS (5) – PHARMACOLOGIE (3)****Effets cutanés**

Majoration d'un acné.

Aggravation ou apparition d'un psoriasis.

Plus rarement rash cutané, prurit, lupus.

**Effets hématologiques**

Le **lithium** entraîne classiquement une hyperleucocytose, et a parfois été proposé dans le traitement du syndrome de Felty. L'induction de leucémies lymphoïdes chroniques n'est pas démontrée.

**Effets cardiologiques**

Rares effets sur la repolarisation (aplatissement de l'onde T) et exceptionnelles arythmies ventriculaires (surtout en cas de surdosage).

**Intoxication hyperlithémique**

Elle survient pour des lithémies  $< 1,2$  mEq/L. Elle peut être dramatique et entraîner le décès du patient ou laisser des séquelles définitives : syndrome cérébelleux, troubles mnésiques. Elle est favorisée par un régime désodé, la prise de médicaments anti-inflammatoires, des erreurs de dosage, une déshydratation, une fièvre ou une intoxication volontaire.

On la suspecte devant toute apparition de

signes digestifs et neurologiques : dysarthrie, céphalées, nausée, diarrhées, vomissements, confusion, tremblement majoré, vertiges, syndrome cérébelleux, nystagmus. Les formes graves évoluent vers le coma et le collapsus cardiovasculaire. Le traitement est initialement symptomatique : arrêt du **lithium**, contrôle de la lithémie, réhydratation, diurèse osmotique. Dans les formes graves le transfert en réanimation s'impose.

Le traitement préventif repose sur l'éducation du malade et le dépistage précoce.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Elles sont nombreuses.

Classiquement les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** peuvent augmenter la lithémie. Les **tétracyclines**, le **métronidazole** auraient le même effet.

L'association **antipsychotique - lithium** doit être prudente en raison du risque de confusion et de neurotoxicité.

Les **ISRS** associés au **lithium** entraînent parfois un syndrome sérotoninergique.

Les **corticoïdes** et les bases xanthiques diminuent la lithémie.

Les **diurétiques** sont contre-indiqués avec les **sels de lithium**.



## TROUBLES DE L'HUMEUR (13) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (5)

### Traitements associés

Les **thymorégulateurs** ont un délai d'action antimaniaque de l'ordre de 1 à 2 sem. Certaines situations cliniques exigent une amélioration symptomatique rapide (agitation importante, trouble du comportement, insomnie totale, etc.).

La prescription repose sur le principe visant à privilégier une monothérapie le plus souvent possible. D'autres traitements peuvent être envisagés en 2<sup>e</sup> intention pour les épisodes aigus, maniaques ou mixtes, hypomaniaques : les **anticonvulsivants** tels que l'**oxcarbazépine** (hors AMM), les **antipsychotiques** conventionnels (hors AMM), d'autres **antipsychotiques atypiques** : **amisulpride**, **clozapine** (hors AMM). La prescription de **clozapine** requiert des mesures de précaution obligatoires (surveillance régulière de la numération formule leucocytaire et du nombre absolu de polynucléaires neutro-

philes) et doit être réalisée conformément aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit (RCP).

En cas de réponse partielle on associera alors deux **thymorégulateurs** ou on en associera un avec des **benzodiazépines** ou des **antipsychotiques**. Ex. : **TÉMESTA** 4 à 8 mg/j, **VALIUM** 30 mg/j ou **NOZINAN** : 100 à 300 mg/j.

Les formes de manie avec symptômes psychotiques sévères seront traitées initialement comme des épisodes psychotiques aigus. Dans tous les cas, l'utilisation des **antipsychotiques** classiques sera transitoire avec une surveillance médicale stricte.

Les patients avec des troubles affectifs supporteraient moins bien les **antipsychotiques** classiques que les patients psychotiques. Ils présenteraient un risque accru de syndrome malin et de dyskinésie tardive.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (14) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (6)

### Évolution sous traitement

L'état maniaque régresse en 3 à 4 sem. On observe fréquemment un virage dépressif de l'humeur au décours de l'accès maniaque. Cette inversion de l'humeur nécessite un réajustement des posologies du **thymorégulateur** et un arrêt des **antipsychotiques**. L'introduction d'un **anti-dépresseur** se fera de façon prudente afin de ne pas induire un nouvel épisode maniaque.

Les manies résistantes au traitement (de même les formes de manie furieuse) sont l'indication des sismothérapies.

La surveillance de la tolérance du traitement est fonction du **thymorégulateur** prescrit.

### Avec les anticonvulsivants

Pour le **lithium**, la lithémie sera vérifiée 1 sem. après la prescription puis tous les 3 mois et après chaque changement de posologie ; la **fonction rénale et thyroïdienne** tous les 6 mois et plus souvent en cas d'aggravation de la fonction rénale. Les principaux effets indésirables observés sont des tremblements, une prise de poids, une polyuropolydypsie.

Au début de la prescription du **LAMICTAL** des effets indésirables cutanés ont été signalés, ils sont généralement survenus dans les 8 premières sem. après l'instauration du traitement par **lamotrigine**. La majorité des éruptions sont bénignes et transitoires, des éruptions cutanées graves nécessitant une hospitalisation et un arrêt de la **lamotrigine** ont également été rapportées : éruptions pouvant mettre en jeu le pronostic vital, comme le syndrome de

**Stevens-Johnson** et le **syndrome de Lyell**.

La prescription de **DÉPAKOTE** nécessite une surveillance du bilan hépatique, de la NFS et de la numération plaquettaire avant, pendant et en fin de traitement. **DÉPAMIDE** et **DÉPAKOTE** sont en général bien tolérés en dehors d'effets sédatifs initiaux et d'une prise de poids. Les effets secondaires digestifs s'amendent le plus souvent spontanément. Le **TÉGRETOL** nécessite des contrôles réguliers de la NFS et du bilan hépatique.

### Avec les antipsychotiques

On surveillera le poids, le périmètre abdominal, la glycémie plasmatique, le bilan lipidique. Un ECG doit être réalisé pour les patients ayant un ATCD cardiovasculaire ou un facteur de risque cardiovasculaire. Les **antipsychotiques** doivent être utilisés avec prudence chez les patients avec des antécédents familiaux d'allongement du QT. On recherchera des signes ou des symptômes évoquant un syndrome malin des antipsychotiques (neuroleptiques).

La durée du traitement d'un épisode maniaque est fonction des antécédents du patient. Lors d'un 1<sup>er</sup> épisode on peut interrompre le traitement après 6 mois. De plus en plus souvent, on décide de poursuivre le traitement thymorégulateur à visée préventive.

### Traitement à long terme des troubles bipolaires

Les stratégies de traitement prophylactique des troubles bipolaires sont établies sous la forme de recommandations pratiques qui concernent l'ensemble de la prise en charge du trouble.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (15) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (7)

### Diagnostic et information du patient

- **Confirmer le diagnostic** de troubles bipolaires : en précisant notamment la fréquence, le type d'épisodes et l'association éventuelle à d'autres troubles psychiatriques.

- **Évaluation psychosociologique** : le statut socioprofessionnel influence la qualité de l'observance.

- **Établissement d'une alliance thérapeutique** avec le patient. Cette étape est essentielle. La plupart des échecs sont liés à une mauvaise observance ou à un arrêt du traitement. Le patient doit être informé des objectifs du traitement, de la nécessité de le poursuivre pendant un temps prolongé (au moins 2 à 3 ans) pour en évaluer l'efficacité. Il doit connaître les effets indésirables et les signes qui annoncent un surdosage. Le patient doit être capable d'appliquer des règles d'hygiène de vie qui constituent une garantie supplémentaire contre les récives maniaques et dépressives (sommeil régulier, etc.).

- **Information du patient et de son entourage** : le psychiatre doit aider le patient à identifier les symptômes qui annoncent une récive. Une information, par le recours à des ouvrages et des documents sur la maladie, doit être communiquée au patient.

- **Prise en charge spécifique** :

- des troubles anxieux associés ;
- des conduites addictives associées ;
- des patientes qui souhaitent une grossesse, enceintes ou qui allaitent ;
- des sujets âgés.

### Stratégie thérapeutique

- **Les critères de décision de prescription** d'un **thymorégulateur** ne sont pas encore clairement établis. Cette décision s'appuie sur la fréquence des récives, l'intensité des épisodes, les enjeux socioprofessionnels et familiaux. Un seul épisode maniaque peut parfois suffire pour décider du traitement. Choix du **thymorégulateur** : en France ont l'AMM pour la prévention des rechutes : les **sels de lithium**, le **DÉPAMIDE**, le **DÉPAKOTE**, le **TÉGRÉTOL**, le **LAMICTAL** (chez les patients à prédominance d'épisodes dépressifs), le **ZYPREXA**,

l'**ABILIFY**, le **XEROQUEL**. Les **sels de lithium** sont indiqués en 1<sup>re</sup> intention. Ils entraînent une diminution de la fréquence et de l'intensité des épisodes maniaques. Le **lithium** serait moins efficace pour la prévention des récives dépressives. Les **anticonvulsifs** sont indiqués en cas de résistance ou d'intolérance au **lithium** ou dans les troubles bipolaires type II. Les **anticonvulsifs** sont aussi indiqués pour les cycles rapides. En cas de résistance, on peut proposer parfois d'associer au **lithium** un **anticonvulsif** (**lithium** + **DÉPAMIDE**, **lithium** + **TÉGRÉTOL**, etc.).

- **Surveillance au long cours**. Elle implique au minimum une évaluation clinique trimestrielle et une surveillance biologique en fonction du traitement **thymorégulateur**.

- **Durée du traitement** : pour les traitements bien tolérés et efficaces, le traitement doit être prolongé à vie. Tout arrêt du traitement doit être négocié avec le médecin traitant. L'interruption expose à un risque de rechute en particulier maniaque. La décision d'arrêter le traitement peut être dictée par : maladie somatique intercurrente, grossesse, inefficacité.

- **Psychothérapies** : elles ont une place importante. Certains patients peuvent demander une psychothérapie plus structurée (cognitivo-comportementale). Le patient doit savoir ce qu'il peut ou pas en attendre. La psychothérapie est toujours associée au traitement **thymorégulateur**, qu'elle ne peut remplacer.

- **Psychoéducation** : elle concerne le patient et les membres de la famille. Elle vise à mieux faire connaître la maladie, à expliquer le rôle de la médication, des facteurs de risque et de protection, apprendre à reconnaître les signes précurseurs spécifiques d'un épisode de la maladie, à établir une bonne hygiène de vie avec une régularité des habitudes de vie, à développer des stratégies afin de gérer au mieux des épisodes de maladie. Cette approche a démontré son efficacité avec une diminution du taux de rechutes et meilleure adhérence au traitement médicamenteux.

## TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (1)

Longtemps limitée à l'**anorexie mentale**, la clinique des troubles de l'alimentation s'est considérablement étoffée avec la prise en compte des **conduites boulimiques**.

Ces deux troubles, probablement liés, restent cependant séparés en tant que catégories diagnostiques dans les systèmes nosologiques actuels.

### Deux syndromes spécifiques principaux (CIM-10)

Ce sont l'anorexie mentale et la boulimie (*bulimia nervosa*).

À côté de ces deux syndromes, la CIM-10 décrit des formes atypiques d'anorexie mentale et de boulimie.

Ces troubles sont qualifiés d'atypiques au sens où manquent le plus souvent des symptômes essentiels au diagnostic de l'une ou l'autre des catégories principales. C'est le cas par exemple de la boulimie atypique à poids normal voire excessif ou de l'anorexie mentale atypique avec perte de poids modérée ou absence d'aménorrhée.

Le DSM-IV propose de préciser : 1) si l'anorexie mentale est à forme restrictive pure ou avec crises de boulimie ; 2) si les boulimies sont avec ou sans vomissements et/ou abus de **laxatifs**.

Les enquêtes épidémiologiques situent généralement la prévalence de l'anorexie aux environs de 1 à 4 pour 100 000 dans la population générale. Les conduites boulimiques auraient une prévalence de l'ordre de 1 % dans la population de jeunes femmes.

Les deux troubles surviennent préférentiellement à l'adolescence et chez les adultes jeunes avec une nette prédominance chez les femmes.

### Anorexie mentale

Elle est caractérisée par une perte de poids intentionnelle et une conduite active de restriction alimentaire. Il est exigé dans la CIM-10 une perte de poids aboutissant à un poids inférieur à la normale de 15 % (index de masse corporelle  $< 17,5 \text{ kg/m}^2$ ). La perte de poids est provoquée par l'évitement des aliments qui font grossir, plus ou moins associé à des vomissements provoqués, une hyperactivité physique, la prise de **laxatifs** et/ou de **diurétiques**. Il n'existe donc pas d'anorexie « vraie » dans l'anorexie mentale.

Il y a presque toujours une peur de grossir et une perturbation de la perception de son poids et de la forme de son corps. L'image du corps exerce une influence excessive sur l'estime du sujet. Le déni de la maigreur représente un des éléments de gravité de cette pathologie. Les sujets, et souvent l'entourage, consultent tardivement dans un état parfois catastrophique sur le plan somatique. Certains auteurs devant la forme majeure de ce déni ont pu évoquer la notion de « délire localisé ». À la restriction alimentaire et l'amaigrissement s'associe enfin une aménorrhée primaire ou secondaire, l'ensemble constituant la triade anorexique classique.

### Boulimie nerveuse

Elle est caractérisée par la survenue répétée d'accès d'hyperphagie et une préoccupation excessive concernant le contrôle du poids corporel. Au cours des accès, en dehors de la consommation d'une quantité importante de nourriture en un temps limité, c'est surtout la notion de **perte de contrôle** sur le comportement alimentaire qui est assez caractéristique.

## TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (2)

### Évolution et pronostic

Le pronostic et l'évolution des troubles des conduites alimentaires sont réservés. En effet les conduites anorexiques et boulimiques ont tendance à s'auto-entretenir et s'autorenforcer.

Classiquement on observerait dans l'anorexie 1/3 de guérison, 1/3 d'évolution vers la chronicité (avec 5 à 10 % de décès), et 1/3 présentant une évolution intermédiaire.

L'évolution des troubles boulimiques est moins bien connue. 1/3 évoluerait sur un mode chronique avec une désinsertion socioprofessionnelle importante. La survenue de décompensation dépressive n'est pas rare dans les boulimies qui évoluent parfois sur un mode périodique comme les troubles de l'humeur. La survenue d'un abus voire d'une dépendance à l'alcool peut également s'observer.

Le pronostic des anorexies et des boulimies doit tenir compte également du pronostic sur le plan de la personnalité.

### Méthodes

Il existe de nombreuses méthodes thérapeutiques proposées dans les troubles de l'alimentation. Ces approches doivent nécessairement être complémentaires et adaptées aux différentes étapes de l'évolution de chaque cas particulier.

Comme le pronostic dépend en partie de la précocité de la mise en route des stratégies thérapeutiques, il importe de fixer d'emblée, au-delà des améliorations symptomatiques initiales, des objectifs à long terme dans la prise en charge des anorexies et des boulimies.

Le traitement des anorexies et des boulimies s'appuie principalement sur les *psychothérapies individuelles*.

Les *traitements pharmacologiques* ont une place réduite dans les anorexies et ils représentent un traitement d'appoint dans les boulimies. Les *approches nutritionnelles* permettent souvent une réorganisation de l'alimentation souvent très désorganisée chez ces patients.

### Cadre thérapeutique

#### Prises en charge en urgence

Elles sont rarement appropriées, particulièrement chez les boulimiques.

L'instauration progressive d'un cadre thérapeutique et d'une relation de confiance avec le patient est donc une étape essentielle dans le traitement des anorexiques et des boulimiques.

La prise en charge est ambulatoire dans la boulimie et pour les anorexies modérées, vues précocement.

L'hospitalisation s'impose chez l'anorexique en cas :

- d'amaigrissement important et rapide,
- de dépression avec risque suicidaire,
- de risque vital engagé (troubles ioniques).

Les hospitalisations sont rarement acceptées par ces patients et ils doivent y être préparés. Il est préférable d'obtenir l'accord du patient à un projet thérapeutique, plutôt que de recourir à une hospitalisation sous contrainte (type SPDT).

Les anorexiques sont très fréquemment hospitalisés pour des durées prolongées, parfois plusieurs mois dans les formes sévères.

#### Objectifs à court terme du traitement

Ils sont d'obtenir une amélioration symptomatique au niveau pondéral et un assouplissement des modalités défensives et relationnelles du sujet. Les objectifs sont souvent définis à l'aide d'un contrat associant :

- **un contrat de poids** : on fixe avec le patient un poids de sortie ;
- **un contrat de séparation** : un poids intermédiaire inférieur au poids de sortie est fixé au préalable. En dessous de ce poids, le sujet ne peut voir son milieu habituel, en particulier familial.

Ces contrats négociés avec les familles et les patients permettent de s'assurer que l'hospitalisation sera menée à son terme sans être remise en cause par des manipulations. Le contrat s'avère également un médiateur dans les relations entre le patient et l'équipe soignante.

## TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (3) – ANOREXIE

### Prise en charge nutritionnelle

#### Formes habituelles

Le traitement vise à réintroduire une réalimentation progressive et à diversifier les apports alimentaires. La prise en charge nutritionnelle a aussi pour objectif de réapprendre au patient les habitudes de table et les dimensions culturelles et relationnelles des repas.

La reprise de poids doit être habituellement progressive.

#### Formes graves

Exceptionnellement, lorsque le risque vital est engagé, on aura recours à une *réalimentation par voie entérale continue* (sonde gastrique, nutripompe).

Ces techniques, parfois inévitables, peuvent être aussi dangereuses en cas de renutrition trop brutale (occlusion, gastropylégie aiguë, troubles métaboliques). Elles favorisent également une attitude passive du patient.

### Psychothérapies

Elles peuvent être individuelles ou familiales.

#### Psychothérapies individuelles

##### ► Psychothérapies

##### *cognitivo-comportementales*

Elles ont été surtout développées pour les conduites boulimiques. Elles commencent à être utilisées pour l'anorexie.

Elles sont centrées principalement sur les théories nutritionnelles erronées des anorexiques et sur les troubles de la perception du corps et de ses formes. Elles prennent tout leur sens en période de reprise pondérale.

##### ► Psychothérapie d'inspiration analytique

Elle vise à prévenir la chronicisation des troubles et à restaurer chez les sujets des capacités relationnelles satisfaisantes. Elle est compatible avec les autres prises en charge, en particulier comportementale et nutritionnelle. Elle ne s'adresse pas non plus spécifiquement à des patients avec des troubles de la personnalité.

L'approche psychanalytique des anorexiques est centrée fréquemment autour de la notion

de dépendance, conçue comme une faillite des ressources internes du sujet et une vulnérabilité accrue aux réponses de l'environnement. La psychothérapie analytique des anorexiques, au moins au début, nécessite souvent des aménagements techniques. C'est donc le plus souvent une psychothérapie de « deuxième intention ».

#### Psychothérapie familiale

L'abord familial est essentiel dans la prise en charge des anorexiques. Il peut s'agir de thérapies systémiques, analytiques ou d'entretiens familiaux. Ces thérapies visent à « dénouer » certaines boucles relationnelles familiales qui entretiennent les conduites pathologiques et à redéfinir la place spécifique de chacun.

### Traitements médicamenteux

#### Correction des désordres nutritionnels

- **Sels de potassium** en cas d'hypokaliémie (vomissements, **diurétiques**, **laxatifs**).
- Dans les grandes carences, on pourra apporter du **cuivre** et du **zinc**.
- Les anorexies anciennes présentent souvent des troubles de la vidange gastrique qui nécessitent l'emploi d'**ÉRYTHROCINE** à faible dose (250 mg avant les repas).
- L'ostéoporose sera traitée par des apports en **calcium** et **vitamine D**.

Au niveau des traitements spécifiques de l'anorexie, aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité.

#### Antidépresseurs - antipsychotiques

Ils peuvent être utiles en cas de dépression majeure. Les **antipsychotiques** sont utiles en cas de sthénicité importante. Ils sont utilisés principalement à visée sédatrice (**LARGACTIL**, **TERCIAN**). L'**olanzapine** (**ZYPREXA**) est utilisée par certaines équipes en vertu de ses propriétés orexigènes.

### Suivi à long terme

Le médecin joue le rôle de référent et de garant de la continuité des soins. Il posera les indications des divers traitements et sera chargé de planifier les stratégies thérapeutiques souvent prolongées sur plusieurs années.

## TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (4) – BOULIMIE

### Prise en charge nutritionnelle

Elle comporte deux volets principaux.

#### Carnet alimentaire

Il permet de recenser les prises alimentaires quotidiennes et d'identifier les facteurs qui facilitent la survenue des crises. Il sert parfois de base pour amorcer une psychothérapie d'inspiration cognitivo-comportementale.

#### Régime alimentaire

Il s'agit le plus souvent de restaurer une alimentation équilibrée avec 3 repas/j. Le patient doit accepter de renoncer à perdre du poids et à limiter la restriction alimentaire qui a souvent pour effet de favoriser les crises. Le régime, souvent difficile à obtenir, sera temporairement contre-indiqué en cas de crises fréquentes.

### Psychothérapies

#### Psychothérapies cognitivo-comportementales

Elles se sont beaucoup développées dans la prise en charge des boulimies.

Différents modèles cognitifs sous-tendent les programmes thérapeutiques. Ces modèles prennent en compte les facteurs émotionnels cognitifs et comportementaux impliqués dans l'initiation et le maintien des conduites boulimiques.

L'abord thérapeutique centré initialement sur le trouble alimentaire débordera souvent ce cadre pour travailler avec le patient au niveau de son estime de soi et son autonomisation.

Les thérapies cognitivo-comportementales associent à des degrés divers :

- la *relaxation* ;
- les *techniques d'affirmation de soi* ;
- les *techniques d'exposition aux aliments interdits* et prévention de la réponse ;
- le *travail sur les schémas cognitifs* et sur les distorsions concernant le poids et l'image du corps.

#### Approche psychanalytique

Elle est assez proche de celle proposée dans l'anorexie.

### Thérapies de groupe et groupes de paroles

Ils sont particulièrement employés dans les boulimies.

### Traitements médicamenteux

#### Traitements symptomatiques

Ils visent à corriger les désordres hydro-électrolytiques liés aux vomissements ou à la prise de **diurétiques/laxatifs** (sels de potassium par exemple).

Concernant les traitements spécifiques des conduites boulimiques, de nombreux produits ont été utilisés : **thymorégulateurs, antidépresseurs, anticonvulsivants.**

#### Antidépresseurs

Les **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine** sont particulièrement intéressants.

Par leurs effets « anti-impulsifs », ils permettraient au patient de différer les crises de boulimie. On peut utiliser : **fluoxétine (PROZAC)** 1 à 2 gél. à 20 mg/j. AMM : boulimie, en complément d'une psychothérapie, indiqué dans la diminution de la fréquence des crises de boulimie et des vomissements ou prise de laxatifs. Les **antidépresseurs** permettent aussi de traiter les troubles de l'humeur et les troubles anxieux fréquents chez ces patients.

Comme dans l'anorexie, les traitements médicamenteux ne doivent pas représenter le seul élément du traitement des boulimies.

### Suivi des patients boulimiques

Les patients boulimiques ont souvent une avidité importante pour les soins (« boulimies de thérapies et de thérapeutes »). Le suivi sera donc confié, comme dans l'anorexie, à un médecin référent garant de la continuité de la prise en charge.

Le suivi conjoint par un psychothérapeute et un psychiatre référent sera finalement assez proche des thérapies bifocales proposées dans les troubles de personnalité limite.

## TOXICOMANIES (1)

La toxicomanie est un trouble des conduites caractérisé par l'existence d'un abus ou d'une pharmacodépendance psychique (cannabis, amphétamines, cocaïne, solvants, hallucinogènes), et parfois physique (opiacés, **benzodiazépines**, barbituriques), à une substance toxique, entraînant des phénomènes d'accoutumance et de tolérance à ce produit. Les toxicomanes (entre 100 000 et 150 000 personnes en France dont 3/4 d'hommes) constituent une population particulièrement vulnérable au plan psychosocial (alcoolisme associé, désinsertion) et somatique (sida). Le mode d'administration de la drogue est variable (ingérée, fumée, sniffée, injectée).

**La dépendance psychique** est essentielle et se caractérise par la recherche contraignante de la satisfaction et le désir de répéter ou de prolonger la prise de drogue afin de provoquer un plaisir ou d'éviter un déplaisir, elle est aussi relationnelle.

**La dépendance physique** est définie comme un état d'adaptation à la drogue qui s'accompagne d'une tolérance et s'exprime par l'apparition d'un syndrome de manque.

**En matière de sevrage** il apparaît que, loin d'être une fin en soi résumant à elle seule

le traitement, la cure de sevrage n'a de sens qu'en tant qu'élément d'un programme global d'un traitement devant s'inscrire très fréquemment dans le long terme.

**La cure de sevrage** a donc une utilité double :

- directe : diminution de la consommation de produits opiacés, voire même abstinence totale ;
- indirecte : prise de conscience de la dépendance, désir du sujet d'intégrer le système de soin médical et médico-social, amélioration de la qualité du suivi et des aides à l'insertion familiale, professionnelle et sociale.

L'évaluation du devenir du sujet dépendant aux opiacés ne saurait s'appuyer sur la seule consommation de drogues et l'abstinence : l'adaptation sociale et le fonctionnement psychologique général, les troubles psychopathologiques, les problèmes médicaux, les conduites antisociales sont autant de dimensions dont il faut tenir compte pour juger de l'efficacité d'un traitement.

**Les techniques de substitution** sont importantes dans l'approche des sevrages, mais la substitution est un outil de régulation de l'addiction et en rien un sevrage.

### CLASSIFICATION DES PRINCIPALES SUBSTANCES PSYCHOTROPES TOXICOMANOGENES (Delay et Deniker, 1957)

- Psychostimulants : amphétamines, cocaïne et dérivés.
- Psycholeptiques : **barbituriques**, **hypnotiques**, **benzodiazépines**.
- Psychodysléptiques : hallucinogènes et onirogènes (cannabis, marijuana, haschisch, phényléthylamines, LSD, etc.), stupéfiants (**opiacés**, **méthadone**, **buprénorphine** etc.), alcools et dérivés (éther, solvants organiques).



## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (1)

## ■ Méthadone

<b>MÉTHADONE AP-HP</b>				
Prescription initiale par médecin exerçant en centre de soins pour toxicomanes, sur ordonnance sécurisée, limitée à 7 j Nécessité d'une surveillance médicale pluri-hebdomadaire (contrôle urinaire) Mise en place du traitement : 20 à 30 mg, 10 h au moins après la dernière prise d'opiacés, en une prise unique quotidienne, à augmenter à 40 à 60 mg/j en 1 à 2 sem. puis de 10 mg/sem., en fonction de la réponse clinique jusqu'à 100 mg	1 unidose 5 mg/3,75 mL	1,40	65 %	1,40
	1 unidose 10 mg/7,5 mL	1,49	65 %	1,49
	1 unidose 20 mg/15 mL	1,67	65 %	1,67
	1 unidose 40 mg/15 mL	1,75	65 %	1,75
	1 unidose 60 mg/15 mL	1,84	65 %	1,84
	7 gél. 1 mg	3,28	65 %	0,47
	7 gél. 5 mg	5,11	65 %	0,73
	7 gél. 10 mg	5,80	65 %	0,83
	7 gél. 20 mg	7,22	65 %	1,03
	7 gél. 40 mg	7,85	65 %	1,12
	1 fl. sirop 1,33 mg/mL	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Agoniste morphinique.

**INDICATIONS**

Traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Enfant (moins de 15 ans), insuffisance respiratoire grave, hypersensibilité à la **méthadone**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Nécessité d'une prise en charge médico-psycho-sociale conjointe. Risque de syndrome de sevrage aigu en cas d'interruption brutale du traitement. Surveillance plus particulière des sujets âgés ou présentant une pathologie somatique grave (asthme, insuffisance respiratoire, rénale, hépatique ou surrénalienne, hypothyroïdie, diabète).

**Grossesse** : évaluation du rapport bénéfice/risque pour la mère et l'enfant, risque de sevrage chez le nouveau-né.

**Allaitement** : pourrait prévenir le risque de sevrage aigu chez le nouveau-né.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles respiratoires (dépression voire arrêt respiratoire si surdosage), cardiaques (flush facial, bradycardie, palpitations, hypotension artérielle avec risque de choc voire d'arrêt cardiaque si surdosage), troubles neuropsychiques (euphorie, agitation, somnolence, céphalées, vertiges), digestifs (constipation, nausées, vomissements, spasmes des voies biliaires), génito-urinaires (dysurie, troubles de la libido), allergiques (urticaire, prurit, œdèmes), hypersudation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool, **agonistes/antagonistes morphiniques** (syndrome de sevrage), autres dérivés morphiniques (dépression respiratoire), dépresseurs du SNC, **IMAO, antidépresseurs** sérotoninergiques, **cimétidine, rifampicine, phénytoïne** (sevrage), acidifiant et alcalinisant urinaires.

**PROPRIÉTÉS**

La naloxone est destinée à empêcher le mauvais usage du produit par voie IV.

## TOXICOMANIES (2)

### Toxicomanie aux opiacés

Les **opiacés** (héroïne, **morphine**, **codéine**, etc.) peuvent être utilisés en « sniff » ou en « shoot » (IV), produisant alors un « flash », sensation de bien-être intense. Le risque principal est celui du surdosage (overdose) qui peut entraîner des complications graves (rhabdomyolyse, pneumopathie d'inhalation, OAP lésionnel, anoxie cérébrale) parfois irréversibles.

#### Surdosage en opiacés

##### ► *Signes cliniques*

- Dépression respiratoire.
- Troubles neurovégétatifs (hypothermie, bradycardie, troubles du rythme).
- Myosis serré bilatéral.
- Constipation, rétention d'urine.
- Troubles de la conscience, voir coma stuporeux aréflexique.

##### ► *Risques*

- Globe vésical.
- Hypothermie.
- Œdème pulmonaire.
- Collapsus cardiovasculaire.
- Mort subite.

##### ► *Traitement*

Administration d'un **antagoniste spécifique des récepteurs morphiniques centraux**, naloxone (**NARCAN**) 1 amp. de 0,4 mg en IV puis 0,1 mg toutes les min jusqu'à obtention d'une ventilation efficace et sans dépasser 10 mg au total.

La prévention antitétanique, la recherche et le traitement spécifique des éventuelles complications fréquentes chez les toxicomanes aux **opiacés** (abcès aux points d'injection, endocardite tricuspide, hépatites virales B et C, sida, etc.) doivent être pratiqués.

### Sevrage aux opiacés [1]

La réalisation pratique du sevrage ne représente qu'une partie limitée de la prise en charge d'un patient dépendant. Elle s'inscrit dans un projet plus large qui comprend une phase de préparation et d'évaluation préalable et prévoit d'emblée les modalités de poursuite de la prise en charge au décours.

**La phase de préparation** permet de s'assurer du caractère adapté de l'indication de sevrage et de l'absence de contre-indication, de discuter et de choisir, avec le patient, le cadre du sevrage. La préparation et la mise en place des sevrages peuvent se décrire en trois temps différenciés : la prise de contact, le constat clinique et la négociation du contrat de soins.

**La prise de contact** a comme l'objectif principal la construction de la relation thérapeutique. Le « **constat clinique** » est une évaluation psychopathologique, des dépendances, évaluation sociale initiale, évaluation somatique (l'examen clinique et biologique). Enfin, on évalue l'opportunité du sevrage, négocie le **projet**, la place de la psychothérapie (entretiens motivationnels) et finalement le cadre (ambulatoire ou institutionnel).

Le sevrage en milieu hospitalier est réalisé en service de médecine non spécialisé, en service psychiatrique ou en institution spécialisée. Le choix du lieu paraît davantage lié à l'offre de soins qu'à une réelle réflexion clinique ou théorique. Le **contrat** est établi entre le patient et l'équipe de soins : variable suivant les institutions, insiste sur le nécessaire respect par le patient de leurs règles de vie, comprend habituellement une période de durée variable pendant laquelle le patient accepte une limitation plus ou moins complète des sorties, des visites, et des appels téléphoniques personnels.

## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (2)

## ■ Buprénorphine

<b>SUBUTEX</b>					
Prescription sur ordonnance sécurisée pour une durée de 28 j	7 cp. subling. 0,4 mg	2,80	I	65 %	0,40
Délivrance fractionnée de 7 j	7 cp. subling. 2 mg	6,18	I	65 %	0,88
Mise en route du traitement : 0,8 à 2 mg/j en une prise, 4 h au moins après la dernière prise de stupéfiants	7 cp. subling. 8 mg	17,65	I	65 %	2,52
Augmentation des doses à 16 mg/j en une prise selon la réponse clinique					

**PROPRIÉTÉS**

Agoniste/antagoniste morphinique (analgésique-opioïde).

**INDICATIONS**

Traitement substitutif d'une pharmacodépendance majeure aux opiacés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **buprénorphine**, enfant (moins de 15 ans), insuffisance respiratoire ou hépatique sévère, intoxication alcoolique aiguë et delirium tremens.

**Grossesse** : déconseillé.

**Allaitement** : déconseillé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de pharmacodépendance, détournement du traitement par usage en IV. À utiliser avec précaution chez l'insuffisant respiratoire, rénal ou hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, céphalées, insomnies, asthénie, somnolence, nausées, vomissements, hypotension orthostatique, sueurs, dépression respiratoire.

Certains toxicomanes utilisent la **buprénorphine (SUBUTEX)** en injection IV après avoir dissous les cp. dans de l'eau ou du jus de citron. Des infections et des hépatites cytolytiques ont été rapportées par cette voie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool (somnolence), **benzodiazépines** et autres dépresseurs du SNC, **IMAO**.

Inhibiteurs du CYP3A4 (augmentation des concentrations de **buprénorphine**) : **antifongiques azolés, inhibiteurs de protéases...**

Inducteurs du CYP3A4 (pas d'étude, surveillance étroite) : **phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, rifampicine**, etc.

## TOXICOMANIES (3)

### Signes cliniques

Le syndrome de manque aux opiacés apparaît 6 à 8 h après la dernière prise des opiacés) associe diversement les symptômes suivants : syndrome pseudo-grippal, anxiété, puis agitation, syndrome confuso-onirique, lombalgies, hyperalgésie, douleurs diffuses à prédominance musculaire, douleurs abdominales, accélération du transit intestinal, diarrhée et parfois vomissements, tremblements, sueurs, bâillement, larmolement, rhinorrhée, augmentation de la transpiration, tachycardie, hypertension artérielle et mydriase bilatérale de valeur sémiologique importante.

Aux signes physiques, s'ajoutent des symptômes psychiques : anxiété, irritabilité, recherche compulsive de produits, troubles du sommeil, dépression.

Le délai d'apparition des **symptômes de sevrage** est variable et fonction de la demi-vie d'élimination de la substance consommée. Pour l'héroïne dont l'élimination est rapide, les symptômes apparaissent en général après 6 à 12 h, s'accroissent progressivement jusqu'au troisième jour, et régressent habituellement en moins de 8 j.

Pour les produits de substitution dont l'élimination est longue (**méthadone** ou **buprénorphine**), les symptômes sont souvent décalés dans le temps et persistent de manière plus prolongée. Il s'agit alors notamment de manifestations psychiques (anxiété, insomnie, aboulie, asthénie) qui pourraient contribuer à une reprise ultérieure de la consommation de drogue.

### Traitement

L'arrêt de toute prise de toxique, la réhydratation, la renutrition, un apport polyvitaminique.

Les **traitements spécifiques** tentent de s'opposer à l'hyperfonctionnement adrénergique, considéré comme responsable des symptômes : la **clonidine (CATAPRESSAN)**, **antihypertenseur**,  $\alpha_2$ -stimulant central, efficace sur l'agitation, l'instabilité, la larmeyon, la rhinorrhée et la transpiration, a peu ou pas d'effet sur l'insomnie et les myalgies. L'administration est uniquement orale, en prises espacées de 2 à 3 h

et en augmentant progressivement la dose ; la surveillance de la pression artérielle est systématique, le traitement est interrompu transitoirement lorsque la pression systolique est inférieure à 100 mmHg. Cette thérapeutique est utilisée particulièrement au début de la prise en charge hospitalière lorsque les patients sont alités.

Ex. 1 : **clonidine (CATAPRESSAN)** 1 cp. à 0,15 mg x 6/j pendant 4 à 8 j.

Les traitements symptomatiques comportent : **antalgiques**, **spasmolytiques**, **anti-nauséeux**, **antidiarrhéiques**, **anxiolytiques**, **sédatifs** et **hypnotiques**. Les produits sédatifs sont indispensables, surtout dans les premiers jours.

Les **benzodiazépines** présentent un risque propre d'induction d'une pharmacodépendance, il paraît souhaitable de limiter leur utilisation et d'éviter leur emploi chaque fois que cela est possible. L'alternative peut être l'utilisation d'un **antipsychotique** sédatif tel que l'**alimémazine (THÉRALÈNE)** ou la **cyamémazine (TERCIAN)**.

### Modalités de suivi

L'indication d'un traitement par un produit de substitution : **méthadone chlorhydrate**, **buprénorphine (SUBUTEX)** ou **buprénorphine + naloxone (SUBOXONE)** peut être posée chez un sujet toxicomane chronique, motivé, compliant, en cas d'échec ou de contre-indication au sevrage.

Un accompagnement doit toujours être proposé. Le **suivi médical** tient compte des pathologies contractées pendant la période de dépendance telles les hépatites B ou C et le VIH. Celles-ci nécessiteront un suivi et/ou des thérapeutiques adéquates. L'**accompagnement social** vise à restaurer l'inscription sociale du patient. Le **suivi éducatif** cherche par la relation, le dialogue et l'accompagnement actif, à résoudre les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Le **soutien psychologique** est nécessaire tout au long de la prise en charge. La famille devrait pouvoir s'impliquer dans le processus de soins et de suivi. L'existence d'un support social éayant est l'un des facteurs favorisant l'efficacité des soins.

## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (3)

## ■ Buprénorphine + naloxone

SUBOXONE					
Prescription sur ordonnance sécurisée pour une durée de 28 j	7 cp. subling. 2 mg/0,5 mg	5,70	I	65 %	0,81
Délivrance fractionnée de 7 j	7 cp. subling. 8 mg/2 mg	16,13	I	65 %	2,30
Induction (J1) : 2-8 mg/j (de buprénorphine)					
Entretien : posologie fonction de la réponse clinique, avec adaptation par paliers de 2 à 8 mg					
Après stabilisation : diminution possible de la fréquence d'administration, mais sans modifier la dose prise par sem.					
<b>Ne jamais dépasser 24 mg/j</b>					

## PROPRIÉTÉS

Cf. buprénorphine.

La **naloxone** est destinée à empêcher le mauvais usage du produit par voie IV, en précipitant le syndrome de sevrage.

## TOXICOMANIES (4)

### Toxicomanie au cannabis

Le cannabis est la drogue illicite la plus répandue au monde et peut provoquer une « ivresse cannabique » (sensation de bien-être, désinhibition, dépersonnalisation-déréalisation, bouffée délirante) lors d'intoxications aiguës. L'usage chronique de cette substance a des conséquences psychiques (syndrome « amotivationnel ») et somatiques (céphalées, vomissements, tachycardie, hypotension artérielle orthostatique), mais n'entraîne pas de dépendance physique. Le principal risque est celui du passage à une consommation d'opiacés. Le risque relatif de développement d'une schizophrénie est de 6,

sans préjuger d'une quelconque relation causale.

### Aspects médico-légaux

Les soins aux toxicomanes sont régis par la loi du 31 décembre 1970 qui comprend un volet répressif (trafic et usage illicite de substances vénéneuses) et un volet médico-social qui incite le toxicomane à se sevrer, soit spontanément soit par le biais d'un signalement effectué par les services médico-sociaux à la DDASS. Enfin, l'injonction thérapeutique (obligation de soins décidée par le Procureur de la République) permet au toxicomane d'éviter une sanction pénale mais reste une disposition contestée.

### CONSENSUS

- [1] Modalités de sevrage chez les toxicomanes dépendant des opiacés, *Anaes*, 1998

## SUICIDE (TENTATIVE DE) (1)

Bien que ne figurant pas dans les classifications internationales des troubles mentaux (CIM-10 et DSM-IV), le suicide et les tentatives de suicides représentent l'urgence et le risque majeur du domaine de la psychiatrie. Le passage à l'acte suicidaire (tentative de suicide ou TS) n'est jamais un geste anodin et traduit l'échec des capacités d'élaboration psychique d'un sujet face à un conflit. Motif fréquent de consultation en urgence (150 000 TS/an en France), il constitue un geste qui entraîne environ 12 000 décès/an. 95 % des TS se font par ingestion médicamenteuse (**paracétamol, benzodiazépines**), associée dans un cas sur deux à de l'alcool, et/ou par phlébotomie. 60 % des suicides aboutis sont la conséquence d'une pendaison ou de l'utilisation d'une arme à feu. Le nombre de tentatives de suicide est plus important chez les femmes, mais le taux de décès par suicide est plus important chez les hommes. Les suicides sont plus fréquents en milieu rural, et sont favorisés par un mauvais niveau socio-économique. L'importance relative du suicide est maximum vers 30 ans et à cet âge c'est la première cause de décès (20 % des décès masculins et 15 % des décès féminins).

La question principale est, en urgence, celle de l'indication d'une hospitalisation, appréciée essentiellement en évaluant le risque de récurrence suicidaire.

### Facteurs de risque suicidaire

#### Caractéristiques générales

L'existence d'une pathologie psychiatrique aiguë, l'âge (adolescent ou sujet âgé), le sexe masculin, l'isolement familial (célibataire, veuf, rupture affective) ou social (chômage, difficultés scolaires), l'existence d'antécédents personnels et/ou familiaux de tentative d'autolyse, l'existence d'une pathologie somatique grave associée, facteurs de stress.

#### Caractéristiques psychopathologiques

Trouble de l'humeur, schizophrénie, trouble délirant chronique, trouble grave

de la personnalité, trouble démentiel, comorbidités : alcoolisme, toxicomanie.

#### Caractéristiques de l'idéation et du geste suicidaire [1]

Il est important d'évaluer :

##### 1. Le niveau de souffrance :

Désarroi ou désespoir, repli sur soi, isolement relationnel, sentiment de dévalorisation ou d'impuissance, sentiment de culpabilité.

##### 2. Le degré d'intentionnalité :

Idées envahissantes, rumination, recherche ou non d'aide, attitude par rapport à des propositions de soins, dispositions envisagées ou prises en vue d'un passage à l'acte (plan, scénario).

##### 3. Les éléments d'impulsivité :

Tension psychique, instabilité comportementale, agitation motrice, état de panique, antécédents de passage à l'acte suicidaire, de fugue ou d'actes violents.

Contexte :

- soit un geste non prémédité (trouble de la personnalité compliqué ou non d'un syndrome dépressif, recrudescence anxieuse dans le contexte d'un épisode dépressif majeur ; geste motivé par un état délirant dans un contexte de schizophrénie) ;
- soit au contraire notion de préméditation dans le cadre d'un syndrome dépressif majeur sévère (dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ou d'un trouble bipolaire) avec ou sans idées délirantes, épisode dépressif dans un contexte de schizophrénie.

##### 4. Un éventuel élément précipitant :

Conflit, échec, rupture, perte.

##### 5. La présence de moyens létaux à disposition :

Armes, médicaments, etc.

##### 6. La qualité du soutien de l'entourage proche :

Capacité de soutien ou inversement.

**SUICIDE (TENTATIVE DE) (2)****Prise en charge du sujet suicidant en urgence**

- Évaluation de l'urgence vitale et maintien des constantes sur place et pendant le transfert aux urgences.
- Si tentative de suicide par précipitation (défenestration) : immobilisation, maintien des constantes vitales. Aux urgences : prise en charge pluridisciplinaire, scanner corps entier à la recherche des lésions osseuses et viscérales.
- Évaluation de la quantité de médicaments et/ou de toxiques absorbés.
- Recherche de toxiques et alcoolémie.
- Traitement en rapport avec le moyen utilisé pour la TS (lavage gastrique, charbon, antidotes spécifiques).
- Traitement symptomatique.
- **Avis psychiatrique systématique lorsque le sujet est conscient** : évaluation du contexte clinique, de l'intentionnalité suici-

daire, du risque de récurrence et proposition (le plus souvent) d'une hospitalisation en milieu spécialisé, au besoin sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT), afin de protéger le sujet, de l'évaluer cliniquement, de mettre en route un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique et d'un éventuel traitement chimiothérapeutique soit un suivi rapproché en ambulatoire par un psychiatre ou une structure psychiatrique.

- Prise en charge de l'entourage [1].
- Prévention de récurrence : limiter l'accès au moyen de suicide, prise en charge des suicidants, amélioration de la connaissance épidémiologique, prise en charge des populations à risque, accompagnement des patients hospitalisés et sortant d'une hospitalisation en psychiatrie, surtout dans un contexte de prise en charge d'une crise suicidaire.

**CONSENSUS**

[1] Suicide : Effets et conséquences du suicide sur l'entourage, FFP, 2010



## ANXIOLYTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (1)

### ■ Clobazam

<b>URBANYL</b>					
Anxiété généralisée : 10 à 60 mg/j en 2 à 3 prises	30 gél. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
Crise d'angoisse aiguë : 10 à 20 mg en 1 fois	30 cp. séc. 10 mg	3,73	I	65 %	0,12
Prévention et traitement du delirium tremens : 10 à 60 mg/j	30 cp. séc. 20 mg	5,15	I	65 %	0,17
Sevrage alcoolique : 10 à 60 mg pendant 3 à 6 sem.					
Formes chroniques de l'épilepsie, en association avec le traitement de base : 0,5 mg/kg/j					

### ■ Clonazépam

<b>RIVOTRIL</b>					
Toutes les formes d'épilepsie rebelle	28 cp. 2 mg	2,16	I	65 %	0,08
Posologie à adapter selon l'âge, le poids, et la sensibilité individuelle : 0,05 à 0,1 mg/kg/j	20 mL sol. buv. (2,5 mg/mL)	2,25	I	65 %	0,11
État de mal convulsif : 1 amp. en IV lente à renouveler x 4 à 6/24 h	6 amp. 1 mL = 1 mg	4,71	I	65 %	0,79

### ■ Clorazépate dipotassique

<b>TRANXÈNE</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse aiguë, prévention du delirium tremens, sevrage alcoolique	30 gél. 5 mg	2,60	I	65 %	0,09
Posologie à adapter : 5 à 150 mg/j	50 gél. 5 mg	HOP	I		
Voie IV lente ou IM (agitation, agressivité, crise d'angoisse, prémédication) : 20 à 200 mg/24 h	30 gél. 10 mg	3,76	I	65 %	0,13
	50 gél. 10 mg	HOP	I		
	28 gél. 20 mg	5,73	I	65 %	0,20
	50 gél. 20 mg	HOP	I		
	5 inj. 20 mg/2 mL	18,80	I	65 %	3,76
	20 inj. 20 mg/2 mL	HOP	I		
	5 inj. 50 mg/2,5 mL	18,80	I	65 %	3,76
	20 inj. 50 mg/2,5 mL	HOP	I		

## TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (2)

### Principes de traitement

L'évolution du TAG est souvent fluctuante et chronique, rythmée par les événements de vie, et TAG requiert le plus souvent *une prise en charge prolongée*.

- Cette prise en charge ne doit pas se limiter à une chimiothérapie au long cours. Les patients anxieux chroniques doivent bénéficier d'un soutien psychothérapique. Les psychothérapies structurées, en particulier les thérapies cognitivo-comportementales, devraient être privilégiées.
- Des mesures hygiéno-diététiques sont recommandées : arrêt de la consommation d'alcool et de tabac, diminution de la consommation de café, pratique régulière d'une activité physique.

### Traitements pharmacologiques

En dépit de leur efficacité démontrée, le TAG n'est plus l'indication privilégiée des **benzodiazépines (BZD)** que l'on réserve pour les manifestations aiguës. La chimiothérapie fait désormais appel en 1<sup>re</sup> intention aux **antidépresseurs [1]**.

La **paroxétine**, l'**escitalopram**, la **venlafaxine**, la **buspirone**, la **prégabaline** ont l'AMM dans l'indication de TAG. Les **benzodiazépines** ou l'**hydroxyzine** ne doivent pas être prescrites dans le traitement de fond ; en revanche, elles peuvent être utilisées pour des périodes courtes d'exacerbation anxieuse : le patient prenant des **benzodiazépines** au long cours doit faire l'objet d'une information et d'une prise en charge spécifiques.

### Antidépresseurs

Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont : **paroxétine (DEROXAT)**, **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** et **escitalopram (SEROPLEX) [2]**.

Le délai d'action des **antidépresseurs** est de 1 à 3 sem. La réponse complète est obtenue après plusieurs sem. de traitement. La durée du traitement doit être d'au moins 6 mois (accord professionnel). La **paroxétine (DEROXAT)** est un **inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine (ISRS)**. Ses effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, l'asthénie, l'insomnie, la somnolence et les troubles sexuels.

L'**escitalopram (SEROPLEX)** est un **ISRS**. À des doses de 10 et 20 mg/j, il s'est montré efficace dans les 4 études contrôlées *versus* placebo. Un effet durable est apparu dès la 1<sup>re</sup> sem. Ses effets indésirables les plus fréquents sont l'insomnie ou la somnolence, des sensations vertigineuses, le bâillements, l'hypersudation, les troubles de la libido, les nausées et une prise pondérale. La **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** est un **inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)**. Elle est efficace dans le contrôle des signes psychiques d'anxiété du TAG dans les traitements de 28 sem. Son effet anxiolytique débute entre la 1<sup>re</sup> et la 3<sup>e</sup> semaine de traitement. Ses effets indésirables les plus fréquents sont les étourdissements en début de traitement, les nausées plus étalées dans le temps, la sécheresse de la bouche, l'asthénie, l'insomnie, la somnolence et les troubles sexuels.

Ex. 1 : **EFFEXOR LP** 37,5 et 75 mg (cp.) : 37,5 mg le premier jour puis 75 mg/j en une seule prise. La posologie peut être augmentée après 2 sem. de traitement par paliers de 37,5 mg/sem. jusqu'à 150 voire 225 mg/j.

Ex. 2 : **DEROXAT** 20 mg (cp.) : 1 cp./j. Cette posologie pourra être augmentée par paliers de 10 mg/j, en fonction de la réponse thérapeutique jusqu'à 50 mg/j.

Ex. 3 : **SEROPLEX** 5 mg (cp.) : 1 cp./j au cours de la 1<sup>re</sup> sem. de traitement, avant une augmentation à 10 mg/j. En fonction de la réponse thérapeutique du patient, la posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg/j. L'efficacité maximale est atteinte après environ 3 mois de traitement. Le traitement devra être poursuivi plusieurs mois.

La **paroxétine (DEROXAT)**, la **venlafaxine LP (EFFEXOR LP)** et l'**escitalopram (SEROPLEX)** sont les traitements de 1<sup>re</sup> intention ; s'il n'y a pas d'amélioration après 6 sem., augmenter les doses puis au bout de 12 sem. choisir l'autre traitement. En cas d'échec des traitements de 1<sup>re</sup> intention, la **clomipramine** peut être proposée (hors AMM). L'**imipramine (TOFRANIL)** est également efficace sur les signes psychiques de l'anxiété du TAG. Elle ne possède pas d'AMM dans cette indication.

## ANXIOLYTIQUES (2) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (2)

## ■ Chlordiazépoxycide + bromure de clidinium

LIBRAX					
<p>Manifestations anxieuses accompagnées de troubles fonctionnels digestifs à composante spasmodique</p> <p>Association : le bromure de clidinium est un <b>antispasmodique anticholinergique</b> contre-indiqué en cas de risque de glaucome par fermeture de l'angle ou de rétention urinaire par obstacle prostatique (cf. Gastro-entérologie) 2 à 4 cp./j</p>	30 cp. 5 mg + 2,5 mg		I	NR	

## ■ Diazépam

VALIUM ROCHE					
<p>Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos</p> <p>Posologie à adapter : 5 à 25 mg/j en 2 à 3 prises</p> <p>Voie IV lente ou IM (agitation, agressivité, crise d'angoisse, état de mal convulsif)</p> <p>Posologie variable, en moyenne : 0,1 à 0,2 mg/kg par inj. à renouveler jusqu'à 4 fois/24 h</p>	40 cp. séc. 2 mg	1,66	I	65 %	0,04
	40 cp. séc. 5 mg	1,72	I	65 %	0,04
	30 cp. séc. 10 mg	2,11	I	65 %	0,07
	600 gttes - fl. 20 mL (3 gttes = 1 mg)	2,92	I	65 %	0,01
	6 amp. (2 mL = 10 mg)	3,16	I	65 %	0,53

**TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (3)**

Quelle que soit la molécule prescrite, la durée de traitement du TAG est de 6 mois au moins. Une réévaluation est recommandée 1 à 2 sem. après la 1<sup>re</sup> consultation, puis toutes les 6 sem.

**Prégabaline (LYRICA)**

La posologie varie de 150 à 600 mg/j, en 2 ou 3 prises. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée régulièrement. Le traitement peut être instauré à la dose de 150 mg/j. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg/j après une sem. Après un délai supplémentaire d'une sem., la dose peut être augmentée à 450 mg/j. La dose maximale de 600 mg/j peut être atteinte après un délai supplémentaire d'une sem.

**Traitement médicamenteux des manifestations aiguës**

Il repose sur les **benzodiazépines** ou l'**hydroxyzine**, en association avec le traitement de fond. Les **benzodiazépines** seront prescrites avec prudence en cas de trouble addictif associé et en cas de dépendance ou de syndrome de sevrage antérieur aux **benzodiazépines**, et pour une durée limitée.

**Benzdiazépines**

Le traitement médicamenteux repose sur les benzodiazépines ou l'**hydroxyzine**, en association avec le traitement de fond. Les **benzodiazépines** seront prescrites avec prudence en cas de trouble addictif associé et en cas de dépendance ou de syndrome de sevrage antérieur aux **benzodiazépines**, et pour une durée limitée. Le choix d'une **benzodiazépine** est affaire de cas particuliers et d'habitudes de prescription. Aucune molécule n'apparaît supérieure aux autres. L'activité anxiolytique dépend pour une large part de la dose utilisée.

Les doses recommandées sont très variables d'un individu à l'autre. On propose des doses allant de 5 à 60 mg de **diazépam (VALIUM)**. Le choix du produit peut s'appuyer sur des paramètres pharmacocinétiques. On oppose les molécules

à demi-vie longue et à métabolite actif (**diazépam**, **chlordiazépoxyde**, **clorazépate dipotassique**, etc.) aux produits à demi-vie courte (**oxazépam**, **lorazépam**, etc.) préférés chez le sujet âgé. Les produits à demi-vie longue exposeraient moins au développement d'accidents de sevrage lors de l'arrêt des traitements.

Exemple de schéma thérapeutique : **benzodiazépine**, **diazépam (VALIUM 5 mg)** : 1 cp. matin et soir. Après une semaine, maintenir ou augmenter de 1 à 2 cp. selon la tolérance et l'efficacité.

**► Surveillance du traitement***En début de traitement*

- On surveillera principalement la tolérance et l'efficacité.

Un effet sédatif s'observe lors des premières prises et s'atténue en 3-4 j. Au-delà de ce délai, la somnolence indique un surdosage et implique une révision des posologies.

- On recherche également les effets indésirables classiques des **benzodiazépines** : amnésie antérograde, désinhibition paradoxale avec irritabilité et impulsivité.

- Dans le TAG, le délai d'action des **benzodiazépines** est habituellement de 2 à 5 j ; la réponse thérapeutique après une sem. serait le meilleur facteur prédictif de l'efficacité des **benzodiazépines**. Un patient non amélioré après quelques sem. de traitement incite à une révision du diagnostic, ou à un changement de molécule ou de classe médicamenteuse.

*Après plusieurs semaines de traitement*

- On élimine principalement l'existence d'une surconsommation par autopréscription qui fait craindre le développement d'une tolérance et d'une dépendance. Enfin au moment de la diminution progressive des doses, par paliers d'une sem., et de l'arrêt des traitements, on dépistera la survenue de symptômes anxieux qui peuvent traduire des phénomènes de rebond ou de sevrage.
- Le syndrome de sevrage survient en moyenne après 1 sem. pour les **BZD à demi-vie courte** ou après 3 sem. pour les **BZD à demi-vie longue**.

## ANXIOLYTIQUES (3) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE LONGUE (3)

## ■ Loflazépate d'éthyle

<b>VICTAN</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos (non indiquée dans l'épilepsie ou les contractures musculaires) Posologie moyenne : 1 à 3 mg/j	30 cp. séc. 2 mg	3,42	I	65 %	0,11

## ■ Nordazépam

<b>NORDAZ</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos Posologie moyenne : 7,5 à 15 mg/j	30 cp. 7,5 mg	2,78	I	65 %	0,09
	30 cp. 15 mg	4,32	I	65 %	0,14

## ■ Prazépam

<b>LYSANXIA</b>					
Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique + contracture musculaire, tétanos Posologie moyenne de 20 à 40 mg/j	40 cp. séc. 10 mg	3,18	I	65 %	0,08
	20 cp. séc. 40 mg		I	NR	
	600 gttes 0,5 mg	2,89	I	65 %	0,00

## TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (4)

### ► Règles d'utilisation

Le risque de dépendance des **BZD** impose des règles de prescription de ces produits et une limitation de leur emploi. Le renouvellement de la délivrance d'un **hypnotique** et/ou **anxiolytique** n'est possible qu'à l'intérieur de la durée de prescription limitée à 2, 4 ou 12 sem. selon le cas et seulement si le prescripteur a précisé le nombre de renouvellements ou la durée de traitement. Il ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (arrêté du 7 octobre 1991). Lorsqu'un médicament contient un ou plusieurs **hypnotiques** et **anxiolytiques** et qu'il comporte l'indication « insomnie » sur son AMM, il est soumis à la réglementation la plus stricte (art. R.5132-21 du CSP). Ne peuvent être prescrits pour une durée > 12 sem. : **alprazolam**, **bromazépam**, **clobazam**, **clotiazépam**, **diazépam**, **éthyl loflazépate**, **lorazépam**, **nordazépam**, **oxazépam**, **prazépam**. Ne peuvent être prescrits pour une durée > 4 sem. : **clorazépate dipotassique**, **estazolam**, **loprazolam**, **lormétazépam**, **nitrazépam**, **témazépam**, **zopiclone**, **zolpidem**.

Cette limitation de la durée de prescription est le plus souvent compatible avec la prise en charge des patients avec un trouble anxieux généralisé. Ainsi les **BZD** sont souvent indiquées pour des cures de courte durée, en particulier au début d'un traitement par **antidépresseur** ou en situation de « crise » (recrudescence anxieuse aiguë).

Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée régulièrement surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne devrait pas excéder **8 à 12 sem.** pour la majorité des patients, y compris la période de réduction de la posologie. Seulement 10 à

30 % des patients justifieraient d'un traitement prolongé par les **BZD**. On utilisera alors les posologies minimales efficaces, en réévaluant régulièrement la nécessité de maintenir le traitement et en évitant les renouvellements systématiques d'ordonnance.

### Alternatives thérapeutiques

En cas d'inefficacité des **antidépresseurs**, de la **prégabaline**, de mauvaise tolérance aux **benzodiazépines**, ou d'un risque élevé d'abus ou de dépendance, on pourra faire appel aux **anxiolytiques non benzodiazépines**.

- La **buspirone** (**BUSPIRONE MYLAN**), agoniste 5HT<sub>1A</sub>, est efficace dans le trouble anxieux généralisé (AMM dans le TAG). Les doses recommandées sont de l'ordre de 15 à 30 mg/j. Son effet anxiolytique concerne surtout les signes psychiques d'anxiété. Les patients rapportent l'inconstance de cet effet. Le délai d'action de la **buspirone** peut atteindre 3 sem. Ses effets indésirables sont les sensations vertigineuses mais un effet sédatif inférieur à celui des **benzodiazépines**. L'arrêt de la **buspirone** n'entraîne pas de syndrome de sevrage ou de dépendance. Ex. : **buspirone** (**BUSPIRONE MYLAN** 10 mg) : 1 à 3 cp./j. Ce produit induit une anxiolyse progressive et n'entraîne pas de pharmacodépendance. La **buspirone** n'est pas un traitement du syndrome de sevrage des **BZD**. Les autres molécules ont plus rarement leur place dans le traitement de l'anxiété chronique : **hydroxyzine** (**ATARAX**).

- Les **bêta-bloquants** (indication AMM : manifestations fonctionnelles cardiaques à type de tachycardie et de palpitations au cours de situations émotionnelles transitoires) sont parfois prescrits lorsque les signes somatiques de l'anxiété sont au-devant de la scène clinique.

### CONSENSUS

[1] Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves, HAS, 2007

[2] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006

## ANXIOLYTIQUES (4) – BENZODIAZÉPINES À DEMI-VIE COURTE

## ■ Alprazolam

<b>XANAX</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie à adapter : 0,5 à 4 mg/j en 2 à 3 prises	30 cp. séc. 0,25 mg	2,19	I	65 %	0,07
	100 cp. 0,25 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 0,5 mg	3,04	I	65 %	0,10
	100 cp. 0,5 mg	HOP	I		
	100 cp. 1 mg	HOP	I		

## ■ Bromazépam

<b>LEXOMIL</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie moyenne : 1/2 à 2,5 cp./j en 2 à 3 prises	30 cp. quadriséc. 6 mg	2,80	I	65 %	0,09
	100 cp. quadriséc. 6 mg	HOP	I		
<b>QUIETILINE</b>					
Idem <b>LEXOMIL</b>	30 cp. quadriséc. 6 mg	2,80	I	65 %	0,09

## ■ Clotiazépam

<b>VÉRATRAN</b>					
Anxiété généralisée, réactionnelle, crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Posologie moyenne : 10 à 30 mg/j en 2 à 3 prises	30 cp. 5 mg	2,12	I	65 %	0,07
	30 cp. séc. 10 mg	3,05	I	65 %	0,10

## ■ Lorazépam

<b>TÉMESTA</b>					
Idem <b>VÉRATRAN</b> Posologie moyenne : 2 à 5 mg/j 2 à 3 prises	30 cp. séc. 1 mg	1,92	I	65 %	0,06
	30 cp. séc. 2,5 mg	3,38	I	65 %	0,11

## ■ Oxazépam

<b>SÉRESTA</b>					
Anxiété réactionnelle, anxiété généralisée, crise d'angoisse Posologie moyenne : 20 à 60 mg/j en 3 à 4 prises Prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique Dans les premiers jours des posologies de l'ordre de 200 à 300 mg/j peuvent être justifiées Diminuer les doses après 24 à 48 h, dose moyenne : 150 mg/j en 3 à 4 prises	30 cp. 10 mg	2,04	I	65 %	0,07
	100 cp. 10 mg	HOP	I		
	20 cp. séc. 50 mg	2,87	I	65 %	0,14
	100 cp. 50 mg	HOP	I		

**TROUBLE ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (NÉVROSE D'ANGOISSE) (5)****Traitement psychologique**

Il fait appel à diverses techniques :

- psychothérapie de soutien toujours indiquée : écoute, réassurance, éducation ;

- psychothérapies cognitives et comportementales et techniques de relaxation.

L'association psychothérapie et traitement médicamenteux n'est pas recommandée systématiquement, néanmoins elle peut constituer une alternative en cas d'échec des traitements utilisés seuls.

**Psychothérapies cognitivo-comportementales (TCC)**

Elles sont aussi efficaces que les traitements médicamenteux dont elles représentent une alternative, souvent utilisées en association avec les traitements médicamenteux. Les TCC visent à clarifier les circonstances de survenue des troubles, identifier les pensées irrationnelles afin de les évaluer et de les modifier par la réorganisation des attitudes inadaptées. Elles associent la relaxation musculaire appliquée, des expositions répétées à des situations évitées et une restructuration cognitive des interprétations catastrophiques sur les soucis surévalués. Tout en étant

soutenu par le thérapeute, le patient est responsabilisé et actif. Les TCC produisent un effet thérapeutique significatif avec maintien du gain thérapeutique 6 mois après la thérapie. Cet effet est plus fréquent en thérapie individuelle *versus* en thérapie de groupe. Un livret du type *Stresspac* ou une cassette audio contenant le programme de TCC peuvent être également proposés comme alternative. Sous TCC, une réduction significative de la consommation de psychotropes est observée.

**Psychothérapie analytique**

Elle a pour but d'aider les patients à identifier les conflits inconscients sous-jacents aux conduites générant l'anxiété et à préciser les traumatismes précoces des premières expériences interpersonnelles. En dépit de la quasi-absence d'études randomisées comparatives de la psychothérapie analytique dans le TAG, l'expérience clinique suggère que certains patients ayant une anxiété handicapante peuvent être significativement améliorés par la psychothérapie analytique en particulier lorsqu'il existe des troubles de la personnalité.

**Anxiolytiques**

- Il n'y a pas lieu de prescrire deux anxiolytiques.
- Il n'y a pas lieu de prescrire les anxiolytiques sans tenir compte des durées de prescription maximale réglementaires : 12 sem. pour l'ensemble des molécules anxiolytiques.
- Il n'y a pas lieu d'initier une prescription d'anxiolytiques sans respecter les posologies recommandées et sans débiter par la posologie la plus faible.
- Il n'y a pas lieu de reconduire systématiquement, sans réévaluation, une prescription d'anxiolytique.



**ANXIOLYTIQUES (5) – BENZODIAZÉPINES – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

Agonistes GABAergiques, les **benzodiazépines (BZD)** sont : anxiolytiques, sédatives, anticonvulsivantes, myorelaxantes, amnésiantes.

**INDICATIONS**

Anxiété généralisée, anxiété réactionnelle (trouble de l'adaptation, état de stress post-traumatique), traitement d'appoint des autres troubles anxieux (phobies, panique, TOC, etc.), crise d'angoisse, prévention et traitement du delirium tremens, sevrage alcoolique, contraction musculaire et tétanos, épilepsie et état de mal convulsif.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance respiratoire et hépatique sévère (risque d'encéphalopathie), hypersensibilité aux **benzodiazépines**, syndrome d'apnée du sommeil.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Toutes les **benzodiazépines** : durée de prescription limitée à 12 sem.

**Clonazépam** : réglementation des stupéfiants (ordonnance sécurisée, durée de prescription limitée à 28 j) à l'exception des prescriptions lors d'une hospitalisation.

Risque de dépendance donc de syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal : décroissance progressive des doses.

**Grossesse** : à éviter par prudence.

**Alprazolam, bromazépam, chlórdiazépoxide, clobazam, clorazépate, diazépam, lorazépam, nordazépam, oxazépam, prazépam** : envisageables toute la grossesse. Si le traitement est

poursuivi jusqu'à l'accouchement, tenir compte d'un risque possible d'imprégnation néonatale immédiate (hypotonie, etc.) ou de sevrage néonatal à distance de la naissance (hyperexcitabilité, agitation, etc.). Ces signes sont réversibles. Le pouvoir tératogène des **BZD** n'a jamais été démontré.

En cas de prise de **BZD** à fortes doses aux 2<sup>e</sup> et/ou 3<sup>e</sup> trimestres de grossesse, une diminution des mouvements actifs fœtaux et de la variabilité du rythme cardiaque fœtal a été décrite.

Un traitement en fin de grossesse par **BZD** même à faibles doses peut être responsable chez le nouveau-né de signes d'imprégnation tels qu'hypotonie axiale, troubles de la succion entraînant une mauvaise prise de poids. Ces signes sont réversibles, mais peuvent durer 1 à 3 sem. en fonction de la demi-vie de la **BZD** prescrite. À doses élevées, une dépression respiratoire ou des apnées, et une hypothermie réversibles peuvent apparaître chez le nouveau-né. Un syndrome de sevrage néonatal est possible, même en l'absence de signes d'imprégnation.

L'utilisation de **prazépam (LYSANXIA)** est envisageable au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme, dans le strict respect des indications et des posologies.

En fin de grossesse, s'il s'avère nécessaire d'instaurer un traitement par **prazépam (LYSANXIA)**, éviter de prescrire des doses élevées et tenir compte, pour la surveillance du nouveau-né, des effets décrits.

**Allaitement** : déconseillé.

Myasthénie : contre-indication relative.

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (1)

### Définition

Le **trouble panique** ou **anxiété épisodique paroxystique** est caractérisé par la récurrence d'attaques d'anxiété sévère. Les attaques de panique ne surviennent pas exclusivement dans des situations particulières, ce qui les différencie des attaques d'anxiété liées aux phobies.

### Critères diagnostiques (DSM-IV-TR)

#### Attaque de panique

Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intenses, dans laquelle au minimum quatre des symptômes suivants sont survenus de façon brutale et ont atteint leur acmé en moins de 10 min. :

- palpitations, battement de cœur ou accélération du rythme cardiaque ;
- transpiration ;
- tremblements ou secousses musculaires ;
- sensations de « souffle coupé » ou impression d'étouffement ;
- sensation d'étranglement ;
- douleur ou gêne thoracique ;
- nausée ou gêne abdominale ;
- sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement ;
- déréalisation, « sentiment d'irréalité », ou dépersonnalisation, « être détaché de soi » ;
- peur de perdre le contrôle ou de devenir fou ;
- peur de mourir ;
- paresthésies « sensations d'engourdissement ou de picotements » ;
- frissons ou bouffées de chaleur.

La prévalence du trouble panique serait comprise entre 1,5 et 2,5 % de la population générale.

#### Trouble panique sans agoraphobie

À la fois (1) et (2) :

- (1) attaques de panique récurrentes et inattendues ;
- (2) au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois « ou plus » de l'un « ou plus » des symptômes suivants :
  - crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique,

– préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences,

– changement de comportement important en relation avec les attaques.

Absence de l'agoraphobie.

Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

Les systèmes nosologiques actuels exigent, pour porter le diagnostic de ce trouble, la survenue de plusieurs attaques et, entre les attaques, l'existence d'une crainte persistante d'avoir d'autres crises de panique (anxiété anticipatoire).

#### Trouble panique avec agoraphobie

À la fois (1) et (2) :

- (1) attaques de panique récurrentes et inattendues ;
- (2) au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois « ou plus » de l'un « ou plus » des symptômes suivants :
  - crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique ;
  - préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences ;
  - changement de comportement important en relation avec les attaques.

Présence d'agoraphobie.

Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

**ANXIOLYTIQUES (6) – BENZODIAZÉPINES – PHARMACOLOGIE (2)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle. Ils peuvent s'atténuer au cours du temps, ce qui traduit le développement d'une tolérance lors d'une administration prolongée.

**Effets principaux**

Asthénie, sensation ébrieuse, somnolence, baisse de vigilance (sujet âgé, début de traitement, conducteurs de véhicules), hypotonie musculaire (risque de chute chez le sujet âgé), amnésie antérograde, dépression respiratoire (cf. Interactions médicamenteuses), phénomènes de rebond anxieux à l'arrêt du traitement (à distinguer du syndrome de sevrage, cf. *infra*).

**Effets indésirables plus rares**

Réactions paradoxales avec irritabilité, agressivité, euphorie, sensations ébrieuses, déambulations, actes automatiques amnésiques, déshinhibition et passage à l'acte suicidaire.

**Effets exceptionnels**

Éruptions cutanées, modifications de la libido.

**Dépendance**

Le problème principal avec les **BZD** est le risque de développement d'une dépendance avec ou sans tolérance. Ce risque est accru en cas de prescription de doses élevées, d'emploi prolongé (> 3 mois), d'escalade des doses, du recours à des **BZD** à demi-vie courte, d'antécédents de dépendance.

Le syndrome de sevrage se manifeste après une diminution des doses ou un arrêt trop brutal de la prescription. Il survient en quelques jours lors de l'arrêt de **BZD** à demi-vie brève, en 1 à 3 sem. lors de l'interruption de **BZD** à demi-vie longue. Les signes de sevrage asso-

cient à des degrés divers et selon la gravité : anxiété, insomnie, vertiges, anorexie, agitation, tremblements, myoclonies, courbatures, douleurs, sueurs profuses, hypersensibilité sensorielle, saveur métallique dans la bouche, signes psychotiques, convulsions, hyperthermie. Le syndrome de sevrage ne doit pas être confondu avec des phénomènes de rebond, une rechute anxieuse, ou un sevrage alcoolique.

Le traitement du syndrome de sevrage est symptomatique. Il consiste à réintroduire des **BZD** et à les diminuer très progressivement. Le traitement préventif repose sur le respect des règles de prescription des **BZD** (arrêté du 7 octobre 1991).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pharmacodynamiques.

L'association à des déprimeurs du système nerveux central peut entraîner une dépression respiratoire. Celle-ci sera d'autant plus marquée lors de l'emploi de fortes doses, par voie rapide. On évitera donc l'association des **BZD** aux : **antidépresseurs sédatifs**, **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **barbituriques**, autres **anxiolytiques** ou **hypnotiques**, **antihypertenseurs centraux**, **dérivés opiacés**, **antipsychotiques**, alcool. L'association à la **clozapine (LÉPONEX)** pourrait entraîner un collapsus avec arrêt cardiorespiratoire.

**INTOXICATION**

Les **BZD** sont classiquement ingérées lors des intoxications médicamenteuses volontaires. Le risque léthal reste faible lorsque les **BZD** sont prises seules.

Le traitement du surdosage est symptomatique : charbon activé, surveillance clinique. Le **flumazénil (ANEXATE)** est utilisé dans les formes graves ou comme test diagnostique. Le lavage gastrique n'est pas recommandé en cas d'intoxication pure aux **BZD**.

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (2)

### Agoraphobie sans antécédent de trouble panique

- Présence d'agoraphobie liée à la peur de développer des symptômes de type panique.
- N'a jamais répondu aux critères de trouble panique.
- Les attaques de panique ne sont pas dues aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.
- Les attaques de panique ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble mental, tel une phobie sociale, une phobie spécifique, un TOC, un état de stress post-traumatique ou un trouble anxieux de séparation.

### Bilan préthérapeutique

Le trouble panique est fréquemment associé à d'autres pathologies somatiques ou psychiatriques qui peuvent en modifier le pronostic et la thérapeutique. La question du diagnostic différentiel se pose principalement pour les affections somatiques (maladies cardiovasculaires – trouble du rythme, angor, infarctus du myocarde ; endocriniennes – hypoglycémies, phéochromocytome ; neurologiques – épilepsie temporale, accident vasculaire transitoire ; pulmonaires – embolie pulmonaire, asthme, etc.) qui peuvent mimer des épisodes anxieux paroxystiques. On recherchera ainsi l'association à un trouble anxieux généralisé, des phobies sociales, des troubles obsessionnels compulsifs, un trouble de la personnalité. De nombreuses substances peuvent également déclencher lors des prises ou du sevrage des attaques de panique chez des sujets prédisposés ou paniqueurs connus. C'est le cas par exemple de la caféine, du cannabis, de l'alcool, etc.

### Évolution

Très variable, l'évolution du trouble panique serait favorable dans la majorité des cas.

Un tiers des patients présenterait cependant une évolution péjorative avec un retentissement social et familial non négligeable.

Les complications possibles du trouble sont les suivantes : la constitution d'agoraphobies, l'apparition de conduites addictives (abus et dépendance à l'alcool, dépendance aux **benzodiazépines**), des dépressions majeures secondaires, une mortalité cardiovasculaire accrue, le suicide.

### Traitements

#### Moyens pharmacologiques et psychothérapeutiques

Le traitement de l'attaque de panique est une indication privilégiée des **benzodiazépines**. Les **antidépresseurs** constituent le traitement de fond. La stratégie thérapeutique à moyen et long terme consiste à prévenir la récurrence des attaques de panique.

On pourra associer aux mesures thérapeutiques habituelles des conseils hygiéno-diététiques : arrêt de l'alcool, du tabac, du café, des toxiques.

#### Traitements pharmacologiques

De nombreuses **benzodiazépines** ont démontré leur capacité à prévenir la récurrence des attaques de panique. Cette indication n'est cependant pas approuvée officiellement (AMM : traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes). Les **antidépresseurs** constituent à l'heure actuelle la chimiothérapie de 1<sup>re</sup> intention dans le trouble panique.

## ANXIOLYTIQUES NON BENZODIAZÉPINES (1)

## ■ Buspirone

<b>BUSPIRONE MYLAN</b>					
Anxiété réactionnelle, trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse : 10 à 40 mg/j Anxiété généralisée : 10 à 60 mg/j en 2 à 3 prises Traitement d'appoint de l'anxiété au cours des névroses : 10 à 40 mg/j	20 cp. séc. 10 mg	6,36	I	65 %	0,32

## ■ Hydroxyzine

<b>ATARAX</b>					
Anxiété : 50 à 300 mg/j en 2 à 3 prises Traitement symptomatique des manifestations allergiques diverses : 50 à 100 mg/j	30 cp. séc. 25 mg 40 càc 10 mg (sirop 200 mL)	2,93 2,70	I I	65 % 65 %	0,10 0,07

## ■ Étifoxine

<b>STRÉSAM</b>					
Manifestations psychosomatiques de l'anxiété : 3 à 4 gél./j	60 gél. 50 mg	5,83	I	15 %	0,10

## ■ Prégabaline

<b>LYRICA</b>					
Troubles anxieux généralisés de l'adulte : Semaine 1 (S1) : 150 mg/j en 2 à 3 prises S2 : 300 mg/j si bonne tolérance en 2 à 3 prises Posologie d'entretien : 150 à 600 mg/j en 2 à 3 prises Posologies à adapter chez l'insuffisant rénal Contre-indiqué chez les patients de moins de 18 ans	56 gél. 25 mg 84 gél. 25 mg 100 gél. 25 mg 84 gél. 50 mg 100 gél. 50 mg 56 gél. 75 mg 100 gél. 75 mg 84 gél. 100 mg 100 gél. 100 mg 56 gél. 150 mg 100 gél. 150 mg 84 gél. 200 mg 100 gél. 200 mg 56 gél. 300 mg 100 gél. 300 mg	15,32 22,71 HOP 36,77 HOP 36,53 HOP 52,64 HOP 52,40 HOP 76,44 HOP 76,44 HOP	I I I I I I I I I I I I I I I I	NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR	0,27 0,27  0,44  0,65  0,63  0,94  0,91  1,37

## TROUBLE PANIQUE (NÉVROSE PHOBIQUE) (3)

### ► Antidépresseurs

Les **antidépresseurs** efficaces dans le trouble panique réduisent la fréquence de survenue des crises et les conduites d'évitement. Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont les **antidépresseurs imipraminiques tricycliques** : **clomipramine (ANAFRANIL)** et les **inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine (ISRS)** : **citalopram (SEROPRAM)**, **escitalopram (SEROPLEX)** et **paroxétine (DEROXAT)** [1].

Les posologies d'**antidépresseurs** recommandées sont généralement identiques à celles qui le sont dans le traitement de la dépression. Toutefois, l'instauration des posologies sera plus progressive (débuter à 50 voire 25 % de la dose efficace), de façon à éviter une aggravation de la symptomatologie anxieuse en début de traitement.

On peut recommander en première intention l'utilisation d'un **ISRS**, en raison d'une meilleure tolérance :

- **citalopram (SEROPRAM)** 20 mg), ou **paroxétine (DEROXAT)** : 1/2 cp./j la 1<sup>re</sup> sem. puis 1 cp./j ; augmenter si nécessaire de 1/2 cp./j par paliers d'une sem. jusqu'à 3 cp./j ;

- **escitalopram (SEROPLEX)** 5, 10, 15, 20 mg) : 1 cp./j de 5 mg la 1<sup>re</sup> sem. puis augmentation progressive de la posologie jusqu'à 20 mg/j si besoin.

L'augmentation des posologies peut être plus lente en fonction de la tolérance clinique.

En seconde intention : **antidépresseur tricyclique** : **clomipramine (ANAFRANIL)** 10, 25, 75 mg) – AMM : prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie. Dose initiale 10 mg en une prise pour atteindre 75 mg en 10 j.

La réponse clinique complète est attendue après 6 à 8 sem. de traitement, comme dans les épisodes dépressifs. Le traitement

est poursuivi plusieurs sem. après la disparition des attaques de panique. Il est d'au moins 6 mois, parfois compris entre 12 et 18 mois, et sera diminué très progressivement. En cas de rechute on réintroduira le traitement, parfois poursuivi pendant plusieurs années à la dose minimale efficace.

### ► Benzodiazépines

Certaines **benzodiazépines** (AMM : traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes) ont démontré leur efficacité dans la prévention des attaques de panique. C'est le cas de l'**alprazolam (XANAX)**, du **lorazépam (TÉMESTA)**, du **diazépam (VALIUM)**, de l'**oxazépam (SÉRESTA)**.

L'effet antipanique des **benzodiazépines** est observé plus rapidement qu'avec les **antidépresseurs**. Le recours à des posologies parfois élevées est nécessaire (**XANAX** : 3 à 10 mg).

Exemple de schéma thérapeutique : **alprazolam (XANAX)** 0,5 mg) : 1 cp. x 3/j pendant 1 sem. puis 2 cp. x 3/j.

Les **benzodiazépines** peuvent être utilisées au début du traitement, à dose efficace en association avec les **antidépresseurs**. Elles seront interrompues après 2 à 3 sem. et l'**antidépresseur** sera alors poursuivi en monothérapie. Le risque de dépendance, les recommandations d'usage justifient en effet un emploi limité dans le temps des **benzodiazépines**.

Les **benzodiazépines** constituent également un traitement d'appoint dans l'anxiété anticipatoire et/ou l'anxiété chronique associée au trouble panique.

### ► $\beta$ -bloquants (*propranolol*)

(AMM dans les manifestations fonctionnelles cardiaques à type de tachycardie et de palpitations au cours de situations émotionnelles transitoires)

Ils peuvent être également associés aux **antidépresseurs** pour traiter les symptômes somatiques du trouble panique.

**ANXIOLYTIQUES NON BENZODIAZÉPINES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'**hydroxyzine (ATARAX)** est un antihistaminique  $H_1$  et un anticholinergique.

La **buspirone** est un agoniste partiel 5HT<sub>1A</sub> pré- et post-synaptique et un antagoniste D<sub>2</sub> présynaptique.

L'**étifoxine (STRÉSAM)** agit sur le canal chlore du complexe GABA.

L'ensemble de ces molécules ont surtout des propriétés anxiolytiques et sédatives. Aucun de ces produits n'est anticonvulsivant.

La **prégabaline** est un analogue de l'acide gamma-aminobutyrique.

**INDICATIONS**

Anxiété réactionnelle et trouble anxieux généralisé pour la **buspirone** et la **prégabaline** en particulier.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : **buspirone** déconseillée ; **étifoxine** à éviter par prudence. Si un traitement doit être instauré, et s'il est poursuivi jusqu'à l'accouchement, tenir compte d'un risque possible de sédation néonatale. **Hydroxyzine** : envisageable. Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, tenir compte d'un risque possible, chez le nouveau-né, de sédation et de signes atopiniques (tachycardie, etc.).

**Allaitement** : toutes les molécules sont déconseillées.

La **buspirone** est contre-indiquée avec les **IMAO**, et dans l'insuffisance hépatique grave.

L'**hydroxyzine** sera utilisée avec prudence en cas de glaucome à angle étroit et d'adénome prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : éviter l'**hydroxyzine** lors du premier trimestre.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

**Neuropsychiques** : tous les produits peuvent induire une somnolence diurne en début de traitement (conducteurs de machines).

Céphalées, vertiges, ataxie, troubles de l'accommodation, voire une excitation paradoxale plus rarement.

Syndrome confusionnel chez le sujet âgé avec l'**hydroxyzine**.

**Autres effets indésirables** non spécifiques et transitoires : nausées, douleurs abdominales, diarrhée, etc.

**Pharmacodépendance**

Elle peut être observée avec l'**hydroxyzine**. La **buspirone** n'entraîne pas de dépendance.

**Syndrome de sevrage** possible avec la **prégabaline**

## INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE (ANTIDÉPRESSEURS) (1)

### ■ Paroxétine

<b>DEROXAT</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 1 à 2 1/2 cp./j	14 cp. séc. 20 mg	5,69	I	65 %	0,41
Anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois :	50 cp. 20 mg	HOP	I		
1 à 2 1/2 cp./j	30 càc 20 mg	13,27	I	65 %	0,44
Phobie sociale : 1 à 2 1/2 cp./j					
TOC : 2 à 3 cp./j					
Prévention des attaques de panique : 2 à 3 cp./j (posologie initiale : 1/2 cp./j)					
Adaptation individuelle et progressive des doses quelle que soit l'indication					
<b>DIVARIUS</b>					
Idem <b>DEROXAT</b>	14 cp. 20 mg	7,97	I	65 %	0,57
	28 cp. 20 mg	15,89	I	65 %	0,57

### ■ Fluoxétine

<b>PROZAC</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 20 à 60 mg/j	14 gél. 20 mg	5,74	I	65 %	0,41
Troubles obsessionnels compulsifs :	70 gél. 20 mg	HOP	I		
Adaptation progressive et individuelle des doses : 20 à 60 mg/j	14 mesurette 20 mg	6,04	I	65 %	0,43
	28 cp. 20 mg	10,25	I	65 %	0,37
	70 cp. 20 mg	HOP	I		

### ■ Citalopram

<b>SEROPRAM</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 1 à 3 cp./j ou 0,4 à 1,2 mL/j	28 cp. séc. 20 mg	15,06	I	65 %	0,54
Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie.	1 fl. sol. buv. 40 mg/mL	25,96	I	65 %	25,96
Adaptation progressive et individuelle des doses : 1 à 1 1/2 cp./j ou 0,4 à 0,6 mL/j	15 mL (gtte = 2 mg)				
<b>SEROPRAM</b> injectable	10 amp. 20 mg/0,5 mL	HOP	I		
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 20 à 60 mg/j en 1 perf. lente dans un soluté isotonique (débit max. 20 mg/h)	10 amp. 40 mg/0,5 mL	HOP	I		

### ■ Escitalopram

<b>SEROPLEX</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 10 à 20 mg/j	14 cp. séc. 5 mg	7,46	I	65 %	0,53
Trouble panique avec ou sans agoraphobie : 5 mg/j pendant 1 sem. puis 10 mg/j	28 cp. séc. 5 mg	14,37	I	65 %	0,51
Trouble anxiété sociale : 5 à 20 mg/j	98 cp. 5 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 10 mg	20,73	I	65 %	0,74
	98 cp. 10 mg	HOP	I		
	28 cp. 15 mg	23,32	I	65 %	0,83
	98 cp. 15 mg	HOP	I		
	28 cp. séc. 20 mg	29,01	I	65 %	1,04
	98 cp. 20 mg	HOP	I		
	300 gttcs 20 mg/mL (fl. 15 mL)	20,85	I	65 %	0,07



## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (2)

### Bilan préthérapeutique

Les TOC sont souvent associés à d'autres troubles psychiatriques ou somatiques qu'il convient de dépister car ces comorbidités peuvent influencer l'évolution du trouble ainsi que sa réactivité au traitement.

### Comorbidités psychiatriques

Troubles de la personnalité (évitante, dépendante, obsessionnelle, schizotypique), troubles anxieux (agoraphobie, phobie sociale, trouble panique), addictions (abus-dépendance alcoolique ou d'une substance), troubles de l'humeur (dépression majeure, dysthymie, trouble bipolaire), schizophrénie.

### Troubles organiques associés

Ils peuvent parfois intervenir dans le déclenchement de TOC ou s'accompagner de manifestations obsessionnelles-compulsives : les affections intéressant les ganglions de la base sont le plus souvent incriminées (tics chroniques ou un syndrome de Gilles de la Tourette, syndrome PANDAS post-streptococcique de l'enfant, encéphalite épidémique, chorée de Sydenham, séquelles d'intoxication oxycarbonée, nécrose bilatérale des noyaux lenticulaires), épilepsies temporales, séquelles de traumatismes crâniens, maladie de Basedow, sevrage aux **BZD** ou abus de psychostimulants.

### Traitement

Comme la plupart des troubles anxieux, et à l'exception des formes sévères ou compliquées, le traitement des TOC est ambulatoire.

Les stratégies thérapeutiques actuelles des TOC sont regroupées en stratégies **pharmacologiques** et **non pharmacologiques**. Elles ont contribué à modifier considérablement le pronostic de ces troubles réputés incurables.

Évoluant sur un mode chronique, les TOC nécessitent souvent une combinaison des différentes possibilités thérapeutiques et une prise en charge au long cours avec une équipe multidisciplinaire.

En raison du retentissement parfois majeur des TOC sur le fonctionnement psychosocial, le *maintien d'une activité professionnelle* est considéré comme une des priorités dans le traitement des TOC sévères.

### Stratégies pharmacologiques

De multiples essais cliniques, ouverts et contrôlés contre placebo, ont confirmé les propriétés anti-obsessionnelles de certains **antidépresseurs**.

Les **antidépresseurs** sont plus efficaces sur les pensées obsédantes que sur les compulsions. Les **ISRS** sont recommandés en 1<sup>re</sup> intention.

La **clomipramine** (**ANAFRANIL**) est recommandée en seconde intention, pour des raisons de tolérance, uniquement après 2 à 3 essais d'**IRSS** sans succès. Cependant, le praticien, dans son choix de molécule de 1<sup>re</sup> intention, devra prendre en compte la possibilité d'efficacité supérieure pour la **clomipramine** dans certaines situations, la probabilité d'effets secondaires moindres pour les **IRSS**, et l'existence éventuelle de comorbidité associée.

Le délai d'action des **antidépresseurs** est plus long (de l'ordre de 4 à 8 sem.) que dans les troubles dépressifs. De même, le temps de traitement nécessaire à l'obtention de la réponse thérapeutique maximale est plus long (10 à 12 sem.). Ainsi, le traitement doit être poursuivi au moins 3 mois avant de pouvoir conclure à une inefficacité. La durée du traitement doit être suffisamment prolongée, souvent supérieure à un an. Elle sera d'autant plus longue que le trouble est chronique et qu'il existe des rechutes à l'arrêt du traitement. La comorbidité avec un épisode dépressif majeur et l'existence d'un trouble de la personnalité sont des facteurs de risque de non-réponse au traitement antidépresseur dans le TOC.

Les **antidépresseurs** ayant une AMM dans cette indication sont : la **fluvoxamine** (**FLOXYFRAN**), la **clomipramine** (**ANAFRANIL**), la **fluoxétine** (**PROZAC**), la **paroxétine** (**DEROXAT**), la **sertraline** (**ZOLOFT**) et l'**escitalopram** (**SEROPLEX**).

## INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE (ANTIDÉPRESSEURS) (2)

### ■ Sertraline

<b>ZOLOFT</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) et TOC : adaptation individuelle et progressive des doses de 50 à 200 mg/j	7 gél. 25 mg	3,55	I	65 %	0,51
	30 gél. 25 mg	HOP	I		
	28 gél. 50 mg	12,29	I	65 %	0,44
	30 gél. 50 mg	HOP	I		

### ■ Fluvoxamine

<b>FLOXYFRAL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) : 100 à 300 mg/j TOC : posologie progressive, pouvant aller jusqu'à 300 mg/j	30 cp. séc. 50 mg	10,21	I	65 %	0,34
	15 cp. séc. 100 mg	9,23	I	65 %	0,62

## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (3)

### ► Mise en route du traitement

Les TOC justifient souvent, mais pas systématiquement, des posologies élevées d'**antidépresseurs**, la plupart du temps bien tolérées par ces malades. On utilise par exemple des doses de l'ordre de 150 mg à 250 mg d'**ANAFRANIL**, de 40 à 60 mg de **PROZAC** ou 40 à 60 mg de **DEROXAT**.

On recherche la posologie efficace en augmentant progressivement les doses avec des paliers de 15 j.

Ex. 1 : **PROZAC** (gél. 20 mg) 1 gél./j. Après 15 j à ce palier, chercher la posologie optimale en augmentant de 10 mg tous les 15 j.

Ex. 2 : **DEROXAT** (cp. 20 mg) : 1 cp. x 2/j en 1 à 2 sem. Après 15 j à ce palier, adapter la posologie en modifiant la dose d'un 1/2 cp. tous les 15 j.

### ► Poursuite et surveillance du traitement

L'effet anti-obsessionnel des **antidépresseurs** est spécifique et indépendant de l'existence d'une dépression au moment de l'initiation du traitement. Cet effet thérapeutique est continu, lent et progressif. Le traitement doit être poursuivi au moins 3 mois avant de pouvoir conclure à une inefficacité. La durée est souvent supérieure à un an. Elle sera d'autant plus longue que le trouble est chronique et

qu'il existe des rechutes à l'arrêt du traitement [1].

La surveillance porte sur les effets symptomatiques ainsi que sur la tolérance aux traitements.

Une fois le TOC stabilisé, le traitement sera poursuivi, parfois indéfiniment, avec des posologies réduites de 30 à 50 % par rapport à la posologie initiale.

Ex. : **PROZAC** 20 mg 1 à 2 gél./j ou **ANAFRANIL** 75 mg : 1 à 2 cp./j.

### ► Réponse au traitement

Environ **50 à 60 %** des patients obsessionnels sont améliorés par une monothérapie sérotoninergique. On ne connaît pas à l'heure actuelle les facteurs prédictifs du succès d'un traitement pharmacologique.

### ► Traitements associés

Des **benzodiazépines** sont parfois associées aux **antidépresseurs** dans les formes avec anxiété sévère. Les **antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)** peuvent être utilisés en 2<sup>e</sup> intention. On peut envisager également des stratégies « d'augmentation » par des **antipsychotiques atypiques**, ou par des **régulateurs de l'humeur**.

Les **antipsychotiques** sont intéressants chez les patients avec des traits de personnalité schizotypique ou des tics complexes.

**INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE  
(ANTIDÉPRESSEURS) (3) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.

**INDICATIONS**

Épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).

Troubles obsessionnels compulsifs : **fluoxétine (PROZAC)**, **paroxétine (DEROXAT)**, **sertraline (ZOLOFT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**, **fluvoxamine (FLOXYFRAL)**.

Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie : **paroxétine (DEROXAT)**, **citalopram (SEROPRAM)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

Phobie sociale : **paroxétine (DEROXAT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

Anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois : **paroxétine (DEROXAT)**, **escitalopram (SEROPLEX)**.

État de stress post-traumatique : **paroxétine (DEROXAT)**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux différentes molécules.

Association avec les **IMAO** non sélectifs et sélectifs B, **sumatriptan** (syndrome sérotoninergique).

Enfant de moins de 15 ans (en l'absence d'étude).

**Grossesse, allaitement** : déconseillés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Association aux **IMAO** A réversibles (cf. Interactions médicamenteuses).

Insuffisant rénal et hépatique : utilisation des doses les plus faibles recommandées.

## TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS : TOC (NÉVROSE OBSESSIONNELLE) (4)

### Stratégies psychothérapeutiques

La prise en charge psychothérapeutique des TOC est principalement *cognitivo-comportementale*.

La *cure psychanalytique* n'offre que des résultats inconstants.

Au niveau comportemental, la technique « Exposition avec prévention de la réponse ritualisée (EPR) » a démontré son efficacité :

- **l'exposition *in vivo* (E)** qui cherche à augmenter l'habituation des sujets aux stimuli déclencheurs de la réponse obsession-malaise-compulsion ;
- **la prévention de la réponse (PR)** qui a pour objectif de diminuer la fréquence d'émission des rituels.

L'EPR est indiquée dans les formes cliniques avec une prévalence des compulsions « ouvertes » : laveurs, vérificateurs. Les TOC avec obsessions sans compulsion sont une indication en première intention des **antidépresseurs**.

Les *thérapies cognitives*, qui visent à apprendre au patient à modifier les distor-

sions cognitives spécifiques de son trouble, sont fréquemment couplées aux techniques comportementales.

70 % des malades seraient améliorés par les thérapies cognitivo-comportementales. Le pourcentage de rechute après arrêt de la thérapie est inférieur à celui observé après interruption du traitement pharmacologique.

Dans les formes chroniques et sévères, il semble légitime de combiner les approches pharmacologiques et psychothérapiques.

### Stratégies neurochirurgicales

Elles sont réservées à des formes sévères et résistantes de TOC. Plusieurs techniques neurochirurgicales ont fait la preuve de leur efficacité et d'une relative rareté des effets secondaires. L'électrostimulation du noyau sous-thalamique à haute fréquence (130-185 Hz) par des stimulateurs implantables (technique stéréotaxique) est actuellement à l'étude. Il s'agit d'une technique réversible, à faible morbidité et qui paraît très prometteuse [2] [3].

### CONSENSUS

[1] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, *Afssaps*, 2006

[2] Brain stimulation treatments in psychiatry, *WFSBP*, 2010

[3] TOC résistants : prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle, *HAS*, 2004

**INHIBITEURS SÉLECTIFS DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE  
(ANTIDÉPRESSEURS) (4) – PHARMACOLOGIE (2)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets digestifs : nausées, gastralgie (en début de traitement), bouche sèche.

Effets hépatiques : élévation modérée des aminotransférases.

Effets neuropsychiques : nervosité, somnolence, insomnie, tremblements.

**Symptomatologie du syndrome  
sérotoninergique**

Au moins trois signes et en l'absence d'introduction récente d'**antipsychotiques** ou d'augmentation de posologie d'**antipsychotiques** antérieurement prescrits (similitude avec le syndrome malin) :

- signes psychiques : confusion, hypomanie, agitation, coma ;
- signes moteurs : myoclonies, tremblements, hyperreflexivité, rigidité, incoordination motrice ;
- signes neurovégétatifs : hypo ou hypertension artérielle, tachycardie, hyperthermie, sueurs, frisson ;
- signes digestifs : diarrhées.

Les symptômes nécessitent parfois une hospitalisation et peuvent évoluer de façon suraiguë. Le traitement curatif associe à la suppression du traitement sérotoninergique la prescription éventuelle de **propranolol (AVLOCARDYL)** ou d'une **benzodiazépine** : **lorazépam (TÉMESTA)**. Le traitement préventif s'appuie sur les éléments suivants :

- éviter les associations de psychotropes pro-sérotoninergiques ;
- adapter les posologies lors d'une monothérapie ;

– prévoir un délai de 2 sem. lors du relais d'un **IMAO** classique par **ISRS** ;

– veiller à l'élimination totale de l'**ISRS** et de tous ses métabolites avant toute substitution d'un **ISRS** par un **IMAO** classique (prévoir 5 sem. lors du passage de la **fluoxétine** à un **IMAO** sélectif et non sélectif).

Effets sexuels : anorgasmie, retard à l'éjaculation, dysérection.

Effets cutanés : éruptions, urticaire.

Effets endocrinologiques : prise de poids, hyponatémie (sujet âgé).

Effets psychiques : levée d'inhibition et majoration du risque suicidaire, virage maniaque.

Effets indésirables plus rares, voire exceptionnels : hépatites cytolytiques ou mixtes, aggravation de dyskinésies bucco-faciales, syndrome extrapyramidal, hyperprolactinémie avec galactorrhée, vascularite, syndrome de Lyell, maladie sérique.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Pharmacocinétiques : les **ISRS** sont des inhibiteurs du cytochrome P450 2D6. À ce titre ils peuvent augmenter les taux plasmatiques des médicaments métabolisés par le foie. Donc surveillance clinique et dosage plasmatique en cas d'association avec : **carbamazépine, lithium, phénytoïne, anticoagulants** oraux (contrôle INR),  **$\beta$ -bloquants, diazépam**.

Pharmacodynamiques : l'augmentation des posologies ou l'association à des médicaments prosérotoninergiques (**IMAO** sélectifs et non sélectifs, **clomipramine, imipramine, lithium, sumatriptan**) peuvent provoquer un syndrome sérotoninergique parfois létal.

## HYPNOTIQUES (1) – BENZODIAZÉPINES

## ■ Estazolam

<b>NUCTALON</b>					
Insomnie occasionnelle et transitoire : 1/2 à 1 cp. le soir	20 cp. séc. 2 mg	2,57	I	30 %	0,13
Insomnie chronique (à déconseiller) : 1/2 à 1 cp. le soir					

## ■ Témozépam

<b>NORMISON</b>					
Insomnie occasionnelle et transitoire : 10 à 20 mg le soir	14 cp. 10 mg	2,30	I	65 %	0,16
Insomnie chronique (à déconseiller) : 10 à 20 mg	7 cp. 20 mg	2,11	I	65 %	0,30

## ■ Nitrazépam

<b>MOGADON</b>					
Insomnie : 2,5 à 5 mg le soir	20 cp. séc. 5 mg	1,77	I	30 %	0,09
	100 cp. séc. 5 mg	HOP	I		

## ■ Lormétazépam

<b>NOCTAMIDE</b>					
Insomnie : 0,5 à 2 mg le soir	14 cp. séc. 1 mg	1,88	I	65 %	0,13
	14 cp. séc. 2 mg	2,44	I	65 %	0,17

## ■ Loprazolam

<b>HAVLANE</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. le soir	20 cp. séc. 1 mg	3,27	I	65 %	0,16
Insomnie chronique (à déconseiller) : 1 cp. le soir					

## SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (2)

### Insomnies

#### Insomnie aiguë (occasionnelle et transitoire)

C'est une insomnie due à une cause aiguë, transitoire et réversible :

- facteurs environnementaux (niveau sonore, climat, altitude, etc.) ;
- stress psychique ;
- stress physique (affection physique aiguë) ;
- prise aiguë de toxiques.

En cas d'insomnie d'ajustement :

- dédramatiser la situation, assurer un soutien psychologique ;
- si nécessaire, prescrire un traitement pharmacologique par sédatif, **anxiolytique** ou **hypnotique**, qui doit être le plus léger et le plus bref possible.

Le traitement repose sur la prescription d'**hypnotiques** « benzodiazépiniques ou apparentés » (**cyclopyrrolones**, **imidazopyridines**) durant une période limitée à quelques sem., au maximum, afin d'éviter les phénomènes de dépendance et de tolérance.

#### Insomnie chronique

##### ► Insomnies secondaires

- Insomnie liée à une pathologie organique, notamment neurologique (douleur neurogène, Parkinson, démences, syndrome des jambes sans repos, confusion, hypertension intracrânienne, etc.), ou psychiatrique (dépression, trouble bipolaire, trouble anxieux, trouble de l'adaptation,

état de stress post-traumatique, troubles psychotiques, etc.).

- Insomnie due à la prise de certains médicaments (**psychostimulants**, **antidépresseurs**, **AINS**, etc.).

• Insomnie due au sevrage trop brutal d'un **hypnotique** à demi-vie courte (syndrome de rebond) qui nécessite sa réintroduction puis sa diminution très progressive.

- insomnie due à une prise chronique des toxiques ou de l'alcool.

##### ► Insomnie dite psychophysiologique (insomnie persistante primaire)

C'est l'insomnie « maladie », appelée aussi insomnie psychophysiologique, elle est la forme la plus fréquente de l'insomnie.

L'insomnie est souvent apparue à un moment précis dans l'histoire du patient à l'occasion d'une circonstance pénible, mais le retour au sommeil normal ne se produit pas, même lorsque la cause initiale a disparu. Symptômes :

- difficultés d'endormissement, le sommeil devient une appréhension ;
- trouble du maintien du sommeil ;
- sommeil perçu comme non réparateur ;
- malgré l'impression de fatigue, il n'y a pas de somnolence diurne (la présence d'une somnolence est un argument contre le diagnostic d'insomnie persistante primaire) ;
- échec des tentatives de sieste en raison de la même difficulté d'endormissement ;
- discordance entre l'importance subjective du retentissement diurne et la discrétion du retentissement objectif.



## HYPNOTIQUES (2) – ANTIHISTAMINIQUES

## ■ Doxylamine

<b>DONORMYL</b>					
Insomnie : 1/2 à 2 cp. le soir	10 cp. séc. 15 mg 10 cp. efferv. 15 mg		I I	NR NR	
<b>NOCTYL</b>					
Idem <b>DONORMYL</b>	10 cp. séc. 15 mg		I	NR	
<b>LIDENE</b>					
Idem <b>DONORMYL</b>	10 cp. séc. 15 mg		I	NR	

## ■ Prométhazine

<b>PHÉNERGAN</b>					
Insomnie : 1 à 2 cp. le soir	20 cp. 25 mg	1,53	I	15 %	0,08

## HYPNOTIQUES (3) – IMIDAZOPYRIDINE

## ■ Zolpidem

<b>STILNOX</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. le soir (1/2 à 1 cp. chez le sujet de plus de 65 ans) Insomnie chronique (prescription décon- seillée) : 1/2 à 1 cp. le soir	7 cp. séc. 10 mg 14 cp. séc. 10 mg	2,30 3,23	I I	65 % 65 %	0,33 0,23

## HYPNOTIQUES (4) – CYCLOPYRROLONE

## ■ Zopiclone

<b>IMOVANE</b>					
Insomnie occasionnelle, transitoire : 1 cp. à 7,5 mg le soir 1 cp. à 3,75 mg ou 1/2 cp. à 7,5 mg le soir chez les patients > 65 ans ou présentant une insuffisance rénale, hépatique ou respiratoire Insomnie chronique (prescription décon- seillée) : 1/2 à 1 cp. le soir	5 cp. 3,75 mg 14 cp. 3,75 mg 30 cp. 3,75 mg 5 cp. séc. 7,5 mg 14 cp. séc. 7,5 mg 20 cp. séc. 7,5 mg	1,80 3,04 HOP 1,88 3,19 HOP	I I I I I I	65 % 65 %  65 % 65 %	0,36 0,22  0,38 0,23

## SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (3)

### Traitement

Dans tous les cas d'insomnie, avant toute autre initiative, il convient de s'assurer que quelques règles élémentaires d'hygiène du sommeil sont réunies.

- Dormir selon les besoins, mais pas plus.
- Éviter les siestes longues (> 1 h) ou trop tardives (après 16 h).
- Adopter un horaire régulier de lever et de coucher.
- Pour les personnes âgées, retarder le coucher.
- Limiter le bruit, la lumière et une température excessive dans la chambre à coucher.
- Éviter la caféine, l'alcool et la nicotine.
- Pratiquer un exercice physique dans la journée, mais en général pas après 17 h.
- Éviter les repas trop copieux le soir.

Le traitement repose sur un abord corporel (relaxation) et des techniques comportementales (désensibilisation systématique, réduction du temps de sommeil) visant à lutter contre des comportements défavorables à l'endormissement, acquis lors de situations de stress (conditionnement négatif) [1].

L'utilisation des **hypnotiques** doit être prudente, le recours à des traitements substitutifs temporaires (**antidépresseurs** sédatifs, **anxiolytiques**) limité. Le traitement de ces insomnies chroniques est souvent long et délicat, requérant une participation active du sujet et un soutien psychologique important.

**Proposer, si nécessaire, un traitement symptomatique le plus prudent possible :**

- soit un sédatif léger (phytothérapie), bien qu'aucune étude n'apporte d'éléments permettant de les situer clairement en termes d'efficacité. Il n'a pas été prouvé pour la valériane d'efficacité supérieure à celle d'un placebo. En l'absence d'essais randomisés, l'innocuité de la mélisse, de l'oranger, du tilleul et de la verveine odorante ne peut être ni affirmée, ni infirmée [1] ;
- soit un **hypnotique non benzodiazépine**.

Parmi les **antihistaminiques** H1 bénéficiant de l'AMM « insomnie transitoire, insomnie occasionnelle », sous réserve des contre-indications et précautions (effets anticholinergiques ou adrénolytiques), peuvent être utilisés chez l'adulte, mais sont à déconseiller chez le sujet âgé (effets atropiniques non négligeables) :

doxylamine (**DONORMYL** 15 mg) ; alimémine (**THÉRALÈNE**) et prométhazine (**PHÉNERGAN**), à réévaluer si l'insomnie dure plus de 5 j.

Ex. 1 : **DONORMYL** 15 mg : 1/2 cp au coucher ; 7,5 à 15 mg/j (soit 1/2 à 1 cp./j). La posologie peut être portée à 30 mg/j (soit 2 cp./j) si nécessaire.

Ex. 2 : **THÉRALÈNE** (sol. buv. en gtttes à 4 % : fl. de 30 mL avec pipette doseuse) : 5 à 20 gtttes au coucher.

La **mélatonine** (**CIRCADIN** 2 mg cp. LP) est indiquée, en monothérapie, pour le traitement à court terme de l'insomnie primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de 55 ans ou plus. L'activité de la **mélatonine** sur les récepteurs MT1, MT2 et MT3 est réputée contribuer à ses propriétés de facilitation du sommeil, puisque ces récepteurs (principalement MT1 et MT2) sont impliqués dans la régulation des rythmes circadiens et du sommeil. En raison du rôle de la **mélatonine** sur le sommeil et la régulation des rythmes circadiens, ainsi que de la réduction de la production de **mélatonine** endogène associée à l'âge, la **mélatonine** peut efficacement améliorer la qualité du sommeil, en particulier chez les patients de plus de 55 ans qui souffrent d'insomnie primaire.

Dans les essais cliniques dans lesquels des patients présentant une insomnie primaire ont reçu 2 mg de **CIRCADIN** tous les soirs pendant 3 sem., l'architecture du sommeil n'a pas été modifiée, ni la durée du sommeil paradoxal ou phase de mouvements oculaires (PMO). **CIRCADIN** 2 mg n'a induit aucune modification du fonctionnement diurne. Dans une étude chez des patients ambulatoires, **CIRCADIN** améliore la qualité du sommeil et de la vigilance matinale chez 47 % des patients traités *versus* 27 % dans le groupe placebo. En outre, la qualité du sommeil et la vigilance matinale se sont améliorées de façon significative avec **CIRCADIN** comparé au placebo. Les variables du sommeil sont progressivement revenues aux valeurs initiales sans effet rebond, sans augmentation des effets indésirables ni des symptômes de sevrage.

## HYPNOTIQUES (5) – PHARMACOLOGIE

## PROPRIÉTÉS

Les **hypnotiques** ont des propriétés proches des **anxiolytiques**. Les **benzodiazépiniques**, les **cyclopyrrolones**, les **imidazopyridines** agissent sur les récepteurs GABAergiques. Les autres molécules sont **antihistaminiques** ou assimilées aux **antipsychotiques**.

## INDICATIONS

Les **hypnotiques** sont indiqués en cas d'insomnie aiguë (occasionnelle et transitoire). Les insomnies chroniques ne représentent pas une indication de ces produits en raison du risque de dépendance. Le risque de dépendance des **BZD** impose des règles de prescription et une limitation d'emploi. Le renouvellement de la délivrance d'un **hypnotique** et/ou **anxiolytique** n'est possible qu'à l'intérieur de la durée de prescription limitée à 2, 4 ou 12 sem. selon le cas et seulement si le prescripteur a précisé le nombre de renouvellements ou la durée de traitement. Il ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (arrêté du 7 octobre 1991). Lorsqu'un médicament contient un ou plusieurs **hypnotiques** et **anxiolytiques** et qu'il comporte l'indication « insomnie » sur son AMM, il est soumis à la réglementation la plus stricte (art. R.5132-21 du CSP). Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à 4 sem : **clorazépate dipotassique**, **estazolam**, **loprazolam**, **lormétazépam**, **nitrazépam**, **témazépam**, **zopiclone**, **zolpidem**.

## CONTRE-INDICATIONS

Elles sont identiques à celles des **BZD** : myasthénie, insuffisance respiratoire et/ou hépatique sévère, hypersensibilité.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cf. Précautions d'emploi des benzodiazépines.

## EFFETS INDÉSIRABLES

## Sur le sommeil

Les **BZD** entraînent une modification de l'architecture du sommeil avec une diminution du sommeil paradoxal et du sommeil lent profond.

Le **zopiclone** et le **zolpidem** semblent mieux préserver cette architecture du sommeil.

À l'arrêt du traitement on peut observer :

- un rebond de sommeil paradoxal avec des rêves désagréables pour les **BZD** ;
- un rebond d'insomnie avec les produits à demi-vie courte ou pour des posologies élevées ;
- une anxiété de sevrage avec les **benzodiazépines**.

## Sur l'état de veille

Les produits à demi-vie longue peuvent entraîner une somnolence diurne, des réveils peu agréables (sensation de « gueule de bois »), des troubles mnésiques (syndrome amnésie-auto-matisme avec le **zolpidem** : **STILNOX**).

Syndromes extrapyramidaux avec les apparentés aux **antipsychotiques**.

## Pharmacodépendance

Les **hypnotiques** avec une biodisponibilité rapide et une demi-vie courte peuvent induire des phénomènes de dépendance.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Éviter l'utilisation d'alcool ou d'autres sédatifs.

**SOMMEIL (TROUBLES DU) - INSOMNIES, HYPERSOMNIES (4)**

Ex. : **CIRCADIN** 2 mg cp. LP 1 à 2 h avant le coucher et après le repas. Cette posologie peut être poursuivie pendant une période allant jusqu'à 13 sem.

- soit un **hypnotique benzodiazépine** ou **apparenté aux benzodiazépines**, adapté au profil d'insomnie du patient, pendant quelques jours, à la plus faible dose possible, choisi parmi ceux qui sont estimés induire le moins possible de retentissement sur la vigilance diurne.

Ex. : **zolpidem (STILNOX)** 1 mg : 1/2 à 1 cp. au coucher.

Le traitement doit être aussi bref que possible, de quelques jours à 4 sem., y compris la période de réduction de la posologie. La durée du traitement doit être présentée au patient :

- 2 à 5 j. en cas d'insomnie occasionnelle (comme par exemple lors d'un voyage) ;
- 2 à 3 sem. en cas d'insomnie transitoire (comme lors de la survenue d'un événement grave).

Les traitements très brefs ne nécessitent pas d'arrêt progressif. Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes préconisées. Cela impose des évaluations précises et répétées de l'état du patient.

Ex. **zopiclone (IMOVANE)** 7,5 mg : 1/2 à 1 cp. au coucher.

La prise doit avoir lieu le soir au coucher, au lit. Le dosage à 3,75 mg est plus particulièrement adapté au sujet âgé de plus de 65 ans et aux populations à risque.

Quel que soit l'**hypnotique** choisi, la plus faible dose efficace, individuelle, doit être recherchée et prescrite pour une période limitée, de quelques jours à 4 sem. maxi-

mum incluant la période de diminution de la dose.

Si la composante anxieuse est prépondérante, la prescription d'un anxiolytique selon les mêmes principes peut s'avérer suffisante pour permettre le rétablissement du sommeil.

**Hypersomnies**

L'hypersomnie correspond à une plainte portant sur un temps de sommeil trop long et/ou de mauvaise qualité. Elle touche environ 5 % de la population.

**Hypersomnies « simples »**

- Hypersomnie liée à une insuffisance de sommeil ou consécutive à la prise d'alcool ou de certains médicaments (**psychotropes, antalgiques**, etc.) dont le traitement principal est constitué par le sevrage.

- Trouble du rythme circadien (« jet lag » par franchissement rapide des fuseaux horaires, retard ou avance de phase de sommeil) pour lequel un traitement par chrono- et/ou phytothérapie sera proposé afin de rétablir le cycle veille-sommeil.

**Hypersomnies pathologiques**

Le recours à des explorations complémentaires (enregistrement polysomnographique, actimétrie, etc.), orienté en fonction du tableau clinique, permettra de rapporter l'hypersomnie à certaines pathologies :

- syndrome d'apnées du sommeil ;
- syndrome de résistance des voies aériennes supérieures nécessitant un traitement spécifique ;
- narcolepsie.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine générale, *SGTG et HAS*, 2006

## HYPNOTIQUES (6) – AGONISTE DE LA MÉLATONINE

## ■ Mélatonine

CIRCADIN					
2 mg x 1/j 1-2h avant le coucher et après le repas	30 cp. LP 2 mg		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

La mélatonine est une hormone naturellement sécrétée par l'organisme, dont les récepteurs sont impliqués dans la régulation des rythmes circadiens, en particulier le rythme veille-sommeil.

**INDICATIONS**

Traitement à court terme de l'insomnie primaire, en monothérapie, chez les patients de 55 ans ou plus.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.  
Patient < 18 ans (manque de données).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Peut entraîner une somnolence diurne.  
Contient du lactose.

Maladie auto-immune, insuffisance hépatique, grossesse : traitement déconseillé (manque de données).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Peu fréquents (< 1/100) : irritabilité, insomnie, céphalées, vertiges, asthénie, hypertension artérielle, douleurs abdominales, prurit, etc.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de l'activité de la **mélatonine** :  
– **consommation d'alcool fortement déconseillée**;  
– tabac, **carbamazépine**, **rifampicine** : prudence.  
Augmentation de l'activité de la **mélatonine** :  
– **fluvoxamine** déconseillée.  
– **cimétidine**, **quinolones**, œstrogénothérapie : prudence.

## HYPNOTIQUES (7) – DEXMÉDÉTOMIDINE

## ■ Dexmédétomidine

<b>DEXDOR</b>					
Solution diluée en perf. IV uniquement Dose initiale : 0,7 µg/kg/h, ajustée pour atteindre le niveau de sédation fixé Dose max. : 1,4 µg/kg/h		25 amp. 2 mL 200 µg	HOP	I	

**PROPRIÉTÉS**

- Agoniste sélectif du récepteur  $\alpha_2$ ,
- Sédatif, antalgique et anesthésique,
- Diminution de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle avec une vitesse de perfusion lente,
- Augmentation des résistances vasculaires périphériques, de la pression artérielle et effet bradycardisant amplifié avec une dose plus élevée,
- Relativement pas d'effet déprimeur respiratoire.

**INDICATIONS**

Indication en Unité de Soins Intensifs chez l'adulte > 18 ans nécessitant un état de sédation pas plus profond que celui permettant une réponse à un stimulus verbal (0 à -3 sur l'échelle de Richmond).

**CONTRE-INDICATIONS**

- Hypersensibilité à l'un des constituant,
- Bloc cardiaque avancé de niveau 2 ou 3 (sauf si pacemaker),

- Hypotension artérielle non contrôlée,
- Pathologies cérébrovasculaires aiguës,
- Allaitement.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Déconseillé pendant la grossesse.
- Prudence en cas d'hypotension, d'antécédent de bradycardie, d'insuffisance hépatique sévère.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents : hypotension, hypertension, bradycardie.

Fréquents : agitation, hyperglycémie, hypoglycémie, nausée, vomissements, syndrome de sevrage, hyperthermie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Potentialisation des effets :

- anesthésiques, hypnotiques, **opioïdes**,
- médicaments hypotenseurs ou bradycardisants :  **$\beta$ -bloquants**, etc.

## ANTIPSYCHOTIQUES (1) – PHÉNOTHIAZINES ALIPHATIQUES

### ■ Chlorpromazine

<b>LARGACTIL</b>					
Psychoses aiguës : 100 à 600 mg/j	50 cp. séc. 25 mg	3,49	I	65 %	0,07
Psychoses chroniques : 25 à 150 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	5,74	I	65 %	0,19
État d'agitation, états maniaque	5 amp. 25 mg/5 mL	7,17	I	65 %	1,43
et hypomaniaque : 100 à 350 mg/j	1200 gttes 1 mg (fl.)	3,83	I	65 %	0,00
Syndrome confusionnel : 25 à 100 mg/j	5000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
en 2 ou 3 prises					
Manifestation d'agressivité des psychoses					
de l'adulte : 1 à 2 amp. x 3/j en IM					
Préparation à l'anesthésie					

### ■ Cyamémazine

<b>TERCIAN</b>					
États anxieux au cours des troubles	30 cp. séc. 25 mg	7,12	I	65 %	0,24
névrotiques : 25 à 100 mg/j en 2 prises	100 cp. séc. 25 mg	HOP	I		
États anxieux au cours des psychoses :	25 cp. séc. 100 mg	17,45	I	65 %	0,70
100 à 400 mg/j en 2 à 3 prises	50 cp. séc. 100 mg	HOP	I		
Mélancolie anxieuse et/ou délirante	1200 gttes 1 mg (fl.)	7,75	I	65 %	0,01
en association aux <b>antidépresseurs</b> :	4000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
100 à 300 mg/j	5 amp. 50 mg/5 mL	23,57	I	65 %	4,71
États d'agressivité chez l'adulte :					
1 à 2 amp. en IM à renouveler si besoin					

### ■ Lévomépromazine

<b>NOZINAN</b>					
États anxieux accompagnant les états	20 cp. séc. 25 mg	4,63	I	65 %	0,23
psychotiques aigus : 50 à 300 mg/j	20 cp. séc. 100 mg	12,82	I	65 %	0,64
État d'excitation psychomotrice : accès	1200 gttes 1 mg (fl.)	7,50	I	65 %	0,01
maniaque, bouffées délirantes :	5000 gttes 1 mg (fl.)	HOP	I		
50 à 200 mg/j en 2 à 3 prises	5 amp. 25 mg/1 mL	2,57	I	65 %	0,51
Mélancolie anxieuse et dépression grave :					
50 à 150 mg/j en 2 prises					
États psychotiques chroniques :					
50 à 100 mg/j en 1 ou 2 prises					

### ■ Alimémazine

<b>THÉRALÈNE</b>					
Insomnies : 5 à 20 mg au coucher	50 cp. séc. 5 mg	1,99	II	15 %	0,04
Traitement symptomatique des	1200 gttes 1 mL (fl. 30 mL)	2,20	II	15 %	0,00
manifestations allergiques diverses :	4000 gttes 1 mg	HOP	II		
rhinite, conjonctivite, urticaire :	15 gobelets doseurs			NR	
5 à 40 mg/j en 2 à 3 prises	2,5 mg				

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (2)

### Définition

La CIM-10 définit les troubles dissociatifs (conversion psychique) par « une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates, et du contrôle des mouvements volontaires ». Les troubles dissociatifs sont psychogènes dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec un événement traumatisant, des problèmes insolubles ou des relations interpersonnelles difficiles.

- *Troubles somatoformes* : présence de symptômes physiques évoquant une affection médicale, mais ne s'expliquant pas ou pas complètement par une étiologie organique précise ou un autre trouble psychiatrique, souffrance clinique, retentissement sur l'existence du sujet.

- *Trouble somatisation* : trouble caractérisé par des plaintes somatiques multiples, débutant avant 30 ans, ni produit intentionnellement ni feint, manifestation pendant plusieurs années, dans différents domaines (gastro-intestinal, neurologique, cardiovasculaire, génito-urinaire), pas de substrat organique, pas de cause psychologique décelable, demande de traitement, comportement anormal de maladie, retentissement socioprofessionnel.

- *Trouble de conversion* : un ou plusieurs symptômes de déficit touchant la motricité volontaire ou les fonctions sensitives ou sensorielles suggérant une affection médicale générale, pas de substrat lésionnel, antécédent de trouble similaire, retentissement social et professionnel, facteurs psychologiques dans déclenchement et persistance, fluctuation, variabilité ou réversibilité du symptôme, ni volontaire, ni feint, tout trouble organique écarté, parfois - personnalité particulière (histrionique ou passive - dépendante), souvent : « belle indifférence », souvent : bénéfices secondaires.

- *Trouble douloureux* : plainte douloureuse durable, une ou plusieurs localisations

anatomiques, intensité suffisante pour justifier un examen clinique, retentissement social et professionnel, pas de substrat organique, facteurs psychologiques dans déclenchement et persistance, ni volontaire, ni feint, consultations répétées, consommation d'antalgiques, isolement, associé à des facteurs psychologiques et/ou à une affection médicale générale aiguë, chronique si > 6 mois.

- *Hypochondrie* : préoccupation centrée sur la crainte ou l'idée d'être atteint d'une maladie grave, même si on ne retrouve pas d'affection médicale, fondée sur l'interprétation erronée par le sujet de symptômes physiques ; préoccupation excessive pour la santé malgré un bilan médical approprié et rassurant, plainte de symptômes physiques, attitude de revendication, explication « médicale », pas d'éléments délirants, « obsession », comportement anormal de maladie, « nomadisme médical », troubles pas mieux expliqués par un trouble anxiété généralisée, trouble panique, trouble obsessionnel, épisode dépressif majeur, trouble de la personnalité ; à noter : sensibilité excessive à la douleur et aux épreuves corporelles ; croyances dysfonctionnelles, existence d'un facteur déclenchant, anxiété, idées hypochondriaques automatiques.

- *Trouble dissociatif* : disruption des fonctions intégrées de la conscience : identité, mémoire, perception de l'environnement - amnésie dissociative, fugue dissociative, trouble dissociatif de l'identité, trouble de dépersonnalisation, trouble dissociatif non spécifié.

On invoque souvent l'intervention de motifs dans la création des symptômes hystériques : tentative de résolution d'un conflit inconscient, revendication du statut de malade, évitement d'une situation intolérable, recherche des bénéfices primaires ou secondaires, mobilisation de l'entourage. Enfin on décrit habituellement une relation particulière de l'hystérique au médecin : opiniâtreté, revendication, quête affective, suggestibilité.



## ANTIPSYCHOTIQUES (2) – PHÉNOTHIAZINES PIPÉRIDINÉES

### ■ Propériciazine

<b>NEULEPTIL</b>					
Agressivité au cours des affections psychiatriques : 10 à 60 mg/j	50 gél. 10 mg	7,32	I	65 %	0,15
Traitement d'appoint des psychoses chroniques : 50 à 200 mg/j	50 cp. séc. 25 mg 1200 gttes 0,25 mg (sol. buv.)	8,53 3,78	I	65 %	0,17 0,00
	1200 gttes 1 mg (sol. buv.)	7,01	I	65 %	0,01

### ■ Pipotiazine

<b>PIPORTIL</b>					
Psychoses chroniques : délires chroniques, schizophrénies, psychoses hallucinatoires chroniques	20 cp. séc. 10 mg	14,74	I	65 %	0,74
À visée antidéficitaire : 3 à 8 mg/j en 2 prises	400 gttes 1 mg (sol. buv. 4 %)	26,45	I	65 %	0,07
À visée antidélirante : 20 à 60 mg/j en prises					

## ANTIPSYCHOTIQUES (3) – THIOXANTHÈNES

### ■ Zuclopenthixol

<b>CLOPIXOL</b>					
États psychotiques aigus et chroniques : schizophrénies, délire chronique, psychose hallucinatoire chronique :	30 cp. 10 mg	5,22	I	65 %	0,17
20 à 200 mg/j en 2 à 3 prises	98 cp. 10 mg	HOP	I		
États d'agitation psychomotrice au cours des schizophrénies, des états maniaques :	30 cp. 25 mg	11,10	I	65 %	0,37
50 à 200 mg/j	98 cp. 25 mg	HOP	I		
Déséquilibre psychopathique grave : 50 à 150 mg/j	800 gttes (fl. 20 mL)	9,72	I	65 %	0,01

### ■ Flupentixol

<b>FLUANXOL</b>					
Traitement d'attaque des psychoses à dominante déficitaire, anxieuse et dépressive : 50 à 200 mg/j	400 gttes 1 mg (sol. buv. 4 %)	6,70	I	65 %	0,02
Traitement des psychoses chroniques : 20 à 50 mg/j en 1 prise					
États d'excitation et d'agitation psychomotrice : 100 à 200 mg/j en 2 à 3 prises					

## TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (3)

### Traitement

Dans le traitement des troubles somatoformes il faut distinguer :

- les « accidents hystériques » - conversion et troubles dissociatifs, qui sont souvent transitoires ;
- les manifestations symptomatiques chroniques, trouble douloureux et syndrome de Briquet, qui imposent une prise en charge au long cours.

Le traitement des troubles somatoformes est essentiellement ambulatoire. Les hospitalisations ne se justifient qu'en présence « d'accidents hystériques » qui rendent impossible la prise en charge ambulatoire (fugue dissociative, amnésie dissociative, trouble de conversion persistant avec perte d'autonomie) ou lors de la présence de complications (dépressions, tentatives de suicide).

L'hospitalisation expose à un risque de développement d'une dépendance à l'institution, source de chronicité et de iatrogénie.

### Traitement des conversions

Il s'agit d'un trouble fonctionnel psychogène. La moitié des conversions cède rapidement. On recommande habituellement de la part du médecin, une fois toute cause organique éliminée, une attitude rassurante, parfois suggestive voire persuasive. Les diagnostics différentiels des troubles de conversion sont la simulation et la pathomimie. Le trouble de conversion n'est ni volontaire, ni feint et il est important de garder une attitude thérapeutique ferme, mais non culpabilisante vis-à-vis des patients.

Si les symptômes de conversion ne cèdent pas rapidement :

#### • Stratégies pharmacologiques

Les chimiothérapies sont indiquées pour le traitement ponctuel des complications dépressives, de la dysthymie ou des troubles anxieux associés (TAG, phobies). Les prescriptions seront prudentes en rai-

son du risque accru chez ces patients d'effets indésirables, de réactions paradoxales, d'abus et de dépendance, d'utilisation à visée manipulatoire ou dans un but suicidaire.

Les traitements anxiolytiques et **antidéresseurs** : **tricycliques** (amitriptyline, **LAROXYL** 25 mg : 1 à 3 cp./j), **tétracycliques** (mirtazapine, **NORSET** : 15 mg : 1 à 3 cp./j) peuvent être bénéfiques.

#### • Stratégies psychothérapeutiques

Peu de travaux ont évalué l'intérêt des psychotropes dans les troubles hystériques. Les techniques de psychothérapie sont utilisées selon l'école : de soutien, analytique, cognitivo-comportementale (décentration, prise de conscience, réassurance, affirmation de soi), hypnose. L'hypnotisme est une indication classique de la psychanalyse. Elle s'adresse à des sujets capables d'introspection et qui souhaitent une meilleure compréhension d'eux-mêmes.

#### • Rééducation fonctionnelle

La mobilisation passive, active, le travail proprioceptif sont des éléments indispensables dans la prise en charge des troubles de conversion, prise en charge en psychomotricité et en ergothérapie avec un travail centré sur le schéma corporel.

Un traitement actif et rapide est souhaitable, car les conversions prolongées peuvent devenir résistantes au traitement, et ont tendance à se chroniciser avec également des complications secondaires au décubitus, des positions vicieuses.

Lorsque l'importance des bénéfices secondaires semble empêcher l'abandon du symptôme, il importe parfois d'isoler le malade de son milieu familial. Les techniques aversives (faradisation, torpillage) ne sont plus justifiées en raison de leur caractère agressif. Les troubles « amnésie dissociative » ou « fugue dissociative » qui ne cèdent pas spontanément peuvent être traités par l'hypnose dans un premier temps puis par la psychothérapie.

## ANTIPSYCHOTIQUES (4) – BENZAMIDES

## ■ Sulpiride

<b>DOGMATIL</b>					
Psychoses aiguës : 400 à 1 600 mg/j en 2 à 3 prises Psychoses déficitaires : 50 à 500 mg/j	30 gél. 50 mg	3,91	I	30 %	0,13
	100 gél. 50 mg	HOP	I		
	150 gél. 200 mg	HOP	I		
	12 cp. séc. 200 mg	5,19	I	65 %	0,43
	40 càc 25 mg (sol. buv.)	2,52	I	30 %	0,06
<b>SYNÉDIL</b>					
200 à 1 000 mg/j	4000 gttes (0,5 g/100 mL)	2,82	I	30 %	0,07
	30 gél. 50 mg	4,45	I	30 %	0,15
<b>SYNÉDIL FORT</b>					
Idem <b>SYNÉDIL</b>	12 cp. 200 mg	5,96	I	65 %	0,50

## ■ Amisulpride

<b>SOLIAN</b>					
Psychoses productives : schizophrénies paranoides et troubles délirants persistants : 300 à 1 000 mg/j en 2 à 3 prises Psychoses déficitaires : 50 à 150 mg/j	30 cp. séc. 100 mg	11,41	I	65 %	0,38
	150 cp. séc. 100 mg	HOP	I		
	60 cp. séc. 200 mg	43,12	I	65 %	0,72
	150 cp. séc. 200 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 400 mg	43,12	I	65 %	1,44
	6 amp. 4 mL/200 mg	HOP	I		
	1 fl. 60 mL avec ser.	45,37	I	65 %	45,37

## ■ Tiapride

<b>TIAPRIDAL</b>					
États d'agitation et d'agressivité chez le sujet âgé et l'éthylrique : 200 à 400 mg : par ex. 2 à 4 amp. en IM/j Algies intenses et rebelles Mouvements choréïques : 300 à 800 mg/j	20 cp. séc. 100 mg	3,67	I	30 %	0,18
	150 cp. 100 mg	HOP	I		
	12 amp. 100 mg/ 2 mL	5,24	I	30 %	0,44
	1 fl. 30 mL sol. buv.	12,23	I	30 %	12,23
	5 mg/gtte				

## **TROUBLES SOMATOFORMES - TROUBLES DISSOCIATIFS (NÉVROSE HYSTÉRIQUE) (4)**

### **Traitement du trouble somatisation**

Il est long et parfois difficile. On a montré qu'une prise en charge psychiatrique régulière réduisait les dépenses en soins médicaux avec une diminution de la fréquence des hospitalisations. Évolution : chronique et fluctuante. Complications : interventions chirurgicales, répétition des bilans médicaux, effets secondaires des médicaments prescrits à tort, addictions.

La prise en charge au long cours est principalement psychologique. Les approches

psychologiques sont multiples et aucune technique psychothérapeutique ne s'avère supérieure à une autre dans le traitement du trouble de somatisation.

Les psychothérapies doivent toujours s'appuyer sur l'instauration d'une relation médecin-malade stable et rassurante, qui permet d'éviter la surconsommation médicale et de convaincre le patient de l'inutilité de la poursuite d'examens complémentaires.

## ANTIPSYCHOTIQUES (5) – BUTYROPHÉNONES

## ■ Halopéridol

<b>HALDOL</b>					
États psychotiques aigus : 5 à 30 mg/j États psychotiques chroniques : 3 à 8 mg/j en traitement d'entretien	40 cp. 1 mg	1,98	I	30 %	0,05
	30 cp. 5 mg	3,37	I	65 %	0,11
	300 gtttes 0,1 mg (sol. buv. 2 mg/mL)	1,75	I	65 %	0,01
	5 amp. 5 mg/mL	2,04	I	65 %	0,41
	4 fl. 300 gtttes 0,1 mg (sol. buv. 2 mg/mL)	HOP	I		
<b>HALDOL DECANOAS</b>					
États psychotiques chroniques : 1 inj. IM toutes les 4 semaines	1 amp. inj. 50 mg/mL	4,39	I	65 %	4,39
	5 amp. inj. 50 mg/mL	17,37	I	65 %	3,47

## ■ Dropréridol

<b>DROLEPTAN</b>					
Voie IV (amp. à 1 mL) : Nausées et vomissements postopératoires de l'adulte (0,625 à 2,5 mg) et de l'enfant (0,020 à 0,075 mg/kg) Prévention des nausées et vomissements induits par les morphiniques en analgésie autocontrôlée postopératoire chez l'adulte : 0,05 à 0,1 mg avec chaque bolus de 1 mg de morphine Voie IM (amp. à 1 mL) : États d'agitation dans les psychoses aiguës et chroniques : 2,5 à 5 mg × 2 à 4/j Risque de torsades de pointe (surveillance ECG)	10 amp. 1 mL (2,5 mg/mL)	HOP	I		
	10 amp. 2 mL (5 mg/2 mL)	HOP	I		
	10 amp. 2,5 mL (1,25 mg/2,5 mL)	HOP	I		

## ■ Pipampérone

<b>DIPIPÉRON</b>					
États d'agressivité, en particulier sujet âgé : 5 à 10 gtttes × 3/j Psychoses chroniques : 40 à 120 mg/j	20 cp. 40 mg	2,11	I	65 %	0,11
	4 fl. 195 mL (40 mg/mL)	HOP	I		
	600 gtttes 2 mg	2,75	I	65 %	0,00

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (1)

### Définition

L'état de stress post-traumatique (ESPT) (ancienne « névrose traumatique ») constitue une réponse différée ou prolongée à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes de détresse chez la plupart des individus. La prévalence vie entière de l'ESPT est de l'ordre de 1 %. Elle varie selon la population avec le degré d'exposition. Chez les femmes le risque est double et les traumatismes sont plus graves, par exemples lors des agressions sexuelles.

L'événement traumatisant peut être une agression, un viol, une catastrophe naturelle ou accidentelle, un accident de la circulation, un attentat, un enlèvement. Le fait d'être témoin d'un événement peut également représenter un traumatisme susceptible de se compliquer d'un ESPT. Le risque de développer un ESPT à la suite d'un événement potentiellement traumatique est d'environ 10 %.

Les principaux éléments cliniques de l'ESPT sont, outre l'existence d'un traumatisme, les signes spécifiques du syndrome de répétition, des signes anxieux et neurovégétatifs. Les formes prolongées peuvent aboutir à une modification et une réorganisation durable de la personnalité.

### Symptômes de répétition

Ils comprennent :

- des souvenirs répétés de l'événement sous forme de pensées, d'images, de perceptions ;
- des cauchemars ou rêves centrés sur les événements ;
- *des impressions que l'événement se répète* (flash-back, illusion, hallucinations, etc.).

Il existe généralement une *peur et un évitement des stimuli associés au traumatisme* ou pouvant éveiller le souvenir du traumatisme. Ces symptômes surviennent dans

un contexte de diminution de la réactivité générale aux autres stimuli, de détachement par rapport aux autres. Ils s'accompagnent fréquemment d'une hyper-réactivité neurovégétative avec une hypervigilance, des réactions de sursaut exagérées, un état de « qui-vive », une insomnie, une irritabilité. Complications possibles : syndrome dépressif avec parfois idées suicidaires, abus ou dépendance à alcool ou d'autres substances.

### Diagnostic différentiel

L'état de stress post-traumatique survient après un stress sévère et intense. La période de latence, qui sépare la survenue du traumatisme et celle du trouble, peut varier de quelques jours à quelques mois (moins de 6 mois après le traumatisme).

Ce trouble doit être distingué des troubles de l'adaptation où le facteur de stress n'est pas sévère et exceptionnel. Les réactions aiguës à un facteur de stress surviennent précocement et disparaissent rapidement en quelques heures ou quelques jours.

### Traitement

L'attitude thérapeutique dépend du moment évolutif de la névrose traumatique.

Dans les suites immédiates du traumatisme, il s'agit de limiter la constitution du trouble parfois par une approche psychothérapique précoce. Le traitement concerne l'ESPT et les comorbidités souvent associées (dépression, risque de suicide, dépendance vis-à-vis de drogues ou de l'alcool, etc.). Le soutien psychosocial est essentiel chez la plupart des patients victimes de traumatismes graves (viols, accidents, attentats, catastrophes naturelles). L'information du patient sur son trouble et sur ses droits est essentielle, et peut être facilitée par le soutien d'associations de patients ou d'aide aux victimes (assistances juridiques, psychothérapies, etc.).

## ANTIPSYCHOTIQUES (6) – DIBENZO-OXAZÉPINE

## ■ Loxapine

<b>LOXAPAC</b>					
Psychoses chroniques : 50 à 300 mg/j	30 cp. 25 mg	6,19	I	65 %	0,21
Psychoses aiguës, états d'agitation,	30 cp. 50 mg	11,92	I	65 %	0,40
états maniaques : 200 à 600 mg/j	30 cp. 100 mg	21,0	I	65 %	0,70
en 2 à 3 prises	750 gtttes sol. buv. (gttte = 1 mg)	5,12	I	65 %	0,01
	10 amp. 50 mg/2 mL	HOP	I		

## ANTIPSYCHOTIQUES (7) – APPARENTÉS AUX BUTYROPHÉNONES

## ■ Pimozide

<b>ORAP</b>					
Psychoses chroniques :	30 cp. 1 mg	2,12	I	65 %	0,07
antidéficitaire : 1 à 3 mg/j	30 cp. 4 mg	5,08	I	65 %	0,17
antiproductif : 4 à 20 mg/j					

## ■ Penfluridol

<b>SÉMAP</b>					
États psychotiques chroniques	6 cp. 20 mg	3,68	I	65 %	0,61
A. 1 à 3 cp. en 1 prise hebdomadaire					
Sujet âgé : 1 cp. en 1 prise hebdomadaire					

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (2)

Le traitement de choix est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) centrée sur le traumatisme ou la désensibilisation avec mouvements oculaires (EMDR : *Eye Movement Desensitization and Reprocessing*). La thérapie EMDR est une thérapie cognitive des troubles psychotraumatiques, fondée sur une exposition en imagination au souvenir douloureux couplée à des mouvements oculaires réguliers, et visant à une désensibilisation émotionnelle. Elle est composée de 3 éléments :

- l'exposition en imagination à des images évoquant les événements traumatiques ;
- des aspects cognitifs où le patient remplace les pensées négatives associées aux images par des pensées positives ;
- la pratique de mouvements oculaires saccadés que l'on demande au patient d'effectuer en suivant les mouvements rapides de gauche à droite de l'index du thérapeute. L'EMDR est contre-indiquée en cas de pathologie psychotique. Les méthodes cognitivo-comportementales associent l'exposition au stimulus traumatique et la désensibilisation en imagination ou *in vivo* pour déconditionner la réponse émotionnelle apprise (techniques de relaxation avec la désensibilisation systématique).

Les thérapies cognitives (restructuration cognitive) permettent au sujet d'apprendre à bloquer ses pensées et les images en rapport avec le traumatisme. La psychothérapie peut faire appel aussi à des techniques d'*immersion*. Il s'agit de faire revivre le traumatisme pour faire diminuer la charge émotionnelle associée (abréaction ou catharsis).

Les techniques d'hypnose peuvent être bénéfiques sur certains symptômes (douleurs, anxiété, cauchemars).

Le traitement psychothérapique est pro-

posé quel que soit le délai écoulé depuis le traumatisme. Ce traitement est conduit en entretiens individuels, habituellement au nombre de 15 à 20 séances, au rythme de 1 ou 2/sem [1].

En l'absence d'amélioration ou en cas d'amélioration limitée : une réévaluation du diagnostic est nécessaire ; un changement de thérapie ou une intensification de la thérapie associée à un traitement médicamenteux peuvent être proposés.

### Traitement préventif ou initial

La prévention des états de stress post-traumatique est illusoire. En psychiatrie militaire, elle peut cependant reposer sur l'information des médecins et des militaires, et sur la détection des individus vulnérables qui seront soumis à une surveillance étroite ou soustraits aux risques.

### Mesures immédiates

Le traitement initial s'inspire des méthodes militaires de la psychiatrie de l'avant. Il consiste à mettre à proximité des zones de combat des unités qui permettent :

- une mise à l'abri des combattants (ou des blessés d'un attentat) et leurs extractions rapides du contexte traumatique ;
- une sécurisation et une psychothérapie précoce qui favorise la mentalisation et la verbalisation des événements, afin d'éviter les ruminations anxieuses de la période de latence ;
- les techniques de « debriefing » - soins post-immédiats effectués le 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> j, très médiatisées, restent l'objet de controverses en raison d'études négatives en ce qui concerne leur caractère préventif sur le développement d'un ESPT, voire leur nocivité potentielle ;
- la prescription d'**anxiolytiques** type **benzodiazépines** qui atténue les réactions émotionnelles et d'anxiété parfois très intenses et limiterait la trace mnésique du traumatisme.



## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (1) – DIBENZODIAZÉPINES

### ■ Clozapine

<b>LÉPONEX</b>					
Schizophrénies résistantes : 50 à 800 mg/j Délivrance particulière : spécialistes et psychiatres. Surveillance régulière de la NFS avec un carnet de contrôle	7 cp. séc. 25 mg	1,99	I	65 %	0,28
	14 cp. séc. 25 mg	3,13	I	65 %	0,22
	28 cp. séc. 25 mg	5,43	I	65 %	0,19
	14 cp. séc. 100 mg	10,37	I	65 %	0,74
	28 cp. séc. 100 mg	20,21	I	65 %	0,72

### ■ Olanzapine

<b>ZYPREXA</b>					
Schizophrénie : 10 mg/j en 1 seule prise avec adaptation posologique de 5 à 20 mg/j en fonction de l'état clinique du patient Épisode maniaque : 15 mg/j puis idem schizophrénie Trouble bipolaire : prévention des rechutes chez un patient ayant répondu au <b>ZYPREXA</b> lors d'un épisode maniaque	28 cp. 5 mg	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 7,5 mg	46,05	I	65 %	1,64
	56 cp. 7,5 mg	87,82	I	65 %	1,57
	28 cp. 10 mg	87,82	I	65 %	3,14
	56 cp. 10 mg	HOP	I		
	1 fl. inj. IV 10 mg	HOP	I		
<b>ZYPREXA VELOTAB</b>					
Idem <b>ZYPREXA</b>	28 cp. 5 mg orod.	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 10 mg orod.	46,05	I	65 %	1,64
	28 cp. 15 mg orod.	HOP	I		
	28 cp. 20 mg orod.	HOP	I		
<b>ZYPADHERA</b>					
Traitement de maintien chez les patients adultes schizophrènes 1 inj. toutes les 2 à 4 sem.	1 inj. IM 210 mg LP	HOP	I		
	1 inj. IM 300 mg LP	HOP	I		
	1 inj. IM 405 mg LP	HOP	I		
<b>ZALASTA</b>					
Idem <b>ZYPREXA</b>	28 cp. 5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. orodisp. 5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. 7,5 mg	25,07	I	65 %	0,90
	28 cp. 10 mg	45,83	I	65 %	1,64
	28 cp. orodisp. 10 mg	45,83	I	65 %	1,64

### ■ Quétiapine

<b>XEROQUEL LP</b>					
Voie orale, une seule prise quotidienne Schizophrénie : 300 mg à J1, 600 mg à J2 Traitement d'entretien : 400-800 mg/j Épisode dépressif majeur : 50 mg à J1, 100 mg à J2, 200 mg à J3 et 300 mg à J4 Entretien : 200-600 mg /j Troubles bipolaires : 300-800 mg/j À adapter en fonction de la clinique, des caractéristiques du patient et du traitement associé	10 cp. 50 mg LP	10,03	I	65 %	1,00
	30 cp. 50 mg LP	29,01	I	65 %	0,97
	100 cp. 50 mg LP	HOP	I		
	30 cp. 300 mg LP	63,27	I	65 %	2,11
	60 cp. 300 mg LP	122,24	I	65 %	2,04
	100 cp. 300 mg LP	HOP	I		
	30 cp. 400 mg LP	91,87	I	65 %	3,06
	60 cp. 400 mg LP	179,43	I	65 %	2,99
	100 cp. 400 mg LP	HOP	I		

## ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (NÉVROSE TRAUMATIQUE) (3)

### Traitement de l'état de stress constitué : psychothérapies

À côté de l'approche cognitive ou cognitivo-comportementale, de l'EMDR ou de l'hypnose, on peut recourir également à des traitements qui reposent sur la recherche d'une abréaction.

- Lorsque le traumatisme est récent, l'abréaction peut survenir facilement par le simple récit de l'événement.

- Quand le stress est installé depuis longtemps, l'abréaction est plus difficile à obtenir. Elle peut être provoquée par la narcoanalyse (narcose amphotaminée et avec les barbituriques) ou l'hypnose. Ces méthodes favorisent l'irruption du souvenir du traumatisme en inhibant les défenses de l'état de veille.

- Plus le traitement est entrepris tardivement, plus les techniques psychothérapeutiques « classiques » doivent prendre le pas sur les techniques abréactives, le traumatisme étant réactualisé et revécu dans le transfert.

- Les psychothérapies analytiques peuvent être également indiquées pour les formes plus anciennes ou associées à un autre trouble névrotique.

### Chimiothérapie

Elle est indiquée dans les formes chroniques durant depuis plus d'un an (dépression quasi systématiquement associée). La **paroxétine** est la seule molécule ayant une AMM dans cette indication. **DEROXAT** 20 mg, 1 à 3 cp./j. Son utilisation prolongée nécessite une réévaluation régulière [2].

Dans 3 études contrôlées randomisées

d'une durée de 5 sem. et d'une durée de 3 mois, la **fluoxétine** (40, 30 et 57 mg/j respectivement) s'est révélée plus efficace que le placebo, y compris à long terme, dans la prévention des rechutes.

Deux études contrôlées randomisées de 12 sem. sont également en faveur de l'efficacité de la **sertraline** (200 mg/j) versus placebo.

Les **imipraminiques** (**amitriptyline** 50 à 300 mg/j et **imipramine**) se sont révélés plus efficaces que le placebo. Ils sont également efficaces sur les troubles du sommeil et l'anxiété.

L'efficacité des **IMAO** n'est pas démontrée dans cette indication, mais ils réduiraient les pensées obsédantes concernant le traumatisme [2].

Donc, en cas d'échec de la paroxétine les médicaments utilisés dans l'ESPT (hors AMM) sont les autres **ISRS** (**fluoxétine**, **fluvoxamine**, **sertraline**) ou les **antidépresseurs tricycliques** (**amitriptyline**, **imipramine**) [1].

L'efficacité de l'association thérapie cognitivo-comportementale et **ISRS** peut être supérieure à celle de chaque traitement isolément. La durée initiale doit être de 12 sem. avant de changer de traitement. Si les problèmes de sommeil sont importants, un traitement **hypnotique** de courte durée peut être proposé.

La chimiothérapie symptomatique (hors AMM) peut faire également appel de façon non spécifique aux **anxiolytiques**, **benzodiazépéniques** ou non.

Aucun traitement médicamenteux n'a toutefois démontré sa capacité à réduire de façon significative et prolongée les symptômes du syndrome de répétition [2].

### CONSENSUS

[1] Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves, HAS, 2007

[2] Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte, Afssaps, 2006

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (2) – BENZISOXAZOLE

### ■ Risperidone

<b>RISPERDAL</b>					
A. : psychoses aiguës et chroniques en particulier schizophrénies : 4 à 8 mg/j	60 cp. séc. 1 mg	22,83	I	65 %	0,38
Traitement à court terme des épisodes maniaques aigus modérés à sévères	60 cp. séc. 2 mg	43,48	I	65 %	0,72
E. : traitement des troubles du comportement (tels que hétéro-agressivité, automutilation, impulsivité majeure, et stéréotypies sévères) observés dans les syndromes autistiques, en monothérapie	30 cp. séc. 4 mg	43,48	I	65 %	1,45
	30 mL sol. buv. 1 mg/mL	9,58	I	65 %	0,32
	60 mL sol. buv. 1 mg/mL	18,63	I	65 %	0,31
	120 mL sol. buv. 1 mg/mL	36,09	I	65 %	0,30
<b>RISPERDALORO</b>					
Psychoses aiguës et chroniques en particulier schizophrénies : 4 à 8 mg/j	28 cp. orodisp. 0,5 mg	10,37	I	65 %	0,37
<b>RISPERDALORO</b> 0,5 et 1 mg : E. de 5 à 11 ans présentant un retard mental accompagné de troubles du comportement (tels que agressivité, agitation, impulsivité, automutilations), en monothérapie	28 cp. orodisp. 1 mg	12,66	I	65 %	0,45
	28 cp. orodisp. 2 mg	21,34	I	65 %	0,76
	28 cp. orodisp. 3 mg	31,72	I	65 %	1,13
	28 cp. orodisp. 4 mg	46,07	I	65 %	1,65

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (3) – DIHYDROXYQUINOLONE

### ■ Aripiprazole

<b>ABILIFY</b>					
Schizophrénie : 15 mg/j en une seule prise	28 cp. 5 mg	97,67	I	65 %	3,49
Traitement et prévention des récurrences des épisodes maniaques modérés à sévères	28 cp. 10 mg	97,67	I	65 %	3,49
des troubles bipolaires de type I	28 cp. 15 mg	97,67	I	65 %	3,49
A : 15 à 30 mg/j en une seule prise	1 inj. IV 7,5 mg/mL	HOP	I		
E. > 13 ans : 2 mg/j les premiers jours, 5 mg/j les jours suivants pour atteindre 10 mg/j pendant 12 sem. et posologie d'entretien	28 cp. orodisp. 10 mg	97,67		65 %	3,49
	28 cp. orodisp. 15 mg	97,67	I	65 %	3,49

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (1)

### Rappel nosologique

Dans les systèmes nosologiques actuels, il n'est pas fait mention des **bouffées délirantes aiguës** (BDA) classiques. La CIM-10 range cette affection sous la catégorie des **troubles psychotiques aigus et transitoires**. Les troubles psychotiques aigus doivent être considérés comme des syndromes cliniques d'étiologies variées.

Les troubles psychotiques aigus et transitoires correspondent à la survenue brusque, le plus souvent chez un sujet jeune, d'une expérience délirante comportant des hallucinations, des idées délirantes, des perturbations des perceptions et du comportement, une insomnie presque totale, un bouleversement émotionnel très intense avec une anxiété et une instabilité de l'humeur qui oscille entre la tristesse et l'euphorie.

Le pronostic à moyen et long terme est incertain. Selon la CIM-10, on attachera une grande importance à repérer :

- le **caractère aigu, voire brutal** (en moins de 48 h) de survenue du trouble ;
- la présence de **syndromes typiques** : dans la BDA classique on décrit l'aspect **polymorphe** du trouble avec un polymorphisme des mécanismes et des thèmes délirants (mystiques, persécution, mégalomanie, possession, transformation corporelle, etc.). On décrit également le caractère fluctuant et changeant des troubles. On peut rencontrer aussi un **syndrome schizophrénique** typique (troubles du cours de la pensée, idées déli-

rantes bizarres, hallucinations de conversations, symptômes négatifs, etc.) ;

- l'existence de **facteurs de stress aigus**. Ces 3 éléments permettent au clinicien d'identifier et de décrire précisément le trouble psychotique aigu.

Le DSM-IV distingue deux entités nosologiques :

- **trouble psychotique bref** : présence d'un ou des symptômes suivants : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement grossièrement désorganisé ou catatonique ; la durée des troubles est supérieure à 1 j et inférieure à un mois, avec ou sans facteurs de stress marqués, avec retour complet au niveau de fonctionnement pré-morbide ;

- **trouble schizophréniforme** : répond aux critères de la schizophrénie, durée supérieure à 1 mois et inférieure à 6 mois. Les caractéristiques du bon pronostic se manifestent par au moins deux des manifestations suivantes : survenue dans les 4 sem. par rapport au premier changement observable, confusion ou perplexité, bon fonctionnement social et professionnel pré-morbide, pas d'émoussement ou d'abrasion de l'affect. Contrairement à la Schizophrénie, une altération du fonctionnement social et des activités n'est pas requise pour porter le diagnostic de Trouble schizophréniforme. Cependant, la plupart des sujets présentent des dysfonctionnements dans divers domaines du fonctionnement quotidien (p. ex., au travail ou à l'école, dans les relations interpersonnelles et dans les soins d'hygiène).

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (4) – DIBENZO-OXAZÉPINE

## ■ Asénapine

SYCREST					
Accès maniaque, trouble bipolaire	60 cp. subling. 5 mg		I	NR	
Posologie initiale en monothérapie : 10 mg x 2/j	100 cp. subling. 5 mg	HOP	I		
Posologie initiale en polythérapie : 5 mg x 2/j	60 cp. subling. 10 mg		I	NR	
Posologie d'entretien : 5 à 10 mg x 2/j en fonction de la réponse clinique	100 cp. subling. 10 mg	HOP	I		

## ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES (5) – ANTIDOPAMINERGIQUE

## ■ Palipéridone

XEPLION					
Traitement d'entretien de la schizophrénie chez l'adulte stabilisé ou ayant répondu à la <b>rispéridone</b> ou la <b>palipéridone</b> : 1 inj. IM dans le deltoïde à J <sub>1</sub> =150 mg et J8 ± 2 j = 100 mg puis 1 inj. mensuelle (± 7 j) La dose d'entretien recommandée est de 75 mg à adapter en fonction de la tolé- rance et l'efficacité entre 25 et 150 mg À administrer dans le deltoïde ou le fessier Ne doit pas être utilisé si le contrôle immé- diat des symptômes est recherché	1 ser. 25 mg 1 ser. 50 mg 1 ser. 75 mg 1 ser. 100 mg 1 ser. 150 mg	111,90 218,25 280,58 342,96 509,22	I I I I I	65 % 65 % 65 % 65 % 65 %	111,90 218,25 280,58 342,96 509,22

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (2)

### Évolution et pronostic

En général les troubles psychotiques aigus guérissent complètement en quelques semaines, voire en quelques jours. Il est pratiquement impossible de prévoir l'évolution à moyen et à long terme. La question du devenir de ces malades représente un des problèmes majeurs.

Globalement les rares enquêtes anamnestiques décrivent 4 types possibles d'évolution :

- l'absence complète de récurrence ;
- la récurrence périodique sur le même mode : « psychose cycloïde » de la CIM-10 ;
- l'évolution vers une schizophrénie (15 % des cas) ;
- l'apparition d'accès périodiques de types maniaco-dépressifs.

### Facteurs pronostiques des troubles psychotiques aigus et transitoires

FACTEURS DE BON PRONOSTIC	FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC
Antécédents personnels ou familiaux de troubles dépressifs ou maniaques	Personnalité prémorbide de type schizoïde ou schizotypique
Début brutal	Début subaigu ou insidieux
Importance de la note confusionnelle	
Bonne réactivité au traitement antipsychotique	Médiocre réactivité au traitement antipsychotique

### Traitement

La BDA constitue une urgence psychiatrique, la plupart du temps prise en charge en milieu hospitalier.

L'hospitalisation permet la réalisation d'un bilan étiologique (élimination de facteurs organiques, recherche de toxiques), et sert à procurer au patient une « atmosphère psychothérapique » sécurisante.

Si l'hospitalisation en service libre ne peut être négociée, on aura recours à une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT), voire à une mise en place des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État (SPDRE) lors de troubles majeurs du comportement menaçant l'ordre public ou la sûreté des personnes.

La prise en charge thérapeutique devra être multidisciplinaire et personnalisée sans oublier d'y inclure le dépistage des comorbidités somatiques et psychiatriques [1].

## ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (1)

## ■ Zuclopenthixol décanoate

<b>CLOPIXOL ACTION PROLONGÉE</b>					
Traitement initial des psychoses aiguës, des états maniaques, et des moments féconds des psychoses chroniques : 50 à 200 mg en 1 seule inj. en IM profonde pour 72 h. À renouveler rarement 8 h après la 1 <sup>re</sup> inj. Prévoir relais <i>per os</i> après 72 h	1 amp. inj. (IM) 200 mg/mL	7,66	I	65 %	
	10 amp. inj. (IM) 200 mg/mL	HOP	I		

## ■ Zuclopenthixol acétate

<b>CLOPIXOL ACTION SEMI-PROLONGÉE</b>					
Psychoses chroniques : schizophrénies, délire paranoïde, psychose hallucinatoire chronique 1 à 2 amp. en IM profonde/3 sem.	5 amp. inj. (IM) 50 mg/mL	HOP	I		

## ■ Flupentixol décanoate

<b>FLUANXOL LP</b>					
Psychoses chroniques : - à visée antidéficitaire : 20 à 80 mg toutes les 2 à 3 sem. en IM profonde - à visée antidépressive : 80 à 300 mg en IM profonde toutes les 2 à 4 sem. Traitement de fond des troubles du comportement chez les éthyliques : 100 mg en IM toutes les 3 sem. (risque de dyskinésie tardive)	4 amp. inj. 20 mg/mL	7,50	I	65 %	1,88
	1 amp. inj. 100 mg/mL	7,66	I	65 %	7,66

## ■ Fluphénazine

<b>MODÉCATE</b>					
Psychoses délirantes chroniques : schizophrénies, troubles délirants persistants, psychose hallucinatoire chronique. 25 à 150 mg en IM profonde toutes les 3 à 4 sem.	3 amp. 25 mg/mL	6,40	I	65 %	2,13
	1 fl. 125 mg/5 mL	9,35	I	65 %	9,35

## ■ Pipotiazine

<b>PIPORTIL L4</b>					
Psychoses chroniques : 20 à 200 mg en IM profondes toutes les 3 à 4 sem.	3 amp. 25 mg/mL	12,93	I	65 %	4,31
	1 amp. 100 mg/4 mL	12,38	I	65 %	12,38
<b>PIPORTIL</b>					
États psychotiques aigu ou chronique : 5 à 20 mg/j	20 cp. 10 mg	14,74	I	65 %	0,74
	400 gtes (sol. buv. 4 %)	26,45	I	65 %	0,07

## ■ Risperidone

<b>RISPERDALCONSTA LP</b>					
Psychoses aiguës et chroniques en particulier schizophrénies en relais du traitement <i>per os</i> : 1 injection IM/2 sem. avec poursuite du <b>RISPERDAL</b> <i>per os</i> en relais pendant 3 sem.	1 ser. 25 mg/2 mL	103,35	I	65 %	103,35
	1 ser. 37,5 mg/2 mL	133,06	I	65 %	133,06
	1 ser. 50 mg/2 mL	162,80	I	65 %	162,80

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (3)

### Traitement médicamenteux

• Généralement les troubles psychotiques aigus et transitoires répondent très bien et très rapidement aux **antipsychotiques (AP)**. Les **AP** dits de seconde génération, ou les **antipsychotiques atypiques (APA)** seront utilisés en première intention avec pour objectif la réduction de la durée de l'épisode processuel. La prévention et la recherche de leurs effets indésirables (prise de poids, troubles endocriniens et sexuels, troubles métaboliques et cardiovasculaires) sera une préoccupation constante afin d'éviter la stigmatisation des patients et d'assurer une bonne observance du traitement, gage d'alliance thérapeutique pour l'avenir. Le traitement **APA** sera prescrit aux doses minimales efficaces et régulièrement réévalué afin de détecter et de gérer précocement les patients non répondeurs. En cas d'agitation et d'angoisse importante on associe temporairement un traitement sédatif.

Ex. : **rispéridone (RISPERDAL)** : 4 j à 8 mg/j en 2 prises ou **olanzapine (ZYPREXA)** : 5 à 20 mg/j en 1 prise, ou **aripiprazole (ABILIFY)** : 10 à 30 mg/j en une prise ± **clorazépate dipotassique (TRANXÈNE)** : 50 à 150 mg/j.

Les formes orales d'absorption rapide (gouttes ou comprimés dispersibles) seront préférées à l'utilisation des formes injectables, sauf cas particuliers.

En seconde intention, les **AP** conventionnels seront utilisés en étant particulièrement vigilant à minimiser les effets extrapyramidaux par la prescription de la posologie minimale efficace et le recours aux médicaments antiparkinsonniens, sans oublier les effets indésirables précités.

On peut associer aux **AP** dans certains cas des traitements par benzodiazépines à visée anxiolytique et sédatrice et des **hypnotiques (zoplicid, STILNOX 1 cp. le soir ou zopiclone, IMOVANE 1 cp. le soir)** en cas d'insomnie importante.

Les **antipsychotiques** (conventionnels et de seconde génération) restent le traitement de référence ; toutefois, en présence de troubles de l'humeur, les **thymorégulateurs**, en particulier les **anticonvulsivants**, pourraient être un appoint ou une alternative intéressante en tant que traitement symptomatique.

Il est recommandé [1] :

- d'organiser le traitement en tenant compte de la triple dimension biologique, psychologique et sociale de l'abord du malade ;
- d'avoir recours de préférence aux **APA**. Ce traitement sera prescrit à la dose minimale efficace pendant une période d'un à 2 ans afin d'éviter les rechutes ;
- de porter un diagnostic aussi précoce que possible pour favoriser la mise en œuvre le plus tôt possible du traitement, gage d'un meilleur pronostic ;
- de bien peser les indications du traitement ambulatoire ou de l'hospitalisation ;
- de ne pas recourir à la sismothérapie en première intention, mais uniquement en cas d'intolérance, de contre-indications à l'usage des **antipsychotiques**, voir d'une résistance ;
- d'utiliser des méthodes d'information systématique du patient et de sa famille à propos des symptômes, des facteurs étiologiques, du traitement et de l'évolution de la maladie. Le travail avec la famille sur les problèmes concrets de la vie quotidienne avec un jeune schizophrène doit être organisé.



## ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (2) – PHARMACOLOGIE (1)

### PROPRIÉTÉS

Le terme **antipsychotique** a remplacé celui de neuroleptique.

Delay et Denicker ont défini les **antipsychotiques** comme des molécules capables :

- d'entraîner une sédation et une réduction des états d'agitation et d'excitation ;
- d'avoir une activité antidépressive et sur les hallucinations ;
- de créer d'un état d'indifférence psychomotrice ;
- de produire des symptômes extrapyramidaux ;
- d'agir principalement au niveau sous-cortical.

On distingue actuellement des **antipsychotiques** conventionnels de première génération et des **antipsychotiques** dits de seconde génération, ou **atypiques (APA)**. Il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus pour définir les propriétés des **APA**. La notion d'atypicité correspond pas à la définition classique, en particulier parce qu'elles induisent moins d'effets extrapyramidaux par diminution des effets anti-D2 nigrostrié, par effets anti-5HT<sub>2</sub>. L'effet anti-5HT<sub>2</sub> est également responsable d'une dimi-

nution des effets secondaires au niveau hypothalamohypophysaire (moins d'aménorrhée-galactorrhée) et mésocortical (moins de symptômes négatifs secondaires).

Les **antipsychotiques** bloquent principalement les récepteurs centraux dopaminergiques (D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, D<sub>4</sub>).

Ils possèdent également à des degrés divers des propriétés anticholinergiques, adréno-lytiques, antisérotoninergiques 5HT<sub>2</sub>, antihistaminiques H<sub>1</sub>. Ces différents sites d'action expliquent les effets thérapeutiques variés des **antipsychotiques** et les différences d'action observées entre ces molécules.

L'**aripiprazole (ABILIFY)** est un agoniste dopaminergique partiel. Il occupe les récepteurs dopaminergiques centraux dont il diminue la disponibilité pour la dopamine endogène.

En dehors de leurs propriétés antipsychotiques, les **antipsychotiques** peuvent être utilisés en anesthésie, comme antiémétiques et contre les manifestations allergiques.

### • CLASSIFICATION

Les classifications sont établies à partir des effets thérapeutiques prédominants, des effets indésirables, de la possibilité d'utilisation en urgence.

### Classification thérapeutique des antipsychotiques

Antipsychotiques sédatifs	Antipsychotiques antiproduitifs	Antipsychotiques antidépresseurs
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LARGACTIL</b></li> <li>– <b>FLUANXOL</b></li> <li>– <b>NOZINAN</b></li> <li>– <b>NEULEPTIL</b></li> <li>– <b>TERCIAN</b></li> <li>– <b>CLOPIXOL</b></li> <li>– <b>TIAPRIDAL</b></li> <li>– <b>DIPIPÉRON</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>HALDOL</b></li> <li>– <b>PIPORTIL</b></li> <li>– <b>DROLEPTAN</b></li> <li>– <b>SÉMAP</b></li> <li>– <b>LOXAPAC</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ORAP</b></li> <li>– <b>PIPORTIL</b></li> <li>– <b>SOLIAN</b></li> <li>– <b>DOGMATIL</b></li> </ul>

### Classification des antipsychotiques en fonction de leur atypicité

ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES	ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>LÉPONEX</b></li> <li>– <b>ZYPREXA</b></li> <li>– <b>RISPERDAL</b></li> <li>– <b>XEROQUEL</b></li> <li>– <b>SYCREST</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ABILIFY</b></li> </ul>

Antipsychotiques utilisés préférentiellement en situation d'urgence : **CLOPIXOL**, **LOXAPAC**, **ABILIFY**.

## TROUBLES PSYCHOTIQUES AIGUS ET TRANSITOIRES (BOUFFÉE DÉLIRANTE AIGUË) (4)

### Traitements associés

Le suivi en cure ambulatoire, si la symptomatologie n'est pas trop bruyante, a l'intérêt d'éviter la stigmatisation liée à l'hospitalisation et de favoriser la conservation des liens familiaux et sociaux. On peut toutefois préférer le traitement dans un cadre hospitalier dont l'indication demeure en cas de risque de dangerosité, de comorbidité organique, de conflit aigu avec l'entourage ou d'absence de soutien familial.

L'accompagnement psychologique est indispensable tout au long de l'épisode aigu. Des entretiens réguliers permettront de rassurer le patient, de rétablir une communication et de mettre en place les éléments pour une psychothérapie ultérieure.

Les cures analytiques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans ce type de pathologie. Toutefois la référence psychanalytique dans l'approche psychopathologique fait l'objet d'un consensus. Différentes méthodes d'inspiration cognitivo-comportementale peuvent également être utilisées.

### Traitements à moyen et long terme

La prévention des rechutes est un objectif fondamental. En cas d'épisode unique, il existe un consensus pour maintenir une chimiothérapie **antipsychotique** pendant 1 à 2 ans. En cas de rechutes ou de récurrences, il existe un accord professionnel pour la prolonger.

À moyen terme et au décours de l'expérience délirante, on observe fréquemment des symptômes dépressifs. Il peut s'agir d'effets latéraux des **AP** (notion classique mais non clairement démontrée), des effets traumatisants de la prise de conscience de l'épisode aigu, voire d'un authentique épisode dépressif majeur. Dans ce cas on propose de baisser les **AP** et d'ajouter un **antidépresseur**. Ex. : **fluoxétine (PROZAC)** : 1 gél. le matin ou **miansérine (MIANSERINE ARROW)** 60 mg en 1 prise le soir.

La conduite thérapeutique au long cours est fonction du cadre diagnostique. Les troubles psychotiques aigus récidivants avec un bon fonctionnement intercritique seront traités de façon prolongée par des **AP** à visée de maintenance.

### CONSENSUS

[1] Schizophrénies débutantes : diagnostic et modalités thérapeutiques, *FFP selon la méthodologie de l'Anaes*, 2003

## ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (3) – PHARMACOLOGIE (2)

### INDICATIONS

Les **antipsychotiques** sont indiqués de façon privilégiée dans le traitement des troubles psychotiques aigus et chroniques : troubles délirants persistants, schizophrénies, troubles psychotiques aigus et transitoires. Ils constituent un traitement symptomatique d'appoint dans les troubles affectifs délirants maniaques ou dépressifs, les syndromes confusionnels, les états d'agitation, les états d'angoisse sévères avec dépersonnalisation, les troubles de personnalité limite, les états névrotiques graves. Dans tous les cas, le maintien au long cours de ces traitements doit être régulièrement rediscuté en tenant compte du risque de dyskinésie tardive.

Les indications neurologiques des **antipsychotiques** sont les tics et la maladie de Gilles de la Tourette. Les antipsychotiques atypiques (**clozapine**) auraient un intérêt dans les formes graves de la maladie de Parkinson avec symptômes psychotiques.

### CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe pas de réelle contre-indication absolue aux **AP**. Les contre-indications sont liées aux effets indésirables de ces médicaments. On déconseillera l'emploi des **AP** dans les situations cliniques suivantes :

- maladie de Parkinson en raison du risque de majoration des signes extrapyramidaux ;
- dyskinésie tardive (*cf. infra*) ;
- phéochromocytome pour les **benzamides** ;
- glaucome à angle fermé, adénome de prostate pour les **AP** anticholinergiques ;
- toute fièvre inexpliquée ;
- les syndromes catatoniques (contre-indication initiale aux **AP** en raison du risque accru de syndrome malin) ;
- en cas d'antécédents d'agranulocytose, éviter la **clozapine** ;
- arythmie, angor, éviter les **phénothiazines** ;
- porphyrie ; on utilisera préférentiellement la **chlorpromazine (LARGACTIL)**.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : la grossesse constitue une contre-indication relative aux **antipsychotiques**.

Les nouveaux **antipsychotiques** n'ont pas encore démontré leur absence d'effets tératogènes. On évitera également de prescrire au 1<sup>er</sup> trimestre et à l'approche du terme.

**Chlorpromazine (LARGACTIL)** et **halopéridol (HALDOL)** : possibles toute la grossesse. Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, en

particulier à fortes doses, tenir compte d'un risque possible chez le nouveau-né de signes atropiniques (tachycardie, etc.), de signes extrapyramidaux (hypertonie, etc.) et de sédation. Les signes atropiniques sont majorés en cas d'association aux correcteurs antiparkinsoniens.

Risque d'hypotension maternelle lors de l'utilisation de la forme injectable.

Envisageables toute la grossesse : **cyaméazine**, **fluphénazine**, **lévomépromazine**, **pipotiazine**, **propériciazine**, **amisulpride**, **sulpiride**, **tiapride**, **lévomépromazine**, **pipotiazine**, **propériciazine**, **clozapine**, **loxapine**, **olanzapine**.

À éviter par prudence toute la grossesse : **perphénazine**, **dropéridol**, **pipampérone**, **flupentixol**, **zuclopenthixol**, **pimozide**.

En cours d'évaluation : **rispéridone**, **aripiprazole**.

**Allaitement** : déconseillé.

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Effets psychiatriques

Somnolence souvent liée à une posologie trop importante (conducteurs de véhicules).

Syndrome confuso-onirique : principalement les produits anticholinergiques, lors d'administration chez le sujet âgé et en cas de lésion cérébrale. On conseille d'arrêter le traitement **antipsychotique**.

Dépression. L'effet dépressiogène des **antipsychotiques** est encore discuté. Dans ce cas on conseille généralement de réduire les doses d'**antipsychotique** et d'adjoindre un **antidépresseur** dans un second temps.

Les **antipsychotiques** antidépresseurs administrés à faible dose peuvent entraîner parfois une réactivation délirante et anxieuse transitoire. Il faut distinguer cet effet des symptômes de l'akathisie.

#### Effets neurologiques

Ils sont d'autant plus asmarqués que le produit possède des propriétés antiproductives et antidopaminergiques. Les **antipsychotiques atypiques** induisent peu ce type de troubles neurologiques.

► **Dyskinésies et dystonies aiguës précoces**  
Trismus, torticolis, plafonnement du regard, crise oculogyre, etc. Impressionnants, ils cèdent à la prise de correcteurs anticholinergiques injectables (**tropatépine**, **LEPTICUR** 10 mg 1 amp. *per os* ou IM si besoin). Ils surviennent précocement en début de traitement.

## SCHIZOPHRÉNIE (1)

### Cadre nosologique

#### Définitions

La schizophrénie (SCZ) représente la catégorie diagnostique la plus courante et la plus importante du groupe des troubles psychotiques chroniques et des troubles délirants persistants.

Prévalence (vie entière, population générale) : 1 %. Incidence annuelle : 0,1 à 0,3 ‰. Le *sex ratio* est de 1, avec un début plus précoce chez l'homme.

Les systèmes de classification, DSM-IV et CIM-10, proposent des critères diagnostiques de la SCZ qui sont centrés principalement sur les symptômes délirants, l'automatisme mental et les troubles de l'affect, du langage ou du comportement.

La notion de dissociation mentale constitue encore pour de nombreux cliniciens l'anomalie caractéristique de la schizophrénie. La dissociation exprime la perte de ce qui fait l'unité et l'homogénéité de la personne. Elle se manifeste dans le fonctionnement intellectuel du sujet, son affectivité et son comportement. Elle « infiltre » la symptomatologie schizophrénique et lui confère ses caractéristiques générales, décrites par H. Ey, de **bizarrie, d'étrangeté, de détachement et d'ambivalence**.

#### Formes cliniques

• La CIM-10 et le DSM-IV reconnaissent à la SCZ 5 grandes formes cliniques en fonction de l'importance respective du délire paranoïde, des signes de désorganisation, déficitaires ou des troubles psychomoteurs :

– **paranoïde** : prédominance de l'activité délirante paranoïde. Le délire paranoïde n'est pas systématisé (peu ou pas cohérent) : flou, incohérent, impénétrable, chaotique, les mécanismes sont polymorphes (hallucinations, illusions, intuitions, etc.), les thèmes souvent intriqués (mystiques, persécutions, influence, etc.). L'adhésion au délire est le plus souvent totale et peut déclencher des troubles du comportement (agitation, agressivité, stupeur, etc.) ;

– **désorganisée ou hébéphrénique** : début en règle générale insidieusement au cours ou au décours de l'adolescence. Une personnalité prémorbide schizoïde est parfois retrouvée.

La dissociation et le repli autistique prédominent. Les perturbations du fonctionnement intellectuel (troubles du contenu et du cours de la pensée, du langage, de l'attention et de la concentration), l'émoussement affectif avec retrait social sont au premier plan. Le délire est pauvre, voire absent. Le pronostic évolutif, malgré le traitement antipsychotique, est souvent défavorable et la désinsertion socioprofessionnelle est fréquente ;

– **catatonique** : présence de symptômes psychomoteurs passant parfois d'un extrême à un autre : hyperkinésie, stupeur, agitation violente, mutisme, négativisme, attitudes imposées, rigidité, flexibilité cirreuse. Les symptômes catatoniques peuvent s'observer en dehors de la SCZ (épisodes thyroïdiens dépressifs ou maniaques, tumeurs cérébrales, affections métaboliques ou toxiques). Le diagnostic de syndrome catatonique justifie donc des investigations cliniques et paracliniques approfondies à la recherche d'étiologies spécifiques. Il peut engager le pronostic vital et nécessite souvent des mesures thérapeutiques et réanimatoires adéquates (cf. Traitement) ;

– **indifférenciée** ;

– **résiduelle** : stade chronique de l'évolution de SCZ, forme stabilisée dans laquelle persistent des symptômes négatifs mais où les symptômes positifs sont absents ou très atténués.

• La CIM-10 distingue également des formes « mineures » : trouble schizophréniforme, autres troubles schizophréniques, troubles schizotypiques, schizophrénies prépsychotiques, prodromique, pseudonévrotique, pseudopsychopathique (héboïdophrénique), personnalité schizotypique. Pour l'ensemble des sous-types de SCZ, on peut spécifier l'évolution : continue ; épisodique avec déficit progressif ; épisodique avec déficit stable ; épisodique rémittent ; rémission incomplète ; rémission complète. Habituellement la SCZ est une affection chronique, et qui s'associe à des périodes d'exacerbation. On dispose de peu d'enquêtes catamnétiques au long cours, mais l'affection semble se stabiliser après 20 à 30 ans d'évolution.

**ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (4) –  
PHARMACOLOGIE (3)****► Syndrome parkinsonien d'imprégnation aux antipsychotiques**

Akinésie, bradykinésie, hypertonie extrapyramidale, tremblement parkinsonien. Ils surviennent plus tardivement après 2 à 3 sem. de traitement. En fonction de la réponse thérapeutique, on peut, dans un premier temps, conseiller la réduction de la posologie de **antipsychotiques** et dans un second temps prescrire un correcteur **antiparkinsonien**, par exemple : **tropatépine**, **LEPTICUR** 1 cp. x 2/j, **bipéridène** (**AKINETON RETARD**) : 1 cp. x 2/j.

**► Syndrome hyperkinétique**

Akathasie-tasikinesie. Le syndrome d'impairance motrice et psychique est très mal toléré par les patients. Le syndrome hyperkinétique répond mal aux **antiparkinsoniens**. On peut proposer de diminuer les doses de **antipsychotiques** (il existe des akathasies de sevrage) ou d'associer des **β-bloquants** : **propranolol** (**AVLOCARDYL**) 40 mg 1/4 à 1/2 x 3/j ou des **benzodiazépines** : **diazépam** (**VALIUM**) 10 à 30 mg/j.

**► Dysckinésies tardives**

Redoutables, elles représentent à long terme le danger principal des traitements prolongés par **antipsychotiques**. Elles peuvent apparaître après quelques semaines (en particulier chez le sujet âgé) ou quelques mois voire années de traitement. De nombreux facteurs favorisent leur apparition : le sexe féminin, les troubles affectifs, la dose totale reçue de **antipsychotiques**, l'âge.

Certains schizophrènes présentent des dyskinésies tardives spontanées sans avoir jamais pris de **antipsychotiques**. Les dyskinésies tardives sont d'expressions cliniques très polymorphes. Elles sont plus fréquentes au niveau facial et axial : mouvements involontaires lents, syn-

drome bucco-linguo-facial, protrusion de la langue, rotation choréo-athétosique des membres, protrusion du bassin, dysphagies, dysphonies, difficultés respiratoires.

Les **antiparkinsoniens** ne sont pas efficaces pour corriger les dyskinésies tardives. Le traitement est préventif et consiste à arrêter les **antipsychotiques** lorsque la prescription n'est plus justifiée. S'il est nécessaire de poursuivre le traitement antipsychotique et en cas d'apparition des dyskinésies tardives, on peut conseiller les **benzodiazépines** type **clonazépam** (**RIVOTRIL**) ou **diazépam** (**VALIUM**), réduire les doses d'**antipsychotique** ou changer pour les molécules atypiques type **olanzapine**.

**Effets neurovégétatifs**

Ils sont plus fréquents avec les **antipsychotiques** sédatifs (**phénothiazines** et anticholinergiques) : hypotension orthostatique, à l'origine de chutes, effets atropiniques.

**Effets métaboliques**

Les **antipsychotiques**, en particulier **atypiques** (p. ex. **olanzapine** : **ZYPREXA**), augmentent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires : poids, cholestérolémie, glycémie. La surveillance de ces paramètres avant et après traitement est indispensable. Une prise en charge diététique précoce est souhaitable en cas de prise de poids, voire à visée préventive.

**Effets cardiovasculaires**

Hypotension orthostatique, baisse de la pression diastolique, effet anesthésique local du myocarde, tachycardie, troubles de conduction : période réfractaire plus longue, temps de conduction ventriculaire plus lent, variation de l'excitabilité du nœud sinusal, blocs AV, arythmies, aplanissement de l'onde T, prolongation du segment QT.

## SCHIZOPHRÉNIE (2)

### Éléments pronostiques

On ne dispose pas d'éléments fiables permettant de prédire un pronostic à l'échelle individuelle. On peut néanmoins dégager des éléments pronostiques généraux.

FACTEURS DE BON PRONOSTIC	FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Début tardif</li> <li>– Sexe féminin</li> <li>– Bon niveau socio-éducatif prémorbide</li> <li>– Forme paranoïde</li> <li>– Absence de lésion cérébrale associée</li> <li>– Instauration précoce d'un traitement</li> <li>– Bonne réactivité au traitement antipsychotique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Début précoce et insidieux</li> <li>– Sexe masculin</li> <li>– Troubles cognitifs prémorbides</li> <li>– Signes négatifs précoces</li> <li>– Atrophie cérébrale</li> <li>– Instauration tardive d'un traitement</li> <li>– Mauvaise réactivité au traitement antipsychotique</li> </ul>

### Traitement initial

Le traitement associe à la chimiothérapie les psychothérapies et les prises en charge institutionnelles. Le traitement des troubles schizophréniques s'appuie principalement sur les **antipsychotiques (AP)**.

Les mesures thérapeutiques proposées dans la SCZ ont pour objectif de limiter le handicap des patients et de promouvoir leur réinsertion et leur réhabilitation psychosociale.

Actifs pour réduire les épisodes psychotiques aigus, les **AP** diminuent également les risques de rechute et de récurrence lors d'administration au long cours.

### Choix des antipsychotiques

Les **AP** permettent de corriger les principaux symptômes observés lors des épisodes aigus : l'agitation, l'angoisse, les hallucinations et les productions délirantes, les troubles du cours de la pensée, le retrait autistique et l'émoussement affectif.

**À l'exception des formes d'intensité modérée, les moments féconds schizophréniques sont souvent pris en charge en milieu hospitalier.** L'hospitalisation libre ou sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT ou soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État : SPDRE) permettra ainsi d'effectuer le bilan médical à la recherche de fac-

teurs organiques (lésions cérébrales, prise de toxiques) à l'origine ou associés à l'épisode aigu. Elle permet également l'instauration d'un cadre thérapeutique rassurant.

Les **AP de seconde génération**, ou **antipsychotiques atypiques (APA)** seront utilisés en première intention avec pour objectif la réduction de la durée de l'épisode processuel. La prévention et la recherche de leurs effets indésirables (prise de poids, troubles endocriniens et sexuels, troubles métaboliques et cardiovasculaires) seront une préoccupation constante afin d'éviter la stigmatisation des patients et d'assurer une bonne observance du traitement, gage d'alliance thérapeutique pour l'avenir. Le traitement par **APA** sera prescrit aux doses minimales efficaces et sera régulièrement réévalué afin de détecter et de gérer précocement les patients non répondeurs. En seconde intention, les **AP** conventionnels seront utilisés en étant particulièrement vigilant à minimiser les effets extrapyramidaux par la prescription de la posologie minimale efficace et le recours aux médicaments antiparkinsoniens, sans oublier les effets indésirables précités [1].

Le choix du **AP** est conditionné par de nombreux paramètres qui prennent en considération la prédominance de certains symptômes cliniques, la notion de réponse ou d'échec à des traitements antérieurs, les habitudes du praticien, la tolérance du patient, la forme galénique. L'**olanzapine (ZYPREXA)** et la **rispéridone (RISPERDAL)** ont souvent une efficacité équivalente sur la symptomatologie positive, et sans doute supérieure sur la symptomatologie négative (cf. Encadré).

- La symptomatologie positive concerne la présence de signes normalement absents : idées délirantes, syndrome hallucinatoire, désorganisation de la pensée, etc.
- La symptomatologie négative concerne l'absence de signes normalement présents : apragmatisme, alogie, athymormie, etc. Cette dichotomie fait référence à l'approche anglo-saxonne de la sémiologie schizophrénique. Elle tend à supplanter la triade classique franco-germanique (délire, syndrome dissociatif, repli autistique).

**ANTIPSYCHOTIQUES D'ACTION PROLONGÉE (5) –  
PHARMACOLOGIE (4)****INCIDENTS ET ACCIDENTS****Insuffisance hépatique**

Réduire les posologies et privilégier les **butyro-phénones**. Les **phénothiazines aliphatiques** sont contre-indiquées.

**Insuffisance rénale**

Pas de contre-indication mais adaptation des posologies. Chez les hémodialysés et lors, par exemple, de phases psychotiques aiguës, on peut conseiller 10 mg d'**halopéridol (HALDOL)** en IV après la séance, à renouveler lors de la séance suivante.

**Effets endocriniens**

Prise de poids, trouble de la libido.

Dysménorrhée, aménorrhée, galactorrhée liée à l'hyperprolactinémie, surtout avec les **benzamidés (amisulpride : SOLIAN, sulpiride : DOGMATIL)**.

**Effets oculaires** : rétinites pigmentaires, dépôts cornéens.

**Effets dermatologiques** : rashes cutanés, pigmentation, réaction de photosensibilisation aux **phénothiazines (LARGACTIL)**.

**Effets digestifs** : hépatite cholestatique à la **chlorpromazine (LARGACTIL)**, hépatite cytotytique plus rare.

**Effets sanguins** : agranulocytose. Cet accident peut survenir avec tous les **antipsychotiques**, mais principalement avec la **clozapine** (0,5 à 1 % des prescriptions). Ce traitement impose une surveillance régulière et sa délivrance est conditionnée à la vérification hebdomadaire pendant 18 sem. puis mensuelle de la numération formule sanguine.

**Syndrome malin des antipsychotiques  
(neuroleptiques)**

Bien que son incidence soit réputée faible (0,5 %), il est de gravité exceptionnelle (mortalité de 20 à 30 % des cas sans traitement, de

10 % avec traitement). Il serait observé chez le sujet jeune, de sexe masculin, lors d'injections répétées d'**antipsychotiques** incisifs et lors de troubles organiques associés. Il doit être redouté et recherché systématiquement devant toute fièvre inexpliquée sous **antipsychotiques**. Les autres signes rencontrés sont : torpeur, confusion, pâleur, sueurs, rigidité extrapyramidale diffuse, instabilité tensionnelle, tachycardie. Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose, une élévation des enzymes hépatiques et des CPK.

Devant le moindre signe suspect, il est impératif d'arrêter les **antipsychotiques** et de mettre en place un traitement et une surveillance médicale.

Dans les formes graves, le malade est transféré en réanimation. On propose alors des traitements à base de **dantrolène**, de **PARLODEL**, voire des **corticoïdes**. Certains ont proposé un traitement par **nifédipine (ADALATE)**. Le syndrome malin est apparenté aux hyperthermies malignes sous anesthésie, aux catatonies létales. On discute actuellement de l'intérêt thérapeutique des sismothérapies. Le traitement symptomatique est fondamental.

Le risque de récurrence est inconnu, mais serait estimé à 50 %. Après 2 à 3 sem. d'arrêt des **antipsychotiques**, on proposera une molécule d'une classe différente ou un **antipsychotique** de famille différente à faible dose avec une surveillance étroite de la température.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association à la **lévodopa** est déconseillée en raison d'un antagonisme réciproque. Les **antipsychotiques** peuvent potentialiser les **antihypertenseurs** et les dépresseurs du SNC. L'association au **lithium** serait confusogène. La coprescription de **DÉPAMIDE** ou **DÉPAKOTE** entraîne l'équivalent d'une augmentation de 30 à 40 % des doses de **antipsychotiques**.

## ANTIDÉPRESSEURS (1) – TRICYCLIQUES (1)

### ■ Clomipramine

<b>ANAFRANIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères chez les patients hospitalisés : 75 à 200 mg/j en 1 prise le soir	60 cp. 10 mg 50 cp. 25 mg 20 cp. 75 mg 5 amp. 25 mg/2 mL	3,14 5,37 6,27 2,87	I I I I	65 % 65 % 65 % 65 %	0,05 0,11 0,31 0,57
Troubles obsessionnels compulsifs : 100 à 200 mg/j					
Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie : 75 à 150 mg/j					
Énurésie nocturne de l'enfant : 10 à 25 mg/j					

### ■ Imipramine

<b>TOFRANIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères hospitalisés : 3 à 6 cp. 25 mg/j en 2 prises	60 cp. 10 mg 100 cp. 25 mg	2,11 4,65	I I	65 % 65 %	0,04 0,05
Énurésie nocturne de l'enfant : 10 à 50 mg/j					
Algie rebelle : 75 à 150 mg/j					

### ■ Amitriptyline

<b>LAROXYL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères hospitalisés : 75 à 150 mg/j	60 cp. 25 mg 100 cp. 25 mg 20 cp. 50 mg	4,41 HOP 3,55	I I I	65 % 65 % 65 %	0,07  0,18
Algies rebelles : 75 à 150 mg/j	800 mL sol. buv. 40 mg/mL	4,63	I	65 %	0,01
Énurésie de l'enfant : 10 à 50 mg/j	12 amp. 50 mg/2 mL	5,48	I	65 %	0,46
<b>ÉLAVIL</b>					
Idem <b>LAROXYL</b>	60 cp. 25 mg	4,41	I	65 %	0,07



## TROUBLES DE L'HUMEUR (2)

### Définitions

La caractéristique essentielle du groupe des troubles affectifs est l'apparition, soit de manière isolée soit de manière récurrente, **d'un changement de l'humeur et des affects**. Ce changement de l'humeur s'accompagne habituellement d'une **modification du niveau global d'activité**. Les autres symptômes sont soit secondaires à ces changements soit compréhensibles dans le contexte de ces modifications. La survenue de ces troubles peut être en rapport avec des événements ou des situations stressantes.

Il existe différentes formes d'épisode dépressif majeur :

- selon l'intensité : léger, modéré et sévère. L'appréciation de l'intensité des symptômes relève de l'évaluation clinique et éventuellement d'échelles validées. Elle est définie en fonction de l'évaluation du nombre, de l'intensité et du retentissement des symptômes dépressifs. Un épisode léger est défini par la présence de 5 symptômes dépressifs et d'une altération limitée du fonctionnement (social, professionnel, etc.), ou d'un fonctionnement normal mais au prix d'efforts importants et inhabituels. Un épisode sévère est défini par la présence de 8 ou 9 symptômes dépressifs correspondant aux critères et d'une altération du fonctionnement nette et observable. Une intensité modérée est intermédiaire entre légère et sévère ;

- selon l'existence de caractéristiques mélancoliques, éventuellement délirantes, pour les épisodes d'intensité sévère.

Les modalités évolutives de l'épisode dépressif majeur sont les suivantes :

- une rémission complète correspond à une disparition des symptômes et à un retour à un fonctionnement normal ;

- une rémission partielle correspond à une amélioration telle que l'individu ne répond plus aux critères diagnostiques de l'épisode dépressif majeur, tout en conservant des symptômes dépressifs, nommés symptômes résiduels ;

- un épisode dépressif résistant est un épisode n'ayant pas répondu à deux traitements antidépresseurs successifs bien conduits, c'est-à-dire à posologie efficace pendant une durée de 4 à 6 sem. ;

- une rechute dépressive correspond, après amélioration, à la réapparition de symptômes dépressifs au cours du même épisode dépressif ;

- une récurrence - ou récurrence - dépressive correspond à la survenue d'un nouvel épisode dépressif, après rémission complète d'au moins 2 mois.

L'épisode dépressif majeur peut être isolé et sans lendemain ou s'intégrer soit dans le cadre d'un trouble dépressif unipolaire récurrent, soit dans celui, plus rare, d'un trouble bipolaire de l'humeur, à rechercher systématiquement.

### Types d'épisodes thymiques

1 - Épisode dépressif majeur : le tableau clinique associe une tristesse de l'humeur, une diminution globale du niveau d'activité et de l'énergie, une fatigue importante, même après un effort minime, une perte d'intérêt, une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une diminution de l'aptitude à se concentrer. On observe habituellement des troubles du sommeil, et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère. Les symptômes doivent être présents depuis au moins 2 sem.

2 - Épisode maniaque : élévation de l'humeur, euphorie, hyperactivité, réduction du besoin de sommeil, logorrhée, augmentation de l'estime de soi, etc.

Les épisodes dépressifs et maniaques peuvent être légers, moyens, sévères avec ou sans caractéristiques psychotiques.

3 - Hypomanie : c'est une forme atténuée de manie.

4 - États mixtes : leur définition est l'objet de controverses. C'est un trouble fréquent et on estime que près de 30 % des épisodes maniaques seraient en fait des états mixtes.

## ANTIDÉPRESSEURS (2) – TRICYCLIQUES (2)

### ■ Dosulépine

<b>PROTHIADEN</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 75 à 150 mg/j	50 gél. 25 mg	6,00	I	65 %	0,12
	20 cp. 75 mg	6,51	I	65 %	0,33

### ■ Amoxapine

<b>DÉFANYL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 75 à 150 mg/j	25 cp. séc. 50 mg	5,89	I	65 %	0,24
	30 cp. séc. 100 mg	12,69	I	65 %	0,42

### ■ Trimipramine

<b>SURMONTIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 75 à 150 mg/j	50 cp. séc. 25 mg	7,79	I	65 %	0,16
	20 cp. séc. 100 mg	12,76	I	65 %	0,64
	1200 gtttes 1 mg (sol. buv. 30 mL)	8,43	I	65 %	0,01

### ■ Doxépine

<b>QUITAXON</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 75 à 150 mg/j	40 cp. séc. 10 mg	2,16	I	65 %	0,05
	20 cp. séc. 50 mg	4,29	I	65 %	0,21
	10 amp. 25 mg/2 mL	2,57	I	65 %	0,26

## ANTIDÉPRESSEURS (3) – IMAO

### ■ Moclobémide

<b>MOCLAMINE</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères : 3 à 6 cp./j en 3 prises	30 cp. séc. 150 mg	8,81	I	65 %	0,29

### ■ Iproniazide

<b>MARSILID</b>					
Traitement de 2 <sup>e</sup> intention dans les épisodes dépressifs majeurs Posologie initiale : 1 à 3 cp./j Posologie d'entretien : 1/2 à 1 cp./j	30 cp. 50 mg	123,44	I	65 %	4,11

## TROUBLES DE L'HUMEUR (3) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (1)

### Troubles de l'humeur - épisodes dépressifs majeurs

**Le traitement d'un épisode dépressif répond à trois objectifs principaux :**

- induire une rémission complète : c'est le **traitement d'attaque** ;
- consolider cette rémission, afin de prévenir les rechutes (réactivation du même épisode) : **traitement de consolidation** ;
- guérir les patients et réduire les récurrences (apparition d'un nouvel épisode) : **traitement de maintenance**.

Il est recommandé de ne pas traiter par **antidépresseur** [1] :

- les symptômes dépressifs ne correspondant pas aux épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire caractérisés, à savoir : symptômes isolés ou en nombre insuffisant pour remplir les critères DSM ou durée des symptômes dépressifs inférieure à 15 j ;
- les épisodes dépressifs caractérisés mais d'intensité légère, sauf en cas d'échec des autres stratégies.

Les **antidépresseurs** n'ont pas d'indication dans le trouble dysthymique, le trouble cyclothymique et le trouble de l'adaptation avec humeur dépressive.

### Durée du traitement

Le traitement d'un épisode dépressif majeur isolé comporte deux phases :

- la phase aiguë (traitement d'attaque), dont l'objectif est la rémission complète des symptômes ;
  - la phase de consolidation, dont l'objectif est de prévenir la rechute de l'épisode.
- Seul un tiers des patients atteints de dépression réagit pleinement aux antidépresseurs, mais peu de données existent sur le meilleur traitement à appliquer ensuite en cas de symptômes résistants au traitement de 1<sup>re</sup> intention.

En cas de trouble dépressif récurrent, s'ajoute une phase de maintenance, dont l'objectif est la prévention des récurrences (ou récurrences). Ce traitement de maintenance est particulièrement indiqué dans le trouble dépressif majeur unipolaire chez

les sujets ayant présenté au moins 3 épisodes dépressifs majeurs au cours des 4 dernières années :

- si ceux-ci ont été rapprochés et/ou sévères (notamment : risque suicidaire, caractéristiques psychotiques, et incapacité fonctionnelle) ;
  - surtout lorsqu'il existe des symptômes résiduels, des pathologies associées, des antécédents familiaux de dépression.
- Il est rappelé que, dans le trouble bipolaire, la prévention de nouveaux épisodes est réalisée en première intention par un traitement thymorégulateur, et non par un **antidépresseur** seul. Le plus souvent, la prescription d'un **antidépresseur** ne répond pas à l'urgence [1].

### Cadre thérapeutique

La plupart des dépressions sont gérées en **ambulatoire**.

Les hospitalisations sont indiquées en cas : de risque suicidaire majeur (ce risque doit toujours être évalué chez un déprimé), de retentissement somatique important, de résistance au traitement, de comorbidité somatique et psychiatrique et au décours d'une tentative de suicide.

Les formes délirantes avec refus de soins peuvent conduire à procéder à une hospitalisation sous contrainte (soins psychiatriques sans consentement effectués à la demande d'un tiers : SPDT).

### Traitement d'attaque

Il fait appel en 1<sup>re</sup> intention à un traitement antidépresseur.

### Choix de l'antidépresseur

Tous les **antidépresseurs** actuellement commercialisés ont obtenu l'AMM pour l'indication « épisode dépressif majeur ».

Aucune étude n'a pu réellement démontrer qu'une molécule était globalement plus efficace qu'une autre.

Le choix de l'**antidépresseur** prescrit en première intention dépendra donc des habitudes du praticien, du respect des contre-indications, du souhait du patient, des conditions socio-environnementales (activité professionnelle ou non).

### ANTIDÉPRESSEURS (4) – IRSNA

#### ■ Milnacipran

<b>IXEL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 50 à 150 mg/j en 2 prises	56 gél. 25 mg	12,50	I	65 %	0,22
	56 gél. 50 mg	22,04	I	65 %	0,39

#### ■ Venlafaxine

<b>EFFEXOR LP</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (caractérisés) y compris sévères chez des patients hospitalisés, anxiété généralisée évoluant depuis au moins 6 mois : 75 à 225 mg/j en 1 seule prise	30 gél. LP 37,5 mg	9,71	I	65 %	0,32
	30 gél. LP 75 mg	18,88	I	65 %	0,63

#### ■ Duloxétine

<b>CYMBALTA</b>					
Épisodes dépressifs majeurs et traitement de douleurs neuropathiques : 60-120 mg/j en 1 prise	7 gél. 30 mg	5,39	I	65 %	0,77
	28 gél. 30 mg	19,74	I	65 %	0,71
	28 gél. 60 mg	29,82	I	65 %	1,07
	100 gél. 60 mg	HOP	I		

### ANTIDÉPRESSEURS (5) – NASSA

#### ■ Mirtazapine

<b>NORSET</b>					
Épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés) : 15 à 45 mg/j le soir	30 cp. 15 mg	13,07	I	65 %	0,44
	1 fl. 66 mL. 15 mg/mL	33,09	I	65 %	33,09

### ANTIDÉPRESSEURS (6) – ANTIDÉPRESSEUR APPARENTÉ AUX TRICYCLIQUES

#### ■ Maprotiline

<b>LUDIOMIL</b>					
Épisodes dépressifs majeurs y compris les épisodes sévères : 75 à 225 mg/j	50 cp. séc. 25 mg	5,65	I	65 %	0,11
	28 cp. séc. 75 mg	9,23	I	65 %	0,33

## TROUBLES DE L'HUMEUR (4) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (2)

### Posologie des antidépresseurs

Les posologies recommandées varient d'un produit à l'autre. Elles peuvent également différer au sein d'une même famille d'**antidépresseurs**. La **posologie optimale efficace** est la dose qui présente le meilleur rapport efficacité/tolérance.

Les **antidépresseurs tricycliques** seront augmentés progressivement par paliers de 24 à 48 h pour obtenir des doses de l'ordre de : 75 à 150 mg de **clomipramine (ANAFRANIL)** ou d'**amitriptyline (LAROXYL)**. En hospitalisation, les perfusions de **tricycliques** se feront sur 2 h avec des doses croissantes : 2 amp. à J1 puis 4 amp. à J2 puis 6 amp./à J3 de **clomipramine (ANAFRANIL)** en IV.

Les **ISRS** et les **ISRNA** : **paroxétine (DEROXAT)** 1 à 2 cp./j en 2 prises ; **sertraline (ZOLOFT)** : 1 à 3 gél. 50 mg/j ; **fluoxétine (PROZAC)** : 1 à 3 gél. 20 mg/j ; **citalopram (SEROGRAM)** 10 à 40 mg/j, **escitalopram (SEROPLEX)** 5 à 20 mg/j ; **milnacipran (IXEL)** 50 mg : 2 à 3 cp./j en 2 prises ; **venlafaxine (EFFEXOR)** 75 à 375 mg/j ; **duloxétine (CYMBALTA)** 30 à 60 mg/j.

La **mirtazapine (NORSET)** 15 mg, **antidépresseur noradrénergique et sérotoninergique spécifique (NASSA)**, est prescrite en une prise le soir ou au coucher : 1 à 3 cp. La **miansérine (MIANSERINE ARROW)** est prescrite en une prise le soir : 30 à 60 mg/j.

L'**agomélatine (VALDOXAN)** est un agoniste mélatoninergique qui resynchronise les rythmes circadiens. La posologie est de 25 mg x 1/j, au coucher et peut être augmentée à 50 mg/j. Un contrôle de la fonction hépatique doit être réalisé chez tous les patients à l'instauration du traitement, puis après environ 3 sem., 6 sem. (fin de la phase aiguë), 12 et 24 sem. (fin de la phase de maintien).

Certains symptômes dépressifs, tels que les symptômes anxieux et les troubles du sommeil, justifient parfois d'être contrôlés rapidement. On peut dans ce cas utiliser de façon temporaire et en attendant l'effet des **antidépresseurs**, des **anxiolytiques benzodiazépines** et/ou des **hypnotiques**. Ces traitements associés respecteront les règles habituelles préconisées pour les **anxiolytiques** et les **hypnotiques**.

**L'association systématique d'un anxiolytique afin de prévenir la levée de l'inhibition est souvent contestée.** De faibles doses de **benzodiazépines** pourraient entraîner chez certains patients un effet désinhibiteur favorisant le passage à l'acte suicidaire.

Dans les dépressions délirantes, il faut souvent associer à l'**antidépresseur** un **anti-psychotique**. En cas d'échec de cette association, les ECT peuvent être utilisés avec succès. Chez le sujet âgé de plus de 70 ans, la posologie initiale recommandée pour les **antidépresseurs**, en particulier **imipraminiques**, est en général la moitié de la posologie préconisée chez l'adulte, les doses étant progressivement augmentées par la suite.

La molécule choisie doit être prescrite à dose efficace tout en respectant la posologie recommandée par l'AMM.

Une des premières causes de non-réponse au traitement est l'utilisation de posologies insuffisantes. Dans les troubles dépressifs, les posologies recommandées sont similaires dans la phase de traitement d'attaque, de traitement de consolidation et, le cas échéant, de prévention des récidives. Une adaptation posologique peut être nécessaire en fonction de la réponse au traitement et de la tolérance. Avant d'augmenter la posologie, il convient de s'assurer de l'observance.

Certains **antidépresseurs**, notamment les **imipraminiques**, peuvent faire l'objet de dosages plasmatiques, qui permettent d'adapter la posologie pour un sujet donné. Ils ne doivent être réalisés qu'en cas de réponse insuffisante, d'effets indésirables marqués, ou de nécessité de vérifier l'observance.

## ANTIDÉPRESSEURS (7) – AUTRES ANTIDÉPRESSEURS

### ■ Miansérine

<b>MIANSERINE ARROW</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 30 à 90 mg/j	30 cp. 10 mg	3,65	I	65 %	0,12
	30 cp. 30 mg	6,97	I	65 %	0,23
	14 cp. 60 mg	6,31	I	65 %	0,45

### ■ Tianeptine

<b>STABLON</b>					
Épisodes dépressifs majeurs : 1 cp. x 3/j	28 cp. 12,5 mg	9,48	I	65 %	0,34
	100 cp. 12,5 mg	HOP	I		

### ■ Agomélatine

<b>VALDOXAN</b>					
Épisodes dépressifs majeurs chez l'adulte : 1 cp. /j au coucher puis 2 cp./j en une seule prise en cas d'inefficacité de la posologie initiale Surveillance hépatique à l'instauration puis aux sem. 6, 12 et 24 ; arrêt si transaminases > 3N	28 cp. 25 mg	41,0	I	65 %	1,46
	100 cp. 25 mg	HOP	I		

## TROUBLES DE L'HUMEUR (5) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (3)

### Suivi médical

#### Évaluation de l'efficacité

Les **antidépresseurs** n'exercent pas leur effet thérapeutique immédiatement et imposent le respect d'un délai d'action, habituellement de l'ordre de **2 à 3 sem.** On affirmera donc l'inefficacité d'un **antidépresseur** après 3 à 4 sem. d'un traitement bien conduit.

60 à 70 % des patients répondent à un premier **antidépresseur**. Ce chiffre s'élèverait à 80 % après essai d'un second **antidépresseur**. 20 % des dépressions résistent donc à au moins deux **antidépresseurs**. Ces **dépensions résistantes** soulèvent des questions thérapeutiques complexes, souvent réservées aux spécialistes. Différentes procédures thérapeutiques sont actuellement proposées dans ces situations : élimination des fausses résistances, changement de molécule, posologie très élevée, association d'**antidépresseurs**, adjonction de **sels de lithium**, d'extraits thyroïdiens, des **antipsychotiques atypiques**, association d'une psychothérapie structurée, photothérapie (luminothérapie), électroconvulsivothérapie.

Le seul **antipsychotique atypique** qui possède une AMM pour potentialisation du traitement antidépresseur en cas de réponse partielle est le **XEROQUEL** (quétiapine).

#### Surveillance des effets indésirables

Le type d'effets indésirables est bien évidemment dépendant de la nature de la molécule prescrite.

Pour certains effets secondaires on peut associer des correcteurs, par exemple des dérivés de l'ergot de seigle pour traiter l'hypotension orthostatique liée aux **tricycliques**.

Les nouvelles molécules généralement mieux tolérées que les **tricycliques**, présentent néanmoins des effets indésirables spécifiques qu'il faut savoir dépister et traiter (rare mais gravissime syndrome sérotoninergique par exemple).

L'effet indésirable majeur reste la **prise de poids** qui survient souvent tardivement et génère des problèmes d'observance.

Les effets indésirables sont, pour leur majorité, de survenue précoce en début de traitement ou après augmentation de la posologie, dose-dépendants, transitoires [1].

#### ► Effets somatiques

Ils sont liés aux effets pharmacologiques des différentes classes :

- effets anticholinergiques des **imipraminiques** : troubles de la vision, bouche sèche, constipation, tachycardie, rétention urinaire (effets périphériques), confusion (effets centraux) ;

- effets antihistaminiques des **imipraminiques** : somnolence ;

- effets sérotoninergiques des **ISRS** et **IRSNA** : nausées, vomissements, diarrhée, hypersudation, céphalées, agitation, insomnie, somnolence, vertiges, tremblements et asthénie.

Des effets cardiovasculaires peuvent également survenir : du fait de leurs effets « quinidine-like », anticholinergiques et antagonistes adrénergiques alpha-1, les **antidépresseurs imipraminiques** peuvent induire une hypotension orthostatique, des troubles du rythme ou des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Les **IMAO** non sélectifs engendrent une hypotension permanente et posturale. La **venlafaxine** et la **duloxétine**, pour des posologies élevées, peuvent augmenter la pression artérielle.

Autres effets : prise de poids, symptômes sexuels, syndrome sérotoninergique, hyponatrémie (sous **ISRS**), risque de saignements (sous **ISRS** et **venlafaxine**).

Il est recommandé d'instaurer une surveillance clinique, notamment en début de traitement. Les effets indésirables attendus doivent être recherchés et évalués de façon systématique à chaque consultation.

**ANTIDÉPRESSEURS (8) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

La plupart des **antidépresseurs** ont une action prédominante sur la neuromédiation noradrénergique et sérotoninergique.

Selon les molécules on décrit des profils d'action plus ou moins sélectifs sur ces divers neurotransmetteurs. Globalement on peut admettre que l'ensemble des produits tend à augmenter la concentration intrasynaptique des neuromédiateurs. Cet effet peut être obtenu soit par une inhibition de la recapture, soit par une inhibition de l'enzyme de dégradation (MAO), soit par une augmentation de la libération des neuromédiateurs. L'**agomélatine** a un mécanisme d'action inédit d'agoniste mélatoninergique et d'antagoniste des récepteurs 5HT<sub>2C</sub>.

L'augmentation de la concentration intrasynaptique ne doit pas être isolée d'un contexte plus large d'actions impliquant des effets sur d'autres médiateurs (propriétés anticholinergiques, adrénolytiques, etc.) et sur les récepteurs : désensibilisation des récepteurs  $\beta$ -adrénergiques, des récepteurs présynaptiques 5HT<sub>1A</sub>, action sur les seconds messagers.

**• CLASSIFICATION**

Les **antidépresseurs** peuvent être classés selon leurs mécanismes d'action, leurs effets sélectifs sur la neurotransmission monoaminergique, les effets secondaires ou la famille chimique. On distingue selon la sélectivité de l'activité sur les monoamines :

- les **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)** : fluoxétine, paroxétine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram ;

- les **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)** : milnacipran (**IXEL**), venlafaxine (**EFFEXOR**), duloxétine (**CYMBALTA**) ;

- les **antidépresseurs noradrénergiques et sérotoninergiques spécifiques (NASSA)**. Ils facilitent la transmission noradrénergique et sérotoninergique en bloquant les récepteurs  $\alpha_2$ -présynaptiques et les récepteurs 5HT<sub>2</sub> et 5HT<sub>3</sub> post-synaptiques : mirtazapine (**NORSET**) ;

- les molécules agissant sur les trois monoamines : les **tricycliques**, les **inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)** ;

- les autres molécules avec des mécanismes d'action différents : miansérine, agomélatine.



## TROUBLES DE L'HUMEUR (6) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (4)

### ► Effets psychiques

Il est parfois difficile de distinguer les effets indésirables du traitement des symptômes de la dépression (idées suicidaires, anxiété, insomnie ou constipation par exemple). Tous les **antidépresseurs**, mais surtout les **tricycliques** et les **IRSNA** peuvent induire des virages maniaques de l'humeur, particulièrement chez les patients bipolaires. **Chez les patients bipolaires**, les **antidépresseurs** sont susceptibles d'induire la survenue de cycles rapides (au moins 4 épisodes thymiques par an), leur **utilisation en monothérapie étant alors à éviter**. La survenue de symptômes, tels que l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété, l'hyperactivité et *a fortiori* les idées suicidaires nécessite une surveillance particulière et des consultations plus fréquentes.

### Renforcement de la relation thérapeutique

Chez certains patients il faut associer à la prescription médicamenteuse un soutien psychothérapeutique, des conseils professionnels voire des mesures d'aide sociale. Toutes ces interventions facilitent l'acceptation de la maladie et de ses conséquences, améliorent l'observance et concourent à renforcer l'efficacité des traitements.

### Psychothérapie, sismothérapie et traitement d'attaque

La place et l'indication des **psychothérapies** en première intention dans le traitement d'attaque des dépressions restent imprécises. Les psychothérapies peuvent être proposées seules ou en association avec les **antidépresseurs** dans les formes de dépression modérée, avec un risque mineur de suicide, en cas de réponse antérieure à la psychothérapie et selon le souhait du patient. Les formes délirantes avec un retentissement somatique et cognitif important sont des contre-indications initiales à la psychothérapie. Les **psychothérapies cognitivo-comportementales** et **interpersonnelles** sont celles dont l'efficacité est la plus documentée dans le traitement des dépressions.

Les **sismothérapies** sont indiquées dans les formes graves de dépressions souvent résistantes avec un risque suicidaire majeur, un retentissement somatique menaçant le pronostic vital (catatonie dépressive, etc.).

Les autres techniques de stimulation cérébrale : **stimulation du nerf vague** (VNS : *Vague Nerve Stimulation*), **stimulation magnétique transcrânienne** (rTMS : *repetitive Transcranial Magnetic Stimulation*) et **stimulation cérébrale profonde** (DBS : *Deep Brain Stimulation*) sont surtout utilisées dans des protocoles de recherche et encore peu dans la routine.

## ANTIDÉPRESSEURS (9) – PHARMACOLOGIE (2)

### INDICATIONS

Tous les **antidépresseurs** sont indiqués dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs c'est-à-dire caractérisés. Certains produits sont officiellement indiqués dans les formes sévères nécessitant une hospitalisation : **clomipramine**, **imipramine**, **maprotiline**, **amitriptyline**, **iproniazide**, **moclobémide**, **venlafaxine**.

Les **antidépresseurs** sont parfois également indiqués dans le traitement des troubles anxieux. C'est principalement le cas des **antidépresseurs** sérotoninergiques : **clomipramine** (**ANAFRANIL**), et la famille des **ISRS** : **fluoxétine**, **paroxétine**, **sertraline**, **fluvoxamine**, **citalopram**, **escitalopram**.

Les **molécules tricycliques** sont aussi indiquées dans le traitement des énurésies nocturnes, et des algies rebelles (**amitriptyline** : **LAROXYL** dans les neuropathies diabétiques).

### CONTRE-INDICATIONS

Les **tricycliques** sont contre-indiqués en cas de :

- glaucome à angle étroit ;
- adénome prostatique ;
- coronaropathie non stabilisée, infarctus du myocarde récent, troubles de conduction (BAV 3<sup>e</sup> degré) et du rythme cardiaque ;
- association avec les **IMAO** (un intervalle de 2 sem. est recommandé après interruption de l'**IMAO**) ;
- l'épilepsie est une contre-indication relative.

La **maprotiline** serait le plus épileptogène des **antidépresseurs**.

Le principal risque avec les **IMAO** est celui d'accès hypertensifs brutaux lors d'interactions médicamenteuses ou alimentaires.

Les **IMAO** sont contre-indiqués en association avec les autres **IMAO**, les **ISRS**, le **sumatriptan**. L'**agomélatine** est contre-indiquée en cas de maladie du foie sous-jacente.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les interactions médicamenteuses concernent surtout les **IMAO**, les **ISRS** et l'association d'**antidépresseurs** susceptibles de générer un syndrome sérotoninergique (cf. **ISRS**).

Pour le passage des **IMAO** à un autre **antidépresseur** ou l'inverse, on recommande les schémas suivants :

- relais possible 48 h après l'arrêt des **IMAO** ;
- attendre 4 à 5 j d'interruption des **tricycliques** pour prescrire les **IMAO** ;

- arrêt de la **fluoxétine** (**PROZAC**) pendant 4 à 5 sem. puis relais possible par les **IMAO** ;
- l'association **IMAO** + **ISRS** est déconseillée ;
- l'association **IMAO** + **NASSA** est déconseillée.

Les **tricycliques** voient leurs effets latéraux se majorer en cas d'association avec les molécules anticholinergiques, les **antihypertenseurs** périphériques ou centraux.

L'agomélatine est métabolisée à 90% par le CYP1A2 et son association avec des **fluoroquinolones** et **β-bloquants** pose problème. Son association avec des inhibiteurs puissants du CYP1A2 (**fluvoxamine**, **ciprofloxacine**) est contre-indiquée. L'association avec des œstrogènes (inhibiteurs modérés du CYP1A2) et les inducteurs modérés du CYP1A2 comme le **propranolol**, la **grépaflaxine** ou l'**énoxacine** doit être faite avec précaution.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : la grossesse constitue une contre-indication relative aux **antidépresseurs**. Aucun effet tératogène n'a vraiment été démontré pour les **antidépresseurs**. Il est cependant prudent de conseiller d'éviter les nouveaux **antidépresseurs**, et d'employer les **antidépresseurs** plus anciens type **clomipramine** (**ANAFRANIL**). On évitera la prescription d'**antidépresseurs** le premier trimestre de grossesse et on surveillera particulièrement le nouveau-né lors de l'administration d'anticholinergiques (risque de sevrage).

**Allaitement** : il est déconseillé.

Insuffisance rénale : pas de modification de la posologie de la plupart des **antidépresseurs**, réduire la posologie des **NASSA**.

Insuffisance hépatique : réduction des posologies pour les **IMAO**.

### Prescription des antidépresseurs

1) Il n'y a pas lieu d'associer systématiquement en début de traitement un **anxiolytique**, un **hypnotique**, un **thymorégulateur**, un **antipsychotique**.

2) Il n'y a pas lieu de prescrire en première intention plus d'un **antidépresseur**.

3) Il n'y a pas lieu de poursuivre un traitement antidépresseur plus de 6 mois après l'obtention de la rémission complète de l'épisode dépressif, sauf en cas d'antécédents d'épisodes dépressifs majeurs récurrents et rapprochés.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (7) – ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS (5)

### Traitement de consolidation

75 % des malades rechutent dans l'année qui suit un arrêt prématuré du traitement. Lors de cette phase de consolidation, il s'agira donc essentiellement de convaincre le patient, devenu asymptomatique, de l'utilité de poursuivre le traitement pendant plusieurs mois.

La posologie du traitement de consolidation est celle qui a permis d'entraîner la rémission. Il en est de même pour la posologie d'un éventuel traitement de maintenance.

La prévention des récurrences dépressives peut faire appel soit à un traitement antidépresseur au long cours soit à un **thymorégulateur**, soit aux deux. En ce qui concerne le recours aux **thymorégulateurs**, il est usuel de l'envisager après 3 épisodes dépressifs.

Le travail **psychothérapique** permettra de limiter les séquelles psychologiques de l'épisode : anxiété, attitudes phobiques, baisse de l'estime de soi, etc.

### Arrêt du traitement

#### Modalités d'arrêt

Au terme d'un traitement bien conduit, il est recommandé d'une part de diminuer les posologies progressivement de façon à prévenir la survenue d'un syndrome de sevrage et d'autre part d'augmenter la fréquence des consultations du fait du risque de réapparition des symptômes qui ont nécessité la mise en place du traitement. Le syndrome de sevrage, également appelé syndrome d'arrêt, ne signifie pas que le patient est dépendant aux **antidépresseurs**. La période de diminution des posologies sera d'autant plus prolongée que la durée de traitement aura été

longue. Elle sera généralement comprise entre 1 et 6 mois, par exemple :

- traitement < 1 an : arrêt en quelques semaines, en diminuant par exemple toutes les semaines la posologie journalière ;

- traitement > 1 an : arrêt en quelques mois, en diminuant par exemple tous les mois la posologie journalière.

#### Syndrome de sevrage (ou syndrome d'arrêt)

Le syndrome de sevrage apparaît dans les jours suivant l'arrêt, rarement au-delà d'une semaine, et dure moins d'une semaine en moyenne.

Les symptômes les plus habituels sont :

- anxiété, irritabilité, tension nerveuse ;
- cauchemars et autres troubles du sommeil ;

- sensations vertigineuses, troubles de l'équilibre et autres troubles neurosensoriels

- syndrome pseudo-grippal (rhinorrhée, myalgies, malaise, nausées, vomissements, diarrhée, frissons).

Ces symptômes ne doivent pas être confondus avec les symptômes dépressifs ou anxieux.

Les facteurs de risque de syndrome de sevrage sont : une posologie élevée, une durée de traitement prolongée, un arrêt brutal du traitement, et les caractéristiques pharmacocinétiques du médicament.

La conduite à tenir consiste à :

- rassurer le patient sur le caractère transitoire de ses symptômes ;

- réinstaurer temporairement, si nécessaire, la posologie antérieure d'**antidépresseur** ;

- puis assurer un sevrage du traitement encore plus progressif. Il est recommandé de revoir le patient à distance de la rémission complète.

## ANTIDÉPRESSEURS (10) – PHARMACOLOGIE (3)

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les **tricycliques** ont la réputation de générer de nombreux effets latéraux, principalement du fait de leur pouvoir anticholinergique. Les nouveaux **antidépresseurs**, type **IRSNA** ou **ISRS**, ne produisent pas ce type d'effets mais ils peuvent être à l'origine d'effets secondaires plus spécifiques, à ne pas négliger. En général les **antidépresseurs** sont bien tolérés, si leur indication est bien posée.

### Effets anticholinergiques

Ils sont plus prononcés avec les **tricycliques** : sécheresse de la bouche, constipation, dysurie, rétention aiguë d'urine, trouble de l'accommodation. En cas d'intoxication aiguë ou chez des sujets prédisposés (sujet âgé) on peut avoir des signes d'encéphalopathie atropinique : sédation, confuso-onirisme, agitation, crises convulsives.

### Effets cardiovasculaires

Ils sont également plus marqués avec les **tricycliques** et sont liés aux effets anticholinergiques, adrénolytiques et aux propriétés «quinidine-like» de certaines molécules. L'**amitriptyline** a la réputation d'être le produit le plus cardiotoxique en cas d'intoxication aiguë. Aux doses thérapeutiques les effets se résument à une tachycardie, une hypotension orthostatique. Aux doses toxiques on peut voir apparaître des troubles du rythme et de conduction.

La **venlafaxine (EFFEXOR)** à forte dose entraîne une HTA.

### Effets neuropsychiques

Suivant le profil de la molécule :

- sédation, somnolence diurne (conducteurs de véhicules et d'engins : **amitriptyline** : **LAROXYL**, **mirtazapine** : **NORSET**, **maprotiline** : **LUDIOMIL**, **miansérine** par exemple). Cet effet disparaît après quelques jours de traitement ;
- confusion mentale avec les **tricycliques**, particulièrement chez le sujet âgé ;
- tremblement fin des extrémités surtout avec les **tricycliques**, céphalées ;

– convulsion : tous les **antidépresseurs** abaissent le seuil épileptogène. La prescription sera prudente chez l'épileptique avec une surveillance clinique et EEG régulière ;

– l'**amoxapine (DÉFANYL)** est un métabolite de la **loxapine (LOXAPAC)**. À ce titre il possède des propriétés antipsychotiques. Il peut induire des effets extrapyramidaux ;

– excitation, insomnie : elles peuvent traduire soit un surdosage, soit un début de syndrome sérotoninergique, soit un virage maniaque de l'humeur. Les psychostimulants peuvent induire une excitation. Dans ce cas on les prescrira plutôt le matin (**imipramine** : **TOFRANIL**, **IMAO**).

### Effets digestifs et hépatiques

Ils sont non spécifiques : nausées (**IRSNA**), vomissements, constipation, douleur abdominale.

Certains produits peuvent induire des hépatites cytolytiques ou mixtes, **miansérine**, **tianeptine**, **IMAO**, **agomélatine**.

Une surveillance régulière du bilan hépatique (ALAT, ASAT principalement) peut être recommandée.

### Effets sexuels

Ils s'observent surtout avec les **tricycliques** et les **ISRS** :

- impuissance érectile, éjaculation retardée, voire anorgasmie chez l'homme ;
- anorgasmie, absence de désir sexuel chez la femme.

### Effets divers

Prise de poids : problème majeur avec les produits prescrits pour une période prolongée et chez des sujets jeunes. On la rencontre surtout avec les **tricycliques**, et la **miansérine**.

Amaigrissement : effet anorexigène de la **fluoxétine (PROZAC)**.

Sueurs, bouffées de chaleur avec les **tricycliques**.

Les troubles cutanés sont rares en dehors de rashs cutanés allergiques.

Agranulocytose (rare) : **miansérine**, **mirtazapine (NORSET)**.

## THYMORÉGULATEURS (1) – SEL DE LITHIUM

## ■ Lithium

<b>TÉRALITHE</b>					
Prévention des récides des psychoses maniaque-dépressives et des troubles schizo-affectifs : 2 à 5 cp./j en 2 prises pour une lithémie comprise entre 0,5 et 0,8 mEq/L ou 2 à 4 cp./j de <i>TÉRALITHE 400 LP</i> en 1 prise le soir pour une lithémie entre 0,8 et 1,2 mEq/L Traitement curatif des épisodes maniaques et hypomaniaques : 2 à 5 cp./j en 2 prises pour une lithémie comprise entre 0,6 à 0,9 mEq/L	100 cp. séc. 250 mg 60 cp. séc. LP 400 mg	9,35	II	65 %	0,09
		8,36	II	65 %	0,14

## TROUBLES DE L'HUMEUR (9) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (1)

### Troubles de l'humeur - états maniaques et hypomaniaques

Les deux catégories les plus fréquentes parmi les troubles bipolaires sont les troubles bipolaires de type I et de type II.

#### Types de troubles bipolaires

- Le type I est défini par la récurrence d'épisodes dépressifs, maniaques, hypomaniaques et mixtes.
- Le type II est défini par la récurrence d'épisodes dépressifs, hypomaniaques et mixtes en l'absence d'épisodes maniaques.

#### Objectifs de la prise en charge initiale

Réduire la sévérité des symptômes des troubles psychocomportementaux, et protéger le patient, ses proches et ses biens.

#### Objectifs à long terme

Stabiliser l'humeur, prévenir les rechutes, dépister et traiter les comorbidités psychiatriques et médicales, aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter son traitement, préserver les capacités d'adaptation pour contribuer à

l'autonomie et à la qualité de vie du patient, évaluer et tenter de préserver au maximum le niveau de fonctionnement social et professionnel, et la vie affective et relationnelle.

#### Cadre thérapeutique

Classiquement les épisodes maniaques justifiaient de l'utilisation en 1<sup>re</sup> intention des **antipsychotiques**.

Actuellement on propose de plus en plus de recourir d'emblée à un traitement **thymorégulateur**.

En règle générale les états maniaques sont pris en charge en **hospitalisation**. Les formes d'intensité modérée ou qui surviennent chez des patients maniaco-dépressifs connus peuvent être traitées en ambulatoire.

Dans les formes avec des troubles majeurs du comportement, une méconnaissance des troubles et un refus de soins, le patient sera hospitalisé en SPDT ou en SPDRE.

Pour tous les patients, en raison du risque de dépenses excessives, il faut envisager une **mesure de protection des biens** (sauvegarde de justice).

## THYMORÉGULATEURS (2) – ANTICONVULSIVANTS

### ■ Carbamazépine

<b>TÉGRÉTOL</b>					
Prévention des récides dans les troubles maniaque-dépressifs : 400 à 800 mg/j en 2 à 3 prises Traitement curatif des épisodes maniaques ou hypomaniaques : 400 à 1 200 mg/j en 2 à 3 prises Troubles caractériels intercritiques dans l'épilepsie : 400 à 600 mg/j	50 cp. séc. 200 mg	5,03	II	65 %	0,10
	30 càc 100 mg (fl. de 150 mL)	4,50	II	65 %	0,15
	30 cp. séc. 200 mg	3,49	II	65 %	0,12
<b>TÉGRÉTOL LP</b> Troubles maniaque-dépressifs Traitement préventif : 400 à 800 mg/j en 2 prises Traitement curatif : 600 à 1 200 mg/j en 2 prises	30 cp. séc. 400 mg	5,87	II	65 %	0,20

### ■ Valpromide

<b>DÉPAMIDE</b>					
Prévention des rechutes des troubles maniaque-dépressifs : 2 à 4 cp./j Traitement curatif des épisodes maniaques, mixtes : 4 à 10 cp./j État d'agressivité d'origines diverses : 2 à 4 cp./j	30 cp. 300 mg 50 cp. 300 mg	6,42 HOP	II II	65 %	0,21

### ■ Divalproate de sodium

<b>DÉPAKOTE</b>					
Traitement des épisodes maniaques en cas de contre-indication ou d'intolérance au <b>lithium</b> Posologie initiale : 750 mg/j en 2 à 3 prises, à augmenter rapidement jusqu'à la dose minimale efficace : 1 000 à 2 000 mg (dose max. 2 500 mg)	30 cp. 250 mg	6,87	II	65 %	0,23
	90 cp. 250 mg	HOP	II		
	90 cp. 500 mg	37,61	II	65 %	0,42

### ■ Lamotrigine

<b>LAMICTAL</b>					
Prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs A. : 200 à 400 mg en 2 prises/j à atteindre progressivement par paliers de 25 à 50 mg tous les 15 j NB : Diminuer la dose quotidienne de moitié si association avec le <b>valproate</b>	30 cp. 2 mg	6,00	I	65 %	0,20
	30 cp. 5 mg	5,41	I	65 %	0,18
	30 cp. 25 mg	9,48	I	65 %	0,32
	30 cp. 50 mg	15,30	I	65 %	0,51
	30 cp. 100 mg	26,91	I	65 %	0,90
	30 cp. 200 mg	47,88	I	65 %	1,60

## TROUBLES DE L'HUMEUR (10) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (2)

### Traitements médicamenteux

Le traitement des troubles bipolaires lors des épisodes aigus maniaques ou mixtes, hypomaniaques, repose en 1<sup>re</sup> intention sur les **thymorégulateurs** : **lithium**, **anti-convulsivants**, **antipsychotiques atypiques**. La prescription repose sur le principe visant à privilégier une monothérapie le plus souvent possible.

#### Thymorégulateurs

Ils sont proposés **d'emblée en monothérapie** ou associés à un traitement sédatif (**benzodiazépines** ou **antipsychotiques**).

##### ► Sels de lithium

Les **sels de lithium** (**TÉRALITHE** cp. 250, 450 mg LP) sont utilisés en 1<sup>re</sup> intention (AMM : prévention des rechutes des troubles bipolaires et des états schizo-affectifs intermittents, traitement curatif des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque).

Après un bilan somatique initial (NFS, TSH, ionogramme sanguin, créatinine, protéinurie des 24 h, ECG, EEG), on prescrit par exemple du **TÉRALITHE** 250 mg en 2 à 3 prises pour obtenir des lithémies de l'ordre de 0,8 à 1 mEq/L.

La prescription initiale de lithium est sous la responsabilité du médecin spécialisé en psychiatrie. Évaluations à réaliser avant la mise sous traitement :

- poids, taille, périmètre abdominal, pression artérielle ;
- fonction rénale : clairance de la créatinine, créatinémie, urée, protéinurie, ionogramme sanguin, NFS ;
- bilan lipidique ;
- glycémie à jeun : à vérifier en cas de prise de poids ;
- bilan thyroïdien, en cas de suspicion d'hypothyroïdie : dosage de l'iodémie protéique (PBI) et/ou index de thyroxine libre, TSH plasmatique, puis T3, T4 ;
- ECG pour les patients ayant un antécédent cardiovasculaire ou un facteur de risque cardiovasculaire. Un avis spécialisé est à demander chez les sujets ayant des troubles du rythme paroxystique ou permanents chroniques ;

- pour les femmes en âge de procréer, vérification de l'absence d'une grossesse et prescription d'une contraception efficace avant la mise sous traitement ;
- établissement d'un protocole de soins avec le médecin traitant du patient pour prescrire le lithium, dosages de lithium plasmatique. Évaluations au cours du traitement. Surveiller la prise de poids ;
- maintien du taux sérique du lithium. L'intervalle pour le taux sérique du lithium sous la forme **TÉRALITHE LP** est entre 0,8 et 1,2 mEq/L. La lithémie sera vérifiée 1 sem. après la prescription puis tous les 3 mois et après chaque changement de posologie.

Les **sels de lithium** sont d'autant plus efficaces que la manie est d'intensité modérée, non délirante, pure ; lorsque le sujet a fait peu d'épisodes antérieurs et lorsqu'on observe une séquence MDI (manie - dépression - intervalle libre).

##### ► Anticonvulsivants

Les thymorégulateurs **anticonvulsivants** (**TÉGRÉTOL**, **DÉPAKOTE**, **DÉPAMIDE**, **LAMICTAL**) seront proposés en cas de résistance au lithium voire en 1<sup>re</sup> intention. Les **anticonvulsivants** seraient plus efficaces que le lithium en cas d'état mixte, chez les patients avec des cycles rapides ou des lésions neurologiques, pour les séquences DMI (dépression - manie - intervalle libre).

**Dialproate de sodium** (**DÉPAKOTE** cp. 250, 500 mg) (AMM : traitement des épisodes maniaques du trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium). La **poursuite du traitement** après l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu au **divalproate de sodium** lors de l'épisode aigu.

**Valpromide** (**DÉPAMIDE** cp. 300 mg) (AMM : traitement des épisodes maniaques du trouble bipolaire en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium). La **poursuite du traitement** après l'épisode maniaque peut être envisagée chez les patients ayant répondu au **valpromide** lors de l'épisode aigu.



**THYMORÉGULATEURS (3) – PHARMACOLOGIE (1)****PROPRIÉTÉS**

On ne connaît pas parfaitement les mécanismes d'action des **thymorégulateurs**. On évoque :

- un effet stabilisant de membrane du lithium ;
- une modification de l'activité des protéines G dépendantes pour les **sels de lithium** ;
- une action sur les neuromédiateurs centraux, en particulier sérotoninergiques pour le **lithium** et GABAergiques pour les **anticonvulsivants**.

**INDICATIONS**

Quatre produits sont officiellement reconnus pour le traitement préventif des troubles bipolaires : les **sels de lithium**, la **carbamazépine**, le **valpromide** et l'**olanzapine (ZYPREXA)**. L'**acide valproïque (DÉPAKINE)** et le **divalproate de sodium (DÉPAKOTE)** sont utilisés hors AMM dans cette indication.

Les indications classiques sont :

- traitement préventif des accès maniaques et dépressifs ;
- traitement curatif des états maniaques et hypomaniaques. Dans les troubles bipolaires atténués (type II), on emploie préférentiellement les **anticonvulsivants**.

La **lamotrigine** est reconnue dans la prévention des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs.

Dans les formes résistantes de dépression, les **sels de lithium** peuvent potentialiser les **anti-dépresseurs** sérotoninergiques (effet starter).

Les **sels de lithium** sont efficaces à un degré moindre dans la prévention des troubles dépressifs récurrents.

Les **thymorégulateurs** sont utilisés en association avec les **antipsychotiques** dans les troubles schizo-affectifs.

Les **thymorégulateurs** ont aussi des indications « annexes » :

- alcoolisme périodique pour le **lithium** ;
- agressivité pour la **carbamazépine (TÉGRÉ-TOL)** et le **valpromide (DÉPAMIDE)**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne seront envisagés que les effets secondaires des **sels de lithium**. Les effets secondaires des **anticonvulsivants** sont développés au chapitre Épilepsie.

**Grossesse**

Le 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse est une contre-indication aux **sels de lithium** qui favorisent la survenue de malformations cardiaques. En préventif, les **sels de lithium** doivent toujours être prescrits chez les femmes avec une contraception.

On peut réintroduire le **lithium** aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres de grossesse avec une surveillance régulière des lithémies. On conseille d'arrêter le **lithium** une semaine avant l'accouchement.

**Allaitement**

L'allaitement est contre-indiqué avec les **sels de lithium**. Ceux-ci doivent être réintroduits précocement chez la mère après l'accouchement. La période du post-partum constitue en effet une période à haut risque de rechute maniaque ou dépressive.

**Insuffisance rénale**

Le **lithium** est contre-indiqué dans les formes graves. Ailleurs, il est utilisé avec une surveillance très rapprochée des taux plasmatiques.

Le **lithium** est contre-indiqué de façon absolue en cas de bloc sino-auriculaire, en association avec les salidiurétiques, en cas de régime désodé (risque accru d'intoxication lithémique) et dans l'insuffisance cardiaque sévère.

Les dysthyroïdies ne représentent qu'une contre-indication relative. Il est en effet préférable d'adapter le traitement hormonal substitutif et de poursuivre la lithiothérapie.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (11) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (3)

**Lamotrigine (LAMICTAL** cp. 25, 50, 100, 200 mg). AMM : **prévention** des épisodes dépressifs chez les patients présentant un trouble bipolaire de type I et qui ont une prédominance d'épisodes dépressifs.

**Carbamazépine (TÉGRÉTOL** cp. 200 mg et 400 mg LP). AMM : **prévention** des rechutes dans le cadre des troubles bipolaires, notamment chez les patients présentant une résistance relative, des contre-indications ou une intolérance au **lithium**, traitement des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque.

Ex. 1 : **DÉPAKOTE** : 750 mg à J1, posologie rapidement augmentée pour obtenir des taux plasmatiques d'**acide valproïque** de l'ordre de 50 à 100 mg/mL.

EX. 2 : **LAMICTAL** en monothérapie l'adaptation posologique est progressive : 25 mg/j les 2 premières sem., 50 mg/j les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> sem., 100 mg/j la 5<sup>e</sup> sem. Posologie cible de stabilisation : 200 mg. Des posologies dans un intervalle allant de 100 à 400 mg/j ont été utilisées dans les essais cliniques. En raison du risque de rash, la dose initiale et les augmentations de doses suivantes ne doivent pas dépasser 400 mg/j. Cette posologie doit être utilisée avec d'autres médicaments qui n'inhibent ou n'induisent pas significativement la glucuronisation de la lamotrigine. En cas de copréscription d'un inducteur ou d'un inhibiteur de glucuronisation, la posologie de **lamotrigine** doit être adaptée. Des éruptions cutanées graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell) ont été rapportées.

Ex. 3 : **TÉGRÉTOL** : traitement des états d'excitation maniaque ou hypomaniaque : 600 à 1200 mg/j, soit 3 à 6 cp. 200 mg en 2 ou 3 prises/jour, soit 2 ou 3 prises par jour de susp. buv., soit 1,5 à 3 cp. LP 200 mg x 2 /j, soit 600 à 1

200 mg/j en 2 ou 3 prises (comprimés LP 400 mg).

### ► Antipsychotiques atypiques

**Olanzapine (ZYPREXA** cp. 5, 7,5, 10, 15, 20 mg ; **ZYPREXA VELOTAB** cp. orodisp. 5, 10, 15, 20 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères, **prévention** des récurrences chez les patients présentant un trouble bipolaire, ayant déjà répondu au traitement par l'**olanzapine** lors d'un épisode maniaque. Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I chez l'adolescent âgé de 13 ans ou plus pour une durée allant jusqu'à 12 sem.

**Olanzapine (ZYPREXA** 10 mg pdre pour sol. inject.). AMM : agitation et les troubles du comportement chez les patients chez les patients présentant des épisodes maniaques, lorsque le traitement par voie orale n'est pas adapté. Le traitement doit être arrêté et remplacé par l'**olanzapine** orale dès que l'état clinique du patient le permet.

**Risperidone (RISPERDAL** cp. 1, 2, 4 mg ; **RISPERDALORO** 0,5, 1, 2, 4 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.

**Aripiprazole (ABILIFY** cp. 5, 10, 15 mg ; **ABILIFY** cp. orodisp. 10, 15 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I, **prévention** de récurrences d'épisodes maniaques chez l'adulte ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement par **aripiprazole**.

**Aripiprazole (ABILIFY** sol. inj. 7,5 mg/mL). AMM : traitement rapide de l'agitation et des troubles du comportement chez les patients présentant un épisode maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire de type I, lorsque le traitement par voie orale n'est pas adapté. Le traitement doit être arrêté et remplacé par l'**aripiprazole** par voie orale dès que l'état clinique du patient le permet.

## THYMORÉGULATEURS (4) – PHARMACOLOGIE (2)

## EFFETS INDÉSIRABLES

Le **lithium** est par définition prescrit pour une durée très longue voire indéfinie. Bien toléré au début de traitement, on peut voir apparaître à plus ou moins long terme, des effets secondaires parfois gênants (prise de poids, dysthyroïdie, polyuro-polydypsie, etc.) qui peuvent inciter le patient à arrêter son traitement. La surveillance et le dépistage des effets latéraux du **lithium** sera donc constante tout au long de la prescription.

## Effets neurologiques

Tremblement fin des extrémités : d'attitude et d'action, il persiste parfois toute la durée du traitement. Sa majoration récente doit faire craindre une intoxication au **lithium**. Il peut être traité en réduisant les doses de **lithium** ou en associant des  **$\beta$ -bloquants** : **AVLOCARDYL** 1/4 x 3/j.

Des syndromes extrapyramidaux ont été décrits sous **lithium** sans prise d'**antipsychotique**. Ils surviennent parfois lors des associations avec les **ISRS**. Ils disparaissent à la baisse de posologie.

L'apparition d'autres signes neurologiques doit faire craindre un début d'intoxication au **lithium** : dysarthrie, confusion, céphalées, troubles de l'équilibre, vertiges.

## Effets psychiques et cognitifs

Certains patients se plaignent d'un émoussement affectif, d'une indifférence, de baisse de la créativité artistique, de difficultés de concentration, de difficultés mnésiques après un traitement prolongé par les **sels de lithium**. Différents de ceux d'un tableau dépressif, ces symptômes sont souvent la conséquence de lithémies un peu trop élevées. Il s'agira alors de réduire la posologie afin d'obtenir des lithémies comprises entre 0,5 et 0,7 mEq/L avec du **lithium (TÉRALITHE)** 250 mg.

## Effets endocriniens

Dysthyroïdie : le **lithium** peut induire un goitre euthyroïdien, une thyrotoxicose et le plus sou-

vent une hypothyroïdie. L'arrêt du **lithium** n'est pas justifié. Il faut d'abord faire le bilan étiologique de la dysthyroïdie et ensuite proposer en association avec le **lithium** une hormonothérapie substitutive. La correction des dysthyroïdies est essentielle dans les troubles de l'humeur. L'hypothyroïdie pourrait, en effet, induire des cycles rapides ou des états mixtes.

Syndrome polyuropolydypsique. Il est lié à un diabète insipide néphrogénique. Il est souvent modéré (< 3 L/24 h). Les formes graves incitent à arrêter le **lithium** et à changer de **thymorégulateur**.

Hyperparathyroïdie : aussi rare que classique, elle fait interrompre le **lithium**. D'authentiques adénomes parathyroïdiens ont pu être révélés par les **sels de lithium**.

Prise de poids (5 à 20 kg) : c'est un des problèmes majeurs du **lithium**. Le **lithium** aurait un effet *insuline-like*. Il faut donc conseiller un régime hypocalorique.

## Effets digestifs

Ils consistent surtout en nausées, gastralgie, diarrhée, douleurs abdominales en début de traitement. Le **NEUROLITHIUM** est mieux toléré sur le plan digestif que le **TÉRALITHE**.

L'apparition récente chez un patient tolérant jusqu'alors bien son traitement doit faire suspecter une intoxication et doser la lithémie en urgence.

## Effets hépatiques

Le **valpromide (DÉPAMIDE)** et le **divalproate de sodium (DÉPAKOTE)** peuvent entraîner des hépatites aiguës cytolytiques. Surveiller de façon régulière le bilan hépatique (ALAT, ASAT, TP).

## Effets rénaux

On a décrit des insuffisances rénales chroniques par néphropathie interstitielle voire par glomérulopathie. Elles sont très rares. Elles justifient néanmoins la surveillance annuelle de la créatinine plasmatique à visée préventive.

## TROUBLES DE L'HUMEUR (12) – ÉTATS MANIAQUES ET HYPOMANIAQUES (4)

**Quétiapine (XEROQUEL).** AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires, traitement des épisodes dépressifs majeurs dans les troubles bipolaires, **prévention** des récurrences chez les patients présentant un trouble bipolaire, ayant déjà répondu au traitement par la **quétiapine** lors d'un épisode maniaque ou dépressif.

**Azénapine (SYCREST** cp. subling. 5, 10 mg). AMM : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires de type I chez l'adulte (non remboursable).

Ex. 1 : **olanzapine (ZYPREXA)** : épisode maniaque : la dose initiale est de 15 mg/j en une seule prise en monothérapie ou 10 mg/j en association. Prévention des récurrences dans le cadre d'un trouble bipolaire : la dose initiale recommandée est de 10 mg/j ; le traitement sera maintenu à la même dose. Si un nouvel épisode (maniaque, mixte ou dépressif) survient, le traitement par l'**olanzapine** doit être poursuivi (à la posologie optimale). Selon l'expression clinique de l'épisode, un traitement de la symptomatologie thymique sera associé.

Ex. 2 : **rispéridone (RISPERDAL)** x 1/j, en débutant par 2 mg. Si nécessaire, les adaptations posologiques se feront par paliers de 1 mg/j en respectant un délai minimum de 24 h entre chaque palier de dose. La **rispéridone** peut être administrée à doses flexibles comprises entre 1 et 6 mg/j afin d'optimiser le niveau d'efficacité et de tolérance de chaque patient. Des doses journalières > 6 mg n'ont pas été étudiées chez des patients présentant des épisodes maniaques.

Ex. 3 : **aripiprazole (ABILIFY)** : posologie initiale recommandée à 15 mg x 1/j pendant ou en dehors des repas, en monothérapie ou en association. Certains patients peu-

vent recevoir une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg. Prévention des récurrences des épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I : chez des patients traités par l'**aripiprazole** en monothérapie ou en association, le traitement sera maintenu à la même dose. La posologie quotidienne peut être adaptée ; une réduction de dose pourra être considérée en fonction de l'état clinique du patient.

Ex. 4 : **quétiapine (XEROQUEL)** : prise au moins 1 h avant un repas. La posologie quotidienne de départ est de 300 mg à J1 et 600 mg à J2. La posologie quotidienne recommandée est de 600 mg, mais elle peut être augmentée jusqu'à 800 mg suivant les besoins cliniques. La dose sera adaptée dans l'intervalle de doses efficaces allant de 400 à 800 mg/j, en fonction de la réponse clinique et de la tolérance du patient. Prévention des récurrences des épisodes maniaques, mixtes ou dépressifs dans les troubles bipolaires : les patients ayant répondu à **XEROQUEL** dans le traitement aigu des troubles bipolaires doivent continuer le traitement à la même dose, administrée au moment du coucher.

**XEROQUEL** peut être ajusté en fonction de la réponse clinique et de la tolérance individuelle du patient dans l'intervalle de dose de 300 à 800 mg/j. Il est important d'utiliser la dose minimale efficace dans le traitement de maintien.

Ex. 5 : **azénapine (SYCREST)** : posologie initiale recommandée en monothérapie de 10 mg x 2/j, matin et soir. La posologie peut être réduite à 5 mg x 2/j en fonction de l'évaluation clinique. En polythérapie, une posologie initiale de 5 mg x 2/j est recommandée. Selon la réponse clinique et la tolérance de chaque patient, la posologie peut être augmentée à 10 mg x 2/j.

**THYMORÉGULATEURS (5) – PHARMACOLOGIE (3)****Effets cutanés**

Majoration d'un acné.  
Aggravation ou apparition d'un psoriasis.  
Plus rarement rash cutané, prurit, lupus.

**Effets hématologiques**

Le **lithium** entraîne classiquement une hyperleucocytose, et a parfois été proposé dans le traitement du syndrome de Felty. L'induction de leucémies lymphoïdes chroniques n'est pas démontrée.

**Effets cardiologiques**

Rares effets sur la repolarisation (aplatissement de l'onde T) et exceptionnelles arythmies ventriculaires (surtout en cas de surdosage).

**Intoxication hyperlithémique**

Elle survient pour des lithémies  $< 1,2$  mEq/L. Elle peut être dramatique et entraîner le décès du patient ou laisser des séquelles définitives : syndrome cérébelleux, troubles mnésiques. Elle est favorisée par un régime désodé, la prise de médicaments anti-inflammatoires, des erreurs de dosage, une déshydratation, une fièvre ou une intoxication volontaire. On la suspecte devant toute apparition de

signes digestifs et neurologiques : dysarthrie, céphalées, nausée, diarrhées, vomissements, confusion, tremblement majoré, vertiges, syndrome cérébelleux, nystagmus. Les formes graves évoluent vers le coma et le collapsus cardiovasculaire. Le traitement est initialement symptomatique : arrêt du **lithium**, contrôle de la lithémie, réhydratation, diurèse osmotique. Dans les formes graves le transfert en réanimation s'impose.

Le traitement préventif repose sur l'éducation du malade et le dépistage précoce.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Elles sont nombreuses.

Classiquement les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** peuvent augmenter la lithémie. Les **tétracyclines**, le **métronidazole** auraient le même effet.

L'association **antipsychotique - lithium** doit être prudente en raison du risque de confusion et de neurotoxicité.

Les **ISRS** associés au **lithium** entraînent parfois un syndrome sérotoninergique.

Les **corticoïdes** et les bases xanthiques diminuent la lithémie.

Les **diurétiques** sont contre-indiqués avec les **sels de lithium**.

## DÉSINTOXICATION ALCOOLIQUE (1)

## ■ Acamprosat

AOTAL					
Sevrage alcoolique :	60 cp. 333 mg	15,13	II	65 %	0,25
≥ 60 kg : 2 cp. matin, midi et soir	180 cp. 333 mg	42,76	II	65 %	0,24
< 60 kg : 2 cp. matin, 1 cp. midi et 1 cp. soir					

## PROPRIÉTÉS

Stimule le système GABAergique inhibiteur et antagonyse les acides aminés excitateurs (glutamate).

## INDICATIONS

Maintien de l'abstinence chez le sujet alcoolodépendant.

## CONTRE-INDICATIONS

Grossesse et allaitement.

Âge < 18 ou > 65 ans.

## ■ Chlorhydrate de naltrexone

REVIA					
Alcoolodépendance psychique :	28 cp. séc. 50 mg	36,07	I	65 %	1,29
1 cp. le matin pendant 3 mois					

## PROPRIÉTÉS

Antagoniste des opiacés. Pas d'effet antabuse.

## INDICATIONS

Maintien de l'abstinence chez les patients alcoolodépendants.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la **naltrexone**, insuffisance hépatocellulaire ou hépatite aiguë, dépendance aux **opiacés** (risque de syndrome de sevrage aigu), âge supérieur à 60 ans.

**Grossesse** : déconseillé.

**Allaitement** : déconseillé.

## ■ Disulfirame

ESPÉRAL					
Sevrage alcoolique : 1 cp. le matin à jeun, puis diminuer à 1/2 cp.	20 cp. séc. 500 mg	2,56	I	65 %	0,13

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de l'acétaldéhyde-déshydrogénase provoquant un effet antabuse (malaise, tachycardie, hypotension artérielle, nausées, vomissements).

## INDICATIONS

Maintien de l'abstinence chez le sujet alcoolodépendant.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : contre-indiqué.

**Allaitement** : contre-indiqué.

Insuffisance hépatique grave notamment cirrhose classée Child C.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Durée recommandée de traitement : 1 an.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, prurit, troubles de la libido.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de syndrome de sevrage grave d'installation rapide (5 min) et durable (48 h) chez les sujets dépendants aux **opiacés**. Surveillance des fonctions hépatique et rénale. Durée recommandée de traitement : 3 mois.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Céphalées, nausées, vomissements, insomnies, douleurs abdominales, asthénie, somnolence, myalgie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Insuffisance hépatique ou respiratoire sévère, diabète, comitativité, insuffisance coronarienne, prise d'alcool récente (inférieure à 24 h), troubles psychiques graves, neuropathie périphérique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Alcool (effet antabuse avec risque de collapsus cardiovasculaire, de troubles du rythme, d'angor, d'œdème cérébral ou d'hémorragie méningée), **isoniazide**, **nitro-5-imidazolés**, **phénytoïne** (troubles neuropsychiques), **warfarine** (risque hémorragique).

## ALCOOLISME (2)

**Bilan paraclinique chez l'alcoolique**

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine.
- NFS, VS, CRP.
- Bilan hépatique (ALAT/ASAT, gamma GT, phosphatases alcalines, bilirubine).
- Hémostase (TP/TCA, facteur V).
- Électrophorèse des protéines.
- Échographie abdominale.
- Gastroskopie.
- Fond d'œil.
- TDM cérébrale, EEG, EMG.
- Tests psychométriques.

**Sevrage alcoolique**

Consécutif à un état d'ivresse aiguë ou résultant d'une demande motivée du patient, il peut nécessiter une prise en charge en milieu hospitalier afin d'isoler le sujet, de réaliser un bilan somatique et de prévenir un delirium tremens quelques jours après l'arrêt brutal de l'alcool.

**Signes cliniques du delirium tremens**

- Troubles de la conscience, désorientation temporo-spatiale, état d'agitation confuso-onirique, insomnie
- Agitation avec risque de passage à l'acte
- Tremblement intense généralisé, prédominant aux extrémités et à la langue
- Hypertonie oppositionnelle
- Délire hallucinatoire visuel et cénesthésique, le malade pouvant vivre activement des scènes d'onirisme
- Symptômes délirants majorés par l'obscurité
- Troubles végétatifs (fièvre, sueurs, vomissements, tachycardie, troubles tensionnels) et signes généraux
- Modifications biologiques (déshydratation, cétonurie, acidose métabolique, hypokaliémie
- Crises convulsives

L'évaluation est souvent défavorable avec le taux de mortalité qui peut atteindre 50 %.

**Traitement immédiat**

- **Hospitalisation** en chambre seule et éclairée.

- **Réhydratation** par 3 à 4 L de sérum glucosé à 5 % avec 4 g de NaCl/L et 2 g de KCl/L, à adapter en fonction de l'ionogramme sanguin et de l'état d'hydratation.

- **Vitaminothérapie B1** (1 g/j) en IV pendant 1 sem. Le sevrage peut favoriser l'apparition de troubles graves neurologiques ou cardiaques par carence en thiamine, en particulier en cas d'apport glucosé associé. Il est nécessaire d'administrer de la **thiamine** (500 mg/j) à tout patient débutant un sevrage. L'administration parentérale, de préférence par perf. IV, doit être préconisée pendant la 1<sup>re</sup> sem., puis relais par vitaminothérapie *per os* B1, B6, PP.

- **Traitement sédatif et préventif des épilepsies de sevrage** par **benzodiazépines**, diazépam (**VALIUM**) 10 à 60 mg/j, posologie adaptée en fonction des signes végétatifs de sevrage. En cas d'insuffisance hépatique, on préférera l'**oxazépam** (**SÉRESTA**).

- **Traitement d'un éventuel facteur déclenchant** (hémorragie digestive, état infectieux, diabète, pancréatite, etc.).

- **Traitement antipsychotique** en cas d'agitation majeure ou symptomatologie non contrôlable par les **benzodiazépines**. Ex. : **tiapride** (**TIAPRIDAL**) 100 à 300 mg/j en 2 à 3 prises.

- **Surveillance** clinique (conscience, hydratation, diurèse, poids, température, pouls, PA) et biologique (ionogramme, protidémie, hématocrite, urée, créatinine, etc.).

**Prise en charge à long terme [1]**

La prise en charge à long terme des patients sevrés et présentant une dépendance à l'alcool repose sur une approche globale par des médecins expérimentés dans le suivi de ce type de patients dépendants, la fréquentation d'associations d'anciens buveurs, un travail psychothérapique (entretiens motivationnels, thérapie cognitivo-comportementale, médiation corporelle ou de groupe) et le recours à une chimiothérapie spécifique.

## DÉSINTOXICATION ALCOOLIQUE (2)

## ■ Nalméfène

<b>SELINCRO</b>					
À prendre chaque jour où le patient perçoit le risque de boire de l'alcool, de préférence 1 à 2 h avant une consommation d'alcool anticipée	7 cp. 18 mg 14 cp. 18 mg 28 cp. 18 mg 42 cp. 18 mg 98 cp. 18 mg		I	30 %	
Max. 1 cp./j			I	30 %	

**PROPRIÉTÉS**

- Antagoniste des récepteurs opioïdes  $\mu$  et  $\delta$ .
- Agoniste partiel des récepteurs opioïdes  $\kappa$ .

**INDICATIONS**

Réduction de la consommation d'alcool chez les patients :

- adultes dépendants à l'alcool,
- avec une consommation d'alcool à risque élevé qui persiste 2 sem. après l'évaluation initiale,
- sans symptôme physique de sevrage et ne nécessitant pas un sevrage immédiat,
- en association à un suivi psychosocial continu.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité.

ATCD récent de dépendance aux opioïdes, symptômes aigus du syndrome de sevrage aux opioïdes, consommation récente d'opioïdes.

ATCD récent de syndrome de sevrage alcoolique (avec hallucinations, convulsions et *delirium tremens*).

Insuffisances hépatique et/ou rénale sévères.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Non recommandé chez la femme enceinte et pendant l'allaitement (manque de données).

Prudence chez les patients atteints de troubles psychiatriques, de troubles convulsifs, insuffisants rénaux ou hépatiques, âgés.  
Contient du lactose.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquents : insomnie, vertiges, céphalées, nausées.

Fréquents : diminution de l'appétit, troubles du sommeil, état confusionnel, baisse de libido, somnolence, tremblements, paresthésie, vomissements, tachycardie, etc..

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Contre-indiqués : **analgésiques opioïdes** (diminution de l'activité voire effet nul des opioïdes) :

– interruption de **SELINCRO** pendant la sem. qui précède une administration prévue d'**opioïdes** ;

– si administration en urgence nécessaire, augmentation de la posologie de l'**opioïde** et surveillance étroite du patient (fonction respiratoire) ;

– penser aux sirops **antitussifs** et **antidiarrhéiques** contenant des opioïdes.

Augmentation de l'exposition au **nalméfène** : **diclofénac**, **fluconazole**, **médroxyprogestérone**, acide méfénamique.

Diminution de l'exposition au **nalméfène** : **dexaméthasone**, **phénobarbital**, **rifampicine**, **oméprazole**.



## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (1)

## ■ Méthadone

<b>MÉTHADONE AP-HP</b>				
Prescription initiale par médecin exerçant en centre de soins pour toxicomanes, sur ordonnance sécurisée, limitée à 7 j Nécessité d'une surveillance médicale pluri-hebdomadaire (contrôle urinaire) Mise en place du traitement : 20 à 30 mg, 10 h au moins après la dernière prise d'opiacés, en une prise unique quotidienne, à augmenter à 40 à 60 mg/j en 1 à 2 sem. puis de 10 mg/sem., en fonction de la réponse clinique jusqu'à 100 mg	1 unidose 5 mg/3,75 mL	1,40	65 %	1,40
	1 unidose 10 mg/7,5 mL	1,49	65 %	1,49
	1 unidose 20 mg/15 mL	1,67	65 %	1,67
	1 unidose 40 mg/15 mL	1,75	65 %	1,75
	1 unidose 60 mg/15 mL	1,84	65 %	1,84
	7 gél. 1 mg	3,28	65 %	0,47
	7 gél. 5 mg	5,11	65 %	0,73
	7 gél. 10 mg	5,80	65 %	0,83
	7 gél. 20 mg	7,22	65 %	1,03
	7 gél. 40 mg	7,85	65 %	1,12
	1 fl. sirop 1,33 mg/mL	HOP		

**PROPRIÉTÉS**

Agoniste morphinique.

**INDICATIONS**

Traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Enfant (moins de 15 ans), insuffisance respiratoire grave, hypersensibilité à la **méthadone**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Nécessité d'une prise en charge médico-psycho-sociale conjointe. Risque de syndrome de sevrage aigu en cas d'interruption brutale du traitement. Surveillance plus particulière des sujets âgés ou présentant une pathologie somatique grave (asthme, insuffisance respiratoire, rénale, hépatique ou surrénalienne, hypothyroïdie, diabète).

**Grossesse** : évaluation du rapport bénéfice/risque pour la mère et l'enfant, risque de sevrage chez le nouveau-né.

**Allaitement** : pourrait prévenir le risque de sevrage aigu chez le nouveau-né.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles respiratoires (dépression voire arrêt respiratoire si surdosage), cardiaques (flush facial, bradycardie, palpitations, hypotension artérielle avec risque de choc voire d'arrêt cardiaque si surdosage), troubles neuropsychiques (euphorie, agitation, somnolence, céphalées, vertiges), digestifs (constipation, nausées, vomissements, spasmes des voies biliaires), génito-urinaires (dysurie, troubles de la libido), allergiques (urticaire, prurit, œdèmes), hypersudation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool, **agonistes/antagonistes morphiniques** (syndrome de sevrage), autres dérivés morphiniques (dépression respiratoire), dépresseurs du SNC, **IMAO, antidépresseurs** sérotoninergiques, **cimétidine, rifampicine, phénytoïne** (sevrage), acidifiant et alcalinisant urinaires.

**PROPRIÉTÉS**

La naloxone est destinée à empêcher le mauvais usage du produit par voie IV.

## TOXICOMANIES (2)

### Toxicomanie aux opiacés

Les **opiacés** (héroïne, **morphine**, **codéine**, etc.) peuvent être utilisés en « sniff » ou en « shoot » (IV), produisant alors un « flash », sensation de bien-être intense. Le risque principal est celui du surdosage (overdose) qui peut entraîner des complications graves (rhabdomyolyse, pneumopathie d'inhalation, OAP lésionnel, anoxie cérébrale) parfois irréversibles.

#### Surdosage en opiacés

##### ► *Signes cliniques*

- Dépression respiratoire.
- Troubles neurovégétatifs (hypothermie, bradycardie, troubles du rythme).
- Myosis serré bilatéral.
- Constipation, rétention d'urine.
- Troubles de la conscience, voir coma stuporeux aréflexique.

##### ► *Risques*

- Globe vésical.
- Hypothermie.
- Œdème pulmonaire.
- Collapsus cardiovasculaire.
- Mort subite.

##### ► *Traitement*

Administration d'un **antagoniste spécifique des récepteurs morphiniques centraux**, naloxone (**NARCAN**) 1 amp. de 0,4 mg en IV puis 0,1 mg toutes les min jusqu'à obtention d'une ventilation efficace et sans dépasser 10 mg au total.

La prévention antitétanique, la recherche et le traitement spécifique des éventuelles complications fréquentes chez les toxicomanes aux **opiacés** (abcès aux points d'injection, endocardite tricuspide, hépatites virales B et C, sida, etc.) doivent être pratiqués.

### Sevrage aux opiacés [1]

La réalisation pratique du sevrage ne représente qu'une partie limitée de la prise en charge d'un patient dépendant. Elle s'inscrit dans un projet plus large qui comprend une phase de préparation et d'évaluation préalable et prévoit d'emblée les modalités de poursuite de la prise en charge au décours.

**La phase de préparation** permet de s'assurer du caractère adapté de l'indication de sevrage et de l'absence de contre-indication, de discuter et de choisir, avec le patient, le cadre du sevrage. La préparation et la mise en place des sevrages peuvent se décrire en trois temps différenciés : la prise de contact, le constat clinique et la négociation du contrat de soins.

**La prise de contact** a comme l'objectif principal la construction de la relation thérapeutique. Le « **constat clinique** » est une évaluation psychopathologique, des dépendances, évaluation sociale initiale, évaluation somatique (l'examen clinique et biologique). Enfin, on évalue l'opportunité du sevrage, négocie le **projet**, la place de la psychothérapie (entretiens motivationnels) et finalement le cadre (ambulatoire ou institutionnel).

Le sevrage en milieu hospitalier est réalisé en service de médecine non spécialisé, en service psychiatrique ou en institution spécialisée. Le choix du lieu paraît davantage lié à l'offre de soins qu'à une réelle réflexion clinique ou théorique. Le **contrat** est établi entre le patient et l'équipe de soins : variable suivant les institutions, insiste sur le nécessaire respect par le patient de leurs règles de vie, comprend habituellement une période de durée variable pendant laquelle le patient accepte une limitation plus ou moins complète des sorties, des visites, et des appels téléphoniques personnels.

## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (2)

## ■ Buprénorphine

<b>SUBUTEX</b>					
Prescription sur ordonnance sécurisée pour une durée de 28 j	7 cp. subling. 0,4 mg	2,80	I	65 %	0,40
Délivrance fractionnée de 7 j	7 cp. subling. 2 mg	6,18	I	65 %	0,88
Mise en route du traitement : 0,8 à 2 mg/j en une prise, 4 h au moins après la dernière prise de stupéfiants	7 cp. subling. 8 mg	17,65	I	65 %	2,52
Augmentation des doses à 16 mg/j en une prise selon la réponse clinique					

**PROPRIÉTÉS**

Agoniste/antagoniste morphinique (analgésique-opioïde).

**INDICATIONS**

Traitement substitutif d'une pharmacodépendance majeure aux opiacés.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **buprénorphine**, enfant (moins de 15 ans), insuffisance respiratoire ou hépatique sévère, intoxication alcoolique aiguë et delirium tremens.

**Grossesse** : déconseillé.

**Allaitement** : déconseillé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de pharmacodépendance, détournement du traitement par usage en IV. À utiliser avec précaution chez l'insuffisant respiratoire, rénal ou hépatique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, céphalées, insomnies, asthénie, somnolence, nausées, vomissements, hypotension orthostatique, sueurs, dépression respiratoire.

Certains toxicomanes utilisent la **buprénorphine (SUBUTEX)** en injection IV après avoir dissous les cp. dans de l'eau ou du jus de citron. Des infections et des hépatites cytolytiques ont été rapportées par cette voie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Alcool (somnolence), **benzodiazépines** et autres dépresseurs du SNC, **IMAO**.

Inhibiteurs du CYP3A4 (augmentation des concentrations de **buprénorphine**) : **antifongiques azolés, inhibiteurs de protéases...**

Inducteurs du CYP3A4 (pas d'étude, surveillance étroite) : **phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, rifampicine**, etc.

## TOXICOMANIES (3)

### Signes cliniques

Le syndrome de manque aux opiacés apparaît 6 à 8 h après la dernière prise des opiacés) associe diversement les symptômes suivants : syndrome pseudo-grippal, anxiété, puis agitation, syndrome confuso-onirique, lombalgies, hyperalgésie, douleurs diffuses à prédominance musculaire, douleurs abdominales, accélération du transit intestinal, diarrhée et parfois vomissements, tremblements, sueurs, bâillement, larmolement, rhinorrhée, augmentation de la transpiration, tachycardie, hypertension artérielle et mydriase bilatérale de valeur sémiologique importante.

Aux signes physiques, s'ajoutent des symptômes psychiques : anxiété, irritabilité, recherche compulsive de produits, troubles du sommeil, dépression.

Le délai d'apparition des **symptômes de sevrage** est variable et fonction de la demi-vie d'élimination de la substance consommée. Pour l'héroïne dont l'élimination est rapide, les symptômes apparaissent en général après 6 à 12 h, s'accroissent progressivement jusqu'au troisième jour, et régressent habituellement en moins de 8 j.

Pour les produits de substitution dont l'élimination est longue (**méthadone** ou **buprénorphine**), les symptômes sont souvent décalés dans le temps et persistent de manière plus prolongée. Il s'agit alors notamment de manifestations psychiques (anxiété, insomnie, aboulie, asthénie) qui pourraient contribuer à une reprise ultérieure de la consommation de drogue.

### Traitement

L'arrêt de toute prise de toxique, la réhydratation, la renutrition, un apport polyvitaminique.

Les **traitements spécifiques** tentent de s'opposer à l'hyperfonctionnement adrénergique, considéré comme responsable des symptômes : la **clonidine (CATAPRESSAN)**, **antihypertenseur**,  $\alpha_2$ -stimulant central, efficace sur l'agitation, l'instabilité, la larmeyon, la rhinorrhée et la transpiration, a peu ou pas d'effet sur l'insomnie et les myalgies. L'administration est uniquement orale, en prises espacées de 2 à 3 h

et en augmentant progressivement la dose ; la surveillance de la pression artérielle est systématique, le traitement est interrompu transitoirement lorsque la pression systolique est inférieure à 100 mmHg. Cette thérapeutique est utilisée particulièrement au début de la prise en charge hospitalière lorsque les patients sont alités.

Ex. 1 : **clonidine (CATAPRESSAN)** 1 cp. à 0,15 mg x 6/j pendant 4 à 8 j.

Les traitements symptomatiques comportent : **antalgiques**, **spasmolytiques**, **anti-nauséeux**, **antidiarrhéiques**, **anxiolytiques**, **sédatifs** et **hypnotiques**. Les produits sédatifs sont indispensables, surtout dans les premiers jours.

Les **benzodiazépines** présentent un risque propre d'induction d'une pharmacodépendance, il paraît souhaitable de limiter leur utilisation et d'éviter leur emploi chaque fois que cela est possible. L'alternative peut être l'utilisation d'un **antipsychotique** sédatif tel que l'**alimémazine (THÉRALÈNE)** ou la **cyamémazine (TERCIAN)**.

### Modalités de suivi

L'indication d'un traitement par un produit de substitution : **méthadone chlorhydrate**, **buprénorphine (SUBUTEX)** ou **buprénorphine + naloxone (SUBOXONE)** peut être posée chez un sujet toxicomane chronique, motivé, compliant, en cas d'échec ou de contre-indication au sevrage.

Un accompagnement doit toujours être proposé. Le **suivi médical** tient compte des pathologies contractées pendant la période de dépendance telles les hépatites B ou C et le VIH. Celles-ci nécessiteront un suivi et/ou des thérapeutiques adéquates. L'**accompagnement social** vise à restaurer l'inscription sociale du patient. Le **suivi éducatif** cherche par la relation, le dialogue et l'accompagnement actif, à résoudre les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Le **soutien psychologique** est nécessaire tout au long de la prise en charge. La famille devrait pouvoir s'impliquer dans le processus de soins et de suivi. L'existence d'un support social éayant est l'un des facteurs favorisant l'efficacité des soins.

## MORPHINE (SEVRAGE AUX OPIACÉS) (3)

## ■ Buprénorphine + naloxone

SUBOXONE					
Prescription sur ordonnance sécurisée pour une durée de 28 j	7 cp. subling. 2 mg/0,5 mg	5,70	I	65 %	0,81
Délivrance fractionnée de 7 j	7 cp. subling. 8 mg/2 mg	16,13	I	65 %	2,30
Induction (J1) : 2-8 mg/j (de buprénorphine)					
Entretien : posologie fonction de la réponse clinique, avec adaptation par paliers de 2 à 8 mg					
Après stabilisation : diminution possible de la fréquence d'administration, mais sans modifier la dose prise par sem.					
<b>Ne jamais dépasser 24 mg/j</b>					

## PROPRIÉTÉS

Cf. buprénorphine.

La **naloxone** est destinée à empêcher le mauvais usage du produit par voie IV, en précipitant le syndrome de sevrage.

## PSYCHOSTIMULANT

## ■ Sulbutiamine

ARCALION				
2-3 cp./j répartis entre le matin et le midi	30 cp. enr. 200 mg			NR
	30 cp. enr. 200 mg en pilulier			NR
	60 cp. enr. 200 mg			NR

## PROPRIÉTÉS

Psychostimulant non amphétaminique, dérivé de la vitamine B1 (thiamine), à activité antias-thénique et énergisante.

## INDICATIONS

Traitement de l'inhibition physique ou psychique avec baisse d'activité et apathie. **Ne dis-pense pas d'un traitement spécifique par antidépresseur en cas d'épisode dépressif avéré.**

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.  
Enfant, nourrisson, nouveau-né.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Grossesse, allaitement : traitement déconseil-lée (manque de données).  
Contient du lactose.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Neuropsychiques : tremblements, malaises, céphalées, agitation.  
Allergie cutanée.  
Intolérance digestive.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune à ce jour (manque de données) : pru-dence.

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (1)

Les affections qui relèvent de la rhumatologie se caractérisent essentiellement par 2 types de symptômes : la douleur et l'atteinte de la fonction articulaire, dont la combinaison aboutit à une impotence fonctionnelle plus ou moins importante. La prise en charge des patients est différente selon l'expression de la symptomatologie, soit aiguë, soit chronique.

### Douleur aiguë

#### Douleur articulaire aiguë

La douleur de l'accès goutteux, ou de la poussée de bursite calcaire, se caractérise par son caractère explosif, l'intensité particulière de la douleur et de l'impotence. L'inflammation y est extrême et c'est là que le traitement anti-inflammatoire est le plus brillant sur la sédation de la douleur, le plus rapide, qu'il s'agisse de la **colchicine**, d'un **AINS** ou d'une courte corticothérapie. Les **antalgiques** ne sont qu'un simple appoint thérapeutique.

#### Douleur rachidienne aiguë du lumbago

Caractéristique par son intensité et par l'impotence qu'elle entraîne, c'est une douleur « mécanique » dont la durée sera en général inférieure à 1 sem.

Le repos, les **antalgiques**, les **myorelaxants** ont souvent autant d'effet qu'un **AINS**, sans en avoir les dangers potentiels.

#### Névralgies d'origine disco-rachidienne

L'inflammation existe, mais la douleur y est parfois l'élément prédominant à prendre en compte, dont la durée moyenne est connue.

Excruciante ou lancinante, la douleur subit des recrudescences « mécaniques » liées aux mouvements dans la sciatique, des recrudescences « inflammatoires » nocturnes au début des cruralgies et de nombreuses névralgies cervico-brachiales.

Le traitement doit être adapté à l'intensité des symptômes, à leur horaire : prescription de l'**antalgique** le plus puissant au moment où la douleur est ou risque d'être la plus forte ; c'est la recrudescence nocturne qui conduit à prescrire un anti-inflammatoire puissant (corticothérapie orale) dans les névralgies hyperalgiques. Le traitement doit aussi être adapté dans le temps en fonction du temps d'évolution de la névralgie : c'est la durée prolongée de certaines sciatiques, plus souvent que l'existence d'un déficit neurologique, qui conduit à envisager un geste thérapeutique chirurgical sur le disque.

### Délai moyen et taux de guérison des névralgies

DÉLAI DE GUÉRISON	SCIATIQUE	CRURALGIE	NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE
6 sem.	50 %	55 %	50 %
8 sem.			80 %
12 sem.	70 %	85 %	
Délai plus long	95 %	97 % ou plus	Près de 100 %
Nécessité d'opérer	5 %	Très rarement	Exceptionnellement

### Ostéalgies

La douleur de la fracture de contrainte est localisée, « mécanique », et peut s'accompagner de signes inflammatoires locaux. Son traitement est « mécanique » : immobilisation jusqu'à consolidation dans des délais habituellement connus.

La douleur du tassement vertébral ostéoporotique est celle d'une fracture, liée au mouvement, à la toux, etc. La consolidation se fait en 6 à 8 sem., l'impotence douloureuse dépasse rarement 3 sem. Le repos relatif, les **antalgiques usuels** suffisent presque toujours.

## ANTALGIQUES USUELS (1) – ASPIRINE, SALICYLÉS (1)

## ■ Acide acétylsalicylique et assimilés

<b>ASPÉGIC</b>					
Douleurs d'intensité légère à modérée : posologie variable, inférieure ou égale à 3 g/j d' <b>acide acétylsalicylique</b> Affections rhumatismales : posologie éventuellement plus élevée, 4 g/j (voire jusqu'à 6 g/j) <b>ASPÉGIC INJECTABLE</b> Voie parentérale : IM profonde, IV ou en perf.	20 sach. 500 mg	2,60		65 %	0,13
	20 sach. 1 g	4,12		65 %	0,21
	30 sach. 1 g			NR	
	6 fl. pdre + sol. 500 mg	5,70		65 %	0,95
	6 fl. pdre + sol. 1 g	9,07		65 %	1,51
<b>ASPIRINE UPSA</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. séc. efferv. 500 mg	3,54		65 %	0,18
<b>ASPRO</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. 500 mg			NR	
	36 cp. efferv. 500 mg			NR	
<b>ASPIRINE PH8</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. gastro-résist. 0,5 g			NR	
	50 cp. gastro-résist. 0,5 g			NR	
<b>ASPIRINE PROTECT</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	30 cp. gastro-résist. 300 mg	2,62		65 %	0,09



## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (2)

### Douleur chronique

D'intensité en général subaiguë ou modérée, son évolution, prolongée sur des mois ou des années, se fait souvent sur un **mode cyclique, avec des ondes évolutives**.

Elle nécessite pour être correctement combattue de prendre en considération :

- son **intensité** ;
- l'**impotence qui peut l'accompagner** ;
- son **évolution** dans le temps ; on ne traitera pas de la même façon le fond douloureux permanent d'une gonarthrose et la poussée congestive qui en émaille souvent l'évolution ;
- son **horaire** et ses facteurs d'aggravation.

La raideur matinale douloureuse des grands rhumatismes inflammatoires chroniques doit être combattue par la prescription d'un anti-inflammatoire à une heure telle qu'il ait son maximum d'efficacité à ce moment.

Les douleurs de démarrage, la limitation douloureuse de la marche des arthroses de la hanche et du genou, pourront bénéficier de la prescription ponctuelle d'un **antalgique** avant une sortie pour la faciliter.

### Façon dont le patient vit (avec) sa douleur

Il nous semble intéressant de donner ici l'exemple des lombalgies chroniques au cours desquelles plusieurs travaux ont confirmé l'importance des formes avec troubles psychopathologiques ou psychiatriques associés aux facteurs organiques : près de 40 % des cas de lombalgies.

L'analyse de ces formes permet de noter la fréquence des signes de dépression confirmée et de critères d'anxiété. Ces signes peuvent être la cause principale de la pérennisation des symptômes ; ne pas

en tenir compte, dès le premier contact avec le patient, exposerait à des échecs thérapeutiques, sans parler de la surconsommation de prescriptions et d'actes médicaux, voire chirurgicaux.

### Douleurs neuropathiques périphériques

Il est schématiquement possible, avec une optique neurologique, de distinguer les douleurs en :

- douleurs neuropathiques, liées à un dysfonctionnement du système nerveux, elles-mêmes d'origine centrale ou d'origine périphérique (DNP) ;
- douleurs nociceptives, dues à des lésions de tissus non nerveux ; aiguës ou chroniques, elles affectent : articulations, muscles, os, etc.

Toutefois, en pratique courante, les deux mécanismes sont fréquemment intriqués : douleurs mixtes.

Les douleurs neuropathiques périphériques sont fréquentes en rhumatologie. L'atteinte du système nerveux périphérique est responsable, quand elle se prolonge, d'une perturbation du système nerveux central, ce qui a des applications thérapeutiques. Il en est ainsi au cours des formes prolongées de radiculalgies (sciatique, cruralgie, névralgie cervico-brachiale), de syndromes canalaires, de neuropathies au cours de vascularites, du diabète, ou d'origine iatrogène ; voire au cours d'un syndrome douloureux complexe régional (algodystrophie réflexe).

#### ► Diagnostic

Pour apprécier et reconnaître une DNP, il est possible d'utiliser le questionnaire DN4 (cf. *infra*), établi par la Société française de rhumatologie.

**ANTALGIQUES USUELS (2) – ASPIRINE, SALICYLÉS (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antalgique périphérique, antipyrétique, anti-inflammatoire à dose élevée.

Antiagrégant plaquettaire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou d'états fébriles. Affections rhumatismales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie avérée à l'**aspirine** et aux **AINS**.

Ulcère gastroduodénal évolutif.

Toute maladie hémorragique et si risque hémorragique.

Interactions médicamenteuses : autres **AINS**, anticoagulants oraux, si  $\geq 3$  g/j, **méthotrexate** à dose  $\geq 15$  mg/sem., etc.

**Grossesse** : contre-indiqués à partir du 6<sup>e</sup> mois ; avant, uniquement si nécessaire et en traitement ponctuel.

**Allaitement** : déconseillés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ce sont celles des **AINS**, plus antécédents d'ulcère gastroduodénal ou d'hémorragie digestive, d'asthme ; insuffisance rénale, métrorragies ou ménorragies, dispositif intra-utérin.

Compte tenu de l'effet antiagrégant plaquettaire, rapide et durable, prévenir le patient des risques hémorragiques pouvant survenir en cas de geste chirurgical, même mineur.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sur le système nerveux central : bourdonnements d'oreille, baisse de l'acuité auditive, céphalées (surdosage).

Gastro-intestinaux : ulcère, hémorragies patentes ou occultes ; douleurs abdominales.

Hématologiques : syndromes hémorragiques

avec augmentation du TS, persistant 4 à 8 j après l'arrêt de l'**aspirine**.

Réaction d'hypersensibilité : œdème de Quincke, urticaire, asthme, anaphylaxie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

– Autres **AINS** : augmentation du risque ulcérogène et hémorragique ; association déconseillée.

– **Anticoagulants oraux** : augmentation du risque hémorragique. **Salicylés** à faible dose : surveillance du TS ; à fortes doses : contre-indication.

– **Héparines** : augmentation du risque hémorragique ; association déconseillée.

– **Antidiabétiques** (insuline, **chlorpropamide**) : majoration du risque hypoglycémiant.

– **Glucocorticoïdes** : diminution de la salicylémie en cours de traitement, majoration à l'arrêt du **corticoïde**.

– **Diurétiques** : précautions d'emploi si fortes doses de **salicylés** (hydratation, fonction rénale).

– **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : précautions d'emploi si fortes doses de **salicylés** (hydratation, fonction rénale). Réduction de l'effet antihypertenseur.

– **Méthotrexate** : contre-indiqué si dose  $> 15$  mg/sem. ; au-dessous, surveillance hebdomadaire de l'hémogramme, accrue chez le sujet âgé et si fonction rénale altérée.

– **Uricosuriques** (**benzbromarone**, **probenécide**) : diminution de l'effet uricosurique ; association déconseillée.

– **Interféron alpha** : risque d'inhibition de l'action de l'interféron ; association déconseillée.

– **Topiques gastro-intestinaux** : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés ; à prendre en compte.

– Dispositif intra-utérin : risque de moindre efficacité, controversé, à prendre en compte.

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (3)

## Questionnaire DN4

**QUESTION 1 :** la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

	Oui	Non
1. Brûlure		
2. Sensation de froid douloureux		
3. Décharges électriques		

**QUESTION 2 :** la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

	Oui	Non
4. Fourmillements		
5. Picotements		
6. Engourdissements		
7. Démangeaisons		

**QUESTION 3 :** la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence :

	Oui	Non
8. Hypoesthésie au tact		
9. Hypoesthésie à la piqure		

**QUESTION 4 :** la douleur est-elle provoquée ou augmentée par :

	Oui	Non
10. Le frottement		

**OUI = 1 point****NON = 0 point****Score du patient : /10**Si le score du patient est  $\geq 4$ , il est probable que la douleur ait une composante neuropathique.**► Conséquences thérapeutiques**

Lorsque les douleurs ne sont pas contrôlées par les thérapeutiques usuelles (**antalgiques, AINS**), ou qu'elles leur échappent, il est alors possible de s'adresser aux médicaments recommandés dans les DNP.

- **antalgiques opiacés (tramadol) ;**
- **antipileptiques (carbamazépine : TEGRE-TOL, prégabaline : LYRICA) ;**
- **antidépresseurs (imipraniques : ANAFRANIL, TOFRANIL ; l'efficacité des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine est moindre) ;**
- ou méthodes non médicamenteuses (stimulation électrique cutanée par exemple, etc.).

**Douleur chronique et morphiniques**

L'objectif de la prescription de **morphiniques** au long cours est seulement de réduire l'intensité de la douleur.

Cette prescription est **exceptionnelle en rhumatologie**, et doit suivre un certain nombre de règles.

La cause de la douleur doit être bien identifiée, et les douleurs mal définies, sans support organique prouvé ou avec facteurs psychologiques prédominants doivent être exclues.

Les autres **antalgiques** de niveau I et II doivent avoir été inefficaces auparavant.

Un antécédent de toxicomanie doit avoir été écarté.

Un seul médecin doit être responsable du traitement, tant pour la prescription initiale que pour le suivi.

Le produit choisi doit être administré en continu, avec renforcement en période d'activité ou de douleur. La posologie sera progressivement adaptée, et en cas de non-réponse à l'augmentation des doses, la prescription sera arrêtée.

Le suivi doit être très régulier, tous les 28 j, et l'efficacité et la tolérance analysées attentivement.

## ANTALGIQUES USUELS (3) – PARACÉTAMOL (1)

## ■ Paracétamol

<b>CLARADOL</b>					
Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles	16 cp. efferv. 500 mg	2,02		65 %	0,13
	16 cp. séc. 500 mg	1,83		65 %	0,11
<b>DAFALGAN</b>					
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou états fébriles Selon les symptômes : 1 à 3 g/j (4 h entre 2 prises) jusqu'à 4 g/j si nécessaire	16 gél. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	10 sup. 600 mg	2,17		65 %	0,22
	8 cp. séc. 1 g	1,95		65 %	0,24
	16 cp. efferv. séc. 500 mg	1,90		65 %	0,12
<b>DOLIPRANE</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	16 cp. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	12 sach. 500 mg	1,95		65 %	0,16
	16 cp. efferv. 500 mg	2,02		65 %	0,13
	16 gél. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	8 sup. 1 g	2,17		65 %	0,27
	8 cp. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 cp. efferv. séc. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 sach. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 gél. 1 g	1,90		65 %	0,24
<b>EFFERALGAN</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	8 cp. efferv. 1 g	2,02		65 %	0,25
	16 cp. séc. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	16 cp. efferv. séc. 500 mg	2,02		65 %	0,13
<b>DOLKO</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	12 sach. 500 mg	1,95		65 %	0,16
	16 cp. séc. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	8 cp. 1 g	1,90		65 %	0,24
<b>PARALYOC</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	10 cp. à suc. 250 mg	2,13		65 %	0,21
	16 cp. à suc. 500 mg	2,75		65 %	0,17
<b>PERFALGAN</b>					
Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en postopératoire, et traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie IV est cliniquement justifiée par l'urgence A. et adolescent > 50 kg : 1 g jusqu'à 4 fois/j Respecter un intervalle d'au moins 4 h entre 2 administrations Éviter la voie centrale	12 fl. 100 mL 10 mg/mL	HOP			

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (4)

## Traitement

Il comporte 3 volets :

- le traitement étiologique lorsqu'il existe ;
- le traitement symptomatique, toujours nécessaire, qui repose sur le repos articulaire, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires principalement ;
- la prise en compte du contexte : personnel (vécu de la douleur ; antécédents et contre-indications thérapeutiques), social et familial, professionnel.

Le traitement de la douleur doit tenir compte des modalités évolutives et de l'histoire naturelle des affections lorsqu'elle est connue.

## Classification de la douleur

Il existe plusieurs classifications possibles. Celle préconisée par l'OMS pour les **douleurs chroniques cancéreuses**, comporte 3 niveaux successifs. Ils correspondent :

- pour le **niveau I** à des douleurs légères à modérées ;
- pour le **niveau II** (II a et II b) à des douleurs modérées à sévères et/ou à l'échec des **antalgiques** utilisés pour le niveau I ;
- pour le **niveau III**, à des douleurs intenses et/ou à l'échec des **antalgiques** utilisés pour le niveau II.

Cette classification peut servir de référence en pathologie rhumatologique, mais elle doit en pratique être adaptée à chaque cas particulier.  
Il faut faire attention aux confusions possibles entre *liste* et *niveau*.

## Classification des médicaments

► Selon les modalités de prescription

La législation française classe les médicaments selon les modalités de prescription. Les **antalgiques** participent à cette classification. Certains, dont le **paracétamol**, ne figurent sur aucune liste ; leur vente est libre, mais le conditionnement en est généralement réduit. Pour les autres ils figurent sur les listes suivantes.

## Liste I

Prescription sur simple ordonnance, non renouvelable, sauf en cas de mention expresse contraire. La délivrance se fait pour 30 j au maximum, sur présentation de l'ordonnance.

## Liste II

Prescription sur simple ordonnance, renouvelable sur présentation de l'ordonnance, sauf en cas de mention expresse contraire. La délivrance se fait par fraction de 30 j, et l'ordonnance doit dater de moins de 3 mois.

*Liste des stupéfiants (voir ci-après)*

► Selon la composition pharmacologique

Les **antalgiques** peuvent être classés selon leur composition pharmacologique.

*Antalgiques non morphiniques*

Ce sont ceux que l'on peut qualifier d'usuels : **paracétamol**, **salicylés**, **analgésiques** de la famille des **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ; ils font partie des **antalgiques** de niveau I. Signalons les **antalgiques** purs : **floctafénine** (**IDARAC**, par voie orale), **néfopam** (**ACUPAN**, par voie IM), beaucoup moins utilisés en pratique rhumatologique.

*Antalgiques opioïdes faibles*

Ils ne donnent lieu, pour un usage normal, ni à accoutumance ni à assuétude : **codéine**, et sont généralement prescrits en association avec le **paracétamol**. Fréquemment utilisés en rhumatologie, ils font partie des **antalgiques de niveau II a** et sont, ou non, inscrits sur la liste I ou la liste II. Parmi les **antalgiques de niveau II b**, on trouve des produits qui ne peuvent être délivrés qu'après prescription sur ordonnance sécurisée (**TEMGÉSIC**), et d'autres qui peuvent être délivrés sur ordonnance simple (**tramadol**).

*Opiacés majeurs*

Ce sont les alcaloïdes naturels de l'opium et les dérivés semi-synthétiques de l'opium, les **analgésiques** de synthèse « majeurs », dont la prescription est réglementée (ordonnance sécurisée, règle des 7 j, des 14 j ou des 28 j). Ils font partie des **antalgiques de niveau III**.

**ANTALGIQUES USUELS (4) – PARACÉTAMOL (2) –  
PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antalgique périphérique et antipyrétique.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie au **paracétamol**.

Insuffisance hépatocellulaire.

**Grossesse** et **allaitement** : autorisé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'insuffisance rénale sévère, les prises doivent être espacées de 8 h.

En cas de régime désodé, tenir compte de l'apport de sel dans les comprimés effervescents (environ 400 mg de Na/cp.).

En cas de régime hypoglucidique, tenir compte de la présence de saccharose dans certains sachets de poudre.

**PERFALGAN** : éviter la voie centrale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares cas d'accidents allergiques : rashs cutanés avec érythème ou urticaire, nécessitant l'arrêt du traitement.

Rares cas d'anomalies biologiques hépatiques, hépatites exceptionnelles (surdosage).

Exceptionnels cas de thrombopénie.

Non liés au **paracétamol**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La prise de **paracétamol** peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (5)

## Modalités de prescription

Quelle que soit l'affection justifiant la prescription, et indépendamment des contre-indications spécifiques à chaque produit et des précautions rendues nécessaires par le patient et ses antécédents, un certain nombre de modalités se retrouvent ; en particulier une *hiérarchie d'utilisation* peut être suivie, de la douleur la plus modeste à la douleur la plus intense.

► *Antalgiques simples, aspirine et paracétamol*

Il est préférable de commencer par eux :

– sous l'une quelconque de leurs formes commerciales et galéniques orales, et de préférence aux repas ;

– en choisissant celle dont le patient a fait l'expérience préalable ou dont il pense (objectivement ou subjectivement) qu'elle lui donne de meilleurs résultats ;

– en privilégiant éventuellement certaines formes, comme par exemple, une **aspirine à délitement intestinal (ASPIRINE PH8 500 mg, ASPIRINE PROTECT 300 mg)** pour bénéficier d'une action maximale décalée de quelques heures après la prise ;

– en associant éventuellement **aspirine et paracétamol**.

Pour le **paracétamol** 500 mg (cp. ou gél.) nous suggérons le mode de prescription suivant :

- pour une poussée arthrosique « simple » : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h. (vers 8 h, vers 12 h, vers 16 h, vers 20 h) plus 1 ou 2 prises/j à la demande, si nécessaire ; pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée ;
- en dehors des poussées, 1 cp. ou gél. 1/2h avant une activité plus importante, et 1 cp. ou gél. après, si nécessaire.

► *Associations d'antalgiques et antalgiques de niveau II*

Lorsque la douleur est insuffisamment calmée par ces médicaments ou lorsque d'emblée on pense qu'elles ne suffiraient pas, il est légitime d'y associer, ou de prescrire exclusivement, une **association d'antalgiques** ou un **antalgique** de niveau II, à base de dérivés **opioïdes** faibles.

Ex. : **codéine + paracétamol (CODOLIPRANE, LINDILANE, DAFALGAN CODÉINE)**.

Ou **caféine + paracétamol (CLARADOL 500 CAFÉINE, LAMALINE (+ opium))**.

Ou **tramadol + paracétamol (IXPRIM, ZALDIAR)**, etc.

La prescription de médicaments à base de **tramadol** ne devrait que rarement être faite d'emblée, en particulier chez le sujet âgé en raison de certains effets indésirables (sommolence, vertiges, avec leur risque de chute).

► *Dérivés des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)*

Entre les deux catégories précédentes nous isolerons les analgésiques dérivés des **AINS**, qui sont, ou non, sur la liste II, selon le conditionnement.

• Soit dérivés de l'**ibuprofène** : **ADVIL**, ou **NUREFLEX**, ou **NUROFEN**.

• Soit dérivés du **kétoprofène** : **TOPREC**, etc.

Il ne faut pas les associer aux **AINS** pour ne pas potentialiser le risque gastroduodénal iatrogène, et il faut le dire expressément au patient.

Ces médicaments sont généralement prescrites pour une durée limitée, quelques jours à quelques semaines, mais parfois pour une durée très prolongée. Leurs effets secondaires éventuels doivent de ce fait être pris en considération lors de la prescription, qui doit rester particulière à un patient donné.

**ASSOCIATIONS D'ANTALGIQUES (1) – AVEC TRAMADOL****■ Tramadol + paracétamol**

<b>ZALDIAR</b>					
Traitement symptomatique des douleurs intenses à modérées ne répondant pas aux antalgiques périphériques utilisés seuls 1 à 2 cp. toutes les 4 à 6 h	20 cp. pell. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
	20 cp. efferv. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
<b>IXPRIM</b>					
Idem <b>ZALDIAR</b>	20 cp. pell. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
	20 cp. efferv. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Antalgique de palier II, qui permet d'agir sur 3 niveaux de la douleur : en périphérie par le **paracétamol**, sur les récepteurs opioïdes centraux et les récepteurs monoaminergiques par le **tramadol**.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs intenses à modérées ne répondant pas aux antalgiques périphériques utilisés seuls. Réservé à l'adulte.

Dans la douleur d'origine dentaire, il est apparu que cette association a une efficacité supérieure à celle de chacun des composants pris isolément ; la tolérance semble également meilleure que celle du **tramadol**, utilisé seul.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.  
Insuffisance rénale sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.

Chez le sujet âgé de plus de 75 ans, il est recommandé d'espacer les prises de 9 h.

En cas d'insuffisance rénale modérée (clairance entre 10 et 30 mL/min) : augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises, soit toutes les 12 h.

Dans les douleurs chroniques s'assurer, le cas échéant avec des pauses thérapeutiques, que la poursuite du traitement est nécessaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux du **tramadol**, surtout, et ceux du **paracétamol**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.



**DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (6)****► Opiacés majeurs [1]**

**Ils ont en rhumatologie**, hormis en cas de métastases osseuses de cancers, **des indications relativement limitées et brèves** :

– *jamais* dans les rhumatismes abarticulaires ;

– *presque jamais* dans les formes hyperalgiques des rhumatismes inflammatoires chroniques, dans les formes rebelles et inopérables de l'arthrose, et après avis préalable d'une consultation multidisciplinaire de la douleur ;

– *parfois* au cours des névralgies aiguës : dans certaines formes réellement hyperal-

giques de sciatique, dans les cruralgies et les névralgies cervico-brachiales, à l'acmé de la douleur, dans les premières semaines de leur évolution. Cette prescription est donc *a priori* limitée dans le temps et ne doit pas être négligée. Le choix du produit étant affaire d'habitude du prescripteur et de la tolérance éventuelle du patient. Il faut aussi tenir compte du risque de syndrome de sevrage.

La prescription de **morphiniques** au long cours, dont l'objectif est seulement de réduire l'intensité de la douleur, est exceptionnelle en rhumatologie, et doit suivre un certain nombre de règles (*cf. supra*).

**CONSENSUS**

[1] Mise au point du bon usage des opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses, Afssaps, 2004

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (1)

### Règles de prescription

Les médicaments anti-inflammatoires sont utilisées pour lutter contre les mécanismes de l'inflammation, qu'elle soit locale ou généralisée et quelle qu'en soit la cause. Elles appartiennent à des classes chimiques différentes :

- **anti-inflammatoires stéroïdiens**, représentés essentiellement par des **glucocorticoïdes** naturels qui sont des hormones surrénaliennes et les **glucocorticoïdes** synthétiques, beaucoup plus souvent utilisés ;

- **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, très nombreux : **dérivés pyrazoliques**, **dérivés arylcarboxyliques**, **dérivés indoliques**, **oxicams**, **fénamates**, etc., qui sont souvent dotés également d'une action analgésique périphérique et d'une action antipyrétique ; **coxibs** dont la toxicité digestive paraît moindre (cf. Mode d'action) ;
- **dérivés salicylés**, utilisés beaucoup plus pour leur action analgésique que pour leur action anti-inflammatoire, plus modeste ;
- autres médicaments utilisés pour leur effet anti-inflammatoire ; citons essentiellement la **colchicine**.

### Règles de bon usage des AINS (Afssaps 2006 [1])

#### AVANT DE PRESCRIRE

- **Évaluer le risque digestif en recherchant les facteurs de risque**

Notamment : antécédents de saignement digestif ou de perforation sous **AINS** ; antécédents d'ulcère gastro-duodénal ou d'hémorragie.

- **Évaluer le risque cardiovasculaire**. Les **AINS** peuvent entraîner :

- une rétention hydrosodée (risque en cas d'antécédents d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, d'œdèmes) ;
- une faible augmentation du risque thrombotique artériel.

En conséquence, les patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive, une cardiopathie ischémique avérée, une artériopathie périphérique et/ou une pathologie vasculaire cérébrale, ainsi que ceux présentant des facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension, hyperlipidémie, diabète, tabagisme, etc.), doivent faire l'objet d'une évaluation approfondie avant la prescription de tout **AINS**.

- **Évaluer le risque rénal**

Les **AINS** sont susceptibles d'induire une insuffisance rénale aiguë. Il convient donc d'être particulièrement attentif aux sujets traités par diurétiques, présentant un risque d'hypovolémie ou une altération préalable de la fonction rénale.

#### LORS DE LA PRESCRIPTION

*Le choix d'un **AINS** doit se faire en tenant compte de son profil de sécurité d'emploi (sur la base du Résumé des caractéristiques du produit) et des facteurs de risque individuels du patient.*

*Attention en cas de substitution d'un **AINS** par un autre.*

*Respecter les indications et la posologie*

*Les **AINS** doivent toujours être prescrits et utilisés à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus courte possible.*

La poursuite du traitement par **AINS**, y compris par un **coxib**, ne se justifie pas, en dehors des manifestations symptomatiques d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde.

- Respecter les contre-indications et les précautions d'emploi
- Prendre en compte le risque d'interaction médicamenteuse

#### SURVEILLANCE DU TRAITEMENT

- Rechercher les effets indésirables, en particulier digestifs
- Être attentif aux éventuelles manifestations cutanées

### CONSENSUS

[1] Rappel des règles de bon usage des AINS, Afssaps, 2006

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (1) – ARYLCARBOXYLIQUES (1)

### ■ Kétoprofène

<b>PROFÉNID</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 100 à 300 mg/j <b>PROFÉNID LP</b> 200 mg Idem <b>PROFÉNID</b>	20 gél. 50 mg	2,65	II	65 %	0,13
	30 cp. 100 mg	6,93	II	65 %	0,23
	12 sup. 100 mg	3,62	II	30 %	0,30
	6 amp. 100 mg pour IM	5,77	II	30 %	0,96
	14 cp. LP 200 mg	8,05	II	65 %	0,58
	14 gél. LP 200 mg	8,46	II	65 %	0,60
<b>TOPREC</b>					
1 à 3 cp./j	20 cp. 25 mg	3,19		65 %	0,16
	1 fl. 150 mL (1 mg/ mL)	2,77	II	65 %	2,77
<b>KÉTUM</b>					
100 à 300 mg/j	30 cp. 100 mg	4,45	II	65 %	0,15
	14 gél. LP 200 mg	5,20	II	65 %	0,37
<b>BI-PROFÉNID LP</b>					
1 à 2 cp./j	20 cp. LP 100 mg	5,19	II	65 %	0,26
	100 cp. LP 100 mg	HOP	II		
<b>PROFEMIGR</b>					
1 cp./j	10 cp. 150 mg	3,72	II	65 %	0,37
	100 cp. 150 mg		II	NR	

### ■ Diclofénac

<b>VOLTARÈNE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques Poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables : 75 à 150 mg/j	30 cp. 25 mg	2,32	II	65 %	0,08
	30 cp. 50 mg	4,67	II	65 %	0,16
	10 sup. 100 mg	3,20	II	30 %	0,32
	2 amp. 75 mg	1,65	II	30 %	0,83
<b>VOLTARÈNE LP</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b>	30 cp. 75 mg	8,57	II	65 %	0,29
	15 cp. 100 mg	5,70	II	65 %	0,38
<b>FLECTOR</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b>	21 sach.-dose 50 mg	3,80	II	65 %	0,18

### ■ Acéclofénac

<b>CARTREX</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b> 100 à 200 mg/j	30 cp. 100 mg	5,53	II	65 %	0,18

### ■ Diclofénac + misoprostol

<b>ARTOTEC</b>					
Traitement symptomatique des affections rhumatismales chez les patients à risque Posologie variable : 50 à 150 mg/j Traitement des poussées aiguës, limité à 10 j : 2 cp./j	30 cp. diclofénac 50 mg + misoprostol 0,2 mg	8,78	I	15 %	0,29
	20 cp. diclofénac 75 mg + misoprostol 0,2 mg	6,86	I	15 %	0,34

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (2)

### Principaux effets indésirables

ORGANE	EFFETS INDÉSIRABLES	SUJETS à RISQUE	PRÉCAUTIONS
Tube digestif	Nausées, épigastralgies Douleurs abdominales, diarrhées Ulcère gastrique ou duodénal Hémorragies digestives Perforations digestives	Sujets de plus de 65 ans Antécédents d'ulcère, de gastrite ou d'intolérance préalable ; tabagisme Ulcère et perforation peuvent se produire à n'importe quel moment, <b>sans signe avant-coureur</b>	<b>Antiacides</b> ou traitement protecteur ( <b>misoprostol, inhibiteurs de la pompe à protons</b> )
Reins	Insuffisance rénale fonctionnelle Néphropathie interstitielle Syndrome néphrotique Rétention hydrosodée, hyponatrémie, hypokaliémie Aggravation d'une HTA	Sujets âgés, déshydratés  Traitements associés : <b>diurétiques, IEC</b>	Surveillance de la fonction rénale
Bronches	Asthme, bronchospasme	Antécédents d'asthme à l' <b>aspirine</b>	Interrogatoire
Système nerveux	Acouphènes, surdité Céphalées, vertiges	<b>Aspirine</b> à dose toxique <b>INDOCID</b>	Interrogatoire
Peau	Réactions allergiques prurigineuses Purpura vasculaire, syndromes de Lyell, de Stevens-Johnson, érythème polymorphe	Banales  Graves	
Hématologie	Agranulocytose, thrombopénie, anémie, voire aplasie médullaire	<b>Phénylbutazone</b>	Indications, posologie, durée limitées (8 j) Au cours des traitements prolongés, contrôler la formule sanguine
	Troubles de la crase sanguine	Traitements associés	Compte tenu d'un effet antiagrégant plaquettaire durable, prévenir le patient des risques hémorragiques pouvant survenir en cas de geste chirurgical, même mineur <b>Il est parfois conseillé d'arrêter un traitement AINS plusieurs jours avant une intervention chirurgicale</b>
Foie	Élévation banale des transaminases hépatite cytolytique, cholestatique, ou mixte		Surveillance biologique ALAT, ASAT, GGT, phosphatases alcalines

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (2) – ARYLCARBOXYLIQUES (2)

### ■ Naproxène

<b>NAPROSYNE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables : 500 à 1 000 mg/j	10 cp. 250 mg	1,95	II	65 %	0,20
	10 cp. 500 mg	3,59	II	65 %	0,36
	8 cp. 1 g	4,25	II	65 %	0,53
	12 sup. 500 mg	4,26	II	30 %	0,36
<b>APRANAX</b>					
Idem <b>NAPROSYNE</b>	30 cp. 275 mg	4,38	II	65 %	0,15
	15 cp. 750 mg	6,16	II	65 %	0,41
	16 cp. séc. 550 mg	3,64	II	65 %	0,23

### ■ Ibuprofène

<b>ADVIL</b>					
200 à 1 200 mg/j	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
	20 cp. 400 mg			NR	
<b>UPFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
<b>NUREFLEX</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 cp. 200 mg	2,46		65 %	0,08
	20 cp. 400 mg	2,91		65 %	0,15
<b>NUREFLEX LP</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 gél. 300 mg	4,04		65 %	0,13
<b>SPIFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 cp. 200 mg	2,39	II	65 %	0,08
	20 cp. 400 mg	2,91	II	65 %	0,15
	20 sach. 400 mg	3,24	II	65 %	0,16
<b>INTRALGIS</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
<b>SPEDIFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	16 cp. 200 mg			NR	
	20 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	12 sach. 400 mg			NR	
<b>NUROFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	10 caps. 400 mg			NR	
<b>NUROFENFLASH</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	12 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	10 sach. 400 mg			NR	

**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (3)****Indications**

Tous les syndromes comportant une inflammation, localisée ou généralisée :

- aiguë : la prescription sera alors relativement brève ;
- chronique : ils sont alors souvent utilisés à la dose minimale active, associés ou non à un traitement « de fond » de l'inflammation.

Ils ont souvent aussi une action antalgique propre, une action inhibitrice sur l'agrégation plaquettaire (sauf les **coxibs**).

**Mode d'action**

L'inhibition des prostaglandines et des leucotriènes est à la base de leur action anti-inflammatoire, mais aussi de certains de leurs effets indésirables. L'effet anti-inflammatoire des **AINS** « classiques » s'explique par le blocage de la cyclo-oxygénase 2 (COX 2) qui s'oppose à l'action pro-inflammatoire des prostaglandines. Malheureusement, ils inhibent en même temps la cyclo-oxygénase 1 (COX 1) qui exerce au contraire une action cytoprotectrice digestive.

La dernière famille d'**AINS** (dits « coxibs ») agit sélectivement sur la cyclo-oxygénase 2, ne bloquant que l'action pro-inflammatoire des prostaglandines.

**Absorption**

Pour la plupart, ils sont absorbés par la muqueuse intestinale (voie orale ou rectale) ; ceux qui sont injectables par voie IM sont directement acheminés vers le foie.

Ils se distribuent à tout l'organisme et en particulier aux nerfs, aux séreuses, et aux organes glandulaires (digestifs).

Certains traversent la barrière placentaire, ce qui explique que la grossesse représente une contre-indication habituelle.

Métabolisés par le foie, ils sont éliminés par les reins ; leur demi-vie est variable : 6 à 72 h, selon le produit.

**Effets indésirables**

Certains sont particuliers à chaque famille, d'autres sont communs à toutes les familles chimiques.

C'est le cas de la toxicité gastrique, d'autant plus grande que l'action anti-inflammatoire est importante et peut justifier l'emploi de protecteurs gastriques ; la toxicité gastrique est augmentée chez le sujet âgé, les sujets tabagiques, et le risque hémorragique doit être constamment présent à l'esprit.

La toxicité existe quelle que soit la voie d'introduction dans l'organisme.

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (3) – ARYLCARBOXYLIQUES (3)

### ■ Flurbiprofène

<b>CEBUTID</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 100 à 300 mg/j Proposé comme antiagrégant plaquettaire à demi-vie courte (relais <b>aspirine</b> ou <b>clopidogrel</b> ) : 50 mg/j en 2 prises <b>CEBUTID LP 200 mg</b> Idem <b>CEBUTID</b>	30 cp. 50 mg	3,60	II	65 %	0,12
	15 cp. 100 mg	3,60	II	65 %	0,24
	16 gél. LP 200 mg	7,35	II	65 %	0,46
<b>ANTADYS</b>					
1 cp. 1 à 3/j	15 cp. 100 mg	3,32	II	65 %	0,22

### ■ Étodolac

<b>LODINE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 200 à 400 mg/j	30 cp. 200 mg	7,05	II	65 %	0,24
	20 cp. 300 mg	6,72	II	65 %	0,34

### ■ Acide tiaprofénique

<b>SURGAM</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques, poussées d'arthrose, lombalgies, règles douloureuses et traitement d'appoint dans les phénomènes inflammatoires de la sphère ORL A. : dose d'attaque 200 mg x 3/j puis 300-400 mg/j à répartir en plusieurs prises E. : 10 mg/kg/j à répartir en 2 ou 3 prises	30 cp. séc. 100 mg	3,50	II	65 %	0,12
	15 cp. séc. 200 mg	3,60	II	65 %	0,24

### ■ Dexkétoprofène

<b>KÉTESSE</b>					
Douleur d'intensité légère à modérée (douleurs dentaires, dysménorrhées) : 12,5 mg x 4 à 6/j ou 25 mg x 1 à 3/j PO Douleur d'intensité modérée à sévère (post-opératoire, colique néphrétique, lombalgie) si voie orale inadaptée : 50 mg x 2 à 3/j IM ou IV	20 cp. 12,5 mg	HOP	II	NR	
	20 cp. 25 mg		II	NR	
	6 amp. 50 mg/2 mL		II		

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (4)

### Modalités de prescription

Dans les affections aiguës un certain nombre de modalités communes se retrouvent.

La posologie initiale peut être maximale, dite « d'attaque », et après 2 j on prescrira une dose moins élevée mais suffisante. Ni la dose, ni la durée, ne peuvent être fixées d'avance, car elles dépendent de l'évolution et de la tolérance.

Dans tous les cas :

- respect des contre-indications classiques ;
- ne pas associer 2 AINS ;
- ne pas associer un AINS et un antalgique dérivé des AINS (*ADVIL*, *NUROFEN*, *TOPREC*, etc.) ;
- prendre des précautions en fonction du patient et de ses antécédents.

### Choix du produit

On ne peut définir de hiérarchie précise entre les différents anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'essentiel étant d'obtenir un équilibre entre l'efficacité et la tolérance. Le choix du produit est guidé par :

- une préférence du patient (intolérance ou efficacité lors d'une prescription préalable) ;
- la chronopharmacologie : les **oxicams** se prescrivent en 1 seule prise quotidienne, ce qui est plus simple chez un sujet polymédicamenté, mais ils ont une demi-vie prolongée, ce qui constitue plutôt un inconvénient chez le sujet âgé ;
- des propriétés particulières : risque de vertiges et de céphalées plus grand avec l'**INDOCID**, risque hématologique avec la **phénylbutazone** (qui n'est plus commercialisée).

À titre d'exemple on prescrira :

- **FELDÈNE** : 20 mg : 1 gél. ou 1 cp. dispersible, x 1 ou 2/j pendant 2 j, puis 1/j pendant 4 à 8 j ; ou un autre **oxicam** de la même façon : **BREXIN**, **CYCLADOL**, **TILCOTIL**, **MOBIC** 15 mg, ou un générique ;
- ou pendant les 2 à 6 premiers j, **VOLTARÈNE**, 50 mg, ou **CEBUTID**, 100 mg, ou un générique : 1 cp. aux 3 repas, ou **PROFÉNID**, 100 mg, ou **NAPROSYNE** 500 mg, ou **APRANAX** 550 mg : 1 cp. matin et soir aux repas. Une dose moindre sera ensuite prescrite chaque fois que possible.



**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (4) –  
ARYLCARBOXYLIQUES (4) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique.  
Action inhibitrice sur la synthèse des prostaglandines, et sur l'agrégation plaquettaire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, et de certaines arthroses ; traitement de courte durée de poussées de rhumatisme abarticulaire, d'arthrite microcristalline, d'arthrose, de lombalgies, de cervicalgies, de radiculalgies sévères.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles des **AINS** en général, plus :  
– **grossesse** : à partir du 6<sup>e</sup> mois ;

– **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles des **AINS** en général, celles liées à la forme galénique.

Au cours des traitements prolongés, contrôler la formule sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux des **AINS** en général.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles des **AINS** en général, et en particulier le **méthotrexate** à dose supérieure à 15 mg/sem. Pour le **naproxène** : interférence possible avec le dosage urinaire des 17-cétostéroïdes et de l'acide 5-hydroxy-indolacétique (cesser l'administration 48 h avant le dosage).

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (5)

### Principales interactions médicamenteuses\*

ASSOCIATION	RISQUE DE L'INTERACTION	PRÉCAUTIONS
+ autres <b>AINS</b> , + <b>antalgiques dérivés des AINS</b>	Augmentation du risque ulcérogène et hémorragique digestif	Association déconseillée <b>BPC</b>
+ <b>aspirine</b>	Risque hémorragique	Déconseillé si > 0,5 g/j <b>BPC</b>
+ anticoagulants oraux	Augmentation du risque hémorragique	Si Tt indispensable, adaptation des <b>AVK</b> à TP, INR
+ <b>héparines</b>	Augmentation du risque hémorragique	Si Tt indispensable, surveillance clinique et biologique pour les <b>héparines non fractionnées</b>
+ diurétiques	Insuffisance rénale aiguë si sujet déshydraté	Hydratation, surveillance de la fonction rénale (au début surtout)
+ <b>inhibiteurs de l'enzyme de conversion</b>	Insuffisance rénale aiguë si sujet déshydraté Diminution de l'effet antihypertenseur	Éviter l'association Si traitement indispensable, hydratation, surveillance de la fonction rénale (au début surtout)
+ <b>β-bloquants</b>	Réduction de l'effet antihypertenseur	À prendre en compte
+ <b>ticlopidine</b>	Risque hémorragique	Éviter l'association
+ <b>pentoxifylline</b>	Risque hémorragique	Surveillance clinique, contrôle TS
+ <b>lithium</b>	Surdosage	Déconseillé ou contrôle de la lithémie
+ <b>méthotrexate</b> à dose élevée (> 20 mg/sem., cancérologie)	Toxicité hématologique accrue (association contre-indiquée pour <b>phénylbutazone</b> , déconseillée pour <b>kétoprofène</b> )	Contre-indication (mais pas en rhumatologie : doses faibles, d'où simple surveillance biologique)
+ <b>ciclosporine</b>	Addition des effets néphrotoxiques, sujet âgé surtout	À prendre en compte
+ <b>zidovudine</b>	Toxicité hématologique (réticulocytes)	NFS et réticulocytes 8 et 15 j après le début du traitement
+ <b>sulfamides hypoglycémiantes</b>	Risque d'hypoglycémie avec les pyrazolés	Éviter l'association
+ stérilet	Risque de grossesse par inefficacité	Prévenir la patiente

\* Certains **AINS** ont en outre des interactions médicamenteuses propres, qui sont signalées avec chacun des produits.

## CORTICOTHÉRAPIE GÉNÉRALE (1)

### Classification

À côté des **glucocorticoïdes** naturels (cortisol et cortisone), un certain nombre de produits de synthèse ont été préparés avec pour but principal l'augmentation de l'activité anti-inflammatoire.

Ainsi on a pu synthétiser :

– la **prednisone** ou delta-cortisone (**CORTANCYL**) et la **prednisolone** (**SOLUPRED**) dont

l'effet anti-inflammatoire est quatre fois supérieur à celui de l'**hydrocortisone** ;

– une action anti-inflammatoire encore plus puissante est obtenue avec : **méthylprednisolone** (**MÉDROL**, **DÉPO-MÉDROL**), **dexaméthasone** (**DECTANCYL**), **bétaméthasone** (**BETNESOL**, **CÉLESTÈNE**), **triamcinolone** (**KENACORT RETARD**, **HEXATRIONE**), **cortivazol** (**ALTIM**), pour ne citer que les plus couramment utilisés.

Le **CORTANCYL** reste le produit de référence.

Hormone	Dose équivalente (mg)	Puissance anti-inflammatoire	Puissance minéralo-corticoïde	Durée d'action moyenne (heures)
Cortisol (hydrocortisone)	20	1	1	8
Cortisone	25	0,8	1	8
Prednisone	5	4	0,8	8
Prednisolone	5	4	0,8	24
Méthylprednisolone	4	0,5	0,5	36
Dexaméthasone Bétaméthasone	0,75	25	0	72

### Utilisation

#### Voie orale

L'utilisation en tant qu'agent anti-inflammatoire de ces produits se fait essentiellement par voie orale.

D'une façon générale, il existe entre les différentes préparations commercialisées une correspondance approximative : l'action anti-inflammatoire d'un comprimé de **CORTANCYL** à 5 mg correspond approximativement à celle d'un comprimé de **MÉDROL** à 4 mg, etc.

La dose anti-inflammatoire varie en fonction de chaque cas, et se situe en moyenne entre 10 et 30 mg/j de **prednisone**.

#### Assaut cortisonique, ou « bolus »

C'est une méthode réservée à des cas très particuliers, en milieu hospitalier spécialisé : formes graves de rhumatismes inflammatoires chroniques, de maladies systémiques, formes pouvant mettre en

jeu le pronostic vital. Elle consiste à administrer une dose très élevée d'un **corticoïde**, par exemple 300 à 1 000 mg de **SOLUMÉDROL**, en perfusion dans 250 mL de sérum physiologique, pendant 3 h, 3 j de suite.

Un bilan cardiovasculaire préalable est indispensable, ainsi qu'une surveillance rigoureuse.

#### Mécanisme d'action

Action anti-inflammatoire.

Effet immunodépresseur ou immunomodulateur.

Action hyperglycémiante.

Négativation du bilan azoté par augmentation du catabolisme protéique, responsable entre autres d'arrêt de la croissance, d'atrophie musculaire et d'ostéoporose.

Diminution de l'absorption intestinale du calcium, contribuant aussi à l'ostéoporose.

Rétention de  $\text{Na}^+$  et excrétion du  $\text{K}^+$ .

Action ulcérogène gastrique, etc.

## CORTICOÏDES PAR VOIE ORALE (1)

## ■ Prednisone

<b>CORTANCYL</b>					
Rhumatismes inflammatoires Posologie variable	30 cp. 1 mg	1,88	I	65 %	0,06
	30 cp. séc. 5 mg	2,61	I	65 %	0,09
	20 cp. séc. 20 mg	3,98	I	65 %	0,20
	100 cp. 20 mg	HOP	I		

## ■ Prednisolone

<b>SOLUPRED</b>					
Idem <b>CORTANCYL</b>	30 cp. efferv. 5 mg	3,22	I	65 %	0,11
	30 cp. orod. 5 mg	3,22	I	65 %	0,11
	50 cp. orod. 5 mg	HOP	I		
	20 cp. efferv. 20 mg	4,88	I	65 %	0,24
	20 cp. orod. 20 mg	4,84	I	65 %	0,24
	50 cp. orod. 20 mg	HOP	I		
	1 mL sol. buv. 1 mg/mL	5,15	I	65 %	5,15

## ■ Méthylprednisolone

<b>MÉDROL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 4 mg	30 cp. séc. 4 mg	3,38	I	65 %	0,11
	100 cp. séc. 4 mg	HOP	I		
	20 cp. séc. 16 mg	5,73	I	65 %	0,29
	100 cp. séc. 16 mg	HOP	I		
	100 cp. séc. 32 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 100 mg	40,04	I	65 %	1,33

## ■ Dexaméthasone

<b>DECTANCYL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	30 cp. séc. 0,5 mg	4,76	I	65 %	0,16

## ■ Bétaméthasone

<b>BETNESOL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	30 cp. efferv. 0,5 mg	2,82	I	65 %	0,09

<b>CÉLESTÈNE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	1200 mL (fl. sol. buv. 40 gtt = 1 mL = 0,5 mg)	3,85	I	65 %	0,00
	20 cp. disp. séc. 3 mg	3,99	I	65 %	0,20

## CORTICOTHÉRAPIE GÉNÉRALE (2)

### Effets indésirables

Ils sont très nombreux.

#### Accidents de surcharge hormonale

Ils sont liés à la durée prolongée ou à la dose élevée nécessaire au traitement : syndrome cushingoïde, rétention sodée, hypokaliémie, diabète, ostéoporose et amyotrophie.

La prévention de l'ostéoporose induite par la corticothérapie est importante (cf. Ostéoporose).

#### Accidents liés au « terrain »

Ils ne sont pas nécessairement proportionnels à la posologie et à la prolongation du traitement : accidents digestifs, accidents psychiques : états d'agitation, syndromes maniaques, psychoses hallucinatoires ou obsessionnelles, accidents oculaires, ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, etc.

#### Surinfections

Réveil d'une tuberculose ancienne, qui doit particulièrement être redouté et surveillé, plus encore chez le sujet âgé ; surinfection à germes banals, assez fréquente, nécessitant alors une antibiothérapie ; mycoses généralisées, aggravation d'une maladie virale (varicelle), sont plus à craindre si la corticothérapie est prescrite dans une hémopathie.

#### Accidents de blocage hypophyso-surrénalien

Le rétrocontrôle surrénalien est très fréquent pour peu que le traitement soit supérieur à 20 mg/j de **CORTANCYL** et prolongé plus de 3 sem. Habituellement, l'insuffisance surrénale est spontanément régressive à l'arrêt du traitement ; il est de règle, pour éviter les phénomènes de rebond et la décompensation de l'insuffisance surrénale, lorsqu'on décide d'arrêter une corticothérapie prolongée, de baisser les doses par paliers : 5 à 10 mg toutes les 1 à 2 sem., puis 1 mg par 1 mg, au-dessous de 10 mg. Cette baisse progressive vise surtout à éviter le rebond de la maladie plutôt que l'insuffisance surrénale. En effet, une corticothérapie peut être, si nécessaire, arrêtée brusquement sous couvert d'une prescription temporaire d'**hydrocortisone** (10 à 30 mg/j) pendant quelques jours.

Les règles d'utilisation des **glucocorticoïdes** doivent être strictes : le moins souvent possible, aux doses les moins élevées possibles, et à condition d'avoir éliminé une contre-indication.

**Contre-indications impératives** : hypertension artérielle sévère et non contrôlée, diabète décompensé, psychopathie aiguë, infection qui ne serait pas « couverte » par une antibiothérapie efficace.

**Contre-indications relatives**, en fonction du rapport risque/bénéfice : antécédent d'ulcère gastroduodénal, insuffisance rénale, thrombose vasculaire par exemple.

## CORTICOTHÉRAPIE LOCALE – INFILTRATIONS (1)

### Indications

Traitement, complémentaire ou principal, localisé, de l'atteinte articulaire des rhumatismes inflammatoires, de l'arthrose, de la pathologie péri-articulaire, des névralgies d'origine disco-rachidienne.

### Risques et effets secondaires

#### Effets généraux

Cette voie d'introduction des corticoïdes (infiltrations locales juxta-articulaires, injections intra-articulaires) comporte les mêmes risques que ceux de la voie orale. La répétition des injections réalise une véritable corticothérapie parentérale.

Parmi les effets métaboliques, le plus fréquent est l'effet diabétogène :

- chez un diabétique insuliné, il oblige parfois à augmenter les doses d'insuline (jusqu'à les doubler) ;
- chez un diabétique traité par **hypoglycémifiants oraux**, il peut obliger à traiter le patient par insuline transitoirement et parfois définitivement ;
- chez un sujet prédisposé, la corticothérapie locale peut déclencher un diabète (une seule injection peut suffire).

#### Risque de choc anaphylactique

Cette situation, exceptionnelle mais potentiellement grave, est à traiter par :

- injection d'**adrénaline (ANAPHEL)**, 1 ampoule-seringue de 1 mL (1 mg/mL) en SC ou en IM, à la face antéro-externe de la cuisse ;
- oxygénothérapie ;
- appel au service d'urgence compétent.

### Complications locales

Ce sont les plus fréquentes, peu graves habituellement, mais obérées par le risque infectieux qui représente en réalité une complication.

Une **réaction douloureuse** dans les toutes premières heures suivant l'infiltration n'est pas exceptionnelle (1 fois sur 10 environ) ; brève, elle ne dure guère plus de 48 h et ne s'accompagne pas de fièvre. Elle est le fait d'une réaction inflammatoire aux produits injectés sous forme de suspension de microcristaux de corticoïde. La prescription d'un **antalgique** peut être utile, celle d'un **AINS** exceptionnelle.

Toute recrudescence douloureuse plus tardive, *a fortiori* en contexte fébrile, doit évoquer une **arthrite septique**, ce qui impose : d'abord une ponction articulaire, avec prélèvement du liquide pour culture, puis un traitement adapté rapide.

L'**infection articulaire** expose à des séquelles fonctionnelles ; le risque est majoré par l'emploi de corticoïdes.

Une atrophie du tissu cellulaire et graisseux sous-cutané est possible au lieu même de l'injection et semble le fait de certains produits ou d'injections répétées.

On a accusé les injections locales de corticoïdes de fragiliser les tendons et de les exposer à la rupture. L'injection intratendineuse est proscrite.

## CORTICOÏDES INJECTABLES PAR VOIE LOCALE (1)

## ■ Prednisolone

<b>HYDROCORTANCYL</b>					
Voie locale Indications : celles de la corticothérapie générale Injection intra-articulaire : 0,5 à 2 mL Injection péri-articulaire : 0,5 à 2 mL Injection épidurale ou intrarachidienne : 75 à 125 mg	1 fl. 5 mL susp. inj. 25 mg/mL	3,87	I	65 %	3,87

## ■ Cortivazol

<b>ALTIM</b>					
0,5 à 1,5 mL/inj. (renouvelable après 1 à 3 sem.)	1 ser. 1,5 mL	5,42	I	65 %	5,42

## ■ Bétaméthasone

<b>BETNESOL</b>					
Corticothérapie locale (voies intra- et péri-articulaires) : 1/4 à 1 mL, tous les 3 à 21 j	3 amp. inj. 4 mg/mL	2,97	I	65 %	0,99
<b>CÉLESTÈNE</b>					
Corticothérapie locale (voies intra- et péri-articulaires) : 1/2 à 1 amp. Voies intradurale contre-indiquée, et péri-durale déconseillée	3 amp. inj. 4 mg/mL	4,48	I	65 %	1,49
<b>DIPROSTÈNE</b>					
0,5 à 1 mL	1 inj. 5 mg/ mL	5,47	I	65 %	5,47

## ■ Méthylprednisolone

<b>DÉPO-MÉDROL</b>					
Voies péri-articulaires : 10 à 40 mg, renouvelables tous les 7 à 10 j Voies intra-articulaires : 4 à 80 mg, toutes les 2 sem., puis espacer	1 ser. 1 mL/40 mg 1 ser. 1 mL/50 mg 1 ser. 2 mL/80 mg	2,47 HOP HOP	I I I	65 %	2,47

## ■ Triamcinolone

<b>HEXATRIONE</b>					
Voie intra-articulaire : 0,5 à 2 mL x 1/mois	1 amp. 2 mL/40 mg	14,10	I	65 %	14,10
<b>KENACORT RETARD</b>					
Idem <b>HEXATRIONE</b>	1 ser. 1 mL/40 mg 1 ser. 2 mL/80 mg	2,84 4,79	I I	65 % 65 %	2,84 4,79

## CORTICOTHÉRAPIE LOCALE – INFILTRATIONS (2)

### Précautions à prendre

#### Précautions générales

Pas d'injection intra-articulaire sans radiographie de l'articulation à infiltrer.

Pas d'infiltration sans avoir éliminé une arthrite infectieuse, y compris tuberculeuse.

Pas d'infiltration pendant une infection en évolution (angine, bronchite, sinusite, etc.). Certains s'assurent par une mesure préalable de la CRP ou des facteurs de la coagulation de l'absence de syndrome inflammatoire associé ou d'un risque hémorragique, cliniquement inattendu.

Peser les avantages chez les sujets à risques (diabète, sujets sous anticoagulants, etc.).

En cas d'injection épidurale, l'arrêt préalable de la prise d'**aspirine** ou d'**antiagrégants plaquettaires** est conseillé.

#### Précautions locales : aseptie stricte

Désinfection large de la surface cutanée autour du point d'injection préalablement marqué à l'ongle, point d'injection que l'opérateur ne touchera plus.

Désinfectant efficace, coloré (alcool iodé, **BÉTADINE**) ou même incolore pourvu qu'il soit efficace (**SEPTÉAL** ou autres solutions de **chlorhexidine** à 0,5 %, etc. ; attention, certaines solutions dosées à 0,05 % sont insuffisantes).

Désinfectant appliqué avec une compresse stérile.

L'emploi de gants stériles est recommandé par certains, mais il n'est pas obligatoire si la désinfection des mains est faite très soigneusement (lavage au savon, alcool).

### Résultats

L'effet bénéfique commence, pour les suspensions, selon les produits entre la 6<sup>e</sup> et la 24<sup>e</sup> h après l'infiltration.

Il peut être retardé, et son inefficacité s'apprécie après la première semaine.

L'effet bénéfique est plus rapide pour les produits hydrosolubles.

### Produits

Le médecin a le choix entre les dérivés cortisoniques soit sous forme soluble, soit sous forme de suspension.

En principe et en règle générale, les dérivés sous forme de suspension sont moins rapidement absorbés et par conséquent d'efficacité souvent plus prolongée que les dérivés solubles.

#### Produits sous forme de suspension

• **Cortivazol** : **ALTIM**, amp.-seringue de 1,5 mL, dosée à 3,75 mg de **cortivazol**.

• **Bétaméthasone** : **DIPROSTÈNE**, seringue préremplie de 1 mL, dosée à 5 + 2 mg de **bétaméthasone**.

• **Méthylprednisolone** : **DÉPO-MÉDROL**, amp.-seringue de 1 mL dosée à 40 mg, ou amp.-seringue de 2 mL, dosée à 80 mg de **méthylprednisolone**.

• La présentation en ampoule-seringue limite encore le risque septique.

• **Triamcinolone** : **HEXATRIONE**, amp. de 2 mL, dosée à 40 mg d'**hexacétone de triamcinolone** ou **KENACORT RETARD**, flacon de 1 mL dosé à 40 mg et de 2 mL dosé à 80 mg de **triamcinolone** (avec seringue et aiguilles).

• **Prednisolone** : **HYDROCORTANCYL** en flacon de 5 mL dosé à 125 mg de **prednisolone**.

#### Produits hydrosolubles

• **Bétaméthasone** : **BETNESOL** injectable (amp. de 1 mL dosée à 4 mg de **bétaméthasone**).

• **Bétaméthasone** : **CÉLÈSTÈNE** injectable (amp. de 1 mL dosée à 4 mg, amp. de 2 mL dosée à 8 mg de **bétaméthasone**, avec seringue et aiguilles).

#### Anesthésique local

Avant de réaliser une infiltration péri-articulaire il est parfois utile d'utiliser un **anesthésique local** ; ou, dans certains cas, de le mélanger au dérivé corticoïde. Par exemple : **lidocaïne (XYLOCAÏNE)** à 1 % (flacon de 20 mL), en l'absence d'allergie connue. Certains utilisent avant l'injection un patch cutané anesthésique.



## CORTICOÏDES INJECTABLES PAR VOIE LOCALE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Anti-inflammatoires stéroïdiens d'action puissante et rapide.

### INDICATIONS

Injection intra-articulaire : arthrite inflammatoire, arthrose en poussées.

Injection dans les parties molles : talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : pas de contre-indication pour un traitement local occasionnel.

**Allaitement** : déconseillé pendant le traitement.

Infection bactérienne ou mycosique non contrôlée par un traitement spécifique.

Certaines infections virales en évolution, notamment varicelle, herpès et zona à manifestations oculaires.

Goutte.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

États psychotiques.

Cirrhose alcoolique avec ascite.

Hépatites aiguës à virus A, B ou non A - non B. Hypersensibilité à l'un des composants.

Toute affection cutanée évolutive au niveau du point d'injection est une contre-indication à la forme injectable.

**CÉLESTÈNE** : injection intradurale contre-indiquée et injection périurale déconseillée compte tenu du risque de brèche.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'injection doit être faite en peau saine.

Nécessité d'une asepsie rigoureuse.

La corticothérapie peut favoriser la survenue de complications infectieuses.

L'attention des sportifs est attirée sur la possibilité de réaction positive aux tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Certains ne concernent que des injections répétées, d'autres peuvent suivre 1 seule injection.

Rares cas de réactions d'hypersensibilité :

- vasodilatation périphérique ;
- lombalgies transitoires ;

– exceptionnellement œdème de Quincke, choc anaphylactique.

- Effets indésirables propres à la voie locale :
  - propres à la voie d'administration : arthrites septiques et infections, périurites et méningites, bursite septique, abcès ;
  - propres au corticoïde injecté : atrophie localisée des tissus musculaires, sous-cutanés et cutanés ; risque de rupture tendineuse.
- Désordres hydroélectrolytiques : Hypokaliémie, alcalose hypokaliémique, rétention hydrosodée avec parfois hypertension artérielle, voire insuffisance cardiaque congestive.
- Troubles endocriniens et métaboliques : Syndrome de Cushing iatrogène ; inertie de la sécrétion d'ACTH parfois définitive ; atrophie corticosurrénale, parfois définitive ; diminution réversible de la tolérance au glucose ; manifestation d'un diabète sucré latent ; balance azotée négative due au catabolisme protidique ; arrêt de la croissance chez l'enfant ; prise de poids ; parfois irrégularités menstruelles ; hirsutisme.

Le risque de déséquilibre d'un diabète connu est à prendre en compte systématiquement.

- Troubles musculo-squelettiques : Atrophie musculaire ; ostéoporose, avec parfois tassements vertébraux ; ostéonécrose aseptique des têtes fémorales ; ruptures tendineuses.
- Troubles digestifs : Ulcères gastroduodénaux, hémorragies ulcéreuses, perforation d'ulcère, ulcérations du grêle.
- Troubles cutanés : Atrophie cutanée, retard de cicatrisation, purpura, ecchymoses, acné surtout dorsale, hypertrichose.
- Troubles neuropsychiques : Surexcitation avec euphorie et troubles du sommeil ; rarement : accès d'allure maniaque ; états confusionnels ou confuso-oniriques ; possibilité de convulsions.
- Troubles oculaires : Certaines formes de glaucome et de cataracte.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Elles ne concernent que les corticothérapies prolongées, donc *a priori* pas les injections locales de corticoïdes, pour un usage habituel.

**CORTICOTHÉRAPIE LOCALE – INFILTRATIONS (3)****Technique**

Nous envisageons exclusivement les injections intra- ou péri-articulaires d'abord facile qui peuvent être réalisées au cabinet du médecin.

**Infiltration de l'épaule****► Voie péri-articulaire**

Elle se fait par voie sous-acromiale externe ou postéro-externe, destinée à injecter dans la bourse séreuse sous-acromio-deltôïdienne.

Il faut utiliser une aiguille fine de calibre 21G, soit 0,8 mm, et de 50 mm de long.

Le point d'injection se fait au-dessous du bord externe de l'acromion ou de son bord postérieur de manière à ce que l'aiguille glisse entre la tête humérale en bas et la face inférieure de l'acromion en haut. La quantité injectée sera de 1 à 1,5 mL.

L'indication majeure est la périarthrite scapulohumérale (tendinite du sus-épineux).

**► Voie intra-articulaire**

Elle se fait par voie antérieure.

On enfonce l'aiguille perpendiculairement à la peau en un point situé à un travers de doigt en dedans et en dessous du bord externe de l'acromion ; en faisant effectuer des mouvements de rotation de l'épaule, le doigt de l'opérateur palpe parfaitement l'interligne.

Il est préférable de disposer d'une aiguille à biseau court, de calibre 21G, soit 0,8 mm, et de 50 mm de long.

L'injection est de 1 à 1,5 mL.

Les indications majeures, limitées, sont la polyarthrite rhumatoïde, l'omarthrose.

**Infiltration du coude****► Voie intra-articulaire**

On la réalise à la face externe de l'articulation du coude, dans l'articulation radio-cubitale.

Le point de repère essentiel est la tête radiale que l'on sent rouler dans les mouvements de pronosupination.

Le coude étant en flexion à 90°, l'injection se fait avec une aiguille fine (de calibre 25G, soit 0,5 mm, et de 25 mm de long) dans le sillon radiocubital, immédiatement au-dessous de l'épicondyle.

L'injection est de 1 mL.

La polyarthrite rhumatoïde, ainsi que la très rare arthrose du coude, sont les indications principales.

**► Voie péri-articulaire**

Elle est utilisée pour l'épicondylite.

On repère le point du condyle externe le plus douloureux, que l'on marque avec l'ongle ; puis on marque un autre repère à 1,5 cm au-dessous, dans le corps musculaire des épicondyliens.

On pique avec une aiguille fine (de calibre 25G, soit 0,5 mm, et de 25 mm de long) à l'endroit du 2<sup>e</sup> repère en se dirigeant vers le 1<sup>er</sup> repère, sans aller jusqu'au contact osseux.

L'injection de 1 à 1,5 mL se fait sans résistance.

**Infiltration du poignet**

L'infiltration se fait très facilement dans l'articulation radio-carpienne à la face dorsale du poignet, un peu en dehors (repère « anatomique ») de la styloïde cubitale. On y palpe une dépression.

Il est utile de faire bailler l'interligne en mettant le poignet en légère flexion.

Il faut utiliser une aiguille très fine (de calibre 25G, soit 0,5 mm, et de 25 mm de long) par laquelle on injecte 1 mL du produit.

Les indications principales sont la polyarthrite rhumatoïde et la monoarthrite psoriasique du poignet.

**CORTICOÏDES PAR VOIE PARENTÉRALE**■ **Méthylprednisolone**

<b>SOLUMÉDROL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 4 mg	1 fl. + solv. 20 mg	2,04	I	65 %	2,04
	10 fl. 20 mg/2 mL	HOP	I		
	1 fl. + solv. 40 mg	2,65	I	65 %	2,65
	10 fl. 40 mg/2 mL	HOP	I		
	1 fl. + solv. 120 mg	5,11	I	65 %	5,11
	10 fl. 120 mg	HOP	I		
	10 fl. 500 mg	HOP	I		
	1 fl. pdre solv. 1 g	14,10	I	65 %	14,10

■ **Bétaméthasone**

<b>CÉLESTÈNE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	3 amp. inj. 4 mg/mL	4,48	I	65 %	1,49
<b>CÉLESTÈNE CHRONODOSE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	1 amp. 5,7 mg/mL 25 amp. 5,7 mg/mL	2,82 HOP	I I	65 %	2,82

**CORTICOTHÉRAPIE LOCALE – INFILTRATIONS (4)****Infiltration du canal carpien**

L'injection est réalisée avec une aiguille fine (de calibre 25G, soit 0,5 mm, et de 25 mm de long).

Elle est faite juste en dedans du tendon du petit palmaire ou entre les tendons des palmaires, à hauteur du pli de flexion inférieur du poignet, en évitant les veines superficielles, suivant une direction oblique en bas et en profond.

Une décharge électrique douloureuse traduirait la piqûre du médian ; il faut alors retirer et déplacer l'aiguille.

On injecte habituellement, sans résistance, 1 à 1,5 mL de solution.

**Infiltration péri-articulaire de la hanche**

Elle est pratiquée sur un patient en décubitus latéral opposé, cuisse très légèrement fléchie.

On repère et on marque avec l'ongle les points les plus douloureux, en général au contact des versants supérieur et postérieur du grand trochanter, puis on badi-gonne la solution antiseptique.

On pique les points repérés avec une aiguille de calibre 21G, soit 0,8 mm, et de 50 mm de long, jusqu'au contact osseux. On retire à peine l'aiguille, on aspire pour s'assurer de l'absence de sang, et on injecte en tout 1 à 1,5 mL du corticoïde, seul ou éventuellement mélangé à 2 ou 3 mL de **lidocaïne (XYLOCAïne à 1 %)**, s'il n'y a pas de contre-indication.

Les indications sont généralement la périarthrite de hanche (tendinites d'insertion, ténobursites, bursites).

**Infiltration du genou**

L'infiltration intra-articulaire peut se faire par la voie antérieure ou par la voie latérale externe. La voie latérale externe sous-patellaire a été recommandée pour les injections d'acide hyaluronique (cf. *infra*).

**► Voie antérieure**

C'est la plus facile, la moins douloureuse, quand il n'y a pas ou peu de liquide.

Le genou étant mis en flexion à 90°, on repère la pointe de la rotule. La piqûre se fera en un point situé à 1 cm en dedans

et au-dessous de la pointe de la rotule, où l'on palpe parfaitement une dépression.

L'aiguille de calibre 21G, soit 0,8 mm, et de 50 mm de long, dirigée dans l'axe de la cuisse, pénétrera facilement dans l'articulation en passant dans l'échancrure intercondylienne.

**► Voie latérale externe supra-patellaire**

Elle est facile lorsqu'il existe un épanchement que l'on peut évacuer dans le même temps.

Le genou étant en extension, on enfonce l'aiguille horizontalement dans le cul-de-sac sous-quadricipital, en piquant à 1 cm au-dessus et en dehors du coin supérieur correspondant de la rotule.

**► Dans les deux cas**

On peut injecter 1 à 1,5 mL de produit.

Les indications sont la gonarthrose, la monoarthrite rhumatismale, la polyarthrite rhumatoïde et les autres rhumatismes inflammatoires, l'hyarthrose intermittente.

**Infiltration de la cheville**

L'injection intra-articulaire peut se faire par la voie antérieure ou la voie postérieure.

**► Voie antérieure**

L'aiguille de calibre 21G, soit 0,8 mm, et de 50 mm de long, est enfoncée dans l'interligne tibio-tarsien, immédiatement en dehors du tendon du jambier antérieur.

Il est utile que le pied soit placé en légère extension pour faire bâiller l'interligne.

**► Voie postérieure**

Le sujet est placé en décubitus ventral, les pieds dépassant du lit d'examen.

L'aiguille est enfoncée perpendiculairement à la peau dans la gouttière rétro-malléolaire externe à mi-distance entre la pointe de la malléole péronière et le bord externe du tendon d'Achille.

Quelle que soit la voie d'abord, la quantité injectée est de 1 à 1,5 mL.

Les indications sont la polyarthrite rhumatoïde et les autres rhumatismes inflammatoires, l'arthrose de la cheville, très rare.

## ARTHROSE

L'arthrose est liée à une destruction du cartilage articulaire, elle-même favorisée par le vieillissement, l'obésité, un dysfonctionnement métabolique, un excès de pression ou encore à la fragilité naturelle du cartilage. Le traitement est essentiellement symptomatique lors des poussées douloureuses et/ou « congestives ».

### Amélioration de la fonction et diminution de la douleur

C'est donc le premier objectif recherché qui relève d'abord des **antalgiques**.

Les anti-inflammatoires sont utilisés en complément, pour diminuer la part « congestive » des symptômes, mais peut-être trop souvent pour leur effet antalgique propre. Les risques thérapeutiques, dans un traitement souvent prolongé, doivent donc être mesurés.

### Appréciation du handicap

L'appréciation du handicap est essentielle dans ces affections chroniques. Pour le genou et la hanche il peut être apprécié et suivi par l'indice algofonctionnel de Lequesne ; l'indication opératoire est justifiée si le handicap est important (score de 8 à 10 points) ou très

important (11 à 13 points), malgré un traitement médical bien conduit.

### Médications dites « antiarthrosiques symptomatiques d'action lente » (AASAL)

Elles peuvent représenter « un traitement d'appoint », en cure discontinue, dans la mesure où, après en général 2 à 3 mois, elles permettent à certains sujets de diminuer leur consommation d'**antalgique**. Leur utilisation prolongée à titre de « traitement de fond », visant à ralentir l'usure du cartilage arthrosique, est discutée. Leur prise en charge par la sécurité sociale est variable.

- **Diacérine (ART 50)**, 1 puis 2 gél./j, ou selon tolérance.
- **Chondroïtine sulfate sodique (CHONDRO-SULF 400 mg)** : 1 gél. ou sach. x 3/j, ou (**STRUCTUM 500 mg**) : 1 gél. x 2/j.
- **Insaponifiables d'avocat et de soja (PIASCLÉ-DINE 300 mg)** : 1 gél./j.

D'autres approches thérapeutiques complémentaires sont à prendre en considération : la correction d'une surcharge pondérale, les massages, la rééducation et les cures thermales.

### Indice algofonctionnel de Lequesne

<p>I. Douleur ou gêne</p> <p>A. La nuit au lit : - même immobile 2</p> <p>B. Le matin lors du dérouillage : - pendant 1 à 15 min 1 - pendant plus de 15 min 2</p> <p>C. Lors de la station debout ou du piétinement pendant 1/2 h 1</p> <p>D. Lors de la marche : - seulement après quelque distance 1 - très rapidement et de façon croissante 2</p> <p>E. Hanche : lors de la station assise prolongée (2 h) sans se relever 1</p> <p>F. Genou : pour se relever d'un siège sans s'aider des bras 1</p>	<p>II. Périmètre de marche maximale (en consentant à souffrir) :</p> <p>- limité mais supérieur à 1 km 1 - environ 1 km (<math>\pm 15</math> min) 2 - 500 à 900 m (<math>\pm 8</math> à 15 min) 3 - 300 à 500 m 4 - 100 à 300 m 5 - moins de 100 m 6 - 1 canne ou une canne-béquille + 1 - 2 cannes ou cannes-béquilles + 2</p>
<p>III. Difficultés de la vie quotidienne/hanche :</p> <p>- mettre ses chaussettes par-devant 0 à 2 - ramasser un objet à terre 0 à 2 - monter et descendre un étage 0 à 2 - sortir d'une voiture, d'un fauteuil profond 0 à 2</p>	<p>III. Difficultés de la vie quotidienne/genou :</p> <p>- monter un étage 0 à 2 - descendre un étage 0 à 2 - s'accroupir - marcher en terrain irrégulier 0 à 2</p>
<p>IV. Retentissement sur l'activité sexuelle, seulement pour l'indication opératoire à la hanche chez les femmes en activité génitale 0 à 2</p>	<p>Cotations III et IV :</p> <p>- pas de difficulté : 0 - possible avec difficulté modeste : 0,5 - moyenne : 1 - importante : 1,5 - impossible : 2</p>

## ARTHROSE DES DOIGTS

Les arthroses des doigts réalisent la rhizarthrose du pouce, les nodosités d'Heberden et de Bouchard.

Après une période douloureuse de quelques mois ou années, ces localisations deviennent généralement indolores, même si elles laissent une déformation inesthétique (dans la rhizarthrose la déformation est plus en rapport avec la subluxation du pouce qu'avec l'ostéophytose).

Le traitement ne s'adresse qu'aux manifestations douloureuses invalidantes.

### Traitement local

#### Repos articulaire/orthèse

En réduisant l'activité, et éventuellement pour le pouce par le port d'un appareil d'immobilisation en abduction, en matériau thermoplastique moulé, qui limite peut-être aussi la déformation.

Prescription : orthèse d'immobilisation du pouce.

#### Application locale biquotidienne d'un gel AINS

Elle peut être utile si elle est faite avec assiduité.

**VOLTARÈNE ÉMULGEL**, **KÉTUM gel**, **GELDÈNE**, **NIFLUGEL**, etc.

#### Infiltrations intra-articulaires de corticoïdes

Les infiltrations ne sont envisagées que dans des formes invalidantes malgré les autres traitements ; elles sont plus efficaces pour la rhizarthrose que pour les autres localisations digitales : une série de 1 à 3 inj., de 0,3 à 1 mL de **cortivazol** (**ALTIM**), ou **bétaméthasone** (**DIPROSTÈNE**), à 15 ou 30 j d'intervalle, peut donner une amélioration de plusieurs semaines ou mois.

Dans de rares cas, il est possible d'injecter, sous contrôle radiologique, une petite

quantité d'un des produits disponibles pour la **visco-supplémentation** (cf. *infra*).

### Traitement médicamenteux

#### Antalgiques usuels

- **Aspirine**, si bien tolérée : 500 mg aux 2 ou 3 repas principaux.
- **Paracétamol** 500 mg : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h (vers 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), plus 1 ou 2 prises/j, pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée, ou occasionnellement, en particulier prise dans la 1/2 h précédant une activité importante.

#### Prescription éventuelle d'un AASAL

Dans la mesure où, après en général 2 à 3 mois, elle permet de diminuer la consommation d'**antalgique**. Leur prise en charge par la sécurité sociale est variable.

- **Diacerhéine** (**ART 50**) : 1 puis 2 gél./j, ou selon tolérance.
- **Chondroïtine sulfate sodique** (**CHONDRO-SULF** 400 mg) : 1 gél. ou sach. x 3/j, ou (**STRUCTUM** 500 mg) 1 gél. x 2/j.
- **Insaponifiables d'avocat et de soja** (**PIASCLÉ-DINE**) 300 mg) : 1 gél./j.

#### Très rarement prescription d'un AINS par voie orale

En cure courte lors d'une poussée congestive, en particulier dans les formes érosives.

### Traitement chirurgical de la rhizarthrose

Exceptionnellement en cas d'impotence majeure et durable du pouce, on pourra discuter une intervention chirurgicale : arthroplastie par prothèse ou éventuellement arthrodèse (pour obtenir un pouce stable et indolore chez un travailleur manuel par exemple).

L'Eular a proposé en 2006 des recommandations pour la prise en charge de l'arthrose des mains [1].

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de l'arthrose des mains, *Eular*, 2006

## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (1)

### ■ Diacérhéine

<b>ART</b>					
1 gél. matin et soir, au milieu du repas	30 gél. 50 mg	16,35	I	15 %	0,55
<b>ZONDAR</b>					
Idem <b>ART</b>	30 gél. 50 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antiarthrosique d'action lente (l'effet apparaît vers le 30<sup>e</sup> j de traitement et est significatif vers le 45<sup>e</sup> j).

Son mécanisme d'action reste encore mal expliqué.

#### INDICATIONS

Traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles de l'arthrose.

Remarque : l'action est différée ; le délai de 30 à 45 j nécessaire au développement de l'effet antalgique peut nécessiter d'initier le traitement par les **antalgiques**/anti-inflammatoires habituels dont l'action est immédiate.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : il est recommandé de ne pas administrer la **diacérhéine** pendant les 3 premiers mois.

**Allaitement** : contre-indication.

Allergie avérée à la rhéine et aux substances d'activité proche.

Insuffisance hépatique sévère.

Ne pas administrer à l'enfant (moins de 15 ans).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez l'insuffisant rénal (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min), les posologies quotidiennes sont à réduire de moitié.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

L'effet indésirable le plus fréquemment signalé est une diarrhée bénigne ou des selles molles, des douleurs abdominales.

Le traitement peut entraîner une coloration des urines variant du jaune orangé au rouge, voire au marron.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'administration d'un **antiacide** d'action locale simultanée ou décalée de 1 h par rapport à la prise d'**ART** diminue significativement la quantité de rhéine circulante.

L'administration concomitante d'**ART** et d'**anti-H<sub>2</sub>** de type **cimétidine** ne modifie pas de façon significative les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques et urinaires de la rhéine.

## ARTHROSE DU GENOU (1)

### Mesures d'hygiène

Elles sont indiquées dans tous les cas, et en fonction de l'importance des symptômes.

- Déconseiller la station debout prolongée, la marche en terrain accidenté, la montée et la descente des escaliers.
- Conseiller un repos en décubitus et l'utilisation d'une canne du côté le moins douloureux pour diminuer l'appui en cas de poussée particulièrement intense.
- Lutter contre la tendance à l'ankylose et la rétraction du genou, contre l'amyotrophie quadricepsale, par une éventuelle kinésithérapie adaptée, en période de moindre douleur ; autorééducation visant à renforcer les quadriceps.

### Traitement médicamenteux

#### Cas simples

Quand la gonarthrose se résume à une simple gêne ou à un « fond douloureux » peu intense, elle est justiciable de :

- **aspirine**, si bien tolérée : 500 mg aux 2 ou 3 repas principaux ;
- **paracétamol** 500 mg :
  - pour une poussée arthrosique « simple » : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h. (vers 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), plus 1 ou 2 prises/j, pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée,
  - en dehors des poussées : 1 cp. ou gél. 1/2 h avant une activité importante, et 1 cp. ou gél. après, si nécessaire ;
- éventuellement prescription d'un **AASAL** ;
- en cas de douleurs plus importantes, on peut proposer une **association d'antalgiques** (paracétamol + codéine, caféine ou autres) ou l'association **paracétamol + tra-**

**madol (IXPRIM)** : 1 cp./4-6 h, si elles sont bien tolérées et utiles avec un certain recul ;

- dans certains cas l'injection intra-articulaire d'une ampoule d'un dérivé corticoïde : **cortivazol (ALTIM)**, **bétaméthasone (DIPROSTÈNE)**, **triamcinolone (HEXATRIONE)** assure une amélioration suffisante permettant de s'abstenir de toute autre thérapeutique pendant une longue période (plusieurs mois ou années parfois).

C'est dans ces formes que l'indication de la **visco-supplémentation** peut se discuter et semble avoir des résultats intéressants : inj. de 1 amp. de l'un des produits disponibles, à renouveler, « classiquement », 1 et 2 sem. après.

#### Cas complexes

Quand les manifestations sont plus intenses, et/ou en cas de poussées congestives avec épanchement.

##### ► Prescription d'un AINS

Elle est indiquée pour une cure de durée limitée (quelques semaines en général), à dose variable, mais suffisante et adaptée à chaque patient.

Le choix du produit est affaire d'habitudes et de tolérance, avec ou sans protection gastrique systématique.

Chez certains sujets, la prescription d'**AINS** doit être maintenue de façon prolongée, mais alors à la dose minimale active, et en renforçant la surveillance au long cours ;

##### ► Injection intra-articulaire d'un dérivé corticoïde

Elle peut utilement remplacer la prescription d'un **AINS**, ou lui être associée (cf. Injections intra-articulaires).



## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (2)

### ■ Chondroïtine sulfate sodique

<b>CHONDROSULF</b>					
1 gél. ou sach. x 3/j, aux repas	84 gél. 400 mg	20,81	I	15 %	0,25
	84 sach. 400 mg	20,81	I	15 %	0,25
<b>STRUCTUM</b>					
1 gél. x 2/j, aux repas	60 gél. 500 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antiarthrosique d'action lente (l'effet est retardé de 2 mois environ et peut persister après l'arrêt du traitement).

#### INDICATIONS

Traitement symptomatique à action retardée des manifestations fonctionnelles de l'arthrose (gonarthrose et coxarthrose).

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : absence de données.

Allergie à l'un des constituants du produit.

Enfant (moins de 16 ans).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prise au moment des repas.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Cutanés : des éruptions érythémateuses de type allergique ont été décrites.

Digestifs : rarement nausées, vomissements.

## ARTHROSE DU GENOU (2)

### Traitement chirurgical

Dans un petit nombre de cas, en regard de la grande fréquence des gonarthroses relativement bien tolérées, un traitement chirurgical peut et mérite d'être envisagé. Lorsque la destruction cartilagineuse entraîne un handicap fonctionnel manifeste, l'indication de la mise en place d'une **prothèse du genou** doit alors être envisagée, en tenant compte de l'état général du sujet et de son autonomie préalable. Les suites en sont relativement courtes, et le résultat fonctionnel très appréciable chaque fois que les indications en ont été soigneusement discutées.

L'appréciation du handicap fonctionnel peut se faire à partir de l'indice algofonctionnel de Lequesne (cf. Arthrose).

Lorsque le cartilage est encore suffisant et chez un sujet jeune, il est possible d'envisager :

- une *ostéotomie de correction*, lorsqu'un genu valgum ou surtout un genu varum s'aggravant régulièrement augmentent les douleurs ;

- une *transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure* dans certaines formes d'arthrose fémoro-patellaire évoluées, avec subluxation externe de la rotule réagissant mal à une rééducation du quadriceps et au traitement médical.

### Recommandations de l'Eular 2003 pour la prise en charge de la gonarthrose [1]

1. Le traitement optimal de l'arthrose du genou requiert l'association d'un traitement pharmacologique et non pharmacologique.
2. Ce traitement doit être individualisé en tenant compte des facteurs de risque propres au genou (obésité, contraintes mécaniques, activité physique), des facteurs de risque généraux (âge, polymédication, etc.), de l'intensité de la douleur et du handicap qu'elle entraîne, de la présence de signes inflammatoires (particulièrement les épanchements), de la localisation et du degré de l'atteinte structurale.
3. Le traitement non pharmacologique doit inclure une éducation régulière du patient, des exercices, l'utilisation de dispositifs d'aide (cannes, semelles, attelles) et une perte de poids.
4. Le **paracétamol** est l'antalgique de premier choix. En cas de succès, la prise doit être poursuivie à long terme.
5. Les applications d'**anti-inflammatoires (AINS)** ou de **capsaïcine** sont efficaces et sans danger.
6. Les **AINS** devraient être utilisés chez les patients qui ne répondent pas au **paracétamol**. En cas de risque gastro-intestinal, il faut préférer les **coxibs**.
7. Les **opioïdes**, avec ou sans **paracétamol**, représentent une option en cas de contre-indication ou d'inefficacité des **AINS**.
8. Les **antiarthrosiques d'action lente** ont un effet symptomatique et peuvent modifier le cours de la maladie.
9. Les injections intra-articulaires de **corticostéroïdes** à longue durée d'action sont indiquées en cas de flambée inflammatoire, surtout s'il y a épanchement concomitant.
10. Les prothèses devraient être proposées aux patients avec douleur réfractaire, handicap certain et évidence radiologique de la gonarthrose.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la gonarthrose, Eular, 2003

## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (3)

### ■ Insaponifiables de soja et d'avocat

#### PIASCLÉDINE

1 gél./j au milieu d'un repas	15 gél. 300 mg	7,69	I	15 %	0,51
-------------------------------	----------------	------	---	------	------

#### INDICATIONS

Utilisé en traitement d'appoint des douleurs arthrosiques.

Médication à visée trophique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Rares régurgitations à odeur lipidique qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu d'un repas.

## VISCO-SUPPLÉMENTATION (ACIDES HYALURONIQUES)

Il s'agit de produits visant à rétablir les propriétés visco-élastiques du liquide articulaire d'une articulation arthrosique, et, de ce fait, à réduire la douleur et la gêne, et à améliorer la mobilité articulaire. Comme le mécanisme d'action de ces produits est encore partiellement inconnu, certains utilisent la dénomination de visco-induction du fait de leur effet retardé.

Ces produits ne sont pas considérés comme des médicaments mais sont classés dans la catégorie des « dispositifs médicaux » du dictionnaire *Vidal*, sauf l'un d'eux qui bénéficie d'une ancienne AMM. Ils sont regroupés sous la dénomination internationale de hyaluronates, avec trois classes :

- les **hyaluronates de sodium**, dont le poids moléculaire (PM) varie entre 0,5 à 2,7 Md ; ce sont les plus nombreux dans le commerce, leur différence portant sur le PM, l'origine (extrait de crêtes de coq ou par fermentation bactérienne), le mode de stérilisation (thermique ou par ultrafiltration) ;
- les hylanes ou **hylane G-F20**, de haut PM (6 Md), et qui est un gel fluide (**SYNVISCO**) ;
- le **NASHA** (*Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid*), qui est un gel de PM beaucoup plus élevé encore (90 Md) (**DUROLANE**).

Le choix entre les différents produits reste difficile, malgré des études comparatives entre eux et, en pratique, en plus des habitudes des prescripteurs, le nombre d'injections à réaliser et le prix peuvent entrer en considération.

Le traitement habituel, en particulier au genou, consiste en 3 inj. de 1 amp. de produit à 1 sem. d'intervalle, par voie intra-articulaire, avec les précautions habituelles d'asepsie et après évacuation d'un éventuel épanchement ; **certaines espacent les inj.** Pour d'autres articulations, ou pour

certaines produits, le nombre d'inj. ou le rythme peuvent être différents.

Il est recommandé que l'inj., qui doit être faite par un rhumatologue, un chirurgien orthopédiste ou un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit suivie d'une période de repos physique, et parfois de l'application d'une poche de glace.

Au genou, il est préférable de pratiquer l'injection, par voie externe sous-patellaire, environ 1 cm en bas et en dehors de l'angle supéro-externe de la rotule ; en subluxant la rotule en dehors et en mettant en tension la capsule et l'aileron externe, le passage de l'aiguille est facilement perçu après l'avoir enfoncée de 1 cm environ, perpendiculairement à l'axe du membre et avec une direction légèrement ascendante, biseau dirigé vers le haut. La voie antéro-interne n'est pas recommandée, pour ne pas risquer d'injecter le produit dans le paquet adipeux ou la tente des croisés.

Pour la désinfection cutanée, en général, il est conseillé dans les notices d'éviter les produits à base d'ammonium quaternaire (**chlorure de benzalkonium**) ou de **chlorhexidine** qui sont susceptibles d'entraîner une précipitation du produit. Une rougeur ou un œdème local modéré peuvent survenir après l'injection ; très rarement une réaction inflammatoire articulaire conduit à évacuer le genou et à prescrire un **AINS**. Ce traitement ne doit pas être renouvelé dans la même articulation avant 6 à 9 mois.

L'indication principale est l'arthrose du genou, mais une hauteur « suffisante » de cartilage restant semble nécessaire pour que l'effet soit appréciable. Certains des produits peuvent être injectés dans la hanche, voire dans la trapèzométacarpienne, la cheville, l'épaule, de préférence sous contrôle radiographique.

Le produit doit être conservé, et injecté, à température ambiante.

**VISCO-SUPPLÉMENTATION****■ Hyaluronate de sodium**

<b>HYALGAN</b>					
Traitement symptomatique de l'arthrose	1 ser. 20 mg/2 mL	29,74	I	65 %	29,74

**PROPRIÉTÉS**

Agent de remplacement et supplément temporaire du liquide synovial, qui vise à rétablir les propriétés physiologiques et rhéologiques des tissus de l'articulation arthrosique, à réduire la douleur et la gêne, et à accroître l'ampleur du mouvement.

**INDICATIONS**

Arthrose du genou essentiellement ; plus rarement arthrose de la hanche, voire rhizarthrose du pouce (injection de préférence sous contrôle radiologique).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients.

Ne pas injecter sur un genou infecté ou en cas de poussée inflammatoire importante, ni en cas de stase veineuse ou lymphatique de la jambe, ni en cas d'infection ou de lésion cutanée au site de l'injection.

Le produit n'a pas été évalué chez la femme enceinte ni chez l'enfant, circonstances inhabituelles d'arthrose.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas injecter par voie intravasculaire, ni en dehors de la cavité articulaire ou dans le tissu synovial ou la capsule.

Ne pas injecter en cas d'épanchement impor-

tant ; toujours aspirer un éventuel liquide avant l'injection.

Pour la désinfection cutanée, il est conseillé dans les notices d'éviter les produits à base d'ammonium quaternaire (**chlorure de benzalkonium**) ou de **chlorhexidine** qui sont susceptibles d'entraîner une précipitation du produit. Il est recommandé que l'injection, qui doit être faite par un rhumatologue, un chirurgien orthopédiste ou un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit suivie d'une période de repos physique, et parfois de l'application d'une poche de glace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réaction d'hypersensibilité (allergie aux produits d'origine aviaire et à certaines protéines) : démangeaison, éruption, urticaire.

Une rougeur ou un œdème local modéré peuvent survenir après l'injection ; très rarement une réaction inflammatoire articulaire conduit à évacuer le genou (le liquide sera systématiquement analysé pour écarter une cause infectieuse ou microcristalline) et à prescrire un **AINS**.

Une asepsie rigoureuse, une injection en dehors de tout contexte infectieux général et local doivent permettre d'éviter le risque d'infection articulaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le produit n'a pas d'effet systémique connu.

## SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE

### Définition

Le syndrome fémoro-patellaire est caractérisé par une douleur de la face antérieure du genou majorée par les contraintes imposées à l'appareil extenseur : descente d'escaliers, position assise prolongée, accroupissement.

Des épisodes de dérobolements ou de faux blocages du genou peuvent s'y associer.

La définition du syndrome fémoro-patellaire est symptomatique et fonctionnelle.

Ce syndrome peut :

- être le témoin d'une arthrose du genou en particulier fémoro-rotulienne, et en précéder l'apparition radiologique ;
- mais aussi survenir chez des sujets jeunes traduisant une chondromalacie ou

simplement un surmenage rotulien, parfois un traumatisme.

### Traitement

Il comporte :

- la mise au repos relatif ;
- la prescription d'**antalgiques** : **paracétamol** à dose suffisante (*cf. supra*) ;
- la kinésithérapie éventuellement : 15 séances de rééducation, avec renforcement du quadriceps (et du vaste interne quand il existe aussi une tendance à la subluxation externe de la rotule), suivies d'une autorééducation régulière.

En cas d'épanchement associé, une cure brève d'un **AINS**, ou 1 à 2 **injections intra-articulaires de corticoïdes**, sont indiquées, comme dans la gonarthrose.

### Syndrome fémoro-patellaire

- Il n'y a pas lieu de prescrire des séances de masso-kinésithérapie dans les syndromes fémoro-patellaires :
  - post-traumatiques contusifs, au cours de la phase aiguë,
  - avec épanchement, tant que celui-ci persiste,
  - dus à des ostéochondrites.
- Il n'y a pas lieu de prescrire, en 1<sup>re</sup> intention, dans le syndrome fémoro-patellaire, plus de 15 séances de rééducation, à raison de 2 à 3 séances/sem.
- Il n'y a pas lieu de prescrire plus de 30 séances de masso-kinésithérapie dans l'année pour syndrome fémoro-patellaire.

**NOTES**

## ARTHROSE DE LA HANCHE (1)

Chaque cas de coxarthrose impose un programme thérapeutique « personnalisé ».

Les traitements médical et chirurgical se complètent ou se succèdent dans un grand nombre de cas.

Le traitement chirurgical ne doit pas être considéré comme vivant des échecs du traitement médical ; il doit être discuté, sinon indiqué, au cours de l'évolution d'une coxarthrose, afin de poser à temps l'indication de l'opération la mieux adaptée, qu'il s'agisse d'une coxarthrose primitive ou secondaire.

### Mesures d'hygiène

Elles sont indiquées dans tous les cas, et en fonction de l'importance des symptômes.

- Cure d'une surcharge pondérale.
- Réduire et fractionner la station debout et la marche.
- Éviter la montée et la descente des escaliers.
- Utiliser la bicyclette et pratiquer la natation.
- Conseiller tous les jours une demi-heure de repos en décubitus ventral pour éviter l'attitude vicieuse en flexion de la hanche.
- Utiliser une canne du côté le moins douloureux pour diminuer l'appui.

### Kinésithérapie

Elle a une valeur certaine chez les sujets coopérants. Elle vise surtout la rééducation active des fessiers et du quadriceps. Son but est de lutter contre l'enraidissement progressif, l'amyotrophie avec sensation de faiblesse ou d'instabilité, l'attitude vicieuse en flessum, les mauvaises habitudes concernant la marche. Elle sera au mieux réalisée dans un centre disposant d'une piscine.

Elle doit être indolore.

**Prescription initiale** de 15 séances de massages et rééducation de la hanche, en piscine et en salle, avec poursuite d'une prescription discontinue d'entretien.

### Traitement médicamenteux

Le traitement médical est toujours indiqué dans les coxarthroses récentes, primitives ou secondaires, tant que le retentissement en est tolérable et que l'aggravation radiologique reste discrète.

Quand la coxarthrose se résume à une simple gêne ou à un « fond douloureux » peu intense, il comporte essentiellement la prescription d'**antalgiques usuels**.

• **Aspirine**, si bien tolérée : 500 mg aux 2 ou 3 repas principaux.

• **Paracétamol** 500 mg :

– pour une poussée arthrosique « simple » : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h (vers 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), plus 1 ou 2 prises/j, pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée ;

– en dehors des poussées : 1 cp. ou gél. 1/2 h avant une activité importante, et 1 cp. ou gél. après, si nécessaire.

• En cas de douleurs plus importantes, on peut proposer une **association d'antalgiques (paracétamol + codéine, caféine ou autres)** ou l'association **paracétamol + tramadol (IXPRIM)** : 1 cp./4-6 h, si elles sont bien tolérées et utiles avec un certain recul.

• Éventuellement prescription d'un « **anti-arthrosique symptomatique d'action lente** » (AASAL).

• Dans de rares cas il est possible d'injecter en intra-articulaire, et sous contrôle radiologique, 1 ampoule d'un des produits disponibles pour la **visco-supplémentation**.

**Quand les manifestations sont plus intenses, la prescription d'un AINS est indiquée :**

– associée aux **antalgiques** ;

– pour une cure de durée limitée (quelques semaines en général) ;

– à dose variable mais suffisante, et adaptée à chaque patient (le choix du produit étant affaire d'habitudes et de tolérance) ;

– avec ou sans protection gastrique systématique.

Chez certains sujets la prescription d'**AINS** doit être maintenue de façon prolongée, mais dans ce cas à la dose minimale active, et en renforçant la surveillance au long cours.



## ARTHROSE DE LA HANCHE (2)

### Traitement chirurgical

#### Dysplasie ou subluxation congénitale « pré-arthrosique »

Les manifestations cliniques douloureuses et fonctionnelles qui leur sont associées, avant qu'elles n'aboutissent à une coxarthrose évoluée, peuvent bénéficier d'une chirurgie précoce à visée correctrice, après un bilan médico-chirurgical soigneux.

- En cas d'insuffisance de couverture cotyloïdienne pure, c'est la **butée ostéoplas-tique** qui est l'opération de choix ; elle nécessite une hospitalisation de moins de 15 j, une rééducation pendant 2 à 4 mois, la reprise de l'appui se faisant progressivement après 6 sem. de mise en décharge.

- En cas de coxa valga pure, ou associée à une insuffisance cotyloïdienne, on envisagera une **ostéotomie de varisation** (Pauwels) ; elle nécessite un alitement de 1 mois environ, une rééducation du 2<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> mois, l'appui étant autorisé après 3 mois.

Ces indications deviennent rares, si le sujet peut attendre « l'âge » de la prothèse.

#### Formes habituelles de coxarthrose

L'indication de la mise en place d'une **prothèse totale de hanche** est justifiée devant une forme évoluée anatomiquement, responsable d'une gêne fonctionnelle et d'une douleur non contrôlées par le traitement médical, si l'état du patient le permet.

- *Éléments de décision*
- Handicap

Il peut être apprécié en s'aidant de l'indice algofonctionnel des coxopathies de Lequesne (cf. Arthrose).

L'indication opératoire est justifiée si le handicap est important (score de 8 à

10 points) ou très important (11 à 13 points), malgré un traitement médical bien conduit.

- Âge

Il est habituel de n'envisager la prothèse que chez des sujets de plus de 60 ans, en raison de la limitation potentielle de sa longévité.

Chez des sujets plus jeunes, dont le handicap est important, la décision peut se prendre après avoir abordé les risques encourus.

#### ➤ *Résultats habituels*

Ils sont souvent très nets et rapides sur la douleur.

Le lever avec reprise de l'appui est très précoce, dans la semaine qui suit l'intervention.

#### ➤ *Suites opératoires*

Elles peuvent être grevées de complications mineures ou sévères :

- *complications postopératoires* classiques ;
- *sciatique*, parfois paralysante, habituellement régressive ;
- *ossifications périprothétiques* ;
- *luxation de la prothèse* que le patient doit éviter en ne croisant pas le membre opéré sur l'autre ;
- *infection*, immédiate ou retardée, qui doit être prévenue par une antibiothérapie au moment de l'intervention, par la détection et le traitement de foyers infectieux avant et après l'intervention ;
- *descellement aseptique*, cause la plus fréquente des échecs, qui peut être favorisé par un surmenage de la prothèse. La mise en place d'une nouvelle prothèse est alors envisageable, mais ses résultats sont parfois moins positifs.

Il n'en reste pas moins que la mise en place d'une prothèse est un acte thérapeutique très bénéfique pour la majorité des patients ne relevant pas ou plus du traitement médical.

**ARTHROSE DE LA HANCHE (3)****Prothèse****Conseils pratiques à donner au patient porteur d'une prothèse de hanche****► Rééducation**

Pouvant se faire à domicile, elle sera poursuivie, de façon à renforcer les muscles fessiers et à obtenir une bonne stabilité.

**► Aide d'une canne ou d'une canne anglaise**

Prise de la main opposée au côté de la prothèse, elle est utile au début seulement.

**► Mouvement interdit**

*Il faut bien préciser au patient qu'est interdite, de façon définitive* : l'association de flexion + adduction + rotation interne de la hanche opérée, c'est-à-dire la hanche fléchie, avec le genou vers le côté opposé.

Il est définitivement interdit de croiser la jambe du côté opéré en station assise.

**Pendant environ deux mois****► Pour se coucher**

Surélever les pieds du lit d'environ 15 à 20 cm (livres, briques, etc.), mettre un oreiller entre les jambes si l'on dort sur le côté.

**► Pour s'asseoir**

Les jambes écartées, sur des sièges hauts et fermes, en évitant les sièges bas et mous.

**► Pour se vêtir**

S'asseoir pour enfiler les collants, chaussettes, slip, pantalon, écarter les genoux et, si besoin, se faire aider.

**► Pour se chausser**

Éviter les chaussures à lacets, boucles, fermeture éclair, bottes, s'aider d'un chausse-pied long, et préférer les mocassins, les escarpins qui ne nécessitent pas de se pencher en avant.

**► Pour la toilette**

Éviter la baignoire et préférer la douche.

**► Pour ramasser les objets à terre**

Ne pas s'accroupir ni se mettre sur le genou du côté opéré. Éviter les objets lourds et s'aider éventuellement pour les petits objets d'une pince télescopique.

**► En voiture**

Éviter de conduire pendant les 2 premiers mois (trajets longs) ; pour rentrer, s'asseoir dos à la voiture puis pivoter, les 2 jambes en même temps. Reculer le siège le plus possible, et le rehausser éventuellement pour éviter une trop forte flexion de la hanche.

**► Pour les rapports sexuels**

Ils sont permis, mais il faut respecter les positions interdites.

**Après le 2<sup>e</sup> mois**

- La vie normale est autorisée.
- La marche et la natation sont possibles ; les sports violents sont cependant interdits.

Toute infection dentaire, urinaire, cutanée ou bronchopulmonaire doit faire consulter et être traitée, pour éviter que l'infection ne se propage à la prothèse.

Les injections intramusculaires sont interdites à la fesse du côté opéré.

**ARTHROSE DE LA HANCHE (4)****Recommandations de l'Eular 2004 pour la prise en charge de la coxarthrose [1]**

1. La prise en charge optimale de la coxarthrose repose sur une combinaison de traitements non pharmacologiques et pharmacologiques.
2. Le traitement de la coxarthrose doit être adapté en fonction :
  - des facteurs de risque (obésité, paramètres mécaniques défavorables, activité physique, dysplasie, etc.) ;
  - des facteurs de risque généraux (âge, sexe, comorbidité, cotraitements) ;
  - de l'intensité de la douleur et du handicap ;
  - de la localisation et du degré des lésions structurales ;
  - des souhaits et des attentes du patient.
3. Les traitements non pharmacologiques de la coxarthrose devraient inclure des mesures d'éducation, des exercices physiques (kinésithérapie) afin de maintenir la trophicité musculaire et la mobilité de la hanche, des aides techniques (cannes, semelles), et une réduction du poids en cas d'obésité ou de surpoids.
4. En raison de son efficacité et de sa tolérance, le **paracétamol** (jusqu'à une dose de 4 g/j) est l'antalgique oral de premier choix pour les douleurs légères à modérées et, en cas de succès, l'antalgique oral à long terme de préférence.
5. Les **AINS**, à la dose efficace la plus faible possible, peuvent être associés ou substitués chez les malades ne répondant pas au **paracétamol**. Chez les patients à risque digestif, une association **AINS** non sélectif avec gastroprotecteur peut être utilisée.
6. Les antalgiques à base d'opioïdes, avec ou sans **paracétamol**, sont des alternatives utiles pour les patients chez qui les **AINS** sont contre-indiqués, inefficaces et (ou) mal tolérés.
7. Les **antiarthrosiques d'action retardée** (**glucosamine**, **chondroïtine sulfate**, **diacerhéine**, extraits d'**insaponifiables d'avocat ou de soja**, et **acide hyaluronique**) ont un effet symptomatique et une faible toxicité, mais les effets-taille sont faibles, les patients susceptibles d'en bénéficier le plus ne sont pas identifiés, les modifications structurales cliniquement significatives et les aspects pharmaco-économiques ne sont pas correctement établis.
8. Les injections intra-articulaires de corticoïdes (radio- ou écho-guidées) peuvent être envisagées chez les patients souffrant d'une poussée évolutive ne répondant pas aux antalgiques ou aux **AINS**.
9. L'ostéotomie ou les mesures de chirurgie préventive peuvent être envisagées chez les adultes jeunes souffrant d'une coxarthrose, en particulier en cas de dysplasie ou de coxa vara/valga.
10. La mise en place d'une prothèse de hanche peut être envisagée chez les patients avec une coxarthrose radiologiquement évidente qui souffrent d'une douleur rebelle ou d'un handicap.

**CONSENSUS**

[1] Prise en charge de la coxarthrose, *Eular*, 2004

**CERVICALGIES (1) AIGÜES – TORTICOLIS**

Très fréquente chez le sujet jeune, soit après un effort, soit spontanément, sans que le mécanisme puisse toujours être affirmé (accident de blocage discal, entorse, contracture musculaire, épisode viral), la crise aiguë du torticolis est souvent associée après la trentaine à une cervicarthrose.

Il ne faut pas méconnaître la situation, très rare, où elle représente la première manifestation d'une spondylodiscite infectieuse, d'une métastase cancéreuse, ou de certaines formes de chondrocalcinose.

Son évolution habituelle se fait vers la guérison en 1 sem. ou moins, le traitement ne paraissant pas raccourcir l'évolution.

**Formes mineures**

Certaines formes mineures, qui peuvent ne durer que 24 à 36 h, ne nécessitent parfois aucun traitement, si ce n'est la prescription d'**aspirine** ou de **paracétamol**, à la dose de 1,5 à 3 g/j, régulièrement répartie.

**Formes habituelles**

On associera :

- Le repos relatif, la chaleur locale.
- Les **antalgiques usuels** pendant 4 à 6 j : **aspirine** ou **paracétamol**, 1,5 à 3 g/j.
- L'emploi des **myorelaxants**, dont personnellement nous pensons qu'ils rendent un service non négligeable à certains

patients, a subi des modifications de recommandations en 2013. Le **MYOLASTAN** et ses génériques n'ont plus l'AMM, pour insuffisance de service rendu. L'indication du **COLTRAMYL** et de ses génériques est libellée ainsi : traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie: 1 cp. x 1 à 3/j.

**Formes aiguës ou prolongées**

On pourra ajouter :

- un **antalgique** plus puissant ;
- un **AINS** pendant 2 à 4 j ;
- une immobilisation par collier cervical souple, en mousse, amovible (modèle C1).

**Formes hyperalgiques**

Dans ces **formes exceptionnelles**, après s'être assuré de l'absence de lésion osseuse autre qu'arthrosique, ou avoir mis en évidence une calcification péri-odontodienne de chondrocalcinose, il peut être nécessaire de prescrire pour une courte durée :

- **CORTANCYL** (cp. à 5 mg) : 30 mg/j le 1<sup>er</sup> ou les 2 premiers jours, en diminuant de 5 à 10 mg/j sur 4 à 8 j ;
- exceptionnellement un **antalgique** plus puissant.

- Les manipulations vertébrales n'ont pas d'indication dans les formes aiguës.
- Les infiltrations locales d'**anesthésiques** et/ou de **corticoïdes** ne semblent pas nécessaires.

**MYORELAXANTS**■ **Thiocolchicoside**

<b>COLTRAMYL</b>					
1 cp. x 1 à 3/j	12 cp. 4 mg	4,08	I	15 %	0,34
<b>MIOREL</b>					
Idem <b>COLTRAMYL</b> 1 amp. x 2/j	12 gél. 4 mg	3,54	I	15 %	0,30
	24 gél. 4 mg	6,03	I	15 %	0,25
	5 amp. IM 4 mg/2 mL		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Myorelaxant non benzodiazépinique.

**INDICATIONS**

Traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie ; en pathologie rachidienne aiguë pour la voie IM.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : à éviter.

■ **Adénosine triphosphate**

<b>ATÉPADÈNE</b>					
Dorsalgies primitives : 1 gél. x 2-3/j	30 gél. 30 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

L'**adénosine triphosphate** intervient dans le métabolisme du tissu musculaire et nerveux.

**Allaitement** : utilisation déconseillée.

Allergie au **thiocolchicoside**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire la posologie en cas de diarrhée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibilités de manifestations allergiques. Gastralgies, diarrhées. Pour la forme injectable, rares cas d'excitation ou d'obnubilation passagère.

**INDICATIONS**

Dorsalgies primitives.

## CERVICALGIES (2) CHRONIQUES – CERVICARTHROSE

Le traitement, qui comporte 2 volets, médicamenteux et non médicamenteux, doit tenir compte de l'intensité de la douleur et de la gêne fonctionnelle, de la durée de la poussée, des facteurs d'entretien.

### Repos

Il doit être ici relatif et « adapté ».

- Il faut éviter la fatigue et le port de paquets lourds, les positions du cou trop longtemps maintenues en flexion, en extension ou en inclinaison latérale.
- Pour les longs trajets en voiture et transports en commun, appui-tête, collier cervical souple (modèle C 1).
- Pour le travail devant un écran, faire très régulièrement des mouvements du cou, voire l'interrompre brièvement par intermittence. Le regard, horizontal, doit être à la hauteur d'une ligne passant entre le 1/3 supérieur et les 2/3 inférieurs de l'écran.
- La chaleur locale, l'utilisation d'un coussin spécial avec un creux pour le couder peuvent améliorer le confort.
- La prescription d'un arrêt de travail n'est qu'exceptionnellement indiquée.

### Traitements « physiques »

Ils ont une place certaine si la responsabilité de l'arthrose est reconnue, et à la condition formelle de ne pas aggraver les douleurs.

- La **kinésithérapie cervicale**, en particulier des exercices combinant étirement et renforcement musculaire, précédée ou associée à des massages des muscles cervicaux et scapulaires, est souvent utile ; on prescrira d'abord une série de 10 à 15 séances, au cours desquelles le patient apprendra les mouvements qu'il devra poursuivre chez lui ; elles pourront être renouvelées 1 fois dans l'année.
- La **physiothérapie locale** antalgique (infrarouges, ondes courtes, fangothérapie) y est associée par certains.

- Les **manipulations vertébrales**, faites par un médecin rhumatologue entraîné, peuvent donner de très bons résultats, mais il ne faut pas insister quand aucun résultat n'est obtenu au bout de 2 à 3 séances.

### Traitements médicamenteux

**Pour des douleurs subaiguës et modérées**, on prescrit seul ou on associe de façon variable :

- un **antalgique usuel**, **aspirine** ou **paracétamol**, à la dose de 1,5 à 3 g/j ;
  - un **myorelaxant**, éventuellement (*cf. supra*) ;
- qui peuvent être poursuivis pendant plusieurs semaines ou mois, s'ils sont efficaces et bien tolérés.

**Dans les poussées intercurrentes plus douloureuses**, on pourra prescrire :

- soit des **antalgiques** plus puissants, comme ceux **dérivés des AINS** ou ceux comportant une association à base de **paracétamol** ;
- soit une cure de 2 à 4 sem. d'un **AINS**, par exemple un **oxicam** : 1/j au dîner ; les comprimés sécables pouvant fournir l'occasion de diminuer la posologie en fonction de l'efficacité, ou un **dérivé arylcarboxylique**, dans une forme à libération prolongée : **VOLTARÈNE LP 100 mg**, ou **PRO-FÉNID LP 200 mg**, 1 cp./j au dîner, ou un autre **AINS**.

**Dans les cas où des manifestations neurovégétatives existent**, impressions vertigineuses, bourdonnements d'oreille, dont l'examen ORL n'aura pas mis en évidence de cause précise et dont la relation directe avec la cervicarthrose n'est pas prouvée, on pourra associer, par cures de 1 à 2 mois :

- soit un **antivertigineux**, par exemple : **SERC**, 1/2 ou 1 cp. x 2 à 3/j ;
- soit un **anxiolytique**, quand une participation anxieuse paraît évidente.

## DORSALGIES CHRONIQUES

Les dorsalgies n'étant qu'un symptôme, il faut s'attacher à leur retrouver ou à écarter une de leurs causes organiques :

- en cas de dorsalgie nocturne ou de décubitus, penser à un ostéome ostéoïde ou à une tumeur intrarachidienne (affections rares) ;
- en l'absence de signes rachidiens, penser à une affection viscérale à distance (aortique, pleurale, médiastinale).

### Dorsalgies symptomatiques d'une affection organique rachidienne

- Spondylarthrite ankylosante.
- Spondylodiscites à germes banals et mal de Pott.
- Ostéoporose (à l'occasion d'un tassement vertébral).
- Cancer secondaire des os ; myélome.
- Scoliose.
- Maladie de Scheuermann.

Les diagnostics à considérer ensuite sont :  
– insuffisance dorsale douloureuse des jeunes femmes (dorsalgie essentielle) ;  
– dorsarthrose, car celle-ci est dans l'immense majorité des cas indolore.

### Dorsarthrose

Le plus souvent latente, elle n'entraîne que rarement des douleurs, et pratiquement jamais de radiculalgies qui doivent faire rechercher une autre lésion associée. Elle relève en période douloureuse :

- d'**antalgiques banals** : paracétamol 1,5 à 3 g/j, aspirine 2 g ;
- d'anxiolytiques : bromazépam (LEXOMIL), 1/4 de cp. 2 à 3 fois/j ;
- ou d'**antidépresseurs** sous surveillance stricte, qui sont parfois indiqués en fonction du psychisme du sujet ;
- éventuellement de la kinésithérapie et/ou de la physiothérapie, comme dans l'arthrose cervicale chronique.

### Insuffisance dorsale douloureuse des femmes jeunes

Ce tableau clinique, très fréquent, est caractérisé par la survenue de dorsalgies moyennes, déclenchées ou aggravées par la position assise : secrétaires, dactylos, saisie informatique devant un écran, couturières, mécanographes, etc., à l'occasion

d'un surmenage dorsal et surtout d'un état dépressif.

La sensation de brûlures dorsales en est très évocatrice.

Le traitement en est difficile, malgré le bon pronostic du syndrome.

- Repos, toujours utile : ménager la colonne dorsale, éviter le port d'objets lourds, la position prolongée en cyphose, conseiller un siège avec appui dorsal dur.
- Éventuellement massages et rééducation portant sur les muscles dorsaux (15 séances avec poursuite, à domicile, des mouvements appris).
- **Antalgiques mineurs**.
- **Sédatifs** ou **psychotoniques** en fonction du psychisme de la patiente.
- Une psychothérapie, dont les premiers éléments sont une écoute patiente, attentive et un examen clinique rigoureux, est parfois indiquée.
- Il est très rarement nécessaire de conseiller un changement de profession. Dans certaines formes chroniques invalidantes malgré les prescriptions précédentes, on peut être amené à prescrire une cure d'**amitriptyline (LAROXYL)**, à dose progressivement croissante, par exemple : 8 à 10 gtes/j la 1<sup>re</sup> sem., puis augmentation de 1 gte toutes les semaines jusqu'à 15 à 20 gtes/j, pendant 3 à 4 mois, puis diminution progressive, la dose pouvant être fractionnée dans la journée en 2 à 3 prises selon l'activité et la tolérance.

### Dorsago

Le tableau de dorsalgie aiguë doit d'abord évoquer et faire écarter une affection dont elle ne serait que le symptôme apparent, comme dans les dorsalgies chroniques. Deux tableaux cliniques particuliers peuvent être envisagés, en plus.

*Le dorsago d'origine discale*, bien que moins fréquent que le lumbago, relève d'un traitement semblable.

*La dorsalgie aiguë fébrile*, lorsque rien n'évoque une origine infectieuse, doit faire évoquer une calcification discale aiguë, confirmée par des radiographies, qui relève d'un bref traitement **AINS** et d'**antalgiques** à dose suffisante.

## NÉURALGIE CERVICO-BRACHIALE (1)

### Néuralgie cervico-brachiale (NCB) commune

Dans la majorité des NCB, il existe une phase initiale nettement plus douloureuse, avec souvent recrudescence nocturne, qui dure 2 à 3 sem. 80 % des névralgies cervico-brachiales communes guérissent dans un délai maximum de 8 sem.

#### Période initiale

On associera :

##### ► *Repos et limitation*

*des mouvements du cou*

Sont souvent souvent bénéfiques et parfois indispensables :

- un collier de soutien cervical souple C1, léger et amovible, à bord mousse ;
- parfois un collier cervical semi-rigide C2 (non réglable en hauteur) ;
- voire un collier C3 (réglable en hauteur et avec appui mentonnier).

Un arrêt de travail peut se justifier.

##### ► *Précautions*

- Éviter le port de charges, l'exposition au froid.
- La nuit, le dos et la nuque seront calés confortablement avec des oreillers ; certains patients sont soulagés en position demi-assise.

##### ► *Médications*

- Des **antalgiques** : **paracétamol**, seul, ou plus souvent en association, en particulier pour la prise du soir qui sera retardée autant que possible.

- Un **myorelaxant**, éventuellement (cf. Cervicalgies).

- Un **AINS** : par voie orale, mais parfois par voie rectale, avec une prise plus importante le soir, par exemple un **aryl-carboxylique** : **VOLTARÈNE LP 100 mg**, ou **PROFÉNID LP 200 mg**, 1 cp. au dîner ; ou **VOLTARÈNE 100 mg** ou **PROFÉNID LP 100 mg**, 1 sup. au coucher ; ou un **oxicam** : **FELDÈNE**, **BREXIN**, **CYCLADOL** ou autre, 1 cp. (ou supp.), le soir, pendant 2 à 3 sem.

#### Période secondaire

Après cette période de 2 à 3 sem., deux circonstances sont à envisager.

##### ► *Amélioration satisfaisante*

La reprise de l'activité sera progressive, en évitant le surmenage du rachis cervical ; un **antalgique usuel** peut être utile.

##### ► *Néuralgie non guérie*

Des douleurs, traînantes mais tolérables, peuvent persister pendant parfois plusieurs mois. Après avoir confirmé le caractère « commun » de la NCB (analyse clinique critique, radiographies et biologie usuelles avant d'envisager une IRM ou un scanner), le traitement précédent sera poursuivi, à la dose minimale active, en s'assurant de sa bonne tolérance.

Un **anxiolytique** peut lui être associé parfois.

Il faut signaler la persistance parfois très prolongée de paresthésies digitales, désagréables plus que douloureuses, pour lesquelles la prescription classique de **vitamines du groupe B** n'est pas toujours efficace.

### Néuralgie cervico-brachiale

Il n'y a pas lieu d'effectuer un EMG dans la névralgie cervico-brachiale typique avant l'épreuve du traitement médical, sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies :

- absence d'anomalies neurologiques laissant préjuger de la gravité de l'atteinte radiculaire ;
- absence de doute diagnostique.



## NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE (2)

### Névralgie cervico-brachiale sévère

#### Traitement d'une forme hyperalgique

Lorsque la douleur est d'emblée majeure, ou lorsqu'elle n'a pas été atténuée par quelques jours du traitement d'une névralgie cervico-brachiale commune, tout en s'assurant qu'il ne s'agit pas d'une NCB « symptomatique », il devient indispensable de prescrire un traitement plus actif.

- **Antalgiques** majeurs, pour une courte période, par exemple :

- **tramadol** (**TOPALGIC**, **CONTRAMAL**, etc.), 50 à 100 mg, x 1 à 2/j, sur ordonnance simple ;

- voire **buprénorphine** (**TEMGÉSIC**), 1 cp. sublingual, x 1 à 3/j, prescription sur ordonnance sécurisée ;

- ou autre **dérivé morphinique**, en prenant en compte la possibilité d'effets secondaires.

- **Corticothérapie par voie orale**, en remplacement des **AINS**, et sous réserve des contre-indications ou précautions habituelles, selon un schéma dégressif, par exemple **prednisolone** (**CORTANCYL**) 5 mg (2 boîtes de 30 cp. suffisent) :

- 30 mg/j les 2 ou 3 premiers j ;
- 25 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 20 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 15 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 10 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;

en fractionnant la dose en 2 prises, la plus élevée le soir.

Régime peu salé, et apport éventuel de potassium.

#### Exceptionnellement corticothérapie locale, par voie intra-durale :

- selon la technique de Luccherini (ponction lombaire), en milieu hospitalier ;

- 1 ou 2 injections, à 3 ou 4 j d'intervalle d'**HYDROCORTANCYL** (75 à 125 mg, d'une ampoule dosée à 125 mg).

Cette voie donne d'excellents résultats, mais peut entraîner un syndrome post-PL et d'exceptionnelles complications graves : thrombophlébites cérébrales, infection, qui doivent toujours être prises en considération par le prescripteur.

Après cette phase hyperalgique, le traitement rejoint celui de la forme d'intensité moyenne.

#### Traitement des formes réellement rebelles

Au-delà de 2 à 3 mois d'un traitement médical bien conduit et bien suivi, il peut être légitime de discuter les indications d'un geste neurochirurgical, après avoir vérifié, en général par une IRM, l'existence d'une hernie discale concordante avec la clinique.

Cette situation reste exceptionnelle en pratique.

## LUMBAGO (1)

Affection bénigne, mais invalidante, **guérissant spontanément en moins de 1 sem.**, rarement 2, le lumbago ne doit pas être aggravé par des manipulations, des tractions, une kinésithérapie vertébrale en période aiguë, des mobilisations intempêtes, qui risquent de le transformer en sciatique.

Les clichés du rachis dorso-lombaire, lorsqu'ils sont nécessaires (première crise de lumbago, lumbagos atypiques), seront faits après la guérison.

L'interrogatoire suffit souvent à reconnaître l'origine discale de l'accident. Il est cependant des lumbagos symptomatiques d'affections rachidiennes inflammatoires, infectieuses ou malignes, justifiant de répéter l'examen clinique, de demander une vitesse de sédimentation, de relire les clichés lorsqu'un lumbago se prolonge.

La mise au repos, voire l'arrêt de travail, doivent être adaptés à chaque cas.

### Formes mineures

Elles peuvent ne durer que quelques jours, et ne nécessitent parfois comme traitement que la prescription d'**aspirine** ou de **paracétamol**, à la dose de 1,5 à 3 g/j, régulièrement répartie, et un **repos relatif**.

### Formes habituelles

Le traitement comporte :

- le **repos**, plus ou moins strict, en fonction de l'impotence fonctionnelle et de l'activité du sujet ;
  - des **antalgiques usuels** pendant 4 à 6 j : **aspirine** ou **paracétamol**, 1,5 à 3 g/j ;
- L'emploi des **myorelaxants**, dont personnellement nous pensons qu'ils rendent un

service non négligeable à un certain nombre de patients, a subi des modifications en 2013.

Le **MYOLASTAN** et ses génériques n'ont plus l'AMM, pour insuffisance de service rendu.

L'indication du **thiocolchicoside** est libellée ainsi : traitement d'appoint des contractions musculaires douloureuses en rhumatologie **MIOREL**, ou **COLTRAMYL**, 1 gél. ou 1 cp. x 2 à 3/j.

les **AINS** ne sont pas indispensables initialement.

### Formes aiguës

On pourra ajouter :

- un **antalgique plus puissant : association d'antalgiques** ;
- un **AINS** : la prescription semble légitime lorsque les **antalgiques usuels** n'ont pas eu d'efficacité sur la douleur au bout de 24 à 48 h ; en cure brève de quelques jours, par voie orale le plus souvent, éventuellement par voie IM les 2 premiers jours,
  - soit **diclofénac (VOLTARÈNE 50 mg)**, 1 cp. x 3/j aux repas, ou **kétoprofène (PROFÉNID 100 mg)** 1 cp. x 2/j aux repas,
  - soit **piroxicam : FELDÈNE 20 mg**, 1 ou 2 gél. ou cp. dispers. le 1<sup>er</sup> j, puis 1 seul/j, etc. ;
- le repos s'impose, au lit, en recherchant la position la plus confortable, pendant quelques jours, un lever trop précoce risquant de prolonger l'évolution ; la station assise est déconseillée.

Il convient, en outre, de rassurer le malade, très vite inquiété par la sensation de blocage et l'intensité de la douleur.

### Lumbago

Il n'y a pas lieu de demander ou de pratiquer un scanner et/ou une IRM, devant une lombalgie aiguë ou un lumbago d'effort, en dehors des cas où les données cliniques et/ou paracliniques font craindre une lombalgie symptomatique.

Par lombalgie symptomatique, on entend les lombalgies révélatrices d'une pathologie infectieuse, inflammatoire, tumorale ou extra-rachidienne.

## LUMBAGO (2)

### Après la phase aiguë

La reprise du travail sera prudente et adaptée : le port d'une ceinture de contention lombaire semi-rigide peut être utile.

Il faut éviter (cf. Conseils pour les lombalgies discales) :

- le port de charges ;
  - les efforts de soulèvement ;
  - les mouvements brusques de flexion-extension du rachis lombaire ;
  - la station assise prolongée, les voyages ou trajets prolongés en voiture, train, etc.
- Ces précautions sont également utiles pour **tenter** de diminuer le risque de récurrences à plus ou moins long terme.

La prescription d'**antalgiques** peut être justifiée pour accélérer la disparition du fond douloureux qui persiste souvent après le lumbago aigu.

### À distance de la période douloureuse

10 à 15 séances de gymnastique vertébrale (en évitant tout surmenage et tout

effort brutal) sont un complément justifié pour renforcer la musculature lombaire et abdominale (« verrouillage lombaire »), et faire prendre conscience au patient des mouvements à éviter et de ceux qui sont préférables.

Nous pensons qu'il y a intérêt à conseiller au sujet une activité physique régulière, par exemple la natation.

Il faut expliquer au patient qu'il a fait un « accident de parcours », certes susceptible de récidiver, voire de se compliquer de sciatique, mais qu'il ne doit pas se considérer comme un « invalide de la colonne vertébrale ».

Dans les métiers exposés aux efforts, des aménagements de poste peuvent être demandés, temporairement ou définitivement, mais le changement de profession ne doit pas être envisagé sans en avoir pesé tous les inconvénients.

### Lumbago

Il n'y a pas lieu, dans la lombalgie aiguë, de prescrire des séances de rééducation fonctionnelle. La lombalgie aiguë est définie par une douleur évoluant depuis moins de 3 mois et dont l'intensité est telle que l'activité quotidienne personnelle ou professionnelle ne peut être maintenue au même niveau.

## LOMBALGIES (1)

### Lombalgie statique

#### Caractérisation

- Survenue de douleurs de type mécanique en position assise et debout prolongée, en fin de journée ou en fin de matinée.
- Dissociation entre l'importance des douleurs décrites et, à l'examen, une mobilité assez bien conservée voire indolore en antéflexion.
- Divers facteurs organiques dont le rôle relatif n'est pas toujours évident à préciser : spondylolisthésis, arthrose interapophysaire postérieure, hyperlordose, insuffisance musculaire, discopathie.
- Fréquents facteurs psychologiques et socioprofessionnels, qui devront être appréciés et discutés avec le patient car ils entretiennent les poussées.

#### Traitement

- **Antalgiques usuels** à dose suffisante.
- Kinésithérapie : 15 séances de rééducation avec renforcement de la musculature lombo-abdominale et gymnastique en cyphose, en particulier dans les hyperlordoses.
- Dans certains cas où le rôle d'une articulation inter-apophysaire postérieure peut

être retenu, il peut être indiqué de faire une **injection locale de corticoïde**, sous contrôle radiologique.

### Lombalgie fonctionnelle

#### Caractérisation

- Prédominance des éléments psychologiques : sensation de brûlure permanente, non influencée par les mouvements ni par l'horaire mais par la fatigue et les contrariétés.
- À l'examen clinique : une bonne mobilité du rachis mais des douleurs surtout à la pression des masses musculaires.


#### Traitement

Il commence par un interrogatoire attentif, par un examen minutieux, par un diagnostic rassurant de bénignité, éléments importants d'une psychothérapie indispensable.

Il sera complété par quelques **antalgiques usuels** non agressifs à dose modérée, et éventuellement par des massages et une rééducation à condition qu'ils soient bien tolérés et n'aggravent pas les douleurs.

Dans certains cas où la lombalgie ne fait que témoigner d'une authentique dépression nerveuse, un traitement antidépresseur peut être nécessaire.

### Conseils pour les lombalgies discales



## LOMBALGIES (2)

### Lombalgie commune discale

La **lombalgie commune** correspond à une définition négative, « d'exclusion ».

Il convient d'avoir écarté les causes des « **lombalgies symptomatiques** » : spondylodiscites, spondylarthrite ankylosante et spondylarthropathies inflammatoires, tumeurs bénignes ou malignes rachidiennes ou intrarachidiennes, myélome, métastases osseuses et épидurites néoplasiques, tassements vertébraux ostéoporotiques, pathologies de voisinage diverses. La **lombalgie commune discale** (discopathie, discarthrose lombaire) est spontanée ou secondaire à un lumbago, voire à une sciatique. La poussée peut durer 1 à 2 mois ou plus.

### En cas de douleur de type mécanique

Le repos relatif est souvent utile au début, associé à des **antalgiques** : **paracétamol**, 1,5 à 3 g/j et/ou **aspirine**, 1,5 à 2 g/j. Pour le **paracétamol** 500 mg : 1 cp. ou gé. toutes les 4 h (vers 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), plus 1 ou 2 prises/j, pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée.

Lorsqu'il existe aussi une douleur au réveil ou une douleur nocturne lors des mouvements, on peut y adjoindre pendant 1 à 2 sem. un **AINS**, par exemple : **diclofénac (VOLTARÈNE)**, 1 sup. au coucher ou 1 cp. à 75 mg à libération prolongée au dîner.

Le **MYOLASTAN** et ses génériques n'ont plus l'AMM, pour insuffisance de service rendu.

L'indication du **COLTRAMYL** et de ses génériques est libellée ainsi : traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie.

### En cas de formes très prolongées

- Soit une cure d'un **AINS**, pendant quelques semaines.
- Soit 1 ou 2 inj. épidurales de **corticoïdes** à 1 ou 2 sem. d'intervalle (**cortivazol** : **ALTIM**, **prednisolone** : **HYDROCORTANCYL**).

### En cas de formes récidivantes et dans les lombalgies chroniques

Il faut souvent proposer en plus :

- une gymnastique de rééducation : 15 séances de renforcement de la musculature lombo-abdominale avec exercices de « verrouillage », progressives pour ne pas aggraver les douleurs et de préférence en piscine. Le sujet devra par la suite faire régulièrement lui-même les exercices.

Chez le sujet exerçant un travail éprouvant pour le rachis, avant d'envisager une réorientation professionnelle, il peut être utile de prescrire, en particulier lors de la reprise du travail :

- soit une ceinture de contention lombaire type *Lombax* ou *CSL Gibortho*, ou lombo-abdominale type *Lombacross* ou *Gibortho* ;

- beaucoup plus rarement un corset d'immobilisation vertébrale, type *CIVA* pour une immobilisation légère, ou *CIVB* pour une immobilisation plus importante. Il faut en préciser la hauteur, en général D12, parfois D9.

Dans les lombalgies chroniques, il est essentiel de tenir compte des facteurs psychologiques éventuellement associés (cf. Douleur en rhumatologie).

### Dans tous les cas

Des conseils de ménagement du rachis, simples, sont nécessaires et ils devront être appliqués même à distance des crises. Il est nécessaire de rassurer les sujets, et souvent de rappeler qu'il n'y a aucun parallélisme entre les manifestations douloureuses et l'importance des images radiologiques.

### Dans les lombalgies communes

- Les méthodes de masso-kinésithérapie dites à effet antalgique direct sont le plus souvent perçues comme sédatives par le patient, notamment le massage et le réchauffement local. Il n'existe cependant aucune preuve de leur efficacité durable dans le traitement de la lombalgie chronique.
- Les méthodes dites à effet antalgique direct ne sont qu'adjuvantes et ne doivent donc pas résumer la séance de masso-kinésithérapie.

- Les soins de masso-kinésithérapie ne peuvent qu'être prescrits après une évaluation médicale orientant vers des objectifs thérapeutiques précis et qui seront pris en compte dans l'appréciation des résultats.

- Il n'y a pas lieu de prescrire en première intention plus de 15 séances de masso-kinésithérapie dans la lombalgie chronique.

## NÉVRALGIE CRURALE - CRURALGIE

Comme la lombosciatique, la névralgie crurale est habituellement le fait d'une hernie discale, mais un certain nombre de points différents méritent d'être soulignés : l'évolution habituelle dure 2 à 3 mois avec assez souvent une diminution franche des douleurs après la 3<sup>e</sup> sem.

55 % des névralgies crurales guérissent en 6 sem., et 85 % en 12 sem. ; presque toutes dans un délai plus long.

Il est très rare qu'une intervention radicale soit nécessaire.

Une recrudescence nocturne est habituelle, au début, dans la névralgie crurale, et n'est pas nécessairement le fait d'une tumeur intrarachidienne ou d'un cancer secondaire du rachis.

### Étiologie

Le plus souvent une hernie discale dont le siège est souvent foraminaux.

Il ne faut pas méconnaître une étiologie autre : métastases osseuses, spondylodiscite, tumeur intrarachidienne.

Les clichés standards doivent être lus attentivement, une enquête biologique minimum effectuée.

En l'absence de signes rachidiens à l'examen clinique, il faut penser à une atteinte tronculaire.

La névralgie crurale dite idiopathique est particulièrement douloureuse et fréquente chez le sujet âgé.

L'association à un diabète est possible et mérite d'être recherchée, au moins pour certains traitements.

### Conduite du traitement

Le traitement de la névralgie crurale, discale ou idiopathique, est conduit de la même façon que pour une sciatique discale commune, avec quelques particularités.

#### Pendant la phase aiguë

- **Antalgiques** plus puissants : en particulier pour la nuit, par exemple (**LAMALINE**) : 1 sup. le soir au coucher, ou **tramadol**

(**TOPALGIC**) : 1 à 2 gél. à 50 mg le soir, voire un **dérivé morphinique**.

- **Myorelaxant** : il pouvait être utile pour la nuit. Toutefois en 2014, le **MYOLASTAN** et ses génériques n'ont plus l'AMM, pour insuffisance de service rendu.

- **Anti-inflammatoires** par voie générale : ils sont souvent indiqués dès le début, mais les **AINS** s'avèrent vite insuffisants ; on aura recours alors à la corticothérapie : **prednisolone (CORTANCYL)** 5 mg (2 boîtes de 30 cp. suffisent) :

- 30 mg/j les 2 ou 3 premiers j ;
- 25 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 20 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 15 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;
- 10 mg/j les 2 ou 3 j suivants ;

en fractionnant la dose en 2 prises, la plus élevée le soir ; en l'absence de diabète et avec les précautions habituelles à cette prescription.

- **Traitement corticoïde par voie locale** : une épidurale voire une intradurale peuvent être rapidement envisagées, de préférence en milieu hospitalier. La voie intradurale donne d'excellents résultats, mais peut entraîner un syndrome post-PL et d'exceptionnelles complications graves : thrombophlébites cérébrales, infection, qui doivent toujours être prises en considération par le prescripteur.

#### Après la phase aiguë

Le traitement et les conseils sont ceux de la sciatique.

Des paresthésies et des dysesthésies dans le territoire du crural persistent assez souvent après la guérison de la douleur.

Une rééducation musculaire peut aider à la récupération de la force musculaire du quadriceps et du psoas.

### Névralgie crurale prolongée ou récidivante à court terme

Dans cette éventualité rare, après un traitement bien conduit et suivi, et après épreuve du repos strict au lit, on peut envisager une indication opératoire après confirmation de la hernie discale par une tomodensitométrie, voire une IRM.

## NÉVRALGIE DU FÉMORO-CUTANÉ

Cette affection est souvent appelée *méralgie parasthésique*.

Le tableau se caractérise par des **dysesthésies** à tonalité plus désagréable que douloureuse à la face externe de la cuisse (**en raquette** à manche supérieur). Il n'y a pas de signes moteurs.

Son origine est parfois au rachis (irritation d'une des racines du fémoro-cutané : L2 et L3) ou au bassin, mais le plus souvent la névralgie résulte d'une irritation du nerf lors de son passage sous le fascia iliaca à la hauteur de l'épine iliaque antéro-supérieure, à la suite de microtraumatismes répétés (appui de sac à dos par exemple). Son pronostic est bénin, et il faut rassurer le malade, mais le traitement est fréquemment décevant et les parasthésies peuvent perdurer des années, mais souvent de manière intermittente.

Le diabète sucré peut être en cause dans cette névralgie.

### Formes canalaire habituelles

L'abstention, ou la simple prescription d'un **antalgique**, peuvent suffire.

Les infiltrations locales sont parfois utiles :

on injecte un dérivé de la cortisone, **prednisolone (HYDROCORTANCYL)** amp. de 5 mL (1 à 2 mL), **cortivazol (ALTIM)**, ampoule seringue de 1,5 mL, parfois mélangé à un **anesthésique, lidocaïne (XYLOCAÏNE 1 %)** : 1 à 3 mL au niveau de l'émergence du nerf sous l'épine iliaque antéro-supérieure.

Elles seront éventuellement répétées : 2 à 4 par série à 10 ou 15 j d'intervalle.

Dans les formes rebelles ou récidivantes et gênantes, la résection de l'épaississement du fascia iliaca avec libération du nerf comprimé a été proposée et a donné des résultats favorables.

### Formes d'origine rachidienne

Le repos relatif, les **antalgiques mineurs** peuvent suffire, mais un traitement AINS est parfois nécessaire, pour une courte période.

### Formes d'origine pelvienne

Il est parfois possible d'identifier un éventuel facteur de compression extrinsèque du nerf, sur lequel un geste est parfois envisagé, en fonction de la nature présumée de la compression.

## NÉVRALGIE SCIATIQUE (1)

### Lombosciatique discale

#### Traitement principal

Le traitement de la majorité des sciaticques par hernie discale est presque exclusivement médical.

La guérison de la **douleur sciatique** survient en 6 sem. dans 50 % des cas, en 12 sem. dans 70 % des cas, dans un délai plus long dans 90 à 95 % des cas.

Après guérison de la douleur sciatique la lombalgie peut disparaître ou persister (cf. Lombalgie commune discale).

#### ► Formes mineures

Dans ces formes très fréquentes, la gêne occasionnée par la lombalgie est habituellement supérieure à celle de la douleur sciatique.

En outre celle-ci n'est pas toujours permanente, ni complète.

On pourrait employer le terme de sciatalgie (douleur sciatique) plutôt que celui de névralgie sciatique.

Le traitement doit se rapprocher de celui de la lombalgie commune discale tant que la sciatalgie n'est qu'un épiphénomène.

#### ► Formes habituelles

Il s'agit de névralgie sciatique discale commune, récente, d'intensité moyenne mais invalidante.

Le traitement associe plusieurs éléments.

- Le repos :
  - plus ou moins strict selon l'impotence : au lit, ou en limitant les stations assise et debout prolongées ;
  - pendant quelques jours ou quelques semaines, en fonction de l'amélioration et en expliquant au malade qu'une reprise trop rapide de l'activité normale risque d'aggraver ou de prolonger la crise ;
  - en choisissant l'attitude qui soulage le mieux le malade, éventuellement sur un lit dur, ou en interposant une planche entre le sommier et le matelas.

#### • Les antalgiques :

- **aspirine** et/ou **paracétamol**, à dose suffisante (1,5 à 3 g/j) ;
- ou associations à base de **paracétamol** ;
- il n'y a jamais d'indication à prescrire des opiacés ou **antalgiques** voisins, dans ce type de sciatique.

Un **myorelaxant** : le choix pouvait être déterminé par l'activité nécessaire au patient, les uns pouvant induire une somnolence, les autres une diarrhée.

Toutefois, l'emploi des myorelaxants, dont personnellement nous pensons qu'ils rendent un service non négligeable à un certain nombre de patients, a subi des modifications en 2013.

Le **MYOLASTAN** et ses génériques n'ont plus l'AMM, pour insuffisance de service rendu.

L'indication du **thiocolchicoside** est libellée ainsi: traitement d'appoint des contractions musculaires douloureuses en rhumatologie: **MIOREL**, ou **COLTRAMYL**, 1 gél. ou 1 cp. x 2 à 3/j.

• Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens**, sous réserve des contre-indications et des précautions habituelles, sont indiqués :

- lorsqu'il existe une douleur nocturne, dans les premiers jours de la crise ;
- lorsque après 24 à 48 h du traitement précédent l'amélioration ne s'amorce pas.

On prescrit :

- soit **diclofénac** : **VOLTARÈNE**, 50 mg, 1 cp. x 3/j aux repas, ou **VOLTARÈNE LP**, 75 mg, 1 cp. x 2/j ; ou **kétoprofène** : **BI-PROFÉNID**, 100 mg, 1 cp. x 2/j ;
- soit **piroxicam** : **FELDÈNE 20 mg**, 1 gél. ou 1 cp. dispersible/j, etc.

Généralement ils sont prescrits par la voie orale qui est suffisante ; dans les cas où elle est employée, la voie IM sera brève. La posologie est adaptée en fonction de l'évolution.



## NÉURALGIE SCIATIQUE (2)

### Traitements secondaires

Ils prennent place après évaluation des résultats du traitement initial de la sciatique.

#### ► Si l'amélioration est manifeste

Le repos relatif se justifie, avec éventuellement la prescription d'une ceinture de contention lombaire.

Les **antalgiques** et **AINS** seront poursuivis à dose suffisante, pendant quelques semaines.

La reprise de l'activité sera prudente et progressive, adaptée à chaque cas.

#### ► S'il n'y a pas de tendance à l'amélioration

Tout en reconsidérant le caractère discal de la sciatique :

- une immobilisation plâtrée ou par matériau thermoformé pendant 3 à 4 sem. peut être proposée ;

- une épreuve de repos strict est nécessaire, pendant 5 à 7 j, au besoin en hospitalisation ;

- les **antalgiques** et **AINS** seront adaptés ;

- des injections épidurales de **corticoïdes** seront envisagées.

En milieu hospitalier de préférence, ou par un médecin maîtrisant bien la technique, soit par le premier trou sacré, soit par l'espace inter-épineux en utilisant la technique de la rachicentèse, mais en arrêtant la progression dès que l'on a franchi le ligament jaune ; dans les 2 cas, en s'assurant que l'on ne retire pas de LCR.

Injection de 1 à 2 mL d'un dérivé cortisonique en général sous forme de suspension : **cortivazol (ALTIM)**, ou **prednisolone (HYDROCORTANCYL)**.

Les injections sont répétées à un rythme variable (tous les 4 à 7 j) en fonction du résultat thérapeutique.

Exceptionnellement des injections intraducales de **corticoïdes** seront envisagées.

### Après la phase aiguë

#### ► Reprise de l'activité

Elle sera prudente.

Il faut éviter le port de charges, les efforts de soulèvement, les mouvements brusques de flexion-extension du rachis lombaire, la station assise prolongée, les voyages ou trajets longs en voiture, train, etc.

Ces précautions sont également utiles pour tenter de diminuer le risque de récurrences à plus ou moins long terme.

#### ► Prescription d'antalgiques

Elle peut être justifiée pour accélérer la disparition du fond douloureux qui persiste souvent après l'épisode aigu de sciatique. Des paresthésies et des dysesthésies dans le territoire sciatique persistent assez souvent après la guérison de la douleur ; elles n'ont pas de caractère de gravité.

#### ► À distance

10 à 15 séances de gymnastique vertébrale (en évitant tout surmenage et tout effort brutal) sont un complément justifié pour renforcer la musculature lombaire et abdominale (« verrouillage lombaire ») et faire prendre conscience au patient des mouvements à éviter et de ceux qui sont préférables.

Il y a intérêt à conseiller au sujet une activité physique régulière, par exemple la natation.

Il faut expliquer au patient qu'il a fait un « accident de parcours », certes susceptible de récidiver, mais qu'il ne doit pas se considérer comme un « invalide de la colonne vertébrale ».

Dans les métiers exposés aux efforts, des aménagements de poste peuvent être demandés, temporairement ou définitivement, mais le changement de profession ne doit pas être demandé sans en avoir pesé tous les inconvénients.

## NÉURALGIE SCIATIQUE (3)

### Formes graves

#### Sciatique rebelle ou récidivante

Lorsqu'au terme de 1 à 2 mois la sciatique ne s'améliore pas, malgré un traitement médical **correctement suivi** et ayant comporté une effective **épreuve de repos** complet au lit, ou lorsqu'une sciatique récidive à court ou moyen terme, constituant effectivement une gêne, professionnelle ou dans la vie active, il faut envisager, avec l'accord formel du malade, une solution chirurgicale.

L'existence de signes cliniques objectifs est indispensable pour poser une telle indication. La mise en évidence et la localisation exacte de la hernie discale par scanner, ou éventuellement IRM, sont alors justifiées.

#### Sciatique hyperalgique

Dans cette éventualité rare (tout mouvement est quasiment impossible et le malade ne peut pas poser le pied), les prescriptions habituelles sont indiquées mais insuffisantes.

Les **antalgiques majeurs** pourront être utilisés pendant une brève période (3 à 4 j). La prescription d'**AINS** par voie générale (IM, voire en perfusion IV) est plus volontiers justifiée, ou celle d'une courte corticothérapie parfois.

La **corticothérapie locale** est souvent nécessaire :

- soit **épidurale**, comme précédemment ;
- soit par voie **intradurale**, sous-arachnoïdienne, selon la technique de Luccherini (ponction lombaire), en milieu hospitalier ; 1 ou 2 inj., à 3 ou 4 j d'intervalle, de **prednisolone (HYDROCORTANCYL)** : 75 à 125 mg, d'une amp. dosée à 125 mg ; après avoir retiré par l'aiguille de ponction lombaire 1 mL de LCR que l'on analyse systématiquement.

Cette voie donne d'excellents résultats, mais peut entraîner un syndrome post-PL et d'exceptionnelles complications graves : thrombophlébites cérébrales, infection, qui doivent toujours rester à l'esprit du prescripteur.

Une **solution chirurgicale précoce** est parfois envisagée, en cas d'échec d'un traitement médical mené au maximum de ses possibilités.

#### Sciatique paralysante

C'est l'intensité du déficit moteur qui définit les formes dites paralysantes, et non l'intensité de la douleur.

L'existence d'un déficit moteur discret est assez fréquente au cours d'une sciatique commune ; il ne s'agit pas alors d'une sciatique paralysante, et son pronostic est habituellement très favorable.

Nous envisageons ici les déficits nets, se traduisant par un steppage (L5) ou l'impossibilité de se tenir sur la pointe du pied (S1).

L'EMG n'est pratiquement jamais nécessaire, et fait l'objet d'une BPC (cf. Encadré ci-dessous).

##### ► Si la paralysie est vue précocement

L'indication chirurgicale est justifiée pour la majorité des auteurs, surtout lorsqu'elle ne coïncide pas avec la disparition des douleurs ; toutefois les chances de récupération sont meilleures avant 50 ans qu'après, et il faut en tenir compte.

##### ► Si la paralysie est vue tardivement

Pas d'indication chirurgicale. Le déficit relève d'une rééducation souvent longue.

##### ► Si la paralysie fait partie

d'un syndrome de la queue de cheval

L'indication est impérative et représente une **urgence neurochirurgicale**.

#### Néuralgie sciatique

Il n'y a pas lieu d'effectuer un EMG dans la sciatique commune avant l'épreuve du traitement médical, sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies : absence d'anomalies neurologiques laissant préjuger de la gravité de l'atteinte radiculaire et absence de doute diagnostique.

## NÉVRALGIE SCIATIQUE (4)

### Traitement « radical » de la sciatique

Dans les formes qui, après un traitement médical bien conduit, dépassent le délai habituel de guérison (6 à 8 sem.), ou dans certaines formes hyperalgiques ou compliquées, on est amené à discuter d'un traitement plus « radical ».

### Critères et objectif

Le siège du conflit disco-radulaire doit être précisé par une imagerie, et l'on doit s'assurer de sa concordance avec le tableau clinique.

Il est indispensable de tenir compte du psychisme du sujet, de la notion éventuelle d'accident de travail.

L'objectif est la guérison de la douleur « radulaire » sciatique, qui est alors obtenue dans la grande majorité des cas, mais il ne met pas nécessairement le malade à l'abri de douleurs lombaires ultérieures, car le disque traité est déjà pathologique, ni de sciatique par hernie à un autre étage.

### Choix de la technique

En accord avec le patient, en fonction de critères anatomiques et cliniques propres à chaque méthode, le choix se fait entre 2 types de traitement.

#### ► *Traitement chirurgical classique*

- Exérèse de la hernie discale et curetage du disque pathologique pour limiter le risque de récidives.

- L'intervention se fait sous anesthésie générale ; le résultat est satisfaisant dans 9 cas sur 10 environ.

- Les suites opératoires sont simples, avec sortie vers le 10<sup>e</sup> j, voire plus tôt, et reprise de l'activité habituelle, lorsqu'elle n'est pas déconseillée, entre la 4<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> sem.

#### ► *Nucléotomie chirurgicale percutanée, nucléotomie au laser, en milieu spécialisé*

- Ces interventions, qui doivent répondre à des conditions anatomiques précises (hernie de petit volume et non « exclue »), ont des suites plus courtes.

- Elles se font sous neuroleptanalgie en salle d'opération et sous contrôle radiologique ; le résultat est satisfaisant dans 6 à 8 cas sur 10 sur la douleur sciatique ; les échecs peuvent bénéficier de la chirurgie.

- Le résultat ne peut en être apprécié avant 1 mois ; pendant cette période les lombalgies sont fréquentes, parfois plus importantes qu'au début, pouvant justifier la prescription d'**antalgiques** et d'**anti-inflammatoires non stéroïdiens** et le port d'un lombostat plâtre.

## CANAL LOMBAIRE ÉTROIT

### Symptomatologie

Nous n'envisagerons ici que les symptômes en rapport avec le canal lombaire rétréci par l'arthrose, chez un sujet âgé, cas le plus fréquent.

Les manifestations, d'abord dysesthésiques et volontiers plantaires, puis douloureuses, de type radiculaire uni- ou bilatéral, surviennent à la marche et vont progressivement raccourcir le périmètre de marche.

Pour se soulager, le sujet a tendance à marcher penché en avant.

Il faut toujours s'assurer de l'absence d'artériopathie des membres inférieurs.

### Conduite du traitement

#### Dans les formes mineures

Amaigrissement, rééducation du rachis lombaire, visant à renforcer la musculature abdominale, et **antalgiques** peuvent suffire.

#### Dans les formes plus invalidantes

- En plus des méthodes précédentes, les injections épidurales de **corticoïdes** par voie inter-épineuse, comme dans la scia-

tique, ont souvent un effet bénéfique parfois pendant plusieurs mois ou plus. Dans ces cas il est légitime de répéter les injections en fonction de la reprise des symptômes, mais en se fixant une limite (arbitraire : 3 ou 4 pour 12 mois consécutifs).

- L'existence d'un diabète qui pourrait être déséquilibré peut limiter cette indication.

- Toujours penser à demander au sujet âgé s'il n'est pas sous anticoagulants.

#### Dans les formes sévères ou rebelles

- Si l'état général du patient le permet, si le bénéfice attendu est supérieur aux inconvénients de la méthode, on peut discuter un traitement chirurgical (laminectomie, parfois complétée par un geste sur une hernie discale associée).

- C'est uniquement dans de tels cas que la prescription d'une IRM est nécessaire pour apprécier l'étendue en hauteur de la sténose, dont va dépendre l'étendue de la libération chirurgicale.

- Le résultat, dans les cas bien sélectionnés, en est habituellement favorable, mais n'est pas exempt de récides à plus ou moins long terme.

## SCOLIOSES

### Nosologie

La scoliose est définie par une déformation du rachis dans les 3 plans de l'espace, et sur des radiographies de face par une courbure anormale dans le plan frontal associée à une rotation des corps vertébraux.

Il faut opposer :

- d'une part les scolioses idiopathiques et les scolioses secondaires : scolioses post-paralytiques, scolioses secondaires à des tumeurs rachidiennes d'évolution lente ou des malformations vertébrales, scolioses associées à des dysplasies conjonctives et/ou osseuses ;
- d'autre part les scolioses survenant avant maturité osseuse et les scolioses de l'adulte.

### Scolioses idiopathiques de l'adolescent

Les décisions thérapeutiques tiennent compte :

- du temps de croissance restant et du statut pubertaire, de la tendance évolutive, avec mesure de l'angle de Cobb apprécié sur des radiographies **en position couchée**, comparables, à 4 mois d'intervalle ;
- du retentissement somatique éventuel, respiratoire voire neurologique ;
- du retentissement psychoaffectif.

L'avis d'un médecin spécialisé dans les scolioses est justifié pour les scolioses « vraies » de l'enfant et de l'adolescent.

### Scolioses inférieures à 30°

Elles ne nécessitent pas de traitement tant qu'elles ne sont pas évolutives.

Dans le cas contraire, elles relèvent :

- d'une rééducation avec corset orthopédique la nuit avant la puberté ;
- d'une immobilisation plus conséquente en phase pubertaire ;
- d'une rééducation seule après la poussée pubertaire.

### Scolioses supérieures à 30°

Elles justifient l'avis et la prise en charge éventuelle en service spécialisé :

- tant pour les décisions d'immobilisation par plâtres successifs ou corsets ;
- que pour les décisions chirurgicales qui sont envisagées quand l'angle de Cobb est supérieur à 50°.

### Scolioses de l'adulte

Elles sont habituellement longtemps bien tolérées.

Dans certains cas la survenue répétée de lombo-radicalgies mécaniques fait discuter la responsabilité directe de la scoliose ; celle-ci ne doit être envisagée que lorsque les symptômes ne régressent pas après un traitement classique.

Les indications opératoires sont exceptionnelles, et les complications semblent plus fréquentes que chez l'enfant. Il est alors très important de pouvoir disposer de radios permettant d'apprécier l'évolution sur plusieurs années.

### Attitudes scoliotiques

L'attitude scoliotique, à la différence de la scoliose vraie, disparaît dans le décubitus, et dans la flexion antérieure du rachis.

Elles sont envisagées ici pour rappeler :

- que les douleurs qui leur sont attribuées ou associées sont souvent d'origine musculaire ;
- que les **antalgies** ne sont pas toujours nécessaires et encore moins les **AINS** ;
- que la kinésithérapie est certes utile pour corriger la mauvaise posture, mais qu'elle ne doit pas être prolongée trop longtemps ;
- que l'activité sportive doit être encouragée, en particulier la natation, mais aussi toute activité physique « gratifiante » donc susceptible d'être poursuivie régulièrement ;
- qu'il ne faut pas transformer ces sujets jeunes en malades potentiels chroniques, et qu'il faut dédramatiser certaines situations, en particulier les comparaisons familiales ;
- que la prise en charge psycho-affective est très importante.

## MONOARTHITES INAUGURALES (1)

### Généralités

La plupart des affections rhumatismales peuvent se révéler, ou se manifester, par un tableau de monoarthrite isolée.

Dans cette circonstance, l'enquête étiologique doit être pragmatique et privilégier la recherche d'une cause relevant d'un traitement urgent (antibiothérapie des arthrites septiques), ou relativement ciblé (colchicine dans la goutte) ; une fois ces situations écartées, le traitement consiste habituellement en la prescription d'un **AINS** à dose suffisante, par exemple :

– **piroxicam (FELDÈNE 20 mg)** ou générique : 1 gél. ou 1 cp. dispersible x 1 ou 2/j pendant 2 j, puis 1/j pendant 4 à 8 j ; ou un autre **oxicam (BREXIN, CYCLADOL, TILCOTIL, MOBIC 15 mg)**, ou générique ;

– ou pendant les 2 à 6 premiers j : **naproxène (APRANAX 550)** : 1 cp. matin et soir ; **diclofénac (VOLTARÈNE 50 mg)**, **kétoprofène (PROFENID 100 mg)**, ou **flurbiprofène (CEBUTID 100 mg)** : 1 cp. aux 3 repas, ou génériques.

Ensuite une dose inférieure sera prescrite chaque fois que possible, avant l'arrêt complet du traitement.

### Monoarthrites (MA) inaugurales

	PENSER D'ABORD À	CONTEXTE CLINIQUE	DEMANDER	PLUS RAREMENT
Monoarthrites infectieuses	Arthrite septique à germe banal	Porte d'entrée infectieuse (cutanée surtout), récente infiltration intra-articulaire, urétrite gonococcique	Mise en culture du liquide synovial, hémocultures, ECBU ± prélèvement urétral	Arthrites septiques subaiguës (tuberculose, brucellose, parasitaire, etc.)
Monoarthrites microcristallines	Goutte	Homme, siège préférentiel au pied (1 <sup>re</sup> MTP), genou	Cristaux d'urate dans le liquide synovial, uricémie habituellement élevée (peut diminuer lors d'une crise inflammatoire articulaire)	
	Chondrocalcinose	Sujet âgé (H, F) postopératoire	Cristaux de pyrophosphate de calcium dans le liquide synovial, uricémie normale, liserés calciques sur les radiographies des poignets, des genoux, du bassin	
Monoarthrites rhumatismales	Polyarthrite rhumatoïde	Femme 35 à 55 ans	Facteurs rhumatoïdes, anticorps anti-CCP positifs	Autres formes périphériques de spondyloarthropathies (arthrites des maladies inflammatoires chroniques intestinales)
	Rhumatisme psoriasique	Antécédent personnel ou familial de psoriasis cutané		
	MA rhumatismale isolée, d'étiologie inconnue	Pronostic habituellement favorable en quelques mois	Diagnostic d'élimination	

## MONOARTHITES INAUGURALES (2)

### Monoarthrite rhumatismale

Cette entité clinique, d'étiologie indéterminée, est caractérisée par son pronostic généralement favorable, et guérit sans séquelles dans un délai de 2 à 3 mois.

Le **traitement** repose sur les **AINS**, ou une injection intra-articulaire de **corticoïdes**, voire une synoviorthèse par isotope radioactif, dans les formes plus prolongées.

Comme il s'agit d'un diagnostic d'élimination, une réserve s'impose : certaines affections rhumatismales définies peuvent se démasquer à retardement, après une période plus ou moins prolongée d'arthrite monofocale (c'est notamment le cas du rhumatisme psoriasique, davantage que des autres formes de spondyloarthrite ou de la polyarthrite rhumatoïde).

## POLYARTHRITE INAUGURALE

D'abord	penser à écarter une <b>septicémie</b> , une <b>endocardite</b> , qui relèvent d'une antibiothérapie urgente
	chez un <b>sujet jeune</b> , évoquer : – une polyarthrite gonococcique : antibiothérapie urgente, – un syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter : AINS
Ensuite	évoquer les <b>rares</b> formes polyarticulaires de <b>goutte</b> et <b>chondrocalcinose</b> : <b>COLCHICINE</b> et/ou AINS
Les autres polyarthrites inaugurales relèvent au début de :	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Traitement symptomatique, en fonction de :</p> <p>intensité des symptômes</p> <p>AINS —————&gt;</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>sujet âgé</p> <p>↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PPR</p> <p>↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Corticothérapie</p> </div> </div>

## MONOARTHITES INAUGURALES (2)

### Monoarthrite rhumatismale

Cette entité clinique, d'étiologie indéterminée, est caractérisée par son pronostic généralement favorable, et guérit sans séquelles dans un délai de 2 à 3 mois.

Le **traitement** repose sur les **AINS**, ou une injection intra-articulaire de **corticoïdes**, voire une synoviorthèse par isotope radioactif, dans les formes plus prolongées.

Comme il s'agit d'un diagnostic d'élimination, une réserve s'impose : certaines affections rhumatismales définies peuvent se démasquer à retardement, après une période plus ou moins prolongée d'arthrite monofocale (c'est notamment le cas du rhumatisme psoriasique, d'avantage que des autres formes de spondyloarthrite ou de la polyarthrite rhumatoïde).

## POLYARTHRITE INAUGURALE

D'abord	penser à écarter une <b>septicémie</b> , une <b>endocardite</b> , qui relèvent d'une antibiothérapie urgente
	chez un <b>sujet jeune</b> , évoquer : – une polyarthrite gonococcique : antibiothérapie urgente, – un syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter : AINS
Ensuite	évoquer les <b>rares</b> formes polyarticulaires de <b>goutte</b> et <b>chondrocalcinose</b> : <b>COLCHICINE</b> et/ou AINS
Les autres polyarthrites inaugurales relèvent au début de :	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Traitement symptomatique, en fonction de :</p> <p>intensité des symptômes</p> <p>AINS —————&gt;</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>sujet âgé</p> <p>↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PPR</p> <p>↓</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">Corticothérapie</p>



## CHONDROCALCINOSE ARTICULAIRE

### Diagnostic de la crise aiguë

Il repose majoritairement sur la clinique, particulière par :

- sa survenue chez le sujet de sexe féminin et de plus de 60 ans ;
- une atteinte préférentielle de certaines articulations (genou et poignet surtout) ;
- l'absence d'hyperuricémie ;
- l'existence de cristaux de pyrophosphate de calcium au sein du liquide de ponction articulaire ;
- et la présence de calcifications cartilagineuses sur les radiographies de face des poignets (calcification du ligament triangulaire du carpe), de face et de profil des genoux (liseré doublant à 1 ou 2 mm le contour épiphysaire associé à des calcifications méniscales), de face du bassin (liseré de la symphyse pubienne).

Bien que cette affection soit le plus souvent primitive, il importe de connaître l'existence de formes « secondaires » (hyperparathyroïdie primitive, hémochromatose, en particulier), qui justifient une prise en charge spécifique.

Il n'y a généralement pas de traitement de fond à envisager, en dehors de poussées inflammatoires itératives, qui peuvent nécessiter le maintien au long cours d'une faible dose de **colchicine** (1/2 à 1 mg/j).

### Traitement d'un accès aigu

- **Repos**, selon l'impotence.
  - **Anti-inflammatoires non stéroïdiens** :
    - **piroxicam** (**FELDÈNE**) ou générique, 20 mg, 1 gél. ou 1 cp. disp./j ou un autre **oxicam** de la même façon (**BREXIN**, **CYCLADOL**, **TILCOTIL**, **MOBIC 15 mg**), ou générique ;
    - ou **diclofénac** (**VOLTARÈNE**) : 100 à 150 mg/j, ou **kétoprofène** (**PROFÉNID**) : 200 à 300 mg/j ou générique ;
    - ou d'autres produits à dose efficace, administrés jusqu'à la fin de l'accès.
  - **Ponction évacuatrice de l'articulation**, qui peut éventuellement être complétée secondairement par une injection intra-articulaire de **corticoïdes**, sous réserve d'avoir préalablement écarté une infection :
    - avec une asepsie stricte ;
    - ex. : 1,5 mL de **cortivazol** (**ALTIM**) ;
    - que l'on pourra répéter 1 fois, si nécessaire, après un intervalle de 8 à 15 j.
- À signaler que la **colchicine** est assez souvent efficace, au même titre que lors des accès goutteux : 3 mg/j les 2 premiers j, 2 mg/j les jours suivants, 1 mg/j ensuite, jusqu'à 3 ou 4 j après la fin de la crise.

## GOUTTE (1)

## Accès aigu

Le traitement comporte 2 volets qui se complètent. Le malade doit en être averti et participer à son traitement, en comprenant bien la différence entre :

- le traitement symptomatique de l'accès goutteux, qui repose sur la **colchicine** et/ou les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ;
- le traitement de « fond », qui cherche à prévenir de nouveaux accès goutteux.

## Traitement symptomatique

## ► Premier accès aigu

Dans les situations évocatrices, même lorsque le diagnostic n'est pas assuré par le constat de cristaux d'urate intra-articulaires ou d'une hyperuricémie, la colchicine peut et doit toujours être tentée.

La **colchicine** ne modifie pas l'uricémie. Elle est plus efficace si elle est instituée précocement et à doses suffisantes.

Le schéma thérapeutique sera le suivant : **COLCHICINE** (cp. séc. à 1 mg) : 3 mg/j les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> j ; 2 mg/j les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> j ; 1 mg/j ensuite. En fonction de chaque cas particulier on peut être amené à modifier ce schéma mais sans dépasser la dose maximale de 4 mg/j.

Ne jamais prescrire 2 cp. à la fois. Chaque prise de 1 cp. doit être séparée de la suivante d'au moins 3 à 4 h.

En cas de mauvaise tolérance digestive, prévisible ou avérée (diarrhée), on peut prescrire une préparation de **colchicine** dosée à 1 mg et contenant de la poudre d'opium : **COLCHIMAX**. Il sera prescrit aux mêmes doses que la **colchicine**.

Contre-indications relatives de la **colchicine** : l'intolérance digestive sévère traduisant une hypersensibilité individuelle du malade ; l'existence d'une affection intestinale évolutive ; l'âge et l'athéromatose diffuse en raison d'un risque de déshydratation aiguë avec ses conséquences.

## ► Crises aiguës chez un goutteux connu

Le traitement dans ce cas est fonction de la sensibilité et des préférences des malades.

La **colchicine**, chaque fois qu'elle est bien tolérée, doit être préférée.

Les **AINS** sont également efficaces.

Pendant les 4 à 8 premiers j :

- soit **diclofénac (VOLTARÈNE 50 mg)**, ou **kétoprofène (PROFÉNID 100 mg)**, ou **flurbiprofène (CEBUTID 100 mg)** : 1 cp. aux 3 repas ;

- soit **piroxicam (FELDÈNE 20 mg)** : 1 gél. ou 1 cp. dispersible, 1 ou 2 fois/j pendant 2 j, puis 1/j pendant 4 à 6 j ; ou un autre **oxicam** de la même façon : **BREXIN, CYCLADOL, TILCOTIL, MOBIC 15 mg** ou génériques. Ensuite une dose inférieure sera prescrite. Les **AINS** peuvent être associés à la **colchicine**, ou lui succéder, lorsqu'elle est mal tolérée ou peu efficace.

## ► Accès aigus sévères et rebelles

Dans de telles formes **réellement** rebelles à l'association **colchicine** et **AINS**, on peut utiliser :

- soit la **voie IM** pour certains **AINS** : **kétoprofène (PROFÉNID 100 mg)**, ou **diclofénac (VOLTARÈNE) 75 mg** : 1 amp. 2/j en IM, ou **piroxicam (FELDÈNE) 20 mg** : 2 amp. à la fois en IM le 1<sup>er</sup> j, puis 1/j, pendant 2 à 4 j environ en respectant les contre-indications habituelles, et avec une prudence accrue chez le sujet âgé ;
- plus exceptionnellement la corticothérapie, assez efficace, mais peu utilisée en raison du risque de rebond après l'arrêt.

## Conduite à tenir

- Repos relatif pendant la phase aiguë.
- Protection de l'articulation enflammée par un arceau pour éviter le poids des draps.
- Boissons abondantes : 2 à 3 L/j.
- Suppression de toute boisson alcoolisée (en particulier la bière et le vin blanc).
- Ration calorique suffisante de 2 000 calories à prédominance glucidique.

## ANTIGOUTTEUX (1) – COLCHICINE SEULE OU ASSOCIÉE

### ■ Colchicine

<b>COLCHICINE OPOCALCIUM</b>					
Accès aigu de goutte : - J1 : 3 mg en 3 prises - J2 et J3 : 2 mg en 2 prises - J4 et après : 1 mg le soir Prophylaxie des accès de goutte : 1 mg le soir	20 cp. 1 mg	3,37	I	65 %	0,17

#### PROPRIÉTÉS

Antigoutteux, anti-inflammatoire, par diminution de l'afflux leucocytaire, inhibition de la phagocytose des microcristaux.

#### INDICATIONS

Accès aigu de goutte, de chondrocalcinose, et de rhumatismes à hydroxyapatite.  
Prévention des accès goutteux.  
Maladie périodique, maladie de Behçet.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement** : en cas de grossesse le traitement peut être poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse si la pathologie le justifie.  
Insuffisance rénale grave.  
Insuffisance hépatique sévère.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance attentive des patients en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.  
En cas de traitement au long cours : surveillance de l'héogramme.

### ■ Tiémonium + opium + colchicine

<b>COLCHIMAX</b>					
Idem <b>COLCHICINE OPOCALCIUM</b>	20 cp. séc. 1 mg	4,93	I	65 %	0,25

#### PROPRIÉTÉS

Celles de la **colchicine**.  
Le **tiémonium** et la poudre d'**opium** sont destinés à limiter l'apparition des phénomènes diarrhéiques dus à la **colchicine**.

#### CONTRE-INDICATIONS

Celles de la **colchicine**, plus :  
– glaucome à angle fermé ;  
– hypertrophie prostatique.  
**Allaitement** : contre-indication, en raison du risque d'effets atropiniques chez l'enfant.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : le traitement peut être poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse si la pathologie le justifie.  
Précautions d'emploi de la **colchicine**, plus celles liées au **tiémonium** : hypertrophie pros-

ter (risque de rétention urinaire) ; insuffisance coronarienne, troubles du rythme ; hyperthyroïdie ; bronchite chronique ; iléus paralytique, atonie intestinale chez le sujet âgé, mégacolon toxique.

#### INTOXICATION

Il s'agit habituellement d'intoxications volontaires. La dose toxique est atteinte dès 10 mg et mortelle au-delà de 40 mg. Il n'existe pas d'antidote. Le traitement est uniquement symptomatique, en milieu hospitalier, après lavage d'estomac puis aspiration duodénale.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : diarrhée, nausées, vomissements. Ce sont les premiers signes d'un surdosage ; il faut réduire les doses ou arrêter le traitement. Éventuellement remplacer par **COLCHIMAX**, ou ajouter un **antidiarrhéique**.  
Urticaire et éruptions morbilliformes.  
Troubles hématologiques exceptionnels : leucopénie, neutropénie, thrombopénie.  
Azoospermie.  
Troubles neuromyopathiques, réversibles à l'arrêt du traitement.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

tique (risque de rétention urinaire) ; insuffisance coronarienne, troubles du rythme ; hyperthyroïdie ; bronchite chronique ; iléus paralytique, atonie intestinale chez le sujet âgé, mégacolon toxique.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Ceux de la **colchicine**, plus ceux liés au **tiémonium** : sécheresse buccale, épaississement des sécrétions bronchiques, diminution de la sécrétion lacrymale, troubles de l'accommodation, tachycardie, palpitations, constipation, rétention urinaire, excitabilité, irritabilité, confusion mentale chez les personnes âgées.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Atropine et substances atropiniques (**antidépresseurs imipraminiques, antihistaminiques H<sub>1</sub>, sédatifs, antiparkinsoniens, anticholinergiques**).

## GOUTTE (2)

### Traitement de fond

Il a pour but de raréfier les crises aiguës, de minimiser les destructions articulaires, de retarder l'atteinte rénale.

On dispose de deux médicaments : soit la **colchicine**, soit les **hypo-uricémiants**, qui se complètent le plus souvent, mais répondent à des indications bien précises.

### Colchicinothérapie continue

Son but est de prévenir les récives inflammatoires, mais elle n'influence nullement les arthropathies uratiques ni les complications rénales, car elle ne fait pas baisser l'uricémie.

L'indication majeure est représentée par les gouttes sévères comportant plusieurs crises aiguës annuelles, et les impossibilités de prescription de l'**allopurinol**.

Il suffit d'administrer 1 cp. de **colchicine** 1 mg tous les j, ou bien 3 à 4 j/sem.

En cas d'accès aigu il faut traiter le malade à la même dose que pour un premier accès.

Ce traitement est habituellement parfaitement toléré et ne nécessite comme surveillance qu'un hémogramme tous les 6 mois.

### Hypo-uricémiants

Le but des **hypo-uricémiants** est d'abaisser l'uricémie à une concentration dite de sécurité, c'est-à-dire inférieure à 430  $\mu\text{mol/L}$  (70 mg/L), pour prévenir ou faire régresser les dépôts uratiques, pour retarder ou empêcher la survenue de la néphropathie goutteuse.

On utilise de préférence un **inhibiteur de l'uricosynthèse** : **allopurinol** (**ZYLORIC**) ou **fébuxostat** (**ADENURIC**). Il est indispensable de le commencer à distance d'une crise aiguë (au moins un mois), pour éviter la survenue d'accès goutteux.

### ► Inhibiteurs de l'uricosynthèse

#### Indications

Toutes les gouttes, mais nécessairement les cas de goutte suivants :

- gouttes avec lithiase urique ;
- gouttes avec hyperuraturie ;
- gouttes avec insuffisance rénale sévère (ce sont les contre-indications des **uricosuriques**).

### Modalités de prescription

- Dose progressivement croissante d'**allopurinol**, en commençant par 100 mg/j, puis augmentée par paliers de 100 mg toutes les 6 à 8 sem, jusqu'à l'obtention du chiffre souhaité d'uricémie ; par exemple : **allopurinol** (**ZYLORIC** 100 mg) ou générique, 1 cp./j le 1<sup>er</sup> mois, puis adaptation en fonction des valeurs d'uricémie.

- Colchicinothérapie associée impérative : **colchicine**, 1 mg, 1 cp./j, pendant 2 à 3 mois.

- Apport liquidien et alcalinisation des urines (cf. ci-après Régime).

- L'arrêt de l'**allopurinol** est suivi de la remontée très rapide de l'uricémie, en 7 à 10 j.

- La **rasburicase** (**FASTURTEC**) est un nouvel **inhibiteur de l'uricosynthèse**, réservé à l'usage hospitalier, indiqué dans le traitement et la prévention des hyperuricémies induites par les chimiothérapies, qui a été exceptionnellement utilisé chez des patients atteints de goutte tophacée, en échec d'un traitement antérieur par **allopurinol** (par intolérance ou inefficacité secondaire à la présence d'une insuffisance rénale).

### ► Uricosuriques

#### Indications

- Devenues exceptionnelles, limitées aux impossibilités d'utiliser les **inhibiteurs de l'uricosynthèse**, dans les formes sévères de goutte nécessitant absolument d'abaisser l'uricémie.

- Et sous réserve des conditions suivantes : absence d'insuffisance rénale, uraturie < 600 mg/24 h.

### Modalités de prescription

- Le **probenécide** (**BENEMIDE**) n'est disponible qu'en pharmacie hospitalière, et après prescription initiale hospitalière.

- La **benzbromarone** (**DESURIC**), après avoir été retirée du commerce, est disponible après demande d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU).

## ANTIGOUTTEUX (2) – INHIBITEURS DE L'URICOSYNTHÈSE (1)

## ■ Allopurinol

<b>ZYLORIC</b>					
Traitement de l'hyperuricémie symptomatique, de la goutte Posologie variable : 100 à 300 mg/j	28 cp. 100 mg	2,11	I	65 %	0,08
	100 cp. 100 mg	HOP	I		
	28 cp. 200 mg	2,84	I	65 %	0,10
	100 cp. 200 mg	HOP	I		
	28 cp. 300 mg	3,40	I	65 %	0,12
	100 cp. 300 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Hypo-uricémiant rapide par inhibition de l'uricosynthèse ; diminue l'uricémie et l'uraturie.

**INDICATIONS**

Hyperuricémies symptomatiques, primitives ou secondaires.

Goutte, goutte tophacée, arthropathies uratiques.

Hyperuricuries et hyperuraturies ; lithiase urique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : prescription déconseillée.

**Allaitement** : prescription déconseillée.

Hypersensibilité à l'**allopurinol**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne jamais commencer un traitement pendant une crise de goutte, ni pendant le mois suivant. Associer la colchicine pendant les 2 à 3 premiers mois du traitement.

Attention particulière en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Prendre les comprimés de préférence après le repas.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Crises de goutte, surtout en début de traitement (associer la **colchicine**).

Épigastralgies, nausées, diarrhée, rarement importantes.

Réactions cutanées rares : éruptions prurigineuses, papulo-érythémateuses ou eczématiformes, devant faire arrêter le traitement. La réintroduction du traitement est parfois possible après désensibilisation.

Hypersensibilité généralisée (en particulier en cas d'insuffisance rénale) : arrêt immédiat et définitif.

Très rarement : cytopénies voire aplasie médullaire (en particulier en cas d'insuffisance rénale) ; céphalées, vertiges, neuropathies ; gynécomastie ; hépatite granulomateuse.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association déconseillée avec les **pénicillines du groupe A** (risque accru de réactions cutanées), et avec la **vidarabine** (risque accru de troubles neurologiques).

Précautions d'emploi avec : anticoagulants oraux (potentialisation, contrôler plus souvent TP et INR), **cytostatiques-antimétabolites** (**azathioprine** et **mercaptopurine**, diminuer leur dose), **chlorpropamide** chez l'insuffisant rénal (risque d'hypoglycémie), **théophylline** (augmentation de la théophyllinémie pour de très fortes doses d'**allopurinol** : 600 mg/j).

## GOUTTE (3)

### Régime au cours de la goutte

Il reste utile et classique mais ne constitue qu'un volet de cette thérapeutique de fond. Il comporte les éléments suivants.

- **Régime hypocalorique** et cure d'une obésité éventuelle.
- **Éviction des aliments riches en purines**, notamment : ris de veau, foie, rognons, cervelle, anchois, sardines, harengs, extraits de viande.
- **Régime pauvre en lipides** : éviter les œufs, le lait et les produits laitiers, la charcuterie.
- **Sont autorisés** : jambon, poulet, poisson, 1 fois/j, 6 j/sem.
- **Suppression souhaitable des boissons alcoolisées, et plus particulièrement de la bière.**
- **Cure de diurèse** nécessitant l'absorption de 2 à 3 L d'eau par jour, par exemple : Évian, Vittel, ou Contrexéville.

• **Alcalinisation** conseillée pour éviter la précipitation urinaire de l'acide urique ; elle peut être réalisée soit par l'eau de Vichy (1/2 L/j), soit par le *Fonctril 4 000*, un paquet trois fois par jour dans un verre d'eau, 1 j/2 ou 20 j/mois par exemple. Dans les deux cas, il faudra tenir compte de l'apport sodé consécutif.

### Précautions à prendre chez les gouteux

Certains médicaments peuvent favoriser une crise de goutte :

- certains **diurétiques**, les salidiurétiques surtout ;
- la **vitamine B12** ;
- certains antibiotiques : **pénicilline, érythromycine ; pyrazinamide** ;
- certains anticoagulants, les dérivés de la coumarine notamment.

### LE PATIENT GOUTTEUX DOIT ÊTRE AVERTI ET COMPRENDRE

- Que le traitement de la crise aiguë et celui de la maladie goutteuse ont des objectifs différents : ils se complètent, mais ne se remplacent pas.
- Qu'une uricémie normale ne le met pas à l'abri d'une crise de goutte, même si elle en diminue considérablement la fréquence.
- Que certaines circonstances sont susceptibles de déclencher une crise : **interventions**

**chirurgicales**, voyages, traumatismes, certains aliments spécifiques à un malade, d'où l'utilité, parfois, d'administrer préventivement de la **colchicine**.

– **Qu'il ne doit pas interrompre ses médicaments, sans avis médical, même en cas de crise de goutte intercurrente**, qui doit être traitée par la **colchicine**.

Toute intervention chirurgicale est susceptible de déclencher un accès aigu.

Chez un gouteux avéré, elle peut être encadrée par une thérapeutique préventive anti-inflammatoire, **COLCHICINE** : 1 cp./j, les 2 j précédant l'intervention et les 8 j suivants. Tout traumatisme est susceptible de déclencher une crise aiguë.

Les cures thermales sont envisageables, à distance d'un épisode aigu et ne doivent comporter qu'une cure de diurèse.

### Hyperuricémie isolée sans manifestation articulaire goutteuse

#### Au cours des hémopathies malignes

Le traitement doit être préventif et institué avant la mise en route des agents cytolytiques.

**Allopurinol** : 100 à 300 mg/j en fonction du chiffre initial.

Si le patient a un antécédent d'accès articulaire goutteux on y adjoindra 1 cp./j de **colchicine**.

### Hyperuricémies découvertes fortuitement

Certains auteurs préconisent, pour prévenir l'apparition d'une éventuelle néphropathie goutteuse, un traitement médicamenteux systématique par l'**allopurinol**.

Il semble suffisant de ne le faire que lorsque l'uricémie reste supérieure à 480  $\mu\text{mol/L}$  (80 mg/L), après un régime approprié et une cure de diurèse alcaline efficace.

L'Eular a proposé en 2006 des recommandations pour la prise en charge de la goutte [1].

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de la goutte, Eular, 2006

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (1)

La prise en charge thérapeutique initiale d'une polyarthrite rhumatoïde (PR) a pour objectifs :

- le soulagement rapide des symptômes ;
- la prévention des lésions destructrices, dont l'installation peut être rapide, dès les premiers mois ;

– la préservation de la fonction articulaire et la prévention de tout handicap fonctionnel ;

- la prise en compte de l'individualité de chaque patient.

### Recommandations de l'Eular pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (2013) [1]

#### Principes généraux

A. Le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) doit être optimisé et basé sur une décision prise d'un commun accord, entre patient et rhumatologue.

B. Les spécialistes devant prioritairement prendre en charge les patients atteints de PR sont les rhumatologues.

C. La PR implique des coûts élevés, tant au niveau individuel, sociétal que médical, ce qui devra être pris en compte dans la prise en charge par les rhumatologues traitants.

#### Recommandations

1. Un traitement modificateur (immunomodulateur) devra être débuté dès que le diagnostic de PR est retenu.

2. Pour chaque patient, le traitement doit viser la rémission ou, à défaut, le plus faible niveau d'activité.

3. En cas de maladie active, une surveillance fréquente est recommandée (tous les 1 à 3 mois) ; en cas d'absence d'amélioration après 3 mois au maximum après le début d'un traitement, ou bien si l'objectif n'a pas été atteint dans les 6 mois, le traitement devra être adapté.

4. Le **méthotrexate** devra faire partie de la 1<sup>re</sup> ligne de traitement chez les patients atteints de PR active.

5. En cas de contre-indication ou d'intolérance au **méthotrexate**, la **sulfasalazine** ou le **léflunomide** devront être envisagés, dans le cadre de la stratégie thérapeutique de 1<sup>re</sup> intention.

6. Chez les patients naïfs de traitement modificateur, avec ou sans utilisation de **corticoïdes**, le recours à un traitement modificateur synthétique est recommandé, que ce soit en monothérapie ou en combinaison.

7. Les **corticoïdes** à faibles doses doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la stratégie thérapeutique initiale (en combinaison avec un plusieurs traitements modificateurs synthétiques) pendant les 6 premiers mois au maximum, mais devront être diminués aussi rapidement que l'évolution clinique le permettra.

8. Dans le cas où l'objectif du traitement initial n'est pas atteint avec la 1<sup>re</sup> stratégie comportant un ou plusieurs traitements modificateurs, en l'absence de facteur de mauvais pronostic, le changement pour un autre traitement modificateur synthétique devra être envisagé ; en cas de facteurs de mauvais pronostic, l'adjonction d'un traitement biologique devra être discutée.

9. Chez les patients répondant insuffisamment au **méthotrexate** et où à un autre traitement modificateur synthétique, avec ou sans **corticoïdes**, une biothérapie (**anti-TNF**, **abatacept**, **tocilizumab**, et, suivant les cas, **rituximab**) devra être débutée, en association avec le **méthotrexate**.

10. En cas d'échec d'une 1<sup>re</sup> biothérapie, le passage à un 2<sup>e</sup> traitement biologique devra être effectué ; l'échec d'une 1<sup>re</sup> biothérapie anti-TNF peut justifier le passage à un autre agent biologique de la même classe, ou au contraire le changement pour une molécule à mode d'action différent.

11. Le tofacitinib (encore non commercialisé en France) pourra être proposé, après échec d'un traitement biologique.

12. En cas de rémission persistante chez un patient ayant pu diminuer significativement son traitement corticoïde, il sera possible d'envisager une réduction du traitement biologique, en particulier si cette biothérapie est combinée avec un traitement modificateur synthétique.

13. Dans le cas d'une rémission persistante et prolongée, une réduction prudente du traitement modificateur synthétique pourra être envisagée, d'un commun accord entre le patient et son rhumatologue.

14. Lorsque le traitement nécessite un ajustement, des facteurs distincts de la seule activité la maladie, comme la progression des lésions structurales, l'existence de comorbidités ou encore des questions de sécurité, devront être pris en considération.

## MÉTHOTREXATE

## ■ Méthotrexate

<b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>					
Posologie rhumatologique habituelle : 7,5 à 15 mg/sem. Ne pas dépasser 20 mg/sem.	20 cp. 2,5 mg	5,33	I	100 %	0,27
<b>NOVATREX</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	12 cp. 2,5 mg	4,04	I	65 %	0,34
<b>METOJECT</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	1 ser. 7,5 mg/ 0,15 mL	17,49	I	65 %	17,49
	1 ser. 10 mg/0,2 mL	18,68	I	65 %	18,68
	1 ser. 15 mg/0,3 mL	21,42	I	65 %	21,42
	1 ser. 20 mg/0,4 mL	23,79	I	65 %	23,79
	1 ser. 25 mg/0,5 mL	27,65	I	65 %	27,65
<b>LEDERTREXATE</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	1 inj. 5 mg/2 mL	3,55	I	100 %	3,55
	1 inj. 25 mg/1 mL	9,01	I	100 %	9,01
	1 inj. 50 mg/2 mL	9,01	I	100 %	9,01

**PROPRIÉTÉS**

Antinéoplasique cytostatique du groupe des antifoliques, agissant comme antimétabolite des acides nucléiques.

**INDICATIONS**

AMM : polyarthrite rhumatoïde, psoriasis.  
Est également prescrit en milieu spécialisé dans certaines formes sévères de spondylarthropathies et de rhumatisme psoriasique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et absence de contraception efficace : contre-indication formelle.

**Allaitement** : contre-indication.

Autres contre-indications absolues :

- insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, atteinte hépatique évolutive et alcoolisme chronique sévère ;
- leucopénie, thrombopénie, anémie ;
- infection aiguë ou chronique, en particulier aux virus VIH ;
- cancer, hémopathie associée.

Contre-indications relatives :

- tabagisme, obésité ; antécédents d'affection hépatique, pulmonaire, rénale ou hématopoïétique ;

– diabète insulinodépendant, ulcère gastro-duodénal évolutif.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Voir texte ci-contre, en particulier pour le tabagisme, les antécédents pulmonaires, et le rythme de la surveillance biologique.  
Recherche préalable et en cours de traitement de foyers infectieux, à traiter.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Voir texte ci-contre.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Certaines associations sont contre-indiquées, même aux doses rhumatologiques : **phénylbutazone, probénécide, sulfaméthoxazole-triméthoprime, triméthoprime**.

Certaines associations doivent faire prendre des précautions :

- **AINS**, bien que la prescription soit possible si **méthotrexate** < 15 mg/sem. ;
- pour le **kétoprofène**, respecter un délai de 12 h par rapport à la prise de **MTX** ;
- **ciclosporine, sulfamides antibactériens, phénytoïne, phénobarbital**, du fait d'une augmentation de la toxicité hématologique ;
- vaccins vivants atténués.



## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (2)

Il est essentiel de reconnaître les patients atteints d'une forme de *PR de progression rapide*, qui doivent bénéficier d'un traitement intensif, contrôlant rapidement et durablement l'inflammation, sur :

- l'appréciation du degré de sévérité de la maladie qui repose sur la définition du nombre de réveils nocturnes et de la durée de la raideur matinale, l'examen clinique (nombre d'articulations douloureuses et d'articulations gonflées), voire une échogra-

phie couplée au Doppler puissance, la biologie (VS, CRP, hémoglobine). L'indice DAS 28 est un outil utile en ce domaine (cf. Figure) : une valeur > 5,1 est le témoin d'une activité inflammatoire importante ;

- l'évolutivité structurale qui est définie par l'apparition et/ou l'aggravation de lésions (pincement articulaire, érosions osseuses) sur deux examens radiographiques successifs (réalisés tous les 6 à 12 mois, pendant les premières années).

### Indice DAS 28

#### Réalisation

28 sites articulaires sont évalués par mobilisation (M) ou par pression (P). L'indice articulaire est égal à la somme de l'ensemble des scores obtenus pour les 28 sites articulaires. Pour chacun des sites articulaires, l'intensité de la douleur est évaluée sur une échelle allant de 0 à 3 :

0 : absence de douleur

1 : douleur à la pression

2 : douleur et grimace

3 : douleur, grimace et retrait du membre

#### Calcul

$DAS = 0,55 \times (\text{Indice articulaire} : 28) + 0,284 \times (\text{Synovites} : 28) + 0,33 \times \log VS + 0,0142 \times \text{Appréciation globale du patient}$

<input type="checkbox"/>	Épaule (M)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Coude (M+P)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Poignet (M)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Métacarpo-phalangiennes (P)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
V IV III II I	Interphalangiennes proximales (P)	I II III IV V
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
V IV III II I	Genou (M)	I II III IV V
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

#### Résultats

$DAS \leq 2,6$  : PR en rémission

$2,6 < DAS \leq 3,2$  : PR faiblement active

$3,2 < DAS \leq 5,1$  : PR modérément active

$DAS > 5,1$  : PR très active

Cette appréciation, qui doit se faire dès le début, doit aussi être régulièrement répétée pour guider les ajustements thérapeutiques nécessaires.

Le statut du patient doit être apprécié dans son ensemble :

- âge, sexe, désir de procréation ;
- antécédents : allergiques, hépatiques, digestifs ;
- statut vis-à-vis de la tuberculose, du VIH, des virus hépatotropes ;
- travail et conditions de vie.

Le traitement comporte plusieurs volets qui s'associent et se complètent, faute de traitement réellement étiologique :

- traitement symptomatique d'effet immédiat mais non durable, par voie générale : antalgiques, **anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)**, **corticoïdes**, ou bien par voie locale : infiltrations cortisoniques, synoviorthèses isotopiques ;

- traitement « de fond », qui utilise des molécules à action plus lente, soit chimiques (comme le **méthotrexate**), soit biologiques (comme les biothérapies anti-TNF), dont certaines sont susceptibles de freiner ou même d'empêcher le processus de destruction articulaire.

## ACIDE FOLIQUE

## ■ Acide folique

<b>SPÉCIAFOLDINE</b>				
En complément du <b>méthotrexate</b> en rhumatologie : 10 à 20 mg/sem.	28 cp. 0,4 mg	3,60	65 %	0,13
	20 cp. 5 mg	2,33	65 %	0,12

**PROPRIÉTÉS**

Acide folique antianémique.

**INDICATIONS**

Compensation des carences en **acide folique**.  
Prévention ou traitement de certains effets secondaires du **méthotrexate** (MTX).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'un des constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prendre le produit le lendemain de la prise du **MTX** ou réparti sur les jours sans **MTX**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très rares cas de réactions cutanées allergiques.  
Possibilité de troubles gastro-intestinaux.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Phénobarbital, phénytoïne, primidone** : diminution du taux des **anticonvulsivants**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (3)

### Traitement symptomatique par voie générale

#### Antalgiques usuels

Peuvent être utilement associés :

- **paracétamol** : 1,5 à 3 g/j ;
- autres **antalgiques** à base de **paracétamol**, à dose suffisante ;
- antalgiques à base de **tramadol**.

#### Aspirine et ses dérivés

Ces spécialités sont de moins en moins prescrites, au profit des autres médicaments AINS. Les doses anti-inflammatoires sont comprises entre 2 et 4 g/j.

Il faut faciliter la tolérance médicamenteuse en conseillant la prise des comprimés au milieu ou à la fin du repas, dissous dans un verre d'eau ou en choisissant parmi certaines spécialités celle qui sera le mieux acceptée par le malade : **ASPÉCIC**, **ASPIRINE PH8**, etc.

#### Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Les **AINS** sont habituellement indispensables. Il faut privilégier les présentations à libération prolongée, dans le but de couvrir au mieux l'intégralité du nyctémère. Les doses sont réparties en 2 à 3 prises/j, en recommandant une dose suffisante au coucher, pour éviter les réveils de fin de nuit et écourter la période de « dérouillage matinal ».

Leur choix est fonction des préférences personnelles mais aussi de l'efficacité et de la tolérance, propres à chaque malade :

- un **oxicam** : **FELDÈNE**, ou **BREXIN**, ou **CYCLADOL**, ou **TILCOTIL**, ou **MOBIC** ;
- ou un **dérivé arylcarboxylique**, de préférence à libération prolongée : **BIPROFÉNID**, ou **VOLTARÈNE LP**, ou **CEBUTID LP**, ou **LODINE**, ou **APRANAX**, ou **NAPROSYNE**, etc. ;
- ou un **coxib** (**CELEBREX**, **ARCOXIA**), moins gastrotoxique ;
- ou, moins souvent en pratique, **INDOCID/CHRONO-INDOCID**.

La dose, constamment adaptée, sera prescrite au niveau minimal efficace, ce qui pourra nécessiter l'implication active du patient, sous réserve d'une éducation thérapeutique préalable.

Il est essentiel de respecter les contre-indications et les précautions d'usage pour l'emploi prolongé de ces anti-inflammatoires et de s'en tenir à la dose minimale efficace.

La toxicité est essentiellement gastrique, parfois cutanée, hépatique, ou encore rénale, en particulier chez le sujet âgé. Dans ce cas, la dose de départ de l'**AINS** prescrit devra toujours tenir compte de la fonction rénale préexistante. En cas d'altération importante, il faudra privilégier les corticostéroïdes.

#### Polyarthrite rhumatoïde

Il n'y a pas lieu d'associer un **AINS** par voie générale à l'**aspirine** prise à une dose supérieure à 500 mg/j. Plus généralement, l'association de deux **AINS**, même à doses antalgiques, est formellement contre-indiquée.

### Corticothérapie au long cours

Bien qu'il soit légitime de considérer la corticothérapie comme un traitement symptomatique de l'inflammation, car elle s'oppose peu au potentiel destructeur de la maladie rhumatoïde, elle doit être envisagée séparément car, une fois commencée, il s'agit souvent d'un traitement difficilement remplaçable, poursuivi au long cours. Cette corticothérapie expose de ce fait à une multiplicité d'effets indésirables et à la rechute du processus rhumatismal lors de son arrêt éventuel, qui ne doit jamais être brutal.

**Elle nécessite des précautions d'emploi** : régime pauvre en sel, apport complémentaire éventuel de potassium, prévention de l'ostéoporose (systématique, si la corticothérapie est  $\geq 7,5$  mg/j d'équivalent-prednisone, pendant plus de 3 mois).

Elle doit être utilisée :

- à faible dose : 6 à 12 mg/j de **prednisone** (**CORTANCYL**), en fractionnant les prises (l'une le matin, l'autre en fin de journée) dans le but de mieux couvrir l'intégralité du nyctémère. En fonction des effets ressentis, le patient pourra soit diminuer, soit augmenter cette dose, par paliers de 1 à 2 mg, tous les 3 à 5 j ;
  - dans les formes ayant résisté ou échappé aux **AINS**, et après introduction d'un traitement modificateur, de « fond ».
- Certains l'emploient volontiers en 1<sup>re</sup> intention chez le sujet âgé, à la fois en raison de son effet plus rapide et de son excellente tolérance rénale.

Dans les formes sévères ou compliquées, il peut être légitime d'utiliser une corticothérapie à forte dose par voie orale ou sous forme de « bolus » en perfusion, pour passer un cap difficile, avec les précautions d'usage.

## LÉFLUNOMIDE (1)

## ■ Léflunomide

ARAVA					
100 mg/j les 3 premiers j	30 cp. 10 mg	75,55	I	65 %	2,52
Puis 10 à 20 mg/j	30 cp. 20 mg	75,55	I	65 %	2,52
	3 cp. 100 mg	43,88	I	65 %	14,63

**PROPRIÉTÉS**

Immunosuppresseur sélectif dont le métabolite actif a une action antiprolifératrice.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde active de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **léflunomide** (notamment antécédent de syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ou érythème polymorphe). Insuffisance hépatique.

Patients ayant un état d'immunodéficience grave, par exemple les patients atteints du sida. Dysfonction médullaire grave, ou anémie, leucopénie, neutropénie, ou thrombopénie pro-

fonde d'origine autre que la polyarthrite rhumatoïde ou infections graves.

Insuffisance rénale modérée à sévère, hypoprotéïnémie sévère.

Femmes enceintes ou en âge de procréer n'utilisant pas de méthode contraceptive fiable pendant le traitement par le **léflunomide**. L'existence d'une grossesse devra être exclue avant la mise en route du traitement. Les femmes ne doivent pas allaiter.

Les patients masculins devront être prévenus d'une possible toxicité fœtale transmise par le père. Il convient d'assurer une contraception efficace pendant le traitement avec le **léflunomide**.

Déconseillé chez les patients de moins de 18 ans.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (4)

### Assauts cortisoniques (« bolus »)

Ils sont intéressants surtout pour passer un cap difficile.

On utilise, en général, **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** : 300 à 1 000 mg, en perf. IV dans 250 mL de sérum physiologique, pendant 3 h, 1 à 3 j de suite, dont le bénéfice peut persister 3 à 6 sem.

Une mise au point cardiovasculaire préalable est indispensable (examen clinique et ECG, au minimum), ainsi qu'une surveillance rigoureuse en milieu hospitalier.

### Traitements modificateurs (de « fond »)

Le choix du traitement modificateur (*Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug* ou DMARD pour les Anglo-Saxons) est fondé sur la sévérité potentielle de la maladie, l'efficacité et le délai d'action des molécules disponibles (**méthotrexate**, **léflunomide**, **anti-TNF-alpha** ont une action relativement rapide, perceptible au bout de 4 à 6 sem. en moyenne) et l'existence de comorbidités associées.

L'algorithme proposé plus loin décrit schématiquement l'escalade thérapeutique dans la PR.

### Traitements « classiques » synthétiques (*synthetic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs* ou sDMARD)

#### ► Méthotrexate (MTX)

Le **méthotrexate**, dont la tolérance est habituellement bonne aux doses utilisées en rhumatologie, est considéré comme la « pierre angulaire » du traitement. Son taux de maintenance thérapeutique est supérieur à 50 % à 5 ans. Il est très utile y compris chez le sujet âgé et doit être utilisé avec précaution chez la femme jeune, en âge de procréer.

L'efficacité clinique apparaît en 4 à 6 sem. et il existe un effet-dose. La dose efficace se situe entre 7,5 et 15 mg/sem. (0,3 mg/kg/sem.). Il est parfois justifié d'atteindre 20 mg/sem.

La réponse maximale a lieu dans les 6 premiers mois. Une rémission est obtenue dans 6 à 14 % des cas.

L'effet d'épargne des **corticoïdes** est généralement important (30 à 65 % de la dose initiale).

#### Prescription

On prescrit : **méthotrexate**, soit **MÉTHOTREXATE BELLON**, soit **NOVATREX**, sous forme de comprimés dosés à 2,5 mg, et, pour le premier seulement, sous forme d'ampoules dosées à 5 mg pour la voie IM, soit **METOJECT** pour la voie injectable, à différents dosages.

La dose initiale est de 7,5 à 10 mg/sem., en 1 ou en 2 à 3 prises réparties sur 24 à 36 h pour la voie orale, la plus utilisée. La forme injectable (**METOJECT**), sensiblement plus efficace à dose égale, s'administre par voie SC profonde.

La dose hebdomadaire peut être augmentée de 2,5 à 5 mg tous les mois, sans dépasser habituellement 20 mg/sem.

En cas d'efficacité la prescription peut être longtemps poursuivie, mais sans desserrer la surveillance clinique et biologique.

Cette dose « rhumatologique » ne contre-indique pas la co-prescription d'**AINS**, mais nécessite une surveillance hématologique régulière.

Une surveillance de l'hémogramme est recommandée toutes les 2 sem. pendant les 2 premiers mois, puis tous les mois. La surveillance hépatique et rénale est mensuelle.

L'adjonction d'**acide folique (SPÉCIAFOLDINE)**, cp. à 5 mg, à une dose égale à celle du **MTX**, 1 cp. x 3/sem., le surlendemain de la prise du **MTX**, diminue certains effets indésirables : stomatite, alopecie, troubles gastro-intestinaux, élévation des transaminases, cytopénie.

Il est primordial d'attirer l'attention des patients sur la prescription **hebdomadaire** du **MTX**.

**LÉFLUNOMIDE (2) – PHARMACOLOGIE****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le médicament ne doit être prescrit que par des médecins spécialistes ayant une bonne expérience dans le traitement des maladies rhumatoïdes. Un traitement récent ou concomitant avec un autre traitement de fond hépatotoxique ou hématoxique (par exemple le **méthotrexate**) peut entraîner un risque accru d'effets indésirables.

**Procédure de wash-out**

- Soit par administration de 8 g de **colestyramine**, x 3/j
  - Soit par administration de 50 g de charbon activé en poudre, 4 fois par jour.
- La durée d'une procédure de wash-out complète est habituellement de 11 j. Cette durée peut être modifiée en fonction des éléments cliniques ou des paramètres biologiques.

Ceux-ci peuvent être graves et survenir même après l'arrêt du **léflunomide**, qui peut persister longtemps dans l'organisme, justifiant alors une procédure de wash-out, en particulier :

- si le taux des ALAT (SGPT) s'élève après adaptation de la posologie, si des anomalies hématologiques apparaissent ;
- en cas de syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell (une stomatite ulcéreuse doit faire arrêter le traitement) ;
- en cas d'infection sévère non contrôlée. Les patients ayant une réaction positive à la tuberculine doivent être étroitement surveillés en raison du risque de réactivation d'une tuberculose ;
- en cas de remplacement par un autre traitement de fond.

**EFFETS INDÉSIRABLES****Appareil cardiovasculaire**

Augmentation modérée de la pression artérielle ; rarement HTA sévère.

**Système gastro-intestinal, foie**

- Fréquents : diarrhée, nausées, vomissements, anorexie, lésions de la muqueuse buccale, douleurs abdominales, élévation des paramètres hépatiques (transaminases en particulier ALAT, plus rarement gamma-GT, phosphatases alcalines, ou bilirubine).
- Rares : hépatite, icère/cholestase et très rarement, atteintes hépatiques sévères, pancréatites.

**Infections**

Très rares : infections sévères, septicémies ; le **léflunomide** peut augmenter la sensibilité aux infections (notamment les rhinites, bronchites et pneumonies), y compris aux infections opportunistes.

**Troubles du métabolisme et de la nutrition**

Maigrissement, hypokaliémie.

**Système nerveux**

Céphalées, étourdissements, asthénie, paresthésies ; perturbations du goût, anxiété.

**Système musculaire et osseux**

- Fréquents : ténosynovite.
- Peu fréquents : rupture tendineuse.

**Peau et annexes**

- Fréquents : accentuation de la chute naturelle des cheveux, eczéma, sécheresse cutanée.
- Très rares : syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, érythème polymorphe.

**Allergie**

- Fréquents : réactions allergiques modérées, éruption (notamment éruption maculopapulaire), prurit.
- Peu fréquents : urticaire. Très rares : réactions anaphylactiques.

**Troubles respiratoires**

Très rares : pneumopathie interstitielle.

**Systèmes hématologique et lymphatique**

- Fréquents : leucopénie (avec leucocytes  $> 2 \text{ G/L}$ ).
- Peu fréquents : anémie, thrombopénie modérée.
- Rares : éosinophilie, leucopénie  $< 2 \text{ G/L}$ , pancytopénie.
- Très rarement : agranulocytose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Une augmentation des effets secondaires peut survenir en cas d'administration récente ou concomitante de produits hépatotoxiques ou hématoxiques, ou lorsqu'un traitement par le **léflunomide** est mis en route après l'administration de ces produits sans qu'il y ait eu entre-temps de période de wash-out. Par conséquent, une surveillance attentive des paramètres hépatiques et hématologiques est recommandée au début du traitement de relais par le **léflunomide**.

Éviter de prendre de la **colestyramine** ou du charbon activé en poudre, ces produits entraînant une baisse rapide et significative des taux plasmatiques, et de consommer de l'alcool.

Aucune donnée clinique sur l'efficacité et la sécurité des vaccinations au cours d'un traitement par le **léflunomide** n'est disponible. Cependant, les vaccinations avec un vaccin vivant atténué ne sont pas recommandées.

**POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (5)***Effets indésirables*

Les plus fréquents sont gastro-intestinaux, les plus graves sont pulmonaires et hématopoïétiques.

- Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, anorexie, stomatite.
- Érythème des extrémités, rash cutané ; ulcérations cutanées ou muqueuses superficielles.

- **Pneumopathie interstitielle** de mécanisme immunoallergique, dont le risque est imprévisible.

Une toux, une dyspnée, une fièvre doivent alerter le patient et son médecin et faire rechercher la présence d'infiltrats interstitiels sur la radiographie thoracique. Des antécédents d'insuffisance respiratoire chronique sont une contre-indication à l'utilisation du **MTX**, alors que le tabagisme constitue une contre-indication relative mais impose l'étude de la fonction respiratoire. Une radiographie thoracique, voire pour certains des explorations fonctionnelles respiratoires, sont nécessaires avant de commencer le **MTX**, en particulier chez le sujet âgé.

- **Complications hématologiques**, dominées par la baisse d'une ou de plusieurs lignées. Les facteurs de risque sont l'insuffisance rénale, la carence en folates, les infections, les coprescriptions. Lymphomes, régressifs à l'arrêt du traitement.

Ceci incite à une plus grande prudence en cas de syndrome de Gougerot-Sjögren associé.

- **Toxicité hépatique.** Les facteurs de risque sont l'âge, la durée du traitement, le diabète, l'obésité, l'intoxication éthylique ; mais le risque est faible.

Une atteinte hépatique évolutive et une intoxication alcoolique sévère sont des contre-indications absolues au traitement. On observe une élévation isolée des transaminases chez environ 20 % des patients. Si le chiffre atteint ou dépasse 3 fois la normale, il faut réduire la dose de **MTX**, voire stopper complètement le traitement, suivant le degré de cytolysé hépatique. Une élévation prolongée des transaminases lors des contrôles successifs, alors que la dose cumulative de 1,5 g est atteinte, pourrait justifier la réalisation d'une ponction-biopsie hépatique, afin de décider de l'arrêt ou de la poursuite du traitement en fonction du grade lésionnel.

- Effets plus rares : hyperthermie ; aménorrhée, azoospermie, perte de la libido, impuissance ; troubles cognitifs légers et transitoires, troubles de l'humeur et dysesthésies crâniennes.

Aucun effet carcinogène n'est prouvé chez l'homme, mais le **MTX** est tératogène et abortif. Il impose une contraception efficace. Il est contre-indiqué lors de la grossesse et de l'allaitement.

## ANTI-TNF-ALPHA (1)

## ■ Étanercept

ENBREL					
De 4 à 17 ans : 0,4 mg/kg, avec un intervalle de 3 à 4 j entre 2 inj. SC A. : 25 mg x 2/sem.	4 inj. ser. 10 mg	211,99	I	65 %	53,00
	4 ser. prérempl. 25 mg	514,33	I	65 %	128,58
	4 ser. prérempl. 50 mg	514,33	I	65 %	128,58
	4 inj. stylos 50 mg	989,19	I	65 %	247,30

## PROPRIÉTÉS

Par inhibition compétitive de la liaison du TNF à ses récepteurs, il diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

## ENBREL 25 et 50 mg

- *Polyarthrite rhumatoïde* :  
– en association au **méthotrexate** pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l'adulte en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le **méthotrexate** (sauf contre-indication) ;

- en monothérapie en cas d'intolérance au **méthotrexate** ou lorsque la poursuite du traitement avec le **méthotrexate** est inadaptée ;

- dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive de l'adulte non précédemment traitée par le **méthotrexate**.

Il a été montré qu'**ENBREL**, seul ou en association avec le **méthotrexate**, ralentit la progression des dommages structuraux articulaires tels que mesurés par la radiographie et améliore les capacités fonctionnelles.

- *Rhumatisme psoriasique* actif et évolutif de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement de fond antérieur.

- *Spondylarthrite ankylosante* sévère et active de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel.

## ENBREL 25 mg

*Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire* active de l'enfant et l'adolescent âgés de 4 à 17 ans en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance avérée au **méthotrexate**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients. Septicémie ou risque. Éviter en cas d'infection évolutive, chronique ou loca-

lisée. Éviter en cas de maladie démyélinisante ou de risque.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Écarter une infection évolutive, dont la tuberculose, avant de commencer le traitement. L'arrêter en cas d'infection grave, de varicelle, de réaction allergique, de pancytopenie.

Prudence en cas d'insuffisance cardiaque congestive (risque d'aggravation).

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquemment, réactions au site d'injection (érythème, démangeaison, douleur, gonflement), ne nécessitant en général pas de traitement, et, fréquemment : fièvre.

Infections fréquentes : voies aériennes supérieures, bronchites, cystites, infections cutanées.

Infections graves, peu fréquentes : septicémies, pneumonies, cellulites, arthrites septiques. Tuberculose, infection fongique.

Hématologie : thrombocytopénie, anémie, leucopénie, pancytopenie et très rarement aplasie.

Réactions allergiques cutanées et sous-cutanées fréquentes (prurit, et plus rarement urticaire, angio-œdème). Rares réactions allergiques/anaphylactiques graves.

Formation d'auto-anticorps.

Rarement : convulsions, épisodes de démyélinisation du type SEP ou localisée (névrite optique, myélite transverse).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

On ne dispose pas d'études particulières. Dans les essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec les **glucocorticoïdes**, les **salicylés**, les **AINS**, les **analgésiques** ou le **méthotrexate**.



## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (6)

### ► Léflunomide (ARAVA)

Le **léflunomide** a une efficacité relativement comparable à celle du **méthotrexate**. L'efficacité clinique de l'**ARAVA** se manifeste habituellement en 4 à 6 sem., et peut s'améliorer par la suite, jusqu'à 4 à 6 mois de traitement.

L'administration concomitante de traitements de fond hépatotoxiques ou hématotoxiques (y compris le **méthotrexate**) n'est pas souhaitable. La mise en route d'un traitement par **ARAVA** doit être initiée par un médecin spécialiste averti, qui doit évaluer soigneusement le rapport bénéfice/risques. Des effets indésirables graves peuvent survenir, même après l'arrêt du **léflunomide** qui peut persister longtemps dans l'organisme, justifiant alors une procédure de wash-out.

Un contrôle de l'hémogramme et des transaminases doit être réalisé avant le début du traitement, puis toutes les 2 sem. pendant les 6 premiers mois, puis toutes les 8 sem.

Le traitement peut commencer par une dose de charge de 100 mg administrée 1 fois/j pendant 3 j. La dose d'entretien recommandée ensuite est de 10 à 20 mg x 1/j. Aucun ajustement posologique n'est recommandé chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère, ni après 65 ans.

### ► Sulfasalazine (SALAZOPYRINE)

Ce traitement représente, avec l'**ARAVA**, une solution alterne possible, en cas d'échec ou d'intolérance au **méthotrexate**. Il peut même être prescrit conjointement avec l'**hydroxychloroquine** et le **méthotrexate**, cette triple association étant créditée d'une efficacité comparable à celle des biothérapies anti-TNF.

Une vérification de l'activité de la G6PD est recommandée avant l'instauration d'un traitement par **sulfasalazine**, en raison d'un

risque élevé d'hémolyse en cas de déficit enzymatique.

La dose de départ est de 1 cp. à 500 mg/j la 1<sup>re</sup> sem., augmentée à 500 mg x 2/j la 2<sup>e</sup> sem., puis enfin à 1 g x 2/j en traitement d'entretien. En cas de réponse partielle à 3 mois, la dose peut être passée à 1 g x 3/j.

Il faut assurer une bonne diurèse et surveiller, tous les mois au début, l'hémogramme, en raison du risque de troubles hématologiques qui imposent l'arrêt du traitement, tout comme la survenue éventuelle de réactions cutanées d'hypersensibilité.

Parmi les autres effets indésirables, citons les troubles digestifs, qui cèdent généralement après la diminution de la dose ; une oligospermie lentement réversible.

Les urines et la sueur peuvent être colorées en brun pendant le traitement.

### Biothérapies

Il s'agit d'une classe d'**agents immunomodulateurs sélectifs** qui, en s'opposant à l'action de certaines cytokines pro-inflammatoires (TNF-alpha, interleukine IL-1 ou IL-6), ou à certains processus d'interaction cellulaire, ou encore en neutralisant les lymphocytes B, diminuent la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses qui en découlent.

Leur introduction relativement récente a permis de mieux contrôler de nombreuses formes avec progression rapide, améliorant le confort des malades et limitant la destruction articulaire. Ils sont généralement associés au **méthotrexate**.

Ils imposent des conditions d'initiation et une surveillance rigoureuses, car tous leurs effets secondaires à long terme ne sont pas encore parfaitement connus. La 1<sup>re</sup> prescription, sur une ordonnance de médicament d'exception, se fait en milieu spécialisé hospitalier.

## ANTI-TNF-ALPHA (2)

## ■ Infliximab

REMICADE				
PR de l'adulte en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le <b>méthotrexate</b> Formes sévères de spondylarthrite ankylosante Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique active et sévère Adulte : 3 mg/kg en perfusion IV, d'une durée de 2 h, suivie de perfusions supplémentaires les 2, puis 6, puis 8 sem. suivantes, en association au <b>méthotrexate</b>	1 fl. 100 mg	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal chimérique qui se lie aux formes solubles et transmembranaires du TNF-alpha, il diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

- **Polyarthrite rhumatoïde** : en association avec le **méthotrexate**. Réduction des signes et symptômes, mais aussi amélioration des capacités fonctionnelles, chez :
  - les patients ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements de fond, dont le **méthotrexate**, a été inappropriée ;
  - les patients ayant une maladie active, sévère et évolutive, non traitée auparavant par le **méthotrexate** ni les autres **DMARD**.
- **Spondylarthrite ankylosante** chez les patients qui ont des signes axiaux sévères, des marqueurs sérologiques de l'activité inflammatoire élevés et qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.
- **Rhumatisme psoriasique** actif et évolutif chez les patients qui n'ont pas répondu de manière adéquate aux **DMARD** (*Disease Modifying Antirheumatic Drugs*) :
  - en association avec le **méthotrexate** ;
  - ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au **méthotrexate** ou chez lesquels il est contre-indiqué.
- Maladie de Crohn active, de forme modérée à sévère.

- Rectocolite hémorragique active, de forme modérée à sévère.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients. Septicémie ou risque. Éviter en cas d'infection évolutive, chronique ou localisée. Éviter en cas de maladie démyélinisante ou de risque, en cas d'insuffisance cardiaque.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La survenue possible de réactions aiguës liées à la perfusion, dont des chocs anaphylactiques et des réactions d'hypersensibilité retardée, qui peuvent survenir dès les premières secondes de la perfusion ou durant les quelques heures qui la suivent, en particulier lors des premières perfusions, impose l'arrêt de la perfusion et un traitement adapté. Les réactions mineures imposent de ralentir le débit, et peuvent éventuellement être prévenues ultérieurement par l'administration d'un **antihistaminique** ou de **paracétamol**.

Écarter une infection évolutive, dont la tuberculose, avant de commencer le traitement. L'arrêter en cas d'infection grave, de varicelle, de réaction allergique, de pancytopenie.

Vérifier le test Quantiféron avant de débiter le traitement.

Prudence en cas d'insuffisance cardiaque congestive (risque d'aggravation).

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés pendant le traitement.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (7)

### Anti-TNF-alpha

Ils sont habituellement prescrits en situation d'échec ou d'intolérance au **méthotrexate**, après une série d'examen permettant d'écarter les contre-indications ou de prévenir le risque de réactivation d'une tuberculose. On dispose de :

- **étanercept (ENBREL)**, inhibiteur compétitif de la liaison du TNF à ses récepteurs p75 situés à la surface cellulaire, s'utilise par voie SC, à la dose de 25 mg x 2/sem. ou plus fréquemment de 50 mg x 1/sem. ;
- **infliximab (REMICADE)**, anticorps monoclonal chimérique qui se lie aux formes solubles et transmembranaires du TNF-alpha, s'administre en perf. IV à la dose de 3 mg/kg, d'une durée de 2 h, suivie de perfusions séquentielles effectuées 2 et 6 sem. plus tard, puis toutes les 6 à 8 sem. Les patients doivent être surveillés pendant 1 à 2 h après la perf., en raison du risque de réactions aiguës liées à la perfusion; un équipement d'urgence, tel qu'**adrénaline**, **antihistaminiques**, **corticoïdes** ainsi qu'une assistance respiratoire doivent être disponibles. L'**infliximab** est généralement associé au **méthotrexate**, pour une meilleure efficacité, passant notamment par un moindre risque d'apparition d'anticorps neutralisants anti-infliximab ;
- **adalimumab (HUMIRA)**, anticorps anti-TNF-alpha humain recombinant, utilisé en association au **méthotrexate**, à la dose de 40 mg toutes les 2 sem., par voie SC ;
- **golimumab (SIMPONI)**, anticorps anti-TNF-alpha recombinant, également utilisé en association avec le **méthotrexate**, à la dose de 50 mg par mois, par voie SC ;
- **certolizumab pegol (CIMZIA)**, anticorps anti-TNF-alpha recombinant ayant la particularité d'être couplé à une molécule de polyéthylène-glycol (PEG), lui conférant une plus longue demi-vie d'élimination. Après une dose de charge de 2 x 200 mg toutes les 2 sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois, la

dose d'entretien est de 200 mg toutes les 2 sem., par voie SC.

### Antagoniste de l'IL-6

Le **tocilizumab (ROACTEMRA)** est un anticorps recombinant dirigé contre le récepteur de l'interleukine-6 (IL-6). En attendant la mise à disposition de la forme SC, cette biothérapie s'administre en perf. mensuelles, à la dose de 8 mg/kg. Son efficacité en monothérapie (c'est-à-dire sans **méthotrexate**) a été démontrée. Ses principaux effets secondaires sont une leucopénie, une cytolysé hépatique et une altération du profil lipidique.

### Anti-interaction cellulaire

L'**abatacept (ORENCIA)** est une biothérapie de mécanisme d'action original, s'opposant à la stimulation des lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigène. Bientôt disponible sous une forme SC, ce traitement s'administre jusqu'à présent par voie IV, sous forme de perf. séquentielles d'une demi-heure, toutes les 2 sem. durant le 1<sup>er</sup> mois, puis tous les mois ensuite. Son effet bénéfique peut être précocement enregistré, mais il est parfois nécessaire d'attendre quelques mois pour qu'il soit clairement perceptible par le patient. Comme pour les autres biothérapies, son action immunomodulatrice peut favoriser la survenue d'infections.

### Antagoniste de l'IL-1

L'**anakinra (KINERET)** est une forme recombinante de l'antagoniste spécifique du récepteur de l'IL-1 humaine (IL-1 ra). Le produit, présenté en seringue pré-remplie, est administré à la dose de 100 mg/j en injection SC, en alternant les sites d'injection. Cette biothérapie, qui n'a pas entièrement confirmé son efficacité en termes cliniques, malgré un effet structurel protecteur, est actuellement peu prescrite dans l'indication « PR ».

**ANTI-TNF-ALPHA (3)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquemment, réactions liées à la perfusion (cf. supra) : fatigue, douleur thoracique, fièvre ou frissons, prurit ou urticaire, bouffées de chaleur, hypo ou hypertension, dyspnée, beaucoup plus rarement réactions anaphylactiques. Ces signes peuvent survenir également quelques jours après la perfusion (hypersensibilité retardée).

Infections virales fréquentes : grippe, herpès.

Infections des voies respiratoires, fréquentes.

Infections graves, peu fréquentes : septicémie, abcès, cellulite, mauvaise cicatrisation, infection bactérienne. Tuberculose, infection fongique.

Hématologie : anémie, leucopénie, lymphadénopathie, lymphocytose, lymphopénie, neutropénie, thrombocytopénie.

Réactions allergiques cutanées fréquentes : rash, prurit, urticaire, sudation augmentée, sécheresse cutanée. Autres réactions cutanées plus rares.

Formation d'anticorps anti-infliximab, d'auto-

anticorps et exceptionnellement apparition d'un syndrome lupique.

Fréquemment : céphalées, vertiges, étourdissement. Peu souvent : dépression, confusion, agitation, amnésie, apathie, nervosité, somnolence. Rarement : convulsions, épisodes de démyélinisation du type SEP ou localisée (névrite optique, myélite transverse).

Fréquemment : syncope, bradycardie, arythmie, palpitations, vasospasme, cyanose, thrombophlébite, ischémie périphérique, aggravation d'une insuffisance cardiaque. Anomalies de la fonction hépatique, fréquentes (à surveiller).

Fréquemment : nausée, diarrhée, douleur abdominale, dyspepsie ; peu fréquemment : constipation, reflux gastro-œsophagien, chéilite, cholécystite.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

On ne dispose pas d'études particulières. Dans les essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec les **glucocorticoïdes**, les **sali-cylés**, les **AINS**, les **analgésiques** ou le **méthotrexate**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (8)

### Anti-lymphocyte B (anti-CD20)

Le **rituximab (RTX) (MABTHERA)** est un anticorps monoclonal chimérique anti-CD20 indiqué, en association au **méthotrexate**, dans le traitement des patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un **anti-TNF-alpha**. Le risque de tuberculose semble moins important mais celui d'une réactivation d'une hépatite B est possible. En cas de portage chronique de l'Ag HBs, une prévention de la réactivation virale est nécessaire (**entécavir**, **ténofovir**). Le produit est contre-indiqué en cas d'hypogammaglobulinémie, d'insuffisance cardiaque sévère, d'infection sévère active.

La dose recommandée est de 1 000 mg, par perf. IV, suivie d'une 2<sup>e</sup> perfusion, à 2 sem. d'intervalle. La même séquence est proposée à 6 et 12 mois, puis tous les 6 mois, chez les sujets répondeurs.

Les patients doivent recevoir un traitement antihistaminique et 100 mg de **méthylprednisolone** par voie IV 30 min avant la perf. pour diminuer la fréquence et la sévérité de réactions allergiques, possibles en cours ou juste après chaque perf.

La survenue d'une neutropénie, en règle tardive, a été constatée dans 8 % des cas. Il n'y a pas d'élément en faveur à l'heure actuelle d'une augmentation possible du risque d'affection néoplasique.

### Autres traitements classiques

Ils sont quasiment abandonnés.

#### ► Antimalariques de synthèse (AMS)

En monothérapie, ils donnent des résultats insuffisants dans la majorité des cas. De plus, il faut attendre généralement

3 mois pour juger de leur réelle efficacité. Ce n'est que dans les formes bénignes de PR, à faible potentiel érosif, ou encore dans la cadre d'association avec le **méthotrexate** et la **sulfasalazine**, que les **AMS** conservent encore une place défendable dans la stratégie thérapeutique.

On prescrit le plus souvent : **hydroxychloroquine (PLAQUENIL)** : 1 cp. à 200 x 2/j, puis éventuellement x 3/j.

À ces doses, les traitements au long cours ont une toxicité oculaire potentielle et nécessitent une surveillance régulière, avant traitement (FO, acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs, grille d'Amsler et ERG), puis tous les 6 mois par l'ophtalmologiste.

D'autres effets indésirables sont possibles (neuromyopathie, poussée de psoriasis, etc).

Lorsque ce traitement de fond a été efficace, il est logique, après 1 ou 2 ans d'utilisation (alors que le risque de toxicité oculaire augmente), d'en diminuer la dose, voire même d'essayer de le suspendre.

#### ► Sels d'or (chrysothérapie), dérivés thiolés (**pénicillamine**, **tiopronine**)

Leur efficacité est certaine mais d'installation relativement lente ; de plus, ces 2 classes thérapeutiques s'accompagnent d'assez nombreux effets indésirables, ce qui explique qu'elles ne sont pratiquement plus prescrites actuellement. Leur niveau de maintenance thérapeutique n'excédait pas 20 % à 5 ans.

#### ► Immunosuppresseurs « classiques »

**Azathioprine (IMUREL)**, **chlorambucil (CHLORAMINOPHÈNE)**, **ciclosporine (NÉORAL)** ont également été quasiment abandonnés à l'heure actuelle, notamment depuis l'avènement des biothérapies.

**ANTI-TNF-ALPHA (4)****■ Adalimumab**

<b>HUMIRA</b>					
1 dose unique de 40 mg toutes les 2 sem. par voie SC, en association avec le <b>méthotrexate</b>	2 ser. prér. 40 mg (0,8 mL)	943,74	I	65 %	471,87
	2 stylos prér. 40 mg (0,8 mL)	943,74	I	65 %	471,87
	2 fl. usage péd. 40 mg (0,8 mL)	1 041,36	I	65 %	

**PROPRIÉTÉS**

L'**adalimumab** se combine avec, et bloque, les récepteurs du TNF ; il diminue ainsi la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

**INDICATIONS**

Traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les patients qui n'ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un immunosuppresseur ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. Pour le traitement d'induction, **HUMIRA** doit être administré en association avec des corticoïdes. **HUMIRA** peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance aux corticoïdes ou lorsque la poursuite du traitement corticoïde n'est pas appropriée.

En association au **méthotrexate** :

- *Polyarthrite rhumatoïde* :
  - forme modérément à sévèrement active de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond, y compris le **méthotrexate**, est inadéquate ;
  - forme sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le **méthotrexate**.

- *Rhumatisme psoriasique* actif et évolutif chez l'adulte lorsque la réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate.

- *Spondylarthrite ankylosante* sévère et active chez l'adulte ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
- Tuberculose évolutive ou autres infections sévères telles que sepsis et infections opportunistes.
- Insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA classes III/IV).

**Grossesse** : l'administration d'**adalimumab** n'est pas recommandée pendant la grossesse. Les femmes en mesure de procréer doivent utiliser une méthode de contraception appropriée et la poursuivre pendant 5 mois au moins après la dernière administration d'**HUMIRA**.

**Allaitement** : comme les immunoglobulines humaines passent dans le lait maternel, les femmes ne doivent pas allaiter pendant au moins 5 mois après la dernière administration d'**HUMIRA**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (9)

### Traitements locaux

#### Injectons intra-articulaires de dérivés cortisoniques

Elles sont indiquées à toutes les étapes de la maladie, en particulier lorsque le processus inflammatoire se localise à une articulation d'abord facile.

Une série de 1 à 3 infiltrations (**cortivazol (ALTIM)**, **hexacétone de triamcinolone (HEXATRIONE)**, etc.) à 7 ou 15 j d'intervalle permet parfois de franchir un cap difficile, évitant en particulier d'augmenter le traitement général.

Les règles d'asepsie doivent être rigoureusement appliquées, le risque infectieux local - mais aussi général - étant particulièrement important au cours des polyarthrites rhumatoïdes habituelles et plus encore chez des malades soumis à une corticothérapie générale au long cours ou à un traitement immunosuppresseur.

#### Synoviorthèses isotopiques

C'est la destruction de la synoviale articulaire enflammée, par l'injection intra-articulaire d'**isotope radioactif** (à éviter chez les sujets jeunes et les femmes en période d'activité génitale).

Elle est indiquée lorsque le traitement général s'avère insuffisant à juguler l'inflammation au sein d'une articulation particulièrement accessible à ce traitement, le

genou surtout, mais aussi le coude, la cheville et les doigts.

Elle semble plus efficace lorsqu'il n'y a pas de destruction ostéo-cartilagineuse. Son effet peut se prolonger sur plusieurs mois, voire années.

Elle ne nécessite pas d'hospitalisation mais ne peut être réalisée qu'en milieu spécialisé.

#### Indications chirurgicales

Elles doivent être discutées en fonction du bénéfice que peut en espérer le malade, en milieu médico-chirurgical spécialisé.

Nous ne ferons que citer quelques indications :

- La synovectomie chirurgicale :
  - toujours incomplète ;
  - qui tend à être supplantée par la synoviorthèse pour les articulations ;
  - mais qui reste utile dans la prévention du risque de rupture tendineuse (doigts).
- Les réparations tendineuses.
- La correction chirurgicale des déformations et raideurs articulaires, qui ne doit être envisagée qu'à distance d'une poussée évolutive :
  - correction d'un flectum irréductible du genou, d'un coup de vent cubital ;
  - ostéotomie de correction d'une déviation latérale du genou ;
  - prothèses de hanche, de genou, de coude parfois ;
  - prothèse en silastic des doigts.

#### Vaccinations et rhumatismes inflammatoires

Si des manifestations articulaires, souvent fugaces, peuvent survenir après de nombreuses vaccinations, des cas de polyarthrite ont été décrits après vaccination contre la rubéole, la grippe, l'hépatite B, mais ces cas restent très rares et la relation avec le vaccin n'est pas prouvée.

D'une façon générale :

1- Il est préférable de ne pas vacciner des sujets ayant des antécédents allergiques à l'un des vaccins.

2- Il faut éviter les vaccinations lors des poussées inflammatoires ou des phases évolutives, et les vaccinations rapprochées.

3- Il n'y a pas de contre-indication aux vaccins tués ni aux vaccins reconstitués par génie génétique. Dans les formes stables de polyarthrite rhumatoïde, la tolérance des **vaccins antigrippal** et **antipneumococcique** est bonne.

4- En cas de vaccins vivants atténués :

- contre-indication formelle si l'immunodépression du sujet est jugée importante ;
- le risque de complications sévères existe en cas d'immunodépression (corticothérapie > 10 mg/j de **prednisone**) pour les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune et pour le BCG. Le risque doit donc être évalué pour chaque patient.

## ANTI-TNF-ALPHA (5)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'administration de **méthotrexate** doit être continuée pendant le traitement par **HUMIRA**.

Le traitement par **HUMIRA** doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste qualifié en matière de diagnostic et de traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique ou de la spondylarthrite ankylosante (sur une ordonnance de «médicament d'exception»). Une carte spéciale de surveillance sera remise aux patients traités par **HUMIRA**.

Après une formation correcte à la technique d'injection, les patients peuvent s'auto-injecter **HUMIRA**, sous le couvert d'un suivi médical approprié. La réponse clinique est habituellement obtenue en 12 sem. de traitement. La poursuite du traitement devra être reconsidérée chez un patient n'ayant pas répondu dans ces délais.

- *Infections*

– Dépister des infections (y compris la tuberculose, voir encadré) avant, pendant et après le traitement par **HUMIRA**.

– Ne pas commencer le traitement tant que les infections évolutives, y compris les infections chroniques ou localisées, ne sont pas contrôlées.

– En cas d'apparition d'une infection grave, l'administration d'**HUMIRA** doit être interrompue jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée.

- *Événements neurologiques*

La prudence est recommandée avant de traiter avec **HUMIRA** les patients atteints d'une maladie démyélinisante du système nerveux central, préexistante ou de survenue récente.

- *Réactions allergiques*

En cas de survenue d'une réaction anaphylactique ou d'une autre réaction allergique grave, l'administration d'**HUMIRA** doit être immédiatement interrompue et un traitement approprié mis en œuvre.

- *Tumeurs malignes et troubles lymphoprolifératifs*

Dans l'état actuel des connaissances, la possibilité d'un risque de développer des lymphomes

ou autres maladies malignes chez les patients traités par **anti-TNF** ne peut être exclue.

Une prudence accrue devra être observée lorsqu'on envisage un traitement des patients avec antécédents de tumeurs malignes par **HUMIRA**.

- *Réactions hématologiques*

Des effets indésirables du système sanguin comprenant des cytopénies médicalement significatives ont été peu souvent observés avec **HUMIRA**. Il doit être conseillé à tous les patients de demander immédiatement un avis médical s'ils ont des signes ou des symptômes suggérant des troubles sanguins (par exemple : fièvre persistante, ecchymoses, saignements, pâleur) sous **HUMIRA**. L'arrêt du traitement par **HUMIRA** devra être envisagé pour les patients chez qui des anomalies sanguines significatives seront confirmées.

- *Vaccinations*

Chez la plupart des patients recevant **HUMIRA** est apparue une réponse immunitaire efficace aux vaccins utilisant des polysaccharides pneumococciques.

Compte tenu du manque de données, il est recommandé d'éviter d'associer des vaccins vivants et **HUMIRA**.

- *Insuffisance cardiaque congestive*

Le traitement par **HUMIRA** doit être arrêté chez les patients présentant de nouveaux symptômes ou une aggravation de leurs symptômes d'insuffisance cardiaque congestive.

- *Processus auto-immuns*

Le traitement par **HUMIRA** peut entraîner la formation d'anticorps auto-immuns. L'impact d'un traitement à long terme par **HUMIRA** sur le développement de maladies auto-immunes est inconnu.

- *Chirurgie*

La longue demi-vie de l'**adalimumab** doit être prise en compte si une intervention chirurgicale est prévue. Un patient traité par **HUMIRA** nécessitant une intervention chirurgicale doit être attentivement surveillé afin de dépister des infections et des actions appropriées doivent être entreprises.



## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (10)

### Traitements complémentaires

#### Traitement orthopédique

Instauré dès la phase initiale de la maladie, plus ou moins facile à accepter, il comporte trois éléments importants.

##### ► Règles d'hygiène posturale

Le malade doit coucher sur un lit assez dur, n'utiliser qu'un mince oreiller, garder les genoux en extension, mettre éventuellement un cerceau au pied du lit.

##### ► Exercices de posture

Ils doivent permettre de s'opposer aux attitudes antalgiques. Plusieurs fois par jour il faut :

- pour le membre supérieur mettre les épaules en abduction, les coudes en flexion, les poignets en extension, les doigts en demi-flexion, les pouces en abduction ;
- pour le membre inférieur, mettre les hanches en extension, les genoux en extension, les pieds en flexion dorsale.

##### ► Attelles de posture

Elles cherchent à s'opposer aux déformations articulaires ; tant que persiste l'inflammation, le malade reposera l'article douloureux plusieurs fois par jour, puis seulement la nuit.

L'attelle doit être faite, sur mesure, en matériau thermoplastique, dans la position de fonction.

Le traitement orthopédique est utile dès le début de la maladie car il permet de lutter contre les attitudes vicieuses.

#### Crénothérapie

Elle ne représente réellement qu'un traitement d'appoint, permettant surtout une prise en charge régulière en kinésithérapie et ergothérapie.

#### Prise en charge sociale

À tous les stades de la maladie, il est important de considérer et d'aider à résoudre les problèmes socioprofessionnels, conséquences de cette affection chronique, mais également facteurs d'entretien des poussées évolutives.

Lorsque la maladie commence chez un sujet relativement jeune, il est utile d'envisager un reclassement professionnel, tenant compte des possibilités de la malade.

Les formes graves font partie de la liste des **affections de longue durée** (ALD 30) donnant droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux par la sécurité sociale.

On veillera à l'aménagement des conditions de vie : logement, matériel domestique adapté, etc.

Certains malades peuvent aussi bénéficier de l'aide fournie par des **associations**.

**ANTI-TNF-ALPHA (6)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Les réactions au point d'injection (érythème et/ou prurit, saignement, douleur ou tuméfaction) sont fréquentes mais ne conduisent généralement pas à l'arrêt du médicament.

Les infections sont assez fréquentes, en particulier celles des voies respiratoires supérieures. Certaines peuvent être graves, et sont redoutées : tuberculose, infections opportunistes.

Moins fréquentes : infections des voies respiratoires basses, urinaires, à virus herpès, grippe, mycoses superficielles ; parfois infection articulaire, infections des plaies, abcès, infection de la peau (cellulite et impétigo), infections pileuses (furuncles, anthrax), périonyxis, éruption pustuleuse, infection dentaire et du parodonte, otite, gastroentérite, candidose oropharyngée, infection vaginale.

Troubles sanguins et du système lymphatique : lymphopénie, anémie, et moins souvent, leucopénie, leucocytose, lymphadénopathie, neutropénie, thrombocytopénie.

Troubles du système nerveux et psychiatriques : céphalées, sensations vertigineuses, paresthésies.

Troubles visuels, conjonctivite, inflammation oculaire (y compris œdème, douleur, rougeur), œdème palpébral, glaucome, blépharite, sécheresse oculaire.

Hypertension artérielle.

Toux, douleur nasopharyngée, congestion nasale.

Troubles gastro-intestinaux :

- fréquents : nausée, douleur abdominale, diarrhée, dyspepsie, ulcération buccale ;
- peu fréquents : vomissements, ballonnements, constipation, reflux gastro-œsophagien,

gastrite, colite, saignements hémorroïdaux, hémorroïdes, œdème buccal, douleurs dentaires, sécheresse de la bouche, gingivite, ulcération de la langue, dysphagie, stomatite (y compris stomatite aphteuse).

Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés :

- fréquents : rash, prurit, rash érythémateux, rash prurigineux, perte des cheveux ;
  - peu fréquents : rash maculeux ou papuleux, peau sèche, eczéma, dermatite, hyperhidrose, psoriasis, lésion cutanée, urticaire, ecchymoses et contusions accrues, purpura, acné, ulcération de la peau, angio-œdème, réaction cutanée, anomalie unguéale, sueurs nocturnes, réactions de photosensibilité, exfoliation cutanée.
- Troubles rénaux et urinaires peu fréquents : hématurie, dysurie, énurésie nocturne, pollakiurie, douleur rénale.

Fatigue (incluant asthénie et malaise), syndrome grippal.

Anomalies biologiques :

- fréquente : augmentation des enzymes hépatiques ;
- peu fréquents : augmentation des triglycérides, allongement du temps de céphaline activé partiel, augmentation des phosphatases alcalines, de la CPK, de la LDH ; diminution du potassium sanguin ; neutropénie ; augmentation de l'urée sanguine, de la créatinine sanguine, albumine urinaire ; anticorps ADN positif, anticorps antinucléaire positif.


**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'administration d'**HUMIRA** sans **méthotrexate** a entraîné une augmentation de la formation d'anticorps et une augmentation de la clairance de l'**adalimumab**.

L'administration simultanée d'**anti-TNF-alpha** et d'**anakinra** n'est pas recommandée (majoration du risque infectieux).

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (11)

Algorithme décisionnel pour le traitement d'une polyarthrite rhumatoïde  
(adapté à partir de Smolen et al. Ann Rheum Dis 2014 ; 73 : 492-509)



**ANTI-TNF-ALPHA (7)****■ Golimumab**

<b>SIMPONI</b>					
Voie SC 50 mg x 1/mois	1 ser. prér. 50 mg/ 0,5 mL	937,23	I	65 %	937,23
	1 stylo. prér. 50 mg/ 0,5 mL	937,23	I	65 %	937,23

**PROPRIÉTÉS**

Anticorps monoclonal humain qui forme des complexes stables à forte affinité avec les deux formes bioactives transmembranaire et soluble du TNF-alpha humain, ce qui empêche la liaison du TNF-alpha à ses récepteurs.

**INDICATIONS**

En association avec le **méthotrexate** dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du rhumatisme psoriasique en cas d'échec aux autres traitements.

Traitement de la spondylarthrite ankylosante en cas d'échec aux traitements conventionnels.

**CONTRE-INDICATIONS**

– Allaitement, hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

– Tuberculose active ou autres infections sévères, telles que sepsis, et infections opportunistes.

– Insuffisance cardiaque modérée ou sévère (de classe III/IV dans la classification NYHA).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan immunitaire et recherche de tuberculose avant traitement.

Pendant le traitement, une surveillance cardiaque et hématologique est recommandée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles du système immunitaire, risque infectieux.

Troubles cardiovasculaires : bouffées, vasomotrices, hypertension artérielle, thrombose artérielle et veineuse, ischémie.

Réaction locale au point d'injection, prurit, urticaire, dermatite, asthénie, douleur, dépression, insomnie, fièvre, troubles gastro-intestinaux, troubles respiratoires.

Anémie, leucopénie, pancytopénie, augmentation des transaminases, perturbation du bilan thyroïdien, hyperglycémie, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association de **golimumab** avec d'autres biothérapies utilisées pour traiter les mêmes affections, dont l'**anakinra** et l'**abatacept**, n'est pas recommandée.

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés de façon concomitante avec le **golimumab**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (12)

### Comment décider du choix thérapeutique de « fond »

Dans les formes manifestement peu ou pas agressives

- Antimalarique de synthèse.
- Sulfasalazine.

Dans les formes apparemment plus agressives (sévères)

- En premier :
  - MTX ;
  - léflunomide ou sulfasalazine en cas d'intolérance au MTX ;

– soit d'emblée association de 2 ou 3 traitements modificateurs.

- En cas d'inefficacité, ou d'échappement rapide :
  - soit MTX associé à une biothérapie (anti-TNF, abatacept, tocilizumab, voire rituximab dans certains cas) ;
  - soit biothérapie seule (tocilizumab).
- En cas d'échec d'une biothérapie : un changement de biothérapie (« switch ») doit être envisagé, en passant à une molécule ayant un mode d'action identique ou différent.

### Règles d'utilisation des biothérapies anti-TNF-alpha

- Indications :
  - PR certaine, diagnostiquée par un médecin spécialiste expérimenté.
  - Activité inflammatoire persistant depuis 1 mois au moins, et évolutivité structurale sur 2 radios successives.
  - PR en échec du MTX, pris pendant au moins 3 mois.
- Contre-indications absolues : infections actives, aiguës ou chroniques, néoplasie ou hémopathie, de moins de 5 ans, insuffisance cardiaque classe III et IV (NYHA), maladie démyélinisante. Dans les cas de force

majeure, une grossesse peut être poursuivie sous **REMICADE**.

• Bilan pré-thérapeutique indispensable (incluant la recherche et le traitement d'une tuberculose latente).

• Il n'y a pas de hiérarchie validée des molécules fondée sur l'efficacité.

• L'association au MTX est recommandée, sauf intolérance au produit, et ce, quelle que soit la molécule **anti-TNF-alpha**.

Pour plus de détails : Club rhumatismes et inflammations (CRI) section de la Société française de rhumatologie (<http://www.cri-net.com>).

### En cas de rémission

• On estime qu'il y a rémission clinique lorsque 5 des 6 critères suivants sont remplis pendant au moins 2 mois consécutifs :

- raideur matinale < 15 min,
- absence de fatigue,
- absence de douleur articulaire,
- absence de sensibilité ou de douleur à la mobilisation articulaire,
- absence de gonflement articulaire ou des gaines tendineuses,
- VS < 30 mm pour la 1<sup>re</sup> h chez la femme et < 20 mm chez l'homme.

• D'autres critères de rémission ont été définis conjointement par l'ACR et l'Eular en 2011 :

- nombre d'articulations douloureuses ≤ 1 ;

et

- nombre d'articulations gonflées ≤ 1 ;

et

- CRP < 1 (en mg/dL) soit ≤ 10 mg/L ;

et

– appréciation globale de l'activité de sa PR par le patient ≤ 1 (sur une EVA allant de 0 à 10)

• Il est alors possible d'envisager une modulation du traitement (voir le site du CRI).

Association française de lutte antirhumatisme (AFLAR) : [aflar.unice.fr](http://aflar.unice.fr).

Association française des polyarthritiques (AFP) : [www.polyarthrite.org](http://www.polyarthrite.org).

Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde (ANDAR) : [www.polyarthrite-andar.com](http://www.polyarthrite-andar.com).

Association de recherche sur la polyarthrite (ARP) : [www.arp-fr.org](http://www.arp-fr.org).

## RHUMATISME PSORIASIQUE

Rattacher une monoarthrite, une oligoarthrite asymétrique ou une polyarthrite séro-négative à un rhumatisme psoriasique n'est pas toujours facile, faute d'évoquer systématiquement ce diagnostic et de rechercher systématiquement les lésions cutanées, en leurs sièges de prédilection : cuir chevelu et régions rétro-auriculaires, coudes et genoux, pli interfessier, ongles et région péri-unguéale.

Les atteintes cutanées et articulaires du psoriasis n'ont pas nécessairement une évolution parallèle ; le rhumatisme peut même précéder le psoriasis de plusieurs années, ce qui rend évidemment plus difficile le diagnostic. C'est dans un tel cas que la recherche d'autres cas familiaux prend toute son importance.

**L'évolution est très capricieuse**, et d'une façon schématique le rhumatisme psoriasique évolue :

- soit, et c'est le cas le plus fréquent, sous une forme mono- ou oligo-articulaire peu invalidante ;
- soit comme une polyarthrite d'allure rhumatoïde, cependant particulière par son atteinte asymétrique et la localisation aux articulations interphalangiennes distales (IPD) ;
- soit comme une spondyloarthrite (rhumatisme axial), avec possibles enthésites associées ;
- parfois sous une forme mixte, axiale et périphérique.

Le traitement est adapté en fonction de l'intensité des symptômes, des modalités évolutives, suivant la prédominance périphérique ou axiale des manifestations (cf. Polyarthrite rhumatoïde et Spondyloarthrite ankylosante), avec cependant quelques particularités.

### Formes mineures

On prescrit un traitement AINS, à dose suffisante, associé à des **antalgiques** à base de **paracétamol**, et éventuellement un **traitement local** (infiltration de dérivés **cortisoniques**, en évitant impérativement de piquer à travers une lésion cutanée de psoriasis ; synoviorthèse isotopique, etc.).

### Formes chroniques

Elles relèvent souvent d'un **traitement de fond** comme dans la polyarthrite rhumatoïde, avec certaines précautions.

#### Produits les plus utilisés, actifs dans les formes périphériques

Ils ont fait preuve d'efficacité et d'une tolérance acceptable :

- la **sulfasalazine**, dans les formes de moyenne gravité ; la dose d'entretien peut atteindre 3 g/j ;
- le **méthotrexate**, par voie parentérale dans les formes sévères (avec les précautions d'usage, en particulier chez le sujet jeune). Il faut rappeler que le **méthotrexate** a souvent aussi un effet extrêmement bénéfique sur le psoriasis cutané.

#### Autres médicaments

Ils peuvent être utilisés, mais leur efficacité semble moindre et ils imposent des **précautions** liées au psoriasis.

- Les **corticoïdes** par voie générale sont globalement déconseillés par les dermatologues, car ils risquent de déstabiliser le psoriasis cutané, avec un risque de rechute ou d'aggravation lors de la décroissance des doses ; leur emploi peut néanmoins s'avérer nécessaire, principalement dans les formes périphériques rebelles de rhumatisme psoriasique.
- Les **antimalariques** sont contre-indiqués de façon habituelle car ils peuvent aggraver le psoriasis (au moins initialement), et être responsables d'une érythrodermie.
- Les **rétnoïdes** n'ont pas d'action bénéfique démontrée dans les atteintes rhumatismales du psoriasis. Ils peuvent en outre favoriser l'apparition d'une périostose douloureuse.

### Formes graves

Ce sont les formes ayant échappé aux thérapeutiques précédentes, qu'il s'agisse des formes axiales prédominantes (résistantes aux **AINS**) ou périphériques (insuffisamment contrôlées par **AINS** ± **corticoïdes** et **méthotrexate**).

Elles justifient alors la prescription de biothérapies **anti-TNF-alpha** (**ENBREL**, **REMICADE**, **HUMIRA**, **SIMPONI**, **CIMZIA**) également employées dans la polyarthrite rhumatoïde.

## ARTHRITES RÉACTIONNELLES

C'est un rhumatisme inflammatoire caractérisé classiquement par une triade symptomatique : **syndrome oculo-uréthro-synovial**, survenant plus particulièrement au décours d'un épisode infectieux à tropisme intestinal ou uro-génital.

Un prélèvement urétral (chez l'homme) ou génital (chez la femme), à la recherche d'agents pathogènes intracellulaires déclenchants (*Chlamydiae*, mycoplasme), peut s'avérer utile pour préciser l'étiologie, même si les conséquences thérapeutiques ne s'en trouvent pas réellement modifiées. La recherche de l'antigène HLA-B27, qui se révèle positive dans environ 2/3 des cas d'arthrite réactionnelle, reste un examen utile pour étayer le diagnostic.

Il faut connaître l'évolution possible, à long terme, vers un tableau de spondylarthrite ankylosante.

### Traitement de la phase aiguë

- Le repos est souvent nécessaire.
- Les **antalgiques** à dose suffisante sont utiles, mais généralement insuffisants.
- Les **AINS** représentent le traitement essentiel :
  - soit un **oxicam** : **piroxicam**, **BREXIN** : 1 cp. x 1 ou 2/j pendant 2 j, puis 1 cp./j pendant 4 à 8 j ; ou un autre **oxicam** de la même façon : **FELDÈNE** 20 mg, **CYCLADOL**, **TILCOTIL**, **MOBIC** 15 mg ;
  - soit un **dérivé aryl-carboxylique**, par exemple : pendant les 5 à 10 premiers j, **diclofénac**, **VOLTARÈNE** 50 mg 1 cp. x 2 à 3/j, ou **kétoprofène**, **BI-PROFÉNID** 100 mg : 1 cp. x 2/j, ou générique ;
  - soit le **naproxène** (**APRANAX**, **NAPROSYNE**),

à une dose comprise entre 750 et 1 100 mg/j.

Ensuite une dose inférieure sera prescrite chaque fois que possible, jusqu'à la fin de la poussée (recherche de la dose minimale active).

- Les infiltrations locales de cortisoniques sont possibles et souvent utiles, surtout dans les formes mono- ou oligo-articulaires récidivantes.
- L'antibiothérapie ne constitue pas le traitement de la poussée d'une arthrite réactionnelle, mais celui d'une éventuelle infection uro-génitale sous-jacente, en particulier à *Chlamydiae*, dont le fréquent portage chronique, volontiers asymptomatique, peut favoriser la persistance ou les rechutes rhumatismales. Dans ce cas, on prescrira une **tétracycline**, comme la **doxycycline**, pendant 3 à 6 semaines, sans omettre de traiter le partenaire. En cas de récurrence d'urétrite, l'antibiothérapie précoce semble très utile car elle diminuerait la fréquence des rechutes articulaires.

### Traitement de la poussée durable, installée

On peut être conduit à prescrire un traitement de fond, comme le **méthotrexate** ou la **SALAZOPYRINE**.

En cas d'évolution vers une spondylarthrite, le traitement rejoint celui de cette affection.

### Mesures générales

Le malade pourra encore bénéficier :

- de mesures orthopédiques, notamment pour éviter les attitudes vicieuses ;
- d'une rééducation précoce et active ;
- de synoviorthèses isotopiques, si l'atteinte d'une articulation a tendance à évoluer vers la chronicité.

## SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE (1)

Le traitement anti-inflammatoire est habituellement réservé aux seules poussées douloureuses de la maladie. Son efficacité se juge avant tout sur la clinique : disparition des douleurs et amélioration de l'enraidissement. Appliqué précocement, il permet de raccourcir la durée des poussées inflammatoires et, par-là même, de freiner l'évolution vers l'ankylose du rachis, qui n'est pas inéluctable.

### Traitement médical

#### En poussée évolutive

- Repos, en fonction de la poussée.
- **AINS**, qui sont la prescription de base.

Leur choix est fonction des préférences personnelles, mais aussi de l'efficacité et de la tolérance propres à chaque malade :

- soit un **oxicam** : **FELDÈNE 20 mg**, ou **BREXIN**, ou **CYCLADOL**, ou **TILCOTIL**, ou **MOBIC 15 mg** ;

- soit un **dérivé aryl-carboxylique** : **VOLTARÈNE**, ou **PROFÉNID**, ou **CEBUTID**, ou **LODINE**, ou **NAPROSYNE**, ou **APRANAX**.

La dose doit être adaptée : d'emblée élevée et correctement répartie dans la journée (importance capitale de la prise vespérale, pour contrôler les douleurs nocturnes), poursuivie jusqu'à la résolution de la poussée, puis diminuée progressivement, à la **recherche constante de la dose minimale active**, jusqu'à la fin de la poussée.

La **phénylbutazone** représentait le médicament le plus efficace pour soigner les poussées inflammatoires axiales de SPA, mais un risque - pourtant très rare - d'agranulocytose a conduit à retirer cette molécule du marché.

#### En dehors des poussées

Le traitement est adapté à chaque cas particulier et doit être le moins agressif possible :

- malades n'ayant aucune manifestation clinique : l'abstention paraît légitime ;
- malades ayant une vie quasi normale, grâce à la prise d'**aspirine** : 1 ou 2 g/j ;
- malades stabilisés grâce à de petites doses d'un **AINS** ;
- dans tous les cas les mesures orthopédiques sont indispensables.

#### Indications particulières

Les arthrites des membres, lorsqu'elles s'avèrent peu sensibles au traitement général, peuvent bénéficier :

- d'infiltrations intra-articulaires de corticoïdes : avec l'asepsie de rigueur, 1 à 1,5 mL de **cortivazol (ALTIM)** ou de **triamcinolone (HEXATRIONE)**, etc.,
- ou même, dans certaines formes évoluant sur un mode chronique, d'une synoviorrhèse isotopique.

Certaines poussées très invalidantes et rebelles d'arthrite sacro-iliaque peuvent aussi bénéficier de l'injection intra-articulaire, sous contrôle radiologique, d'un dérivé corticoïde (**HEXATRIONE**).

#### Complications évolutives, formes sévères

- Traitement « de fond » : synthétiques comme **SALAZOPYRINE**, **MÉTHOTREXATE BELLON** (seulement efficaces dans les formes périphériques de SPA), ou biologiques **anti-TNF-alpha** : **étanercept (ENBREL)**, **adalimumab (HUMIRA)**, **golimumab (SIMPONI)**, **infliximab (REMICADE) [1]**.
- Arthroplastie en cas de coxite sévère, malgré le risque, après l'intervention, d'une tendance à l'ankylose.
- Immobilisation plâtrée ou en matériau thermoplastique, en cas de fracture sur rachis ankylosé (« colonne bambou »).



## SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE (2)

### Traitement orthopédique

Les mesures orthopédiques ont une place importante dès le début de l'affection, et même en dehors des poussées, permettant de prévenir ou de limiter les conséquences d'une ankylose en mauvaise position.

- Coucher sur un plan dur (interposition éventuelle d'une planche entre matelas et sommier) ; il faut tolérer un mince traversin.

- Des mouvements en extension luttent contre la tendance à la cyphose dorsale.

- Gymnastique posturale, dos au mur, le corps touchant le mur par les talons, les épaules, les épineuses iliaques postérieures, les omoplates et l'occiput. La mesure de la flèche entre le mur et le creux de la nuque étant l'élément de surveillance.

- Exercices respiratoires quotidiens visant à limiter la diminution de l'amplitude respiratoire.

- Prescription éventuelle de séances de kinésithérapie pour faciliter la compréhension et le suivi des conseils précédents.

### Critères de New York modifiés pour le diagnostic de spondylarthrite ankylosante

- Critère radiologique
  - Sacro-iliite de grade  $\geq 2$  si sacro-iliite bilatérale ou
  - Sacro-iliite de grade  $\geq 3$  si sacro-iliite unilatérale
- Critères cliniques (au moins 1)
  - Lombalgies et raideur lombaire de plus de 3 mois améliorées par l'activité physique et non soulagées par le repos.
  - Limitation de la mobilité du rachis lombaire dans le plan sagittal et frontal.
  - Limitation de l'expansion thoracique par rapport aux valeurs de sujets de même âge et même sexe.

### CONSENSUS

[1] Recommandations pour l'utilisation des anti-TNF-alpha dans la spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique, *SFR et CRI*, 2007

**RHUMATISME POST-ANGINEUX, POST-STREPTOCOCCIQUE**

Ce cadre, relativement **rare par rapport aux autres rhumatismes**, n'a de réel intérêt en pratique qu'en raison d'une incidence thérapeutique qui lui est propre : la nécessité d'un traitement antibiotique par la **pénicilline**.

Les circonstances de diagnostic sont variables : lorsque l'atteinte articulaire, généralement subaiguë, a été précédée d'une pharyngo-amygdalite, ou lorsque l'on découvre une ascension **significative** du titre des anticorps antistreptodornase ou antistreptokinase, plus spécifique que l'élévation des antistreptolysines O (ASLO).

Si le tableau est proche de celui du rhumatisme articulaire aigu, surtout chez l'adulte jeune ou l'adolescent, il semble préférable de le traiter comme tel, c'est-à-dire de manière nettement plus prolongée par **pénicilline**.

**Traitement****Traitement anti-inflammatoire**

Il repose surtout sur l'**acide acétylsalicylique**, à la dose de 3, voire 4 g/j (qui sera réduite

progressivement après la 6<sup>e</sup> sem. pour éviter un rebond), plus que les **AINS**.

La corticothérapie n'est employée que dans les rares formes évoluant comme un RAA, avec localisation cardiaque.

**Pénicilline**

Elle transforme l'évolution.

- **Pénicilline G**, 2 à 4 M UI/j par voie IM pendant 10 à 15 j environ.

- Ou, par voie orale : **amoxicilline (CLAMOXYL** ou générique) : 1 gél. à 500 mg, matin midi et soir, pendant 10 à 15 j.

- Puis, traitement d'entretien pour éviter les rechutes, pendant 3 à 6 mois : soit par **EXTENCILLINE** : 1 200 000 UI tous les 15 j, ou 2 400 000 UI toutes les 3 à 4 sem., en inj. IM profonde ; soit par **ORACILLINE** : 1 MUI, 1 cp./j.

- En cas d'allergie à la **pénicilline** on utilisera l'**érythromycine**, à la dose de 1,5 g/j.

- Lorsque le rhumatisme est guéri (au bout de 2 à 3 mois au maximum), il faut envisager sous pénicillinothérapie la cure des éventuels foyers streptococciques : amygdaliens, dentaires, sinusiens, etc.

**ARTÉRITE TEMPORALE (MALADIE DE HORTON) (1)****Urgence thérapeutique**

Elle doit avoir pour objectifs l'efficacité rapide et la prévention des complications dont le malade est menacé :

- l'une rare, mais redoutable et imprévisible : la cécité, en règle définitive (*cf.* Oblitération de l'artère centrale de la rétine (OACR) en Ophtalmologie) ;
- l'autre plus fréquente et de nature iatrogène : les tassements vertébraux de la corticothérapie au long cours.

Comme celle-ci représente le seul traitement, le diagnostic mérite d'être étayé par un examen histologique positif.

La biopsie de l'artère temporale ne doit pas être retardée, ni négativée par quelques jours de corticothérapie. Dans les cas où, malgré un prélèvement suffisant, elle serait négative, il est certes pos-

sible de faire une biopsie controlatérale, mais si les arguments cliniques et biologiques sont très évocateurs il est légitime de ne pas attendre pour traiter.

Il est toujours légitime de s'assurer :

- de l'absence de contre-indication, ou de précautions supplémentaires rendues nécessaires par une pathologie associée ;
- que le risque oculaire n'est pas immédiatement menaçant, auquel cas la corticothérapie devrait précéder la biopsie de l'artère temporale ;
- qu'il n'existe pas de localisation sur un autre territoire artériel (écho-Doppler des vaisseaux de la base du cou, de l'aorte thoracique et abdominale). Une image de halo autour d'une artère temporale peut apporter un argument diagnostique notable.

## ARTÉRITE TEMPORALE (MALADIE DE HORTON) (2)

### Traitement

C'est la corticothérapie au long cours.

En pratique le produit le plus utilisé est la **prednisone**, **CORTANCYL** (cp. dosés à 1, 5 et 20 mg).

Il est souvent possible (en l'absence de signes fonctionnels oculaires menaçants) de commencer par une dose de 30 mg/j seulement, dont l'effet est habituellement aussi rapide en 24 à 48 h que la dose classique de 40 à 60 mg/j.

- La dose journalière peut être fractionnée, en donnant une dose un peu plus forte le matin.
- Cette dose initiale est réduite très progressivement, au début par paliers de 5 mg, toutes les 2 à 4 sem. par exemple, en surveillant parallèlement la VS, la CRP **et les signes fonctionnels**.
- À partir de 15 mg/j, la réduction des doses doit encore être plus lente, de l'ordre de 1 mg à chaque palier, pour parvenir à une dose d'entretien voisine de 10 mg/j. Ensuite, la baisse se fera mg par mg, à un rythme adapté à chaque cas.
- L'ajustement thérapeutique nécessite une participation éclairée du malade.
- En cas de rechute des signes cliniques ou d'augmentation significative de la VS, on reviendra à la dose précédente.
- Le traitement, finalement, a une durée moyenne de 2 à 3 ans, parfois plus.
- Sa complication majeure est le tassement vertébral ostéoporotique.

### Formes nécessitant de fortes doses de corticoïdes

On peut envisager d'associer d'autres médicaments permettant de réduire la corticothérapie : moins les **antimalariques de synthèse**, peu efficaces, ou la **dapsone**, relativement iatrogène, que le **méthotrexate** comme dans la polyarthrite rhumatoïde, mais les données publiées ne révèlent pas un haut niveau de preuve de leur efficacité.

### Précautions liées à la corticothérapie

Elles sont d'autant plus impératives qu'il s'agit de sujets âgés ; citons les plus importantes.

- Régime sans sel et surveillance tensionnelle ; apport de potassium.
- Prévention de l'aggravation prévisible de l'ostéoporose du sujet âgé : par apport de **calcium** et de **vitamine D** : **OROCAL**, ou **CALTRATE VIT. D3**, de préférence 2 cp./j, voire en y associant un **biphosphonate** (cf. Ostéoporose).
- Détection et équilibration éventuelle d'un diabète.
- Surveillance de la tolérance gastrique, en général bonne, et intestinale.
- Surveillance pulmonaire par des clichés thoraciques réguliers pour déceler la survenue ou le réveil d'une tuberculose chez le sujet âgé.

### Traitement antiagrégant plaquettaire

Certains le recommandent chez les patients « à risque » :

- signes ischémiques, même fugaces ;
- hyperfibrinogénémie > 6 g/L ;
- thrombocytose > 450 000/mm<sup>3</sup>.

Par exemple : **aspirine**, 100 à 300 mg/j, sauf contre-indications.

## PSEUDO-POLYARTHRITE RHIZOMÉLIQUE (PPR)

### Diagnostic

Le diagnostic de PPR est clinique.

- La raideur douloureuse des ceintures chez un sujet de plus de 60 ans est d'autant plus évocatrice qu'elle est importante au réveil, qu'elle s'accompagne d'une altération de l'état général avec fébricule et amaigrissement, d'une augmentation de la VS (et de la CRP) et d'une anémie de type inflammatoire.
- L'indication d'une biopsie de l'artère temporale ne paraît pas devoir être systématique, mais réservée aux cas où il existe quelques céphalées. S'il y a des signes histologiques d'artérite giganto-cellulaire, le patient sera traité comme pour une maladie de Horton.
- Le diagnostic avec une polyarthrite rhumatoïde est parfois difficile : soit que la PPR s'accompagne de manifestations articulaires périphériques en plus de l'atteinte des ceintures, soit qu'elle s'accompagne d'une sérologie rhumatoïde positive (assez souvent positive chez des sujets âgés, en dehors de la maladie rhumatoïde) : l'évolution tranchera en règle.

### Traitement

La corticothérapie au long cours résume le traitement, comme dans l'artérite temporale, mais la posologie initiale nécessaire est moindre.

### Traitement initial

On commence par 15 mg/j (dose habituellement suffisante, et efficace en 24 à 48 h) de **prednisone**, **CORTANCYL**, et l'on diminue ensuite mg par mg, par paliers de 4 sem. environ jusqu'à 10 mg.

Il est exceptionnel de prescrire des doses plus élevées.

L'efficacité se juge sur la clinique et sur la normalisation de la VS et de la CRP, habituellement retardée par rapport à l'amélioration clinique.

### Traitement d'entretien

Il sera poursuivi à la **dose minimale active**, diminuée mg par mg jusqu'à extinction de la maladie, ce qui peut nécessiter plusieurs années.

L'ajustement thérapeutique bénéficie d'une participation éclairée du malade.

En cas de rechute des signes cliniques ou d'augmentation significative des paramètres inflammatoires biologiques, on reviendra à la posologie précédente.

### Précautions liées à la corticothérapie

Ce sont les mêmes que pour l'artérite temporale, mais les tassements vertébraux ostéoporotiques sont heureusement beaucoup moins fréquents aux doses utilisées dans la PPR.

## LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE (1)

L'atteinte pluriviscérale de la maladie lupique explique que le traitement symptomatique tienne une place considérable, parallèlement au traitement « de fond ».

### Diagnostic du lupus érythémateux systémique (LES)

Le problème essentiel est d'évoquer le diagnostic, que le lupus se présente :

- sous une forme aiguë : maladie évolutive avec signes généraux graves et localisations multiples ;
- ou sous une forme subaiguë ou monosymptomatique (pleurésie, polyarthrite, éruption cutanée, syndrome néphrotique, etc.).

#### Critères diagnostiques du lupus

- Éruption du visage en aile de papillon.
- Lupus discoïde.
- Photosensibilité.
- Ulcérations buccales ou nasopharyngées.
- Polyarthrite non érosive.
- Pleurésie ou péricardite.
- Atteinte rénale : protéinurie > 0,50 g/j ou cylindres urinaires.
- Atteinte neurologique : convulsions ou psychose.
- Atteinte hématologique : anémie hémolytique avec hyperréticulocytose, ou leucopénie < 4 000/mm<sup>3</sup> ou lymphopénie < 1 500/mm<sup>3</sup>, ou thrombocytopénie < 100 000/mm<sup>3</sup>.
- Désordres immunologiques : présence de cellules LE ou d'anticorps anti-ADN natif, ou d'anticorps anti-Sm ou d'une fausse sérologie syphilitique.
- Présence d'un titre anormal d'anticorps antinucléaires en l'absence de médicaments pouvant en susciter.

La présence de 4 critères sur les 11 permet de retenir le diagnostic de LES avec une très grande sensibilité et spécificité.

Les médicaments susceptibles d'induire un syndrome proche du LES sont très nombreux, dont : **RIMIFON, TROLOVOL, LARGAC-**

**TIL, DI-HYDAN, TÉGRÉTOL, ZARONTIN, SEC-TRAL, TRANDATE, VISKEN, ALDOMET**, etc.

### Contraception et LES

On sait actuellement que les œstrogènes peuvent être bien tolérés, non délétères chez les femmes lupiques, mais, si une autre contraception n'est pas souhaitée, les critères de sélection doivent être stricts :

- lupus en rémission ;
- absence d'antécédent thrombotique ou thromboembolique ;
- absence d'anticorps antiphospholipides.

### Grossesse et LES

La grossesse reste contre-indiquée pendant une poussée.

Elle peut être envisagée après 6 à 12 mois de rémission, et en l'absence d'atteinte cardiaque ou rénale.

En cas de présence d'anticoagulant circulant ou d'anticorps antiphospholipides, il y a un risque accru de fausse couche spontanée.

La présence chez la mère d'anticorps anti-SSA fait courir au fœtus un risque de bloc auriculo-ventriculaire cardiaque à expression néonatale, pouvant justifier la pose d'un stimulateur.

Une grossesse en contexte lupique doit être considérée comme à « haut risque ». Si la patiente est déjà sous corticothérapie avant d'être enceinte, la dose sera volontiers augmentée en fin de grossesse ; sinon, elle sera mise en place au cours du dernier trimestre. En l'absence de toxicité fœtale des **antimalariques de synthèse**, il est recommandé de poursuivre l'**hydroxychloroquine** pendant la grossesse, pour diminuer l'activité de la maladie et s'opposer au risque de poussée durant le post-partum.

## LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX SYSTÉMIQUE (2)

Un certain nombre de mesures générales doivent être appliquées.

- Se reposer pendant les poussées.
- Éviter l'exposition solaire en cas de photosensibilité.
- Éviter les produits allergisants.
- Les vaccinations sont toutefois possibles.

Le traitement médicamenteux est difficile à codifier.

- Il est bien différent dans les formes mineures (formes articulaires et/ou cutanées), dans les formes « moyennes », et enfin dans les formes graves, qui mettent en jeu le pronostic vital.
- Il n'est pas possible de fixer une durée au traitement symptomatique ; il ne doit pas être arrêté brusquement mais progressivement, en fonction de l'évolution clinique et biologique.
- Il doit être constamment ajusté au cours de l'évolution, de façon à n'utiliser que la dose minimale nécessaire pour être efficace et pour limiter les effets secondaires.
- Les infections constituent la principale cause de morbidité et de mortalité des patients.

### Formes mineures

Pour une polyarthrite modérément invalidante, une pleurésie ou péricardite discrètes, les **AINS** peuvent suffire pour atténuer les symptômes.

Lorsqu'une polyarthrite tend à devenir chronique, il est possible, si elle est modérément invalidante, de prescrire comme **traitement de fond un antimalarique de synthèse**.

On prescrit le plus souvent : **hydroxychloroquine (PLAQUENIL)** : 1 cp. à 200 mg x 3/j pendant 2 à 3 mois, puis diminuer à 2 cp./j ensuite.

À ces doses, le traitement au long cours par **PLAQUENIL** comporte un risque potentiel de **toxicité oculaire** et nécessite une surveillance régulière, d'abord avant traitement, puis tous les 6 mois par un ophtalmologiste.

Des effets indésirables sont possibles.

Rappelons que la **D-pénicillamine** et les **sels d'or** sont contre-indiqués dans le LES. Dans les formes cutanées, les **antimalariques de synthèse** sont aussi une bonne indication, avec en plus dans le lupus discoïde une pommade à base de **corticoïde**.

### Formes plus sévères, ou échappant aux mesures précédentes

La corticothérapie est indispensable : habituellement **prednisone, CORTANCYL** (cp. à 1, 5 et 20 mg) mais d'autres produits sont possibles, à des doses variables selon la localisation et sa gravité :

- Polyarthrites invalidantes : 10 à 25 mg/j. L'adjonction du **méthotrexate** (10 à 20 mg/sem.) peut faciliter la nécessaire épargne cortisonique.

- Anémie hémolytique, purpura thrombopénique : 1 mg/kg/j.

- Péricardite avec volumineux épanchement, myocardite : 0,50 à 1 mg/kg/j.

- Encéphalopathie lupique : 1 à 1,5 mg/kg/j.

- Glomérulonéphrite proliférative : 1,5 mg/kg/j en association systématique avec un agent **immunosuppresseur (CELL-CEPT, ENDOXAN)**. La glomérulonéphrite focale peut bénéficier d'une corticothérapie seule. La glomérulonéphrite extra-membraneuse, rarement corticosensible, n'a pas de traitement clairement codifié. Le **bélimumab (BENLYSTA)** peut être utilisé dans certaines formes rebelles ou cortico-dépendantes, à l'exception des atteintes rénales actives ou neurologiques centrales.

- Vascularites lupiques : 1 mg/kg/j.

La posologie initiale est poursuivie jusqu'au contrôle des symptômes, puis réduite progressivement, cas par cas, par ex. de 10 %/sem. jusqu'à 20 mg/j, puis de façon plus lente.

La prescription associée de **PLAQUENIL**, en traitement de fond, peut aider à atteindre la dose minimale efficace.

Il faut toujours tenir compte des effets secondaires de la corticothérapie au long cours.

## LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE (3)

### Formes graves

Dans les formes qui mettent en jeu le pronostic vital immédiat, ou celles qui échappent aux traitements précédents, mais aussi systématiquement pour certaines atteintes, des **traitements plus agressifs** sont envisagés. Il est certain que **leur emploi nécessite une réflexion particulière pour chaque malade**, une mise en route et une surveillance en milieu hospitalier et spécialisé. Il s'agit :

- des **immunosuppresseurs** : **azathioprine (IMUREL)** : 2 à 3 mg/kg/j, ou **cyclophosphamide (ENDOXAN ASTA)** : 2,5 à 5 mg/kg/j, nécessitant une surveillance hématologique et hépatique, une contraception efficace, et une posologie constamment ajustée ; ils peuvent être associés à la corticothérapie ou la relayer ;
- des **plasmaphérèses**, dans les vascularites graves et certaines glomérulonéphrites prolifératives diffuses ;
- des **assauts cortisoniques** (bolus) : par exemple et à titre simplement indicatif :

**méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** 7,5 à 15 mg/kg/j, pendant 1 à 3 j, en perfusion, avec une surveillance attentive en raison de risques parfois vitaux.

- des biothérapies peuvent être proposées dans des cas particuliers de LES, avec atteinte rénale ou du système nerveux central, réfractaires aux **immunosuppresseurs synthétiques** : biothérapies **anti-lymphocyte B (MABTHERA)** (cf. Polyarthrite rhumatoïde).

### Cas particuliers

Les phlébites et accidents emboliques relèvent des anticoagulants (à vie en cas de syndrome des antiphospholipides).

L'hypertension artérielle, l'épilepsie justifient un traitement propre ; il n'y a pas de contre-indication à utiliser si nécessaire des médicaments susceptibles de favoriser un lupus induit.

Une insuffisance rénale avancée peut nécessiter une hémodialyse ou une transplantation.



## PÉRIARTÉRITE NOUEUSE

Le traitement de la périartérite noueuse (PAN) reste un traitement symptomatique, adapté à l'expression clinique de la maladie, très diverse, à ses modalités évolutives et surtout à sa gravité.

La fréquence des multinévrites parmi les circonstances révélatrices est connue. L'association d'un amaigrissement rapide, d'une fièvre, de myalgies, d'arthralgies et de multinévrite est très évocatrice de PAN. Parmi les autres signes de la maladie (purpura, asthme), certains ont en outre une valeur pronostique : hypertension artérielle et surtout insuffisance rénale.

Affirmer la PAN repose sur l'examen histologique : par biopsie nerveuse et musculaire, par biopsie d'un élément cutané, ou par biopsie rénale.

La **corticothérapie** représente le traitement principal qui a permis une augmentation nette des survies à 5 ans, encore faut-il tenir compte de l'évolution spontanée parfois lente et bien tolérée de certaines périartérites noueuses.

### Formes de gravité moyenne

La corticothérapie orale peut suffire. Le traitement corticoïde d'attaque, adapté à chaque malade et chaque forme de la maladie, comporte jusqu'à 0,5 à 1 mg/kg/j de **prednisone**, **CORTANCYL** (cp. à 5 et à 20 mg), pour une période de quelques semaines.

Le traitement d'entretien est adapté en fonction du résultat obtenu, en diminuant la corticothérapie par paliers de 5 mg, sur plusieurs mois en général ; l'association au **cyclophosphamide** (**ENDOXAN ASTA**) peut permettre de diminuer la dose nécessaire. Rappelons que la corticothérapie prolongée expose à de nombreux effets secondaires ; les risques de tassements vertébraux ostéoporotiques et de tuberculose,

qui sont les plus à craindre, doivent être prévenus.

### Formes cliniquement sévères

- Formes avec altération de l'état général, pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
- Multinévrites sévères.
- Insuffisance rénale rapidement progressive.

### Assauts cortisoniques (bolus IV)

À titre simplement indicatif : **méthylprednisolone** (**SOLUMÉDROL**) 7,5 à 15 mg/kg/j, pendant 1 à 3 j, en perfusion et avec une surveillance très attentive, puis relais par corticothérapie orale. La prescription de **cyclophosphamide** (**ENDOXAN ASTA**), en perfusions séquentielles, lui est souvent associée.

### Immunosuppresseurs

Ils représentent la base habituelle du traitement, en association avec la corticothérapie ; on utilise, soit l'**azathioprine** (**IMUREL**) : 2 à 3 mg/kg/j, soit surtout le **cyclophosphamide** (**ENDOXAN ASTA**), par perfusion (moins toxique que la forme orale continue), selon un rythme à discuter en fonction de chaque cas.

### Plasmaphérèses, immunoglobulines humaines

Les plasmaphérèses, les **immunoglobulines humaines** normales (**TÉGÉLINE**), en milieu spécialisé, peuvent donner de bons résultats, seules ou associées aux autres traitements.

### PAN secondaire à l'infection par le virus de l'hépatite B

La prise en charge, en milieu spécialisé, associe un traitement antiviral au traitement d'attaque de la forme classique de la PAN, parfois complété par des plasmaphérèses initiales.

## POLYMYOSITE - DERMATOMYOSITE

La cause de ce groupe d'affections demeure inconnue, même si un phénomène d'auto-immunité est le plus souvent impliqué. Il n'y a donc pas de traitement étiologique, en dehors des formes paraneoplasiques, où l'éradication du cancer, lorsqu'elle est possible, peut aboutir à un état de guérison apparente. Certaines polymyosites s'inscrivent dans la cadre de connectivites auto-immunes définies (comme le lupus érythémateux systémique ou le syndrome de Gougerot-Sjögren) ; d'autres formes sont reliées à une infection virale chronique (par le VIH en particulier).

Les options thérapeutiques sont dominées par la corticothérapie en 1<sup>re</sup> intention, au traitement symptomatique des diverses manifestations et complications, auxquels s'ajoutent diverses tentatives de traitement immunomodulateur complémentaire, variant suivant les formes cliniques évolutives de la maladie.

### Corticothérapie

Elle représente la base principale du traitement.

Elle est instituée, par voie orale, à forte dose durant les premières poussées : 1 à 1,5 mg/kg/j de **prednisone (CORTANCYL)** (cp. à 1, 5 et 20 mg), pendant plusieurs sem., avant d'envisager une diminution progressive, en cas d'efficacité initiale, par

paliers de 5 mg en moins tous les 2 à 4 sem., ceci sur plusieurs mois, le traitement pouvant être prolongé pendant plusieurs années.

Dans les formes sévères, la corticothérapie parentérale à très fortes doses, administrée sous forme de bolus IV pendant une courte période semble justifiée, en particulier en cas d'atteinte respiratoire.

### Traitements complémentaires

Ils peuvent être institués après échec, ou insuffisance, de la corticothérapie, mais parfois d'emblée, lorsque la gravité de l'atteinte musculaire ou l'association à d'autres manifestations systémiques le justifient.

On utilise avant tout le **méthotrexate**, à une dose comprise entre 10 et 25 mg/sem., par voie orale (**METHOTREXATE BELLON**) ou en inj. IM (**METOJECT**) (sous une surveillance du même type que pour la polyarthrite rhumatoïde), plus rarement l'**azathioprine**, le **cyclophosphamide**, la **ciclosporine**, etc.

Dans certains cas on peut utiliser des injections intraveineuses mensuelles d'**immunoglobulines polyvalentes (TÉGÉLINE)**, ou des échanges plasmatiques, dont l'indication se décide en milieu spécialisé.

Des essais thérapeutiques ont eu lieu avec certaines biothérapies, comme le **rituximab (MABTHERA)**.

## SCLÉRODERMIE

La cause de la maladie est toujours inconnue et il n'y a pas de traitement étiologique.

Les possibilités thérapeutiques sont donc limitées au traitement symptomatique des diverses manifestations et aux tentatives de traitement de fond, que nous ne ferons que citer.

Elle atteint surtout l'adulte et plus souvent la femme. On peut schématiquement opposer 2 formes de pronostic différent :

- une forme cutanée limitée ;
- une forme cutanée diffuse, plus grave car souvent rapidement compliquée.

### Traitements immunomodulateurs « de fond »

Leur efficacité étant très discutée, leur indication justifie une décision en milieu spécialisé.

L'atteinte pulmonaire interstitielle peut parfois se stabiliser sous **cyclophosphamide (ENDOXAN)**.

### Traitements symptomatiques

Ils sont très utiles et doivent être adaptés aux manifestations cliniques ; nous ne

ferons que citer les principales d'entre elles :

- le phénomène de Raynaud nécessite généralement, en dehors des mesures logiques de protection vis-à-vis du froid, un traitement par inhibiteur des canaux calciques : **nifédipine (ADALATE)** ou **diltiazem (BI-TILDIEM ou MONO-TILDIEM LP)**, voire - dans les cas les plus graves avec risque de gangrène distale - des perfusions quotidiennes d'un analogue de la prostacycline, l'**iloprost (ILOMÉDINE)** pendant 6 à 10 j consécutifs ;
- l'atteinte œsophagienne justifie habituellement un traitement du reflux et de l'œsophagite ;
- l'atteinte rénale et l'hypertension artérielle relèvent au début des **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** ;
- l'hypertension artérielle pulmonaire, grevant le pronostic vital, peut bénéficier de la prescription d'un **inhibiteur de l'endothéline** comme le **bosentan (TRACLEER)**, ou d'**inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5** comme le **sildénafil** ou le **tadalafil** (prescrits et surveillés en milieu spécialisé).

## TENDINITES ET TENDINOPATHIES (1)

### Définitions

#### Tendinopathies d'insertion

Les tendinopathies d'insertion sont d'origine avant tout dégénérative, microtraumatique reconnue ou non, mais parfois le fait de concrétions calcaires (hydroxyapatite), voire de certains rhumatismes inflammatoires (enthésopathies au cours des spondylarthrites plus que de la polyarthrite rhumatoïde).

Ces tendinopathies d'insertion peuvent être associées à des bursites de voisinage (ténobursites), à une réaction périostée (ténopériostite).

#### Ténosynovites

La tendinite est associée à une réaction inflammatoire de la gaine du tendon, qui

peut elle aussi être d'origine microtraumatique, ou parfois infectieuse.

Elles s'intègrent volontiers dans un tableau de rhumatisme inflammatoire en général évident.

#### Mesures générales

Le traitement des formes douloureuses de tendinopathies est assez univoque.

- Mise au repos du tendon affecté.
- Traitement anti-inflammatoire allant de l'application d'un gel **AINS**, dans les formes superficielles, à la prescription d'un **AINS** par voie orale ou à la réalisation d'une série de 1 à 4 injections locales d'un **corticoïde**, en fonction : de l'intensité des symptômes, de leur durée préalable, de contre-indications éventuelles, de préférences personnelles du patient ou du médecin.

## TENDINITES ET TENDINOPATHIES (2)

### Modalités thérapeutiques

#### Repos

Il doit être relatif, adapté à l'activité préalable du sujet, mais il concerne plus particulièrement la suspension des mouvements itératifs qui ont favorisé et entretiennent la réaction inflammatoire. Dans certaines formes une immobilisation par attelle ou orthèse est utile.

#### Médications antalgiques

Elles peuvent constituer un appoint, en particulier dans les formes réellement hyperalgiques (rares), mais aussi lorsque le traitement AINS est contre-indiqué.

On s'adresse habituellement au **paracétamol**, à la posologie de 1,5 à 3 g/j, seul ou éventuellement associé, par exemple au **tramadol (IXPRIM)** : 1 à 2 cp./4-6 h.

#### Gels anti-inflammatoires locaux

Ils peuvent être utiles **dans les formes très superficielles** de tendinopathie, en général d'intensité symptomatique modérée, à condition d'être appliqués régulièrement 2 à 3 fois/j et pendant une durée prolongée, plusieurs semaines habituellement.

On prescrira : **diclofénac (VOLTARÈNE ÉMUL-GEL ou FLECTOR)** ; ou **piroxicam (GELDÈNE)** ; ou **kétoprofène (PROFÉNID gel ou KÉTUM gel)**, etc.

#### Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Ils représentent, avec les injections locales de **corticoïdes**, l'un des 2 traitements habituellement efficaces des tendinopathies.

Il est important de respecter leurs contre-indications et précautions d'emploi, d'autant que la prescription doit souvent être prolongée quelques semaines pour éviter un rebond à leur arrêt.

Selon les habitudes personnelles :

- soit un **oxicam**, à la dose de 1/j (et si possible 1/2 seulement, après amélioration) : **piroxicam (FELDÈNE 20 mg)** (gélule ou comprimé dispersible), ou **BREXIN**, ou **CYCLADOL**, ou **ténoxycam (TILCOTIL)**, ou générique ;
- soit un dérivé aryl-carboxylique, à posologie adaptée, par exemple **diclofénac (VOLTARÈNE)** (100 à 150 mg/j), ou **kétoprofène (PROFÉNID)** (200 mg/j), etc., ou génériques.

#### Injections locales de corticoïdes (cf. Corticothérapie locale)

Elles représentent l'autre traitement habituellement efficace des tendinopathies, à condition de **respecter quelques règles** :

- ne pas répéter le geste s'il n'a pas fait preuve d'efficacité après la 2<sup>e</sup> inj. ;
- effet bénéfique ayant duré au moins une quinzaine de j ;
- espacer d'au moins 10 à 20 j les 2 premières inj., et en général plus pour les suivantes ;
- ne pas dépasser 4 inj. pour une série, et d'une façon générale 6 inj. pour une période de 12 mois consécutifs (arbitraire) ;
- asepsie rigoureuse et technique bien maîtrisée (pas d'injection intra-tendineuse).

Il faut prévoir pour les sportifs de compétition de remplir un formulaire AUT (autorisation d'usage à des fins thérapeutiques), car les corticoïdes font partie de la liste des produits « dopants ».

## TENDINITES ET TENDINOPATHIES (3) – TENDINITES DU MEMBRE SUPÉRIEUR

### Périarthrite scapulo-humérale (en général une tendinite du supra-épineux)

#### Formes habituelles

Le traitement habituel (**AINS** ou injections locales de **corticoïdes**) est efficace, à condition d'être suffisamment poursuivi. Certaines formes d'emblée hyperalgiques, avec grande impotence, correspondent à une poussée de calcification tendineuse ou dans la bourse adjacente. Elles réagissent très bien et très vite à la prescription d'un **AINS** à la dose maximale autorisée ; une brève corticothérapie par voie orale peut lui être substituée en cas de contre-indication aux **AINS**.

Dans les formes d'emblée hyperalgiques, les infiltrations sont à éviter, au moins les premiers jours, car elles risquent d'accroître la douleur.

#### Formes chroniques et invalidantes

Il faut éviter la répétition des infiltrations en particulier si leur action n'est pas durable, éviter les **AINS** lorsque la douleur est modérée.

Quand il est manifeste que l'accrochage tendineux est responsable de la gêne fonctionnelle, on peut envisager un geste chirurgical après bilan radiologique complémentaire (arthroscanner, IRM).

Lorsque la gêne est liée à une calcification, on peut envisager l'aspiration de la calcification sous contrôle radiologique et anesthésie locale.

**D'une façon générale la rééducation n'est pas utile en phase douloureuse.** Sa meilleure indication concerne les formes chroniques. Elle consiste à apprendre au patient comment mobiliser l'épaule pour éviter l'accrochage du tendon : 15 séances de rééducation avec exercices de décoaptation.

### Épicondylite

#### Formes mineures

Contre la douleur intermittente, avec gêne modérée, on peut essayer pendant quelques semaines le repos relatif (éviter les mouvements de pronosupination, le port de charges coude fléchi), l'application

locale 2 à 3 fois/j d'un gel **AINS** (attention aux réactions cutanées).

#### Formes habituelles, invalidantes

##### Le traitement comporte :

- en plus du repos (arrêt de l'activité sportive dédénchantante, modification du matériel ou du geste : cf. ci-après, Tennis elbow) et de l'application éventuelle d'un gel **AINS** ;
- soit un traitement **AINS** par voie générale, souvent pendant plusieurs semaines, s'il s'avère efficace ce qui n'est pas constant ;
- soit, et plus volontiers, un traitement local par infiltration de **corticoïdes**, à condition d'obtenir un résultat favorable.

#### Formes chroniques et invalidantes

Un traitement chirurgical peut être envisagé, après analyse attentive du cas, appréciation de la gêne réelle et imagerie complémentaire (IRM). Le geste consiste en général en la désinsertion des muscles épicondylaires.

En pratique, l'intervention chirurgicale est exceptionnellement indiquée dans une pathologie qui finit habituellement par guérir en 6 mois à 2 ans.

### Tennis elbow

Il existe des facteurs favorisant :

- le changement trop rapide de modèle de raquette ;
- certaines raquettes lourdes en tête, trop tendues (> 25 kg), avec un tamis trop petit,
- un manche trop fin ;
- certains mouvements : lift de revers, arrêt trop brusque du geste lors de la frappe ;
- une frappe de balle décentrée, en particulier vers le haut ;
- les balles trop dures.

Il en résulte un excès de vibrations nocives, ce qui déclenche un réflexe de serrage et de préhension violente du manche, d'autant plus fort et plus durable que le grip est petit, et entraîne de ce fait une contracture des muscles épicondylaires et épitrochléens.

Le port d'une coudière, d'un bracelet voire d'une orthèse « anti-épicondylite » semble utile à certains patients.

## TENDINITES ET TENDINOPATHIES (4) – TENDINITES DU MEMBRE INFÉRIEUR

### Périarthrite de hanche (ou ténobursite trochantérienne, ou tendinite du moyen fessier)

#### Formes habituelles

Le traitement comportera en plus du ménagement physique :

- soit un traitement AINS par voie générale, souvent pendant plusieurs semaines ;
- soit un traitement local par infiltration de **corticoïdes**, dont le résultat est souvent plus rapide et plus brillant.

Le produit sera injecté aux points les plus douloureux, en général au contact des versants supérieur et postérieur du grand trochanter, seul ou mélangé à 2 ou 3 mL de **lidocaïne (XYLOCAïne à 1 %)**, s'il n'y a pas de contre-indication.

#### Formes traînantes, avec bursite

L'injection pourra être guidée sous échographie.

#### Tendinite patellaire

Fréquente chez le sportif, cette ténopériostite de la pointe de la rotule est justiciable de la mise au repos, d'un traitement médicamenteux, d'une physiothérapie. Il est préférable d'éviter, ou de retarder, l'indication d'une infiltration au contact de la pointe de la rotule (risque de rupture) ; dans ce cas, le repos est indispensable.

#### Tendinite de la patte d'oie

Lorsque le traitement local est choisi, l'injection se fera avec une aiguille fine, au contact du point le plus douloureux de la patte d'oie, ou dans la bourse péri-tendineuse en cas de bursite associée.

#### Tendinites achilléennes

##### Tendinites achilléennes d'insertion

Elles se traduisent par une douleur et un empatement du tendon à sa terminaison. Elles surviennent surtout chez les sportifs, parfois chez un goutteux ou après traitement antibiotique par une **fluoroquinolone**, qui doit être arrêtée.

Le traitement associe le repos (le port de bottillons, d'une petite talonnette, peut être utile), les **antalgiques** et **AINS** selon les

modalités habituelles. Les récides ne sont pas exceptionnelles.

Il est préférable d'éviter les infiltrations de **corticoïdes** au contact du tendon, qui peuvent avoir un effet favorable, mais qui ont été accusées par certains auteurs de favoriser les ruptures tendineuses.

Chez le sportif, diverses méthodes complémentaires sont proposées : ration hydrique importante (2 L au minimum), réduction de l'apport protidique ; semelle thermoformée ; ultrasons ; strapping puis rééducation avec massage transverse profond, étirements du tendon, stretching et réentraînement, etc. Dans les formes rebelles à un traitement bien conduit et longtemps prolongé, un « peignage chirurgical » du tendon peut parfois être envisagé, qui provoque un épaississement cicatriciel indolore du tendon.

##### Tendinites achilléennes nodulaires

Variété particulière où existe, au-dessus et à plus de 2 cm de l'insertion, un nodule palpable, douloureux, qui constitue le foyer cicatriciel d'une rupture partielle limitée.

Les infiltrations sont formellement contre-indiquées. Le traitement reste classique par ailleurs.

Dans les formes rebelles et invalidantes, il est possible d'immobiliser le tendon dans une botte de marche en résine, pendant 6 sem.

##### Ténobursites pré-achilléennes

Elles surviennent plus souvent dans les rhumatismes inflammatoires et peuvent être révélatrices (spondylarthropathies plus que polyarthrite rhumatoïde). Le traitement est celui du rhumatisme en cause, mais un traitement local peut être utilement associé.

##### Ténobursites superficielles rétro-achilléennes

Elles sont dues au frottement du contrefort des chaussures et justifient un repos, le port de chaussures bien adaptées, un gel **AINS** localement, et plus rarement un bref traitement AINS ou 1 à 2 infiltrations de **corticoïdes** au contact.

Parfois, il existe en plus une déformation de la tubérosité postérieure du calcaneum (maladie de Haglund) qui peut nécessiter une résection chirurgicale.

## TALALGIE (ÉPINE CALCANÉENNE) – MYOAPONÉVROSITE PLANTAIRE

La myoaponévrosite plantaire ou talalgie plantaire (ou épine calcanéenne, talonade) est caractérisée cliniquement par une douleur plantaire sous-calcanéenne, survenant lors de la mise en charge.

Elle est le plus souvent d'origine micro-traumatique par sollicitation excessive, mais parfois en relation avec une spondyloarthropathie.

### Traitement

- Repos relatif.
- Port d'une talonnette amortissante (*VISCOGIB* ou *VISCOHEEL*, non remboursées), ou d'une simple talonnette mousse évidée au contact du point le plus douloureux.
- Traitement AINS classique.
- Ou série de 1 à 3 infiltrations locales d'un **corticoïde** au contact. On repère le point le plus douloureux par pression de la face plantaire et de la face interne ; l'aiguille est enfoncée au point douloureux interne, perpendiculairement à la peau, en direction du point douloureux plantaire.

Le produit est utilisé seul ou associé à 2 ou 3 mL de **lidocaïne** (**XYLOCAÏNE** à 1 %). Certains préfèrent faire auparavant une anesthésie du nerf tibial postérieur dans la gouttière rétromalléolaire interne.

En cas d'échec d'une 1<sup>re</sup> infiltration, il est légitime d'en envisager une 2<sup>e</sup> sous contrôle échographique.

### Évolution

- Il n'est pas rare que les symptômes soient rebelles au traitement ; dans ce cas il faut éviter de multiplier les infiltrations, prescrire les médicaments à la dose minimale active, insister sur le port d'une talonnette, et patienter.
- Lorsqu'il existe une « épine calcanéenne » sur les radiographies, il faut expliquer au patient qu'elle n'est nullement la cause des douleurs, mais la conséquence des sollicitations myotendineuses et de la réaction inflammatoire. De ce fait, l'excès chirurgical de l'épine est bien entendu à proscrire.



## TÉNO-SYNOVITES

### Ténosynovites simples (exsudatives ou crépitanes)

Ce sont des atteintes inflammatoires des tendons et de leurs gaines synoviales. Il faut toujours écarter les ténosynovites infectieuses par porte d'entrée locale, infection génitale, voire tuberculose.

Elles atteignent :

- les extenseurs des doigts à la face dorsale du carpe ;
- les radiaux : « aï crépitan » au tiers inférieur de la face dorsale de l'avant-bras ;
- les fléchisseurs des doigts, avec ou sans syndrome du canal carpien (cf. Syndrome du canal carpien) ;
- les fibulaires, le jambier antérieur, les extenseurs des orteils.

Les ténosynovites réagissent habituellement à la mise au repos, à un traitement AINS par voie générale.

Dans les cas rebelles, ou en cas de contre-indication des **AINS**, une série de 1 à 3 infiltrations de **corticoïdes** est justifiée et efficace.

### Ténosynovite sténosante de De Quervain

Elle intéresse les tendons jumelés du long abducteur et du court extenseur du pouce : à la face externe du poignet le long de la styloïde radiale où l'on palpe une zone douloureuse et parfois une tuméfaction dure qui paraît collée à l'os.

**Son traitement est d'abord médical :**

- soit injection locale d'un **dérivé corticoïde** le long ou si possible dans la gaine (1 à 3 inj. à 10-15 j d'intervalle pour une série) ;

- soit **AINS** par voie générale et locale en gel ;

– l'immobilisation du pouce, par un simple bandage immobilisant le pouce, voire par une orthèse du commerce, ou en matériau thermoplastique, laissant libre l'interphalangienne du pouce.

**Dans les formes rebelles**, on peut avoir recours à la chirurgie : résection de la gaine des tendons.

### Ténosynovite nodulaire

Elle est également dénommée « **doigt à ressaut** » ou « à ressort ».

Sur le tendon du fléchisseur profond d'un doigt, au niveau de la métacarpophalangienne surtout, peut se développer un nodule. Celui-ci, pendant son passage dans la coulisse ostéofibreuse, entraîne lors de l'extension du doigt un ressaut douloureux ou un blocage en position de flexion ; le patient doit alors s'aider de l'autre main pour étendre son doigt.

Volontiers d'origine microtraumatique, on la rencontre aussi au cours des rhumatismes inflammatoires.

L'utilisation d'un gel **AINS** est rarement suffisante, en dehors des formes mineures et récentes.

1 à 2 injections locales d'une petite dose d'un **dérivé corticoïde** (de 0,5 à 1 mL) donnent habituellement un bon résultat.

En cas d'échec et de gêne fonctionnelle importante, ce qui est rare, ou de récurrences fréquentes, le traitement chirurgical est simple et efficace : section de la gaine fibreuse.

## SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Les manifestations cliniques sont liées à la souffrance du nerf médian dans son trajet au niveau du poignet.

- Accès de paresthésies et d'engourdissement des doigts (respectant en général le 5<sup>e</sup> doigt), accompagnés de douleurs très vives pouvant irradier à l'avant-bras, voire au bras.
- Manifestations souvent bilatérales avec recrudescence nocturne, fréquemment génératrice d'insomnie, et au réveil, avec impression de gonflement des doigts, et lors de la répétition de certains travaux (couture, tricot, repassage, tenue d'un livre, etc.).

Il est important pour le traitement de s'assurer de l'absence de déficit moteur du court abducteur et de l'opposant du pouce. Dans les formes prolongées, on peut constater une atrophie des muscles de la partie supéro-externe de l'éminence thénar, rarement réversible.

Le diagnostic est essentiellement clinique ; il est exceptionnellement nécessaire en pratique courante de demander un EMG.

### Étiologies

Les étiologies de ce syndrome sont nombreuses et utiles à définir pour certaines formes pouvant bénéficier d'un traitement plus spécifique.

- Très souvent il survient pendant ou après la ménopause sans que l'on ne décèle d'autre facteur favorisante.
- Chez la femme jeune il peut être dû à une polyarthrite rhumatoïde, une ténosynovite non spécifique des fléchisseurs des doigts.
- Il se voit aussi au cours ou au décours de la grossesse, dans l'hypothyroïdie, dans l'amylose (primitive, ou du myélome, ou de l'insuffisant rénal chronique en hémodialyse) ou après des traumatismes du poignet ayant modifié l'anatomie osseuse du canal carpien.
- Il peut être d'origine professionnelle, microtraumatique (surmenage des fléchisseurs, justifiant leur mise au repos).

**L'évolution est souvent longue**, un an ou beaucoup plus, mais se fait par ondes évolutives, et les symptômes sont intermittents et d'intensité très variable.

### Traitement symptomatique

Il n'y a pas de traitement médicamenteux efficace par voie générale, sauf parfois les AINS en particulier en cas de ténosynovite.

**Dans les formes mineures** ou simplement paresthésiantes, l'abstention est possible.

**Dans les formes douloureuses habituelles** : le traitement le plus efficace consiste en une série de 1 à 3 infiltrations de corticoïdes dans le canal carpien, à 2 sem. ou plus d'intervalle, au moment d'une poussée douloureuse : 1/2 à 1 ampoule-seringue, soit de cortivazol (**ALTIM**), soit de bétaméthasone (**DIPROSTÈNE**), etc. L'injection doit se faire sans résistance.

**Dans la forme bilatérale** : on injectera le produit, soit du côté le plus douloureux en appréciant le résultat sur les 2 côtés à la consultation suivante, soit des 2 côtés, en fractionnant la dose en 2.

Ce traitement peut être renouvelé 1 ou 2 fois dans l'année, en se fixant une limite, arbitraire : pas plus de 6 doses pour 12 mois consécutifs. Au-delà il est préférable de choisir une solution chirurgicale.

### Traitement étiologique

Il est rarement suffisant : mise au repos dans les formes microtraumatiques, correction d'une hypothyroïdie, etc.

### Traitement chirurgical

Il n'est qu'exceptionnellement indiqué (5 % des cas environ), sauf cas particuliers : en cas d'échec des infiltrations ou de récurrences trop fréquentes, en cas de déficit sensitif durable ou moteur décelé cliniquement, et de préférence avant l'apparition d'une amyotrophie. Dans ces cas, une confirmation électrique (EMG) est souvent demandée par le chirurgien, dans un but médico-légal, ainsi qu'une radiographie en incidence « canal carpien » pour mettre en évidence une éventuelle anomalie osseuse. Le geste chirurgical consiste en une section du ligament annulaire du carpe, qui libère le nerf médian.

C'est un geste simple, qui peut se faire par abord chirurgical classique ou par voie endoscopique, par un chirurgien entraîné à ces techniques pour ne pas léser le rameau thénarien du médian.

Il peut se faire en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale ; les suites sont courtes et les résultats sont habituellement très favorables.

## SYNDROME DU TUNNEL MÉTATARSIE (MALADIE DE MORTON)

Les symptômes traduisent la compression du nerf digital, dans le tunnel métatarsien, entre la tête des métatarsiens des 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> espaces : douleur aiguë, en coup de poignard, ou douleurs lancinantes, de siège plantaire antérieur, survenant à la marche et à l'appui antérieur ; paresthésies, et parfois, à l'examen, hypoesthésie en feuillets de livre ; réveil de la douleur par la pression dorsale de l'espace intermétatarsien, ou la flexion dorsale d'un orteil.

Les étiologies sont essentiellement micro-traumatiques, favorisées par le port de chaussures trop serrées ou de talons trop hauts, conditions qu'il faudra corriger pour éviter les récives.

### Traitement orthopédique

- Il est toujours utile et parfois suffisant.
- Correction de l'appui défectueux ou traumatisant.

- Port d'une *semelle de décharge avec appui rétrocapital mousse*.

### Traitement symptomatique

- Essentiellement infiltration de **corticoïde** dans l'espace intercapito-métatarsien douloureux, par voie dorsale, comme pour les autres syndromes canauxaires.
- On peut ajouter 1 mL de **lidocaïne (XYLOCAÏNE 1 %)** dans l'ampoule-seringue de **corticoïde**, pour une plus grande diffusion locale du produit.

### Traitement chirurgical

Neurolyse, en cas d'échec des méthodes précédentes, de préférence après confirmation du diagnostic par une imagerie : échographie par un opérateur entraîné, voire IRM qui peut montrer un névrome ou une bursite.

## BURSITES ET HYGROMAS

On appelle **bursite** l'inflammation d'une bourse séreuse, généralement située autour d'une articulation. L'**hygroma** est une variété de bursite caractérisée par son enkystement.

L'inflammation peut être d'origine traumatique ou microtraumatique locale, d'origine rhumatismale (goutte, dépôts calcaires, etc.), mais **parfois d'origine infectieuse** et cette hypothèse doit toujours être évoquée.

Les **localisations les plus fréquentes** sont le coude (bursite rétro-olécrânienne) ; le genou (hygroma prérotulien) ; puis le talon (bursite rétroachilléenne par frottement, et bursite préachilléenne au cours des rhumatismes inflammatoires ; la hanche (bursite du psoas, ténobursite trochantérienne) ; l'épaule (bursite sous acromio-deltôïdienne).

**Le traitement est avant tout médical et local.**

- **Ponction** des bursites superficielles avec analyse du liquide, s'il n'est pas clair, pour écarter une origine infectieuse (culture).
- **Injection locale** d'un dérivé **corticoïde** comme pour une infiltration articulaire : 1 ampoule de **bétaméthasone (DIPROSTÈNE)**, ou de **cortivazol (ALTIM)**, etc. qui pourra être renouvelée 10 à 20 j après.
- Ou cure courte d'un **AINS**.

Lorsqu'on a un doute sur une éventuelle infection, il faut s'abstenir d'injecter un **corticoïde** et, en attendant le résultat de la culture du liquide, prescrire un **AINS**.

- En cas d'infection, antibiothérapie adaptée au germe, parfois suivie d'exérèse chirurgicale.

**L'exérèse chirurgicale d'un hygroma** peut être nécessaire en cas d'échec du traitement médical, de récurrence fréquente ou de gêne fonctionnelle après guérison de l'inflammation locale.

## KYSTES SYNOVIAUX

Les kystes synoviaux sont le plus souvent l'expression d'une pathologie articulaire sous-jacente (dégénérative ou inflammatoire) dont le traitement ne doit pas être négligé.

Ils siègent le plus souvent au genou (kyste poplité surtout, et plus rarement kyste méniscal), au poignet, au dos du pied, à l'épaule ou à la hanche.

### Kyste poplité

Le kyste poplité siège à la face postérieure du genou, et il peut être palpé lorsqu'il est volumineux. Il est habituellement secondaire à une gonarthrose, à une arthrite en particulier rhumatoïde, ou à une autre pathologie articulaire, dont le traitement parallèle est important.

Cliniquement, en plus de la gêne douloureuse postérieure qu'il peut entraîner, il faut connaître les tableaux aigus, simulant une thrombophlébite par compression veineuse ou par rupture du kyste.

Son diagnostic est facilité par une échographie de qualité, avec Doppler qui écarte une lésion vasculaire.

**Lorsque le kyste communique manifestement** avec la cavité articulaire, gonflée par l'épanchement provoqué par une gonarthrose ou une arthrite, l'injection d'un **corticoïde** dans la cavité articulaire après ponction évacuatrice peut suffire à guérir la poussée douloureuse due au kyste.

**Dans les formes peu invalidantes** le repos, la prescription d'une cure courte d'un **AINS**, comme dans la gonarthrose, peut suffire.

**Dans les formes plus invalidantes** l'évacuation du kyste, par un opérateur entraîné, se justifie, avec une aiguille de calibre 18G si l'on pense que son contenu est gélatineux, ou une aiguille plus fine (21G) si l'on pense que le contenu est fluide.

Ce geste est suivi de l'injection d'un dérivé cortisonique dans le kyste : 1 ampoule-

seringue de **cortivazol (ALTIM)**, ou de **béta-méthasone (DIPROSTÈNE)**, etc.

Ce geste pourra être renouvelé 1 à 2 fois après un intervalle de 2 à 4 sem., si le résultat est insuffisant ou en cas de récurrence plus tardive.

**Dans les formes récidivantes**, le traitement de la pathologie articulaire sous-jacente est nécessaire. Une synoviorthèse (avec un produit radioactif) peut être discutée et faite en milieu spécialisé.

**Le traitement chirurgical** est exceptionnellement indiqué car les traitements précédents sont habituellement suffisants.

### Kyste synovial du poignet

Le kyste siège habituellement à la face dorsale du poignet ; son volume est très variable. Certains peuvent régresser spontanément, mais lorsqu'ils entraînent une gêne fonctionnelle ou esthétique ils relèvent des traitements suivants.

#### Ponction-aspiration

Elle représente le geste thérapeutique le plus simple :

- ponction avec une aiguille de calibre 18G, et aspiration de la gelée translucide qui le remplit ;
- suivie d'une compression forte pendant quelques minutes, et d'un pansement compressif pendant quelques jours.

En cas de récurrence on peut renouveler le geste, et y associer l'injection d'une petite quantité d'un dérivé **corticoïde** : **cortivazol (ALTIM)**, ou **prednisolone (HYDROCORTAN-CYL)**, etc.

#### Exérèse chirurgicale

En cas de récurrence trop fréquente et de gêne réelle, il est préférable de recourir alors à l'exérèse chirurgicale qui se fait sous anesthésie loco-régionale,

Elle nécessite l'excision complète du kyste et de sa base d'implantation et d'une partie de la capsule articulaire, ce qui peut laisser une cicatrice importante, dont il faut tenir compte dans la décision.

## RÉTRACTION CAPSULAIRE – CAPSULITE RÉTRACTILE DE L'ÉPAULE

### Étiologie

La rétraction capsulaire de l'épaule, qui ne fait que très rarement partie d'un syndrome épaule-main, est le plus souvent idiopathique, parfois post-traumatique ou iatrogène (**barbituriques**, **isoniazide**, **antirétroviraux**, etc.), mais peut quelquefois être associée à une affection cardiovasculaire (insuffisance coronaire), neurologique (hémiplegie), ou pulmonaire.

### Évolution

Le traitement doit absolument tenir compte du stade évolutif.

#### En effet deux phases se succèdent :

– *d'abord une phase douloureuse*, pseudo-inflammatoire, avec une douleur qui peut avoir une recrudescence nocturne, en particulier dans le décubitus homolatéral, qui dure 4 à 6 mois ; l'affection ayant un début progressif, elle est souvent confondue au début avec une « périarthrite » ; c'est la constatation d'une raideur trop importante et touchant tous les mouvements de l'épaule qui fait redresser le diagnostic ;

– *puis une phase de raideur*. Pendant cette phase la raideur prédomine sur la douleur, qui n'apparaît le plus souvent qu'aux mouvements extrêmes et brusques.

**L'évolution se fait pratiquement toujours vers la guérison complète**, même spontanément, mais en 12 à 18 mois en moyenne.

### Traitement

#### Pendant la phase douloureuse initiale

Le traitement comporte :

- les **antalgiques** à posologie suffisante ;
- les **AINS**, en particulier au début, avec les précautions d'usage ;
- ou les infiltrations locales de **corticoïdes**, qui donnent de bons résultats mais seulement sur la douleur, en particulier celle du décubitus homolatéral. 1 à 4 injections de **cortivazol (ALTIM)** ou de **bétaméthasone (DIPROSTÈNE)**, à 2 ou 4 sem. d'intervalle, aident à atteindre la seconde phase évolutive.

La masso-kinésithérapie, systématique et prudente pour certains, semble ne pas être utile à ce stade. Elle ne raccourcit pas l'évolution et est trop souvent source de douleurs.

Certains pratiquent une distension synoviale de l'épaule après arthrographie, injection locale d'**anesthésique** et de **corticoïde**, suivie d'une rééducation intensive, et estiment raccourcir l'évolution. Ce choix, à la phase intermédiaire de l'évolution, dépend de l'importance de la gêne fonctionnelle.

#### À la phase de raideur par rétraction capsulaire

Le traitement médicamenteux peut être allégé : **antalgiques** à dose suffisante.

La rééducation, douce et progressive, peut être entreprise, mais le sujet peut la réaliser lui-même activement.

## FIBROMYALGIE – SYNDROME POLYALGIQUE IDIOPATHIQUE DIFFUS

La fibromyalgie, ou fibrosite, ou syndrome polyalgique idiopathique diffus (**SPID**), correspond à un syndrome, exclusivement clinique, fait de douleurs chroniques retrouvées à la pression de nombreuses insertions musculo-tendineuses (bilatérales et symétriques), et d'une fatigue musculaire, habituellement chez des femmes jeunes.

### Étiologie

Son étiologie n'est pas connue, et sa pathogénie, encore incertaine et ceci quels que soient les médiateurs biochimiques mis en évidence, fait essentiellement référence à une perturbation psychologique car on retrouve souvent un état anxiodépresseur et des conditions de stress psychologique.

### Traitement

Son objectif est l'amélioration de la qualité de vie.

Les recommandations de l'Eular (publiées en 2008 [1]) mettent en 1<sup>er</sup> choix thérapeutique les approches non médicamenteuses avec un accent sur l'activité physique aérobie, les thérapies cognitives et comportementales et les approches associant plusieurs composantes (physiques et psychologiques). Elles insistent sur les **molécules à ne pas utiliser** telles que : les **AINS**, la corticothérapie, les **benzodiazépines**, et les **opioïdes forts**.

### Psychothérapie

Elle commence par une écoute attentive et patiente de la plainte et de ses facteurs de survenue et d'entretien. Elle est très importante dans la prise en charge des patientes, qu'il faut rassurer sur la « bénignité » de leur cas ; le « catastrophisme » ne ferait qu'aggraver la situation.

Des exercices de relaxation sont souvent bénéfiques.

### Activité physique

Elle n'est nullement contre-indiquée, mais doit être fractionnée pour ne pas aggraver les douleurs. Les techniques de réadaptation musculaire progressive à l'effort, de renforcement musculaire, pratiquées par la patiente, peuvent être utiles, et seront poursuivies en cas de réel bénéfice.

### Approche médicamenteuse

Elle apporte parfois 20 à 30 % d'efficacité, et fait appel surtout aux :

- **antidépresseurs tricycliques** dont certains ont fait preuve d'efficacité, et agissent en général après 2 à 4 sem. de prescription : **amitriptyline (LAROXYL)**, solution buvable, en flacon compte-gouttes de 20 mL (1 gte = 1 mg), ou cp. à 25 mg. On peut le prescrire à dose progressivement croissante, à partir de 10 mg/j, pour aboutir à une dose efficace proche de 25 mg/j, voire 50 mg/j. Il est possible de fractionner la dose, en donnant la dose la plus élevée le soir. La prescription doit être poursuivie plusieurs mois, à la dose minimale efficace, avant d'envisager une diminution ;
- **antidépresseurs, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA) : paroxétine (DEROXAT)** : 1 cp. séc. dosé à 20 mg/j. L'utilisation à long terme doit être régulièrement évaluée ;
- **anticonvulsivants** : **gabapentine (NEURONTIN)** et **prégabaline (LYRICA)** ;
- **antalgiques usuels**. Ils sont toujours utiles : **paracétamol** ou **aspirine**, à dose suffisante, alors que les **AINS** sont inefficaces et source d'effets secondaires.

Il faut toujours tenir compte des effets secondaires des médicaments, fréquents au cours de la fibromyalgie, qui semblent correspondre à une exacerbation des symptômes eux-mêmes (effet nocebo).

### CONSENSUS

[1] Recommandations pour la prise en charge de la fibromyalgie, Eular, 2008

## COCCYGODYNIE

### Définition

On désigne habituellement sous ce terme des douleurs localisées de la région coccygienne survenant presque exclusivement en position assise et au relèvement d'un siège, ayant comme caractéristique leur évolution souvent prolongée et rebelle. Les mécanismes les plus fréquemment évoqués sont, schématiquement, une luxation postérieure (sujet obèse), une hypermobilité (sujet maigre).

Une chute est fréquemment retrouvée, mais le coccyx se fracture rarement (contrairement au sacrum).

Il n'en demeure pas moins qu'il faut écarter par un examen rigoureux des causes exceptionnelles : radiculaires par kyste intrasacré, voire lésion de la queue de cheval ; tumeur rectale ou sacrococcygienne, qui relèvent d'un traitement spécifique. Des clichés de bonne qualité sont nécessaires initialement, qui ne seront répétés ou complétés par une exploration plus poussée (IRM, etc.) qu'en cas de forte suspicion d'organicité.

### Traitement

Les méthodes médicales sont le plus souvent utilisées et peuvent se compléter.

#### Dans tous les cas :

- les **antalgiques** à dose suffisante ;
- l'utilisation d'un coussin avec zone centrale évidée, pour diminuer l'appui sur la zone douloureuse ;
- il semble préférable d'éviter les **AINS**, dans cette pathologie volontiers chronique.

**Dans beaucoup de cas** : un traitement

- anxiolytique, voire une psychothérapie ou un traitement antidépresseur, sont utiles.
- Dans certains cas**, des traitements locaux :
- les infiltrations, de préférence sous contrôle radio, dans le tissu précoccygien voire le disque sacro-coccygien, d'anesthésique, ou de **corticoïdes** ou des 2 à la fois. Si la 1<sup>re</sup> inj. apporte un soulagement net, elle peut être renouvelée après quelques sem. ; il est préférable de s'en abstenir en cas d'inefficacité ;
  - les techniques manuelles par un médecin en ayant la pratique.

**Très rarement**, en cas d'échec de ces moyens thérapeutiques, certains ont proposé une intervention chirurgicale :

- soit résection coccygienne et du disque sacrococcygien ;
- soit résection du nerf coccygien et des cinquièmes racines sacrées.

C'est une solution extrême qui ne semble pas justifiée car le terrain névrosé expose souvent à un échec thérapeutique.



## INFECTIONS OSTÉOARTICULAIRES (1)

### Règles générales de l'antibiothérapie

#### Principes

La gravité potentielle des infections ostéoarticulaires, tant dans le domaine fonctionnel que parfois vital, fait que l'antibiothérapie doit obéir impérativement à plusieurs principes :

- être adaptée au germe en cause, ce qui suppose sa mise en évidence et la prise en compte de l'antibiogramme, ou à défaut être orientée par le contexte clinique ;
- avoir une bonne pénétration tissulaire, en particulier osseuse ;
- assurer une concentration tissulaire bactéricide.

#### Voie d'administration

Il convient en général de commencer le traitement par voie parentérale le plus souvent (sauf pour la tuberculose et certains antibiotiques), pendant environ 15 j, avant de prendre le relais par la voie orale, qui sera poursuivie plusieurs semaines.

En outre, il est indispensable de prendre en considération les problèmes de la voie d'abord veineuse, les risques propres à l'immobilisation prolongée, le confort du malade.

#### Associations

Il faut utiliser des associations synergiques d'antibiotiques et donner des doses initialement élevées, en fonction du poids du malade et de ses fonctions rénale et hépatique.

Il est de bonne règle de rechercher des facteurs favorisants, locaux ou généraux, témoins d'une diminution des défenses de l'organisme.

### Choix de l'antibiotique

#### Quand le germe a été isolé

À titre très schématisé, et d'après la conférence de consensus sur l'antibiothérapie des infections ostéoarticulaires, le traitement initial est résumé dans le tableau.

#### Lorsque le germe n'a pas été mis en évidence

Le contexte peut orienter :

- infection cutanée, infiltration de corticoïdes, prothèse articulaire : staphylocoque doré ;
- infection urinaire ou digestive : bacilles Gram négatif ;
- infection dentaire ou ORL : streptocoque ;
- infection génitale, sujet jeune (+ ténosynovite) : gonocoque ;
- pneumopathie : pneumocoque ;
- toxicomanie : staphylocoque doré, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia*, *Candida* ;
- sujets immuno-déprimés, hémopathies : pneumocoque, mycoses.

#### En l'absence d'orientation

Une fois la tuberculose exclue, on prescrit une antibiothérapie à large spectre couvrant à la fois les staphylocoques et les bacilles Gram négatifs, par exemple : **fluoroquinolone (ofloxacine) + aminoside (gentamicine)**. Cette association sera éventuellement modifiée si elle s'avérait inefficace, ou si un germe était ultérieurement mis en évidence, ou en fonction d'un antibiogramme.

### Modalités particulières

Certaines sont propres à une étiologie, ou à une localisation :

- arthrites septiques à germe banal ;
- arthrite à gonocoque ;
- spondylodiscites infectieuses ;
- tuberculoses ostéoarticulaires.

## INFECTIONS OSTÉOARTICULAIRES (2)

Staphylocoque doré ou à coagulase négative, méthi-sensible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pénicilline + aminoglycoside</b>, par exemple : <b>BRISTOPEN + GENTALLINE</b></li> <li>• Ou <b>céfazoline + aminoglycoside</b>, par exemple : <b>CÉFACIDAL + GENTALLINE</b></li> <li>• Ou <b>pénicilline M + rifampicine</b>, par exemple : <b>BRISTOPEN + RIFADINE</b></li> <li>• Ou <b>fluoroquinolone + rifampicine</b></li> </ul>
Staphylocoque doré ou à coagulase négative, méthi-résistant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vancomycine + acide fusidique (FUCIDINE)</b></li> <li>• Ou <b>céfotaxime + fosfomycine</b>, par exemple : <b>CLAFORAN + FOSFOCINE</b></li> </ul>
Entérocoque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amoxicilline + aminoglycoside</b>, par exemple : <b>CLAMOXYL + GENTALLINE</b></li> </ul>
Cocci Gram négatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amoxicilline (CLAMOXYL ou générique)</b></li> </ul>
Bacille Gram négatif (sauf <i>Pseudomonas</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération + aminoglycoside</b>, par exemple : <b>ROCÉPHINE + GENTALLINE</b></li> <li>• Ou <b>céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération + fluoroquinolone</b></li> </ul>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ceftazidime (FORTUM) + tobramycine (NEBCINE, TOBEX)</b></li> <li>• Ou <b>ticarcilline (TICARPEN) + tobramycine</b></li> </ul>
Gonocoque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pénicilline G en IV, ou amoxicilline</b></li> </ul>
<i>Borrelia burgdorferi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soit <b>doxycycline (VIBRAMYCINE N)</b> (200 mg/j), ou <b>amoxicilline (CLAMOXYL)</b> (2 g/j), pendant 4 sem.</li> <li>• Soit <b>pénicilline G</b> par voie veineuse (20 MU/j), ou <b>ceftriaxone (ROCÉPHINE)</b> (2 g/j), pendant 2 sem.</li> </ul>
Brucellose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cycline de 2<sup>e</sup> génération + rifampicine</b>, par exemple : <b>doxycycline + RIFADINE</b></li> </ul>
Tuberculose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 2 premiers mois triple (ou quadruple) association de <b>pyrazinamide (PIRILÈNE) + isoniazide (RIMIFON) + rifampicine (RIFADINE) éthambutol (MYAMBUTOL ou DEXAMBUTOL)</b></li> <li>• Puis bithérapie (en général <b>isoniazide + rifampicine</b>), pendant 9 mois au total, parfois jusqu'à 12 mois, en fonction de l'antibiogramme éventuel et de l'évolution</li> </ul>
<i>Candida</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amphotéricine B (FUNGIZONE)</b> et/ou <b>5-fluorcytosine (ANCOTIL)</b></li> <li>• <b>Fluconazole (TRIFLUCAN)</b></li> </ul>

## ARTHrites SEPTIQUES À GERMES BANALS

Le pronostic d'une arthrite infectieuse est directement influencé par la précocité du diagnostic et la rapidité de mise en œuvre d'une antibiothérapie efficace.

### Identification

Le diagnostic ne pose guère de problème dans un contexte de septicémie évidente. En revanche, il est plus difficile lorsque la symptomatologie survient au décours d'une infiltration intra-articulaire de **corticoides** ; ou en l'absence de porte d'entrée identifiée, ou encore devant une arthrite particulièrement inflammatoire et rebelle survenant au cours d'un rhumatisme déjà connu (polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, etc.).

### Ponction articulaire

Dans tous les cas, la ponction articulaire à visée diagnostique s'impose en urgence, permettant de soutirer un liquide le plus souvent purulent, très riche en polynucléaires neutrophiles altérés, devant faire l'objet d'une étude microbiologique, en vue de l'identification précise du germe causal et de la réalisation d'un antibiogramme.

### Autres méthodes

La recherche du germe responsable par d'autres méthodes est également recommandée : hémocultures, urocultures, prélèvements génitaux, prélèvements locaux, etc.

Une fois effectuée la ponction articulaire, ainsi que les autres prélèvements à visée bactériologique, le traitement antibiotique ne doit pas être retardé si les arguments cliniques et biologiques sont suffisamment évocateurs, en sachant que la mise en évidence du germe causal est parfois impossible.

### Antibiothérapie adaptée

Elle est commencée dès que la ponction articulaire a été faite.

### Choix de l'antibiothérapie

Voir antibiothérapie des infections ostéo-articulaires.

### Posologie, durée

- Des doses élevées sont nécessaires pour assurer une concentration tissulaire bactéricide.
- L'antibiothérapie sera prolongée par voie IV pendant au moins 15 j, avec relais possible par voie orale en cas d'efficacité démontrée et si la biodisponibilité est bonne.
- La durée de l'antibiothérapie est difficile à fixer, en général 6 à 8 sem., l'arrêt pouvant être envisagé 1 mois après l'obtention d'une apyrexie stable et d'une normalisation de la VS et de la CRP.
- Dans l'arthrite gonococcique, si le traitement est rapidement efficace, le traitement pourra être raccourci (10 j), du fait de la grande sensibilité habituelle du germe aux antibiotiques.

### Traitements complémentaires

#### Immobilisation de l'articulation

En position de fonction, par une gouttière ou un plâtre bivalve pour le genou (voire par traction pour la hanche), elle est également utile dans les premiers temps de la maladie, mais pas de façon prolongée, pour éviter une source de raideur supplémentaire.

#### Évacuation et lavage articulaire

Elle permet de réduire l'inoculum bactérien, de débarrasser l'articulation des substances pro-inflammatoires qu'elle contient et permet aussi de vérifier l'efficacité du traitement en analysant le liquide qui se stérilise et devient de plus en plus clair.

Elle est réalisée :

- par ponction simple ou ponction-lavage articulaire régulièrement répétées ;
- voire par arthroscopie ou même arthrotomie, en cas d'échec des ponctions ou de persistance du germe, ou parfois d'emblée quand les signes inflammatoires locaux sont particulièrement intenses.

#### Synovectomie chirurgicale

Très rarement utilisée actuellement, elle est réservée aux formes trainantes malgré le traitement médical. Dans certains cas, elle peut être remplacée par une **synoviorthèse isotopique**.

## SPONDYLODISCITES INFECTIEUSES

Comme pour une arthrite bactérienne, le pronostic est influencé par la précocité du diagnostic et la rapidité de mise en œuvre d'une antibiothérapie efficace.

### Identification

Il est assez fréquent que l'agent responsable de la spondylodiscite ne puisse pas être identifié, quels que soient les moyens mis en œuvre :

- hémocultures, urocultures, prélèvements génitaux, prélèvements locaux ;
- sérodiagnostics de brucellose, de salmonellose ;
- tests tuberculiniques, recherche d'autres localisations tuberculeuses ;
- ponction-biopsie disco-vertébrale radioguidée en milieu spécialisé, à l'aiguille ou au trocart, avec cultures et examen histologique ;
- voire intervention chirurgicale, à visée diagnostique.

On conçoit ainsi les difficultés thérapeutiques qui peuvent surgir, suivant les cas de figure :

- tantôt un diagnostic est affirmé : tuberculose, brucellose, salmonellose, ou isolement d'un pyogène : staphylocoque, entérocoque ; le traitement adapté peut être entrepris sans retard ;
- ailleurs, les étiologies précédentes, en particulier la tuberculose, n'ont pas été prouvées, aucun germe n'a été isolé (parfois du fait d'une antibiothérapie préalable à doses insuffisantes). Il faudra alors déterminer un diagnostic probabiliste et recourir à une association d'antibiotiques au pouvoir bactéricide puissant.

### Antibiothérapie adaptée

#### Choix de l'antibiothérapie

Cf. Infections ostéoarticulaires.

#### Posologie, durée

- Doses élevées, pour assurer une concentration tissulaire bactéricide.

- L'antibiothérapie sera prolongée par voie IV pendant au moins 15 j, avec relais possible par voie orale en cas d'efficacité démontrée et si la biodisponibilité est bonne.

- La durée de l'antibiothérapie est difficile à fixer, en général 3 à 4 mois (9 à 12 mois en cas de tuberculose), l'arrêt pouvant être envisagé après disparition des douleurs, 1 mois après l'obtention d'une apyrexie stable et d'une normalisation de la VS et de la CRP.

### Traitements complémentaires

#### Immobilisation

Le repos au lit est indispensable au début. Le port d'une minerve, ou au minimum d'un collier cervical, est le plus souvent justifié pour le rachis cervical.

Pour le rachis dorsal ou lombaire, on utilise habituellement un système de contention confectionné sur mesure, en matériau thermo-moulable. Une telle immobilisation n'est cependant pas toujours nécessaire. Une fois décidée, sa durée est jugée au cas par cas, surtout fonction de l'importance des lésions vertébrales et de leur instabilité.

#### Indications chirurgicales

Elles sont assez rares dans l'ensemble, limitées aux cas s'accompagnant d'abcès volumineux et compressifs, non ponctionnables et non contrôlés par une antibiothérapie efficace, ou en cas d'échec du traitement médical.

#### Surveillance

Elle doit être attentive :

- recherche d'abcès ;
- recherche de complications neurologiques ;
- tolérance du traitement.

## OSTÉOMYÉLITE AIGÜE

### Définition

C'est une infection aiguë de l'os par un agent bactérien, principalement représenté par le staphylocoque doré.

Elle survient habituellement chez le jeune enfant ou l'adolescent ; elle débute à la métaphyse d'un os long, le plus souvent près du genou.

Le diagnostic évoqué cliniquement sera confirmé en **urgence** par l'imagerie, radiographie standard et surtout IRM, très sensible.

Tout doit être mis en œuvre pour isoler le germe en cause (hémocultures, recherche des portes d'entrée possibles, ponction d'un abcès sous-périosté, voire ponction métaphysaire). Le plus souvent, mais pas systématiquement, il s'agit d'un staphylocoque doré.

Il est de règle de rechercher des facteurs favorisants (drépanocytose pour les infections à salmonelles, immunodéficience, diabète, etc.).

Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique, qui doit permettre d'éviter l'extension aux articulations de voisinage, grave, et l'évolution vers l'ostéite chronique, marquée par la succession de périodes de réactivation bactérienne.

### Traitement

#### Antibiothérapie adaptée

Comme pour les infections ostéoarticulaires :

- association de 2 antibiotiques à forte pénétration osseuse ;
- à visée antistaphylococcique initiale ;
- à forte dose et par voie parentérale les 8 à 10 premiers j ;
- avec relais par voie orale en cas d'efficacité démontrée et si la biodisponibilité est bonne, pendant 6 à 8 sem. ;
- l'arrêt du traitement antibiotique pouvant être envisagé après guérison clinique et normalisation durable de la VS et de la CRP.

#### Immobilisation stricte

Immobilisation du membre et des articulations sus et sous-jacentes, dans un plâtre fenêtré ou en bivalve, de durée aussi courte que possible, en fonction de l'amélioration clinique.

#### Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical n'a qu'une place restreinte :

- évacuation par ponction d'une collection sous-périostée ;
- et en tout cas, sur un os en pleine croissance, le geste doit toujours être limité.

## ALGODYSTROPHIE RÉFLEXE

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC), dénomination actuelle de l'algodystrophie réflexe (ADR) est une affection douloureuse neuropathique chronique. Sa physiopathogénie étant encore mal connue, son traitement reste difficile ; il est surtout fonction du stade évolutif de la maladie et de son intensité, parfois de l'étiologie qui a pu être mise en évidence. La prise en charge doit intégrer pleinement le patient.

Les symptômes ont habituellement une évolution cyclique s'étendant sur plusieurs mois. La main et l'épaule, le pied et le genou, sont fréquemment touchés.

À la phase « chaude », il existe des signes vasomoteurs d'allure inflammatoire avec une impotence douloureuse importante.

À la phase « froide », ce sont les troubles trophiques qui dominent, avec raideur articulaire.

Le pronostic est généralement favorable en l'espace de quelques mois (jusqu'à 12 ou 18 mois) et le malade doit être averti de ce délai. Des séquelles sous forme de raideur et de douleurs sont possibles.

### Étiologies connues

- Traumatisme ou agression d'un membre.
- Affection neurologique (hémiplégie), cardiaque (coronarienne, infarctus du myocarde), pleuropulmonaire, etc.
- Au cours d'un traitement médicamenteux (**isoniazide**, **phénobarbital**).
- Parfois pendant la grossesse, à la hanche.
- Dans 1/4 des cas aucune cause n'est retrouvée, hormis un terrain fait de « dystonie neurovégétative ».

### Traitement

#### Formes habituelles et mineures

La mise au repos relatif, sans appareil plâtre, est nécessaire au début, pendant la période douloureuse. Toutefois il faut encourager l'utilisation « normale » du membre et la *kinésithérapie*, à laquelle on peut associer les moyens de la médecine dite physique (*bains écossais* en phase chaude ; ultrasons, ionisations calciques, diathermie, etc.), et qui ne doit pas être traumatisante.

La *masso-kinésithérapie* représente l'essentiel de la thérapeutique à la 2<sup>e</sup> phase (stade de rétractions tendineuses et capsulaires).

Les **antalgiques**, à dose suffisante, représentent un complément utile : **aspirine**, ou **paracétamol** : 1,5 à 3 g/j, ou **associations antalgiques**.

Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** sont rarement indiqués, malgré l'allure pseudo-inflammatoire des manifestations. Les **corticoïdes** par voie orale sont parfois utilisés à la phase oedémateuse. Par voie locale, l'infiltration de **corticoïdes** peut aider à passer un cap douloureux ; cela ne constitue qu'un traitement d'appoint dans les syndromes canalaux associés.

La *psychothérapie élémentaire* est très importante chez les malades anxieux et qui souffrent réellement. Il faut les rassurer, les encourager.

*En cas de syndrome algodystrophique iatrogène :*

- la poursuite du traitement par **GARDÉNAL**, lorsque son remplacement n'est pas possible, n'empêche pas l'évolution favorable ;
- il en est de même pour l'**isoniazide** ; cependant l'**éthionamide** associée à l'**isoniazide** doit être supprimée.

#### Formes rebelles ou sévères

On peut s'adresser, et de préférence en milieu spécialisé :

- soit à la prescription de **biphosphonates** en perfusion, qui ont fait la preuve de leur efficacité sur la douleur ; mais le dosage optimal, la fréquence et la durée ne sont pas établis ;
- soit à la pratique de « blocs anesthésiques », sympathiques veineux ou ganglionnaires (ganglion stellaire) ;
- à la phase séquellaire « froide », dans les grandes raideurs articulaires, certains utilisent la mobilisation sous anesthésie locale qui peut être utile (main).

#### Prévention

Certaines études ont attiré l'attention sur l'intérêt préventif, à l'occasion d'une fracture du poignet, de la prescription de vitamine C.

## MALADIE DE PAGET (1)

En raison de la très grande fréquence des formes asymptomatiques de cette dystrophie osseuse bénigne, le médecin doit se poser les 3 questions suivantes : quelles sont les formes qui justifient un traitement ? Comment en apprécier l'efficacité ? Quel produit employer ?

### Quelles formes est-il utile de traiter médicalement ?

**Certaines formes constituent une indication formelle :**

- manifestations neurologiques : céphalées, surdité, compression médullaire lente ;
- douleurs osseuses indiscutablement liées à une poussée évolutive, avec douleur exquise, augmentation de la chaleur locale et léger gonflement, sur le tibia, ou le fémur ;
- fissures pagétiques au sommet de l'incurvation d'un os long.

**D'autres ne justifient pas de traitement freinateur :**

- formes asymptomatiques de découverte fortuite ;
- formes paucisegmentaires ;
- formes biologiquement peu actives.

**Entre ces 2 catégories :** il existe des formes où le traitement est utile ou possible, en raison des risques que font encourir certaines conditions. Ces risques et le bénéfice escompté doivent être appréciés cas par cas. Il s'agit :

- d'une localisation osseuse particulière : atteinte du rocher (surdité), impression basilaire, rachis dorsal (compression neurologique), incurvations diaphysaires ;
- d'une grande extension squelettique, appréciée par scintigraphie osseuse, et/ou

une forte évolutivité biologique : des chiffres de phosphatases alcalines supérieurs à 4 fois la normale, en constituent des indices suffisants pour justifier un traitement freinateur ;

- des manifestations cardiovasculaires formellement rattachées à la maladie, ce qui est rare ;
- d'une immobilisation prolongée, qui expose à une hypercalcémie ;
- d'une intervention chirurgicale sur un os pagétique, ce qui contribue à diminuer le saignement peropératoire.

### Comment en apprécier l'efficacité ?

**Par l'analyse clinique :** diminution des douleurs authentiquement pagétiques, à bien différencier des douleurs arthrosiques associées ; régression de signes neurologiques parfois.

**Par la radiographie :** surveillance des lésions **ostéolytiques** qui se recalcifient. Mais les clichés ne doivent pas être répétés avant plusieurs mois, et la scintigraphie ne constitue pas un élément de surveillance.

**Par la biologie :** dosage des phosphatases alcalines, essentiellement, réalisé par le même laboratoire.

### Quel produit employer ?

La relativement bonne tolérance des **biphosphonates** en fait le traitement de choix ; ils inhibent d'une part l'activité ostéoclastique et d'autre part la minéralisation osseuse. La **calcitonine**, dont le taux de remboursement est réduit à 15 %, n'est plus qu'exceptionnellement utilisée dans certaines contre-indications des **biphosphonates**.

**BIPHOSPHONATES (MALADIE DE PAGET) (1)**■ **Acide tiludronique**

<b>SKELID</b>					
Maladie de Paget : 400 mg/j pendant 12 sem., pour la 1 <sup>re</sup> cure	28 cp. 200 mg	123,72	I	65 %	4,42

D'autres biphosphonates sont en regard des maladies : Ostéoporose et Hypercalcémie.

■ **Acide pamidronique**

<b>OSTEPAM</b>					
Maladie de Paget : 120-180 mg/j pendant 2 à 3 j consécutifs Possibilité de 2 <sup>e</sup> cure 6 mois après la 1 <sup>re</sup>	4 fl. 1 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	40,91
	1 fl. 2 mL 15 mg/mL	83,97	I	65 %	83,97
	1 fl. 4 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	163,63
	1 fl. 6 mL 15 mg/mL	237,72	I	65 %	237,72

■ **Acide zolédronique**

<b>ACLASTA</b>					
1 inj. IV en 15 min Apport de calcium préalable	1 fl. 5 mg	358,56	I	65 %	358,56



## MALADIE DE PAGET (2)

### Biphosphonates

La voie IV semble plus simple à utiliser que la voie orale.

- L'**acide tiludronique (SKELID)**, comprimés dosés à 200 mg, s'utilise *per os*, à la posologie de 400 mg soit 2 cp./j, en une seule prise, pendant une durée de 12 sem. au maximum pour la 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide risédronique (ACTONEL 30 mg)**, cp. à 30 mg, s'utilise *per os* à la posologie de 30 mg/j pendant une durée de 2 mois pour la 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide zolédronique (ACLASTA)** est administré en perf. IV de 5 mg pendant au moins 15 min, pour une 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide pamidronique (OSTEPAM)**, s'utilise à la posologie de 120 à 180 mg en perfusion IV, dose répartie sur 2 à 3 j consécutifs, pour une 1<sup>re</sup> cure.

#### Suivi du traitement

- La réponse biologique est variable, et peut être longue à se manifester. Habituellement elle persiste plusieurs mois (3 à 6 mois, voire plus) après l'arrêt du traitement.
- Une 2<sup>e</sup> cure peut être envisagée, en général au moment de la réascension des phosphatases alcalines (25 % de la valeur atteinte après la fin de la 1<sup>re</sup> cure), mais toujours après un intervalle libre de **2 mois** pour le **risédronate**, **6 mois** pour le **tiludronate** et le **pamidronate**, voire beaucoup plus pour le **zolédronate**, en raison de l'effet rémanent des **biphosphonates**.
- Les précautions d'emploi, les effets indésirables sont envisagés dans le chapitre consacré à l'ostéoporose.

### Médications complémentaires

Les **antalgiques usuels** (paracétamol, 1,5 à 3 g/j, aspirine 1,5 à 2 g/j) ou les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** en cure courte peuvent apporter un soulagement suffisant et rapide dans certaines formes douloureuses.

**Calcium, vitamine D**, sont utiles en cas de carence manifeste.

### Tableaux particuliers

- La coxopathie pagétique et l'arthrose du genou sur os pagétique doivent être traitées comme une arthrose banale, par traitement antalgique et/ou anti-inflammatoire. Pour la plupart des auteurs, une localisation pagétique autour de l'articulation coxofémorale constitue une indication au traitement antiostéoclastique.
- Les fractures des os des membres consolident facilement et parfois même rapidement. Le matériel d'ostéosynthèse n'est pas contre-indiqué. Les **biphosphonates** doivent être suspendus.
- Les fissures ou fractures incomplètes, sont justiciables du repos et éventuellement d'une cure de **calcitonine** (les **biphosphonates** sont contre-indiqués).
- Les déformations diaphysaires, lorsqu'elles retentissent sur les articulations sus- ou sous-jacentes peuvent bénéficier d'une ostéotomie correctrice.
- En cas de dégénérescence sarcomateuse : radiothérapie, amputation, chimiothérapie, restent d'efficacité très modeste.

## OSTÉOPOROSE (1)

### Mécanismes

L'ostéoporose se caractérise par une rupture de l'équilibre dynamique physiologique entre la résorption et la formation osseuse du fait d'une insuffisance d'édification de la trame organique ou d'un excès de résorption. À cette diminution quantitative est associée une diminution qualitative de l'architecture osseuse. Les traitements vont tenter d'y remédier.

L'ostéoporose peut prédominer sur la corticale osseuse ou sur le tissu spongieux, trabéculaire.

La fragilité osseuse qui en résulte expose à un risque important de fractures (tassements vertébraux, fractures du poignet et du col fémoral), mais celui-ci n'est pas inéluctable ; le principal facteur de risque de fracture est la chute.

Certaines fractures survenant après un traumatisme minime, ou sans traumatisme, sont considérées comme des « **fractures sévères** », car elles sont associées à une augmentation de la mortalité et de la morbidité (nouvelle fracture) dans les 5 ans qui les suivent : extrémité supérieure du fémur, vertèbres, bassin, extrémité supérieure de l'humérus, fémur distal, tibia proximal, 3 côtes simultanées. La fracture du poignet, souvent révélatrice d'une ostéoporose, n'est pas associée à une surmortalité mais est néanmoins considérée comme un signe d'alerte.

La survenue d'une fracture « sévère », en l'absence de traumatisme, chez la femme ménopausée, justifie de commencer un traitement anti-ostéoporotique.

### Étiologies

Chez le sujet normal, le capital osseux se constitue jusqu'à l'âge de 30 ans, puis commence une diminution progressive ;

cette perte s'accroît chez la femme après la ménopause du fait du déficit physiologique en œstrogènes. La femme perd jusqu'à 40 % de son capital osseux entre 20 et 80 ans. Toutefois cette perte osseuse est cliniquement très souvent latente. Sur les mesures de densitométrie osseuse, les sujets se situent dans la zone correspondant à la moyenne des sujets de même âge.

### Ostéoporoses dites primitives

L'ostéoporose post-ménopausique est la plus fréquente. On en rapproche l'ostéoporose précoce après castration thérapeutique.

L'ostéoporose primitive de l'homme n'est pas rare. L'ostéoporose idiopathique de l'homme jeune, entre 40 et 45 ans, est une forme rare.

### Ostéoporoses dites secondaires

Selon la présentation clinique, un bilan étiologique (biologique) adapté peut se justifier, qui ne saurait être systématique. Les causes peuvent être d'origine endocrinienne, au cours de l'hypercorticisme surrénalien (maladie de Cushing et **surtout corticothérapie au long cours**), l'hyperthyroïdie, l'acromégalie, l'hypogonadisme ; l'ostéoporose peut être induite par les traitements anticancéreux.

Elles peuvent aussi s'observer au cours d'affections diverses : hémochromatose, rhumatismes inflammatoires chroniques, alcoolisme et cirrhose hépatique, mastocytose, intoxication par métaux lourds (bismuth), traitements prolongés par l'héparine.

Elles peuvent être d'origine neurotrophiq ue : hémiplégi e, maladie de Parkinson, etc. ; ostéoporose d'immobilisation (sujets plâtrés, paralysés ; astronautes).

Elles peuvent être enfin d'origine génétique : ostéogénèse imparfaite (maladie de Lobstein).

**CALCIUM (1)**

## ■ Calcium

<b>CACIT</b>					
Calcithérapie à forte dose : 500 à 1 200 mg/j (calcium-élément)	60 cp. efferv. 500 mg 30 cp. efferv. 1 g	6,97 6,97		65 % 65 %	0,12 0,23
<b>CALCIUM SANDOZ</b>					
Idem <b>CACIT</b>	20 cp. efferv. 500 mg 30 sach. sol. buv. 500 mg	2,88 3,90		65 % 65 %	0,14 0,13
<b>CALCIFORTE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 amp. buv. 500 mg	5,15		65 %	0,17
<b>CALCIDOSE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 sach. pdre 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg 60 cp. 750 mg 30 cp. 1 000 g	6,97 10,41 6,97		65 % 65 % 65 %	0,12 0,17 0,23
<b>CALPEROS</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. à sucer 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALTRATE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>DENSICAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>OSTRAM</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 sach. 0,6 g 30 sach. 1,2 g	6,97 3,90		65 % 65 %	0,23 0,13
<b>OROCAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIDIA</b>					
2 à 3 sach./j	20 sach. granulés 1,54 g	5,64		65 %	0,28

## OSTÉOPOROSE (2)

### Comment apprécier l'ostéoporose

La densitométrie osseuse (DMO) par absorption biphotonique à rayons X est la technique actuellement la plus utilisée. Elle mesure essentiellement une quantité (mais pas la « qualité »), exprimée sur les zones les plus exposées à des fractures (col fémoral, rachis lombaire, poignet moins souvent), et selon plusieurs paramètres :

- par un chiffrage en  $\text{g/cm}^2$ ,
- par le T-score qui se réfère aux valeurs théoriques de la densité osseuse présumée maximale enregistrée chez l'adulte jeune entre 20 et 25 ans,
- par le Z-score, qui se réfère à la valeur moyenne des sujets de même sexe et de même âge ; il diminue normalement avec l'âge.

L'OMS a proposé pour le seuil diagnostique de l'ostéoporose une valeur du T-score  $\leq 2,5$  écarts-types (ou DS, déviation standard).

Ceci permet d'insister sur le fait que toutes ces valeurs « statistiques » doivent être interprétées en fonction de la clinique, au moins pour ne pas alarmer inutilement nombre de patients. Elles ont rarement, prises seules, une valeur décisionnelle thérapeutique. La recherche de fractures vertébrales méconnues cliniquement (en dehors des cas où une importante diminution, récente et chiffrée, de la taille orienterait) peut se faire par un cliché simple du rachis de profil, ou par la technique peu irradiante du VFA (*Vertebral Fracture Assessment*) quand on en dispose. Enfin, il faut rappeler qu'au rachis lombaire, les valeurs du T-score ne sont plus utilisées après 70 ans, et qu'une arthrose surajoutée vient fréquemment surestimer les valeurs retrouvées.

Elles ont un intérêt certain dans le suivi évolutif, en rappelant que les mesures ne doivent pas être trop rapprochées et

qu'elles doivent être faites avec le même appareillage (en raison des variations possibles d'étalonnage).

Le terme d'**ostéopénie**, qui se définissait par un T-score compris entre -2,5 et -1,5 DS ne devrait plus être utilisé, car ces valeurs ne correspondent pas à un risque statistique plus important de fracture.

Le **seuil fracturaire** est une valeur théorique, calculée dans une population souffrant d'une ostéoporose compliquée de fracture, au-dessous de laquelle le risque de fracture est considéré comme plus important. Il ne signifie pas que la survenue d'une fracture est inéluctable. Ce terme inquiète inutilement les patients, même si leurs valeurs sont situées « au-dessus ».

### Objectifs du traitement

Ils sont importants à considérer, faute de traitement idéal actuellement.

#### Chez le sujet jeune et à la ménopause

Le traitement vise à améliorer la qualité du tissu osseux et à augmenter la masse osseuse ou au moins à freiner sa diminution physiologique, ou excessive. Il s'agit d'une **prévention**.

#### Au stade d'ostéoporose constituée

L'objectif principal est de diminuer le risque de fractures par les médicaments susceptibles d'améliorer la qualité du tissu osseux et d'augmenter la masse osseuse (cet objectif est nécessairement modeste à l'heure actuelle), mais aussi par toutes les méthodes permettant de limiter les chutes, source principale de fracture.

#### Au moment des complications

L'objectif du traitement est en fait symptomatique :

- atténuation des douleurs en relation directe avec l'ostéoporose, c'est-à-dire essentiellement les douleurs qui accompagnent un tassement vertébral ;
- c'est aussi le traitement des fractures.

**CALCIUM (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Apport calcique.

**INDICATIONS**

Carences calciques en période de croissance, de grossesse et d'allaitement.

Traitement d'appoint des ostéoporoses.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Hypercalcémie, hypercalciuries avec lithiase calcique, calcifications tissulaires (néphrocalcinoses).

Immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie : le traitement calcique ne doit être utilisé qu'à la reprise de la mobilisation.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'insuffisance rénale contrôler régulièrement la calcémie et la calciurie et éviter l'administration de fortes doses.

En cas de traitement de longue durée et/ou d'insuffisance rénale, il est nécessaire de contrôler la calciurie et de réduire ou d'interrompre momentanément le traitement si celle-ci dépasse 7,5 mmol/24 h (300 mg/24 h), chez l'adulte.

En cas de traitement associé à base de **digitaliques**, **tétracyclines**, **vitamine D**, **fluorure de sodium** (cf. Interactions médicamenteuses).

En raison de la présence d'aspartam dans cer-

tains produits, l'administration devra alors être évitée en cas de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, flatulence, éructations, nausées ; une sensation de bouche sèche a été signalée au moment de la prise des comprimés.

Hypercalciurie, hypercalcémie en cas de traitement prolongé à fortes doses, ou d'association à la **vitamine D**.

Risque d'hypophosphatémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Digitaliques** : l'administration orale de **calcium**, surtout si elle est associée à la **vitamine D**, risquant d'augmenter la toxicité des **digitaliques**, nécessite une stricte surveillance clinique et électrocardiographique.

**Tétracyclines** par voie orale : il est recommandé de décaler d'au moins 3 h la prise de **calcium** (interférence possible de l'absorption des **tétracyclines**).

**Vitamine D** à fortes doses : un contrôle hebdomadaire de la calciurie et de la calcémie est indispensable en raison du risque d'hypercalcémie.

En cas de traitement à base de **fluorure de sodium** ou par **biphosphonates**, il est conseillé de prendre le **calcium** à distance de ces produits (respecter un délai minimal de 2 h avant de prendre du **calcium**).

**Diurétiques thiazidiques** : risque d'hypercalcémie par suite de la réduction de l'élimination urinaire du calcium.

## OSTÉOPOROSE (3)

### Prévention de l'ostéoporose

#### Chez le sujet jeune

La prévention vise à assurer un capital osseux initial satisfaisant. Elle est réalisée par des apports protidiques, calciques et vitaminiques D réguliers et suffisants, par une activité physique en charge, mais qui ne doit pas être excessive (ostéoporose des sportives de compétition, aménorrhéiques).

#### Teneur moyenne en calcium des laitages et boissons (riches en calcium)\*

Aliments, boissons	Teneur moyenne (mg)
1 verre de lait (180 mL)	200
1 yaourt (100 g)	140
2 petits suisses	135
Fromage blanc (100 g)	120
Fromages (camembert, comté, gruyère, cantal) : portion de 30 g	150 à 300
Eau minérale <i>Contrex</i> (1 L)	Environ 500
Eau minérale <i>Hépar</i> (1 L)	
Eau minérale <i>Courmayeur</i> (1 L)	

#### À la ménopause

La prévention s'adresse aux femmes ayant plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose associés : ménopause précoce, patiente maigre, tabagisme, antécédents familiaux de fractures ostéoporotiques, valeurs densitométriques déjà abaissées. Elle s'adresse quand c'est possible au traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM), traitement qui a fait preuve de son efficacité sur l'amélioration de la masse osseuse.

Il peut également être encore choisi en cas de mauvaise tolérance aux autres traitements de l'ostéoporose.

L'institution d'un THM pour prévenir l'ostéoporose conduit à faire quelques remarques :

- il faut toujours garder à l'esprit que l'objectif final est de diminuer le risque de fractures, et que ce risque n'est pas inéluctable ;
- il ne doit pas y avoir de contre-indication, le traitement doit être bien « accepté » et toléré, et la patiente doit se soumettre à une surveillance gynécologique régulière ;
- la durée de l'hormonothérapie substitutive ne fait pas l'unanimité. On pense qu'elle doit durer au moins 7 ans, voire plus, si elle reste bien tolérée.

#### Après la ménopause

Un traitement par le **raloxifène** (**EVISTA**, **OPTRUMA**) peut être envisagé en « prévention des fractures vertébrales non traumatiques chez les femmes ménopausées à risque accru d'ostéoporose » (AMM), en particulier quand le traitement par **biphosphonate** n'est pas choisi ou est contre-indiqué.

Le **raloxifène**, **modulateur sélectif de l'activation des récepteurs œstrogènes (SERM)**, a un effet agoniste sur l'os et partiellement sur le cholestérol, mais n'a pas d'effet sur l'hypothalamus, l'utérus ou le sein. Il peut être envisagé chez les femmes ayant un risque de cancer du sein, ou abandonnant le traitement hormonal substitutif.

**EVISTA**, **OPTRUMA** : 1 cp./j dosé à 60 mg (boîte de 28 cp.). La durée préconisée pour ce traitement est de 3 ans.

La surveillance gynécologique est celle de toute femme après la ménopause. Des bouffées de chaleur sont possibles au cours des 6 premiers mois.

Le traitement est contre-indiqué en cas d'antécédent thromboembolique, d'insuffisance hépatique ou rénale sévère, de saignement génital inexplicé, et chez les femmes ayant un cancer de l'endomètre ou du sein.

\* Les laitages écrémés contiennent autant de calcium que les non écrémés.

## MODULATEUR SÉLECTIF DE L'ACTIVATION DES RÉCEPTEURS AUX ŒSTROGÈNES (SERM)

### ■ Raloxifène

<b>EVISTA</b>					
Prévention des fractures vertébrales non traumatiques chez les femmes ménopausées à risque accru d'ostéoporose	28 cp. pell. 60 mg	24,54	I	65 %	0,88
	84 cp. pell. 60 mg	69,16	I	65 %	0,82
<b>OPTRUMA</b>					
Idem <b>EVISTA</b>	28 cp. pell. 60 mg	24,54	I	65 %	0,88
	84 cp. pell. 60 mg	69,16	I	65 %	0,82

### PROPRIÉTÉS

Modulateur sélectif de l'activation des récepteurs aux œstrogènes.

### INDICATIONS

Strictement réservé à la prévention des fractures vertébrales non traumatiques chez les femmes ménopausées à risque accru d'ostéoporose.

Il n'y a pas de données sur les fractures extra-vertébrales.

Lors de la décision du choix par rapport aux œstrogènes (traitement hormonal substitutif : THM) pour une femme ménopausée, il conviendra de prendre en compte les symptômes de la ménopause (le **raloxifène** n'a pas d'effet sur les bouffées de chaleur et les autres symptômes de la ménopause liés au déficit en œstrogènes), les effets sur le sein, et les risques et bénéfices cardiovasculaires.

Les études cliniques ont montré que le **raloxifène** à 60 mg/j réduit significativement le cholestérol total et le LDL-cholestérol. Les concentrations de HDL-cholestérol et de triglycérides ne sont pas modifiées. Par rapport aux œstrogènes aucune donnée n'est encore disponible pour démontrer un bénéfice du **raloxifène** sur la maladie cardiovasculaire athéromateuse.

Dans les essais cliniques le **raloxifène** n'a pas stimulé l'endomètre postménopausique, ni le tissu mammaire. À trois ans, il n'a pas augmenté le risque de cancer de l'endomètre, et le risque relatif de cancer du sein nouvellement diagnostiqué était significativement plus faible chez les femmes ménopausées traitées par **raloxifène** que chez les femmes ménopausées sous placebo.

### CONTRE-INDICATIONS

Femme en âge de procréer : le **raloxifène** ne doit être utilisé que chez les femmes ménopausées. Épisode actuel ou antécédent d'accidents thromboemboliques veineux, incluant la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse rétinienne.

Hypersensibilité au **raloxifène** ou aux autres constituants du comprimé.

Insuffisance hépatique, y compris la cholestase.

Insuffisance rénale sévère.

Saignement génital inexpliqué.

Patiente ayant un cancer de l'endomètre ou du sein, la sécurité d'emploi dans ce groupe de patientes n'ayant pas été prouvée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le **raloxifène** est associé à un risque accru d'accident thromboembolique veineux qui semble identique à celui rapporté avec le THM.

Il doit être interrompu dès que possible en cas de maladie ou de situation entraînant une immobilisation prolongée, et 3 j avant une immobilisation programmée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Accidents thromboemboliques veineux : thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire et thrombose veineuse rétinienne.

Thrombophlébite superficielle.

Bouffées de chaleur.

Crampes des jambes.

Œdème périphérique.

Faible diminution du nombre de plaquettes.

Rares cas d'augmentation modérée des transaminases.

L'incidence des symptômes mammaires et des saignements d'origine utérine s'est avérée moins forte chez les patientes sous **raloxifène** par rapport aux patientes sous traitement hormonal substitutif.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Dans l'éventualité d'une administration simultanée du **raloxifène** avec de la **warfarine** ou d'autres dérivés de la **coumarine**, le taux de prothrombine devra être surveillé.

Le **raloxifène** ne doit pas être administré en association avec la **colestyramine**, qui réduit l'absorption et le cycle entérohépatique du **raloxifène**.

## OSTÉOPOROSE (4)

### En cas de corticothérapie au long cours

La prévention commence par la prescription de la dose de **corticoïdes** la plus faible possible.

Un traitement médicamenteux peut être nécessaire : calcithérapie, **vitamine D**, **biphosphonates** éventuellement.

Pour les **biphosphonates**, on peut s'adresser soit à une forme orale, ex : **risédronate (ACTONEL 35 mg)**, soit à la voie parentérale : **acide zolédronique (ACLASTA)** (cf. *infra*), qui ont obtenu une AMM dans l'indication : *maintien ou augmentation de la masse osseuse chez les femmes ménopausées prenant des corticoïdes par voie systémique au*

*long cours (plus de 3 mois) à des doses  $\geq 7,5$  mg/j de prednisone ou d'équivalent prednisone.*

### Prévention des chutes

C'est un élément tout aussi important, si ce n'est plus, chez les sujets âgés :

- éviter les somnifères et **benzodiazépines à effet prolongé** ;
- améliorer les troubles de la vue et de l'équilibre ;
- améliorer la force musculaire des membres inférieurs et la marche ;
- aménager l'environnement : tapis qui glissent, meubles mal placés, etc.



**CALCIUM + VITAMINE D3 (1)****■ Calcium + colécalciférol**

<b>CACIT VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 sach./j	30 sach.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 000 mg + <b>vit. D3</b> 880 UI	90 sach.	19,60		65 %	0,22
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 440 UI	180 cp. à croquer et à sucer			NR	
<b>CALCIDOSE VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 sach./j	60 sach.	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>CALPEROS D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>CALTRATE VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j ou 2 sach./j	60 cp. pell.	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 600 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI	180 cp. pell.	19,60		65 %	0,11
<b>DENSICAL VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>OSTRAM VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 sach./j	30 sach.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1,2 g + <b>vit. D3</b> 800 UI	90 sach.	19,60		65 %	0,22
<b>EPTAVIT</b>					
Ostéoporose : 1 cp./j	30 cp efferv.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 g + <b>vit. D3</b> 880 UI	90 cp efferv.	19,60		65 %	0,22
<b>FIXICAL VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 cp./j	30 cp. à sucer	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 g + <b>vit. D3</b> 800 UI	90 cp. à sucer	19,60		65 %	0,22
Ostéoporose : 1 cp. matin et soir	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI	180 cp. à croquer et à sucer	19,60		65 %	0,11

## OSTÉOPOROSE (5)

### Traitement des douleurs d'un tassement vertébral ostéoporotique récent

#### Rappel clinique

Les douleurs sont d'intensité variable mais généralement assez forte pendant 2 à 3 sem. ; puis elles s'estompent progressivement, la crise douloureuse liée à un tassement pouvant durer 4 à 8 sem.

Des douleurs persistant après ce délai doivent faire penser à la survenue éventuelle d'un nouveau tassement, au réveil d'une arthrose rachidienne associée, voire faire discuter l'origine ostéoporotique du tassement.

Elles siègent dans la région de la vertèbre atteinte, rachis dorsal ou rachis lombaire (mais **jamais le rachis cervical**), et ne s'accompagnent qu'exceptionnellement d'irradiations en ceinture et de signes neurologiques.

Il est essentiel de rappeler que beaucoup de tassements vertébraux se font sans douleurs et sont de découverte radiologique fortuite.

L'immobilisation au lit éventuellement, puis rapidement au fauteuil, est indispensable quand le tassement est récent et quand la douleur est forte ; il s'agit d'une fracture et ce sont les mouvements qui sont douloureux. **Dans les formes récentes, la discussion d'une vertébroplastie, en milieu spécialisé, peut être utile.**

Il faut souligner que le risque de nouvelle fracture augmente dans l'année qui suit une 1<sup>re</sup> fracture ostéoporotique.

#### Traitement médicamenteux

Les **antalgiques usuels** sont toujours utiles.

- **Paracétamol** seul ou associé, à dose suffisante et régulièrement répartie, pendant 4 à 8 sem. (délai moyen de cicatrisation du tassement).

- Ils peuvent représenter le seul traitement dans les formes moyennement douloureuses.

Les **biphosphonates** en perfusion sont actuellement souvent utilisés, en milieu hospitalier, dans un but à la fois antalgique immédiat et thérapeutique (**acide zolédronique, ZOMETA ou ACLASTA**).

La **prévention** des phlébites et des escarres est indispensable chez ces sujets âgés.

#### Fracture ostéoporotique du sacrum

Dans le cadre de l'ostéoporose cette fracture n'est pas exceptionnelle, et peut survenir quasi spontanément, ou à la suite d'une chute.

La douleur pouvant n'apparaître que quelques jours après, il en résulte souvent un retard au diagnostic, d'autant plus que les radiographies sont rarement « parlantes ». Le recours à un scanner ou une IRM, voire à une scintigraphie osseuse (fixation en « H » caractéristique), est utile dans les cas difficiles.

Le traitement comprend la mise en décharge relative : fauteuil, cannes-béquilles, ce qui peut raccourcir l'évolution spontanée marquée par l'impotence douloureuse qui peut durer 2 à 3 mois ; la prescription d'**antalgiques usuels**, voire d'un **biphosphonate** en perfusion unique, comme pour un tassement vertébral.

**CALCIUM + VITAMINE D3 (2) – PHARMACOLOGIE****INDICATIONS**

Correction des carences vitamino-calciques chez les sujets âgés. Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l'ostéoporose, chez les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles de la calcithérapie et celles liées à la **vitamine D**.

Tenir compte de la dose de **vitamine D** par unité de prise et d'une éventuelle autre prescription de **vitamine D**.

Le produit doit être prescrit avec précaution chez les patients atteints de sarcoïdose en raison d'une augmentation possible du métabolisme de la **vitamine D** en sa forme active. Chez ces patients, il faut surveiller la calcémie et la calciurie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Cf. Contre-indications.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux de la calcithérapie, plus les risques de surdosage en **vitamine D** : hypercalcémie et hypercalciurie, avec nausées, vomissements, polydipsie, polyurie, constipation, etc.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles de la calcithérapie, plus :


- **phénytoïne, barbituriques** : diminution possible de l'effet de la **vitamine D3** par inhibition de son métabolisme ;
- **glucocorticoïdes** : diminution possible de l'effet de la **vitamine D3**.

Interaction possible avec des aliments contenant : acide oxalique, phosphates, acide phytique.

## OSTÉOPOROSE (6)

### Traitements médicamenteux

#### Schéma de prise de décision d'un traitement médicamenteux dans l'ostéoporose post-ménopausique



Parmi les différents traitements la calcithérapie au long cours, la vitaminothérapie D est l'élément de base. Les autres traitements médicamenteux éventuellement associés comprennent : **biphosphonates**, **ranélate de strontium**, **hormone parathyroïdienne** ou, plus récemment, **dénosumab**.

Une véritable stratégie thérapeutique peut se dessiner, par le choix successif de médicaments actifs. Le choix de la durée repose avant tout sur l'effet antifracturaire attendu.

Certaines options peuvent être guidées par les modalités de remboursement (souvent variables et remises à jour), ou par les **notions d'observance thérapeutique à long terme**, qu'il est indispensable de prendre en compte, de rémanence médicamenteuse et d'effets indésirables à long terme.

**PHOSPHORE****■ Phosphore**

<b>PHOSPHONEUROS</b>					
150 à 200 gtttes/j (soit 1,2 à 1,6 mg de phosphore-élément) en fractionnant les prises	2800 gtttes (fl. 120 mL) 10 gtttes = 78,8 mg	5,10	II	65 %	0,00
<b>PHOCYTAN</b>					
Apport IV de phosphore principalement au cours des alimentations parentérales	50 fl. 20 mL	HOP			
	0,33 mmol/mL				
	1 fl. 100 mL	HOP			
	0,33 mmol/mL				
	10 amp. 10 mL	37,82		65 %	0,38
	0,66 mmol/mL				

**PROPRIÉTÉS**

Le phosphore par voie orale a pour objectif de faire diminuer la calciurie en formant dans l'intestin un complexe de phosphate tricalcique peu assimilable. Il est absorbé par le tube digestif et éliminé par le rein. La diminution de la résorption calcique entraîne une diminution parallèle de la calciurie et de la magnésurie.

L'action osseuse du phosphore est indirecte : la diminution de l'absorption calcique provoque une hyperparathyroïdie réactionnelle et une stimulation de l'activité ostéoblastique.

L'action hypocalcémiante n'est plus utilisée du fait du risque majeur de calcifications diffuses métastatiques.

**INDICATIONS**

Hypercalciurie idiopathique avec ou sans lithiase.

Diabète phosphaté et tubulopathies avec pertes de phosphore.

Traitement associé au cours des ostéoporoses ou de la corticothérapie au long cours, soit avec une calcithérapie (traitement alterné : **calcium** pendant 3 semaines puis **phosphore**

pendant 10 j), soit administré en continu avec la **calcitonine**.

Apport phosphoré en nutrition parentérale (formes injectables).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperkaliémie.

Hypocalcémie.

Insuffisance rénale chronique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

L'administration de **phosphore** est rarement isolée. Elle implique une surveillance régulière du bilan phospho-calcique : calcémie, calciurie, phosphorémie, créatininémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les effets indésirables les plus fréquents sont digestifs : intolérance digestive avec douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée. Précipitations calciques tissulaires (reins, muscles) en cas d'hypercalcémie et de doses dépassant 2 g/j.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Médications susceptibles de ralentir ou bloquer l'absorption du produit : **sucralfate**, **hydroxydes d'aluminium** et de **magnésium**, **gels de phosphate d'alumine**.

## OSTÉOPOROSE (7)

### Calcithérapie au long cours

Elle reste la médication de base, seule parfois, ou en association avec les médications envisagées ultérieurement.

**Les apports alimentaires doivent être privilégiés** ; ils peuvent être calculés (il existe des aides au calcul) et éventuellement corrigés, mais habituellement chez le sujet âgé et même chez le sujet jeune, ils atteignent rarement les valeurs conseillées de 1,2 g/j chez l'adulte. Rappelons que les laitages écrémés contiennent autant de calcium que les laitages non écrémés, et qu'il existe des eaux minérales plus riches en calcium (*Contrex, Hépar, Courmayeur*) dont l'aide peut être précieuse.

C'est pourquoi une **supplémentation médicamenteuse** est utile, ou indispensable avec d'autres médicaments ; elle se situe entre 500 mg et 1,2 g/j de calcium-élément.

#### ► Contre-indications

Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique, néphrocalcinose.

#### ► Précautions d'emploi

- Contrôle régulier de la calcémie, de la calciurie, en cas d'immobilisation prolongée, de traitement associé à base de **digitaliques**, de **diurétiques thiazidiques**, de **vitamine D** à trop fortes doses, de **tétracyclines**.

- Prises décalées en cas d'association aux **biphosphonates**.

#### ► Effets indésirables

- Le plus sérieux et le plus rare est l'hypercalcémie.
- Le plus fréquent et souvent le plus gênant est la constipation.
- Citons aussi la flatulence, les éructations et les nausées.

#### ► Produits disponibles

Ils sont très nombreux et se présentent soit en comprimés à avaler ou à sucer, soit en poudre ou en sachets, soit en ampoules buvables, ce qui permet de **personnaliser la prescription**.

Beaucoup d'entre eux sont aussi commercialisés sous forme d'association calcium-

élément (500 à 600 mg) + **vitamine D3** (en général à la dose de 400 UI par unité ; attention, il existe aussi des formes avec seulement 200 UI), ce qui peut aussi faciliter les prises et améliorer l'observance thérapeutique.

On prescrit en général 1 cp. ou 1 sach. x 2/j, de l'un des produits.

### Vitaminothérapie D

C'est un traitement complémentaire utile chez le sujet âgé, habituellement carencé. Deux modalités se présentent :

- soit une prescription quotidienne à la dose 800 UI/j de **vitamine D2** ou **D3**, ex : **STÉROGYL 2** gtttes/j, soit 800 UI/j, **DÉDROGYL** (sol. buv. de 25-OH vit. D3) : 4 gtttes/j soit 800 UI. Il peut être plus simple lorsque l'on décide d'ajouter une vitaminothérapie D, d'utiliser une spécialité associant **calcium + vitamine D** (attention à la posologie de la vitamine D) ;

- soit, chez les sujets dont la carence a été objectivée par un dosage de la vitamine D (le taux recommandé est d'au moins 30 ng/mL ou 75 nmol/L), une **prescription séquentielle** jusqu'à normalisation (1 amp. toutes les 2 à 4 sem., selon la carence), qui nécessite une surveillance attentive pour éviter une hypercalcémie (rare), ex : **UVÉDOSE** 100 000 UI (**vitamine D3** ou **colécalciférol**) (amp. buv. 2 mL), **STÉROGYL 15A** (**vitamine D2** ou **ergocalciférol**) : sol. buv. à 600 000 UI/1,5 mL. Pour éviter des surdosages accidentels, liés à des coprescriptions de calcium associé à de la vitamine D3, il semble préférable d'éviter actuellement **STÉROGYL 15H**, 1 amp. inj. en IM x 1 à 2/an (cette médication restant pourtant toujours valable et moins coûteuse).

### Biphosphonates

Les **biphosphonates** (ou **bisphosphonates**) représentent actuellement le traitement médicamenteux non hormonal qui semble le plus efficace et le mieux toléré, et qui est toujours prescrit en parallèle avec du **calcium** ; il a un effet antirésorptif osseux. Il est important de tenir compte de la rémanence osseuse prolongée du produit utilisé.

**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (1)****■ Alendronate monosodique**

<b>FOSAMAX</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique avérée : 10 mg/j	28 cp. 10 mg	31,75	I	65 %	1,13
Traitement de l'ostéoporose masculine 70 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique : 70 mg/j, 1 j/sem.	4 cp. 70 mg	20,32	I	65 %	5,08
	12 cp. 70 mg	57,25	I	65 %	4,77
<b>FOSAVANCE</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez les patientes à risque d'insuffisance en vitamine D : 1 cp./sem.	4 cp. 70 mg alendronate/70 µg vit. D3 colécalciférol (2 800 UI)	17,42	I	65 %	4,36
	4 cp. 70 mg alendronate/140 µg vit. D3 colécalciférol (5 600 UI)	17,42	I	65 %	4,36
	12 cp. 70 mg alendronate/70 µg vit. D3 colécalciférol (2 800 UI)	47,15	I	65 %	3,93
	12 cp. 70 mg alendronate/140 µg vit. D3 colécalciférol (5 600 UI)	47,15	I	65 %	3,93

D'autres biphosphonates sont en regard des maladies : Maladie de Paget et Hypercalcémie.

## OSTÉOPOROSE (8)

**Des précautions sont à prendre pour le traitement par biphosphonates :**

- pour la voie orale, prise à jeun avec un grand verre d'eau (plate), en position assise, 1/2 h avant le petit déjeuner, et sans s'allonger dans cet intervalle pour éviter un reflux, ou à au moins de 2 h de toute prise d'aliments ou de boisson et au moins 30 min avant de se coucher. En cas de dysphagie, de douleur rétrosternale, le produit doit être arrêté ;

- il est contre-indiqué en cas de pathologie œsophagienne, d'hypocalcémie et d'insuffisance rénale sévère ;

- en cas d'association avec **calcium** ou **calcium + vitamine D** la prise doit se faire à distance du **biphosphonate** ;

- bien qu'une ostéonécrose de la mâchoire ait été rapportée chez des patients ostéoporotiques traités par **biphosphonates** par voie orale, cette complication grave reste exceptionnelle. Un examen dentaire ainsi que des soins dentaires préventifs appropriés doivent être envisagés, en particulier chez les patientes présentant des facteurs de risque associés (ex : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccale) ;

- la survenue de douleurs musculo-squelettiques en relation avec le traitement peut éventuellement conduire à son interruption. Aux cuisses, il est important de s'assurer de l'absence de fissure sous-trochantérienne, au besoin par une IRM ou une scintigraphie osseuse, avant la survenue éventuelle d'une fracture sous-trochantérienne dite atypique ; cette éventualité, rare, semble se produire plus souvent après 5 à 7 ans de traitement.

On dispose dans le commerce de :

- **risédronate monosodique** : **ACTONEL** cp. dosés à 5, 35 et 75 mg ;

- **alendronate monosodique** : **FOSAMAX** cp. dosés à 10 et 70 mg ; **FOSAVANCE** 70/2 800 ou 5 600, **ADROVANCE** 70/2 800 ou 5 600 quand ils sont associés à de la vitamine D.

La durée de la prescription n'est pas encore clairement établie, et reste assujettie aux résultats d'essais contrôlés. Une durée d'au moins 4 ans peut être actuellement proposée ; au-delà, la décision de

poursuivre reste une décision individuelle prenant en compte l'évaluation du risque fracturaire et la durée de l'effet rémanent de chaque produit.

La prescription d'**ACTONEL** 5 mg et de **FOSA-MAX** 10 mg est quotidienne : 1 cp./j ; la contrainte qu'elle représente, avec son risque de mauvaise observance à long terme, peut conduire à utiliser les autres dosages.

La prescription d'**ACTONEL** 35 mg et de **FOSA-MAX** 70 mg est hebdomadaire : 1 cp./j x 1/sem.

La prescription d' **ACTONEL** 75 mg est mensuelle : la dose recommandée est de 1 cp. à 75 mg par voie orale, 2 j consécutifs/mois. L'acide **ibandronique** (**BONVIVA**, cp. pell. à 150 mg : 1 cp./mois), dont l'intérêt réside dans la prise unique, mensuelle, n'est plus remboursé (l'efficacité sur les fractures du col du fémur n'a pas été établie).

Dans certains cas, on peut utiliser les **biphosphonates** par voie IV, à un rythme de prescription beaucoup plus espacé. On dispose de l'acide **zoledronique**, **ACLASTA** 5 mg ou **ZOMETA** 4 mg. sol. pour perfusion.

Cette prescription a l'avantage d'être moins contraignante pour les patients (en favorisant une meilleure observance ; avec une administration à domicile). La prescription initiale est souvent faite à l'occasion d'une éventuelle hospitalisation pour fracture, en raison de leur effet antalgique immédiat. Il est recommandé d'attendre 15 j après une fracture de hanche opérée avant de la commencer.

Il existe un risque de survenue d'accidents aigus d'hypersensibilité, qui peuvent être prévenus par la prise de **paracétamol** pendant 72 h, et un risque de fibrillation atriale dont il faut tenir compte.

Pour le traitement de l'ostéoporose postménopausique, de l'ostéoporose masculine, et de l'ostéoporose associée à une corticothérapie au long cours par voie générale, la dose recommandée est une perf. IV de 5 mg d'**ACLASTA** x 1/an.

La décision de poursuivre ce traitement doit être réévaluée régulièrement au cas par cas en fonction des bénéfices et des risques potentiels d'**ACLASTA**, particulièrement après 5 ans ou plus de traitement.



**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (2)****■ Risédronate monosodique**

<b>ACTONEL</b>					
5 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique, prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes à risque élevé Prévention de la perte osseuse en cas de corticothérapie prolongée (> 3 mois) avec équivalent prednisone > 7,5 mg/j : 5 mg/j 35 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique pour réduire le risque de fractures vertébrales, ou de l'ostéoporose avérée pour diminuer le risque de fracture de la hanche : 35 mg/j, 1 j/sem. 75 mg : 1 cp./j pdt 2 j consécutifs par mois à débiter toujours le même jour du mois	28 cp. pell. 5 mg	28,62	I	65 %	1,02
	4 cp. pell. 35 mg	25,11	I	65 %	6,28
	12 cp. pell. 35 mg	70,75	I	65 %	5,90
	2 cp. pell. 75 mg	26,87	I	65 %	13,44
	6 cp. pell. 75 mg	75,70	I	65 %	12,62
<b>ACTONELCOMBI</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez les patientes à risque d'insuffisance en vitamine D : 1 cp./sem. puis 1 sach./j les 6 j suivants <b>Risédronate monosodique</b> 35 mg (cp.) + <b>calcium</b> 1 000 mg + <b>colécalciférol</b> 880 UI (sach.)	4 cp./sach.	24,89	I	65 %	6,22
	12 cp./sach.	73,07	I	65 %	6,09

**■ Ibandronate monosodique**

<b>BONVIVA</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez la femme à risque augmenté de fractures : 1 cp. x 1/mois 1 inj. IV en 30 s tous les 3 mois	1 cp. 150 mg		I	NR	
	3 cp. 150 mg		I	NR	
	1 ser. prér. 3 mg/3 mL		I	NR	

**OSTÉOPOROSE (9)****Ranélate de strontium**

Schématiquement, le **ranélate de strontium PROTELOS** augmente la formation osseuse et diminue la résorption osseuse et rééquilibre ainsi le métabolisme osseux en faveur de la formation. Indiqué chez les patient(e)s à risque élevé de fracture (AMM et remboursement variables), **PROTELOS** réduit le risque de fractures vertébrales et de la hanche. Une évaluation individuelle de l'ensemble des risques pour chaque patient(e) est nécessaire. La durée optimale du traitement n'a pas été établie.

**► Modalités d'administration**

La dose quotidienne recommandée est de 1 sach. de 2 g de granulés en une seule prise par voie orale, et doit être administrée à distance des repas du fait de la diminution de l'absorption du **ranélate de strontium** par les aliments, le lait et ses produits dérivés. Étant donné sa lente absorption, **PROTELOS** doit être pris au moment du coucher et de préférence au moins 2 h après le dîner.

Les patientes doivent recevoir, en plus, du **calcium** et de la **vitamine D** si leurs apports alimentaires sont insuffisants.

**► Précautions d'emploi et contre-indications**

**PROTELOS** est contre-indiqué :

- chez les patient(e)s ayant des antécédents d'événements veineux thromboemboliques (EVT) et doit être utilisé avec précaution chez les patient(e)s à risque d'EVT ;
- les patient(e)s présentant des facteurs de risques cardiovasculaires non contrôlés (hypertension artérielle, hyperlipidémie, diabète, tabagisme) ;
- en cas d'immobilisation temporaire ou permanente due par exemple à une convalescence post-chirurgicale ou à un alitement prolongé.

Des réactions cutanées mettant en jeu le pronostic vital, telles que des syndromes de Stevens-Johnson, des nécrolyses épidermiques toxiques (syndromes de Lyell) et des DRESS syndromes ont été rapportées sous **PROTELOS**.

**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la résorption osseuse ostéoclastique.

**INDICATIONS**

Traitement de l'ostéoporose postménopausique.

Avec des libellés d'AMM un peu différents selon les produits, et susceptibles de variation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients.

Hypocalcémie.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

Maladies de l'œsophage qui ralentissent le transit œsophagien : sténose, achalasie.

**Grossesse et allaitement** : sans objet chez la femme ménopausée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les patients doivent bénéficier d'un apport suffisant en **calcium** et en **vitamine D**. Les troubles du métabolisme calcique (hypocalcémie, déficit en vitamine D) doivent être contrôlés avant de commencer le traitement.

Le mode d'administration des **biphosphonates** est important : les comprimés doivent être avalés entiers, sans être croqués, à distance d'aliments, en position assise ou debout, avec un grand verre d'eau plate faiblement minéralisée en calcium et en magnésium. Les patients ne doivent pas s'allonger au cours des 30 min qui suivent la prise d'un comprimé. Selon les produits, la prise peut avoir lieu :

- soit au moins 30 min avant la première prise alimentaire ou la première boisson (autre que de l'eau) de la journée ;

- soit à tout autre moment de la journée, à au moins 2 h de distance de toute prise d'aliments ou de boissons, et au moins 30 min avant d'aller se coucher.

Prévenir les patientes d'arrêter le **biphosphonate** et de consulter en cas de dysphagie, de déglutition douloureuse ou de douleur rétro-sternale.

Prudence chez les patientes ayant une affection gastro-intestinale haute évolutive, telle que : dysphagie, pathologie œsophagienne symptomatique, gastrite, duodénite ou ulcère, ainsi

que chez les malades prenant des **AINS** ou de l'**aspirine**.

En cas de fracture il est recommandé d'interrompre le traitement, jusqu'à complète consolidation.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont principalement de nature gastro-intestinale : douleurs abdominales ou gastriques, nausées, diarrhées, parfois constipation ; ces effets sont d'intensité légère à modérée, et leur incidence est liée à la dose. La survenue d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes favorisée par la prise couchée et/ou avec une faible quantité d'eau est possible.

Des douleurs articulaires, osseuses et des crampes sont possibles. Des cas rares d'asthénie, de sensations vertigineuses, de céphalées, de réactions cutanées, voire d'asthme chez des sujets prédisposés, ont été rapportés.

Une hypocalcémie, en général asymptomatique, a parfois été observée.

Le risque de survenue d'une ostéonécrose de la mâchoire est beaucoup plus faible que lors de l'emploi des **biphosphonates** dans les ostéolyses malignes.

**Biphosphonates et ostéonécrose de la mâchoire**

Un examen dentaire avec des soins dentaires préventifs appropriés devra être pris en considération avant l'instauration d'un traitement par **biphosphonates** chez des patients présentant des facteurs de risque associés (par exemple : cancer, chimiothérapie, corticoïdes ou mauvaise hygiène buccale).

Au cours du traitement, ces patients devront éviter dans la mesure du possible toute intervention dentaire invasive.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les **biphosphonates** doivent être avalés à distance des **sels de calcium**, du **magnésium**, du **fer** ou de l'**aluminium**, ou de **topiques gastro-intestinaux**, **antiacides**, qui en diminuent l'absorption digestive.

L'association des **biphosphonates** avec des produits susceptibles d'entraîner des troubles de la minéralisation doit être évitée.

Les patientes doivent attendre au moins 1/2 h après la prise, avant de prendre tout autre médicament.

## OSTÉOPOROSE (10)

### Hormone parathyroïdienne

Le **tériparatide (FORSTEO)** est un « médicament d'exception », inhibiteur de la résorption osseuse. Son remboursement est assuré à 65 % dans l'ostéoporose avec au moins 2 fractures vertébrales chez la femme ménopausée, chez l'homme et dans l'ostéoporose cortisonique sur une durée maximale de 18 mois.

La posologie recommandée est de 20 µg x 1/j par injection SC dans la cuisse ou l'abdomen. Le produit se présente sous forme de cartouche de 2,4 mL (28 doses de 20 µg/80 µL) en stylo prérempli jetable, en boîte unitaire.

Les patientes doivent être formées pour appliquer les techniques d'injection appropriées ; elles doivent être supplémentées en **calcium** et **vitamine D** si leurs apports alimentaires sont insuffisants.

Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés chez les patients traités par **FORSTEO** sont : nausées, douleurs dans les membres, céphalées et sensations vertigineuses ; le risque d'hypercalcémie est très faible.

Les données disponibles permettent de recommander une durée maximale de traitement de 18 mois pour **FORSTEO**. Après interruption du traitement, les patientes peuvent être traitées par un **biphosphonate** pour continuer d'augmenter la densité minérale.

### Dénosumab

Le **dénosumab (PROLIA)** est un anticorps monoclonal humain s'opposant à l'activation des ostéoclastes, présenté en seringue préremplie. La posologie recom-

mandée est de 60 mg en dose unique x 1/6 mois, par inj. SC dans la cuisse, l'abdomen ou le haut du bras.

Il réduit significativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Il est indiqué dans le traitement de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes à risque élevé de fractures (*en relais des biphosphonates pris au moins 3 mois consécutifs dans l'année précédant son instauration*), dans le traitement de la perte osseuse associée à un traitement hormono-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures.

La vérification de la calcémie, et sa correction, est nécessaire avant l'instauration du traitement.

Parmi les effets indésirables citons : eczéma, flatulence et des cas peu fréquents de cellulite, de rares cas d'hypocalcémie, d'hypersensibilité et d'ostéonécrose de la mâchoire, et de rares cas de fracture fémorale atypique.

### Suivi du traitement médicamenteux

Il est assuré par :

- la clinique (appréciation de la tolérance, évaluation des facteurs de risque de fracture) ;
- une DMO faite 2 à 3 ans après le début ou en fin de séquence, avec le même appareillage ;
- et, pour les traitements *per os* inhibant la résorption osseuse (**biphosphonates, raloxifène, THM**), lorsque c'est possible, le dosage d'un marqueur biologique de la résorption, le CTX sérique. Une valeur inférieure à celle de la femme ménopausée incite à revoir avec la patiente les conditions de prise du traitement.

## OSTÉOMALACIE

L'ostéomalacie, maladie de l'adulte, se définit histologiquement par un défaut de la minéralisation du tissu ostéoïde. Chez l'enfant il y a en plus une anomalie de la maturation des cartilages de conjugaison et on parle de rachitisme.

### Étiologie

Les ostéomalacies résultent :

- le plus souvent d'une carence d'absorption en **vitamine D** (malabsorption intestinale par maladie cœliaque de l'adulte surtout, par résection du grêle, par gastrectomie, etc.), ou d'une carence d'apport,
- parfois d'une carence en phosphore (nutrition parentérale, pertes tubulaires rénales),
- d'un déficit de la synthèse de la 1-25 (OH)<sub>2</sub> vit. D (au cours de certains traitements par **barbituriques** et **hydantoïnes**),
- ou d'une résistance à l'action de la 1-25 (OH)<sub>2</sub> vit. D3 (rachitisme décelé à l'âge adulte, très rare),
- ou d'un trouble local de la minéralisation (hypophosphatasie, intoxication par l'aluminium ou par le fluor, traitement par les **biphosphonates**),
- citons aussi l'ostéomalacie « tumorale » au cours de certaines tumeurs du tissu conjonctif, et de très rares cas de cancer de la prostate métastasés.

Le traitement n'est donc pas nécessairement univoque : il faut non seulement compenser la carence, mais aussi chaque fois que c'est possible agir sur sa cause.

### Traitement

#### Vitaminothérapie D2 ou D3

La correction de la carence repose essentiellement sur la **vitamine D2 (ergocalciférol)** ou la **vitamine D3 (colécalciférol)**, jusqu'à disparition des douleurs et correction de l'hypocalcémie et de l'hypophosphorémie, et normalisation des phosphatases alcalines ; en réduisant la posologie en cas d'élévation de la calciurie, et en s'assurant de l'absence d'hypercalcémie.

On prescrit en début de traitement, le plus souvent des ampoules buvables contenant une dose importante de **vitamine D**, à un rythme adapté à chaque cas jusqu'à normalisation du taux sérique de la vitamine D :

- soit **ergocalciférol** : **STÉROGYL** 15 mg (600 000 UI/amp.), sous forme de **STÉROGYL 15A** (amp. buv.) ou, plus rarement actuellement, de **STÉROGYL 15H** (amp. buv. et injectable en IM) ;
- soit **colécalciférol** (**UVEDOSE 100000**), en amp. buv. de 100 000 UI.

Après guérison, on prescrit :

- soit une forme en gouttes (moins dosée, donc quotidienne) par exemple 800 à 2 000 UI environ (2 à 5 gtt/j de **STÉROGYL**), ou plus selon l'importance de la carence, pour éviter les récives ;
- soit la forme en ampoules.

#### Autres formes de vitamine D

- **Calcifédiol**, **DÉDROGYL** (sol. buv. de 25-OH vit. D3) (1 gtte = 400 UI), lorsque l'ostéomalacie est secondaire à une affection hépatique ou à un traitement barbiturique ou anticonvulsivant : 4 à 10 gtt/j.
  - **Calcitriol**, **ROCALTROL** (calcitriol ou 1,25 (OH)<sub>2</sub> vit. D3) (capsules dosées à 0,25 µg) en cas d'ostéomalacie vitamino-résistante : 2 à 4 caps./j.
- Dans tous les cas avec la même surveillance qu'avec la vitaminothérapie D2 ou D3.

#### Cas particuliers

- Une calcithérapie est parfois nécessaire en cas de grande hypocalcémie, sous stricte surveillance biologique également.
- Un apport de phosphore est parfois nécessaire en cas d'hypophosphorémie (diabète phosphoré), par voie orale et en fractionnant les prises pour diminuer les troubles digestifs possibles.
- En cas de maladie cœliaque, un régime sans gluten est nécessaire.
- Dans les ostéomalacies tumorales, l'excès de la tumeur peut faire régresser l'ostéomalacie.

## ÉPIPHYSITES, APOPHYSITES DE CROISSANCE – MALADIES DE SCHEUERMANN, D'OSGOOD-SCHLATTER

### Maladie de Scheuermann

Cette affection, très fréquente à l'adolescence, touche surtout le garçon et s'installe habituellement sans douleur, et cesse d'évoluer, la croissance terminée.

On l'appelle aussi : ostéocondrose vertébrale de croissance, cyphose douloureuse de l'adolescent. Son diagnostic est radiologique : aspect feuilleté des plateaux vertébraux, hernies intraspongieuses ou rétromarginales antérieures. Certaines images doivent être connues pour ne pas orienter à tort vers d'autres diagnostics, source d'anxiété :

- aspect cunéiforme des vertèbres responsable de la cyphose dorsale, à distinguer d'un tassement vertébral traumatique ;
- image d'épiphyse libre (aux coins antérieurs de la vertèbre) à ne pas confondre avec une fracture ;
- pincement discal en regard d'une hernie intraspongieuse à distinguer d'une spondylodiscite.

### À l'adolescence

Le traitement concerne les rares formes avec manifestations douloureuses, mais aussi les formes avec tendance à l'aggravation de la cyphose dorsale, et comporte des conseils d'hygiène du rachis :

- dormir sur un lit dur, la tête à plat, sans oreiller ;
- limiter le port de charges (cartables trop lourds) ;
- éviter les efforts physiques et les sports comportant une réception brutale sur le sol ;
- conseiller la natation, ainsi que le basket et le volley-ball (sports d'extension) ;
- prescrire parfois un repos en décubitus dorsal au milieu de la journée.

La **kinésithérapie** cherche à corriger les anomalies posturales : 1 seule série de 10 à 15 séances de rééducation avec correction de la tendance à la cyphose dorsale et renforcement de la musculature lombobdominale.

Toutes ces prescriptions avec parfois quelques **antalgiques banals** ne seront guère prolongées plus de 6 à 9 mois, c'est-à-dire pendant la phase douloureuse.

Par la suite il conviendra cependant de ménager la colonne vertébrale.

Le port d'un corset ne se conçoit qu'en cas, rare, de cyphose pathologique s'aggravant avant la fin de la maturation osseuse.

### À l'âge adulte

- Des lombalgies ou des dorsalgies peuvent se manifester lorsque des lésions d'arthrose secondaire se sont développées, mais les manifestations douloureuses surviennent en général chez des sujets anxieux, neurotoniques.

- Il est fondamental de s'assurer de la responsabilité réelle de ces lésions radiologiques, banales en elles-mêmes, dans le tableau clinique.

La **prescription** comporte, pendant la poussée douloureuse : le repos relatif, la prescription d'**antalgiques banals** à dose suffisante, **aspirine** : 2 g/j, **paracétamol** : 1,5 à 3 g/j, 10 à 15 séances de rééducation vertébrale avec renforcement de la musculature, correction de la tendance à la cyphose, associée à des massages, rarement un **anxiolytique**.

### Maladie d'Osgood-Schlatter

Il s'agit d'une dystrophie de croissance de l'adolescent, un garçon en général, qui touche l'apophyse tibiale antérieure. Une affection voisine touche la pointe de la patella (maladie de Sinding-Larsen-Johansson).

Les formes douloureuses sont justiciables :

- du repos relatif, réduisant la marche et les escaliers, supprimant la pratique des sauts ;
- de l'application d'un **gel anti-inflammatoire** : **piroxicam (FELDENE)**, ou **diclofénac (FLECTOR)**, ou autre : 1 appl. matin et soir pendant plusieurs semaines, ou d'une cryothérapie ;
- d'une éventuelle contention élastique adhésive ;
- parfois d'un traitement médicamenteux classique : **antalgique** à dose suffisante, voire **AINS** en cure très brève, mais il faut proscrire les infiltrations de **corticoïdes** ;
- chez les sportifs une rééducation spécialisée peut être utile.

## TUMEURS OSSEUSES BÉNIGNES

Le traitement des tumeurs osseuses bénignes dépend de leurs modalités évolutives. Toute biopsie, tout traitement devraient être « planifiés », en milieu spécialisé pour les cas difficiles.

### Diagnostic radiologique

On constate une zone radiotransparente, homogène, bien limitée, assez souvent bordée d'une zone de condensation.

- Lorsque la tumeur est très volumineuse, elle paraît dilater l'os intéressé qui reste en tout cas entouré dans une coque osseuse. Les tumeurs bénignes de ce type sont représentées par le kyste anévrysmal de l'os ou encore le kyste essentiel.
- Certaines tumeurs bénignes donnent un aspect radiologique différent : fortement radio-opaque. Elles sont constituées partiellement (comme l'ostéochondrome) ou entièrement de tissu osseux, comme l'ostéome ostéoïde.

### Tumeurs asymptomatiques

Elles sont de découverte fortuite, à l'âge adulte, sur une radiographie demandée pour une autre raison :

- enchondromes des doigts ;
- lacune corticale métaphysaire bénigne (ou fibrome non ossifiant, ou cortical defect), qui peut régresser spontanément ;
- kyste solitaire vieilli ;
- exostose ostéogénique ossifiée.

Dans ces cas l'abstention est la règle si le diagnostic radio-clinique est certain.

### Tumeurs symptomatiques

#### ► Ostéome ostéoïde

Il est responsable d'une douleur nocturne ou de décubitus prolongé, calmée par l'aspirine, et qui a sur les radiographies un aspect en cocarde : condensé en périphérie, autour d'une zone claire dans laquelle on voit parfois le « nidus » qui caractérise la tumeur.

Son traitement consiste en l'exérèse de la lésion, soit chirurgicale, soit par abord au trocart dans certaines formes accessibles.

#### ► Tumeurs « actives »

Elles ont tendance sur les clichés successifs à augmenter de taille ; bien qu'elles

puissent souffler la corticale osseuse, elles restent bien limitées. De trop gros volume, elles peuvent fragiliser l'os et devenir alors symptomatiques.

• Certaines sont de diagnostic facile par l'imagerie, du fait de leur localisation et de leur aspect, d'autres le sont moins et demandent une discussion en milieu spécialisé, avant d'envisager une biopsie ou un traitement.

• Parmi ces tumeurs qui peuvent devenir actives, citons : certains enchondromes, le fibrome chondromyxœïde, le kyste solitaire jeune, le kyste anévrysmal et la tumeur à cellules géantes.

#### ► Tumeurs « agressives »

Elles ont un aspect ostéolytique et un contour mal délimité, elles augmentent rapidement de volume et vont franchir les barrières naturelles osseuses. Elles auront tendance à récidiver si le traitement n'en est pas radical.

Parmi ces tumeurs agressives ; certains kystes anévrysmaux, certaines tumeurs à cellules géantes, certains chondroblastomes et certains granulomes éosinophiles.

### Traitement chirurgical

Il doit viser à éviter une récurrence, mais ne pas fragiliser l'os ou menacer une structure anatomique adjacente noble, en particulier chez l'enfant.

### Tumeurs non « agressives »

Il peut s'agir de la résection d'une tumeur périphérique ou du curetage suivi de comblement pour les lésions centrales. Certains kystes solitaires jeunes ont pu bénéficier de l'injection intrakystique de corticoïdes.

### Tumeurs « agressives »

Dans ces cas le curetage doit être complet, avec traitement des parois, suivi de comblement ; parfois une résection suivie de reconstruction osseuse s'avère nécessaire.

## PATHOLOGIE MUSCULAIRE DU SPORTIF – ÉLONGATION, RUPTURE, OSTÉOME, SYNDROME DE LOGE

### Élongation musculaire

Elle se caractérise par une douleur soudaine au cours de l'effort, mais elle est modérée et permet habituellement la poursuite de l'activité à un rythme ralenti ; le muscle est contracturé, douloureux à la palpation, mais il n'y a pas d'ecchymose.

#### Le traitement comporte :

- le refroidissement immédiat avec une vessie de glace ou une poche réfrigérée type *PHYSIOPACK* ou *COLDHOT*, s'il est possible, puis discontinu ;
- le repos strict pendant 3 j, puis relatif pendant 5 à 10 j, pour éviter un risque de rupture secondaire ;
- des soins locaux avec application de chaleur locale et massages à partir du 3<sup>e</sup> j ;
- parfois, au début, un **antalgique** et/ou un **AINS** ;
- la reprise du sport ne se fera qu'au 15<sup>e</sup> j environ, précédée de séances d'échauffement progressif et en évitant les accélérations brutales.

### Déchirure musculaire

Elle s'accompagne d'une douleur plus violente, parfois syncopale, qui persiste au repos. L'impotence est majeure d'emblée. À la contracture et à la douleur élective à la pression s'associent une ecchymose, parfois une encoche palpable ou une tuméfaction nodulaire ; l'hématome a tendance à être déclive et peut s'extérioriser à distance.

#### Le traitement comporte :

- le repos complet,
- le refroidissement immédiat comme pour l'élongation,
- **antalgiques** et **AINS** et éventuellement **myorelaxants** pendant 2 sem. environ,
- l'évacuation éventuelle d'un volumineux hématome (> 30 mL) par ponction sous échographie.

Les massages et les injections locales de **corticoïdes** sont contre-indiqués au début, mais sont parfois envisagés secondairement pour faciliter la fonte d'un noyau fibreux cicatriciel.

La reprise du sport sera très progressive, après 1 à 2 mois au moins d'interruption, et avec les mêmes précautions que pour l'élongation.

### Rupture musculaire

Elle se traduit par une douleur violente et une impotence majeure ; la palpation d'une encoche si le sujet est vu très tôt et la rétraction du corps musculaire. L'échographie est très utile pour le bilan des lésions.

#### Les indications thérapeutiques dépendent du stade évolutif et du niveau sportif.

- Vue tôt, chez un sportif de haut niveau, la rupture doit être confiée au chirurgien, pour suture (bout à bout ou sur une aponevrose) après évacuation de l'hématome. Après 5 sem. d'immobilisation une rééducation sera entreprise ; l'interruption de l'activité sportive se chiffre en mois (4 à 8 mois).
- Vue tardivement, au stade de rétraction et de fibrose le résultat de la chirurgie est incertain. La rééducation, les **antalgiques** apportent une certaine aide.

### Ostéome musculaire

Il s'agit de la complication tardive d'une fracture, ou chez le sportif (football) d'un arrachement de l'insertion ou d'une lésion du droit antérieur, ou bien d'une lésion musculaire négligée ou traitée par des massages intempestifs, qui relève d'un traitement **AINS** pour le « refroidir » et limiter le risque d'ossification.

L'exérèse ne se conçoit qu'en cas de gêne fonctionnelle importante et effectivement en rapport avec l'ostéome, dont la surveillance aura montré l'absence d'évolutivité.

### Syndrome de loge

Il s'agit d'un syndrome ischémique, dû à l'augmentation de la pression à l'intérieur d'un compartiment inextensible comme la loge antéro-externe de la jambe.

Le traitement commence par une limitation de l'activité sportive et son adaptation aux besoins, mais peut être chirurgical : aponévrotomie de décompression, après confirmation du diagnostic par imagerie.



## PUBALGIES, TENDINOPATHIE DES ADDUCTEURS

### Symptomatologie

Le symptôme pubalgie concerne les douleurs de la région pubienne et celles des régions ilio- et ischio-pubiennes, survenant chez les sportifs.

D'origines très diverses, les pubalgies ne sont pas l'apanage exclusif des sportifs, en outre certaines affections préalables peuvent être révélées ou aggravées par le sport. Il faut donc :

- écarter ces affections :
  - coxopathie, dysplasie de hanche,
  - pathologie pariétale ou viscérale, abdominale, crurale ou inguino-scrotale,
  - affections rhumatismales : symphysite ou enthésopathie au cours d'une spondyloarthrite,
  - voire infection de la symphyse pubienne ;
- reconnaître et préciser le mécanisme de la pubalgie :
  - tendinopathie des adducteurs,
  - ostéo-arthropathie pubienne, micro-traumatique,
  - pathologie pariétale abdominale.

### Traitement

Le traitement initial comporte :

- le repos, qui doit avoir une durée suffisante : 1 à 3 mois au moins ;

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (**AINS**) à dose efficace et prolongée, en l'absence de contre-indication ;
- éventuellement un traitement local, en fonction de chaque cas : physiothérapie, gel **AINS** en appl. x 2 à 3/j, infiltrations de **corticoïdes**.

### Infiltrations locales de corticoïdes

Elles sont utiles quand il s'agit d'une tendinite d'insertion, et que le diagnostic ne fait pas de doute.

Elles sont contre-indiquées dans les ostéoarthropathies pubiennes et les formes nodulaires des tendinites.

### Kinésithérapie

Elle est souvent utile :

- étirement progressif et assouplissement de la jonction ostéo-tendino-musculaire des adducteurs ;
- rééducation musculaire prolongée dans les formes pariéto-abdominales.

### Chirurgie

C'est un geste exceptionnel, réservé aux lésions majeures pariétales ou à certaines tendinites chroniques, chez des sujets jeunes pratiquant le sport à un haut niveau.

## HYDARTHROSE POST-TRAUMATIQUE

### Étiologie

Devant un gros genou traumatique, 2 questions se posent initialement :

- s'agit-il bien d'un épanchement exclusivement traumatique, car rares sont les cas où cette interprétation n'est pas retenue par le blessé ;
- ne s'agit-il pas d'une hémarthrose et quelle est la gravité des lésions, ce qui n'est pas toujours appréciable au 1<sup>er</sup> examen.

L'interrogatoire doit faire préciser :

- la date de l'accident invoqué ;
- sa nature, traumatisme franc ou micro-traumatisme ;
- ses circonstances de survenue : choc direct, mouvement de torsion en charge, etc. ;
- le mode évolutif ; en l'absence de lésion grave, une hydarthrose traumatique simple ne dure en général pas plus de 4 sem.

### Traitement

#### Traumatisme bénin

► *Dans un premier temps*

Vont permettre la guérison :

- le refroidissement par de la glace dans une poche imperméable ou avec une poche réfrigérée type *PHYSIOPACK* ou *COLDHOT* au tout début ;
- l'évacuation, non imposée d'emblée ;
- le repos avec immobilisation relative ;
- un **antalgique** et/ou un **AINS** éventuellement.

► *Si l'épanchement persiste*

- Une **ponction évacuatrice**, qui doit s'entourer de précautions d'asepsie rigou-

reuses, soulagera le blessé et permettra d'analyser le liquide, qui est macroscopiquement clair, pauvre en éléments cellulaires et stérile.

- La prescription d'un **AINS** se justifie, pour une durée de 2 sem. environ, par exemple : **diclofénac** (**VOLTARÈNE LP 75 mg**) : 1 cp. matin et soir, ou autre **AINS**, avec les précautions habituelles.

- Ou une injection intra-articulaire de 1 ampoule-seringue de **cortivazol** (**ALTIM**) ou de **bétaméthasone** (**DIPROSTÈNE**).

La persistance de l'épanchement doit faire rechercher une cause soit traumatique (entorse grave, lésion méniscale, fracture parcellaire méconnue, etc.), soit rhumatismale (réveil d'une arthrose associée, rhumatisme inflammatoire).

#### Traumatisme important

La ponction évacuatrice fait partie du bilan lésionnel, tout comme les radiographies, pour écarter une hémarthrose qui évoquerait alors une lésion d'un ligament croisé.

Lorsqu'il se confirme que le liquide est clair, dans un premier temps le traitement est le même que précédemment, et l'examen clinique sera repris sur un genou asséché pour écarter une lésion méniscale ou ligamentaire nécessitant un traitement propre.

#### Hydarthrose ayant tendance à persister ou à récidiver

La recherche étiologique doit être reprise, mais en s'aidant de l'imagerie (IRM ou parfois arthro-scanner, selon le contexte clinique), voire d'une arthroscopie.

## HYPERCALCÉMIE

### Évaluation de la gravité et du mécanisme

L'hypercalcémie est un symptôme biologique qui peut avoir des conséquences vitales et dont les causes sont multiples. Il faut donc parallèlement :

- apprécier la gravité de l'hypercalcémie : soit sur l'existence de signes cliniques « menaçants » (troubles de la conscience voire coma, soif, polyurie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, quelle que soit la valeur de la calcémie), soit devant une calcémie élevée :  $> 3,25$  mmol/L ou  $> 130$  mg/L, ou augmentant progressivement et rapidement, *a fortiori* avec insuffisance rénale. Dans ces formes menaçantes, le traitement symptomatique doit être appliqué d'extrême urgence, en milieu spécialisé. Ailleurs, et en particulier pour des calcémies  $< 2,75$  mmol/L, il n'y a pas d'urgence thérapeutique. Certaines hypercalcémies bien tolérées (hyperparathyroïdie) peuvent se passer de traitement symptomatique en attendant le traitement étiologique ;

- rechercher le mécanisme et la cause de l'hypercalcémie : le plus fréquemment ostéolyse, surtout par métastase osseuse d'un cancer ostéolytique : sein (parfois lors de l'institution d'une hormonothérapie), poumon, rein, thyroïde, etc., ou myélome multiple ; assez souvent par hyperparathyroïdie primitive ; plus rarement, hyperthyroïdie, immobilisation prolongée, etc. Il n'est pas rare qu'une hypercalcémie modérée soit induite par une hyperparathyroïdie elle-même secondaire à une carence en vitamine D, dont la correction est alors nécessaire.

Certaines hypercalcémies sont liées à une augmentation de l'absorption intestinale du **calcium** : sarcoïdose et autres granulomatoses, intoxication par **vitamine D**.

### Traitement

#### Hypercalcémie grave, menaçante

Dans ces formes, avec insuffisance rénale, le traitement urgent doit être appliqué de préférence en unité de soins intensifs. Il comporte, schématiquement :

- Réhydratation et équilibration électrolytique.
- Perfusion de **furosémide (LASILIX)**.
- Voire une épuration extrarénale par hémodialyse ou dialyse péritonéale.
- Traitement anti-ostéoclastique, par **biphosphonates** par voie IV, avec surveillance quotidienne de la calcémie :
  - **biphosphonates**, avec prudence en cas d'insuffisance rénale, d'action retardée (1 à 3 j) mais prolongée (3 à 5 sem.). On dispose du **clodronate (CLASTOBAN)** : 300 mg/j, en perfusion de 2 h, pendant 2 à 5 j, du **pamidronate (OSTEPAM)** : 30 à 90 mg/j, en perfusion de 4 à 6 h pendant 1 à 3 j, ou de l'**acide zolédronique (ZOMETA)** surtout ;
  - en cas d'efficacité le relais par un **biphosphonate** par voie orale est à envisager.

#### Hypercalcémie élevée, sans signe clinique de gravité

- Le traitement doit commencer par une réhydratation avec correction des anomalies électrolytiques, ce qui peut déjà abaisser la calcémie. Puis on s'adresse aux médicaments hypocalcémisants (**biphosphonates**) selon l'état de la fonction rénale, la tolérance des produits, le degré de tolérance de l'hypercalcémie et les possibilités de traitement étiologique.
- La corticothérapie, *per os* ou parentérale, peut être utilisée comme traitement adjuvant dans les hypercalcémies malignes du myélome, des lymphomes, ou dans le traitement des hypercalcémies liées à une augmentation de l'absorption intestinale du **calcium** : sarcoïdose, intoxication par la **vitamine D**.

## MÉTASTASES OSSEUSES DES CANCERS

### Recherche du cancer primitif

Elle est indispensable car elle peut orienter le choix du traitement. Elle ne doit pas faire retarder le traitement des métastases lorsque le cancer n'est pas connu ou qu'il n'est pas découvert d'emblée par la palpation des seins (métastases ostéolytiques ou condensantes ou mixtes), par le toucher rectal (métastases condensantes plus souvent qu'ostéolytiques des cancers de la prostate) ou par la radiographie des poumons (métastases ostéolytiques). L'exploration rénale et thyroïdienne se fera ensuite.

### Découverte des métastases osseuses

Elle ne doit pas faire écarter systématiquement la cure du cancer primitif lorsqu'elle est possible, tout particulièrement si la métastase est unique et elle-même accessible à un traitement local.

Le bilan d'extension du cancer, et du retentissement des métastases osseuses doit être fait rapidement :

- scintigraphie osseuse à la recherche de localisations multiples ;
- complétée par des radiographies, un scanner ou une IRM en cas de localisations menaçantes par leur siège ;
- bilan biologique avec marqueurs tumoraux chaque fois que possible.

Trois cancers seront particulièrement recherchés en raison de leur fréquente hormonodépendance : sein, prostate, thyroïde. Nous renvoyons le lecteur aux chapitres de cancérologie les concernant.

**Mais dans tous les cas certaines mesures communes peuvent s'imposer, que nous envisagerons ci-après.**

### Traitements complémentaires

Quelle que soit l'origine des métastases, le traitement à visée spécifique peut être complété par les traitements suivants :

- La radiothérapie locale osseuse :
  - soit conventionnelle, sur une métastase osseuse unique, non accessible à une exérèse chirurgicale ;
  - soit « flash antalgique » souvent très utile et bien toléré.
- La chirurgie :
  - à titre palliatif antalgique, voire curateur en cas de métastase unique accessible ;
  - enclouage d'une métastase diaphysaire douloureuse et exposée à une fracture pathologique ;

- mise en place d'une prothèse : métastase cervico-céphalique du fémur ;
- injection radioguidée de ciment dans une vertèbre douloureuse ;

– laminectomie en cas de menace ou d'installation d'une paraplégie.

- Un traitement médicamenteux antalgique :

- faisant appel à des **antalgiques** puissants éventuellement morphiniques ;
- et prescrits de façon continue pour couvrir le nycthémère, dans les cas graves.

- Une médication antiostéoclastique : les **biphosphonates**, grâce à leur action directe sur les ostéoclastes et à l'inhibition de certains facteurs de croissance, diminuent le risque d'atteinte osseuse et ont un effet antalgique notable.

Il en est ainsi pour les métastases osseuses du cancer du sein avec le **clodronate** pour la voie orale, et le **pamidronate** ou le **zoledronate** pour la voie IV.

Dans le cancer de la prostate, le **zoledronate** a montré une efficacité significative.

Leur prescription prolongée, sous surveillance de la calcémie et de la fonction rénale, doit aussi tenir compte du risque, plus important sur ce terrain, de survenue d'une ostéonécrose de la mâchoire (cf. Biphosphonates [hypercalcémie] - pharmacologie).

On peut utiliser :

- **acide pamidronique (OSTEPAM)**, en perfusion IV ;
- **acide zoledronique (ZOMETA)**, en perfusion IV.

- La corticothérapie : **prednisone (CORTANCYL)** : à forte dose, 20 à 60 mg/j, soit 1 à 3 cp. à 20 mg/j, peut avoir un effet antalgique pendant un certain temps.

- Le **dénosumab (XGEVA 120 mg sol. inj. 1 fl. 1,7 mL)** fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Si l'ensemble de ces méthodes n'aboutit qu'exceptionnellement à la guérison, les rémissions sont néanmoins fréquentes, quelquefois durables, et souvent de qualité satisfaisante pour permettre un confort de vie suffisant, qui doit être l'un des objectifs essentiels du médecin.

## ANTALGIQUES USUELS (1) – ASPIRINE, SALICYLÉS (1)

## ■ Acide acétylsalicylique et assimilés

<b>ASPÉGIC</b>					
Douleurs d'intensité légère à modérée : posologie variable, inférieure ou égale à 3 g/j d' <b>acide acétylsalicylique</b> Affections rhumatismales : posologie éventuellement plus élevée, 4 g/j (voire jusqu'à 6 g/j) <b>ASPÉGIC INJECTABLE</b> Voie parentérale : IM profonde, IV ou en perf.	20 sach. 500 mg	2,60		65 %	0,13
	20 sach. 1 g	4,12		65 %	0,21
	30 sach. 1 g			NR	
	6 fl. pdre + sol. 500 mg	5,70		65 %	0,95
	6 fl. pdre + sol. 1 g	9,07		65 %	1,51
<b>ASPIRINE UPSA</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. séc. efferv. 500 mg	3,54		65 %	0,18
<b>ASPRO</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. 500 mg			NR	
	36 cp. efferv. 500 mg			NR	
<b>ASPIRINE PH8</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	20 cp. gastro-résist. 0,5 g			NR	
	50 cp. gastro-résist. 0,5 g			NR	
<b>ASPIRINE PROTECT</b>					
Idem <b>ASPÉGIC</b>	30 cp. gastro-résist. 300 mg	2,62		65 %	0,09

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (2)

### Douleur chronique

D'intensité en général subaiguë ou modérée, son évolution, prolongée sur des mois ou des années, se fait souvent sur un **mode cyclique, avec des ondes évolutives**.

Elle nécessite pour être correctement combattue de prendre en considération :

- son **intensité** ;
- l'**impotence qui peut l'accompagner** ;
- son **évolution** dans le temps ; on ne traitera pas de la même façon le fond douloureux permanent d'une gonarthrose et la poussée congestive qui en émaille souvent l'évolution ;
- son **horaire** et ses facteurs d'aggravation.

La raideur matinale douloureuse des grands rhumatismes inflammatoires chroniques doit être combattue par la prescription d'un anti-inflammatoire à une heure telle qu'il ait son maximum d'efficacité à ce moment.

Les douleurs de démarrage, la limitation douloureuse de la marche des arthroses de la hanche et du genou, pourront bénéficier de la prescription ponctuelle d'un **antalgique** avant une sortie pour la faciliter.

### Façon dont le patient vit (avec) sa douleur

Il nous semble intéressant de donner ici l'exemple des lombalgies chroniques au cours desquelles plusieurs travaux ont confirmé l'importance des formes avec troubles psychopathologiques ou psychiatriques associés aux facteurs organiques : près de 40 % des cas de lombalgies.

L'analyse de ces formes permet de noter la fréquence des signes de dépression confirmée et de critères d'anxiété. Ces signes peuvent être la cause principale de la pérennisation des symptômes ; ne pas

en tenir compte, dès le premier contact avec le patient, exposerait à des échecs thérapeutiques, sans parler de la surconsommation de prescriptions et d'actes médicaux, voire chirurgicaux.

### Douleurs neuropathiques périphériques

Il est schématiquement possible, avec une optique neurologique, de distinguer les douleurs en :

- douleurs neuropathiques, liées à un dysfonctionnement du système nerveux, elles-mêmes d'origine centrale ou d'origine périphérique (DNP) ;
- douleurs nociceptives, dues à des lésions de tissus non nerveux ; aiguës ou chroniques, elles affectent : articulations, muscles, os, etc.

Toutefois, en pratique courante, les deux mécanismes sont fréquemment intriqués : douleurs mixtes.

Les douleurs neuropathiques périphériques sont fréquentes en rhumatologie. L'atteinte du système nerveux périphérique est responsable, quand elle se prolonge, d'une perturbation du système nerveux central, ce qui a des applications thérapeutiques. Il en est ainsi au cours des formes prolongées de radiculalgies (sciatique, cruralgie, névralgie cervico-brachiale), de syndromes canalaires, de neuropathies au cours de vascularites, du diabète, ou d'origine iatrogène ; voire au cours d'un syndrome douloureux complexe régional (algodystrophie réflexe).

#### ► Diagnostic

Pour apprécier et reconnaître une DNP, il est possible d'utiliser le questionnaire DN4 (cf. *infra*), établi par la Société française de rhumatologie.

**ANTALGIQUES USUELS (2) – ASPIRINE, SALICYLÉS (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antalgique périphérique, antipyrétique, anti-inflammatoire à dose élevée.

Antiagrégant plaquettaire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou d'états fébriles. Affections rhumatismales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie avérée à l'**aspirine** et aux **AINS**.

Ulcère gastroduodénal évolutif.

Toute maladie hémorragique et si risque hémorragique.

Interactions médicamenteuses : autres **AINS**, anticoagulants oraux, si  $\geq 3$  g/j, **méthotrexate** à dose  $\geq 15$  mg/sem., etc.

**Grossesse** : contre-indiqués à partir du 6<sup>e</sup> mois ; avant, uniquement si nécessaire et en traitement ponctuel.

**Allaitement** : déconseillés.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ce sont celles des **AINS**, plus antécédents d'ulcère gastroduodénal ou d'hémorragie digestive, d'asthme ; insuffisance rénale, métrorragies ou ménorragies, dispositif intra-utérin.

Compte tenu de l'effet antiagrégant plaquettaire, rapide et durable, prévenir le patient des risques hémorragiques pouvant survenir en cas de geste chirurgical, même mineur.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Sur le système nerveux central : bourdonnements d'oreille, baisse de l'acuité auditive, céphalées (surdosage).

Gastro-intestinaux : ulcère, hémorragies patentes ou occultes ; douleurs abdominales.

Hématologiques : syndromes hémorragiques

avec augmentation du TS, persistant 4 à 8 j après l'arrêt de l'**aspirine**.

Réaction d'hypersensibilité : œdème de Quincke, urticaire, asthme, anaphylaxie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

– Autres **AINS** : augmentation du risque ulcérogène et hémorragique ; association déconseillée.

– **Anticoagulants oraux** : augmentation du risque hémorragique. **Salicylés** à faible dose : surveillance du TS ; à fortes doses : contre-indication.

– **Héparines** : augmentation du risque hémorragique ; association déconseillée.

– **Antidiabétiques** (insuline, **chlorpropamide**) : majoration du risque hypoglycémiant.

– **Glucocorticoïdes** : diminution de la salicylémie en cours de traitement, majoration à l'arrêt du **corticoïde**.

– **Diurétiques** : précautions d'emploi si fortes doses de **salicylés** (hydratation, fonction rénale).

– **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : précautions d'emploi si fortes doses de **salicylés** (hydratation, fonction rénale). Réduction de l'effet antihypertenseur.

– **Méthotrexate** : contre-indiqué si dose  $> 15$  mg/sem. ; au-dessous, surveillance hebdomadaire de l'hémogramme, accrue chez le sujet âgé et si fonction rénale altérée.

– **Uricosuriques** (**benzbromarone**, **probenécide**) : diminution de l'effet uricosurique ; association déconseillée.

– **Interféron alpha** : risque d'inhibition de l'action de l'interféron ; association déconseillée.

– **Topiques gastro-intestinaux** : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés ; à prendre en compte.

– Dispositif intra-utérin : risque de moindre efficacité, controversé, à prendre en compte.

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (3)

## Questionnaire DN4

**QUESTION 1 :** la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

	Oui	Non
1. Brûlure		
2. Sensation de froid douloureux		
3. Décharges électriques		

**QUESTION 2 :** la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

	Oui	Non
4. Fourmillements		
5. Picotements		
6. Engourdissements		
7. Démangeaisons		

**QUESTION 3 :** la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence :

	Oui	Non
8. Hypoesthésie au tact		
9. Hypoesthésie à la piqure		

**QUESTION 4 :** la douleur est-elle provoquée ou augmentée par :

	Oui	Non
10. Le frottement		

**OUI = 1 point****NON = 0 point****Score du patient : /10**Si le score du patient est  $\geq 4$ , il est probable que la douleur ait une composante neuropathique.**► Conséquences thérapeutiques**

Lorsque les douleurs ne sont pas contrôlées par les thérapeutiques usuelles (**antalgiques, AINS**), ou qu'elles leur échappent, il est alors possible de s'adresser aux médicaments recommandés dans les DNP.

- **antalgiques opiacés (tramadol) ;**
- **antipileptiques (carbamazépine : TEGRE-TOL, prégabaline : LYRICA) ;**
- **antidépresseurs (imipraniques : ANAFRANIL, TOFRANIL ; l'efficacité des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine est moindre) ;**
- ou méthodes non médicamenteuses (stimulation électrique cutanée par exemple, etc.).

**Douleur chronique et morphiniques**

L'objectif de la prescription de **morphiniques** au long cours est seulement de réduire l'intensité de la douleur.

Cette prescription est **exceptionnelle en rhumatologie**, et doit suivre un certain nombre de règles.

La cause de la douleur doit être bien identifiée, et les douleurs mal définies, sans support organique prouvé ou avec facteurs psychologiques prédominants doivent être exclues.

Les autres **antalgiques** de niveau I et II doivent avoir été inefficaces auparavant.

Un antécédent de toxicomanie doit avoir été écarté.

Un seul médecin doit être responsable du traitement, tant pour la prescription initiale que pour le suivi.

Le produit choisi doit être administré en continu, avec renforcement en période d'activité ou de douleur. La posologie sera progressivement adaptée, et en cas de non-réponse à l'augmentation des doses, la prescription sera arrêtée.

Le suivi doit être très régulier, tous les 28 j, et l'efficacité et la tolérance analysées attentivement.



## ANTALGIQUES USUELS (3) – PARACÉTAMOL (1)

## ■ Paracétamol

<b>CLARADOL</b>					
Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles	16 cp. efferv. 500 mg	2,02		65 %	0,13
	16 cp. séc. 500 mg	1,83		65 %	0,11
<b>DAFALGAN</b>					
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou états fébriles Selon les symptômes : 1 à 3 g/j (4 h entre 2 prises) jusqu'à 4 g/j si nécessaire	16 gél. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	10 sup. 600 mg	2,17		65 %	0,22
	8 cp. séc. 1 g	1,95		65 %	0,24
	16 cp. efferv. séc. 500 mg	1,90		65 %	0,12
<b>DOLIPRANE</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	16 cp. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	12 sach. 500 mg	1,95		65 %	0,16
	16 cp. efferv. 500 mg	2,02		65 %	0,13
	16 gél. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	8 sup. 1 g	2,17		65 %	0,27
	8 cp. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 cp. efferv. séc. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 sach. 1 g	2,02		65 %	0,25
	8 gél. 1 g	1,90		65 %	0,24
<b>EFFERALGAN</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	8 cp. efferv. 1 g	2,02		65 %	0,25
	16 cp. séc. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	16 cp. efferv. séc. 500 mg	2,02		65 %	0,13
<b>DOLKO</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	12 sach. 500 mg	1,95		65 %	0,16
	16 cp. séc. 500 mg	1,95		65 %	0,12
	8 cp. 1 g	1,90		65 %	0,24
<b>PARALYOC</b>					
Idem <b>DAFALGAN</b>	10 cp. à suc. 250 mg	2,13		65 %	0,21
	16 cp. à suc. 500 mg	2,75		65 %	0,17
<b>PERFALGAN</b>					
Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en postopératoire, et traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie IV est cliniquement justifiée par l'urgence A. et adolescent > 50 kg : 1 g jusqu'à 4 fois/j Respecter un intervalle d'au moins 4 h entre 2 administrations Éviter la voie centrale	12 fl. 100 mL 10 mg/mL	HOP			

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (4)

## Traitement

Il comporte 3 volets :

- le traitement étiologique lorsqu'il existe ;
- le traitement symptomatique, toujours nécessaire, qui repose sur le repos articulaire, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires principalement ;
- la prise en compte du contexte : personnel (vécu de la douleur ; antécédents et contre-indications thérapeutiques), social et familial, professionnel.

Le traitement de la douleur doit tenir compte des modalités évolutives et de l'histoire naturelle des affections lorsqu'elle est connue.

## Classification de la douleur

Il existe plusieurs classifications possibles. Celle préconisée par l'OMS pour les **douleurs chroniques cancéreuses**, comporte 3 niveaux successifs. Ils correspondent :

- pour le **niveau I** à des douleurs légères à modérées ;
- pour le **niveau II** (II a et II b) à des douleurs modérées à sévères et/ou à l'échec des **antalgiques** utilisés pour le niveau I ;
- pour le **niveau III**, à des douleurs intenses et/ou à l'échec des **antalgiques** utilisés pour le niveau II.

Cette classification peut servir de référence en pathologie rhumatologique, mais elle doit en pratique être adaptée à chaque cas particulier.  
Il faut faire attention aux confusions possibles entre *liste* et *niveau*.

## Classification des médicaments

► Selon les modalités de prescription

La législation française classe les médicaments selon les modalités de prescription. Les **antalgiques** participent à cette classification. Certains, dont le **paracétamol**, ne figurent sur aucune liste ; leur vente est libre, mais le conditionnement en est généralement réduit. Pour les autres ils figurent sur les listes suivantes.

## Liste I

Prescription sur simple ordonnance, non renouvelable, sauf en cas de mention expresse contraire. La délivrance se fait pour 30 j au maximum, sur présentation de l'ordonnance.

## Liste II

Prescription sur simple ordonnance, renouvelable sur présentation de l'ordonnance, sauf en cas de mention expresse contraire. La délivrance se fait par fraction de 30 j, et l'ordonnance doit dater de moins de 3 mois.

*Liste des stupéfiants (voir ci-après)*

► Selon la composition pharmacologique

Les **antalgiques** peuvent être classés selon leur composition pharmacologique.

*Antalgiques non morphiniques*

Ce sont ceux que l'on peut qualifier d'usuels : **paracétamol**, **salicylés**, **analgésiques** de la famille des **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ; ils font partie des **antalgiques** de niveau I. Signalons les **antalgiques** purs : **floctafénine** (**IDARAC**, par voie orale), **néfopam** (**ACUPAN**, par voie IM), beaucoup moins utilisés en pratique rhumatologique.

*Antalgiques opioïdes faibles*

Ils ne donnent lieu, pour un usage normal, ni à accoutumance ni à assuétude : **codéine**, et sont généralement prescrits en association avec le **paracétamol**. Fréquemment utilisés en rhumatologie, ils font partie des **antalgiques de niveau II a** et sont, ou non, inscrits sur la liste I ou la liste II. Parmi les **antalgiques de niveau II b**, on trouve des produits qui ne peuvent être délivrés qu'après prescription sur ordonnance sécurisée (**TEMGÉSIC**), et d'autres qui peuvent être délivrés sur ordonnance simple (**tramadol**).

*Opiacés majeurs*

Ce sont les alcaloïdes naturels de l'opium et les dérivés semi-synthétiques de l'opium, les **analgésiques** de synthèse « majeurs », dont la prescription est réglementée (ordonnance sécurisée, règle des 7 j, des 14 j ou des 28 j). Ils font partie des **antalgiques de niveau III**.

**ANTALGIQUES USUELS (4) – PARACÉTAMOL (2) –  
PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antalgique périphérique et antipyrétique.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie au **paracétamol**.

Insuffisance hépatocellulaire.

**Grossesse** et **allaitement** : autorisé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'insuffisance rénale sévère, les prises doivent être espacées de 8 h.

En cas de régime désodé, tenir compte de l'apport de sel dans les comprimés effervescents (environ 400 mg de Na/cp.).

En cas de régime hypoglucidique, tenir compte de la présence de saccharose dans certains sachets de poudre.

**PERFALGAN** : éviter la voie centrale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares cas d'accidents allergiques : rashs cutanés avec érythème ou urticaire, nécessitant l'arrêt du traitement.

Rares cas d'anomalies biologiques hépatiques, hépatites exceptionnelles (surdosage).

Exceptionnels cas de thrombopénie.

Non liés au **paracétamol**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

La prise de **paracétamol** peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

## DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (5)

## Modalités de prescription

Quelle que soit l'affection justifiant la prescription, et indépendamment des contre-indications spécifiques à chaque produit et des précautions rendues nécessaires par le patient et ses antécédents, un certain nombre de modalités se retrouvent ; en particulier une *hiérarchie d'utilisation* peut être suivie, de la douleur la plus modeste à la douleur la plus intense.

► *Antalgiques simples, aspirine et paracétamol*

Il est préférable de commencer par eux :

– sous l'une quelconque de leurs formes commerciales et galéniques orales, et de préférence aux repas ;

– en choisissant celle dont le patient a fait l'expérience préalable ou dont il pense (objectivement ou subjectivement) qu'elle lui donne de meilleurs résultats ;

– en privilégiant éventuellement certaines formes, comme par exemple, une **aspirine à délitement intestinal (ASPIRINE PH8 500 mg, ASPIRINE PROTECT 300 mg)** pour bénéficier d'une action maximale décalée de quelques heures après la prise ;

– en associant éventuellement **aspirine et paracétamol**.

Pour le **paracétamol** 500 mg (cp. ou gél.) nous suggérons le mode de prescription suivant :

- pour une poussée arthrosique « simple » : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h. (vers 8 h, vers 12 h, vers 16 h, vers 20 h) plus 1 ou 2 prises/j à la demande, si nécessaire ; pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée ;
- en dehors des poussées, 1 cp. ou gél. 1/2h avant une activité plus importante, et 1 cp. ou gél. après, si nécessaire.

► *Associations d'antalgiques et antalgiques de niveau II*

Lorsque la douleur est insuffisamment calmée par ces médicaments ou lorsque d'emblée on pense qu'elles ne suffiraient pas, il est légitime d'y associer, ou de prescrire exclusivement, une **association d'antalgiques** ou un **antalgique** de niveau II, à base de dérivés **opioïdes** faibles.

Ex. : **codéine + paracétamol (CODOLIPRANE, LINDILANE, DAFALGAN CODÉINE)**.

Ou **caféine + paracétamol (CLARADOL 500 CAFÉINE, LAMALINE (+ opium))**.

Ou **tramadol + paracétamol (IXPRIM, ZALDIAR)**, etc.

La prescription de médicaments à base de **tramadol** ne devrait que rarement être faite d'emblée, en particulier chez le sujet âgé en raison de certains effets indésirables (sommolence, vertiges, avec leur risque de chute).

► *Dérivés des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)*

Entre les deux catégories précédentes nous isolerons les analgésiques dérivés des **AINS**, qui sont, ou non, sur la liste II, selon le conditionnement.

• Soit dérivés de l'**ibuprofène** : **ADVIL**, ou **NUREFLEX**, ou **NUROFEN**.

• Soit dérivés du **kétoprofène** : **TOPREC**, etc.

Il ne faut pas les associer aux **AINS** pour ne pas potentialiser le risque gastroduodénal iatrogène, et il faut le dire expressément au patient.

Ces médicaments sont généralement prescrites pour une durée limitée, quelques jours à quelques semaines, mais parfois pour une durée très prolongée. Leurs effets secondaires éventuels doivent de ce fait être pris en considération lors de la prescription, qui doit rester particulière à un patient donné.

**ASSOCIATIONS D'ANTALGIQUES (1) – AVEC TRAMADOL****■ Tramadol + paracétamol**

<b>ZALDIAR</b>					
Traitement symptomatique des douleurs intenses à modérées ne répondant pas aux antalgiques périphériques utilisés seuls 1 à 2 cp. toutes les 4 à 6 h	20 cp. pell. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
	20 cp. efferv. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
<b>IXPRIM</b>					
Idem <b>ZALDIAR</b>	20 cp. pell. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24
	20 cp. efferv. 37,5 mg + 325 mg	4,85	I	65 %	0,24

**PROPRIÉTÉS**

Antalgique de palier II, qui permet d'agir sur 3 niveaux de la douleur : en périphérie par le **paracétamol**, sur les récepteurs opioïdes centraux et les récepteurs monoaminergiques par le **tramadol**.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des douleurs intenses à modérées ne répondant pas aux antalgiques périphériques utilisés seuls. Réservé à l'adulte.

Dans la douleur d'origine dentaire, il est apparu que cette association a une efficacité supérieure à celle de chacun des composants pris isolément ; la tolérance semble également meilleure que celle du **tramadol**, utilisé seul.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.  
Insuffisance rénale sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.

Chez le sujet âgé de plus de 75 ans, il est recommandé d'espacer les prises de 9 h.

En cas d'insuffisance rénale modérée (clairance entre 10 et 30 mL/min) : augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises, soit toutes les 12 h. Dans les douleurs chroniques s'assurer, le cas échéant avec des pauses thérapeutiques, que la poursuite du traitement est nécessaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux du **tramadol**, surtout, et ceux du **paracétamol**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles du **tramadol**, surtout, et celles du **paracétamol**.

**DOULEUR EN RHUMATOLOGIE (6)****► Opiacés majeurs [1]**

**Ils ont en rhumatologie**, hormis en cas de métastases osseuses de cancers, **des indications relativement limitées et brèves** :

- *jamais* dans les rhumatismes abarticulaires ;

- *presque jamais* dans les formes hyperalgiques des rhumatismes inflammatoires chroniques, dans les formes rebelles et inopérables de l'arthrose, et après avis préalable d'une consultation multidisciplinaire de la douleur ;

- *parfois* au cours des névralgies aiguës : dans certaines formes réellement hyperal-

giques de sciatique, dans les cruralgies et les névralgies cervico-brachiales, à l'acmé de la douleur, dans les premières semaines de leur évolution. Cette prescription est donc *a priori* limitée dans le temps et ne doit pas être négligée. Le choix du produit étant affaire d'habitude du prescripteur et de la tolérance éventuelle du patient. Il faut aussi tenir compte du risque de syndrome de sevrage.

La prescription de **morphiniques** au long cours, dont l'objectif est seulement de réduire l'intensité de la douleur, est exceptionnelle en rhumatologie, et doit suivre un certain nombre de règles (*cf. supra*).

**CONSENSUS**

[1] Mise au point du bon usage des opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses, Afssaps, 2004

## ASSOCIATIONS D'ANTALGIQUES (2) – AVEC CODÉINE

## ■ Codéine + paracétamol

<b>CODOLIPRANE</b>					
Jusqu'à 6 cp./j	16 cp. séc. 20 mg + 400 mg	2,47		65 %	0,15
	16 cp. efferv. 30 mg + 500 mg	2,47	I	65 %	0,15
<b>DAFALGAN CODÉINE</b>					
Jusqu'à 6 cp./j	16 cp. pell. 30 mg + 500 mg	2,47	I	65 %	0,15
	16 cp. efferv. séc. 30 mg + 500 mg	2,47	I	65 %	0,15
<b>LINDILANE</b>					
Jusqu'à 6 cp./j	16 cp. 25 mg + 400 mg	2,47	I	65 %	0,15
<b>CLARADOL CODÉINÉ</b>					
Jusqu'à 6 cp./j	16 cp. séc. 20 mg + 500 mg	2,47	I	65 %	0,15
<b>ALGISÉDAL</b>					
Jusqu'à 6 cp./j	16 cp. 25 mg + 400 mg	2,47	I	65 %	0,15

**PROPRIÉTÉS**

Association d'antalgiques périphérique et central, dont l'effet est potentialisé ; antipyrétique.

**INDICATIONS**

Douleurs modérées ou intenses ne répondant pas à l'utilisation d'antalgiques périphériques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles du **paracétamol** + celles de la **codéine** :

- insuffisance respiratoire ;
- hypersensibilité à la **codéine** ;
- enfant < 15 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles du **paracétamol** + celles de la **codéine** :  
– absorption d'alcool déconseillée ;

- sportifs : risque de réaction positive des tests de contrôle antidopage ;
- prudence en cas de conduite et d'utilisation de machines.

**Grossesse** : éviter pendant le 1<sup>er</sup> trimestre.

**Allaitement** : éviter.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux du **paracétamol** + ceux de la **codéine** :

- états vertigineux, somnolence ;
- constipation ;
- nausées, vomissements ;
- bronchospasme, dépression respiratoire ;
- réactions cutanées allergiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles du **paracétamol** surtout.

## ASSOCIATIONS D'ANTALGIQUES (3) – AVEC CAFÉINE ET AUTRES (1)

## ■ Paracétamol + caféine

CLARADOL 500 CAFÉINE					
1 à 2 cp. x 1 à 3/j	16 cp. efferv. séc. 500 mg + 50 mg	2,25	I	65 %	0,14
	16 cp. quadriséc. 500 mg + 50 mg	2,17	I	65 %	0,14

**PROPRIÉTÉS**

**Caféine** : stimulant central, potentialisant l'effet antalgique du **paracétamol**.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique d'affections douloureuses et/ou fébriles.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie au **paracétamol**.  
Insuffisance hépatocellulaire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles du **paracétamol**.  
Tenir compte de la teneur en sodium des comprimés effervescents (environ 400 mg de Na/cp.).

Sportifs : risque de réaction positive aux tests de contrôle antidopage en cas d'absorption simultanée de thé, café.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux du **paracétamol** + ceux de la **caféine** : possibilité d'excitation, insomnie, palpitations.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles du **paracétamol** (dosage de l'acide urique), et celles de la caféine : interaction avec **énoxacine**, **ciprofloxacine** et **norfloxacine** (risque de surdosage en **caféine**).



## ASSOCIATIONS D'ANTALGIQUES (4) – AVEC CAFÉINE ET AUTRES (2)

## ■ Acide acétylsalicylique + paracétamol + opium + codéine + belladone

<b>SÉDASPIR</b>					
1 à 2 cp. x 1 à 3 /j ; ne pas dépasser 6 cp./j	20 cp. 500 mg <b>ac. acétylsalicylique</b> + 50 mg <b>caféine</b> + 20 mg <b>codéine</b>		I	NR	
<b>PRONTALGINE</b>					
Idem <b>SÉDASPIR</b>	18 cp. 400 mg <b>ac. acétylsalicylique</b> + 50 mg <b>caféine</b> + 20 mg <b>codéine</b>		I	NR	
<b>LAMALINE</b>					
3 à 5 gél./j (ne pas dépasser 2 gél. par prise, ni 10 gél./j)	16 gél. 500 mg <b>paracétamol</b> + 15 mg <b>opium</b> + 30 mg <b>caféine</b>	2,25	II	65 %	0,14
1 sup. x 1 à 3 /j (les prises doivent être espacées d'au moins 4 h)	10 sup. 300 mg <b>paracétamol</b> + 10 mg <b>opium</b> + 50 mg <b>caféine</b>	3,35	II	65 %	0,33

**PROPRIÉTÉS****Paracétamol** : analgésique périphérique.**Opium** et **codéine** : analgésique central.**Belladone** : antispasmodique.**Caféine** : stimulant central.**INDICATIONS**

Traitement symptomatique d'affections douloureuses.

**CONTRE-INDICATIONS****Grossesse** et **allaitement** : contre-indiqué (**belladone**, **opium**).Celles du **paracétamol** plus : adénome prostatique avec rétention urinaire, risque de glaucome avec fermeture de l'angle.**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire les doses chez le sujet âgé et chez l'insuffisant respiratoire chronique.

Sportifs : risque de réaction positive des tests de contrôle antidopage.

Conduite et utilisation de machines.

**EFFETS INDÉSIRABLES**Ceux du **paracétamol**, plus ceux :

- liés à la **belladone** : sécheresse de la bouche, trouble de l'accommodation, tachycardie ;
- liés à l'**opium** : majoration d'une tendance à la constipation ;

- liés à la **caféine** : possibilité d'excitation, insomnie, palpitations.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**Liées à la **morphine** : association d'alcool déconseillée. Prendre en compte les associations avec d'autres déprimeurs du système nerveux central et d'autres **morphiniques**.Liées à la **caféine** : interaction avec **énoxacine** (déconseillée), **ciprofloxacine** et **norfloxacine** (risque de surdosage en caféine).

## ANTALGIQUES DÉRIVÉS DES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (1)

### ■ Ibuprofène

<b>ADVIL</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	20 cp. 200 mg			NR		
	30 cp. 200 mg			NR		
Antalgique : 1 à 3 cp./j	20 cp. 400 mg			NR		
<b>NUREFLEX</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	30 cp. 200 mg	2,46		65 %		0,08
Antalgique : 1 à 4 gél./j	30 gél. LP 300 mg	4,04	II	65 %		0,13
Antalgique : 1 à 3 cp./j	20 cp. 400 mg	2,91	II	65 %		0,15
<b>BRUFEN</b>						
Antalgique : 1 à 3/j	30 cp. 400 mg	3,23	II	65 %		0,11
<b>SPIFEN</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	30 cp. 200 mg	2,39		65 %		0,08
Antalgique : 1 à 3 cp./j	20 cp. 400 mg	2,91	II	65 %		0,15
Antalgique : 1 à 3 sach./j	20 sach. 400 mg	3,24	II	65 %		0,16
<b>INTRALGIS</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	20 cp. efferv. 200 mg			NR		
	30 cp. 200 mg			NR		
<b>NUROFEN</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	20 cp. 200 mg			NR		
Antalgique : 1 à 3 caps. ou cp./j	12 cp. 400 mg			NR		
	10 caps. 400 mg			NR		
<b>SPEDIFEN</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	16 cp. 200 mg			NR		
	20 cp. 200 mg			NR		
Antalgique : 1 à 3 cp./j	12 cp. 400 mg			NR		
<b>UPFEN</b>						
Antalgique : 2 à 6 cp./j	20 cp. 200 mg			NR		

**ANTALGIQUES DÉRIVÉS DES ANTI-INFLAMMATOIRES  
NON STÉROÏDIENS (2) – PHARMACOLOGIE (1)****PRESCRIPTION**

Certains **anti-inflammatoires non stéroïdiens** sont commercialisés à faible dose, prescrits à titre antalgique.

Il s'agit de produits qui sont, ou non, sur la liste II, selon le conditionnement.

Ces médications sont généralement prescrites pour une durée limitée, quelques jours à quelques semaines, mais parfois pour une durée très prolongée.

Certains peuvent être vendus sans ordonnance, et être ainsi à l'origine d'autoprescription, source possible de complications, en particulier gastro-duodénales, s'ils sont associés à un autre anti-inflammatoire.

Leurs effets secondaires éventuels doivent de ce fait être pris en considération lors de la prescription, qui doit toujours rester particulière à un patient donné.

**PROPRIÉTÉS**

Anti-inflammatoire non stéroïdien, antalgique, antipyrétique.

**POSOLOGIE**

La dose initiale est de 200 à 400 mg, soit 1 à 2 cp. ou gél. à 200 mg, puis si nécessaire la prise est renouvelée toutes les 6 h, sans dépasser 1 200 mg/j, soit 6 cp. ou gél. à 200 mg/j.

**INDICATIONS**

Elles sont limitées au traitement symptomatique des douleurs d'intensité moyenne à modérée et/ou des états fébriles.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : contre-indication à partir du 6<sup>e</sup> mois. À éviter avant.

**Allaitement** : prescription à éviter.

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans).

Allergie avérée à l'**ibuprofène** et aux substances d'activité proche (autres **anti-inflammatoires non stéroïdiens**) : la survenue de crise d'asthme a été observée chez certains sujets, notamment allergiques à l'**aspirine**.

Ulcère gastro-duodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Lupus érythémateux disséminé.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En raison de la possibilité de manifestations gastro-intestinales graves, notamment chez les malades soumis à un traitement anticoagulant, il convient de surveiller particulièrement l'apparition d'une symptomatologie digestive. En cas d'hémorragie gastro-intestinale, interrompre le traitement.

L'**ibuprofène** doit être utilisé avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs (ulcère gastro-duodénal, hernie hiatale, hémorragies digestives).

En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, cirrhotiques et rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie, particulièrement chez les sujets âgés.

En cas de troubles de la vue, un examen ophtalmologique complet doit être effectué.

Au cours des traitements prolongés, il est recommandé de contrôler la numération sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur l'apparition possible d'étourdissements attachés à l'emploi de ce médicament.

## ANTALGIQUES DÉRIVÉS DES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (3) – PHARMACOLOGIE (2)

### EFFETS INDÉSIRABLES

#### Effets gastro-intestinaux

Des troubles gastro-intestinaux à type de nausées, vomissements, gastralgies, troubles du transit, dyspepsies, hémorragies occultes ou non, ont été habituellement rapportés.

#### Réactions d'hypersensibilité

- Réactions dermatologiques : éruptions, rash, prurit, œdème.
- Réactions respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être observée chez certains sujets, notamment allergiques à l'**aspirine** et aux **anti-inflammatoires non stéroïdiens**.

#### Effets sur le système nerveux central

- L'**ibuprofène** peut exceptionnellement être responsable de vertiges et de céphalées.

#### Autres effets

- Quelques rares cas de troubles de la vue ont été rapportés.
- Oligurie, insuffisance rénale.
- La découverte d'une méningite aseptique à l'**ibuprofène** doit faire rechercher un lupus ou une connectivite.

*Quelques modifications biologiques ont pu être observées :*

- hépatiques : augmentation transitoire des transaminases ;
- hématologiques : agranulocytose, anémie hémolytique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

#### Associations déconseillées

- Autres **AINS** (y compris les salicylés à fortes doses) : augmentation du risque ulcérogène et hémorragique digestif par synergie additive.

Anticoagulants oraux, **héparine** par voie parentérale et **ticlopidine** : augmentation du risque

hémorragique par inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastro-duodénale.

- Dispositif intra-utérin : possibilité de diminution d'efficacité.

– **Méthotrexate** (par extrapolation à partir d'autres **AINS**) : augmentation de toxicité hématologique, en particulier lorsqu'il est administré à fortes doses, supérieures à 15 mg/sem.

- **Lithium** (décrit avec d'autres **AINS**) : augmentation de la lithémie.

#### Associations nécessitant des précautions d'emploi

- **Diurétiques** : risque d'insuffisance rénale aiguë chez le sujet déshydraté. Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de traitement.

– **Méthotrexate** (utilisé à des doses > 15 mg/sem.) : contrôle hebdomadaire de l'hémogramme durant les premières semaines de l'association, surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.

- **Pentoxifylline** : augmentation du risque hémorragique. Contrôler plus fréquemment le temps de saignement.

– **Zidovudine** : risque de toxicité accrue sur la lignée rouge (action sur les réticulocytes) avec anémie sévère survenant 8 j après l'introduction de l'**AINS**. Contrôler la NFS et le taux de réticulocytes 8 à 15 j après le début du traitement par l'**AINS**.

#### Associations à prendre en compte

- **Antihypertenseurs** ( $\beta$ -bloquants, **inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, **diurétiques**), par extrapolation à partir de l'**indométadine** : réduction de l'effet antihypertenseur.

– **Thrombolytiques** : augmentation du risque hémorragique.

## ANTALGIQUES PURS (1)

## ■ Floctafénine

IDARAC					
Douleur chronique : 2 à 3 cp./j Douleur aiguë : 2 cp. d'emblée, puis jusqu'à 4/j	20 cp. séc. 200 mg	3,46	II	15 %	0,17

## PROPRIÉTÉS

Antalgique périphérique.

## INDICATIONS

Traitement symptomatique des affections douloureuses.

## CONTRE-INDICATIONS

Accidents antérieurs d'hypersensibilité à la **floctafénine** ou à des substances apparentées (**glafénine**, **antrafénine**).

**β-bloquants** (cf. Interactions).

Insuffisance cardiaque sévère.

Cardiopathies ischémiques.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse** : la surveillance dans l'espèce humaine n'a pas mis en évidence de malformations fœtales imputables au produit.

**Allaitement** : prescription à éviter.

Des allergies, cutanéomuqueuses ou générales, sont possibles. Souvent, elles ont été précédées par la survenue, lors d'une prise antérieure, de symptômes allergiques mineurs : fourmillements au niveau des paumes des mains ou de la plante des pieds, rougeur brusque du visage et du décolleté, éruption cutanée, picotements laryngés, sensation de malaise.

Éviter la répétition de prises uniques, facteur de sensibilisation.

Insuffisance rénale : chez l'insuffisant rénal, les taux sériques augmentent légèrement ; la posologie utile pourra donc être légèrement abaissée.

L'acide floctafénique et les dérivés hydroxylés sont dialysables.

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement : accidents d'allure allergique :

- urticaire, œdème de Quincke ;
- accidents de type anaphylactique, 30 min en moyenne après la prise, avec fourmillements et sensation de cuisson des extrémités et du visage, érythème généralisé prurigineux, sensation de malaise, lipothymie, hypotension artérielle pouvant aller jusqu'au collapsus ;
- dyspnée de type asthmatiforme.

Ces troubles peuvent se produire chez un sujet préalablement sensibilisé, sans antécédent allergique connu, avec un seul comprimé. Le traitement, non spécifique, est celui de toute réaction anaphylactique, en particulier l'utilisation d'**adrénaline** (avec les précautions habituelles) en cas de collapsus. Une corticothérapie et/ou l'administration d'**antihistaminiques** peuvent être indiquées, notamment en cas de dyspnée asthmatiforme ou d'œdème de Quincke.

Exceptionnellement :

- nausées et vomissements ;
- insuffisance rénale aiguë oligoanurique de mécanisme probablement immunoallergique ;
- somnolence chez certains sujets ;
- sensation de brûlure à la miction.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'association aux **β-bloquants** est contre-indiquée dans la mesure où, en cas d'hypotension ou de choc, ces produits réduisent les réactions cardiovasculaires de compensation.

## ANTALGIQUES PURS (2)

## ■ Néfopam

<b>ACUPAN</b>					
Traitement symptomatique des affections douloureuses 20 mg/injection ; 120 mg/j jusqu'à toutes les 6 h par voie IM ou 4 h pour voie IV	5 amp. 2 mL (20 mg) IM profonde ou IV très lente	4,19	I	65 %	0,84

**PROPRIÉTÉS**

Antalgique non morphinique, d'action centrale.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique des affections douloureuses.

**CONTRE-INDICATIONS**

Enfants de moins de 15 ans.

Convulsions ou antécédent de troubles convulsifs.

Risques de rétention urinaire liés à des troubles urétroprostatiques.

Risque de glaucome par fermeture d'angle.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**ACUPAN** n'est ni un **morphinique** ni un antagoniste des morphiniques. De ce fait, arrêter un **morphinique** chez un patient physiquement dépendant risque d'aboutir à un syndrome de sevrage. **ACUPAN** n'accélère pas le sevrage d'un tel patient.

Précautions d'emploi chez l'insuffisant hépatique ou rénal.

**Grossesse et allaitement** : en l'absence de données, **ne pas prescrire**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ont été signalés par ordre décroissant de fréquence : sueurs, somnolence, nausées avec ou sans vomissements, malaise, ainsi que des manifestations de type atropinique sous forme de sécheresse buccale, tachycardie, palpitations, vertiges, rétention d'urine, excitabilité, irritabilité.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Certains effets indésirables de l'**ACUPAN** peuvent être majorés par les **sympathicomimétiques** ou **anticholinergiques**, notamment en cas d'administration concomitante de :

- **antispasmodiques atropiniques** ;
- **antiparkinsoniens anticholinergiques** ;
- **antidépresseurs imipraminiques**, et **antipsychotiques phénothiaziniques** ;
- **antihistaminiques H<sub>1</sub>** ;
- **disopyramide**.

## ANTALGIQUES OPIACÉS (1) – SELS MORPHINIQUES (1)

### ■ Sulfate de morphine

<b>MOSCONTIN</b>					
Posologie initiale : environ 30 à 60 mg/j	14 cp. LP 10 mg	4,48	S	65 %	0,32
1 prise toutes les 12 h	14 cp. LP 30 mg	9,45	S	65 %	0,68
Adaptation toutes les 24 à 48 h	14 cp. LP 60 mg	19,02	S	65 %	1,36
Augmentation des doses de 50 %	14 cp. LP 100 mg	27,95	S	65 %	2,00
si douleur non contrôlée	14 cp. LP 200 mg	48,93	S	65 %	3,50
<b>SKÉNAN LP</b>					
Idem <b>MOSCONTIN</b>	14 gél. 10 mg	4,30	S	65 %	0,31
	14 gél. 30 mg	9,00	S	65 %	0,64
	14 gél. 60 mg	18,15	S	65 %	1,30
	14 gél. 100 mg	26,60	S	65 %	1,90
	14 gél. 200 mg	48,93	S	65 %	3,50
<b>ACTISKENAN</b>					
Forme à libération immédiate parfois utilisée en rhumatologie	14 gél. 5 mg	2,61	S	65 %	0,19
	14 gél. 10 mg	3,09	S	65 %	0,22
	14 gél. 20 mg	4,86	S	65 %	0,35
	14 gél. 30 mg	6,94	S	65 %	0,50
<b>SÉVRÉDOL</b>					
Nécessite 4 prises /j Peu utilisé en rhumatologie, surtout utilisé en cancérologie, en appoint au traitement de fond des douleurs cancéreuses	14 cp. 10 mg	3,31	S	65 %	0,24
	14 cp. 20 mg	5,37	S	65 %	0,38

## ANTALGIQUES OPIACÉS (2) – SELS MORPHINIQUES (2)

### PRESCRIPTION

Sur ordonnances sécurisées, règle des 28 j.

### PROPRIÉTÉS

Analgésiques opioïdes, agissant sur le système nerveux central (action dose-dépendante), et sur le muscle lisse.

### INDICATIONS

Douleurs persistantes intenses ou rebelles aux analgésiques de niveau plus faible, en particulier douleurs cancéreuses.

### CONTRE-INDICATIONS

**Allaitement** : contre-indication formelle.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avec les formes à libération prolongée, la dose journalière doit être répartie en 2 prises, le plus souvent équivalentes, à 12 h d'intervalle.

Il ne faut pas s'attarder plus de 24 à 48 h sur un palier qui s'avère inefficace. Le patient doit être vu de manière rapprochée tant que la douleur n'est pas contrôlée ; dans ce cas la posologie doit être augmentée de 50 % environ.

Réduire la posologie dans les cas suivants : insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, sujet âgé.

Prudence en cas de constipation, d'adénome prostatique avec risque de rétention urinaire, d'hypertension intracrânienne.

Sportifs : risque de réaction positive des tests de contrôle antidopage.

En raison de la baisse de vigilance induite par ce médicament, l'attention est attirée sur les risques liés à la conduite d'un véhicule et à l'utilisation d'une machine.

**Grossesse** : la **morphine**, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrite si besoin au cours de la grossesse. En fin de grossesse, en cas de prises ponctuelles élevées, de traitement chronique voire de toxicomanie,

une surveillance néonatale doit être envisagée, afin de prévenir les risques de dépression respiratoire ou de sevrage chez l'enfant.

Insuffisance respiratoire décompensée, insuffisance hépatocellulaire sévère.

Association à la **buprénorphine**.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents aux doses habituelles sont la somnolence, une confusion, des nausées et vomissements, une constipation. Les premiers sont transitoires, la constipation en revanche ne cède pas à la poursuite du traitement.

Tous ces effets sont prévisibles et doivent donc être anticipés afin d'optimiser le traitement ; ils peuvent nécessiter une thérapeutique correctrice.

On peut également noter : sédation, excitation, cauchemars, plus spécialement chez le sujet âgé, avec éventuellement hallucinations ; dépression respiratoire ; rétention urinaire.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Association contre-indiquée : agonistes-antagonistes morphiniques (**buprénorphine**, **nalbuphine**, **pentazocine**) : diminution de l'effet antalgique par blocage compétitif des récepteurs, avec risque d'apparition d'un syndrome de sevrage.

Association déconseillée avec l'alcool : majoration de l'effet sédatif des analgésiques morphiniques.

Association à prendre en compte : dépresseurs du système nerveux central tels que autres dérivés morphiniques (**analgésiques** et **antitussifs**), **antidépresseurs sédatifs**, **antihistaminiques H<sub>1</sub>**, **sédatifs**, **barbituriques**, **benzodiazépines**, **anxiolytiques** autres que benzodiazépines, **antipsychotiques**, **clonidine** et apparentés : majoration de la dépression centrale (sédation et respiration).



## ANTALGIQUES OPIACÉS (3) – SELS MORPHINIQUES (3)

### ■ Chlorhydrate de morphine

<b>MORPHINE AGUETTANT</b>					
Injectable	10 amp. 10 mg	10,06	S	65 %	1,01
	10 amp. 20 mg	10,38	S	65 %	1,04
<b>MORPHINE RENAUDIN</b>					
Injectable	100 amp. 10 mg	HOP	S		

### ■ Fentanyl

<b>DUROGÉSIC</b>					
1 patch à garder 72 h	5 pch 12 µg/h	13,96	S	65 %	2,79
	5 pch 25 µg/h	19,67	S	65 %	3,93
	5 pch 50 µg/h	38,79	S	65 %	6,76
	5 pch 75 µg/h	45,20	S	65 %	9,04
	5 pch 100 µg/h	54,51	S	65 %	10,90
<b>INSTANYL</b>					
Pulvérisation nasale 50 µg à renouveler après 15 min si besoin x 4/j	1 fl. 50 µg/dose (10 doses)	76,74	S	65 %	76,74
	6 fl. 50 µg/unidose	HOP	S		
	1 fl. 100 µg/dose (10 doses)	76,74	S	65 %	76,74
	6 fl. 100 µg/unidose	HOP	S		
	1 fl. 200 µg/dose (10 doses)	76,74	S	65 %	76,74
	6 fl. 200 µg/unidose	HOP	S		
<b>PECFENT</b>					
Pulvérisation nasale 100 µg à renouveler après 15 min si besoin x 4/j	1 fl. 100 µg/dose (8 doses)	59,96	S	65 %	59,96
	1 fl. 400 µg/dose (8 doses)	59,96	S	65 %	59,96
<b>BREAKYL</b>					
Dose initiale : 200 µg puis titration jusqu'à la dose efficace Espacer les administrations de 4 h	4 films orodisp. 200, 400 ou 600 µg	31,71	S	65 %	7,93
	10 films orodisp. 200, 400 ou 600 µg	72,81	S	65 %	7,28
	28 films orodisp. 200, 400, 600, 800 ou 1200 µg	195,66	S	65 %	6,99
<b>ABSTRAL</b>					
Dose initiale : 100 µg puis titration jusqu'à la dose efficace Espacer les administrations de 2 h, max. 4 doses/j	10 cp. subling. 100, 200, 300, 400 µg	74,35	S	65 %	7,44
	30 cp. subling. 100, 200, 300, 400, 600, 800 µg	213,37	S	65 %	7,11
<b>ACTIQ</b>					
Dose initiale : 200 µg x 1 à 2/j puis titration jusqu'à dose efficace Max. 4 cp./j	3 cp. avec appl. buc. 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg	27,26	S	65 %	9,09
<b>EFFENTORA</b>					
Dose initiale : 100 µg puis titration jusqu'à la dose efficace Espacer les administrations de 4 h	4 cp. gingiv. 100, 200 µg	32,32	S	65 %	8,08
	28 cp. gingiv. 100, 200, 400, 600, 800 µg	199,84	S	65 %	7,14

**ANTALGIQUES OPIACÉS (4) – SELS MORPHINIQUES (4)****PROPRIÉTÉS**

Analgésique central.

**INDICATIONS**

**INSTANYL**, **BREAKYL** sont indiqués dans le traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients adultes recevant déjà un traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques d'origine cancéreuse.

**CONTRE-INDICATIONS**

À adapter dans le contexte du traitement des douleurs cancéreuses chroniques.  
Insuffisance respiratoire, syndrome abdominal aigu d'origine inconnue, insuffisance hépatocellulaire grave, traumatisme crânien et hypertension intracrânienne, état convulsif, intoxication alcoolique aiguë, delirium tremens, **IMAO**.  
Les solutions nasales sont également contre-

indiquées en cas d'épisodes récurrents d'épistaxis et chez les moins de 18 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Sujet âgé.  
Insuffisance hépatique.  
Accoutumance.  
Hypertension intracrânienne.

**BREAKYL** : mucite (adaptation de dose).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, nausées, vomissements, confusion.  
Sédation, excitation, délire, hallucinations, rétention urinaire, dépression respiratoire, augmentation de la pression intracrânienne, de la voie biliaire principale.  
Dépendance physique, psychique, syndrome de privation.

**ANTIDOTE**

**Naloxone** ou **nalorphine** : 0,4 mg IV.

## ANTALGIQUES OPIACÉS (5) – SELS MORPHINIQUES (5)

### ■ Hydromorphone

<b>SOPHIDONE</b>					
1 dose de 4 mg est approximativement équivalente à 30 mg de <b>sulfate de morphine</b>	14 gél. 4 mg	13,26	S	65 %	0,95
	14 gél. 8 mg	24,71	S	65 %	1,77
	14 gél. 16 mg	44,21	S	65 %	3,16
	14 gél. 24 mg	60,77	S	65 %	4,34

#### PROPRIÉTÉS

Analgésique stupéfiant agoniste sélectif des récepteurs  $\mu$ .

#### INDICATIONS

Traitement des douleurs intenses d'origine cancéreuse en cas de résistance ou d'intolérance à la morphine.

#### CONTRE-INDICATIONS

##### Absolues :

- Douleur aiguë.
- Insuffisance respiratoire décompensée.
- Enfant de moins de 7 ans.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Épilepsie non contrôlée.
- Allaitement.
- Buprénorphine, nalbuphine et pentazocine (cf. Interactions).
- **IMAO**, sélectifs ou non.

##### Relatives :

- Grossesse.
- Alcool ou médicaments contenant de l'alcool.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les gélules doivent être avalées entières sans être mâchées, à 12 h d'intervalle.

En cas de traitement prolongé, l'arrêt brutal peut entraîner un syndrome de sevrage, caractérisé par les symptômes suivants : anxiété, irritabilité, frissons, mydriase, bouffées de chaleur, sudation, larmoiement, rhinorrhée, nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhées, arthralgies. On évitera l'apparition de ce syndrome de sevrage par une diminution progressive des doses.

L'hydromorphone doit être utilisée avec précaution dans les cas suivants :

- insuffisant rénal et insuffisant hépatique ;
- insuffisant respiratoire : la fréquence respiratoire sera surveillée attentivement. La somno-

lence constitue un signe d'appel d'une décompensation ;

- sujet âgé : en réduisant notamment la posologie initiale ; risques de confusion, de constipation, de rétention urinaire ;
- hypertension intracrânienne.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

##### Associations contre-indiquées :

- agonistes-antagonistes morphiniques (**buprénorphine, nalbuphine, pentazocine**) ;
- **IMAO** sélectifs ou non : risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique ; respecter un délai de 15 jours avant la mise en route d'un traitement par l'**hydromorphone**.

##### Associations déconseillées ou à prendre en compte :

- alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des analgésiques morphiniques. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines ;
- autres déprimeurs du système nerveux central.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents aux doses habituelles sont la somnolence, une confusion, des nausées et vomissements, une constipation. Les premiers sont transitoires et leur persistance doit faire rechercher une cause associée. La constipation, en revanche, ne cède pas à la poursuite du traitement. Tous ces effets sont prévisibles et doivent donc être anticipés.

On peut également noter :

- sédation, excitation, cauchemars, plus spécialement chez le sujet âgé, avec éventuellement hallucinations ;
- dépression respiratoire ;
- augmentation de la pression intracrânienne, qu'il convient de traiter dans un premier temps ;
- rétention urinaire en cas d'adénome prostatique ou de sténose urétrale.

## ANTALGIQUES OPIACÉS (6) – SELS MORPHINIQUES (6)

## ■ Oxycodone

<b>OXYCONTIN LP</b>					
Posologie quotidienne totale à répartir en 2 prises, le plus souvent équivalentes, à 12 h d'intervalle	28 cp. 5 mg	8,38	S	65 %	0,30
	28 cp. 10 mg	14,78	S	65 %	0,53
	28 cp. 15 mg	22,18	S	65 %	0,79
	28 cp. 20 mg	29,05	S	65 %	1,04
	28 cp. 30 mg	42,33	S	65 %	1,51
	28 cp. 40 mg	54,83	S	65 %	1,96
	28 cp. 60 mg	71,02	S	65 %	2,54
	28 cp. 80 mg	87,51	S	65 %	3,13
	28 cp. 120 mg	116,38	S	65 %	4,16
<b>OXYNORM</b>					
Posologie initiale : 5 mg x 4-6/j Posologie d'entretien : à adapter	14 gél. 5 mg	3,55	S	65 %	0,25
	14 gél. 10 mg	5,71	S	65 %	0,41
	14 gél. 20 mg	10,7	S	65 %	0,76
	1 sol. buv. 10 mg/mL (30 mL)	HOP	S		
	4 amp. 10 mg/mL (20 mL)	HOP	S		
	5 amp. 10 mg/mL (1 mL)	HOP	S		
	5 amp. 10 mg/mL (2 mL)	HOP	S		
<b>OXYNORMORO</b>					
Idem <b>OXYNORM</b>	14 cp. orodisp. 5 mg	3,55	S	65 %	0,25
	14 cp. orodisp. 10 mg	5,71	S	65 %	0,41
	14 cp. orodisp. 20 mg	10,7	S	65 %	0,76

**ANTALGIQUES OPIACÉS (7) – SELS MORPHINIQUES (7)****PROPRIÉTÉS**

Analgésique opioïde, l'**oxycodone** est un agoniste opioïde pur.

Son action antalgique est similaire qualitativement à celle de la **morphine**, comme ses actions sur les muscles lisses, les centres respiratoires et la toux.

10 mg d'**oxycodone** par voie orale sont équivalents à 20 mg de **morphine** orale.

**INDICATIONS**

Douleurs chroniques d'origine cancéreuse, intenses ou rebelles aux antalgiques de niveau plus faible, chez l'adulte (à partir de 18 ans).

**CONTRE-INDICATIONS****Absolues**

- Enfant de moins de 18 ans.
- Hypersensibilité connue à l'**oxycodone**, ou à l'un des composants de ce médicament.
- Insuffisance respiratoire décompensée.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Allaitement.
- **Buprénorphine, nalbuphine, pentazocine.**

**Relatives** : grossesse, alcool.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

L'**oxycodone** doit être utilisée avec précaution dans les cas suivants :

- hypovolémie : risque de collapsus ;
- insuffisance rénale, insuffisance hépatique ;
- insuffisance respiratoire, en particulier lorsque d'autres traitements antalgiques d'action centrale sont prescrits simultanément ;

– sujets âgés, en particulier en cas de confusion, constipation, coprescriptions, pathologie urétrorprostatique ;

– hypertension intracrânienne ;

– sportifs : l'**oxycodone** induit une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les effets indésirables les plus fréquents aux doses habituelles sont prévisibles et doivent donc être anticipés afin d'optimiser le traitement : constipation, somnolence, confusion, nausées et vomissements. On peut également noter :

- sédation, excitation, cauchemars, plus spécialement chez le sujet âgé, avec éventuellement hallucinations ;
  - céphalées, vertiges ;
  - dépression respiratoire, avec, au maximum, apnée ;
  - augmentation de la pression intracrânienne ;
  - dysurie et rétention urinaire.
- De rares hypotensions ou bradycardies graves ont été décrites.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Associations contre-indiquées** : agonistes-antagonistes morphiniques (**buprénorphine, nalbuphine, pentazocine**).

**Associations déconseillées ou à prendre en compte** :

- alcool ;
- autres dépresseurs du système nerveux central, notamment en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.

## ANTALGIQUES OPIACÉS (8) – SELS MORPHINIQUES (8)

### Détermination de la dose de DUROGÉSIC

1) Patient n'ayant jamais reçu de **morphine** : utiliser le dispositif 25 µg/h lors de l'administration initiale.

2) Pour les patients ayant déjà reçus de la **morphine** : calculer la dose analgésique (mg) à l'aide du tableau suivant, sur 24 h.

### Dose analgésique (mg) équivalente à 30 mg de morphine orale

Produit	IM	Orale
<b>Morphine</b>	10	
<b>Buprénorphine</b>	0,3	0,8 (sublinguale)

3) Extrapoler les doses de **DUROGÉSIC** à partir du tableau suivant.

Morphine orale mg/j	DUROGÉSIC* /72 h	Morphine	
		IV mg/j	SC mg/j
60	25 µg/h	20	30
120	50 µg/h	40	60
180	75 µg/h	60	90
240	100 µg/h	80	120
300	125 µg/h	100	150
360	150 µg/h	120	180
420	175 µg/h	140	210
480	200 µg/h	160	240
540	225 µg/h	180	270
600	250 µg/h	200	300
660	275 µg/h	220	330
720	300 µg/h	240	360
780	325 µg/h	260	390
840	350 µg/h	280	420
900	375 µg/h	300	450
960	400 µg/h	320	480

\* L'évaluation initiale de l'effet analgésique du **DUROGÉSIC** ne peut se faire qu'après un port de 24 à 72 h d'un dispositif transdermique.

## ANTALGIQUES OPIACÉS (9) – AUTRES OPIACÉS (1)

## ■ Buprénorphine

TEMGÉSIC					
1 à 2 cp. par prise, en moyenne x 3/j	20 cp. subling. 0,2 mg 50 cp. subling. 0,2 mg	10,02 HOP	I	65 %	0,50
1 à 2 amp. par administration toutes les 6-8 h en aigu/12 h en chronique	2 amp. 0,3 mg 10 amp. 0,3 mg	HOP HOP	I I		

## ■ Nalbuphine

NALBUPHINE SERB					
1/2 à 1 amp. IV, IM ou SC toutes les 3 à 6 h jusqu'à 8 amp./j	10 amp. 20 mg/2 mL	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Analgésique central, de longue durée d'action, avec des propriétés de type agoniste-antagoniste morphinique.

## INDICATIONS

Douleurs intenses, en particulier postopératoires et néoplasiques.

## MODE D'ADMINISTRATION

Les comprimés ne doivent pas être avalés ni croqués ; les placer sous la langue et les laisser se dissoudre lentement.

## PRESCRIPTION

Sur ordonnances sécurisées, règle des 28 j.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : innocuité non démontrée.

**Allaitement** : passage dans le lait.

Insuffisances respiratoire sévère, et hépatocellulaire grave.

Intoxication alcoolique aiguë et delirium tremens.

Association à la **morphine** (cf. Interactions) et aux **IMAO**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réduire la posologie dans les cas suivants : insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, sujet âgé.

Sportifs : risque de réaction positive aux tests de contrôle antidopage.

En raison du risque de somnolence il est déconseillé de conduire un véhicule et d'utiliser une machine.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Habituellement : somnolence, nausées, vomissements, sueurs, lipothymies et sensations vertigineuses.

Plus rarement dépression respiratoire.

Très rarement hallucinations.

Risque faible de dépendance physique et psychique (utilisation abusive).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées : **morphine**, **IMAO**.

Association déconseillée avec l'alcool : majoration de l'effet sédatif des **analgésiques morphiniques**.

Association à prendre en compte : dépresseurs du système nerveux central (cf. **Sulfate de morphine**, plus haut).

## ANTALGIQUES OPIACÉS (10) – AUTRES OPIACÉS (2)

## ■ Tramadol

<b>TOPALGIC</b>					
Posologie variable ; dose initiale 100 mg Ne pas dépasser 400 mg/j	30 gél. 50 mg	4,85	I	65 %	0,16
	100 gél. 50 mg	HOP	I		
	5 amp. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 10 mL sol. buv. 10 mg/mL	5,84	I	65 %	5,84
<b>TOPALGIC LP</b> Idem <b>TOPALGIC</b> Sujets âgés de 65 à 75 ans : 1 cp. 100 mg matin et soir	30 cp. LP 100 mg	11,21	I	65 %	0,37
	30 cp. LP 150 mg	15,85	I	65 %	0,53
	30 cp. LP 200 mg	18,59	I	65 %	0,62
<b>CONTRAMAL</b>					
Idem <b>TOPALGIC</b> Dose d'attaque de 100 mg Ne pas dépasser 600 mg/j	30 gél. 50 mg	4,85	I	65 %	0,16
	100 gél. 50 mg	HOP	I		
	5 amp. 100 mg	HOP	I		
	1 fl. 10 mL sol. buv. 100 mg/mL	5,84	I	65 %	5,84
<b>CONTRAMAL LP</b> Posologie variable ; dose initiale 100 mg Ne pas dépasser 400 mg/j	30 cp. LP 100 mg	11,21	I	65 %	0,37
	100 cp. LP 100 mg	HOP	I		
	30 cp. LP 150 mg	15,85	I	65 %	0,53
	100 cp. LP 150 mg	HOP	I		
	30 cp. LP 200 mg	18,59	I	65 %	0,62
	100 cp. LP 200 mg	HOP	I		
<b>MONOCRIXO LP</b>					
Posologie variable ; dose initiale 100 mg Ne pas dépasser 400 mg/j	15 gél. 100 mg	6,63	I	65 %	0,44
	15 gél. 150 mg	8,74	I	65 %	0,58
	15 gél. 200 mg	10,87	I	65 %	0,72

**PROPRIÉTÉS**

Analgésique opioïde, central. Les autres effets des opioïdes sont moindres.

**INDICATIONS**

Traitement des douleurs modérées à intenses de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : innocuité non démontrée.

**Allaitement** : contre-indication par prudence.

Hypersensibilité connue au **tramadol** ou aux opiacés.

Intoxication aiguë ou surdosage avec des dépresseurs du SNC, dont l'alcool.

Insuffisances respiratoire sévère et hépatocellulaire grave.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Consommation d'alcool déconseillée.

Réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance respiratoire, si sujet âgé.

Prudence en cas d'hypertension intracrânienne.  
Sportifs : risque de réaction positive des tests de contrôle antidopage.

En raison du risque de somnolence il est

déconseillé de conduire un véhicule et d'utiliser une machine.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Habituellement : nausées, vomissements, somnolence, céphalées, vertiges, hypersudation, sécheresse buccale, constipation en cas de prise prolongée.

Plus rarement : douleurs abdominales ; rash ; asthénie, euphorie ; troubles mineurs de la vision.

Très rarement : anaphylaxie, convulsions (par abaissement du seuil épileptogène).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées : **IMAO**.

Association déconseillée avec l'alcool ; les **morphiniques** agonistes-antagonistes (**buprénorphine**), la **carbamazépine** et autres **inducteurs enzymatiques** ; les médicaments pouvant diminuer le seuil épileptogène.

Association à prendre en compte : dépresseurs du système nerveux central (cf. **sulfate de morphine**, plus haut), **antitussifs** en particulier chez le sujet âgé.

**Antiacides** : respecter un intervalle de 2 h entre leur prise et celle du **tramadol**.



## ANTALGIQUES OPIACÉS (11) – ANTIDÉPRESSEUR TRICYCLIQUE

### ■ Amitriptyline

LAROXYL					
Posologie variable : < 25 mg pour des douleurs « fonctionnelles » 75 à 150 mg/j dans certaines douleurs intenses et rebelles	800 mL sol. buv.	4,63	I	65 %	0,01
	40 mg/mL				
	60 cp. 25 mg	4,41	I	65 %	0,07
	20 cp. 50 mg	3,55	I	65 %	0,18
	12 amp. inj. 50 mg/2 mL	5,48	I	65 %	0,46

#### PROPRIÉTÉS

Antidépresseur dit imipraminique, utilisé ici pour son effet antalgique.

#### INDICATIONS

Épisodes dépressifs majeurs.

Dans des indications non psychiatriques : algies rebelles.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'**amitriptyline**; risque de glaucome par fermeture d'angle ; risque de rétention urinaire lié à des troubles urétroprostatiques ; infarctus du myocarde récent ; **IMAO**.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Grossesse et allaitement** : à éviter.

Prudence en cas d'épilepsie, d'insuffisance hépatique et rénale.

Chez le sujet âgé : risque d'hypotension orthostatique, d'effet sédatif, de constipation, d'hypertrophie prostatique.

Prudence dans certaines affections cardiovasculaires en raison des effets quinidiniques, tachycardisants et hypotenseurs.

Ce médicament peut affaiblir les facultés mentales et physiques nécessaires à l'exécution de certaines tâches dangereuses, telles que la manipulation d'appareils ou la conduite de véhicules à moteur.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Liés aux effets périphériques de la molécule, habituellement bénins et cédant le plus souvent à la poursuite du traitement ou à une réduction de la posologie :

- effet anticholinergique : sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, tachycardie, sueurs, troubles de la miction et éventuellement rétention urinaire ;
- effet adrénolytique : hypotension orthostatique, impuissance.

Liés aux effets centraux :

- fréquemment observés : somnolence ou sédation, plus marquée en début de traitement ;
- beaucoup plus rares : tremblements, crises convulsives sur terrain prédisposé, états confu-

sionnels transitoires, syndrome sérotoninergique (en association).

En cas de maladie dépressive : levée de l'inhibition psychomotrice, avec risque suicidaire ; inversion de l'humeur avec apparition d'épisodes maniaques ; réactivation d'un délire chez les sujets psychotiques.

Autres effets : prise de poids, troubles de la conduction ou du rythme (avec des doses élevées), troubles endocriniens : hypertrophie mammaire, galactorrhée, bouffées de chaleur ; réactions cutanées allergiques ; dysarthrie ; hépatites cytolytiques ou cholestatiques exceptionnelles ; troubles hématologiques : hyperéosinophilie, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie ; syncope.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

##### Associations contre-indiquées

– **IMAO** : risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique.

– **Sultopride** : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes, par addition des effets électrophysiologiques.

##### Associations déconseillées

– **Adrénaline, noradrénaline (sympathomimétiques alpha et bêta)**.

– **Alcool** : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de l'**antidépresseur**.

– **Clonidine** et apparentés : inhibition de l'effet antihypertenseur.

##### Associations nécessitant des précautions d'emploi

– **Anticonvulsivants, carbamazépine, fluoxétine** : risque de survenue de crises convulsives généralisées.

– **Fluoxamine**.

##### Associations à prendre en compte

– **Antihypertenseurs**, autres dépresseurs du système nerveux central, **atropine** et autres substances atropiniques.

– **Baclofène** : risque d'augmentation de l'hypotonie musculaire.

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (1) – ARYLCARBOXYLIQUES (1)

### ■ Kétoprofène

<b>PROFÉNID</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 100 à 300 mg/j <b>PROFÉNID LP</b> 200 mg Idem <b>PROFÉNID</b>	20 gél. 50 mg	2,65	II	65 %	0,13
	30 cp. 100 mg	6,93	II	65 %	0,23
	12 sup. 100 mg	3,62	II	30 %	0,30
	6 amp. 100 mg pour IM	5,77	II	30 %	0,96
	14 cp. LP 200 mg	8,05	II	65 %	0,58
	14 gél. LP 200 mg	8,46	II	65 %	0,60
<b>TOPREC</b>					
1 à 3 cp./j	20 cp. 25 mg	3,19		65 %	0,16
	1 fl. 150 mL (1 mg/ mL)	2,77	II	65 %	2,77
<b>KÉTUM</b>					
100 à 300 mg/j	30 cp. 100 mg	4,45	II	65 %	0,15
	14 gél. LP 200 mg	5,20	II	65 %	0,37
<b>BI-PROFÉNID LP</b>					
1 à 2 cp./j	20 cp. LP 100 mg	5,19	II	65 %	0,26
	100 cp. LP 100 mg	HOP	II		
<b>PROFEMIGR</b>					
1 cp./j	10 cp. 150 mg	3,72	II	65 %	0,37
	100 cp. 150 mg		II	NR	

### ■ Diclofénac

<b>VOLTARÈNE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques Poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables : 75 à 150 mg/j	30 cp. 25 mg	2,32	II	65 %	0,08
	30 cp. 50 mg	4,67	II	65 %	0,16
	10 sup. 100 mg	3,20	II	30 %	0,32
	2 amp. 75 mg	1,65	II	30 %	0,83
<b>VOLTARÈNE LP</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b>	30 cp. 75 mg	8,57	II	65 %	0,29
	15 cp. 100 mg	5,70	II	65 %	0,38
<b>FLECTOR</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b>	21 sach.-dose 50 mg	3,80	II	65 %	0,18

### ■ Acéclofénac

<b>CARTREX</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE</b> 100 à 200 mg/j	30 cp. 100 mg	5,53	II	65 %	0,18

### ■ Diclofénac + misoprostol

<b>ARTOTEC</b>					
Traitement symptomatique des affections rhumatismales chez les patients à risque Posologie variable : 50 à 150 mg/j Traitement des poussées aiguës, limité à 10 j : 2 cp./j	30 cp. diclofénac 50 mg + misoprostol 0,2 mg	8,78	I	15 %	0,29
	20 cp. diclofénac 75 mg + misoprostol 0,2 mg	6,86	I	15 %	0,34

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (2)

### Principaux effets indésirables

ORGANE	EFFETS INDÉSIRABLES	SUJETS à RISQUE	PRÉCAUTIONS
Tube digestif	Nausées, épigastralgies Douleurs abdominales, diarrhées Ulcère gastrique ou duodénal Hémorragies digestives Perforations digestives	Sujets de plus de 65 ans Antécédents d'ulcère, de gastrite ou d'intolérance préalable ; tabagisme Ulcère et perforation peuvent se produire à n'importe quel moment, <b>sans signe avant-coureur</b>	<b>Antiacides</b> ou traitement protecteur ( <b>misoprostol, inhibiteurs de la pompe à protons</b> )
Reins	Insuffisance rénale fonctionnelle Néphropathie interstitielle Syndrome néphrotique Rétention hydrosodée, hyponatrémie, hypokaliémie Aggravation d'une HTA	Sujets âgés, déshydratés  Traitements associés : <b>diurétiques, IEC</b>	Surveillance de la fonction rénale
Bronches	Asthme, bronchospasme	Antécédents d'asthme à l' <b>aspirine</b>	Interrogatoire
Système nerveux	Acouphènes, surdité Céphalées, vertiges	<b>Aspirine</b> à dose toxique <b>INDOCID</b>	Interrogatoire
Peau	Réactions allergiques prurigineuses Purpura vasculaire, syndromes de Lyell, de Stevens-Johnson, érythème polymorphe	Banales  Graves	
Hématologie	Agranulocytose, thrombopénie, anémie, voire aplasie médullaire	<b>Phénylbutazone</b>	Indications, posologie, durée limitées (8 j) Au cours des traitements prolongés, contrôler la formule sanguine
	Troubles de la crase sanguine	Traitements associés	Compte tenu d'un effet antiagrégant plaquettaire durable, prévenir le patient des risques hémorragiques pouvant survenir en cas de geste chirurgical, même mineur <b>Il est parfois conseillé d'arrêter un traitement AINS plusieurs jours avant une intervention chirurgicale</b>
Foie	Élévation banale des transaminases hépatite cytolytique, cholestatique, ou mixte		Surveillance biologique ALAT, ASAT, GGT, phosphatases alcalines

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (2) – ARYLCARBOXYLIQUES (2)

### ■ Naproxène

<b>NAPROSYNE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables : 500 à 1 000 mg/j	10 cp. 250 mg	1,95	II	65 %	0,20
	10 cp. 500 mg	3,59	II	65 %	0,36
	8 cp. 1 g	4,25	II	65 %	0,53
	12 sup. 500 mg	4,26	II	30 %	0,36
<b>APRANAX</b>					
Idem <b>NAPROSYNE</b>	30 cp. 275 mg	4,38	II	65 %	0,15
	15 cp. 750 mg	6,16	II	65 %	0,41
	16 cp. séc. 550 mg	3,64	II	65 %	0,23

### ■ Ibuprofène

<b>ADVIL</b>					
200 à 1 200 mg/j	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
	20 cp. 400 mg			NR	
<b>UPFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
<b>NUREFLEX</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 cp. 200 mg	2,46		65 %	0,08
	20 cp. 400 mg	2,91		65 %	0,15
<b>NUREFLEX LP</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 gél. 300 mg	4,04		65 %	0,13
<b>SPIFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	30 cp. 200 mg	2,39	II	65 %	0,08
	20 cp. 400 mg	2,91	II	65 %	0,15
	20 sach. 400 mg	3,24	II	65 %	0,16
<b>INTRALGIS</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
<b>SPEDIFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	16 cp. 200 mg			NR	
	20 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	12 sach. 400 mg			NR	
<b>NUROFEN</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	20 cp. 200 mg			NR	
	30 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	10 caps. 400 mg			NR	
<b>NUROFENFLASH</b>					
Idem <b>ADVIL</b>	12 cp. 200 mg			NR	
	12 cp. 400 mg			NR	
	10 sach. 400 mg			NR	

**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (3)****Indications**

Tous les syndromes comportant une inflammation, localisée ou généralisée :

- aiguë : la prescription sera alors relativement brève ;
- chronique : ils sont alors souvent utilisés à la dose minimale active, associés ou non à un traitement « de fond » de l'inflammation.

Ils ont souvent aussi une action antalgique propre, une action inhibitrice sur l'agrégation plaquettaire (sauf les **coxibs**).

**Mode d'action**

L'inhibition des prostaglandines et des leucotriènes est à la base de leur action anti-inflammatoire, mais aussi de certains de leurs effets indésirables. L'effet anti-inflammatoire des **AINS** « classiques » s'explique par le blocage de la cyclo-oxygénase 2 (COX 2) qui s'oppose à l'action pro-inflammatoire des prostaglandines. Malheureusement, ils inhibent en même temps la cyclo-oxygénase 1 (COX 1) qui exerce au contraire une action cytoprotectrice digestive.

La dernière famille d'**AINS** (dits « coxibs ») agit sélectivement sur la cyclo-oxygénase 2, ne bloquant que l'action pro-inflammatoire des prostaglandines.

**Absorption**

Pour la plupart, ils sont absorbés par la muqueuse intestinale (voie orale ou rectale) ; ceux qui sont injectables par voie IM sont directement acheminés vers le foie.

Ils se distribuent à tout l'organisme et en particulier aux nerfs, aux séreuses, et aux organes glandulaires (digestifs).

Certains traversent la barrière placentaire, ce qui explique que la grossesse représente une contre-indication habituelle.

Métabolisés par le foie, ils sont éliminés par les reins ; leur demi-vie est variable : 6 à 72 h, selon le produit.

**Effets indésirables**

Certains sont particuliers à chaque famille, d'autres sont communs à toutes les familles chimiques.

C'est le cas de la toxicité gastrique, d'autant plus grande que l'action anti-inflammatoire est importante et peut justifier l'emploi de protecteurs gastriques ; la toxicité gastrique est augmentée chez le sujet âgé, les sujets tabagiques, et le risque hémorragique doit être constamment présent à l'esprit.

La toxicité existe quelle que soit la voie d'introduction dans l'organisme.

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (3) – ARYLCARBOXYLIQUES (3)

### ■ Flurbiprofène

<b>CEBUTID</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 100 à 300 mg/j Proposé comme antiagrégant plaquettaire à demi-vie courte (relais <b>aspirine</b> ou <b>clopidogrel</b> ) : 50 mg/j en 2 prises <b>CEBUTID LP 200 mg</b> Idem <b>CEBUTID</b>	30 cp. 50 mg	3,60	II	65 %	0,12
	15 cp. 100 mg	3,60	II	65 %	0,24
	16 gél. LP 200 mg	7,35	II	65 %	0,46
<b>ANTADYS</b>					
1 cp. 1 à 3/j	15 cp. 100 mg	3,32	II	65 %	0,22

### ■ Étodolac

<b>LODINE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 200 à 400 mg/j	30 cp. 200 mg	7,05	II	65 %	0,24
	20 cp. 300 mg	6,72	II	65 %	0,34

### ■ Acide tiaprofénique

<b>SURGAM</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques, poussées d'arthrose, lombalgies, règles douloureuses et traitement d'appoint dans les phénomènes inflammatoires de la sphère ORL A. : dose d'attaque 200 mg x 3/j puis 300-400 mg/j à répartir en plusieurs prises E. : 10 mg/kg/j à répartir en 2 ou 3 prises	30 cp. séc. 100 mg	3,50	II	65 %	0,12
	15 cp. séc. 200 mg	3,60	II	65 %	0,24

### ■ Dexkétoprofène

<b>KÉTESSE</b>					
Douleur d'intensité légère à modérée (douleurs dentaires, dysménorrhées) : 12,5 mg x 4 à 6/j ou 25 mg x 1 à 3/j PO Douleur d'intensité modérée à sévère (post-opératoire, colique néphrétique, lombalgie) si voie orale inadaptée : 50 mg x 2 à 3/j IM ou IV	20 cp. 12,5 mg	HOP	II	NR	
	20 cp. 25 mg		II	NR	
	6 amp. 50 mg/2 mL		II		

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (4)

### Modalités de prescription

Dans les affections aiguës un certain nombre de modalités communes se retrouvent.

La posologie initiale peut être maximale, dite « d'attaque », et après 2 j on prescrira une dose moins élevée mais suffisante. Ni la dose, ni la durée, ne peuvent être fixées d'avance, car elles dépendent de l'évolution et de la tolérance.

Dans tous les cas :

- respect des contre-indications classiques ;
- ne pas associer 2 AINS ;
- ne pas associer un AINS et un antalgique dérivé des AINS (*ADVIL*, *NUROFEN*, *TOPREC*, etc.) ;
- prendre des précautions en fonction du patient et de ses antécédents.

### Choix du produit

On ne peut définir de hiérarchie précise entre les différents anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'essentiel étant d'obtenir un équilibre entre l'efficacité et la tolérance. Le choix du produit est guidé par :

- une préférence du patient (intolérance ou efficacité lors d'une prescription préalable) ;
- la chronopharmacologie : les **oxicams** se prescrivent en 1 seule prise quotidienne, ce qui est plus simple chez un sujet polymédicamenté, mais ils ont une demi-vie prolongée, ce qui constitue plutôt un inconvénient chez le sujet âgé ;
- des propriétés particulières : risque de vertiges et de céphalées plus grand avec l'**INDOCID**, risque hématologique avec la **phénylbutazone** (qui n'est plus commercialisée).

À titre d'exemple on prescrira :

- **FELDÈNE** : 20 mg : 1 gél. ou 1 cp. dispersible, x 1 ou 2/j pendant 2 j, puis 1/j pendant 4 à 8 j ; ou un autre **oxicam** de la même façon : **BREXIN**, **CYCLADOL**, **TILCOTIL**, **MOBIC** 15 mg, ou un générique ;
- ou pendant les 2 à 6 premiers j, **VOLTARÈNE**, 50 mg, ou **CEBUTID**, 100 mg, ou un générique : 1 cp. aux 3 repas, ou **PROFÉNID**, 100 mg, ou **NAPROSYNE** 500 mg, ou **APRANAX** 550 mg : 1 cp. matin et soir aux repas. Une dose moindre sera ensuite prescrite chaque fois que possible.

**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (4) –  
ARYLCARBOXYLIQUES (4) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique.  
Action inhibitrice sur la synthèse des prostaglandines, et sur l'agrégation plaquettaire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, et de certaines arthroses ; traitement de courte durée de poussées de rhumatisme abarticulaire, d'arthrite microcristalline, d'arthrose, de lombalgies, de cervicalgies, de radiculalgies sévères.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles des **AINS** en général, plus :  
– **grossesse** : à partir du 6<sup>e</sup> mois ;

– **allaitement**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles des **AINS** en général, celles liées à la forme galénique.

Au cours des traitements prolongés, contrôler la formule sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux des **AINS** en général.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles des **AINS** en général, et en particulier le **méthotrexate** à dose supérieure à 15 mg/sem. Pour le **naproxène** : interférence possible avec le dosage urinaire des 17-cétostéroïdes et de l'acide 5-hydroxy-indolacétique (cesser l'administration 48 h avant le dosage).



## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (5)

### Principales interactions médicamenteuses\*

ASSOCIATION	RISQUE DE L'INTERACTION	PRÉCAUTIONS
+ autres <b>AINS</b> , + <b>antalgiques dérivés des AINS</b>	Augmentation du risque ulcérogène et hémorragique digestif	Association déconseillée <b>BPC</b>
+ <b>aspirine</b>	Risque hémorragique	Déconseillé si > 0,5 g/j <b>BPC</b>
+ anticoagulants oraux	Augmentation du risque hémorragique	Si Tt indispensable, adaptation des <b>AVK</b> à TP, INR
+ <b>héparines</b>	Augmentation du risque hémorragique	Si Tt indispensable, surveillance clinique et biologique pour les <b>héparines non fractionnées</b>
+ diurétiques	Insuffisance rénale aiguë si sujet déshydraté	Hydratation, surveillance de la fonction rénale (au début surtout)
+ <b>inhibiteurs de l'enzyme de conversion</b>	Insuffisance rénale aiguë si sujet déshydraté Diminution de l'effet antihypertenseur	Éviter l'association Si traitement indispensable, hydratation, surveillance de la fonction rénale (au début surtout)
+ <b>β-bloquants</b>	Réduction de l'effet antihypertenseur	À prendre en compte
+ <b>ticlopidine</b>	Risque hémorragique	Éviter l'association
+ <b>pentoxifylline</b>	Risque hémorragique	Surveillance clinique, contrôle TS
+ <b>lithium</b>	Surdosage	Déconseillé ou contrôle de la lithémie
+ <b>méthotrexate</b> à dose élevée (> 20 mg/sem., cancérologie)	Toxicité hématologique accrue (association contre-indiquée pour <b>phénylbutazone</b> , déconseillée pour <b>kétoprofène</b> )	Contre-indication (mais pas en rhumatologie : doses faibles, d'où simple surveillance biologique)
+ <b>ciclosporine</b>	Addition des effets néphrotoxiques, sujet âgé surtout	À prendre en compte
+ <b>zidovudine</b>	Toxicité hématologique (réticulocytes)	NFS et réticulocytes 8 et 15 j après le début du traitement
+ <b>sulfamides hypoglycémiantes</b>	Risque d'hypoglycémie avec les pyrazolés	Éviter l'association
+ stérilet	Risque de grossesse par inefficacité	Prévenir la patiente

\* Certains **AINS** ont en outre des interactions médicamenteuses propres, qui sont signalées avec chacun des produits.

**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (5) – OXICAMS****■ Piroxicam**

<b>FELDÈNE</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ;	30 gél. 10 mg	3,74	I	30 %	0,12
arthrose, rhumatismes abarticulaires	15 gél. 20 mg	4,03	I	30 %	0,27
Posologies variables selon le tableau clinique : 10 à 20 mg/j, en 1 seule prise ;	15 sup. 20 mg	6,80	I	15 %	0,45
rarement 40 mg/j	2 amp. 20 mg IM	2,77	I	15 %	1,39
<b>FELDÈNE DISPERSIBLE</b>					
Idem <b>FELDÈNE</b>	15 cp. disp. 20 mg	4,03	I	30 %	0,27

**■ Piroxicam-bêta-cyclodextrine**

<b>BREXIN</b>					
Idem <b>FELDÈNE</b>	14 cp. séc. 20 mg	6,45	I	30 %	0,46
	14 cp. efferv. 20 mg	6,45	I	30 %	0,46
<b>CYCLADOL</b>					
Idem <b>FELDÈNE</b>	14 cp. séc. 20 mg	6,45	I	30 %	0,46
	14 cp. efferv. 20 mg	6,45	I	30 %	0,46

Pour la **cyclodextrine**, dégradée en glucose, limiter l'utilisation prolongée chez le diabétique.

**■ Ténoxicam**

<b>TILCOTIL</b>					
Idem <b>FELDÈNE</b>	15 cp. séc. 20 mg	7,27	I	65 %	0,48

**■ Méloxicam**

<b>MOBIC</b>					
Posologie variable : 7,5 à 15 mg x 1/j	14 cp. 7,5 mg	3,71	I	65 %	0,27
	50 cp. 7,5 mg	HOP	I		
	14 cp. séc. 15 mg	6,56	I	65 %	0,47
	50 cp. séc. 15 mg	HOP	I		
	3 amp. 1,5 mL/15 mg	3,56	I	30 %	1,19

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (6) – INDOLIQUES

## ■ Indométacine

<b>INDOCID</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques ; poussées d'arthrose, de rhumatismes abarticulaires Posologies variables selon le tableau clinique : 50 à 150 mg/j	30 gél. 25 mg	3,69	I	65 %	0,12
	10 sup. 100 mg	4,47	I	30 %	0,45
<b>CHRONO-INDOCID</b>					
1 à 2 gél./j	20 gél. 75 mg	7,69	I	65 %	0,38

## ■ Sulindac

<b>ARTHROCINE</b>					
Idem <b>INDOCID</b>	40 cp. séc. 100 mg	5,34	I	65 %	0,13
	30 cp. séc. 200 mg	8,05	I	65 %	0,27

**PROPRIÉTÉS**

Anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique.  
Action inhibitrice sur la synthèse des prostaglandines, et sur l'agrégation plaquettaire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, et de certaines arthroses ; traitement de courte durée de poussées de rhumatisme abarticulaire, d'arthrite microcristalline, d'arthrose, de lombalgies, de cervicalgies, de radiculalgies sévères.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles des **AINS** en général, plus :  
– antécédents d'allergie aux composants, à l'**aspirine** et autres **AINS** ;  
– insuffisance hépatique ou rénale sévère.

**Grossesse et allaitement.****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Celles des **AINS** en général, plus :  
– celles liées à la forme galénique ;

– sujet âgé (plus d'effets indésirables), troubles psychiques, Parkinson, épilepsie.

Au cours des traitements prolongés : contrôle de la formule sanguine, des fonctions hépatique et rénale, et nécessité de surveillance oculaire.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux des **AINS** en général, plus :

- céphalées, sensations d'étourdissement, de tête vide, acouphènes, surtout au début (souvent transitoires ; prévenir le patient, tester la 1<sup>re</sup> prise le soir au coucher) ;
- anomalies rétinienues et cornéennes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles des **AINS** en général, plus :

- **desmopressine (MINIRIN)** ; action potentialisée) ;
- **topiques gastro-intestinaux** : diminution de l'absorption de l'**indométacine** ; prendre les **antiacides** à distance (2 h).

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (7) – INHIBITEURS PRÉFÉRENTIELS COX 2

### ■ Nabumétone

<b>NABUCOX</b>					
Rhumatismes inflammatoires chroniques, poussées d'arthrose, de rhumatismes articulaires 1 à 2 g/j	28 cp. pell. 500 mg	5,86	I	65 %	0,21
	14 cp. disp. 1 g	5,86	I	65 %	0,42
	28 cp. disp. 1 g	10,55	I	65 %	0,38

Se référer à l'inhibiteur sélectif COX 2 (célecoxib) pour la pharmacologie (ci-après).

## ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (8) – INHIBITEURS DITS SÉLECTIFS COX 2

### ■ Célécoxib

<b>CELEBREX</b>					
Arthrose : 200 mg en 1 ou 2 prises à augmenter si besoin à 200 mg x 2/j Polyarthrite rhumatoïde : 200 à 400 mg en 2 prises	30 gél. 100 mg	8,57	I	65 %	0,29
	100 gél. 100 mg	HOP	I		
	30 gél. 200 mg	16,61	I	65 %	0,55
	100 gél. 200 mg	HOP	I		

### ■ Étoricoxib

<b>ARCOXIA</b>					
Arthrose : 30 mg x 1/j Max. 60 mg x 1/j	28 cp. 30 mg	14,11	I	30 %	0,50
	98 cp. 30 mg	HOP	I		
	28 cp. 60 mg	22,12	I	30 %	0,79
	50 cp. 60 mg	HOP	I		

### PROPRIÉTÉS

Anti-inflammatoire, par effet inhibiteur sélectif de la cyclo-oxygénase 2.

Alors que les **AINS** classiques, en inhibant la cyclo-oxygénase 1, bloquent l'action cytoprotectrice des prostaglandines, ce qui explique leur effet délétère sur la muqueuse gastrique, cet **AINS** agit sélectivement sur la cyclo-oxygénase 2, ne bloquant que l'action pro-inflammatoire des prostaglandines.

L'action anti-inflammatoire reste équivalente à celle des autres **AINS**. Les **coxibs** semblent être mieux tolérés sur le plan digestif, n'allongent pas le temps de saignement et interfèrent peu avec les **AVK**.

### INDICATIONS

Traitement symptomatique de l'arthrose ou de la polyarthrite rhumatoïde.

### CONTRE-INDICATIONS

Antécédent d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit.

Ulcère gastroduodénal évolutif ou saignement gastro-intestinal.

Insuffisance hépatique modérée ou sévère.

Clairement de la créatinine estimée < 30 mL/min.

Antécédent d'asthme, de rhinite aiguë, de polypes nasaux, d'œdème de Quincke ou d'urticaire déclenchés par la prise d'**aspirine** ou d'autres **AINS**.

Maladie inflammatoire de l'intestin.

Insuffisance cardiaque congestive sévère.

À partir du 3<sup>e</sup> mois de la grossesse et au cours de l'allaitement.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Au cours des études cliniques des perforations d'ulcères ou des saignements ont été rapportés

chez certains patients arthrosiques. Les patients ayant des antécédents d'ulcères et ceux âgés de plus de 65 ans semblaient les plus exposés. À des doses > 25 mg/j : risque de symptômes gastro-intestinaux, d'œdème ou d'HTA augmenté.

Réhydratation préalable des patients déshydratés.

Surveillance attentive de la fonction rénale chez les sujets ayant une altération significative de la fonction rénale, une insuffisance cardiaque non compensée ou une cirrhose hépatique.

Surveillance médicale appropriée chez le sujet âgé.

Attention particulière chez les sujets ayant des œdèmes préexistants de toute nature, et prudence chez les sujets ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance ventriculaire gauche, d'HTA.

Les **coxibs** ne sont pas un substitut de l'**aspirine** utilisée à visée antiagrégante plaquettaire dans la prévention des affections cardiovasculaires ; une telle prescription d'une faible dose d'**aspirine** doit donc être poursuivie pendant le traitement. Le **célécoxib (CELEBREX)** entraîne une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires (IDM). Le traitement avec cette molécule doit être le plus bref possible.

Des élévations des transaminases (> 3N) ont été rapportées chez environ 1 % des patients ; le traitement devra être interrompu en cas de persistance des anomalies.

Les patients présentant des étourdissements, des vertiges ou une somnolence au cours du traitement doivent s'abstenir de conduire ou d'utiliser des machines.

**ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (9) – INHIBITEURS PRÉFÉRENTIELS ET DITS SÉLECTIFS COX 2 – PHARMACOLOGIE****EFFETS INDÉSIRABLES**

Au cours des études cliniques les effets indésirables suivants, imputés au médicament, ont été rapportés avec une incidence supérieure à celle du placebo.

**Fréquents (entre 1/100 et 1/10)**

œdème, rétention liquidienne, douleur abdominale, étourdissement ; HTA ; brûlures d'estomac, gêne épigastrique, diarrhée, nausée, dyspepsie ; céphalée ; prurit.

**Peu fréquents (entre 1/1 000 et 1/100)**

Asthénie, fatigue ; ballonnement abdominal ; douleur thoracique ; constipation, ulcération buccale, vomissement, gaz, reflux acide ; acouphènes ; prise de poids ; crampes musculaires ; insomnie, somnolence, vertige ; dépression, diminution de l'activité intellectuelle ; dyspnée ; rash cutané, dermite atopique.

**Rarement**

Réactions modérées d'hypersensibilité.

**Événements indésirables biologiques relevés****► Fréquents (entre 1/100 et 1/10)**

Élévation des transaminases (ALAT et ASAT) ; diminution de l'hématocrite.

**► Peu fréquents (entre 1/1 000 et 1/100)**

Élévation de l'urée sanguine, de la créatininémie ; diminution de l'hémoglobine ; élévation

des phosphatases acides ; protéinurie ; diminution des érythrocytes et des leucocytes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Warfarine** : chez les sujets stabilisés, l'administration de 25 mg/j de **roféc Coxib** a augmenté d'environ 8 % le temps de Quick exprimé en INR.

**Inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : risque de diminution de l'effet antihypertenseur, et de détérioration supplémentaire de la fonction rénale.

**Aspirine** : à la dose de 50 mg/j, le **roféc Coxib** n'a pas eu d'effet sur l'activité antiplaquettaire d'une faible dose d'**aspirine** (81 mg/j). L'administration concomitante de doses plus élevées d'**aspirine** ou d'un autre **AINS** devra être évitée. **Ciclosporine, tacrolimus** : risque d'augmentation de l'effet néphrotoxique de ces produits.

**Méthotrexate** au cours de la polyarthrite rhumatoïde : nécessité de surveillance de la toxicité.

Attention particulière en cas de co-administration de **théophylline, amitriptyline, tacrine** et **zileuton**.

Pas d'effet cliniquement important sur les paramètres pharmacocinétiques de : **prednisone, prednisolone**, ou **contraceptifs oraux**.

**Rifampicine** : diminution de la concentration plasmatique du **roféc Coxib**. Attention particulière avec les inducteurs puissants du métabolisme hépatique.

## GELS ANTI-INFLAMMATOIRES (1)

## ■ Diclofénac

<b>VOLTARÈNE ÉMULGEL</b>					
Tendinites ; œdèmes postopératoires et post-traumatiques x 2 à 4/j	1 tube 50 g (1 %) 1 fl. 100 mL (1 %)	2,82 3,86		30 % 30 %	0,06 0,04
<b>VOLTARENACTIGO</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE ÉMULGEL</b>	1 tube 60 g (1 %)			NR	
<b>XÉNID</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE ÉMULGEL</b>	1 tube 60 g (1 %)	2,87		30 %	0,05
<b>FLECTOR</b>					
Idem <b>VOLTARÈNE ÉMULGEL</b>	1 tube 60 g (1 %) 1 fl. 100 g (1 %)	2,87 3,58		30 % 30 %	0,05 0,04
<b>FLECTORTISSUGELEP</b>					
Arthrose du genou, douleur tendino-ligamentaire : 1 appl. matin et soir pendant 7 j	5 sach. emplâtre			NR	
<b>COMPRALFÈNE</b>					
Tendinite, œdème postopératoire ou traumatique, arthrose des doigts : 2 à 4 appl./j	1 tube 50 g (1 %)			NR	

## ■ Kétoprofène

<b>KÉTUM GEL</b>					
2 à 3 appl. de 4 g/j	1 tube 60 g (2,5 %)	2,47	II	30 %	2,47
	1 tube 120 g (2,5 %)	3,78	II	30 %	3,78

## ■ Piroxicam

<b>GELDÈNE</b>					
Tendinites ; traumatologie bénigne 2 à 4 appl. locales/j	1 tube 50 g (0,5 %)	3,16	I	30 %	0,06

**GELS ANTI-INFLAMMATOIRES (2)**■ **Acide niflumique**

<b>NIFLUGEL</b>					
Tendinites ; traumatologie bénigne 1 appl. x 3/j de 5 à 10 cm <sup>3</sup>	1 tube 60 g gel (2,5 %)	2,95	I	30 %	0,05

■ **Ibuprofène**

<b>CLIPTOL</b>					
Traumatologie bénigne : 1 appl. x 3/j Traitement de 5 j max	1 tube 50 g (5 %)			NR	
<b>IBUTOP</b>					
Idem <b>CLIPTOL</b>	1 tube 50 g (5 %)			NR	
<b>NUROFEN</b>					
Idem <b>CLIPTOL</b>	1 tube 50 g (5 %)			NR	



**GELS ANTI-INFLAMMATOIRES (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Action anti-inflammatoire (**AINS**) et antalgique locale.

**INDICATIONS**

Arthrose des petites articulations.

Tendinites des membres supérieurs et inférieurs.

Traumatologie bénigne (entorses).

Traitement symptomatique de la lombalgie aiguë.

Traitement des veinites post-sclérothérapie, en cas de réaction inflammatoire intense.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : contre-indication à partir du 6<sup>e</sup> mois.

**Allaitement** : à éviter, par prudence.

Allergie au produit et aux substances d'activité proches telles que autres **AINS**, **aspirine**.

Allergie à l'un des excipients.

Peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

Enfant (moins de 15 ans).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réservé à l'adulte.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

tion. Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

Il est déconseillé d'appliquer le gel sous pansement occlusif.

L'apparition d'une éruption après application du gel impose l'arrêt immédiat.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Effets liés à la voie d'administration :

- réactions cutanées locales à type de rougeur, prurit et sensations de brûlures ;

- exceptionnellement, réactions plus sévères à type d'eczéma bulleux ou phlycténulaires, pouvant s'étendre ou se généraliser secondairement ;

- réactions cutanées de photosensibilisation.

Réactions d'hypersensibilité :

- dermatologiques ;

- respiratoires : la survenue de crises d'asthme peut être liée chez certains sujets à une allergie à l'**aspirine** ou à un **AINS**. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué ;

- générales : réactions de type anaphylactique.

Autres effets systémiques des **AINS** : ils sont fonction du passage transdermique du principe actif et donc de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée, du degré d'intégrité cutanée, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement occlusif (effets digestifs, rénaux).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Peu probables pour un usage normal.

## CORTICOÏDES PAR VOIE ORALE (1)

## ■ Prednisone

<b>CORTANCYL</b>					
Rhumatismes inflammatoires Posologie variable	30 cp. 1 mg	1,88	I	65 %	0,06
	30 cp. séc. 5 mg	2,61	I	65 %	0,09
	20 cp. séc. 20 mg	3,98	I	65 %	0,20
	100 cp. 20 mg	HOP	I		

## ■ Prednisolone

<b>SOLUPRED</b>					
Idem <b>CORTANCYL</b>	30 cp. efferv. 5 mg	3,22	I	65 %	0,11
	30 cp. orod. 5 mg	3,22	I	65 %	0,11
	50 cp. orod. 5 mg	HOP	I		
	20 cp. efferv. 20 mg	4,88	I	65 %	0,24
	20 cp. orod. 20 mg	4,84	I	65 %	0,24
	50 cp. orod. 20 mg	HOP	I		
	1 mL sol. buv. 1 mg/mL	5,15	I	65 %	5,15

## ■ Méthylprednisolone

<b>MÉDROL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 4 mg	30 cp. séc. 4 mg	3,38	I	65 %	0,11
	100 cp. séc. 4 mg	HOP	I		
	20 cp. séc. 16 mg	5,73	I	65 %	0,29
	100 cp. séc. 16 mg	HOP	I		
	100 cp. séc. 32 mg	HOP	I		
	30 cp. séc. 100 mg	40,04	I	65 %	1,33

## ■ Dexaméthasone

<b>DECTANCYL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	30 cp. séc. 0,5 mg	4,76	I	65 %	0,16

## ■ Bétaméthasone

<b>BETNESOL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	30 cp. efferv. 0,5 mg	2,82	I	65 %	0,09

<b>CÉLESTÈNE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	1200 mL (fl. sol. buv. 40 gtt = 1 mL = 0,5 mg)	3,85	I	65 %	0,00
	20 cp. disp. séc. 3 mg	3,99	I	65 %	0,20

## CORTICOTHÉRAPIE GÉNÉRALE (2)

### Effets indésirables

Ils sont très nombreux.

#### Accidents de surcharge hormonale

Ils sont liés à la durée prolongée ou à la dose élevée nécessaire au traitement : syndrome cushingoïde, rétention sodée, hypokaliémie, diabète, ostéoporose et amyotrophie.

La prévention de l'ostéoporose induite par la corticothérapie est importante (cf. Ostéoporose).

#### Accidents liés au « terrain »

Ils ne sont pas nécessairement proportionnels à la posologie et à la prolongation du traitement : accidents digestifs, accidents psychiques : états d'agitation, syndromes maniaques, psychoses hallucinatoires ou obsessionnelles, accidents oculaires, ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, etc.

#### Surinfections

Réveil d'une tuberculose ancienne, qui doit particulièrement être redouté et surveillé, plus encore chez le sujet âgé ; surinfection à germes banals, assez fréquente, nécessitant alors une antibiothérapie ; mycoses généralisées, aggravation d'une maladie virale (varicelle), sont plus à craindre si la corticothérapie est prescrite dans une hémopathie.

#### Accidents de blocage hypophyso-surrénalien

Le rétrocontrôle surrénalien est très fréquent pour peu que le traitement soit supérieur à 20 mg/j de **CORTANCYL** et prolongé plus de 3 sem. Habituellement, l'insuffisance surrénale est spontanément régressive à l'arrêt du traitement ; il est de règle, pour éviter les phénomènes de rebond et la décompensation de l'insuffisance surrénale, lorsqu'on décide d'arrêter une corticothérapie prolongée, de baisser les doses par paliers : 5 à 10 mg toutes les 1 à 2 sem., puis 1 mg par 1 mg, au-dessous de 10 mg. Cette baisse progressive vise surtout à éviter le rebond de la maladie plutôt que l'insuffisance surrénale. En effet, une corticothérapie peut être, si nécessaire, arrêtée brusquement sous couvert d'une prescription temporaire d'**hydrocortisone** (10 à 30 mg/j) pendant quelques jours.

Les règles d'utilisation des **glucocorticoïdes** doivent être strictes : le moins souvent possible, aux doses les moins élevées possibles, et à condition d'avoir éliminé une contre-indication.

**Contre-indications impératives** : hypertension artérielle sévère et non contrôlée, diabète décompensé, psychopathie aiguë, infection qui ne serait pas « couverte » par une antibiothérapie efficace.

**Contre-indications relatives**, en fonction du rapport risque/bénéfice : antécédent d'ulcère gastroduodénal, insuffisance rénale, thrombose vasculaire par exemple.

**CORTICOIDES PAR VOIE ORALE (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Action anti-inflammatoire puissante, effet immunodépresseur, action sur les métabolismes glucidique, phosphocalcique, lipidique, effet minéralocorticoïde.

**INDICATIONS**

Rhumatismes inflammatoires et connectivites. Certaines névralgies sévères.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : retard de croissance possible.

**Allaitement** : à éviter.

États infectieux ou mycosique non contrôlés, hépatites aiguës.

Herpès et zona ophtalmiques.

États psychotiques.

Vaccins vivants.

Il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Risque de déséquilibre d'un diabète, de rétention hydrosodée, d'aggravation d'une HTA, de fuite potassique, d'ostéoporose, de réveil d'une tuberculose.

En cas d'antécédent ulcéreux, contrôle fibroscopique et traitement préventif éventuel.

Arrêt progressif du traitement pour limiter le risque d'insuffisance surrénale aiguë, de même en cas de stress quelconque.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ostéoporose, ostéonécrose épiphysaire, atrophie musculaire, myopathie ceinture pelvienne, flatulences, gastralgies, gastrite, ulcère gastrique ou duodénal, hémorragies digestives, perforations coliques, pancréatites.

Acné, érythrose du visage, purpura et hématomas, hirsutisme, vergetures, atrophie cutanée, retard à la cicatrisation.

Obésité, syndrome cushingoïde, retard de croissance (enfant), insuffisance surrénale, hyperglycémie, diabète, rétention sodée : risque d'aggravation d'une HTA, d'une insuffisance cardiaque ou rénale.

Fuite potassique (crampes).

Thrombose vasculaire.

Excitation, insomnie, syndrome maniaque ou dépressif.

Cataracte, glaucome.

Sensibilité aux infections, réveil de tuberculose ancienne.

Angiomyelose maligne.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Vincamine** et certains **antiarythmiques** : risque de torsades de pointe.

**Digitaliques**, autres **hypokaliémisants**, **aspirine**, **héparine** et **AVK**, **antidiabétiques oraux** et insuline, **phénobarbital**, **rifampicine**, **antihypertenseurs**, vaccins vivants atténués, **interféron  $\alpha$** .

**CORTICOÏDES INJECTABLES PAR VOIE LOCALE (1)****■ Prednisolone**

<b>HYDROCORTANCYL</b>					
Voie locale Indications : celles de la corticothérapie générale Injection intra-articulaire : 0,5 à 2 mL Injection péri-articulaire : 0,5 à 2 mL Injection épidurale ou intrarachidienne : 75 à 125 mg	1 fl. 5 mL susp. inj. 25 mg/mL	3,87	I	65 %	3,87

**■ Cortivazol**

<b>ALTIM</b>					
0,5 à 1,5 mL/inj. (renouvelable après 1 à 3 sem.)	1 ser. 1,5 mL	5,42	I	65 %	5,42

**■ Bétaméthasone**

<b>BETNESOL</b>					
Corticothérapie locale (voies intra- et péri-articulaires) : 1/4 à 1 mL, tous les 3 à 21 j	3 amp. inj. 4 mg/mL	2,97	I	65 %	0,99
<b>CÉLESTÈNE</b>					
Corticothérapie locale (voies intra- et péri-articulaires) : 1/2 à 1 amp. Voies intradurale contre-indiquée, et péri-durale déconseillée	3 amp. inj. 4 mg/mL	4,48	I	65 %	1,49
<b>DIPROSTÈNE</b>					
0,5 à 1 mL	1 inj. 5 mg/ mL	5,47	I	65 %	5,47

**■ Méthylprednisolone**

<b>DÉPO-MÉDROL</b>					
Voies péri-articulaires : 10 à 40 mg, renouvelables tous les 7 à 10 j Voies intra-articulaires : 4 à 80 mg, toutes les 2 sem., puis espacer	1 ser. 1 mL/40 mg 1 ser. 1 mL/50 mg 1 ser. 2 mL/80 mg	2,47 HOP HOP	I I I	65 %	2,47

**■ Triamcinolone**

<b>HEXATRIONE</b>					
Voie intra-articulaire : 0,5 à 2 mL x 1/mois	1 amp. 2 mL/40 mg	14,10	I	65 %	14,10
<b>KENACORT RETARD</b>					
Idem <b>HEXATRIONE</b>	1 ser. 1 mL/40 mg 1 ser. 2 mL/80 mg	2,84 4,79	I I	65 % 65 %	2,84 4,79

## CORTICOTHÉRAPIE LOCALE – INFILTRATIONS (2)

### Précautions à prendre

#### Précautions générales

Pas d'injection intra-articulaire sans radiographie de l'articulation à infiltrer.

Pas d'infiltration sans avoir éliminé une arthrite infectieuse, y compris tuberculeuse.

Pas d'infiltration pendant une infection en évolution (angine, bronchite, sinusite, etc.). Certains s'assurent par une mesure préalable de la CRP ou des facteurs de la coagulation de l'absence de syndrome inflammatoire associé ou d'un risque hémorragique, cliniquement inattendu.

Peser les avantages chez les sujets à risques (diabète, sujets sous anticoagulants, etc.).

En cas d'injection épidurale, l'arrêt préalable de la prise d'**aspirine** ou d'**antiagrégants plaquettaires** est conseillé.

#### Précautions locales : asepsie stricte

Désinfection large de la surface cutanée autour du point d'injection préalablement marqué à l'ongle, point d'injection que l'opérateur ne touchera plus.

Désinfectant efficace, coloré (alcool iodé, **BÉTADINE**) ou même incolore pourvu qu'il soit efficace (**SEPTÉAL** ou autres solutions de **chlorhexidine** à 0,5 %, etc. ; attention, certaines solutions dosées à 0,05 % sont insuffisantes).

Désinfectant appliqué avec une compresse stérile.

L'emploi de gants stériles est recommandé par certains, mais il n'est pas obligatoire si la désinfection des mains est faite très soigneusement (lavage au savon, alcool).

### Résultats

L'effet bénéfique commence, pour les suspensions, selon les produits entre la 6<sup>e</sup> et la 24<sup>e</sup> h après l'infiltration.

Il peut être retardé, et son inefficacité s'apprécie après la première semaine.

L'effet bénéfique est plus rapide pour les produits hydrosolubles.

### Produits

Le médecin a le choix entre les dérivés cortisoniques soit sous forme soluble, soit sous forme de suspension.

En principe et en règle générale, les dérivés sous forme de suspension sont moins rapidement absorbés et par conséquent d'efficacité souvent plus prolongée que les dérivés solubles.

#### Produits sous forme de suspension

• **Cortivazol** : **ALTIM**, amp.-seringue de 1,5 mL, dosée à 3,75 mg de **cortivazol**.

• **Bétaméthasone** : **DIPROSTÈNE**, seringue préremplie de 1 mL, dosée à 5 + 2 mg de **bétaméthasone**.

• **Méthylprednisolone** : **DÉPO-MÉDROL**, amp.-seringue de 1 mL dosée à 40 mg, ou amp.-seringue de 2 mL, dosée à 80 mg de **méthylprednisolone**.

• La présentation en ampoule-seringue limite encore le risque septique.

• **Triamcinolone** : **HEXATRIONE**, amp. de 2 mL, dosée à 40 mg d'**hexacétone de triamcinolone** ou **KENACORT RETARD**, flacon de 1 mL dosé à 40 mg et de 2 mL dosé à 80 mg de **triamcinolone** (avec seringue et aiguilles).

• **Prednisolone** : **HYDROCORTANCYL** en flacon de 5 mL dosé à 125 mg de **prednisolone**.

#### Produits hydrosolubles

• **Bétaméthasone** : **BETNESOL** injectable (amp. de 1 mL dosée à 4 mg de **bétaméthasone**).

• **Bétaméthasone** : **CÉLÈSTÈNE** injectable (amp. de 1 mL dosée à 4 mg, amp. de 2 mL dosée à 8 mg de **bétaméthasone**, avec seringue et aiguilles).

#### Anesthésique local

Avant de réaliser une infiltration péri-articulaire il est parfois utile d'utiliser un **anesthésique local** ; ou, dans certains cas, de le mélanger au dérivé corticoïde. Par exemple : **lidocaïne (XYLOCAÏNE)** à 1 % (flacon de 20 mL), en l'absence d'allergie connue. Certains utilisent avant l'injection un patch cutané anesthésique.

## CORTICOÏDES INJECTABLES PAR VOIE LOCALE (2) – PHARMACOLOGIE

### PROPRIÉTÉS

Anti-inflammatoires stéroïdiens d'action puissante et rapide.

### INDICATIONS

Injection intra-articulaire : arthrite inflammatoire, arthrose en poussées.

Injection dans les parties molles : talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : pas de contre-indication pour un traitement local occasionnel.

**Allaitement** : déconseillé pendant le traitement.

Infection bactérienne ou mycosique non contrôlée par un traitement spécifique.

Certaines infections virales en évolution, notamment varicelle, herpès et zona à manifestations oculaires.

Goutte.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

États psychotiques.

Cirrhose alcoolique avec ascite.

Hépatites aiguës à virus A, B ou non A - non B. Hypersensibilité à l'un des composants.

Toute affection cutanée évolutive au niveau du point d'injection est une contre-indication à la forme injectable.

**CÉLESTÈNE** : injection intradurale contre-indiquée et injection périurale déconseillée compte tenu du risque de brèche.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'injection doit être faite en peau saine.

Nécessité d'une asepsie rigoureuse.

La corticothérapie peut favoriser la survenue de complications infectieuses.

L'attention des sportifs est attirée sur la possibilité de réaction positive aux tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Certains ne concernent que des injections répétées, d'autres peuvent suivre 1 seule injection.

Rares cas de réactions d'hypersensibilité :

- vasodilatation périphérique ;
- lombalgies transitoires ;

– exceptionnellement œdème de Quincke, choc anaphylactique.

- Effets indésirables propres à la voie locale :
  - propres à la voie d'administration : arthrites septiques et infections, périurites et ménin-gites, bursite septique, abcès ;
  - propres au corticoïde injecté : atrophie localisée des tissus musculaires, sous-cutanés et cutanés ; risque de rupture tendineuse.
- Désordres hydroélectrolytiques : Hypokaliémie, alcalose hypokaliémique, rétention hydrosodée avec parfois hypertension artérielle, voire insuffisance cardiaque congestive.
- Troubles endocriniens et métaboliques : Syndrome de Cushing iatrogène ; inertie de la sécrétion d'ACTH parfois définitive ; atrophie corticosurrénale, parfois définitive ; diminution réversible de la tolérance au glucose ; manifestation d'un diabète sucré latent ; balance azotée négative due au catabolisme protidique ; arrêt de la croissance chez l'enfant ; prise de poids ; parfois irrégularités menstruelles ; hirsutisme.

Le risque de déséquilibre d'un diabète connu est à prendre en compte systématiquement.

- Troubles musculo-squelettiques : Atrophie musculaire ; ostéoporose, avec parfois tassements vertébraux ; ostéonécrose aseptique des têtes fémorales ; ruptures tendineuses.
- Troubles digestifs : Ulcères gastroduodénaux, hémorragies ulcéreuses, perforation d'ulcère, ulcérations du grêle.
- Troubles cutanés : Atrophie cutanée, retard de cicatrisation, purpura, ecchymoses, acné surtout dorsale, hypertrichose.
- Troubles neuropsychiques : Surexcitation avec euphorie et troubles du sommeil ; rarement : accès d'allure maniaque ; états confusionnels ou confuso-oniriques ; possibilité de convulsions.
- Troubles oculaires : Certaines formes de glaucome et de cataracte.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Elles ne concernent que les corticothérapies prolongées, donc *a priori* pas les injections locales de corticoïdes, pour un usage habituel.

**CORTICOÏDES PAR VOIE PARENTÉRALE**■ **Méthylprednisolone**

<b>SOLUMÉDROL</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 4 mg	1 fl. + solv. 20 mg	2,04	I	65 %	2,04
	10 fl. 20 mg/2 mL	HOP	I		
	1 fl. + solv. 40 mg	2,65	I	65 %	2,65
	10 fl. 40 mg/2 mL	HOP	I		
	1 fl. + solv. 120 mg	5,11	I	65 %	5,11
	10 fl. 120 mg	HOP	I		
	10 fl. 500 mg	HOP	I		
	1 fl. pdre solv. 1 g	14,10	I	65 %	14,10

■ **Bétaméthasone**

<b>CÉLESTÈNE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	3 amp. inj. 4 mg/mL	4,48	I	65 %	1,49
<b>CÉLESTÈNE CHRONODOSE</b>					
Équivalence anti-inflammatoire pour 5 mg de <b>prednisone</b> : 0,75 mg	1 amp. 5,7 mg/mL 25 amp. 5,7 mg/mL	2,82 HOP	I I	65 %	2,82



## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (1)

### ■ Diacérhéine

<b>ART</b>					
1 gél. matin et soir, au milieu du repas	30 gél. 50 mg	16,35	I	15 %	0,55
<b>ZONDAR</b>					
Idem <b>ART</b>	30 gél. 50 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antiarthrosique d'action lente (l'effet apparaît vers le 30<sup>e</sup> j de traitement et est significatif vers le 45<sup>e</sup> j).

Son mécanisme d'action reste encore mal expliqué.

#### INDICATIONS

Traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles de l'arthrose.

Remarque : l'action est différée ; le délai de 30 à 45 j nécessaire au développement de l'effet antalgique peut nécessiter d'initier le traitement par les **antalgiques**/anti-inflammatoires habituels dont l'action est immédiate.

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : il est recommandé de ne pas administrer la **diacérhéine** pendant les 3 premiers mois.

**Allaitement** : contre-indication.

Allergie avérée à la rhéine et aux substances d'activité proche.

Insuffisance hépatique sévère.

Ne pas administrer à l'enfant (moins de 15 ans).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Chez l'insuffisant rénal (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min), les posologies quotidiennes sont à réduire de moitié.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

L'effet indésirable le plus fréquemment signalé est une diarrhée bénigne ou des selles molles, des douleurs abdominales.

Le traitement peut entraîner une coloration des urines variant du jaune orangé au rouge, voire au marron.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'administration d'un **antiacide** d'action locale simultanée ou décalée de 1 h par rapport à la prise d'**ART** diminue significativement la quantité de rhéine circulante.

L'administration concomitante d'**ART** et d'**anti-H<sub>2</sub>** de type **cimétidine** ne modifie pas de façon significative les paramètres pharmacocinétiques plasmatiques et urinaires de la rhéine.

## ARTHROSE DU GENOU (1)

### Mesures d'hygiène

Elles sont indiquées dans tous les cas, et en fonction de l'importance des symptômes.

- Déconseiller la station debout prolongée, la marche en terrain accidenté, la montée et la descente des escaliers.
- Conseiller un repos en décubitus et l'utilisation d'une canne du côté le moins douloureux pour diminuer l'appui en cas de poussée particulièrement intense.
- Lutter contre la tendance à l'ankylose et la rétraction du genou, contre l'amyotrophie quadriceps, par une éventuelle kinésithérapie adaptée, en période de moindre douleur ; autorééducation visant à renforcer les quadriceps.

### Traitement médicamenteux

#### Cas simples

Quand la gonarthrose se résume à une simple gêne ou à un « fond douloureux » peu intense, elle est justiciable de :

- **aspirine**, si bien tolérée : 500 mg aux 2 ou 3 repas principaux ;
- **paracétamol** 500 mg :
  - pour une poussée arthrosique « simple » : 1 cp. ou gél. toutes les 4 h. (vers 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), plus 1 ou 2 prises/j, pendant 1 à 3 sem. ou jusqu'à la fin de la poussée,
  - en dehors des poussées : 1 cp. ou gél. 1/2 h avant une activité importante, et 1 cp. ou gél. après, si nécessaire ;
- éventuellement prescription d'un **AASAL** ;
- en cas de douleurs plus importantes, on peut proposer une **association d'antalgiques** (paracétamol + codéine, caféine ou autres) ou l'association **paracétamol + tra-**

**madol (IXPRIM)** : 1 cp./4-6 h, si elles sont bien tolérées et utiles avec un certain recul ;

- dans certains cas l'injection intra-articulaire d'une ampoule d'un dérivé corticoïde : **cortivazol (ALTIM)**, **bétaméthasone (DIPROSTÈNE)**, **triamcinolone (HEXATRIONE)** assure une amélioration suffisante permettant de s'abstenir de toute autre thérapeutique pendant une longue période (plusieurs mois ou années parfois).

C'est dans ces formes que l'indication de la **visco-supplémentation** peut se discuter et semble avoir des résultats intéressants : inj. de 1 amp. de l'un des produits disponibles, à renouveler, « classiquement », 1 et 2 sem. après.

#### Cas complexes

Quand les manifestations sont plus intenses, et/ou en cas de poussées congestives avec épanchement.

##### ► Prescription d'un AINS

Elle est indiquée pour une cure de durée limitée (quelques semaines en général), à dose variable, mais suffisante et adaptée à chaque patient.

Le choix du produit est affaire d'habitudes et de tolérance, avec ou sans protection gastrique systématique.

Chez certains sujets, la prescription d'**AINS** doit être maintenue de façon prolongée, mais alors à la dose minimale active, et en renforçant la surveillance au long cours ;

##### ► Injection intra-articulaire d'un dérivé corticoïde

Elle peut utilement remplacer la prescription d'un **AINS**, ou lui être associée (cf. Injections intra-articulaires).

## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (2)

### ■ Chondroïtine sulfate sodique

<b>CHONDROSULF</b>					
1 gél. ou sach. x 3/j, aux repas	84 gél. 400 mg	20,81	I	15 %	0,25
	84 sach. 400 mg	20,81	I	15 %	0,25
<b>STRUCTUM</b>					
1 gél. x 2/j, aux repas	60 gél. 500 mg		I	NR	

#### PROPRIÉTÉS

Antiarthrosique d'action lente (l'effet est retardé de 2 mois environ et peut persister après l'arrêt du traitement).

#### INDICATIONS

Traitement symptomatique à action retardée des manifestations fonctionnelles de l'arthrose (gonarthrose et coxarthrose).

#### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** et **allaitement** : absence de données.

Allergie à l'un des constituants du produit.

Enfant (moins de 16 ans).

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prise au moment des repas.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

Cutanés : des éruptions érythémateuses de type allergique ont été décrites.

Digestifs : rarement nausées, vomissements.

## ARTHROSE DU GENOU (2)

### Traitement chirurgical

Dans un petit nombre de cas, en regard de la grande fréquence des gonarthroses relativement bien tolérées, un traitement chirurgical peut et mérite d'être envisagé. Lorsque la destruction cartilagineuse entraîne un handicap fonctionnel manifeste, l'indication de la mise en place d'une **prothèse du genou** doit alors être envisagée, en tenant compte de l'état général du sujet et de son autonomie préalable. Les suites en sont relativement courtes, et le résultat fonctionnel très appréciable chaque fois que les indications en ont été soigneusement discutées.

L'appréciation du handicap fonctionnel peut se faire à partir de l'indice algofonctionnel de Lequesne (cf. Arthrose).

Lorsque le cartilage est encore suffisant et chez un sujet jeune, il est possible d'envisager :

- une *ostéotomie de correction*, lorsqu'un genu valgum ou surtout un genu varum s'aggravant régulièrement augmentent les douleurs ;

- une *transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure* dans certaines formes d'arthrose fémoro-patellaire évoluées, avec subluxation externe de la rotule réagissant mal à une rééducation du quadriceps et au traitement médical.

### Recommandations de l'Eular 2003 pour la prise en charge de la gonarthrose [1]

1. Le traitement optimal de l'arthrose du genou requiert l'association d'un traitement pharmacologique et non pharmacologique.
2. Ce traitement doit être individualisé en tenant compte des facteurs de risque propres au genou (obésité, contraintes mécaniques, activité physique), des facteurs de risque généraux (âge, polymédication, etc.), de l'intensité de la douleur et du handicap qu'elle entraîne, de la présence de signes inflammatoires (particulièrement les épanchements), de la localisation et du degré de l'atteinte structurale.
3. Le traitement non pharmacologique doit inclure une éducation régulière du patient, des exercices, l'utilisation de dispositifs d'aide (cannes, semelles, attelles) et une perte de poids.
4. Le **paracétamol** est l'antalgique de premier choix. En cas de succès, la prise doit être poursuivie à long terme.
5. Les applications d'**anti-inflammatoires (AINS)** ou de **capsaïcine** sont efficaces et sans danger.
6. Les **AINS** devraient être utilisés chez les patients qui ne répondent pas au **paracétamol**. En cas de risque gastro-intestinal, il faut préférer les **coxibs**.
7. Les **opioïdes**, avec ou sans **paracétamol**, représentent une option en cas de contre-indication ou d'inefficacité des **AINS**.
8. Les **antiarthrosiques d'action lente** ont un effet symptomatique et peuvent modifier le cours de la maladie.
9. Les injections intra-articulaires de **corticostéroïdes** à longue durée d'action sont indiquées en cas de flambée inflammatoire, surtout s'il y a épanchement concomitant.
10. Les prothèses devraient être proposées aux patients avec douleur réfractaire, handicap certain et évidence radiologique de la gonarthrose.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge de la gonarthrose, Eular, 2003

## ANTIARTHROSQUES SYMPTOMATIQUES D'ACTION LENTE (AASAL) (3)

### ■ Insaponifiables de soja et d'avocat

#### **PIASCLÉDINE**

1 gél./j au milieu d'un repas	15 gél. 300 mg	7,69	I	15 %	0,51
-------------------------------	----------------	------	---	------	------

#### **INDICATIONS**

Utilisé en traitement d'appoint des douleurs arthrosiques.

Médication à visée trophique.

#### **EFFETS INDÉSIRABLES**

Rares régurgitations à odeur lipidique qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu d'un repas.

**VISCO-SUPPLÉMENTATION****■ Hyaluronate de sodium**

<b>HYALGAN</b>					
Traitement symptomatique de l'arthrose	1 ser. 20 mg/2 mL	29,74	I	65 %	29,74

**PROPRIÉTÉS**

Agent de remplacement et supplément temporaire du liquide synovial, qui vise à rétablir les propriétés physiologiques et rhéologiques des tissus de l'articulation arthrosique, à réduire la douleur et la gêne, et à accroître l'ampleur du mouvement.

**INDICATIONS**

Arthrose du genou essentiellement ; plus rarement arthrose de la hanche, voire rhizarthrose du pouce (injection de préférence sous contrôle radiologique).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients.

Ne pas injecter sur un genou infecté ou en cas de poussée inflammatoire importante, ni en cas de stase veineuse ou lymphatique de la jambe, ni en cas d'infection ou de lésion cutanée au site de l'injection.

Le produit n'a pas été évalué chez la femme enceinte ni chez l'enfant, circonstances inhabituelles d'arthrose.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas injecter par voie intravasculaire, ni en dehors de la cavité articulaire ou dans le tissu synovial ou la capsule.

Ne pas injecter en cas d'épanchement impor-

tant ; toujours aspirer un éventuel liquide avant l'injection.

Pour la désinfection cutanée, il est conseillé dans les notices d'éviter les produits à base d'ammonium quaternaire (**chlorure de benzalkonium**) ou de **chlorhexidine** qui sont susceptibles d'entraîner une précipitation du produit. Il est recommandé que l'injection, qui doit être faite par un rhumatologue, un chirurgien orthopédiste ou un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit suivie d'une période de repos physique, et parfois de l'application d'une poche de glace.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Réaction d'hypersensibilité (allergie aux produits d'origine aviaire et à certaines protéines) : démangeaison, éruption, urticaire.

Une rougeur ou un œdème local modéré peuvent survenir après l'injection ; très rarement une réaction inflammatoire articulaire conduit à évacuer le genou (le liquide sera systématiquement analysé pour écarter une cause infectieuse ou microcristalline) et à prescrire un **AINS**.

Une asepsie rigoureuse, une injection en dehors de tout contexte infectieux général et local doivent permettre d'éviter le risque d'infection articulaire.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le produit n'a pas d'effet systémique connu.

**MYORELAXANTS**■ **Thiocolchicoside**

<b>COLTRAMYL</b>					
1 cp. x 1 à 3/j	12 cp. 4 mg	4,08	I	15 %	0,34
<b>MIOREL</b>					
Idem <b>COLTRAMYL</b> 1 amp. x 2/j	12 gél. 4 mg	3,54	I	15 %	0,30
	24 gél. 4 mg	6,03	I	15 %	0,25
	5 amp. IM 4 mg/2 mL		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Myorelaxant non benzodiazépinique.

**INDICATIONS**

Traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie ; en pathologie rachidienne aiguë pour la voie IM.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : à éviter.

■ **Adénosine triphosphate**

<b>ATÉPADÈNE</b>					
Dorsalgies primitives : 1 gél. x 2-3/j	30 gél. 30 mg			NR	

**PROPRIÉTÉS**

L'**adénosine triphosphate** intervient dans le métabolisme du tissu musculaire et nerveux.

**Allaitement** : utilisation déconseillée.

Allergie au **thiocolchicoside**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Réduire la posologie en cas de diarrhée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Possibilités de manifestations allergiques. Gastralgies, diarrhées. Pour la forme injectable, rares cas d'excitation ou d'obnubilation passagère.

**INDICATIONS**

Dorsalgies primitives.

## ANTIGOUTTEUX (1) – COLCHICINE SEULE OU ASSOCIÉE

## ■ Colchicine

<b>COLCHICINE OPOCALCIUM</b>					
Accès aigu de goutte : - J1 : 3 mg en 3 prises - J2 et J3 : 2 mg en 2 prises - J4 et après : 1 mg le soir Prophylaxie des accès de goutte : 1 mg le soir	20 cp. 1 mg	3,37	I	65 %	0,17

**PROPRIÉTÉS**

Antigoutteux, anti-inflammatoire, par diminution de l'afflux leucocytaire, inhibition de la phagocytose des microcristaux.

**INDICATIONS**

Accès aigu de goutte, de chondrocalcinose, et de rhumatismes à hydroxyapatite.  
Prévention des accès goutteux.  
Maladie périodique, maladie de Behçet.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** : en cas de grossesse le traitement peut être poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse si la pathologie le justifie.  
Insuffisance rénale grave.  
Insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance attentive des patients en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.  
En cas de traitement au long cours : surveillance de l'hémodiagramme.

## ■ Tiémonium + opium + colchicine

<b>COLCHIMAX</b>					
Idem <b>COLCHICINE OPOCALCIUM</b>	20 cp. séc. 1 mg	4,93	I	65 %	0,25

**PROPRIÉTÉS**

Celles de la **colchicine**.  
Le **tiémonium** et la poudre d'**opium** sont destinés à limiter l'apparition des phénomènes diarrhéiques dus à la **colchicine**.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles de la **colchicine**, plus :  
– glaucome à angle fermé ;  
– hypertrophie prostatique.  
**Allaitement** : contre-indication, en raison du risque d'effets atropiniques chez l'enfant.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : le traitement peut être poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse si la pathologie le justifie.  
Précautions d'emploi de la **colchicine**, plus celles liées au **tiémonium** : hypertrophie pros-

ter (risque de rétention urinaire) ; insuffisance coronarienne, troubles du rythme ; hyperthyroïdie ; bronchite chronique ; iléus paralytique, atonie intestinale chez le sujet âgé, mégacolon toxique.

**INTOXICATION**

Il s'agit habituellement d'intoxications volontaires. La dose toxique est atteinte dès 10 mg et mortelle au-delà de 40 mg. Il n'existe pas d'antidote. Le traitement est uniquement symptomatique, en milieu hospitalier, après lavage d'estomac puis aspiration duodénale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs : diarrhée, nausées, vomissements. Ce sont les premiers signes d'un surdosage ; il faut réduire les doses ou arrêter le traitement. Éventuellement remplacer par **COLCHIMAX**, ou ajouter un **antidiarrhéique**.  
Urticaire et éruptions morbilliformes.  
Troubles hématologiques exceptionnels : leucopénie, neutropénie, thrombopénie.  
Azoospermie.  
Troubles neuromyopathiques, réversibles à l'arrêt du traitement.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune.

tique (risque de rétention urinaire) ; insuffisance coronarienne, troubles du rythme ; hyperthyroïdie ; bronchite chronique ; iléus paralytique, atonie intestinale chez le sujet âgé, mégacolon toxique.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux de la **colchicine**, plus ceux liés au **tiémonium** : sécheresse buccale, épaississement des sécrétions bronchiques, diminution de la sécrétion lacrymale, troubles de l'accommodation, tachycardie, palpitations, constipation, rétention urinaire, excitabilité, irritabilité, confusion mentale chez les personnes âgées.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Atropine et substances atropiniques (**antidépresseurs imipraminiques, antihistaminiques H<sub>1</sub>, sédatifs, antiparkinsoniens, anticholinergiques**).



## GOUTTE (2)

### Traitement de fond

Il a pour but de raréfier les crises aiguës, de minimiser les destructions articulaires, de retarder l'atteinte rénale.

On dispose de deux médicaments : soit la **colchicine**, soit les **hypo-uricémiants**, qui se complètent le plus souvent, mais répondent à des indications bien précises.

### Colchicinothérapie continue

Son but est de prévenir les récives inflammatoires, mais elle n'influence nullement les arthropathies uratiques ni les complications rénales, car elle ne fait pas baisser l'uricémie.

L'indication majeure est représentée par les gouttes sévères comportant plusieurs crises aiguës annuelles, et les impossibilités de prescription de l'**allopurinol**.

Il suffit d'administrer 1 cp. de **colchicine** 1 mg tous les j, ou bien 3 à 4 j/sem.

En cas d'accès aigu il faut traiter le malade à la même dose que pour un premier accès.

Ce traitement est habituellement parfaitement toléré et ne nécessite comme surveillance qu'un hémogramme tous les 6 mois.

### Hypo-uricémiants

Le but des **hypo-uricémiants** est d'abaisser l'uricémie à une concentration dite de sécurité, c'est-à-dire inférieure à 430  $\mu\text{mol/L}$  (70 mg/L), pour prévenir ou faire régresser les dépôts uratiques, pour retarder ou empêcher la survenue de la néphropathie goutteuse.

On utilise de préférence un **inhibiteur de l'uricosynthèse** : **allopurinol** (**ZYLORIC**) ou **fébuxostat** (**ADENURIC**). Il est indispensable de le commencer à distance d'une crise aiguë (au moins un mois), pour éviter la survenue d'accès goutteux.

### ► Inhibiteurs de l'uricosynthèse

#### Indications

Toutes les gouttes, mais nécessairement les cas de goutte suivants :

- gouttes avec lithiase urique ;
- gouttes avec hyperuraturie ;
- gouttes avec insuffisance rénale sévère (ce sont les contre-indications des **uricosuriques**).

### Modalités de prescription

- Dose progressivement croissante d'**allopurinol**, en commençant par 100 mg/j, puis augmentée par paliers de 100 mg toutes les 6 à 8 sem, jusqu'à l'obtention du chiffre souhaité d'uricémie ; par exemple : **allopurinol** (**ZYLORIC** 100 mg) ou générique, 1 cp./j le 1<sup>er</sup> mois, puis adaptation en fonction des valeurs d'uricémie.

- Colchicinothérapie associée impérative : **colchicine**, 1 mg, 1 cp./j, pendant 2 à 3 mois.

- Apport liquidien et alcalinisation des urines (cf. ci-après Régime).

- L'arrêt de l'**allopurinol** est suivi de la remontée très rapide de l'uricémie, en 7 à 10 j.

- La **rasburicase** (**FASTURTEC**) est un nouvel **inhibiteur de l'uricosynthèse**, réservé à l'usage hospitalier, indiqué dans le traitement et la prévention des hyperuricémies induites par les chimiothérapies, qui a été exceptionnellement utilisé chez des patients atteints de goutte tophacée, en échec d'un traitement antérieur par **allopurinol** (par intolérance ou inefficacité secondaire à la présence d'une insuffisance rénale).

### ► Uricosuriques

#### Indications

- Devenues exceptionnelles, limitées aux impossibilités d'utiliser les **inhibiteurs de l'uricosynthèse**, dans les formes sévères de goutte nécessitant absolument d'abaisser l'uricémie.

- Et sous réserve des conditions suivantes : absence d'insuffisance rénale, uraturie < 600 mg/24 h.

### Modalités de prescription

- Le **probenécide** (**BENEMIDE**) n'est disponible qu'en pharmacie hospitalière, et après prescription initiale hospitalière.

- La **benzbromarone** (**DESURIC**), après avoir été retirée du commerce, est disponible après demande d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU).

## ANTIGOUTTEUX (2) – INHIBITEURS DE L'URICOSYNTHÈSE (1)

## ■ Allopurinol

<b>ZYLORIC</b>					
Traitement de l'hyperuricémie symptomatique, de la goutte Posologie variable : 100 à 300 mg/j	28 cp. 100 mg	2,11	I	65 %	0,08
	100 cp. 100 mg	HOP	I		
	28 cp. 200 mg	2,84	I	65 %	0,10
	100 cp. 200 mg	HOP	I		
	28 cp. 300 mg	3,40	I	65 %	0,12
	100 cp. 300 mg	HOP	I		

**PROPRIÉTÉS**

Hypo-uricémiant rapide par inhibition de l'uricosynthèse ; diminue l'uricémie et l'uraturie.

**INDICATIONS**

Hyperuricémies symptomatiques, primitives ou secondaires.

Goutte, goutte tophacée, arthropathies uratiques.

Hyperuricuries et hyperuraturies ; lithiase urique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : prescription déconseillée.

**Allaitement** : prescription déconseillée.

Hypersensibilité à l'**allopurinol**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne jamais commencer un traitement pendant une crise de goutte, ni pendant le mois suivant. Associer la colchicine pendant les 2 à 3 premiers mois du traitement.

Attention particulière en cas d'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Prendre les comprimés de préférence après le repas.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Crises de goutte, surtout en début de traitement (associer la **colchicine**).

Épigastralgies, nausées, diarrhée, rarement importantes.

Réactions cutanées rares : éruptions prurigineuses, papulo-érythémateuses ou eczématiformes, devant faire arrêter le traitement. La réintroduction du traitement est parfois possible après désensibilisation.

Hypersensibilité généralisée (en particulier en cas d'insuffisance rénale) : arrêt immédiat et définitif.

Très rarement : cytopénies voire aplasie médullaire (en particulier en cas d'insuffisance rénale) ; céphalées, vertiges, neuropathies ; gynécomastie ; hépatite granulomateuse.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Association déconseillée avec les **pénicillines du groupe A** (risque accru de réactions cutanées), et avec la **vidarabine** (risque accru de troubles neurologiques).

Précautions d'emploi avec : anticoagulants oraux (potentialisation, contrôler plus souvent TP et INR), **cytostatiques-antimétabolites** (**azathioprine** et **mercaptopurine**, diminuer leur dose), **chlorpropamide** chez l'insuffisant rénal (risque d'hypoglycémie), **théophylline** (augmentation de la théophyllinémie pour de très fortes doses d'**allopurinol** : 600 mg/j).

## GOUTTE (3)

### Régime au cours de la goutte

Il reste utile et classique mais ne constitue qu'un volet de cette thérapeutique de fond. Il comporte les éléments suivants.

- **Régime hypocalorique** et cure d'une obésité éventuelle.

- **Éviction des aliments riches en purines**, notamment : ris de veau, foie, rognons, cervelle, anchois, sardines, harengs, extraits de viande.

- **Régime pauvre en lipides** : éviter les œufs, le lait et les produits laitiers, la charcuterie.

- **Sont autorisés** : jambon, poulet, poisson, 1 fois/j, 6 j/sem.

- **Suppression souhaitable des boissons alcoolisées, et plus particulièrement de la bière.**

- **Cure de diurèse** nécessitant l'absorption de 2 à 3 L d'eau par jour, par exemple : Évian, Vittel, ou Contrexéville.

- **Alcalinisation** conseillée pour éviter la précipitation urinaire de l'acide urique ; elle peut être réalisée soit par l'eau de Vichy (1/2 L/j), soit par le *Fonctril 4 000*, un paquet trois fois par jour dans un verre d'eau, 1 j/2 ou 20 j/mois par exemple. Dans les deux cas, il faudra tenir compte de l'apport sodé consécutif.

### Précautions à prendre chez les gouteux

Certains médicaments peuvent favoriser une crise de goutte :

- certains **diurétiques**, les salidiurétiques surtout ;

- la **vitamine B12** ;

- certains antibiotiques : **pénicilline, érythromycine ; pyrazinamide** ;

- certains anticoagulants, les dérivés de la coumarine notamment.

### LE PATIENT GOUTTEUX DOIT ÊTRE AVERTI ET COMPRENDRE

- Que le traitement de la crise aiguë et celui de la maladie goutteuse ont des objectifs différents : ils se complètent, mais ne se remplacent pas.

- Qu'une uricémie normale ne le met pas à l'abri d'une crise de goutte, même si elle en diminue considérablement la fréquence.

- Que certaines circonstances sont susceptibles de déclencher une crise : **interventions**

**chirurgicales**, voyages, traumatismes, certains aliments spécifiques à un malade, d'où l'utilité, parfois, d'administrer préventivement de la **colchicine**.

- **Qu'il ne doit pas interrompre ses médicaments, sans avis médical, même en cas de crise de goutte intercurrente**, qui doit être traitée par la **colchicine**.

*Toute intervention chirurgicale* est susceptible de déclencher un accès aigu.

Chez un gouteux avéré, elle peut être encadrée par une thérapeutique préventive anti-inflammatoire, **COLCHICINE** : 1 cp./j, les 2 j précédant l'intervention et les 8 j suivants.

*Tout traumatisme* est susceptible de déclencher une crise aiguë.

Les cures thermales sont envisageables, à distance d'un épisode aigu et ne doivent comporter qu'une cure de diurèse.

### Hyperuricémie isolée sans manifestation articulaire goutteuse

#### Au cours des hémopathies malignes

Le traitement doit être préventif et institué avant la mise en route des agents cytolytiques.

**Allopurinol** : 100 à 300 mg/j en fonction du chiffre initial.

Si le patient a un antécédent d'accès articulaire goutteux on y adjoindra 1 cp./j de **colchicine**.

### Hyperuricémies découvertes fortuitement

Certains auteurs préconisent, pour prévenir l'apparition d'une éventuelle néphropathie goutteuse, un traitement médicamenteux systématique par l'**allopurinol**.

Il semble suffisant de ne le faire que lorsque l'uricémie reste supérieure à 480 µmol/L (80 mg/L), après un régime approprié et une cure de diurèse alcaline efficace.

L'Eular a proposé en 2006 des recommandations pour la prise en charge de la goutte [1].

### CONSENSUS

[1] Prise en charge de la goutte, Eular, 2006

## ANTIGOUTTEUX (3) – INHIBITEURS DE L'URICOSYNTÈSE (2)

## ■ Fébuxostat

ADENURIC					
80 à 120 mg en 1 prise/j	28 cp. 80 mg	37,66	I	65 %	1,35
	28 cp. 120 mg	37,66	I	65 %	1,35

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteur de la xanthine-oxydase, enzyme permettant la transformation de la xanthine en acide urique.

## INDICATIONS

Traitement de l'hyperuricémie chronique dans les cas où un dépôt d'urate s'est déjà produit (incluant des antécédents ou la présence de tophus et/ou d'arthrite goutteuse).

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients et chez les patients de moins de 18 ans.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque de crise de goutte en début de traitement : ne pas interrompre le traitement, traiter la crise.

Surveillance clinique étroite et bilans recommandés en cas d'atteinte hépatique, rénale ou thyroïdienne.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents : œdèmes, céphalées, éruptions cutanées, nausées, diarrhées, anomalies du bilan hépatique, crises de goutte.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Interactions liées à son mécanisme d'action :
  - **mercaptopurine/ azathioprine**. L'administration concomitante de **fébuxostat** n'est pas recommandée car peut entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques de ces médicaments et provoquer une toxicité. Cependant, aucune étude n'a été menée ;
  - **théophylline**. Aucune étude d'interaction n'a été menée avec le **fébuxostat**, mais l'inhibition de la xanthine-oxydase peut induire une élévation de la théophyllinémie. Il est recommandé d'être prudent en cas d'administration concomitante de ces deux principes actifs, et de surveiller la théophyllinémie en début de traitement par **fébuxostat**.
- Interactions dues à son métabolisme : les inducteurs puissants de la glycuronidation peuvent accroître le métabolisme et diminuer l'efficacité du **fébuxostat**. Un contrôle de l'uricémie est donc recommandé 1 à 2 sem. après le début d'un traitement par un inducteur puissant de la glycuronidation. À l'inverse, l'arrêt du traitement par un inducteur pourrait se traduire par une augmentation de la concentration plasmatique du **fébuxostat**.

## ANTIGOUTTEUX (4) – URICOSURIQUE

■ **Probénécide**

<b>BENEMIDE</b>					
Traitement de fond des hyperuricémies : 1 cp./j en association avec la <b>colchicine</b> pendant 1 sem. puis 2 à 3 cp./j en entretien	30 cp. 500 mg	3,07	II	30 %	0,10

**PROPRIÉTÉS**

Hypo-uricémiant par effet uricosurique puissant.

**INDICATIONS**

Devenues exceptionnelles, limitées aux impossibilités d'utiliser les **inhibiteurs de l'uricosynthèse**, dans les formes sévères de goutte, nécessitant absolument d'abaisser l'uricémie, et sous réserve des conditions suivantes :

- absence d'insuffisance rénale ;
- uraturie < 600 mg/24 h.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement** : prescription à éviter. Hypersensibilité à la **probénécide**.

Insuffisance rénale modérée ou sévère.

Antécédent de lithiase rénale.

Uricurie ≥ 700 mg/24 h.

Goutte secondaire aux hémopathies.

Intolérance au gluten.

Certaines associations médicamenteuses.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Association contre-indiquée avec le **méthotrexate**.

Éviter la coprescription de médicaments hépatotoxiques et de **salicylés**.

Ne jamais commencer un traitement pendant une crise de goutte, ni pendant le mois suivant. Associer la **colchicine** pendant les 2 à 3 premiers mois du traitement.

Vérifier l'uricémie et l'uraturie des 24 h régulièrement.

Associer une cure de diurèse et un alcalinisant.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Crises de goutte, surtout en début de traitement (associer la **colchicine**).

Nausées, diarrhée, céphalée, anorexie.

Miction fréquente, colique néphrétique et lithiase rénale.

Hypersensibilité généralisée, fièvre, urticaire, prurit, dermite allergique.

Nécrose hépatique.

Anémie aplastique, anémie hémolytique en cas de déficit en G6PD.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Salicylés** : diminution de l'effet uricosurique.

Augmentation des taux de **diprophylline** et de **zidovudine**.

**ANTIMALARIQUE**■ **Hydroxychloroquine**

<b>PLAQUENIL</b>				
400 à 600 mg/j	30 cp. 200 mg	5,33	65 %	0,18

**PROPRIÉTÉS**

Antimalarique ; antirhumatismal d'action lente.

**INDICATIONS**

Polyarthrite rhumatoïde. Lupus érythémateux subaigu. Traitement d'appoint ou prévention des rechutes des lupus systémiques.

**CONTRE-INDICATIONS**

Rétinopathie. Allergie aux dérivés de la **chloroquine**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : le risque étant inconnu, il est recommandé de s'abstenir. Surveillance oculaire en début de traitement puis tous les 6 à 12 mois.

Prudence en cas de psoriasis et de déficit en G6PD.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Anorexie, gastralgies, état nauséeux. Bourdonnements d'oreille, vertiges, céphalées, insomnie.

Éruption cutanéo-muqueuse.

Troubles hématologiques portant sur les différentes lignées sanguines.

Neuromyopathies, pouvant imposer l'arrêt du traitement.

Exceptionnellement : rétinopathies, psychoses.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Topiques gastro-intestinaux : diminution de l'absorption de la **chloroquine**.

**SALAZOPYRIDINE**■ **Sulfasalazine**

<b>SALAZOPYRIDINE</b>					
En rhumatologie : 2 g/j	100 cp. 500 mg	14,07	I	65 %	0,14

**PROPRIÉTÉS**

Action anti-inflammatoire ; action immunosuppressive probable.

**INDICATIONS**

En rhumatologie : polyarthrite rhumatoïde (est aussi utilisée dans certaines spondylarthropathies).

En gastro-entérologie : maladie de Crohn, rectocolite hémorragique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité aux **sulfamides** et aux **salicylés**.

Déficit en G6PD.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : le traitement peut être poursuivi, en utilisant la dose minimale efficace.

Assurer une ration hydrique importante.

Dans les traitements prolongés contrôler régulièrement l'hémogramme (tous les mois le 1<sup>er</sup> trimestre, puis tous les 2 à 3 mois) et la diurèse. La surveillance régulière des transaminases est plus controversée.

En cas d'insuffisance hépatique ou rénale sévère, réduire la posologie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles digestifs, qui cèdent à la diminution de la posologie.

Oligospermie lentement réversible.

Les urines peuvent être colorées en brun pendant le traitement.

Certains effets secondaires imposent l'arrêt du traitement :

- réactions cutanées d'hypersensibilité ;
- risque d'anémie hémolytique, ou immunoallergique, de neutropénie, de thrombopénie, et exceptionnellement d'aplasie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Anticoagulants oraux de type coumarinique : augmentation de l'activité anticoagulante.

**Antidiabétiques oraux** de type sulfonyluré : risque d'hypoglycémie.

Les **ralentisseurs du transit**, en particulier les opiacés, favoriseraient une plus grande absorption du produit.

**Acide folique** : diminution de l'absorption.

**Digoxine** : diminution de la digoxinémie.

## MÉTHOTREXATE

## ■ Méthotrexate

<b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>					
Posologie rhumatologique habituelle : 7,5 à 15 mg/sem. Ne pas dépasser 20 mg/sem.	20 cp. 2,5 mg	5,33	I	100 %	0,27
<b>NOVATREX</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	12 cp. 2,5 mg	4,04	I	65 %	0,34
<b>METOJECT</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	1 ser. 7,5 mg/ 0,15 mL	17,49	I	65 %	17,49
	1 ser. 10 mg/0,2 mL	18,68	I	65 %	18,68
	1 ser. 15 mg/0,3 mL	21,42	I	65 %	21,42
	1 ser. 20 mg/0,4 mL	23,79	I	65 %	23,79
	1 ser. 25 mg/0,5 mL	27,65	I	65 %	27,65
<b>LEDERTREXATE</b>					
Idem <b>MÉTHOTREXATE BELLON</b>	1 inj. 5 mg/2 mL	3,55	I	100 %	3,55
	1 inj. 25 mg/1 mL	9,01	I	100 %	9,01
	1 inj. 50 mg/2 mL	9,01	I	100 %	9,01

**PROPRIÉTÉS**

Antinéoplasique cytostatique du groupe des antifoliques, agissant comme antimétabolite des acides nucléiques.

**INDICATIONS**

AMM : polyarthrite rhumatoïde, psoriasis.  
Est également prescrit en milieu spécialisé dans certaines formes sévères de spondylarthropathies et de rhumatisme psoriasique.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** et absence de contraception efficace : contre-indication formelle.

**Allaitement** : contre-indication.

Autres contre-indications absolues :

- insuffisance respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, atteinte hépatique évolutive et alcoolisme chronique sévère ;
- leucopénie, thrombopénie, anémie ;
- infection aiguë ou chronique, en particulier aux virus VIH ;
- cancer, hémopathie associée.

Contre-indications relatives :

- tabagisme, obésité ; antécédents d'affection hépatique, pulmonaire, rénale ou hématopoïétique ;

– diabète insulino-dépendant, ulcère gastro-duodénal évolutif.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Voir texte ci-contre, en particulier pour le tabagisme, les antécédents pulmonaires, et le rythme de la surveillance biologique.  
Recherche préalable et en cours de traitement de foyers infectieux, à traiter.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Voir texte ci-contre.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Certaines associations sont contre-indiquées, même aux doses rhumatologiques : **phénylbutazone, probénécide, sulfaméthoxazole-triméthoprime, triméthoprime**.

Certaines associations doivent faire prendre des précautions :

- **AINS**, bien que la prescription soit possible si **méthotrexate** < 15 mg/sem. ;
- pour le **kétoprofène**, respecter un délai de 12 h par rapport à la prise de **MTX** ;
- **ciclosporine, sulfamides antibactériens, phénytoïne, phénobarbital**, du fait d'une augmentation de la toxicité hématologique ;
- vaccins vivants atténués.



## ACIDE FOLIQUE

## ■ Acide folique

SPÉCIAFOLDINE				
En complément du <b>méthotrexate</b> en rhumatologie : 10 à 20 mg/sem.	28 cp. 0,4 mg	3,60	65 %	0,13
	20 cp. 5 mg	2,33	65 %	0,12

**PROPRIÉTÉS**

Acide folique antianémique.

**INDICATIONS**

Compensation des carences en **acide folique**.  
Prévention ou traitement de certains effets secondaires du **méthotrexate** (MTX).

**CONTRE-INDICATIONS**

Allergie à l'un des constituants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prendre le produit le lendemain de la prise du **MTX** ou réparti sur les jours sans **MTX**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Très rares cas de réactions cutanées allergiques.  
Possibilité de troubles gastro-intestinaux.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Phénobarbital, phénytoïne, primidone** : diminution du taux des **anticonvulsivants**.

## LÉFLUNOMIDE (1)

## ■ Léflunomide

ARAVA					
100 mg/j les 3 premiers j	30 cp. 10 mg	75,55	I	65 %	2,52
Puis 10 à 20 mg/j	30 cp. 20 mg	75,55	I	65 %	2,52
	3 cp. 100 mg	43,88	I	65 %	14,63

**PROPRIÉTÉS**

Immunosuppresseur sélectif dont le métabolite actif a une action antiprolifératrice.

**INDICATIONS**

Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde active de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **léflunomide** (notamment antécédent de syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ou érythème polymorphe). Insuffisance hépatique.

Patients ayant un état d'immunodéficience grave, par exemple les patients atteints du sida. Dysfonction médullaire grave, ou anémie, leucopénie, neutropénie, ou thrombopénie pro-

fonde d'origine autre que la polyarthrite rhumatoïde ou infections graves.

Insuffisance rénale modérée à sévère, hypoprotéïnémie sévère.

Femmes enceintes ou en âge de procréer n'utilisant pas de méthode contraceptive fiable pendant le traitement par le **léflunomide**. L'existence d'une grossesse devra être exclue avant la mise en route du traitement. Les femmes ne doivent pas allaiter.

Les patients masculins devront être prévenus d'une possible toxicité fœtale transmise par le père. Il convient d'assurer une contraception efficace pendant le traitement avec le **léflunomide**.

Déconseillé chez les patients de moins de 18 ans.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (4)

### Assauts cortisoniques (« bolus »)

Ils sont intéressants surtout pour passer un cap difficile.

On utilise, en général, **méthylprednisolone (SOLUMÉDROL)** : 300 à 1 000 mg, en perf. IV dans 250 mL de sérum physiologique, pendant 3 h, 1 à 3 j de suite, dont le bénéfice peut persister 3 à 6 sem.

Une mise au point cardiovasculaire préalable est indispensable (examen clinique et ECG, au minimum), ainsi qu'une surveillance rigoureuse en milieu hospitalier.

### Traitements modificateurs (de « fond »)

Le choix du traitement modificateur (*Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug* ou DMARD pour les Anglo-Saxons) est fondé sur la sévérité potentielle de la maladie, l'efficacité et le délai d'action des molécules disponibles (**méthotrexate**, **léflunomide**, **anti-TNF-alpha** ont une action relativement rapide, perceptible au bout de 4 à 6 sem. en moyenne) et l'existence de comorbidités associées.

L'algorithme proposé plus loin décrit schématiquement l'escalade thérapeutique dans la PR.

### Traitements « classiques » synthétiques (*synthetic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs* ou sDMARD)

#### ► Méthotrexate (MTX)

Le **méthotrexate**, dont la tolérance est habituellement bonne aux doses utilisées en rhumatologie, est considéré comme la « pierre angulaire » du traitement. Son taux de maintenance thérapeutique est supérieur à 50 % à 5 ans. Il est très utile y compris chez le sujet âgé et doit être utilisé avec précaution chez la femme jeune, en âge de procréer.

L'efficacité clinique apparaît en 4 à 6 sem. et il existe un effet-dose. La dose efficace se situe entre 7,5 et 15 mg/sem. (0,3 mg/kg/sem.). Il est parfois justifié d'atteindre 20 mg/sem.

La réponse maximale a lieu dans les 6 premiers mois. Une rémission est obtenue dans 6 à 14 % des cas.

L'effet d'épargne des **corticoïdes** est généralement important (30 à 65 % de la dose initiale).

#### Prescription

On prescrit : **méthotrexate**, soit **MÉTHOTREXATE BELLON**, soit **NOVATREX**, sous forme de comprimés dosés à 2,5 mg, et, pour le premier seulement, sous forme d'ampoules dosées à 5 mg pour la voie IM, soit **METOJECT** pour la voie injectable, à différents dosages.

La dose initiale est de 7,5 à 10 mg/sem., en 1 ou en 2 à 3 prises réparties sur 24 à 36 h pour la voie orale, la plus utilisée. La forme injectable (**METOJECT**), sensiblement plus efficace à dose égale, s'administre par voie SC profonde.

La dose hebdomadaire peut être augmentée de 2,5 à 5 mg tous les mois, sans dépasser habituellement 20 mg/sem.

En cas d'efficacité la prescription peut être longtemps poursuivie, mais sans desserrer la surveillance clinique et biologique.

Cette dose « rhumatologique » ne contre-indique pas la co-prescription d'**AINS**, mais nécessite une surveillance hématologique régulière.

Une surveillance de l'hémogramme est recommandée toutes les 2 sem. pendant les 2 premiers mois, puis tous les mois. La surveillance hépatique et rénale est mensuelle.

L'adjonction d'**acide folique (SPÉCIAFOLDINE)**, cp. à 5 mg, à une dose égale à celle du **MTX**, 1 cp. x 3/sem., le surlendemain de la prise du **MTX**, diminue certains effets indésirables : stomatite, alopecie, troubles gastro-intestinaux, élévation des transaminases, cytopénie.

Il est primordial d'attirer l'attention des patients sur la prescription **hebdomadaire** du **MTX**.

**LÉFLUNOMIDE (2) – PHARMACOLOGIE****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Le médicament ne doit être prescrit que par des médecins spécialistes ayant une bonne expérience dans le traitement des maladies rhumatoïdes. Un traitement récent ou concomitant avec un autre traitement de fond hépatotoxique ou hématoxique (par exemple le **méthotrexate**) peut entraîner un risque accru d'effets indésirables.

**Procédure de wash-out**

- Soit par administration de 8 g de **colestyramine**, x 3/j
  - Soit par administration de 50 g de charbon activé en poudre, 4 fois par jour.
- La durée d'une procédure de wash-out complète est habituellement de 11 j. Cette durée peut être modifiée en fonction des éléments cliniques ou des paramètres biologiques.

Ceux-ci peuvent être graves et survenir même après l'arrêt du **léflunomide**, qui peut persister longtemps dans l'organisme, justifiant alors une procédure de wash-out, en particulier :

- si le taux des ALAT (SGPT) s'élève après adaptation de la posologie, si des anomalies hématologiques apparaissent ;
- en cas de syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell (une stomatite ulcéreuse doit faire arrêter le traitement) ;
- en cas d'infection sévère non contrôlée. Les patients ayant une réaction positive à la tuberculine doivent être étroitement surveillés en raison du risque de réactivation d'une tuberculose ;
- en cas de remplacement par un autre traitement de fond.

**EFFETS INDÉSIRABLES****Appareil cardiovasculaire**

Augmentation modérée de la pression artérielle ; rarement HTA sévère.

**Système gastro-intestinal, foie**

- Fréquents : diarrhée, nausées, vomissements, anorexie, lésions de la muqueuse buccale, douleurs abdominales, élévation des paramètres hépatiques (transaminases en particulier ALAT, plus rarement gamma-GT, phosphatases alcalines, ou bilirubine).
- Rares : hépatite, icère/cholestase et très rarement, atteintes hépatiques sévères, pancréatites.

**Infections**

Très rares : infections sévères, septicémies ; le **léflunomide** peut augmenter la sensibilité aux infections (notamment les rhinites, bronchites et pneumonies), y compris aux infections opportunistes.

**Troubles du métabolisme et de la nutrition**

Maigrissement, hypokaliémie.

**Système nerveux**

Céphalées, étourdissements, asthénie, paresthésies ; perturbations du goût, anxiété.

**Système musculaire et osseux**

- Fréquents : ténosynovite.
- Peu fréquents : rupture tendineuse.

**Peau et annexes**

- Fréquents : accentuation de la chute naturelle des cheveux, eczéma, sécheresse cutanée.
- Très rares : syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, érythème polymorphe.

**Allergie**

- Fréquents : réactions allergiques modérées, éruption (notamment éruption maculopapulaire), prurit.
- Peu fréquents : urticaire. Très rares : réactions anaphylactiques.

**Troubles respiratoires**

Très rares : pneumopathie interstitielle.

**Systèmes hématologique et lymphatique**

- Fréquents : leucopénie (avec leucocytes  $> 2 \text{ G/L}$ ).
- Peu fréquents : anémie, thrombopénie modérée.
- Rares : éosinophilie, leucopénie  $< 2 \text{ G/L}$ , pancytopénie.
- Très rarement : agranulocytose.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Une augmentation des effets secondaires peut survenir en cas d'administration récente ou concomitante de produits hépatotoxiques ou hématoxiques, ou lorsqu'un traitement par le **léflunomide** est mis en route après l'administration de ces produits sans qu'il y ait eu entre-temps de période de wash-out. Par conséquent, une surveillance attentive des paramètres hépatiques et hématologiques est recommandée au début du traitement de relais par le **léflunomide**.

Éviter de prendre de la **colestyramine** ou du charbon activé en poudre, ces produits entraînant une baisse rapide et significative des taux plasmatiques, et de consommer de l'alcool.

Aucune donnée clinique sur l'efficacité et la sécurité des vaccinations au cours d'un traitement par le **léflunomide** n'est disponible. Cependant, les vaccinations avec un vaccin vivant atténué ne sont pas recommandées.

## DÉRIVÉS THIOLÉS

## ■ Pénicillamine

TROLOVOL					
Posologie progressive, 300 mg puis 600 mg/j Ne pas dépasser 900 mg/j	30 cp. séc. 300 mg	22,67	I	65 %	0,76

## ■ Tiopronine

ACADIONE					
Dose efficace : 1 g/j Ne pas dépasser 1,5 g/j	120 cp. 250 mg	58,18	I	65 %	0,48

## PROPRIÉTÉS

Antirhumatismal d'action lente.

## INDICATIONS

Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde.

**Pénicillamine** : maladie de Wilson.

## CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse** : interrompre le traitement, et ne pas le prescrire chez une femme susceptible d'être enceinte.

**Allaitement** : interrompre l'allaitement.

Néphropathies hématurique et protéinurique.

Altérations hématologiques importantes.

Dermatoses sévères.

Maladie lupique, myasthénie.

Allergie aux **pénicillines** et **céphalosporines**.

Antécédents d'accident grave avec des dérivés thiols : aplasie, pemphigus, myasthénie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence en cas d'association avec un médicament pouvant provoquer une aplasie.

Surveillance clinique et biologique régulière : hémogramme, créatininémie, recherche de protéinurie, voire d'hématurie.

Une fièvre ou un état infectieux doivent faire pratiquer un hémogramme.

En cas de dyspnée inexpliquée, cesser le traitement et faire un bilan radiographique et fonctionnel respiratoire.

Attendre 6 mois pour commencer le traitement

s'il est prescrit après l'arrêt d'une chrysothérapie pour effets indésirables.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles cutanés et muqueux : prurit, érythème ; plus rarement, mais imposant l'arrêt du traitement : toxidermie, pemphigus, stomatite, gingivite, lésion aphthoïde.

Nausées, vomissements, anorexie, perte du goût (agueusie).

Protéinurie isolée, à rechercher systématiquement tous les 15 j au moins. Certains auteurs n'interrompent la **pénicillamine** que si la protéinurie est > 1 g/24 h. D'autres préfèrent l'arrêter plus tôt car elle expose à la survenue d'un syndrome néphrotique, lentement régressif après l'arrêt du traitement.

Pneumopathie interstitielle ou bronchiolite oblitérante.

Troubles hématologiques : thrombopénie, leucopénie, voire agranulocytose.

Troubles dysimmunitaires : apparition de facteurs antinucléaires ; lupus induit, myasthénie, dermatomyosite, thyroïdite, anémie hémolytique, pemphigus, nécessitant l'arrêt du traitement.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas associer aux **pyrazolés** en raison du risque hématologique.

Les **sels de fer**, les **topiques intestinaux** doivent être pris à distance de la **pénicillamine**, dont l'absorption serait diminuée.

## ANTI-TNF-ALPHA (1)

## ■ Étanercept

ENBREL					
De 4 à 17 ans : 0,4 mg/kg, avec un intervalle de 3 à 4 j entre 2 inj. SC A. : 25 mg x 2/sem.	4 inj. ser. 10 mg	211,99	I	65 %	53,00
	4 ser. prérépl. 25 mg	514,33	I	65 %	128,58
	4 ser. prérépl. 50 mg	514,33	I	65 %	128,58
	4 inj. stylos 50 mg	989,19	I	65 %	247,30

## PROPRIÉTÉS

Par inhibition compétitive de la liaison du TNF à ses récepteurs, il diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

## ENBREL 25 et 50 mg

- *Polyarthrite rhumatoïde* :  
– en association au **méthotrexate** pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l'adulte en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le **méthotrexate** (sauf contre-indication) ;

- en monothérapie en cas d'intolérance au **méthotrexate** ou lorsque la poursuite du traitement avec le **méthotrexate** est inadaptée ;

- dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive de l'adulte non précédemment traitée par le **méthotrexate**.

Il a été montré qu'**ENBREL**, seul ou en association avec le **méthotrexate**, ralentit la progression des dommages structuraux articulaires tels que mesurés par la radiographie et améliore les capacités fonctionnelles.

- *Rhumatisme psoriasique* actif et évolutif de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement de fond antérieur.

- *Spondylarthrite ankylosante* sévère et active de l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel.

## ENBREL 25 mg

*Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire* active de l'enfant et l'adolescent âgés de 4 à 17 ans en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance avérée au **méthotrexate**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients. Septicémie ou risque. Éviter en cas d'infection évolutive, chronique ou loca-

lisée. Éviter en cas de maladie démyélinisante ou de risque.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Écarter une infection évolutive, dont la tuberculose, avant de commencer le traitement. L'arrêter en cas d'infection grave, de varicelle, de réaction allergique, de pancytopenie.

Prudence en cas d'insuffisance cardiaque congestive (risque d'aggravation).

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquemment, réactions au site d'injection (érythème, démangeaison, douleur, gonflement), ne nécessitant en général pas de traitement, et, fréquemment : fièvre.

Infections fréquentes : voies aériennes supérieures, bronchites, cystites, infections cutanées.

Infections graves, peu fréquentes : septicémies, pneumonies, cellulites, arthrites septiques. Tuberculose, infection fongique.

Hématologie : thrombocytopénie, anémie, leucopénie, pancytopenie et très rarement aplasie.

Réactions allergiques cutanées et sous-cutanées fréquentes (prurit, et plus rarement urticaire, angio-œdème). Rares réactions allergiques/anaphylactiques graves.

Formation d'auto-anticorps.

Rarement : convulsions, épisodes de démyélinisation du type SEP ou localisée (névrite optique, myélite transverse).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

On ne dispose pas d'études particulières. Dans les essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec les **glucocorticoïdes**, les **salicylés**, les **AINS**, les **analgésiques** ou le **méthotrexate**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (6)

### ► Léflunomide (ARAVA)

Le **léflunomide** a une efficacité relativement comparable à celle du **méthotrexate**. L'efficacité clinique de l'**ARAVA** se manifeste habituellement en 4 à 6 sem., et peut s'améliorer par la suite, jusqu'à 4 à 6 mois de traitement.

L'administration concomitante de traitements de fond hépatotoxiques ou hématotoxiques (y compris le **méthotrexate**) n'est pas souhaitable. La mise en route d'un traitement par **ARAVA** doit être initiée par un médecin spécialiste averti, qui doit évaluer soigneusement le rapport bénéfice/risques. Des effets indésirables graves peuvent survenir, même après l'arrêt du **léflunomide** qui peut persister longtemps dans l'organisme, justifiant alors une procédure de wash-out.

Un contrôle de l'hémogramme et des transaminases doit être réalisé avant le début du traitement, puis toutes les 2 sem. pendant les 6 premiers mois, puis toutes les 8 sem.

Le traitement peut commencer par une dose de charge de 100 mg administrée 1 fois/j pendant 3 j. La dose d'entretien recommandée ensuite est de 10 à 20 mg x 1/j. Aucun ajustement posologique n'est recommandé chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère, ni après 65 ans.

### ► Sulfasalazine (SALAZOPYRINE)

Ce traitement représente, avec l'**ARAVA**, une solution alterne possible, en cas d'échec ou d'intolérance au **méthotrexate**. Il peut même être prescrit conjointement avec l'**hydroxychloroquine** et le **méthotrexate**, cette triple association étant créditée d'une efficacité comparable à celle des biothérapies anti-TNF.

Une vérification de l'activité de la G6PD est recommandée avant l'instauration d'un traitement par **sulfasalazine**, en raison d'un

risque élevé d'hémolyse en cas de déficit enzymatique.

La dose de départ est de 1 cp. à 500 mg/j la 1<sup>re</sup> sem., augmentée à 500 mg x 2/j la 2<sup>e</sup> sem., puis enfin à 1 g x 2/j en traitement d'entretien. En cas de réponse partielle à 3 mois, la dose peut être passée à 1 g x 3/j.

Il faut assurer une bonne diurèse et surveiller, tous les mois au début, l'hémogramme, en raison du risque de troubles hématologiques qui imposent l'arrêt du traitement, tout comme la survenue éventuelle de réactions cutanées d'hypersensibilité.

Parmi les autres effets indésirables, citons les troubles digestifs, qui cèdent généralement après la diminution de la dose ; une oligospermie lentement réversible.

Les urines et la sueur peuvent être colorées en brun pendant le traitement.

### Biothérapies

Il s'agit d'une classe d'**agents immunomodulateurs sélectifs** qui, en s'opposant à l'action de certaines cytokines pro-inflammatoires (TNF-alpha, interleukine IL-1 ou IL-6), ou à certains processus d'interaction cellulaire, ou encore en neutralisant les lymphocytes B, diminuent la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses qui en découlent.

Leur introduction relativement récente a permis de mieux contrôler de nombreuses formes avec progression rapide, améliorant le confort des malades et limitant la destruction articulaire. Ils sont généralement associés au **méthotrexate**.

Ils imposent des conditions d'initiation et une surveillance rigoureuses, car tous leurs effets secondaires à long terme ne sont pas encore parfaitement connus. La 1<sup>re</sup> prescription, sur une ordonnance de médicament d'exception, se fait en milieu spécialisé hospitalier.

## ANTI-TNF-ALPHA (2)

## ■ Infliximab

REMICADE				
PR de l'adulte en cas de réponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le <b>méthotrexate</b> Formes sévères de spondylarthrite ankylosante Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique active et sévère Adulte : 3 mg/kg en perfusion IV, d'une durée de 2 h, suivie de perfusions supplémentaires les 2, puis 6, puis 8 sem. suivantes, en association au <b>méthotrexate</b>	1 fl. 100 mg	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal chimérique qui se lie aux formes solubles et transmembranaires du TNF-alpha, il diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

- **Polyarthrite rhumatoïde** : en association avec le **méthotrexate**. Réduction des signes et symptômes, mais aussi amélioration des capacités fonctionnelles, chez :
  - les patients ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements de fond, dont le **méthotrexate**, a été inappropriée ;
  - les patients ayant une maladie active, sévère et évolutive, non traitée auparavant par le **méthotrexate** ni les autres **DMARD**.
- **Spondylarthrite ankylosante** chez les patients qui ont des signes axiaux sévères, des marqueurs sérologiques de l'activité inflammatoire élevés et qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.
- **Rhumatisme psoriasique** actif et évolutif chez les patients qui n'ont pas répondu de manière adéquate aux **DMARD** (*Disease Modifying Antirheumatic Drugs*) :
  - en association avec le **méthotrexate** ;
  - ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au **méthotrexate** ou chez lesquels il est contre-indiqué.
- Maladie de Crohn active, de forme modérée à sévère.

- Rectocolite hémorragique active, de forme modérée à sévère.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients. Septicémie ou risque. Éviter en cas d'infection évolutive, chronique ou localisée. Éviter en cas de maladie démyélinisante ou de risque, en cas d'insuffisance cardiaque.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La survenue possible de réactions aiguës liées à la perfusion, dont des chocs anaphylactiques et des réactions d'hypersensibilité retardée, qui peuvent survenir dès les premières secondes de la perfusion ou durant les quelques heures qui la suivent, en particulier lors des premières perfusions, impose l'arrêt de la perfusion et un traitement adapté. Les réactions mineures imposent de ralentir le débit, et peuvent éventuellement être prévenues ultérieurement par l'administration d'un **antihistaminique** ou de **paracétamol**.

Écarter une infection évolutive, dont la tuberculose, avant de commencer le traitement. L'arrêter en cas d'infection grave, de varicelle, de réaction allergique, de pancytopenie.

Vérifier le test Quantiféron avant de débiter le traitement.

Prudence en cas d'insuffisance cardiaque congestive (risque d'aggravation).

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés pendant le traitement.



## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (7)

### Anti-TNF-alpha

Ils sont habituellement prescrits en situation d'échec ou d'intolérance au **méthotrexate**, après une série d'examen permettant d'écarter les contre-indications ou de prévenir le risque de réactivation d'une tuberculose. On dispose de :

- **étanercept (ENBREL)**, inhibiteur compétitif de la liaison du TNF à ses récepteurs p75 situés à la surface cellulaire, s'utilise par voie SC, à la dose de 25 mg x 2/sem. ou plus fréquemment de 50 mg x 1/sem. ;
- **infliximab (REMICADE)**, anticorps monoclonal chimérique qui se lie aux formes solubles et transmembranaires du TNF-alpha, s'administre en perf. IV à la dose de 3 mg/kg, d'une durée de 2 h, suivie de perfusions séquentielles effectuées 2 et 6 sem. plus tard, puis toutes les 6 à 8 sem. Les patients doivent être surveillés pendant 1 à 2 h après la perf., en raison du risque de réactions aiguës liées à la perfusion; un équipement d'urgence, tel qu'**adrénaline**, **antihistaminiques**, **corticoïdes** ainsi qu'une assistance respiratoire doivent être disponibles. L'**infliximab** est généralement associé au **méthotrexate**, pour une meilleure efficacité, passant notamment par un moindre risque d'apparition d'anticorps neutralisants anti-infliximab ;
- **adalimumab (HUMIRA)**, anticorps anti-TNF-alpha humain recombinant, utilisé en association au **méthotrexate**, à la dose de 40 mg toutes les 2 sem., par voie SC ;
- **golimumab (SIMPONI)**, anticorps anti-TNF-alpha recombinant, également utilisé en association avec le **méthotrexate**, à la dose de 50 mg par mois, par voie SC ;
- **certolizumab pegol (CIMZIA)**, anticorps anti-TNF-alpha recombinant ayant la particularité d'être couplé à une molécule de polyéthylène-glycol (PEG), lui conférant une plus longue demi-vie d'élimination. Après une dose de charge de 2 x 200 mg toutes les 2 sem. pendant le 1<sup>er</sup> mois, la

dose d'entretien est de 200 mg toutes les 2 sem., par voie SC.

### Antagoniste de l'IL-6

Le **tocilizumab (ROACTEMRA)** est un anticorps recombinant dirigé contre le récepteur de l'interleukine-6 (IL-6). En attendant la mise à disposition de la forme SC, cette biothérapie s'administre en perf. mensuelles, à la dose de 8 mg/kg. Son efficacité en monothérapie (c'est-à-dire sans **méthotrexate**) a été démontrée. Ses principaux effets secondaires sont une leucopénie, une cytolysé hépatique et une altération du profil lipidique.

### Anti-interaction cellulaire

L'**abatacept (ORENCIA)** est une biothérapie de mécanisme d'action original, s'opposant à la stimulation des lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigène. Bientôt disponible sous une forme SC, ce traitement s'administre jusqu'à présent par voie IV, sous forme de perf. séquentielles d'une demi-heure, toutes les 2 sem. durant le 1<sup>er</sup> mois, puis tous les mois ensuite. Son effet bénéfique peut être précocement enregistré, mais il est parfois nécessaire d'attendre quelques mois pour qu'il soit clairement perceptible par le patient. Comme pour les autres biothérapies, son action immunomodulatrice peut favoriser la survenue d'infections.

### Antagoniste de l'IL-1

L'**anakinra (KINERET)** est une forme recombinante de l'antagoniste spécifique du récepteur de l'IL-1 humaine (IL-1 ra). Le produit, présenté en seringue pré-remplie, est administré à la dose de 100 mg/j en injection SC, en alternant les sites d'injection. Cette biothérapie, qui n'a pas entièrement confirmé son efficacité en termes cliniques, malgré un effet structurel protecteur, est actuellement peu prescrite dans l'indication « PR ».

**ANTI-TNF-ALPHA (3)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Très fréquemment, réactions liées à la perfusion (cf. supra) : fatigue, douleur thoracique, fièvre ou frissons, prurit ou urticaire, bouffées de chaleur, hypo ou hypertension, dyspnée, beaucoup plus rarement réactions anaphylactiques. Ces signes peuvent survenir également quelques jours après la perfusion (hypersensibilité retardée).

Infections virales fréquentes : grippe, herpès.

Infections des voies respiratoires, fréquentes.

Infections graves, peu fréquentes : septicémie, abcès, cellulite, mauvaise cicatrisation, infection bactérienne. Tuberculose, infection fongique.

Hématologie : anémie, leucopénie, lymphadénopathie, lymphocytose, lymphopénie, neutropénie, thrombocytopénie.

Réactions allergiques cutanées fréquentes : rash, prurit, urticaire, sudation augmentée, sécheresse cutanée. Autres réactions cutanées plus rares.

Formation d'anticorps anti-infliximab, d'auto-

anticorps et exceptionnellement apparition d'un syndrome lupique.

Fréquemment : céphalées, vertiges, étourdissement. Peu souvent : dépression, confusion, agitation, amnésie, apathie, nervosité, somnolence. Rarement : convulsions, épisodes de démyélinisation du type SEP ou localisée (névrite optique, myélite transverse).

Fréquemment : syncope, bradycardie, arythmie, palpitations, vasospasme, cyanose, thrombophlébite, ischémie périphérique, aggravation d'une insuffisance cardiaque. Anomalies de la fonction hépatique, fréquentes (à surveiller).

Fréquemment : nausée, diarrhée, douleur abdominale, dyspepsie ; peu fréquemment : constipation, reflux gastro-œsophagien, chéilite, cholécystite.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

On ne dispose pas d'études particulières. Dans les essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec les **glucocorticoïdes**, les **sali-cylés**, les **AINS**, les **analgésiques** ou le **méthotrexate**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (8)

### Anti-lymphocyte B (anti-CD20)

Le **rituximab (RTX) (MABTHERA)** est un anticorps monoclonal chimérique anti-CD20 indiqué, en association au **méthotrexate**, dans le traitement des patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un **anti-TNF-alpha**. Le risque de tuberculose semble moins important mais celui d'une réactivation d'une hépatite B est possible. En cas de portage chronique de l'Ag HBs, une prévention de la réactivation virale est nécessaire (**entécavir**, **ténofovir**). Le produit est contre-indiqué en cas d'hypogammaglobulinémie, d'insuffisance cardiaque sévère, d'infection sévère active.

La dose recommandée est de 1 000 mg, par perf. IV, suivie d'une 2<sup>e</sup> perfusion, à 2 sem. d'intervalle. La même séquence est proposée à 6 et 12 mois, puis tous les 6 mois, chez les sujets répondeurs.

Les patients doivent recevoir un traitement antihistaminique et 100 mg de **méthylprednisolone** par voie IV 30 min avant la perf. pour diminuer la fréquence et la sévérité de réactions allergiques, possibles en cours ou juste après chaque perf.

La survenue d'une neutropénie, en règle tardive, a été constatée dans 8 % des cas. Il n'y a pas d'élément en faveur à l'heure actuelle d'une augmentation possible du risque d'affection néoplasique.

### Autres traitements classiques

Ils sont quasiment abandonnés.

#### ► Antimalariques de synthèse (AMS)

En monothérapie, ils donnent des résultats insuffisants dans la majorité des cas. De plus, il faut attendre généralement

3 mois pour juger de leur réelle efficacité. Ce n'est que dans les formes bénignes de PR, à faible potentiel érosif, ou encore dans la cadre d'association avec le **méthotrexate** et la **sulfasalazine**, que les **AMS** conservent encore une place défendable dans la stratégie thérapeutique.

On prescrit le plus souvent : **hydroxychloroquine (PLAQUENIL)** : 1 cp. à 200 x 2/j, puis éventuellement x 3/j.

À ces doses, les traitements au long cours ont une toxicité oculaire potentielle et nécessitent une surveillance régulière, avant traitement (FO, acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs, grille d'Amsler et ERG), puis tous les 6 mois par l'ophtalmologiste.

D'autres effets indésirables sont possibles (neuromyopathie, poussée de psoriasis, etc).

Lorsque ce traitement de fond a été efficace, il est logique, après 1 ou 2 ans d'utilisation (alors que le risque de toxicité oculaire augmente), d'en diminuer la dose, voire même d'essayer de le suspendre.

#### ► Sels d'or (chrysothérapie), dérivés thiolés (**pénicillamine**, **tiopronine**)

Leur efficacité est certaine mais d'installation relativement lente ; de plus, ces 2 classes thérapeutiques s'accompagnent d'assez nombreux effets indésirables, ce qui explique qu'elles ne sont pratiquement plus prescrites actuellement. Leur niveau de maintenance thérapeutique n'excédait pas 20 % à 5 ans.

#### ► Immunosuppresseurs « classiques »

**Azathioprine (IMUREL)**, **chlorambucil (CHLORAMINOPHÈNE)**, **ciclosporine (NÉORAL)** ont également été quasiment abandonnés à l'heure actuelle, notamment depuis l'avènement des biothérapies.

## ANTI-TNF-ALPHA (4)

## ■ Adalimumab

<b>HUMIRA</b>					
1 dose unique de 40 mg toutes les 2 sem. par voie SC, en association avec le <b>méthotrexate</b>	2 ser. prér. 40 mg (0,8 mL)	943,74	I	65 %	471,87
	2 stylos prér. 40 mg (0,8 mL)	943,74	I	65 %	471,87
	2 fl. usage péd. 40 mg (0,8 mL)	1 041,36	I	65 %	

**PROPRIÉTÉS**

L'**adalimumab** se combine avec, et bloque, les récepteurs du TNF ; il diminue ainsi la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

**INDICATIONS**

Traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les patients qui n'ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un immunosuppresseur ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. Pour le traitement d'induction, **HUMIRA** doit être administré en association avec des corticoïdes. **HUMIRA** peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance aux corticoïdes ou lorsque la poursuite du traitement corticoïde n'est pas appropriée.

En association au **méthotrexate** :

- **Polyarthrite rhumatoïde** :
  - forme modérément à sévèrement active de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond, y compris le **méthotrexate**, est inadéquate ;
  - forme sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le **méthotrexate**.

- **Rhumatisme psoriasique** actif et évolutif chez l'adulte lorsque la réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate.

- **Spondylarthrite ankylosante** sévère et active chez l'adulte ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
- Tuberculose évolutive ou autres infections sévères telles que sepsis et infections opportunistes.
- Insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA classes III/IV).

**Grossesse** : l'administration d'**adalimumab** n'est pas recommandée pendant la grossesse. Les femmes en mesure de procréer doivent utiliser une méthode de contraception appropriée et la poursuivre pendant 5 mois au moins après la dernière administration d'**HUMIRA**.

**Allaitement** : comme les immunoglobulines humaines passent dans le lait maternel, les femmes ne doivent pas allaiter pendant au moins 5 mois après la dernière administration d'**HUMIRA**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (9)

### Traitements locaux

#### Injectons intra-articulaires de dérivés cortisoniques

Elles sont indiquées à toutes les étapes de la maladie, en particulier lorsque le processus inflammatoire se localise à une articulation d'abord facile.

Une série de 1 à 3 infiltrations (**cortivazol (ALTIM)**, **hexacétone de triamcinolone (HEXATRIONE)**, etc.) à 7 ou 15 j d'intervalle permet parfois de franchir un cap difficile, évitant en particulier d'augmenter le traitement général.

Les règles d'asepsie doivent être rigoureusement appliquées, le risque infectieux local - mais aussi général - étant particulièrement important au cours des polyarthrites rhumatoïdes habituelles et plus encore chez des malades soumis à une corticothérapie générale au long cours ou à un traitement immunosuppresseur.

#### Synoviorthèses isotopiques

C'est la destruction de la synoviale articulaire enflammée, par l'injection intra-articulaire d'**isotope radioactif** (à éviter chez les sujets jeunes et les femmes en période d'activité génitale).

Elle est indiquée lorsque le traitement général s'avère insuffisant à juguler l'inflammation au sein d'une articulation particulièrement accessible à ce traitement, le

genou surtout, mais aussi le coude, la cheville et les doigts.

Elle semble plus efficace lorsqu'il n'y a pas de destruction ostéo-cartilagineuse. Son effet peut se prolonger sur plusieurs mois, voire années.

Elle ne nécessite pas d'hospitalisation mais ne peut être réalisée qu'en milieu spécialisé.

#### Indications chirurgicales

Elles doivent être discutées en fonction du bénéfice que peut en espérer le malade, en milieu médico-chirurgical spécialisé.

Nous ne ferons que citer quelques indications :

- La synovectomie chirurgicale :
  - toujours incomplète ;
  - qui tend à être supplantée par la synoviorthèse pour les articulations ;
  - mais qui reste utile dans la prévention du risque de rupture tendineuse (doigts).
- Les réparations tendineuses.
- La correction chirurgicale des déformations et raideurs articulaires, qui ne doit être envisagée qu'à distance d'une poussée évolutive :
  - correction d'un flectum irréductible du genou, d'un coup de vent cubital ;
  - ostéotomie de correction d'une déviation latérale du genou ;
  - prothèses de hanche, de genou, de coude parfois ;
  - prothèse en silastic des doigts.

#### Vaccinations et rhumatismes inflammatoires

Si des manifestations articulaires, souvent fugaces, peuvent survenir après de nombreuses vaccinations, des cas de polyarthrite ont été décrits après vaccination contre la rubéole, la grippe, l'hépatite B, mais ces cas restent très rares et la relation avec le vaccin n'est pas prouvée.

D'une façon générale :

1- Il est préférable de ne pas vacciner des sujets ayant des antécédents allergiques à l'un des vaccins.

2- Il faut éviter les vaccinations lors des poussées inflammatoires ou des phases évolutives, et les vaccinations rapprochées.

3- Il n'y a pas de contre-indication aux vaccins tués ni aux vaccins reconstitués par génie génétique. Dans les formes stables de polyarthrite rhumatoïde, la tolérance des **vaccins antigrippal** et **antipneumococcique** est bonne.

4- En cas de vaccins vivants atténués :

- contre-indication formelle si l'immunodépression du sujet est jugée importante ;
- le risque de complications sévères existe en cas d'immunodépression (corticothérapie > 10 mg/j de **prednisone**) pour les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune et pour le BCG. Le risque doit donc être évalué pour chaque patient.

## ANTI-TNF-ALPHA (5)

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'administration de **méthotrexate** doit être continuée pendant le traitement par **HUMIRA**.

Le traitement par **HUMIRA** doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste qualifié en matière de diagnostic et de traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique ou de la spondylarthrite ankylosante (sur une ordonnance de «médicament d'exception»). Une carte spéciale de surveillance sera remise aux patients traités par **HUMIRA**.

Après une formation correcte à la technique d'injection, les patients peuvent s'auto-injecter **HUMIRA**, sous le couvert d'un suivi médical approprié. La réponse clinique est habituellement obtenue en 12 sem. de traitement. La poursuite du traitement devra être reconsidérée chez un patient n'ayant pas répondu dans ces délais.

- *Infections*

– Dépister des infections (y compris la tuberculose, voir encadré) avant, pendant et après le traitement par **HUMIRA**.

– Ne pas commencer le traitement tant que les infections évolutives, y compris les infections chroniques ou localisées, ne sont pas contrôlées.

– En cas d'apparition d'une infection grave, l'administration d'**HUMIRA** doit être interrompue jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée.

- *Événements neurologiques*

La prudence est recommandée avant de traiter avec **HUMIRA** les patients atteints d'une maladie démyélinisante du système nerveux central, préexistante ou de survenue récente.

- *Réactions allergiques*

En cas de survenue d'une réaction anaphylactique ou d'une autre réaction allergique grave, l'administration d'**HUMIRA** doit être immédiatement interrompue et un traitement approprié mis en œuvre.

- *Tumeurs malignes et troubles lymphoprolifératifs*

Dans l'état actuel des connaissances, la possibilité d'un risque de développer des lymphomes

ou autres maladies malignes chez les patients traités par **anti-TNF** ne peut être exclue.

Une prudence accrue devra être observée lorsqu'on envisage un traitement des patients avec antécédents de tumeurs malignes par **HUMIRA**.

- *Réactions hématologiques*

Des effets indésirables du système sanguin comprenant des cytopénies médicalement significatives ont été peu souvent observés avec **HUMIRA**. Il doit être conseillé à tous les patients de demander immédiatement un avis médical s'ils ont des signes ou des symptômes suggérant des troubles sanguins (par exemple : fièvre persistante, ecchymoses, saignements, pâleur) sous **HUMIRA**. L'arrêt du traitement par **HUMIRA** devra être envisagé pour les patients chez qui des anomalies sanguines significatives seront confirmées.

- *Vaccinations*

Chez la plupart des patients recevant **HUMIRA** est apparue une réponse immunitaire efficace aux vaccins utilisant des polysaccharides pneumococciques.

Compte tenu du manque de données, il est recommandé d'éviter d'associer des vaccins vivants et **HUMIRA**.

- *Insuffisance cardiaque congestive*

Le traitement par **HUMIRA** doit être arrêté chez les patients présentant de nouveaux symptômes ou une aggravation de leurs symptômes d'insuffisance cardiaque congestive.

- *Processus auto-immuns*

Le traitement par **HUMIRA** peut entraîner la formation d'anticorps auto-immuns. L'impact d'un traitement à long terme par **HUMIRA** sur le développement de maladies auto-immunes est inconnu.

- *Chirurgie*

La longue demi-vie de l'**adalimumab** doit être prise en compte si une intervention chirurgicale est prévue. Un patient traité par **HUMIRA** nécessitant une intervention chirurgicale doit être attentivement surveillé afin de dépister des infections et des actions appropriées doivent être entreprises.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (10)

### Traitements complémentaires

#### Traitement orthopédique

Instauré dès la phase initiale de la maladie, plus ou moins facile à accepter, il comporte trois éléments importants.

##### ► Règles d'hygiène posturale

Le malade doit coucher sur un lit assez dur, n'utiliser qu'un mince oreiller, garder les genoux en extension, mettre éventuellement un cerceau au pied du lit.

##### ► Exercices de posture

Ils doivent permettre de s'opposer aux attitudes antalgiques. Plusieurs fois par jour il faut :

- pour le membre supérieur mettre les épaules en abduction, les coudes en flexion, les poignets en extension, les doigts en demi-flexion, les pouces en abduction ;
- pour le membre inférieur, mettre les hanches en extension, les genoux en extension, les pieds en flexion dorsale.

##### ► Attelles de posture

Elles cherchent à s'opposer aux déformations articulaires ; tant que persiste l'inflammation, le malade reposera l'article douloureux plusieurs fois par jour, puis seulement la nuit.

L'attelle doit être faite, sur mesure, en matériau thermoplastique, dans la position de fonction.

Le traitement orthopédique est utile dès le début de la maladie car il permet de lutter contre les attitudes vicieuses.

#### Crénothérapie

Elle ne représente réellement qu'un traitement d'appoint, permettant surtout une prise en charge régulière en kinésithérapie et ergothérapie.

#### Prise en charge sociale

À tous les stades de la maladie, il est important de considérer et d'aider à résoudre les problèmes socioprofessionnels, conséquences de cette affection chronique, mais également facteurs d'entretien des poussées évolutives.

Lorsque la maladie commence chez un sujet relativement jeune, il est utile d'envisager un reclassement professionnel, tenant compte des possibilités de la malade.

Les formes graves font partie de la liste des **affections de longue durée** (ALD 30) donnant droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux par la sécurité sociale.

On veillera à l'aménagement des conditions de vie : logement, matériel domestique adapté, etc.

Certains malades peuvent aussi bénéficier de l'aide fournie par des **associations**.

**ANTI-TNF-ALPHA (6)****EFFETS INDÉSIRABLES**

Les réactions au point d'injection (érythème et/ou prurit, saignement, douleur ou tuméfaction) sont fréquentes mais ne conduisent généralement pas à l'arrêt du médicament.

Les infections sont assez fréquentes, en particulier celles des voies respiratoires supérieures. Certaines peuvent être graves, et sont redoutées : tuberculose, infections opportunistes.

Moins fréquentes : infections des voies respiratoires basses, urinaires, à virus herpès, grippe, mycoses superficielles ; parfois infection articulaire, infections des plaies, abcès, infection de la peau (cellulite et impétigo), infections pileuses (furuncles, anthrax), périonyxis, éruption pustuleuse, infection dentaire et du parodonte, otite, gastroentérite, candidose oropharyngée, infection vaginale.

Troubles sanguins et du système lymphatique : lymphopénie, anémie, et moins souvent, leucopénie, leucocytose, lymphadénopathie, neutropénie, thrombocytopénie.

Troubles du système nerveux et psychiatriques : céphalées, sensations vertigineuses, paresthésies.

Troubles visuels, conjonctivite, inflammation oculaire (y compris œdème, douleur, rougeur), œdème palpébral, glaucome, blépharite, sécheresse oculaire.

Hypertension artérielle.

Toux, douleur nasopharyngée, congestion nasale.

Troubles gastro-intestinaux :

- fréquents : nausée, douleur abdominale, diarrhée, dyspepsie, ulcération buccale ;
- peu fréquents : vomissements, ballonnements, constipation, reflux gastro-œsophagien,

gastrite, colite, saignements hémorroïdaux, hémorroïdes, œdème buccal, douleurs dentaires, sécheresse de la bouche, gingivite, ulcération de la langue, dysphagie, stomatite (y compris stomatite aphteuse).

Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés :

- fréquents : rash, prurit, rash érythémateux, rash prurigineux, perte des cheveux ;
  - peu fréquents : rash maculeux ou papuleux, peau sèche, eczéma, dermatite, hyperhidrose, psoriasis, lésion cutanée, urticaire, ecchymoses et contusions accrues, purpura, acné, ulcération de la peau, angio-œdème, réaction cutanée, anomalie unguéale, sueurs nocturnes, réactions de photosensibilité, exfoliation cutanée.
- Troubles rénaux et urinaires peu fréquents : hématurie, dysurie, énurésie nocturne, pollakiurie, douleur rénale.

Fatigue (incluant asthénie et malaise), syndrome grippal.

Anomalies biologiques :

- fréquente : augmentation des enzymes hépatiques ;
- peu fréquents : augmentation des triglycérides, allongement du temps de céphaline activé partiel, augmentation des phosphatases alcalines, de la CPK, de la LDH ; diminution du potassium sanguin ; neutropénie ; augmentation de l'urée sanguine, de la créatinine sanguine, albumine urinaire ; anticorps ADN positif, anticorps antinucléaire positif.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**


L'administration d'**HUMIRA** sans **méthotrexate** a entraîné une augmentation de la formation d'anticorps et une augmentation de la clairance de l'**adalimumab**.

L'administration simultanée d'**anti-TNF-alpha** et d'**anakinra** n'est pas recommandée (majoration du risque infectieux).



## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (11)

Algorithme décisionnel pour le traitement d'une polyarthrite rhumatoïde  
(adapté à partir de Smolen et al. Ann Rheum Dis 2014 ; 73 : 492-509)



**ANTI-TNF-ALPHA (7)****■ Golimumab**

<b>SIMPONI</b>					
Voie SC 50 mg x 1/mois	1 ser. prér. 50 mg/ 0,5 mL	937,23	I	65 %	937,23
	1 stylo. prér. 50 mg/ 0,5 mL	937,23	I	65 %	937,23

**PROPRIÉTÉS**

Anticorps monoclonal humain qui forme des complexes stables à forte affinité avec les deux formes bioactives transmembranaire et soluble du TNF-alpha humain, ce qui empêche la liaison du TNF-alpha à ses récepteurs.

**INDICATIONS**

En association avec le **méthotrexate** dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du rhumatisme psoriasique en cas d'échec aux autres traitements.

Traitement de la spondylarthrite ankylosante en cas d'échec aux traitements conventionnels.

**CONTRE-INDICATIONS**

– Allaitement, hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

– Tuberculose active ou autres infections sévères, telles que sepsis, et infections opportunistes.

– Insuffisance cardiaque modérée ou sévère (de classe III/IV dans la classification NYHA).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan immunitaire et recherche de tuberculose avant traitement.

Pendant le traitement, une surveillance cardiaque et hématologique est recommandée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles du système immunitaire, risque infectieux.

Troubles cardiovasculaires : bouffées, vasomotrices, hypertension artérielle, thrombose artérielle et veineuse, ischémie.

Réaction locale au point d'injection, prurit, urticaire, dermatite, asthénie, douleur, dépression, insomnie, fièvre, troubles gastro-intestinaux, troubles respiratoires.

Anémie, leucopénie, pancytopénie, augmentation des transaminases, perturbation du bilan thyroïdien, hyperglycémie, hyperlipidémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association de **golimumab** avec d'autres biothérapies utilisées pour traiter les mêmes affections, dont l'**anakinra** et l'**abatacept**, n'est pas recommandée.

Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés de façon concomitante avec le **golimumab**.

## POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (12)

### Comment décider du choix thérapeutique de « fond »

Dans les formes manifestement peu ou pas agressives

- Antimalarique de synthèse.
- Sulfasalazine.

Dans les formes apparemment plus agressives (sévères)

- En premier :
  - MTX ;
  - léflunomide ou sulfasalazine en cas d'intolérance au MTX ;

– soit d'emblée association de 2 ou 3 traitements modificateurs.

- En cas d'inefficacité, ou d'échappement rapide :
  - soit MTX associé à une biothérapie (anti-TNF, abatacept, tocilizumab, voire rituximab dans certains cas) ;
  - soit biothérapie seule (tocilizumab).
- En cas d'échec d'une biothérapie : un changement de biothérapie (« switch ») doit être envisagé, en passant à une molécule ayant un mode d'action identique ou différent.

### Règles d'utilisation des biothérapies anti-TNF-alpha

- Indications :
  - PR certaine, diagnostiquée par un médecin spécialiste expérimenté.
  - Activité inflammatoire persistant depuis 1 mois au moins, et évolutivité structurale sur 2 radios successives.
  - PR en échec du MTX, pris pendant au moins 3 mois.
- Contre-indications absolues : infections actives, aiguës ou chroniques, néoplasie ou hémopathie, de moins de 5 ans, insuffisance cardiaque classe III et IV (NYHA), maladie démyélinisante. Dans les cas de force

majeure, une grossesse peut être poursuivie sous **REMICADE**.

• Bilan pré-thérapeutique indispensable (incluant la recherche et le traitement d'une tuberculose latente).

• Il n'y a pas de hiérarchie validée des molécules fondée sur l'efficacité.

• L'association au MTX est recommandée, sauf intolérance au produit, et ce, quelle que soit la molécule **anti-TNF-alpha**.

Pour plus de détails : Club rhumatismes et inflammations (CRI) section de la Société française de rhumatologie (<http://www.cri-net.com>).

### En cas de rémission

• On estime qu'il y a rémission clinique lorsque 5 des 6 critères suivants sont remplis pendant au moins 2 mois consécutifs :

- raideur matinale < 15 min,
- absence de fatigue,
- absence de douleur articulaire,
- absence de sensibilité ou de douleur à la mobilisation articulaire,
- absence de gonflement articulaire ou des gaines tendineuses,
- VS < 30 mm pour la 1<sup>re</sup> h chez la femme et < 20 mm chez l'homme.

• D'autres critères de rémission ont été définis conjointement par l'ACR et l'Eular en 2011 :

- nombre d'articulations douloureuses ≤ 1 ;

et

- nombre d'articulations gonflées ≤ 1 ;

et

- CRP < 1 (en mg/dL) soit ≤ 10 mg/L ;

et

– appréciation globale de l'activité de sa PR par le patient ≤ 1 (sur une EVA allant de 0 à 10)

• Il est alors possible d'envisager une modulation du traitement (voir le site du CRI).

Association française de lutte antirhumatismale (AFLAR) : [aflar.unice.fr](http://aflar.unice.fr).

Association française des polyarthritiques (AFP) : [www.polyarthrite.org](http://www.polyarthrite.org).

Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde (ANDAR) : [www.polyarthrite-andar.com](http://www.polyarthrite-andar.com).

Association de recherche sur la polyarthrite (ARP) : [www.arp-fr.org](http://www.arp-fr.org).

## ANTI-TNF-ALPHA (8)

## ■ Certolizumab

CIMZIA				
Voie SC, 1 inj./2 sem. Posologie initiale : 400 mg à S1, S3 et S5 Posologie d'entretien : 200 mg/2 sem.	2 ser. prér. 200 mg/mL	867,97	I	65 % 433,99

**PROPRIÉTÉS**

Le TNF-alpha est une cytokine pro-inflammatoire clé qui joue un rôle central dans les processus inflammatoires. Ce médicament neutralise de manière sélective le TNF-alpha.

**INDICATIONS**

En association au **méthotrexate**: traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond est inadéquate.

Peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au **méthotrexate** ou lorsque la poursuite du traitement par le **méthotrexate** est inadaptée.

**CONTRE-INDICATIONS**

Allaitement, hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Tuberculose active ou autres infections sévères, telles que sepsis, et infections opportunistes.

Insuffisance cardiaque modérée ou sévère (classification NYHA III/IV).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Bilan immunitaire et recherche de tuberculose avant traitement.

Pendant le traitement, une surveillance cardiaque et hématologique est recommandée.

**Anti-TNF-alpha et tuberculose**

**Avant l'instauration du traitement par anti-TNF-alpha, tous les patients doivent faire**

**l'objet d'une recherche d'infection tuberculeuse active ou non (latente).**

En cas de diagnostic d'une tuberculose active, le traitement par **anti-TNF-alpha** ne doit pas être instauré.

En cas de diagnostic d'une tuberculose latente, une prophylaxie antituberculeuse appropriée, conforme aux recommandations locales, doit être mise en œuvre avant de commencer le traitement. Dans un tel cas, il convient de bien peser les bénéfices et les risques du traitement par **anti-TNF-alpha**.

Les patients devront être informés qu'il leur faudra consulter leur médecin en cas de survenue de signes ou symptômes (par exemple toux persistante, cachexie/amaigrissement, fébricule), évocateurs d'une infection tuberculeuse, pendant ou après le traitement.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Fréquents :

- troubles de l'état général : pyrexie, douleur, asthénie, prurit, réactions au site d'injection ;
- troubles du système nerveux : céphalées, anomalies sensorielles ;
- éruption cutanée, nausées ;
- troubles du système immunitaire pouvant entraîner l'apparition d'infections (virales, bactériennes, parasitaires ou fongiques) ou entraînant la prolifération de cellules cancéreuses ;
- troubles hématologiques : leucopénie ;
- troubles cardiovasculaires : hypertension, cardiomyopathie, arythmie, palpitations.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

L'association avec l'**anakinra** ou l'**abatcept** n'est pas recommandée.

## ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR DE L'IL-1

## ■ Anakinra

KINERET					
PR de l'adulte, en association au <b>méthotrexate</b> , en cas de réponse inadéquate au <b>méthotrexate</b> seul Adulte : 100 mg x 1/j, en inj. SC Alterner les sites d'injection.		7 ser. 100 mg préremp. 0,67 mL	223,96	I	65 %  31,99

## PROPRIÉTÉS

Forme recombinante de l'antagoniste spécifique du récepteur de l'IL-1 humaine (IL-1 Ra), agent immunosuppresseur, il diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

Traitement de la PR de l'adulte, en association au **méthotrexate**, en cas de réponse inadéquate au **méthotrexate** seul.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active, à l'un de ses excipients ou à des protéines provenant ou dérivant d'*E. coli*.

Insuffisance rénale sévère.

**Grossesse et allaitement** : déconseillé.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Écarter une infection évolutive, dont la tuberculose, avant de commencer le traitement. L'arrê-

ter en cas d'infection grave, de varicelle, de réaction allergique, de neutropénie. Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquemment, réactions au site d'injection (érythème, ecchymoses, inflammation, douleur), généralement pendant les premières semaines du traitement seulement.

Très fréquemment : céphalées.

Dans les études cliniques, le risque d'infection grave a été plus élevé chez les patients ayant un antécédent d'asthme.

Hématologie : neutropénie.

Réactions allergiques rares : éruptions maculopapuleuses ou urticariennes.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

On ne dispose pas d'études particulières. Dans les essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec les **glucocorticoïdes**, les **salicylés**, les **AINS**, les **analgésiques** ou le **méthotrexate**.

# ANTILYMPHOCYTE B CD20

## Rituximab

MABTHERA					
Polyarthrite rhumatoïde : 2 perf. IV de 1 000 mg à 2 sem. d'intervalle. Évaluation de la réponse à la 16 <sup>e</sup> sem. Retraitement à partir de la 24 <sup>e</sup> sem. chez les sujets initialement répondeurs  Lymphomes non hodgkiniens : 375 mg/m <sup>2</sup> x 1/sem. à adapter au protocole de chimiothérapie (CHOP ou CVP)	2 fl. 100 mg/10 mL 1 fl. 500 mg/50 mL	HOP	I		
		HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal chimérique anti-CD20 qui, en inhibant l'antigène CD20 des lymphocytes B, diminue la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

En association au **méthotrexate** : traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un **anti-TNF-alpha**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypogammaglobulinémie, infections sévères actives et insuffisance cardiaque sévère.

**Grossesse et allaitement** : comme les IgG passent la barrière placentaire et dans le lait, l'utilisation de **rituximab** ne devra être envisagée au cours de la grossesse que si le bénéfice attendu paraît supérieur au risque potentiel ; l'allaitement est contre-indiqué.

Les femmes en âge de procréer devront utiliser des mesures contraceptives efficaces tout au long du traitement et pendant 12 mois après son arrêt.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les patients doivent recevoir 100 mg de **méthylprednisolone** par voie IV pendant 30 min avant **MABTHERA** pour diminuer la fréquence et la sévérité des réactions lors des perfusions.

La présence d'anticorps humains antichimériques peut être associée à une aggravation des

réactions liées à la perfusion ou à des réactions allergiques suivant la seconde perfusion des traitements ultérieurs.

Toutes les vaccinations devront être terminées au moins 4 sem. avant la première administration de **MABTHERA**. Les vaccins vivants sont déconseillés en cas de déplétion en lymphocytes B.

Une réactivation virale est possible. En cas de portage chronique de l'Ag HBs, un traitement préventif de la réactivation virale B devra être prescrit (**entécavir**, **ténofovir**).

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions lors des perfusions dans 30 à 35 % des cas (première perfusion) : HTA ou hypotension, nausées, fièvre, rash, prurit, urticaire, rhinite.
- Certains patients ont développé des anticorps humains antichimériques.
- Légère augmentation des infections sévères, mais on n'a pas constaté sous **rituximab** d'infections opportunistes. Réactivation virale B (cf. Précautions d'emploi).
- La survenue d'une neutropénie en règle tardive a été constatée dans 8 % des cas.
- Arthralgies, douleurs ostéo-musculaires.
- Beaucoup plus rares : asthénie, troubles digestifs, neurologiques.
- Il n'y a pas à l'heure actuelle d'élément en faveur d'une augmentation possible du risque d'affection néoplasique.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Peu documentées, elles n'ont pas été relevées pour l'utilisation du **méthotrexate** et autres traitements de fond « classiques », des **AINS**, de la corticothérapie.

**BIPHOSPHONATES (MALADIE DE PAGET) (1)**■ **Acide tiludronique**

<b>SKELID</b>					
Maladie de Paget : 400 mg/j pendant 12 sem., pour la 1 <sup>re</sup> cure	28 cp. 200 mg	123,72	I	65 %	4,42

D'autres biphosphonates sont en regard des maladies : Ostéoporose et Hypercalcémie.

■ **Acide pamidronique**

<b>OSTEPAM</b>					
Maladie de Paget : 120-180 mg/j pendant 2 à 3 j consécutifs Possibilité de 2 <sup>e</sup> cure 6 mois après la 1 <sup>re</sup>	4 fl. 1 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	40,91
	1 fl. 2 mL 15 mg/mL	83,97	I	65 %	83,97
	1 fl. 4 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	163,63
	1 fl. 6 mL 15 mg/mL	237,72	I	65 %	237,72

■ **Acide zolédronique**

<b>ACLASTA</b>					
1 inj. IV en 15 min Apport de calcium préalable	1 fl. 5 mg	358,56	I	65 %	358,56

## MALADIE DE PAGET (2)

### Biphosphonates

La voie IV semble plus simple à utiliser que la voie orale.

- L'**acide tiludronique (SKELID)**, comprimés dosés à 200 mg, s'utilise *per os*, à la posologie de 400 mg soit 2 cp./j, en une seule prise, pendant une durée de 12 sem. au maximum pour la 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide risédronique (ACTONEL 30 mg)**, cp. à 30 mg, s'utilise *per os* à la posologie de 30 mg/j pendant une durée de 2 mois pour la 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide zolédronique (ACLASTA)** est administré en perf. IV de 5 mg pendant au moins 15 min, pour une 1<sup>re</sup> cure.
- L'**acide pamidronique (OSTEPAM)**, s'utilise à la posologie de 120 à 180 mg en perfusion IV, dose répartie sur 2 à 3 j consécutifs, pour une 1<sup>re</sup> cure.

#### Suivi du traitement

- La réponse biologique est variable, et peut être longue à se manifester. Habituellement elle persiste plusieurs mois (3 à 6 mois, voire plus) après l'arrêt du traitement.
- Une 2<sup>e</sup> cure peut être envisagée, en général au moment de la réascension des phosphatases alcalines (25 % de la valeur atteinte après la fin de la 1<sup>re</sup> cure), mais toujours après un intervalle libre de **2 mois** pour le **risédronate**, **6 mois** pour le **tiludronate** et le **pamidronate**, voire beaucoup plus pour le **zolédronate**, en raison de l'effet rémanent des **biphosphonates**.
- Les précautions d'emploi, les effets indésirables sont envisagés dans le chapitre consacré à l'ostéoporose.

### Médications complémentaires

Les **antalgiques usuels** (paracétamol, 1,5 à 3 g/j, aspirine 1,5 à 2 g/j) ou les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** en cure courte peuvent apporter un soulagement suffisant et rapide dans certaines formes douloureuses.

**Calcium, vitamine D**, sont utiles en cas de carence manifeste.

### Tableaux particuliers

- La coxopathie pagétique et l'arthrose du genou sur os pagétique doivent être traitées comme une arthrose banale, par traitement antalgique et/ou anti-inflammatoire. Pour la plupart des auteurs, une localisation pagétique autour de l'articulation coxofémorale constitue une indication au traitement antiostéoclastique.
- Les fractures des os des membres consolident facilement et parfois même rapidement. Le matériel d'ostéosynthèse n'est pas contre-indiqué. Les **biphosphonates** doivent être suspendus.
- Les fissures ou fractures incomplètes, sont justiciables du repos et éventuellement d'une cure de **calcitonine** (les **biphosphonates** sont contre-indiqués).
- Les déformations diaphysaires, lorsqu'elles retentissent sur les articulations sus- ou sous-jacentes peuvent bénéficier d'une ostéotomie correctrice.
- En cas de dégénérescence sarcomateuse : radiothérapie, amputation, chimiothérapie, restent d'efficacité très modeste.



**BIPHOSPHONATES (MALADIE DE PAGET) (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la résorption osseuse ostéoclastique. Effet antalgique sur la douleur pagétique.

**INDICATIONS**

Traitement de la maladie osseuse de Paget de l'adulte.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients.

Hypocalcémie.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

**Fractures traumatiques, fissures pagétiques, ostéotomies.**

Maladie de Paget juvénile.

**Grossesse et allaitement.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les patients doivent bénéficier d'un apport suffisant en **calcium** et en **vitamine D**. Les troubles du métabolisme calcique (hypocalcémie, déficit en vitamine D) doivent être contrôlés avant de commencer le traitement.

Il est également conseillé d'administrer des suppléments de calcium (500 mg x 2/j) pendant au moins 10 j suivant l'administration d'**ACLASTA**.

Le mode d'administration des **biphosphonates** est important : les comprimés doivent être avalés entiers, sans être croqués, à distance d'aliments, en position assise ou debout, avec un grand verre d'eau plate faiblement minéralisée en calcium et en magnésium. Les patients ne doivent pas s'allonger au cours des 30 min qui suivent la prise d'un comprimé. Selon les produits, la prise peut avoir lieu :

- soit au moins 30 min avant la 1<sup>re</sup> prise alimentaire ou la première boisson (autre que de l'eau) de la journée ;
- soit à tout autre moment de la journée, à au moins 2 h de distance de toute prise d'aliments ou de boissons, et au moins 30 min avant d'aller se coucher.

Les **biphosphonates** par voie IV ne doivent pas être dilués dans des solutions contenant du **calcium**.

Les patients doivent être correctement hydratés avant l'administration d'**ACLASTA** ; en particulier ceux recevant un traitement diurétique.

**ACLASTA** n'est pas recommandé chez les

patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

En cas de fracture il est recommandé d'interrompre le traitement, jusqu'à complète consolidation.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont principalement de nature gastro-intestinale : douleurs abdominales ou gastriques, nausées, diarrhées, parfois constipation ; ces effets sont d'intensité légère à modérée et leur incidence est liée à la dose. Ils sont moins fréquents avec la voie IV.

Des douleurs articulaires, osseuses et des crampes sont possibles.

Des cas rares d'asthénie, de sensations vertigineuses, de céphalées, de réactions cutanées, voire d'asthme chez des sujets prédisposés, ont été rapportés.

Avec la voie IV, un syndrome pseudogrippal accompagné de fièvre, malaise, rigidité, asthénie et réactions vasomotrices, peut survenir pendant ou après une perfusion ; il peut être prévenu et disparaît en moins de 4 j.

Troubles métaboliques (cf. Précautions d'emploi) : hypocalcémies (souvent asymptomatiques), hypophosphatémie, hypomagnésémie.

De très rares cas d'ostéonécrose (principalement de la mâchoire) ont été rapportés chez les patients traités par des biphosphonates.

**Biphosphonates et ostéonécrose de la mâchoire**

Un examen dentaire avec des soins dentaires préventifs appropriés devra être pris en considération avant l'instauration d'un traitement par **biphosphonates** chez des patients présentant des facteurs de risque associés (par exemple : cancer, chimiothérapie, **corticoïdes** ou mauvaise hygiène buccale).

Au cours du traitement, ces patients devront éviter dans la mesure du possible toute intervention dentaire invasive.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les **biphosphonates** doivent être absorbés à distance (plus de 2 h) des **sels de calcium**, du **magnésium**, du **fer** ou de l'**aluminium**, ou de **topiques gastro-intestinaux, antiacides**, qui en diminuent l'absorption digestive.

L'association des **biphosphonates** avec des produits susceptibles d'entraîner des troubles de la minéralisation doit être évitée.

**CALCIUM (1)**

## ■ Calcium

<b>CACIT</b>					
Calcithérapie à forte dose : 500 à 1 200 mg/j (calcium-élément)	60 cp. efferv. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	30 cp. efferv. 1 g	6,97		65 %	0,23
<b>CALCIUM SANDOZ</b>					
Idem <b>CACIT</b>	20 cp. efferv. 500 mg	2,88		65 %	0,14
	30 sach. sol. buv. 500 mg	3,90		65 %	0,13
<b>CALCIFORTE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 amp. buv. 500 mg	5,15		65 %	0,17
<b>CALCIDOSE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 sach. pdre 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIPRAT</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg	6,97		65 %	0,12
	60 cp. 750 mg	10,41		65 %	0,17
	30 cp. 1 000 g	6,97		65 %	0,23
<b>CALPEROS</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. à sucer 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALTRATE</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. séc. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>DENSICAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 600 mg	6,97		65 %	0,12
<b>OSTRAM</b>					
Idem <b>CACIT</b>	30 sach. 0,6 g	6,97		65 %	0,23
	30 sach. 1,2 g	3,90		65 %	0,13
<b>OROCAL</b>					
Idem <b>CACIT</b>	60 cp. 500 mg	6,97		65 %	0,12
<b>CALCIDIA</b>					
2 à 3 sach./j	20 sach. granulés 1,54 g	5,64		65 %	0,28

## OSTÉOPOROSE (2)

### Comment apprécier l'ostéoporose

La densitométrie osseuse (DMO) par absorption biphotonique à rayons X est la technique actuellement la plus utilisée. Elle mesure essentiellement une quantité (mais pas la « qualité »), exprimée sur les zones les plus exposées à des fractures (col fémoral, rachis lombaire, poignet moins souvent), et selon plusieurs paramètres :

- par un chiffrage en  $\text{g/cm}^2$ ,
- par le T-score qui se réfère aux valeurs théoriques de la densité osseuse présumée maximale enregistrée chez l'adulte jeune entre 20 et 25 ans,
- par le Z-score, qui se réfère à la valeur moyenne des sujets de même sexe et de même âge ; il diminue normalement avec l'âge.

L'OMS a proposé pour le seuil diagnostique de l'ostéoporose une valeur du T-score  $\leq 2,5$  écarts-types (ou DS, déviation standard).

Ceci permet d'insister sur le fait que toutes ces valeurs « statistiques » doivent être interprétées en fonction de la clinique, au moins pour ne pas alarmer inutilement nombre de patients. Elles ont rarement, prises seules, une valeur décisionnelle thérapeutique. La recherche de fractures vertébrales méconnues cliniquement (en dehors des cas où une importante diminution, récente et chiffrée, de la taille orienterait) peut se faire par un cliché simple du rachis de profil, ou par la technique peu irradiante du VFA (*Vertebral Fracture Assessment*) quand on en dispose. Enfin, il faut rappeler qu'au rachis lombaire, les valeurs du T-score ne sont plus utilisées après 70 ans, et qu'une arthrose surajoutée vient fréquemment surestimer les valeurs retrouvées.

Elles ont un intérêt certain dans le suivi évolutif, en rappelant que les mesures ne doivent pas être trop rapprochées et

qu'elles doivent être faites avec le même appareillage (en raison des variations possibles d'étalonnage).

Le terme d'**ostéopénie**, qui se définissait par un T-score compris entre -2,5 et -1,5 DS ne devrait plus être utilisé, car ces valeurs ne correspondent pas à un risque statistique plus important de fracture.

Le **seuil fracturaire** est une valeur théorique, calculée dans une population souffrant d'une ostéoporose compliquée de fracture, au-dessous de laquelle le risque de fracture est considéré comme plus important. Il ne signifie pas que la survenue d'une fracture est inéluctable. Ce terme inquiète inutilement les patients, même si leurs valeurs sont situées « au-dessus ».

### Objectifs du traitement

Ils sont importants à considérer, faute de traitement idéal actuellement.

#### Chez le sujet jeune et à la ménopause

Le traitement vise à améliorer la qualité du tissu osseux et à augmenter la masse osseuse ou au moins à freiner sa diminution physiologique, ou excessive. Il s'agit d'une **prévention**.

#### Au stade d'ostéoporose constituée

L'objectif principal est de diminuer le risque de fractures par les médicaments susceptibles d'améliorer la qualité du tissu osseux et d'augmenter la masse osseuse (cet objectif est nécessairement modeste à l'heure actuelle), mais aussi par toutes les méthodes permettant de limiter les chutes, source principale de fracture.

#### Au moment des complications

L'objectif du traitement est en fait symptomatique :

- atténuation des douleurs en relation directe avec l'ostéoporose, c'est-à-dire essentiellement les douleurs qui accompagnent un tassement vertébral ;
- c'est aussi le traitement des fractures.

**CALCIUM (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Apport calcique.

**INDICATIONS**

Carences calciques en période de croissance, de grossesse et d'allaitement.

Traitement d'appoint des ostéoporoses.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Hypercalcémie, hypercalciuries avec lithiase calcique, calcifications tissulaires (néphrocalcinoses).

Immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie : le traitement calcique ne doit être utilisé qu'à la reprise de la mobilisation.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

En cas d'insuffisance rénale contrôler régulièrement la calcémie et la calciurie et éviter l'administration de fortes doses.

En cas de traitement de longue durée et/ou d'insuffisance rénale, il est nécessaire de contrôler la calciurie et de réduire ou d'interrompre momentanément le traitement si celle-ci dépasse 7,5 mmol/24 h (300 mg/24 h), chez l'adulte.

En cas de traitement associé à base de **digitaliques**, **tétracyclines**, **vitamine D**, **fluorure de sodium** (cf. Interactions médicamenteuses).

En raison de la présence d'aspartam dans cer-

tains produits, l'administration devra alors être évitée en cas de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Constipation, flatulence, éructations, nausées ; une sensation de bouche sèche a été signalée au moment de la prise des comprimés.

Hypercalciurie, hypercalcémie en cas de traitement prolongé à fortes doses, ou d'association à la **vitamine D**.

Risque d'hypophosphatémie.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Digitaliques** : l'administration orale de **calcium**, surtout si elle est associée à la **vitamine D**, risquant d'augmenter la toxicité des **digitaliques**, nécessite une stricte surveillance clinique et électrocardiographique.

**Tétracyclines** par voie orale : il est recommandé de décaler d'au moins 3 h la prise de **calcium** (interférence possible de l'absorption des **tétracyclines**).

**Vitamine D** à fortes doses : un contrôle hebdomadaire de la calciurie et de la calcémie est indispensable en raison du risque d'hypercalcémie.

En cas de traitement à base de **fluorure de sodium** ou par **biphosphonates**, il est conseillé de prendre le **calcium** à distance de ces produits (respecter un délai minimal de 2 h avant de prendre du **calcium**).

**Diurétiques thiazidiques** : risque d'hypercalcémie par suite de la réduction de l'élimination urinaire du calcium.

## MODULATEUR SÉLECTIF DE L'ACTIVATION DES RÉCEPTEURS AUX ŒSTROGÈNES (SERM)

### ■ Raloxifène

<b>EVISTA</b>					
Prévention des fractures vertébrales non traumatiques chez les femmes ménopausées à risque accru d'ostéoporose	28 cp. pell. 60 mg	24,54	I	65 %	0,88
	84 cp. pell. 60 mg	69,16	I	65 %	0,82
<b>OPTRUMA</b>					
Idem <b>EVISTA</b>	28 cp. pell. 60 mg	24,54	I	65 %	0,88
	84 cp. pell. 60 mg	69,16	I	65 %	0,82

### PROPRIÉTÉS

Modulateur sélectif de l'activation des récepteurs aux œstrogènes.

### INDICATIONS

Strictement réservé à la prévention des fractures vertébrales non traumatiques chez les femmes ménopausées à risque accru d'ostéoporose.

Il n'y a pas de données sur les fractures extra-vertébrales.

Lors de la décision du choix par rapport aux œstrogènes (traitement hormonal substitutif : THM) pour une femme ménopausée, il conviendra de prendre en compte les symptômes de la ménopause (le **raloxifène** n'a pas d'effet sur les bouffées de chaleur et les autres symptômes de la ménopause liés au déficit en œstrogènes), les effets sur le sein, et les risques et bénéfices cardiovasculaires.

Les études cliniques ont montré que le **raloxifène** à 60 mg/j réduit significativement le cholestérol total et le LDL-cholestérol. Les concentrations de HDL-cholestérol et de triglycérides ne sont pas modifiées. Par rapport aux œstrogènes aucune donnée n'est encore disponible pour démontrer un bénéfice du **raloxifène** sur la maladie cardiovasculaire athéromateuse.

Dans les essais cliniques le **raloxifène** n'a pas stimulé l'endomètre postménopausique, ni le tissu mammaire. À trois ans, il n'a pas augmenté le risque de cancer de l'endomètre, et le risque relatif de cancer du sein nouvellement diagnostiqué était significativement plus faible chez les femmes ménopausées traitées par **raloxifène** que chez les femmes ménopausées sous placebo.

### CONTRE-INDICATIONS

Femme en âge de procréer : le **raloxifène** ne doit être utilisé que chez les femmes ménopausées. Épisode actuel ou antécédent d'accidents thromboemboliques veineux, incluant la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse rétinienne.

Hypersensibilité au **raloxifène** ou aux autres constituants du comprimé.

Insuffisance hépatique, y compris la cholestase.

Insuffisance rénale sévère.

Saignement génital inexpliqué.

Patiente ayant un cancer de l'endomètre ou du sein, la sécurité d'emploi dans ce groupe de patientes n'ayant pas été prouvée.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le **raloxifène** est associé à un risque accru d'accident thromboembolique veineux qui semble identique à celui rapporté avec le THM.

Il doit être interrompu dès que possible en cas de maladie ou de situation entraînant une immobilisation prolongée, et 3 j avant une immobilisation programmée.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Accidents thromboemboliques veineux : thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire et thrombose veineuse rétinienne.

Thrombophlébite superficielle.

Bouffées de chaleur.

Crampes des jambes.

Œdème périphérique.

Faible diminution du nombre de plaquettes.

Rares cas d'augmentation modérée des transaminases.

L'incidence des symptômes mammaires et des saignements d'origine utérine s'est avérée moins forte chez les patientes sous **raloxifène** par rapport aux patientes sous traitement hormonal substitutif.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Dans l'éventualité d'une administration simultanée du **raloxifène** avec de la **warfarine** ou d'autres dérivés de la **coumarine**, le taux de prothrombine devra être surveillé.

Le **raloxifène** ne doit pas être administré en association avec la **colestyramine**, qui réduit l'absorption et le cycle entérohépatique du **raloxifène**.

**CALCIUM + VITAMINE D3 (1)****■ Calcium + colécalciférol**

<b>CACIT VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 sach./j	30 sach.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 000 mg + <b>vit. D3</b> 880 UI	90 sach.	19,60		65 %	0,22
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 440 UI	180 cp. à croquer et à sucer			NR	
<b>CALCIDOSE VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 sach./j	60 sach.	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>CALPEROS D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>CALTRATE VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j ou 2 sach./j	60 cp. pell.	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 600 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI	180 cp. pell.	19,60		65 %	0,11
<b>DENSICAL VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 2 cp./j	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI					
<b>OSTRAM VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 sach./j	30 sach.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1,2 g + <b>vit. D3</b> 800 UI	90 sach.	19,60		65 %	0,22
<b>EPTAVIT</b>					
Ostéoporose : 1 cp./j	30 cp efferv.	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 g + <b>vit. D3</b> 880 UI	90 cp efferv.	19,60		65 %	0,22
<b>FIXICAL VITAMINE D3</b>					
Ostéoporose : 1 cp./j	30 cp. à sucer	6,97		65 %	0,23
<b>Ca-élément</b> 1 g + <b>vit. D3</b> 800 UI	90 cp. à sucer	19,60		65 %	0,22
Ostéoporose : 1 cp. matin et soir	60 cp. à croquer et à sucer	6,97		65 %	0,12
<b>Ca-élément</b> 500 mg + <b>vit. D3</b> 400 UI	180 cp. à croquer et à sucer	19,60		65 %	0,11

## OSTÉOPOROSE (5)

### Traitement des douleurs d'un tassement vertébral ostéoporotique récent

#### Rappel clinique

Les douleurs sont d'intensité variable mais généralement assez forte pendant 2 à 3 sem. ; puis elles s'estompent progressivement, la crise douloureuse liée à un tassement pouvant durer 4 à 8 sem.

Des douleurs persistant après ce délai doivent faire penser à la survenue éventuelle d'un nouveau tassement, au réveil d'une arthrose rachidienne associée, voire faire discuter l'origine ostéoporotique du tassement.

Elles siègent dans la région de la vertèbre atteinte, rachis dorsal ou rachis lombaire (mais **jamais le rachis cervical**), et ne s'accompagnent qu'exceptionnellement d'irradiations en ceinture et de signes neurologiques.

Il est essentiel de rappeler que beaucoup de tassements vertébraux se font sans douleurs et sont de découverte radiologique fortuite.

L'immobilisation au lit éventuellement, puis rapidement au fauteuil, est indispensable quand le tassement est récent et quand la douleur est forte ; il s'agit d'une fracture et ce sont les mouvements qui sont douloureux. **Dans les formes récentes, la discussion d'une vertébroplastie, en milieu spécialisé, peut être utile.**

Il faut souligner que le risque de nouvelle fracture augmente dans l'année qui suit une 1<sup>re</sup> fracture ostéoporotique.

#### Traitement médicamenteux

Les **antalgiques usuels** sont toujours utiles.

- **Paracétamol** seul ou associé, à dose suffisante et régulièrement répartie, pendant 4 à 8 sem. (délai moyen de cicatrisation du tassement).

- Ils peuvent représenter le seul traitement dans les formes moyennement douloureuses.

Les **biphosphonates** en perfusion sont actuellement souvent utilisés, en milieu hospitalier, dans un but à la fois antalgique immédiat et thérapeutique (**acide zolédronique, ZOMETA ou ACLASTA**).

La **prévention** des phlébites et des escarres est indispensable chez ces sujets âgés.

#### Fracture ostéoporotique du sacrum

Dans le cadre de l'ostéoporose cette fracture n'est pas exceptionnelle, et peut survenir quasi spontanément, ou à la suite d'une chute.

La douleur pouvant n'apparaître que quelques jours après, il en résulte souvent un retard au diagnostic, d'autant plus que les radiographies sont rarement « parlantes ». Le recours à un scanner ou une IRM, voire à une scintigraphie osseuse (fixation en « H » caractéristique), est utile dans les cas difficiles.

Le traitement comprend la mise en décharge relative : fauteuil, cannes-béquilles, ce qui peut raccourcir l'évolution spontanée marquée par l'impotence douloureuse qui peut durer 2 à 3 mois ; la prescription d'**antalgiques usuels**, voire d'un **biphosphonate** en perfusion unique, comme pour un tassement vertébral.

**CALCIUM + VITAMINE D3 (2) – PHARMACOLOGIE****INDICATIONS**

Correction des carences vitamino-calciques chez les sujets âgés. Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l'ostéoporose, chez les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celles de la calcithérapie et celles liées à la **vitamine D**.

Tenir compte de la dose de **vitamine D** par unité de prise et d'une éventuelle autre prescription de **vitamine D**.

Le produit doit être prescrit avec précaution chez les patients atteints de sarcoïdose en raison d'une augmentation possible du métabolisme de la **vitamine D** en sa forme active. Chez ces patients, il faut surveiller la calcémie et la calciurie.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Cf. Contre-indications.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ceux de la calcithérapie, plus les risques de surdosage en **vitamine D** : hypercalcémie et hypercalciurie, avec nausées, vomissements, polydipsie, polyurie, constipation, etc.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Celles de la calcithérapie, plus :

- **phénytoïne, barbituriques** : diminution possible de l'effet de la **vitamine D3** par inhibition de son métabolisme ;
- **glucocorticoïdes** : diminution possible de l'effet de la **vitamine D3**.

Interaction possible avec des aliments contenant : acide oxalique, phosphates, acide phytique.



**PHOSPHORE**■ **Phosphore**

<b>PHOSPHONEUROS</b>					
150 à 200 gtttes/j (soit 1,2 à 1,6 mg de phosphore-élément) en fractionnant les prises	2800 gtttes (fl. 120 mL) 10 gtttes = 78,8 mg	5,10	II	65 %	0,00
<b>PHOCYTAN</b>					
Apport IV de phosphore principalement au cours des alimentations parentérales	50 fl. 20 mL	HOP			
	0,33 mmol/mL				
	1 fl. 100 mL	HOP			
	0,33 mmol/mL				
	10 amp. 10 mL	37,82		65 %	0,38
	0,66 mmol/mL				

**PROPRIÉTÉS**

Le phosphore par voie orale a pour objectif de faire diminuer la calciurie en formant dans l'intestin un complexe de phosphate tricalcique peu assimilable. Il est absorbé par le tube digestif et éliminé par le rein. La diminution de la résorption calcique entraîne une diminution parallèle de la calciurie et de la magnésurie.

L'action osseuse du phosphore est indirecte : la diminution de l'absorption calcique provoque une hyperparathyroïdie réactionnelle et une stimulation de l'activité ostéoblastique.

L'action hypocalcémiante n'est plus utilisée du fait du risque majeur de calcifications diffuses métastatiques.

**INDICATIONS**

Hypercalciurie idiopathique avec ou sans lithiase.

Diabète phosphaté et tubulopathies avec pertes de phosphore.

Traitement associé au cours des ostéoporoses ou de la corticothérapie au long cours, soit avec une calcithérapie (traitement alterné : **calcium** pendant 3 semaines puis **phosphore**

pendant 10 j), soit administré en continu avec la **calcitonine**.

Apport phosphoré en nutrition parentérale (formes injectables).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hyperkaliémie.

Hypocalcémie.

Insuffisance rénale chronique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

L'administration de **phosphore** est rarement isolée. Elle implique une surveillance régulière du bilan phospho-calcique : calcémie, calciurie, phosphorémie, créatininémie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les effets indésirables les plus fréquents sont digestifs : intolérance digestive avec douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée. Précipitations calciques tissulaires (reins, muscles) en cas d'hypercalcémie et de doses dépassant 2 g/j.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Médications susceptibles de ralentir ou bloquer l'absorption du produit : **sucralfate**, **hydroxydes d'aluminium** et de **magnésium**, **gels de phosphate d'alumine**.

**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (1)**■ **Alendronate monosodique**

<b>FOSAMAX</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique avérée : 10 mg/j	28 cp. 10 mg	31,75	I	65 %	1,13
Traitement de l'ostéoporose masculine 70 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique : 70 mg/j, 1 j/sem.	4 cp. 70 mg	20,32	I	65 %	5,08
	12 cp. 70 mg	57,25	I	65 %	4,77
<b>FOSAVANCE</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez les patientes à risque d'insuffisance en vitamine D : 1 cp./sem.	4 cp. 70 mg alendronate/70 µg vit. D3 colécalciférol (2 800 UI)	17,42	I	65 %	4,36
	4 cp. 70 mg alendronate/140 µg vit. D3 colécalciférol (5 600 UI)	17,42	I	65 %	4,36
	12 cp. 70 mg alendronate/70 µg vit. D3 colécalciférol (2 800 UI)	47,15	I	65 %	3,93
	12 cp. 70 mg alendronate/140 µg vit. D3 colécalciférol (5 600 UI)	47,15	I	65 %	3,93

D'autres biphosphonates sont en regard des maladies : Maladie de Paget et Hypercalcémie.

## OSTÉOPOROSE (8)

**Des précautions sont à prendre** pour le traitement par **biphosphonates** :

- pour la voie orale, prise à jeun avec un grand verre d'eau (plate), en position assise, 1/2 h avant le petit déjeuner, et sans s'allonger dans cet intervalle pour éviter un reflux, ou à au moins de 2 h de toute prise d'aliments ou de boisson et au moins 30 min avant de se coucher. En cas de dysphagie, de douleur rétrosternale, le produit doit être arrêté ;

- il est contre-indiqué en cas de pathologie œsophagienne, d'hypocalcémie et d'insuffisance rénale sévère ;

- en cas d'association avec **calcium** ou **calcium + vitamine D** la prise doit se faire à distance du **biphosphonate** ;

- bien qu'une ostéonécrose de la mâchoire ait été rapportée chez des patients ostéoporotiques traités par **biphosphonates** par voie orale, cette complication grave reste exceptionnelle. Un examen dentaire ainsi que des soins dentaires préventifs appropriés doivent être envisagés, en particulier chez les patientes présentant des facteurs de risque associés (ex : cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccale) ;

- la survenue de douleurs musculo-squelettiques en relation avec le traitement peut éventuellement conduire à son interruption. Aux cuisses, il est important de s'assurer de l'absence de fissure sous-trochantérienne, au besoin par une IRM ou une scintigraphie osseuse, avant la survenue éventuelle d'une fracture sous-trochantérienne dite atypique ; cette éventualité, rare, semble se produire plus souvent après 5 à 7 ans de traitement.

On dispose dans le commerce de :

- **risédronate monosodique** : **ACTONEL** cp. dosés à 5, 35 et 75 mg ;

- **alendronate monosodique** : **FOSAMAX** cp. dosés à 10 et 70 mg ; **FOSAVANCE** 70/2 800 ou 5 600, **ADROVANCE** 70/2 800 ou 5 600 quand ils sont associés à de la vitamine D.

La durée de la prescription n'est pas encore clairement établie, et reste assujettie aux résultats d'essais contrôlés. Une durée d'au moins 4 ans peut être actuellement proposée ; au-delà, la décision de

poursuivre reste une décision individuelle prenant en compte l'évaluation du risque fracturaire et la durée de l'effet rémanent de chaque produit.

La prescription d'**ACTONEL** 5 mg et de **FOSA-MAX** 10 mg est quotidienne : 1 cp./j ; la contrainte qu'elle représente, avec son risque de mauvaise observance à long terme, peut conduire à utiliser les autres dosages.

La prescription d'**ACTONEL** 35 mg et de **FOSA-MAX** 70 mg est hebdomadaire : 1 cp./j x 1/sem.

La prescription d' **ACTONEL** 75 mg est mensuelle : la dose recommandée est de 1 cp. à 75 mg par voie orale, 2 j consécutifs/mois. L'acide **ibandronique** (**BONVIVA**, cp. pell. à 150 mg : 1 cp./mois), dont l'intérêt réside dans la prise unique, mensuelle, n'est plus remboursé (l'efficacité sur les fractures du col du fémur n'a pas été établie).

Dans certains cas, on peut utiliser les **biphosphonates** par voie IV, à un rythme de prescription beaucoup plus espacé. On dispose de l'acide **zoledronique**, **ACLASTA** 5 mg ou **ZOMETA** 4 mg. sol. pour perfusion.

Cette prescription a l'avantage d'être moins contraignante pour les patients (en favorisant une meilleure observance ; avec une administration à domicile). La prescription initiale est souvent faite à l'occasion d'une éventuelle hospitalisation pour fracture, en raison de leur effet antalgique immédiat. Il est recommandé d'attendre 15 j après une fracture de hanche opérée avant de la commencer.

Il existe un risque de survenue d'accidents aigus d'hypersensibilité, qui peuvent être prévenus par la prise de **paracétamol** pendant 72 h, et un risque de fibrillation atriale dont il faut tenir compte.

Pour le traitement de l'ostéoporose postménopausique, de l'ostéoporose masculine, et de l'ostéoporose associée à une corticothérapie au long cours par voie générale, la dose recommandée est une perf. IV de 5 mg d'**ACLASTA** x 1/an.

La décision de poursuivre ce traitement doit être réévaluée régulièrement au cas par cas en fonction des bénéfices et des risques potentiels d'**ACLASTA**, particulièrement après 5 ans ou plus de traitement.

**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (2)****■ Risédronate monosodique**

<b>ACTONEL</b>					
5 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique, prévention de l'ostéoporose postménopausique chez les femmes à risque élevé	28 cp. pell. 5 mg	28,62	I	65 %	1,02
Prévention de la perte osseuse en cas de corticothérapie prolongée (> 3 mois) avec équivalent prednisone > 7,5 mg/j : 5 mg/j	4 cp. pell. 35 mg	25,11	I	65 %	6,28
35 mg : traitement de l'ostéoporose postménopausique pour réduire le risque de fractures vertébrales, ou de l'ostéoporose avérée pour diminuer le risque de fracture de la hanche : 35 mg/j, 1 j/sem.	12 cp. pell. 35 mg	70,75	I	65 %	5,90
75 mg : 1 cp./j pdt 2 j consécutifs par mois à débiter toujours le même jour du mois	2 cp. pell. 75 mg	26,87	I	65 %	13,44
	6 cp. pell. 75 mg	75,70	I	65 %	12,62
<b>ACTONELCOMBI</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez les patientes à risque d'insuffisance en vitamine D : 1 cp./sem. puis 1 sach./j les 6 j suivants	4 cp./sach.	24,89	I	65 %	6,22
<b>Risédronate monosodique</b> 35 mg (cp.) + <b>calcium</b> 1 000 mg + <b>colécalciférol</b> 880 UI (sach.)	12 cp./sach.	73,07	I	65 %	6,09

**■ Ibandronate monosodique**

<b>BONVIVA</b>					
Traitement de l'ostéoporose postménopausique chez la femme à risque augmenté de fractures :	1 cp. 150 mg		I	NR	
1 cp. x 1/mois	3 cp. 150 mg		I	NR	
1 inj. IV en 30 s tous les 3 mois	1 ser. prér. 3 mg/3 mL		I	NR	

**OSTÉOPOROSE (9)****Ranélate de strontium**

Schématiquement, le **ranélate de strontium PROTELOS** augmente la formation osseuse et diminue la résorption osseuse et rééquilibre ainsi le métabolisme osseux en faveur de la formation. Indiqué chez les patient(e)s à risque élevé de fracture (AMM et remboursement variables), **PROTELOS** réduit le risque de fractures vertébrales et de la hanche. Une évaluation individuelle de l'ensemble des risques pour chaque patient(e) est nécessaire. La durée optimale du traitement n'a pas été établie.

**► Modalités d'administration**

La dose quotidienne recommandée est de 1 sach. de 2 g de granulés en une seule prise par voie orale, et doit être administrée à distance des repas du fait de la diminution de l'absorption du **ranélate de strontium** par les aliments, le lait et ses produits dérivés. Étant donné sa lente absorption, **PROTELOS** doit être pris au moment du coucher et de préférence au moins 2 h après le dîner.

Les patientes doivent recevoir, en plus, du **calcium** et de la **vitamine D** si leurs apports alimentaires sont insuffisants.

**► Précautions d'emploi et contre-indications**

**PROTELOS** est contre-indiqué :

- chez les patient(e)s ayant des antécédents d'événements veineux thromboemboliques (EVT) et doit être utilisé avec précaution chez les patient(e)s à risque d'EVT ;
- les patient(e)s présentant des facteurs de risques cardiovasculaires non contrôlés (hypertension artérielle, hyperlipidémie, diabète, tabagisme) ;
- en cas d'immobilisation temporaire ou permanente due par exemple à une convalescence post-chirurgicale ou à un alitement prolongé.

Des réactions cutanées mettant en jeu le pronostic vital, telles que des syndromes de Stevens-Johnson, des nécrolyses épidermiques toxiques (syndromes de Lyell) et des DRESS syndromes ont été rapportées sous **PROTELOS**.

**BIPHOSPHONATES (OSTÉOPOROSE) (3) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Inhibiteur de la résorption osseuse ostéoclastique.

**INDICATIONS**

Traitement de l'ostéoporose postménopausique.

Avec des libellés d'AMM un peu différents selon les produits, et susceptibles de variation.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un de ses excipients.

Hypocalcémie.

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

Maladies de l'œsophage qui ralentissent le transit œsophagien : sténose, achalasie.

**Grossesse et allaitement** : sans objet chez la femme ménopausée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les patients doivent bénéficier d'un apport suffisant en **calcium** et en **vitamine D**. Les troubles du métabolisme calcique (hypocalcémie, déficit en vitamine D) doivent être contrôlés avant de commencer le traitement.

Le mode d'administration des **biphosphonates** est important : les comprimés doivent être avalés entiers, sans être croqués, à distance d'aliments, en position assise ou debout, avec un grand verre d'eau plate faiblement minéralisée en calcium et en magnésium. Les patients ne doivent pas s'allonger au cours des 30 min qui suivent la prise d'un comprimé. Selon les produits, la prise peut avoir lieu :

- soit au moins 30 min avant la première prise alimentaire ou la première boisson (autre que de l'eau) de la journée ;

- soit à tout autre moment de la journée, à au moins 2 h de distance de toute prise d'aliments ou de boissons, et au moins 30 min avant d'aller se coucher.

Prévenir les patientes d'arrêter le **biphosphonate** et de consulter en cas de dysphagie, de déglutition douloureuse ou de douleur rétro-sternale.

Prudence chez les patientes ayant une affection gastro-intestinale haute évolutive, telle que : dysphagie, pathologie œsophagienne symptomatique, gastrite, duodénite ou ulcère, ainsi

que chez les malades prenant des **AINS** ou de l'**aspirine**.

En cas de fracture il est recommandé d'interrompre le traitement, jusqu'à complète consolidation.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ils sont principalement de nature gastro-intestinale : douleurs abdominales ou gastriques, nausées, diarrhées, parfois constipation ; ces effets sont d'intensité légère à modérée, et leur incidence est liée à la dose. La survenue d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiennes favorisée par la prise couchée et/ou avec une faible quantité d'eau est possible.

Des douleurs articulaires, osseuses et des crampes sont possibles. Des cas rares d'asthénie, de sensations vertigineuses, de céphalées, de réactions cutanées, voire d'asthme chez des sujets prédisposés, ont été rapportés.

Une hypocalcémie, en général asymptomatique, a parfois été observée.

Le risque de survenue d'une ostéonécrose de la mâchoire est beaucoup plus faible que lors de l'emploi des **biphosphonates** dans les ostéolyses malignes.

**Biphosphonates et ostéonécrose de la mâchoire**

Un examen dentaire avec des soins dentaires préventifs appropriés devra être pris en considération avant l'instauration d'un traitement par **biphosphonates** chez des patients présentant des facteurs de risque associés (par exemple : cancer, chimiothérapie, corticoïdes ou mauvaise hygiène buccale).

Au cours du traitement, ces patients devront éviter dans la mesure du possible toute intervention dentaire invasive.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les **biphosphonates** doivent être avalés à distance des **sels de calcium**, du **magnésium**, du **fer** ou de l'**aluminium**, ou de **topiques gastro-intestinaux**, **antiacides**, qui en diminuent l'absorption digestive.

L'association des **biphosphonates** avec des produits susceptibles d'entraîner des troubles de la minéralisation doit être évitée.

Les patientes doivent attendre au moins 1/2 h après la prise, avant de prendre tout autre médicament.

## HORMONE PARATHYROÏDIENNE (OSTÉOPOROSE)

## ■ Tériparatide

FORSTEO					
20 µg/j en inj. SC Durée : 18 mois Supplémentation vitamino-calcique associée si apports insuffisants	1 styl. 3 mL 20 µg/80 µL	341,63	I	65 %	341,63

## PROPRIÉTÉS

Parathormone de synthèse, favorise la formation osseuse en augmentant l'activité ostéoblastique au profit de l'activité ostéoclastique.

## INDICATIONS

Traitement de l'ostéoporose postménopausique avérée des femmes présentant au moins 2 fractures vertébrales et selon la procédure des médicaments d'exception.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au tériparatide.  
Hypercalcémie.  
Maladie métabolique osseuse en dehors de l'ostéoporose primitive.  
Hyperparathyroïdie, maladie de Paget.  
Élévation inexpliquée des phosphatases alcalines.  
Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min).

**Grossesse et allaitement** : sans objet chez la femme ménopausée.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Augmentation possible, transitoire, de la calcémie en début de traitement sans nécessité de surveillance.

Hypercalciurie avec risque de lithiase urinaire chez les patientes prédisposées (antécédent de lithiase urinaire).

Hypotension orthostatique parfois observée.

Association avec prudence des **digitaliques**.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs des membres musculo-squelettiques.

Affections hématologiques : anémie.

Hypercalcémie.

Asthénie, dépression.

Céphalées, vertiges, sciatique.

Palpitations, hypotension, dyspnée.

Nausées, vomissements, hernie hiatale, RGO.

Réaction au point d'injection.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'hypercalcémie peut prédisposer au surdosage en **digitaliques** imposant la surveillance de la calcémie chez les patients sous **digitaliques**.

## RANÉLATE DE STRONTIUM (OSTÉOPOROSE)

## ■ Ranélate de strontium

PROTELOS					
1 sach./j en une seule prise par voie orale au moment du coucher et de préférence au moins 2 h après le dîner	28 sach. 2 g	33,83	I	30 %	1,21

**PROPRIÉTÉS**

Schématiquement, le **ranélate de strontium** augmente la formation osseuse et diminue la résorption osseuse. Il rééquilibre ainsi le métabolisme osseux en faveur de la formation.

**INDICATIONS**

Traitement de l'ostéoporose postménopausique. Il réduit le risque de fractures vertébrales et de la hanche.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **ranélate de strontium**.

**Grossesse et allaitement** : sans objet chez la femme ménopausée.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Chez les patientes à risque accru d'événements veineux thromboemboliques (EVT), y compris les patientes ayant des antécédents d'EVT.

Déconseillé chez les patientes ayant une clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min ; un suivi périodique de la fonction rénale est recommandé chez les patientes atteintes d'insuffisance rénale chronique.

Le strontium interfère avec les méthodes colorimétriques de dosage du calcium sanguin et urinaire.

Contient de l'aspartame, pouvant être nocif pour les patientes atteintes de phénylcétonurie.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les plus fréquents sont les nausées et diarrhées en début de traitement, les céphalées.

Moins souvent : pertes fécales, dermatites, eczéma. Événements veineux thromboemboliques, troubles de la conscience, pertes de mémoire et crises convulsives.

Des augmentations transitoires de l'activité de la créatine-kinase (fraction musculo-squelettique), > 3 fois la limite supérieure de la normale, ont été rapportées. Dans la plupart des cas, ces valeurs se sont normalisées spontanément sans modification du traitement.

Rarement : réactions allergiques graves.

Exceptionnellement DRESS syndrome (*Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms*), syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Les aliments, le lait et ses produits dérivés et les médicaments contenant du calcium peuvent réduire la biodisponibilité du **ranélate de strontium** d'environ 60 à 70 %.

Par mesure de précaution, le traitement devra être suspendu lors de la prise par voie orale de **tétracyclines** ou de **quinolones**.



## VITAMINE D (1)

## ■ Ergocalciférol (ou vitamine D2)

<b>STÉROGYL</b>					
Ostéoporose : 2 gttes/j Ostéomalacie : 10 à 50 gttes/j au début du traitement, puis 2 à 5 gttes/j	1000 fl. 20 mL (gtte = 0,01 mg ou 400 UI)	2,66		65 %	0,00
<b>STÉROGYL 15A</b>					
Ostéoporose : 1/2 à 1 amp./an Ostéomalacie : 1 amp./sem. ou 2 sem., jusqu'à guérison	1 amp. buv. (600 000 UI = 15 mg)	2,12	II	65 %	2,12
<b>STÉROGYL 15H</b>					
Ostéoporose : 1/2 à 1 amp./an Ostéomalacie : 1 amp./sem. ou 2 sem., jusqu'à guérison	1 amp. buv. ou inj. en IM (600 000 UI = 15 mg)	2,23	II	65 %	2,23

## ■ Colécalciférol (ou vitamine D3)

<b>VITAMINE D3 BON</b>					
Ostéoporose : 1/2 à 1 amp./an Ostéomalacie : 1 amp./sem. ou 2 sem., jusqu'à guérison	1 amp. buv. ou inj. en IM (200 000 UI = 5 mg)	2,15	II	65 %	2,15
<b>ZYMAD</b>					
Ostéoporose : 2 à 3 gttes/j Max. 600 000 UI/an	333 fl. sol. buv. 10 mL (10 000 UI)	2,87	II	65 %	0,01
	1 amp. buv. 2 mL (80 000 UI)	2,03	II	65 %	2,03
	1 amp. buv. 2 mL (200 000 UI)	2,03	II	65 %	2,03
<b>ADRIGYL</b>					
Carence en vit. D Préventif : 2 à 6 gttes/j Curatif : 6 à 60 gttes/j Max. 600 000 UI/an	1 fl. sol. buv. 10 mL	2,47	II	65 %	2,47
<b>UVÉDOSE</b>					
Carence en vit. D Préventif : 1 amp./3 mois Curatif : 1 à 2 amp./mois	1 amp. buv. 2 mL (100 000 UI)	2,02	II	65 %	2,02

## VITAMINE D (2) – PHARMACOLOGIE

**PROPRIÉTÉS**

La **vitamine D** augmente l'absorption intestinale du **calcium** et des phosphates et favorise la minéralisation osseuse.

**INDICATIONS**

Traitement et/ou prophylaxie des états de carence en **vitamine D** (rachitisme, ostéomalacie).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** et **allaitement** : ne pas utiliser le **STÉROGYL 15A**.

Le **STÉROGYL 15 mg** contient une dose très élevée en **vitamine D**. Pour éviter tout surdosage, ne pas administrer plus d'une fois/an et éviter

l'association à d'autres traitements contenant cette vitamine.

Surveiller la calciurie et la calcémie et arrêter les apports de **vitamine D** si la calcémie dépasse 105 mg/mL (2,62 mmol/L) ou si la calciurie dépasse 4 mg/kg/j chez l'adulte.

**STÉROGYL 15A** : tenir compte de la présence d'alcool dans ce médicament.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Liés au surdosage en **vitamine D** : hypercalcémie et hypercalciurie, avec nausées, vomissements, polydipsie, polyurie, constipation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Diurétiques thiazidiques** : en raison du risque d'hypercalcémie, utiliser la posologie la plus faible recommandée et renforcer la surveillance de la calcémie.

Tenir compte de la présence d'alcool dans le **STÉROGYL 15A**.

## VITAMINE D (3) – MÉTABOLITES (1)

**■ Calcifédiol (ou 25-OH vitamine D3)**

<b>DÉDROGYL</b>					
Ostéomalacie : 4 à 10 gtt/j	300 fl. 10 mL (1 gtte = 400 UI de 25-OH vit. D3)	8,11	II	30 %	0,03

**PROPRIÉTÉS**

Métabolite de la vitamine D déjà hydroxylé en 25 et court-circuitant ainsi la phase hépatique de métabolisation de la vitamine D.

**INDICATIONS**

Ostéomalacie.  
Traitement de la carence en vitamine D.  
Prévention des troubles calciques de la corticothérapie et des **anticonvulsivants**.  
Prévention de la carence en vitamine D dans l'insuffisance rénale (voir aussi Hypoparathyroïdie).

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à l'un des constituants.  
Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Grossesse** : possible, ne pas dépasser 2 à 3 gtt/j.

**Allaitement** : possible ; tenir compte du passage dans le lait.

Surveiller la calciurie et la calcémie et arrêter les apports de **vitamine D** si la calcémie dépasse 105 mg/mL (2,62 mmol/L) ou si la calciurie dépasse 4 mg/kg/j chez l'adulte.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Liés au surdosage en **vitamine D** : hypercalcémie et hypercalciurie, avec nausées, vomissements, polydipsie, polyurie, constipation, etc.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Diurétiques thiazidiques** : en raison du risque d'hypercalcémie, utiliser la posologie la plus faible recommandée et renforcer la surveillance de la calcémie.

## VITAMINE D (4) – MÉTABOLITES (2)

■ **Alfacalcidol**

<b>UN-ALFA</b>					
Ostéomalacie, hypoparathyroïde : 1 à 6 mg/kg/j Ostéomalacie rénale : 1 à 2 mg/j E. : 0,05 mg/g/j	30 caps. 0,25 µg	6,90	I	65 %	0,23
	30 caps. 1 µg	14,97	I	65 %	0,50
	10 fl. sol. inj. IV	HOP	I		
	1 µg/0,5 mL				
	10 fl. sol. inj. IV 2 µg/mL	HOP	I		
	200 fl. sol. buv. 2 µg/mL (10 mL)	9,18	I	65 %	0,05
	30 caps. 0,5 µg	10,93	I	65 %	0,36

**PROPRIÉTÉS**

Précurseur de synthèse du métabolite actif de la vitamine D déjà hydroxylé en 1- $\alpha$  et court-circuitant ainsi la phase rénale de métabolisation de la vitamine D. Ses propriétés sont celles du 1-25(OH)<sub>2</sub> colécalciférol (**calcitriol**). Sa conversion est complète en 12 h et sa demi-vie d'élimination plasmatique de 24 h.

**INDICATIONS**

Ostéomalacie.  
Traitement de la carence en vitamine D.  
Prévention des troubles calciques de la corticothérapie et des **anticonvulsivants**.  
Prévention de la carence en vitamine D dans

l'insuffisance rénale (voir aussi Hypoparathyroïdie).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : possible, ne pas dépasser 2 à 3 gouttes/j.

**Allaitement** : possible ; tenir compte du passage dans le lait.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Cf. **DÉDROGYL**.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Cf. **DÉDROGYL**.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cf. **DÉDROGYL**.

■ **Calcitriol (ou 1,25 (OH)<sub>2</sub> vitamine D3)**

<b>ROCALTROL</b>					
Ostéomalacie vitamino-résistante : 2 à 4 caps./j	30 caps. 0,25 µg	9,24	I	65 %	0,31

**PROPRIÉTÉS**

Métabolite actif naturel de la vitamine D. Au niveau de l'intestin, augmente l'absorption du calcium et du phosphore.

Au niveau de l'os, augmente la résorption ostéoclastique, conjointement à la parathormone, permettant la minéralisation du tissu osseux.

Au niveau du rein, augmente la réabsorption tubulaire du phosphore, et peut-être du calcium.

**INDICATIONS**

Ostéomalacies vitamino-résistantes (et rachitismes).

Ostéodystrophie rénale.

Hypoparathyroïdie.

Pseudo-hypoparathyroïdie.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse et allaitement.**

Lithiase calcique avec hypercalciurie.

Hyperparathyroïdie primaire.

États connus d'hypersensibilité à la vitamine D.  
Hypercalcémies.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance régulière de la calcémie et de la phosphorémie, hebdomadaire en début de traitement ; et de la calciurie en l'absence d'insuffisance rénale.

Dosage mensuel de la créatinine, du magnésium, des phosphatases alcalines sériques.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Risque d'hypercalcémie, d'hyperphosphorémie entraînant des précipitations calciques dans les tissus mous.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Cf. **DÉDROGYL**, plus :

- **magnésium**, risque d'hypermagnésémie ;
- **digitaline**, risque d'arythmie ;
- **cholestyramine**, risque de diminution de l'absorption intestinale du **calcitriol**.

**BIPHOSPHONATES (HYPERCALCÉMIE) (1)****■ Pamidronate de sodium**

<b>OSTEPAM</b>					
Perf. IV unique (ou plusieurs perf. réparties sur 3-4 j) ; posologie à adapter à la calcémie < 3 mmol/L : 15-30 mg/cure 3-3,5 mmol/L : 30-60 mg/cure 3, 5-4 mmol/ 60-90 mg/cure > 4 mmol/L : 90 mg/cure À répéter en l'absence d'amorce de réduction de la calcémie dans les 48 h suivant le début du traitement	4 fl. 1 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	40,91
	1 fl. 2 mL 15 mg/mL	83,97	I	65 %	83,97
	1 fl. 4 mL 15 mg/mL	163,63	I	65 %	163,63
	1 fl. 6 mL 15 mg/mL	237,72	I	65 %	237,72

**■ Clodronate disodique**

<b>CLASTOBAN</b>					
300 mg/j en 1 perf. de 500 mL d'au moins 2 h jusqu'à normalisation de la calcémie sans dépasser 7 j de traitement Ostéolyse sans hypercalcémie : 1 600 mg/j (1 cp. x 2/j) Ostéolyse maligne avec hypercalcémie : 2 400 à 3 200 mg/j en plusieurs prises en relais de la forme IV	5 amp. 300 mg/5 mL	HOP	I		
	60 cp. 800 mg	115,97	I	65 %	1,93

**■ Ibandronate de sodium**

<b>BONDRONAT</b>					
Perf. IV unique de 4 mg dans 500 mL de NaCl 9 ‰ si calcémie > 3 mmol/L	1 fl. 2 mg/2 mL	HOP	I		
	1 fl. 6 mg/6 mL	289,25	I	65 %	289,25

**■ Acide zolédronique**

<b>ZOMETA</b>					
Perf. IV unique de 4 mg administrée en 15 min	1 fl. pdre 4 mg/100 mL	258,56	I	65 %	258,56

D'autres biphosphonates sont en regard des maladies : Ostéoporose et Maladie de Paget.

## BIPHOSPHONATES (HYPERCALCÉMIE) (2)

### PROPRIÉTÉS

Les **biphosphonates** sont de puissants inhibiteurs de la résorption osseuse ostéoclastique. En inhibant l'activité des ostéoclastes, ils semblent retarder ou prévenir les complications cliniques du myélome et des métastases osseuses (fractures, tassements vertébraux, etc.) et normalisent une hypercalcémie maligne.

### INDICATIONS

Forme IV : hypercalcémie maligne.

Forme orale : relais de la forme IV ; traitement palliatif des ostéolyses malignes sans ou avec hypercalcémie.

### CONTRE-INDICATIONS

**Grossesse et allaitement** : passage placentaire et dans le lait ; à éviter sauf mise en jeu du pronostic vital.

Ne pas administrer chez l'enfant.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nécessité d'une bonne hydratation avant de débiter le traitement.
- Voie orale : fractionner la dose en plusieurs prises ; administrer en dehors des repas.
- Réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale.
- De très rares cas d'ostéonécrose (principalement de la mâchoire) ont été rapportés chez les patients traités par des **biphosphonates**.

### Biphosphonates et ostéonécrose de la mâchoire

Un examen dentaire avec des soins dentaires préventifs appropriés devra être pris en considération avant l'instauration d'un traitement par **biphosphonates** chez des patients présentant des facteurs de risque associés (par exemple : cancer, chimiothérapie, corticoïdes ou mauvaise hygiène buccale).

Au cours du traitement, ces patients devront éviter dans la mesure du possible toute intervention dentaire invasive.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Ils sont généralement modérés et transitoires :

- généraux : fièvre transitoire ; syndrome pseudo-grippal, céphalées ;
- réaction au point d'injection : prurit, érythème, phlébite, induration ;
- douleurs osseuses transitoires, myalgies, arthralgies, douleurs diffuses, crampes musculaires ; hypocalcémie symptomatique ou non, hypophosphatémie ;
- nausées, vomissements, anorexie, diarrhée, constipation, douleurs abdominales ;
- conjonctivite, etc. Un antécédent d'uvéïte peut constituer une contre-indication ;
- anémie, leucopénie, thrombopénie transitoires ;
- troubles tensionnels, insuffisance cardiaque congestive par surcharge hydrique ;
- dyskaliémie, perturbation transitoire de la fonction hépatique.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Administrer les **antiacides** à distance des **biphosphonates** (2 h).

Diminution de l'absorption des **biphosphonates** en cas de prise concomitante de **sels de fer**, d'aluminium (ou de **calcium** !).

## ANTICORPS MONOCLONAL ANTI-RANKL (OSTÉOPOROSE)

## ■ Dénosumab

PROLIA					
Voie SC	1 ser. prér. 60 mg/mL	207,16	I	65 %	207,16
1 inj. tous les 6 mois					

## PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal (IgG2) humain qui cible le RANKL, ligand du récepteur RANK. Le **dénosumab** se lie de façon spécifique au RANKL avec une forte affinité, empêchant l'activation du récepteur RANK situé à la surface des ostéoclastes et de leurs précurseurs. Le blocage de l'interaction RANK/RANKL inhibe la formation, la fonction et la survie des ostéoclastes et diminue ainsi la résorption osseuse dans l'os cortical et trabéculaire.

## INDICATIONS

Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique chez les femmes à risque élevé de fractures. Ce médicament réduit significativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche.

## CONTRE-INDICATIONS

Patientes de moins de 18 ans, grossesse, allaitement, hypersensibilité au produit. Hypocalcémie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Bilan bucco-dentaire avant le traitement  
Supplémentation en **calcium et vitamine D**. Il est important pour toutes les patientes d'avoir un apport adéquat de calcium et de vitamine D.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents :

- troubles du système nerveux : sciatique ;
- troubles musculo-squelettiques : douleurs des membres ;
- diarrhées ;
- extraction dentaire ;
- dyspnée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction médicamenteuse notable n'a été recensée.

D'après les études, il n'influerait pas sur les médicaments métabolisés par le CYP3A4 et peut être administré de manière concomitante avec des **oestrogénothérapie substitutive orale** ou des **biphosphonates**.

## INHIBITEUR DES RÉCEPTEURS À L'IL-6

## ■ Tocilizumab

ROACTEMRA				
Voie IV, en perf. de 1 h A. 4-8 mg/kg x 1/4 sem. (sans dépasser 800 mg/adm.) Formes systémiques de la polyarthrite juvénile E. > 30 kg : 8 mg/kg x 1/2 sem. E. < 30 kg : 12 mg/kg x 1/2 sem. Forme polyarticulaire de la polyarthrite juvénile E. > 30 kg : 8 mg/kg x 1/4 sem. E. < 30 kg : 10 mg/kg x 1/4 sem.	1 fl. 20 mg/mL (4 mL)	HOP	I	
	1 fl. 20 mg/mL (10 mL)	HOP	I	
	1 fl. 20 mg/mL (20 mL)	HOP	I	

## PROPRIÉTÉS

L'IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire pléiotrope produite par un grand nombre de types cellulaires notamment les lymphocytes T et B, les monocytes et les fibroblastes.

Le rôle de l'IL-6 a été mis en évidence dans la pathogenèse d'un certain nombre de maladies, notamment les affections inflammatoires, l'ostéoporose et les néoplasies.

Le **tocilizumab** se lie de manière spécifique aux récepteurs solubles et membranaires de l'IL-6, empêchant la transmission du signal de l'inflammation.

## INDICATIONS

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un précédent traitement par un ou plusieurs traitements de fond. Chez ces patients, ce médicament peut être utilisé en monothérapie en cas d'intolérance au **méthotrexate (TX)**, ou lorsque la poursuite du traitement par **MTX** est inadaptée.

Traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique ou polyarticulaire active chez les patients âgés de 2 ans et plus, qui ont présenté une réponse inadéquate à un précédent traitement par **AINS** et **corticoïdes** systémiques. Ce médicament peut être utilisé en monothérapie (en cas d'intolérance au **MTX** ou lorsque le traitement par **MTX** est inadapté) ou en association au **MTX**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Infections sévères ou actives, troubles sévères du système immunitaire (neutropénie, agranulocytose).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Perf. IV dans 50 mL (enfants de moins de 30 kg) ou 100 mL de chlorure de sodium 0,9 %.

Comme pour les **anti-TNF-alpha**, une recherche de tuberculose active doit être effectuée avant le traitement.

Une surveillance clinique, hématologique, neurologique, hépatique, cardiaque est recommandée pendant le traitement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Fréquents :

- œdèmes périphériques, réaction cutanée, céphalées, conjonctivite, prise de poids ;
- troubles du système nerveux : céphalées, sensations vertigineuses ;
- troubles du système immunitaire : infections des voies respiratoires supérieures, herpès, zona ;
- troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales, nausées, diarrhées, gastrites, ulcérations buccales ;
- hypercholestérolémie ;
- hypertension artérielle ;
- troubles respiratoires : dyspnée, toux.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction médicamenteuse notable n'a été recensée.

Le **tocilizumab** peut être utilisé en association avec le **méthotrexate**, les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ou les **corticoïdes**.

## BIOTHÉRAPIE ANTI-INTERACTIONS CELLULAIRES

## ■ Abatacept

ORENCIA					
1 inj. IVL en 30 min > 60 kg : 500 mg 60-100 kg : 750 mg > 100 kg : 1 000 mg 2 et 3 <sup>e</sup> inj. les 2 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> sem. puis 1 inj. toutes les 4 sem.	1 fl. pdre 250 mg + ser.	HOP	I		

## PROPRIÉTÉS

L'**abatacept** diminue l'activation des lymphocytes T et la production spécifique du TNF alpha, de l'IFN (interféron) gamma et de l'IL-2 (interleukine 2) par les lymphocytes T ; il diminue ainsi la réaction inflammatoire synoviale et les destructions ostéo-cartilagineuses.

## INDICATIONS

En association au **méthotrexate** : polyarthrite rhumatoïde, forme modérément à sévèrement active de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond incluant au moins un **anti-TNF**, est insuffisante.

## CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
- Tuberculose évolutive ou autres infections sévères telles que sepsis et infections opportunistes.
- **Grossesse**.
- **Allaitement** : comme les immunoglobulines humaines passent dans le lait maternel, les femmes ne doivent pas allaiter pendant au moins 14 sem. après la dernière administration d'**ORENCIA**.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement par **ORENCIA** doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste qualifié en matière de diagnostic et de traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique ou de la spondylarthrite ankylosante

(sur une ordonnance de « médicament d'exception »).

- **Infections** :
  - dépister des infections (y compris la tuberculose) avant, pendant et après le traitement par **ORENCIA** ;
  - ne pas commencer le traitement tant que les infections évolutives, y compris les infections chroniques ou localisées, ne sont pas contrôlées ;
  - en cas d'apparition d'une infection grave, l'administration d'**ORENCIA** doit être interrompue jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée.
- **Événements neurologiques**

La prudence est recommandée avant de traiter avec **ORENCIA** les patients atteints d'une maladie démyélinisante du système nerveux central, préexistante ou de survenue récente.

- **Réactions allergiques**

En cas de survenue d'une réaction anaphylactique ou d'une autre réaction allergique grave, l'administration d'**ORENCIA** doit être immédiatement interrompue et un traitement approprié mis en œuvre.

- **Tumeurs malignes et troubles lymphoprolifératifs**

Dans l'état actuel des connaissances, la possibilité d'un risque de développer des lymphomes ou autres maladies malignes chez les patients traités par **anti-TNF** ne peut être exclue. Une prudence accrue devra être observée lorsqu'on envisage un traitement des patients avec antécédents.



## ANTICORPS MONOCLONAL (LUPUS)

### ■ Bélimumab

<b>BENLYSTA</b>					
Perf. IV de 1 h 10 mg/kg à J0, J14 et J28, puis toutes les 4 sem.	1 fl. pdre 120 mg	<b>HOP HOP</b>	I I		
	1 fl. pdre 400 mg				

### PROPRIÉTÉS

Anticorps monoclonal humain dirigé contre la protéine BLyS, une protéine soluble humaine activant les lymphocytes B. Le médicament bloque ainsi la liaison de la protéine à ses récepteurs. Il inhibe la survie des lymphocytes B, notamment les lymphocytes B auto-réactifs, et diminue la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'immunoglobulines.

### INDICATIONS

Traitement des patients adultes atteints de lupus systémique actif avec présence d'autoanticorps et activité de la maladie élevée (définie par exemple par la présence d'anticorps anti-ADN natif et un complément bas) malgré un traitement standard. Utilisé en association au traitement habituel.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vaccins vivants à éviter pendant le traitement et dans les 30 j précédant l'administration. Déconseillé par manque de données en cas de :  
– lupus systémique avec atteinte neurologique centrale ou néphropathie sévères et actives ;

– infection par le VIH ;  
– infection ou antécédent d'infection par le VHB ou VHC ;  
– hypogammaglobulinémie (IgG < 400 mg/dL) ou déficit en IgA (IgA < 10 mg/dL) ;  
– antécédent de greffe d'un organe majeur, de greffe de cellules souches hématopoïétiques/moelle osseuse ou de greffe rénale ;  
– grossesse et/ou allaitement.  
Femmes en âge de procréer : contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à au moins 4 mois après l'arrêt du traitement.  
Prudence chez le sujet âgé et le patient < 18 ans ou en cas d'insuffisance rénale sévère.  
Conserver entre +2 et +8 °C.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquent : infection.  
Fréquents : leucopénie, réaction d'hypersensibilité à la perfusion, dépression, migraine, fièvre, diarrhée, nausée, rash, douleur aux extrémités, etc.  
Peu fréquent : choc anaphylactique.  
Risque augmenté : cancer, syndrome lymphoprolifératif.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Non compatible avec le glucose 5 %.  
Aucune étude.  
Prudence en cas d'administration concomitante avec un traitement ciblant les lymphocytes B ou avec le **cyclophosphamide**.

## CANCER DE LA PROSTATE (1)

### Dépistage [1]

L'étude ERSPC (*European Randomized Study of screening for Prostate Cancer*) confirme la réduction de mortalité de 21 % en cas de dépistage systématique du cancer de la prostate par le PSA par rapport l'absence de dépistage, chez des hommes européens âgés de 55 à 69 ans, suivis pendant au moins 11 années. Cette baisse de mortalité atteint 29 % pour les hommes ayant effectivement réalisé le dépistage. Dans cette étude, après ce suivi de 11 ans, pour éviter un décès par cancer de la prostate, 1 055 hommes doivent être dépistés et 37 doivent être traités. Cette analyse après 2 années de suivi supplémentaires confirme que le dépistage par PSA diminue de façon importante la mortalité par cancer de la prostate.

Les résultats de cette étude sont très favorables au dépistage, même si certaines limites méthodologiques ne permettent pas encore aujourd'hui de se prononcer définitivement en faveur du dépistage systématique ou dépistage de masse : le dépistage par décision individuelle reste donc recommandé par l'AFU et, en pratique, utilisé par plus de 2 hommes sur 3 en France. Ce dépistage implique une information claire du patient portant sur le cancer de la prostate, ses risques d'évolution, son dépistage et sa prise en charge, d'où l'importance de campagnes d'information largement diffusées vers le grand public et les professionnels de santé.

L'AFU rappelle l'importance de la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, de chaque cas de cancer de prostate diagnostiqué, qui doit prendre en compte l'âge, l'agressivité (grade), le nombre et la longueur de biopsies envahies, la vélocité du PSA, etc. La surveillance active doit être systématiquement évaluée comme les autres modalités de traitement. La stratégie thérapeutique doit ensuite être discutée avec le patient.

À l'issue de l'analyse critique des articles issus des études ERSPC et PLCO publiés en mars 2009 et au vu des travaux récents parus en France, l'HAS a considéré qu'aucun élément scientifique nouveau n'est de nature à justifier la réévaluation de l'opportunité de la mise en place d'un programme de dépistage systématique du cancer de la prostate par dosage du PSA.

### Cancer localisé [2]

#### Score de Gleason

Le score de Gleason correspond au grade de la tumeur.

Le pathologiste évalue la différenciation des glandes tumorales selon un score allant de 1 (très différencié) à 5 (très indifférencié).

Le score de Gleason correspond à la somme du contingent le plus représenté suivi du contingent au grade le plus élevé (addition des 2 grades).

Ainsi, il varie de 2 à 10 et est exprimé de la façon suivante (le premier chiffre correspondant au score du contingent le plus représenté) : 4+3, 3+4, 4+4, etc.

Confiné à la prostate (stades T1 ou T2, N0, M0). Souvent décelé sur des copeaux de résection d'adénome de prostate, ou après biopsies prostatiques effectuées pour PSA élevé.

- Cancer à bas risque : score de Gleason  $\leq 6$  et PSA  $< 10$  ng/mL.
- Cancer à risque intermédiaire : Gleason 7 et PSA 10 à 20 ng/mL.
- Cancer à haut risque : Gleason  $\geq 8$  ou PSA  $> 20$  ng/mL.

#### Surveillance seule

Raisnable et licite si l'espérance de vie est inférieure à 10 ans, pour des cancers à bas risque. Un traitement médical pourra être secondairement proposé en cas de signes d'évolutivité clinique (toucher rectal) ou biologique (augmentation des PSA, dosés tous les 3 mois la 1<sup>re</sup> année, nouvelles biopsies prostatiques à 1 an).

**ANTIANDROGÈNES (1)**■ **Nilutamide**

<b>ANANDRON</b>					
300 mg/j pendant 4 sem. puis 150 mg/j	90 cp. 50 mg	137,33	I	100 %	1,53
	30 cp. 150 mg	128,25	I	100 %	4,28

■ **Flutamide**

<b>FLUTAMIDE BIOGARAN</b>					
1 cp. x 3/j	30 cp. 250 mg	28,33	I	100 %	0,94

■ **Bicalutamide**

<b>CASODEX</b>					
1 cp./j en continu	30 cp. 50 mg	55,40	I	100 %	1,85
<b>ORMANDYL</b>					
Idem <b>CASODEX</b>	30 cp. 50 mg	72,42	I	100 %	2,57

■ **Cyprotérone**

<b>ANDROCUR</b>					
4 à 6 cp. /j	20 cp. 50 mg	12,09	I	65 %	0,60
2 à 3 cp. /j	60 cp. 100 mg	86,83	I	100 %	1,45

■ **Enzalutamide**

<b>XTANDI</b>					
160 mg (4 caps.) en 1 prise/j	112 caps. 40 mg	3374,48	I	100 %	30,13

## CANCER DE LA PROSTATE (2)

### Traitement curatif

Prostatectomie totale ou radiothérapie à dose curative justifiées si l'espérance de vie est > 10 ans. Les 2 traitements ont *a priori* une efficacité comparable avec un avantage pour la chirurgie en survie sans progression après 12 ans.

La curiethérapie est une option valable pour les petits cancers (moins de 20 mm sur les biopsies) à bas risque uniquement au sein de prostates d'un volume total inférieur à 50 mL.

#### ► Prostatectomie totale (ou « radicale »)

##### Technique

La lymphadénectomie ilio-obturatrice bilatérale doit être réalisée pour les cancers à haut risque ou à risque intermédiaire, et si le bilan d'imagerie (TDM, IRM ou PET-scan à la choline) montre des adénopathies ilio-obturatrices.

La chirurgie, réalisée par voie ouverte ou laparoscopique, avec ou sans assistance robotisée, consiste en une ablation de la prostate, des vésicules séminales et des ampoules déférentielles. La préservation des bandelettes neurovasculaires où cheminent les nerfs érecteurs est possible si la tumeur est petite et intracapsulaire.

##### Complications

- Les troubles de l'érection sont fréquents (80 % des cas), même après conservation des nerfs érecteurs (50 % des cas).
- L'incontinence permanente est rare (< 5 %) mais l'incontinence d'effort est fréquente (20 %, augmentée avec l'âge).
- La sténose de l'anastomose uréthro-vésicale est rare.

Après prostatectomie totale, le taux de PSA à 2 mois doit être indétectable.

#### ► Radiothérapie externe

- Environ 76 Gy délivrés en fractionné (5 séances/sem. pendant 1 mois).
- Les complications sont l'asthénie (marquée et fréquente), les troubles de l'érection (50 %), l'incontinence (1 à 5 %), les cystites, rectites ou iléites radiques, et les

sténoses urétrales, plus rarement urétérales.

La chute des PSA est très progressive, s'étalant parfois sur 1 à 2 ans. Le PSA n'est qu'exceptionnellement indétectable. La guérison est définie par un PSA stable à son niveau le plus bas.

#### ► Curiethérapie

- Implantation percutanée sous contrôle échographie et endoscopique de grains d'iode 125.
- Nécessite une hospitalisation de 24 h.
- Les complications sont comparables à la radiothérapie externe mais les troubles de l'érection et les troubles de la continence sont plus rares. En revanche, la pollakiurie et la dysurie sont des complications fréquentes ; la curiethérapie n'est donc pas proposée en cas d'adénome prostatique associé ou en cas de troubles urinaires du bas appareil.

### Cancer localement avancés et cancer métastatiques [2]

#### Stades T3 N0 ou NxM0

Chez les patients jeunes, une radiothérapie peut être utilisée à visée curative, en association avec une hormonothérapie par **agonistes de la LH-RH** pendant 2 ans. Dans certains cas sélectionnés, une prostatectomie totale peut être proposée associée un curage ganglionnaire étendu (ilio-obturateur, iliaque primitif, pré-sacré, iliaque interne).

#### Stades T4, N+ ou M+

Grâce à l'hormonodépendance du cancer prostatique (80 %) un traitement palliatif par castration est très efficace. Il peut être mis en œuvre dès le diagnostic porté ou dès l'apparition des symptômes cliniques.

#### ► Castration chirurgicale

Pulpectomie ou orchidectomie bilatérale : c'est le traitement le plus simple et le moins coûteux.

#### ► Castration chimique ou médicamenteuse

En cas de refus du patient ou de contre-indications à la chirurgie, plusieurs traitements hormonaux sont possibles.

**ANTIANDROGÈNES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antiandrogène non stéroïdien bloquant les récepteurs des androgènes ou la liaison androgène-récepteur, sans autre activité hormonale.

**INDICATIONS**

Cancer de la prostate, en prescription simultanée avec une castration chirurgicale ou médicamenteuse par **agonistes de la LH-RH** ou en continu pour un blocage androgénique total. Au premier mois de la castration chimique la prescription est destinée à éviter le *flare up* et doit être débutée quelques jours avant.

L'**enzalutamide** est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ayant progressé après au moins une chimiothérapie préalable contenant du **docétaxel** et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible appropriée.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique.

**Nilutamide** : insuffisance respiratoire (risque de pneumopathie interstitielle).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller les transaminases, l'état respiratoire, la vision. Interrompre le traitement en cas d'élévation des transaminases, de dyspnée, de troubles de l'accommodation et de la vision des couleurs.

Pour l'**enzalutamide**, une surveillance cardiovasculaire et neurologique est recommandée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles de l'érection.

Bouffées de chaleur.

Troubles de l'accommodation à l'obscurité et de la vision des couleurs.

Effet antabuse et hépatite.

Troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée.

Aplasie médullaire.

Pour le **flutamide** il faut noter la possibilité de méthémoglobinémies et de photosensibilisation.

Pour l'**enzalutamide**, il faut également noter des troubles neurologiques (céphalées, troubles de mémoire ou cognitifs) et un risque d'hypertension artérielle.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **nilutamide** peut perturber le métabolisme des **antivitamines K**, **phénytoïne**, **propranolol**, **chlordiazépoxyde**, **diazépam** et **théophylline**.

En cas de traitement anticoagulant : contrôler l'INR et réduire si nécessaire la posologie des **AVK**.

L'**enzalutamide** est métabolisé par le CYP 2C8 : il convient donc d'éviter une association avec un inducteur (**rifampicine**) ou un inhibiteur (**gemfibrozil**) de ce CYP. C'est par ailleurs un inducteur puissant du CYP3A4, d'où une interaction importante avec certaines molécules : **praziquantel**, **télaprévir**, **voriconazole**, **inhibiteurs de protéases** boostés par **ritonavir** sont contre-indiqués.

**CANCER DE LA PROSTATE (3)****Traitements du cancer de prostate métastatique hormonosensible [1]****Blocage antiandrogénique hypophysaire par agonistes de la LH-RH**

Les produits les plus utilisés sont les **analogues de la LH-RH** (**ENANTONE LP**, **ZOLADEX**, **DÉCAPEPTYL LP**, **ELIGARD**). La posologie est, selon les formes, d'une seule injection trimestrielle ou semestrielle. Le traitement est poursuivi à vie avec éventuellement des périodes d'interruption selon la tolérance clinique (on parle alors de traitement séquentiel).

Durant le 1<sup>er</sup> mois l'association d'un **antiandrogène** périphérique est nécessaire pour éviter une poussée évolutive du cancer liée à l'élévation de testostérone due à l'augmentation temporaire de l'activité hypophysaire (effet *flare up*). Il n'est indiqué qu'en cas de métastases osseuses rachidiennes ou de risque fracturaire métastatique.

Le blocage complet par un **agoniste de la LH-RH** et un **antiandrogène** périphérique, le plus souvent non stéroïdien, n'est plus très utilisé, en l'absence de bénéfice sur le traitement par **agoniste** seul. En revanche, en cas de progression (cancer hormonorésistant), l'adjonction de l'**antiandrogène** périphérique ou d'**œstrogènes** peut retarder la progression biologique.

**Blocage par antagoniste de la LH-RH**

Le **dégarélix** (**FIRMAGON**) est une nouvelle molécule ne nécessitant pas d'association

avec un antiandrogène (pas de *flare up*) et permettant l'obtention rapide d'une castration. Son schéma thérapeutique est cependant différent des **agonistes** : 2 inj. SC profondes de 120 mg (= 240 mg) puis une inj. mensuelle de 80 mg.

**Blocage par antiandrogène périphérique dans le cancer hormonosensible****► Antiandrogènes stéroïdiens**

L'**acétate de cyprotérone** (**ANDROCUR**) : 4 à 6 cp./j a une double action :

- essentiellement périphérique en empêchant l'action des androgènes sur les organes cibles, dont la prostate ;
- antigonadotrope.

**► Antiandrogènes non stéroïdiens**

Ces médicaments : **ANANDRON**, **flutamide**, **CASODEX** sont moins efficaces en monothérapie et prescrits en complément des **agonistes**.

**► Œstrogènes**

On utilisait **DISTILBÈNE**. Son emploi est maintenant peu courant, du fait de ses nombreux effets indésirables surtout cardiovasculaires.

**Surveillance**

La surveillance repose principalement sur le toucher rectal, le taux de PSA, la testostéronémie (dosée à 3 mois : pour vérifier la compliance au traitement).

D'autres examens (fonction rénale, échographie, scintigraphie osseuse, etc.) seront prescrits en fonction des symptômes.

**AGONISTES DE LA LH-RH (1)****■ Triptoréline**

<b>DÉCAPEPTYL</b>					
0,1 mg pendant 7 j puis relais par la forme LP	7 amp. inj. SC 1 mL = 0,1 mg + 7 fl. pdre	40,90	I	100 %	5,84
<b>DÉCAPEPTYL LP</b>					
1 IM/3 mois	1 inj. IM 11,25 mg	376,15	I	65 %	376,15
1 IM/6 mois	1 inj. IM 22,5 mg	715,44	I	100 %	715,44
1 IM/4 sem.	1 inj. IM 3 mg	134,44	I	65 %	134,44
<b>GONAPEPTYL</b>					
1 IM ou SC/4 sem.	1 inj. 3,75 mg	121,43	I	65 %	121,43
<b>SALVACYL LP</b>					
1 IM/12 sem.	1 inj. 11,25 mg	387,45	I	100 %	387,45

**■ Leuproréline**

<b>ELIGARD</b>					
1 SC/mois	1 ser. pdre + ser. solv. 7,5 mg	123,89	I	100 %	123,89
1 SC/3 mois	1 ser. pdre + ser. solv. 22,5 mg	339,58	I	100 %	339,58
1 SC/6 mois	1 ser. pdre + ser. solv. 45 mg	648,01	I	100 %	648,01
<b>ENANTONE LP</b>					
1 IM/4 sem.	1 fl. pdre + solv. + ser. + aig. 3,75 mg	137,17	I	65 %	137,17
1 IM/12 sem.	1 fl. pdre + solv. + ser. + aig. 11,25 mg	376,15	I	65 %	376,15
1 SC/26 sem. (6 mois)	1 fl. pdre + solv. + ser. 30 mg	715,44	I	100 %	715,44

## CANCER DE LA PROSTATE (4)

### Cancer de prostate métastatique hormonorésistant

Après une période moyenne d'environ 24 mois, le cancer de prostate devient hormonorésistant (échappement hormonal).

L'existence de clones cellulaires encore hormonosensibles justifie de laisser le traitement hormonal en association avec la chimiothérapie.

Les **taxanes** sont le traitement de référence : **docétaxel (TAXOTÈRE)** avec un maximum de 7 à 10 cures et plus récemment la **cabazitaxel**.

En cas de progression après chimiothérapie, de nouvelles molécules sont actuellement en développement de phase III (**MDV3100**, **abiratéron**, etc.) avec des résultats très prometteurs qui laissent

peut-être envisager leur utilisation avant chimiothérapie.

### Complications des stades métastatiques

- Douleurs osseuses : **antalgiques, corticoïdes, bisphosphonates (ZOMETA)**, anticorps monoclonal (**XGEVA**) et à plus long terme hormonothérapie sont efficaces. La radiothérapie est prescrite en cas de douleurs rebelles ou de compression neurologique associée.
- Complications cardiovasculaires des traitements hormonaux.
- Syndrome métabolique.
- Complications liées à l'évolution locale : dysurie, rétention vésicale chronique, hématurie, insuffisance rénale avec urétéro-hydronephrose par envahissement du trigone vésical et des bas-uretères (nécessitant un drainage permanent par sondes urétérales).

### CONSENSUS

[1] Dépistage du cancer de la prostate - Analyse critique des articles issus des études ERSPC (European Randomized Study of screening for Prostate Cancer) et PLCO : Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (cancer screening trial) (mars 2009), HAS, 2010

[2] Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Cancer de la prostate, AFU, 2010



## CANCER DU REIN (1)

Le seul traitement curatif est chirurgical. Il faut donc s'efforcer d'enlever une tumeur, même si elle a une extension extrarénale. Une métastase ne contre-indique pas la néphrectomie.

### Cancer du rein localisé ou localement avancé [1]

#### Néphrectomie élargie

Elle enlève le rein, la graisse périrénale, la surrénale, éventuellement un thrombus cave ou un organe contigu envahi.

Le curage ganglionnaire n'a qu'un intérêt de stadification car le pronostic n'est pas amélioré si les ganglions sont envahis.

La surrénale doit être préservée en l'absence d'extension extra-rénale (donc dans les stades < T3).

#### Traitement « conservateur » : néphrectomie partielle, tumorectomie, radiofréquence, cryothérapie

- Le traitement conservateur doit être systématiquement envisagé dans les indications dites « impératives », c'est-à-dire dans les situations où une néphrectomie totale imposerait une mise en dialyse: cancer bilatéral, cancer sur rein unique, néphropathie associée avec insuffisance rénale chronique.
- Le traitement conservateur est la règle dans les formes familiales de cancer du rein en raison du risque majeur de tumeur synchrone ou métachrone controlatérale (maladie de Von Hippel Lindau, Birt Hogg Dubé, forme héréditaire de cancer du rein papillaire, etc.). On privilégie alors le traitement par ablation (radiofréquence ou cryothérapie).
- Dans les indications dites électives (pas d'insuffisance rénale, rein controlatéral sain) le traitement conservateur par néphrectomie partielle ou tumorectomie

est le traitement de référence des tumeurs de moins de 4 cm (T1a). Il peut être également proposé pour les tumeurs de plus de 4 cm (T1b, T2) limitées au rein.

### Cancer du rein métastatique [1]

Plus de 10 % des patients asymptomatiques ont une maladie métastatique peu évolutive autorisant expectative et surveillance rapprochée. Le nombre de métastases, la cinétique lente ou rapide d'évolution de la maladie et l'état général (évalué par l'ECOG ou le *Performance Status*) sont des éléments capitaux pour décider de la stratégie thérapeutique.

#### Immunothérapie

Peu efficace et souvent mal tolérée, l'immunothérapie est usuellement entreprise en cas de symptômes cliniques, ou de maladie tumorale évolutive sur les données scannographiques successives. Elle a été presque totalement abandonnée depuis l'avènement des thérapies ciblées (agents antiangiogéniques). Néanmoins, l'**interféron alpha** garde une indication éventuelle dans le traitement de première ligne en situation métastatique en association avec le **bévacizumab** lorsque le **sunitinib** est contre-indiqué.

- **Interféron alpha** : 6 MUI x 3/sem. 12 % de réponses (partielles ou totales), le plus souvent transitoires (moins de 2 ans).
- **IL2 à haute dose** : 600 000 UI/kg/dose, avec une dose toutes les 8 h pendant 5 j, puis 9 j off, puis à nouveau 5 j de traitement.

Il faut rappeler que certains travaux actuels continuent de montrer l'intérêt de l'immunothérapie dans des essais précliniques (anticorps anti-PD1, anti-CTLA4, vaccinations à base de cellules dendritiques autologues, etc.). Cette thérapeutique ne doit donc pas être totalement mise de côté.

## CANCER DU REIN (2)

### Agents antiangiogéniques

Ces agents appartiennent à différentes familles :

- inhibiteurs des tyrosine-kinases ciblant la voie VEGF/HIF : **sunitinib** (*SUTENT*), **sorafénib** (*NEXAVAR*), **erlotinib** (*TARCEVA*), **pazopanib** (*VOTRIENT*) ;
- inhibiteurs de mTOR (ciblant le cycle cellulaire) : **évérolimus** (*AFINITOR*) ou **temsirolimus** (*TORISEL*).

Ces agents améliorent le taux de réponses objectives (exceptionnellement complètes), la survie sans progression et la survie globale des patients. Ces produits sont utilisés habituellement en première ligne en fonction du score de MSKCC (critères de Motzer) qui permet de définir des groupes à risque de progression selon le tableau suivant.

Lignes de traitement	Risque faible ou intermédiaire	Haut risque
Première ligne	<b>Sunitinib</b> <b>Pazopanib</b> <b>Bévacizumab</b> + IFN IL-2 haute dose (option)	<b>Temsirolimus</b>
Deuxième ligne	<b>Axitinib</b> <b>Évérolimus</b> <b>Sorafénib</b> <b>Pazopanib</b>	

### Place de la chirurgie en situation métastatique

À l'ère de l'immunothérapie, la néphrectomie avait montré un faible avantage en termes de survie sans progression et était donc systématiquement proposé.

À l'ère des thérapies ciblées, la nécessité de la néphrectomie n'est pas prouvée ; un essai prospectif randomisé (essai CARMENA) actuellement en cours (néphrectomie + **sunitinib** vs **sunitinib** seul)

répondra à cette question dans quelques années.

En attendant, la néphrectomie est indiquée dans deux situations :

- lorsque la tumeur est symptomatique (douleurs, déglobulisation, etc.) ;
- lorsque les métastases sont limitées à un seul site et sont extirpables ; dans ce cas, la chirurgie de la tumeur primitive (par néphrectomie totale ou partielle si elle est réalisable) doit être associée à la résection de toutes les métastases.

### CONSENSUS

[1] Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Cancer du rein, AFU, 2010

## CANCER DU TESTICULE (1)

Premier cancer de l'homme jeune (25-35 ans). Toute tumeur du testicule est cancéreuse jusqu'à preuve du contraire. La survie globale est de 95 % à 5 ans.

### Traitement initial : orchidectomie [1]

En préopératoire : dosage sanguin des marqueurs tumoraux bêta-hCG, alpha foeto-protéine et LDH. Examen du testicule controlatéral (clinique + échographie).

Intervention : voie d'abord inguinale, ligature haute et première du cordon, extériorisation rétrograde, inversion ± extemporané puis orchidectomie.

En postopératoire : examen anatomopathologique de la pièce opératoire + recherche des marqueurs (immunohistochimie + dosage dans le sang du cordon).

### Traitement ultérieur

Il dépend du bilan d'extension et de l'histologie.

#### Bilan d'extension

- Résultats des marqueurs postopératoires.
- Scanner thoraco-abdomino-pelvien à la recherche d'adénopathies lombo-aortiques ou médiastinales, de métastases pulmonaires (ou plus rarement hépatiques).

### Histologie

- Séminomes purs (marqueurs tumoraux négatifs).
- Tumeurs non séminomateuses (carcinome embryonnaire, chorio-carcinome, tumeur villose, tératomes).
- Tumeurs mixtes (la présence d'un contingent non séminomateux fait considérer la tumeur comme non séminomateuse).
- Tumeurs rares.
- Tumeurs de Leydig, sarcomes.

### Stades tumoraux

- **Stade I** : tumeur localisée au testicule, marqueurs normaux.
- **Stades II A, B, C** : envahissement ganglionnaire. Selon le diamètre : A < 2 cm ; B 2 à 5 cm ; C > 5 cm.
- **Stade III** : métastases.

### Séminomes purs [1]

- **Stade I** : surveillance ou radiothérapie sous-diaphragmatique lombo-aortique et iliaque ipsilatérale, ou 1 cycle de **carboplatine**.
- **Stades IIA et IIB** : radiothérapie lombo-aortique ou chimiothérapie par 3 cycles de BEP.
- **Stades > IIB** : chimiothérapie.

**Après chimiothérapie : curage (lymphadénectomie) des masses résiduelles si > 3 cm ou si activité sur le PET-scan.**

## CANCER DU TESTICULE (2)

### Tumeurs non séminomateuses [1]

#### Stade I

- Faible risque de dissémination (pas d'embolies vasculaires du cordon, moins de 50 % de carcinome embryonnaire), et patient consentant:
- Surveillance (marqueurs et scanner abdomino-thoracique tous les 2 à 3 mois la première année + testicule contrôlé).
- Ou chimiothérapie (2 cycles de **BEP**).
- Ou lymphadénectomie rétropéritonéale (et **BEP** uniquement si N+).
- Haut risque de dissémination (embolies vasculaires) : curage ganglionnaire lombo-aortique :
  - curage négatif : surveillance (cf. ci-dessus) ;

– curage positif : chimiothérapie (**BEP**) en 2 cycles : **bléomycine** : 30 mg IV toutes les semaines ; **étoposide** : 100 mg/m<sup>2</sup> /j de J1 à J5 ; **cisplatine** : 20 mg/m<sup>2</sup> /j de J1 à J5 (voir aussi Chimiothérapie des cancers).

#### Stades II et III

Chimiothérapie (3 à 4 cycles de **BEP**).

Puis bilan d'extension :

- marqueurs normaux ; pas de masse résiduelle : surveillance ;
- marqueurs normaux + masses résiduelles : curage lombo-aortique. Surveillance simple en cas de négativité ou chimiothérapie si positif (4 cycles de **VEIP** : **vinblastine**, **étoposide**, **ifosfamide**, **cisplatine**) ;
- marqueurs élevés + masses résiduelles : chimiothérapie (4 cycles de **VIP** ± curage) ;
- maladie réfractaire : chimiothérapie intensive avec auto-greffe de moelle.

### CONSENSUS

[1] Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Tumeurs germinales du testicule, AFU, 2010

## COLIQUE NÉPHRÉTIQUE (1)

La colique néphrétique est l'expression clinique de la distension aiguë de l'appareil urinaire. Le diagnostic clinique est facile, et le premier geste à accomplir est de traiter la douleur. La majorité des coliques néphrétiques sont traitables en ambulatoire et sont dues à une obstruction [1].

### Traitement au domicile

En cas de colique néphrétique simple typique, l'hospitalisation n'est habituellement pas nécessaire. La douleur peut être traitée à domicile ; les examens complémentaires prescrits peuvent être effectués en ambulatoire de façon légèrement différée (24-48 h).

### Faire céder la douleur rapidement

#### ► AINS parentéral

Le **PROFÉNID** 100 mg IM ou IV est le meilleur traitement antalgique en urgence.

#### ► Si les AINS sont contre-indiqués

**Morphinique** par ex. : **chlorhydrate de morphine** : 1 amp. (10 mg) en SC.

### Une fois la douleur initiale calmée

- Restriction hydrique (1 L/j) initialement : après disparition complète des douleurs, hyperdiurèse pour aider la migration lithiasique.
- Tamiser l'urine (à travers un tamis disponible en pharmacie) et conserver tout fragment émis pour analyse.
- **AINS** *per os* ou en supp. Ex : **BI-PROFÉNID LP** 100 mg 1 cp. matin et soir pendant 5 j, associé à du **lansoprazole** 15 mg x 1/j.
- **Antalgiques** type **LAMALINE**.

- **Antispasmodiques** : **SPASFON** *per os*, 6 cp. ou lyocs/j.

### Auto-surveillance à domicile et nouvelle consultation en urgence dans les cas suivants

- Absence de mictions.
- Aspect hématique ou purulent de l'urine.
- Fièvre ou frissons.
- Douleurs récurrentes résistantes aux antalgiques.

### Examens complémentaires à effectuer rapidement

- Créatininémie, NFS, calcémie: les examens biologiques ne sont pas à réaliser à chaque épisode chez les patients lithiasiques connus.
- Bandelette urinaire, ECBU (infection urinaire ?).
- Imagerie de l'appareil urinaire : le scanner abdomino-pelvien sans injection est l'examen de référence pour le diagnostic de lithiasie et de dilatation des cavités. L'injection n'est pas nécessaire en urgence en l'absence de signes de gravité ou d'hospitalisation. Il est proposé de faire à distance un uroscanner en l'absence d'insuffisance rénale ou d'allergie à l'iode ; cet examen a totalement remplacé l'urographie intraveineuse dans cette indication.
- En urgence, et en l'absence de scanner sans injection : faire un ASP et une échographie rénale afin de rechercher une dilatation des cavités et de voir un calcul radio-opaque. Ces examens ont une sensibilité inférieure au scanner mais une spécificité acceptable.
- Conserver tout fragment émis pour analyse ultérieure (spectrophotométrie infrarouge).

## COLIQUE NÉPHRÉTIQUE (2)

### Hospitalisation

Elle est nécessaire dans les cas suivants.

### Sujet âgé et/ou fragile

Dans ces cas, le traitement ambulatoire est peu réaliste.

### Doute diagnostique

Si l'ASP et l'échographie n'ont pas confirmé le diagnostic, le scanner sans injection, qui est l'examen de référence, est indispensable. En l'absence de calcul sur le scanner, l'étude de la voie excrétrice après injection permet de faire le diagnostic d'une éventuelle colique néphrétique non lithiasique (jonction, compression extrinsèque, nécrose papillaire, etc.).

### Colique néphrétique résistante

Définie par la résistance des douleurs aux AINS. Il y a souvent dans ces cas :

- une obstruction complète avec distension échographique des cavités ;
- une lithiase volumineuse > 7 mm dont les chances de migration spontanées sont minimes.
- Drainage des urines par sonde urétérale ou néphrostomie percutanée en urgence : soulage immédiatement la douleur et met à l'abri des autres complications obstructives (sepsis, destruction du rein).
- À distance, lithotritie extracorporelle ou extraction lithiasique par urétéroscopie. La

chirurgie ouverte est exceptionnelle en dehors des maladies lithiasiques héréditaires.

### Fièvre : « pyélonéphrite aiguë lithiasique » ou colique néphrétique fébrile

- Voie veineuse. Urgence médicochirurgicale, pronostic vital mis en jeu.
- Remplissage : on redoute le choc septique qui peut être gravissime même chez le sujet jeune.
- Antibiothérapie parentérale : **céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération + aminosides** si fonction rénale normale.
- Bilan préopératoire, patient à jeun.
- Drainage de l'urine : sonde urétérale montée par les voies naturelles (sonde urétérale droite ou sonde double J) ou néphrostomie percutanée échoguidée.
- Prélèvements bactériologiques peropératoires de l'urine en amont de l'obstacle pour antibiogramme.
- Traitement de la lithiase à distance (3 sem.) du sepsis initial, l'antibiothérapie étant poursuivie *per os* jusqu'à cette date.

### Absence d'urine : « anurie calculeuse » par lithiase obstructive sur rein unique ou obstruction bilatérale

- Antibiothérapie parentérale.
- Drainage des urines retenues en amont de l'obstacle : sonde urétérale ou néphrostomie percutanée.

### CONSENSUS

- [1] Prise en charge urologique des calculs rénaux et urétéraux de l'adulte, *Comité lithiase de l'AFU*, 2004

## CYSTITES AIGÜES INFECTIEUSES (1)

### Définition

Il s'agit d'une infection limitée à l'urine et à l'urothélium, survenant quasi exclusivement chez la femme.

### Critères de diagnostic [1]

#### Cliniques

- Syndrome de cystite aiguë : pollakiurie, impériosités et brûlures mictionnelles, douleurs sus-pubiennes, parfois dysurie, hématurie totale ou terminale.
- Pyurie (urines troubles).
- Pas d'atteinte parenchymateuse : absence de fièvre et de lombalgies.

#### Paracliniques

- *Bandelette urinaire*
  - Négative (pas de leucocytes, pas de nitrites), elle écarte le diagnostic avec une bonne sécurité (98 %).
- *ECBU (cf. Cystites aiguës infectieuses (4), tableau ECU : interprétation)*

Prélevé avant le début du traitement, il n'est indispensable qu'en cas de grossesse, cystite

compliquée, cystite récidivante, cystite avec bandelette urinaire négative.

Si un ECU est prélevé, une antibiothérapie probabiliste (adaptée à l'épidémiologie bactérienne) sera débutée sans attendre les résultats.

En cas de cystite simple, un ECU de contrôle en fin de traitement n'est pas nécessaire.

### Bactériologie

*E. coli* domine : environ 80 %.

*S. saprophitica* : 5 à 15 %.

Plus rares : *P. mirabilis*, *Klebsiella* et entérocoques.

La résistance de *Escherichia coli* aux **aminopénicillines** (ampicilline et amoxicilline) dépasse largement 40 % des souches et peut atteindre 35 % pour l'association **amoxicilline-acide clavulanique**. La résistance aux anciennes **quinolones** peut atteindre 10 % et se situe autour de 7 % pour les **fluoroquinolones**. 15 à 35 % des souches sont résistantes au **cotrimoxazole**...

**ANTIBACTÉRIENS URINAIRES (1) – NITROFURANE**

## ■ Nitrofurantoïne

<b>FURADANTINE</b>					
1 (préventif) à 3 (curatif) gél. x 3/j	21 gél. 50 mg 100 gél. 50 mg	3,32 HOP	I I	65 %	0,16

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactériostatique à forte élimination urinaire, actif sur de nombreuses souches d'*E. coli* et autres entérobactéries, ainsi que certains streptocoques.

**INDICATIONS**

Cystites simples (curatif, préventif).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : au 9<sup>e</sup> mois (hémolyse possible si déficit en G6PD).

**Allaitement** : déconseillé.

Insuffisance rénale sévère.

Déficit en G6PD.

Allergie aux furanes.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prendre pendant les repas (améliore la tolérance digestive).

Éviter la prise associée d'alcool (effet antabuse).

Efficacité modeste à pH urinaire alcalin (pour certains, acidification urinaire associée).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées et vomissements fréquents.

Effet antabuse avec l'alcool.

Réactions immuno-allergiques générales, cutanées, pulmonaires.

Neuropathies optiques et périphériques.

Hypertension intracrânienne.

Hémolyse aiguë (si déficit en G6PD).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Résorption limitée par les **antiacides**.

Antagonisme avec les **quinolones**.



## CYSTITES AIGÜES INFECTIEUSES (2)

### Traitement « minute » ou monodose [1] [2]

Ce traitement empirique (pas de documentation bactériologique) est efficace (sauf en cas de staphylocoques) et économique. L'observance est assurée, il y a peu d'effets latéraux et pas de sélection de souches résistantes.

### Conditions d'application strictes

- femme de moins de 65 ans ;
- pas d'immunodépression ;
- pas de diabète ;
- pas de grossesse ;
- pas de fièvre ;
- pas de lombalgies ;
- pas d'uropathie connue ;
- pas d'intervention urologique récente (y compris endoscopie) ;
- premiers symptômes récents (moins de 3 j).

### Antibiotiques validés (éviter les $\beta$ -lactamines)

- Fosfomycine - trométamol (**MONURIL, URIDOL**) : 3 g. C'est le traitement recommandé en première intention pour épargner les fluoroquinolones.
- En seconde intention (allergie à la fosfomycine ou échec), il est actuellement discuté de proposer un traitement minute. Un traitement par 5 j de **FURADANTINE** est actuellement recommandé mais les traitements suivants sont efficaces et ont

l'avantage d'être des traitements minutes. Aucune *Evidence Base Medicine* ne compare les différents traitements.

- **BACTRIM FORTE** : 3 cp. ;
- ofloxacine (**OFLOCET**) : 400 mg ;
- ciprofloxacine (**CIFLOX, UNIFLOX**) : 500 mg.

Actuellement, l'utilisation des quinolones doit être évitée lors des infections urinaires basses non compliquées afin de préserver l'émergence de résistances. Ces molécules sont toutefois très efficaces et ne doivent pas être abandonnées à l'échelle individuelle. La seule certitude est d'éviter absolument la prescription de **quinolones** pour le traitement de la cystite simple si la patiente a pris des **quinolones** dans les 6 derniers mois.

Mesures associées : hyperdiurèse  $\pm$  **antalgiques**.

### Traitement court (3 j) ou conventionnel (7 à 10 j) (en dehors de la grossesse)

Traitement court et conventionnel sont le plus souvent équivalents ; ce dernier sera toutefois préféré en cas de récurrence ou rechute, symptômes  $\geq 7$  j, diabète, âge  $> 65$  ans, ou port d'un diaphragme.

Les **antibiotiques** préconisés actuellement sont :

- norfloxacine (**NOROXINE 400**), 400 mg x 2/j ;
- ofloxacine (**OFLOCET**), 200 mg x 2 /j ou lévofloxacine (**TAVANIC**), 1 cp./j ;
- **BACTRIM FORTE**, 3 cp./j ;
- loméfloxacine (**DÉCALOGIFLOX, LOGIFLOX**), 400 mg/j.

## ANTIBACTÉRIENS URINAIRES (2) – AMINOSIDE

## ■ Spectinomycine

<b>TROBICINE</b>					
Traitement «minute» par 1 inj. IM profonde exclusivement d'une amp. à 2 g Possibilité d'augmenter la posologie à 4 g (2 sites d'injection distincts)	1 pdre + solv. pour sol. inj. 2 g	5,62	I	65 %	5,62

**PROPRIÉTÉS**

La **spectinomycine** possède une structure chimique proche de la famille des **aminosides** mais se distingue de cette famille puisqu'elle présente une stéréochimie particulière et ne possède pas de sucre aminé ce qui caractérise les **aminosides**. Néanmoins, les analogies importantes entre la **spectinomycine** et les **aminosides** expliquent leurs profils pharmacocinétiques et leurs potentiels toxiques comparables.

**INDICATIONS**

Traitement des blennorragies gonococciques aiguës et donc des urétrites gonococciques chez l'homme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **spectinomycine**. Chez l'enfant de moins de 3 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

L'association avec des composés à potentiel néphrotoxique doit être réalisée avec précaution en raison des similarités entre la **spectinomycine** et les **aminosides**.

Attention : **TROBICINE** n'est pas actif sur d'autres agents responsables d'IST.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

On peut noter des douleurs au site d'injection, un syndrome pseudogrippal, des rougeurs et de rares cas de réactions de type anaphylactique et anaphylactoïde.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Il convient de surveiller étroitement l'INR des patients sous anticoagulants comme souvent lors d'antibiothérapies et plus généralement dans un contexte infectieux.

## CYSTITES AIGÜES INFECTIEUSES (3)

### Cystites récidivantes

- Après une première cystite, environ 20 % des femmes ont une rechute précoce (même germe) ou surtout une récurrence tardive (germes différents). On parle de cystites récidivantes à partir de 4 à 6 épisodes de cystite (correctement traitées) par an.

- Cystographie, cystoscopie et imagerie du haut appareil sont peu utiles ici : les anomalies fonctionnelles ou anatomiques de l'appareil urinaire sont exceptionnellement retrouvées. Néanmoins, ces examens peuvent être proposés en cas de résidu post-mictionnel. La cystoscopie permet aussi de rechercher une sténose de l'urètre et de faciliter l'examen du méat (reliquats hyménéaux).

- Toujours rechercher le BK (culture dans les urines) et les germes des IST (*Chlamydiae*, *Mycoplasma*).

### Chez la femme jeune en période d'activité génitale

Les principaux facteurs de risque de cystite récidivante sont la vie sexuelle, l'absence de miction post-coïtale, le port d'un diaphragme ou l'utilisation de spermicides. Les recommandations sont :

- éviter diaphragmes et spermicides,
- toilette périnéale d'avant en arrière,
- traitement des mycoses vaginales,
- traitement de la constipation,
- boissons abondantes, pour obtenir des urines claires,
- mictions régulières, notamment avant le coucher et après un coït.

Trois stratégies d'utilisation des **antibiotiques** sont possibles.

#### ► 1 à 2 cystites/an

Autotraitement (traitement minute ou traitement court de 3 j).

#### ► Plus de 3 cystites/an

Antibioprophylaxie continue, quotidienne ou 3 j/sem., utilisant de faibles doses de **BACTRIM**, **fosfomycine** ou **NOROXINE 400** pendant 6 mois à 1 an. Au terme de cette période, des rechutes sont observées moins d'une fois sur trois. La furadantine, très efficace, n'est désormais plus utilisée depuis la mise en garde de l'Afssaps concernant le risque faible mais dramatique de fibrose pulmonaire.

#### ► Cystites liées au coït

Antibiothérapie post-coïtale en prise unique (cf. Cystites infectieuses (2) : traitement minute).

Si le traitement médical est insuffisant, l'excision des reliquats hyménéaux péri-méatiques avec électrocoagulation des glandes para-urétrales peut être efficace.

### Chez la femme ménopausée

Deux facteurs favorisant des cystites doivent être recherchés : une vidange vésicale incomplète (souvent par prolapsus génital ou vésical) et surtout une sécheresse vaginale excessive, liée à un manque d'œstrogènes. La correction d'une carence hormonale locale prévient efficacement les récurrences de cystites.

## CYSTITES AIGÜES INFECTIEUSES (4)

**Cystites chez l'homme**

Selon certains, *E. coli* uropathogènes pourraient être la cause d'authentiques cystites aiguës chez l'homme jeune, avec urétrite, mais sans prostatite ni pyélonéphrite aiguë associée. Les facteurs de risque seraient les rapports ano-génitaux, la contamination vaginale de la partenaire par des *E. coli* uropathogènes, l'absence

de circoncision, et l'infection par le VIH. L'ECBU est impératif ; un traitement par **BACTRIM** ou **fluoroquinolone** (7 j) est le plus souvent suffisant, et la recherche d'une uropathie sous-jacente (systématique pour certains) le plus souvent négative.

Fréquemment une cystite chez l'homme est fébrile et il s'agit d'une prostatite.

**ECBU : interprétation**

	LEUCOCYTES/mL	BACTÉRIES/mL	CULTURE
Urine normale	≤ 10 000	≤ 10 000	Stérile
Infection	> 10 000	> 100 000*	Positive
Leucocyturie aseptique	> 10 000	≤ 10 000	Stérile
Souillure (digestive)	≤ 10 000	> 10 000	Positive
À contrôler	> 10 000	≤ 100 000	Positive

**CONSENSUS**

[1] Diagnostic et traitement des infections bactériennes urinaires de l'adulte : cystites aiguës, AFU, 2008

[2] Prise en charge des cystites aiguës simples, AFU, 2009

\*  $10^3 = 1\,000/\text{mL}$  pour les cystites aiguës à *E. coli* et autres entérobactéries, notamment *Proteus* spp et *Klebsiella* spp, et pour *S. saprophyticus*.

## PYÉLONÉPHRITE AIGÜE (1)

### Pyélonéphrite aiguë communautaire simple [1]

#### Évaluation initiale

- Examen clinique.
- Bandelette urinaire.
- Bactériologie : ECBU, 2 hémocultures.
- Fonction rénale : créatininémie.
- Imagerie : au minimum cliché d'ASP (sauf risque de grossesse) et échographie rénale. Un scanner abdomino-pelvien sans injection est systématique en cas de doute sur un obstacle (douleurs de colique néphrétique, lombalgies précédant l'épisode fébrile, antécédents lithiasiques).

#### Traitement ambulatoire

##### ► Conditions

Toutes les conditions suivantes doivent être réunies :

- femme jeune, état général conservé ;
- pas de signes de gravité biologiques ;
- pas de vomissements ;
- pas de lombalgies vives ;
- imagerie : ni obstacle ni abcès rénal ;
- pas d'uropathie connue ;
- pas d'immunosuppression ;
- pas de diabète ;
- pas de grossesse ;
- surveillance à domicile possible.

##### ► Antibiothérapie

– En urgence, dès les prélèvements effectués, sans en attendre les résultats, active et bactéricide sur *E. Coli*, *Proteus*, *Klebsiella* (90 % des cas).

– Monothérapie orale, pendant 10 j : **fluoroquinolone** : ofloxacine 200 mg x 2/j ou lévofloxacine (**TAVANIC**, 1 cp./j) ou **BACTRIM FORTE**, 2 cp./j.

– La pefloxacine n'est plus utilisée. De manière générale, les **fluoroquinolones** ne doivent pas être utilisées en cas de prise récente de quinolones (risque d'émergence d'*E. coli* BLSE).

– Si l'examen direct montre un Gram+ (cocci ou bacille) : traiter par **amoxicilline** 3 g/j (**CLAMOXYL**).

##### ► Mesures associées

Hyperdiurèse orale, **antalgiques** périphériques.

##### ► Surveillance

• Sensibilité du germe à l'antibiotique (antibiogramme sur l'ECBU initial).

• À la 72<sup>e</sup> h : obtention de l'apyrexie et stérilisation de l'urine (1<sup>er</sup> ECBU de contrôle). En cas de fièvre et/ou d'infection persistante, l'hospitalisation est nécessaire et un uroscanner sera souvent programmé.

• 2<sup>e</sup> ECBU de contrôle 15 j après l'arrêt des antibiotiques.

• En cas d'infections récurrentes : un UroScanner est utile ainsi que des mesures prophylactiques (Cf. Cystites récidivantes).

#### Traitement hospitalier

• L'ensemble des critères nécessaires au traitement ambulatoire n'est pas réuni : une hospitalisation est nécessaire. Le plus souvent il s'agit d'un état général altéré, d'un syndrome septicémique, de vomissements.

• Évaluation initiale : la même qu'en ambulatoire, volontiers complétée par un uroscanner (en l'absence de grossesse), la hantise étant la présence d'un obstacle à l'écoulement de l'urine (le plus souvent une lithiasie).

• L'antibiothérapie initiale est intraveineuse une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** (céfotaxime 1 g x 3/j ou céftriaxone 2 g/j) le plus souvent associée à un **aménoside** pendant 2 à 4 j si la fonction rénale est normale en l'absence d'antécédent d'ototoxicité. Si l'examen direct montre un Gram+ (cocci ou bacille), il faut traiter par une pénicilline (**amoxicilline** 3 g/j).

• Le relais oral est possible après 48 h d'apyrexie chez une patiente en bon état général ; le choix de la molécule est dicté par l'antibiogramme et l'efficacité du traitement initial. La durée totale de traitement de 12 j en l'absence d'antécédent particulier (uropathie malformative), d'obstacle ou de germe multirésistant.

## PYÉLONÉPHRITE AIGÜE (2)

### Pyélonéphrite obstructive [1]

- Drainage en urgence des urines retenues en amont, par néphrostomie percutanée ou montée de sonde urétérale. Il s'agit alors d'une urgence médicochirurgicale mettant en jeu le pronostic vital. Le traitement détaillé se trouve dans la fiche « Colique néphrétique ».
- Abscess : drainage parfois indiqué, percutané ou chirurgical.
- Phlegmon périnéphrétique : drainage de la loge rénale.
- La destruction du rein (pyonéphrose) peut requérir une néphrectomie.

Le nombre de souches résistantes à l'**amoxicilline** ( $\pm$  **acide clavulanique**) est trop important pour que ces produits gardent leur place en 1<sup>re</sup> intention ; de plus, même en cas de souche sensible, leur efficacité est moindre que celle des **fluoroquinolones** ou du **BACTRIM**. De même, les **céphalosporines** orales doivent être évitées. La **norfloxacin**e n'a pas d'AMM dans cette indication. Toutefois, l'émergence de résistances aux quinolones doit impérativement conduire à éviter la répétition des traitements par quinolones chez un même patient.

### CONSENSUS

[1] Diagnostic et traitement des infections bactériennes urinaires de l'adulte : pyélonéphrites aiguës, AFU, 2008

## ÉPIDIDYMITE ET ORCHI-ÉPIDIDYMITE

### Épididymite aiguë

L'épididymite aiguë est :

- soit vénérienne chez un sujet jeune avec urétrite préexistante ;
  - soit due à un germe banal chez un sujet plus âgé, favorisée par un obstacle cervico-prostatique ou une manœuvre endo-urétrale récente (sondage, endoscopie).
- Le diagnostic est clinique : fièvre élevée et douleurs scrotales, l'examen révélant une douleur épидидymaire, voire testiculaire ou prostatique (TR) en cas d'orchite ou prostatite associée(s).

Chez un sujet jeune une torsion du cordon spermatique doit être évoquée de principe (exploration chirurgicale en cas de doute).

### Suspicion d'épididymite vénérienne (sujet jeune, urétrite préexistante)

- ECBU, prélèvement urétral, sérologie *Chlamydia*, syphilitique ± VIH.
- Traitement antibiotique ambulatoire initialement présomptif, débuté en urgence, actif sur les *Chlamydiae* et les mycoplasmes : **OFLOXET** 200 mg x 2/j (actif aussi sur les bacilles Gram-) ou **VIBRAMYCINE N** 100 mg x 2/j pendant 3 sem.
- Traitement systématique du ou des partenaires.
- Rapports sexuels protégés ou abstinence pendant le traitement.
- Déclaration obligatoire d'une éventuelle gonococcie.

### Suspicion d'épididymite à germes banals (sujet âgé, troubles mictionnels, manœuvre urétrale récente)

- ECBU, hémocultures.
- Traitement antibiotique ambulatoire initialement présomptif, débuté en urgence, actif et bactéricide sur les bacilles Gram-, à bonne diffusion tissulaire et une élimination urinaire prédominante, prolongé 4 sem.
- Ambulatoire (état général conservé, pas de vomissement) : monothérapie orale

par **fluoroquinolone** ou **association de triméthoprime et de sulfamides** : **BACTRIM**.

- Hospitalier par voie parentérale plus rarement (sepsis sévère, état général altéré).

Soit une **fluoroquinolone** : **ofloxacine** (**OFLOXET** : 200 mg x 2/j) ou **péfloxacin** (**PÉFLACINE** : 400 mg x 2/j) ou **ciprofloxacine** (**CIFLOX** : 500 mg x 2/j), soit une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** (céfotaxime : 1 g x 3/j ou **ceftriaxone** : 2 g/j, soit du **BACTRIM** 4 amp./j).

L'un de ces produits est volontiers associé à un **aminoside** pendant 2 à 4 j ; le relais oral est possible après 48 h d'apyrexie chez un patient en bon état général : **fluoroquinolone** ou **BACTRIM FORTE** (2 cp./j) pour une durée totale de traitement de 4 sem.

- En cas d'abcédation : épидидymectomie chirurgicale.
- ECBU de contrôle 15 j après la fin du traitement.
- Traitement d'une cause favorisante à distance (adénome prostatique).

### Mesures associées

- Repos au lit (arrêt de travail ou hospitalisation).
- Port d'un suspensoir pendant 1 sem.
- Traitement antalgique et antipyrétique (**paracétamol**).
- Pour certains **AINS** à la phase aiguë.

### Épididymite chronique

L'inflammation épидидymaire chronique se voit dans deux circonstances :

- évolution d'une épидидymite aiguë tardivement ou insuffisamment traitée : un traitement antibiotique prolongé peut être proposé ;
- une tuberculose urogénitale : BK urinaires et UIV (recherchant d'autres signes de tuberculose) sont systématiques. Une bilharziose urogénitale est plus rare dans ce contexte.

## PROSTATITE AIGÜE

### Prostatite aiguë simple [1]

#### Antibiothérapie

Initialement empirique (en urgence, dès les prélèvements bactériologiques effectués, sans en attendre les résultats, visant les bacilles Gram-) puis secondairement adaptée aux résultats bactériologiques (identification du germe, antibiogramme).

- Bactéricide.
- À bonne diffusion prostatique.
- Prolongée au moins 4 sem.
- Monothérapie orale par **fluoroquinolones** : **ofloxacin** (**OFLOXET**) 200 mg x 2/j ou **lévofloxacin** ou **BACTRIM FORTE** (1 cp. matin et soir).
- Pour certains, association d'un **amino-side** pendant 2 à 4 j (ex. : **GENTALLINE**, 3 mg/kg en une IM/j).

#### Mesures associées

- Arrêt de travail.
- Repos au lit.
- Boissons abondantes pour maintenir une diurèse supérieure à 2 L.
- **Antalgiques** et **antipyrétiques** ; pour certains : **anti-inflammatoires non stéroïdiens** après apyrexie et contrôle du sepsis.
- En cas de dysurie importante :  **$\alpha$ -bloquants**.

- En cas de constipation : **laxatif**.
- Pas d'éjaculation.

### Prostatite aiguë compliquée

- Rétention aiguë d'urines.
- Hospitalisation.
- Traitement antibiotique par une **céphalosporine de 3<sup>e</sup> génération** (céfotaxime ou **ceftriaxone**) + **aminoside**.
- Recherche d'un abcès prostatique (TR, échographie sus-pubienne, scanner pelvien), inconstant.
- Drainage des urines par cathéter sus-pubien (sondage urétral contre-indiqué ; évacuation lente et fractionnée de l'urine (100 cm<sup>3</sup> toutes les 5 min) afin d'éviter l'hémorragie vésicale *a vacuo* ; dépistage d'un syndrome de levée d'obstacle. Retrait du cathéter après épreuve de clampage satisfaisante (mictions possibles, résidu post-mictionnel minime).

### Abcès prostatique

- Hospitalisation.
- Antibiothérapie parentérale.
- Drainage chirurgical de l'abcès par voie transurétrale (résection endoscopique), ou trans-rectale, ou trans-périnéale, s'il ne s'est pas évacué spontanément.

## CONSENSUS

[1] Diagnostic et traitement des infections bactériennes urinaires de l'adulte : prostatites aiguës, AFU, 2008



## HYPERTROPHIE PROSTATIQUE BÉNIGNE - ADÉNOME PROSTATIQUE

### Règles hygiéno-diététiques [1]

Activité physique régulière.  
Activité sexuelle habituelle.  
Miction dès perception du besoin.  
Éviter la congestion pelvienne : vins blancs, bière, repas abondants et épicés, station assise prolongée, constipation.

### Hypertrophie prostatique bénigne asymptomatique [1]

Pas de traitement.

### Traitement médical [1]

Adénome symptomatique non compliqué.

- Extraits de plantes (*PERMIXON*, *TADENAN*).
- $\alpha$ -bloquants.
- Parfois, association avec des **anticholinergiques** si symptômes irritatifs sans symptômes obstructifs (risque de rétention) : *CERIS* ou *DITROPAN*.

Médicaments dangereux (risque de rétention)  
 $\alpha$ -stimulants (sympathomimétiques).

### Traitement chirurgical [1]

En cas d'échec du traitement médical ou de retentissement vésical ou sur le haut appareil (dilatation urétéropyélocalicelle, insuffisance rénale obstructive).

### Techniques

► Adénomectomie voie haute (pour les adénomes de plus de 100 g)

► Résection trans-urétrale (à l'anse électrique monopolaire, bipolaire, au laser KTP argon ou au laser holmium)

Si l'indication relative dépend du volume de l'adénome, une séquelle est quasi constante : l'éjaculation rétrograde dont il faut prévenir le patient (conservation de sperme préalable possible).

En revanche libido et érections sont conservées.

Le choix entre la voie haute ou la voie endoscopique dépend de la taille de l'adénome mais aussi du patient (obésité, comorbidités, ATCD urologiques peuvent influencer sur le choix).

- La cryothérapie, l'hyperthermie, les micro-ondes, les ultrasons ne sont pas validés ni pris en charge par l'assurance-maladie.

### Indications de la chirurgie

- Troubles fonctionnels altérant la qualité de vie et résistant au traitement médical.
- Symptômes obstructifs prédominants, avec retentissement vésical : résidu important ( $> 100$  mL), diverticules, lithiase, distension par regorgement.
- Retentissement sur le haut appareil urinaire : dilatation de la voie excrétrice avec ou sans insuffisance rénale.
- Infections fréquentes, hématuries.

### Traitement palliatif

Endoprothèse urétrale ou sonde à demeure chez les patients en rétention inopérables.

### CONSENSUS

[1] Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'hypertrophie bénigne de la prostate, *Anaes*, 2003

## DYSFONCTION ÉRECTILE (1)

### Étiologie

Le meilleur traitement est étiologique [1]. Les causes des troubles de l'érection sont multiples et souvent associées.

Les examens à demander dépendent évidemment de l'orientation clinique :

- examen neurophysiologique ;
- bilan métabolique : cholestérolémie, triglycéridémie, glycémie ;
- bilan hormonal : FSH/LH, testostéronémie, prolactinémie, TSH ;

- bilan radiologique : écho-Doppler pulsé pénien ;
- parfois rigidimétrie nocturne.

La consultation pour une dysfonction érectile impose une dépistage de la maladie athéromateuse adaptée à l'âge du patient et aux autres facteurs de risque. Ainsi, une dysfonction érectile chez un homme tabagique de plus de 50 ans impose un Doppler des axes iliaques, des axes carotidiens et une consultation cardiologique.

### Causes des dysfonctions érectiles

MÉCANISME	ÉTIOLOGIES	
Hormonal	Hypogonadismes (hypergonadotrope par insuffisance testiculaire ou hypogonadotrope par insuffisance hypothalamo-hypophysaire) Hypothyroïdies	
Iatrogène	Cardiologie	<b>Antihypertenseurs</b> centraux <b>β-bloquants</b> <b>Diurétiques thiazidiques</b> <b>Digitaliques</b>
	Endocrinologie	<b>Antiandrogènes</b> (centraux et périphériques) <b>Corticoïdes, fibrates</b>
	Gastro-entérologie	<b>Anti-H<sub>2</sub></b>
	Neurologie et psychiatrie	<b>Antipsychotiques, antidépresseurs</b> <b>Anxiolytiques, lithium</b>
Vasculaire	HTA, artérite, fuite veineuse, intoxication tabagique	
Métabolique	Diabète sucré (atteinte vasculaire et neurologique) Hyperlipidémie majeure	
Neurologique	Alcoolisme chronique Alzheimer Carences vitaminiques Sclérose en plaques, syringomyélie Toxicomanies Traumatismes du bassin Tumeurs du système nerveux central	
Psychiatriques	Tous les troubles psychologiques peuvent entraîner des troubles de l'érection	
Radiothérapiques	Toutes les irradiations péviennes	
Urologiques	Tissulaires	Maladie de La Peyronie Traumatisme pénien Séquelles de priapisme Injections intracaverneuses
	Séquelles de chirurgie	Chirurgie aorto-iliaque Exérèse colorectale Prostatectomie totale Prostato-cystectomie Shunt caverno-spongieux

S'il existe une cause précise, le traitement suffit en général à guérir les troubles de l'érection.

Une sexothérapie est utile en cas de cause psychogène.

Souvent on se contente du traitement symptomatique car les causes sont intriquées.

**INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES (1)**■ **Sildénafil**

<b>VIAGRA</b>					
1 cp. 30 min à 1 h avant l'activité sexuelle La dose peut être réduite à 25 mg ou augmentée jusqu'à 100 mg (dose maximale)	4 cp. 25 mg		I	NR	
	8 cp. 25 mg		I	NR	
	4 cp. 50 mg		I	NR	
	8 cp. 50 mg		I	NR	
	12 cp. 50 mg		I	NR	
	4 cp. 100 mg		I	NR	
	8 cp. 100 mg		I	NR	
	12 cp. 100 mg		I	NR	

■ **Tadalafil**

<b>CIALIS</b>					
Idem <b>VIAGRA</b>	28 cp. 2,5 mg		I	NR	
	28 cp. 5 mg		I	NR	
	4 cp. 10 mg		I	NR	
	4 cp. 20 mg		I	NR	
	8 cp. 20 mg		I	NR	
<b>ADCIRCA</b>					
40 mg/j en une prise	30 cp. 20 mg	35,40	I	30 %	1,18
	30 cp. 20 mg	35,40	I	30 %	1,18

■ **Vardénafil**

<b>LEVITRA</b>					
Idem <b>VIAGRA</b>	4 cp. 5 mg		I	NR	
	4 cp. 10 mg		I	NR	
	8 cp. 10 mg		I	NR	
	4 cp. 20 mg		I	NR	
	8 cp. 20 mg		I	NR	
	12 cp. 20 mg		I	NR	
	20 cp. 20 mg		I	NR	

## DYSFONCTION ÉRECTILE (2)

### Traitement médicamenteux

Ils sont utilisés en première intention.

#### Alphabloquants

Yohimbine (**VASOBRA**, **CARLYTÈNE**).

#### Inhibiteurs des phosphodiesterases

Les **inhibiteurs des phosphodiesterases**.

Ex. : **sildénafil (VIAGRA)** ; **tadalafil (CIALIS)** ; **vardenafil (LEVITRA)** provoquent une augmentation du taux de GMP cyclique responsable de la myorelaxation des fibres musculaires lisses du tissu érectile. Le remplissage vasculaire des corps caverneux est rendu ainsi possible et provoque la rigidité de la verge.

Le délai pour parvenir à la concentration plasmatique maximale (Tmax) est d'environ 1 h pour le **VIAGRA** et le **LEVITRA** qui ont une demi-vie d'élimination de 4 à 5 h. La durée d'action du **VIAGRA** est de 4 à 5 h. Celle du **LEVITRA** n'est pas précisée. Le Tmax du **CIALIS** est d'environ 2 h, sa demi-vie d'élimination est de 17,5 h et sa durée d'action est de 36 h ; pour ce dernier, un délai de 2 j est à respecter entre 2 prises.

#### Traitement androgénique

Il est surtout utile en cas d'hypoandrogénie avec baisse de la libido. Après vérification d'absence de cancer de la prostate (toucher rectal, dosage des PSA), de cancer mammaire (palpation) et de syndrome métabolique (poids, bilan lipidique, numération formule sanguine) prescription d'**androgènes** (cf. Hypogonadismes) :

- **PANTESTONE** per os : 3 caps. à 40 mg/j, 3 j/sem. puis 1 à 3/j suivant les résultats ;
- **ANDROTARDYL** : 1 amp. à 250 mg : 1 inj. toutes les 3 sem. ou tous les mois.

Une hormonothérapie substitutive par les androgènes ne doit être entreprise qu'en cas d'indication claire, c'est-à-dire devant des signes cliniques évocateurs de déficit androgénique lié à l'âge confirmés biologiquement par deux dosages de testosté-

ronémie inférieurs à la normale.

Il s'agit d'un traitement au long cours, nécessitant une surveillance clinique et biologique régulière. Cette surveillance est une responsabilité partagée : le médecin doit insister auprès du patient sur la nécessité de bilans périodiques de ce traitement, instauré *a priori* à vie.

#### Injections intracaverneuses (IIC)

On peut utiliser l'**alprostadil (CAVERJECT, EDEX)**.

La PGE1 est un agent inducteur de l'érection, par l'intermédiaire de récepteurs intracaverneux, dont la stimulation provoque une relaxation du muscle lisse par augmentation de la concentration de l'AMPc.

#### Indications

- Contre-indication ou intolérance au traitement oral.
- Échec du traitement oral.
- Chirurgie carcinologique prostatique (prostatectomie radicale sans préservation des bandelettes vasculonerveuses) ou vésicale (cysto-prostatectomie totale).
- Préférence du patient (problèmes du non-remboursement des traitements oraux, efficacité supérieure à celle des traitements oraux).

#### Remboursement

Les **IIC** de PGE1 sont remboursées dans certaines indications (avec un formulaire de médicaments d'exception) :

- neuropathie diabétique avérée ;
- para ou tétraplégie ;
- séquelles de la chirurgie (prostatectomie radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale) ou de la radiothérapie abdomino-pelvienne ;
- sclérose en plaques ;
- séquelles de priapisme ;
- séquelles de la chirurgie vasculaire (anévrisme de l'aorte) ;
- traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires.

**INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'afflux sanguin dans les corps caverneux est dû à un relâchement des muscles lisses qui à l'état normal sont contractés autour des artérioles des corps caverneux. Ce relâchement est lié à l'action de la guanosine-monophosphate cyclique (GMPc) dont la concentration augmente sous l'effet d'une enzyme (la guanylate cyclase) activée par le monoxyde d'azote libéré par la stimulation sexuelle.

Les **inhibiteurs des phosphodiesterases** empêchent la dégradation de la GMPc en inhibant l'enzyme responsable, la phosphodiesterase de type 5 (PDE5) pour laquelle ils sont sélectifs. L'érection est ainsi amplifiée et maintenue plus longtemps, mais ce mécanisme d'action explique la nécessité d'une stimulation sexuelle pour que l'érection se produise.

Le temps nécessaire pour obtenir une érection suffisante pour un rapport sexuel est de 10 à 30 min. Cette érection peut être obtenue jusqu'à 4 à 5 h plus tard.

**INDICATIONS**

Traitement des troubles de l'érection (incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante). On peut aussi utiliser ces molécules dans l'hypertension artérielle pulmonaire (hors AMM).

**CONTRE-INDICATIONS**

Elles sont principalement cardiovasculaires. Patients chez lesquels l'activité sexuelle est déconseillée (angor instable, insuffisance cardiaque grave).

Insuffisance coronarienne. Antécédents d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral.

Prise de certains médicaments : **hypotenseurs, dérivés nitrés** (potentialisation), **nitroprussiate de sodium, nitrile d'amyle** (poppers).

Rétinite pigmentaire et autres troubles héréditaires dégénératifs de la rétine.

Insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les **inhibiteurs des phosphodiesterases** ne doivent être prescrits qu'après avoir recherché une cause organique aux troubles de l'érection (neurologique, hormonale, diabète) et les pathologies comportant un risque de priapisme.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypotension artérielle : la baisse de la PA est de 8 mmHg pour la maxima et 5,5 mmHg pour la minima.

Céphalées (12,8 %), rougeur de la face (10,4 %), sensations vertigineuses (1,2 %), dyspepsie, congestion nasale.

Priapisme.

Des effets passagers sur la vision des couleurs sont possibles : diminution de la discrimination des nuances entre bleu et vert, probablement par baisse de la PDE6 nécessaire à la transduction des couleurs dans les cellules rétiennes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de la clairance du **sildénafil** lors de la prise de **kétoconazole, érythromycine, cimétidine**.

Potentialisation de l'effet des **dérivés nitrés**.

## DYSFONCTION ÉRECTILE (3)

### Principaux effets secondaires

- Douleurs, pouvant toucher jusqu'à 29 % des patients, essentiellement au début du traitement, et qui s'amendent en général progressivement au fil des injections.
- Hématome au point de ponction, sans caractère de gravité.
- Érections pharmacologiquement prolongées, voire priapisme, rapportés dans 1 à 2 % des cas.
- Fibrose localisée des corps caverneux (0,8 à 23,3 % des cas),

Le respect strict des contre-indications est nécessaire avant instauration de ce traitement. Une contraception devra être utilisée si la partenaire est susceptible d'être enceinte ; sinon les IIC ne devront pas être instaurées.

### Prostaglandines intra-urétrales

C'est le même mécanisme d'action que les IIC. La voie intra-urétrale évite l'injection. Ce traitement est disponible en France (**MUSE**), en 500, 750 et 1 000 µg. Il n'est pas remboursé, quelle que soit la pathologie à l'origine de la DE.

La diffusion de la PGE1 par cette voie entraîne une efficacité moindre que par IIC (environ 50 %).

Un préservatif est nécessaire chez les femmes susceptibles d'être enceintes. Un test médicalisé est nécessaire avant prescription (risque d'hypotension par passage sanguin de la PGE1, apprentissage de la technique et détermination de la dose à prescrire).

### Moyens mécaniques

Le **VACUUM** est une pompe à dépression qui provoque un afflux de sang lorsqu'elle est appliquée sur la verge. Un garrot léger empêche la fuite veineuse.

L'appareil ne peut être utilisé en cas de prise d'**anticoagulants**. Ses inconvénients

sont les difficultés de la manipulation, une sensation de verge froide, un blocage possible de l'éjaculation, un manque de rigidité.

### Interventions chirurgicales

- Les opérations de revascularisation artérielle sont quasiment abandonnées, de même que les ligatures de la veine dorsale de la verge pour fuite veineuse, ainsi que l'artérialisation de la veine profonde.
- La mise en place d'implants péniers est justifiée après échec des autres traitements :

- implants souples ;
- prothèses semi-rigides ;
- prothèses gonflables.

Il s'agit de la mise en place chirurgicale de deux implants, un dans chaque corps caverneux, entraînant une érection mécanique. Il existe différents types d'implants : semi-rigides, gonflables en 2 ou 3 parties. Les implants péniers ne sont proposés qu'après échec ou refus des autres traitements, car ils se substituent de façon définitive au tissu érectile : il s'agit donc d'un traitement de «3<sup>e</sup> ligne».

### Efficacité

Chez les patients présentant une prothèse fonctionnelle, chez des couples sélectionnés, et parfaitement informés, le taux de satisfaction est très élevé allant de 79 à 98 %.

### Complications

Les risques principaux des implants péniers sont :

- l'infection prothétique qui survient dans 1 à 5 % des cas et nécessite l'ablation du matériel prothétique ;
- les problèmes mécaniques avec la prothèse ou les tubulures ; ceux-ci augmentent avec le temps (5 % après 1 an, 20 % à 5 ans et 50 % à 10 ans) et nécessitent une ré-intervention pour remplacement.

## INCONTINENCE URINAIRE CHEZ LA FEMME

Il existe deux types d'incontinence urinaire :

- l'incontinence urinaire d'effort (IUE) ;
- l'incontinence par impériosités mictionnelles.

- L'IUE est due à la ptose du col vésical à laquelle peut s'associer une insuffisance sphinctérienne, toutes deux conséquences des accouchements et favorisées par l'atrophie muqueuse après la ménopause.

- L'incontinence par impériosité peut être due à une lésion vésicale (tumeur, calcul, infection) à dépister, à un prolapsus génital, à une maladie neurologique ou métabolique (diabète).

- Les incontinenances mixtes par impériosité et à l'effort sont fréquentes.

### Bilan préthérapeutique

Outre l'évaluation clinique :

- ECBU ;
- frottis cervico-vaginal ;
- échographie pelvienne ;
- étude urodynamique : défaut de transmission  $\pm$  insuffisance sphinctérienne dans l'IUE et contractions vésicales non inhibées dans l'incontinence par impériosité ;
- cystoscopie.

### Incontinence urinaire d'effort

#### IUE modérée

- Rééducation périnéo-mictionnelle avec stimulation électrique et biofeedback pour

réduquer les releveurs et apprendre à la patiente le verrouillage périnéal.

Cette rééducation après accouchement fait la prévention des IUE ultérieures.

- Après la ménopause.

Traitement œstrogénique local (**COLPOTROPHINE**, **TROPHIGIL**).

#### IUE invalidante ou persistante

**Intervention chirurgicale** : soulèvement urétral par une bandelette prothétique : *Tension-Free Vaginal Tape* (TVT) ou *Trans-Obturator Tape* (TOT et TVTO).

Lorsque l'incontinence urinaire est associée à une cystocèle, il faut traiter le prolapsus dans le même temps :

- promontofixation coelioscopique avec double bandelette antérieure et postérieure ;

- cure de cystocèle voie basse : spino-fixation de richter et plicature du fascia de Halban.

### Incontinence par impériosités

- Traitement anticholinergique.

- Un certain nombre de produits sont utilisés : **DITROPAN**, **DRIPTANE**, **URISPAS**, **DÉTRUSITOL**.

- Traitement œstrogénique local.

- Après la ménopause on emploie : **COLPOTROPHINE**, **TROPHIGIL**.

- Traitement étiologique.

- Traitement anti-infectieux, traitement chirurgical d'une lésion urétrale, d'un prolapsus.

## LITHIASÉ URINAIRE (1)

### Traitement médical [1]

Le traitement médical ne peut dissoudre les calculs rénaux déjà formés (à l'exception des lithiases uriques et éventuellement cystiniques), mais permet de prévenir le développement de nouveaux calculs.

Une enquête étiologique est systématique chez les sujets jeunes, et en cas de calculs récidivants, bilatéraux, ou radiotransparents.

- Sang : calcémie, phosphorémie, uricémie, créatininémie, bicarbonatémie.
- Urines des 24 h : calciurie, oxalurie, phosphaturie, uraturie, citraturie, natriurèse, urée urinaire.
- Cristallurie, analyse des calculs émis.
- pH urinaire.

### Lithiase oxalocalcique

#### Hypercalcémie

La grande majorité des patients atteints de lithiase hypercalcémique ont une *hyperparathyroïdie primitive*, dont la solution est chirurgicale ; plus rarement il s'agit d'une sarcoïdose, d'une hypercalcémie familiale hypocalciurique, d'une néoplasie, d'une

prise médicamenteuse hypercalcémiante (**vitamine D, thiazidiques, lithium**).

#### Hypercalciurie

Plus de 50 % des patients atteints de lithiase oxalocalcique ont une calcémie normale mais une calciurie  $> 0,1$  mmol/kg/j. Ceci peut être dû à un régime déséquilibré, très riche en protides, sel, glucides, calcium, et pauvre en fibres végétales (« hypercalciurie alimentaire ») ou bien à une métabolisation particulière du calcium, volontiers héréditaire, appelée « hypercalciurie idiopathique » : hyperabsorption intestinale et/ou défaut de réabsorption rénale.

#### ► Mesures thérapeutiques

- Cure de diurèse  $> 2$  L/j.  
Correction des erreurs diététiques :
- régime normocalcique (800 à 1 000 mg/j) ;
  - apports sodés : 100 mmol (6 g)/j ;
  - apports protidiques : 1 g/kg/j.

► En cas d'hypercalciurie persistante après 8 sem. de régime effectif

Prescrire un **diurétique thiazidique (ESI-DREX 25 mg/j)** qui réduit l'excrétion urinaire du calcium (à vérifier 2 mois plus tard).



## ALCALINISANTS URINAIRES

## ■ Bicarbonate de sodium

EAUX DE VICHY					
Célestin 1 L = 3 g de $\text{HCO}_3 \text{ Na}$	1 bouteille 1 L			NR	
St-Yorre 1 L = 4 g de $\text{HCO}_3 \text{ Na}$	1 bouteille 1 L			NR	

## ■ Sels de citrate

CITRATE DE POTASSIUM OFFICINAL					
2 à 8 g/j (diluer dans 1 L d'eau)	pdre			NR	
FONCITRIL					
Contient <b>citrate de sodium</b> de <b>potassium</b> et <b>acide citrique</b> ; 2 à 4 sach./j	30 sach.			NR	

## ■ Trométamol (ou THAM) + citrates de sodium et de potassium

ALCAPHOR					
Contient <b>citrate de sodium</b> de <b>potassium</b> et <b>trométamol</b> Posologie : 2 à 4 càs./j	1 fl. 250 mL (2,3 g ou 10 mmol de THAM/càs)		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

L'alcalinisation favorise la solubilisation des cristaux d'acide urique et de cystine.

## INDICATIONS

Lithiase urique (prévention, traitement).  
Lithiase cystinique.  
Acidoses tubulaires distales.

## CONTRE-INDICATIONS

Alcalose.  
pH urinaire 7 (et lithiase infectieuse).  
Surcharge hydrosodée (sauf pour le **trométamol** qui ne contient pas de sel).

Hyperkaliémie (pour le **citrate de potassium**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque d'alcalose métabolique en cas de fortes doses et d'insuffisance rénale avancée.  
Prudence chez l'insuffisant cardiaque (sauf **trométamol**).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée, gastralgies.  
Surcharge hydrosodée (sauf **trométamol**).  
Hyperkaliémie (**citrate de potassium**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Quinidine.

## LITHIASÉ URINAIRE (2)

### Hyperoxalurie

L'acide oxalique excrété par les reins provient de l'alimentation à 10 % (absorption colique passive d'oxalate libre, l'oxalate de calcium étant éliminé dans les selles), et du métabolisme endogène à 90 % (à partir du glyoxylate). Une hyperoxalurie modérée (500 à 700  $\mu\text{mol/L}$ ) est idiopathique ou alimentaire tandis qu'une franche hyperoxalurie ( $> 1\,000\ \mu\text{mol/L}$ ) est entérique ou héréditaire (oxalose).

#### ► Hyperoxalurie diététique

Corriger une alimentation trop riche en oxalates (thé, chocolat, cacao, épinards, rhubarbe, betteraves, oseille, **vitamine C**) ou trop pauvre en calcium.

#### ► Hyperoxalurie entérique

Une maladie entérique (résection du grêle, court-circuit jéuno-iléal, Crohn, maladie cœliaque, pancréatite chronique, obstruction biliaire, pullulation microbienne) favorise une perte fécale de graisses qui se complexent avec le calcium (« savons calciques ») et laissent dans la lumière colique de grandes quantités d'oxalate libre.

- Cure de diurèse  $> 2\ \text{L/j}$ .
- Apports calciques (**carbonate de calcium**, 1 g par repas).
- Limiter les apports en oxalates et en acides gras saturés.
- Chélation des acides gras, biliaires et de l'oxalate par **colestyramine (QUESTRAN)**, 1 sach. par repas).

#### ► Hyperoxalurie primitive : « oxalose »

Le déficit (autosomique récessif) en AGT (alanine glyoxylate-aminotransférase) hépatique définit le type I ; rare et grave, cette lithiasé bilatérale, évolutive, avec néphrocalcinose se révèle volontiers dans

l'enfance ; les dépôts oxalocalciques tubulo-interstitiels favorisent le développement d'une insuffisance rénale ; d'autres dépôts (cœur, vaisseaux, os et articles, rétine, nerfs) sont possibles.

- Cure de diurèse  $> 3\ \text{L/j}$ .
- La **vitamine B6 (PYRIDOXINE)**, 300 à 1 000 mg/j) réduit l'oxalurie chez 30 % des patients et peut stopper l'évolution de la maladie.
- Réduction des apports d'oxalate, prescription de **magnésium, phosphates, citrate, diurétiques thiazidiques** sont parfois associés.
- En cas d'insuffisance rénale avancée, on peut discuter : épuration extrarénale précoce et intensive, transplantation hépatique (corrige le déficit enzymatique) ou hépato-rénale, transplantation rénale seule.

### Hyperuricurie

La correction d'une hyperuricurie permet de réduire la formation de lithiasés oxalocalciques. Un régime pauvre en purines (abats, sardines, anchois, protéines animales) et en alcool suffit le plus souvent ; en cas d'échec, l'**allopurinol (ZYLORIC)** peut être prescrit à la dose de 100 à 300 mg/j.

### Hypocitraturie

L'acide citrique est le principal acide organique urinaire. Il est antilithogène : le **citrate de calcium**, très soluble, diminue la sursaturation oxalocalcique de l'urine. L'**hypocitraturie idiopathique** ( $< 1,4\ \text{mmol/L}$ ) est logiquement combattue par le **citrate de potassium** (3 à 6 g/j).

Il faut traiter la cause des **hypocitraturies secondaires** (infection urinaire, acidose tubulaire, hypokaliémie, diarrhée chronique, iléopathies, prise d'**acétazolamide**).

## LITHIASSE URINAIRE (3)

### Lithiase phosphocalcique

Une acidose tubulaire rénale distale (type I) congénitale (syndrome d'Albright) ou acquise (auto-immune, syndrome de Sjögren) favorise souvent cette variété de lithiase.

La difficulté à acidifier l'urine favorise la cristallisation phosphocalcique ; une acidose métabolique associée induit de plus une profonde hypocitraturie et une hypercalciurie qui accroissent la lithogénèse.

- Diurèse > 2 L/j.
- Si acidose métabolique : **bicarbonate de sodium, citrate de potassium**.  
En l'absence d'acidose métabolique : corriger l'hypocitraturie (**citrate de potassium**).  
En cas d'hypercalciurie persistante, un **diurétique thiazidique** peut être prescrit.

### Lithiase urique (10 % des lithiases)

La formation de cette lithiase est favorisée par :

- une acidité permanente de l'urine (pH urinaire < 6) ;
- une hyperuricémie (> 400  $\mu\text{mol/L}$ ) primitive ou secondaire, avec hyperuricurie ;
- une hyperuricurie isolée (> 4 700  $\mu\text{mol/j}$ ), secondaire à une alimentation riche en purines ou à la prise d'un médicament uricosurique (à interrompre).

Afin d'éviter la sursaturation de l'urine en urate, très insoluble, on peut recommander :

- cure de diurèse > 2 L/j ;
- alcalinisation de l'urine : obtenir un pH urinaire entre 6,5 et 7,5 sur tout le nyctémère grâce au  $\mu$  (poudre ou gélules, eaux de Vichy, 500 à 1 000 mL/j) ou au **citrate de sodium (FONCITRIL 400)** et de **potassium (ALCAPHOR)** : la majorité de l'acide urique est alors éliminée sous forme d'urate de sodium, très soluble.

En cas d'uricémie élevée : régime pauvre en purines, et **inhibiteur de la synthèse de**

l'acide urique type **allopurinol (ZYLORIC)**, 100 à 300 mg/j) en cas d'échec.

Ces mesures sont préventives mais aussi curatives, permettant de dissoudre rapidement une lithiase urique déjà formée.

### Lithiase cystinique (1 % des lithiases)

Peu radio-opaque, parfois coralliforme, souvent bilatérale et récidivante, cette lithiase se révèle chez l'enfant ou le sujet jeune (parfois plus tard). Il s'agit d'une affection héréditaire (autosomique récessive) avec défaut de réabsorption tubulaire des 4 acides aminés dibasiques ; seule la cystine (disulfure de cystéine) est peu soluble et cristallise au-delà de 250 mg/L à pH 6. Pour solubiliser la cystine libre produite par ces patients (parfois > 1 000 mg/j), on peut proposer plusieurs mesures. L'objectif est d'obtenir une cystinurie libre < 250 mg/L :

- cure de diurèse > 3 à 4 L/j ;
- alcalinisation de l'urine : la cystine est 2 fois plus soluble lorsque le pH urinaire est entre 7 et 8 ; on utilise le **citrate de potassium**, ou parfois le **bicarbonate de sodium** ;
- régime modérément sodé (augmentation modérée de la cystinurie en cas de régime hypersalé) ;
- dérivés thiolés.

Les **dérivés thiolés** seront prescrits en cas de concentration urinaire de cystine libre élevée malgré les mesures précédentes : la **tiopronine (ACADIONE)**, la **D-pénicillamine (TROLOVOL)** et à un degré moindre le **captopril (LOPRIL)** peuvent former avec la cystéine des sels très solubles, et donc réduire par compétition la formation de cystine. Les nombreux effets indésirables de ces traitements limitent souvent leur usage.

Ces mesures préventives permettent en outre de solubiliser en partie des lithiases déjà formées.

## LITHIASÉ URINAIRE (4)

### Lithiasé d'infection (5 à 10 % des lithiasés)

Ces calculs sont volontiers observés chez la femme ; coralliformes, faiblement radio-opaques, leur croissance est rapide et souvent silencieuse. Ils peuvent compromettre irrémédiablement la fonction rénale. Leur formation (phosphates ammoniac-magnésiens et phosphate de calcium) s'opère à pH urinaire alcalin ( $\geq 8$ ), du fait d'infection chronique de l'appareil urinaire à germes producteurs d'uréases (*Proteus*, parfois *Klebsiella*, entérocoques). *L'infection est secondaire à une uropathie malformative sous-jacente, ou à une lithiasé d'autre nature secondairement infectée.*

Seules l'ablation complète de la lithiasé, la stérilisation de l'urine, et la correction d'une uropathie causale garantissent l'absence de récurrence.

- Les boissons abondantes et non alcalines sont recommandées.
- L'acidification urinaire est difficile à obtenir.
- L'inhibition de l'uréase (acide acétohydroxyamique) est peu efficace en pratique.

### Lithiasé xanthique

- Cure de diurèse  $> 2$  L/j.
- Alcalinisation.
- Pas d'allopurinol.

### 2-8 dihydroxyadénine

- Cure de diurèse  $> 2$  L/j.
- Allopurinol (ZYLORIC) : 300 mg/j.

### Traitement chirurgical [1]

#### Indications

##### ► Abstention

Elle est logique en cas de lithiasé radio-opaque de petite taille ( $< 3$  mm) sans infection associée. Il faut demander au patient de boire abondamment et de se mobiliser, afin de favoriser la migration spontanée de la lithiasé (à recueillir par tamisage des urines). Des épisodes de colique néphrétique sont possibles et seront traités médicalement. Des clichés d'abdomen sans préparation seront effectués à intervalles réguliers.

##### ► Intervention

- En urgence.

Colique néphrétique hyperalgique, « anurie » calculeuse, pyélonéphrite aiguë lithiasique. Il faut drainer les urines en montant une sonde urétérale par les voies naturelles (voire par néphrostomie percutanée en cas d'échec).

- Programmée.

Elle s'adresse principalement aux lithiasés totalement obstructives, celles dont la taille rend la migration spontanée impossible ( $> 8$  mm).

Le lithotritie extra-corporelle est proposée pour les lithiasés radio-opaques de plus de 3 mm.

Les progrès technologiques (urétéroscopie souple, laser) tendent à développer les indications pour des lithiasés de petite taille, même calicelle inférieure.

**LITHIASÉ URINAIRE (5)****Techniques chirurgicales**► *Lithotripsie extracorporelle (LEC)*

Fragmente les calculs par des ondes de choc, pour favoriser leur migration spontanée.

## • Respect des contre-indications.

- Rein non fonctionnel.
- Obstruction urinaire en aval du calcul.
- Infection urinaire.
- Troubles de l'hémostase.
- Anévrisme aortique.
- Cancer du rein.
- Grossesse.
- Patient non coopérant.
- Lithiasé urique pure (non-indication).

## • Technique.

- Uroscanner préalable + ASP.
- ECBU.
- Contrôle de l'hémostase.
- Sonde double J en cas de lithiasé volumineuse, ou urétérale dans certains cas.
- Complications.
- Lombalgies voire colique néphrétique.
- Hématurie.
- Infection urinaire.
- Obstruction par empiérement du bas urètre.

La surveillance paraclinique comporte : un ASP, un contrôle de la créatinémie.

## • Résultats.

Le succès dépend de la composition des calculs (cystiniques et calciques monohydratés difficiles à fragmenter), de leur taille (idéalement < 20 mm), et de leur siège (urétéral et caliciel inférieur moins favorables).

Les fragments résiduels persistants plus de 6 sem. peuvent bénéficier d'une nouvelle séance de LEC.

► *Traitement endo-urologique (urétéroscopie rigide ou souple)*

Le développement de l'urétéroscopie souple et du laser holmium permet désormais d'introduire des instruments flexibles dans tous les calices rénaux, et de transmettre l'énergie de fragmentation (fibre laser) même en angulation.

L'urétéroscopie s'est donc imposée comme le traitement de référence des lithiasés inférieurs à 2 cm, en alternative à la LEC ou lorsque les fragments ne peuvent s'éliminer spontanément (calculs caliciels inférieurs, obstacles sous-jacents).

Dans certains cas, le recours à l'urétéroscopie plutôt qu'à la LEC est discutable (balance bénéfice/risque) et doit être expliqué au patient : risque chirurgical vs risque colique néphrétique post-LEC, etc.

► *Néphrolithotomie percutanée*

Les cavités rénales sont ponctionnées sous anesthésie ; après dilatation du trajet, un endoscope est introduit et permet d'extraire le(s) calcul(s), parfois après fragmentation (néphrolithotomie). Cette technique est désormais uniquement proposée pour les calculs coralliformes ou supérieurs à 2 ou 3 cm.

► *Chirurgie classique par voie ouverte ou laparoscopique*

La néphrotomie, la pyélotomie, l'urétérotomie pour lithiasé sont réservées :

- aux échecs ou contre-indications des techniques précédentes ;
- aux cas où une laparotomie associée est nécessaire.
- dans les maladies lithiasiques complexes, récidivantes et lorsque les patients ne peuvent subir des traitements itératifs.

**CONSENSUS**

- [1] Prise en charge urologique des calculs rénaux et urétéraux de l'adulte, Comité lithiasé de l'AFU, 2004

**JONCTION PYÉLO-URÉTERALE (SYNDROME DE LA)****Définition**

Dilatation des cavités pyélo-calicielles en amont d'une sténose fibreuse ou fonctionnelle de la jonction pyélo-urétérale ou parfois d'une striction par une artère polaire inférieure.

Lorsque la sténose est une fibrose congénitale de la jonction, on parle de maladie de la jonction pyélo-urétérale.

**Clinique**

- Volontiers asymptomatique, elle peut détruire le rein sus-jacent à bas bruit.
- Parfois révélée par des coliques néphrétiques ou pyélonéphrites à répétition.
- Le diagnostic, suggéré par l'échographie (bassinets dilatés, uretère fin), est confirmé par l'uroscanner (sensibilisé par un test au **LASILIX**) et par la scintigraphie rénale au MAG3 qui confirme la stase pyélique et l'absence de vidange du bassinets en situation d'hypertiurèse forcée (test au **LASILIX**).

**Traitement**

**Syndrome de jonction asymptomatique, absence de retentissement rénal, passages urétéraux sur l'urographie ou bonne vidange scintigraphique**

- Abstention et surveillance.

**Rein détruit sans symptôme ni complication**

- Abstention et surveillance.

**Douleurs, complications infectieuses ou lithiasiques, retentissement rénal débutant**

- Pyéloplastie (résection de la jonction et d'une partie du bassinets, avec anastomose pyélo-urétérale) : 1<sup>re</sup> intention chez le sujet jeune.

- Ou, plus rarement chirurgie endoscopique (fente de la sténose et cicatrisation protégée par une sonde JJ).

La principale complication de ces traitements est la récurrence.

**Rein atrophique, non ou peu fonctionnel (< 10 % si clairance > 60 mL/min), chez un patient menacé par des pyélonéphrites à répétition**

Néphrectomie.

## TUMEURS DE LA VESSIE (1)

Les tumeurs de vessie, généralement révélées par une hématurie, sont le plus souvent visibles sur l'échographie. Elles sont volontiers multifocales, rendant indispensable l'uroscanner avec étude en coupes fines de la voie excrétrice.

L'endoscopie vésicale permet d'assurer le diagnostic de certitude, et le traitement local des tumeurs superficielles ; ces dernières sont cependant récidivantes et à haut risque d'infiltration. Superficielles ou infiltrantes, toutes les tumeurs de vessie sont donc considérées comme des carcinomes de l'urothélium et justifient la prise en charge en ALD.

### Résection endoscopique [1]

Avec un endoscope rigide, sous AG, après contrôle de l'hémostase et de la stérilité urinaire.

- Résection biopsique de la ou des tumeurs, passant en zone saine.
- Étude anatomopathologique :
  - degré d'infiltration de la paroi vésicale ;
  - grade cellulaire, état de la muqueuse intertumorale : normale, dysplasie, carcinome *in situ* (CIS).

### Tumeurs superficielles [1]

Il s'agit des carcinomes *in situ* (membrane basale non franchie), des tumeurs Ta (sous-muqueuse non atteinte) et T1 (muscleuse non atteinte).

Ces résultats anatomopathologiques proviennent d'une résection biopsique qui a assuré un traitement local *a priori* complet. Il reste à prévenir et dépister les récidives.

### Prévention des récidives

- Soustraction à l'exposition urotoxique : tabac, colorants, toxiques professionnels.
- Discussion d'instillations vésicales, de BCG (*IMMUCYST*) ou de *mitomycine C*, selon le nombre de tumeurs, leur taille, le grade cytologique, leur caractère récidivant ou non.
- Discuter une cystectomie totale en cas de tumeurs superficielles à grade cellulaire élevé (3) multirécidivantes ou lorsque la muscularis mucosae est franchie (T1b).

### Surveillance

À vie, régulièrement : cytologie urinaire et endoscopie vésicale (1<sup>er</sup> contrôle à 3 mois, puis tous les 6 mois).

## TUMEURS DE LA VESSIE (2)

### Tumeurs infiltrantes [1]

Il s'agit des tumeurs ayant atteint la musculuse vésicale ( $\geq$  T2).

#### Sans extension loco-régionale ni métastases

- *Cystoprostatectomie totale chez l'homme ou pelvectomie antérieure chez la femme* + curage ganglionnaire pelvien étendu bilatéral, idéalement suivis d'une entéro-cystoplastie de remplacement (néovessie suturée à l'urètre). Si cette reconstruction est impossible ou contre-indiquée par l'extension à l'urètre ou aux uretères, l'âge ou l'état général du patient, une *dérivation urinaire* sera effectuée :
  - urétérostomie transcutanée trans-iléale (Bricker) ;
  - dérivation cutanée continente (poche d'Indiana ou Miami, poche de Koch) ;
  - implantation des uretères dans le côlon sigmoïde ou le rectum (Coffey et variantes) ;
  - urétérostomie cutanée.
- Une chimiothérapie adjuvante à base de cisplatine doit être discutée en RCP selon le résultat anatomopathologique (surtout pour les T4 et pour les microinvasions ganglionnaires).

*Surveillance postopératoire régulière à vie* : UIV, échographies ou scanner abdomino-pelvien, scintigraphie osseuse, radiographie pulmonaire, créatinine et ionogramme sanguin, vitamine B12 et folates.

- *Certaines tumeurs petites avec une résection complète* peuvent être traitées par radio-chimiothérapie. L'évaluation à mi-traitement impose des biopsies randomisées de la vessie. La présence d'un reliquat tumoral impose la cystectomie.

#### Avec extension loco-régionale, ganglionnaire ou métastases

- *Chimiothérapie* : association Gemox (gemcitabine - oxaliplatine) ou M-VAC (méthotrexate, vinblastine, doxorubicine, cisplatine). Dans environ 20 % des cas elle peut être envisagée en pré ou postopératoire dans les formes étendues et opérables.
- *Radiothérapie* : elle est faite sur la vessie et les aires ganglionnaires (60 Gy).
- *Cystectomie palliative* : elle est pratiquée avec dérivation si troubles mictionnels, douleurs ou hématuries non contrôlées par le traitement médical. La survie à 5 ans est de 10 %.

### CONSENSUS

[1] Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Tumeurs urothéliales, AFU, 2010



## URÉTRITE (1)

### Urétrite aiguë non compliquée

Pour les urétrites compliquées (orchi-épididymite, prostatite), consulter les fiches correspondantes.

L'urétrite est une inflammation de l'urètre et des glandes périurétrales, le plus souvent d'origine infectieuse et sexuellement transmissible. Elle nécessite une information au patient et un traitement rapide en raison de la contagiosité et du risque de complications.

Les symptômes se manifestent dans 50 % des cas par un écoulement urétral purulent ou séreux, voire hémorragique, avec brûlures mictionnelles. Ils sont habituellement plus marqués dans les urétrites gonococciques (= communément appelées «chaude pisse» et caractérisées par un écoulement purulent urétral matinal). En l'absence d'écoulement, les symptômes sont : un prurit canalaire, des brûlures mictionnelles, une dysurie, une pollakiurie. Des localisations pharyngées ou anales peuvent être associées.

### Écologie bactérienne

*Chlamydia trachomatis* est la première cause d'infection sexuellement transmissible bactérienne dans les pays industrialisés.

Les autres pathogènes incluent *N. gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium* et *Tricho-*

*monas vaginalis*. *Ureaplasma urealyticum*, dont la pathogénicité est discutée, est une cause plus rare d'urétrite [1]. *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* peuvent se compliquer d'une épididymite chez l'homme, une endocervicite, endométrite ou salpingite chez la femme.

### Examens complémentaires

Toute suspicion d'urétrite doit être confirmée biologiquement : un prélèvement bactériologique avant traitement est indispensable. Le prélèvement urétral n'est plus réalisé à la curette mais à l'aide d'un écouvillon non traumatique. Les examens biologiques suivants seront donc réalisés en 1<sup>re</sup> intention sur le prélèvement urétral et sur le premier jet urinaire. En cas de négativité, une spermoculture peut aussi être proposée (plus souvent positive en cas de symptômes prostatiques) :

- examen direct avec coloration de Gram (recherche de pyogènes, de gonococque et de *T. vaginalis*) ;
- msc en culture traditionnelle ;
- msc en culture sur milieu spécifique pour *U. urealyticum* ;
- PCR à la recherche de *C. trachomatis* et PCR à la recherche de *Mycoplasma genitalium*.

Les sérologies ne sont plus recommandées.

## URÉTRITE (2)

### Traitement étiologique [1]

Les traitements probabilistes des urétrites non compliquées sont monodoses, permettant d'interrompre rapidement la contagiosité, de favoriser l'observance thérapeutique et de limiter la pression antibiotique, facteur de résistance.

#### Urétrite gonococcique

- Une injection unique par voie IM de 500 mg de **ceftriaxone** (aucune souche résistante en France à ce jour, bonne diffusion pharyngée).
- Ou une prise orale unique de 400 mg de **céfixime**, en cas de refus ou d'impossibilité d'administrer un traitement par voie parentérale ; son niveau de bactéricidie est moins élevé et sa biodisponibilité variable.

En cas d'allergie aux bêta-lactamines :

- une injection unique de 2 g de spectinomycine ; sa mauvaise diffusion pharyngée n'en fait pas un traitement de première intention ;
- ou une prise orale 500 mg de **ciprofloxacine**. Du fait de l'augmentation des résistances aux **fluoroquinolones** (40 % en 2007), ce traitement ne sera proposé que sous contrôle de l'antibiogramme. Un traitement anti-*Chlamydia* sera systématiquement associé.

#### Urétrite à *C. trachomatis*

- **Azithromycine** : 1 g en monodose PO.
- Ou **doxycycline** : 200 mg/j en 2 prises PO pendant 7 j.

#### Urétrite à *M. genitalium*

Le traitement actuellement recommandé est l'**azithromycine** 250 à 500 mg/j pendant 5 j ou en cas d'échec la **moxifloxacine** 400 mg/j pendant 10 j.

#### Urétrite à *U. urealyticum* (pathogénie discutée)

**Érythromycine** : 500 mg × 4/j pendant 7 à 14 j ou **doxycycline** (10 % de souches résistantes) 200 mg/j pendant la même durée.

#### Urétrite à *T. vaginalis*

Une prise orale de 2 g de **nitro-imidazolé**, éventuellement répétée 10 à 30 j plus tard.

### Mesures associées

Dépister et traiter le(s) partenaire(s) ++.  
Proposer un dépistage pour rechercher d'autres infections sexuellement transmissibles : sérologies VIH 1/2, VHB, VHC (transmission sexuelle possible), syphilis (TPHA/VDRL), en tenant compte des délais de séroconversion. Rechercher de condylomes. Les mesures de prévention incluent les rapports protégés pendant 7 j en cas de dose unique, ou jusqu'à la fin du traitement en plusieurs prises, et jusqu'à la disparition des symptômes.

### CONSENSUS

[1] Recommandations de bonnes pratiques cliniques : diagnostic et traitement des urétrites aiguës non compliquées de l'homme, AFU, 2010

**ANTIBACTÉRIENS URINAIRES (1) – NITROFURANE**

## ■ Nitrofurantoïne

<b>FURADANTINE</b>					
1 (préventif) à 3 (curatif) gél. x 3/j	21 gél. 50 mg 100 gél. 50 mg	3,32 HOP	I I	65 %	0,16

**PROPRIÉTÉS**

Antibiotique bactériostatique à forte élimination urinaire, actif sur de nombreuses souches d'*E. coli* et autres entérobactéries, ainsi que certains streptocoques.

**INDICATIONS**

Cystites simples (curatif, préventif).

**CONTRE-INDICATIONS**

**Grossesse** : au 9<sup>e</sup> mois (hémolyse possible si déficit en G6PD).

**Allaitement** : déconseillé.

Insuffisance rénale sévère.

Déficit en G6PD.

Allergie aux furanes.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Prendre pendant les repas (améliore la tolérance digestive).

Éviter la prise associée d'alcool (effet antabuse).

Efficacité modeste à pH urinaire alcalin (pour certains, acidification urinaire associée).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées et vomissements fréquents.

Effet antabuse avec l'alcool.

Réactions immuno-allergiques générales, cutanées, pulmonaires.

Neuropathies optiques et périphériques.

Hypertension intracrânienne.

Hémolyse aiguë (si déficit en G6PD).

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Résorption limitée par les **antiacides**.

Antagonisme avec les **quinolones**.

## CYSTITES AIGÜES INFECTIEUSES (2)

### Traitement « minute » ou monodose [1] [2]

Ce traitement empirique (pas de documentation bactériologique) est efficace (sauf en cas de staphylocoques) et économique. L'observance est assurée, il y a peu d'effets latéraux et pas de sélection de souches résistantes.

### Conditions d'application strictes

- femme de moins de 65 ans ;
- pas d'immunodépression ;
- pas de diabète ;
- pas de grossesse ;
- pas de fièvre ;
- pas de lombalgies ;
- pas d'uropathie connue ;
- pas d'intervention urologique récente (y compris endoscopie) ;
- premiers symptômes récents (moins de 3 j).

### Antibiotiques validés (éviter les $\beta$ -lactamines)

- Fosfomycine - trométamol (**MONURIL, URIDOL**) : 3 g. C'est le traitement recommandé en première intention pour épargner les fluoroquinolones.
- En seconde intention (allergie à la fosfomycine ou échec), il est actuellement discuté de proposer un traitement minute. Un traitement par 5 j de **FURADANTINE** est actuellement recommandé mais les traitements suivants sont efficaces et ont

l'avantage d'être des traitements minutes. Aucune *Evidence Base Medicine* ne compare les différents traitements.

- **BACTRIM FORTE** : 3 cp. ;
- ofloxacine (**OFLOCET**) : 400 mg ;
- ciprofloxacine (**CIFLOX, UNIFLOX**) : 500 mg.

Actuellement, l'utilisation des quinolones doit être évitée lors des infections urinaires basses non compliquées afin de préserver l'émergence de résistances. Ces molécules sont toutefois très efficaces et ne doivent pas être abandonnées à l'échelle individuelle. La seule certitude est d'éviter absolument la prescription de **quinolones** pour le traitement de la cystite simple si la patiente a pris des **quinolones** dans les 6 derniers mois.

Mesures associées : hyperdiurèse  $\pm$  **antalgiques**.

### Traitement court (3 j) ou conventionnel (7 à 10 j) (en dehors de la grossesse)

Traitement court et conventionnel sont le plus souvent équivalents ; ce dernier sera toutefois préféré en cas de récurrence ou rechute, symptômes  $\geq 7$  j, diabète, âge  $> 65$  ans, ou port d'un diaphragme.

Les **antibiotiques** préconisés actuellement sont :

- norfloxacine (**NOROXINE 400**), 400 mg x 2/j ;
- ofloxacine (**OFLOCET**), 200 mg x 2 /j ou lévofloxacine (**TAVANIC**), 1 cp./j ;
- **BACTRIM FORTE**, 3 cp./j ;
- loméfloxacine (**DÉCALOGIFLOX, LOGIFLOX**), 400 mg/j.

## ANTIBACTÉRIENS URINAIRES (2) – AMINOSIDE

## ■ Spectinomycine

<b>TROBICINE</b>					
Traitement «minute» par 1 inj. IM profonde exclusivement d'une amp. à 2 g Possibilité d'augmenter la posologie à 4 g (2 sites d'injection distincts)	1 pdre + solv. pour sol. inj. 2 g	5,62	I	65 %	5,62

**PROPRIÉTÉS**

La **spectinomycine** possède une structure chimique proche de la famille des **aminosides** mais se distingue de cette famille puisqu'elle présente une stéréochimie particulière et ne possède pas de sucre aminé ce qui caractérise les **aminosides**. Néanmoins, les analogies importantes entre la **spectinomycine** et les **aminosides** expliquent leurs profils pharmacocinétiques et leurs potentiels toxiques comparables.

**INDICATIONS**

Traitement des blennorragies gonococciques aiguës et donc des urétrites gonococciques chez l'homme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité à la **spectinomycine**. Chez l'enfant de moins de 3 ans.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

L'association avec des composés à potentiel néphrotoxique doit être réalisée avec précaution en raison des similarités entre la **spectinomycine** et les **aminosides**.

Attention : **TROBICINE** n'est pas actif sur d'autres agents responsables d'IST.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

On peut noter des douleurs au site d'injection, un syndrome pseudogrippal, des rougeurs et de rares cas de réactions de type anaphylactique et anaphylactoïde.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Il convient de surveiller étroitement l'INR des patients sous anticoagulants comme souvent lors d'antibiothérapies et plus généralement dans un contexte infectieux.

## ALCALINISANTS URINAIRES

## ■ Bicarbonate de sodium

EAUX DE VICHY					
Célestin 1 L = 3 g de $\text{HCO}_3 \text{ Na}$	1 bouteille 1 L			NR	
St-Yorre 1 L = 4 g de $\text{HCO}_3 \text{ Na}$	1 bouteille 1 L			NR	

## ■ Sels de citrate

CITRATE DE POTASSIUM OFFICINAL					
2 à 8 g/j (diluer dans 1 L d'eau)	pdre			NR	
FONCITRIL					
Contient <b>citrate de sodium</b> de <b>potassium</b> et <b>acide citrique</b> ; 2 à 4 sach./j	30 sach.			NR	

## ■ Trométamol (ou THAM) + citrates de sodium et de potassium

ALCAPHOR					
Contient <b>citrate de sodium</b> de <b>potassium</b> et <b>trométamol</b> Posologie : 2 à 4 càs./j	1 fl. 250 mL (2,3 g ou 10 mmol de THAM/càs)		I	NR	

## PROPRIÉTÉS

L'alcalinisation favorise la solubilisation des cristaux d'acide urique et de cystine.

## INDICATIONS

Lithiase urique (prévention, traitement).  
Lithiase cystinique.  
Acidoses tubulaires distales.

## CONTRE-INDICATIONS

Alcalose.  
pH urinaire 7 (et lithiase infectieuse).  
Surcharge hydrosodée (sauf pour le **trométamol** qui ne contient pas de sel).

Hyperkaliémie (pour le **citrate de potassium**).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Risque d'alcalose métabolique en cas de fortes doses et d'insuffisance rénale avancée.  
Prudence chez l'insuffisant cardiaque (sauf **trométamol**).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Diarrhée, gastralgies.  
Surcharge hydrosodée (sauf **trométamol**).  
Hyperkaliémie (**citrate de potassium**).

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Quinidine.

**ANTIANDROGÈNES (1)**■ **Nilutamide**

<b>ANANDRON</b>					
300 mg/j pendant 4 sem. puis 150 mg/j	90 cp. 50 mg	137,33	I	100 %	1,53
	30 cp. 150 mg	128,25	I	100 %	4,28

■ **Flutamide**

<b>FLUTAMIDE BIOGARAN</b>					
1 cp. x 3/j	30 cp. 250 mg	28,33	I	100 %	0,94

■ **Bicalutamide**

<b>CASODEX</b>					
1 cp./j en continu	30 cp. 50 mg	55,40	I	100 %	1,85
<b>ORMANDYL</b>					
Idem <b>CASODEX</b>	30 cp. 50 mg	72,42	I	100 %	2,57

■ **Cyprotérone**

<b>ANDROCUR</b>					
4 à 6 cp. /j	20 cp. 50 mg	12,09	I	65 %	0,60
2 à 3 cp. /j	60 cp. 100 mg	86,83	I	100 %	1,45

■ **Enzalutamide**

<b>XTANDI</b>					
160 mg (4 caps.) en 1 prise/j	112 caps. 40 mg	3374,48	I	100 %	30,13

## CANCER DE LA PROSTATE (2)

### Traitement curatif

Prostatectomie totale ou radiothérapie à dose curative justifiées si l'espérance de vie est > 10 ans. Les 2 traitements ont *a priori* une efficacité comparable avec un avantage pour la chirurgie en survie sans progression après 12 ans.

La curiethérapie est une option valable pour les petits cancers (moins de 20 mm sur les biopsies) à bas risque uniquement au sein de prostates d'un volume total inférieur à 50 mL.

#### ► Prostatectomie totale (ou « radicale »)

##### Technique

La lymphadénectomie ilio-obturatrice bilatérale doit être réalisée pour les cancers à haut risque ou à risque intermédiaire, et si le bilan d'imagerie (TDM, IRM ou PET-scan à la choline) montre des adénopathies ilio-obturatrices.

La chirurgie, réalisée par voie ouverte ou laparoscopique, avec ou sans assistance robotisée, consiste en une ablation de la prostate, des vésicules séminales et des ampoules déférentielles. La préservation des bandelettes neurovasculaires où cheminent les nerfs érecteurs est possible si la tumeur est petite et intracapsulaire.

##### Complications

- Les troubles de l'érection sont fréquents (80 % des cas), même après conservation des nerfs érecteurs (50 % des cas).
- L'incontinence permanente est rare (< 5 %) mais l'incontinence d'effort est fréquente (20 %, augmentée avec l'âge).
- La sténose de l'anastomose uréthro-vésicale est rare.

Après prostatectomie totale, le taux de PSA à 2 mois doit être indétectable.

#### ► Radiothérapie externe

- Environ 76 Gy délivrés en fractionné (5 séances/sem. pendant 1 mois).
- Les complications sont l'asthénie (marquée et fréquente), les troubles de l'érection (50 %), l'incontinence (1 à 5 %), les cystites, rectites ou iléites radiques, et les

sténoses urétrales, plus rarement urétérales.

La chute des PSA est très progressive, s'étalant parfois sur 1 à 2 ans. Le PSA n'est qu'exceptionnellement indétectable. La guérison est définie par un PSA stable à son niveau le plus bas.

#### ► Curiethérapie

- Implantation percutanée sous contrôle échographie et endoscopique de grains d'iode 125.
- Nécessite une hospitalisation de 24 h.
- Les complications sont comparables à la radiothérapie externe mais les troubles de l'érection et les troubles de la continence sont plus rares. En revanche, la pollakiurie et la dysurie sont des complications fréquentes ; la curiethérapie n'est donc pas proposée en cas d'adénome prostatique associé ou en cas de troubles urinaires du bas appareil.

### Cancer localement avancés et cancer métastatiques [2]

#### Stades T3 N0 ou NxM0

Chez les patients jeunes, une radiothérapie peut être utilisée à visée curative, en association avec une hormonothérapie par **agonistes de la LH-RH** pendant 2 ans. Dans certains cas sélectionnés, une prostatectomie totale peut être proposée associée un curage ganglionnaire étendu (ilio-obturateur, iliaque primitif, pré-sacré, iliaque interne).

#### Stades T4, N+ ou M+

Grâce à l'hormonodépendance du cancer prostatique (80 %) un traitement palliatif par castration est très efficace. Il peut être mis en œuvre dès le diagnostic porté ou dès l'apparition des symptômes cliniques.

#### ► Castration chirurgicale

Pulpectomie ou orchidectomie bilatérale : c'est le traitement le plus simple et le moins coûteux.

#### ► Castration chimique ou médicamenteuse

En cas de refus du patient ou de contre-indications à la chirurgie, plusieurs traitements hormonaux sont possibles.



**ANTIANDROGÈNES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Antiandrogène non stéroïdien bloquant les récepteurs des androgènes ou la liaison androgène-récepteur, sans autre activité hormonale.

**INDICATIONS**

Cancer de la prostate, en prescription simultanée avec une castration chirurgicale ou médicamenteuse par **agonistes de la LH-RH** ou en continu pour un blocage androgénique total. Au premier mois de la castration chimique la prescription est destinée à éviter le *flare up* et doit être débutée quelques jours avant.

L'**enzalutamide** est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ayant progressé après au moins une chimiothérapie préalable contenant du **docétaxel** et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible appropriée.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique.

**Nilutamide** : insuffisance respiratoire (risque de pneumopathie interstitielle).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller les transaminases, l'état respiratoire, la vision. Interrompre le traitement en cas d'élévation des transaminases, de dyspnée, de troubles de l'accommodation et de la vision des couleurs.

Pour l'**enzalutamide**, une surveillance cardiovasculaire et neurologique est recommandée.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Troubles de l'érection.

Bouffées de chaleur.

Troubles de l'accommodation à l'obscurité et de la vision des couleurs.

Effet antabuse et hépatite.

Troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée.

Aplasie médullaire.

Pour le **flutamide** il faut noter la possibilité de méthémoglobinémies et de photosensibilisation.

Pour l'**enzalutamide**, il faut également noter des troubles neurologiques (céphalées, troubles de mémoire ou cognitifs) et un risque d'hypertension artérielle.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Le **nilutamide** peut perturber le métabolisme des **antivitamines K**, **phénytoïne**, **propranolol**, **chlordiazépoxyde**, **diazépam** et **théophylline**.

En cas de traitement anticoagulant : contrôler l'INR et réduire si nécessaire la posologie des **AVK**.

L'**enzalutamide** est métabolisé par le CYP 2C8 : il convient donc d'éviter une association avec un inducteur (**rifampicine**) ou un inhibiteur (**gemfibrozil**) de ce CYP. C'est par ailleurs un inducteur puissant du CYP3A4, d'où une interaction importante avec certaines molécules : **praziquantel**, **télaprévir**, **voriconazole**, **inhibiteurs de protéases** boostés par **ritonavir** sont contre-indiqués.

**AGONISTES DE LA LH-RH (1)****■ Triptoréline**

<b>DÉCAPEPTYL</b>					
0,1 mg pendant 7 j puis relais par la forme LP	7 amp. inj. SC 1 mL = 0,1 mg + 7 fl. pdre	40,90	I	100 %	5,84
<b>DÉCAPEPTYL LP</b>					
1 IM/3 mois	1 inj. IM 11,25 mg	376,15	I	65 %	376,15
1 IM/6 mois	1 inj. IM 22,5 mg	715,44	I	100 %	715,44
1 IM/4 sem.	1 inj. IM 3 mg	134,44	I	65 %	134,44
<b>GONAPEPTYL</b>					
1 IM ou SC/4 sem.	1 inj. 3,75 mg	121,43	I	65 %	121,43
<b>SALVACYL LP</b>					
1 IM/12 sem.	1 inj. 11,25 mg	387,45	I	100 %	387,45

**■ Leuproréline**

<b>ELIGARD</b>					
1 SC/mois	1 ser. pdre + ser. solv. 7,5 mg	123,89	I	100 %	123,89
1 SC/3 mois	1 ser. pdre + ser. solv. 22,5 mg	339,58	I	100 %	339,58
1 SC/6 mois	1 ser. pdre + ser. solv. 45 mg	648,01	I	100 %	648,01
<b>ENANTONE LP</b>					
1 IM/4 sem.	1 fl. pdre + solv. + ser. + aig. 3,75 mg	137,17	I	65 %	137,17
1 IM/12 sem.	1 fl. pdre + solv. + ser. + aig. 11,25 mg	376,15	I	65 %	376,15
1 SC/26 sem. (6 mois)	1 fl. pdre + solv. + ser. 30 mg	715,44	I	100 %	715,44

## CANCER DE LA PROSTATE (4)

### Cancer de prostate métastatique hormonorésistant

Après une période moyenne d'environ 24 mois, le cancer de prostate devient hormonorésistant (échappement hormonal).

L'existence de clones cellulaires encore hormonosensibles justifie de laisser le traitement hormonal en association avec la chimiothérapie.

Les **taxanes** sont le traitement de référence : **docétaxel (TAXOTÈRE)** avec un maximum de 7 à 10 cures et plus récemment la **cabazitaxel**.

En cas de progression après chimiothérapie, de nouvelles molécules sont actuellement en développement de phase III (**MDV3100**, **abiratéron**, etc.) avec des résultats très prometteurs qui laissent

peut-être envisager leur utilisation avant chimiothérapie.

### Complications des stades métastatiques

- Douleurs osseuses : **antalgiques, corticoïdes, bisphosphonates (ZOMETA)**, anticorps monoclonal (**XGEVA**) et à plus long terme hormonothérapie sont efficaces. La radiothérapie est prescrite en cas de douleurs rebelles ou de compression neurologique associée.
- Complications cardiovasculaires des traitements hormonaux.
- Syndrome métabolique.
- Complications liées à l'évolution locale : dysurie, rétention vésicale chronique, hématurie, insuffisance rénale avec urétéro-hydronephrose par envahissement du trigone vésical et des bas-uretères (nécessitant un drainage permanent par sondes urétérales).

### CONSENSUS

[1] Dépistage du cancer de la prostate - Analyse critique des articles issus des études ERSPC (European Randomized Study of screening for Prostate Cancer) et PLCO : Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (cancer screening trial) (mars 2009), HAS, 2010

[2] Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Cancer de la prostate, AFU, 2010

## AGONISTES DE LA LH-RH (2)

## ■ Busaréline

SUPREFACT					
Forme nasale pour traitement d'entretien : 2 pulv. x 3/j (600 µg/j) En moyenne, traitement d'induction de 7 j à raison de 500 µg en SC, x 3/j puis x 2/j pulvérisations nasales	1 fl. sol. nasale : 100 µg/pulv. (1 mg/mL)  2 fl. 6 mL (mg/mL)		I	NR	
		39,33	I	100 %	19,67
BIGONIST					
1 implant à placer dans la paroi abdominale toutes les 8 sem.	1 implant SC 6,3 mg + ser.	285,30	I	100 %	285,30

## ■ Goséréline

ZOLADEX					
1 implant toutes les 4 sem.	1 ser. 3,6 mg	123,85	I	100 %	123,85
1 implant toutes les 12 sem.	1 ser. 10,8 mg	339,46	I	100 %	339,46

## PROPRIÉTÉS

Les **agonistes de la LH-RH** sont des décapeptides de synthèse qui provoquent l'arrêt de la sécrétion de LH hypophysaire. Ils se fixent en effet sur les récepteurs de la LH-RH et empêchent l'action de cette hormone. Ils suppriment ainsi la fonction testiculaire et entraînent une réduction des taux de la testostérone sérique équivalents à ceux d'une castration.

Lors de l'instauration du traitement, il existe une stimulation initiale du taux de LH (effet *flare up*) qui provoque une élévation transitoire de la testostérone et un risque de poussée évolutive d'un cancer. Il convient à ce stade d'associer un **antiandrogène** périphérique, pendant 1 mois environ.

## INDICATIONS

Cancer de prostate métastasé.

Cancer de prostate extracapsulaire et cancer localisé évolutif non justiciable d'un traitement curatif.

Cancer de prostate localisé à risque intermédiaire ou élevé, en association avec la radiothérapie.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux composants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérification de l'effet biologique et du PSA tous les 6 mois (et de la testostéronémie en cas de doute sur l'observance).

## EFFETS INDÉSIRABLES

Poussée évolutive lors du début du traitement évitée par l'adjonction systématique d'**antiandrogènes** périphériques.

Manifestations de la castration : bouffées de chaleur, troubles de l'érection, gynécomastie.

Rarement : fièvre, nausées, vomissements, constipation ou diarrhée, arthralgies.

Manifestations cardiovasculaires : hypertension artérielle, tachycardie, palpitations.

Troubles neurologiques et psychiatriques (troubles de la vue, syndrome dépressif, somnolence), chute des cheveux qui doivent faire changer de produit ou interrompre le traitement.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune dans cette indication.

## ŒSTROGÈNES ANTIANDROGÉNIQUES

## ■ Diéthylstilbestrol

<b>DISTILBÈNE</b>					
1 à 3 mg/j	26 cp. 1 mg	13,98	II	100 %	0,54

**PROPRIÉTÉS**

Les œstrogènes à forte dose (œstradiol retard) et les œstrogènes de synthèse ont une action directe sur le tissu prostatique cancéreux et une action indirecte d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire induisant la diminution de la sécrétion d'androgènes.

**INDICATIONS**

Cancer de la prostate hormono-dépendant.

**CONTRE-INDICATIONS**

Maladies thromboemboliques, cardiovasculaires et hépatiques.  
Diabète, obésité, insuffisance rénale.  
Intoxication tabagique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance du poids, de la PA, dépistage clinique des symptômes faisant craindre une

complication : céphalées, troubles oculaires, épilepsie, asthme, dépression et troubles métaboliques (hyperglycémie, hypertriglycémie, hypercholestérolémie).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Outre les effets de la castration (gynécomastie, troubles de l'érection, bouffées de chaleur), hypertension artérielle, œdème des membres inférieurs, accidents vasculaires et thromboemboliques, ictère et adénome hépatique, hyperlipidémie, épilepsie.  
Douleurs et démangeaisons anogénitales.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Inhibition de l'efficacité de médicaments à métabolisme hépatique : **rifampicine, barbituriques, hydantoïnes**.

## ■ Estramustine

<b>ESTRACYT</b>					
2 gél. midi et soir à la fin des repas	40 gél. 140 mg	90,56	I	100 %	2,26
Augmentation des doses possible jusqu'à 6 gél./j	100 gél. 140 mg	218,66	I	100 %	2,19

**PROPRIÉTÉS**

Double action œstrogénique et chimiothérapeutique.

**INDICATIONS**

Cancer prostatique métastatique en échappement hormonal.

**CONTRE-INDICATIONS**

Celle des **œstrogènes** : ne doit pas être utilisé en première intention du cancer prostatique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance de l'hémogramme et des tests hépatiques.  
En cas de risque thromboembolique un traitement anticoagulant est justifié.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées, vomissements (associer un traitement antiémétique), accidents thromboemboliques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Éviter les produits lactés et les médicaments contenant du **calcium**.  
Adapter le traitement des diabétiques (effet hyperglycémiant).

INHIBITEURS 5- $\alpha$  RÉDUCTASE - PRODUITS EXTRAITS DE PLANTES

## ■ Finastéride

<b>CHIBRO-PROSCAR</b>					
1 cp./j	28 cp. 5 mg	23,03	I	30 %	0,82

## ■ Dutastéride

<b>AVODART</b>					
1 cp./j	30 caps. 0,5 mg	24,60	I	30 %	0,82

## PROPRIÉTÉS

Inhibiteurs spécifiques de la 5  $\alpha$ -réductase (enzyme convertissant la testostérone en dihydrotestostérone).

Diminue progressivement le volume de la prostate (- 20 %) et améliore les symptômes liés à un adénome dans un certain nombre de cas après 6 mois de traitement.

Résorption digestive (80 %), fixation protéique (93 %), métabolisation en dérivés inactifs, élimination mixte (fécale et urinaire) rapide, non modifiée par l'insuffisance rénale.

## INDICATIONS

Proposé dans l'hypertrophie bénigne de prostate : provoquant des manifestations fonctionnelles gênantes avec des symptômes congestifs et irritatifs prédominants.

## ■ Produits extraits de plantes

<b>PERMIXON</b>					
1 gél. x 2/j au cours des repas durant 3 mois	60 gél. 160 mg 180 gél. 160 mg	25,12 69,12	I I	30 % 30 %	0,42 0,38
<b>TADENAN</b>					
1 caps. x 2/j avant les repas durant 3 mois	30 caps. 50 mg 60 caps. 50 mg	12,76 24,94	I I	30 % 30 %	0,43 0,42

## PROPRIÉTÉS

Médicaments extraits de plantes (**PERMIXON** 160 mg : extrait de *Serenoa repens* ou Palmier de Floride ; **TADENAN** 50 mg : extrait de *Pygeum africanum* ou *Prunus africanus*). Mécanisme d'action précis inconnu mais efficacité récemment démontrée.

## INDICATIONS

Proposé dans l'hypertrophie bénigne de prostate : provoquant des manifestations fonctionnelles gênantes avec des symptômes congestifs et irritatifs prédominants.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des constituants.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance urologique indispensable, afin de dépister :

- une indication au traitement chirurgical ;
- un cancer de prostate associé.

Le **finastéride** réduit le taux des PSA (jusqu'à 50 %), ce qui rend son interprétation délicate. Prudence en cas d'insuffisance hépatocellulaire : pharmacocinétique non étudiée, posologie inconnue.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Possibles : troubles de l'érection, diminution de la libido, diminution du volume de l'éjaculat. Exceptionnellement : gynécomastie, hypersensibilité (gonflement des lèvres, éruption cutanée).

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveillance urologique indispensable, afin de dépister :

- une indication au traitement chirurgical ;
- un cancer de prostate associé.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement : nausées, constipation ou diarrhée.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune connue à ce jour.

## ALPHABLOQUANTS (PROSTATE) (1)

## ■ Alfuzosine

<b>XATRAL</b>					
2,5 mg x 2 à 3/j (débuter par 5 mg le soir (sans dépasser 10 mg/j))	30 cp. 2,5 mg	9,80	I	30 %	0,33
5 mg x 1 à 2/j Débuter par une dose faible le soir	30 cp. LP 10 mg	19,24	I	30 %	0,64
<b>URION</b>					
2,5 mg x 2 à 3/j Débuter le soir au coucher	30 cp. 2,5 mg	9,80	I	30 %	0,33

## ■ Tamsulosine

<b>JOSIR LP</b>					
0,4 mg x 1/j à la fin du petit-déjeuner	30 gél. LP 0,4 mg	10,29	I	30 %	0,34
<b>OMIX LP</b>					
Idem <b>JOSIR LP</b>	30 gél. LP 0,4 mg	10,29	I	30 %	0,34
<b>MECIR LP</b>					
Idem <b>JOSIR LP</b>	30 cp. LP 0,4 mg	10,29	I	30 %	0,34
<b>OMEXEL LP</b>					
1 cp./j	30 cp. 0,4 mg	10,29	I	30 %	0,34

## ■ Térazosine

<b>DYSALFA</b>					
Posologie progressive 1 mg/j, puis 2 mg/j à J2, puis 5 mg/j à J9 le soir	15 cp. 1 mg 28 cp. 5 mg	8,00 14,53	I I	30 % 30 %	0,53 0,50

## ■ Prazosine

<b>MINIPRESS</b>					
Posologie progressive : 0,5 mg x 2/j puis 1 mg x 2/j jusqu'à 2 mg x 2/j max.	30 cp. séc. 1 mg 30 cp. séc. 5 mg	4,80 18,18	I I	65 % 65 %	0,16 0,61

## ■ Doxazosine

<b>ZOXAN LP</b>					
4 mg/j et en fonction de la réponse 8 mg/j en une prise	28 cp. LP 4 mg 28 cp. LP 8 mg	12,70 16,82	I I	30 % 30 %	0,45 0,60

## ■ Silodosine

<b>UROREC</b>					
8 mg/j en 1 prise Posologie initiale de 4 mg/j recommandée chez l'IR modéré	30 gél. 4mg 30 gél. 8mg	14,78 14,78	I I	30 % 30 %	0,49 0,49

**ALPHABLOQUANTS (PROSTATE) (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

Alphabloquant des récepteurs  $\alpha_1$ -postsynaptiques, ayant un tropisme particulier pour les récepteurs urinaires (trigone vésical, urètre et prostate), améliorant les symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate dans plus de 50 % des cas. Ces produits ont aussi un effet systémique vasculaire : vasodilatation artérielle et veineuse, pouvant induire une baisse de la pression artérielle (en particulier en orthostatisme), et parfois une tachycardie réflexe.

Après résorption digestive (65 %), liaison aux protéines plasmatiques (90 %), la demi-vie de ces produits est de 6 h (sauf la **silodosine** : 11 h) : métabolisation en dérivés inactifs, puis élimination digestive (biliaire et fécale).

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique de l'hypertrophie bénigne de prostate : manifestations fonctionnelles gênantes, notamment avec des signes obstructifs, en dehors des indications chirurgicales.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypotension orthostatique.

Hypersensibilité connue aux **quinazolines** (**alfuzosine**, **prazosine**).

Association aux autres  $\alpha_1$ -bloquants.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveillance urologique indispensable, afin de dépister :

- une indication au traitement chirurgical;
- un cancer de prostate associé.

Rechercher une hypotension orthostatique (clinique et/ou manométrique) ; préconiser un passage progressif en orthostatisme, et une mise en décubitus en cas de symptômes lipotymiques (vertiges, sueurs, fatigue).

Débuter à dose faible, le soir, progressive et avec prudence chez les sujets âgés, les conducteurs et utilisateurs de machines (risque d'hypotension orthostatique), et les coronariens (effet tachycardisant possible avec risque d'angor fonctionnel, efficacement prévenu par un traitement  $\beta$ -bloquant).

La **silodosine** n'a pas fait l'objet d'études cliniques chez les insuffisants hépatiques et insuffisants rénaux sévères.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypotension orthostatique dose-dépendante, parfois syncopale (à traiter par mise en décubitus, puis réduction des doses ou interruption du traitement).

Troubles digestifs : nausées, gastralgies, diarrhée.

Rarement : palpitations, tachycardie, angor fonctionnel (à prévenir par un traitement  $\beta$ -bloquant), asthénie, somnolence, céphalées, bouche sèche, prurit, éruptions cutanées, flush, œdèmes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Associations contre-indiquées : autres  $\alpha_1$ -bloquants (**alfuzosine**, **moxisylyte**, **prazosine**, **urapidil**).

Associations déconseillées : certains **anti-hypertenseurs vasodilatateurs** (**dihydralazine**, **minoxidil**).

Associations à manier avec précaution :

- **anticalciques** ;
- **antidépresseurs** ;
- **antipsychotiques** ;
- **anesthésiques généraux**.

La **prazosine** ( $\alpha_1$ -bloquant commercialisé en tant qu'antihypertenseur) peut également être utilisée en urologie, à la dose de 1 à 2 mg/j en 2 prises.



**ANTISPASMODIQUES ANTICHOLINERGIQUES**■ **Oxybutynine**

<b>DITROPAN</b>					
1/2 à 1 cp. x 3/j	60 cp. 5 mg	4,90	II	30 %	0,08
<b>DRIPTANE</b>					
Idem <b>DITROPAN</b>	60 cp. 5 mg	4,90	I	30 %	0,08

■ **Flavoxate**

<b>URISPAS</b>					
1 cp. x 3/j	42 cp. 200 mg	6,27	II	15 %	0,15

■ **Toltérodine**

<b>DÉTRUSITOL</b>					
1 cp. x 2/j	28 cp. 1 mg		II	NR	
	28 cp. 2 mg		II	NR	

■ **Solifénacine**

<b>VESICARE</b>					
5 mg en 1 prise/j, 10 mg/j max. si nécessaire	30 cp. 5 mg	35,40	II	30 %	1,18
	30 cp. 10 mg	35,40	II	30 %	1,18

■ **Trospium**

<b>CERIS</b>					
1 cp. x 2/j soit 40 mg/j 1 cp./j si ins. rénale	30 cp. 20 mg	7,05	I	30 %	0,14

**PROPRIÉTÉS**

Anticholinergiques antispasmodiques, ils diminuent la contractilité du détrusor.

**INDICATIONS**

Besoins impérieux chez la femme.

**CONTRE-INDICATIONS**

Glaucome par fermeture de l'angle.

Dysurie.

Obstacle urétral.

Myasthénie.

Bronchite chronique.

Atonie intestinale.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Ce sont des effets atropiniques :

- sécheresse de la bouche ;
- troubles visuels, diminution de la sécrétion lacrymale ;
- tachycardie, céphalées ;
- constipation ;
- nausées, dyspepsie ;
- rarement convulsions, éruptions cutanées.

**INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES (1)**■ **Sildénafil**

<b>VIAGRA</b>					
1 cp. 30 min à 1 h avant l'activité sexuelle La dose peut être réduite à 25 mg ou augmentée jusqu'à 100 mg (dose maximale)	4 cp. 25 mg		I	NR	
	8 cp. 25 mg		I	NR	
	4 cp. 50 mg		I	NR	
	8 cp. 50 mg		I	NR	
	12 cp. 50 mg		I	NR	
	4 cp. 100 mg		I	NR	
	8 cp. 100 mg		I	NR	
	12 cp. 100 mg		I	NR	

■ **Tadalafil**

<b>CIALIS</b>					
Idem <b>VIAGRA</b>	28 cp. 2,5 mg		I	NR	
	28 cp. 5 mg		I	NR	
	4 cp. 10 mg		I	NR	
	4 cp. 20 mg		I	NR	
	8 cp. 20 mg		I	NR	
<b>ADCIRCA</b>					
40 mg/j en une prise	30 cp. 20 mg	35,40	I	30 %	1,18
	30 cp. 20 mg	35,40	I	30 %	1,18

■ **Vardénafil**

<b>LEVITRA</b>					
Idem <b>VIAGRA</b>	4 cp. 5 mg		I	NR	
	4 cp. 10 mg		I	NR	
	8 cp. 10 mg		I	NR	
	4 cp. 20 mg		I	NR	
	8 cp. 20 mg		I	NR	
	12 cp. 20 mg		I	NR	
	20 cp. 20 mg		I	NR	

## DYSFONCTION ÉRECTILE (2)

### Traitement médicamenteux

Ils sont utilisés en première intention.

#### Alphabloquants

Yohimbine (**VASOBRA**, **CARLYTÈNE**).

#### Inhibiteurs des phosphodiésterases

Les **inhibiteurs des phosphodiésterases**.

Ex. : **sildénafil (VIAGRA)** ; **tadalafil (CIALIS)** ; **vardénafil (LEVITRA)** provoquent une augmentation du taux de GMP cyclique responsable de la myorelaxation des fibres musculaires lisses du tissu érectile. Le remplissage vasculaire des corps caverneux est rendu ainsi possible et provoque la rigidité de la verge.

Le délai pour parvenir à la concentration plasmatique maximale (Tmax) est d'environ 1 h pour le **VIAGRA** et le **LEVITRA** qui ont une demi-vie d'élimination de 4 à 5 h. La durée d'action du **VIAGRA** est de 4 à 5 h. Celle du **LEVITRA** n'est pas précisée. Le Tmax du **CIALIS** est d'environ 2 h, sa demi-vie d'élimination est de 17,5 h et sa durée d'action est de 36 h ; pour ce dernier, un délai de 2 j est à respecter entre 2 prises.

#### Traitement androgénique

Il est surtout utile en cas d'hypoandrogénie avec baisse de la libido. Après vérification d'absence de cancer de la prostate (toucher rectal, dosage des PSA), de cancer mammaire (palpation) et de syndrome métabolique (poids, bilan lipidique, numération formule sanguine) prescription d'**androgènes** (cf. Hypogonadismes) :

- **PANTESTONE** per os : 3 caps. à 40 mg/j, 3 j/sem. puis 1 à 3/j suivant les résultats ;
- **ANDROTARDYL** : 1 amp. à 250 mg : 1 inj. toutes les 3 sem. ou tous les mois.

Une hormonothérapie substitutive par les androgènes ne doit être entreprise qu'en cas d'indication claire, c'est-à-dire devant des signes cliniques évocateurs de déficit androgénique lié à l'âge confirmés biologiquement par deux dosages de testosté-

ronémie inférieurs à la normale.

Il s'agit d'un traitement au long cours, nécessitant une surveillance clinique et biologique régulière. Cette surveillance est une responsabilité partagée : le médecin doit insister auprès du patient sur la nécessité de bilans périodiques de ce traitement, instauré *a priori* à vie.

#### Injections intracaverneuses (IIC)

On peut utiliser l'**alprostadil (CAVERJECT, EDEX)**.

La PGE1 est un agent inducteur de l'érection, par l'intermédiaire de récepteurs intracaverneux, dont la stimulation provoque une relaxation du muscle lisse par augmentation de la concentration de l'AMPc.

#### Indications

- Contre-indication ou intolérance au traitement oral.
- Échec du traitement oral.
- Chirurgie carcinologique prostatique (prostatectomie radicale sans préservation des bandelettes vasculonerveuses) ou vésicale (cysto-prostatectomie totale).
- Préférence du patient (problèmes du non-remboursement des traitements oraux, efficacité supérieure à celle des traitements oraux).

#### Remboursement

Les **IIC** de PGE1 sont remboursées dans certaines indications (avec un formulaire de médicaments d'exception) :

- neuropathie diabétique avérée ;
- para ou tétraplégie ;
- séquelles de la chirurgie (prostatectomie radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale) ou de la radiothérapie abdomino-pelvienne ;
- sclérose en plaques ;
- séquelles de priapisme ;
- séquelles de la chirurgie vasculaire (anévrisme de l'aorte) ;
- traumatismes du bassin compliqués de troubles urinaires.

**INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTÉRASES (2) – PHARMACOLOGIE****PROPRIÉTÉS**

L'afflux sanguin dans les corps caverneux est dû à un relâchement des muscles lisses qui à l'état normal sont contractés autour des artérioles des corps caverneux. Ce relâchement est lié à l'action de la guanosine-monophosphate cyclique (GMPc) dont la concentration augmente sous l'effet d'une enzyme (la guanylate cyclase) activée par le monoxyde d'azote libéré par la stimulation sexuelle.

Les **inhibiteurs des phosphodiesterases** empêchent la dégradation de la GMPc en inhibant l'enzyme responsable, la phosphodiesterase de type 5 (PDE5) pour laquelle ils sont sélectifs. L'érection est ainsi amplifiée et maintenue plus longtemps, mais ce mécanisme d'action explique la nécessité d'une stimulation sexuelle pour que l'érection se produise.

Le temps nécessaire pour obtenir une érection suffisante pour un rapport sexuel est de 10 à 30 min. Cette érection peut être obtenue jusqu'à 4 à 5 h plus tard.

**INDICATIONS**

Traitement des troubles de l'érection (incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante). On peut aussi utiliser ces molécules dans l'hypertension artérielle pulmonaire (hors AMM).

**CONTRE-INDICATIONS**

Elles sont principalement cardiovasculaires. Patients chez lesquels l'activité sexuelle est déconseillée (angor instable, insuffisance cardiaque grave).

Insuffisance coronarienne. Antécédents d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral.

Prise de certains médicaments : **hypotenseurs, dérivés nitrés** (potentialisation), **nitroprussiate de sodium, nitrite d'amyle** (poppers).

Rétinite pigmentaire et autres troubles héréditaires dégénératifs de la rétine.

Insuffisance hépatique sévère.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Les **inhibiteurs des phosphodiesterases** ne doivent être prescrits qu'après avoir recherché une cause organique aux troubles de l'érection (neurologique, hormonale, diabète) et les pathologies comportant un risque de priapisme.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Hypotension artérielle : la baisse de la PA est de 8 mmHg pour la maxima et 5,5 mmHg pour la minima.

Céphalées (12,8 %), rougeur de la face (10,4 %), sensations vertigineuses (1,2 %), dyspepsie, congestion nasale.

Priapisme.

Des effets passagers sur la vision des couleurs sont possibles : diminution de la discrimination des nuances entre bleu et vert, probablement par baisse de la PDE6 nécessaire à la transduction des couleurs dans les cellules rétiennes.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Diminution de la clairance du **sildénafil** lors de la prise de **kétoconazole, érythromycine, cimétidine**.

Potentialisation de l'effet des **dérivés nitrés**.

**INJECTIONS INTRACAVERNEUSES****■ Alprostadil**

<b>CAVERJECT</b>					
Inj. intracaverneuse	1 fl. 10 µg/mL	11,59	I	30 %	11,59
La posologie strictement individuelle doit être déterminée par le médecin, puis auto-injections à domicile en respectant les doses	1 fl. 20 µg/mL	11,59	I	30 %	11,59
<b>CAVERJECT DUAL</b>					
Inj. intracaverneuse	2 cart. 10 µg/0,5 mL	22,64	I	30 %	11,32
	2 cart. 20 µg/0,5 mL	22,64	I	30 %	11,32
<b>EDEX</b>					
Inj. intracaverneuse	2 fl. 10 µg/mL	23,80	I	30 %	11,90
	2 fl. 20 µg/mL	23,80	I	30 %	11,90
<b>MUSE</b>					
Inj. intra-urétrale	1 bâton 250 µg		I	NR	
Posologie initiale : 250 µg. max 2/j, 7/sem.	1 bâton 500 µg		I	NR	
	1 bâton 1 000 µg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Vasodilatateurs entraînant une rigidité du tissu érectile.

**INDICATIONS**

Troubles de l'érection.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypotension artérielle.  
 Accident cardiovasculaire récent.  
 Hypersensibilité aux prostaglandines.  
 Risque de priapisme : drépanocytose, myélome, leucémies.  
 Partenaire enceinte.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Traitement anticoagulant.  
 Maladie de La Peyronie avec coudure.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Douleur au point d'injection.  
 Hématome.  
 Priapisme.  
 Érythème et douleur testiculaire ou périanale, hypotension, arythmie, vertiges, céphalées, choc vagal et collapsus.  
 Fibrose des corps caverneux.  
 Dépôts d'hémossidérine dans le pénis.

## ALPHABLOQUANTS (DYSFONCTION ÉRECTILE)

## ■ Yohimbine

<b>YOHIMBINE HOUDÉ</b>					
3 cp. x 3/j loin des repas	50 cp. 2 mg			NR	
<b>YOCORAL</b>					
3 à 4 cp./j en 3 prises	50 cp. 5 mg		I	NR	
Max. 4/j	100 cp. 5 mg		I	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Sympathicolytique  $\alpha$ -bloquant.

**INDICATIONS**

Dysfonction érectile.

**CONTRE-INDICATIONS**

Insuffisance hépatique et rénale. Spasmes vasculaires cérébraux ou rétiens. Traitement par

médicaments  $\alpha$ -mimétiques (**CATAPRESSAN** et analogues).

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nervosité, insomnie, tremblements, vertiges, migraines.

Nausées, vomissements, diarrhée.

Hypotension orthostatique, tachycardie.

Priapisme.

## ■ Dihydroergocryptine + caféine

<b>VASOBAL</b>					
2 cp./j	30 cp. séc.		II	NR	
	60 cp. séc.		II	NR	
2 mes./j	25 mes. (mes. = 40 gtt = 2 mL) dans 1 fl. de 50 mL		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Association d'un  $\alpha$ -bloquant psychostimulant et de caféine, proposé pour accroître la circulation sanguine cérébrale et le métabolisme cérébral.

**INDICATIONS**

Troubles vasculaires de l'érection chez le sujet âgé.

**CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées rarement.

## ■ Moxisylyte

<b>CARLYTÈNE</b>					
1 cp. x 3/j	32 cp. 30 mg		II	NR	

**PROPRIÉTÉS**

Alphabloquant entraînant une vasodilatation artérielle dans certains territoires.

**INDICATIONS**

Dysfonction érectile.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Nausées.

Hépatite cytotytique.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Surveiller les transaminases.

**ANTAGONISTE DE LA LH-RH****■ Dégarélix**

<b>FIRMAGON</b>					
Initiation : 240 mg en 2 inj. SC Entretien mensuel : 80 mg en 1 inj. SC	1 fl. pdre et solv. pour sol. inj.	148,93	I	100 %	148,93
	2 fl. pdre et solv. pour sol. inj.	264,68	I	100 %	132,34

**PROPRIÉTÉS**

Antagoniste sélectif des récepteurs de la LH-RH. Il implique une diminution de la sécrétion de la LH, de la FSH et donc de la testostérone. Les taux de DHT circulante sont corrélés à la diminution de sécrétion de testostérone qui est maintenue sous le seuil de castration médicale. Temps de demi-vie : 28 j pour la dose d'entretien, expliqué par la libération très lente du composé à partir du dépôt formé au site d'injection.

**INDICATIONS**

Traitement du cancer hormonodépendant avancé de la prostate.

**CONTRE-INDICATIONS**

Hypersensibilité au **dégarélix**.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**FIRMAGON** doit être exclusivement administré par voie SC et pas par voie IV.

La diminution prolongée des taux d'androgènes peut conduire à un allongement de l'intervalle QT, il faut également s'attendre à un effet sur la densité osseuse.

Diminution de la tolérance au glucose et aggravation d'un diabète préexistant possibles.

**EFFETS INDÉSIRABLES**

Les réactions au site d'injection sont fréquentes à l'initiation du traitement mais sont transitoires et de sévérité faible. Elles se caractérisent par une douleur, un érythème local et parfois un gonflement qui peut être induré. Les effets observés sont pour la plupart directement liés à la suppression de la sécrétion de testostérone : bouffées de chaleur, prise de poids, anémie, hyperhidrose, gynécomastie, atrophie testiculaire, dysfonction érectile et fatigue.

D'autres effets indésirables sont observés : insomnies, céphalées, nausées, vomissements ainsi qu'augmentation des transaminases hépatiques.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Aucune étude d'interaction spécifique n'a été menée. Le **dégarélix** n'est ni inducteur, ni inhibiteur ni pris en charge par les principaux CYP450 humains.

Un allongement de l'intervalle QT est attendu en raison de la suppression androgénique, il convient d'évaluer avec précaution toute utilisation concomitante avec les médicaments connus pour allonger l'intervalle QT : les **antiarythmiques de classe IA (quinidine, etc.) et III (amiodarone, etc.)**, les **antipsychotiques**, certains **antidépresseurs**, les **fluoroquinolones**, les **macrolides**, les **imidazolés et triazolés**.

## INHIBITEUR SÉLECTIF DE RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

## ■ Dapoxétine

PRILIGY				
Posologie initiale : 30 mg/prise Posologie d'entretien : 30 à 60 mg/prise selon la réponse clinique et la survenue éventuelle d'effets indésirables À prendre 1 à 3 h avant l'activité sexuelle, à la demande, max x 1/j Arrêt progressif du traitement (syndrome de sevrage)	3 cp. 30 mg		I	NR
	6 cp. 30 mg		I	NR
	3 cp. 60 mg		I	NR
	6 cp. 60 mg		I	NR

## PROPRIÉTÉS

Puissant inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS), potentialisant l'action du neurotransmetteur au niveau du système nerveux sympathique.

## INDICATIONS

Traitement de l'éjaculation précoce (EP) chez les hommes adultes âgés de 18 à 64 ans présentant **tous** les critères suivants :

- temps de latence d'éjaculation intravaginale (IELT) < 2 min ;
- ET éjaculation survenant, de façon permanente ou récurrente, avec une stimulation sexuelle minimale, avant, pendant ou peu de temps après la pénétration et avant que le patient ne le souhaite ;
- ET souffrance personnelle importante ou difficultés interpersonnelles consécutives à l'EP ;
- ET mauvais contrôle de l'éjaculation ;
- ET antécédents d'EP dans la majorité des rapports sexuels au cours des 6 derniers mois.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité.

Pathologie cardiaque : insuffisance cardiaque (NYHA II-IV), trouble de la conduction, cardiopathie ischémique, valvulopathie, antécédent de syncope.

Antécédent de manie ou de dépression sévère.

Insuffisance hépatique modérée ou sévère.

Épilepsie non contrôlée.

Cf. Interactions médicamenteuses.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prudence dans ces situations :

- insuffisance rénale chronique (si sévère, traitement déconseillé) ;
- antécédent d'hypotension orthostatique (test orthostatique avant traitement) ;
- hypertension oculaire, glaucome à angle fermé ;
- facteurs de risque cardiovasculaires (bilan cardiovasculaire avant traitement) ;
- syndrome hémorragique ;
- épilepsie contrôlée.

Le patient doit être averti des symptômes pré-curseurs des syncopes et éviter en conséquence les situations dangereuses (utilisation de machines, conduite).  
Contient du lactose.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Très fréquents : hypotension orthostatique, sensations vertigineuses, céphalées, nausées.  
Fréquents : anxiété, insomnie, somnolence, diarrhée, fatigue, trouble de la vision.  
Peu fréquents : syncope, dépression, tachycardie ou bradycardie, mydriase.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

**Contre-indications absolues :**

- alcool (augmentation des effets indésirables) ;
- **inhibiteurs de la monoamine-oxydase**, autres **ISRS**, **inhibiteurs de recapture de la sérotonine** et de la **noradrénaline**, **antidépresseurs tricycliques** (augmentation de l'activité sérotoninergique) ;
- thioridazine (inhibition de son métabolisme par la **dapoxétine**) ;
- L-tryptophane, **triptans**, **tramadol**, **linéolide**, **lithium**, millepertuis (augmentation de l'activité sérotoninergique) ;

**La dapoxétine peut être instaurée 14 j après arrêt du traitement par les médicaments ci-dessus. Le traitement peut reprendre 7 j après arrêt de prise de dapoxétine.**

- inhibiteurs puissants du CYP3A4 : **kétoconazole**, **itraconazole**, **ritonavir**, **saquinavir**, **nelfinavir**, **atazanavir**, **télithromycine**, **néfazodone**, etc. (inhibition du métabolisme de la **dapoxétine**) ;
  - inhibiteurs de phosphodiesterase 5 (PDE5) : **sildénafil**, **tadanafile**, **vardénafil** ;
  - kétamine, LSD, MDMA (augmentation de l'activité sérotoninergique).
- Prudence avec les médicaments actifs sur le SNC, aux propriétés vasodilatatrices, métabolisés par les CYP3A4, 2D6, 2C9 ou 2C19, inhibiteurs modérés du CYP3A4, inhibiteurs puissants du CYP2D6, **anticoagulants**, **antiagrégants plaquettaires**, **AINS**, **tamsulosine**.



## INHIBITEUR DE LA BIOSYNTÈSE DES ANDROGÈNES

## ■ Acétate d'abiratéronne

ZYTIGA					
2 à 4 cp en une prise quotidienne. Ne doit pas être pris avec de la nourriture	120 cp. 250 mg	3612,58	I	100 %	30,10

## PROPRIÉTÉS

L'**acétate d'abiratéronne** est une prodrogue transformée *in vivo* en abiratéronne qui est le métabolite actif. L'abiratéronne est un inhibiteur de la synthèse des androgènes par inhibition sélective du CYP17.

## INDICATIONS

Cancer métastatique de la prostate résistant à la castration, progressant durant/après une chimiothérapie comportant du **docétaxel**. En association avec la **prednisone/prednisolone**.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'abiratéronne et ses prodrogues. Chez la femme en âge de procréer (à avoir en tête bien que la population cible soit masculine).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'inhibition du CYP17 conduit à une hausse du taux de minéralocorticoïdes pouvant causer une HTA, une hypokaliémie et une rétention hydrique. Cela justifie la co-administration de **corticoïdes** qui agissent par rétrocontrôle négatif sur la production d'ACTH. Ainsi, la pression artérielle, la kaliémie et la rétention hydrique doivent être surveillées avant et tout au long du traitement.

On peut observer une accentuation de la dimi-

nution de la densité osseuse souvent préexistante dans ce type de pathologie.

Une surveillance des transaminases est nécessaire :

- si ALAT > 5N : arrêt du traitement puis réintroduction à 500 mg/j lors du retour aux valeurs normales ;
- si ALAT > 20N : arrêt définitif du traitement ;
- si des valeurs anormales sont réobservées après réintroduction du traitement à 500 mg/j, le traitement doit être arrêté définitivement.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents sont : HTA, hypokaliémie, œdèmes périphériques, infections urinaires.

Fréquemment : élévation des ALAT, insuffisance cardiaque, angine de poitrine, fibrillation auriculaire, tachycardie.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La prise alimentaire lors de l'administration augmente l'absorption de l' **acétate d'abiratéronne** (cf. Posologie).

Les inhibiteurs/inducteurs puissants du CYP3A4 doivent être évités car l'abiratéronne en est un substrat. Les substrats du CYP2D6 à marge thérapeutique étroite doivent être associés avec précaution (certains **β-bloquants**, **antidépresseurs tricycliques**, **antipsychotiques** tels que l' **halopéridol** ou la **rispéridone** ainsi que des dérivés de la **codéine/morphine**).



# Guide de Thérapeutique

Léon Perlemuter - Gabriel Perlemuter

Outil constamment actualisé, indispensable à la pratique médicale quotidienne, destiné aux étudiants préparant les épreuves classantes nationales et aux médecins prescripteurs.

Pour cette 8<sup>e</sup> édition, les stratégies thérapeutiques et la pharmacologie ont été mises à jour en tenant compte des consensus qui sont intégrés avec leurs liens internet. De nouvelles molécules sont insérées et les prix et taux de remboursement actualisés.

Plus de 1000 pathologies classées dans 17 spécialités. Pour chaque pathologie, en vis-à-vis :

## Les **bonnes pratiques cliniques** :

- les éléments indispensables à la stratégie de prescription ;
- les meilleurs choix de traitement tenant compte des consensus lorsqu'ils existent ;
- les modes d'administration ;
- la durée et les éléments de surveillance du traitement ;
- les aléas et problèmes éventuels ;
- les adaptations thérapeutiques au cours du suivi médical.

## La **prescription**, avec plus de 3000 médicaments, dans des tableaux clairs comprenant :

- la classe ;
- la DCI ;
- le nom commercial ;
- le mode de prescription ;
- la liste sur laquelle est inscrit le médicament ;
- le prix par conditionnement et par unité ;
- le taux de remboursement.

Les DCI qui existent sous forme de générique sont identifiées en rouge.

## Pour chaque classe de médicament, une **pharmacologie** rappelle :

- les propriétés ;
- les indications, contre-indications et précautions d'emploi ;
- les effets indésirables et incompatibilités.

À la fin du livre, un index très détaillé renvoie aux renseignements recherchés.

## L'ouvrage de référence

réalisé par une équipe de spécialistes de haut niveau  
rompus à la prescription de terrain.



Application en vente  
pour iPhone, iPad et Android

Retrouvez tous nos ouvrages  
sur [www.elsevier-masson.fr](http://www.elsevier-masson.fr)

ISBN 978-2-294-73971-2

